

BAKTERI PADA SAYAP LALAT RUMAH DAN LALAT HIJAU

IDENTIFIKASI MOLEKULER BAKTERI
PADA SAYAP LALAT RUMAH (*MUSCA DOMESTICA*)
DAN LALAT HIJAU (*CHRYSOMYA SP*)
BERDASARKAN HADIS BUKHARY



Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.
Subair, S.Si., M.Kes.
dkk.

BAKTERI PADA SAYAP LALAT RUMAH DAN LALAT HIJAU

oleh:

Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.; Subair, S.Si., M.Kes.
Handayani Halik, S.Si., M.Kes.; Novita Syarif, S.Si.
Mukarramah, S.Si.; Rusny, S.Pt., M.Si.

©2020

Editor: Imanda
Desain Sampul: Ridha Kelana
Layouter: Afandi

Diterbitkan oleh
Bitread Publishing
PT. Lontar Digital Asia
www.bitread.co.id

Surel: info@bitread.co.id
Facebook: BitreadID
Twitter: BITREAD_ID
Android Digital Books: BitRead

Anggota IKAPI No. 556/DKI/2018

ISBN: 978-623-224-502-0
ISBN (E): 978-623-224-503-7

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء
والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. أمّا بعد

Segala puji bagi Allah swt. yang maha Pengasih dan Penyayang atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul **“Identifikasi Molekuler Bakteri Pada Sayap Lalat Rumah *Musca domestica* Dan Sayap Lalat Hijau *Chrysomya sp* Yang Terilhami Dari Hadis Bukhary Tentang Lalat”**.

Dari awal hingga akhir dalam proses penyusunan buku ini, penulis tidak luput dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun, semua itu dapat diatasi dengan kesabaran, ketekunan, kerja keras dan doa mengharap petunjuk dari Allah Swt. dan dalam penyusunan buku ini, penyusun merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknik penulisan maupun materi. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan buku ini di masa mendatang.

Penulis juga menyadari bahwa buku ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memperlancar jalannya penyusunan buku ini. Oleh karena itu, secara mendalam, saya sampaikan terima kasih kepada semua yang membantu dalam penyelesaian buku ini, di antaranya:



- 
1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan dalam membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan universitas lain.
 2. Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami.
 3. Bapak dan Ibu Pegawai Laboratorium Mikrobiologi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin (RSP UNHAS) yang senantiasa menjadi teman diskusi selama penulisan berlangsung.
 4. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi semangat dan doa untuk keberhasilan penulis menyelesaikan buku ini.

Semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan dan menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah. *Aaaamiin Yaa Robbal 'Alamiin*.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang dilimpahkan rahmat dan rida-Nya. *Aamiin*.

Makassar, Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
LALAT DAN HADIS YANG RELEVAN	9
Ayat dan Hadis yang Relevan	24
Analisis Kandungan	25
Tinjauan Umum Insecta	47
Tinjauan Umum Lalat Rumah <i>M. domestica</i>	49
Tinjauan Umum Lalat Hijau <i>Chrysomya</i> sp	52
Tinjauan Umum Bakteri	57
Klasifikasi Bakteri	60
Bakteri yang Teridentifikasi pada Penelitian	65
Pemeriksaan Molekuler	85
Dasar dasar Pemeriksaan Bakteri	91
Media dan Hewan Percobaan (Kulturasi dan Inokulasi)	100
Inokulasi pada Hewan Percobaan	112
Pewarnaan Bakteri dengan Pewarnaan Gram	114
Identifikasi secara Umum Bakteri Gram Negatif	120
Kerangka Pikir	129



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN	131
Jenis dan Lokasi Penelitian	133
Pendekatan Penelitian	133
Populasi dan Sampel	133
Variabel Penelitian	133
Defenisi Operasional Variabel	134
Instrumen Penenelitian	135
Prosedur Kerja	136


BAB IV

BAKTERI PADA SAYAP LALAT RUMAH

DAN LALAT HIJAU	147
Bakteri pada Sayap Lalat Rumah <i>Musca domestica</i>	148
Bakteri pada Sayap Lalat Hijau <i>Chrysomya sp</i>	154
Pembahasan	164

BAB V

PENUTUP	179
KEPUSTAKAAN	182
LAMPIRAN-LAMPIRAN	188
PROFIL PENULIS	
TENTANG BITREAD	216



BAB I

PENDAHULUAN





Salah satu jenis bakteri yang teridentifikasi dari sayap lalat rumah (*Musca Domestica*) adalah *Bacillus cereus*, bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, bakteri ini mampu menghasilkan spora yang tahan terhadap panas dan proses dehidrasi.

وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى
جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ. (رواه البخارى)

Artinya:

Nabi saw. bersabda: Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian maka tenggelamkan kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya.

Terilhami dari hadis yang terdapat di dalam kitab Shahih Bukhary no. 5336 di atas, telah dilakukan dua penelitian di jurusan biologi UIN Alauddin Makassar di tahun 2016, mengenai identifikasi bakteri secara biokimia, mikrobiologi, dan molekuler yang terdapat pada sayap kiri dan kanan lalat rumah (*Musca domestica*), dan penelitian mengenai identifikasi bakteri secara biokimia, mikrobiologi dan molekuler yang terdapat pada sayap kiri dan kanan lalat hijau (*Chrysomya sp*).

Fakta yang kami peroleh dari penelitian pertama bahwa dari sayap lalat rumah (*Musca Domestica*) teridentifikasi bakteri *Bacillus cereus*. Bakteri *Bacillus cereus* ini merupakan bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, bakteri ini mampu menghasilkan spora yang tahan terhadap panas dan proses dehidrasi. Kasus keracunan yang terjadi dan telah dilaporkan sampai saat ini sering dikaitkan dengan makanan olahan dari tepung nabati seperti pasta, nasi, kentang, roti dan mie.

Pada penelitian ke dua didapatkan hasil 3 jenis bakteri pada sayap lalat hijau (*Chrysomya sp*), yakni bakteri *Acinetobacter baumannii*, bakteri *Escherichia coli* dan bakteri *Pantoea*



aglomerans. Tiga spesies bakteri tersebut merupakan bakteri patogen, yang berperan sebagai vektor pembawa suatu penyakit, yakni bakteri *Acinetobacter baumannii*, menyebabkan penyakit infeksi pneumonia, ISK, *meningitis*, *septikemi*, infeksi luka bakar atau luka operasi. *Escherichia coli* menyebabkan penyakit diare akut. Sementara itu, *Pantoea aglomerans* menyebabkan penyakit *bakteremia*, infeksi saluran pernapasan bawah, infeksi kulit, infeksi jaringan lunak, infeksi saluran kemih, *endokarditis*, infeksi intraabdominal, *septic arthritis*, *osteomyelitis*, dan infeksi mata.

Dari kedua penelitian tersebut, kemudian dilakukan kajian eksplorasi yang terilhami dari hadis Bukhary bahwa pada lalat begitu banyak bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, sedangkan di satu sisi lalat sangat dekat dengan kehidupan manusia. Hadis Bukhary seakan menjadi pencerah bahwasanya di balik bakteri patogen yang ditemukan pada lalat, ternyata Allah sudah menitipkan anti bakteri pada sayap yang lain pada lalat tersebut. Secara nalar keilmuan, hal ini sangat dapat diterima, mengingat fakta bahwa lalat bisa hidup walaupun dengan bakteri yang terdapat di sayapnya, artinya Allah sang pendesain sejati sudah menyiapkan anti bakteri pada sayap yang lainnya. Hal tersebut kemudian mengilhami kami untuk melakukan *Grand Design Multy Years Research* yang mana secara garis besar dibagi menjadi beberapa tahap.

1. Tahap pertama (2016-2018): Identifikasi bakteri pada sayap lalat *Musca Domestica* dan lalat *Chrysomya sp.*
2. Tahap ke dua (2019): Uji antagonis Bakteri patogen yang diperoleh dari tahap pertama dengan berbagai macam bakteri yang diperoleh dari sayap lainnya dari masing masing lalat.

3. Tahap ke tiga (2020): Isolasi, identifikasi dan pemurnian senyawa anti bakteri yang diperoleh dari tahap kedua.

Buku ini akan membahas tahapan pertama dari *Grand Design Multy Years Research* ini. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan hadis dalam kitab Shahih Bukhary no. 5336 dalam kerangka sains yang sistematis dan mengidentifikasi jenis bakteri pada sayap lalat *Musca Domestica* dan lalat *Chrysomya sp.*

Pada dasarnya, penelitian terkait hal ini bukanlah hal baru, terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang serupa dan dapat dijadikan acuan. Prof Brefild (1871) dari Universitas Hall di Jerman, misalnya, bertahun-tahun yang lalu telah melakukan penelitian tentang lalat dan ditemukan bahwa dalam badan lalat terdapat mikroba-mikroba (bakteri-kuman). Mikroba-mikroba tersebut dapat membunuh kuman-kuman penyakit di mana mikroba tersebut terdapat dalam perut dan punggung lalat dan kedua bagian tubuh lalat tersebut tidak pernah bersentuhan langsung dengan tempat hinggapnya atau benda apapun saat terbang karena selalu dijaga oleh kaki, bulu dan sayap.

Menurut Retno Hestningsih (2004), lalat *Chrysomya sp* dominan ditemukan pada tempat penampungan sampah akhir (TPA); Di antara keempat spesies bakteri penyebab penyakit Gastrointestinal yang diperkirakan (*E. coli*, *Salmonella sp*, *Shigella sp*, dan *Vibrio sp*) tidak semua ditemukan, hanya *E. coli* yang dapat ditemukan, adapun species lain yang dapat diidentifikasi adalah *Klebsiella pnemoniae*, *Bacillus sp.* dan *Enterobacter aerogenes* (dominan pada lalat dan sampah di lokasi penampungan sampah yang dijadikan lokasi pengambilan sampel), kemudian *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus sp.*,



Proteus morgani dan *Proteus mirabilis*; Kontaminasi bakteri pada lalat *Chrysomya megacephala* dan lalat *Musca domestica* berasal dari tempat penampungan sampah.

Pada penelitian Suraini (2011), Jenis bakteri *Enterobacteriaceae* yang ditemukan pada permukaan tubuh lalat *M. domestica* dan *C. megacephala* yaitu *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Proteus sp*, *Serratia marcescens* dan satu jenis bakteri basil dari genus *Bacillus sp*.

Para peneliti lain dari Inggris yaitu Prof. Kock, Famer dan dari Jerman yaitu Rose dan Etlengger (2010), juga melakukan penyelidikan dan berkesimpulan sama. Mereka juga membuktikan bahwa berbagai macam penyakit dan bakteri pada lalat hanya terdapat pada ujung kaki dan bukan pada seluruh tubuh lalat.

Penelitian Dr. Juan Clark (2009) yang dilakukan di Australia, menemukan bahwa seekor lalat membawa antibiotik yang dapat mengobati sejumlah penyakit yang terdapat pada tubuh bagian luarnya. Berbagai riset juga telah dilakukan oleh para peneliti. Mereka menemukan bahwa seekor lalat yang membawa sejumlah penyakit, juga membawa antibiotik yang menetralkan penyakit-penyakit tersebut. Oleh karena itu, lalat tidak pernah terserang penyakit yang dibawanya.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Tim Departemen Mikrobiologi Medis, Fakultas Sains, Universitas Qashim, Kerajaan Arab Saudi, beberapa peneliti yaitu Sami Ibrahim al-Taili, 'Adil 'Abd al-Rahman al-Misnid, Khalid Za'ar al-Utaibi yang dibimbing oleh Dr. Jamal Hamid, dan dikoordinasi oleh Dr. Salih al-Salih (seorang da'i terkenal di Eropa), melakukan penelitian tentang

analisis mikrobiologi tentang sayap lalat. Laporan ini mereka presentasikan ke acara “*Student Research Seminar*” di Universitas Qasim, KSA. Dalam laporan tersebut digunakan tiga species lalat dan setiap species lalat terdiri atas 2 sampel, pada sampel pertama lalat hanya dimasukkan ke dalam air steril tanpa merendam ataupun mencelupkan lalat tersebut dan sampel yang kedua lalat dimasukkan ke dalam air steril dan juga dicelupkan seluruh tubuhnya. Hasil kultur mikroba tersebut diidentifikasi untuk mengetahui jenis mikroba tersebut. Dalam laporan tersebut disimpulkan bahwa yang dapat diambil dari percobaan tersebut adalah masuknya lalat pada makanan maupun minuman dengan dicelup maupun tanpa dicelup ternyata memberikan hasil berbeda. Makanan yang dihinggapi lalat lalu dicelupkan dapat menghindari adanya bakteri-bakteri yang berbahaya.

Terdapat pula buku yang menjelaskan tentang lalat ditinjau dari segi fiqh dan medis seperti buku karangan Abu Na'im dengan judul “*Rahasia Sunnah; Kajian Syari'at Islam Tinjauan Fiqh dan Medis*”. Dalam buku ini, menjelaskan mengenai hadis tentang lalat ditinjau dari segi fiqh dan medis secara umum.

Pada praktiknya, buku ini disusun dan diterbitkan agar memiliki kegunaan bagi khalayak, di antaranya berupaya mempercepat perkembangan sains melalui penelitian dengan mengimplementasikan hadis yang terdapat di dalam kitab Shahih Bukhary no. 5336 melalui kerangka sains yang sistematis.

Selain itu, penerbitan buku ini adalah upaya untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai cikal bakal mewujudkan UIN Alauddin Makassar sebagai *research university*.



Sementara itu, dari segi praktis, penelitian ini berupaya menambah isolat bakteri pada jurusan Biologi UIN Alauddin Makassar untuk mewujudkan eksistensi UIN sebagai lembaga yang berintegrasikan sains dan agama.





BAB II

LALAT DAN HADIS

YANG RELEVAN





Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian, maka tenggelamkan kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya. (HR.Bukhary)

Setiap tahun, ratusan juta kasus penyakit yang disebabkan oleh serangga, siput, dan binatang mengerak, khususnya tikus (*insect-snail and rodent borne diseases*) menimbulkan tantangan kesehatan masyarakat secara global. Penyakit karena vektor (*vector borne diseases*) berkisar 17% sebagai prakiraan global dari penyakit-penyakit infeksi. Operasional, dana, dan permasalahan manajerial, bersama dengan perubahan lingkungan (*environmental change*), resistensi terhadap insektisida dan bertambahnya mobilitas penduduk menyebabkan bertambahnya prevalensi penyakit di dekade ini.

Penyakit-penyakit yang umumnya ditularkan melalui vektor, atau *hospes intermedier*, termasuk DBD, filariasis, Japanese Encephalitis (JE), leishmaniasis, malaria, *onchocerciasis*, *schistosomiasis*, dan *trypanosomiasis*. Akhir-akhir ini telah dikonfirmasi bahwa lalat rumah berperan dalam penularan secara mekanis penyakit *diarrhoeal* dan *trachoma*. Walaupun dua penyakit ini ditularkan pula melalui jalan lain. Namun, sebagai penyebab penting kematian anak dan kebutaan, lalat rumah perlu dipertimbangkan sebagai vektor penyakit utama yang signifikan.

Pengendalian vektor (*vector control*) merupakan komponen penting dalam program pengendalian beberapa penyakit tular vektor. Implementasi termasuk target, lokasi spesifik, dan penggunaan metode yang ada, sifat teknis dan kemungkinan operasional, sumber dan infrastruktur yang ada. Mereka harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip manajemen vektor terpadu (*integrated vector management*) dan proses penentuan keputusan berdasarkan bukti (*evidence-based decision-making process*). Hal tersebut kemudian diadaptasikan kepada kondisi



lokal yang rasional untuk penggunaan metode-metode pengendalian vektor dan sumber-sumber yang mengutamakan kebersamaan/partisipasi masyarakat.

Di beberapa negara endemis dengan infestasi hama, strategi pengendalian vektor telah dilakukan dengan skala besar. Mulai dari program pemerintah pusat sampai kepada program desentralisasi yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat secara umum.



PHYLUM: ARTHROPODA (BINATANG DENGAN TUBUH BERUAS/ BERBUKU-BUKU)

A. BINATANG TUBUH BERUS (Tiga Pasang Kaki)

- Kelas Insekta (Serangga)
 - Tipe mulut: menggigit dan menguyah
 - Ordo: Orthoptera (Kecoa)
 - Tipe mulut: menusuk, menghisap dan spons
 - Serangga - ada sayap (proboscis beruas)
 - a. Ordo: Hemiptera
 - Bed bug; Kissing bug
 - b. Ordo: Diptera
 - Lalat
 1. Lalat menggigit
 - *Tabanus* sp
 - *Chrysops* sp
 - *Simulium* sp
 - *Colicoides* sp
 - *Phlebotomus* sp
 - *Glossina* sps (Lalat Tse-tse)
 2. Lalat tidak menggigit
 - lalat rumah (*Musca domestica*)
 - lalat hijau (*Chrysomya beziana*)
 - lalat blirik (*Sarcophaga walfahria*)





- Nyamuk
 1. *Anopheles* spp
 2. *Culex* spp
 - *Aedes* spp
 - *Mansonia* spp
- Serangga - tidak ada sayap
 - a. Ordo: Siphonaptera (flea=pinjal)
 - b. Ordo: Anoplura (Kutu penghisap)

B. BINATANG TUBUH BERUAS (Empat pasang kaki)

- Kelas Arachnida
 - Scorpion (Kalajengking, Ketonggeng)
 - Spider (Kemonggo, Tarantula)
 - Tick (Caplak: *Boophylus* sp)
 - Mites (Tungau: *Leptothrombidium* sp)

C. BINATANG TUBUH BERUAS (Lima-Tujuh Pasang Kaki)

- Kelas Crustacea
 - Crab (Kepiting dan Yuyu)
 - Shrimps, Lobster (Udang-udangan)
 - Copepoda (*Mesocyclop* sp)

D. BINATANG TUBUH BERUAS (Sepuluh atau Lebih Pasang Kaki)

- Kelas: Chilopoda (Satu Pasang Kaki Setiap Ruas Badan)
 - Centipedes (Kelabang)
- Kelas: Diplopoda (Dua Pasang Kaki Setiap Ruas Badan)
 - Millipedes (Luwing)

ARTHROPODA SEBAGAI VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT

No.	Kelas	Vektor	Penyakit Ditularkan	Specific Agent
1.	Arachnida	Mites (Tungau)	Rickettsialpox	<i>Rickettsia akari</i>
			Tsutsugamushi (Scrub-typhus)	<i>Rickettsia tsutsugamushi</i>
		Tick (Caplak)	Relapsing fever	<i>Borrelia duttoni</i>
			Spoted fever	<i>Rickettsia rickettsia</i>
			Plague (Sampar/Pes)	<i>Pasteurella pestis</i>
			Tularemia	<i>Pasteurella tularensis</i>
2.	Insekta (Serangga)	Black flies (<i>Simulium</i> sp).	Onchocerciasis	<i>Onchocerca volvulus</i>
		<i>Colicoides</i>	Blue tongue	Virus
		<i>Chrysops</i> (Deer flies)	Loaiasis	<i>Loa-loa</i>
		<i>Tabanus</i> spp	Penyakit Sura (ternak)	<i>Trypanosoma evansi</i>
		Lalat rumah (<i>M. domestica</i>)	Amoebiasis	<i>Entamoeba histolytica</i>
			Balantidiasis	<i>Balantidium coli</i>
			Kholera	<i>Vibrio comma</i> (cholera)
			Polimyelitis	Virus type: 1, 2, 3
			Makanan beracun	<i>Staphylococcus</i> sp
				<i>Salmonella</i> sp dan <i>Streptococcus</i> sp
		Typhoid fever	<i>Salmonella</i> sp	
	Lalat hijau (<i>Crysomya</i> sp)	Myiasis	Larva lalat (<i>Crysomya</i> sp)	



No.	Kelas	Vektor	Penyakit Ditularkan	Specific Agent
		Lalat blirik (<i>Sarcophaga</i> sp)		
		<i>Phlebotomus</i> sp	Pappataci fever Kala azar	virus <i>Leishmania donovani</i>
		<i>Glossina</i> sp (Tse-tse)	Tripanosomiasis	<i>Trypanosoma gambiense</i>
		Cockroaches (Kecoa/lipas)	Kholera	<i>Vibrio comma</i> (cholera)
			Desentri	<i>Shigella</i> sp
			Makanan beracun	<i>Staphylococcus</i> sp
				<i>Salmonella</i> sp
				<i>Streptococcus</i> sp
			Balantidiasis	<i>Balantidium coli</i>
			Amoebiasis	<i>Entamoeba histolytica</i>
			Paratyphoid fever	<i>Salmonella</i> sp.
		Triatomine	Trypanosomiasis	<i>Trypanosoma cruzi</i>
		Pinjal (fleas): (<i>X. cheopis</i> ; <i>Stivalius cognatus</i>)	Plague (Sampar/Pes)	<i>Pasteurella pestis</i>
			Typhoid fever (endemic)	<i>Rickettsia mooseri</i>
		Kutu (Lice)	Relapsing fever (epidemic)	<i>Borrelia</i> sp
			Typhus fever (epidemic)	<i>Rickettsia prowazeki</i>
		Nyamuk		
		Anopheles	Malaria	<i>Plasmodium</i> sp
		Mansonia, Culex, Anopheles	Filariasis	<i>Wuchereria</i> sp; <i>Brugia</i> sp
		Culex	Japanese B. encephalitis	Virus
		Aedes	Yellow fever	Virus



No.	Kelas	Vektor	Penyakit Ditularkan	Specific Agent
			Demam Berdarah Dengue (DBD)	Virus
			Chikungunya	Virus
3.	Reservoir Penyakit	Tikus		
		Rattus Rattus diardii	Plague (Sampar/Pes)	<i>Pasteurella pestis/ Y. pestis</i>
		Rattus thiomanicus	Hanta virus	virus
		Rattus argentiventer	Leptospirosis	<i>Leptospira sp</i>
		Rattus exulans		

Lalat adalah serangga kecil yang dapat terbang; pada umumnya berwarna hitam. Ia suka hinggap pada tempat-tempat yang busuk lalau menyebarkan aneka kuman. Lalat bermacam-macam jenisnya. Salah satu jenis lalat yang dinamai lalat sehari mempunyai sekitar dua ribu macam. Usianya hanya beberapa hari bahkan ada yang hanya sehari. Seandainya Allah memberinya usia panjang, entah apa yang akan terjadi bagi manusia. Pasti hidup kita tidak akan tenang, karena seekor saja yang mengelilingi kita, saat akan tidur, walau hanya melalui bunyinya, maka itu sudah cukup mengganggu (M. Quraish, 2015).

Allah menyebut lalat dalam al-Qur'an untuk menggambarkan betapa kuasa-Nya dan betapa manusia dan lalat sungguh lemah. Allah berfirman dalam QS. al-Hajj [22]: 73-74:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ



شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿٧٢﴾ مَا قَدَرُوا

اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧١﴾

Artinya:

Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa

Ayat di atas menyebut lalat sebagai contoh karena lalat adalah binatang yang remeh, lemah, kotor, sekaligus banyak. Jika makhluk seperti demikian, maka tidak dapat diciptakan serta dihalangi gangguannya oleh apa yang dianggap oleh kaum musyrik sebagai Tuhan, dalam hal ini berhala-berhala, maka bagaimana mungkin mereka dipertuhan? (M. Quraish, 2015).

Masyarakat mengenal lalat sebagai binatang yang jorok karena berkembang biak di tempat-tempat yang kotor seperti di tempat sampah, kotoran manusia, hewan, dan bangkai serta, sisa-sisa makanan. Selain menyukai tempat yang kotor, lalat juga menyukai hinggap di makanan dan minuman sehingga makanan yang terkontaminasi oleh kuman-kuman yang dibawa oleh lalat akan menyebabkan penyakit. Lebih kurang 125.000



bibit penyakit disebarkan lalat pada lokasi yang dihinggapinya. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh lalat, di antaranya diare, tifus, disentri, kolera, dan TBC (Isnayanti, 2014).

Pada tahun 2009, United Nations Children's Fund (UNICEF) dan World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa diare merupakan penyebab kematian nomor 2 pada balita di dunia, nomor 3 pada bayi dan nomor 5 bagi segala umur. Diberitakan juga bahwa sekitar 1,5 juta anak meninggal dunia setiap tahunnya karena penyakit tersebut. Di Indonesia sendiri, diare termasuk penyebab utama kematian pada bayi dan balita pada tahun 2007 berdasarkan hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh kementerian kesehatan (Isnayanti, 2014).

Di sini seakan terdapat kontradiksi antara lalat sebagai pembawa penyakit dan lalat sebagai obat. Dalam riwayat terdapat dalam kitab Shahih Bukhary no. 3073, adalah sebagai berikut.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ.

(رواه البخارى)

Artinya:

Nabi saw. bersabda: Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian maka tenggelamkan kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya.



Dalam al-Qur'an, kata al-zubab hanya disebutkan sekali yaitu dalam QS al-Hajj/22: 73 yang merupakan perumpamaan kepada manusia bahwa segala yang disembah selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat, walaupun semua sesembahan mereka bersatu, sebagaimana yang diketahui bahwa hadis merupakan salah satu dari sumber hukum Islam setelah al-Qur'an yang wajib diikuti. Allah sendiri telah memerintahkan untuk mengikuti Rasul-Nya sebagaimana Allah Swt., berfirman dalam QS An-Nisa'/4: 59 yang berbunyi:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas membuktikan bahwa Allah telah mewajibkan untuk menaati rasul-Nya pada apa yang telah disyariatkan. Pada masa Rasulullah saw., para sahabat menaati semua perintah dan larangannya dan mereka pun tak membedakan antara hukum yang diwahyukan Allah dalam al-Qur'an dan hukum yang bersumber dari Rasulullah.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa lalat membawa dampak buruk bagi kesehatan bahkan sampai menyebabkan kematian, tetapi di sisi lain ada riwayat yang menganjurkan untuk mencelupkan lalat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang muncul adalah berapa besar potensi *M. Domestica* dan *Chrysomya sp* sebagai vektor penyakit yang terdapat pada sayap lalat tersebut dan bakteri apa yang terdapat pada sayap lalat tersebut, karena di dalam hadis terdapat pesan Rasulullah saw. mengatakan bahwa “Bila lalat terceburlah dalam minuman salah seorang dari kalian hendaklah ia mencelupkannya sekalian lalu mengangkatnya. Sebab, di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan di sayap yang lainnya terdapat obat” (HR. Bukhari).

Lalat yang termasuk subordo *Cyclorrhapha* (ordo Diptera) sering dijumpai dalam keseharian kita dan pada hampir semua jenis lingkungan. Di ekosistem tersebut lalat dapat berperan dalam proses pembusukan, sebagai predator, parasit pada serangga, dan polinator (Byrd et al., 2001).

Pada dasarnya, lalat kerap hinggap di makanan dan minuman. Akibatnya, makanan terkontaminasi oleh kuman-kuman yang dibawa oleh lalat sehingga menyebabkan penyakit. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh lalat, di antaranya diare, tifus, disentri, kolera dan TBC (Suheriyanto, 2008).

Namun, terdapat beberapa keistimewaan lalat dalam hadis Nabi Muhammad saw. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah (Fitriani, 2008).



Adapun riwayatnya terdapat dalam kitab Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, Juz 3, *bâb Idzâ Waqo'a adz-Dzubâb fi Syarôbi Ahadikum*, XI:99 (Cet. III; Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987 M/ 1407 H), h. 1206, hadîs no. 3073, adalah sebagai berikut.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءً.
(رواه البخارى)

Artinya:

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian maka tenggelamkan kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya. (HR. Bukhary)

Dalam hadis di atas berkaitan erat dengan penelitian yang akan dilakukan. Artinya, lalat tak hanya membawa penyakit, tetapi juga berfungsi sebagai penawar/obat.

Lalat yang termasuk subordo *Cyclorhapha* sebagian besar bersifat sinantropik karena pada habitat dan kehidupannya lebih banyak berasosiasi dengan kehidupan manusia. Hal ini menyebabkan lalat sinantropik lebih mudah menjadi vektor mekanis (Byrd dkk., 2001).

Kelompok lalat yang sering datang ke permukiman penduduk dan sering mengadakan kontak dengan manusia berasal dari famili Calliphoridae, terutama dari jenis *Chrysomia*

megacephala atau lalat hijau. Lalat tersebut berasal dari famili Muscidae, yaitu jenis *Musca domestica* yang lebih dikenal sebagai lalat rumah, lalat biru (*Calliphora vomitoria*), dan lalat rumah kecil (*Fannia canicularis*) (Simanjuntak, 2001).

Lalat juga dapat berperan sebagai vektor mekanik suatu penyakit, seperti amubiasis yang disebabkan oleh *Entamoeba histolytica*, giardiasis yang disebabkan oleh *Giardia lamblia*, ascariasis yang disebabkan oleh *Ascaris lumbricoides*, dan trichuriasis yang disebabkan cacing cambuk (*Trichuris trichiura*). Adapun penyebaran penyakit cacingan ascariasis dan trichuriasis termasuk luas dan kosmopolitan (Tan et al., 1997).

Penularan penyakit oleh lalat non-*biting flies* terjadi secara mekanis, karena secara morfologis bulu-bulu badannya, kaki-kaki serta bagian tubuh yang lain dari lalat non-*biting flies* merupakan tempat menempelnya mikroorganisme. Mikroorganisme patogen yang dibawanya dapat berasal dari sampah, kotoran manusia, dan binatang. Penyakit-penyakit yang ditularkan oleh lalat, antara lain disentri, kolera, dan diare yang berkaitan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk (Departemen Kesehatan RI, 2000).

Pada sisi lain, lalat dapat berfungsi sebagai pengurai binatang yang telah mati dan lalat juga bermanfaat terhadap tumbuhan yang lain. Beberapa spesies lalat berperan dalam proses penyerbukan (Ismail, 2008).

Penelitian mengenai berbagai aspek tentang lalat, khususnya mengenai bakteri yang terdapat pada sayap lalat dan keterkaitannya dengan hadis di atas masih terbatas sehingga perlu dilakukan identifikasi morfologi dan uji biokimia serta



identifikasi molekuler untuk mengetahui spesies bakteri yang diperoleh secara spesifik pada sayap lalat tersebut. Adapun penelitian ini dibatasi pada sayap rumah (*Musca domestica*) dan spesies lalat hijau (*Chrysomya* sp) yang berada di Perumahan Penduduk Bumi Sarindah, Samata Kab Gowa, Sulawesi Selatan.

A. Ayat dan Hadis yang Relevan

Terdapat berbagai jenis serangga yang hidup di atas muka bumi ini. Kepentingan serangga dalam kehidupan manusia bukan terletak pada bilangannya yang hampir 75% dari seluruh spesies hewan. Akan tetapi, serangga amat berperan dalam ekosistem dalam mewujudkan kesejahteraan hidup secara keseluruhannya. Justru, al-Qur'an telah membicarakan tentang serangga dalam kehidupan manusia. Walaupun terdapat berbagai jenis serangga di muka bumi ini, al-Qur'an hanya menyetengahkan beberapa jenis serangga yang mewakili berbagai serangga lainnya berdasarkan cara hidupnya. Misalnya, serangga pemakan tumbuh-tumbuhan, pemakan benda-benda organik mati, serangga pemangsa dan parasit, dan serangga yang hidup secara individu maupun berkelompok. Pernyataan tentang serangga dalam al-Qur'an menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Swt. Ia bersesuaian dengan konsep ilmu di dalam Islam yang mengarah kepada tauhid dan keridaan Allah Swt. (M. Quraish, 2015).

Secara umum, serangga yang disebut dalam al-Qur'an ialah nyamuk, lalat, belalang, kutu, lebah, semut, dan anai-anai. Namun, serangga yang dijadikan sebagai perumpamaan dalam al-Qur'an hanyalah nyamuk dan lalat. Berdasarkan hal

tersebut, kajian dalam artikel ini akan melihat rahasia dan hikmah pemilihan serangga-serangga tersebut dalam al-Qur'an. Seterusnya, analisis akan dilakukan untuk melihat elemen i'jaz yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang serangga tersebut (M. Quraish, 2015).

Lalat adalah salah satu jenis serangga mahluk perusak yang paling mudah dijumpai. Allah Swt. telah mendatangkan lalat sebagai perumpamaan di dalam al-Qur'an, melalui firman-Nya: dalam QS al-Hajj (22): 73.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ
شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

Artinya:

Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah.

B. Analisis Kandungan

Dalam ayat 73 surah al-Hajj ini, Allah Swt. telah mendatangkan perumpamaan tentang lalat (*dhubab*). Dalam al-Mu`jam al-



Wasit, dinyatakan bahawa *dhubab* ialah sejenis hewan kecil yang bersayap (Anis, dkk.) . Ia adalah serangga berwarna hitam yang terdapat di dalam rumah dan sering hinggap di dalam bekas air dan makanan. Serangga ini dinamakan *dhubab* kerana pergerakannya yang banyak.

Sebenarnya, menciptakan lalat sama mustahilnya dengan menciptakan unta atau gajah, karena lalat pun memiliki rahasia yang tidak dapat terungkap, yakni hidup. Namun, gaya bahasa al-Qur'ān yang sungguh istimewa memilih lalat yang kecil dan diremehkan sehingga ketidakmampuan menciptakannya lebih tertanam dalam benak. Jangankan gajah dan unta, lalat yang lemah pun tah mampu diciptakan (M. Quraish. 2015).

Sementara itu, para pakar mengatakan bahwa walaupun manusia mampu menangkap lalat, mereka tidak akan mampu mengambil kembali apa yang telah direbutnya. Pada dasarnya, saat menggunakan belalainya, lalat mengeluarkan zat yang mengubah sifat dari apa yang direbutnya sehingga tidak lagi sepenuhnya sama dengan keadaannya sebelum direbut (M. Quraish. 2015).

Oleh karena itu, jangan sekali-kali meremehkan lalat. Lalat adalah binatang yang sangat berani. Barangkali lalat memang terbang jika Anda mengusirnya, tetapi hanya sementara, karena lalat akan terus kembali. Lalat dinilai pemberani sehingga seseorang yang luar biasa keberaniannya dilukiskan oleh pribahasa Arab dengan ungkapan “lebih berani dari lalat”.

Jika Anda memperhatikan lalat dan merenungkannya, Anda akan sampai kepada kesadaran tentang kehadiran Allah pada lalat dan kegiatan-kegiatannya. Bukankah Allah hadir di mana-mana? (M. Quraish. 2015).



Perumpamaan yang diketengahkan dalam ayat ini menunjukkan betapa lemahnya berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir. Kebodohan orang kafir itu menyebabkan mereka masih mengharapkan berhala-berhala yang lemah itu. Allah Swt. mendatangkan perumpamaan ini supaya mereka berpikir, bagaimana tuhan-tuhan yang mereka sembah tidak mampu untuk mencipta walau seekor lalat sekalipun. Bahkan, bukan hanya itu, sekiranya lalat mengambil sesuatu dari mereka, niscaya mereka tidak dapat mengembalikan keadaannya seperti semula. Dalam ayat ini, Allah Swt. telah mendatangkan hujah dalam bentuk perumpamaan untuk memudahkan kefahaman mereka. Firman Allah Swt. dalam QS al-Baqarah/2: 26

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا
الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ
كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: “Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?”. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik”.





Thahir Ibn 'Asyur menulis bahwa secara lahiriah, ayat ini tidak memiliki hubungan yang serasi dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan keistimewaan al-Qur'ān serta sanksi atas pembangkang dan ganjaran bagi yang taat. Lalu, tiba-tiba muncul pernyataan bahwa Allah tidak malu membuat perumpamaan. Ibn 'Asyur menjelaskan bahwa bila hal ini diteliti akan ditemukan keserasian hubungannya. Menurut ulama asal Tunisia ini, ayat-ayat yang lalu mengandung tantangan kepada sastrawan untuk menyusun satu surah yang semisal al-Qur'ān. Namun, ketika mereka gagal, mereka kemudian mengkritik kandungannya dengan menyatakan bahwa ada kandungannya yang tidak sesuai dengan kebesaran dan kesucian Allah Swt. Tujuannya adalah menanamkan benih keraguan di hati orang-orang yang beriman atau di hati mereka yang memiliki kecenderungan untuk beriman (M. Quraish, 2002).

Upaya mereka itu, menurut Ibn 'Asyur, semakin menjadi-jadi setelah turunnya ayat-ayat 17-20 yang mengumpamakan orang-orang munafik dengan dua perumpamaan yang buruk. Sebagian besar orang-orang munafik yang dimaksud adalah orang Yahudi yang tidak mahir dalam sastra Arab. Karena mereka pun ingin mengkritik al-Qur'ān, maka cara yang dapat mereka lakukan adalah dengan berusaha menampilkan kelemahan kandungannya. Antara lain menyangkut perumpamaan-perumpamaan yang ditampilkan al-Qur'ān (M. Quraish, 2002).

Menurut al-Biqā'i, setelah ketidakmampuan mereka dalam melayani tantangan al-Qur'ān terbukti, nyatalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah firman-firman-Nya. Sebelum ini, dinyatakan-Nya bahwa buah-buahan surgawi tidak sama dengan yang terdapat di dunia, walaupun dari segi nama

dan bentuknya serupa, maka pada ayat ini diisyaratkan-Nya bahwa *matsal* (perumpamaan) yang disajikan al-Qur'ān, walau dari segi lahiriah memiliki kesamaan nama dengan yang dikenal manusia, tetapi dari segi hakikat, ketetapan dan kebenarannya sungguh berbeda. Oleh karena itu, tidaklah tepat mengkritik dan menilainya tidak wajar karena *sesungguhnya Allah tiada malu*, yakni tidak enggan *membuat perumpamaan* yang dapat mengesankan, yaitu contoh *berupa kutu atau yang melebihinya* yang boleh jadi diremehkan atau dianggap tidak wajar oleh orang-orang kafir. *Adapun orang-orang yang beriman* dengan iman yang benar, *mereka mengetahui* dengan pasti bahwa *itu adalah kebenaran sempurna* yang bersumber dari Allah, *Tuhan Pemelihara mereka* yang melimpahkan aneka bimbingan untuk memelihara merek. Sementara itu, *orang-orang kafir*, baik yang kekufurannya terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, *maka mereka akan terus berkata: "Apakah maksud Allah menjadikan sesuatu yang hina ini, satu perumpamaan?"* pertanyaan mereka dijawab: *Dengan perumpamaan itu banyak orang yang menutup mata dan telinganya yang terus menerus disesatkan Allah*, karena mereka tidak mau mengerti *dan banyak pula yang terus-menerus diberi-Nya tambahan petunjuk*, karena keyakinan mereka akan ke Maha sempurna Allah; Allah tidak berbuat aniaya kepada yang Dia sesatkan, karena *Tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasiq* yakni yang sebelumnya memang telah mendarah daging dalam jiwanya kefasikan (M. Quraish, 2002).

Malu ada mukadimahya, yaitu perasaan yang meliputi jiwa akibat kekhawatiran dinilai negatif oleh pihak lain, dan ada pula akibatnya yaitu meninggalkan, membatalkan, atau



menjauhi perbuatan yang melahirkan perasaan itu. Akibat itulah yang dimaksud dengan “malu” bagi Allah, yakni Allah tidak meninggalkan memberi perumpamaan walau perumpamaan itu berupa *ba’udhah*. *Ba’dhah* dalam *Tafsir al-Jalalain* diartikan sebagai bentuk tunggal dari kata *ba’udh*, yakni *kutu yang kecil*. Kutu dimaksud, dijelaskan dalam *Hasyiat al-Jamal ‘ala al-Jalalain* sebagai “binatang yang sangat kecil, menggigit dengan menyakitkan, dan berbau sangat busuk (semacam bangsat). Memang–tulisnya lebih jauh–kata yang digunakan al-Qur’ān itu dapat juga berarti *nyamuk*, tetapi bukan itu yang dimaksud di sini. Lebih jauh *al-Jamal* mengutip dari *Tafsir al-Khazin* bahwa kutu itu sangat kecil, berkaki enam dan bersayap empat, berekor dan berbelalai. Kendati ia kecil, belalainya dapat menembus kulit gajah, kerbau dan unta, serta menggigitnya sampai-sampai unta dapat mati akibat gigitannya itu (M. Quraish, 2002).

Allah tidak malu memberi perumpamaan tentang kutu kecil yang diremehkan oleh kaum musyrik dan dianggap tidak wajar untuk disebutkan oleh Allah, bahkan walau lebih besar dari kutu itu pada nilai kerendahannya dalam pandangan kaum musyrik (yakni walau yang lebih tidak bermutu darinya), atau lebih kecil dari kutu itu pada bentuk badannya atau bagian dari bentuk badannya, misalnya hanya sayapnya saja. Hal ini seperti disabdakan Nabi saw.: “Seandainya dunia ini memiliki nilai sebesar sayap kutu di sisi Allah, niscaya Dia tidak menganugerahkan setetes airpun kepada seorang kafir.” Ini, karena tujuan memberi perumpamaan adalah menjelaskan yang abstrak dalam bentuk konkret, sehingga menjadi jelas adanya (M. Quraish, 2002).

Kefasikan adalah sifat yang menjadikan manusia keluar dan menjauh dari kebenaran dan keadilan. *Buah yang busuk* ditunjuk



dengan menggunakan akar kata *fasiq*, karena kulit buah yang busuk terkelupas dengan sendirinya atau amat mudah dikelupas kulitnya sehingga ia terpisah dari isinya. Demikian juga seorang fasik. Ia keluar dengan kemauannya sendiri dari tuntunan Ilahi, atau dengan mudah dikeluarkan dari kebenaran yang tadinya telah melekat pada dirinya (M. Quraish, 2002).

Kefasikan bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, puncaknya adalah kekufuran. Al-Qur'ān pun menggunakannya untuk makna-makna itu. Namun, dari pandangan hukum—setelah para pakar mengamati sekian banyak dalil—pakar-pakar dari kelompok Ahl as-Sunnah menyimpulkan bahwa kefasikan bukan kekufuran. Walaupun kefasikan sering dilakukan, tetapi itu tidak menjadikannya seorang kafir selama ia tetap mengakui—walau hanya dengan lidahnya—keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad saw. (M. Quraish, 2002).

Ucapan orang-orang kafir itu lahir dari kepribadian mereka yang buruk. Mereka dinilai Allah memiliki tiga sifat buruk sehingga mengakibatkan kerugian dan bencana buat mereka sendiri. (M. Quraish, 2002).

Perlu dicatat bahwa hidayah dan kesesatan merupakan dua istilah yang mengandung makna-makna menyeluruh mencakup semua jenis anugerah Allah— untuk istilah *hidayah*—dan aneka kecelakaan dan kerugian bagi kata *kesesatan* (M. Quraish, 2002).

Selama ulama berpendapat bahwa ayat ini turun sebagai tanggapan atas orang-orang kafir menyangkut firman-Nya tentang lalat (baca QS. al-Hajj [22]: 73) dan laba-laba(QS. al-Ankabut [9]: 41) yang telah turun jauh setelah turunnya ayat ini. Jika demikian, timbul pertanyaan, mengapa bantahan tersebut



baru dikemukakan sekarang di Madinah, jauh setelah turunnya ayat tersebut?

Thahir Ibn 'Asyur menjawab bahwa hal ini dapat diserupakan dengan seorang dermawan yang tidak memberi bantuan kepada musuhnya sehingga sang musuh menuduhnya kikir, atau serupa dengan seorang pemberani yang menunda keterlibatannya dalam perang, berdasarkan suatu siasat tertentu sehingga diduga oleh musuhnya bahwa ia takut. Namun, kemudian yang menuduh kikir datang dan diberi bantuan oleh sang dermawan, si pemberani pun sesaat kemudian tampil menghacurkan musuhnya. Demikian juga al-Qur'ān yang sebelum ini telah tampil dengan perumpamaan-perumpamaan yang dikritik kaum kafir, tetapi didiamkan dan tidak ditanggapi. Setelah itu berlalu, al-Qur'ān tampil dengan kedua ayat di atas yang mengandung perumpamaan yang sangat indah, tetapi kini sambil membantah kritik mereka. Tidak ubahnya dengan dermawan dan pemberani di atas dalam QS an-Nahl/16: 8

وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ



Artinya:

Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.

Setelah ayat yang lalu menyebut binatang-binatang yang paling banyak dimiliki manusia sekaligus paling banyak

mamfaatnya, kini disebut lagi beberapa binatang lain dengan firman-Nya: *dan Allah juga telah menciptakan untuk kamu mamfaatkan kuda, bagal, yakni binatang yang lahir dari seekor kuda dan keledai, dan keledai, itu semua diciptakan Allah agar kamu menungganginya dan Allah menjadikannya juga sebagai perhiasan* di muka bumi ini. Siapa yang memandang kuda-kuda yang tangguh dan kuat, atau binatang lain, hatinya akan berdecak kagum karena keindahannya (M. Quraish, 2002).

Dan bukan hanya itu sebagai alat transportasi dan hiasan, tetapi *Dia*, yakni Allah Swt., secara terus-menerus *menciptakan* aneka ciptaan, baik alat transportasi maupun perhiasan, *apa yang kamu tidak mengetahuinya* sekarang tetapi kelak akan kamu ketahui dan gunakan jika kamu mau berpikir dan mengarahkan segala potensi yang ada, dan Allah menciptakan juga apa yang kamu tidak akan mengetahuinya sama sekali hingga ciptaan itu kamu lihat dan ketahui (M. Quraish, 2002).

Ayat ini hanya menyebutkan fungsi ketiga binatang yang disebut di atas dalam tunggangan dan hiasan tanpa menyebutkannya sebagai alat pengangkut sebagaimana halnya binatang ternak. Ini bukan berarti bahwa ketiga binatang yang disebut di sini tidak dapat digunakan sebagai alat angkut. Ayat ini berdialog dengan masyarakat Arab yang ketika itu tidak terbiasa menjadikan kuda, bagal, dan keledai kecuali sebagai tunggangan dan hiasan. Kuda dan bagal mereka gunakan untuk berperang atau berburu, sedang keledai mereka tunggangi sebagai alat transportasi dalam kota. Karena ayat ini bertujuan menguraikan nikmat-nikmat Allah Swt., tentu saja yang digaris bawahinya adalah hal-hal yang mereka rasakan langsung, walaupun yang tidak disebut itu merupakan juga aspek nikmat ilahi (M. Quraish, 2002).



Atas dasar itu, bukanlah pada tempatnya menjadikan ayat ini sebagai argumentasi larangan memakan daging kuda, bagal, atau keledai dengan dalih bahwa ayat ini tidak menyebut ketiga binatang itu sebagai bahan pangan. Sekian banyak nikmat Allah yang terhampar di bumi ini yang tidak disebut secara khusus manfaatnya namun dapat digunakan dan dimanfaatkan secara halal. Katakanlah jenis-jenis tumbuhan yang berfungsi sebagai obat bagi penyakit-penyakit tertentu (M. Quraish, 2002).

Memang para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya ketiga binatang itu dimakan berdasarkan berbagai argumentasi di luar ayat ini. Imam Malik dan Abu Hanifah mengharamkan daging kuda. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Imam Malik hanya menilainya makruh. Demikian pakar tafsir dan hukum al-Qurthubi. Adapun keledai, ia terdiri atas keledai jinak dan liar. Banyak ulama membolehkan memakan keledai liar dan melarang yang jinak. Pendapat ini antara lain dianut oleh Imam-imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i. Adapun bagal, mayoritas ulama mengharamkannya, paling tidak dengan alasan ia lahir dari percampuran dua binatang-kuda dan keledai-sedang keledai (yang jinak) tidak boleh dimakan (M. Quraish, 2002).

Penggunaan bentuk *mudhari'*/kata kerja masa kini dan akan daganti pada kata *yakhluqu*/menciptakan mengisyaratkan akan berkembangnya aneka alat transportasi yang belum tergambar dalam benak mitra bicara (manusia) ketika turunnya ayat ini. Alat-alat itu pastilah lebih baik dari apa yang selama ini mereka ketahui (M. Quraish, 2002).

Ayat ini dinilai oleh Thahir Ibn Asyur sebagai salah satu ayat yang mengandung mukjizat dari aspek pemberitaan gaib.



Ayat ini, menurutnya, mengisyaratkan akan adanya ilham Allah kepada manusia guna menciptakan alat-alat transportasi yang lebih baik dan berguna daripada ketiga binatang yang disebut di atas, dimulai dengan lahirnya sepeda, berlanjut dengan kereta api, mobil, pesawat udara, dan lain-lain yang kesemuanya tidak dikenal oleh generasi-generasi masa lalu sebelum terciptanya alat-alat tersebut (M. Quraish, 2002).

Sayyid Quthub menggarisbawahi penggalan ayat ini *wa yakhluqu ma la ta'lamun/dan dia menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya* antara lain bahwa ini membuka lapangan yang luas dalam pandangan manusia untuk menerima bentuk-bentuk baru dari alat-alat pengangkutan dan transportasi serta keindahan. Dengan demikian, ayat ini tidak menetup pandangan mereka menyangkut hal-hal yang berada di luar batas lingkungan atau batas waktu di mana mereka hidup karena di balik apa yang terdapat pada lingkungan dan zaman mereka masih ada hal-hal lain (M. Quraish, 2002).

Memang, Islam adalah agama yang terbuka, lentur dapat menerima segala sesuatu yang lahir dari kemampuan, ilmu dan apa yang dilahirkan oleh masa depan selama hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan fitrah manusia dan nilai-nilai Ketuhanan Yang maha Esa firman Allah Swt. Dalam QS Yasin/36: 71-73.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا
مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾



Artinya:

“Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?”

Ayat-ayat yang lalu, seperti penulis kemukakan ketika menafsirkannya, adalah uraian tentang kerasulan. Itu merupakan nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia. Tiada arti nikmat-nikmat yang lain, tanpa kehadiran Rasul dan al-Qur’ān. Kelompok ayat ini kembali menguraikan beberapa nikmat Allah yang lain. Allah kembali menguraikan tentang hal itu karena memang nikmat-Nya terlalu banyak, sedang sebagian manusia sangat kafir, tidak mensyukuri nikmat yang sehari-hari mereka peroleh itu. Karena itu, Allah mengecam mereka dengan berfirman: *Dan apakah mereka, yakni orang-orang kafir itu buta sehingga tidak melihat dengan mata kepala dan mata hatinya bahwa Kami telah menciptakan buat kemamfaatan dan kemaslahatan mereka dari apa yang telah dilakukan oleh tangan kekuasaan Kami, yakni dari hasil ciptaan Kami, berupa binatang ternak, yakni unta, sapi, dan domba, lalu setelah Kami menciptakannya mereka berkuasa atasnya dan mereka menjadi pemilik-pemilik binatang-binatang tersebut, lagi dapat memperlakukannya sesuka hati mereka? Hewan-hewan itu lebih besar dan lebih kuat dari mereka, tetapi demikian kami menguasakannya untuk mereka dan Kami menundukkannya*

untuk kepentingan mereka, maka sebagian dari binatang itu menjadi tanggungan mereka dan sebagian lainnya mereka makan. Dan mereka memperoleh juga padanya manfaat-manfaat, seperti wol, bulu, kulit, maupun tulangnya dan juga minuman dari susunya. Semua nikmat yang disebut itu adalah anugerah Ilahi dan bukti kemahakuasaan-Nya. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan semua itu kepada mereka?

Kata *aidi* adalah bentuk jamak dari *katayady* yang secara umum biasa diartikan tangan. Secara majazi ia berarti juga *kekuasaan* atau *hikmah*. Ayat di atas bermaksud menggambarkan betapa penciptaan binatang ternak merupakan nikmat yang besar dan bukti kuasa Allah Swt. Ayat di atas menggarisbawahi tiga jenis binatang saja, yaitu unta, sapi, dan kambing, karena ketika itu ketiga binatang tersebut merupakan lambang kekayaan dan kesejahteraan mereka. Unta menjadi alat transportasi sekaligus sumber rezeki dan makanan mereka. Kekayaan dan harta benda yang termahal adalah unta, khususnya yang sedang hamil (M. Quraish, 2002).

Didahulukannya kata *fahum laha/lalu* mereka atasnya atas kata *malikun/pemilik-pemilik* bertujuan menekankan dan menghadirkan manfaat dan nilai binatang-binatang itu dalam benak mitra bicara sebelum mengingatkan mereka tentang nikmat kepemilikannya. Di sisi lain, penggunaan bentuk *nakirah /indefinite* pada kata *malikun* untuk menggambarkan betapa besar dan mantap kepemilikan itu. Lihatlah bagaimana binatang-binatang itu, kendati demikian besar, penuhnya dikusai dan di tundukkan manusia. Bandingkanlah dengan lalat yang demikian kecil, manusia tidak kuasa merebut kembali apa



yang direbut darinya oleh lalat, sungguh anugerah binatang ternak itu adalah nikmat yang besar dan sungguh kepemilikan dan penundukannya pun merupakan anugerah yang besar firman Allah Swt. Dalam QS Thaha/20: 53-54

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۖ كُلُوا
وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النَّهْيِ ۝

Artinya:

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.

Setelah Nabi Musa as. menjelaskan kuasa dan pengetahuan Allah Swt. serta penciptaan-Nya yang sempurna, agaknya beliau berhenti sejenak, dan perhatian itu diisi dengan komentar Allah Swt. Melalui keempat ayat di atas. Perhatian semacam ini sering kali ditemukan dalam al-Qur'an dalam rangka membangkitkan rasa ingin tahu tentang kelanjutan kisah atau menghilangkan kejenuhan, di samping menggunakan setiap kesempatan untuk mengingatkan manusia tentang kehadiran dan aneka nikmat Allah. Ini dipahami demikian karena pada redaksi ayat-ayat di atas terdapat kata *Kami* yang konteks uraiannya tidak mungkin



diucapkan kecuali oleh Allah Swt. Ayat-ayat di atas menyatakan: *Dia*, yakni Allah, *Yang telah menjadikan bagi kamu*, wahai Fir'aun dan seluruh manusia, *sebagain besar bumi sebagai hamparan* dan menjadikan *sebagain kecil lainnya gunung-gunung* untuk menjaga kestabilan bumi *dan Dia*, yakni Tuhan itu juga, *Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan* yang mudah kamu tempuh, *dan menurunkan dari langit air*, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, *maka Kami tumbuhkan dengannya*, yakni dengan perantara hujan itu, *berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna, dan manfaatnya*. Itu semua Allah ciptakan buat kamu dan binatang-binatang kamu. Karena itu, *makan dan gembalakanlah binatang-binatang kamu*. *Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal*. *Darinya*, yakni dari bumi atau tanah itulah-bukan dari selainya-Kami menciptakan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dengan kematian dan penguburan sehingga kamu bercampur lagi dengan tanah *dan darinya Kami akan mengeluarkan kamu* yakni membangkitkan kamu, *pada kali yang lain*, yakni pada Hari Kiamat (M. Quraish, 2002).

Itu semua telah disampaikan oleh Nabi Musa as. Kepada Fir'aun *dan di samping itu sesungguhnya Kami pun telah perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan Kami* yang sangat nyata melalui Nabi Kami itu, *semuanya Kami perlihatkan*, tetapi demikian ia tetap bersikap keras kepala, *maka akibatnya ia mendustakan dan enggan menerima kebenaran atau enggan patuh kepada Kami* antara lain dengan terus menyiksa dan membelenggu Bani Isra'il (M. Quraish, 2002).



Thabathaba'i menghubungkan ayat ini dengan akhir ayat yang lalu, yang menegaskan bahwa, "Allah Swt. Memberikan kepada setiap sesuatu bentuk kejadiannya", kemudian memberinya petunjuk serta mengaitkannya pula dengan jawaban Nabi Musa as. Tentang keluasan ilmu Allah. Ulama itu menulis bahwa Allah Swt. Menempatkan manusia di bumi dengan menghamparkannya agar mereka dapat menikmati hidup dan berbekal guna kehidupan akhirlatnya, serupa dengan bayi yang ditempatkan dalam buaian dan dididik guna meraih kehidupan yang lebih mulia dan tinggi. Allah menjadikan manusia di bumi ini agar ia menyadari bahwa ada jarak antara ia dan tujuan hidupnya. Ada jalan yang harus ditempuhnya guna mencapai tujuan hidup itu, yakni pendekatan diri kepada Allah dan upaya masuk ke hadirat-Nya, sebagaimana halnya ia menempuh jalan-jalan di permukaan bumi ini untuk mencapai arah yang ditujunya. Allah menurunkan air dari langit berupa hujan dan juga mata-mata air dan sungai-sungai serta lautan, lalu ditumbuhkan dari air itu aneka macam dan jenis tumbuhan lalu Allah Swt. Memberi hidayah kepada manusia untuk memakannya dan itu semua merupakan ayat-ayat, yakni tanda-tanda tentang hidayah dan *rububiyah*/ Ketuhanan dan pemeliharaan Allah Swt. Hal-hal tersebut harus dicamkan oleh kaum yang berakal. Dengan demikian—tulis Thabathaba'i lebih jauh— firman-Nya: *Dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan* adalah isyarat bahwa keberadaan manusia di pentas bumi dalam rangka kehidupannya adalah bagian dari hidayah Allah; firman-Nya: *Menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan* adalah isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh manusia di bumi guna meraih tujuannya juga adalah bagian dari hidayah-Nya. Selanjutnya, firman-Nya bahwa: *Dia*



menurunkan dari langit air, maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah kepada langit guna menurunkan hujan, dan hidayah buat hujan agar turun tercurah, dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang. Demikian lebih kurang pandanganThabathaba' l (M. Quraish, 2002).

Redaksi firman-Nya: *akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta/maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam* beralih menjadi persona pertama (*Kami*) sedang sebelumnya adalah persona ketiga (*Dia*) dalam firman-Nya: *alladzi ja'ala lakum al-ardh mahdan/Dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan*. Pengalihan bentuk redaksi tersebut bertujuan mengisyaratkan bahwa penumbuhan aneka tumbuhan dengan bermacam-macam jenis bentuk dan rasanya itu merupakan hal-hal yang sungguh menabjubkan lagi membuktikan betapa agung Penciptanya. Pengalihan redaksi itu juga bertujuan mengundang perhatian pendengar dan mitra bicara agar mengarahkan pandangan dan pikirannya kepada hal-hal yang disebut itu. Gaya Bahasa semacam ini banyak ditemukan dalam al-Qur'an dan dalam konteks uraian yang sama. Bacalah misalnya. QS. Al-An'am [6]: 99, Fathir [35]: 27, Naml [27]: 60, dan lain-lain (M. Quraish, 2002).

Dalam bahasa Arab, lalat dikatakan الذباب, asal katanya adalah ذبّ yang berarti serangga kecil yang terbang, tajam, kacau, atau gerak dan lain-lain (Ibn Zakariyyah, 1979). Kata ذباب



ini identik dengan warna gelap (hitam). Jadi, ذباب bisa juga dikatakan serangga yang memiliki warna gelap (Al-Misry, h.380).

Secara umum, serangga yang telah disebut di dalam al-Qur'an ialah nyamuk, lalat, belalang, kutu, lebah, semut dan anai-anai. Namun begitu, serangga yang telah dijadikan sebagai perumpamaan dalam al-Qur'an hanyalah nyamuk dan lalat. Oleh yang demikian, kajian dalam artikel ini akan melihat kepada rahasia dan hikmah pemilihan serangga-serangga tersebut di dalam al-Qur'an. Seterusnya, analisis akan dilakukan untuk melihat elemen i'jaz yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang serangga tersebut (Shihab, 2015).

Dalam al-Qur'an lalat dijadikan sebagai perumpamaan sebagaimana yang terdapat dalam QS al-Hajj/ 22: 73. Lalat yang merupakan binatang yang kotor, lemah dan dianggap remeh, tidak dapat diciptakan oleh sesembahan orang musyrik walaupun para sesembahan mereka bersatu. Seekor lalat pun tidak dapat diciptakan apalagi yang lebih besar dari pada itu seperti gajah maupun unta (Shihab, 2012).

Allah Swt. telah mendatangkan lalat sebagai perumpamaan di dalam QS al-Hajj/ 22: 73, melalui firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ
شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

Artinya:

“Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, Tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan Amat lemah (pulalah) yang disembah”. (Kementerian Agama RI, 2012)

Pada ayat di atas mengandung sisi keilmiahannya yakni apapun yang telah diambil oleh lalat tidak akan dapat diambil kembali. Walaupun manusia berhasil menangkap lalat namun sesuatu yang telah diambil lalat tidak dapat kembali sebab lalat menggunakan mulutnya yang seperti belalai untuk mengambil makanan atau semacamnya di mana pada saat yang sama juga mengeluarkan zat-zat yang menyebabkan apa yang diambilnya tersebut berubah bentuk/sifat. Jadi apapun yang telah diambil oleh lalat tidak lagi sepenuhnya sama dengan keadaan sebelum diambil (Shihab, 2004).

Pelajaran yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah lalat diciptakan untuk menyadarkan manusia bahwa dirinya begitu lemah dan tidak ada sesuatupun yang mampu menyamai kekuasaan Allah Swt. (Shihab, 2004).

Perumpamaan yang diketengahkan dalam ayat ini menunjukkan betapa lemahnya berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir. Kebodohan orang kafir itu menyebabkan mereka masih mengharapkan berhala-berhala yang lemah itu. Allah Swt. mendatangkan perumpamaan ini supaya mereka berpikir,



bagaimana tuhan-tuhan yang mereka sembah tidak mampu untuk mencipta walau seekor lalat sekalipun. Bahkan, bukan setakat itu sahaja tetapi sekiranya lalat itu mengambil sesuatu daripada mereka, niscaya mereka tidak dapat mengambilnya semula. Dalam ayat ini, Allah Swt. telah mendatangkan hujah dalam bentuk perumpamaan untuk memudahkan kefahaman mereka. Firman Allah Swt. Dalam QS al-Baqarah/2: 26, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا
الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ
كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: “Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?”. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik”. (Kementerian Agama RI, 2012)

Allah tidak malu memberi perumpamaan tentang kutu kecil yang diremehkan oleh kaum musyrik dan dianggap tidak wajar untuk disebutkan oleh Allah, bahkan walau lebih besar

dari kutu itu pada nilai kerendahannya dalam pandangan kaum musyrik (yakni walau yang lebih tidak bermutu darinya), atau lebih kecil dari kutu itu pada bentuk badannya atau bagian dari bentuk badannya, misalnya hanya sayapnya saja. Hal ini seperti disabdakan Nabi saw.: “Seandainya dunia ini memiliki nilai sebesar sayap kutu di sisi Allah, niscaya Dia tidak menganugerahkan setetes airpun kepada seorang kafir.” Ini, karena tujuan memberi perumpamaan adalah menjelaskan yang abstrak dalam bentuk konkret, sehingga menjadi jelas adanya (Shihab, 2002).

Walaupun lalat hanyalah seekor serangga yang kecil, tetapi makhluk ciptaan Allah ini sangat unik. Ia sekaligus membuka ruang kepada manusia untuk berpikir dan merenung kehebatan dan kekuasaan Allah Swt. inilah antara tujuan perumpamaan itu diungkapkan di dalam QS al-Hashr/ 59: 21 sebagaimana firman Allah Swt.:

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia agar mereka berpikir” (Kementerian Agama RI, 2012).

Adapun hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan lalat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah (Fitriani, 2008).



Adapun riwayatnya terdapat dalam kitab Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, Juz 3, *bâb Idzâ Waqo'a adz-Dzubâb fî Syarôbi Ahadikum*, XI:99 (Cet. III; Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987 M/ 1407 H), h. 1206, hadits no. 3073, adalah sebagai berikut.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ.
(رواه البخاري)

Artinya:

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian, maka tenggelamkan kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya. (HR. Bukhary)

Dari hadis ini terdapat hukum yang dapat diambil yaitu lalat bukan merupakan sesuatu yang najis. Sebab, apabila lalat itu najis maka Nabi saw. tidak akan menyuruh untuk mencelupkan tetapi menyuruh untuk membuangnya. Namun dalam hadis ini tidak menekankan apakah lalat itu najis atau tidak, akan tetapi hadis ini lebih menekankan kepada penyakit yang ada pada lalat dan adanya obat yang terdapat pada sayap lalat makanya Nabi memerintahkan untuk mencelupkan lalat tersebut untuk mengeluarkan unsur obat yang terdapat pada sayap lalat (Ali ibn Zain, 1356, h. 450).

Lalat juga telah terkenal pada masa Rasul. Di samping lalat identik dengan sesuatu yang terkesan jelek namun lalat ketika itu juga dikenal sebagai bahan pembuat obat untuk mempertajam penglihatan dan mengobati gigitan anjing dengan cara mencampurkan bagian dari lalat dengan bahan kimia lalu campuran tersebut ditempelkan pada bagian yang telah digigit anjing (Al Jauzi, 1566).

Selain lalat, banyak hewan yang juga memiliki sifat-sifat yang berlawanan. seperti halnya lebah yang pada bagian bawahnya menghasilkan racun sedangkan bagian atasnya menghasilkan madu yang bermanfaat dan juga ular berbisa, racunnya dapat digunakan untuk mengobati racun yang lain (Al Jauzi, 1566).

C. Tinjauan Umum Insecta

Insecta (serangga) merupakan anggota dari filum Arthropoda yang memiliki jumlah spesies terbanyak. Ada banyak jenis hewan yang masuk ke dalam kelas ini, salah satunya adalah lalat. Lalat merupakan salah satu serangga yang termasuk ke dalam ordo Diptera. Beberapa spesies lalat merupakan spesies yang paling berperan dalam masalah kesehatan masyarakat, yaitu sebagai vektor penularan penyakit. Peranan lalat dalam menyebarkan penyakit adalah sebagai vektor mekanik dan vektor biologis. Sebagai vektor mekanis lalat membawa bibit-bibit penyakit melalui anggota tubuhnya. Tubuh lalat mempunyai banyak rambut-rambut terutama pada kakinya. Rambut-rambut yang terdapat pada kaki mengandung semacam cairan perekat sehingga benda-benda yang kecil mudah melekat (Suraini, 2011).



Lalat adalah jenis serangga dari keluarga Diptera (dua sayap) yang mempunyai lebih daripada 80.000 jenis (Thorik, 2001) .

Ordo Diptera dibagi menjadi 3 subordo, yaitu Nematocera, Brachycera, dan Cyclorrhapha. Subordo Nematocera dan Brachycera disebut juga ordo Orthorrhapha yang akan meninggalkan bekas pecahan seperti huruf T atau Y pada kulit larvanya saat menjadi dewasa. Sedangkan subordo Cyclorrhapha meninggalkan pecahan berbentuk sirkuler. Tiga famili lalat yang berperan dalam entomologi forensik adalah family Calliphoridae, Sarcophagidae dan Muscidae. Ketiganya tergolong dalam subordo Cyclorrhapha (Wahyu, 2009).

Famili Calliphoridae (*blow flies*) memiliki lebih dari 1000 spesies dan dapat ditemukan hampir di seluruh dunia. Famili ini dibagi menjadi dua golongan yaitu *metallic calliphoridae* berwarna hijau, biru atau ungu dan *non-mettalic calliphoridae* dengan warna hitam, abu-abu tua atau jingga. *Green bottle flies* (genus *phaenicia*), *blue bottle flies* (genus *calliphora*), genus *cochliomyia* dan genus *chrysomyia* adalah termasuk dalam famili ini. Lalat dewasa dari famili ini rata-rata panjangnya 6-14 mm, dengan mayoritas memiliki warna yang metalik mulai dari hijau, biru, perunggu atau hitam (Wahyu, 2009).

Salah satu serangga yang dipakai dalam studi forensik entomologi adalah lalat dan larvanya. Famili lalat yang dianggap berperan cukup besar adalah Calliphoridae ("*bottle flies*" atau "*blow flies*"), Sarcophagidae ("*flesh flies*") dan Muscidae ("*house flies*"). Beberapa penelitian telah dilakukan terhadap *blow flies* dan serangga darat lain pada jenazah yang ditemukan terapung di permukaan air (Smith, 1986).



Berbagai macam genus lalat yang penting antara lain adalah *Musca* (berbagai jenis lalat rumah), *Chrysomya* sp. (berbagai jenis lalat hijau) dan *Sarcophaga* (berbagai jenis lalat daging). Lalat hijau atau *Chrysomya* sp. banyak dijumpai di Indonesia, terutama di tempat-tempat lembab dan daerah yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah (Departemen kesehatan RI, 1991).

D. Tinjauan Umum Lalat Rumah *M. domestica*

Lalat adalah insekta yang lebih banyak bergerak dengan mempergunakan sayap (terbang). Hanya sesekali bergerak dengan kakinya. Ada berbagai jenis lalat yang berada di sekitar kita. Cara membedakannya dapat dilihat dari morfologi yang dimiliki lalat tersebut. Salah satu contoh lalat yang sering kita temukan adalah lalat rumah (*M. domestica*). Lalat ini tersebar merata di berbagai daerah. Kebiasaan lalat ini adalah berpindah-pindah tempat dari tempat-tempat yang kotor seperti tempat pembuangan sampah, bangkai, bahkan kotoran. Tidak heran apabila pada tubuh lalat ini menempel banyak mikroba yang dapat menyebabkan penyakit.

M. domestica atau lalat rumah atau sering disebut *housefly* merupakan salah satu spesies serangga yang banyak terdapat di seluruh dunia. Sebagian besar (95%) dari berbagai jenis lalat yang dijumpai di sekitar rumah dan kandang, adalah lalat jenis ini. Di bidang kesehatan *M. domestica* dianggap sebagai serangga pengganggu karena merupakan vektor mekanis beberapa



penyakit dan penyebab myiasis pada manusia dan hewan. Lalat ini juga mengganggu dari segi kebersihan dan ketenangan.

Lalat merupakan serangga yang hanya memiliki sepasang sayap meskipun begitu, mereka bergerak cepat dan lincah di udara. Lalat dapat terbang dengan cara mundur maupun naik turun. Lalat juga memiliki mata majemuk yang berukuran besar menutupi sebagian besar kepalanya dan memiliki mulut yang berfungsi seperti spons yang terlipat di bawah kepala.

1. Siklus Hidup Lalat rumah (*M. domestica*)

Siklus hidup lalat dimulai dari telur kemudian berubah menjadi larva kemudian pupa (kepompong) dan menjadi lalat dewasa. Lalat dapat bertelur sebanyak 100 telur dalam sehari dan hal tersebut dilakukan setiap 10 hari. Telurnya berwarna putih dan panjangnya sekitar 1 mm. Telur lalat tidak dapat menetas pada suhu rendah yakni kurang dari 12 hingga 13°C. Telur berubah menjadi larva dalam waktu 8 sampai 20 jam. Panjang tubuh larva antara 3 sampai 9 mm dengan warna putih kekuningan. Dalam proses ini, kulit larva lalat berubah sebanyak tiga kali dan akhir dari fase ini, larva berpindah tempat dari yang banyak makan ke tempat yang dingin guna mengeringkan tubuhnya. Setelah itu, berubah menjadi kepompong yang berwarna coklat tua, panjangnya sama dengan larva dan tidak bergerak. Fase ini berlangsung pada musim panas 3-7 hari pada temperatur 30–35 °C. Kemudian akan keluar lalat muda dan sudah dapat terbang antara 450–900 meter, beberapa hari kemudian lalat muda ini akan memasuki fase dewasa dan sudah siap untuk bereproduksi. Siklus hidup dari telur hingga menjadi lalat dewasa 6-20 hari.



Lalat dewasa biasanya terbang antara 1 hingga 2 km namun lalat juga bisa terbang hingga 20 km. Lalat dewasa biasanya hidup selama 15-25 hari namun pada kondisi yang lebih sejuk, lalat dapat hidup hingga 3 bulan. Lalat dewasa aktif di siang hari.

Lalat rumah merupakan vektor mekanis bakteri patogen, protozoa, telur serta larva cacing. Luasnya penularan penyakit yang disebabkan oleh lalat ini sulit ditentukan. Lalat ini dipandang sebagai vektor penyakit tifus abdominalis, salmonellosis, kolera, disentri basiler dan amuba, tuberculosis, penyakit sampar, tularemia, anthraks, flambusia, kunjungvitis, demam undulans, tripanosomiasis dan penyakit spirokaeta.

2. Klasifikasi lalat rumah (*M. domestica*)

Klasifikasi lalat rumah adalah sebagai berikut (Simanjuntak, 2001):

Kingdom	: Animalia
Phylum	: Arthropoda
Class	: Insecta
Ordo	: Diptera
Famili	: Muscidae
Genus	: Musca
Spesiess	: Musca domestica

Lalat masuk ke dalam ordo Diptera yaitu memiliki dua pasang sayap (Di=dua dan ptera=sayap). Mata biasanya berukuran besar. Antena memiliki jumlah segmen yang bervariasi dari 3–40 buah. Metamorfosis sempurna dengan larva yang tidak berkaki (Sa'adah, 2013).



Ordo ini memiliki tipe alat mulut untuk mengunyah dan menghisap atau menjilat dan menghisap membentuk alat mulut yang seperti belalai disebut probosis. Probosis ini dapat ditarik ke dalam atau dijulurkan sesuai dengan keperluan hewan tersebut. Sesuai dengan namanya, hewan dari ordo ini mempunyai 2 pasang sayap depan, sedangkan sayap belakang berubah bentuknya menjadi suatu bulatan kecil yang disebut haltere. Haltere ini digunakan sebagai alat keseimbangan dan alat untuk mengetahui keadaan angin (Rusyana, 2011).

Siklus hidup dari telur hingga menjadi lalat dewasa 6-20 hari. Lalat dewasa panjangnya lebih kurang $\frac{1}{4}$ inci, dan mempunyai 4 garis yang agak gelap hitam di punggungnya. Beberapa hari kemudian sudah siap untuk bereproduksi, pada kondisi normal lalat dewasa betina dapat bertelur sampai 5 (lima) kali. Umur lalat pada umumnya sekitar 2-3 minggu, tetapi pada kondisi yang lebih sejuk biasa sampai 3 (tiga) bulan. Lalat tidak kuat terbang menantang arah angin, tetapi sebaliknya lalat akan terbang jauh mencapai 1 kilometer (Depkes, diakses 2013).

E. Tinjauan Umum Lalat Hijau

Chrysomya sp

Chrysomya sp. dikenal sebagai lalat hijau. Sebenarnya penamaan lalat hijau ini bukan hanya diperuntukkan bagi lalat jenis ini saja tetapi juga semua lalat yang memiliki ciri-ciri umum yang sama. Dalam bahasa Inggris kelompok lalat hijau ini diistilahkan sebagai "*blow flies*". Penamaan khusus terhadap lalat *Chrysomya sp* dalam istilah Inggris disebut sebagai "*Oriental latrine fly*" (Kurahashi, 1996).

Penyebaran lalat ini, berspekulasi bahwa sebenarnya nama *Chrysomya megacephala* diambil dari kelompok lalat megacephala yang terdiri atas tujuh spesies lalat yang terutama berasal dari wilayah Oseania dan Australia. Ketujuh spesies lalat itu adalah *Chrysomya saffraneae* (Bigot), *C. phaonis* (Seguy), *C. bezziana* (Villeneuve), *C. thanomthini* (Kurahashi dan Tumrasvin), *C. pinguis* (Wiedeman), *C. defixa* (Walker) serta *C. megacephala* (Fabricius) sendiri (Kurahashi, 1984).

Umumnya lalat hijau (*Chrysomya* sp.) memiliki warna tubuh yang hijau atau kehijauan, mengkilat dan berpotensi menimbulkan myasis, baik pada manusia, hewan, maupun bahan makanan lain, dan semuanya termasuk dalam kelompok lalat famili Calliphoridae (Kurahashi, 1996).




Gambar 1. Lalat Hijau (*Chrysomya* sp.)
(Mikroskop Trinokuler Lab. Genetika UIN Alauddin Makassar)

Lalat termasuk ordo diptera pada kelas insecta, bercirikan sepasang sayap yang terletak di mesothorax. Sepasang sayap lainnya bereduksi menjadi alat keseimbangan terbang yang disebut halter. Bentuk mulut bervariasi untuk menghisap, menusuk dan mengunyah (Wahyu, 2009).

Ciri umum *Chrysomya* sp. dewasa selain memiliki warna tubuh hijau kebiruan metalik, mengkilat, lalat ini memiliki ukuran



kira-kira 1,5 kali lalat rumah. Sayatan jernih dengan guratan urat-urat yang jelas, seluruh tubuh tertutup dengan bulu-bulu keras dan letaknya agak jarang. Mempunyai abdomen berwarna hijau metalik dengan mata berwarna jingga dan bagian mulutnya berwarna kuning. Panjang lalat kurang lebih 8 mm dari kepala sampai ujung abdomen. Lalat jantan memiliki sepanjang mata yang cenderung bersatu atau holoptik sedangkan lalat betina memiliki sepasang mata yang sedikit terpisah antara satu dan lainnya atau dioptik (Sigit, 1978).



Gambar 2. Morfologi lalat hijau (*Chrysomya* sp.)
(Mikroskop Trinokuler Lab. Genetika UIN Alauddin Makassar)

Lalat hijau (*Chrysomya* sp.) adalah pemakan zat-zat organik yang membusuk dan berkembang biak di dalam bangkai, dan meletakkan telurnya pada bangkai (White et al., 1940).

1. Siklus Hidup Lalat Hijau *Chrysomya* sp

Dalam kehidupan alami lalat *Chrysomya* sp. mengalami metamorfosa sempurna yang diawali dengan telur, yang

kemudian menjadi larva, pupa dan akhirnya menjadi bentuk dewasa. Telur diletakkan oleh lalat dewasa dalam keadaan berkelompok-kelompok. Peletakan telur oleh lalat ini dipengaruhi oleh rangsangan kimia, yang disimpulkan sebagai feromon, yang dihasilkan oleh lalat betina pada saat bertelur. Sehingga adanya telur segar dan lalat betina lain yang bertelur pada suatu media, mendorong lalat betina lainnya untuk meletakkan telurnya pada media tersebut (Esser, 1990).

Pada umumnya telur yang menetas akan membentuk kelompok-kelompok kecil larva. Setelah berganti kulit dalam waktu 12–18 jam dan menjadi larva tahap kedua, setelah dua hari kemudian berkembang menjadi larva tahap ketiga. Larva yang cukup umur dapat berukuran satu cm dan berwarna kuning tua keputih-putihan, stadium larva dilalui selama 5–6 hari. Bila telah siap menjadi pupa, larva tersebut akan mencari tempat yang kering. Stadium pupa dilalui selama 7–9 hari dan akhirnya menjadi bentuk dewasa. Waktu yang diperlukan dari telur sampai menjadi lalat dewasa adalah kira-kira 14–15 hari (Soviana, 1996).

Seluruh siklus hidupnya, yaitu dari telur sampai menghasilkan telur lagi memerlukan waktu kira-kira tiga minggu (Spradbery, 1991).

2. Klasifikasi Lalat Hijau *Chrysomya sp*

Klasifikasi *Chrysomya sp* menurut Kurahashi (Evenhuis 1989 dalam Soviana 1996) sebagai berikut.

Kingdom	: Animalia
Phylum	: Arthropoda
Class	: Hexapoda
Ordo	: Diptera



Famili : Calliphoridae
Genus : Chrysomya
Spesies : *Chrysomya* sp.

3. Dampak yang Ditimbulkan oleh Lalat *Chrysomya* sp

Adapun menurut Ismail bin Jakarsi (2008), dampak yang dapat ditimbulkan oleh lalat (*Chrysomya* sp.), yaitu:

a. Dampak Positif

Seperti serangga yang lain, lalat berfungsi untuk menguraikan binatang yang mati. Lalat juga bermanfaat terhadap tumbuhan yang lain. Beberapa spesies lalat sangat berperan dalam proses penyerbukan. Peran lalat penting dalam proses pembusukan hewan dan tanaman di lingkungan, juga dalam proses penyerbukan dan predator serangga lain.

b. Dampak Negatif

Lalat terkenal dalam penyebaran beberapa penyakit seperti disentri, demam, dan penyakit menular dan menjadi parasit, penyebab myiasis, dan vektor beberapa penyakit infeksi seperti kala-azar dan *black fever sleeping sickness*, dan lain-lain.

Pada penelitian mengenai "peran lalat *Chrysomya* sp. sebagai vektor mekanik penyakit kecacingan", di wilayah kumuh kota Manila, Filipina, yang menemukan 41,9% dari seluruh lalat *Chrysomya megacephala* yang tertangkap mengandung telur-telur cacing pada permukaan tubuhnya (Monzo et. al., 1991).



F. Tinjauan Umum Bakteri

Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membrane inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil (mikroskopik), serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan mamfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Struktur sel bakteri relatif sederhana: tanpa *nukleus*/inti sel, dan organel-organel lain seperti *mitokondria* dan *kloroplas*. Hal inilah yang menjadi dasar perbedaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik yang lebih kompleks (Colome, 2001).

Bakteri tersusun atas dinding sel dan isi sel. Di sebelah luar dinding sel terdapat selubung atau kapsul. Di dalam sel bakteri tidak terdapat *membran* dalam (*endomembran*) dan organel bermembran seperti *kloroplas* dan *mitokondria*. Berikut akan disajikan susunan sel bakteri, berturut-turut dari dinding sel, *membrane sitoplasma*, dan *sitoplasma* (Irianto, 2006).

Bakteri adalah makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Untuk menyelidiki ukuran bakteri, dalam pemeriksaan mikrobiologis biasanya digunakan satuan *mikron* (diberi symbol huruf μ m), seperti misalnya pada pengukuran virus. Bakteri yang biasa diteliti di laboratorium kebanyakan berukuran antara 0,5-2 μ m lebarnya dan 1-5 μ m panjangnya. Dahulu, pengukuran ini dilakukan dengan jalan membandingkan ukuran butir darah merah, yang pada waktu itu sudah diketahui besarnya (Irianto, 2006).



Bentuk bakteri bermacam-macam, yaitu sebagai berikut.

1. Bakteri Berbentuk Bulat (Bola)

Bakteri berbentuk bulat atau bola dinamakan *Kokus* (*coccus*); dapat dibedakan sebagai berikut.

- a. *Monokokus*, yaitu bakteri berbentuk bola tunggal, misalnya *Neisseria gonorrhoeae*, penyebab penyakit kencing nanah.
- b. *Diplokokus*, yaitu bakteri berbentuk bola yang bergandengan dua-dua, misalnya. *Diplococcus pneumonia*, penyebab penyakit pneumonia atau radang paru-paru.
- c. *Sarkina*, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok empat-empat, sehingga bentuknya mirip kubus.
- d. *Streptokokus*, yaitu bakteri bentuk bola yang berkelompok memanjang membentuk rantai.
- e. *Stafilokokus*, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkoloni membentuk sekelompok sel tidak teratur, sehingga bentuknya mirip dompolan buah anggur.

2. Bakteri Berbentuk Batang

Bakteri berbentuk batang dinamakan *basilus* (*bacillus* yang berarti batang). Bentuk basilus dapat pula dibedakan sebagai berikut.

- a. *Basil tunggal*, yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal misalnya *Salmonella typhi*, penyebab penyakit tifus.
- b. *Diplobasil*, yaitu bakteri berbentuk batang yang bergandengan dua-dua.



- c. *Streptobasil*, yaitu bakteri berbentuk batang yang bergandengan memanjang membentuk rantai misalnya *Bacillus anthracis* penyebab penyakit antraks.

3. Bakteri Berbentuk Melilit

Bakteri berbentuk melilit, yang dinamakan spirillum atau spiral. Ada tiga macam bentuk spiral, yaitu sebagai berikut.

- a. Spiral, yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral, misalnya Spirillum. Sel tubuhnya umumnya kaku.
- b. Vibrio atau bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna, misalnya Vibrio cholera penyebab penyakit kolera.
- c. Spirochaeta (baca: spiroseta), yaitu golongan bakteri berbentuk spiral yang bersifat lentur. Pada saat bergerak, tubuhnya dapat memanjang dan mengerut (Irianto, 2006).

Bakteri adalah salah satu golongan organisme prokariotik (tidak memiliki selubung inti). Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam tempat khusus (nukleus) dan tidak ada membran inti. Bentuk DNA bakteri adalah sirkuler, panjang dan biasa disebut nukleoi. Pada DNA bakteri tidak mempunyai intron dan hanya tersusun atas akson saja. Bakteri juga memiliki DNA ekstrakromosomal yang tergabung menjadi plasmid yang berbentuk kecil dan sirkuler (Jawetz, 2004) .

Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan bakteri, antara lain sebagai berikut.



- 
1. Sumber energi, yang diperlukan untuk reaksi-reaksi sintesis yang membutuhkan energi dalam pertumbuhan dan restorasi, pemeliharaan keseimbangan cairan, gerak dan sebagainya.
 2. Sumber karbon.
 3. Sumber nitrogen, sebagian besar untuk sintesis protein dan asam-asam nukleat.
 4. Sumber garam-garam anorganik, khususnya folat dan sulfat sebagai anion; dan potasium, sodium magnesium, kalsium, besi, mangan sebagai kation.
 5. Bakteri-bakteri tertentu membutuhkan faktor-faktor tumbuh tambahan, disebut juga vitamin bakteri, dalam jumlah sedikit untuk sintesis metabolik esensial (Irianto, 2006).

G. Klasifikasi Bakteri

Untuk memahami beberapa kelompok organisme, diperlukan klasifikasi. Tes biokimia, pewarnaan gram, merupakan kriteria yang efektif untuk klasifikasi. Hasil pewarnaan mencerminkan perbedaan dasar dan kompleks pada sel bakteri (struktur dinding sel), sehingga dapat membagi bakteri menjadi 2 kelompok, yaitu bakteri gram-positif dan bakteri gram-negatif.

1. Bakteri Gram-Negatif

- a. Bakteri gram Negatif Berbentuk Batang (*Enterobacteriaceae*).
Bakteri gram negatif berbentuk batang habitatnya adalah usus manusia dan binatang. *Enterobacteriaceae* meliputi *Escherichia*, *Shigella*, *Salmonella*, *Enterobacter*, *Klebsiella*,

Serratia, *Proteus*. Beberapa organisme seperti *Escherichia coli* merupakan flora normal dan dapat menyebabkan penyakit, sedangkan yang lain seperti *salmonella* dan *shigella* merupakan patogen yang umum bagi manusia.

- b. *Pseudomonas*, *Acinobacter* dan Bakteri gram Negatif Lain.

Pseudomonas aeruginosa bersifat invasif dan toksigenik, mengakibatkan infeksi pada pasien dengan penurunan daya tahan tubuh dan merupakan patogen nosokomial yang penting.

- c. *Vibrio* *Campylobacter*, *Helicobacter*, dan Bakteri lain yang berhubungan.

Mikroorganisme ini merupakan spesies berbentuk batang gram-negatif yang tersebar luas di alam. *Vibrio* ditemukan di daerah perairan dan permukaan air. *Aeromonas* banyak ditemukan di air segar dan terkadang pada hewan berdarah dingin.

- d. *Haemophilus*, *Bordetella*, dan *Brucella*

Gram negatif *Hemophilis influenza* tipe b merupakan patogen bagi manusia yang penting.

- e. *Yersinia*, *Franscisella* dan *Pasteurella*.

Berbentuk batang pendek gram-negatif yang pleomorfik. Organisme ini bersifat katalase positif, oksidase positif, dan merupakan bakteri anaerob fakultatif (Jawetz,2004).

2. Bakteri Gram-Positif

- a. Bakteri gram positif pembentuk spora: Spesies *Bacillus* dan *Clostridium*.



Kedua spesies ini terdapat di mana-mana, membentuk spora, sehingga dapat hidup di lingkungan selama bertahun-tahun. Spesies *Bacillus* bersifat aerob, sedangkan *Clostridium* bersifat anaerob obligat.

b. Bakteri Gram-positif tidak Membentuk Spora: Spesies *Corynebacterium*, *Listeria*, *Propionibacterium*, *Actinomyces*. Beberapa anggota genus *Corynebacterium* dan kelompok *Propionibacterium* merupakan flora normal pada kulit dan selaput lender manusia.

c. *Staphylococcus*

Berbentuk bulat, biasanya tersusun bergerombol yang tidak teratur, seperti anggur. Beberapa spesies merupakan anggota flora normal pada kulit dan selaput lendir, yang lain menyebabkan supurasi dan bahkan septikemia fatal. *Staphylococcus* yang patogen sering menghemolisis darah, mengkoagulasi plasma dan menghasilkan berbagai enzim ekstraseluler. Tipe *Staphylococcus* yang berkaitan dengan medis adalah *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis* dan *Staphylococcus saprophyticus*.

d. *Streptococcus*

Merupakan bakteri gram-positif berbentuk bulat yang mempunyai pasangan atau rantai pada pertumbuhannya. Beberapa *Streptococcus* merupakan flora normal manusia, tetapi lainnya bisa bersifat patogen pada manusia. Ada 20 spesies di antaranya *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus agalactiae*, dan jenis *Enterococcus* (Jawetz, 2004).

Ada beragam jenis bakteri, salah satunya adalah kelompok patogenik. Untuk memahami kelompok bakteri yang satu



ini, bisa dimulai dari istilah “patogenik” itu sendiri. Secara harfiah, istilah ini mengakar pada bahasa Yunani kuno yang berarti penyebab penderitaan. Jadi, secara sederhana, bakteri patogen bisa diartikan sebagai jenis bakteri yang menjadi sumber penderitaan. Dalam kajian yang lebih lengkap, bakteri patogen adalah jenis-jenis bakteri yang menjadi biang penyakit pada makhluk hidup. Bakteri patogen ini bekerja dengan cara menginfeksi organisme dan sebagai akibatnya, muncul gejala-gejala abnormal yang kita kenali sebagai tanda-tanda penyakit. Sebagian dari bakteri patogen ini tidak terasa di tubuh, tetapi tak jarang pula yang menyebabkan penyakit serius semacam HIV, SARS, flu burung, dan masih banyak lagi lainnya.

M. domestica bertindak sebagai vektor penyakit, artinya lalat ini bersifat pembawa/memindahkan penyakit dari satu tempat ke tempat lain. Terdapat dua macam vektor, yaitu vektor mekanis dan vektor biologis. Disebut vektor mekanis apabila agen penyakit di dalam tubuh vector tidak mengalami perubahan. Sementara itu, bila agen penyakit mengalami perubahan (bertambah banyak, berubah siklus atau keduanya) di dalam tubuh vektor disebut sebagai vektor biologis. *M. domestica* bukan merupakan parasit obligat tetapi merupakan vektor yang penting dalam penyebaran agen penyebab penyakit. Di samping itu juga dapat menyebabkan myiasis atau memperparah keadaan luka pada jaringan akibat infestasi lalat.

M. domestica adalah spesies lalat yang banyak berperan sebagai vektor mekanis pada beberapa penyakit. Menurut Arroyo (1998), seekor lalat *M. domestica* dapat membawa sekitar lebih dari 100 macam organisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Selama ini



lalat rumah dikenal hanya dapat menyebabkan penyakit secara tidak langsung karena perannya sebagai vektor mekanik atau perantara berbagai penyakit. Lalat berkembang biak pada media berupa tinja atau feces, karkas, sampah, kotoran hewan dan limbah buangan yang banyak mengandung agen penyakit, dengan demikian lalat mudah tercemari oleh agen penyakit baik di dalam perut, bagian mulut dan kaki. Kontaminasi terjadi pada bagian mulut atau bagian tubuh lalat yang lain seperti kaki, ketika lalat tersebut makan feces yang mengandung agen penyakit, kemudian terbang dan hinggap pada makanan sehat sambil memindahkan agen penyebab penyakit.

Menurut Sigit dkk., (2006), patogen ditularkan oleh *M. domestica* ke manusia saat lalat hinggap pada makanan dan melakukan *regurgitasi* (*vomit drops*) yang secara alami dilakukan sebelum dan selama menelan makanan untuk membantu makannya serta *defikasi*. *Eskreta* dari *regurgitasi* dan *defekasi* inilah yang mengandung agen penyakit. Lalat ini bukan pemakan darah, tetapi dapat mengikuti lalat penghisap darah, makan darah yang busuk dan cairan jaringan. Agen penyakit berpindah dari *feces* atau ludah pada kutikula dan *probosis* lalat ke manusia/hewan akibat perilaku yang dikenal dengan istilah *regurgitasi*. Bibit penyakit dipindahkan melalui rambut-rambut yang terdapat pada kaki dan badan serta bagian mulut dari lalat. Kebiasaan terbang kemudian pergi dan kembali lagi dari feces ke makanan sangat memungkinkan untuk terjadinya proses penularan penyakit .

Berbagai penyakit penting yang dapat ditularkan oleh lalat, antara lain poliomielitis, hepatitis, trakhoma, coxsackie, dan infeksi ECHO virus. Berbagai jenis bakteri enteropatogen yang

berhasil diisolasi dari *M. domestica* yang dikoleksi dari tempat sampah dan kandang ayam antara lain adalah *Acinetobacter* sp, *Cirtobacter freundii*, *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter agglomerans*, *Escherichia coli*, *Hafnia alvei*, *Klebsiella pneumoniae*, *Morganella morganii*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas* sp dan *Salmonella* sp.

H. Bakteri yang Teridentifikasi pada Penelitian

Pada penelitian pertama pada sayap lalat rumah (*Musca Domestica*) teridentifikasi bakteri *Bacillus Cereus* dan pada penelitian yang ke dua didapatkan hasil 3 jenis bakteri pada sayap lalat hijau (*Chrysomya* sp), yakni bakteri *Acinetobacter baumannii*, bakteri *Escherichia coli* dan bakteri *Pantoea aglomerans*. Berikut uraian keempat jenis bakteri tersebut.

1. *Bacillus Cereus*

Bacillus cereus telah dikenali sebagai salah satu penyebab keracunan pada makanan sejak tahun 1955, sejak saat itu mikroorganisme ini telah menarik banyak perhatian dan menjadi salah satu penyebab keracunan pada pangan yang sering ditemukan. Sekitar 5% dari semua kasus keracunan pangan di Eropa tahun 1990 yang telah dilaporkan ke *World Health Organization Surveillance Programme* disebabkan oleh *Bacillus cereus* (WHO, 1990). Menurut data, jumlah kasus minimal *Bacillus cereus* yang dapat menimbulkan keracunan pada pangan adalah sekitar 10^5 sel/gram pangan (CDCP, 1979) Berikut ini merupakan klasifikasi dari *Bacillus cereus*:



Kingdom : Bacteria
Phylum : Firmicutes
Class : Bacilli
Order : Bacillales
Family : Bacillaceae
Genus : Bacillus
Spesies : *Bacillus cereus*

a. Karakteristik Umum

Bacillus cereus merupakan golongan bakteri Gram-positif (bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram), aerob fakultatif (dapat menggunakan oksigen, tetapi dapat juga menghasilkan energi secara anaerobik), dan dapat membentuk spora (endospora). Spora *Bacillus cereus* lebih tahan pada panas kering daripada pada panas lembab dan dapat bertahan lama pada produk yang kering. Selnya berbentuk batang besar (bacillus) dan sporanya tidak membengkakkan sporangiumnya.

Sifat-sifat dan karakteristik-karakteristik lainnya, termasuk sifat-sifat biokimia, digunakan untuk membedakan dan menentukan keberadaan *Bacillus cereus*, walaupun sifat-sifat ini juga dimiliki oleh *Bacillus cereus* var. *mycooides*, *Bacillus thuringiensis* dan *Bacillus anthracis*. Organisme-organisme ini dapat dibedakan berdasarkan pada motilitas/gerakan (kebanyakan *Bacillus cereus* motil/dapat bergerak), keberadaan kristal racun (pada *Bacillus thuringiensis*), kemampuan untuk menghancurkan sel darah merah (aktivitas *hemolytic*) (*Bacillus*

cereus dan lainnya bersifat *beta haemolytic* sementara *Bacillus anthracis* tidak bersifat *hemolytic*), dan pertumbuhan *rhizoid* (struktur seperti akar), yang merupakan sifat khas dari *Bacillus cereus var. mycoides*.

Tabel 1. Kondisi yang Diperlukan bagi Pertumbuhan *Bacillus cereus*

Parameter	
Suhu	< 4°C (4–50°C)
pH	< 4,4 (4,4–9,3)
a _w	< 0,91
Jumlah <i>Bacillus cereus</i> yang ditemukan dalam susu segar pasteurisasi	< 10 organisme/100 ml
Jumlah indikasi <i>Bacillus cereus</i> yang menyebabkan <i>foodborne disease</i>	> 10 ⁵ cfu g ⁻¹ atau ml ⁻¹
Konsentrasi pada makanan yang terkait dengan racun makanan <i>Bacillus cereus</i>	10 ⁵ to > 10 ⁹ cfu ml ⁻¹ atau g ⁻¹

b. Tipe Keracunan

Keracunan akan timbul jika seseorang menelan makanan atau minuman yang mengandung bakteri atau bentuk spornya, kemudian bakteri bereproduksi dan menghasilkan toksin di dalam usus, atau seseorang mengonsumsi pangan yang telah mengandung toksin tersebut. Ada dua tipe toksin yang dihasilkan oleh *Bacillus cereus*, yaitu toksin yang menyebabkan diare (disebabkan oleh protein dengan berat molekul besar) dan



toksin yang menyebabkan muntah atau emesis (disebabkan oleh peptida tahan panas dengan berat molekul rendah). Gejala keracunannya, yaitu sebagai berikut.

1) Tipe Penyebab Diare (*Diarrheal Form*) atau *Long Incubation*

Tipe ini merupakan tipe yang paling ditemukan kasusnya dan terjadi bila seseorang mengalami keracunan yang disebabkan oleh toksin penyebab diare, maka gejala yang timbul berhubungan dengan saluran pencernaan bagian bawah berupa mual dan nyeri perut, seperti kram, diare berair, yang terjadi 8-16 jam setelah mengonsumsi pangan yang telah terkontaminasi *Bacillus cereus*. Rasa mual mungkin seringkali terjadi untuk tipe kasus ini akan tetapi jarang terjadi muntah atau emesis. Kasusnya hampir mirip dengan keracunan makanan yang disebabkan oleh *Clostridium perfringens*. Pada sebagian besar kasus gejala-gejala ini akan tetap berlangsung selama 12–24 jam, tetapi untuk beberapa kasus akan lebih lama (Lancette dan Harmon, 1980).

2) Tipe Penyebab Muntah (*Emetic Form*) atau *Short Incubation*

Bila seseorang mengalami keracunan yang disebabkan oleh toksin penyebab muntah, gejala yang timbul akan bersifat lebih parah dan akut serta berhubungan dengan saluran pencernaan bagian atas, berupa mual dan muntah yang dimulai 1–6 jam setelah mengonsumsi pangan yang terkontaminasi oleh *Bacillus cereus*. Kadang-kadang kram perut dan/atau diare dapat juga terjadi. Umumnya, gejala terjadi selama kurang dari 24 jam. Kasusnya mirip dengan keracunan makanan yang disebabkan oleh *Staphylococcus aureus* (*staph*) dalam hal gejala dan waktu inkubasinya.




Beberapa strain *Bacillus subtilis* dan *Bacillus licheniformis* telah diisolasi dari kambing dan ayam yang dicurigai menjadi penyebab kasus keracunan makanan. Organisme-organisme ini menghasilkan racun yang sangat tahan panas yang mungkin mirip dengan racun penyebab muntah yang diproduksi oleh *Bacillus cereus*.

Tabel 2. Karakteristik Penyakit Akibat *Bacillus cereus*


	Type Diare	Type Muntah
Dosis infeksi	10^5 - 10^7 sel/g	10^5 - 10^8 sel/g
Produksi toksin	Pada usus halus penderita	Terbentuk pada pangan
Tipe Toksin	Protein	Peptida siklik
Masa inkubasi	8-16 jam	1-6 jam
Lama penyakit	12-24 jam (bias > 24 jam)	6-24 jam
Gejala	Mual, nyeri perut seperti kram, dan diare berair	Mual dan muntah
Pangan yang sering tercemar	Produk asal daging, sup, sayuran, susu, pudding, dll.	Nasi, pasta, mie, dll.

Sumber: Granum dan Lund, 1997.




Gambar 3. Koloni *Bacillus aureus* pada medium agar






Gambar 4. Morfologi *Bacillus cereus*



Gambar 5. Koloni *Bacillus cereus*



Gambar 6. Spora *Bacillus cereus*

2. *Acinetobacter baumannii*

Genus *Acinetobacter* termasuk dalam subkelas γ -Proteobacteria, famili Moraxellaceae, yang memiliki karakteristik berupa bakteri gram negatif, obligat aerob, oksidase negatif, katalase positif, tidak bergerak, tidak memfermentasikan glukosa, dan DNA bakteri terdiri atas ikatan hidrogen basa guanine dengan sitosin sebesar 39-47%." Sel bakteri berukuran panjang 1.5 μ m dengan bentuk bervariasi mulai dari kokoid sampai kokobasil yang bergantung pada fase pertumbuhannya. Kebanyakan spesies *Acinetobacter* dapat tumbuh dengan mudah pada media laboratorium sederhana dengan membentuk koloni halus berukuran diameter 2 mm pada temperatur 20-30°C.

Bakteri *Acinetobacter baumannii* (*A. baumannii*) merupakan bakteri gram negatif yang memiliki karakteristik terdiri atas obligat aerob, tidak bergerak, dan pleiomorfik. Infeksi oportunistik bakteri *A.baumannii* dapat ditemukan seringkali pada individu-individu dengan supresi sistem imun dan juga pada individu-individu yang mendapat perawatan di rumah sakit dalam jangka waktu lama (lebih) dari 90 hari). Manifestasi klinis infeksi tersebut dapat berupa pneumonia, infeksi pada kulit atau jaringan lunak, infeksi saluran kemih, meningitis, dan bakteremia. Angka mortalitas yang disebabkan oleh infeksi *Acinetobacter baumannii* setara dengan angka mortalitas yang disebabkan oleh bakteri gram-negatif lainnya (28 to 32%).

Adanya dua karakteristik *A.baumannii* yang menjadikan bakteri ini mendapat perhatian oleh WHO sebagai patogen penting yang sedang menghadapi kesehatan manusia, yaitu ketahanan hidup *A.baumannii* di lingkungan—dan—adanya resistensi terhadap berbagai obat (multidrugresistant/MDR).



Bakteri *A.baumannii* merupakan bakteri yang dapat bertahan hidup baik pada kondisi lingkungan kering maupun lingkungan basah. Studi yang dilakukan oleh Jawad dkk. menunjukkan bahwa *A.baumannii* dapat bertahan hidup selama 20 hari pada kondisi lingkungan dengan kelembaban relatif sekitar 31%.^o Studi lainnya menunjukkan bahwa *A.baumannii* tetap dapat diisolasi dari tempat tidur di rumah sakit setelah 9 hari pasien tersebut keluar dari rumah sakit

Pada tahun 1970, infeksi bakteri *A.baumannii* dapat dengan mudah diobati dengan antibiotik. Akan tetapi, pada saat ini bakteri *A. baumannii* seringkali resisten pada semua jenis antibiotik pilihan pertama. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya wabah *A. baumannii* yang dilaporkan di berbagai rumah sakit di Eropa, Amerika Utara, Argentina, Brazil, Cina, Taiwan, Hongkong, Jepang, dan Korea, serta beberapa rumah sakit di daerah Tahiti dan Asia Pasifik (Gambar 1). Di Indonesia, belum terdapat data yang menunjukkan adanya wabah *A. baumannii* di rumah sakit.

Acinetobacter baumannii adalah patogen yang sangat mengganggu secara global, menginfeksi terutama pasien yang berada di unit perawatan intensif dengan *ventilator-associated pneumonia*, infeksi aliran darah, dan infeksi saluran kemih. Sebuah tim peneliti telah menemukan mekanisme resistensi lain dalam patogen *Acinetobacter baumannii* yang dalam hal ini, salah satu yang memblokir antibiotik, yaitu *colistin*. Penelitian ini telah diterbitkan secara *online* pada tanggal 30 April 2018 dalam *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, sebuah jurnal dari *American Society for Microbiology*.

Awal mula dilakukannya penelitian ini karena penemuan yang dilakukan seorang oleh dokter bahwa *Acinetobacter baumannii* tetap ada pada pasien tua walaupun setelah dilakukannya perawatan. Pasien telah diobati dengan enam antibiotik yang berbeda dan *colistin* digunakan sebagai pengobatan terakhir karena *strain* tersebut sangat resisten terhadap obat-obatan. Ini seperti yang diungkapkan oleh John Boyce, PhD, BSc (Hons), *Associate Professor*, Kepala Laboratorium Departemen Mikrobiologi *Monash University*, Australia.

Sementara itu, menurut Dr. Boyce, yang merupakan *Associate Professor*, Program pada Infeksi dan Imunitas, *Monash Biomedicine Discovery Institute*, dan Departemen Mikrobiologi, *Monash University*, Australia, infeksi tidak dapat dibersihkan karena *strain* ini mengembangkan tingkat resistensi *colistin* yang tinggi selama dalam masa perawatan. Hal ini menyebabkan para dokter yang bertemu dengan Dr. Boyce dalam sebuah konferensi di Roma ingin lebih memahami bagaimana *strain* bisa menjadi sangat resisten terhadap *colistin* sehingga menghasilkan kolaborasi dalam penelitian ini.

Para peneliti kemudian membandingkan urutan untuk mengidentifikasi perubahan genetik, terkait dengan tingkat resistensi *colistin* yang tinggi. Mereka hanya menemukan satu perbedaan: gen yang disebut *hns* telah terganggu oleh elemen urutan penyisipan (sepotong DNA yang dapat memasukkan dirinya ke dalam kromosom), mencegah ekspresi normal. Gen *hns* mengodekan protein yang mengatur transkripsi gen. Mengganggu dengan regulator transkripsi tersebut akan mengubah ekspresi banyak gen lain dalam bakteri. Untuk menentukan bagaimana gangguan gen pengatur, *hns*



memengaruhi resistensi *colistin*, para peneliti membandingkan produk transkripsi gen dari pra—dan pasca—pengobatan isolat. Ekspresi gen yang dapat meningkatkan resistensi *colistin* telah meningkatkan pasca perawatan.

Beberapa eksperimen tambahan yang telah dilakukan menegaskan bahwa gangguan hns bertanggung jawab atas resistensi, termasuk menonaktifkan pada *strain* yang tidak resisten menyebabkan *strain* menjadi sangat resisten terhadap *colistin*.

Colistin sendiri adalah “antibiotik terakhir” yang biasa digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan terhadap *strain* yang resistan terhadap obat bakteri yang kebal terhadap semua antibiotik lainnya. Perkembangan resistensi *colistin* tingkat tinggi, dalam kasus ini memainkan peran utama dalam kegagalan bagaimana cara pengobatan dan menyebabkan infeksi yang tak terpecahkan (meskipun pasien memiliki komorbiditas lain).

Di balik pengembangan resistensi antibiotik *colistin*, dalam kasus ini, memainkan peran utama dalam kegagalan pengobatan dan menyebabkan infeksi yang tak terpecahkan (meskipun pasien memiliki komorbiditas lain).

Untuk memahami mekanisme di balik pengembangan resistensi *colistin* dalam pengaturan klinis dapat memungkinkan kita untuk mengidentifikasi perawatan yang meminimalkan atau menghindari perkembangan resistensi, atau di masa depan memungkinkan kita untuk mengembangkan obat yang menargetkan sistem regulasi yang mengontrol resistensi.



3. *Escherichia coli*

Escherichia coli (*E.coli*) diidentifikasi pertama kali oleh Theodor Escherich seorang dokter anak dari Jerman, dalam studinya mengenai sistem pencernaan anak tahun 1885. Bakteri ini digambarkan sebagai komunitas bakteri coli—sehingga nama bakteri ini sering digunakan—hingga pada akhirnya Castellani dan Chalamos menemukan genus *Escherichia coli* dan menyusun tipe spesies *E. coli*. Nama *Escherichia coli* diberikan tahun 1920 sebagai penghargaan terhadap Theodor Escherich.

Klasifikasi bakteri *E.coli* adalah sebagai berikut.

Domain : Bacteria

Kingdom : Eubacteria

Filum : Proteobacteria

Kelas : Gamma proteobacteria

Ordo : Enterobacteriales

Famili : Enterobacteriaceae

Genus : *Escherichia*

Spesies : *Escherichia coli*.

Bakteri ini mempunyai ukuran panjang sel 2,0–6,0 μm dan lebar 1,1–1,5 μm . Bakteri ini tidak memiliki spora, berbentuk batang gram negatif, bersifat aerob dan aerob fakultatif memfermentasi laktosa, bereaksi positif terhadap indol dan metal merah, dan tidak menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. Umumnya bersifat sebagai flora normal pada saluran pencernaan manusia maupun hewan, tetapi ada 6 beberapa stereotipe yang mempunyai faktor virulensi sehingga bersifat patogen pada manusia maupun hewan.



E.coli *Escherichia coli* masih menjadi problem bagi kesehatan masyarakat di seluruh dunia, karena dapat menyebabkan kejadian luar biasa atau wabah. Pada umumnya, *E. coli* menyebabkan diare dengan derajat kesakitan dan kematian yang tinggi di berbagai negara, terutama negara berkembang.

Diare adalah buang air besar (defekasi) dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair (setengah padat), kandungan air tinja lebih banyak dari biasanya lebih dari 200 g atau 200 ml/24 jam. Definisi lain memakai kriteria frekuensi, yaitu buang air besar encer lebih dari 3 kali per hari. Buang air besar encer tersebut dapat/tanpa disertai lendir dan darah.

Diare akut adalah diare yang onset gejalanya tiba-tiba dan berlangsung kurang dari 14 hari. Sementara itu, diare kronik adalah diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. Diare dapat disebabkan infeksi maupun non infeksi. Dari penyebab diare yang terbanyak adalah diare infeksi. Diare infeksi dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit.

Diare akut sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan, tidak saja di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Penyakit diare masih sering menimbulkan KLB (kejadian luar biasa) dengan penderita yang banyak dalam waktu yang singkat.

Di negara maju walaupun sudah terjadi perbaikan kesehatan dan ekonomi masyarakat, tetapi insiden diare infeksi tetap tinggi dan masih menjadi masalah kesehatan. Di Inggris 1 dari 5 orang menderita diare infeksi setiap tahunnya dan 1 dari 6 orang pasien yang berobat ke praktik umum menderita diare infeksi. Tingginya kejadian diare di negara Barat ini oleh



karena foodborne infections dan waterborne infections yang disebabkan bakteri *Salmonella* spp, *Campylobacter jejuni*, *Stafilococcus aureus*, *Bacillus cereus*, *Clostridium perfringens* dan *Enterohemorrhagic Escherichia coli* (EHEC).

Di negara berkembang, diare infeksi menyebabkan kematian sekitar 3 juta penduduk setiap tahun. Di Afrika anak-anak terserang diare infeksi 7 kali setiap tahunnya, lebih tinggi dibanding negara berkembang lainnya yang hanya mengalami serangan diare 3 kali setiap tahun.

Dari 2.812 pasien diare di Indonesia—berdasarkan data yang dianalisis dari 1995 s/d 2001—penyebab utama diare adalah *Vibrio cholerae* 01, diikuti dengan *Shigella* spp, *Salmonella* spp, *V. Parahaemolyticus*, *Salmonella typhi*, *Campylobacter Jejuni*, *V. Cholera non-01*, dan *Salmonella paratyphi A*.

Diare akut merupakan masalah yang umum ditemukan di seluruh dunia. Di Amerika Serikat keluhan diare menempati peringkat ketiga dari daftar keluhan pasien pada ruang praktik dokter. Sementara itu, beberapa rumah sakit di Indonesia data menunjukkan diare akut karena infeksi terdapat peringkat pertama hingga keempat pasien dewasa yang datang berobat ke rumah sakit.

Di negara maju diperkirakan insiden sekitar 0,5-2 episode/orang/tahun, sedangkan di negara berkembang lebih dari itu. Di USA dengan penduduk sekitar 200 juta diperkirakan 99 juta episode diare akut pada dewasa terjadi setiap tahunnya. WHO memperkirakan ada sekitar 4 miliar kasus diare akut setiap tahun dengan mortalitas 3-4 juta pertahun.





Bila angka itu diterapkan di Indonesia, setiap tahun sekitar 100 juta episode diare pada orang dewasa per tahun.¹⁰ Dari laporan surveilan terpadu tahun 1989 jumlah kasus diare e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara 1 didapatkan 13,3% di Puskesmas, di rumah sakit didapat 0,45% pada penderita rawat inap dan 0,05% pasien rawat jalan. Penyebab utama disentri di Indonesia adalah *Shigella*, *Salmonella*, *Campylobacter jejuni*, *Escherichia coli*, dan *Entamoeba histolytica*. Disentri berat umumnya disebabkan oleh *Shigella dysentery*, kadang-kadang dapat juga disebabkan oleh *Shigella flexneri*, *Salmonella*, dan Enteroinvasive *E.coli* (EIEC).

Beberapa faktor epidemiologis penting dipandang untuk mendekati pasien diare akut yang disebabkan oleh infeksi. Makanan atau minuman terkontaminasi, berpergian, penggunaan antibiotik, HIV positif atau AIDS, merupakan petunjuk penting dalam mengidentifikasi pasien beresiko tinggi untuk diare infeksi.

4. Patofisiologi

Diare akut infeksi diklasifikasikan secara klinis dan patofisiologis menjadi diare non inflamasi dan Diare inflamasi. Diare Inflamasi disebabkan invasi bakteri dan sitotoksin di kolon dengan manifestasi sindroma disentri dengan diare yang disertai lendir dan darah. Gejala klinis yang menyertai keluhan abdomen seperti mulas sampai nyeri, seperti kolik, mual, muntah, demam, tenesmus, serta gejala dan tanda dehidrasi. Pada pemeriksaan tinja rutin secara makroskopis ditemukan lendir dan/atau darah, serta mikroskopis didapati sel leukosit polimorfonuklear.

Pada diare non inflamasi, diare disebabkan oleh enterotoksin yang mengakibatkan diare cair dengan volume yang besar tanpa lendir dan darah. Keluhan abdomen biasanya minimal atau tidak ada sama sekali, tetapi gejala dan tanda dehidrasi cepat timbul, terutama pada kasus yang tidak mendapat cairan pengganti. Pada pemeriksaan tinja secara rutin tidak ditemukan leukosit.

Mekanisme terjadinya diare yang akut maupun yang kronik dapat dibagi menjadi kelompok osmotik, sekretorik, eksudatif dan gangguan motilitas. Diare osmotik terjadi bila ada bahan yang tidak dapat diserap meningkatkan osmolaritas dalam lumen yang menarik air dari plasma sehingga terjadi diare. Contohnya adalah malabsorpsi karbohidrat akibat defisiensi laktase atau akibat garam magnesium.

Diare sekretorik bila terjadi gangguan transportasi elektrolit, baik absorpsi yang berkurang maupun sekresi yang meningkat. Hal ini dapat terjadi akibat toksin yang dikeluarkan bakteri misalnya toksin kolera atau pengaruh garam empedu, asam lemak rantai pendek, atau laksatif non osmotik. Beberapa hormon intestinal, seperti gastrin vasoactive intestinal polypeptide (VIP) juga dapat menyebabkan diare sekretorik.

Diare eksudatif, inflamasi akan mengakibatkan kerusakan mukosa baik usus halus maupun usus besar. Inflamasi dan eksudasi dapat terjadi akibat infeksi bakteri atau bersifat non infeksi seperti gluten sensitif enteropathy, inflammatory bowel disease (IBD) atau akibat radiasi.

Kelompok lain adalah akibat gangguan motilitas yang mengakibatkan waktu transit usus menjadi lebih cepat. Hal ini



terjadi pada keadaan tirotoksikosis, sindroma usus iritabel atau diabetes melitus.

Diare dapat terjadi akibat lebih dari satu mekanisme. Pada infeksi bakteri paling tidak ada dua mekanisme yang bekerja peningkatan sekresi usus dan penurunan absorpsi di usus. Infeksi bakteri menyebabkan inflamasi dan mengeluarkan toksin yang menyebabkan terjadinya diare. Infeksi bakteri yang invasif mengakibatkan perdarahan atau adanya leukosit dalam feses.

Pada dasarnya mekanisme terjadinya diare akibat kuman enteropatogen meliputi penempelan bakteri pada sel epitel dengan atau tanpa kerusakan mukosa, invasi mukosa, dan produksi enterotoksin atau sitotoksin. Satu bakteri dapat menggunakan satu atau lebih mekanisme tersebut untuk dapat mengatasi pertahanan mukosa usus.

a. Adhesi

Mekanisme adhesi yang pertama terjadi dengan ikatan antara struktur polimer fimbria atau pili dengan reseptor atau ligan spesifik pada permukaan sel epitel. Fimbria terdiri atas lebih dari 7 jenis, disebut juga sebagai colonization factor antigen (CFA) yang lebih sering ditemukan pada enteropatogen seperti Enterotoxic E. Coli (ETEC).

Mekanisme adhesi yang kedua terlihat pada infeksi Enteropatogenic E.coli (EPEC), yang melibatkan gen EPEC adherence factor (EAF), menyebabkan perubahan konsentrasi kalsium intraselluler dan arsitektur sitoskeleton di bawah membran mikrovilus. Invasi intraselluler yang ekstensif tidak terlihat pada infeksi EPEC ini dan diare terjadi akibat shiga like toksin.



Mekanisme adhesi yang ketiga adalah dengan pola agregasi yang terlihat pada jenis kuman enteropatogenik yang berbeda dari ETEC atau EHEC.

b. Sitotoksin

Prototipe kelompok toksin ini adalah toksin shiga yang dihasilkan oleh *Shigella dysenteriae* yang bersifat sitotoksik. Kuman lain yang menghasilkan sitotoksin adalah *Enterohemorrhagic E. Coli* (EHEC) serogroup 0157 yang dapat menyebabkan kolitis hemoragik dan sindroma uremik hemolitik, kuman EPEC serta *V. Parahemolyticus*.

c. Beberapa Penyebab Diare Akut Infeksi Bakteri

1) Infeksi non-invasif.

a) *Stafilococcus aureus*

Keracunan makanan karena stafilokokkus disebabkan asupan makanan yang mengandung toksin stafilokokkus, yang terdapat pada makanan yang tidak tepat cara pengawetannya. Enterotoksin stafilokokus stabil terhadap panas.

Gejala terjadi dalam waktu 1–6 jam setelah asupan makanan terkontaminasi. Sekitar 75% pasien mengalami mual, muntah, dan nyeri abdomen, yang kemudian diikuti diare sebanyak 68%. Demam sangat jarang terjadi. Lekositosis perifer jarang terjadi, dan sel darah putih tidak terdapat pada pulasan feses. Masa berlangsungnya penyakit kurang dari 24 jam.

Diagnosis ditegakkan dengan biakan *S. aureus* dari makanan yang terkontaminasi, atau dari kotoran dan muntahan pasien. Terapi dengan hidrasi oral dan antiemetik. Tidak ada peranan antibiotik dalam mengeradikasi stafilokokus dari makanan yang ditelan.



b) *Bacillus cereus*

B. cereus adalah bakteri batang gram positif, aerobik, membentuk spora. Enterotoksin dari *B. cereus* menyebabkan gejala muntah dan diare, dengan gejala muntah lebih dominan.

Gejala dapat ditemukan pada 1–6 jam setelah asupan makanan terkontaminasi, dan masa berlangsungnya penyakit kurang dari 24 jam. Gejala akut mual, muntah, dan nyeri abdomen, yang seringkali berakhir setelah 10 jam. Gejala diare terjadi pada 8–16 jam setelah asupan makanan terkontaminasi dengan gejala diare cair dan kejang abdomen. Mual dan muntah jarang terjadi. Terapi dengan rehidrasi oral dan antiemetik.

c) *Clostridium perfringens*

C. perfringens adalah bakteri batang gram positif, anaerob, membentuk spora. Bakteri ini sering menyebabkan keracunan makanan akibat dari enterotoksin dan biasanya sembuh sendiri. Gejala berlangsung setelah 8–24 jam setelah asupan produk-produk daging yang terkontaminasi, diare cair dan nyeri epigastrium, kemudian diikuti dengan mual, dan muntah. Demam jarang terjadi. Gejala ini akan berakhir dalam waktu 24 jam.

Pemeriksaan mikrobiologis bahan makanan dengan isolasi lebih dari 10⁵ organisme per gram makanan, menegaskan diagnosis keracunan makanan *C. perfringens*. Pulasan cairan fekal menunjukkan tidak adanya sel polimorfonuklear, pemeriksaan laboratorium lainnya tidak diperlukan.

Terapi dengan rehidrasi oral dan antiemetik.

d) *Vibrio cholerae*

V. cholerae adalah bakteri batang gram-negatif, berbentuk koma dan menyebabkan diare yang menimbulkan dehidrasi berat, kematian dapat terjadi setelah 3–4 jam pada pasien yang tidak dirawat. Toksin kolera dapat memengaruhi transport cairan pada usus halus dengan meningkatkan cAMP, sekresi, dan menghambat absorpsi cairan. Penyebaran kolera dari makanan dan air yang terkontaminasi.

Gejala awal adalah distensi abdomen dan muntah, yang secara cepat menjadi diare berat, diare seperti air cucian beras. Pasien kekurangan elektrolit dan volume darah. Demam ringan dapat terjadi.

Kimia darah terjadi penurunan elektrolit dan cairan dan harus segera digantikan yang sesuai. Kalium dan bikarbonat hilang dalam jumlah yang signifikan, dan penggantian yang tepat harus diperhatikan. Biakan feses dapat ditemukan *V.cholerae*. Target utama terapi adalah penggantian cairan dan elektrolit yang agresif. Kebanyakan kasus dapat diterapi dengan cairan oral. Kasus yang parah memerlukan cairan intravena. Antibiotik dapat mengurangi volume dan masa berlangsungnya diare. Tetrasiklin 500 mg tiga kali sehari selama 3 hari, atau doksisisiklin 300 mg sebagai dosis tunggal, merupakan pilihan pengobatan. Perbaikan yang agresif pada kehilangan cairan menurunkan angka kematian (biasanya < 1%). Vaksin kolera oral memberikan efikasi lebih tinggi dibandingkan dengan vaksin parenteral.

e) *Escherichia coli* patogen

E. coli patogen adalah penyebab utama diare pada pelancong. Mekanisme patogen yang melalui enterotoksin dan invasi



mukosa. Ada beberapa agen penting, yaitu sebagai berikut.

- Enterotoxigenic E. coli (ETEC).
- Enteropathogenic E. coli (EPEC).
- Enteroadherent E. coli (EAEC).
- Enterohemorrhagic E. coli (EHEC)
- Enteroinvasive E. Coli (EIHEC)

Kebanyakan pasien dengan ETEC, EPEC, atau EAEC mengalami gejala ringan yang terdiri atas diare cair, mual, dan kejang abdomen. Diare berat jarang terjadi, di mana pasien melakukan BAB lima kali atau kurang dalam waktu 24 jam. Lamanya penyakit ini rata-rata 5 hari. Demam timbul pada kurang dari 1/3 pasien. Feses berlendir, tetapi sangat jarang terdapat sel darah merah atau sel darah putih. Lekositosis sangat jarang terjadi. ETEC, EAEC, dan EPEC merupakan penyakit self limited, dengan tidak ada gejala sisa.

Pemeriksaan laboratorium tidak ada yang spesifik untuk E. coli, lekosit feses jarang ditemui, kultur feses negatif dan tidak ada lekositosis. EPEC dan EHEC dapat diisolasi dari kultur, dan pemeriksaan aglutinasi latex khusus untuk EHEC tipe O157. Terapi dengan memberikan rehidrasi yang adekuat. Antidiare dihindari pada penyakit yang parah. ETEC berespons baik terhadap trimetoprim-sulfametoksazole atau kuinolon yang diberikan selama 3 hari. Pemberian antimikroba belum diketahui akan mempersingkat penyakit pada diare EPEC dan diare EAEC. Antibiotik harus dihindari pada diare yang berhubungan dengan EHEC.

f) **Pantoea agglomerans**

Pantoea Agglomerans, sebelumnya dikenal sebagai *Erwinia herbicola* atau *Enterobacter agglomerans*, ubiquitous epiphytic bakteri gram negatif termasuk kelompok *Enterobacteriaceae*. *Pantoea Agglomerans* ditemukan terutama di permukaan tanaman. Namun, pernah dilaporkan diisolasi dari usus sejumlah serangga dan cephalothorax kepiting bakau, *Ucides cordatus*.

I. Pemeriksaan Molekuler

Teknik analisis biologi molekuler adalah salah satu kunci dalam memahami dogma sentral dalam biologi. Keberadaan teknik ini akan membantu kita memahami proses replikasi, transkripsi, translasi, dan lain-lain. Dengan teknik ini dimungkinkan kita akan dapat mengenal organisme sampai pada tingkatan molekuler yaitu sampai pada tingkatan DNA, RNA, asam amino, dan protein. Pengetahuan awal mengenai alat-alat yang dipakai dalam teknik analisis biologi molekuler menjadi sangat penting untuk dipahami. Alat-alat tersebut bisa dikelompokkan berdasarkan alat utama dan alat pendukung. Alat utama dapat berupa *thermocycler*, elektroforesis, *Geldoc transiluminator*, *sequencer*, dan lain-lain. Sementara itu, alat-alat pendukung lainnya di antaranya adalah oven, spektrofotometer, vortex, mikropipet, dan lain-lain (Holil, 2014).

Salah satu teknik molekuler yang paling sering digunakan yaitu *Polymerase Chain Reaction* (PCR) merupakan suatu metode enzimatik untuk amplifikasi DNA dengan cara *in vitro*. PCR ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1985 oleh





Kary B. Mullis. Amplifikasi DNA pada PCR dapat dicapai bila menggunakan primer oligonukleotida yang disebut amplimers. Primer DNA suatu sekuens oligonukleotida pendek yang berfungsi mengawali sintesis rantai DNA. PCR memungkinkan dilakukannya pelipatgandaan suatu fragmen DNA. Umumnya primer yang digunakan pada PCR terdiri atas 20-30 nukleotida. DNA template (cetakan), yaitu fragmen DNA yang akan dilipatgandakan dan berasal dari patogen yang terdapat dalam spesimen klinik. Enzim DNA polimerase merupakan enzim termotabil Taq dari bakteri termofilik *Thermus aquaticus*. Deoksiribonukleotida trifosfat (dNTP) menempel pada ujung 3' primer ketika proses pemanjangan dan ion magnesium menstimulasi aktivasi polimerase (Yuwono, 2006).

PCR adalah suatu teknik yang melibatkan beberapa tahap yang berulang (siklus) dan pada setiap siklus terjadi duplikasi jumlah target DNA untai ganda. Untai ganda DNA templat (*unamplified DNA*) dipisahkan dengan denaturasi termal dan kemudian didinginkan hingga mencapai suatu suhu tertentu untuk memberi waktu pada primer menempel (*anneal primers*) pada daerah tertentu dari target DNA. Polimerase DNA digunakan untuk memperpanjang primer (*extend primers*) dengan adanya dNTPs (dATP, dCTP, dGTP dan dTTP) dan *buffer* yang sesuai. Umumnya keadaan ini dilakukan antara 20–40 siklus. Target DNA yang diinginkan (*short "target" product*) akan meningkat secara eksponensial setelah siklus keempat dan DNA non-target (*long product*) akan meningkat secara linier (Newton and Graham, 1994).

Menurut Yuwono (2006), pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama, yakni sebagai berikut.

1. DNA cetakan, yaitu fragmen DNA yang akan dilipatgandakan. DNA cetakan yang digunakan sebaiknya berkisar antara 10⁵–10⁶ molekul. Dua hal penting tentang cetakan adalah kemurnian dan kuantitas.
2. Oligonukleotida primer, yaitu suatu sekuen oligonukleotida pendek (18–28 basa nukleotida) yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA. Dan mempunyai kandungan G + C sebesar 50–60%.
3. Deoksiribonukleotida trifosfat (dNTP), terdiri atas dATP, dCTP, dGTP, dTTP. dNTP mengikat ion Mg²⁺ sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Ini yang diperlukan untuk reaksi polimerasi.
4. Enzim DNA Polimerase, yaitu enzim yang melakukan katalisis reaksi sintesis rantai DNA. Enzim ini diperoleh dari Eubacterium yang disebut *Thermus aquaticus*, spesies ini diisolasi dari taman Yellowstone pada tahun 1969. Enzim polimerase taq tahan terhadap pemanasan berulang-ulang yang akan membantu melepaskan ikatan primer yang tidak tepat dan meluruskan wilayah yang mempunyai struktur sekunder.
5. Komponen pendukung lain adalah senyawa *buffer*. Larutan *buffer* PCR umumnya mengandung 10–50mM Tris-HCl pH 8,3–8,8 (suhu 20 °C); 50 mM KCl; 0,1% gelatin atau BSA (Bovine Serum Albumin); Tween 20 sebanyak 0,01% atau dapat diganti dengan Triton X-100 sebanyak 0,1%; di samping itu perlu ditambahkan 1,5 mM MgCl₂. Adapun proses PCR menggunakan alat termosiklus. Sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi.



Menurut Mordechai (1999), ada tiga tahapan penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30-40 siklus dan berlangsung dengan cepat.

1. Denaturasi

Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim taq polymerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit, untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi (membentuk DNA untai ganda lagi) secara cepat, dan ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktifitas enzim Taq polymerase. Aktifitas enzim tersebut mempunyai waktu paruh lebih dari 2 jam, 40 menit, 5 menit masing-masing pada suhu 92,5; 95 dan 97,5 °C.


2. *Annealing* (Penempelan Primer)

Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18–25 basa, mengandung 50–60% G+C dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplemen, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi PCR. Waktu *annealing* yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30–45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah antara 36° C sampai dengan 72° C, tetapi suhu yang biasa dilakukan itu adalah antara 50–60° C.



3. Pemanjangan Primer (*Extention*)


Selama tahap ini Taq polymerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3'. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 °C diperkirakan 35–100 nukleotida/detik, bergantung pada *buffer*, pH, konsentrasi garam dan molekul DNA target. Dengan demikian untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan primer ini. Biasanya di akhir siklus PCR waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda.




Gambar 7. Siklus PCR (1) Denaturasi pada suhu 90°–95 °C; (2) *Annealing* pada suhu 37°–65 °C; (3) Elongasi pada suhu 72 °C ; (4) Siklus pertama selesai (Newton, 1989).

Reaksi-reaksi tersebut di atas diulangi lagi dari 25–30 kali (siklus) sehingga pada akhir siklus akan diperoleh molekul-molekul DNA rantai ganda yang baru yang merupakan hasil polimerasi dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah DNA cetakan yang digunakan. Banyaknya siklus amplifikasi tergantung pada konsentrasi DNA target dalam campuran reaksi. Produk PCR dapat diidentifikasi melalui ukurannya dengan menggunakan elektroforesis gel agarosa. Metode ini terdiri atas menginjeksi DNA ke dalam gel agarosa dan menyatukan gel tersebut dengan listrik. Hasilnya untai DNA kecil pindah dengan cepat dan untai yang besar di antara gel menunjukkan hasil positif (Newton, 1989).

(a) Standard electrophoresis



(b) Gel electrophoresis



Gambar 8. Metode Elektroforesis (Mordechai, 1999)

Keunggulan PCR dikatakan sangat tinggi. Hal ini didasarkan atas spesifitas, efisiensi dan keakuratannya. Spesifitas PCR terletak pada kemampuannya mengamplifikasi sehingga

menghasilkan produk melalui sejumlah siklus. Keakuratan yang tinggi karena DNA polymerase mampu menghindari kesalahan pada amplifikasi produk. Masalah yang berkenaan dengan PCR adalah biaya PCR yang masih tergolong tinggi. Selain itu kelebihan lain metode PCR dapat diperoleh pelipatgandaan suatu fragmen DNA (110 bp, 5×10^{-9} mol) sebesar 200.00 kali setelah dilakukan 20 siklus reaksi selama 220 menit. Reaksi ini dilakukan dengan menggunakan komponen dalam jumlah sangat sedikit, DNA cetakan yang diperlukan hanya sekitar 5 ug oligonukleotida yang diperlukan hanya sekitar 1 mM dari reaksi ini biasa dilakukan dalam volume 50-100 ul. DNA cetakan yang digunakan juga tidak perlu dimurnikan terlebih dahulu sehingga metode PCR dapat digunakan untuk melipatgandakan suatu sekuen DNA dalam genom bakteri hanya dengan mencampurkan kultur bakteri di dalam tabung PCR (Mahardika, 2005).

J. Dasar Dasar Pemeriksaan Bakteri

Untuk menetapkan nama atau identifikasi suatu kuman (bakteri) dari hasil isolasi, diperlukan urutan pemeriksaan seperti berikut.

1. Reaksi terhadap pewarnaan dan morfologi bakteri.
2. Sifat-sifat pertumbuhan (media) dan morfologi koloni.
3. Pengujian sifat-sifat fisiologis/reaksi biokimia dan gerak.
4. Reaksi aglutinasi dan presipitasi.
5. Patogenitet hewan percobaan.
6. tes kulit.
7. Serologi (reaksi pengikat komplemen).



1. Morfologi dan Reaksi Terhadap Pewarnaan

Untuk mengetahui morfologi (bentuk) kuman dan sekaligus reaksi terhadap pewarnaan, dilakukan dengan pewarnaan gram. Namun, jika hanya untuk mengetahui adanya kuman dan bentuk, dapat diperiksa dengan pewarnaan Methylen biru. Dalam *routine* di laboratorium, biasanya dipulas dengan gram, kecuali bakteri-bakteri tahan asam. Dengan mengetahui gram suatu bakteri, dapat kita memilih media-media apa yang diperlukan.

Dengan pewarnaan gram dapat dibagi bakteri-bakteri itu atas 2 golongan: gram positif dan gram negatif.

Gram positif:

- a. Semua Bacillus, misalnya: B.substilis, B.anthrax, B.mycoides.
- b. Semua Clostridium, misalnya: Cl.tetani, Cl.botulinum, Cl.Welchii.
- c. Semua coccus, misalnya: Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Gaffkya, Tetrigena.
- d. Semua diphtheroid, misalnya: C.B.diphtheri, C.xerosis, C.Hoffman.
- e. Genus Mycobacterium, misalnya: @#\$% tbc, lepra.
- f. Treponemataceae
- g. Sel-sel ragi (yeast).

Gram negatif:

- a. Bakteri-bakteri usus patogen, misalnya: B typhus dan paratyphus, B.dysenteri.

- b. Bakteri-bakteri usus apatogen: E.coli, E.intermedium, A.aerogenes, Paracolobactrum.
- c. Semua Reisseria, misalnya: Gonococcus, Meningococcus dan Neisseria lain.
- d. Semua bacteroid, misalnya: B.fragillis, B.funduliformis.
- e. Semua Brucella, misalnya: B.melitensis, B.Ab.Bang.
- f. Hemophilus2.
- g. Pasteurella.

2 Media (Perbenihan, Kultur)

Untuk mengisolasi bakteri dari material (bahan) harus ditanam kepebenihan. Atas dasar pengamatan gram dan morfologi bakteri, kita dapat memilih media apa yang diperlukan. Ada juga bahan yang tidak dapat dilakukan pewarnaan Gram, misalnya terhadap feses, darah. Namun, dalam hal ini, biasanya ada permintaan dari dokter yang ditujukan terhadap pemeriksaan suatu bakteri, misalnya pemeriksaan terhadap salmonella atau shigella atau vibrio (Salmonella bisa terdapat dalam feses dan darah, sedangkan shigella dan vibrio hanya terdapat dalam feses). Dengan demikian, kita dapat memilih media yang selektif untuk gram negatif staf atau media yang eksklusif bagi bakteri-bakteri yang bersangkutan.

Berikut ini contoh media yang diperlukan untuk mengisolasi bakteri-bakteri.

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Media : | Untuk bakteri-bakteri: |
| a. Agar biasa dan bouillon | : Streptococcus,
Staphylococcus. |



- 
- b. Agar darah dan bouillon darah : Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Hemophilus influenza.
 - c. Endo. S.S.agar, Leifson : Salmonella dan Shigella.
 - d. Wilson-Blair : Salmonella typhi.
 - e. Eosin Methylen Blue (E.M.B.agar): Shigella.
 - f. Levinthal pelat agar : Hemophilus influenza.
 - g. Lowenstein, Finlayson, Dubos : Mycobacterium tuberculose.
 - h. Alkalis pepton : Enrichment untuk Vibrio.
 - i. Gaal, Tetrathionat : Enrichment untuk Salmonella.
 - j. Telluriet, Loffler : Corynebacterium diphtheriae.
 - k. Agar darah-kentang-glycerin : Hemophilus pertusis.
 - l. Soda agar, TCBS, Dieudonne : Vibrio (kolera dan ElTor).
 - m. Vervoort dan Noguchi : Leptospira.
 - n. Tarozzi bouillon : Clostridium (anaerobe).
 - o. Sabouraud agar : Ragi, Saccharomyces, Fungi, Torula, Monilia.

3. Reaksi Bio-Kimia

Untuk membantu determinasi atau identifikasi suatu mikroba diperlukan pengujian sifat-sifat fisiologis terhadap beberapa macam gula. Daya fermentasi (peragian) terhadap karbohidrat dari kuman-kuman itu satu sama lain berbeda-beda. Secara pasti, sukar dimengerti mengapa suatu kuman dapat meragikan salah satu gula, sedangkan gula yang lainnya tidak. Padahal jika ditinjau dari sudut empiris, gula itu adalah sama. Hal ini

disebabkan mungkin adanya perbedaan letak atom-atom H dan OH di sekitar atom C.

Gula-gula yang dipakai adalah monosakarida, disakarida, trisakarida. Tiap jenis gula terdapat dalam air-pepton, kadarnya kira-kira 1%. Dalam tabung-tabung peragian ini dimasukkan satu tabung kecil letaknya terbalik, untuk menampung gas yang terbentuk. Tabung peragian ini disebut "tabung Durham". Untuk mengetahui adanya peragian atau tidak maka ke dalam perbenihan dibubuhi suatu indikator sebagai petunjuk asam dan basa. Indikator yang biasanya dipakai dalam peragian gula-gula ini adalah sebagai berikut.

- a. Azolitmin, dalam keadaan netral atau sedikit basa warnanya violet (ungu), dalam keadaan asam warnanya kuning.
- b. Phenol-red, dalam keadaan netral atau sedikit basa warnanya merah dan dalam keadaan asam warnanya kuning.

Bila suatu bakteri ditanam ke peragian ini, maka terdapat 3 kemungkinan, yaitu sebagai berikut.

- a. Bakteri tidak meragikan gula atau terbentuk alkalis sedikit sehingga warna indikator dalam tabung peragian tidak berubah. Hal tersebut dicatat sebagai peragian negatif (-).
- b. Bakteri meragikan gula, tidak membentuk gas. Karena adanya peragian ini, terbentuk asam yang menyebabkan warna indikator berubah dan perubahan ini dapat dilihat. Hal tersebut dicatat sebagai peragian positif (+).
- c. Bakteri meragikan gula dan membentuk gas, terjadi perubahan indikator dan gas yang terbentuk masuk ke dalam tabung Durham. Gas ini dapat kita lihat, yaitu isi tabung Durham jernih. Hal tersebut dicatat sebagai peragian positif dan membentuk gas (+g).



Untuk melakukan pemeriksaan reaksi bio-kimia, di laboratorium disebut "jajaran warna" (jajaran panjang) mungkin karena tutup macam-macam gula itu berwarna-warni. Jajaran warna secara *routine* biasanya terdiri atas agar miring, glukose, lactose, seitz, mannit, maltose, saccharose, indol, methyl red, simon citrat, voges proskauer, urea, T.S.A (T.S.I), dan semi-solid. Sesudah 1-2 hari disimpan pada suhu 37°C (kecuali semi-solid disimpan pada suhu kamar), hasil reaksi dan peragian dapat dibaca.

Cara melakukan pemeriksaan reaksi biokimia.

Pemeriksaan reaksi biokimia, pada umumnya dilakukan terhadap gram negatif staf. Material yang telah ditanam pada media untuk gram negatif staf, seperti Endo agar, S.S. agar dan Leifson secara apusan, sesudah dikeram pada inkubator 37°C selama 24 jam, tumbuhlah koloni-koloni bakteri. Pilihlah koloni-koloni yang rein, kemudian dengan jarum diambil 1 koloni dan ditanam ke perbenihan bouillon 1 ml. Bouillondieram pada suhu 37°C kira-kira 30 menit, seterusnya ditanam ke jajaran warna seperti di atas, dengan ose dan jarum. Untuk citrat, urea, T.S.A. dan semi solid ditanam dengan jarum, selainnya dengan ose.

- Citrat : Tusuk sampai ke dasar tabung, kemudian goreskan pada permukaan citrat agar.
- Urea : Penanaman dilakukan dengan melakukan goresan pada permukaan urea-agar.
- T.S.A : Tusuk sampai ke dasar tabung, kemudian goreskan pada permukaan.
- Semi-solid : Tusuk sampai ke dasar tabung, kemudian jarum ditarik pelan-pelan, melihat gerak.

Penanaman harus secepat mungkin dan aseptis.



4. Aglutinasi dan Presipitasi

Reaksi aglutinasi dilakukan di atas gelas-objek yang bersih, sedangkan reaksi presipitasi dilakukan pada tabung kecel, dengan memakai antiserum. Antiserum diperoleh dengan menyuntik kelinci beberapa kali dengan kuman yang telah dimatikan. Darah kelinci diambil sesudah dibiarkan membeku dan diputar maka cairan yang jernih sebelah atas tabung putar terdapat serum yang mengandung antibody, misalnya agglutinin atau presipitin. Serum ini di laboratorium disebut antiserum. Antiserum ini beraglutinasi dengan bakteri yang homolog (sebagai aglutinogen) reaksinya adalah khas (spesifik).

Reaksi aglutinasi, antara lain dilakukan terhadap pemeriksaan: Salmonella, Shigella, Pneumococ, Vibrio. Sementara itu, presipitat antara lain dilakukan terhadap pemeriksaan: Brucella, Anthrax (Ascoli test), Yeast, dan Fungi.

Berikut ditampilkan sejumlah contohnya.

- a. Pada pemeriksaan feses (tinja) dari seorang pasien dapat dipisahkan sejenis bakteri yang menurut sifat-sifat pertumbuhan dan sifat-sifat biokimianya seperti kuman typhus (*Salmonella typhi*). Berdasarkan pengamatan sifat-sifat ini saja belum dapat ditetapkan diagnosis, pemeriksaan harus dilengkapi dengan aglutinasi dengan antiserum typhus. Bila terjadi aglutinasi positif, barulah dapat diberikan/ditetapkan nama kuman tadi. Sebaliknya, jika aglutinasi negatif, pasti bukan kuman typhus (*Salmonella typhi*).
- b. Demikian juga halnya jika dari urin pasien dapat diisolasi suatu kuman yang sifat-sifat pertumbuhannya dan sifat-



sifat biokimianya sama dengan kuman paratyphus, untuk memastikan diagnosis, harus dilengkapi dengan aglutinasi antiserum paratyphus.

- c. Begitu juga kalau dari feses penderita dapat diisolasi suatu kuman yang sifat-sifat pertumbuhan dan sifat-sifat biokimianya sama dengan Shigella. Maka untuk menetapkan diagnosis dan penetapan jenis Shigella tersebut harus dilanjutkan dengan pemeriksaan aglutinasi, dengan mempergunakan antiserum Shigella.

Dari contoh-contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menetapkan diagnosis/nama bakteri yang dapat diasingkan, misalnya untuk Salmonella, Shigella, Vibrio harus dilengkapi dengan aglutinasi.

5 Patogenitet Hewan Percobaan

Untuk menetapkan diagnosis terhadap beberapa kuman penyakit diperlukan percobaan hewan. Hewan atau binatang yang dipergunakan harus sensitif (peka = rentan) terhadap kuman yang bersangkutan. Pada hewan-hewan percobaan tersebut harus dijumpai kembali kuman-kuman tersebut, atau menimbulkan gejala-gejala yang spesifik (Postulate Koch).

Contoh-contoh:

- a. Mycobacterium tuberculose tipe human dan bovine sensitif terhadap marmut. Tipe bovine saja sensitif terhadap sapi dan kelinci dan sapi.
- b. Pasteurella pestis sensitif terhadap marmut.
- c. Pneumococcus sensitif terhadap tikus putih kecil.
- d. Percobaan rabies binatang kera dan tikus putih kecil (*habel mouse test*).

6. Tes Kulit

Beberapa kuman memerlukan tes kulit untuk memperlengkapi diagnosis. Contoh yang dilakukan tes kulit, ialah sebagai berikut.

- a. Beta Streptococcus.
- b. Pneumococcus.
- c. Myc.tuberkulose.
- d. C.diphtheriae.
- e. Brucella.
- f. Yeast dan Fungi, dll.

7. Serologi

Beberapa penyakit dapat diperiksa dengan “*complement fixation test*” (reaksi pengikat komplemen). Untuk reaksi ini, diperlukan ekstrak-antigen, amboceptor, serum-pasien, eritrosit biri-biri, dan serum komplemen. Cara-cara melakukan *complement fixation test*, lihat diktat serologi. Yang dapat diperiksa dengan tes ini, antara lain sebagai berikut.

- a. Gonococcus (gonorrhoea).
- b. Brucella.
- c. Yeast dan Fungi.
- d. Treponema (penyakit syphilis), dll.

Di dalam *routine* (pekerjaan sehari-hari) pemeriksaan bakteri hanya dilakukan dengan: pewarnaan, kultur (media), reaksi biokimia, aglutinasi dan percobaan hewan.



K. Media dan Hewan Percobaan (Kulturasi dan Inokulasi)

1. Fungsi Media

Media (perbenihan) adalah suatu substansi yang berisi beberapa zat-zat makanan (nutrient) yang dipergunakan untuk menumbuhkan kuman (mikroba). Dalam Laboratorium Mikrobiologi, media itu mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai berikut.

- a. Untuk mengisolasi dan penanaman mikroba.
- b. Untuk pengujian sifat-sifat fisiologis atau reaksi biokimia mikroba.

Zat makanan yang diperlukan oleh mikroba pada umumnya sangat bervariasi. Adanya merupakan senyawa-senyawa organik sederhana atau majemuk, dan bahkan ada yang memerlukan unsur-unsur kimia dalam perkembangan biakannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, pada umumnya bakteri-bakteri yang hidup di dalam tanah, untuk pertumbuhannya memerlukan zat-zat organik sederhana. Sebaliknya bakteri-bakteri patogen hanya dapat tumbuh dalam media yang cukup mengandung "ekstrak daging". Sebab di dalam ekstrak daging itu banyak terdapat unsur-unsur makanan yang cukup, seperti asam-asam amino, pepton protease, hexose-phosphat, dan beberapa vitamin.

Agar supaya mikroba atau bakteri yang ditanam di suatu media dapat tumbuh dengan baik dan subur, medium tersebut harus memenuhi syarat-syarat, antara lain sebagai berikut.

- a. Cukup mengandung unsur-unsur makanan yang mudah dipergunakan atau diambil oleh mikroba.
- b. Mempunyai tekanan osmotis, tegangan permukaan dan reaksi pH yang sesuai (optimum).
- c. Tidak mengandung zat-zat yang dapat menghambat pertumbuhannya (bahan-bahan inhibitor).
- d. Harus steril dan dicegah kemungkinan adanya kontaminasi (mendapat cemaran).

2. Media Pokok (Media Sederhana)

Banyak dikenal macamnya media atau perbenihan. Pada umumnya, media itu adalah variasi dari media pokok atau media sederhana ini. Yang termasuk media pokok adalah larutan bouillon dan air pepton.

Dari kedua media pokok ini dapat dibuat berbagai macam media, seperti media agar, agar-darah, dan bouillon darah. Larutan bouillon dibuat dari air daging, biasanya daging sapi. Bila air daging (kaldu) ini terus dididihkan, kemudian disaring dan air saringan dipekatkan dalam keadaan hampa, maka hasilnya terdapat "ekstrak daging", warnanya merah-tengguli. Hampir semua media itu memerlukan ekstrak daging.

Komposisi dari larutan Bouillon:

R/ Larutan bouillon:

Air daging : 1 liter.
NaCl : 5 gram.
Pepton : 10 gram.



R/ Larutan bouillon:

Aquades : 1 liter.
NaCl : 5 gram.
Pepton : 10 gram.
Ekstrak : 3 gram.

Mengingat air daging itu belum cukup mengandung garam dan protein (pepton), maka perlu ditambah lagi NaCl (0,05%) dan pepton (1%).

Komposisi air pepton.

Media ini adalah media yang paling sederhana, terdiri dari:

R/ Aquadset : 1 liter.
NaCl : 5 gram.
Pepton : 10 gram.

Jika kita ingin membuat perbenihan padat, misalnya perbenihan agar-agar, maka pada perbenihan bouillon di atas ditambah agar-agar 30 gram tiap liter media. Jadi, persentase agar-agar dalam media adalah 3%. Agar-agar ini adalah semacam hidrat-arang, dibuat dari ganggang. Merupakan gel, mencair pada suhu 90-100°C dan membeku kembali pada temperatur 40°C ke bawah. Oleh karena itu, membuat media agar-agar harus dituang ke dalam pelat pada waktu suhunya kira-kira 45-50°C. Agar-agar ini sukar dirusak oleh bakteri yang tumbuh padanya. Fungsi agar ini sebenarnya hanya untuk mengeraskan perbenihan. Dengan perbenihan yang padat ini mikroba tumbuh dengan membentuk koloni-koloni yang dapat dilihat dan memudahkan identifikasi atau determinasi kuman tersebut.

Jika kepada media bouillon di atas ditambah dengan eritrosit biri-biri yang telah dilihat fibrinnya, maka kita memperoleh "bouillon darah". Demikian juga halnya jika pada suatu agar-pelat kita bubuhi eritrosit (darah) biri-biri, maka kita mendapat perbenihan "agar-darah". Demikian juga jika diperlukan perbenihan yang mengandung gula-gula yang diperlukan untuk pengujian sifat-sifat fisiologis dan reaksi biokimia, dapat dibuat dengan menambah gula-gula kepada perbenihan air pepton atau larutan bouillon, sehingga kadarnya di dalam media terdapat kira-kira 1%. Bagaimana proses mengerjakan media ini, tidak diuraikan.

3. Sifat Pertumbuhan pada Media

Sifat-sifat tumbuhnya kuman pada media, baik pada media cair maupun media padat, ada berbagai macam rupa. Untuk menetapkan atau mengisolasi suatu kuman lebih banyak dipakai media padat daripada media yang cair.

a. Media Cair

Tumbuhnya bakteri pada umumnya homogen (merata). Dalam perbenihan cair terdapat beberapa kemungkinan:

- 1) Perbenihan menjadi keruh merata.
- 2) Pembentukan selaput pada permukaan dan selaput ini mungkin:
 - kering, berlendir (*Acetobacter xylinum*, *Micobacterium tuberculose*).
 - mengerut (bakteri mesentericus).
- 3) Pembentukan endapan pada dasar tabung sehingga cairan sebelah atas menjadi jernih (biakan *Streptococcus*).



- 4) Pembentukan zat-zat warna yang meresap ke dalam cairan, seperti warna merah (bakteri *Prodigiosum*), warna hijau (bakteri *Pyocyanus*).

b. Media Padat

Pada media padat karena tumbuhnya kuman-kuman membentuk koloni-koloni maka dari morfologi koloni ini sebagai penolong untuk menetapkan spesies kuman. Yang dimaksud dengan "koloni" adalah kesatuan individu yang mempunyai sifat-sifat sama. Koloni ini terdiri atas beribu-ribu kuman yang berasal dari 1 sel kuman. Bentuk koloni pada media padat pada umumnya bulat. Ada yang licin (*smooth*) dan kasar (*rough*). Pada umumnya, bakteri-bakteri penyakit dapat tumbuh dengan koloni yang *smooth* dan *rough*. Pinggir koloni ada bermacam-macam variasi, misalnya sebagai berikut.

- Rata : bakteri typhus dan paratyph.
- Bergerigi : Streptococcus.
- Berombak : bakteri anthrax.
- Bercabang : bakteri mycoides (bakteri pembentuk spora yang terdapat dalam tanah).
- berlendir : bakteri Klebsiella Friedlander.

Morfologi koloni yang terdapat pada media padat, merupakan faktor yang penting dalam mengisolasi suatu bakteri. Ada koloni yang berlendir, ada yang dapat meluas (merayap) seperti bakteri *Proteus*, dll.

c. Rupa Koloni dan Pembentukan Zat Warna

Pada umumnya, koloni-koloni bakteri pada media tidak berwarna, tetapi ada juga dapat membentuk zat warna karena pengaruh media atau bakteri itu sendiri mengeluarkan zat-zat



warna yang meresap ke dalam perbenihan. Untuk mengisolasi suatu kuman-kuman penyakit dari media, ciri-ciri koloni ini harus dikenal betul. Berikut beberapa contohnya.

- 1) *Salmonella* dan *Shigella* : Koloni-koloninya tidak berwarna, seperti titik air pada media: Endo, S. S. agar.
- 2) *Sal. typhi* : Koloninya berwarna hitam-mengkilat pada media Wilson-Blair.
- 3) *Vibrio* : Koloninya berwarna kuning pada media TCBS-agar, tidak berwarna pada Endo dan Soda-agar.
- 4) *Eschericia coli* : Berwarna merah kilat logam pada media Endo.
- 5) *E. Intermedium* dan *A. aerogenes*: Berwarna merah jambu pada media Endo.
- 6) *Stap. Aureus* : Kuning emas (aurum) pada agar.
- 7) *Stap. albus* : Putih (albus) pada agar.
- 8) *Stap. citrues* : Kuning jeruk pada agar.
- 9) *Myc. tuberculose* : Kuning pucat pada media Lowenstein.
- 10) *B. Prodigiosum* : Membentuk warna merah medianya juga turut berpendar merah.
- 11) *B. Pyocianeus* : Membentuk warna biru (pyocianin) dan medianya juga turut berpendar biru.
- 12) *B. Fluorescens* : Membentuk warna hijau dan medianya juga berpendar hijau.
- 13) *B. Yiolaceus* : Membentuk warna ungu dan medianya juga turut berpendar ungu.



d. Pemecahan Darah (Eritrosit)

Ada beberapa bakteri mempunyai enzim yang dapat mengeluarkan hemoglobin dari stroma eritrosit, enzim ini dinamakan “enzim hemolytic”. Untuk mengetahui apakah suatu bakteri dapat atau merusak darah (eritrosit) maka kita tumbuhkan bakteri itu pada perbenihan bouillon darah atau pada agar-darah. Pada media yang mengandung darah ini (biasanya digunakan darah biri-biri) terdapat 3 kemungkinan: tidak merusak darah (anhemolyse), merusak darah (hemolyse), dan mencernakan darah (hemodigesti).

Tidak merusak darah disebut juga: gamma-hemolyse.

Merusak darah: beta-hemolyse.

Mencernakan darah: alpha-hemolyse (hemodigesti).

Jika suatu kuman ditanam pada perbenihan agar-darah, sesudah 1-2 hari pada suhu 37°C, jika kuman tadi mempunyai enzim hemolytic, maka di sekitar koloni kuman tadi terdapat gelanggang yang jernih dan kemerah-merahan sedikit. Bila diperiksa dengan alat spektroskop maka masih terlihat adanya garis-garis spektrum dari hemoglobin. Jadi hemolysis tidak lain ialah: keluarnya hemoglobin dari eritrosit.

Jika kita memakai medium cair, sesudahnya beberapa lama (1-2 hari), eritrosit akan mengendap menjadi sediment eritrosit. Bila kuman yang ditanam itu mengandung enzim hemolytic, maka terlihatlah larutan sebelah atas sediment eritrosit ada berwarna merah. Warna merah ini adalah disebabkan hemoglobin yang keluar dari eritrosit.

Dapat juga kita menjumpai peristiwa lain, misalnya jika vibrio cholera kita tanam pada medium agar darah, maka sekeliling



koloni terlihat sedikit gelanggang jernih. Selain jernih, terdapat juga warna kehijau-hijauan. Jika diperiksa dengan spektroskop, tidak kelihatan garis spektrum Hb. Di sini Hb terus dihancurkan atau dicernakan menjadi met-Hb, oleh enzim yang dinamakan hemoglobin-trypsin. Jika kita memakai perbenihan cair (bouillon darah), maka sebelah atas sediment eritrosit kelihatan sedikit warna kehijau-hijauan, dan tidak kelihatan warna kemerah-merahan. Peristiwa ini disebut: hemodigesti (alpha hemolise).

Seandainya kuman yang merusakkan darah pada media padat, maka sekitar koloni-koloni tidak terdapat gelanggang jernih, maupun gelanggang hijau. Peristiwa ini disebut: anhemolise (indifferent, gamma-hemolise).

Contoh:

- 1) Anhemolise : Salmonella, Shigella, Klebsiella, Hemophilus influenza, Proteus, dll.
- 2) Hemolysis : Vibrio biotipe ElTory, Staphylococcus aureus, Streptococcus, dll.
- 3) Hemodigesti: Vibrio biotipe classic, Pneumococcus, Streptococcus viridans (alpha Sterptococcus), dll.

4. Cara-cara Menanam pada Perbenihan

Untuk memperoleh biakan murni dari tanaman yang diisolasi dari bahan-bahan pemeriksaan (material), diperlukan perbenihan-pelat. Istilah pelat di laboratorium biasanya dimaksudkan ialah perbenihan padat yang terdapat pada pinggan petri. Pelat yang digunakan sebaiknya mempunyai garis tengah sekurang-kurangnya 12½ cm. Makin lebar permukaan pelat atau media



tentu lebih baik, karena selain untuk mempermudah tumbuhnya kuman juga lebih mudah memperoleh koloni-koloni yang rein. Koloni yang rein ialah koloni yang terpisah, dan sangat diperlukan dalam penetapan kuman selanjutnya.

Untuk mendapatkan koloni-koloni yang rein pada media dapat dilakukan sebagai berikut.

a. Isolasi dengan Goresan (*Streak Plate Method*)

Alat untuk isolasi dengan cara goresan ini ialah ose. Ose terbuat dari platina atau kawat dari "nichrome", panjangnya kira-kira 5 cm. Ujungnya bulat dengan diameter 2-3 mm. Gagangnya dapat dibuat dari tembaga atau kuningan sebagai tempat pegangan. Setiap hendak mempergunakan ose harus dilidah apikan terlebih dahulu di atas nyala api Bunsen sampai membara, kemudian lakukan 3x di atas nyala. Jika sudah dipakai, dilidah apikan lagi seperti di atas. Janganlah meletakkan ose pada sembarang tempat, tetapi letakkanlah ose itu berdiri dengan gagangnya sebelah.

Bahan-bahan yang ditanam dengan cara goresan, misalnya darah, sedimen urin, pus, sputum, cairan otak, dll. Sesudah ose dilidah-apikan, material diambil, kemudian dengan cepat ditanam pada perbenihan padat, misalnya agar-pelat, endo-agar, dll. Pertama-tama, dibuat goresan pada permukaan media mulai dari kiri ke kanan (dari pinggir ke pinggir) sampai memenuhi pelat. Kemudian, goresan-goresan selanjutnya menyilang goresan-goresan pertama tadi. Permukaan media tidak boleh luka karena goresan. Sesudah disimpan dalam inkubator, kita lihat tumbuhnya bakteri, banyak pada goresan-goresan pertama, makin lama makin berkurang. Pada goresan-



goresan yang menyilang terdapat koloni-koloni bakteri yang terpisah (rein koloni), karena pada goresan-goresan ini sudah sedikit tempat bakteri.

Cara lain ada juga dilakukan dengan goresan-goresan yang berliku-liku, seperti zig-zag sampai memenuhi permukaan pelat. Cara ini keduanya baik, bergantung kepada pengalaman masing-masing.

b. Isolasi dengan Apusan (*Smear Plate Method*).

Alat untuk menanam cara apusan ialah spatel, terdiri atas tangkai kaca (*pyrex*) sebelah ujungnya bengkok-siku. Cara apusan biasanya dilakukan terhadap bahan yang banyak mengandung kuman-kuman apatogen, seperti pemeriksaan feses, terhadap bakteri-bakteri typhus kolera, dysentri basiler. Mengingat feses itu banyak mengandung kuman-kuman apatogen, maka jika dilakukan cara goresan, tipis sekali menemukan kuman-kuman bakteri patogen tadi. Untuk mengisolasi bakteri-bakteri patogen yang terdapat di feses, ditanam pada perbenihan yang selektif, misalnya Endo-agar, Salmonella-Shigella-agar (*S. S. agar*) untuk pemeriksaan Salmonella dan Shigella. Pada perbenihan selektif ini koloni-koloni golongan coli dapat dibedakan dengan koloni-koloni Salmonella dan Shigella. Sementara itu, untuk mengisolasi kuman kolera, biasanya dipakai perbenihan eksklusif, artinya kuman-kuman lain mati selain vibrio kolera.

Sedikit bahan diambil dengan ose secara aseptis kemudian ditaruh pada permukaan media sebelah pinggir. Kemudian dengan spatel yang telah disterilkan di atas nyala api Bunsen, dinginkan, bahan tadi diapus dengan spatel sehingga memenuhi permukaan pelat. Penanaman cara apusan ini prinsipnya juga





sama dengan cara goresan, yaitu mula-mula ditanami secara tebal dan lama-kelamaan menipis (ringan). Sesudah disimpan dalam inkubator, maka pada apusan mula-mula terdapat koloni-koloni bakteri yang rapat dan pada apusan yang terakhir, terdapat koloni-koloni yang rein. Pada koloni-koloni yang rein ini kita dapat mengenal koloni-koloni *Salmonella-Shigella*, seperti tetesan air yang tidak berwarna.

c. Isolasi dengan Taburan (*Pour Plate Method*).

Cara ini biasanya dipakai untuk mengisolasi atau menghitung kuman-kuman yang terdapat dalam air. Untuk ini diperlukan agar-agar.

- 1) Bahan (air) diencerkan dahulu dengan air suling yang steril, misalnya 10x, 100x.
- 2) Tiap-tiap penipisan diambil 1 ml kemudian dimasukkan ke dalam piringan petri steril.
- 3) Dibubuhi agar-agar yang suhunya kira-kira 45-50°C secara aseptis, dan tiap pelat 10 ml. Suhu ini dapat diketahui dengan menyentuh tabung ke punggung tangan atau ke pelopak mata. Jika sudah tahu suhunya kira-kira seperti di atas. Jika suhunya sudah di bawah 40°C agar-agar sudah mulai membeku dan tidak dapat dipakai lagi.
- 4) Air dengan agar dicampur pelan-pelan di atas permukaan yang rata, hindarkan jangan sampai agar menyentuh (mengenai) tutup pelat.
- 5) Biarkan membeku, disimpan dalam inkubator 37°C selama 1-2 hari.

- 6) Penyimpanan agar ini terbalik, artinya bagian agarnya sebelah atas, untuk menghindarkan adanya air condens yang mengotori agar.
- 7) Pada agar tumbuh koloni-koloni yang dapat dipisahkan dan dihitung berapa terdapat dalam 1 ml dari yang diencerkan. Kemudian, dapat dihitung berapa jumlah kuman dalam 1 ml air asli (yang tidak diencerkan). Misalnya dalam enceran 10x terdapat kuman 20 maka dalam 1 ml = 200 kuman, dalam 1 ml enceran 100x terdapat 3 maka di dalam 1 ml terdapat 300. Dari jumlah ini dapat diambil jumlah rata-rata, yaitu dalam 1 ml air asli dapat = $(200 + 300) : 2 = 250$ kuman.

d. Cara Menanam Agar-Tegak (*Agar Deep Culture*).

Agar tegak dipakai untuk menyimpan bakteri-bakteri yang telah murni atau stam-stam bakteri. Dalam agar tegak ini bakteri tahan berbulan-bulan. Bila bakteri ini diperlukan, dari agar tegak dapat diisolasi kembali. Penanaman pada agar tegak biasanya diambil dari biakan cair (bouillon).

Caranya:

- 1) Ose (jarum) disterilkan dahulu di atas lampu sen atau lampu spiritus sampai pijar, kemudian dinginkan.
- 2) Tutup kapas dari tabung tempat biakan kuman jika akan dipindahkan, dilepaskan dengan kelingking tangan kanan.
- 3) Kemudian, mulut dan leher tabung reaksi diganggang, dan cara memegang tabung tabung reaksi hendaknya miring untuk menghindari kemungkinan adanya kontaminasi dari udara.



- 
- 4) Dengan ose tadi, biakan diambil, kemudian sebelum menutup mulut tabung, mulut tabung reaksi itu diganggang sekali lagi.
 - 5) Agar tegak yang akan ditanam, tutup kapasnya dilepaskan secara aseptis (lihat di atas), kemudian tusukkan dengan ose yang telah mengandung biakan tadi, sampai ke dasar tabung, selanjutnya jarum ose ditarik dengan hati-hati.
 - 6) Mulut dan leher tabung disterilkan (diganggang) lagi, kemudian ditutup dengan kapas yang terdapat pada keliling tangan sebelah kanan.
 - 7) Ose sebelum diletakkan, harus dilidah-apikan dahulu, kemudian lakukan 3x di atas api.
 - 8) Agar tegak yang telah ditanam, buat etiket dari: nama kuman yang ditanam, tanggal penanaman, dengan pinsil atau tinta dengan etiket kertas yang dilem.

e. Cara menanam agar miring (*Agar slant culture*).

Teknik membuka dan menutup biakan sama dengan di atas, secara aseptis. Namun, cara menanam pada agar miring ialah cara goresan dengan ose atau jarum, dimulai dari pangkal ke arah mulut tabung.

L. Inokulasi pada Hewan Percobaan

Kadang-kadang dalam pembuktian atau penetapan diagnose suatu kuman diperlukan percobaan hewan. Terutama dalam pembuatan-pembuatan imun-serum, percobaan bisa ular,

hewan (kuda) diperlukan sekali. Binatang yang selalu diperlukan untuk percobaan ialah: kuda, kera, marmut, kelinci, tikus-putih, dll.

- Kera : Untuk pembuatan vaksin rabies.
- Kuda : Untuk pembuatan serum, misalnya serum anti tetanus, anti bisa ular, dsb.
- Marmut : Untuk percobaan bakteri tbc. tipe human, leptospira, pasteurilla pestis, Vibrio, Diptheri.
- Kelinci : Untuk percobaan bakteri tbc. tipe bovine, percobaan virus cacar, Staphylococcus.
- Tikus putih : Untuk percobaan Pneumooccus.
- Embryo-ayam : Untuk membiakkan virus, rickettsia.

Cara-cara penyuntikan (inokulasi).

1. Percutan (goresan pada kulit).
Contoh: Pasteurella pestis pada marmut, bibit cacar sapi pada kelinci.
2. Intracutan (ke dalam kulit).
Contoh: Toxin C. B. diphtheriae pada marmut.
3. Subcutan (di bawah kulit).
Contoh: Myc. tuberculose pada pangkal kaki belakang marmut, pemeriksaan kehamilan pada tikus putih kecil. (Aschheim-Zondek), Staphylococcus.
4. Intraperitoneal (ke dalam rongga perut).
Contoh: Pemeriksaan Vibrio kolera, Leptospir, Pasteurella pestis, pada marmut.
5. intraveneus (ke dalam pembuluh darah balik).
Contoh: Pemeriksaan kehamilan (Friedman).



6. Intracerebral (ke dalam otak).
Contoh: Pembuatan vaksin rabies dan pemeriksaan Bakteri Cohn pada otak kera (monyet).
7. Rongga sendi.
Contoh: Percobaan staphylococcus, streptococcus pada kaki belakang kelinci.
8. Ruang mata.
Contoh: Percobaan cacar (Paul test), pada mata kelinci.

M. Pewarnaan Bakteri dengan Pewarnaan Gram

Pewarnaan gram ini pertama kali dikembangkan oleh seorang ahli histologik Christian gram (1884). Dengan pewarnaan gram, bakteri-bakteri dapat dibagi atas 2 golongan, yaitu gram positif dan gram negatif. Gram positif warnanya violet (ungu) karena mengikat zat warna utama "kristal violet". Sementara itu, gram negatif berwarna merah jambu karena melepaskan zat warna utama dan menangkap zat warna penutup "*fuchsin*". Prinsip atau pokok-pokok pewarnaan gram meliputi 4 tingkatan, yaitu sebagai berikut.

1. Pewarnaan dengan zat warna utama (kristal gentian violet yang warnanya violet).
2. Merekatkan (mengintensifkan) dengan suatu larutan mordant, yaitu larutan lugol (J-KJ).
3. Menambahkan zat decolorisasi (bahan peluntur), misalnya alkohol atau alkohol-asam.
4. Pemberian zat penutup (*counter stain*), misalnya larutan fuchsin, safranin, dll.

Pulasan menurut gram mempunyai banyak modifikasi, sebaiknya pakailah salah satu cara saja di antara yang banyak. Kesalahan biasanya terdapat pada "*overstaining*" dan "*overdecolorizing*", yaitu terlalu lama memberikan zat-zat warna atau pancucian dengan alkohol. Akibatnya, gram-positif dapat menjadi gram-negatif. Teknik mewarnai hendaknya dikontrol juga dengan melakukan pemulasan terhadap bakteri yang telah diketahui gramnya. Larutan-larutan zat warna yang digunakan senantiasa diperiksa, apakah sudah terdapat kristal-kristal atau kotoran-kotoran lainnya. Gunakanlah selalu larutan-larutan zat warna yang disaring dengan kertas saring.

Perlu kita ketahui bahwa perbedaan sifat antara kedua golongan bakteri tadi, tidaklah absolut tegas dan spesifik, melainkan bergantung juga pada beberapa faktor, antara lain:

1. Bakteri-bakteri gram positif sering kali tidak dapat menyerap dan mengikat zat warna kristal violet, terutama apabila dibuat preparat dari bakteri-bakteri biakan murni yang telah tua (*rough*).
2. Ada bakteri-bakteri tertentu yang sangat peka terhadap cara-cara yang mengalami sedikit perubahan.
3. Selain daripada itu ada juga bakteri-bakteri yang bersifat "*gram variable*", dll.

Gentian violet dapat diganti dengan crystalviolet atau methylviolet, jika gentian violet tidak ada.

- Larutan Standard Gentian Violet.
Bubuk (kristal) gentian violet : 5 gram.
Alkohol 95-96% : 95 ml.



- Larutan Pakai.
 Larutan standard gentian violet : 10 ml.
 Karbol (phenol) 5% : 90 ml.
- Larutan Standard Fuchsin.
 Bubuk (kristal) fuchsin : 5 gram.
 Alkohol 95-96% : 95 ml.
- Larutan Pakai.
 Larutan standard fuchsin : 10 ml.
 Aquades : 90 ml.

Bubuk digerus dalam mortir dengan alkohol sedikit demi sedikit, setelah larut masukkan ke dalam botol (untuk gentian violet harus botol yang cokelat atau sawo matang). Genapkan volume alkohol sampai volume yang diperlukan. Biarkan 24 jam baru dapat dipakai. Jika hendak dipakai larutan stam ini harus diencerkan dahulu 10x dan disaring. Filtrat ini dipakai untuk pewarnaan.

- Larutan Lugol (J-KJ).
 Yodium kristal : 1 gram
 Kalium jodida (KJ) : 2 gram
 Aquades : 300 ml.

Mula-mula yodium + KJ dalam kira-kira 10 ml aquades. Sesudah yodium larut, genapkan volumenya menjadi 300 ml. Larutan lugol ini disimpan dalam botol yang sawo matang. Dapat juga kita sediakan larutan lugol dalam 5x atau 10x kuat. Pada waktu pemakaian encerkan dengan aquades. Bila perlu disaring. Larutan lugol yang dibuat seperti di atas, langsung dipakai tanpa ditipiskan lagi.

1. Cara Pewarnaan Gram

- a. Buat sediaan pada objek gelas, keringkan, kemudian rekatkan (fiksasi) 3x di atas api Bunsen.
- b. Tuangi dengan larutan karbol-gentian-violet (sesudah sediaan dingin), biarkan selama 5 menit.
- c. Zat warna dibuang dan bubuhi dengan larutan mordant (lugol), diamkan selama kira-kira 1-3 menit.
- d. Lugol dibuang dan preparat dicelupkan ke dalam alkohol 96%, sampai warna gentian violet lepas (sampai gentian violet tidak ada luntur lagi).
- e. Cuci dengan air kran sampai bersih, kemudian bubuhi dengan cat-penutup (*counter stain*) larutan water-fuchsin, biarkan kira-kira 1-2 menit.
- f. Cuci dengan air kran, keringkan dalam temperatur kamar, lihat dengan mikroskop memakai lensa rendam minyak. gram positif = ungu. gram negatif = merah.

2. Variasi Pewarnaan

Gram yang digunakan di Bagian Pathologi Klinik Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta.

Larutan-larutan zat warna:

a. Carbol Gentian Violet

Gentian violet 1 gram; Phenol kristal 2 gram; Alkohol 95% 10 ml dan aquades ad. 100 ml. Gentian violet digerus dengan alkohol dalam mortir tambahkan phenol dan campur. Kemudian tambah air sedikit demi sedikit dengan mengaduk terus, biarkan 24 jam kemudian disaring.



b. Larutan Lugol (J-KJ)

Yodium 1 gram, KJ 2 gram dan aquades 300 ml. Geruslah Yodium bersama KJ hingga homogen, tambah air sedikit demi sedikit, biarkan 24 jam. Saring dan simpan dalam botol yang cokelat. Larutan ini gunanya sebagai mordant.

c. Larutan Safranin (*Counter Stain*)

Safranin 1 gram, alkohol 95% sebanyak 4 ml dan aquades 360 ml. Geruslah safranin dengan alkohol, tuangkan ke dalam botol, mortir berkali-kali dicuci dengan air, biarkan 24 jam. Saring dan siap untuk digunakan.

Cara pewarnaan:

- 1) Buat sediaan pada objek gelas, rekatkan di atas api Bunsen 3x, tunggu sampai dingin.
- 2) Pulas dengan karbol gentian violet selama 60 detik.
- 3) Cuci dengan aquades, bubuhi lugol selama 30 detik.
- 4) Cuci dengan aquades, buang zat warna dengan alkohol (*decolorisasi*) sampai tidak ada lagi warna yang dilepaskan dari sediaan. Boleh juga dicuci lagi dengan aquades.
- 5) Pulas dengan larutan safranin (*counter stain*) kira-kira 30 detik.
- 6) Cuci dengan aquades, biarkan kering dalam temperatur kamar dan periksa dengan mikroskop memakai lensa rendam minyak.

Hasil pewarnaan gram:

- Bakteri gram positif : Biru-ungu (ungu kebiru-biruan).
- Bakteri gram negatif : Merah kekuning-kuningan.

3. Pewarnaan gram modifikasi BURKE.

(Burke's modifikation: J. Bact. 7: 159, 1922).

- a. Sediaan sesudah difiksasi 3x di atas api, dituangi dengan larutan 1% gentian violet (*crystal violet*) dalam alkohol, kemudian segera ditambah dengan larutan Natrium-Bikarbonat 5%, biarkan selama kira-kira 1 menit.
- b. Cuci dengan air, bubuhi dengan larutan mordant yaitu larutan lugol (1 gram J + 2 gram KJ + 200 ml aquades), biarkan selama 1 menit.
- c. Segera dicuci dengan air. Bubuhi larutan decolorisasi tetes demi tetes (bahan peluntur) yang terdiri atas 1 bagian ether + 3 bagian acetone, sampai zat warna utama terlepas atau bahan peluntur tidak berwarna lagi.
- d. Bersihkan dengan air, kemudian bubuhi dengan larutan *counter stain* (cat penutup) safranin 0,5% beberapa detik lamanya.
- e. Bersihkan dengan air, keringkan pada temperatur kamar, lihat dengan mikroskop memakai lensa rendam minyak.
 - 1) Gram positif: biru-ungu.
 - 2) Gram negatif: merah kekuning-kuningan.

Sebagai *counter-stain* dapat juga digunakan karbol fuchsin encer, yaitu Karbol Fuchsin Z. Neelsen 1 ml + 9 ml aquades (pengenceran 10x). Jika karbol fuchsin ini dipakai waktunya dipersingkat, paling lama 1 menit. Karbol fuchsin encer ini sering digunakan untuk memulas vibrio, waktunya kira-kira 5-10 detik. Vibrio berwarna merah jambu dan bentuk koma. Susunan pulasan karbol fuchsin lihat pada pewarnaan tahan asam.



N. Identifikasi secara Umum Bakteri Gram Negatif

1. Karbohidrat (Gula-Gula).

Untuk mengetahui apakah kuman dapat meragikan gula-gula atau tidak. Jika diragukan apakah terbentuk gas, yang dapat dilihat dalam tabung Durham. Dari peragian ini dapat diambil beberapa penafsiran, yakni sebagai berikut.

- a. Golongan coli dapat meragikan gula-gula di atas dan membentuk gas.
- b. *Paracolobactrum* tidak dapat meragikan laktosa dan sakrosa, gula yang diragikan terbentuk gas.
- c. *Salmonella* dan *Shigella* tidak dapat meragikan laktosa dan sakrosa.
- d. *Salmonella paratyphus* membentuk gas pada gula-gula lain yang diragikan, sedangkan *Salmonella typhi* tidak membentuk gas.
- e. *Shigella* juga tidak membentuk gas pada gula yang diragikan, kecuali *Shigella New Castle* dapat membentuk gas.
- f. *Vibrio* baik biotipe klasik maupun biotipe ElTor hanya tidak dapat meragikan gula laktosa pada jajaran warna, tetapi tidak membentuk gas pada gula-gula yang diragikan.

2. Seitz

Seitz itu hanya untuk mengetahui apakah bakteri itu dapat membentuk asam atau basa.

3. Semi-Solid

Semi solid, gunanya untuk mengetahui apakah bakteri dapat bergerak (motile) atau tidak bergerak (nonmotile). Bakteri-bakteri yang bergerak akan naik kepermukaan semi-solid, sedangkan bakteri-bakteri yang tidak bergerak hanya tumbuh pada tempat tusukan saja. Pada semi-solid tumbuhnya bakteri kelihatan seperti awan (embun) putih.

Contoh: Gerak +

- a. Serum vibrio.
- b. Serum salmonella (kecuali *S.gallinarum* dan *B.pullorum* pada burung).
- c. Golongan coli (kecuali *A.Aerogenes*).
- d. *Malleomyces Pseudomallei*.
- e. dll.

Contoh: Gerak –

- a. Semua gol. shigella.
- b. Semua gol. coccus.
- c. *Pasteurella pestis*.
- d. Semua klebsiella.
- e. *Malleomyces mallei*.
- f. *Aerobacter aerogenes*.
- g. dll.

4. Indol Test

Untuk tes ini dipakai perbenihan air pepton yang mengandung tryptophan. Pepton yang banyak mengandung tryptophan ialah: Pepton-witte dan Bactopepton. Syarat perbenihan air pepton



ialah harus bebas dari glukosa, karena jika ada glukosa, kuman meragikan glukosa menjadi asam. Suasana asam ini mencegah bekerjanya enzim proteolytic untuk mencernakan tryptophan.

Prinsip reaksi:

Bakteri yang ditanam pada air pepton, akan memecahkan tryptophan menjadi indol, skatol dan alanin. Indol dengan reagensia indol berwarna merah (*rose*). Warna merah ini dapat disebabkan oleh: methyl-indol dan alanine (hasil ikutan). Ada beberapa cara untuk mengetahui terbentuknya indol ini.

a. Menurut Ehrlich

R/ Paradimethylaminobenzaldehyde : 1 gram.

Asam chlorida (HCl) pekat pa. : 20 ml.

Alkohol absolut (96%) : 95 ml.

Pemakaian:

Kepada perbenihan air pepton yang telah ditanam dengan bakteri 37°C selama 1-2 hari, ditetesi dengan beberapa tetes reagensia. Terbentuk lapisan berwarna merah antara biakan dengan reagensia, reaksi indol positif. Jika tidak terbentuk warna merah, reaksi indol negatif. Jika tabung digoncang, warna merah larut, tambah lagi reagensia.

Untuk mengetahui warna merah yang terjadi benar-benar karena indol atau karena reaksi ikutan, dapat dilakukan sebagai berikut.

- 1) Kepada tabung yang positif tadi dibubuhi dengan *chloroform*, kocok. Tabung dibiarkan berdiri pada rak. Jika warna merah tetap ada di dalam larutan



chloroform, reaksi Indol positif (warna merah bukan karena methylindol atau alanine).

- 2) Kepada perbenihan air pepton yang telah ditanam seperti di atas, dibubuhi dengan campuran reagensia + kaliumpersulfat jenuh sama banyak (aa). Warna merah yang terjadi di sini, hanya disebabkan oleh Indol saja.

b. Menurut Kovacs (Modifikasi)

- R/ Paradikethylaminobenzaldehyde : 5 gram.
Amylalkohol pa. : 75 ml.
Asam chlorida pekat pa. : 25 ml.

Pemakaian:

Beberapa tetes kepada perbenihan telah ditanam dengan bakteri, terjadi warna merah maka reaksi Indol positif. Jika sesudah ditetesi dengan reagensia Indol berwarna kuning, berarti Indol negatif.

Reagensia Indol ini senantiasa disimpan dalam lemari es dan warnanya kuning.

5. Methyl-red Test (Clark dan Lubs)

Perbenihan yang dipakai ialah air-pepton yang mengandung glukosa 5% (glucose-phosphat-medium), sudah ditanam dengan bakteri, inkubator pada 37°C selama 1-2 hari ditetesi dengan indikator Methyl-red.

Prinsip: M.R. tes gunanya untuk mengetahui apakah bakteri dapat membentuk H-ion yang banyak, sehingga pH di bawah 5 (asam). Keadaan asam ini bila ditetesi dengan reagensia M.R. terjadi warna merah pada lapisan permukaan. Terbentuknya warna kuning: negatif.



Reagensia M.R:

0,1 gram methyl-merah dilarutkan dalam 300 ml alkohol 95-96%, sesudah larut ditambah air sampai volume menjadi 500 ml. Reagensia ini senantiasa disimpan dalam lemari es.

6. Voges Proskauer Test

Medium yang digunakan ialah sama dengan untuk M.R. test, yaitu glucose-phosphat-medium.

Prinsip: V.P. tes gunanya untuk mengetahui apakah bakteri sanggup membentuk acetyl metyl carbinol dari glukosa yang ada dalam medium. Acetyl metyl carbinol ini adalah hasil dari pertengahan dari pencernaan glukosa. Dalam suasana alkalis, acetyl metyl carbinol membentuk warna merah pada lapisan sebelah atas dengan reagensia-reagensia Voges Proskauer.

Untuk mengetahui terbentuknya acetyl metyl carbinol dapat diperiksa dengan bermacam-macam reagensia, yang terbaik menurut Barrit.

a. Reagensia Barrit

- 1) Kepada 1 ml kultur yang telah di-eram 1-2 hari pada 37°C ditambah dengan 0,6 ml alpha-naftol 5% dalam alkohol + 0,2 ml KOH 40%. Campur dan dalam 5-20 menit terbentuk warnamerah-jambu, acetyl metyl carbinol positif (V.P. positif).
- 2) Ada juga dilakukan sebagai berikut. kepada perbenihan 5 ml yang telah ditanam dengan bakteri, sesudah di-eram 37°C selama 1-2 hari ditetesi dengan beberapa tetes KOH 16% + beberapa tetes 5% alpha-naftol. Terbentuk warna merah jambu pada lapisan permukaan: V.P. positif.

Terbentuk warna hitam: V.P. negatif. Yang paling umum dipergunakan adalah dengan reagensia menurut Barrit.

b. Reagensia O'Meara

Kepada 2 ml kultur + beberapa tetes NaOH (KOH) 40% yang mengandung reatin 0,3%. Campur dan bila terbentuk warna merah-eosin dalam waktu kira-kira 15 menit, V.P. positif. Pembentukan warna merah tidak boleh lewat dari 4 jam.

c. Reagensia Werkman

Kepada 5 ml kultur + 2-3 tetes FeCl_3 kemudian ditambah dengan 10% NaOH (KOH) sama banyak, kocok sampai bercampur. Terbentuk warna merah pada permukaan medium, V.P. positif.

7. Simon Citrat (Levine Koser)

Medium citrat sama dengan agar miring, warnanya hijau karena dibubuhi dengan indikator bromthymolblue.

Prinsip: Untuk mengetahui apakah bakteri-bakteri yang ditanam pada citrat, sanggup memecahkan Natrium-citrat, yang terdapat dalam medium menjadi NaOH dan asam citrat. Jika dapat dipecahkan maka suasana medium menjadi alkalis (basa) yang menyebabkan medium menjadi biru karena adanya indikator bromthymolblue. Jika tidak dipecahkan maka citrat tidak menjadi alkalis dan warnanya tetap hijau.

IMVIC test.

Indol test, Methyl-red, Voges Proskauer dan Simon citrat, lazim dinamakan "IMVIC test". Imvic tes ini untuk membedakan (diferensiasi) gol.coli. Ketiga jenis bakteri dari gol.coli pada Imvic tes adalah sebagai berikut.



No	Jenis Bakteri	I	M	V	C
1	Escherisia coli	+	+	-	-
2	Esch. Intermediet	-	+	-	+
3	Aerobacter aerogenes	-	-	+	+

8. Urea-Agar

Perbenihan ini gunanya untuk mengetahui apakah bakteri dapat memecahkan urea atau mempunyai enzim urease.

Prinsip:

Bila urea dipecah oleh enzim urease akan terbentuk: $2 \text{NH}_3 + \text{CO}_2$. NH_3 ini menyebabkan suasana alkalis sedikit dan dengan indikator phenol-merah pada medium menyebabkan warna merah jambu. Perbenihan warna merah jambu, Urea tes positif.

9. T.S.A. (T.S.I. = Triple Sugar Iron Agar)

T.S.A. berisi 3 macam gula, yaitu: glukosa, laktosa, saccharosa. Yang sama fungsinya dengan T.S.A. adalah K.I.A. (Kligler Iron Agar), di dalamnya hanya terdapat 2 macam gula: laktosa dan glukosa. Indikator dipakai phenol-red, sehingga T.S.I. (KIA) ini warnanya merah.

Prinsip:

Bila bakteri dapat memecahkan ferroammoniumsulfat dan protein yang mengandung S menjadi H_2S . Asam sulfida yang terbentuk ini dengan Fe^{++} menjadi FeS yang berwarna hitam. Warna hitam ini tampak pada garis tusukan media.

- ~ Terbentuk H_2S atau warna hitam : T.S.A. positif.
- ~ Tidak terbentuk H_2S : T.S.A. negatif.

Medium ini terutama digunakan untuk membedakan dan sebagai biakan muka (biakan awal) dalam pemeriksaan golongan *Salmonella*, *Shigella*, *Vibrio* dan golongan *Coli*.

10. Perbenihan Endo-Agar

Medium Endo-agar untuk mengisolasi bakteri-bakteri usus gram negatif staf, dalam mana dapat dibedakan (diferensiasi) koloni-koloni dari *coli-aerogenes* dengan bakteri-bakteri usus patogen (*Salmonella*, *Shigella* dan *Vibrio*). Bakteri-bakteri gram negatif staf apatogen (*coli aerogenes*) membentuk koloni-koloni yang merah dengan/tanpa merah kilat logam. Sementara itu, bakteri-bakteri patogen yang tidak meragikan laktosa, membentuk koloni yang tidak berwarna seperti titik air (*Salmonella*, *Shigella* dan *Vibrio*).

Prinsip Endo.

Perbenihan Endo-agar mengandung bermacam-macam bahan, antara lain: laktosa, fuchsin-basis dan Na-sulfit.

- a. Fuchsin dengan Na-sulfit membentuk senyawa yang tidak berwarna "leucofuchsin-sulfit", yang sifatnya labil dan mudah direduksi.
- b. Misalnya kita tanam *E.coli* pada Endo, maka *coli* ini memecahkan laktosa menjadi aldehide, seterusnya menjadi asam gula. Aldehide mempunyai sifat yang mereduksi.
- c. Oleh aldehide leucofuchsin-sulfit direduksi menjadi fuchsin dan sulfit kembali, sehingga pada tempat (koloni) *E.coli* tumbuh terjadi penguraian. *E.coli* mempunyai ciri koloni: merah kilat logam. Sedangkan



koloni-koloni *E.intermedium* dan *Aerobacter aerogenes* mempunyai koloni-koloni yang merah jambu tanpa merah kilat logam.

Bakteri yang tidak memecahkan laktosa, seperti *Salmonella*, *Shigella*, *Vibrio* tidak berwarna.

11. Perbenihan Wilson-Blair (Bismuth Sulfite Agar)

Perbenihan W.B.agar khusus untuk mengisolasi bakteri typhus (*Salmonella typhi*). Bahan-bahan yang terdapat dalam medium ini, antara lain: Bismuth ammonium-citrat dan Na-sulfite.

Prinsip:

Bakteri (*S.typhi*) yang dapat menguraikan Bismuth ammonium-citrat dan Na-sulfite, sehingga terbentuk Bismuth-Sulfite yang warnanya hitam. Koloni-koloni dari *S.typhi* pada W.B.agar berwarna hitam dan dikelilingi oleh suatu daerah yang menghitam. Jika dilihat dengan cahaya memantul, maka daerah ini menunjukkan kilat logam. *Salmonella* lain seperti: *S.paratyphi A*, *S.typhimurium*, *S.cholera suis*, membuat koloni-koloni yang berwarna hijau dan mendatar.

12. Perbenihan Tarozzi Bouillon


Tarozzi bouillon untuk bakteri-bakteri yang anaerob. Di dalamnya terdapat potongan-potongan hati, kalsium karbonat dan paraffine.

- a. Bouillon untuk pertumbuhan bakteri (media).
- b. Potongan hati, gunanya untuk menetralkan hidrogen peroksida (H_2O_2) dari udara, karena hati itu mengandung enzim katalase.




- c. Kalsium-karbonat, gunanya untuk menetralkan asam yang mungkin terbentuk.
- d. Paraffin yang terdpat pada permukaan medium, untuk mencegah supaya udara jangan masuk ke dalam perbenihan Tarozzi bouillon.

O. Kerangka Pikir







BAB III

METODOLOGI

PENELITIAN





Aktivitas biokimia sangat penting dalam pengidentifikasian suatu bakteri.

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan model observasi laboratorium murni untuk menentukan spesies bakteri pada sayap lalat hijau (*Chrysomya* sp.). Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *Observasional laboratory* menerapkan prinsip-prinsip penelitian laboratorium, terutama dalam pengontrolan terhadap hal-hal yang memengaruhi jalannya penelitian. Metode ini bersifat *validation* atau menguji, yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Variabel yang memberi pengaruh dikelompokkan sebagai variabel bebas (*independent variables*) dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan sebagai variabel terikat (*dependent variables*).

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua bakteri yang terdapat pada sayap lalat hijau (*Chrysomya* sp). Sampel dalam penelitian ini adalah bakteri pada sayap lalat hijau (*Chrysomya* sp).

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki variabel tunggal yaitu jenis bakteri yang terdapat pada sayap lalat rumah (*Musca domestica*) dan lalat hijau (*Chrysomya* sp.)



E. Defenisi Operasional Variabel

1. *Musca domestica* dikenal sebagai lalat rumah yang pada penelitian ini di peroleh dari perumahan sarindah, kelurahan samata kabupaten Gowa Sulawesi selatan.

2. *Chrysomya* sp.

Chrysomya sp. dikenal sebagai lalat hijau. Sebenarnya penamaan lalat hijau ini bukan hanya diperuntukkan bagi lalat jenis ini saja, tetapisemua lalat yang memiliki ciri-ciri umum yang sama. Lalat hijau memiliki warna tubuh yang hijau atau kehijauan, mengilat dan berpotensi menimbulkan myasis (belatungan) baik pada manusia, hewan maupun bahan makanan lain, yang semuanya termasuk dalam kelompok lalat dari famili Calliphoridae.

3. Bakteri Patogen

Bakteri Patogen adalah bakteri parasit yang menimbulkan penyakit pada hospes atau inang yang dihinggapai.

4. Isolasi Bakteri

Pertumbuhan mikroba dapat dilakukan dalam medium padat, karena dalam medium padat sel-sel mikroba akan terbentuk suatu koloni sel yang tetap pada tempatnya, teknik isolasi mikroba pada sayap lalat hijau (*Chrysomya* sp) yang dilakukan yakni metode gores atau *streak plate* menggunakan loop ose dan menggoreskannya ke permukaan medium agar dengan pola tertentu dengan harapan pada ujung goresan, hanya sel-sel bakteri tunggal yang terlepas dari ose dan menempel ke medium. Sel-sel bakteri tunggal ini akan membentuk koloni tunggal yang



kemudian dapat dipindahkan ke medium selanjutnya agar didapatkan biakan murni.

5. Identifikasi Molekuler

Identifikasi molekuler merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengkonfirmasi spesies bakteri yang terdapat pada sayap lalat (*Chrysomya* sp.) dengan menggunakan metode uji PCR (*Polymerase Chain Reaction*).

6. Uji Mikroskopik

Pengujian secara mikroskopik ialah suatu proses penelitian yang ditujukan untuk melihat dan menganalisis struktur mikro suatu bakteri. Hal ini terkadang menjadi sangat penting untuk mendapatkan jawaban dari suatu kegagalan yang terjadi yang tidak dapat di jelaskan sepenuhnya oleh pengujian secara makroskopik.

F. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu autoklaf, cawan petri, inkubator, labu erlenmeyer, gelas piala, lamina air flow, gelas ukur, pipet tetes, jarum ose, bunsen, gelas objek, deck glass, bunsen, mikropipet , tip, water bath, vortex, mikroskop binokuler, neraca analitik, spatula, tabung eppendorf, gelas objek, tabung reaksi, kertas label, pinset, rak, gelas kimia, saringan, stopwatch, PCR workstation/cabinet (*Scie-Plus*)/Biosafety cabinet, Gene Amp PCR System 9700 (*Applied Biosystem*), satu set alat elektroforesis, UV transulaminator, komputer, oven, freezer -20°C, Sub cell GT Electroforesis system, Profuge Gk-Centrifuge dan tabung PCR (*Sorensen*, Cat. No 35900).



2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu: lalat hijau (*Chrysomya* sp.), aquades, medium *Nutrient Agar* (NA), medium MCA (*Mac Conkey Agar*), medium SSA (*Salminella Shigella Agar*), medium MSA (*Manitol Salt Agar*), larutan pewarnaan gram (alkohol 96%, kristal violet, Iodium, Safranin), medium pengujian aktivitas biokimia (uji TSIA, uji motility, reagen kovac, uji indol, uji citrat dan uji urea), tube, etanol 96%, protease, *buffer* AL-mix, korek, tisu, parafilm (*Sigma*, Cat. No P 7543), primer forward, primer reverse, loading dye, Agarose, Marker 100bp, Kit ekstraksi DNA dan TBE *Buffer* 10x.

G. Prosedur Kerja

1. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang akan digunakan dicuci bersih lalu dibilas dengan air suling, kemudian alat-alat gelas disterilkan dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C dengan tekanan 2 atm selama 2 jam. Alat-alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan menggunakan lampu spiritus dengan tekanan 15 PSI suhu 121°C (Rakhmawati, 2012).

2. Preparasi Sampel

Sampel yang digunakan adalah sayap lalat hijau (*Chrysomya* sp). Pengambilan sampel tersebut dilakukan dengan cara steril.

3. Pembuatan Suspensi Sampel

Sayap lalat hijau (*Chrysomya* sp) dimasukkan ke dalam tabung eppendorf yang berisi PBS. Tujuan dari teknik ini pada prinsipnya adalah melarutkan atau melepaskan mikroba dari substratnya.

4. Pembuatan Media

Bahan-bahan yang akan digunakan disiapkan untuk pembuatan masing-masing medium. Pembuatan media yang digunakan untuk penanaman bakteri antara lain, yaitu:

a. Pembuatan Media NA

Pembuatan media NA (*Nutrient Agar*) adalah dengan cara melarutkan 23 gram bubuk NA ke dalam satu liter aquades, larutan yang terbentuk dimasukkan ke dalam botol scott kemudian dipanaskan hingga homogen. Media NA disterilkan dalam autoclaf selama 15 menit pada suhu 121 °C.

b. Pembuatan Media MCA

Pembuatan Media MCA (*Mac Conkey Agar*) adalah dengan cara melarutkan 23 gram bubuk MCA, masukkan dalam beaker gelas 50 ml dan larutkan dengan aquades dan masukkan dalam erlemeyer. Homogenkan dengan cara dipanaskan di dalam pemanas selama 15 menit, kemudian mulut erlenmeyer di sumbat dengan menggunakan kapas, yang dilapisi kertas, kemudian sumbatan tersebut di tutup kembali dengan menggunakan kertas, lalu di ikat. Sterilkan media tersebut di dalam *autoclave* pada suhu 121 °C selama 15 menit. Dinginkan dengan tuangkan ke dalam cawan petri dan simpan dalam lemari es.

c. Pembuatan Media SSA

Pembuatan Media SSA (*Salminella Shigella Agar*) adalah dengan cara melarutkan 23 gram bubuk SSA, kemudian masukkan dalam *beaker glass* 50 ml dan larutkan dengan aquades, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer. Homogenkan dengan cara dipanaskan di atas pemabas selama 15 menit.



Sterilkan media tersebut di dalam *autoclave* pada suhu 121° C selama 15 menit. Dinginkan dan tuang ke dalam cawan petri dan simpan dalam lemari es.

d. Pembuatan Media MSA

Pembuatan Media MSA (*Manitol Salt Agar*) adalah dengan cara melarutkan 60 gram dehydrate medium dalam 1000 ml aquades dingin. Kocok dan panasi sampai mendidih (jangan terlalu lama mendidih) sampai larut sempurna. Tidak usah steril, tuang pada cawan petri dalam *beaker glass* 50 ml (Rakhmawati, 2012).

Pembuatan media yang digunakan dalam pengujian aktivitas biokimia antara lain, yaitu sebagai berikut.

a. Pembuatan media TSIA

Pembuatan Media TSIA Media (*Triple Sugar Iron Agar*), ditimbang bubuk TSI dengan neraca analitik. Bubuk TSI dimasukkan ke erlenmeyer lalu dilarutkan dengan aquades. Larutan media dipanaskan dengan menggunakan kompor listrik dan diaduk hingga larut sempurna. Dicek pH menggunakan pH stick, pH media TSI adalah 7,4. Media dimasukkan ke tabung reaksi, masing-masing 5 ml dengan menggunakan pipet ukur. Tabung ditutup dengan kapas berlemak, aluminium foil, dan diikat dengan benang pulung. Larutan media disterilisasi dengan *autoclave*. Tabung reaksi diletakkan dalam posisi miring hingga media membeku.

b. Pembuatan media SIM

Media SIM merupakan media yang terdiri atas sulfur dan indol metility (medium tripton). Dalam pembuatannya, pertama-tama yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Pembuatan *motility*: Siapkan alat dan bahan melakukan penimbangan Pepton sebanyak 20,0 gr, NH₄Fe citrat sebanyak 0,2 gr, N₂S₂O₃ sebanyak 0,2 gr, Agar sebanyak 0,3 gr, kemudian ditambahkan aquades sebanyak 1 L dan dilakukan pemanasan sampai mendidih.
- 2) Pembuatan medium tripton 1% (Indol): menimbang tripton sebanyak 10 gr, tambahkan aquasest sebanyak 1 L, kemudian panaskan hingga mendidih.

Setelah keduanya mendidih maka dilakukan pencampuran antara Motility dengan Indol, setelah tercampur, maka didinginkan sejenak dan masukkan kedalam tabung reaksi. Media siap digunakan dengan metode tusuk.

a. Pembuatan Media Simon Citrat

Larutkan SC bubuk 22.5 g/L, *autoclave* 15 menit pada suhu 121 °C, kemudian masukan ke tabung dan miringkan sampai mengeras, dengan pH 6.6 ± 0.2 pada suhu 25 °C.

b. Pembuatan Media Urea

Larutkan urea bubuk 21 g/L akuades, *autoclaf* (15 menit 121 °C), dinginkan sampai 45-55 °C dan tambah 50 ml urea 40% dari larutan urea 40% yang di saring dan disterilisasi. Diamkan dalam keadaan miring sampai mengeras. PH 6.8 ± 0.2 pada suhu 25 °C (Djide, 2006).

5. Isolasi Bakteri

- a. Dari 5 ekor lalat yang dipisahkan antara sayap kanan dan kirinya, sehingga diperoleh 10 sampel sayap lalat hijau (*Chrysomya* sp).
- b. Masing-masing dari 10 sampel sayap lalat tersebut,



masukkan ke dalam tabung eppendorf yang berisi *Phosphat Buffer Saline* (PBS) atau disebut larutan penyangga. PBS merupakan larutan yang terdiri atas asam lemah dan garamnya yang dapat menjaga dan mempertahankan pH. Larutan PBS terdiri atas Natrium Klorida, Natrium Phosphat, Kalium Phosphat dan Kalium Klorida yang dilarutkan dengan air suling (aquades)/ *water for injection* (WFI). Kelompok fosfat berguna untuk mempertahankan pH.

- c. Sampel pada tabung eppendorf tersebut, kemudian dikultivasi ke dalam media yang telah disiapkan yakni media NA, MC dan SS untuk kemudian diidentifikasi mikroba yang tumbuh.

6. Identifikasi Morfologi secara Mikroskopik dengan Pewarnaan Gram

Gelas objek dibersihkan dengan alkohol 96% kemudian difiksasi di atas lampu spiritus, selanjutnya isolat aktif diambil secara aseptik dan diletakkan di atas gelas objek lalu diratakan. Difiksasi kembali di atas lampu spiritus. Setelah dingin ditetaskan cat gram A (kristal violet) 2-3 tetes selama 1 menit, kemudian dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan di udara. Setelah itu ditetesi dengan gram B (Iodium) selama 1` menit, dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan di udara. Kemudian ditetesi dengan gram C (Alkohol 96%) selama 30 detik, lalu dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan di udara. Terakhir ditetesi dengan gram D 42 (*Safranin*) selama 45 detik, lalu dicuci dengan air mengalir dan kelebihan air dihilangkan dengan kertas serap. Pengamatan ini dilakukan dengan melihat bentuk dan warna sel dibawah mikroskop dengan pembesaran tertentu.

7. Pengujian Aktivitas Biokimia

Aktivitas biokimia sangat penting dalam pengidentifikasian suatu bakteri. Jenis reaksi biokimia yang terjadi pada tiap organisme berbeda-beda, dapat dikatakan bahwa reaksi biokimia merupakan sidik jari organisme dalam pengidentifikasian. Tiap jenis bakteri memiliki molekul DNA yang khas dengan rangkaian nukleotida.

Aktivitas biokimia atau metabolisme adalah berbagai reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup atau mikroorganisme untuk mempertahankan hidup. Identifikasi dan pengukuran perubahan kimia yang dilakukan mikroorganisme dengan melakukan berbagai pengujian untuk mengetahui apakah mikroorganisme tersebut menyebabkan perubahan kimia pada substansi khusus atau tidak dan juga pengujian yang dilakukan untuk mengidentifikasi sebagian besar senyawa kimia yang terlihat dalam proses metabolisme. Uji kimia yang dilakukan pada penelitian ini di antaranya, yaitu: uji SIM (*Sulfida Indol Motil*), uji TSIA (*triple sugar iron agar*), uji urea, uji citrat, uji katalase dan uji oksidase.

a. Uji TSIA (*triple sugar iron agar*)

Isolat mikroba biakan diambil sebanyak satu ose kemudian goreskan pada agar miring untuk melihat sifat dari mikroba tersebut, inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam.

b. Uji Indol

Isolat mikroba biakan diambil sebanyak satu ose kemudian inokulasikan ke dalam medium untuk melihat sifat dari mikroba tersebut, inkubasi pada suhu 37°C selama 24



jam, kemudian tambahkan reagen kovak's untuk melihat perubahan warna.

c. Uji Motility

Isolat mikroba biakan diambil sebanyak satu ose kemudian inokulasikan ke dalam medium untuk melihat sifat dari mikroba tersebut, inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam.

d. Uji Urea

Isolat mikroba biakan diambil sebanyak satu ose kemudian goreskan pada agar miring untuk melihat sifat dari mikroba tersebut, inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam.

e. Uji Citrat

Isolat mikroba biakan diambil sebanyak satu ose kemudian goreskan pada agar miring untuk melihat sifat dari mikroba tersebut, inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam (Dwijoesepuro, 1990).

8. Identifikasi Molekuler

a. Ekstraksi DNA

Ekstraksi DNA pada dasarnya merupakan serangkaian proses pemisahan DNA dari komponen-komponen sel lainnya. Ekstraksi DNA pada organisme eukariot dilakukan melalui proses preparasi sampel (*sampel preparation*), melisiskan sel (*cell lysis*), DNA binding, pencucian (*wash*) dan elution.

Langkah-langkah ekstraksi DNA adalah sebagai berikut.

- 1) Sebanyak 200µl sampel dimasukkan ke dalam tabung mikro *sentrifuge* 1,5 ml steril lalu ditambahkan 20µl Proteinase K.

- 2) Homogenkan dengan cara pipetting, kemudian diinkubasi pada 60 °C selama 5 menit.
- 3) Tambahkan 200µl *Buffer* GSB (Geneaid) lalu vortex kemudian diinkubasi kembali pada temperatur yang sama selama 2 menit. 45 Selanjutnya ditambahkan ethanol absolute (96%) dan vortex selama 10 detik.
- 4) Pindahkan semua campuran tersebut ke dalam spin column, sentrifugasi pada 14.000 xg selama 1 menit. Buang *collection tube* yang berada di bawah spin column dan ganti dengan *collection tube* yang baru.
- 5) Tambahkan 400µl *buffer* W1 lalu *sentrifuge* selama 30 detik dengan kecepatan yang sama kemudian buang cairan yang ada pada *collection tube*.
- 6) Tambahkan 600µl *wash buffer* (Geneid) *sentrifuge* selama 30 detik, lalu buang cairan pada *collection tube* dan *sentrifuge* kembali selama 3 menit. Buang *collection tube* dan letakkan *microcentrifuge* steril pada bagian bawah *spin column*.
- 7) Selanjutnya tambahkan 100 µl *Elution buffer* diamkan selama 3 menit kemudian *sentrifuge* dengan kecepatan yang sama selama 30 detik. Cairan yang mengandung DNA yang tertampung pada tabung *microcentrifuge* disimpan pada -4 °C untuk digunakan sebagai template PCR (Levinson, 2008).

b. Amplifikasi PCR (*Polimerase Chain Reaction*).

Prosesnya meliputi 3 tahap, yaitu denaturasi dengan suhu 95 °C selama 30 detik, *annealing* dengan suhu 55 °C selama 30 detik dan ekstention dengan suhu 72 °C selama 1 menit. 46



ini dikerjakan pada sampel DNA yang telah diisolasi, ekstrak DNA dari sampel dan aquades sebagai kontrol negatif. "PCR mix" dimasukkan ke dalam tabung PCR:

Tabel. 3.1. Komposisi Primer Mix

Reaksi	(μ l)
ddH ₂ O	34.75
10X PCR <i>buffer</i>	5
25 mM MgCl	2 2
5 mM Dntp	1
Reverse primer (20pmol)	1
Forward primer (20pmol)	1
Hotstart DNA pol.	0.25
DNA sampel	5
Total premix	50

(Indah N, 2008)

Amplifikasi dilakukan dengan menggunakan mesin PCR (*DNA thermal Cycler*). Untuk amplifikasi PCR, tahap awal denaturasi pada suhu 95 °C selama 15 menit, selanjutnya 94 °C selama 1 menit, *annealing* pada suhu 55 °C selama 30 detik, ekstensi 72 °C selama 1 menit sebanyak 40 siklus dilanjutkan dengan ekstensi akhir suhu 72 °C selama 5 menit dan 12 °C \pm 30 menit untuk penyimpanan (Mordechai, 1999).

c. Elektroforesis Gel Agarose


Agarosa dibuat dengan melarutkan 2 g agarose (BioRad) dalam 100 ml 0,5 x Tris borate EDTA (100 g Tris base, 27.5 g asam borat, 20

ml 0.5 M EDTA pH 8.047 dalam 1 liter air). Kemudian dipanaskan sampai mendidih dan larut. Selanjutnya, ditambahkan 1 μ l ethidium bromida (0.2 μ g/ml) dan dimasukkan dalam pencetak gel yang telah dipasang sisir. Setelah agarosa memadat (sekitar 30 menit) selanjutnya dimasukkan ke dalam tank elektroforesis yang berisi larutan TBE 0.5%. Masukkan DNA sampel yang telah dicampur dengan cairan "*loading dye*" ke dalam sumur dengan perbandingan 2:1, kemudian dimasukkan Marker 100 bp setelah keseluruhan sampel dimasukkan. Elektroda dihubungkan dengan *power supply* kemudian dinyalakan selama 1 jam + voltase 100 volt, 400 Ampere. Setelah itu, alat elektroforesis dimatikan kemudian gel dari alat tersebut diambil. Gel dipindahkan ke dalam UV transiluminator kemudian diamati hasilnya pada komputer. Ukuran fragmen hasil amplifikasi PCR ditentukan dengan cara dibandingkan antara posisi ukuran penanda DNA (*marker*) dengan ukuran fragmen sampel. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya band pada ukuran 996 bp (Muladno, 2002).

d. Analisis Data Sekuensing

Analisis data sekuensing dilakukan dengan menggunakan program *software DNA star*. Untuk analisis sequence alignment, dilakukan dengan membandingkan sekuens yang diperoleh (*query*) dengan yang telah ada pada Gene Bank dengan *database searches NCBI internet site* (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>) menggunakan BLAST (Basic Local Alignment Search Tool).







BAB IV

BAKTERI PADA SAYAP LALAT RUMAH DAN LALAT HIJAU



A. Bakteri pada Sayap Lalat Rumah


Musca domestica

1. Isolasi Bakteri pada Sayap Lalat *M. domestica* Sampel Lalat Kantin

Dari 5 sampel lalat (*M. domestica*) dipisahkan sayap kiri (A) dan sayap kanan (B) yang di isolasikan pada 10 tabung yang berisi medium BHIB. Hasil pengujian pada medium BHIB menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri ditandai dengan adanya kekeruhan pada medium BHIB. Kemudian dilakukan inokulasi pada medium NA (*Nutrien Agar*), MCA (*Mac Conkey Agar*), dan SSA (*Salmonella Shigella Agar*). Selanjutnya, dilakukan pewarnaan gram dari isolate koloni yang umbuh pada medium NA. Kemudian, dilakukan identifikasi dengan pendekatan molekuler pada sampel-sampel yang menunjukkan morfologi koloni yang berbeda pada media kultur yakni sampel L2b, L4a, dan L5b.



(a)



(b)

Gambar 9. (a) Morfologi koloni Isolat L2a pada medium NA yang diisolasi dari sayap lalat (*Musca domestica*). (b) Morfologi koloni isolat L1a dengan pewarnaan gram dengan pembesaran 100 x tampak berbentuk coccus dan basil serta berwarna ungu.

Tabel 4.1 Hasil uji pewarnaan gram bakteri yang disolasi dari sayap lalat kantin

No.	Parameter Uji	Hasil Isolat sampel lalat kantin									
		L1a	L1b	L2a	L2b	L3a	L3b	L4a	L4b	L5a	L5b
1	Morfologi (pewarnaan gram)	Basil	Basil	Basil	Basil	Basil	Basil	Basil		<i>Basil</i>	<i>Basil</i>
2	NA	+	+	+	+	+	+	+	*	+	+


Keterangan: (+) positif

(-) Negatif

(*) Tidak ada pertumbuhan

a. Identifikasi Molekuler Bakteri Pada Sayap Lalat

Setelah melakukan identifikasi molekuler diperoleh hasil strain sebagai berikut.



Gambar 10. Hasil Elektroforesis gel agarose 2% Isolat L2a, L3a dan L5a menunjukkan adanya amplifikasi pada 996 bp.




b. Hasil *Squensing* Urutan Basa Nitrogen Isolat dari Lalat Kantin

GGGGATTTTCGGATTTTTGGGCGTAAGCGCGCGCAGGTG
GTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTG
GAGGGTCATTGGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAG
GAAAGTGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGA
TATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGTCTGTA
ACTGACACTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATT
AGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGT
GTTAGAGGGTTTTCCGCCCTTTAGTGCTGAAGTTAACGCATTA
AGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACT
CAAAGGAATTGACGGGGGCCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGT
GGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGA
CATCCTCTGACAACCCTAGAGATAGGGCTTCTCCTTCGGGAG
CAGAGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGT
GAGATGTTGGGTTAAGTCCC GCAACGAGCGCAACCCTTGATCT
TAGTTGCCATCATTTAGTTGGGCACTCTAAGGTGACTGCCGGT
GACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCAT
GCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGACGG
TACAAAGAGCTGCAAGACCGCGAGGTGGAGCTAATCTCATA
AAACCGTTCTCAGTTCCGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACAT
GAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGT
GAATACGTTCCCGGGCCTTGACACACCGCCCGTCACACCAC
GAGAGTTTGTAAACCCAAAATCGGTGGGGGTAACCTTTTTTG
GAGCCGGCCTCCTAAAGGGGGGACAGGATAATTGGGGTG
GAGTCTCTATCAAGGTTATCGCATAAAAGAAGATTCTCTCT

Gambar 11. Hasil *squensing* urutan basa nitrogen isolat L2b.

2. Isolasi Bakteri pada Sayap Lalat *M. domestica* Sampel Lalat rumah

Dari 5 sampel lalat (*M. domestica*) yang masing-masing dipisahkan sayapnya dan di inokulasikan pada medium NA, MCA dan SS diperoleh 30 isolat yaitu 10 isolat medium NA, 10 isolat medium MCA, dan 10 isolat pada medium SS. Hasil isolat dari medium NA, MCA, dan SSA hanya medium NA dan MCA saja yang ada pertumbuhan bakterinya, sedangkan pada medium SSA tidak ada pertumbuhan bakteri. Selanjutnya melakukan uji pewarnaan gram dari sampel L1a, L1b, L2b, L3a, L3b, L4a pada medium NA dan sampel L4b pada medium MC hasil yang di dapatkan dari pewarnaan gram pada medium NA adalah bakteri *Staphylococcus aureus* gram (+) pada sampel L4b yang tumbuh pada medium MCA adalah bakteri basil gram (-). Setelah itu melakukan pengujian MSA dan pengujian katalase pada sampel L1a, L1b, L2b, L3a, L3b, dan L4a, selanjutnya uji biokimia. Pada uji biokimia hanya sampel L4b saja yang diuji karena sampel L4b hanya tumbuh di medium MCA saja berbeda dengan sampel yang lainnya, kemudian uji selanjutnya yaitu uji molekuler. Pada pengujian molekuler dari sampel lalat rumah hanya beberapa sampel saja yang diuji karena sampel L3a sama koloninya dengan L3b, dan L2b, jadi sampel yang diuji molekuler adalah sampel L1a, L3a, L4a, dan L4b saja.



Gambar 12. Hasil Isolasi bakteri sampel L3b (a) dan L4b (b) yang diisolasi dari sayap lalat (*M. domestica*) pada medium NA.

3. Karakterisasi dan Identifikasi Bakteri pada Sayap Lalat *M. domestica*


Uji yang digunakan pada uji biokimia yaitu, uji TSIA, SIM, citrat dan urea, selanjutnya diamati bentuk selnya dan diuji secara biokimiawi untuk kepentingan identifikasi. Hasil yang diperoleh dari isolat L4b dari medium MC adalah sebagai berikut, untuk TSIA: alkali acid, H₂S (-), dan gas (-). SIM: indol (+), motility (+), dan H₂S (-). Citrat: (+) dan Urea: (+).

Tabel 4.2 Hasil pewarnaan gram bakteri yang disolasi dari sayap lalat rumah

No	Morfologi (pewarnaan gram)	NA	MC	Katalase	Urea	Citrat	MSA	MSA			TSIA			
								Indol	Motiliti	H ₂ S		H ₂ S	Gas	
L1a	<i>Stapylococcus aureus</i>	+	*	+	*	*	Kuning							
L1b	<i>Stapylococcus aureus</i>	+	*	*	*	*	Merah + kuning							
L2a	*													
L2b	<i>Stapylococcus aureus</i>	+	*	+	*	*	Kuning							
L3a	<i>Stapylococcus aureus</i>	+	*	+	*	*	Kuning							
L3b	<i>Stapylococcus aureus</i>	+	*	+	*	*	Kuning							
L4a	<i>Stapylococcus aureus</i>	+	*	+	*	*	Kuning							
L4b	<i>Providencia stuartii</i>		-	*	+	+	*	+	+	-	Alkali acid	-	-	
L5a	*													
L5b	*													

a. Identifikasi Molekuler Bakteri pada Sayap Lalat

Setelah melakukan identifikasi molekuler diperoleh hasil strain sebagai berikut.



Gambar 13. Hasil Elektroforesis gel agarose 2% Isolat L1a, L3a dan L4a, L4b menunjukkan adanya amplifikasi pada 996 bp.

b. Hasil *Squensing* Urutan Basa Nitrogen Isolat dari Lalat Rumah

```

CTGGATACGGATTATTGGGCGTAAGCGCGCTAGGCGGTTTCT
TAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGT
CATTGGAAACTGGGAAACTTGAGTGCAGAAGAGGAAAGTG
GAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGCAGAGATATGGAGGAA
CACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGTCTGTAAGTACTGACGCT
GATGTGCGAAAGCGTGGGGATCAAACAGGATTAGATACCTT
GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTAGGGG
GTTTCCGCCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCG
CCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATT
GACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTC
GAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAATCTTGACATCCTTT
GACCACTCTAGAGATAGAGCTTCCCTTCGGGGACAAAGT
GACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCTGTGAGAT
GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTAAGCT
TAGTTGCCATCATTAAAGTTGGGCACTCTAGGTTGACTGCCGGT
GACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATG

```





```
CCCCTTATGATTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGACAATA
CAAAGGGCAGCTAAACCGCGAGGTCATGCAAATCCCATA
AAGTTGTTCTCAGTTCGGATTGTAGTCTGCAACTCGACTACAT
GAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGTAGATCAGCATGCTACGGT
GAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCAC
GAGAGTTTGTAAACCCGAAGCCGGTGGAGTAACCATTTAT
GGAGCTAGCCGTCGAAGGTGGGACAAATGATTGGGGT
GAAGTCCTAAGGGGGGGCCCCCATAAAAAAGGGGCGGGGG
GG
```


Gambar14. Hasil squensing urutan basa nitrogen isolat L1a)

B. Bakteri pada Sayap Lalat Hijau

Chrysomya sp

1. Isolasi Bakteri pada Sayap Lalat Hijau (*Chrysomya sp.*)

Sampel sayap lalat yang dikultivasi ke dalam media NA, MCA dan SSA dan berdasarkan hasil identifikasi mikroba yang tumbuh. Pada media NA diperoleh 10 isolat yakni L1.KN, L1.KR, L2.KN, L2.KR, L3.KN, L3.KR, L4.KN, L4.KR, L5.KN dan L5.KR. Pada media MC diperoleh 4 isolat yakni L1.KN, L4.KN, L5.KN, L5.KR dan 6 sampel tidak terdapat pertumbuhan bakteri yakni L1.KR, L2.KN, L2.KR, L3.KN, L3.KR, L4.KR. Pada media SS diperoleh 1 isolat L4.KR dan yang tidak terdapat pertumbuhan bakteri ada 9 sampel yakni L1.KN, L1.KR, L2.KN, L2.KR, L3.KN, L3.KR, L4.KN, L5.KN dan L5.KR. (Tabel 4.1).



(a)

(b)

(c)

Gambar 15. Pertumbuhan koloni bakteri dari hasil isolasi sapel sayap lala hijau pada Media NA (a), MacConkey (b) dan SSA (c)

2. Identifikasi Morfologi secara Mikroskopik dengan Pewarnaan Gram

Tabel 4.3. Pengamatan Morfologi Koloni

Sampel	Media NA		Media MC		Media SS		Media MSA	
	Warna	Bentuk	Warna	Bentuk	Warna	Bentuk	Warna	Bentuk
L1. KN	Putih	Tidak teratur	Pink	Bulat	-	-		
	Kuning	Tidak teratur						
L1. KR	Putih	Tidak teratur	-	-	-	-		
L2.KN	Putih	Tidak teratur	-	-	-	-	-	-
	Kuning	Tidak teratur						
L2.KR	Putih	Tidak teratur	-	-	-	-	-	-
	Kuning	Tidak teratur						
L3.KN	Bulat	Tidak teratur	-	-	-	-		





Sampel	Media NA		Media MC		Media SS		Media MSA	
	Warna	Bentuk	Warna	Bentuk	Warna	Bentuk	Warna	Bentuk
L3.KR	Putih	Tidak teratur	-	-	-	-		
L4.KN	Putih	Tidak teratur	Pink	Bulat	-	-		
L4.KR	Putih	Tidak teratur	-	-	Coklat	Menyebar		
L5.KN	Putih	Tidak teratur	Pink	Menyebar	-	-		
L5.KR	Putih	Tidak teratur	Pink	Bulat	-	-	Kuning	Tidak teratur
	Kuning	Tidak teratur						

Keterangan : K1.KN = Sampel 1 sayap kanan lalat hijau (*Chrysomya* sp)
 K1.KR = Sampel 1 sayap kiri lalat hijau (*Chrysomya* sp)

Dari pengamatan morfologi koloni dilakukan berdasarkan warna koloni dan bentuk. Dari media NA pada isolat L1.KN, L2.KN, L2.KR dan L5.KR didapatkan koloni berwarna putih dan kuning berbentuk tidak teratur, pada isolat L1.KR didapatkan koloni berwarna putih dan berbentuk tidak teratur, pada isolat L3.KN, L3.KR, L4.KN, L4.KR dan L5.KN didapatkan koloni berwarna putih berbentuk tidak teratur. Dari media MCA pada isolat L1.KN, L4.KN, L5.KN dan L5.KR didapatkan koloni berwarna pink keunguan dan berbentuk bulat kecil dan menyebar. Dari media SSA pada isolat L4.KR didapatkan koloni berwarna coklat dan bentuknya tersebar. Untuk mengetahui jenis *staphylococcus* pada isolat L2.KN, L2.KR dan L5.KR, maka isolat tersebut kemudian dikultur pada media MSA dan diperoleh hasil pada isolat L2.KN, L2.KR tidak adanya warna mikroba dan pada isolat L5.KR didapatkan koloni berwarna kuning bentuk tak teratur (Tabel 4.1).


Dari hasil pewarnaan gram pada media NA isolat L1.KN koloni putih termasuk basil gram (+) dan koloni kuning termasuk basil gram (-), isolat L1.KR termasuk basil gram (+), isolat L2.KN, L2.KR dan L5.KR pada koloni putih termasuk basil gram (+) dan koloni kuning termasuk coccus gram (+), pada isolat L3.KN, L3.KR, L4.KN, L4.KR dan L5.KN koloni berwarna putih termasuk basil gram (+). Dari media MCA pada isolat L1.KN, L4.KN, L5.KN dan L5.KR termasuk basil gram (-). Dari media SSA pada isolat L4.KR termasuk basil gram (-) (Tabel 4.4).

Tabel 4.4 Pewarnaan Gram


Sampel	Media NA			Media MC			Media SS		
	Warna	Bentuk	Gram	Warna	Bentuk	Gram	Warna	Bentuk	Gram
L1. KN	Ungu	Basil	+	Pink	Basil	-			
	Merah	Basil	-						
L1. KR	Ungu	Basil	+						
L2.KN	Ungu	Basil	+						
	Ungu	Coccus	+						
L2.KR	Ungu	Basil	+						
	Ungu	Coccus	+						
L3.KN	Ungu	Basil	+						
L3.KR	Ungu	Basil	+						
L4.KN	Ungu	Basil	+	Pink	Basil	-			
L4.KR	Ungu	Basil	+				Pink	Basil	-
L5.KN	Ungu	Basil	+	Pink	Basil	-			



Sampel	Media NA			Media MC			Media SS		
	Warna	Bentuk	Gram	Warna	Bentuk	Gram	Warna	Bentuk	Gram
L5.KR	Ungu	Basil	+	Pink	Basil	-			
	Ungu	Coccus	+						



(a)



(b)

Gambar 15. Hasil Identifikasi morfologi secara mikroskopik dengan pewarnaan gram (a) gram positif; (b) gram negatif

3. Uji Biokimia

Setelah dilakukan identifikasi morfologi selanjutnya dilakukan uji biokimia dengan cara menginokulasikan isolat pada medium yang di antaranya TSIA (*triple sugar iron agar*), SIM (*Sulfida Indol Motil*), uji urea, uji citrat.

Tabel 4.5 Hasil uji biokimia isolat dari media MCA

Isolat (Media MC)	TSIA	SIM	Citrat	Urea	Hasil
L1. KN	BS → Alkali Netral Gas (-) H ₂ S (-)	Indol (-) Motiliti (-) H ₂ S (-)	+	+	<i>Acinetobacter</i> sp.

Isolat (Media MC)	TSIA	SIM	Citrat	Urea	Hasil
L4.KN	BS→ Acid Acid Gas (+) H ₂ S (-)	Indol (+) Motiliti (+) H ₂ S (-)	-	-	<i>Escherichia coli</i>
L5.KN	BS→ Alkali Acid Gas (+) H ₂ S (-)	Indol (-) Motiliti (+) H ₂ S (-)	+	+	<i>Enterobacter sp.</i>
L5.KR	BS→ Alkali Acid Gas (+) H ₂ S (-)	Indol (-) Motiliti (+) H ₂ S (-)	-	+	<i>Enterobacter sp.</i>

Keterangan : BS = Butt (permukaan) Slant (miring)


Hasil uji biokimia dari media MC isolat L1.KN diperoleh hasil dari uji TSIA = BS→ Alkali Netral, Gas (-), H₂S (-), uji SIM = Indol (-), Motiliti (-), H₂S (-), uji Citrat (+) dan uji Urea (+). Isolat L4.KN diperoleh hasil dari uji TSIA = BS→ Acid Acid, Gas (+), H₂S (-), uji SIM = Indol (+), Motiliti (+), H₂S (-), uji Citrat (-) dan uji Urea (-). Isolat L5.KN diperoleh hasil dari uji TSIA = BS→ Alkali Acid, Gas (+), H₂S (-), uji SIM = Indol (-), Motiliti (+), H₂S (-), uji Citrat (+) dan uji Urea (+). Isolat L5.KR diperoleh hasil dari uji TSIA = BS→ Alkali Acid, Gas (+), H₂S (-), uji SIM = Indol (-), Motiliti (+), H₂S (-), uji Citrat (-) dan uji Urea (+) (Tabel 4.3).

Tabel 4.6 Hasil uji biokimia isolat dari media SSA

Isolat (Media SS)	TSIA	SIM	Citrat	Urea	Hasil
L4. KR	BS→ Alkali Acid Gas (-) H ₂ S (-)	Indol (-) Motiliti (+) H ₂ S (-)	-	-	<i>Bacillus sp.</i>



Dan dari media SS isolat L4.KR diperoleh hasil dari uji TSIA = BS→Alkali Acid, Gas (-), H₂S (-), uji SIM = Indol (-), Motiliti (+), H₂S (-), uji Citrat (-) dan uji Urea (-) (Tabel 4.4).



Gambar 16. Uji Biokimia pada isolate L1.KN

Sifat metabolisme bakteri dalam uji biokimia biasanya dilihat dari interaksi metabolit-metabolit yang dihasilkan dengan reagen-reagen kimia. Selain itu dilihat kemampuannya menggunakan senyawa tertentu sebagai sumber karbon dan sumber energi.

4. Identifikasi Molekuler

Untuk menentukan spesies bakteri yang jelas maka dilakukan identifikasi molekuler. Adapun isolat yang diidentifikasi secara molekuler yaitu L1.KN, L4.KN dan L5.KR.

```
CCCGTCACCTAGCTGCTCTTGCATTGGTGTATCTAC
CGCTTGTTTCCCGTCGGATGTGAGACCCTGGCGGACTAGGG
TATCCCTTTGATACTGGGGCCTAGAGCAGGGGAGAGGGAG
GTTGATCTCCTGGTGTGGGTCAAAGCGGCGGGATCTG
CAGGAATACCGATGGCGATTAGCCATCTGGGTAATACTGAC
GCTGAGGTACGAAAGCATGGGGAGCAAACAGGATTAGATAC
CCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGATGTCTACTAGCCGTTGGGG
```

```
CCTTTGAGGCTTTAGTGGCGCAGCTAACGCGGTAAGTGGAC
CGCCTGGGGAGTTGGCTTGCAAGATAAACTCATATGATTGGAC
GGGGGTCCGCACAAGCGGGGAGTTGTGTTTTAATCGTTGCAAT
GGAGGAACTTTTTTGGTTTTATATATTAGAACTTTTAAGAGAT
GGATTGGGGGCCCTTTCGGGAAATCTAGAATACAGGGTGCT
GCATGGGTTTTTCGGTCAGCCTCGTTTTCGTGAAGAGGTTGG
GTTTAAGTTTCGGCAAGGAGCGCAACCCTTTTTCTTTACTTTC
CAGCATTTCGGATGGGAACCTTAAAGGATACTGCCAGTA
AAAAATTGGAAGGAAGGGGGGACGATTTCAAGGTCAT
CATGGCCCCTTACCGGCAGGGGCTCCAAAGGGCTACAATG
GTCGGTTCAAAGGGTTGCTTCCCAGCGAAGTATGCTAATCT
CAAAAAAGCCGATCGGAAGCCGGAATGGAGTTTGCCACTTC
GACTTCCATGAAGCCGGAATTCGCTTGTATTTCGCGGGAT
CAGAATGCCCGCGGGGAATCCTTCCCAGGGCCTTGATCCATC
CGCCCCGCAAACCAAGGGGAGTTTGTGGCCCTCGGAAGTC
GTAGGCCTCTACTTGCAAAGAAGGCGGTACCACGGTTGG
GCTCGATGACTGGGTGAAAGTCGAAACAAGGGAAGCCGA
TACATGCTAATCTCCTTGATCCAACCTCTTACCTCAAAAATC
TACCTCGCCGCGAGATCACCGCTGCTGGGATTTA
```

Gambar 17. Hasil skuensing urutan basa isolat L1.KN

Dari hasil identifikasi molekuler urutan basa nitrogen dari isolat L1.KN (Gambar 17.) memiliki kesamaan persentase tertinggi dengan bakteri *Acinotobacter baumannii partial*.





```
GATGGCTTTCGGATACTGGGCGTAAGCGCACGCAGGCG-
GTTTGTAAAGTCAGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGG-
GAACTGCATCTGATACTGGCAAGCTTGAGTCTCGTAGAGGGG-
GTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAG-
GAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCTGGACGAAGACTGAC-
GCTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATAC-
CCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCGACTTGGAGGTTGT-
GCCCTTGAGGCGTGGCTTCCGGAGCTAACGCGTTAAGTCGAC-
CGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACCTCAAATGAATT-
GACGGGGGCCCGCACAAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTC-
GATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGTCTTGACATCCACG-
GAAGTTTTTCAGAGATGAGAATGTGCCTTCGGGAACCGTGAGA-
CAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTGTGAAATGTTG-
GGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTTGTTGC-
CAGCGGTCCGGCCGGAACTCAAAGGAGACTGCCAGTGA-
TAAACTGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGG-
CCCTTACGACCAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATA-
CAAAGAGAAGCGACCTCGCGAGAGCAAGCGGACCTCATA-
AAGTGCGTCTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTC-
CATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGAATGCCAC-
GGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGACACACCGCCCGTCACAC-
CATGGGAGTGGGTTGCAAAGAAGTAGGTAGCTTAACCTTC-
GGGAGGGCGCTTACCACTTTGTGATTCATGACTGGGGT-
GAAGTCTACGGGGTAACCCCAATAATAAACCGGGGGGGGGG
```

Gambar 18. Hasil skuensing urutan basa isolat L4.KN

Dari hasil identifikasi molekuler urutan basa nitrogen dari isolat L4.KN (Gambar 18) memiliki kesamaan persentase tertinggi dengan bakteri *Escherchia coli*.

GTAGACTTATCGGATTACTGGGCGTAAGCGCACGCAGGC-
GGTCTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCCGGGCTTAACCT-
GGGAAGTGCATTTCGAAACTGGCAGGCTAGAGTCTTGTA-
GAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTA-
GAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGG-
ACAAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAA-
CAGGATTAGATAACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTC-
GACTTGGAGGCTGTTCCCCTGAGGAGTGGCTTCCGGAGCTA-
ACGCGTTAAGTCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAG-
GTTAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCGCACAAGCG-
GTGGAGCATGTGGTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCT-
TACCTACTCTTGACATCCACGGAATTCGGCAGAGATGCCT-
TAGTGCCTTCGGGAACCGTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTC-
GTCAGCTCGTGTGTGAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAAC-
GAGCGCAACCCTTATCCTTTGTTGCCAGCGATTCCGGTCGG-
GAACTCAAAGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGT-
GGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCTA-
CACACGTGCTACAATGGCGCATACAAAGAGAAGCGACCTC-
GCGAGAGCAAGCGGACCTCATAAAGTGCGTCGTAGTCCG-
GATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGTCGGAATC-
GCTAGTAATCGTGGATCAGAATGCCACGGTGAATACGTTCC-
CGGGCCTTGACACACCGCCCGTCACACCATGGGGAGT-
GGGTTGCAAAGAAGTAGGTAGCTTAACCTTCGGGAGG-
GCGCTTACCACTTTGTGATTCATGACTGGGGTGAAGTCTA-
AGGGGGGGGCCCAATAAAAAAACCAACAAAGGGG

Gambar 19. Hasil skuensing urutan basa isolat L5.KR

Dari hasil identifikasi molekuler urutan basa nitrogen dari isolat L5.KR (Gambar 19) memiliki kesamaan persentase tertinggi dengan bakteri *Pantoea agglomerans*.



C. Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel lalat dari 2 lokasi yang berbeda. Lokasi pertama yaitu di kantin kampus yang terdapat banyak makanan dalam kondisi tempat yang terbuka, sedangkan lokasi ke dua yaitu diperumahan dalam kondisi tertutup dibandingkan dengan kondisi kantin yang terbuka. Pengumpulan sampel pada 2 lokasi yang berbeda karena pertimbangannya untuk membandingkan bakteri yang terdapat pada sampel sayap lalat kantin dan sayap lalat rumah.

Hasil isolasi sayap lalat pada medium BHIB ditandai dengan adanya kekeruhan pada media yang menunjukkan adanya aktivitas fisiologis dari mikroba yang tumbuh pada media tersebut.

1. Bakteri pada Sampel Lalat Rumah (*Musca domestica*)

Hasil pewarnaan gram dari seluruh isolat yang tumbuh pada medium NA adalah merupakan bakteri basil gram (+) karena bakteri tersebut mengikat warna kristal violet dan menghasilkan warna biru keunguan. Hal ini disebabkan oleh peptidoglikan yaitu salah satu komponen penyusun bakteri. Penyerapan warna yang dilakukan oleh bakteri gram positif akan lebih kuat karena susunan peptidoglikan yang lebih tebal dibandingkan bakteri gram negatif. Warna yang dihasilkan bakteri gram positif akan lebih gelap daripada bakteri gram negatif. Warna yang dihasilkan bakteri gram positif adalah biru keunguan sedangkan bakteri gram negatif akan menghasilkan warna ungu muda sampai merah muda. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang

cukup tebal (20-80 nm) dan terdiri atas 60 sampai 100 persen peptidoglikan dan membran sel selapis. Sedangkan pada isolat medium Mc dan medium SS tidak ada pertumbuhan bakteri.

Hasil yang sama juga diperoleh untuk sampel lalat rumah di mana hasil pewanaan koloni bakteri yang tumbuh pada medium NA merupakan bakteri gram positif untuk sampel L1a, L1b, L2b, L3a, L3b, dan L4a dan gram (-) untuk sampel L4b. Pada uji biokimia sampel L4b yang tumbuh pada medium MCA uji yang dilakukan yaitu, uji TSIA, SIM, Citrat, dan Urea. Hasil yang di dapatkan dari uji biokimia yaitu: bakteri yang diperoleh dari sampel L4b pada medium MCA adalah sebagai berikut, untuk TSIA: alkali acid, H₂S (-), dan gas (+). SIM: indol (+), motility (+), dan H₂S (-). Citrat: (+) dan Urea: (+). Motilitas isolat L4b diuji dengan menginokulasikan isolate pada medium MIO agar tegak dengan menggunakan ose lurus.

Uji MIO terdiri atas motil untuk melihat pergerakan bakteri, indol untuk mengetahui produksi indol dari *tryptophane* dan *ornithin* untuk mengamati perubahan warna yang terjadi pada media. Apabila biakan bakteri menyebar dari bekas garis tusukan maka motilitas positif, apabila terbentuk cincin merah setelah diberi larutan kovak's maka indol positif. Dari isolat L4b menunjukkan hasil positif pada uji indol dan positif motility pada isolat L4b.

Pada pengujian terhadap medium sitrat diperoleh hasil positif pada isolat L4b. Uji sitrat digunakan untuk melihat kemampuan mikroorganismenya menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon dan energi. Untuk uji ini digunakan medium sitrat-koser berupa medium cair atau medium sitrat-simon berupa medium padat. Perubahan warna dari



hijau menjadi biru menunjukkan bahwa mikroorganisme mampu menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. Sedangkan pada medium sitrat-koser, kemampuan menggunakan sitrat ditunjukkan oleh kekeruhan yang menandakan adanya pertumbuhan.

Pada pengujian terhadap medium urea diperoleh hasil positif pada isolat L4b. Isolat L4b ini memiliki enzim urease. Medium Urea Broth digunakan untuk menguji aktivitas urease. Urease merupakan enzim hidrolitik yang menyerang ikatan nitrogen dan karbon pada komponen amida misalnya urea dan membentuk alkaline yang produk akhirnya adalah amonia. Adanya amonia dalam media akan menyebabkan warna indikator berubah menjadi pink tua yang menandakan bahwa bakteri memiliki enzim urease sehingga dapat dikatakan reaksi ini menunjukkan hasil uji positif. Berdasarkan hasil uji biokimia dan pewarnaan gram, koloni yang tumbuh pada medium NA adalah *Staphylococcus aureus* yang merupakan bakteri gram (+). Sedangkan dari medium MC hasil yang diperoleh yaitu bakteri *Providencia stuartii* yang merupakan bakteri basil gram (-).

Dalam proses identifikasi molekuler mikroorganisme, ada 3 proses utama yang paling dasar yaitu ekstraksi, amplifikasi dan elektroforesis. Pada tahap ekstraksi terjadi pemisahan benang-benang DNA dengan komponen sel yang lain.

Pada proses ekstraksi DNA ini digunakan Kit Gysnc Genomic DNA Purifucation kit (Geneid). Tahap pertama dalam isolasi DNA adalah proses perusakan atau penghancuran membran dan dinding sel. Pemecahan sel (lisis) merupakan tahapan dari awal isolasi DNA yang bertujuan untuk mengeluarkan isi sel. Pada proses lisis dengan menggunakan *buffer* GSB Geneid. *Buffer*



tersebut selain berperan dalam melisiskan membran sel juga dapat berperan dalam mengurangi aktivitas enzim nuklease yang merupakan enzim pendegradasi.

Pada proses pemanasan tinggi atau metode boiling selama beberapa 5 menit akan menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding sel yang berakibat pada masuknya cairan dan materi lain di sekitar sel dan keluarnya materi-materi dari dalam sel. Suhu tinggi juga bermanfaat untuk inaktifasi enzim terutama DN-ase yang dapat merusak DNA. Suhu pemanasan yang dilakukan pada penelitian ini suhu 60°C selama 5 menit seperti yang tertera pada manual prosedur geneaid.

Suhu yang terlalu tinggi atau waktu terlalu lama pada saat pemasan dikhawatirkan akan merusak DNA target dan akan memperpanjang proses ekstraksi, mengakibatkan proses pengeluaran DNA tidak sempurna sehingga kemungkinan adanya DNA yang terperangkap dalam sel. Eliminasi partikel lain juga tidak sempurna sehingga dapat menjadi inhibitor pada proses amplifikasi.

Ekstraksi DNA dengan mini column merupakan metode ekstraksi yang paling umum dilakukan karena hasil yang didapatkan sangat baik dalam waktu yang singkat (dibandingkan metode phenol-chlorophorm) dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan magnetic bead. Metode ini hanya memerlukan waktu sekitar 1 jam (cukup lama dibandingkan metode sederhana).

Dari hasil amplifikasi PCR dari DNA sampel tersebut menunjukkan adanya amplifikasi band target yakni ukuran ± 996 bp, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses amplifikasi





bakteri berhasil dilakukan. Selanjutnya melakukan identifikasi spesies bakteri (L2b), (L4a) dan (L5a) untuk sampel sayap lalat dari kantin dan untuk isolat sampel sayap lalat dari rumah yaitu (L1a), (L3a), dan (L4a, L4b) di mana hasil PCR kemudian dilanjutkan dengan tahapan sequencing yang bertujuan untuk mengurutkan urutan basa nukleotida pada wilayah 16s rRNA dari bakteri. Hasil analisis urutan basa adalah berupa elektroferogram yang berupa urutan basa A,T,G,C yang menyusun urutan basa gen sesuai dengan primer yang digunakan. Setelah urutan basa nukleotida dari gen 16s rRNA terlihat, maka dilakukan analisis dengan menggunakan program Bioedit (Novita, 2011).

Analisis BLAST dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil sekuen DNA dari seluruh dunia dari hasil yang didepositkan pada database gen bank sekuen publik. Analisis BLAST dilakukan secara online pada website NCBI, 2016: (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>).

Program nucleotide Blast secara otomatis akan memproses *alignment* data sekuens *query* dengan database GenBank. Hasil analisis dengan nucleotide Blast akan menampilkan visualisasi grafik penyejajaran sekuens, deskripsi setiap data sekuens yang sesuai dengan sekuens *query*, dan hasil alignment untuk setiap sekuens yang sesuai dengan database.

Ciri-ciri yang paling mirip dengan squens DNA yang diperoleh, dapat dilihat nilai Max Score dan Total Score sama, Query Coverage mendekati 100%, E-value mendekati 0 dan max ident mendekati 100%. Yang terpenting adalah presentase daabase yang tertutupi oleh Query. Nilai nol pada E-Value menunjukkan hasil lebih terpercaya dan nilai 1 pada E-Value tidak boleh digunakan (Narita, 2012).

Hasil analisis BLAST dari isolat L2b adalah bakteri *B. cereus* strain MRS1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. Strain ini diambil dari hasil yang paling sesuai dengan strain yang diperoleh dengan nilai Max Score dan Total Score sama 1668, Query Coverage yang paling mendekati 100% yaitu dengan nilai 95%, E-Value sama dengan 0 dan mix ident 99% (Gambar 4.14) Strain Bakteri patogen yang diperoleh dari urutan 66 sampai 954 sampai 1486 (Gambar 4.15).

Hasil BLAST isolat L4a adalah *Bacillus cereus* strain MB401 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. Strain ini diambil dari hasil yang paling sesuai dengan strain yang diperoleh max score dan total score yang sama yaitu 1531, Query Coverage 93% yang paling mendekati 100%, E-Value sama dengan 0 dan mix ident 96% (Gambar 4.16). Strain Bakteri patogen yang diperoleh dari urutan 11 sampai 955 (Gambar 4.17). Sedangkan hasil BLAST pada isolat L5a adalah *Bacillus cereus* strain p12_E1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. Strain ini diambil dari hasil yang paling sesuai dengan strain yang diperoleh max score dan total score yang sama yaitu 1402, Query Coverage 98% yang paling mendekati 100%, E-Value sama dengan 0 dan mix ident 99% (Gambar 4.18). Strain Bakteri patogen yang diperoleh dari urutan 5 sampai 798 (Gambar 4.19). Tanda " | " menunjukkan kecocokan antar sequence sedangkan kesenjangan ditunjukkan dengan tanda " _ " yang diasosiasikan dengan proses insersi atau delesi pada bagian tersebut, sedangkan basa nukleotida yang diganti dengan huruf " N " dapat digantikan salah satu dari keempat urutan basa yang ada.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada sayap lalat (*M. domestica*) terdapat beberapa jenis bakteri pada sayap kanan



dan kiri lalat, dari hasil penelitian ini hanya menunjukkan adanya bakteri patogen pada sayap lalat, tetapi belum dapat dipastikan bahwa bakteri tersebut hanya terdapat pada sayap sebelah kiri ataupun kanan. Demikian juga dengan keberadaan obat sebagai anti bakteri ataupun anti racun tidak menutup kemungkinan bahwa dari salah satu sayap kanan dan sayap kiri lalat terdapat anti bakteri maupun anti racun untuk penawar bakteri patogen.

2. Bakteri pada Sayap Lalat Hijau (*Chrysomya sp.*)

Sampel yang digunakan adalah sayap lalat hijau (*Chrysomya sp*) yang diambil dari wilayah pembuangan sampah pemukiman penduduk Patallasang (Gowa) yang dilakukan dengan cara steril.

Isolasi bakteri pada sayap lalat dilakukan dengan mengambil sampel 5 ekor lalat hijau (*Chrysomya sp*) yang dipisahkan antara sayap kanan (KN) dan kirinya (KR) sehingga diperoleh 10 sampel sayap lalat hijau (*Chrysomya sp*) (L) yang dimasukkan ke dalam 10 tabung eppendorf yang berisi PBS (*Phosphat Buffer Saline*). *Phosphat Buffer Saline* (PBS) atau disebut larutan penyangga. PBS merupakan larutan yang terdiri atas asam lemah dan garamnya yang dapat menjaga dan mempertahankan pH. Larutan PBS terdiri atas Natrium Klorida, Natrium Phosphat, Kalium Phosphat dan Kalium Klorida yang dilarutkan dengan air suling (*aquades*)/ *water for injection* (WFI). PBS (*Phosphat Buffer Saline*) adalah larutan fisiologis yang bersifat isotonic dan tidak beracun terhadap sel serta bertujuan untuk menjaga kadar pH dan mempertahankan osmolaritas sel (Sari, 2015).

Hasil pewarnaan mencerminkan perbedaan dasar dan kompleks pada sel bakteri (struktur dinding sel), sehingga dapat membagi bakteri menjadi 2 kelompok, yaitu bakteri Gram-positif



dan bakteri Gram-negatif. Prosedur pewarnaan gram dimulai dengan pemberian pewarna basa, kristal violet. Larutan iodine yang kemudian ditambahkan menyebabkan semua bakteri terwarnai biru pada fase ini. Sediaan kemudian diberi alcohol. Sel gram positif akan tetap mengikat senyawa kristal violet-iodine sehingga berwarna biru, sedangkan gram negatif akan hilang warnanya oleh alcohol. Sebagai langkah akhir ditambahkan *counterstain* (misalnya Safranin yang berwarna merah) sehingga sel gram negatif yang tidak berwarna akan mengambil warna kontras, sedangkan sel gram positif terlihat dalam warna biru keunguan (violet) (Jawetz,2004).

Berdasarkan hasil pengamatan morfologi koloni dan pewarnaan gram diperoleh dugaan bakteri pada isolat L1.KN, L1.KR, L3.KN, L3.KR, L4.KN, L4.KR dan L5.KN adalah *Bacillus* sp. Pada isolat L2.KN dan L2.KR diperoleh dua koloni bakteri yaitu *Bacillus* sp. dan *Enterococcus* sp. Pada Isolat L5.KR juga diperoleh dua koloni bakteri yaitu *Bacillus* sp. dan *Staphylococcus* sp.

Uji biokimia ini dilakukan untuk menguatkan dugaan bakteri yang diperoleh dari identifikasi morfologi secara mikroskopik dengan pewarnaan gram sebelumnya. Uji bertujuan untuk melihat ciri bakteri berdasarkan kelompok hidupnya dan melihat reaksi biokimia (ada tidaknya enzim pengurai di dalam bakteri). Adapun uji biokimia yang dilakukan adalah uji TSIA, uji motilitas, uji indol, uji citrat dan uji urea. Berdasarkan hasil uji biokimia pada media MC diperoleh dugaan bakteri pada isolat L1.KN adalah *Acinetobacter* sp. Isolat L4.KN adalah *Escherichia* sp. Isolat L5.KN dan L5.KR adalah *Enterobacter* sp. Dan pada media SS diperoleh dugaan bakteri pada isolat L4.KR adalah *Bacillus* sp.





Dari isolat L4.KN adalah *Escherichia coli* strain NF36 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. Strain ini diambil dari hasil yang paling sesuai dengan strain yang diperoleh max score dan total score yang sama yaitu 1738, Query Coverage 98% yang paling mendekati 100%, E-Value sama dengan 0 dan mix ident 99% (Tabel 16). Strain Bakteri patogen yang diperoleh dari urutan 63 sampai 970.

Dari isolat L5.KR adalah *Pantoea agglomerans* strain FDDA RGOS 160, complete genome. Strain ini diambil dari hasil yang paling sesuai dengan strain yang diperoleh max score 1687 dan total score yaitu 11776, Query Coverage 95% yang paling mendekati 100%, E-Value sama dengan 0 dan mix ident 99% (Gambar 17). Strain Bakteri patogen yang diperoleh dari urutan 66 sampai 953.

Dan berdasarkan hasil identifikasi molekuler diperoleh hasil bakteri pada isolat L1.KN adalah *Acinetobacter baumannii partial*, pada isolat L4.KN adalah *Escherichia coli*, pada isolat L5.KR adalah *Pantoea agglomerans*.

Dari 5 sampel lalat hijau (*Chrysomya* sp) terdapat beberapa jenis bakteri pada sampel lalat isolat L1.KN hasil dari kultur (fenotif) bakteri *Acinetobacter* sp. sama dengan hasil PCR (genotif) yaitu bakteri *baumannii*. Sampel L4.KN dari hasil kultur (fenotif) bakteri *Escherichia* sp. sama dengan hasil PCR (genotif) yaitu bakteri *herichia coli*. Sampel L5.KR dari hasil kultur (fenotif) bakteri *Enterobacter* sp. sama dengan hasil PCR (genotif) yaitu bakteri *Pantoea agglomerans*.

Adapun spesies bakteri yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1) *Acinetobacter baumannii*

Acinetobacter baumannii adalah bakteri gram-negatif yang dapat menyebabkan infeksi nosokomial pada manusia. Bakteri ini dapat tumbuh pada suhu 44 °C, menggunakan berbagai jenis karbohidrat sebagai sumber nutrisi, dan mampu melekat pada sel epitelial manusia. Karakteristik dari bakteri ini adalah aerobik, berbentuk koko-basil, dan dapat dengan cepat tahan (resisten) terhadap berbagai antibiotik. Bakteri ini diketahui dapat melakukan kolonisasi di unit operasi, medis, persalinan, dan perawatan luka bakar dalam suatu rumah sakit serta berperan dalam infeksi penyakit akut seperti meningitis, pneumonia, dan bakteremia. *Acinetobacter baumannii* juga diketahui tahan (resisten) terhadap sabun dan antiseptik konvensional sehingga kontaminasi koloni bakteri ini pada tangan petugas kesehatan mudah terjadi (Daniel, 1998).

Bakteri *Acinetobacter baumannii* merupakan bakteri patogen oportunistik atau patogen nosokomial. Sebagai patogen oportunistik, banyak terdapat di lingkungan, air, tanah, kotoran dan bahkan ditubuh manusia. *Acinetobacter baumannii* dapat menyebabkan infeksi jika menyerang pada orang/individu dengan kondisi sistem imun rendah. Sedangkan sebagai patogen nosokomial, sering terjadi kolonisasi dan infeksi di rumah sakit, terutama di ruang perawatan intensif. Dapat menyebabkan infeksi pneumonia, ISK, meningitis, sepsis, infeksi luka bakar atau luka operasi. Untuk terjadi infeksi diawali dengan bakteri melekat (adhesi) pada sel hospes, kemudian terjadi multiplikasi, kolonisasi dan akhirnya berkembang menjadi infeksi.



Adhesi pada sel hospes diperantarai oleh molekul adhesin yang merupakan faktor virulensi dari bakteri. Adhesin biasanya berupa protein yang berikatan dengan reseptor yang terdapat pada permukaan sel hospes (Jordi, 2008).

2) *Escherichia coli*

Escherichia coli, atau biasa disingkat *E. coli*, adalah salah satu jenis spesies utama bakteri gram negatif. Pada umumnya, bakteri yang ditemukan oleh Theodor Escherich ini dapat ditemukan dalam usus besar manusia. Kebanyakan *E. Coli* tidak berbahaya, tetapi beberapa, seperti *E. Coli* tipe O157:H7, dapat mengakibatkan keracunan makanan yang serius pada manusia yaitu diare berdarah karena eksotoksin yang dihasilkan bernama verotoksin. Toksin ini bekerja dengan cara menghilangkan satu basa adenin dari unit 28S rRNA, sehingga menghentikan sintesis protein. Sumber bakteri ini contohnya adalah daging yang belum masak, seperti daging hamburger yang belum matang. *E. Coli* yang tidak berbahaya dapat menguntungkan manusia dengan memproduksi vitamin K₂, atau dengan mencegah bakteri lain di dalam usus. *E. coli* banyak digunakan dalam teknologi rekayasa genetika. Biasa digunakan sebagai vektor untuk menyisipkan gen-gen tertentu yang diinginkan untuk dikembangkan. *E. coli* dipilih karena pertumbuhannya sangat cepat dan mudah dalam penanganannya. Negara-negara di eropa sekarang sangat mewaspadaai penyebaran bakteri *E.Coli* ini, mereka bahkan melarang mengimpor sayuran dari luar (Levinson, 2008).

Beberapa keuntungan dari bakteri *E. coli* yaitu menghasilkan kolisin, yang dapat melindungi saluran

pencernaan dari bakteri usus yang patogenik, dipakai sebagai indikator untuk menguji adanya pencemaran air oleh tinja. Di dalam lingkungan dan kehidupan kita, bakteri *E. coli* banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, baik pertanian, peternakan, kedokteran maupun dikalangan Industri. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, *E. coli* telah banyak diketahui baik sifat morfologi, fisiologi maupun pemetaan DNA nya, sehingga bakteri ini dipakai untuk menyimpan untaian DNA yang dianggap potensial, baik dari tanaman, hewan maupun mikroorganisma dan sekaligus untuk perbanyakannya. Dengan diketahuinya bahwa *E. coli* dapat dipakai untuk menyimpan untaian DNA yang potensial, maka hal ini membuka kesempatan untuk mempelajari sifat dan karakter dari mikroba lain yang tentunya memberikan dampak yang positif untuk kemajuan di bidang kedokteran, pertanian maupun industri. Di bidang pertanian telah dilaporkan bahwa beberapa tanaman tidak tahan terhadap suatu penyakit atau serangan hama, tetapi bantuan *E.coli* sebagai inang yang membawa gen yang tahan terhadap penyakit atau hama tertentu, maka hal itu dapat di atasi sehingga perkembangan di bidang pertanian tidak terhambat.

E. coli juga dapat membahayakan kesehatan karena diketahui bahwa bakteri *E.coli* merupakan bagian dari mikrobiota normal saluran pencernaan dan telah terbukti bahwa galur galur tertentu mampu menyebabkan gastroenteritis taraf sedang sampai parah pada manusia dan hewan.*E.coli* juga dapat menyebabkan diare akut, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 katagori yaitu enteropatogenik



(penyebab gastroenteritis akut pada bayi yang baru lahir sampai pada yang berumur 2 tahun), enteroinaktif dan enterotoksigenik (penyebab diare pada anak-anak yang lebih besar dan pada orang dewasa). Dilaporkan pula bila *E.coli* di dalam usus memasuki kandung kemih, maka dapat menyebabkan sintitis yaitu suatu peradangan pada selaput lender organ tersebut (Melliawati, 2009).

3) *Pantoea aglomerans*

Pantoea aglomerans termasuk dalam family *Enterobacteriaceae* yang merupakan kelompok gram negatif anaerob fakultatif berbentuk batang yang habitat umumnya adalah di usus manusia dan hewan. *Pantoea aglomerans* satu family dengan *E.coli*, *Klebsiella*, *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus*, dan sebagainya. Pada keadaan tertentu jika terjadi perubahan pada inang atau bila kesempatan memasuki tubuh yang lain, banyak di antara bakteri ini yang mampu menimbulkan penyakit (Irianto, 2006).

Pantoea aglomerans merupakan flora normal pada sistem pencernaan manusia dan hewan. Bakteri ini tidak akan menimbulkan penyakit jika tidak bergabung dengan jenis bakteri lain. Ini disebabkan bakteri *Pantoea aglomerans* bukan penyebab tunggal munculnya suatu penyakit. Bakteri *Pantoea aglomerans* merupakan patogen nosokomial oportunistik yang menyebabkan lebih banyak infeksi termasuk sampai dengan 5% dari septicemias didapat di rumah sakit, 5% dari pneumonia nosokomial, 4% dari infeksi saluran kemih nosokomial, dan 10% dari kasus peritonitis pascaoperasi (daftar dari Hoffmann dan Roggenkamp 2003). Bakteri ini juga memiliki beberapa



kegunaan bagi manusia, misalnya *Pantoea agglomerans* digunakan dalam kontrol biologis penyakit tanaman (*Anaesthetist*) dan *Enterobacter agglomerans* (*Pantoea agglomerans*) adalah Salah satu bakteri yang resisten dan mampu mengakumulasi logam berat dan salah satu spesies bakteri yang berperan sebagai PGPR (*Plant Growth Promoting Rhizobacteria*) serta mempunyai potensi dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman (Raka, dkk., 2012).

Beberapa gejala infeksi *Enterobacter* termasuk bakteremia, infeksi saluran pernapasan bawah, infeksi kulit, infeksi jaringan lunak, infeksi saluran kemih, ISK, endokarditis, infeksi intraabdominal, *septic arthritis*, *osteomyelitis*, dan infeksi mata. Mereka adalah patogen oportunistik yang jarang menyebabkan penyakit pada orang yang sehat. Virulensi bakteri ini tampaknya terutama disebabkan suatu endotoksin yang menghasilkan. Infeksi nosokomial adalah jenis yang paling sering infeksi *Pantoea agglomerans*, tetapi infeksi diperoleh masyarakat kadang-kadang diamati. Bakteri biasanya menginfeksi orang-orang yang tinggal di rumah sakit, terutama pada ICU, untuk jangka waktu yang lama serta orang-orang bagaimana telah menggunakan banyak agen antimikroba, memiliki kondisi serius yang mendasarinya (misalnya: diabetes, kanker, luka bakar, ventilasi mekanis, dll), menggunakan perangkat asing seperti kateter intravena, dan infeksi *immunosuppression* (Jawetz, dkk. 2005).


Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada sayap lalat hijau (*Chrysomya* sp.) terdapat beberapa jenis bakteri pada



sayap kanan dan kiri lalat tersebut. Dan pada penelitian ini ditemukan beberapa bakteri patogen pada sayap lalat tersebut, tetapi belum dapat dipastikan adanya keberadaan anti bakteri ataupun anti racun (obat) pada sayap lalat seperti halnya pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah, yaitu “Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian maka tenggelamkan kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya.”

Dengan demikian, penelitian untuk membuktikan hadis tersebut masih perlu dikembangkan dalam hal penelitian tentang bakteri yang terdapat pada sayap kanan dan kiri lalat. Meskipun begitu, penelitian ini juga dapat memperkuat hadis Rasulullah saw. tentang lalat tersebut dengan membuktikan bahwa adanya bakteri yang terdapat pada sayap lalat hijau tersebut dari sisi ilmu biologi.





BAB V

PENUTUP





Bakteri patogen yang terdapat pada sayap lalat *Musca Domestica* adalah *Bacillus cereus*, sedangkan pada lalat *Chrysomya sp* yakni bakteri *Acinetobacter baumannii*, bakteri *Escherichia coli* dan bakteri *Pantoea aglomerans*.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, implementasi hadis dalam kitab Shahih Bukhary no. 5336 dapat diterapkan dalam kerangka sains yang sistematis dengan memberikan bukti terdapatnya bakteri patogen pada sayap lalat rumah *Musca Domestica* dan lalat hijau *Chrysomya sp*, tetapi kedua jenis lalat tersebut tetap ada dan tidak punah walaupun banyak bakteri patogen di dalam sayapnya. Ini mengindikasikan bahwa terdapat anti bakteri pada sayap yang lainnya. Hadis Bukhary menyatakan bahwa di satu sayapnya terdapat racun (bakteri patogen) dan di sayap lainnya terdapat obat (anti bakteri patogen).

Kedua, jenis bakteri patogen pada sayap lalat *Musca Domestica* yakni *Bacillus cereus* dan pada lalat *Chrysomya sp* yakni bakteri *Acinetobacter baumannii*, bakteri *Escherichia coli* dan bakteri *Pantoea agglomerans*.



KEPUSTAKAAN

- Abu An'im. 2010. *Rahasia Sunnah Kajian Syari'at Islam Tinjauan Fiqh dan Medis*. Kediri: Mu'jizat Manivestasi Santari Jawa Barat.
- Al-Misry, Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Afriqi. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Sadir, t.th. h. 380
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdillah. 1987 M/ 1407 H. *al-Jami' al-Sahih*. Cet. III; Beirut: Dar Ibnu Kasir.
- A.H. Desouky, Z.H. Kheiralla, S. Zaki, A.A. Rushdy, W. Abd-El-Raheim, J. Environ. Monit. 5 (2003) 865.
- Anis, Ibrahim et.al (t.t), al-Mu`jam al-Wasit. T.T.P: T.P
- A.M. Shaban, B.M. Haroun, M.A. Ali, M.A. Elras, J. Appl. 1769. Sciences Res. 4 (2008)
- Arroyo HS. 1998. *Distribution and Importance–Life Cycle and descriptin-Damage-Economic Injury Level-Management - selected references*. Univ. of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences. Depart.of Entomology Nematology. http://www.house fly-Musca_domestica-Linnaeus.htm.
- Ciesla WP, Guerrant RL. Infectious Diarrhea. In: Wilson WR, Drew WL, Henry NK, et al editors. *Current Diagnosis and Treatment in Infectious Disease*. New York: Lange Medical Books, 2003. 225 - 68.
- Cowan,ST. 2004. *Manual for the Identification of Medical Fungi*. Cambridge University Press. London.
- Djide, Natsir dan Sartini. 2006. *Dasar-Dasar Mikrobiologi. Laboratorium Mikrobiologi Farmasi*. Universitas Hasanuddin. Makassar ; 123.

- Dwijoseputro. 1990. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Djambatan. Malang ;73, 74.
- Faradz, Sultana M. H. 2004. *Retardasi Mental Pendekatan Seluler dan Molekuler*. Universitas Diponegoro Semarang: Semarang.
- Granum and Lund, 1997. Dalam <http://rismanismail2.wordpress.com/2010/12/09/bacillus-cereus/>
- Graczyk TK, MR Cranfield, F Ronal and H Bixler. 1999. *House Flies (Musca domestica) as transport host of CRYPTOSPORIDIUM PARVUM*. Am. J. Trop. Med. Hyg. 61(3): 500-504.
- Guerrant RL, Gilder TV, Steiner TS, et al. Practice Guidelines for the Management of Infectious Diarrhea. *Clinical Infectious Diseases* 2001;32:331-51.
- Hendarwanto. Diare akut Karena Infeksi, Dalam: Waspadji S, Rachman AM, Lesmana LA, dkk, editor. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid I*. Edisi ketiga. Jakarta: Pusat Informasi dan Penerbit Bagian Ilmu Penyakit Dalam FKUI ;1996. 451-57.
- <http://labmikrobiologi.blogspot.com/2012/02/pewarnaan-gram.html>
- Holil, M.Si., Kholifah. 2014. *Teknik Analisis Biologi Molekuler (TABM)*. Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim Malang: Malang.
- Ibn Zakariyya, Abi al-Hasan Ahmad ibn Faris. *Maqayis al-Lughah*. t.t: Dar al-Fikr, 1979 M/ 1399 H. h. 348
- Ibn Zain, Zain al-Din Muh}ammad al-Mad'u Ba'bad al-Ru'uf ibn Taj al-'Arifin ibn 'Ali. *Faid al-Qadir*. Cet. I; t.t.: al-Maktabah al-Tajariyah al-Kubra, 1356.
- Ibnu `Ashūr, Muhammad al-Tāhir (t.t), *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, T.T.P: al-Dār al-Tūnisiyyah.



- 
- Indah Nur O, Liliek S dan Arifin N.S. 2008 “*Analisis Kekebabatan Mentimun (Cucunius Sativus L) Menggunakan Metode RAPD-PCR Dan Isozim*”. Jurnal Biodiversitas, Vol. 9. no.2 April, 99-102.
- Jones ACC, Farthing MJG. Management of infectious diarrhoea. Gut 2004; 53:296-305.
- Lacey L A. 1997. *Manual of Techniques in Insect Pathology*. Academic Press.
- Lee YK, Lee JH, Lee HK. 2001. *Microbial symbiosis in marine sponges*. J Microbiol 30:254-264.
- Levinson W. 2008. *Review of Medical Microbiology*. Amerika: The McGraw-Hill Companies.
- Lung E, Acute Diarrheal Disease. In: Friedman SL, McQuaid KR, Grendell JH, editors. *Current Diagnosis and Treatment in Gastroenterology*. 2nd edition. New York: Lange Medical Books, 2003. 131 - 50.
- Mohd Ismail bin jarkasi. 2008. *Kajian Sifat-Sifat Serangga dan Reka bentuk Mekanisme Penghalau Serangga Secara Tidak Bertoksik*, Skripsi. Melaka: Fak. Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
- Mordechai, E., 1999. Application of PCR The methodologies in Molecular Diagnostic. Burlington Country, USA.
- Muladno. 2002. *Seputar Teknologi Rekayasa Genetika*. Pustaka Wirausaha Muda. Bogor.
- Nadiah Thayyarah. 2010. *Mausu’ah al-I’jaz al-Qur’ani (Buku pintar sains dalam al-Qur’an; Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah)*, terj. M. Zaenal arifin dkk. Jakarta: Zaman.
- Oscar, G., G. Duarte, J. Bai, and N. Elizabeth. 2009. *Detection of Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio cholerae, and Campylobacter spp. enteropatogens by 3 reaction multiplex polymerase chain reaction. Diagnostic Microbiol. Infectious Dis.(63): 1–9.*

- Pedoman Pemberantasan Penyakit Diare. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Available from: <http://www.depkes.go.id/downloads/SK1216-01.pdf>
5. Manatsathit S, Dupont HL, Farthing MJG, et al. Guideline for the Management of acute diarrhea in adults. *Journal of Gastroenterology and Hepatology* 2002;17: S54-S71.
- Pelczar, M. J., Chan, E.C. S. 1988. *Dasar- Dasar Mikrobiologi*. (Terjemahan), R. R. S.Hadioetomo, T. Imas, S.S Tjitrosoepomo dan Angka Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Press Release American Society for Microbiology dalam <https://gakken-idn.id/articles/mekanisme-acinetobacter-baumannii-yang-sering-resisten-terhadap-banyak-obat>
- Procop GW, Cockerill F. Enteritis Caused by *Escherichia coli* dan *Shigella* dan *Salmonella* Species. In: Wilson WR, Drew WL, Henry NK, et al, Editors. *Current Diagnosis and Treatment in Infectious Disease*, New York: Lange Medical Books, 2003. 584 - 66.
- Qurtubiy al-, (1993), *al-Jami` li Ahkam al-Qur`an*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- Rachdie, Abu Salma Muhammad. 2007. "*Mukjizat Hadits Lalat, Studi Ilmiah Hadits Lalat dalam Perspektif Islam dan Ilmu Medis Modern*". Maktabah lit Tahmil: Malang.
- Rakhmawati, Anna. 2012. *Media penyiapan Mikroorganisme, Pelatihan Laboratorium*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Rani HAA. Masalah Dalam Penatalaksanaan Diare Akut pada Orang Dewasa. Dalam: Setiati S, Alwi I, Kasjmir YI, dkk, Editor. *Current Diagnosis and Treatment in Internal Medicine* 2002. Jakarta: Pusat Informasi Penerbitan Bagian Penyakit Dalam FK UI, 2002. 49-56.



Retno Hestningsih. 2004. *PERBANDINGAN BAKTERI KONTAMINAN PADA LALAT Chrysowya n egacepkala DAI Musca domestica DI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR PIYUNGAN, BANTUL, YOGYAKARTA.*

Rusyana, Adun. 2011. *Zoologi Invertebrata (Teori dan Praktik).* Bandung: Alfabeta.

Sa'adah, Sumiyati. 2013. *Zoologi Invertebrata. Bandung: Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati.*

Salyers, A.A, dan Whitt, D.D. 1994. *Bacterial Patogenesis A Molecular Approach ASM Press. Washington D.C.*

Sarah Larter, dkk. 2010. *E.Encyclopedia Fauna.* Jakarta: Erlangga.

Sari, Putri Junita, 2015. *Hisotonik Perfusi PBS-Formalin dan Gambaran Histologi Organ Hepar, Pankreas dan Ginjal Tikus Strain Sprague Dawlay.* UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta

Shihab, M. Quraish. 2012. *al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an.* Cet. I; Tangerang: Lentera Hati.

Shihab, M.Quraish. 2004. *Dia di Mana-Mana "Tangan" Tuhan di Balik Setiap Fenomena.* Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati.

Sigit HS, FX Koesharto, UK Hadi, DJ Gunandini dan S Soviana. 2006. *Hama Pemukiman Indonesia, Pengenalan, Biologi dan Pengendalian.* Unit Kajian Pengendalian Hama Permukiman (UKPHP), Fakultas Kedokteran Hewan IPB.

Simanjuntak, N.C.E. 2001. *Potensi lalat sebagai vektor mekanik cacing parasit.* skripsi. Fakultas Kedokteran Hewan. Institute Pertanian Bogor.

Suraini. 2011. *Jenis-jenis Lalat (Diptera) dan Bakteri Enterobacteriaceae yang terdapat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Kota Padang.* [http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/jenis-jenis-lalat diptera-dan-bakteri-enterobacteriaceae-yang-](http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/jenis-jenis-lalat-diptera-dan-bakteri-enterobacteriaceae-yang)

terdapat-di-tempat-pembuangan-akhir-sampah-tpa-kota-padang.pdf diakses tanggal 13 Desember 2015 pukul 12.16.

- Soewondo ES. Penatalaksanaan diare akut akibat infeksi (Infectious Diarrhoea). Dalam: Suharto, Hadi U, Nasronudin, editor. Seri Penyakit Tropik Infeksi Perkembangan Terkini Dalam Pengelolaan Beberapa penyakit Tropik Infeksi. Surabaya: Airlangga University Press, 2002. 34–40.
- T.P. Loch* and M. Faisal. Isolation of *Pantoea agglomerans* from Brown Trout (*Salmo trutta*) from Gilchrist Creek, Michigan, USA . Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 27(5) 2007, 200. Department of Pathobiology and Diagnostic Investigation, College of Veterinary Medicine, Michigan State University, East Lansing, MI 48824.
- Tatalaksana Penderita Diare. Available from: <http://www.depkes.go.id/downloads/diare.pdf>.
- Thomas S R, Joseph S E. 2004. *Patogenicity and Virulence. Journal Of InvertebratePhatology 85, 146-151.*
- Thoriq Muiz Muhamad. 2001. *Hubungan Manusia, Haiwan dan Serangga*. Kuala Lumpur: Usnie Sdn Bhd.
- Tjaniadi P, Lesmana M, Subekti D, et al. Antimicrobial Resistance of Bacterial Patogens Associated with Diarrheal Patiens in Indonesia. Am J Trop Med Hyg 2003; 68(6): 666-10.
- Trisna Putra. 2012. *Perambatan Retak (Crack Propagation) TAP BOLT UNC-OIL COATED ASTM 325*. Jurnal Teknik Mesin. Vol 2, No. 1, 20-25.
- Wijaya Ratna Sari, CucunawangSih. Bakteri Acinetobater Baumannii. MEDICINUS JURNAL KEDOKTERAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN. Vol. 3 No. 10 Februari 2012 - Mei 2012, Diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran, Universitas Pelita Harapan, Indonesia ISSN 1978-3094



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran pada penelitian bakteri pada rumah (*Musca domestica*)

Hasil Squensing urutan basa nitrogen isolate lalat rumah

GGGATACGGATTATTGGGCGTAAGCGCGCTAGGCGGTTTCTTA-
AGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTG-
GAAACTGGGAAACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAAT-
TCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGCAGAGATATGGAGGAACAC-
CAGTGGCGAAGGCGGCTCTCTGGTCTGTAAGTACGCTGATGT-
GCGAAAGCGTGGGGATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTC-
CACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTAGGGGGTTTCCGC-
CCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAG-
TACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGAC-
CCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGC-
GAAGAACCTTACCAAATCTTGACATCCTTTGACCGCTCTAGAGA-
TAGAGTCTTCCCCTTCGGGGGACAAAGTGACAGGTGGTGAT-
GGTTGTCGTCAGCTCGTGTGCTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCG-
CAACGAGCGCAACCCTTAAGCTTAGTTGCCATCATTAAAGTTGG-
GCACTCTAGGTTGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTG-
GGGATGACGTCAAATCATCATGCCCTTATGATTTGGGCTACA-
CACGTGCTACAATGGATAATACAAAGGGCAGCGAATCCGCGAG-
GCCAAGCAAATCCATAAAATTTATTCTCAGTTCGGATTGTAGTCT-
GCAACTCGACTACATGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGTAGAT-

CAGCATGCTACGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCCGC-
CCGTCACACCACGAGAGTTTGTAAACACCCGAAGCCGGTGGAG-
TAACCTTTTAGGAGCTAGCCGTCGAAGGTGGGACAAATGATTGG-
GGTGAAGTCGTAAGGGGGTCCCCAAAATAAACTTTTCTTTTTT

Hasil squensing urutan basa nitrogen isolat L3a

GTGGATATCGGATATTGGGCGTAAGCGCGCTAGGCGTTTCTTA-
AGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTG-
GAAACTGGGAAACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAAAT-
TCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGCAGAGATATGGAGGAACAC-
CAGTGGCGAAGGCGGCTCTCTGGTCTGTAAGTACGCTGATGT-
GCGAAAGCGTGGGGATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTC-
CACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTAGGGGGTTTCCGC-
CCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAG-
TACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGAC-
CCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTGCAAGCAACGC-
GAAGAACCTTACCAAATCTTGACATCCTTTGACCGCTCTAGAGA-
TAGAGTCTTCCCCTTCGGGGGACAAAGTGACAGGTGGTGCAT-
GGTTGTCGTCAGCTCGTGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCG-
CAACGAGCGCAACCCTTAAGCTTAGTTGCCATCATTAAAGTTGG-
GCACTCTAGGTTGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTG-
GGGATGACGTCAAATCATCATGCCCTTATGATTTGGGCTACA-
CACGTGCTACAATGGATAATACAAAGGGCAGCGAATCCGCGAG-
GCCAAGCAAATCCCATAAAATTATTCTCAGTTCGGATTGTAGTCT-
GCAACTCGACTACATGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGTAGAT-
CAGCATGCTACGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCCGC-
CCGTCACACCACGAGAGTTTGTAAACACCCGAAGCCGGTGGAGTA-
ACCTTTTAGGAGCTAGCCGTCGAAGGTGGGACAAATGATTGGG-
GTGAAGTCTAAGGGGGGGCCGCCTAAATAAGGGGGCCTGGGGC

Hasil squensing urutan basa nitrogen isolat L4a





GGAAATATCGGATACTGGGCGTAAGCGCACGCAGGCGGTT-
GATTAAGTTAGATGTGAAATCCCCGGGCTTAACCTGGGAATGG-
CATCTAAGACTGGTCAGCTAGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAAT-
TCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAATAC-
CGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACAAAGACTGACGCTCAG-
GTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGG-
TAGTCCACGCTGTAAACGATGTCGATTTGGAGGTTGTGCCCTT-
GAGGCGTGGCTCCGGAGCTAACGCGTTAAATCGACCGCCTG-
GGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGGG-
GGCCCGCACAAAGCGGTGGAGCATGTGGTTAATTCGATGCAAC-
GCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTAGCA-
GAGATGCTTTGGTGCCTTCGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCAT-
GGCTGTCGTCAGCTCGTGTGTGAAATGTTGGGTTAAGTCCCG-
CAACGAGCGCAACCCTTATCCTTTGTTGCCAGCGATTCCGGTCGG-
GAACTCAAAGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGG-
GATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCTACACAC-
GTGCTACAATGGCGTATACAAAGAGAAGCGACCTCGCGAGAG-
CAAGCGGAACTCATAAAGTACGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCT-
GCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTAGAT-
CAGAATGCTACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGC-
CCGTCACACCATGGGAGTGGGTTGCAAAGAAGTAGGTAGCTTA-
ACCTTCGGGAGGGCGCTTACCACTTTGTGATCCATGACTGGGGT-
GAAGTCGTAAGGGGGGGCCCCAAAATAAAGGAAGCGGGGGG

Hasil squensing urutan basa nitrogen isolat L4b

Hasil analisis BLAST

Sequences producing significant alignments:

Select: All None Selected 0

Alignments	Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Accession
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. T324 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1746	1746	98%	0.0	99% KJ834144.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. T320 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1736	1736	98%	0.0	99% KJ834142.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus callinarum strain HB B 8871 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1735	1735	96%	0.0	99% KF568482.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. SV030 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1735	1735	96%	0.0	99% HQ202806.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. SV079 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1735	1735	96%	0.0	99% HQ202804.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. PLR069 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1733	1733	95%	0.0	99% KF734343.1
<input type="checkbox"/>	Bacterium LF7 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1733	1733	95%	0.0	99% JX114800.1
<input type="checkbox"/>	Unaffiliated Staphylococcus sp. clone GJ_3_39 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	96%	0.0	99% K0062672.1
<input type="checkbox"/>	Unaffiliated bacterium clone CU23 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	96%	0.0	99% KC2416649.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. LF73 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	96%	0.0	99% JX114813.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. LF27 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	96%	0.0	99% JX114804.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. S124(1) 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	96%	0.0	99% JF511163.1
<input type="checkbox"/>	Unaffiliated Staphylococcus sp. clone 87.8 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	96%	0.0	99% AF467426.1
<input type="checkbox"/>	Unaffiliated Staphylococcus sp. clone 87.5 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	96%	0.0	99% AF467420.1
<input type="checkbox"/>	Unaffiliated Staphylococcus sp. clone 87.10 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	96%	0.0	99% AF467411.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus saprophyticus strain OS5.2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1724	1724	98%	0.0	99% KX242270.1

Analisis BLAST isolat L4a

Sequence ID: **KJ833772.1** Length: 1019 Number of Matches: 1

Range 1: 17 to 946 [Go to text](#) [Go to file](#) [Next Match](#) [Previous Match](#)

Score	Exact	Identities	Gaps	Strand
1531 bits (82%)	0.0	910/946 (96%)	17/946 (1%)	Plus/Plus
Query 11	GAATATGGGGGCTAAAGCGCGCGCGAGTGGTTCTTAAGCTGATGTGAAGGCCCGCC	69		
Sbjct 17	GAATATGGGGCTAAAGCGCGCGCGAGTGGTTCTTAAGCTGATGTGAAGGCCCGCC	76		
Query 70	TCAACCGTGGAGGTCATTGGAALCTGGGAGCTTGATGCGAGGAGGAAAGTGGAAAT	129		
Sbjct 77	TCAACCGTGGAGGTCATTGGAALCTGGGAGCTTGATGCGAGGAGGAAAGTGGAAAT	136		
Query 130	CCATGTATGCGGTGAATGCGTAGAGATATGGAGACACCACTGGCGAGGCGACTTT	189		
Sbjct 137	CCATGTATGCGGTGAATGCGTAGAGATATGGAGACACCACTGGCGAGGCGACTTT	196		
Query 190	CTGGTCTGTAACCTGACACTGAGGCGCGCGAAGCGTGGGGGCGAACAAGATAGATACC	249		
Sbjct 197	CTGGTCTGTAACCTGACACTGAGGCGCGCGAAGCGTGGGGGCGAACAAGATAGATACC	256		
Query 250	GGTAGTCCAGCGCGTAAACGATGAGTCTAAGTGTGAGAGGTTTCCCGCCCTTAGTGC	309		
Sbjct 257	GGTAGTCCAGCGCGTAAACGATGAGTCTAAGTGTGAGAGGTTTCCCGCCCTTAGTGC	316		
Query 310	GAACTTAACGCATTAAAGCACTCCGCGTGGGAGTACGCGCGAAGGCGAALCTCAAA	369		
Sbjct 317	GAACTTAACGCATTAAAGCACTCCGCGTGGGAGTACGCGCGAAGGCGAALCTCAAA	376		
Query 370	AATTGACGGGGGGCGCGCAAGCGGTGGAGCATGGTTTAATCGAAGCAAGCGGAGAG	429		
Sbjct 377	AATTGACGGGGGGCGCGCAAGCGGTGGAGCATGGTTTAATCGAAGCAAGCGGAGAG	436		
Query 430	ACCTTACCAGCTCTTGACATCCTCTGACACCCCTAGAGATAGGCGTCTCTCTGGGAG	489		
Sbjct 437	ACCTTACCAGCTCTTGACATCCTCTGACACCCCTAGAGATAGGCGTCTCTCTGGGAG	496		
Query 490	AGAGTGCAGAGTGGTGCATGGTGTCTGCTGAGCTGTGCTGAGATGTTGGGTAAGTGC	549		
Sbjct 497	AGAGTGCAGAGTGGTGCATGGTGTCTGCTGAGCTGTGCTGAGATGTTGGGTAAGTGC	556		
Query 550	CCCAAGGAGCGCCCAACCTTGAATCTTAGTCCCATCTTAGTGGGCACTCTAAGGTGAC	609		
Sbjct 557	CCCAAGGAGCGCCCAACCTTGAATCTTAGTCCCATCTTAGTGGGCACTCTAAGGTGAC	616		
Query 610	TGCGGCTGACAAACCGGAGAGGTGGGATGAGCTCAAACTCATGCGCCCTATGAGCC	669		
Sbjct 617	TGCGGCTGACAAACCGGAGAGGTGGGATGAGCTCAAACTCATGCGCCCTATGAGCC	676		
Query 670	TGGGCTACACAGCTGCTACAGTGGACCGGTACAAAGAGCTGCAGACCGGAGGTTGAGCT	729		
Sbjct 677	TGGGCTACACAGCTGCTACAGTGGACCGGTACAAAGAGCTGCAGACCGGAGGTTGAGCT	736		
Query 730	AACTCATATAGCGTCTCACTGGATGTAGGCTGCAACTCGCCCTACATGAAAGCTGG	789		
Sbjct 737	AACTCATATAGCGTCTCACTGGATGTAGGCTGCAACTCGCCCTACATGAAAGCTGG	796		
Query 790	AATCGCTAGTAATCTGGGATCAGCATGCGCTCGCTGAAATACGTTCCGGGGGCGCTGT	849		
Sbjct 797	AATCGCTAGTAATCGGATCAGCATGCGCTCGCTGAAATACGTTCCGGGGGCGCTGT	854		
Query 850	AAAAAACCGGCGCGCTCCCGACCGGCGTATAGGTTGGTAAACACCGCTGATCGCGGG	909		
Sbjct 855	AAAAAACCGGCGCGCTCCCGACCGGCGTATAGGTTGGTAAACACCGCTGATCGCGGG	915		
Query 910	GGGTAACCTCTTTGGGAGCGGCACTCTCCGAAATCTGGGAGAGAGAGAGAGAGAG	955		
Sbjct 916	GG-TAA-CTTTTTTGGAGGCG-AG-CCGCTAAGGT-GGGAGACAAA 946			



Perbandingan urutan basa sampel L4a dan *Bacillus* sp

Sequences producing significant alignments:

Select All None Selected 0

Alignments	Download	GenBank	Graphics	Distance	tree of results					
	Description				Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
<input type="checkbox"/>	Bacillus cereus strain MHF ENV 26 16S ribosomal RNA gene, partial sequence				1410	1410	99%	0.0	99%	JF514501.1
<input type="checkbox"/>	Bacillus cereus strain CCW3/11 16S ribosomal RNA gene, partial sequence				1406	1406	99%	0.0	99%	Q2319543.1
<input type="checkbox"/>	Bacillus thuringiensis strain 35 16S ribosomal RNA gene, partial sequence				1402	1402	99%	0.0	99%	KT759960.1
<input type="checkbox"/>	Bacillus cereus strain e12_E 11 16S ribosomal RNA gene, partial sequence				1402	1402	98%	0.0	99%	JQ832373.1
<input type="checkbox"/>	Bacillus cereus genomic DNA containing 18S-23S intergenic spacer region, strain B_1036				1400	1400	99%	0.0	99%	LN659100.1
<input type="checkbox"/>	Bacillus cereus strain TE09 16S ribosomal RNA gene, partial sequence				1400	1400	98%	0.0	99%	KJ83787.1
<input type="checkbox"/>	Bacillus sp. MB083 16S ribosomal RNA gene, partial sequence				1400	1400	98%	0.0	99%	KF956341.1
<input type="checkbox"/>	Bacillus sp. DR8 16S ribosomal RNA gene, partial sequence				1399	1399	98%	0.0	99%	KF588738.1
<input type="checkbox"/>	Uncultured Bacillus sp. clone BCP58 16S ribosomal RNA gene, partial sequence				1399	1399	98%	0.0	99%	KF529235.1
<input type="checkbox"/>	Bacillus cereus strain e45_E17 16S ribosomal RNA gene, partial sequence				1399	1399	98%	0.0	99%	KJ032567.1
<input type="checkbox"/>	Bacillus cereus strain VCR9_B520_16S ribosomal RNA gene, partial sequence				1397	1397	98%	0.0	99%	KC1191192.1
<input type="checkbox"/>	Bacillus thuringiensis 16S rRNA gene, strain DAB-88				1397	1397	99%	0.0	98%	AM293444.1
<input type="checkbox"/>	Bacillus cereus strain RC9_1609 16S ribosomal RNA gene, partial sequence				1397	1397	98%	0.0	99%	EF195169.1
<input type="checkbox"/>	Bacillus anthracis strain KF-111 16S ribosomal RNA gene, partial sequence				1395	1395	98%	0.0	99%	KU146514.1
<input type="checkbox"/>	Bacillus thuringiensis strain 313 16S ribosomal RNA gene, partial sequence				1395	1395	98%	0.0	99%	LN603545.1
<input type="checkbox"/>	Bacillus thuringiensis partial 16S rRNA gene, isolate B. thuringiensis_24_1058				1395	1395	99%	0.0	99%	LN610446.1
<input type="checkbox"/>	Bacillus cereus strain MB401 16S ribosomal RNA gene, partial sequence				1395	1395	98%	0.0	99%	KJ83772.1
<input type="checkbox"/>	Bacillus cereus strain e26_H10 16S ribosomal RNA gene, partial sequence				1395	1395	97%	0.0	99%	JQ831109.1

Tabel analisis BLAST isolat L5a

[Download](#) [GenBank](#) [Graphics](#)

Bacillus cereus strain MHF ENV 26 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
 Sequence ID: [JF514501.1](#) Length: 863 Number of Matches: 1

Range 1: 4 to 795 [GenBank](#) [Graphics](#) [Next Match](#) [Previous Match](#)

Score	Expect	Identities	Gaps	Strand
1410 bits(763)	0.0	785/795(99%)	4/795(0%)	Plus/Plus
Query 5	GCTATCGGATATTGGGCGTAAGCCGCGCAGGTGGTTCTTAACTCTGATGCTGAAAGCC			
Sbjct 4	GCTATCGGATATTGGGCGTAAGCCGCGCAGGTGGTTCTTAACTCTGATGCTGAAAGCC			
Query 65	ACGGCTCAACCGTGGAGGCTCATTGGAACTGGGAGCTTGAAGTGCAGAGAGGAAAGT			
Sbjct 64	ACGGCTCAACCGTGGAGGCTCATTGGAACTGGGAGCTTGAAGTGCAGAGAGGAAAGT			
Query 125	GAATTCATGCTGTAGCGGTGAATGCGTAGAGATATGGAGAACACAGCTGGCGAAGGC			
Sbjct 124	GAATTCATGCTGTAGCGGTGAATGCGTAGAGATATGGAGAACACAGCTGGCGAAGGC			
Query 185	ACTTCTGGCTCTTAACTGACACTGAGCGCCAAAGCGTGGGAGCAACAGGATTAGAT			
Sbjct 184	ACTTCTGGCTCTTAACTGACACTGAGCGCCAAAGCGTGGGAGCAACAGGATTAGAT			
Query 245	ACCGTGTAGTCCAGCGCTAAACGATGAGTGGTAAAGTGTAGAGGGTTTCCGCCCTTTA			
Sbjct 244	ACCGTGTAGTCCAGCGCTAAACGATGAGTGGTAAAGTGTAGAGGGTTTCCGCCCTTTA			
Query 305	GTGCTGAAGTTAAGCATTAAAGCACTCCGCTGGGAGTACGGCCGAAAGCTGAAACT			
Sbjct 304	GTGCTGAAGTTAAGCATTAAAGCACTCCGCTGGGAGTACGGCCGAAAGCTGAAACT			
Query 365	AAAGGAATTGACGGGGCCCGCACAGCGGTGGAGCATGTGTTAAATCGAAGCAACGC			
Sbjct 364	AAAGGAATTGACGGGGCCCGCACAGCGGTGGAGCATGTGTTAAATCGAAGCAACGC			
Query 425	GAAGAACCTTACAGGCTTTGACATCCTCTGACAACTAGAGATAGGGCTTCTCCTCG			
Sbjct 424	GAAGAACCTTACAGGCTTTGACATCCTCTGACAACTAGAGATAGGGCTTCTCCTCG			
Query 485	GGAGCAGAGTGCACAGTGGTGCATGGTTGCTCAGCTCGTCTCCTGAGATGTTGGGGTA			
Sbjct 484	GGAGCAGAGTGCACAGTGGTGCATGGTTGCTCAGCTCGTCTCCTGAGATGTTGGGGTA			
Query 545	AGTCCCGCACAGCGCCAAACCTTGATCTTAGTGGCCATTAAGTGGGCACTCTAAG			
Sbjct 544	AGTCCCGCACAGCGCCAAACCTTGATCTTAGTGGCCATTAAGTGGGCACTCTAAG			
Query 605	GTGACTGCGGGTGCACAAACCGGAGGAGGTGGGATGACTCAAAATCATCATGCCCTT			
Sbjct 604	GTGACTGCGG-GTGACAAACCGGAGGAGGTGGGATGACTCAAAATCATCATGCCCTT			
Query 665	TATGACTGGGCTACACAGCTGCTACAATGGACGCTACAAAGAGCTCCAAAGCCCGGAG			
Sbjct 662	TATGACTGGGCTACACAGCTGCTACAATGGACGCTACAAAGAGCTCCAAAGCCCGGAG			
Query 725	TGGACTTAATCTCATAAAACCGTCTCAATGGATTTGAGGCTTC-ACTGCTCTACATG			
Sbjct 722	TGGACTTAATCTCATAAAACCGTCTCAATGGATTTGAGGCTTC-ACTGCTCTACATG			
Query 784	AAACCTGGAATCGCT 798			
Sbjct 782	AAGC-TGGAATCGCT 795			

Perbandingan urutan basa sampel L5a dan *Bacillus* sp

Sequences producing significant alignments:

Select: All None Selected 0

Alignments	Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. T624 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1746	1746	98%	0.0	99%	KJ634144.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. T620 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1736	1736	96%	0.0	99%	KJ634142.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus saulinum strain HB B.6871 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1735	1735	96%	0.0	99%	KF568482.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. SW80 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1735	1735	96%	0.0	99%	HQ228200.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. SW79 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1735	1735	96%	0.0	99%	HQ228201.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. PL8068 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1733	1733	95%	0.0	99%	KF716414.1
<input type="checkbox"/>	Bacterium LF7 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1733	1733	95%	0.0	99%	JX114800.1
<input type="checkbox"/>	Uncultured Staphylococcus sp. clone GJ_3_36 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	96%	0.0	99%	KC050312.1
<input type="checkbox"/>	Uncultured bacterium clone CU23 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	96%	0.0	99%	KC414649.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. LF73 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	96%	0.0	99%	JX114813.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. LF27 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	96%	0.0	99%	JX114804.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. S124(1) 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	96%	0.0	99%	JF513183.1
<input type="checkbox"/>	Uncultured Staphylococcus sp. clone 87.8 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	96%	0.0	99%	AF467426.1
<input type="checkbox"/>	Uncultured Staphylococcus sp. clone 87.5 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	96%	0.0	99%	AF467420.1
<input type="checkbox"/>	Uncultured Staphylococcus sp. clone 87.10 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	96%	0.0	99%	AF467417.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus saprophytus strain OS5 2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1724	1724	98%	0.0	99%	KX242272.1

Analysis BLAST isolat L1a

Range 1: 16 to 984		GeneBank	Graphia	Next Match	Previous Match
Score	Expect	Identities	Gaps	Strand	
1746 bits(945)	0.0	963/971(99%)	4/971(0%)	Plus/Plus	
Query 9	CGATTATTG-CCGCTAAGCCGCGCATAGCCGGTTCTTAAAGTCTGATCTGAAAGCCACCGG	67			
Sbjct 16	CGATTATTGTGGCGTAAGCCGCGCATAGCCGGTTCTTAAAGTCTGATCTGAAAGCCACCGG	75			
Query 68	CTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAACTGGGAACTGAGTGCAGACAGGAAAGTGGAA	127			
Sbjct 76	CTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAACTGGGAACTGAGTGCAGACAGGAAAGTGGAA	135			
Query 128	TCCATGTGTAGCGGTGAAATGGCCAGAGATATGGGAAACACCGATGGCCGAAAGGCGACTT	187			
Sbjct 136	TCCATGTGTAGCGGTGAAATGGCCAGAGATATGGGAAACACCGATGGCCGAAAGGCGACTT	195			
Query 188	TCTGGTCTGTAAGTCAAGCTGATGTGGCAAAGCGTGGGATCAACAGGATTAGATACCC	247			
Sbjct 196	TCTGGTCTGTAAGTCAAGCTGATGTGGCAAAGCGTGGGATCAACAGGATTAGATACCC	255			
Query 248	TGGTAGTCCACGCGCTAAACGATGAGTCTAAGTGTGAGGGGGTTCCGCCCGCTTAGTGC	307			
Sbjct 256	TGGTAGTCCACGCGCTAAACGATGAGTCTAAGTGTGAGGGGGTTCCGCCCGCTTAGTGC	315			
Query 308	TGCAGCTAACGCATTAGCACTCCGCGCTGGGAGTACGACCGCCAGGTTGAAACTCAAAG	367			
Sbjct 316	TGCAGCTAACGCATTAGCACTCCGCGCTGGGAGTACGACCGCCAGGTTGAAACTCAAAG	375			
Query 368	GAATTGACGGGGACCCGCCACAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAAATTCGAAGCAACCGGAA	427			
Sbjct 376	GAATTGACGGGGACCCGCCACAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAAATTCGAAGCAACCGGAA	435			
Query 428	AACCTTACCAAACTTGCATCTCTTGAACACTCTAGAGATAGAGCTTCCCGCTTCGGG	487			
Sbjct 436	AACCTTACCAAACTTGCATCTCTTGAACACTCTAGAGATAGAGCTTCCCGCTTCGGG	495			
Query 488	GACAAAGTCAAGCGTGGTGCATGGTTCTCTCAGCTCTCTCTCTGAGATGTTGGGTTAAG	547			
Sbjct 496	GACAAAGTCAAGCGTGGTGCATGGTTCTCTCAGCTCTCTCTCTGAGATGTTGGGTTAAG	555			
Query 548	TCCCGCAAGAGCGCCACCGCTTAAGCTTAGTGGCATCATTAAAGTGGCCACTCTAGGTT	607			
Sbjct 556	TCCCGCAAGAGCGCCACCGCTTAAGCTTAGTGGCATCATTAAAGTGGCCACTCTAGGTT	615			
Query 608	GACTCCCGGTGACAAACCGGAGAGGTTGGGATGAGCTCAAATCATCATGCCCGCTTAGT	667			
Sbjct 616	GACTCCCGGTGACAAACCGGAGAGGTTGGGATGAGCTCAAATCATCATGCCCGCTTAGT	675			
Query 668	ATTTGGGCTACACACGCTGCTACAATGGCAATACAAGGGCAGCTAAACCGGAGGTCAT	727			
Sbjct 676	ATTTGGGCTACACACGCTGCTACAATGGCAATACAAGGGCAGCTAAACCGGAGGTCAT	735			
Query 728	GCAAATCCCAATAAGTGTCTCTCAGTGGATGTGATCTGCAACTCGACTACATCAAGC	787			
Sbjct 736	GCAAATCCCAATAAGTGTCTCTCAGTGGATGTGATCTGCAACTCGACTACATCAAGC	795			
Query 788	TGGATCGCTAGTAAATCGTAGATCAGCATGCTACGGTGAATACGTTCCCGGGTCTGTAC	847			
Sbjct 796	TGGATCGCTAGTAAATCGTAGATCAGCATGCTACGGTGAATACGTTCCCGGGTCTGTAC	855			
Query 848	ACACCGCCCGCTCACACCCAGAGTTTCTAAACCCCGAAGCCGCTGAGTAAACATTAT	907			
Sbjct 856	ACACCGCCCGCTCACACCCAGAGTTTCTAAACCCCGAAGCCGCTGAGTAAACATTAT	915			
Query 908	GGAGCTAGCCCTCGAAGTGGCAAAATCATTGGGCTCAAGTCTTA-AGGGGGGGGGGGGG	966			
Sbjct 916	GGAGCTAGCCCTCGAAGTGGCAAAATCATTGGGCTCAAGTCTTA-AGGGGGGGGGGGGG	974			
Query 967	ataaaaaaggg 977				
Sbjct 975	ATAAAA-GGG 984				





Range 1: 539 to 1494 [GenBank](#) [Graphical](#) [Next Match](#) [Previous Match](#)

Score	Expect	Identities	Gaps	Strand
1740 bits(942)	0.0	952/956(99%)	3/956(0%)	Plus/Plus
Query 4	ATACGG-ATTATTGGGCGT-AGCGCGCGTAGCGCGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCC	61		
Sbjct 539	ATCCGGAAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGCGCGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCC	598		
Query 62	CACGGCTCAACCGCTGAGGGTCATTGGAAACTGGAAACTTGAGTCCAGAGAGGACAGT	121		
Sbjct 599	CACGGCTCAACCGCTGAGGGTCATTGGAAACTGGAAACTTGAGTCCAGAGAGGACAGT	658		
Query 122	GGAAATTCAGTGTGACCGGTGAAATGGCAGAGATATGGAGGAACACCCAGTGGCAAGCC	181		
Sbjct 659	GGAAATTCAGTGTGACCGGTGAAATGGCAGAGATATGGAGGAACACCCAGTGGCAAGCC	718		
Query 182	GGCTCTCTGGTCTCTAACTGACCGTGAATGTCGGAAAGCGTGGGCATCAAAACGGATTAGA	241		
Sbjct 719	GGCTCTCTGGTCTCTAACTGACCGTGAATGTCGGAAAGCGTGGGCATCAAAACGGATTAGA	778		
Query 242	TACCCGCTAGTCCACCGCGTAAACGATGAGTGGTAAAGCTTAAAGGGTTCGCGCCCTCT	301		
Sbjct 779	TACCCGCTAGTCCACCGCGTAAACGATGAGTGGTAAAGCTTAAAGGGTTCGCGCCCTCT	838		
Query 302	AGTCTCCAGCTAACGCCATTAAAGCACTCCCGCTGGGGATGACGCCCCAGGTTCAAACT	361		
Sbjct 839	AGTCTCCAGCTAACGCCATTAAAGCACTCCCGCTGGGGATGACGCCCCAGGTTCAAACT	898		
Query 362	CAAAGGAATTGACGGGGACCCGCAACAGCGGTGGAGCATCTGGTTAAATTCGAAACAGCC	421		
Sbjct 899	CAAAGGAATTGACGGGGACCCGCAACAGCGGTGGAGCATCTGGTTAAATTCGAAACAGCC	958		
Query 422	CGAAGAACCTTACCAAATCTTGACATCCTTTGACCGCTCTAGAGATAGAGTCTTCCCCCT	481		
Sbjct 959	CGAAGAACCTTACCAAATCTTGACATCCTTTGACCGCTCTAGAGATAGAGTCTTCCCCCT	1018		
Query 482	CGGGGGACAAAGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTGAGATGTTGGG	541		
Sbjct 1019	CGGGGGACAAAGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTGAGATGTTGGG	1078		
Query 542	TTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTTAAGCTTAGTTGCCATCATTAAAGTGGGCACCT	601		
Sbjct 1079	TTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTTAAGCTTAGTTGCCATCATTAAAGTGGGCACCT	1138		
Query 602	AGGTTGACTGCGCGGTGACAAAACGGGAGGAGGTTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCC	661		
Sbjct 1139	AGGTTGACTGCGCGGTGACAAAACGGGAGGAGGTTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCC	1198		
Query 662	TTATGATTTGGGCTACACACGCTGCTACAAATGGATAATACAAAAGGGCAGCGAATCCCGGAG	721		
Sbjct 1199	TTATGATTTGGGCTACACACGCTGCTACAAATGGATAATACAAAAGGGCAGCGAATCCCGGAG	1258		
Query 722	GCCAAAGCAAAATCCCATAAAATATTCTCAGTTCGGATTGTAGTCTGCAACTCGACTACAT	781		
Sbjct 1259	GCCAAAGCAAAATCCCATAAAATATTCTCAGTTCGGATTGTAGTCTGCAACTCGACTACAT	1318		
Query 782	GAACTGGAAATCGCTAGTAAATCGTAGATCAGCATGCTACGGTGAATAAGTCCCGGGTCT	841		
Sbjct 1319	GAACTGGAAATCGCTAGTAAATCGTAGATCAGCATGCTACGGTGAATAAGTCCCGGGTCT	1378		
Query 842	TGTACACACCGCCCGTCCACACCACGAGAGTTTGTAAACCCGAGCGCGGTGGAGTAACT	901		
Sbjct 1379	TGTACACACCGCCCGTCCACACCACGAGAGTTTGTAAACCCGAGCGCGGTGGAGTAACT	1438		
Query 902	TTTAGGAGCTAGCCCTCGAAGGTGGGACAAATGATTGGGGTGAAGTCGTA-AGGGG	956		
Sbjct 1439	TTTAGGAGCTAGCCCTCGAAGGTGGGACAAATGATTGGGGTGAAGTCGTA-AGGGG	1494		

Perbandingan urutan basa sampel L1a dan *Stapylococuss* sp

Analisis BLAST isolat L3a

Perbandingan urutan basa sampel L3a dan *Stapylococuss* sp

Sequences producing significant alignments:

Select: All None Selected 0

Alignments	Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Identity	Accession
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. B48-3119_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	95%	0.0	99%	KF984418.1
<input type="checkbox"/>	Uncultured bacterium clone OTU23_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1727	1727	95%	0.0	99%	KP275279.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. MRS4581_13_2E_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1727	1727	95%	0.0	99%	KP78104.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. MRS4581_13_1E_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1727	1727	95%	0.0	99%	KP78908.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. MB371_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1727	1727	95%	0.0	99%	KP27353.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. A9_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1727	1727	95%	0.0	99%	KC31081.5
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus scuti strain MBR12_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1727	1727	95%	0.0	99%	JX96430.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. JSM_114054_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1727	1727	95%	0.0	99%	JQ20739.1
<input type="checkbox"/>	Endosymbiont of Nilaparvata lugens clone A302_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1727	1727	95%	0.0	99%	JG87587.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. MSS_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1727	1727	95%	0.0	99%	JF910017.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus scuti strain R10-5A_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1727	1727	95%	0.0	99%	HQ15480.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus scuti strain CTSP3_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1727	1727	95%	0.0	99%	EUB55191.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. XUL-1_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1727	1727	95%	0.0	99%	DQ83754.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. TUF1203 gene for 16S rRNA, partial sequence	1727	1727	95%	0.0	99%	AB188210.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus sp. DRG61_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1727	1727	95%	0.0	99%	AY440424.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus scuti strain SCBM1_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1727	1727	95%	0.0	99%	AY20254.1
<input type="checkbox"/>	Staphylococcus scuti strain DSM_20345_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1727	1727	95%	0.0	99%	UR_025020.1

Analysis BLAST isolat L4a

Sequence ID: [KF984418.1](#) Length: 1503 Number of Matches: 1

Range 1: 548 to 1494 [GenBank](#) [Graphis](#) [Next Match](#) [Previous Match](#)

Score	Expect	Identifies	Gaps	Strand
1729 bits(936)	0.0	944/947(99%)	3/947(0%)	Plus/Plus
Query 13	TATTGGGCGT- <u>AA</u> GGCGCGGTAGCGCGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCACGGGCTCA	71		
Sbjct 548	TATTGGGCGTAAAGCGCGCGGTAGCGCGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCACGGGCTCA	607		
Query 72	ACCOTGAGGGTCAITGGAAACTGGGAACTTGAAGTCCAGAGAGGAGAGTGGAAATCCA	131		
Sbjct 608	ACCOTGAGGGTCAITGGAACTGGGAACTTGAAGTCCAGAGAGGAGAGTGGAAATCCA	667		
Query 132	TGTGTAGCGGTCGAATGGCCAGAGATATGGAGGACACCGAGTGGCCAGGGCGCTCTCTG	191		
Sbjct 668	TGTGTAGCGGTCGAATGGCCAGAGATATGGAGGACACCGAGTGGCCAGGGCGCTCTCTG	727		
Query 192	CTCTGTAATGACCGTGAATTCGAAAGCGTGGGATCAAAACAGATAGATACCTGGT	251		
Sbjct 728	CTCTGTAATGACCGTGAATTCGAAAGCGTGGGATCAAAACAGATAGATACCTGGT	787		
Query 252	AGTCCACCGCCTAAACGATGAGTCTAAAGTCTTAGGGGTTTCCGCGCCTTAGTGTCTCA	311		
Sbjct 788	AGTCCACCGCCTAAACGATGAGTCTAAAGTCTTAGGGGTTTCCGCGCCTTAGTGTCTCA	847		
Query 312	GCTAACCGATTAAACGATCGCGCTGGGGAGTACGACCGCAGGTTGAAACTCAAGGAAT	371		
Sbjct 848	GCTAACCGATTAAACGATCGCGCTGGGGAGTACGACCGCAGGTTGAAACTCAAGGAAT	907		
Query 372	TGACGGGACCGCCACAGCGGTCGAGCATGTGGTTAAATTCGAAACCGCCGAAAGCC	431		
Sbjct 908	TGACGGGACCGCCACAGCGGTCGAGCATGTGGTTAAATTCGAAACCGCCGAAAGCC	967		
Query 432	TTACCAATCTTGACATCGTTTACCGCTCTAGAGATAGAGTCTTCCCGCTTGGGGGAC	491		
Sbjct 968	TTACCAATCTTGACATCGTTTACCGCTCTAGAGATAGAGTCTTCCCGCTTGGGGGAC	1027		
Query 492	AASTGACAGGTGGTGCATGGTGTGTCTCAGTCTGTCTGTGAGATGTTGGGTAAATCCC	551		
Sbjct 1028	AASTGACAGGTGGTGCATGGTGTGTCTCAGTCTGTCTGTGAGATGTTGGGTAAATCCC	1087		
Query 552	GCACGAGCGCAACCGCTTAAGTCTAGTGGCCATCATTAAGTGGGCACTCTAGTGTCACT	611		
Sbjct 1088	GCACGAGCGCAACCGCTTAAGTCTAGTGGCCATCATTAAGTGGGCACTCTAGTGTCACT	1147		
Query 612	CCCGGTGACAAACCGGAGGAGCGTGGGATGACGCTGAATCATCGCCCGCTTATGATT	671		
Sbjct 1148	CCCGGTGACAAACCGGAGGAGCGTGGGATGACGCTGAATCATCGCCCGCTTATGATT	1207		
Query 672	GGGCTACACAGTGTCTCAATGGTAATACAAAGGACCGCAATCCCGGAGGCAAGCA	731		
Sbjct 1208	GGGCTACACAGTGTCTCAATGGTAATACAAAGGACCGCAATCCCGGAGGCAAGCA	1267		
Query 732	ATCCCATAAAATATTCTCAGTCCGATTTGATGTCGCACTCGACTACATGAAGGTGGA	791		
Sbjct 1268	ATCCCATAAAATATTCTCAGTCCGATTTGATGTCGCACTCGACTACATGAAGGTGGA	1327		
Query 792	ATCGCTAGTAAATGATGATCAAGTCTAGCGTGAATGAGTCCCGCGCTTGTGACACAC	851		
Sbjct 1328	ATCGCTAGTAAATGATGATCAAGTCTAGCGTGAATGAGTCCCGCGCTTGTGACACAC	1387		
Query 852	CGCCCGTCAACCCAGAGTTTGTACCCGAGCCCGGCGCGGATGAACTTTAGAGGC	911		
Sbjct 1388	CGCCCGTCAACCCAGAGTTTGTACCCGAGCCCGGCGCGGATGAACTTTAGAGGC	1447		
Query 912	TAGCCCTCGAAGTGGGCAAAATGATGGGTTGAAGTC-TA- <u>Agggg</u> 956			
Sbjct 1448	TAGCCCTCGAAGTGGGCAAAATGATGGGTTGAAGTC-TA- <u>Agggg</u> 1494			



Perbandingan urutan basa sampel L4a dan *Staphylococcus* sp

Sequences producing significant alignments:

Select All None Selected 0

Alignments	Download	GenBank	Graphics	Distance tree of results							
					Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
<input type="checkbox"/>					<i>Providencia rettgeri</i> strain BFM1.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1724	1724	96%	0.0	99%	KU870748.1
<input type="checkbox"/>					Uncultured bacterium clone LVE Biofact_bd_16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1718	1718	96%	0.0	99%	KP204501.1
<input type="checkbox"/>					<i>Providencia vermicola</i> strain GC_16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1718	1718	96%	0.0	99%	KG727572.1
<input type="checkbox"/>					<i>Providencia stuartii</i> strain FDIHR1-1.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1712	1712	95%	0.0	99%	KT216580.1
<input type="checkbox"/>					<i>Providencia</i> sp. ICDB210.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1712	1712	96%	0.0	99%	JN836927.1
<input type="checkbox"/>					<i>Providencia</i> sp. MR180.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1711	1711	95%	0.0	99%	KJ483296.3
<input type="checkbox"/>					<i>Providencia vermicola</i> strain KURT-1.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1709	1709	95%	0.0	99%	KO089543.1
<input type="checkbox"/>					<i>Providencia stuartii</i> strain AEF-3ac.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1709	1709	95%	0.0	99%	KR867634.1
<input type="checkbox"/>					<i>Providencia</i> sp. 444.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1707	1707	96%	0.0	99%	KR232640.1
<input type="checkbox"/>					<i>Providencia</i> sp. A47.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1705	1705	96%	0.0	99%	KR232641.1
<input type="checkbox"/>					<i>Providencia rettgeri</i> strain OK-62. NR8-DRCOMP.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1701	1701	96%	0.0	99%	KO089556.3
<input type="checkbox"/>					<i>Providencia</i> sp. A41.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1701	1701	95%	0.0	99%	KR232639.1
<input type="checkbox"/>					<i>Providencia vermicola</i> strain TI-37.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1701	1701	95%	0.0	99%	KJ127181.1
<input type="checkbox"/>					<i>Providencia vermicola</i> strain C1CR-SPB8.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1701	1701	96%	0.0	99%	JG645158.1
<input type="checkbox"/>					<i>Providencia vermicola</i> strain FF48.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1701	1701	96%	0.0	99%	JN892786.3
<input type="checkbox"/>					<i>Providencia vermicola</i> strain FF46.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1701	1701	96%	0.0	99%	JN892784.1
<input type="checkbox"/>					Enterobacteriaceae bacterium MB6.1.16S ribosomal RNA gene, complete sequence	1701	1701	96%	0.0	99%	DQ439917.1

Analisis BLAST isolat L4b

Providencia rettgeri strain BFM1.16S ribosomal RNA gene, partial sequence
 Sequence ID: KU870748.1 Length: 1539 Number of Matches: 1


Range 1: 531 to 1477 [GenBank](#) [Graphics](#) [Next Match](#) [Previous Match](#)

Score	Expect	Identitles	Gaps	Strand	
1724 bits(933)	0.0	943/947(99%)	3/947(0%)	Plus/Plus	
Query 7	ATCGG-A-TACTGGGGCT-AAGCGCACCGAGCGGGTTGATTAACTAGATGTGAAATGCC				530
Sbjct 531	ATCGGAATACTGGGCTAAGCGCACCGAGCGGGTTGATTAACTAGATGTGAAATGCC				530
Query 64	CGGGCTTAACTGGGAATGGCATCTAAGACTGGTCAGCTAGACTCTTCTAGAGGGGGGTA				123
Sbjct 591	CGGGCTTAACTGGGAATGGCATCTAAGACTGGTCAGCTAGACTCTTCTAGAGGGGGGTA				123
Query 124	GAATTCATGTGTAGCGGTTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGAAATACCGGTGGCGAAGGCG				680
Sbjct 651	GAATTCATGTGTAGCGGTTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGAAATACCGGTGGCGAAGGCG				710
Query 184	GGCCCTGGCAAGAAGCTGACGCTCAGTGCAGAAAGCGTGGGAGCAAAACAGGATTAGAT				243
Sbjct 711	GGCCCTGGCAAGAAGCTGACGCTCAGTGCAGAAAGCGTGGGAGCAAAACAGGATTAGAT				740
Query 244	ACCTGTGTAGTCCAGCGCTTAAACGATGTGATTTGGAGGTTGTGCCCTGGAGCGGTGGC				303
Sbjct 771	ACCTGTGTAGTCCAGCGCTTAAACGATGTGATTTGGAGGTTGTGCCCTGGAGCGGTGGC				830
Query 304	TTCCGGAGCTAAACGGTTAAATGACACCGCGTGGGAGTACCGCCCGAGGTTAAAACATCA				363
Sbjct 831	TTCCGGAGCTAAACGGTTAAATGACACCGCGTGGGAGTACCGCCCGAGGTTAAAACATCA				890
Query 364	AATGAATTGACGGGGGCGCCACAAAGCGGTGGAGCATGTGTTTAAATCGATCGAAGCGCG				423
Sbjct 891	AATGAATTGACGGGGGCGCCACAAAGCGGTGGAGCATGTGTTTAAATCGATCGAAGCGCG				950
Query 424	AAGAACCTTACTACTCTTGACATCCAGAGAACTTAGCAGAGATGCTTGGTGGCTTGGG				483
Sbjct 951	AAGAACCTTACTACTCTTGACATCCAGAGAACTTAGCAGAGATGCTTGGTGGCTTGGG				1010
Query 484	GAATCTGAGACAGGTGATCGATGGCTGTGTGAGCTGGTGTGTGAAAATGTTGGGTTAA				543
Sbjct 1011	GAATCTGAGACAGGTGATCGATGGCTGTGTGAGCTGGTGTGTGAAAATGTTGGGTTAA				1070
Query 544	GTCCCGCAACCGAGCGCAACCGCTTATCGTTTGTTCGACGAGTTCGGTGGGAACTCAAAG				603
Sbjct 1071	GTCCCGCAACCGAGCGCAACCGCTTATCGTTTGTTCGACGAGTTCGGTGGGAACTCAAAG				1130
Query 604	GAGACTGGCGGTGATAAACCGGAGAGAGTGGGGATGACGCTCAAGTCAATCATGCGCCCTTA				663
Sbjct 1131	GAGACTGGCGGTGATAAACCGGAGAGAGTGGGGATGACGCTCAAGTCAATCATGCGCCCTTA				1190
Query 664	CGATAGGGGCTACACAGCTGCTACAAATGGCGTATACAAAGGAGAGAGCGACTCCGAGAGC				723
Sbjct 1191	CGATAGGGGCTACACAGCTGCTACAAATGGCGTATACAAAGGAGAGAGCGACTCCGAGAGC				1250
Query 724	AAGCGGAAGCTATAAAGTACGTCGTAGTCCGAGTTGGAGTCTGCAACTGGATCCATGAA				783
Sbjct 1251	AAGCGGAAGCTATAAAGTACGTCGTAGTCCGAGTTGGAGTCTGCAACTGGATCCATGAA				1310
Query 784	GTGGAAATCGCTAGTAATCGTAGATCAGAAATGCTACGGTGAATACGTTCCCGGGGCTTGT				843
Sbjct 1311	GTGGAAATCGCTAGTAATCGTAGATCAGAAATGCTACGGTGAATACGTTCCCGGGGCTTGT				1370
Query 844	ACACACCCCGGCTCACACCATGGGATGGGTTGCAAAAAGATAGGTAGCTTAACTCTCG				903
Sbjct 1371	ACACACCCCGGCTCACACCATGGGATGGGTTGCAAAAAGATAGGTAGCTTAACTCTCG				1430
Query 904	GGAGGGGCGCTTACCACCTTGTGTGATCGATGACTGGGTTGAAGTGTAA				950
Sbjct 1431	GGAGGGGCGCTTACCACCTTGTGTGATCGATGACTGGGTTGAAGTGTAA				1477

Perbandingan urutan basa sampel L4b dan *Providencia stuartii*



GAMBAR GRAFIK




Gambar Lalat rumah *Musca domestica*




Pengambilan sampel




Sampel diinokulasikan pada medium BHIB



Diinokulasikan pada medium NA, MCA, dan SSA



Hasil Inkubasi pertumbuhan bakteri pada medium NA, MCA, dan SSA




Uji biokimia



pewarnaan gram



pengamatan pada mikroskop



uji molekuler




Uji elektroforesis



B. Lampiran pada penelitian bakteri pada lalat hijau (*Chrysomya* sp)

- Peta Lokasi Pengambilan Sampel



- Skema Kerja
 1. Isolasi Bakteri Sayap Lalat Hijau (*Chrysomya* sp)



Chrysomya sp

- memisahkan sayap kiri dan sayap kanan dari tubuh lalat
- memasukkan sampel sayap ke dalam tabung eppendorf yang berisi PBS.
- diinokulasikan pada medium NA, SS, dan MC dengan metode goresan kuadran
- diinkubasi selama 24 – 48 jam
- disimpan di *refrigerator* pada suhu 4°C.

Isolat siap untuk uji selanjutnya

2. Pewarnaan Gram

- Memfiksasi isolat L1.KN, L1.KR, L2.KN, L2.KR, L3.KN, L3.KR, L4.KN, L4.KR, L5.KN, L5.KR dari media NA, isolat L1.KN, L4.KN, L5.KN, L5.KR dari media MC dan isolat L4.KR dari media SS
- Tetesi isolat dengan A (Kristal violet) 2-3 tetes
- Selama 1 menit
- Cuci dengan air mengalir lalu keringkan
- Tambahkan gram B (Iodium)
- Selama 1 menit
- Cuci dengan air mengalir lalu keringkan
- Tambahkan gram C (alkohol 96%)
- Selama 10 detik
- Cuci dengan air mengalir lalu keringkan
- Tambahkan gram D (Safranin)
- Selama 40 detik
- Cuci dengan air mengalir lalu keringkan



Hasil pengecatan gram dilihat dengan Mikroskop



3. Pengujian Aktivitas Biokimia

a. Uji TSIA (*triple sugar iron agar*)

Isolat Murni

- Ambil 1 ose isolat
- Goreskan pada agar miring
- Inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam

Pengamatan

b. Uji Indol

Isolat Murni

- Ambil 1 ose isolat
- Inokulasikan ke dalam medium
- Inkubasi pada suhu 37°C
- Selama 1x 24 jam
- Tambahkan reagen kovak's

Pengamatan

c. Uji Motility

Isolat Murni

- Ambil 1 ose isolat
- Inokulasikan ke dalam medium
- Inkubasi pada suhu 37°C
- Selama 1x 24 jam

Pengamatan

d. Uji Urea

Isolat Murni

Pengamatan

- Ambil 1 ose isolat
- Goreskan pada agar miring
- Inkubasi pada suhu 37°C selama 1X24 jam

e. Uji Citrat


Isolat Murni

Pengamatan

- Ambil 1 ose isolat
- Goreskan pada agar miring
- Inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam



4. Identifikasi Molekuler



• Proses Pengambilan Sampel




- **Pembuatan Media**




- **Proses Isolasi Bakteri**




- Hasil Pertumbuhan Bakteri



- Proses Identifikasi Morfologi






- **Uji Biokimia**




- Uji Molekuler



- Hasil Se kuensing

L4.KN



Sequences producing significant alignments:

Select: All None Selected 0

	Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
<input type="checkbox"/>	Escherichia coli strain HF36_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1738	1738	96%	0.0	99%	KP772064.1
<input type="checkbox"/>	Escherichia coli strain HF55_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1735	1735	96%	0.0	99%	KP772060.1
<input type="checkbox"/>	Escherichia coli gene for 16S ribosomal RNA, partial sequence, strain NMB3-2	1735	1735	96%	0.0	99%	LC005643.1
<input type="checkbox"/>	Escherichia coli gene for 16S rRNA, partial sequence, strain YB3-2	1735	1735	96%	0.0	99%	AB756350.1
<input type="checkbox"/>	Uncultured Escherichia sp. clone G04-G1410230254-4-37-M13F(-47)_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1729	1729	95%	0.0	99%	KP406459.1
<input type="checkbox"/>	Escherichia coli strain HF50_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1727	1727	96%	0.0	99%	KP772057.1
<input type="checkbox"/>	Escherichia coli strain HF93_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1725	1725	95%	0.0	99%	KP772051.1
<input type="checkbox"/>	Escherichia coli strain HF19_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1725	1725	95%	0.0	99%	KP772048.1
<input type="checkbox"/>	Uncultured Escherichia sp. clone G09-G1408230616-5-20-M13F(-47)_16S_ribosomal RNA gene, partial sequence	1725	1725	95%	0.0	99%	KP406369.1
<input type="checkbox"/>	Escherichia coli strain NADC_5570/96-24/5564, complete sequence	1722	11765	96%	0.0	99%	CP017251.1
<input type="checkbox"/>	Escherichia coli O157:H7 strain 9234, complete genome	1722	11878	96%	0.0	99%	CP017446.1
<input type="checkbox"/>	Escherichia coli O157:H7 strain 8368, complete genome	1722	11806	96%	0.0	99%	CP017444.1
<input type="checkbox"/>	Escherichia coli O157:H7 strain 4276, complete genome	1722	11878	96%	0.0	99%	CP017442.1
<input type="checkbox"/>	Escherichia coli O157:H7 strain 3384, complete genome	1722	11800	96%	0.0	99%	CP017440.1




Escherichia coli strain NF36 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
 Sequence ID: [KP772064.1](#) Length: 972 Number of Matches: 1

Range 1: 8 to 972 [GenBank](#) [GenBank](#) [Next Match](#) [Previous Match](#)

Score	Expect	Identifies	Gaps	Strand
1738 bits(941)	0.0	959/967(99%)	3/667(0%)	Plus/Plus
Query 5	GCTTCCGA-TACTGGCGTAAAGCCAGCGAGCGGGTTGTTAAATCAGATGTGAATCC	63		
Sbjct 8	GCTATCGAATTACTGGCGTAAAGCCAGCGAGCGGGTTGTTAAATCAGATGTGAATCC	67		
Query 64	CGGGCTCAACCTGGGAATCGATCTGATACTGGCAAGCTTGGTCTCTGTAGAGGGGGGT	123		
Sbjct 68	CGGGCTCAACCTGGGAATCGATCTGATACTGGCAAGCTTGGTCTCTGTAGAGGGGGGT	127		
Query 124	AGAATTCAGGTTAGCGGTTAAATCGGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGC	183		
Sbjct 128	AGAATTCAGGTTAGCGGTTAAATCGGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGC	187		
Query 184	GGCCCCCTGGACAGACTGACGCTCAGGTGGGAAGCGTGGGAGCAACAGSATTAGA	243		
Sbjct 188	GGCCCCCTGGACAGACTGACGCTCAGGTGGGAAGCGTGGGAGCAACAGSATTAGA	247		
Query 244	TACCCTGGTAGTCCACCGCGTAAACGATGTGCACTTGGAGGTTGTGCCCTTGGAGCGCTGG	303		
Sbjct 248	TACCCTGGTAGTCCACCGCGTAAACGATGTGCACTTGGAGGTTGTGCCCTTGGAGCGCTGG	307		
Query 304	CTTCGGAGCTAACCGGTTAAGTCGACCGGCTGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAATCTC	363		
Sbjct 308	CTTCGGAGCTAACCGGTTAAGTCGACCGGCTGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAATCTC	367		
Query 364	AAATGAATTGACGGGGGGCCGACAAAGCGGTGGAGCATGTGGTTAATCGATGCAACGC	423		
Sbjct 368	AAATGAATTGACGGGGGGCCGACAAAGCGGTGGAGCATGTGGTTAATCGATGCAACGC	427		
Query 424	GAAAGACCTTACTCGTCTTGCATCCAGCGAAGTTTCAGAGTGAAGATGCGCTTCG	483		
Sbjct 428	GAAAGACCTTACTCGTCTTGCATCCAGCGAAGTTTCAGAGTGAAGATGCGCTTCG	487		
Query 484	GGAAACCTGAGACAGGTTGCTGATGGCTGTGCACTCGTGTGTGAAATGTTGGGTTA	543		
Sbjct 488	GGAAACCTGAGACAGGTTGCTGATGGCTGTGCACTCGTGTGTGAAATGTTGGGTTA	547		
Query 544	AGTCCCGCACAGCGCAACCTTATCCTTGTGTGCCAGCGGTCGGGCGGGAATCAAA	603		
Sbjct 548	AGTCCCGCACAGCGCAACCTTATCCTTGTGTGCCAGCGGTCGGGCGGGAATCAAA	607		
Query 604	GGAACTCCCAATGATAAATCGAGGAGGTGGGATGCACTCAAGTCATCATGGCCCTT	663		
Sbjct 608	GGAACTCCCAATGATAAATCGAGGAGGTGGGATGCACTCAAGTCATCATGGCCCTT	667		
Query 664	ACGACAGGGCTTACACAGCTGCTCAATGGCCATACAAAGAGGAGCGACTCGCGAGAG	723		
Sbjct 668	ACGACAGGGCTTACACAGCTGCTCAATGGCCATACAAAGAGGAGCGACTCGCGAGAG	727		
Query 724	CAGCGGCACTCATAAAGTGGCTGTAGTCCGGATTGGAGTTCGAACCTGACCTCATGA	783		
Sbjct 728	CAGCGGCACTCATAAAGTGGCTGTAGTCCGGATTGGAGTTCGAACCTGACCTCATGA	787		
Query 784	AGTCGGATCCCTAGTAATCGTGGATCAGATGCCACGGTGAATACCTTCCCGGCTTG	843		
Sbjct 788	AGTCGGATCCCTAGTAATCGTGGATCAGATGCCACGGTGAATACCTTCCCGGCTTG	847		
Query 844	TACACACCGCCCTTACACCATGGGAGTGGGTTGCAAAAGAGTAGGTAGCTTAACTTTC	903		
Sbjct 848	TACACACCGCCCTTACACCATGGGAGTGGGTTGCAAAAGAGTAGGTAGCTTAACTTTC	907		
Query 904	GGAGGGGCGCTTACCACTTTGTGATTCAGCTGGGTTGAAGTCTACGGGTTAACCCCA	963		
Sbjct 907	GGAGGGGCGCTTACCACTTTGTGATTCAGCTGGGTTGAAGTCTACGGGTTAACCCCA	967		
Query 964	TAATAAA 970			
Sbjct 966	TAATAAA 972			





L5.KR

Sequences producing significant alignments:

Select: All None Selected 0

Alignments [Download](#) [GenBank](#) [Graphics](#) [Distance tree of results](#)

	Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
<input type="checkbox"/>	Uncultured bacterium clone 5.10.168.ribosomal RNA gene, partial sequence	1716	1716	95%	0.0	99%	EF178932.1
<input type="checkbox"/>	Uncultured bacterium partial.16S rRNA gene, clone F01027	1709	1709	95%	0.0	99%	F8872505.1
<input type="checkbox"/>	Enterobacteriaceae bacterium Smatlab_3202238.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1709	1709	94%	0.0	99%	AY338964.1
<input type="checkbox"/>	Uncultured bacterium clone 5.12.168.ribosomal RNA gene, partial sequence	1698	1698	95%	0.0	99%	EF178933.1
<input type="checkbox"/>	Parathea agglomerans strain FDMRG08_160, complete genome	1687	11776	95%	0.0	99%	CP014129.1
<input type="checkbox"/>	Parathea agglomerans strain VSB.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1687	1687	95%	0.0	99%	KT075209.1
<input type="checkbox"/>	Parathea agglomerans strain SDD.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1687	1687	95%	0.0	99%	KT075208.1
<input type="checkbox"/>	Parathea agglomerans strain SDF.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1687	1687	95%	0.0	99%	KT075194.1
<input type="checkbox"/>	Parathea agglomerans strain OGA.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1687	1687	95%	0.0	99%	KT075182.1
<input type="checkbox"/>	Parathea agglomerans strain NVO.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1687	1687	95%	0.0	99%	KT075181.1
<input type="checkbox"/>	Parathea agglomerans strain NFE.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1687	1687	95%	0.0	99%	KT075179.1
<input type="checkbox"/>	Parathea agglomerans strain NVC.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1687	1687	95%	0.0	99%	KT075177.1
<input type="checkbox"/>	Parathea agglomerans strain NSE.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1687	1687	95%	0.0	99%	KT075176.1
<input type="checkbox"/>	Uncultured bacterium clone MG-113.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1687	1687	95%	0.0	99%	KM044400.1
<input type="checkbox"/>	Uncultured penicillium proteobacterium clone ASC108.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1687	1687	95%	0.0	99%	JR825482.1
<input type="checkbox"/>	Parathea agglomerans isolate PSB27.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1687	1687	95%	0.0	99%	HQ242740.1
<input type="checkbox"/>	Parathea agglomerans isolate PSB29.16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1687	1687	95%	0.0	99%	HQ242739.1
<input type="checkbox"/>	Parathea vagans CG-1, complete genome	1687	11593	95%	0.0	99%	CP002206.1






Pantoea agglomerans strain FDAARGOS_160, complete genome
 Sequence ID: [CP014129.1](#) Length: 4050093 Number of Matches: 7

Range	1:3350326 to 3351272	GetSeq	Graph	Next Match	Previous Match
Score	Expect	IdentHes	Gaps	Strand	
1687 bits(913)	0.0	937/948(99%)	4/948(0%)	Plus/Minus	
Query 9	ATCGG-ATTACTGGGCTAA-GGGACGCGGGGGCTCTCGAAGTGGATGTGAATTCGC				66
Sbjct 3351272	ATCGGAACTACTGGGCTAAAGCGACCGGGGGCTCTCTAAAGTGGATGTGAATTCGC				3351213
Query 67	CGGGCTTAACCTGGGAAGTGCATTCCGAAGTGGCAGGCTAGACTTTGTAGAGGGGGGTA				136
Sbjct 3351212	CGGGCTTAACCTGGGAAGTGCATTCCGAAGTGGCAGGCTAGACTTTGTAGAGGGGGGTA				3351153
Query 127	GAATTCAGGCTTAGCGGCTGAATTCGGTACAGATCTGGAGGAATACCGGTCGGAAAGCC				186
Sbjct 3351152	GAATTCAGGCTTAGCGGCTGAATTCGGTACAGATCTGGAGGAATACCGGTCGGAAAGCC				3351093
Query 187	GGCCCCGGACAAAGACTGACCGTCAAGTCCGAAACCGTGGGAGCAACAGGATTAGAT				246
Sbjct 3351092	GGCCCCGGACAAAGACTGACCGTCAAGTCCGAAACCGTGGGAGCAACAGGATTAGAT				3351033
Query 247	ACCCCTGGTACTCCAGCCGCTAAACGATGTCCACTTGGAGGCGTCTCCCTCCAGGATGGC				306
Sbjct 3351032	ACCCCTGGTACTCCAGCCGCTAAACGATGTCCACTTGGAGGCGTCTCCCTCCAGGATGGC				3350973
Query 307	TTCCGGAGCTAACCGGCTTAAGTCCAGCCCGCTGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAACTCA				366
Sbjct 3350972	TTCCGGAGCTAACCGGCTTAAGTCCAGCCCGCTGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAACTCA				3350913
Query 367	AATGAACTGACGGGGGGCCGACAGGGGGTGGAGCATGTGGTTAATTGATGCAAGCGCC				426
Sbjct 3350912	AATGAACTGACGGGGGGCCGACAGGGGGTGGAGCATGTGGTTAATTGATGCAAGCGCC				3350853
Query 427	AGGAACTTACTACTCTTGGACATCCAGGATTCGGCAGAGAGGCTTACTGCTCTGG				486
Sbjct 3350852	AGGAACTTACTACTCTTGGACATCCAGGATTCGGCAGAGAGGCTTACTGCTCTGG				3350793
Query 487	GAACCGTGGACAGAGTGGTCTGATGGGCTGTGGTCAAGTCTGTGTGTGAATGTGGGTTAA				546
Sbjct 3350792	GAACCGTGGACAGAGTGGTCTGATGGGCTGTGGTCAAGTCTGTGTGTGAATGTGGGTTAA				3350733
Query 547	GTCCCGGACAGCGCAACCTCTATCCCTTTGTCGACGAGATTCCGTCGGGAACTCAAG				606
Sbjct 3350732	GTCCCGGACAGCGCAACCTCTATCCCTTTGTCGACGAGATTCCGTCGGGAACTCAAG				3350673
Query 607	GAGACTCCGGGTGATAAACCGGAGAGGTTGGGATGACTCAAGTCATCATGCGCCCTTA				666
Sbjct 3350672	GAGACTCCGGGTGATAAACCGGAGAGGTTGGGATGACTCAAGTCATCATGCGCCCTTA				3350613
Query 667	CGAGTAGGGCTCACACAGTGTCAATGGGCGATACAAAGAGAGCGACTCGGAGAGCC				726
Sbjct 3350612	CGAGTAGGGCTCACACAGTGTCAATGGGCGATACAAAGAGAGCGACTCGGAGAGCC				3350553
Query 727	AGCGGACTCATAAATGGCGCTTAACTCCGATTCGGAGTCTGCAACTCCACTCCCTAAA				786
Sbjct 3350552	AGCGGACTCACAAAGTCCGCTTAACTCCGATTCGGAGTCTGCAACTCCACTCCCTAAA				3350493
Query 787	GTCCGATCCGCTAATTCCTGGATCAGAAATGCCACGGTGAATACCTCCCGGGGCTGT				846
Sbjct 3350492	GTCCGATCCGCTAATTCCTGGATCAGAAATGCCACGGTGAATACCTCCCGGGGCTGT				3350433
Query 847	ACACACCGCCGCTCACACCATGGGAGTGGTTGGCAAAAGAGTAGTAGCTTAACCTTC				906
Sbjct 3350432	ACACACCGCCGCTCACACCATGGG-AGTGGGTTGGCAAAAGAGTAGTAGCTTAACCTTC				3350374
Query 907	GGAGGGGGCTTACCAGCTTTGTGATTCATGACTGGGTTGAAGTC-TAA 953				
Sbjct 3350373	GGAGGGGGCTTACCAGCTTTGTGATTCATGACTGGGTTGAAGTC-TAA 3350326				

L1.KN



Sequences producing significant alignments:

Select: All None Selected 0

Alignments [Download](#) [GenBank](#) [Graphics](#) [Distance tree of results](#)

	Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
<input type="checkbox"/>	Acinetobacter baumannii partial 16S rRNA gene, isolate 8731	791	791	87%	0.0	83%	U011387.1
<input type="checkbox"/>	Acinetobacter baumannii partial 16S rRNA gene, isolate 11587	791	791	87%	0.0	83%	U011372.1
<input type="checkbox"/>	Acinetobacter baumannii partial 16S rRNA gene, isolate 4000	791	791	87%	0.0	83%	U011359.1
<input type="checkbox"/>	Acinetobacter baumannii partial 16S rRNA gene, isolate 1070	791	791	87%	0.0	83%	U011363.1
<input type="checkbox"/>	Acinetobacter baumannii partial 16S rRNA gene, isolate 152	791	791	87%	0.0	83%	U011349.1
<input type="checkbox"/>	Acinetobacter baumannii strain KAB08, complete genome	789	4737	88%	0.0	83%	CP017856.1
<input type="checkbox"/>	Acinetobacter baumannii strain KAB07, complete genome	789	4737	88%	0.0	83%	CP017854.1
<input type="checkbox"/>	Acinetobacter baumannii strain KAB05, complete genome	789	4737	88%	0.0	83%	CP017852.1
<input type="checkbox"/>	Acinetobacter baumannii strain KAB05, complete genome	789	4730	88%	0.0	83%	CP017850.1
<input type="checkbox"/>	Acinetobacter baumannii strain KAB04, complete genome	789	4737	88%	0.0	83%	CP017848.1
<input type="checkbox"/>	Acinetobacter baumannii strain KAB03, complete genome	789	4726	88%	0.0	83%	CP017846.1
<input type="checkbox"/>	Acinetobacter baumannii strain KAB02, complete genome	789	4737	88%	0.0	83%	CP017844.1
<input type="checkbox"/>	Acinetobacter baumannii strain KAB01, complete genome	789	4732	88%	0.0	83%	CP017842.1
<input type="checkbox"/>	Acinetobacter baumannii Q1292, complete genome	789	4737	88%	0.0	83%	CP017840.1
<input type="checkbox"/>	Acinetobacter pittii biosour strain NC127344 genome assembly, chromosome_1	789	4737	88%	0.0	83%	LT06059.1
<input type="checkbox"/>	Acinetobacter baumannii strain 30275D15784958 genome assembly, chromosome_1	789	4737	88%	0.0	83%	LT06005.1

Acinetobacter baumannii strain KAB08, complete genome

sequence ID: [CP017856.1](#) Length: 3973763 Number of Matches: 6

Range 1: 42935 to 43849 [GenBank](#) [Graphics](#) [Next Match](#) [Previous Match](#)

Score	Expect	IdentRes	Gaps	Strand
789 bits (427)	0.0	786/951 (83%)	58/951 (6%)	Plus/Plus
Query 49	CTCGGATGTGGA-CCCTG-CC-GCACTAGGGTATTCCTTTGATACTGG-GGCTAGAG	104		
Sbjct 42935	CTCGGATGTGGAATCCCAGGCTTAAGTCTGGAAATTCGATTCGATATCTGGAGCTAGAG	42994		
Query 105	CAGGGCAGAGGAGGTTGATCTCCTGCTTTGGGTCALAAAGCGGGGATCTCCAGAA	164		
Sbjct 42995	TATGGGAGAGATGTAGAAATCCAGGTGTAGCGGTCGAAATCGGTAGAGATCTGGAGAA	43054		
Query 165	TACCGATGGGG-ATTACGCCATCTGG-ATAACTGACGCTGAGGTACGAAAGCATGGGG	222		
Sbjct 43055	TACCGATGGGAGGACGAGCTTCCGTAATACTCCGATGATACGAAAGCATGGGG	43114		
Query 223	AGCAACAGGATTAGATACCGTGGTAGTCCATGCCGTAAACGATGCTACTAGCGTTGG	282		
Sbjct 43115	AGCAACAGGATTAGATACCGTGGTAGTCCATGCCGTAAACGATGCTACTAGCGTTGG	43174		
Query 283	GGCTTTTGAGGCTTTAGTGGGCGACTAAGCGGTAAGTGGACCGGCTGGGATGGCT	342		
Sbjct 43175	GGCTTTTGAGGCTTTAGTGGGCGACTAAGCGGTAAGTGGACCGGCTGGGATGGCT	43234		
Query 343	TGCAGA-TAAL-CTCATATGATTGGAGCGGGTCCGACAGAGGG-AGAGT-TATGTTTT	398		
Sbjct 43235	CGCAACTAARAACCTAAATGAATTGACGGGGGGCCGACAGAGGGTGGCATGTGTTT	43294		
Query 399	TAAT-CTTGCATG-CAGGAAGCTTTT-TGGTTTT-ATAATTAG-AAGTTTTAAGAGA	453		
Sbjct 43295	TAATTCGATGCACCGGAGAACTTACCTGGGCTTGACATACTAGAAACTTCCAGAGA	43354		
Query 454	TGATTTGGGGGCGCTTCCGGAACTAGATACAGGGTGGTGGATGGGTTTTGGTCCAG	513		
Sbjct 43355	TGATTTGGGTC-CC-TT-CGGGAA-CTAGA-TACA-GTGTGTCATGGGTTT-CC-TCAG	43406		
Query 514	CTCTGTTTCTGTAAGAGGTTGGGTTTAAAGTTTGGGCAAGGAGCGCAAGCTTTTCTTTTA	573		
Sbjct 43407	C-TCGTTCTGTGA-GATGTTGGGTT-AGTCCG-CCAAAGCGCCCAAGCTTTTCC-ATA	43461		
Query 574	CTTCCAGCACTTGGATGGGAAGCTTAAGGATCTGCCAGCTAAAAAATGGAGGAAG	633		
Sbjct 43462	CTTCCAGCACTTGGATGGGAAGCTT-AGGATAGTCCGCTCAACAACTGGG-CGAG	43519		
Query 634	G-GGGACAGATTCAGGTCATCATGGGCGCTTACGGCCAGGGGCTCCAAAAG-CTTACA	691		
Sbjct 43520	GGGGGACAGACTCAA-CTCATCATGGGCC-TTACGGCCAGGG-CTACACAGCTCTACA	43576		
Query 692	ATGGTCGGTTCAAAAGGTTGCTTCCGAGCGAAGT-ATGCTAATCTCAA AAAAGCGGATCG	750		
Sbjct 43577	ATGGTCGGTTCAAAAGGTTGCTTCCGAGCGGATGATGATGATCTCAA AAAAGCGGATCG	43633		
Query 751	GAGCGCGAATGGATTTCCCACTTCGACTTCGATGAAACCGGAAATCGCTGTATTCGC	810		
Sbjct 43634	TAGTCGGATGGAGTCTCGCAACT-CGAC-TCCATGAATCGGAA-TGCTAGTAAATCGC	43692		
Query 811	GGATCAGAAAGCGGGGGGAAATCC-TTCCGGGGGCTTGGATCCATCCGCCCCGCAAA	869		
Sbjct 43693	GG-ATCAGAAATCC-GGGTAAATAGTCTCCGGG-CCCTATACACA-CCGCCCCGCAAA	43748		
Query 870	CCCAAGGGAGTTTGGGCGCTCGGAGTCC-TAGCGCTCTACTCCAAAAGCGGGCT	928		
Sbjct 43749	CC-ATGGG-AGTTTGGTG-CAC-CAGAAGTAGTAG-CCTA-AC-TGCAAAAGGGGGCT	43801		
Query 929	-ACCAAGTTGGGCTCGATGACTGGG-TGAAAAGTCCAAAAGGGAGGGCGCG	977		
Sbjct 43802	TACCAGGTTGGGCTCGATGACTGGGTTG-AACTCCATACAGGTA-CCCG	43849		





bitread

Tentang Bitread

Bitread telah aktif mengkampanyekan gerakan literasi dan penerbitan sejak tahun 2014. Sejalan dengan misi tersebut, Bitread Publishing lahir untuk memberikan kemudahan sekaligus kesempatan seluas-luasnya bagi para penulis untuk menerbitkan buku. Siapapun bisa menerbitkan buku di Bitread dengan estimasi waktu 1-2 bulan sejak naskah dikirimkan kepada tim redaksi.

Dengan kemudahan dan kecepatan proses penerbitan buku di Bitread, penulis memiliki porsi besar dalam mempersiapkan buku yang akan diterbitkannya. Tim redaksi Bitread akan melakukan asistensi bersama penulis untuk mempersiapkan naskah hingga layak diterbitkan. Bitread juga memberikan treatment kepada para penulis berupa pembuatan desain cover serta program marketing dan promosi bersama penulis.



Nikmati cara seru menerbitkan buku, hanya di:



   Bitread_ID  BitreadID  www.bitread.id