

**INTERVENSI TERAPI MUROTTAL PADA Ny L
DENGAN MASALAH NYERI AKUT (PRE-EKLAMSI)
DI PUSKESMAS BAJENG KABUPATEN GOWA**



Tugas Akhir Ners

Oleh:

SUPIANI YAMLEAN, S.Kep

NIM: 70900120007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

**INTERVENSI TERAPI MUROTTAL PADA Ny L
DENGAN MASALAH NYERI AKUT (PRE-EKLAMSI)
DI PUSKESMAS BAJENG KABUPATEN GOWA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tugas Akhir Ners

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas
Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SUPIANI YAMLEAN, S.Kep
NIM : 70900120007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Supiani Yamlean, S.Kep
Nim : 70900120007
Tempat/Tgl Lahir : Bau-Bau, 6 Agustus 1999
Prodi : Profesi Ners
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul : Intervensi Terapi Murottal Pada Ny L Dengan Masalah Nyeri Akut (Pre-Eklamsi) Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Gowa, 15 Juli 2021

Penyusun

Supiani Yamlean, S.Kep
Nim: 70900120007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudari Supiani Yamlean Nim 70900120007, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul **‘Intervensi Terapi Murottal Pada Ny L Dengan Masalah Nyeri Akut (Pre-Eklamsi) Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa’** memandang bahwa Tugas Akhir Ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 10 Juli 2021



.....
Dr. Hasnah, S.Kep.,Ns.,M.Kes



.....
Nurul Fadhilah Gani, S.Kep.,Ns.,M.Kep

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhi Ners yang berjudul “Intervensi Terapi Murottal Pada Ny L Dengan Masalah Nyeri Akut (Pre-Eklamsi) Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa” yang disusun oleh **Supiani Yamlean, S.Kep NIM : 70900120007**, Mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan di pertahankan dalam sidang *munaqasah* yang diselenggarakan pada hari Kamis dan tanggal 15 Juli 2021 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan)

Makassar, 15 Juli 2021 M
5 Zulhijah 1442 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patimah. S.Kep.,Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Nurhidayah, S.Kep.,Ns.M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Aisyah Arsyad. M.A	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hasnah, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Nurul Fadhilah Gani, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP:198007012006042002

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah swt. Atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Shalawat beserta salam kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Tugas akhir ners yang berjudul “Intervensi Terapi Murottal Pada Ny L Dengan Masalah Nyeri Akut (Pre-Eklamsi) Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa”, ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan di Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. dr.Syatirah,Sp.,A.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
2. Dr. Patima,S.Kep.,Ns.M.Kep selaku Kepala Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. Dr. Hasnah S.SIT.,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Pembimbing I dan Nurul Fadhilah Gani,S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini
4. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
5. Kepada kedua Orang Tua tercinta yang menjadi sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai cita. Ayahanda Taraati, S.sos & Ibunda Any Wally atas kasih sayang, arahan, serta nasehatnya yang tak henti-hentinya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi. Untuk segenap keluarga besar khususnya saudari kandung Khairul Yamlean yang telah memberikan kasih sayang serta semangatnya yang mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sampai dititik ini

6. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu dalam penyusunan tugas akhir ners ini.

Penulis mengharapkan tugas ini dapat bermanfaat demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Oleh karena itu, besar harapan penulis atas kontribusinya baik berupa saran dan kritikan yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik di waktu yang akan datang. Akhirnya kepada Allah swt jualah penulis memohon do'a dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian masyarakat nantinya

Gowa, 15 Juli 2021

Supiani Yamlean



DAFTAR ISI

Sampul	
Halaman Sampul.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	viii
Abstrak	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus	5
D. Manfaat	6
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Konsep Teori	7
B. Konsep Keperawatan	16
C. Pendekatan Teori Yang Digunakan.....	23
D. <i>Evidence Based Nursing</i> (EBN)	24
BAB III LAPORAN KASUS	
A. Pengkajian	26
B. Analisa Data	32
C. Diagnosis Keperawatan.....	33
D. Intervensi Keperawatan.....	34
E. Implementasi Dan Evaluasi Keperawatan.....	35
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Analisa Kasus	39
B. Analisa Intervensi.....	40
C. Alternatif Pemecahan Masalah	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran.	44
DAFTAR PUSTAKA	45
Lampiran Pathway	48
Lampiran Jurnal Rujukan.....	49
Lampiran Daftar Riwayat Hidup.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Intervensi Konsep Keperawatan

Tabel 2.1 Analisa Data

Tabel 2.2 Intervensi Asuhan Keperawatan



ABSTRAK

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. WHO menjelaskan bahwa dari 99% dari semua kematian ibu hamil terjadi di negara berkembang sekitar 830 wanita meninggal karena komplikasi pada kehamilan dan persalinan di seluruh dunia setiap hari. Komplikasi yang dapat menyebabkan dengan angka 75% dari semua kematian ibu adalah perdarahan hebat setelah melahirkan, infeksi, tekanan darah tinggi selama kehamilan (pre-eklamsi dan eklamsi) serta aborsi yang tidak aman. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh terapi *murottal* pada Ny L dengan masalah nyeri akut (pre-eklamsi). Metode yang digunakan adalah Studi Kasus dengan melakukan Pengkajian, diagnosis, intervensi dan evaluasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan data sekunder atau pemeriksaan fisik. Responden dipilih dengan cara mengkaji tanda dan gejala dari masalah keperawatan yang dirasakan pasien. Hasil analisis didapatkan bahwa Ny L berusia 22 tahun. Klien Status riwayat obstetrik pasien yaitu G1P0A0, pasien mengatakan merupakan kehamilan yang pertama. Hasil pemeriksaan fisik di dapatkan TD : 130/70 mmHg. Pasien mengatakan merasa nyeri dua minggu terakhir, Lokasi nyeri pada kepala bagian belakang, nyeri yang dirasakan seperti tegang dengan skala nyeri 3 (Ringan). Kesimpulan setelah dilakukan kegiatan pada Ny L dengan masalah nyeri akut yang dapat dilakukan dengan non farmakologi yaitu Terapi *murottal*. Efek dari terapi *murottal* yang bersifat sedatif memberikan respon berupa ketenangan emosional, dan relaksasi sehingga pasien mampu mengontrol diri ketika terjadi rasa tidak nyaman yang menyebabkan respon nyeri pun berkurang..

Keyword : Terapi *Murottal*, Nyeri Akut, Pre-eklamsi, Antenatal Care



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. WHO menjelaskan bahwa dari 99% dari semua kematian ibu hamil terjadi di negara berkembang sekitar 830 wanita meninggal karena komplikasi pada kehamilan dan persalinan di seluruh dunia setiap hari. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan (TPB) yaitu mengurangi rasio angka kematian ibu (AKI) menjadi kurang dari 70 per 100/00 kelahiran. Komplikasi yang dapat menyebabkan dengan angka 75% dari semua kematian ibu adalah perdarahan hebat setelah melahirkan, infeksi, tekanan darah tinggi selama kehamilan (pre-eklamsi dan eklamsi) serta aborsi yang tidak aman (WHO, 2019).

Perawatan kehamilan sangat berpengaruh terhadap kehamilan dan keselamatan bayi yang akan dilahirkan. Wanita yang secara teratur pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan dalam perawatan kehamilan akan memiliki kesehatan yang baik dan melahirkan bayi yang sehat. Sedangkan wanita yang memiliki kesehatan yang buruk akan lebih rentan menyebabkan kematian bayi. Melalui ANC, kesempatan untuk menyampaikan edukasi dan promosi kesehatan pada ibu hamil khususnya bisa dilakukan lebih baik. Fungsi suportif dan komunikatif dari ANC tidak hanya mampu menurunkan AKI tapi juga meningkatkan kualitas hidup bagi ibu dan bayi yang akan dilahirkan (Kementrian Kesehatan RI, 2020).

Penyebab tertinggi kedua kematian ibu yaitu preeklamsi, di seluruh dunia menurut (Zhang, Ming MD, 2020) menjelaskan bahwa insiden preeklamsia di seluruh dunia adalah 2,3-7,6%, dengan rata-rata 5%. WHO memperkirakan 76.000 per tahun disebabkan oleh kematian ibu, yang merupakan 16% dari global kematian ibu, terjadi di negara sebagian besar yang berpenghasilan menengah dan rendah. Preeklamsia merupakan kelainan pada masa kehamilan dan sistem multiple yang berhubungan dengan peningkatan Tekanan darah dan bersamaan dengan tingginya kandungan protein urin atau proteinuria yang terjadi sekitar minggu ke-20 kehamilan (Rahmaeni, 2020).

Menurut Wang. et al (2020) menjelaskan faktor-faktor penyebab dari preeklamsia yaitu primigravida atau kehamilan pertama, grand multigravida atau kehamilan lebih dari 5 kali, morbid obesitas atau biasa disebut kegemukan, riwayat hipertensi, dan usia. Dengan tanda gejalanya salah satunya adalah sakit kepala atau nyeri kepala.

Nyeri berdasarkan *International Association for the Study of Pain* (IASP) adalah sensori tidak nyaman dan pengalaman emosional yang sangat berhubungan dengan potensial kerusakan jaringan atau terdapat kerusakan jaringan yang nyata. Nyeri akut sendiri berhubungan dengan kaskade biokimia dan tingkah laku yang dimulai dari kerusakan jaringan (Meissner et al, 2015).

Tindakan nonfarmakologis yang dapat diberikan pada pasien yang mengalami nyeri kepala atau nyeri akut salah satunya adalah dengan

melakukan Terapi Murottal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susi susanti dkk (2019) Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Untuk Menurunkan Nyeri atau The Effect Of "Murottal Al-Qur'an" Therapy didapatkan bahwa hasil pengukuran skala nyeri setelah diberikan terapi murottal Al-Qur'an diketahui bahwa mayoritas nyeri berkurang dengan skala nyeri 3 yaitu 4 orang (50,0 %). Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh terapi murottal Al-Qur'an untuk menurunkan nyeri.

Data kasus rujukan di Puskemas Gowa periode Januari – Februari paling banyak adalah kejadian preeklampsia, baik preeklampsia (preeklampsia ringan / PER) maupun preeklampsia dengan perburukan (PEB). Hal tersebut menunjukkan bahwa ibu hamil dengan risiko tinggi preeklampsia di wilayah Puskesmas Bajeng Kab Gowa.

Hasil wawancara dari beberapa bidan menyatakan bahwa ibu hamil dengan preeklampsia sering kali tidak menunjukkan kenaikan tekanan darah selama pemeriksaan antenatal care (ANC), namun tiba-tiba tekanan darah naik pada akhir trimester atau mendekati persalinan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Ny L dimana mengalami tanda gejala yairu mengatakan dua minggu terakhir sering merasakan nyeri kepala, selain itu Ny L mengatakan bahwa kehamilannya merupakan kehamilan yang pertama.

Berdasarkan dari data tersebut, maka penulis tertarik memberikan intervensi tentang 'Intervensi Terapi Murottal Pada Ny L Dengan Masalah Nyeri Akut (Pre-Eklamsi) Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa'

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana gambaran Intervensi Terapi Murottal Pada Ny L Dengan Masalah Nyeri Akut (Pre-Eklamsi) Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.

C. Tujuan Umum dan Khusus

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Intervensi Terapi Murottal Pada Ny L Dengan Masalah Nyeri Akut (Pre-Eklamsi) Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hasil pengkajian pada Intervensi Terapi Murottal Pada Ny L Dengan Masalah Nyeri Akut (Pre-Eklamsi) Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.
- b. Untuk mengetahui diagnosis keperawatan pada Ny L Dengan Masalah Nyeri Akut (Pre-Eklamsi) Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.
- c. Untuk mengetahui intervensi keperawatan Ny L Dengan Masalah Nyeri Akut (Pre-Eklamsi) Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.

- d. Untuk mengetahui implementasi keperawatan pada Ny L Dengan Masalah Nyeri Akut (Pre-Eklamsi) Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan keperawatan, khususnya dalam keperawatan maternitas dengan menerapkan upaya pencegahan untuk mengurangi komplikasi kehamilan pada ibu hamil dengan Antenatal Care.

2. Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat digunakan pada intervensi dengan asuhan keperawatan antenatal care.

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Konsep Teori Preeklamsia

1. Defenisi Preeklamsia

Preeklamsia atau yang biasa disebut Kehamilan Induced Hypertension (PIH) kehamilan atau toksemia kehamilan, ditandai dengan Tekanan darah meningkat, oedema, bahkan adanya proteinuria. Biasanya preeklamsia terjadi pada ibu hamil yang usia kehamilannya 20 minggu keatas atau tiap triwulan dari kehamilan, pada kehamilan 37 minggu tersebut umumnya preeklamsia biasa terjadi hingga minggu pertama setelah persalinan. Preeklamsia memiliki 2 tingkatan yaitu preeklamsia ringan hingga berat, yang berkelanjutan terjadi eclampsia (Diana Christine Lalenoh, 2018).

Terkait masalah dalam kehamilan sebagaimana dijelaskan dalam QS.Luqman 31:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيْنٍ أَنِ

ALAUDDIN
M A K A S S A R

أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya :

'Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik) kepada kedua

2. Faktor Risiko Preeklamsia

Preeklamsia adalah penyakit spesifik selama kehamilan tanpa etiologi yang jelas (Wang, W., & Wang, 2020) kemudian menurut Norma & Mustika (2013), terdapat beberapa faktor resiko terjadinya preeklamsia

- a. Primigravida atau kehamilan pertama, Berdasarkan teori imunologik, preeklamsia pada primigravida terjadi karena di primigravida pembentukan *blocking antibody*.
- b. Grand multigravida atau kehamilan lebih dari 5 kali sangat beresiko mengalami preeklamsia dikarenakan kurangnya elastis alat-alat kandungan yang mengalami perubahan termasuk pembuluh darah.
- c. Morbid obesitas atau biasa disebut kegemukan, penyakit ini menyertai kehamilan misalnya diabetes mellitus.
- d. Riwayat Hipertensi, Ibu hamil dengan hipertensi kronis membuatnya lebih mudah mengalami preeklamsia berat dikarenakan pembuluh darah ibu sebelum mencapai 20 minggu telah mengalami vasokonstriksi.
- e. Usia, ibu hamil pada usia 35 tahun lebih rentan mengalami masalah kesehatan salah satunya adalah preeklamsia. Karena adanya perubahan jaringan rahim dan saluran lahir

yang tidak fleksibel seperti halnya pembuluh darah, disebabkan oleh peningkatan tekanan darah.

3. Klasifikasi Preeklamsi

Klasifikasi preeklampsia atau hipertensi dalam kehamilan terbagi 2, yaitu :

a. Preeklampsia Ringan

- 1) 140/90mmHg diukur dengan posisi ibu berbaring terlentang
- 2) Adanya pembengkakan kaki, muka, jari tangan serta berat badan naik 1kg lebih tiap minggunya
- 3) Proteinuria kuantitatif $>0,3$ gram/L , dan kualitatif (+1 dan +2) di kateter urin

b. Preeklampsia Berat

- 1) Tekanan darah senilai $>160/100$ mmHg
- 2) Adanya proteinuria >5 gram/L
- 3) Jumlah urine kurang (Oliguria) dari 500 cc/24Jam
- 4) Serebral terganggu, visus terganggu dan timbul nyeri pada epigastium
- 5) Terjadi pembengkakan/edema paru atau sianosis
- 6) Timbul keluhan subjektif, seperti : nyeri, gangguan penglihatan, sakit kepala, gangguan kesadaran ataupun odema paru

4. Manifestasi Klinis

(J.Y Jhonson, 2014) menjelaskan beberapa manifestasi klinis dari Preeklamsi adalah sebagai berikut :

- a. Spasme pembuluh darah ibu serta sirkulasi dan nutrisi yang buruk dapat mengakibatkan kelahiran dengan berat badan dan kelahiran prematur.
- b. Mengalami hipertensi diberbagai level.
- c. Protein dalam urin berkisar dari +1 hingga +4.
- d. Gejala neurologi seperti pandangan kabur, sakit kepala dan hiper refleksia mungkin akan terjadi.
- e. Berpotensi gagal hati.
- f. kemungkinan akan mengalami nyeri di kuadran kanan atas.
- g. meningkatnya enzim hati.
- h. jumlah trombosit menurun.

5. Patofisiologi

Menurut (D. C Lalenoh, 2018) patofisiologi terjadinya hipertensi dalam kehamilan atau preeklampsia terdapat beberapa teori teori yang berkaitan yaitu:

- a. Teori kelainan vaskularisasi plasenta

Cabang-cabang Arteri uterus dan arteri ovarium memberikan sirkulasi darah menuju plasenta serta Rahim. kemudian keduanya akan masuk meometrium dalam bentuk arteri aquaria sehingga dapat memberikan cabang arteri radial.

arteri radial tersebut akan masuk ke endometrium sehingga menjadi anggota dari arteri basal dari cabang arteri spiral. Dengan kehamilan yang normal, biasa terdapat trofoblas yang masuk kedalam lapisan otot arteri spiral. Trofoblas juga masuk kedalam bagian arteri spiral, sehingga jaringan matriks menjadi longgar serta lumen spiral menjadi lebih lebar. Lumen arteri spiral terjadi vasodilatasi dan distensi sehingga berdampak terjadinya hipotensi, resistensi pembuluh darah juga menurun, bahkan dapat membuat aliran darah ke daerah plasenta utero itu meningkat.

Tekanan darah yang tinggi pada masa kehamilan membuat tidak terdapat invasi yang cukup lengkap di dalam sel trofoblas yang di lapisi otot arteri spiral untuk tetap kaku dan keras maka tidak mungkin terjadi distensi dan vasodilatasi akibat lumen arteri spiral itu sendiri. Maka mengakibatkan arteri spiral mengalami pengecilan lumen pembuluh darah sehingga aliran darah uteroplacenta itu menjadi berkurang, berakibat tidak adanya oksigen yang cukup dalam jaringan untuk mempertahankan fungsi tubuh, dan sirkulasi darah berkurang pada plasenta (D. C Lalenoh, 2018)

- b. Teori sirkulasi darah berkurang pada Plasenta, radikal bebas dan disfungsi endotel

Sirkulasi darah berkurang yang dialami oleh plasenta serta tidak adanya oksigen yang cukup dalam jaringan untuk mempertahankan fungsi tubuh itu akan menimbulkan radikal bebas atau senyawa oksidan. Radikal bebas ialah senyawa yang mendapatkan elektron atom atau molekul yang memiliki elektron tetapi tak memiliki pasangan. Iskemik di plasenta dapat menghasilkan sebuah oksidan penting yaitu radikal hidroksi yang toksik, terutama membran endotel didalam pembuluh darah untuk perlindungan dalam tubuh yang normal yaitu produksi oksidan (D. C Lalenoh, 2018)

Hadirnya radikal hidroksil ini didalam pembuluh darah dianggap sebagai racun mengalir dalam aliran darah, sehingga hipertensi dalam kehamilan tersebut biasa disebut dengan "Toksemia". Radikal hidroksil tersebut dapat menghancurkan membrane yang menyimpan asam lemak tidak jenuh membuat lemak peroksida. Lemak peroksida dapat menghancurkan protein sel endotel dan juga nucleus. Preeklampsia teruji kadar oksidan yang lebih khusus meningkatnya lemak peroksida, sedangkan antioksidan mis. fat-soluble sebagai vitamin dalam preeklampsia mengalami penurunan, yang mengakibatkan dominasi kadar lemak oksidatif peroksida yang tinggi. Lemak peroksidan seperti oksidan sangat toksik bersirkulasi aliran darah ke seluruh tubuh tetapi menghancurkan membrane sel

sendotel itu sendiri. Selaput sel endotel sangat rentan terhadap kerusakan akibat peroksida lemak yang relatif gemuk. Secara langsung berkaitan dengan peraliran darah dan yang menampung begitu banyak asam lemak takjenuh.

Lemak peroksida yang terkena sel endotel, sel endotel mengalami kerusakan, membrane sel endotel itu sendiri yang mulai mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut mengakibatkan gangguan fungsi endotel, dan bahkan kerusakan pada struktur sel endotel secara menyeluruh.

c. Teori pembenaran imunologik ibu dan janin

Ibu dengan kehamilan yang normal, respon imunnya tidak lagi tolak keberadaan konsepsi. Terdapat Human Leukocyte Antigen Protein G (HLA-G), yang sangat memiliki peran penting terkait modulasi respon imun seseorang, sehingga untuk menolak hasil konsepsi (plasenta) ibu tidak bisa. Dengan adanya kehadiran HLA-G maka penyerbuan sel trofoblas menuju kedalam jaringan desidua ibu bisa terjadi. Ibu yang preeklampsia maka plasenta mengalami penurunan pada HLA-G. Penurunan tersebut pada daerah desidua plasenta, maka terlambat invasi trofoblas menuju desidua. Jadi, pentingnya invasi trofoblas ini sehingga menjadikan jaringan desidua yang lunak, juga rapuh mudah dilatasi arteri spiral. Produksi sitikon yang dirangsang

oleh HLA-G untuk mempermudah terjadinya reaksi inflamasi (D. C Lalenoh, 2018).

d. Teori penyesuaian kardiovaskuler

Ibu hamil normal, pembuluh darahnya refrakter. Refrakter adalah suatu pembuluh darah yang tidak peka dengan adanya impuls bahan vasopresor, untuk menimbulkan respon vasokonstriksi maka dibutuhkan kadar vasopresor yang tinggi. Ibu hamil normal, sintesis prostaglandin dalam sel endotel melindungi pembuluh darah refrakter pada vasopresor (D. C Lalenoh, 2018).

Tetapi pada preeklampsia, kekuatan refrakter menghilang terhadap bahan vasokonstriktor, pada kenyataannya sensitivitas meningkat terhadap vasopresor. kekuatan refraktori pembuluh darah menghilangnya bahan vasopresor sehingga membuat pembuluh darah jadi sensitif akan bahan vasopresor (D. C Lalenoh, 2018).

e. Teori stimulus inflamasi

Teori yang didasarkan pada fakta adanya proses inflamasi ketika pelepasan puing-puing trofoblas dalam peredaran darah merupakan stimulus utama. Ibu hamil yang normal, memiliki jumlah puing trofoblas yang masih batas wajar, sehingga reaksi inflasi dalam batas normal dan plasenta lepaskan puing-puing trofoblas sebagai nekrotik trofoblas dan sisa proses apoptosis

karena reaksi stres oksidatif. Bahan asing tersebut yang memicu munculnya proses inflamasi. Berbeda dengan adanya proses apoptisis atau kematian sel pada ibu hami yang terkena preeklampsia membuat produksi debris apoptosis dan trofoblas nekrotik mengalami peningkatan maka terjadi peningkatan stress oksidatif (D. C Lalenoh, 2018).

6. Pemeriksaan Penunjang

Menurut (Saifuddin, 2016) Pemeriksaan Laboratorium Preeklampsia adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan darah lengkap, hemoglobin menurun kadar normal Hb pada ibu yang sedang hamil adalah 12-14 gram%, peningkatan hemaktrosit (dengan nilai 37-43 vol%), dan trombosit mengalami penurunan (dengan nilai 150.000-450.000/mm³)
- b. Tes urin, yang ditemukan proteinuria
- c. Tes fungsi hati, Bilirubin.
- d. Tes asam urat, peningkatan asam urat (N = 2,4-2,7 mg/dl)
- e. Radiologi dan Ultrasonografi, dan Kardiografi.

7. Komplikasi

(Nuryaningsih dan Fatimah, 2017), menyebutkan beberapa komplikasi yang mungkin terjadi akibat hipertensi dalam kehamilan pada ibu dan janin. Pada ibu :

- a. Eklampsia

- b. Pre eklampsia berat
- c. Solusio plasenta
- d. Kelainan ginjal
- e. Perdarahan subkapsula hepar
- f. Kelainan pembekuan darah
- g. Sindrom HELLP (hemolisis, elevated, liver, enzymes, dan low platelet count).
- h. Ablasio retina.

B. Konsep Keperawatan

1. Pengkajian

- a. Anamnesa : Identitas ibu hamil, meliputi : Inisial nama, TTL / Usia, Pendidikan terakhir, suku, pekerjaan, agama, dan alamat tempat tinggal.
- b. Data Riwayat Kesehatan ibu : Riwayat Kesehatan yang sekarang, Riwayat Kesehatan yang lalu, Riwayat Kesehatan genetic.
- c. Pemeriksaan fisik
 - a) Keadaan umum : pada ibu yang menderita preeklampsia biasanya mengalami kelelahan.
 - b) TTV
 - c) Kepala : kepala yang kurang bersih dan berketombe serta ibu yang mengalami preeklampsia mengeluh sakit kepala

- d) Wajah : ibu hamil yang preeklampsia wajahnya tampak bengkak/edema
- e) Mata : ibu hamil yang preeklampsia mata dengan penglihatan yang kabur dan konjungtiva anemis
- f) Mulut : ibu hamil yang preeklampsia mukosa bibirnya lembab dan mulut terjadi pembengkakan vaskuler pada gusi sehingga bisa mengalami pembengkakan dan pendarahan.
- g) Thorax : Paru – paru , Jantung preeklampsia mengalami dekompensasi jantung
- h) Payudara : payudara membesar, lebih keras dan padat, areola menghitam dan puting menonjol
- i) Abdomen : terjadinya mual dan muntah akibat nyeri epigastrium
- j) Pemeriksaan janin : ibu hamil yang preeklampsia Gerakan janin melemah dan tidak teraturnya bunyi jantung
- k) Ektremitas : terdapat pembengkakan pada kaki serta jari-jari (Karjatin, 2016)

2. Diagnosis Keperawatan

- a. Nyeri akut
- b. Pola nafa tidak efektif

- c. Deficit pengetahuan
- d. Resiko cedera pada janin (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017)



3. Intervensi Keperawatan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018)

No.	Diagnosa	Tujuan	Intervensi
a.	Nyeri akut	<p>Setelah pemberian Tindakan diharapkan klien dapat menunjukkan penurunan nyeri dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluhan nyeri menurun 2. Tekanan darah normal 3. Frekuensi nadi normal (SLKI, 2019) 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lokasi nyeri, waktu timbulnya nyeri, kualitas, frekuensi 2. Identifikasi skala nyeri pada ibu hamil 3. identifikasi respons jika timbul nyeri non verbal 4. Identifikasi faktor yang dapat memperingan nyeri dan memperberat nyeri 5. Identifikasi pengetahuan ibu hamil serta tanyakan tentang nyeri 6. Identifikasi pengaruh budaya dalam menangani nyeri jika timbul 7. Pantau / Monitor keberhasilan terapi komplementer pada ibu hamil jika sudah diberikan <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik nonfarmakologis tetap diberikan pada ibu yang mengalami preeklampsia untuk mengurangi rasa nyeri ibu (mis. Terapi music, hypnosis, imajinasi terbimbing, aromaterapi, TENS, terapi pijat, akupresur, terapi bermain serta kompres hangat/dingin) 2. Tetap control lingkungan yang bisa memperberat nyeri pada ibu hamil (mis. cahaya, kebisingan dan Suhu ruangan) 3. Fasilitasi untuk istirahat dan tidur <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beri penjelasan pada ibu hamil pemicu timbulnya nyeri, periode dan pemicu

			<p>nyeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jelaskan pada ibu hamil bagaimana strategi dalam meredakan rasa nyeri 3. Anjurkan dalam memonitor nyeri jika secara mandiri 4. Anjurkan menggunakan analgetik yang tepat 5. Ajarkan teknik nonfarmakologis agar rasa nyeri pada ibu hamil berkurang <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian analgetik pada ibu hamil, jika perlu. <p>(SIKI, 2018)</p>
b.	Pola nafas tidak efektif	<p>Setelah pemberian Tindakan keperawatan diharapkan Klien menunjukkan pola nafas kembali efektif dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedalaman napas normal 2. Frekuensi napas normal 3. Tekanan darah normal 4. (SLKI, 2019) 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap monitor pola nafas ibu hamil (mulai dari kedalaman, usaha napas serta frekuensi) 2. Tetap monitor adanya bunyi napas tambahan (mis. Mengi, Gurgling, ronkhi kering, dan <i>wheezing</i>) 3. Tetap untuk Monitor sputum (warna, aroma dan jumlah) <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patenan jalan napas tetap dipertahankan <i>chin-lift</i> dan head-tilt (jika curiga trauma sevikal maka lakukan <i>jaw-trust</i>) 2. Posisikan ibu hamil dengan posisi semi-fowler atau fowler 3. Berikan minuman yang hangat 4. Jika terdapat lendir, Lakukan penghisapan lendir <15 detik 5. Berikan oksigen (O₂), jika perlu

			<p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajarkan ibu hamil melakukan Teknik batuk yang efektif <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasikan pemberian ekspektoran, mukolitik dan bronkodilator, jika perlu. <p>(SIKI, 2018)</p>
d.	Defisit pengetahuan	<p>Setelah pemberian tindakan keperawatan, diharapkan klien menunjukkan peningkatan pengetahuan dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan agar mengurangi risiko cedera 2. Meningkatkan pengetahuan untuk perilaku yang berisiko tinggi 3. meningkatkan pengetahuan untuk mencegah <p>(SLKI, 2019)</p>	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kesiapan ibu hamil dan kemampuan dalam menerima informasi 2. Identifikasi faktor-faktor yang dapat menurunkan ataupun meningkatkan pengetahuan dalam mencegah terjadinya preeklampsia <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan media dan materi Pendidikan Kesehatan yang akan diberikan pada ibu hamil 2. Jadwal kapan akan dilakukan Pendidikan Kesehatan sesuai kesepakatan bersama 3. Beri kesempatan ibu hamil untuk bertanya <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya preeklampsia pada ibu hamil <p>(SIKI, 2018)</p>

e.	Resiko cedera pada janin	<p>Setelah pemberian tindakan keperawatan, diharapkan klien tidak menimbulkan terjadinya resiko cedera pada janin dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menimbulkan perdarahan 2. Tekanan darah normal 3. Pola istirahat dan tidur baik 4. Frekuensi denyut nadi normal <p>(SLKI, 2019)</p>	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi status obstetric 2. Identifikasi Riwayat obstetric 3. Identifikasi adanya penggunaan obat, diet dan merokok 4. Identifikasi pemeriksaan kehamilan sebelumnya 5. Periksa denyut jantung janin selama 1 menit 6. Monitor denyut jantung janin 7. Monitor tanda vital ibu <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atur posisi pasien 2. Lakukan <i>manuver leopold</i> untuk menentukan posisi janin <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tujuan dan prosedur dalam pemantauan janin ibu 2. Setelah itu berikan ibu informasi dari hasil pemantauan, jika perlu <p>(SIKI, 2018)</p>
----	--------------------------	---	---

C. Pendekatan Teori yang digunakan

Katharine Kolcaba terlahir dengan nama Arnold Kathrine pada 8 Desember 1944, di Clevelan, Ohio. Pada tahun 1965 Kolcaba menyelesaikan diploma keperawatannya, dan pada tahun 1987, ia lulus program RN ke MSN di Sekolah Perawat Frances Payne Bolton, Universitas Case Western Reserve, dengan spesialisasi di bidang gerontologi. Pengalaman klinis Kolcaba sebelum kembali ke sekolah adalah dalam perawatan medis-bedah, perawatan jangka panjang, dan perawatan di rumah (Risnah dan Muh Irwan, 2021).

Dikembangkan Katharine Kolcaba pada tahun 1990, teori comfort merupakan middle range theory, karena memiliki batasan konsep dan proposisi, tingkat abstraksinya rendah dan mudah diterapkan pada pelayanan keperawatan. Teori ini lebih mengedepankan kenyamanan sebagai kebutuhan semua manusia. Kenyamanan ialah kebutuhan yang diperlukan pada rentang sakit hingga sehat dan kenyamanan merupakan label tahap akhir dari tindakan terapeutik perawat kepada pasien (Risnah dan Muh Irwan, 2021).

Kolcaba Mengemukakan bahwa kenyamanan adalah suatu konsep yang mempunyai suatu hubungan yang kuat dengan ilmu perawatan. Perawat menyediakan kenyamanan ke pasien dan keluarga-keluarga mereka melalui intervensi dengan prientasi pengukuran kenyamanan. Hubungan antara intervensi dengan teori yang dikemukakan yaitu memberikan rasa aman nyaman nyeri terhadap keluhan yang dirasakan pasien dengan memberikan tindakan keperawatan terapi Murottal guna menurunkan nyeri akut pada pasien dengan menekan nilai-nilai keislaman.

D. Evidence Based Nursing (EBN)

1. Defenisi

Terapi Murottal merupakan suatu bentuk asuhan keperawatan, yang dalam hal ini perawat mengajarkan kepada klien memberikan perlakuan terapi dengan memperdengarkan ayat-ayat suci Al quran, terapi murotal Al Quran adalah terapi bacaan Al Quran yang merupakan terapi religi dimana seseorang dibacakan ayat-ayat Al Quran selama beberapa menit atau jam sehingga memberikan dampak positif bagi tubuh seseorang (Arif Hendra, 2020)

Terapi murottal adalah menggunakan media Al-Quran (Baik dengan mendengarkan atau membaca) untuk membantu meningkatkan perubahan yang spesifik dalam tubuh baik secara fisiologis maupun psikologis (Yulianti Melyana, 2018).

2. Manfaat

Selain dapat menurunkan intensitas nyeri, terapi murottal melalui terapi pembacaan Al Quran memberikan manfaat dan obat yang mujarab bagi seseorang yang mengalami kegundahan hati, keputusasaan, kecemasan, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernafasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak (Arif Hendra, 2020).

Perubahan tersebut menunjukkan adanya penurunan ketegangan saraf reflektif yang mengakibatkan terjadinya vasodilatasi dan peningkatan kadar darah dalam kulit, diiringi dengan penurunan frekuensi detak jantung. Pemberian Terapi bacaan Al Quran terbukti mengaktifkan sel-sel tubuh dengan mengubah getaran suara menjadi gelombang yang ditangkap oleh tubuh, menurunkan rangsangan reseptor nyeri sehingga otak mengeluarkan opioid natural endogen. Opioid ini bersifat permanen untuk memblokir nociceptor nyeri (Arif Hendra, 2020).

3. Pelaksanaan

Terapi Murattal

Observasi

- a. Identifikasi aspek yang akan diubah atau dipertahankan
- b. Identifikasi aspek yang akan difokuskan dalam terapi

Terapeutik

- a. Posisikan dalam posisi dan lingkungan yang nyaman
- b. Putar rekaman yang telah ditetapkan
- c. Yakinkan volume yang digunakan sesuai dengan keinginan pasien

Edukasi

- a. Jelaskan tujuan dan manfaat terapi
- b. Anjurkan memusatkan perhatian/pikiran pada lantunan ayat Al-Qur'an (SIKI, 2018).

BAB III
LAPORAN KASUS

A. Pengkajian

I. Data Umum Klien

- a. Inisial klien : Ny L
- b. Usia : 22 Tahun
- c. Status perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- d. Pendidikan : SMA
- e. Riwayat kehamilan dan persalinan lalu : Tidak ada
- f. Riwayat Ginekologi
 - 1) Masalah Ginekologi : tidak ada
 - 2) Riwayat KB : Klien mengatakan tidak menggunakan KB
- g. Riwayat kehamilan saat ini :
 - 1) HPHT : 08 Juni 2020
 - 2) Taksiran Partus : 15 Maret 2021
 - 3) BB sebelum hamil : 67 Kg
 - 4) TD sebelum hamil : 100/70 mmHg

TD	BB/TB	Letak/Presentasi	DJJ	Usia	Keluhan
		Janin		Gestasi	
130/70 mmHg	73 Kg/153 Cm	LI : Bokong LII : PUKA LIII : Kepala LIV : BAP	132x/i	36 Minggu	Maagh

II. Data Umum Kesehatan saat ini

- a. Status Obstertik : G1 P0 A0
- b. Keluhan utama : Klien mengatakan dua minggu terakhir merasakan nyeri kepala

- c. Keadaan umum : Baik
- d. Kesadaran : Composmentis, E4 V5 M6 = 15
- e. BB/TB : 73 Kg/153 cm, terjadi peningkatan berat badan sesudah hamil sebanyak 6 Kg.

f. Tanda-tanda Vital :

TD : 130/70 mmHg

N : 84 x/i

P : 24 x/i

S : 36,5 celcius

g. Kepala-Leher

1) Kepala : bentuk kepala normosefalik, kulit kepala tampak bersih dan lembab, tidak ditemukan nodul, luka, iritasi ataupun massa, persebaran rambut merata, rambut tebal, dan klien mengatakan merasa nyeri pada kepala.

a) Lokasi nyeri : Pasien mengatakan nyeri pada kepala bagian belakang

b) Gambaran nyeri : Pasien mengatakan nyeri seperti tegang

c) Skala nyeri : Nyeri skala 3 (Ringan)

d) Durasi : Pasien mengatakan nyeri terasa kurang lebih 2 menit ketika timbul

e) Respon emosional : Pasien mengatakan ia tidak cemas saat nyeri

- f) Cara mengatasi nyeri : Pasien mengatakan jika nyeri ia menaruh minyak urut/balsem.
- 2) Mata : alis dan kedua mata tampak simetris, kedua alis bergerak simetris saat diangkat, tidak ada produksi cairan abnormal dari mata. Sklera mata tampak putih susu, konjungtiva tampak berwarna merah cerah. Pupil mata mengecil saat menerima cahaya.
- 3) Hidung : tidak terdapat produksi apapun yang keluar dari hidung, tidak ada pernapasan cuping hidung. Tidak teraba massa, tidak ada dislokasi hidung, tidak teraba pembengkakan dan nyeri
- 4) Mulut : warna bibir pucat, tidak tampak adanya lesi, gigi kurang lengkap, terdapat 2 gigi berlubang, tidak tampak karang gigi, dan gusi tidak bengkak. Lidah tampak bergerak dengan bebas, tidak ada pembengkakan, dan tidak ada produksi pus.
- 5) Telinga : mampu mendengar dan merespon cahaya, tidak mengeluh nyeri.
- 6) Leher : tidak tampak massa, pembengkakan atau kaku leher. Tidak teraba pembesaran kelenjar limfe dan tidak teraba kelenjar tiroid.

Masalah Khusus : Nyeri Akut

h. Dada

- 1) Jantung : tidak tampak adanya lesi, S1 S2 terdengar, hasil perkusi pekak
- 2) Dada : tidak tampak adanya nodul, massa atau luka, dinding dada bergerak simetris, tidak ada penggunaan otot bantu napas. Tidak ada fraktur, dan tidak teraba nyeri. Hasil perkusi normal pada paru abdomen. Tidak terdengar suara napas tambahan.
- 3) Payudara : tampak simetris, areola mammae tampak menghitam, tidak tampak dan tidak teraba massa, lesi atau nodul. Tidak ada benjolan atau pembengkakan.
- 4) Puting susu : kedua puting susu menonjol, klien mengatakan ada pengeluaran ASI. Tidak teraba ada massa atau produksi cairan yang abnormal.

Masalah Khusus :-

i. Abdomen

- 1) TFU : 32 cm
- 2) Leopold I : Bokong
- 3) Leopold II : PUKA
- 4) Leopold III : Kepala
- 5) Leopold IV : BAP
- 6) Linea Nigra : terdapat linea nigra dan ada striae.

Masalah Khusus :-

j. Perineum Genital : klien mengatakan tidak ditemukan lesi, tidak ada hemorroid dan tidak ada keputihan.

k. Ekstremitas

1) Ekstremitas atas : tidak nampak kontraktur , tidak nampak tremor, tidak ada deformitas, tidak ditemukan ada edema, jumlah jari normal adalah 5, kulit teraba lembab, warnah merah pada kuku dan kembang dala, waktu kurang dari 2 detik. Kekuatan otot sama pada sisi ekstremitas bawah 5 – 5 yaitu mampu menahan gaya gravitasi dan tahanan maksimal.

2) Ekstremitas bawah : tidak nampak kontraktur , tidak nampak tremor, tidak ada deformitas, tidak ditemukan ada edema, jumlah jari normal adalah 5, kulit teraba lembab, warnah merah pada kuku dan kembang dala, waktu kurang dari 2 detik. Kekuatan otot sama pada kedua sisi ekstremitas bawah yaitu 5-5

3) Refleks patella : +

Masalah Khusus:-

l. Eliminasi

1) Urin : klien mengatakan terkadang kurang lebih 4-6 kali

2) Fekal : klien mengatakan terkadang 1 atau 2 kali

Masalah khusus:-

m. Mobilisasi dan Latihan

- 1) Tingkat mobilisasi : klien mengatakan dapat bergerak dengan baik
- 2) Latihan/senam : Klien mengatakan tidak pernah melakukan berolahraga atau senam. Klien mengatakan takut senam atau berolahraga karena dapat keguguran.

Masalah khusus: Defst pengetahuan

n. Nutrisi dan cairan

- 1) Asupan nutrisi : klien mengatakan pola makannya baik, kadang-kadang sering menambah makan karena merasa lapar.
- 2) Asupan cairan : klien mengatakan sering minum air putih, kurang lebih 1 botol air le mineral 1,5 liter perhari.

Masalah khusus:-

o. Keadaan mental

- 1) Adaptasi psikologis : klien mengatakan merasa senang dengan kehamilannya.
- 2) Penerimaan kehamilan : klien mengatakan sangat menerima kehamilannya sekarang dan selalu menerima saran untuk kesehatan bayinya.

p. Persiapan persalinan : klien mengatakan persiapan yang dilakukan yaitu rencana tempat melahirkan dipuskesmas Bajeng, dan pengetahuan tentang tanda-tanda melahirkan.

- q. Obat-obatan yang dikonsumsi : klien mengatakan tablet Fe,
Bcom Tab.

B. Analisis Data

ANALISA DATA

NO	Sign/Simptom/Data	Etiologi/Penyebab	Problem/ Masalah Keperawatan
1.	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. klien mengatakan merasa nyeri pada kepala. b. Pasien mengatakan nyeri pada kepala bagian belakang c. Pasien mengatakan nyeri seperti tegang d. Nyeri skala 3 (Ringan) e. Pasien mengatakan nyeri terasa kurang lebih 2 menit ketika timbul f. Pasien mengatakan ia tidak cemas saat nyeri g. Pasien mengatakan jika nyeri ia menaruh minyak urut/balsem <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. TD: 130/70 mmHg N : 84 x/i P : 24 x/i S : 36,5 celcius 	<p>Kerusakan vaskuler pembuluh darah</p> <p>↓</p> <p>Aktivitas epineprin dan netepineprin</p> <p>↓</p> <p>vasokonstriksi</p> <p>↓</p> <p>peningkatan tekanan darah</p> <p>↓</p> <p>Gangguan Sirkulasi ke Otak</p> <p>↓</p> <p>Resistensi pembuluh darah otak</p> <p>↓</p> <p>Somatik Sensori</p> <p>↓</p> <p>Nyeri diperepsikan</p> <p>↓</p> <p>Nyeri Kepala</p>	<p>Nyeri Akut</p>

C. Diagnosis Keperawatan

1. Nyeri Akut berhubungan dengan peningkatan tekanan vesikuler ditandai dengan klien mengatakan merasakan nyeri



D. Rencana Keperawatan

INTERVENSI KEPERAWATAN

NAMA KLIEN : Ny. L
UMUR KLIEN : 22 tahun

Ruangan : Puskesmas Bajeng

No	Diagnosa Keperawatan	Luaran Keperawatan	Intervensi Keperawatan	Rasional
1.	<p>Nyeri Akut berhubungan dengan peningkatan tekanan vesikuler ditandai dengan DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> klien mengatakan merasa nyeri pada kepala. Pasien mengatakan nyeri pada kepala bagian belakang Pasien mengatakan nyeri seperti tegang Nyeri skala 3 (Ringan) Pasien mengatakan nyeri terasa kurang lebih 2 menit ketika timbul Pasien mengatakan 	<p>Setelah diberikan tindakan keperawatan 1X24 Jam diharapkan Nyeri menurun dengan kriteri hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> Keluhan nyeri menurun (SLKI, 2019) 	<p>Terapi Murattal</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi aspek yang akan diubah atau dipertahankan Identifikasi aspek yang akan difokuskan dalam terapi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Posisikan dalam posisi dan lingkungan yang nyaman Putar rekaman yang telah ditetapkan Yakinkan volume yang digunakan sesuai dengan keinginan pasien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan tujuan dan manfaat terapi Anjurkan memusatkan perhatian/pikiran pada 	<p>Untuk menetapkan tindakan terapi yang diberikan</p> <p>Untuk memberikan posisi yang nyaman</p> <p>Untuk melindungi pendengaran pasien</p> <p>Untuk dapat memahami tindakan yang akan diberikan</p> <p>Untuk memfokuskan dan memberikan perhatian pada</p>

	<p>ia tidak cemas saat nyeri</p> <p>g. Pasien mengatakan jika nyeri ia menaruh minyak urut/balsem</p> <p>DO :</p> <p>a. TD: 130/70 mmHg N : 84 x/i P : 24 x/i S : 36,5 celcius</p>		lantunan ayat Al-Qur'an	pasien
--	--	--	-------------------------	--------

E. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan

IMPLEMENTASI & EVALUASI KEPERAWATAN

NAMA KLIEN : Ny. L
UMUR KLIEN : 22 tahun

No	No. DX	Hari, Tgl./ Jam	Implementasi	Evaluasi
		Senin, 8 / 03 / 2021 08.36 – 09.00	<p>Terapi Murattal</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi aspek yang akan diubah atau dipertahankan Hasil : aspek yang akan diubah adalah psikologis pasien terkait dengan kenyamanan pasien dan nyeri aut yang pasien alami. Mengidentifikasi aspek yang akan difokuskan dalam terapi Hasil : aspek yang akan difokuskan dalam terapi murattal yang hendaak dilakukan adalah aspek relaksasi dan pengurangan nyeri. <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengubah posisi klien dalam posisi dan lingkungan yang nyaman Hasil : Klien mengikuti perubahan posisi yang dilakukan, klien merasa nyaman dengan posisi duduk. 	<p>S : Klien mengikuti anjuran yang diberikan dan akan mengulangi di rumahnya nanti.</p> <p>O : Klien tampak memahami</p> <p>A : Masalah belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Posisikan dalam posisi dan lingkungan yang nyaman Putar rekaman yang telah ditetapkan Yakinkan volume yang digunakan

			<p>2. Putar rekaman yang telah ditetapkan Hasil : Klien memilih surat Ar-Rahman, klien mendengarkan dengan fokus dan penuh penghayatan.</p> <p>3. Yakinkan volume yang digunakan sesuai dengan keinginan pasien Hasil : Klien mengatur sendiri volume di Handphone nya.</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Menjelaskan tujuan dan manfaat terapi Hasil : Klien mencermati penjelasan yang diberikan, dan mempercayai bahwa Al-Qur'an adalah sumber segala solusi atas permasalahan yang ada, baik itu mengenai kesehatan.</p> <p>2. Mengajukan memusatkan perhatian/pikiran pada lantunan ayat Al-Qur'an Hasil : Klien mengikuti anjuran yang diberikan dan akan mengulangi di rumahnya nanti.</p>	sesuai dengan keinginan pasien
		10 / 03 / 2021 07:05 WITA	<p>Terapi Murattal</p> <p>Observasi</p> <p>3. Mengidentifikasi aspek yang akan diubah atau dipertahankan Hasil : aspek yang akan diubah adalah psikologis pasien terkait dengan kenyamanan pasien dan nyeri aut yang pasien alami.</p> <p>4. Mengidentifikasi aspek yang akan difokuskan dalam terapi</p>	<p>: Klien mengatakan senang mendengar pengajiannya, walaupun kadang nyeri masih dirasakan.</p> <p>O : klien mampu melakukan dengan baik</p> <p>A : Masalah belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi Edukasi</p> <p>1. menganjurkan untuk</p>

		07.25 WITA	<p>Hasil : klien mengatakan masih merasakan nyeri kepala.</p> <p>Terapeutik</p> <p>4. Mengubah posisi klien dalam posisi dan lingkungan yang nyaman</p> <p>Hasil : Klien mengikuti perubahan posisi yang dilakukan, yaitu dengan duduk.</p> <p>5. Putar rekaman yang telah ditetapkan</p> <p>Hasil : Klien memilih lagi surat Ar-Rahman, klien mendengar sambil mengikuti dengan pelan.</p> <p>6. Yakinkan volume yang digunakan sesuai dengan keinginan pasien</p> <p>Hasil : Klien mengatur sendiri volume di Handphone nya.</p>	mengulangi kembali.
--	--	------------	--	---------------------

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis kasus

Pada kasus laporan akhir ners ini dilakukan pengkajian tanggal 8 Maret 2021 pada Ny L, pasien datang memeriksakan kehamilannya (ANC) di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa, hasil pengkajian didapatkan Ny L berusia 22 tahun dengan HPHT 8 Juni 2020, BB sebelum hamil yaitu 67 Kg, TFU : 32 cm, Leopold I : Bokong, Leopold II : PUKA, Leopold III : Kepala, Leopold IV : BAP. Klien mengatakan dua minggu terakhir merasakan nyeri kepala dan pasien tidak mempunyai riwayat darah tinggi. Status riwayat obstetrik pasien yaitu G1P0A0, pasien mengatakan merupakan kehamilan yang pertama.

Hasil pemeriksaan fisik di dapatkan keadaan umum pasien baik, Kesadaran Composmentis dan Kooperatif, BB: 73 Kg , TB :153 cm, TD : 130/70 mmHg, N : 84 x/i, P : 24 x/i, S : 36,5 celcius. Di dapatkan pasien mengatakan merasa nyeri pada kepala. Lokasi nyeri pada kepala bagian belakang, nyeri yang dirasakan seperti tegang dengan skala nyeri 3 (Ringan).

Kasus pada Ny L secara teori yang menyebabkan yaitu status primigravida. Primigravida merupakan wanita yang hamil untuk pertama kalinya. Tekanan darah tinggi banyak dijumpai pada primigravida dibanding multigravida, terutama primigravida usia muda. Primigravida lebih beresiko mengalami hipertensi dalam kehamilan karena baru pertama kali terpapar virus korion. Hal ini terjadi karena pada wanita tersebut

mekanisme imunologik pembentukan *blocking antibody* yang dilakukan oleh HLA-G terhadap antigen plasenta belum terbentuk secara sempurna, sehingga proses implantasi trofoblas ke jaringan desidua ibu menjadi terganggu (Dian Pratiwi, 2020).

Diagnosa yang muncul yaitu Nyeri akut. Nyeri akut merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat. Diagnosis ini juga dapat didapatkan setelah dilakukan pengkajian dengan data pasien mengeluh nyeri.

B. Analisis Intervensi

Tindakan keperawatan yang dilakukan pada diagnosis nyeri akut yaitu terapi murottal. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Arif Hendra, 2020) menjelaskan bahwa Pemberian terapi murottal akan mengaktifkan sel-sel tubuh dengan mengubah getaran suara menjadi gelombang yang ditangkap oleh tubuh, menurunkan rangsangan reseptor nyeri sehingga otak mengeluarkan opioid natural endogen. Opioid ini bersifat permanen untuk memblokir nociceptor nyeri. Arif menjelaskan dalam penelitiannya yaitu penurunan skala nyeri ini bisa disebabkan oleh efek murottal yang bersifat sedatif memberikan respon berupa ketenangan emosional, dan relaksasi sehingga pasien mampu mengontrol diri ketika terjadi rasa tidak nyaman yang menyebabkan respon nyeri pun berkurang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nani Mulyani, 2019) menjelaskan bahwa terapi murottal surat Ar Rahman yang dilakukan

efektif menurunkan nyeri. Namun pada intervensi yang diberikan keluhan nyeri yang dirasakan pasien belum efektif dikarenakan waktu yang diberikan kurang dari tiga hari.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Nani Mulyani, 2019) yang menjelaskan bahwa pemberian terapi murottal efektif dilakukan dilakukan selama kurang lebih 3 hari kemungkinan dapat terjadi karena selisih waktu yang cukup singkat. Terapi dalam penelitian ini diberikan selama tiga hari berturut-turut. Setiap harinya dilakukan dua sesi dimana lama waktu terapi setiap sesinya yaitu 30 menit. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan penurunan skala nyeri pada sesi pertama dan kedua pada hari pertama tidak signifikan, baru mengalami penurunan nyeri yang signifikan pada hari kedua dan ketiga.

C. Alternatif Pemecahan Masalah

Terapi murottal yaitu menggunakan media Al-Quran (baik mendengar atau membaca) untuk membantu meningkatkan perubahan yang spesifik dalam tubuh baik secara fisiologis maupun psikologis. Al-Qur'an adalah salah satu metode pengobatan yang memiliki semua jenis program dan data yang diperlukan untuk mengobati berbagai macam gangguan pada sel tubuh.

Mendengarkan murottal Al-Qur'an dapat memberikan pengaruh terhadap kecerdasan emosional, (EQ) kecerdasan intelektual (IQ), serta kecerdasan spiritual (SQ) seseorang. Mendengarkan murottal akan menimbulkan efek tenang dan rileks pada diri seseorang, sehingga akan

turut memberikan kontribusi dalam penurunan tekanan darah (Yuliani, Widyawati, Rahayu, Widiastuti, & Rusmini, 2018).

Al-Qur'an sebagai penawar rasa sakit juga telah dibuktikan dalam beberapa penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh (Aini D, 2017) dengan memberikan intervensi membaca Al-Qur'an secara tertil selama 10 menit menunjukkan bahwa 16 dari 31 pasien mengalami penurunan dari berbagai skala nyeri. Hal ini dikarenakan ketika membaca Al-Qur'an, beberapa jenis saraf aktif yakni saraf untuk membaca, menyuarakan dan mendengarkan ayat yang dilantunkan sehingga rangsang nyeri yang sampai ke otak lebih berkurang.

Murattal Al-Qur'an termasuk upaya mengingat Allah, dianggap mampu menjadi intervensi nonfarmakologi dalam mengurangi tingkat nyeri dan bahkan menghilangkan rasa nyeri secara perlahan. Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah SWT berfirman :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah SWT. Ingatlah!, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram”. (Kementerian Agama, 2016).

Menurut tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa orang-orang yang mendapat petunjuk Illahi dan kembali menerima tuntunan-Nya, sebagaimana disebut yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram setelah

sebelumnya bimbang dan ragu. Ketenteraman itu bersemi di dada mereka disebabkan karena dzikrullah, yakni mengingat Allah atau karena ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, yang memesona kandungan dan redaksinya. Sungguh camkanlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, Hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, seperti yang keadaanya seperti itu, yang tidak akan meminta bukti-bukti tambahan dan bagi mereka itulah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan bagi mereka juga tempat kembali yang baik, yaitu surga (Shihab, 2014)

Dalam penjelasan Tafsir Al-Mishbah tersebut dapat dimaknai bahwa upaya pendekatan mengingat Allah seperti membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an dapat membawa kita menjadi tenang, damai dan tenteram. Begitupula pada orang yang merasakan nyeri apabila diperdengarkan ayat Al-Qur'an maka akan merasakan kedamaian dan ketenteraman, terbukti di dalam penelitian (Ariska, 2018) mengatakan bahwa bacaan Murattal Al-Qur'an merupakan salah satu rangkaian ibadah yang menunjukkan keimanan kepada Allah SWT. Karena keimanan akan memberikan ketenangan jiwa, kedamaian hati, ketenteraman pikiran dan kemuliaan. Murattal Al-Qur'an yang dijalankan dengan penuh khusyu, tepat, ikhlas dan kontinu dapat memberikan respon emosi positif (positive thinking) dan motivasi positif serta mengefektifkan coping sehingga dapat mengurangi derita nyeri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kegiatan pada Ny L dengan masalah nyeri akut dapat disimpulkan bahwa dari diagnosis Nyeri akut yang dapat dilakukan dengan non farmakologi yaitu Terapi mural. Efek dari terapi mural yang bersifat sedatif memberikan respon berupa ketenangan emosional, dan relaksasi sehingga pasien mampu mengontrol diri ketika terjadi rasa tidak nyaman yang menyebabkan respon nyeri pun berkurang.

B. Saran

1. Bagi Profesi Keperawatan karya akhir ini sebagai referensi tambahan dalam memberikan asuhan keperawatan dalam keperawatan maternitas.
2. Bagi Pelayanan puskesmas karya akhir ini menjadi tambahan ataupun masukan dalam memberikan pelayanan Antenatal Care dalam meningkatkan upaya pencegahan terjadinya Hipertensi dalam kehamilan maupun preeklamsi.
3. Bagi institusi Pendidikan diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien dalam tindakan non farmakologi. Perlu dilakukannya penelitian yang lebih lanjut dengan kasus yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kementrian Agama RI
- Arif Hendra. (2020). *Pengaruh terapi murotal terhadap skala nyeri kepala pada klien cedera kepala di rsu prof. dr. margono soekarjo dan rsud banyumas. 2006–2009.*
- Ariska, M. D. (2018). *Pendekatan Spiritual Mengatasi Kecemasan pada Lansia.*
- Dian Pratiwi. (2020). Faktor Maternal Yang Mempengaruhi Kejadian Preeklamsia Pada Kehamilan. *Jurnal Medika Utama, 02 02.*
- J.Y Jhonson. (2014). *Keperawatan Maternitas.* Yogyakarta : Rapha Publishing.
- Karjatin, A. (2016). *Keperawatan Maternitas : Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.*
- Kementrian Kesehatan RI. (2020). *Buku KIA Revisi 2020 Lengkap* (p. 16). p. 16.
- Lalenoh, D. C. (2018). *Preeklampsia Berat dan Eklampsia : Tatalaksana Anastesia Periopertif (1st ed.).* Yogyakarta: Deepublish.
- Lalenoh, Diana Christine. (2018). *Preeklampsia Berat dan Eklampsia : Tatalaksana Anastesia Periopertif (1st ed.).* Yogyakarta: Deepublish.
- Nani Mulyani. (2019). *Perbedaan Pengaruh Terapi Murottal selama 15 Menit dan 25 Menit terhadap Penurunan Skala Nyeri pada Pasien Kanker Pasca Bedah.* 1(1), 77–88.
- Nuryaningsih dan Fatimah. (2017). *Asuhan Kebidanan Kehamilan.*
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia.* Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Rahmaeni. (2020). *Factors Effective in the Prevention of Preeclampsia : A*

- Systematic Review. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology, 173–182.*
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tjog.2020.01.002>
- Risnah dan Muh Irwan. (2021). *Falsafah dan teori keperawatan dalam integrasi keilmuan* (Musdalifah, Ed.). Alauddin University Press.
- Saifuddin, A. B. (2016). *Buku panduan praktis pelayanan kesehatan maternal dan Neonatal*. Jakarta: YBP-SP.
- Shihab, M. Q. (2014). *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol IV, Vol VII*. Jakarta : Lentera Hati.
- SIKI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia : Definisi dan Tindakan Keperawatan* (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI.
- SLKI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia : Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Wang, W., & Wang, Y. (2020). *Nomogram-based Prediction of Pre-eclampsia in First Trimester of Gestation. Pregnancy Hypertension*.
- Wang, W., & Wang, Y. (2020). *Nomogram-based Prediction of Pre-eclampsia in First Trimester of Gestation. Pregnancy Hypertension*.
- WHO. (2019). *World health statistics 2019: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals*. L'IV Com Sàrl, Switzerland.
- Yuliati Melyana. (2018). *Terapi Murottal Sebagai Upaya Menurunkan Kecemasan*


Dan Tekanan Darah Pada Ibu Hamil Dengan Preeklampsia : Literature Review Dilengkapi Studi Kasus. 8(2), 79–98.

Zhang, Ming MD, P. (2020). *Preeclampsia Among African American Pregnant Women: An Update on Prevalence, Complications, Etiology, and Biomarkers.* *Obstetrical and Gynecological Survey*, 75, 10.



LAMPIRAN

Lampiran 1 *Pathway*



Sumber : Nanda 2013

Lampiran 2 Jurnal Rujukan Utama

Santi Wahyuni: Effect Of Muroltal Therapy On Blood Pressure Of Pregnant Women

All verses and surahs in the Al Qur'an have good content. Likewise, the letter of Maryam can be read by the mother during pregnancy. The letter Maryam describes the figure of a woman who is obedient to her husband, patient when experiencing difficult times and loneliness when giving birth to Prophet Isa, and very much maintaining her chastity (Wahyuni, 2017).

Murottal therapy is believed to have a powerful relaxing effect on pregnant women. The response to relaxation techniques is thought to inhibit the autonomic nervous system and central nervous system, as well as increase parasympathetic activity which will decrease heart rate so that cardiac output decreases and ultimately BP will decrease (Rudiana & Cahaya, 2016). Murottal therapy can be done only by listening to the chanting of the verse (version A), the translation only (B) or the verse accompanied by the translation (C). Based on the description above, the aim of this study was to determine the effect of murottal therapy on BP changes in pregnant women with hypertension.

METHOD

Quasi experimental research design. This research used three groups, each group was carried out pretest and posttest. The study population was all pregnant women who had hypertension and had their pregnancy checked at the Kumpang district health center during the study period. There were 37 respondents with Minimax criteria, BP > 140/90 mmHg, did not have a history of hypertension, did not take antihypertensive drugs and were willing to become respondents. 27 respondents were obtained according to the criteria that the researcher set and were divided into 3 groups. Respondents were measured BP before the murottal therapy intervention (pretest). Respondents were given therapy guidance and taught how to do murottal therapy using portable wireless mini speaker (music box) and a 4 GB capacity Toshiba brand MicroSDHC memory Card (MMC) containing files of murottal QS Maryam versions A, B and C. Medium tempo murottal with details of duration version A: 25 minutes 19 seconds, version B 19 minutes 29 seconds

and version C 45 minutes 30 seconds.

Each respondent routinely performs murottal therapy at home (every day for 30 days and is done after sunset prayers). The intervention group 1 (R1) was given murottal therapy version A by listening to the chanting of the holy verse from QS Maryam, the intervention group 2 (R2) used version B which contained a translation of QS Maryam, and the intervention group 3 (R3) murottal version C by listening to chants and translations QS Maryam. The level of compliance of respondents in carrying out murottal therapy according to the version of the group was monitored by the researcher and assisted by the enumerator (spatial coordinator outside) by filling in a checklist. BP measurement during and after the intervention (posttest) was carried out directly at the health center every week on the fifth day for each intervention group. Respondents were also subjected to ANCOV examinations. For respondents who were unable to attend the posttest, a home visit was conducted. Each TD measurement result is documented in the blood pressure monitoring form.

The results of the normality test using the Shapiro-Wilk test showed that the data were not normally distributed. Quantitative data analysis to determine the median value and the Interquartile Range (IQR) of BP before and after the intervention on each group. Furthermore, bivariate analysis was carried out using systematic difference BP between groups using a non-parametric test (Kruskal-Wallis H test). This study has received ethical approval from the Health Research Ethics Commission (KEPK) of the Tasikmalaya Police to 2018 / KEPK / PE / VII / 0004. Research respondents had informed consent, their identity was written in the respondent's code (anonymous) and the confidentiality of the research results was guaranteed (confidentiality).

RESULT

The results of univariate data analysis in the form of respondent characteristics and BP measurements' results before and after intervention are described as follows.

EFFECT OF MUROTTAL THERAPY ON BLOOD PRESSURE OF PREGNANT WOMEN WITH HYPERTENSION

Santi Wahyuni¹, Badriah², Yanti Cahyati³
^{1,2,3} Program Studi Keperawatan Cirebon¹, Program Studi Keperawatan Tasikmalaya,
Poltekkes Kenseskes Tasikmalaya,
Email : daffa_keisha@yahoo.com & poltekkes:rim@gmail.com

ABSTRACT

The high incidence of cases of Hypertension in Pregnancy (HDK) increases the risk of maternal and perinatal complications, even maternal death. Complementary therapy can be done to help control blood pressure (TD). Murottal therapy is one of the therapies that is conceptually believed to provide a relaxing effect that can help control TD. Murottal therapy can be done only by listening to the chanting of the verse (version A), only the translation (B), or the verse accompanied by the translation (C). These types of differences are as far as researchers know that no one has done the research. The purpose of this study was to determine the effect of murottal therapy on changes in BP of pregnant women with hypertension. Quasi-experimental research design with a pretest-posttest group approach. Obtained 27 respondents with inclusion criteria namely Muslim, TD > 140/90 mmHg, and willing to be respondents. The analysis showed that there were differences in systolic and diastolic BP in groups 1, 2, and 3 before and after murottal therapy versions A, B, C, and there were no significant differences between systolic and diastolic BP between the three groups. In conclusion, the three types of murottal therapy performed to have the same effect in reducing systolic and diastolic BP. This shows that any type of murottal therapy has a significant impact in reducing blood pressure. Researchers recommend the application of murottal therapy in HDK patients as an alternative effort to reduce BP.

Keywords: BP, hypertension, murottal therapy

JNC - Volume 4 Issue 1 February 2021

279

Santi Wahyuni: Effect Of Muroltal Therapy On Blood Pressure Of Pregnant Women

BACKGROUND

Hypertension in pregnancy is a major cause of morbidity, long-term disability and maternal and fetal mortality. Nearly one-tenth of all maternal deaths in Africa and Asia are attributable to HDK, and a quarter of maternal deaths in Latin America are complicated (WHO, 2011). The Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia in 2012 was still dominated by HDK, reaching 32% in 2013 it reached 32%. These data indicate that HDK is a major cause of maternal death. It is estimated that 5-10% of cases of HDK, mothers experience difficulties in the delivery process and are at risk for babies with low birth weight.

The highest MMR of the 6 regional groups in West Java is in Region III Cirebon (366.80 / 100,000 KH), include Kumpang Regency (West Java Health Office, 2017). Kumpang Regency ranks the 4th highest MMR in West Java in 2017, namely 112.9 / 100,000 KH (West Java Health Office, 2017). A quarter of MMR in 2013 in Kumpang District was due to HDK (Dinkes Kumpang, 2013). The incidence of HDK in RSUD⁴⁵ Kumpang in the last six months of 2016, cases of preeclampsia 21% and gestational hypertension 11%.

The high incidence of HDK indicates a higher risk of maternal and perinatal complications. Complications can include decreased blood supply to the placenta, placental abruption and damage to internal organs (WHO, 2011). The prevention and management of complications is carried out pharmacologically and non-pharmacologically. However, the use of pharmacological therapy in pregnancy is not recommended because of the risk to the fetus and the risk of placental insufficiency. Pharmacological therapy is only given in certain conditions and is more focused on efforts to prevent morbidity such as stroke and myocardial dysfunction.

used for therapy by legendary Islamic musicians, such as Abu Yusuf Ibn Al-Kindi and Al-Farabi.

Various research results are used as evidence based in this study. Research on the application of music and murottal therapy in cases of hypertension shows the effect of therapy on reducing BP (Widayat, 2014; Kartun, 2016; Romadoni, 2013; Muhyadi, 2013; Ismarina, 2015; Supriadi, 2015). Research by Zulhairani, et al. (2012) in Malaysia showed Yasin letter therapy increased brain waves compared to classical music. Abdillah, et al. (2011) in Malaysia, murottal produces alpha waves and is calming compared to rock music. Fauzan and Abidin (2017) prove that the verse chair is applied to stimulate the brain. Wikaningsih and Purwaningrum (2018) in Purwokerto prove that Ar-Rahman's murottal Qur'an Surah (QS) therapy is more effective in reducing the pain of hypertensive patients compared to Mozart's music.

Murottal therapy application uses several types of letters of choice such as chair verses, Surah Yasin, Al-Rahman, Yusuf, Maryam, Al-Baqarah, An-Nisa', but to the knowledge of researchers there is no research that has conducted a review between the holy verses of the Qur'an and their translations. Murottal therapy can be done only by listening to the chanting of the holy Qur'an or verses and their translations. Listening to the recitation of the holy Qur'an has a therapeutic effect, including individuals who do not understand the meaning of the verse being read (Elkadi in Ibrahim, 2017). The Qur'an can function as sound therapy because listening to the chanting of the Qur'an can create calm (relaxation) and a state of alertness compared to classical music (Zulkurnaini, et al., 2012).

The majority of Indonesia's population is Muslim, so reading, listening to murottal, apart from being therapy, is also part of daily worship. Even pregnant women can read and listen to the chanting of the holy Qur'an to their fetus. Apart from stimulating the growth



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Supiani Yamlean, Lahir di Bau-Bau pada tanggal 6 Agustus 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Taraati Yamlean dan Ibu Any Wally.

Penulis dengan nama panggilan Upi ini mulai mengikuti pendidikan pertama di SDN Inpres Sathean, SMP Negeri 1 Kota Tual dan SMA N 1 KEI KECIL dan Lulus pada tahun S1 Keperawatan di UIN Alauddin Makassar dengan hasil Buku berjudul '*Tren dan Isu Riset Keperawatan Maternitas Kedepan*'. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan sehingga bisa melewati perjuangan yang hebat dan diiringi doa dari kedua orang tua, keluarga serta teman-teman yang sangat banyak membantu penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan telah selesai menyusun Tugas Akhir Ners.

Adapun pengalaman organisasi penulis yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan UIN Alauddin Makassar sebagai anggota Divisi Penelitian dan Perkembangan periode 2016-2017, berlanjut pada periode 2018-2019 sebagai Kepala Divisi Akhlak dan Moral dan Kemudian memasuki Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA F) pada periode 2019-2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R