

**INTERVENSI TERAPI MUROTTAL DAN MASSAGE DALAM
MENGATASI NYERI PADA IBU DENGAN KETUBAN PECAH
DINI DI RS LABUANG BAJI**



Tugas Akhir Ners

Oleh:

ADE IRMA SUHARDI,
NIM : 70900119032

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

**INTERVENSI TERAPI MUROTTAL DAN MASSAGE DALAM
MENGATASI NYERI PADA IBU DENGAN KETUBAN
PECAH DINI DI RS LABUANG BAJI**



Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ADE IRMA SUHARDI, S.Kep
NIM : 70900119032

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Irma Suhardi, S.Kep
NIM : 70900119032
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 25 Februari 1994
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Keperawatan/Ners/Departemen Maternitas
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumahan Bumi Batara Mawang Blok AA4/10
Judul : Intervensi Terapi Murottal Dan Massage Dalam
Mengatasi Nyeri Pada Ibu Dengan Ketuban Pecah
Dini Di Rs Labuang Baji

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 16 Juli 2021

Penyusun,



Ade Irma Suhardi
70900119032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Ade Irma Suhardi NIM: 70900119032, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul **“Intervensi Terapi Murottal Dan Massage Dalam Mengatasi Nyeri Pada Ibu Dengan Ketuban Pecah Dini Di Rs Labuang Baji”** memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan

Demikian persetujuan ini di berikan untuk diproses lebih lanjut

Gowa, 16 Juli 2021



Dr. Hasnah, S.Kep.,Ns.,M.Kes



Nurul Fadhillah Gani, S.Kep.Ns.,M.Kep

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "Intervensi Terapi Murottal dan Massage dalam mengatasi Nyeri pada Ibu dengan Ketuban Pecah Dini di Rs Labuang Baji" yang disusun oleh Ade Irma Suhardi, S. Kep, NIM : 70900119032, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 16 Juli 2021 M, bertepatan dengan 8 Dzul Hijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan)

Gowa, 16 Juli 2020 M

8 Dzul Hijjah 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Arbianingsih, S.Kep, Ns, M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hasnah, S.Kep, Ns, M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Nurul Fadilah Gani, S.Kep. Ns, M.Kep	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 198007012006042002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Shalawat beserta salam kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw

Tugas akhir ners yang berjudul “Intervensi Terapi Murottal Dan Massage Dalam Mengatasi Nyeri Pada Ibu Dengan Ketuban Pecah Dini Di Rs Labuang Baji” ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan di Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M. Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
2. Dr. Patima, S. Kep. Ns., M. Kep selaku Kepala Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. Dr. Hasnah, S. Kep., Ns., M. Kes selaku pembimbing I dan dan Nurul Fadhilah Gani, S. Kep. Ns., M. Kep selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini
4. Dr. Arbianingsih, S.Kep, Ns, M.Kes dan Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I selaku Penguji I dan Penguji II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini
5. Seluruh Dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
6. Keluarga tercinta terimakasih yang tak terhingga atas doa dan dukungannya selama ini

7. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis satu persatu yang telah begitu banyak membantu dalam penyusunan proposal tugas akhir ners ini

Penulis mengharapkan tugas ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik di waktu yang akan datang

Gowa, 16 Juli 2021

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul	i
Halaman Sampul.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian	iii
Halaman persetujuan	iv
Halaman pengesahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	ix
Halaman Abstrak (Indonesia)	x
Halaman Abstrak (Inggris).....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-4
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus	4
D. Manfaat	4
BAB II TINJAUAN TEORI.....	5-35
A. Konsep Teori	5
B. Konsep Keperawatan	13
C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan	31
D. <i>Evidence Based Nursing (EBN)</i>	32
BAB III LAPORAN KASUS.....	37-51
A. Pengkajian	37
B. Analisa Data	38
C. Diagnosis Keperawatan.....	42
D. Intervensi Keperawatan.....	43
E. Implementasi Keperawatan.....	45
F. Evaluasi	51
BAB IV PEMBAHASAN	56-63
A. Analisis Kasus.....	56
B. Analisis Intervensi.....	57
C. Alternative Pemecahan Masalah.....	62
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran.....	63
Daftar Pustaka	64-67
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Pengkajian.....	41
Tabel 2.1 Analisa Data.....	42
Tabel 3.1 Intervensi Keperawatan.....	43
Tabel 4.1 Implementasi Keperawatan.....	45
Tabel 5.1 Evaluasi	51



ABSTRAK

Nama : Ade Irma Suhardi
NIM : 70900119032
Judul : Intervensi Terapi Murottal Dan Massage Dalam Mengatasi Nyeri Pada Ibu Dengan Ketuban Pecah Dini Di Rs Labuang Baji

Latar Belakang : Ketuban Pecah Dini merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang membahayakan pada ibu hamil selama kehamilan. Menurut WHO, Angka kejadian ketuban pecah dini di dunia mencapai 12,3% dari total angka persalinan. Di Indonesia pada tahun 2013 terjadi sebanyak 35%-55% dari 17.665 kelahiran. Berdasarkan Kemenkes 2018, jumlah kasus KPD di Sulawesi Selatan sebesar 4,9%. Dari data observasi lapangan salah satu gejala yang sering dialami oleh ibu hamil dengan KPD adalah nyeri. Nyeri dapat dihilangkan dengan metode farmakologis dan nonfarmakologis. Salah satu metode nonfarmakologis yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri adalah Terapi Murottal dan Massage. **Tujuan** penelitian adalah Melaksanakan Asuhan Keperawatan dalam mengatasi nyeri pada ibu hamil dengan Ketuban Pecah Dini. **Metode** yang digunakan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Penatalaksanaan dilakukan sebanyak 1 kali pemberian Terapi Murottal dan Massage dengan waktu 15 menit selama 3 hari pemberian. **Hasil** analisis data menunjukkan diagnosis yaitu Nyeri akut. Pemberian Terapi Murottal dan Massage sebagai intervensi yang digunakan dalam mengatasi Nyeri akut pada Ibu hamil. **Kesimpulan** berdasarkan hasil evaluasi kasus yang dilakukan, Terapi Murottal dan Massage dengan jadwal yang ditetapkan menunjukkan penurunan skala Nyeri, hal ini mengindikasikan bahwa Terapi Murottal dan Massage efektif menurunkan Nyeri pada Ibu hamil yang mengalami Ketuban Pecah Dini

Kata Kunci : Ketuban Pecah Dini, Nyeri akut, Murrotal Quran, Terapi Pijat

ABSTRACT

Name : Ade Irma Suhardi
NIM : 70900119032
Title : Intervention of Murottal Therapy and Massage in Overcoming Pain in Mothers with Premature Rupture of Membranes at Labuang Baji Hospital

Background : Premature rupture of membranes is one of the dangerous complications of pregnancy for pregnant women during pregnancy. According to WHO, the incidence of premature rupture of membranes in the world reaches 12.3% of the total number of deliveries. In Indonesia in the year 2013 occurred as much as 35% -55% of the 17 665 births. Based on the 2018 Ministry of Health, the number of KPD cases in South Sulawesi was 4.9%. From field observation data, one of the symptoms that is often experienced by pregnant women is pain. Pain can be eliminated by pharmacological and non-pharmacological methods. one of the main methods of nonpharmacologic that can be used to reduce pain is Murottal Therapy and Massage. **The purpose of the study** was to carry out nursing care in overcoming pain in pregnant women with premature rupture of membranes. **The method** used is a case study with data collection techniques through observation, interviews, physical examination and documentation. The treatment was carried out 1 time giving Murottal Therapy and Massage with a time of 15 minutes for 3 days of administration. **The results** of data analysis showed a diagnosis of acute pain. Giving Murottal Therapy and Massage as an intervention used in overcoming acute pain in pregnant women. **The conclusion** based on the results of the case evaluation carried out, Murottal Therapy and Massage with a set schedule showed a decrease in the Pain scale, this indicated that Murottal and Massage Therapy was effective in reducing pain in pregnant women who experienced premature rupture of membranes

Keywords: Premature Rupture of Membranes, Acute Pain, Murrotal Quran, Massage Therapy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan merupakan suatu keadaan dimana seorang wanita yang di dalam rahimnya terdapat embrio atau fetus. Kehamilan dimulai pada saat masa konsepsi hingga lahirnya janin, dan lamanya kehamilan dimulai dari ovulasi hingga partus yang diperkirakan sekitar 40 minggu dan tidak melebihi 43 minggu (Kuswanti, 2014). Berbagai komplikasi kehamilan yang membahayakan pada ibu hamil selama kehamilan banyak terjadi, salah satunya adalah ketuban pecah dini yang menyebabkan terjadi peningkatan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Di Indonesia ketuban pecah dini masih menjadi masalah kesehatan dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi (Wiadny, Surya, 2016)

Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum proses persalinan. Bila ketuban pecah dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu disebut ketuban pecah dini pada kehamilan prematur. Insiden ketuban pecah dini (KPD) terkait erat dengan banyak faktor eksternal, dan insiden lebih tinggi pada orang dengan aktivitas yang banyak selama kehamilan. Selain itu, banyak referensi menunjukkan bahwa dalam insiden KPD yang dilaporkan, kejadian kehamilan aterm lebih tinggi daripada kehamilan awal, sekitar 95%, sedangkan kejadian kehamilan awal atau KPD awal kehamilan adalah sekitar 34% (Wiadnya, Surya, 2016)

Angka kejadian ketuban pecah dini di dunia mencapai 12,3% dari total angka persalinan, semuanya tersebar di negara berkembang di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Laos. Angka kejadian KPD di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 35%-55% dari 17.665 kelahiran (WHO, 2014). Angka kejadian KPD di provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,9% (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Angka KPD berkisar di antara 3-18% yang terjadi pada kehamilan preterm, sedangkan pada kehamilan aterm sekisar 8-10% (Ernawati, 2020).

Berdasarkan data observasi di lapangan, kejadian ketuban pecah dini

pada ibu hamil salah satu gejala yang sering dialami adalah nyeri, maka dari itu, perawat berperan untuk membantu pengunjung dan keluarga mengatasi rasa sakit. Penting juga bagi perawat untuk memahami sepenuhnya arti dari rasa sakit bagi setiap orang, sehingga dapat mengembangkan strategi manajemen nyeri dan memberikan analgesik, yaitu perawatan nonfarmakologis (Nuhan et al., 2018).

Nyeri dapat dihilangkan dengan metode farmakologis dan nonfarmakologis. Penatalaksanaan nyeri farmakologis lebih efektif daripada metode nonfarmakologis, namun metode farmakologis lebih mahal dan dapat menimbulkan efek samping yang merugikan. Meskipun metode nonfarmakologi lebih murah, sederhana, efektif dan tidak memiliki efek samping, serta dapat meningkatkan kepuasan selama persalinan, karena ibu dapat mengontrol perasaan dan tenaganya (Danuatmaja, 2014). Beberapa contoh metode nonfarmakologis yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri meliputi teknik relaksasi, imajinasi, gerakan dan perubahan posisi, biofeedback, pengangkatan perut, pijat, hidroterapi, hipnoterapi, homeopati, terapi tekanan balik, terapi musik, akupresur, akupunktur dan aromaterapi (Aprilia, 2011).

Terapi musik merupakan salah satu pengobatan yang dapat membantu meredakan nyeri pada ibu hamil. Terapi musik adalah kombinasi dari nada, harmoni, ritme dan melodi. Reaksi musik seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Terapi musik adalah penggunaan musik untuk mencapai tujuan terapeutik dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Musik yang ditunjuk dapat meningkatkan toleransi dan kemampuan untuk mengontrol rangsangan yang menyakitkan dan mengurangi kecemasan. Respons terhadap stres bergantung pada kesadaran seseorang akan setiap peristiwa. Tanda dan gejala stres fisiologis akibat aktivasi endokrin tubuh dan sistem saraf simpatik mempengaruhi seluruh bagian tubuh. Terapi musik penenang untuk menenangkan pasien adalah salah satunya. Membaca Al-Qur'an juga disebutkan dalam Al-Qur'an akan membawa ketenangan bagi pasien karena kebijaksanaan yang terkandung dalam bacaan Al-Qur'an. Murottal adalah

musik dengan kekuatan 50 desibel dan memberikan efek yang positif bagi yang mendengarkan (Wijaya 2009).

Penelitian Abdurrahman (2008) merekam elektroensefalogram (EEG) setelah mendengarkan Al-Qur'an. Hasil perekaman EEG terutama gelombang delta di area depan dan tengah otak kanan dan kiri, yang berarti otak tenang, damai, dan dalam kondisi nyaman. Terapi murottal (membaca Alquran) mampu menurunkan kecemasan pada pasien. Terapi murottal ini terbukti sangat membantu dalam proses pengobatan karena menghilangkan rasa sakit dan membuat klien rileks. Spiritualitas dan iman sangat penting dalam kehidupan manusia karena mempengaruhi kebiasaan, gaya hidup dan perasaan sakit. Penyakit, kehilangan atau rasa sakit mempengaruhi seseorang, energi orang tersebut terkuras dan jiwa orang tersebut juga terpengaruh (Potter dan Perry, 2006)..

Selain itu terapi pijat juga adalah salah satu metode non farmakologis yang memberikan tindakan penekanan oleh tangan pada jaringan lunak, biasanya pada otot, tendon atau ligament, tanpa menyebabkan pergeseran atau perubahan posisi sendi guna menurunkan nyeri, menghasilkan relaksasi, dan meningkatkan sirkulasi (Henderson, 2006). Pijat dapat memberikan kesenangan dan relaksasi yang lebih besar. Tekanan dan kecepatan saat pemijatan dilakukan dengan cara yang lembut, seperti ibu yang menenangkan bayinya. Saat dipijat dengan kecepatan 110 cm/s, saraf mengirimkan sinyal kesenangan ke otak. Keuntungan sentuhan ringan adalah dapat menstimulasi saraf aferen yang masuk ke dalam otak. Ini bekerja terutama pada sistem saraf perifer, yaitu serabut saraf taktil dari saraf C. Saraf ini mengirimkan sinyal yang berhubungan dengan perasaan positif dan emosi. Pijatan lembut dalam 15 menit dapat menaikkan gelombang delta dan mengurangi gelombang alfa dan betta. Gelombang delta memperlihatkan keadaan yang santai (Situmorang, 2009).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengelola asuhan keperawatan maternitas dengan Intervensi Terapi Murottal dan Massage dalam mengatasi Nyeri pada Ibu dengan Ketuban pecah dini di RS

Labuang Baji

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah dari karya tulis ilmiah ini adalah :

Bagaimana pelaksanaan intervensi murrotal al-quran dan massage pada ibu hamil yang mengalami ketuban pecah dini dengan masalah nyeri akut

C. Tujuan umum dan Tujuan Khusus

1. Tujuan Umum

Gambaran asuhan keperawatan dalam mengatasi nyeri pada ibu hamil dengan Ketuban Pecah Dini

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran hasil pengkajian pada ibu hamil dengan Ketuban Pecah Dini
- b. Untuk mengetahui diagnosis keperawatan pada ibu pada ibu hamil dengan Ketuban Pecah Dini
- c. Untuk mengetahui intervensi keperawatan pada pada ibu hamil dengan Ketuban Pecah Dini
- d. Untuk mengetahui implementasi keperawatan pada ibu hamil dengan Ketuban Pecah Dini
- e. Untuk mengetahui evaluasi keperawatan pada ibu hamil dengan Ketuban Pecah Dini
- f. Untuk menganalisis intervensi Murrotal Quran dan Massage dalam mengatasi nyeri pada ibu hamil dengan Ketuban Pecah Dini

D. Manfaat

1. Manfaat teoritis

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan Ketuban Pecah Dini

2. Manfaat aplikatif

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat digunakan sebagai intervensi dalam mengatasi nyeri pada ibu hamil dengan Ketuban Pecah Dini

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Definisi

Ketuban pecah dini (KPD) atau ketuban pecah sebelum waktunya (KPSW) didefinisikan sebagai pecahnya ketuban sebelum waktunya melahirkan. Hal ini dapat terjadi pada kehamilan aterm maupun kehamilan preterm (Prawirohardjo, 2010)

Ketuban pecah dini adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya tanpa disertai tanda inpartu dan setelah satu jam tetap tidak diikuti dengan proses inpartu sebagaimana mestinya. Sebagian besar pecahnya ketuban secara dini terjadi sekitar usia kehamilan 37 minggu (Manuaba, 2007)

2. Etiologi

Menurut Morgan (2009) dan Manuaba (2012), penyebab KPD adalah::

- a) Serviks inkompeten
- b) Genetik
- c) Pengaruh dari luar yang melemahkan ketuban
- d) Malposisi atau malpresentase janin
- e) Faktor menyebabkan kerusakan serviks
- f) Riwayat KPD sebelumnya 2 kali atau lebih
- g) Faktor yang berhubungan dengan berat badan sebelum dan selama hamil
- h) Merokok saat hamil
- i) Usia ibu yang lebih tua mungkin menyebabkan kurang kuat daripada usia muda
- j) Riwayat hubungan seksual baru-baru ini
- k) Paritas
- l) Anemia
- m) Keadaan sosial ekonomi

Morgan (2009) menjelaskan PROM dapat disebabkan karena beberapa faktor meliputi :

a) Umur

Sifat ibu terkait usia memiliki dampak yang signifikan pada persiapan ibu untuk kehamilan dan persalinan. Usia terbaik seorang ibu untuk melahirkan adalah antara tahun 20-35. Ada peningkatan risiko kehamilan dan persalinan di bawah atau di atas usia ini. Usia seseorang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap organ reproduksi, karena organ reproduksi mulai mengurangi kemampuan dan kelenturannya untuk menerima kehamilan.

b) Sosial ekonomi

Pendapatan adalah faktor penentu kuantitas dan kualitas kesehatan keluarga. Penghasilan berupa uang yang mempengaruhi penyelesaian hidup seseorang, terutama di institusi medis.

c) Kelahiran

Kelahiran merupakan jumlah anak dilahirkan ibu dari anak pertama sampai anak terakhir. Paritas dibagi menjadi minoritas, pasangan ganda dan pasangan terbanyak. Riwayat kelahiran kembar, pengalaman KPD pada kehamilan terakhir, jarak kelahiran yang terlalu dekat diduga meningkatkan risiko mengalami KPD pada kehamilan berikutnya.

d) Anemia

Anemia selama kehamilan adalah anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi. Kalau suplai zat besi rendah, setiap kehamilan mengurangi suplai zat besi tubuh, yang akhirnya menyebabkan anemia. Selama kehamilan, karena darah ibu hamil mengalami hematopoesis atau pengenceran, volumenya meningkat 30 persen hingga 40 persen, mencapai puncaknya antara 32 hingga 34 minggu kehamilan, sehingga relatif mungkin terjadi anemia. Ibu hamil dengan anemia umumnya lemah, pucat, cepat lelah, dan mata pusing. Tes darah dilakukan setidaknya dua kali selama kehamilan, yaitu

pada trimester pertama dan ketiga. Efek anemia pada janin antara lain keguguran, lahir mati, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, cacat lahir, dan kerentanan terhadap infeksi. Pada ibu, kehamilan dapat menyebabkan ancaman keguguran, persalinan prematur, dekompensasi, dan ketuban pecah dini. Selama persalinan, hal itu akan menyebabkan penyakit Anda, retensi plasenta, dan perdarahan postpartum yang disebabkan oleh kontraksi rahim yang lemah. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dibagi menjadi (1) HD > 11g%, tidak ada anemia, (2) 9-10g% anemia sedang, (3) < 8g% anemia berat.

e) Perilaku Merokok

Kebiasaan merokok atau lingkungan dengan intensitas rokok yang tinggi dapat mempengaruhi kondisi ibu hamil. Rokok mengandung lebih dari 2500 bahan kimia yang teridentifikasi, termasuk karbon monoksida, anemia, aseton, hidrogen sianida, dll. Merokok selama kehamilan dapat menyebabkan penyakit seperti kehamilan ektopik, ketuban pecah dini & peningkatan risiko lahir mati.

f) Riwayat KPD

Riwayat KPD pada kehamilan sebelumnya sangat berpengaruh terhadap status kehamilan berikutnya. Riwayat KPD sebelumnya memiliki 24 risiko mengalami kembali ketuban pecah dini. Singkatnya, patogenesis KPD adalah karena penurunan kandungan kolagen dalam membran, yang menyebabkan ketuban pecah dini & ketuban pecah dini.

g) Serviks yang inkompeten

Aplasia serviks adalah istilah untuk kelainan pada otot leher atau leher rahim (serviks) yang terlalu lunak & lemah, yang mungkin sedikit terbuka di pertengahan kehamilan karena ketidakmampuan menahan tekanan pertumbuhan janin.

3. Manifestasi klinik

Tanda dan gejala kehamilan dengan KPD adalah cairan ketuban yang

keluar melalui vagina. Cairan ketuban memiliki bau amis dan bebas amonia, dapat mengalir atau masih mengalir, berwarna pucat dan berlumuran darah. Cairan ini tidak akan berhenti kalau mengering karena terus diproduksi sampai pengiriman. Namun saat, kepala bayi yang berbaring sering kali menyumbat fistula atau menyumbat fistula untuk sementara. Demam, keputihan, nyeri perut, dan detak jantung janin yang cepat adalah tanda-tanda infeksi (Sunarti, 2017)

4. Patofisiologi

Pecahnya selaput ketuban selama persalinan biasanya disebabkan oleh kontraksi uterus dan pemanjangan berulang. Ketuban pecah, bukan karena seluruh amnion melemah, tetapi karena ada perubahan biokimiawi yang menyebabkan amnion di bawahnya melemah di area tertentu. Ada keseimbangan antara sintesis dan degradasi matriks ekstraseluler. Dengan perubahan struktur, jumlah sel dan katabolisme kolagen, aktivitas kolagen berubah dan membran pecah.

Penurunan asam askorbat sebagai komponen kolagen & kekurangan asam dan tembaga askorbat berkontribusi pada perkembangan struktur abnormal yang disebabkan oleh aktivitas merokok. Degradasi kolagen dimediasi oleh matrix metalloproteinases (MMPs), yang spesifik jaringan dan dihambat oleh protease inhibitor..

Saat mendekati waktu persalinan, keseimbangan antara MMP & TIMP1 menyebabkan proteolisis matriks ekstraseluler dan membran janin. Aktivitas proteolitik ini meningkat sebelum pemberian. Pada periodontitis dengan peningkatan MMP, ketuban pecah dini cenderung terjadi. Selaput ketuban sangat resisten pada tahap awal kehamilan. Selama trimester ketiga, ketuban rentan pecah. Melemahnya kekuatan selaput ketuban berkaitan dengan ekspansi rahim, kontraksi rahim dan gerakan janin. Selama trimester terakhir, terjadi perubahan biokimia pada selaput ketuban. Pecahnya cairan ketuban selama kehamilan cukup bulan adalah peristiwa fisiologis. Ketuban pecah dini pada awal kehamilan disebabkan oleh faktor eksternal, seperti infeksi yang menyebar dari vagina. Ketuban

pecah dini sering terjadi pada kasus penimbunan cairan, insufisiensi serviks, dan solusio plasenta (Soewarto, 2014).

5. Pemeriksaan penunjang

a. Pemeriksaan laboratorium

Sekresi vagina harus diuji untuk bau, konsentrasi, warna, PH.

1. Uji Lakmus (Uji Nitorazin). Jika kertas lakmus merah telah berubah menjadi biru, itu berarti cairan ketuban (basa).
2. Pemeriksaan mikroskopis (pemeriksaan pakis), dengan meneteskan air ketuban ke dalam lensa objektif dan mengeringkannya, pemeriksaan mikroskopis mengungkapkan bentuk daun pakis

b. Pemeriksaan USG

Tes ini bertujuan untuk mengetahui jumlah cairan ketuban di dalam rongga rahim. Untuk PROM ada sedikit cairan ketuban (Manuaba 2009).

6. Penatalaksanaan (Farmakologi dan non farmakologi)

Prinsip dasar penatalaksanaan KPD adalah mencegah kematian dan kesakitan bayi dan ibu yang kemungkinan akan meningkat akibat infeksi dan kelahiran prematur 37 minggu. Sebagian besar pasien (90%) mengalami persalinan spontan dalam 24 jam setelah berkembangnya KPD jangka penuh. Perawatan pasien diserahkan kepada kebijaksanaan mereka sendiri, tetapi perlu untuk mempertimbangkan risiko infeksi rahim ibu. Risiko infeksi intrauterin meningkat dengan KPD berkepanjangan (Sulistiyowati, 2013). Selain itu, usia kehamilan ibu juga harus diperhitungkan. Hal ini terkait dengan pematangan organ janin dan morbiditas dan mortalitas selama persalinan atau penekanan kontraksi uterus. (POGI, 2016)

Penanganan Ketuban Pecah Dini memerlukan pertimbangan usia gestasi, adanya infeksi pada kehamilan ibu dan janin, serta adanya tanda-tanda persalinan (Prawirohardjo, 2016)

- a) Ketuban Pecah Dini dengan kehamilan aterm
 - 1) Pemberian antibiotik profilaksis, 7 hari pemberian 4x500 mg yang dipasang di Amphitheatre
 - 2) Jika ada kecenderungan untuk menggugurkan kandungan, lakukan "pemeriksaan rawat inap"
 - 3) Jika suhu tubuh cenderung naik, amati suhu setiap 3 jam Di atas 37,6 C, segera habis
 - 4) Jika suhu belum naik, amati selama 12 jam. Jika tidak ada tanda-tanda persalinan setelah 12 jam, maka persalinan selesai.
 - 5) Batasi tes internal hanya berdasarkan indikasi gunung
 - 6) Setelah selesai, evaluasi skor panggul (PS):
 - (a) Dalam kasus PS 5, tetesan oksitosin diinduksi.
 - (b) Untuk PS > 5, pematangan serviks dengan g misoprostol diberikan secara oral hingga 4 kali setiap 6 jam.
- b) Ketuban Pecah Dini dengan kehamilan preterm:
 - 1) Pemanganan dirauat di Rumah Sakit
 - (a) Pemberian antibiotik: 7 hari ampicilin 4x500 mg
 - (b) Pemberian kortikosteroid untuk merangsang pematangan paru (UK <35 minggu): Dexamethasone 5 mg setiap 6 jam.
 - (c) Pengamatan di ruang bersalin:
 - (1) perawatan di ruang bersalin setelah istirahat 24 jam
 - (2) pengamatan suhu setiap 3 jam, jika ada kecenderungan naik di atas 37,6 C, segera hentikan
 - (a) Di rwang bersalin :
 - (1) pemeriksaan suhu setiap 6 jam
 - (2) dilakukan uji klinis: laju endap darah dan leukosit (LED) setiap 3 hari
 - (b) Tata cara perawatan konservatif :
 - (1) Lakukan sampai janin masih hidup 21 minggu
 - (2) Selama pengobatan konservatif, pemeriksaan medis tidak dianjurkan. Tindak lanjut selama 1 minggu,

kontrol ultrasound untuk menilai cairan ketuban, jika cairan ketuban cukup, lanjutkan kehamilan, jika kekurangan cairan ketuban (oligohidramnion), pertimbangkan penghentian kehamilan

(3) Dalam pengobatan konservatif, pasien meninggalkan RSUD. Pada hari ke 7 dengan anjuran untuk tidak mengejan, tidak memijat vagina, segera ke rumah sakit jika terjadi kebocoran cairan ketuban.

(4) Jika cairan masih mengalir, pengobatan konservatif dipertimbangkan dengan pemeriksaan uji laboratorium. Dalam kasus leukositosis dan peningkatan ESR, hentikan

c) Terminasi kehamilan

1) Induksi persalinan dengan drip oksitosin

2) Seksio sesaria bila prasyarat drip oksitosin tidak terpenuhi atau bila drip oksitosin gagal

3) Bila skor pelvik jelek, dilakukan pematangan dan induksi persalinan dengan Misoprostol 50 μ gr oral tiap 6 jam, maksimal 4 kali pemberian.

7. Komplikasi

Manurut POGI (2016), kejadian komplikasi KPD dapat dibagi menjadi dua kategori.:

a. Komplikasi ibu

Komplikasi pada ibu yang terjadi biasanya berupa infeksi intrauterin. Infeksi tersebut dapat berupa endomyometritis, maupun korioamnionitis yang berujung pada sepsis

b. Komplikasi janin

Salah satu komplikasi yang paling sering terjadi adalah persalinan lebih awal. Periode laten, yang merupakan masa dari pecahnya selaput amnion sampai persalinan secara umum bersifat proporsional secara terbalik dengan usia gestasi pada saat KPD terjadi. Bila KPD terjadi

sangat cepat, neonatus yang lahir hidup dapat mengalami sekuele seperti malpresentasi, kompresi tali pusat, oligohidramnion, necrotizing enterocolitis, gangguan neurologi, perdarahan intraventrikel, dan sindrom distress pernapasan

Menurut (Negara, et al. 2017), komplikasi dari KPD akan mempengaruhi morbiditas dan mortalitas neonatus serta berdampak pada ibu itu sendiri, termasuk :

a) Persaliman prenature

Setelah ketuban pecah, persalinan biasanya segera berlanjut. Akhirnya, 90% kehamilan terjahi 24 jam setelah ketuban pecuh. Pada usia kehamilan 28-34 minggu, 50% kelahiran terjadi dalam 24 jam. Kelahiran normal dalam waktu 1 minggu selama 26 minggu kehamilan atau lebih..

b) Inpeksi

Risiko inpeksi pada ibu & bayi meningkat dengan ketuban pecah dini. Korioamnionitis dapat terjadi pada ibu. Pada neonatus, sepsis, pneumonia, nasofaringitis dapat terjadi

c) Hepoksia & aspiksia

Ketika selaput ketuban pecah, plasenta berkembang, dan bagian dari janin dapat menempel pada janin dan mati lemas serta meremas tali pusat karena kekurangan oksigen..

d) Sindrom malformasi janin

Keterlambatan pertumbuhan janin akibat ketuban pecah dini

B. Konsep Keperawatan

1. Pengkajian

Dokumentasi pengkajian adalah catatan hasil pengkajian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari pasien, menetapkan data dasar pasien, dan mendokumentasikan respons kesehatan pasien.

a) Identifikasi pasien atau data biografi

Meliputi nama, umur, agama, jenis kelamin, alamat, etnis, status pernikahan, pekerjaan, pendidikan, tanggal masuk, nomor registrasi,

diagnosis keperawatan.

b) Keluham Utama

Pada pasien dengan indikasi operasi SC, pasien sering mengeluh nyeri

c) Riwayat penyakit

1) Riwayat penyakit

Penyakit kronis atau infeksi & gangguan seperti penyakit jantung, peningkatan tekanan darah, diabetes, TBC, hepatitis, penyakit kelamin, penyakit menular seksual, aborsi, riwayat SC.

2) Riwayat saat ini

Riwayat prenatal, kebocoran vagina spontan, berat janin > 3,5 kg, retensi cairan janin, partus lama, persalinan prematur atau tidak ada tanda transisi Ya.

3) Riwayat Kesehatan Keluarga

Apakah ada penyakit keturunan dalam keluarga seperti penyakit jantung, DM, HT, TBC, penyakit menular seksual, penyakit kelamin, aborsi, yang dapat ditularkan kepada pasien.

4) Riwayat psikososial

Riwayat pasien nifas sering kali menyangkut cara merawat bayi, penambahan berat badan dan harga diri yang rendah.

d) Pola-pola fungsi kesehatan

1) Pola persepsi dan gaya hidup sehat

Karena kurangnya pengetahuan pasien, dan cara pencegahan, penanganan, dan perawatan serta kurangnya menjaga kebersihan tubuhnya akan menimbulkan masalah dalam perawatan dirinya

2) Pola nutrisi dan metabolisme

Pada pasien nifas biasanya terjadi peningkatan nafsu makan karena dari keinginan untuk menyusui bayinya.

3) Pola aktivitas

Pada pasien pos partum pasien dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, terbatas pada aktifitas ringan, tidak membutuhkan tenaga banyak, cepat lelah, pada pasien nifas didapatkan keterbatasan

aktivitas karena mengalami kelemahan dan nyeri.

4) Pola eliminasi

Pada pasien pos partum sering terjadi adanya perasaan sering/susah kencing selama masa nifas yang ditimbulkan karena terjadinya odema dari trigono, yang menimbulkan inveksi dari uretra sehingga sering terjadi konstipasi karena penderita takut untuk melakukan BAB.

5) Pola istirahat & tidur

Pada pasien nifas terjadi perubahan pada pola istirahat dan tidur karena adanya kehadiran sang bayi dan nyeri epis setelah persalinan

6) Pola peran & hubungan

Peran pasien dalam keluarga meliputi hubungan pasien dengan keluarga dan orang lain.

7) Pola koping stres

Biasanya pasien sering melamun dan merasa cemas

8) Pola sensorik dan kognitif

Pola sensori pasien merasakan nyeri pada prineum akibat luka janhitan dan nyeri perut akibat involusi uteri, pada pola kognitif pasien nifas primipara terjadi kurangnya pengetahuan merawat bayinya

9) Pola persepsi dan konsep diri

Biasanya terjadi kecemasan terhadap keadaan kehamilannya, lebih-lebih menjelang persalinan dampak psikologis pasien terjadi perubahan konsep diri antara lain dan body image dan ideal diri

10) Pola sosial dan reproduksi

Terjadi disfungsi seksual yaitu perubahan dalam hubungan seksual atau fungsi dari seksual yang tidak adekuat karena adanya proses persalinan dan nifas

11) Pola nilai dan keyakinan

Biasanya pada saat menjelang persalinan dan sesudah persalinan

pasien akan terganggu dalam hal ibadahnya karena harus bedres total setelah partus sehingga aktifitas pasien dibantu oleh keluarganya.

e) Pemeriksaan fisik

1) Kepala

Bagaimana bentuk kepala, bagaimana kepala dibersihkan, kadang ada gumpalan darah, dan jika ada benjolan

2) Leher

Kadang pembesaran tiroid, karena penerangan yang kurang

3) Mata

Kadang ada bengkak kelopak mata, konjungtiva, kadang ada kelopak mata pucat (anemia) karena pendarahan saat melahirkan, sklera kuning

4) Telinga

Biasanya gambaran bentuk telinga simetris atau tidak, bagaimana. Oke, apakah ada cairan yang keluar dari telinga?

5) Hidung

Dengan atau tanpa polip dan jika kembaran postpartum bernafas di cuping hidung

6) Payudara

Dengan pembesaran kelenjar susu, dengan hiperpigmentasi areola dan papila

7) Perut

Pada pasien postpartum, terkadang perut yang kendor masih memiliki garis-garis yang menyakitkan. Lintasan 3 jari dibawa ke tengah.

Genitalia

f) Ekskresi berdarah disertai lendir, keluarnya cairan amnion, bila terjadi ekskresi meconium berarti feses yang dibentuk oleh bayi dalam kandungan menunjukkan kelainan

8) Anus

Kadang-kadang pada pasien nifas ulserasi pada anus karena pecah

9) Ekstrim

Periksa edema untuk kelainan yang disebabkan oleh pembesaran rahim, preeklamsia, atau penyakit jantung atau ginjal.

10) Muskuloskeletal

Pada pasien postpartum, gerakan sering terbatas karena episiotomi

f) Tanda-tanda vital

Selama perdarahan postpartum, tekanan darah menurun, takikardia, takipnea, suhu tubuh turun.

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosa 1: Nyeri akut

a. Definisi

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan.

b. Penyebab

- 1) Agen pencedera fisiologis (mis. inflamasi, iskemia, neoplasma)
- 2) Agen pencedera kimiawi (mis. terbakar, bahan kimia iritan)
- 3) Agen pencedera fisik (mis. abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan)

c. Gejala dan tanda mayor

Subjektif :

- 1) Mengeluh nyeri

Objektif :

- 1) Tampak meringis
- 2) Bersifat protektif (mis. waspada, posisi menghindari nyeri)
- 3) Gelisah
- 4) Frekuensi nadi meningkat
- 5) Sulit tidur

- d. Gejala dan tanda minor
- Objektif :
- 1) Tekanan darah meningkat
 - 2) Pola napas berubah
 - 3) Nafsu makan berubah
 - 4) Proses berpikir terganggu
 - 5) Menarik diri
 - 6) Berfokus pada diri sendiri
 - 7) Diaforesis

- e. Kondisi klinis terkait
- 1) Kondisi pembedahan
 - 2) Cedera traumatis
 - 3) Infeksi
 - 4) Sindrom koroner akut
 - 5) Glaukoma

Diagnosa 2 : Risiko syok

- a. Definisi
- Beresiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh, yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa
- b. Faktor risiko
- 1) Hipoksemia
 - 2) Hipoksia
 - 3) Hipotensi
 - 4) Kekurangan volume cairan
 - 5) Sepsis
 - 6) Sindrom respons inflamasi sistemik (systemic inflammatory response syndrome [SIRS])
- c. Kondisi klinis terkait
- 1) Pendarahan
 - 2) Trauma multipel
 - 3) Pneumothoraks

- 4) Infark miokard
- 5) Kardiomiopati
- 6) Cedera medula spinalis
- 7) Anafilaksis
- 8) Sepsis
- 9) Koagulasi intravaskuler diseminata
- 10) Sindrom respons inflamasi sistemik (systemic inflammatory response syndrome [SIRS])

Diagnosa 3 : Risiko infeksi

a. Definisi

Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik

b. Faktor risiko

- 1) Penyakit kronis (mis. diabetes mellitus)
- 2) Efek prosedur invasif
- 3) Malnutrisi
- 4) Peningkatan paparan organisme pathogen lingkungan
- 5) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer
 - a) Gangguan peristaltik
 - b) Kerusakan integritas kulit
 - c) Perubahan sekresi PH
 - d) Penurunan kerja siliaris
 - e) Ketuban pecah lama
 - f) Ketuban pecah sebelum waktunya
 - g) Merokok
 - h) Statis cairan tubuh
- 6) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder
 - a) Penurunan hemoglobin
 - b) Imunosupresi
 - c) Leukopenia
 - d) Supresi respon inflamasi
 - e) Vaksinasi tidak adekuat

- c. Kondisi klinis terkait
 - 1) AIDS
 - 2) Luka bakar
 - 3) Penyakit paru obstruktif kronis
 - 4) Diabetes mellitus
 - 5) Tindakan invasif
 - 6) Kondisi penggunaan terapi steroid
 - 7) Penyalahgunaan obat
 - 8) Ketuban Pecah Sebelum Waktunya

Diagnosa 4 : Defisit perawatan diri

- a. Defenisi
 - Tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri
- b. Penyebab
 - 1) Gangguan muskuloskeletal
 - 2) Gangguan neuromuskuler
 - 3) Kelemahan
 - 4) Gangguan psikologis dan/atau psikotik
 - 5) Penurunan motivasi/minat
- c. Gejala dan tanda mayor
 - Subjektif
 - (tidak tersedia)
 - Objektif
 - 1) Tidak mampu mandi/ mengenakan pakaian/ makan/ke toilet/ berhias secara mandiri
 - 2) Minat melakukan perawatan diri kurang
- d. Gejala dan tanda minor
 - Subjektif
 - (tidak tersedia)
 - Objektif
 - (tidak tersedia)
- e. Kondisi klinis terkait

- 1) Stroke
- 2) Cedera medula spinalis
- 3) Depresi
- 4) Arthritis reumatoid
- 5) Delirium
- 6) Demensia
- 7) Gangguan amnestik
- 8) Skizofrenia dan gangguan psikotik lain
- 9) Fungsi penilaian terganggu

f. Keterangan

Diagnosis ini dispesifikkan menjadi salah satu atau lebih dari :

- 1) Mandi
- 2) Berpakaian
- 3) Makan
- 4) *Toileting*
- 5) Berhias

Diagnosa 5 : Ansietas

a. Defenisi

Kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman.

b. Penyebab

- 1) Krisis situasional
- 2) Kebutuhan tidak terpenuhi
- 3) Krisis maturasional
- 4) Ancaman terhadap konsep diri
- 5) Ancaman terhadap kematian
- 6) Kekhawatiran mengalami kegagalan
- 7) Disfungsi system keluarga
- 8) Hubungan orang tua – anak tidak memuaskan
- 9) Faktor keturunan (tempramen mudah teragitasi sejak lahir)

- 10) Penyalahgunaan zat
- 11) Terpapar bahaya lingkungan (mis.toksin,polutad, dn lain-lain)
- 12) Kurang terpapar informasi
- c. Gejala dan tanda mayor
 - Subjektif
 - 1) Merasa bimbang
 - 2) Merasa khawatir dengan akibat dari situasi yang sedang dihadapi
 - 3) Sulit berkonsentrasi
 - Objektif
 - 1) Tampak gelisah
 - 2) Tampak tagang
 - 3) Sulit tidur
- d. Gejala dan tanda minor
 - Subjektif
 - 1) Mengeluh pusing
 - 2) Anoreksia
 - 3) Palpitasi
 - 4) Merasa tidak berdaya
 - Objektif
 - 1) Frekuensi nafas meningkat
 - 2) Frekuensi nadi meningkat
 - 3) Tekanan darah meningkat
 - 4) Diaphoresis
 - 5) Tremor
 - 6) Muka tampak pucat
 - 7) Suara bergetar
 - 8) Kontak mata buruk
 - 9) Sering berkemih
 - 10) Berorientasi pada masa lalu
- e. Kondisi klinis terkait
 - 1) Penyakit kronis progresif (mis.kanker, penyakit autoimun)

- 2) Penyakit akut
 - 3) Hospitalisasi
 - 4) Rencana operasi
 - 5) Kondisi diagnosis penyakit belum jelas
 - 6) Penyakit neurologis
 - 7) Tahap tumbuh kembang
3. Perencanaan Keperawatan

Diagnosa 1: Nyeri akut

Manajemen Nyeri

a. Tujuan dan kriteria hasil

Tujuan: Mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik dan emosional yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dalam interaksi ringan dan berat dengan onset yang tiba-tiba atau lambat. Serius dan konstan berdasarkan dengan kriteria hasil:

- 1) Keluhan nyeri menurun
- 2) Meringis dapat menurun
- 3) Gelisah dapat menurun dari
- 4) Sikap protektif dapat menurun

b. Intervensi keperawatan dan rasional

1) Observasi

- a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri

Rasional : Mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri pasien

- b) Identifikasi skala nyeri

Rasional : Mengetahui tingkat nyeri pasien

- c) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memperberat dan menghilangkan nyeri

Rasional : Mengetahui bahwa nyeri dapat diperberat atau dihilangkan oleh pasien

- d) Nyeri adalah kualitas hidup Mengidentifikasi efek pada

Rasional: Mengetahui bagaimana nyeri mempengaruhi kualitas hidup pasien

2) *Terapeutik*

- a) Tawarkan metode non-farmakologis untuk mengurangi nyeri (misalnya terapi pijat, hipnosis kompresi dingin hangat, bantuan pernapasan dalam)

Rasional: Mengurangi tingkat nyeri pada pasien/membiaskan pasien dari penderitaan

- b) Mengontrol kemungkinan keadaan

Rasional : Mempengaruhi Nyeri: Memperberat nyeri/mengurangi faktor risiko yang dapat menyebabkan nyeri

- c) Meningkatkan istirahat dan tidur

Rasional : Mengabaikan dan memuaskan kebutuhan pasien akan istirahat

3) *Edukasi*

- a) Jelaskan penyebab, durasi, dan faktor pemicu nyeri.

Rasional : Memberikan informasi berhubungan dengan nyeri yang dirasakan pasien.

- b) Tolong jelaskan strategi untuk mengatasi rasa sakit itu.

Rasional : Bantu pasien mengatasi saat nyeri terjadi.

- c) Anjurkan untuk memonitor nyeri. Mandiri

Rasional : Saat nyeri terjadi, pasien mampu mengetahui karakteristik, penyebab, dan lokasinya

- d) Ajarkan teknik non farmakologi untuk meredakan nyeri.

Rasional : Memungkinkan pasien untuk dengan mudah menyesuaikan nyeri dengan cara yang mudah.

4) *Kolaborasi*

- a) Pemberian bersama analgetik sesuai kebutuhan

Rasional : Meredakan/menghilangkan nyeri yang dirasakan pasien

Diagnosa 2: Risiko syok

Pencegahan syok

a. Tujuan dan kriteria hasil

Setelah dilakukan tindakan keperawatan seselama....x24 jam integritas kerusakan kulit dapat diatasi dengan Kriteria Hasil

- 1) Tidak terjadi penurunan tekanan nadi perifer
- 2) Waktu pengisian kapiler kurang dari 3 detik
- 3) Nadi tidak lemah
- 4) Klien tidak mengalami akral dingin, lembab/basah
- 5) Klien tidak tampak pucat
- 6) Klien tidak mengalami penurunan kesadaran

b. Intervensi keperawatan

1) Observasi

- a) Pemantauan status kardiopulmoner (denyut dan kekuatan nadi, laju pernapasan, BP, MAP)
- b) Pemantauan status oksigen (pengukuran oksigen nadi, AGD)
- c) Pemantauan status cairan tubuh (input dan output, ketegangan kulit, CRT))
- d) Pemantauan kesadaran dan reaksi pupil
- e) Konfirmasi riwayat alergi

2) Terapeutik

- a) Pemberian oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen > 94% b)
- b) Mengatur intubasi dan ventilasi sesuai kebutuhan c)
- c) Memasang jalur IV sesuai kebutuhan d) memasukkan kateter uretra ke luar jika perlu
- d) Untuk menilai jumlah urin
- e) Dilakukan tes kulit untuk mencegah reaksi alergi

3) Edukasi

- a) Mendeskripsikan penyebab/faktor risiko Syok
- b) Mendeskripsikan tanda dan gejala awal Syok

- c) Anjurkan untuk melaporkan tanda dan gejala awal syok, jika ditemukan / dirasakan
 - d) Anjurkan untuk meningkatkan asupan cairan oral
 - e) Anjurkan untuk menghindari alergen
- 4) *Kolaborasi*
- a) Kerjasama dalam pemberian IV sesuai kebutuhan
 - b) Kerjasama dalam pemberian transfusi darah sesuai kebutuhan
 - c) Kerjasama dalam pemberian obat anti inflamasi sesuai kebutuhan

Diagnosa 3: Risiko infeksi

Pencegahan infeksi

a. Tujuan dan kriteria hasil

Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil:

- 1) Demam menurun
- 2) Nyeri menurun
- 3) Kadar sel darah putih membaik

b. Intervensi keperawatan

1) Observasi

- a) Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik

Rasional: Mengetahui tanda dan gejala infeksi yang dapat terjadi

2) Terapeutik

- a) Batasi jumlah pengunjung

Rasional: mencegah kontaminasi mikroorganisme dari orang lain

- b) Berikan perawatan kulit pada area edema

Rasional: menjaga kulit tetap bersih

- c) Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien

Rasional: mencegah kontaminasi mikroorganisme antara pasien dan perawat

- d) Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi

Rasional: Pasien berisiko tinggi dapat dengan mudah terinfeksi dengan mempertahankan teknik aseptik dapat mengurangi/mencegah resiko infeksi

3) *Edukasi*

- a) Jelaskan tanda dan gejala infeksi
- b) Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar
- c) Ajarkan etika batuk
- d) Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi
- e) Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi
- f) Anjurkan meningkatkan asupan cairan

Rasional: memberikan informasi kepada pasien mengenai penyakitnya dan cara pencegahan sederhana secara mandiri

4) *Kolaborasi*

- a) Kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu

Rasional: Meningkatkan kekebalan imun pasien

Diagnosa 5: Defisit perawatan diri

Dukungan perawatan diri

a. Tujuan dan Kriteria Hasil

Pasien mampu membersihkan diri dengan/tanpa bantuan

Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama x 24 jam, pasien mampu mempertahankan kebersihan diri dan kerapian dengan kriteria hasil :

- 1) Mempertahankan kerapian diri meningkat

b. Intervensi Keperawatan dan rasional

1) Observasi

- a) Identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia

Rasional : Mengetahui keterbatasan dan kebiasaan pasien dalam perawatan diri

- b) Monitor tingkat kemandirian

Rasional : Mengetahui tingkat kemandirian pasien dalam melakukan perawatan diri

2) *Terapeutik*

- a) Sediakan lingkungan yang terapeutik (mis, suasana hangat, rileks, privasi)

Rasional : Agar pasien merasa nyaman

- b) Dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri

Rasional : Membantu pasien dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri

- c) Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan mandiri

Rasional : Membantu pasien dalam melakukan perawatan diri

3) *Edukasi*

- a) Anjurkan melakukan perawatan mandiri secara konsisten sesuai kemampuan

- b) Rasional : Membiasakan pasien melakukan perawatan diri

Diagnosa 5: Ansietas

Terapi Relaksasi

a. Tujuan dan Kriteria Hasil

Tujuan :Menggunakan teknik peregangan untuk mengurangi tanda dan gejala ketidak nyamanan seperti nyeri, ketegangan otot dan kecemasan

Kriteria Hasil: Kondisi emosi dan pengalaman subjektif terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman dapat menurun dengan kriteria hasil:

- 2) Perilaku gelisah menurun
3) Konsentrasi membaik

b. Intervensi Keperawatan dan rasional

1) Observasi

- a) Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi dan gejala lain

Rasional : mengetahui kemampuan pasien sebelum melakukan teknik relaksasi

- b) Identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan

Rasional : mengetahui tindakan yang tepat untuk dilakukan

- c) Periklas ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan

- d) Rasional : mengetahui adanya perubahan setelah tindakan diberikan

- e) Monitor respon terhadap terapi relaksasi

Rasional : mengevaluasi perasaan pasien setelah tindakan dilakukan

2) Terapeutik

- a) Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan yang nyaman

Rasional : memberikan rasa nyaman kepada pasien

- b) Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama

Rasional : agar pasien merasa rileks

3) Edukasi

- a) Jelaskan tujuan, manfaat, dan jenis relaksasi yang akan dilakukan

Rasional : memberikan informasi yang jelas terkait tindakan yang akan dilakukan

- b) Anjurkan mengambil posisi yang nyaman

Rasional : memudahkan pasien selama melakukan teknik relaksasi

- c) Anjurkan sering mengulangi atau melatih diri

Rasional : agar pasien dapat secara mandiri melakukan teknik relaksasi

d) Demostrasikan dan latih teknik relaksasi

Rasional : memberikan /menggambarkan secara jelas kepada pasien teknik yang diberikan

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien memecahkan masalah kesehatan menghadapi kondisi kesehatan yang baik yang menggambarkan standar hasil yang diharapkan. Intervensi keperawatan terkait dengan dukungan dan pengobatan yang diberikan kepada klien, serta tindakan untuk memperbaiki kondisi dan pendidikan klien dan keluarga, atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah masalah kesehatan di masa yang akan datang. Proses implementasi harus difokuskan pada kebutuhan klien dan faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan keperawatan, strategi implementasi keperawatan, dan aktivitas komunikasi. Pemberian asuhan adalah mengkoordinasikan kegiatan pasien, anggota keluarga dan anggota tim kesehatan lainnya untuk memantau dan mencatat respon pasien terhadap tindakan asuhan yang dilakukan (Nettina, 2002)

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap akhir, yang bertujuan untuk menilai apakah tindakan asuhan yang dilaksanakan telah tercapai atau belum menyelesaikan masalah. (Merissa, 2013). Selama fase evaluasi, perawat dapat mengetahui sejauh mana diagnosis, rencana tindakan, dan asuhan telah dilaksanakan. Meskipun tahap evaluasi berada di akhir proses keperawatan, ini merupakan bagian integral dari semua tahap perawatan. proses. Pengumpulan data harus ditinjau untuk menentukan kesesuaian data yang dikumpulkan dan kesesuaian perilaku yang diamati. Keakuratan dan kelengkapan diagnosis juga harus dinilai. Fase intervensi juga harus dievaluasi untuk menentukan apakah tujuan intervensi dapat dicapai secara efektif. (Nursalam, 2008)

C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan

Metode teori kenyamanan yang dikembangkan oleh Kolcaba (2003) menempatkan kenyamanan sebagai yang terdepan dalam proses perhatian. Kolcaba berpendapat bahwa kenyamanan umum merupakan kenyamanan yang menyeluruh, meliputi kenyamanan fisik, psikologis, spiritual, lingkungan & psikologis sosial. Kenyamanan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu lega mengacu pada kebutuhan kenyamanan khusus pasien; kemudahan mengacu pada menyingkirkan ketidaknyamanan atau meningkatkan kenyamanan; transendensi mengacu pada mampu bertahan atau beradaptasi dengan ketidaknyamanan. (Ilmiasih, dkk, 2010).

Menurut (Kolcaba, Tilton & Drouin, 2006), bantuan didefinisikan sebagai keadaan pengurangan ketidaknyamanan atau memenuhi kebutuhan tertentu. Kemudahan diartikan sebagai keadaan tenang atau kepuasan. Transendensi adalah tahap di mana seseorang dapat beradaptasi dengan masalah. Kenyamanan fisik atau physical comfort meliputi kebutuhan pasien akan status hemodinamik, kenyamanan manajemen nyeri, dan nyeri serta penyakit fisik lainnya (aktual atau potensial). Kenyamanan psikologis atau psikologis meliputi kebutuhan rohaniwan, kecemasan, ketakutan, doa dengan perawat atau orang lain, persepsi penyakit, persepsi hidup & pengalaman hidup. Kenyamanan sosial budaya/social budaya meliputi keuangan, rutinitas rumah sakit, pendidikan kesehatan/kebutuhan informasi kesehatan, kunjungan teman/anggota keluarga, hubungan dengan orang lain, dukungan/kekuatan, dan ketersediaan perawatan berkelanjutan oleh staf di rumah. Kenyamanan lingkungan meliputi privasi, bau, kebisingan, pencahayaan, tempat tidur yang nyaman, dekorasi ruangan, dll (Wirastri, 2010)

Keterkaitan antara teori *comfort* dengan kasus yang diteliti oleh penulis yaitu pasien ibu hamil untuk meningkatkan rasa nyaman kepada pasien dengan diberikan murattal al-qur'an dan massage untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien

D. Evidence Based Nursing

1. Pengertian

Massage/Pijat merupakan aplikasi tekanan pada jaringan lunak tubuh, seperti kulit, otot, tendon dan ligament. Pijat merupakan salah satu cara untuk memunculkan *wellness for body and mind* (Fadilah. 2015).

2. Tujuan

- a. Melancarkan sirkulasi darah
- b. Menurunkan respon nyeri punggung
- c. Menurunkan ketegangan otot

3. Indikasi

Klien dengan gangguan rasa nyaman nyeri punggung pada ibu hamil

4. Kontraindikasi

- a. Nyeri pada daerah yang akan di masase
- b. Luka pada daerah yang akan di masase
- c. Gangguan atau penyakit kulit
- d. Jangan melakukan pemijatan langsung pada daerah tumor
- e. Jangan melakukan masase pada daerah yang mengalami ekimosis atau lebam
- f. Hindari melakukan masase pada daerah yang mengalami inflamasi
- g. Jangan melakukan masase pada daerah yang mengalami tromboflebitis
- h. Hati-hati saat melakukan masase pada daerah yang mengalami gangguan sensasi seperti penurunan sensasi maupun hiperanastesia

5. Prosedur pemberian dan rasionalisasi

No	Prosedur	Rasional
1.	Berikan salam, perkenalkan diri anda	Mengaplikasikan perilaku islami dan membina saling percaya dengan komunikasi terapeutik
2.	Identifikasi klien dengan memeriksa identitas dengan cermat	Memastikan kembali identitas pasien
3.	Jelaskan tentang prosedur yang akan dilakukan, berikan kesempatan kepada	Memberi informasi kepada klien tindakan yang akan diberikan

	klien untuk bertanya dan jawab seluruh pertanyaan klien	
4.	Atur ventilasi dan sirkulasi udara yang baik	Agar klien merasa nyaman dan rileks
5.	Beri tahu klien bahwa tindakan akan segera dimulai	Memberi waktu bagi klien untuk mempersiapkan diri
6.	Periksa TTV	Mengetahui kondisi klien
7.	Posisikan pasien miring ke kiri untuk mencegah terjadinya hipoksia janin	Posisi miring kiri dapat membantu untuk mencegah terjadinya tekanan pada perut ibu yang bisa menyebabkan hipoksia janin
8.	Jika pasien masih bisa untuk duduk berikan posisi berlutut kemudian berbaring dibantal yang besar senyaman mungkin	Memberi posisi yang nyaman sesuai dengan keinginan klien agar klien tidak merasa tertekan dan tetap rileks
9.	Instruksikan pasien untuk menarik nafas dalam melalui hidung dan mengeluarkan lewat mulut secara perlahan sampai pasien merasa rileks	Nafas dalam dapat membantu untuk mempertahankan kenyamanan klien agar tetap rileks dan dapat mengurangi nyeri
10.	Tuangkan baby oil pada telapak tangan kemudian gosokkan kedua tangan hingga hangat	Baby oil merupakan lubrikan yang baik untuk masase
11.	Letakkan kedua tangan pada punggung pasien, mulai dengan gerakan mengusap dan bergerak dari bagian panggul menuju sacrum	Gerakan mengusap membantu dapat merangsang pelepasan endorphen untuk mengurangi rasa nyeri dan memberi kenyamanan pada klien
12.	Buat gerakan melingkar kecil dengan menggunakan ibu jari menuruni area tulang belakang, gerakkan secara perlahan berikan penekanan arahkan penekanan kebawah sehingga tidak mendorong pasien kedepan	Gerakan sirkuler secara perlahan dengan pada satu titik yang dirasa pasien terasa nyeri mampu memblok impuls nyeri agar nyerinya dapat berkurang dan gerakan perlahan agar tidak terjadi tekanan yang berlebih pada punggung ibu yang dapat menambah rasa nyeri
13.	Usap bagian lumbar atau punggung	Usapan pada daerah punggung

	bawah dari arah kepala ke tulang ekor, untuk mencegah terjadinya lordosis lumbal	memberikan relaksasi pada klien dan mencegah terjadinya lordosis pada daerah lumbal
14.	Bersihkan minyak atau lotion pada punggung klien	Memelihara kebersihan
15.	Rapikan klien ke posisi semula	Mempertahankan kenyamanan klien
16.	Beritahu bahwa tindakan telah selesai	Menginformasikan kepada klien bahwa tindakan telah usai
17.	Bereskan peralatan yang telah di gunakan	Memelihara kebersihan lingkungan yang terapeutik
18.	Cuci tangan	Membunuh organisme

6. Kriteria evaluasi

- a. Evaluasi keadaan umum klien
- b. Evaluasi respon klien selama tindakan

E. Evidence Based Nursing

1. Definisi

Murottal adalah rekaman suara Al-qur'an yang dinyanyikan oleh Qori' (pembaca Al-qur'an). Secara fisik, lantunan Al-qur'an adalah unsur suara manusia dan alat musiknya suara manusia merupakan pengobatan yang luar biasa dan alat yang mudah di akses (Puji, 2018)

2. Tujuan

Tujuan pengobatan murottal adalah untuk mengurangi hormon stres, mengaktifkan endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks dan mengalihkan perhatian dari ketakutan, kecemasan dan ketegangan, meningkatkan sistem kimia tubuh untuk menurunkan tekanan darah dan memperlambat pernapasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak

3. Indikasi

Terapi murottal diberikan kepada klien yang mengalami kecemasan, nyeri, kesedihan, dan digunakan untuk berbagai macam penyakit serta meningkatkan ketenangan jiwa (Hidayah, dkk, 2013)

4. Kontraindikasi

Terapi murottal ini tidak dapat digunakan bagi klien yang mengalami gangguan pendengaran (Mayrani, 2013)

5. Prosedur pemberian dan rasionalisasi

No	Prosedur	Rasional
1.	Mengucapkan salam terapeutik	Mengaplikasikan perilaku islami dan membina saling percaya dengan komunikasi terapeutik
2.	Menanyakan perasaan pasien hari ini	Mengetahui keadaan klien
3.	Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilaksanakan kepada responden	Memberi informasi kepada klien tindakan yang akan diberikan
4.	Beri kesempatan pada pasien untuk	Agar klien mengetahui informasi

	bertanya sebelum kegiatan dimulai	yang ingin klien ketahui
5.	Pertahankan privasi pasien selama tindakan dilakukan	Agar klien merasa nyaman
6.	Memposisikan pasien senyaman mungkin	Agar klien merasa tetap nyaman
7.	Ukur tingkat nyeri responden	Mengetahui kondisi klien
8.	Responden diminta dalam proses terapi berbaring dengan tenang dan tidak berbicara	Memberi posisi yang nyaman agar klien tetap rileks
9.	Pastikan responden dalam posisi nyaman dan rileks	Mempertahankan kenyamanan klien
10.	Menghubungkan earphone dengan handphone yang berisikan murottal al-qur'an	Agar memudahkan dalam mendengarkan murottal
11.	Pasang earphone/headset di telinga kiri dan kanan responden	Memudahkan dalam mendengarkan murottal
12.	Dengarkan murottal selama 15 menit	Membantu merilekskan klien
13.	Setelah 15 menit mendengarkan murottal al-qur'an, lepaskan earphone/headset	
14.	Tingkat nyeri responden di ukur kembali setelah diberikan terapi murottal	Mengetahui keadaan klien setelah diberikan tindakan

6. Kriteria evaluasi

- a. Evaluasi keadaan umum klien
- b. Evaluasi respon klien selama tindakan

BAB III
LAPORAN KASUS

A. DATA UMUM KLIEN

1. Inisial Klien : Ny. M
2. Usia : 37 Tahun
3. Status perkawinan : Menikah
4. Pekerjaan : IRT
5. Pendidikan : SMA
6. Alamat : Jl. Cendrawasih

Riwayat Kehamilan dan Persalinan yang lalu

No	Tahun	Jenis persalinan	Penolong	Jenis Kelamin	Keadaan Bayi waktu lahir	Masalah kehamilan
1	2000	Normal	Bidan	Perempuan	Sehat	Tidak ada
2	2005	Normal	Bidan	Laki-laki	Sehat	Tidak ada
3	2010	Normal	Bidan	Perempuan	Sehat	Tidak ada

Pengalaman menyusui : Ada Berapa lama : 2 tahun

Riwayat Ginekologi

1. Masalah ginekologi : Tidak ada
2. Riwayat KB : Memakai KB susuk ±5 tahun

Riwayat Kehamilan saat ini

HPHT : 07 November 2020

Taksiran partus : 21 Juli 2021

BB sebelum hamil : 55kg

TD sebelum hamil : 100/60 mmHg

TD	BB/ TB	TFU	Letak/presentasi janin	DJJ	Usia Gestasi	Keluhan	Data lain
100/60 mmHg	55 kg / 160 cm	26cm	LI : Bokong LII : PUKA LIII : Kepala LIV : Konvergen	120x/m	21minggu, 1 hari	Nyeri perut bawah tembus ke belakang	Lingkar perut : 84cm

B. DATA UMUM KESEHATAN SAAT INI

1. Status obstetrik : G4P3A0 H: 21 Minggu, 1 hari
2. Keluhan utama : Nyeri perut
3. Riwayat keluhan utama :
 - P : Klien mengeluh nyeri perut bagian bawah tembus ke belakang dan dirasa memberat saat bergerak
 - Q : Klien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk
 - R : Klien mengatakan nyeri pada bagian perut bawah
 - S : Klien mengatakan skala nyeri yang dirasakan skala 5 (NRS)
 - T : Klien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul dengan durasi 5 menit
4. Keadaan umum : Klien nampak lemah
5. Kesadaran : Composmentis GCS : 15
BB/TB Kg/cm : 55 kg /157 cm
6. Tanda Vital :
 - Tekanan Darah : 100/60 mmHg
 - Nadi : 80 x/menit
 - Suhu : 36,4 °C
 - Pernapasan : 20 x/menit
7. Pemeriksaan Fisik
 - a. Kepala Leher
 - Kepala: Tampak bersih, tidak ada lesi, tidak ada rambut rontok, tidak ada massa & nyeri tekan.
 - Mata : Simetris kanan dan kiri,. Konjungtiiva anemis. Sklera

putih, refleks cahaya positif kanan dan kiri, reflek pupil isokor di mata kanan dan kiri, edema palpebra negatif.

Hidung : Simetris, tampak bersih , tidak ada pengeluaran sekret, dan pernapasan cuping hidung tidak ada.

Mulut dan Gigi : Keadaan mulut bersih, mukosa bibir lembab, tidak sianosis, & tampak karies gigi.

Telinga : Telinga bersih dan tidak ada nyeri tekan

Leher : Tidak teraba pembesaran kelenjar tiroid dan getah bening.

Masalah Khusus : tidak ada masalah

b. Dada

Jantung : Iktus kordis tidak nampak, pekak, irama jantung teratur

Paru-paru : Gerakan dinding dada sama, tidak ada tarikan dinding dada saat bernafas, fremitus kanan dan kiri sama, perkusi paru-paru redup & bunyi vesikuler

Payudara : tidak dikaji

Puting susu : tidak dikaji

Pengeluaran ASI : tidak ada

Masalah Khusus : tidak ada masalah

c. Abdomen

Uterus : Ball

TFU : 26 cm

Kontraksi : Ada

Leopold I : Bokong, TFU:26 cm, LP: 84 cm

Leopold II : PUKA,

Leopold III: Kepala

Leopold IV: Konvergen

Linea nigra: Terdapat linea nigra dan ada striae

Masalah Khusus : Tidak ada masalah

d. Perineum dan Genital: Tidak dikaji

e. Ekstremitas

Ekstremitas Atas Edema : tidak . Varises : tidak

Ekstremitas Bawah Edema : tidak. Varises : tidak

Refleks patela : + kiri kanan

Masalah khusus : Tidak ada masalah

f. Eliminasi

Urin : kebiasaan BAK : Klien mengatakan 10 x/hari.

Fekal: kebiasaan BAB : Klien mengatakan 1 x/hari.

Masalah Khusus : Tidak ada masalah

g. Mobilisasi dan latihan

Tingkat mobilisasi : Klien mengatakan beraktivitas seperti biasa

Latihan/senam : Klien mengatakan tidak melakukan senam ataupun latihan lainnya selama hamil

Masallah kusus : Tiidak adia masalah

h. Nutrisii & cairan

Asuipan nutrisi :. Klien mengatakan tidak nafsumakan

Klien mengatakan makan 3-4 sendok makanan

Asupan cairan : Klien mengatakan minumnya baik dengan frekuensi 5-8 gelas/hari

Masalah khusus : Tidak ada masalah

i. Keadaan mental

Adaptasi psikologis : Klien mengatakan merasa cemas dengan kondisinya

Penerimaan terhadap kehamilan : Klien mengatakan merasa cemas dengan kondisinya

Masalah khusus : Tidak ada masalah

8. Pola hidup yang meningkatkan risiko kehamilann : Klien kurang nafsu makan dan kurang tidur, klien tampak merokok, dan pola

aktivitas pekerjaan yang padat dan berat dapat meningkatkan resiko kehamilan pada ibu

9. Persiapan persalinan

Klien mengatakan persiapan yang dilakukan adalah pengetahuan tentang tanda-tanda melahirkan

10. Obat-obatan yang dikonsumsi

Nama Obat
Ceftriaxone
Dexamethasone

11. Hasil pemeriksaan penunjang :

Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
Leukosit (WBC)	8.6	4.0-10.0	10^3 /Ul
LYM	2.6	0.6-3.5	10^3 /uL
MON	0.5	0.1-0.9	10^3 /uL
GRA	5.5	1.3-6.7	10^3 /uL
*LYM	30.7	20.0-40.0	%
*MON	1.34	2.0-8.0	%
*GRA	6.1	50-70	%
Eritrosit (RBC)	3.79	3.50-5.50	10^6 /uL
Hemoglobin (HGB)	12.1	11.0-17.9	g/dl
Hematokrit (HCT)	33.6	40-50	%
MCV	88.7	80.0-96.0	fL
MCH	31.9	23.2-38.7	pg
MCHC	36.0	32.2-38.7	g/dL
RDW-SD	46.3	32-37	fL
RDW-CV	13.2	37.0-54.0	%
Trombosit (PLT)	254	150-400	10^3 /uL
PCT	0.25	0.15-0.50	%
MPV	9.7	6.5-11.0	fL
PDW	11.5	10.0-18.0	fl
P-CLR	22.9	13.0-43.0	%

C. ANALISA DATA

NO	Data	Masalah Keperawatan
1	<p>DS :</p> <p>1. P : Klien mengatakan nyeri pada perut bawah</p> <p>Q : Klien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul</p> <p>R : Klien mengatakan pada perut bagian bawah</p> <p>S : Klien mengatakan skala nyeri 5 (NRS):</p> <p>T : Klien mengatakan nyeri dirasakan 5 menit dengan frekuensi nyeri hilang timbul.</p> <p>DO : TTV:</p> <p>TD : 100/60 mmHg N : 80 x/menit</p> <p>S : 36,4 °C P : 20 x/menit</p>	Nyeri akut
2	<p>DS :</p> <p>1. Klien mengatakan kesulitan tidur selama hamil</p> <p>DO : TTV:</p> <p>TD : 100/60 mmHg N : 80 x/menit</p> <p>S : 36,4 °C P : 20 x/menit</p>	Gangguan pola tidur

D. RENCANA TINDAKAN KEPERAWATAN

No	Diagnosis	Luaran Keperawatan	Intervensi	Rasional
1.	Nyeri akut	Setelah dilakukan tindakan pasca persalinan selama 3 x 24 jam maka tingkat nyeri berkurang dengan Kriteria Hasil : a. Keluhan nyeri menurun b. Meringis menurun	Manajemen nyeri <i>Observasi</i> a. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas nyeri b. Identifikasi skala nyeri c. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri <i>Terapeutik</i> a. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <i>Edukasi</i> a. Menjelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri b. Menjelaskan strategi mengatasi nyeri <i>Kolaborasi</i> a. Kolaborasi pemberian analgetik	Manajemen nyeri <i>Observasi</i> a. Untuk mengetahui tingkat nyeri b. Mengetahui skala/tingkat nyeri c. Meminimalkan gerakan yang memperberat nyeri <i>Terapeutik</i> a. Mengurangi nyeri <i>Edukasi</i> a. Memberikan informasi terkait nyeri b. Untuk memandirikan pasien <i>Kolaborasi</i> a. Untuk mengurangi nyeri
2.	Gangguan Pola tidur	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam Pola tidur membaik dengan kriteria hasil : a. Keluhan sulit tidur membaik b. Keluhan sering terjaga membaik	Dukungan tidur <i>Observasi</i> : a. Identifikasi pola aktivitas dan tidur b. Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik dan/atau psikologis)	<i>Observasi</i> a. Mengkaji dan mengidentifikasi kebiasaan tidur pasien b. Mengkaji dan mengidentifikasi faktor mengganggu pola aktivitas tidur pasien (fisik dan/ atau psikologis)

		<p>c. Keluhan istirahat cukup membaik</p>	<p>c. Identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur (mis. kopi, teh, alkohol, makan mendekati waktu tidur, minum banyak air sebelum tidur)</p> <p><i>Terapeutik :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Modifikasi lingkungan (mis. pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan fempat tidur) Batasi waktu tidur siang, jika perlu Fasilitasi menghilangkan stres sebelum tidur Tetapkan jadwal tidur rutin Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (mis. pijat, pengaturan posisi, terapi akupresur) <p><i>Edukasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit Anjurkan menghindari makanan dan minuman yang dapat membuat pasien terjaga Ajarkan relaksasi otot autogenik atau cara nonfarmakologi lainnya 	<p>c. Mengidentifikasi adanya kandungan makanan atau minuman yang dapat menyebabkan pasien terjaga</p> <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk pasien Agar pasien dapat tidur dengan baik saat malam hari Stress dapat mempengaruhi pola tidur pasien Membiasakan pasien tidur tepat waktu setiap hari Memberikan rasa nyaman agar pasien dapat mengatasi kesulitan tidurnya <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Istirahat yang cukup dapat meningkatkan status emosional Menghindarkan pasien mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat membuat pasien terjaga Membantu pasien mengatasi kesulitan tidurnya
--	--	---	--	--

E. IMPLEMENTASI KEPERAWATAN

No	DX.Keperawatan	Waktu	Implementasi Tindakan Keperawatan
1.	Nyeri akut	<p>Kamis, 8 April 2021</p> <p>(14.38)</p> <p>(14.40)</p> <p>(14.45)</p> <p>(14.50)</p> <p>(15.20)</p> <p>(15.30)</p> <p>(14.55)</p> <p>(15.40)</p> <p>(15.40)</p>	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi:</p> <p>1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri Hasil : Klien mengatakan nyeri perut bagian bawah tembus ke belakang, durasinya 5 menit dengan frekuensi nyeri hilang timbul, intensitas nyeri terasa tertusuk-tusuk</p> <p>2. Identifikasi skala nyeri Hasil : Klien mengatakan skala nyeri 5 NRS</p> <p>3. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Hasil : Klien mengatakan nyeri yang dirasakan saat terlalu banyak bergerak</p> <p>4. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup Hasil : Klien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam) Hasil : Memberikan massage dan murrotal quran selama 15 menit</p> <p>2. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri Hasil : Menganjurkan klien untuk istirahat di tempat tidur</p> <p>Edukasi :</p> <p>1. Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri Hasil : Klien mengerti penjelasan yang diberikan</p> <p>2. Jelaskan strategi mengatasi nyeri Hasil : Klien mengerti penjelasan yang diberikan</p> <p>3. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Hasil : Menganjurkan teknik relaksasi nafas dalam</p>

1.	Gangguan pola tidur	<p>Kamis, April 2021</p> <p>(20.30)</p> <p>(20.35)</p> <p>(20.40)</p> <p>(20.45)</p> <p>(20.30)</p> <p>(20.40)</p> <p>(20.45)</p>	<p>Dukungan tidur</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pola aktivitas dan tidur Hasil : Klien mengatakan sulit tidur selama hamil 2. Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik dan/atau psikologis) Hasil : Klien sulit tidur karena nyeri pada perut bagian bawah <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modifikasi lingkungan (mis. Pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan tempat tidur) Hasil : Klien tampak merasa nyaman 2. Fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur Hasil : Menganjurkan klien mendengarkan murrotal quran 3. Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (mis. Pijat, pengaturan posisi, terapi akupresur) Hasil : Klien diberikan posisi semi fowler <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit Hasil : Klien mengerti penjelasan yang diberikan 2. Anjurkan menghindari makanan dan minuman yang mengganggu waktu tidur Hasil : Klien mengerti anjuran yang diberikan
2.	Nyeri akut	<p>Jumat, 09 April 2021</p> <p>(08.38)</p> <p>(08.45)</p>	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri Hasil : Klien mengatakan nyeri perut bagian bawah tembus ke belakang, durasinya 5 menit dengan frekuensi nyeri hilang timbul, intensitas nyeri terasa tertusuk-tusuk 2. Identifikasi skala nyeri Hasil : Klien mengatakan skala nyeri 5 NRS

		(09.15)	3. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Hasil : Klien mengatakan nyeri yang dirasakan saat terlalu banyak bergerak
		(09.20)	4. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup Hasil : Klien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul
		(11.20)	Terapeutik 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam) Hasil : Memberikan massage dan murrotal quran selama 15 menit
		(13.45)	2. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri Hasil : Menganjurkan klien untuk istirahat di tempat tidur
		(11.03)	Edukasi : 1. Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri Hasil : Klien mengerti penjelasan yang diberikan
		(11.20)	2. Jelaskan strategi mengatasi nyeri Hasil : Klien mengerti penjelasan yang diberikan
		(11.05)	3. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Hasil : Menganjurkan teknik relaksasi nafas dalam
2.	Gangguan pola tidur	Jumat, 09 April 2021	Dukungan tidur
		(09.30)	Observasi: 1. Identifikasi pola aktivitas dan tidur Hasil : Klien mengatakan sulit tidur
		(09.35)	2. Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik dan/atau psikologis) Hasil : Klien sulit tidur karena nyeri pada perut bagian bawah
		(13.40)	Terapeutik 1. Modifikasi lingkungan (mis. Pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan tempat tidur) Hasil : Klien tampak merasa nyaman
		(13.45)	2. Fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur

		(13.30)	<p>Hasil : Menganjurkan klien mendengarkan murrotal quran</p> <p>3. Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (mis. Pijat, pengaturan posisi, terapi akupresur)</p> <p>Hasil : Klien diberikan posisi semi fowler</p>
3	Nyeri akut	<p>Sabtu, 10 April</p> <p>(09.25)</p> <p>(09.45)</p> <p>(09.35)</p> <p>(09.30)</p> <p>(10.10)</p> <p>(11.45)</p> <p>(10.03)</p> <p>(10.10)</p> <p>(10.05)</p>	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi:</p> <p>1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri</p> <p>Hasil : Klien mengatakan nyeri perut bagian bawah tembus ke belakang, durasinya 5 menit dengan frekuensi nyeri hilang timbul, intensitas nyeri terasa tertusuk-tusuk</p> <p>2. Identifikasi skala nyeri</p> <p>Hasil : Klien mengatakan skala nyeri 4 NRS</p> <p>3. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri</p> <p>Hasil : Klien mengatakan nyeri yang dirasakan saat terlalu banyak bergerak</p> <p>4. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup</p> <p>Hasil : Klien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam)</p> <p>Hasil : Memberikan massage dan murrotal quran selama 15 menit</p> <p>2. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri</p> <p>Hasil : Menganjurkan klien untuk istirahat di tempat tidur</p> <p>Edukasi :</p> <p>1. Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri</p> <p>Hasil : Klien mengerti penjelasan yang diberikan</p> <p>2. Jelaskan strategi mengatasi nyeri</p> <p>Hasil : Klien mengerti penjelasan yang diberikan</p> <p>3. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p>

			Hasil : Menganjurkan teknik relaksasi nafas dalam
3	Gangguan pola tidur	Sabtu, 10 April 2021	Dukungan tidur
		(11.30)	Observasi: 1. Identifikasi pola aktivitas dan tidur Hasil : Klien mengatakan sulit tidur
		(11.35)	2. Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik dan/atau psikologis) Hasil : Klien sulit tidur karena nyeri pada perut bagian bawah
		(13.40)	Terapeutik 1. Modifikasi lingkungan (mis. Pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan tempat tidur) Hasil : Klien tampak merasa nyaman
		(13.45)	2. Fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur Hasil : Menganjurkan klien mendengarkan murrotal quran
		(13.30)	3. Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (mis. Pijat, pengaturan posisi, terapi akupresur) Hasil : Klien diberikan posisi semi fowler

F. EVALUASI KEPERAWATAN

Hari /Tgl	Waktu	Evaluasi (SOAP)
1.	Kamis, 08 April 2021 (13. 50)	<p>S: Klien mengatakan masih merasa nyeri tapi sudah sedikit berkurang Klien mengatakan skala nyeri 5 (NRS)</p> <p>O: TTV : TD : 110/80 mmHg N : 80 x/menit P : 20 x/menit S : 36,5 °C</p> <p>A: Masalah belum teratasi. P: Lanjutkan Intervensi Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri 4. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam) 2. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri 2. Jelaskan strategi mengatasi nyeri 3. Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri 4. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri

		<p>Kolaborasi Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.</p>
1.	Kamis, 08 April 2021 (20.45)	<p>S: Klien mengatakan masih sulit tidur O: Klien tampak mengantuk Tampak lingkaran hitam disekitar mata A: Masalah belum teratasi. P: Lanjutkan Intervensi Dukungan tidur Observasi: 1. Identifikasi pola aktivitas dan tidur 2. Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik dan/atau psikologis) Terapeutik 1. Modifikasi lingkungan (mis. Pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan tempat tidur) 2. Fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur 3. Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (mis. Pijat, pengaturan posisi, terapi akupresur) Edukasi : 1. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit 2. Anjurkan menghindari makanan dan minuman yang mengganggu waktu tidur</p>
2.	Jumat, 09 April 2021 (11.21)	<p>S: Klien mengatakan nyeri sedikit berkurang pada perut bagian bawahnya Klien mengatakan skala nyeri 5 (NRS) O: TTV : TD : 110/80 mmHg N : 80 x/menit P : 20 x/menit S : 36,5 °C A: Masalah belum teratasi. P: Pertahankan intervensi</p>

		<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri 4. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam) 2. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri 3. Fasilitasi istirahat dan tidur <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri 2. Jelaskan strategi mengatasi nyeri 3. Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri 4. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p>Kolaborasi</p> <p>Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.</p>
2.	<p>Jumat, 09 April2021 (13.10)</p>	<p>S: Klien mengatakan masih belum bisa tidur pada malam hari</p> <p>O: Klien tampak mengantuk Tampak lingkaran hitam disekitar mata</p> <p>A: Masalah teratasi.</p> <p>P: Pertahankan Intervensi</p> <p>S: Klien mengatakan masih sulit tidur</p> <p>O: Klien tampak bermain hp</p> <p>A: Masalah belum teratasi.</p>

		<p>P: Lanjutkan Intervensi Dukungan tidur</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pola aktivitas dan tidur 2. Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik dan/atau psikologis) <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modifikasi lingkungan (mis. Pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan tempat tidur) 2. Fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur 3. Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (mis. Pijat, pengaturan posisi, terapi akupresur) <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit 2. Anjurkan menghindari makanan dan minuman yang mengganggu waktu tidur
3	Sabtu, 10 April 2021 (12.20)	<p>S: Klien mengatakan nyerinya yang dirasakan sudah lumayan berkurang Klien mengatakan skala nyeri yang dirasakan 4 NRS</p> <p>O: Klien tampak rileks TTV : TD : 100/60 mmHg N : 80 x/menit P : 20 x/menit S : 36,5 °C</p> <p>A: Masalah teratasi. P: Pertahankan Intervensi</p>
3	Sabtu, 10 April 2021 (13.50)	<p>S: Klien mengatakan masih sulit tidur</p> <p>O: Klien tampak mengantuk Tampak lingkaran hitam disekitar mata</p> <p>A: Masalah belum teratasi. P: Lanjutkan Intervensi</p>

		<p>Dukungan tidur</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pola aktivitas dan tidur 2. Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik dan/atau psikologis) <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modifikasi lingkungan (mis. Pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan tempat tidur) 2. Fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur 3. Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (mis. Pijat, pengaturan posisi, terapi akupresur) <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit 2. Anjurkan menghindari makanan dan minuman yang mengganggu waktu tidur
--	--	---

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis kasus

Pada kasus laporan akhir ners ini dilakukan pengkajian pada tanggal 07 April 2021 Pada Ny.M, pasien dirawat di Ruang Baji Gau tanggal 04 April 2017 di RS Labuang Baji Makassar, hasil pengkajian di dapatkan Ny.M berusia 37 tahun dengan HPHT 07 November 2021, BB sebelum hamil yaitu 50 Kg, TFU : 26 cm, Leopold I : Bokong, Leopold II : PUKA, Leopold III : Kepala, Leopold IV : Konvergen. Klien mengeluh Nyeri perut bawah tembus kebelakang. Status riwayat obstetrik pasien yaitu G4P3A0, pasien mengatakan ini kehamilan ke empatnya setelah melahirkan anaknya ketiganya 11 tahun yang lalu.

Hasil pemeriksaan fisik di dapatkan keadaan umum pasien baik, kesadaran composmentis dan kooperatif, BB : 55kg, TB : 157cm, TD : 100/60 mmHg, N : 80x/m, P : 20x/m, S : 36,4 °C, Klien mengeluh nyeri perut bagian bawah tembus ke belakang, skala nyeri yang dirasakan 5 (NRS), durasinya 5 menit dengan frekuensi nyeri hilang timbul.

Secara teori air ketuban biasanya pecah ketika ibu hamil mulai mengalami kontraksi rahim untuk melahirkan bayi. Ketika ketuban pecah, kuman dapat bermigrasi ke dalam kantung ketuban hingga menyebabkan infeksi dalam rahim. Salah satu gejalanya yaitu nyeri di perut bagian bawah (Adrian, 2018)

Pada klien kemungkinan terjadinya ketuban pecah dini disebabkan oleh aktivitas klien yang padat, dimana klien dan suaminya bekerja untuk mengambil kayu diluar kota meskipun dalam keadaan hamil. Klien mengatakan biasa keluar kota selama 3 kali dalam 1 minggu. Selain itu pola hidup klien yang merokok juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan klien. Diagnosa utama yang muncul pada kasus ini adalah Nyeri akut.

Masalah ini ditemukan pada awal pengkajian. Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berhubungan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, yang menyerang secara intensitas tiba-tiba

atau lambat berkisar dari ringan hingga berat. Dimana tanda dan gejala pada pasien yaitu mengeluh nyeri.

Diagnosis kedua yang muncul pada kasus ini adalah gangguan pola tidur. Gangguan pola tidur adalah gangguan kualitas dan kuantitas tidur yang di sebabkan oleh faktor eksternal. Diagnosis ini juga didapatkan setelah dilakukan pengkajian dengan data klien mengatakan kesulitan tidur selama kehamilan

B. Analisis intervensi

Tindakan keperawatan utama yang diberikan pada Nyeri akut yaitu Manajemen nyeri dengan memberikan Murottal Al-Qur'an dan Massage kepada ibu hamil.

Tindakan diberikan dengan proses pijat relaksasi pada punggung klien sambil memutarakan murottal al-qur'an yang dilakukan selama 15 menit selama 3 hari berturut-turut dengan pemberian tindakan 1 kali setiap hari sambil terus memantau keadaan klien. Hari pertama klien di massage dengan memutarakan Murottal al-qur'an Surah Yasin dengan Murottal oleh Salim Bahanan melalui aplikasi youtube selama 15 menit. Alasan di putarkan Surah Yasin sebagai jantung Al-Qur'an dapat memberikan keberkahan bagi orang yang sakit sehingga dapat menenangkan dan merilekskan atas kondisi yang sedang dialami ibu hamil. Selama di lakukan massage, klien fokus mendengarkan Murottal al-qur'an. Setelah dilakukan intervensi klien mengatakan skala nyeri masih 5 (NRS)

Hari kedua dilakukan di massage dengan memutarakan Murottal al-qur'an Surah Yasin dengan Murottal oleh Ibrahim Elhaq melalui aplikasi youtube selama 15 menit. Selama di lakukan massage, klien fokus mendengarkan Murottal al-qur'an. Setelah dilakukan intervensi klien mengatakan skala nyeri masih 5 (NRS)

Hari ketiga dilakukan massage dengan memutarakan Murottal al-qur'an Surah Ar-Rahman dengan Murottal oleh Muzammil Hasballah melalui aplikasi youtube selama 15 menit. Alasan di putarkan Surah Ar-Rahman sebagai Arus al-qur'an yang secara harfiah berarti Pengantin al-qur'an dimana

disini menunjukkan wujud cinta Ibu kepada Anak yang dikandungnya agar tetap sehat. Selama di lakukan massage, klien fokus mendengarkan Murottal al-qur'an. Setelah dilakukan intervensi klien mengatakan skala nyeri turun menjadi 4 (NRS)

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Gozali, Nyoman, Rizal, 2020). Tujuan penelitian untuk mengetahui intensitas nyeri sebelum dan sesudah dilakukan intervensi nyeri punggung pada ibu hamil, hasil yang didapatkan bahwa Hasil penelitian ada perbedaan intensitas nyeri sebelum dan sesudah responden di intervensi massage

Studi lain yang sejalan dengan intervensi yang diberikan yaitu penelitian oleh (Wulan Diana, 2019) menjelaskan hasil yang didapatkan menunjukkan dari hasil analisis menggunakan uji Wilcoxon didapatkan nilai $p = 0,000 < \alpha = 0,05$ yang menunjukkan bahwa ada keefektifan yang signifikan endorfin massage terhadap penurunan nyeri punggung ibu hamil trimester III

Pijat bagi ibu hamil yang mengalami nyeri akibat ketuban pecah dini membantu meredakan ketegangan saraf dan otot, karena tindakan pijat dapat merangsang dan melemaskan saraf dan otot yang tegang dan membuatnya tenang. Jaringan saraf dan otot dalam keadaan rileks secara otomatis dapat merangsang tubuh secara otomatis untuk meningkatkan produksi endorfin alami di otak. Peran endorfin adalah untuk mengurangi rasa sakit akibat spasme otot (Luh Kade, et al. 2019)

Kartiikasari & Nuryanti (2016) menjellaskan bahwa pijat untuk ibu hamil bisa mengendurkan otot dan saraf, kemudian memicu pelepasan endorfin dalam tubuh. Endorfin adalah hormon yang alami di produksi oleh hipotalamus yang terletak di otak bagian tengah. Fungsi endorfin adalah untuk mengontrol rasa sakit dan meningkatkan, meningkatkan aliran endorfin dalam tubuh ibu yang hamil, membuat ibu merasakan nyaman, rileks & menghilangkan sakit saat mengalami kram otot

Selain dari intervensi massage, Terapi murottal Al-Qur'an merupakan salah satu teknik distraksi untuk mengatasi nyeri. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Alyensi, Hafsah, 2018). Tujuan dilakukam penelitian adalah

untuk mengetahui hasil dari pengaruh terapi Murottal Qur'an terhadap skala nyeri persalinan pada kala I fase aktif dan hasilnya. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada perbedaan intensitas sebelum dan sesudah mendapat perlakuan Murottal Quran, rata-rata penurunan nyeri persalinan kala I fase aktif adalah 1.95.

Penelitian lain yang sesuai dengan intervensi yang diberikan yaitu penelitian oleh (Khairun, Titi, Murhan, 2018), menjelaskan bahwa terdapat perbedaan intensitas nyeri antara kelompok perlakuan sebelum dan sesudah perlakuan murottal (*p--value* 0.002) serta perbedaan skala nyeri sebelum & setelah pengobatan Tidak ada perbedaan pengurangan. Murrotal pada kelompok kontrol (nilai p 0,003). Hasil analisis perbedaan kelompok kontrol menyimpulkan bahwa rata--rata perbedaan skala nyeri antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan berbeda (*p--value* 0,001), sehingga dapat di simpulkan bahwa terapi Murrotal menurunkan skala nyeri pasca operasi SC. pasien dalam kelompok kontrol. Dan kelompok perlakuan. Berdasarkan tingkat penurunan & nilai p, dapat di simpulkan bahwa terapi Quran lebih efektif dalam mengurangi sakit pasca operasi pasien SC

Murottal AlQuran adalah salah satu pilihan suara yang bisa ibu dengarkan untuk menghilangkan rasa sakit. Mendengarkan "Quran" merangsang indera pendengar, memungkinkan ibu untuk fokus pada suara yang didengar, dan menenangkan ibu. Hal ini memberikan efek hipnotis dan membantu memudahkan ibu menghadapi persalinan. Suara Al-Qur'an dapat mengurangi kecemasan saat melahirkan, membantu ibu rileks dan menyemangati mereka (Alyensi, 2018)

Hadi, dkk menjelaskan dalam Zahrofi(2013) bahwa terapi murottal Alquran adalah terapi keagamaan di mana orang akan membaca atau mendengarkan ayat-ayat Alquran selama beberapa menit untuk memberikan efek positif. Pada saat yang sama, menurut Potter & Perry (2005), perlu mendengarkan musik dan terapi suara setidaknya selama 15 menit untuk menghasilkan efek terapeutik. Terapi murottal telah dibuktikan menstimulus sel dalam tubuh, mengubah getaran suara jadi gelombang yang di tangkap

oleh tubuh, sehingga mengurangi rangsangan dari reseptor rasa sakit. Mengenai perawatan Al-Qur'an, ditemukan bahwa rentang waktu untuk perawatan Al-Qur'an adalah 1115 menit Rangsangan Murrotal Qur'an meningkatkan pelepasan endorfin dan ini menurunkan kebutuhan akan obat-obatan. Pelepasan tersebut memberikan pula suatu pengalihan perhatian dari rasa sakit dan dapat mengurangi kecemasan. Mekanismenya mempengaruhi semua organ sistem tubuh. Menurut teori Candace Pert bahwa neuropeptida dan reseptor-reseptor biokimia yang dikeluarkan oleh hypothalamus berhubungan erat dengan kejadian emosi. Sifat riang/rileks mampu mengurangi kadar kortisol, epinefrin-norepinefrin, dopa dan hormone pertumbuhan di dalam serum (Zahrof, 2013). Selain perubahan fisik tersebut, setelah mendengarkan "Al-Quran", psikologi tubuh manusia juga akan berubah. Perasaan damai karena percaya bahwa Allah akan selalu melindungi dan menyembuhkan (Faridah,2015)

Banyak ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan obat karena Al-Qur'an sendiri diturunkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang beriman. (Hisyam,2009).

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Yunus/10:57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
 وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman"

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah SWT menyebutkan karunia-Nya. Dalam menurunkan Al-Qur'an kepada makhluknya, memiliki tiga fungsi, yaitu, pertama, untuk memperingatkan perbuatan keji. Moral itu bersumber dari kecemasan dan keraguan, yakni sebagai terapis penyakit dada. Yang kedua adalah sugesti dan yang ketiga adalah nikmat. Melalui amalan, Anda akan mendapatkan hidayah dan ridho Allah SWT. Faktanya, hanya

orang-orang yang beriman dan mereka yang beriman dan beriman kepada isi Al-Qur'an yang dapat memperolehnya. Sistem kehidupan manusia yang sempurna memaksa manusia untuk menaati dan menaati firman-Nya untuk kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paksaan Allah datang kepada manusia dalam bentuk siksaan atau bencana, berupa penyakit, kecelakaan, dan lain-lain.

Sementara itu, dalam penjelasan Profesor al-Misbah M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata Syifa` secara umum berarti obat atau obat, digunakan untuk menghilangkan rasa kekurangan. Penyakit adalah semacam rahmat untuk orang mukmin, artinya Al-Qur'an tidak akan menambah kerugian pelanggar hukum kecuali kerugian yang disebabkan oleh kekafirannya sendiri.

Kekhasan dan fungsi Al-Qur'an dalam penafsirannya, sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad. Lebih lanjut, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa para ulama memahami hal ini dan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an juga dapat mengobati penyakit fisik. Mereka merujuk pada berbagai narasi dengan nilai dan makna yang kontroversial.

Dan dalam Firman Allah dalam Q.S. Al Isra/17: 82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

خَسَارًا

Terjemahnya: “dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”

Dalam penjelasan al-mishbah dijelaskan kalau ayat ini menyampaikan manfaat wahyu Al-Qur'an sebagai obat. Wahai semua umat manusia, kapanpun & dimanapun, pamilah bahwa sesungguhnya Tuhan, pelindung dan pembimbingmu, semua doktrin yang sangat agung dan bermanfaat telah datang kepadamu, Al-Qur'an al-Karim dan sangat mujarab, yaitu Kesehatan Jiwa. Penyakit di dada, yaitu hati manusia, adalah petunjuk yang sangat jelas

untuk kebenaran dan kebajikan, dan belas kasihan yang sangat besar dan kaya bagi orang-orang yang beriman.

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah obat yang baik untuk penyakit dada. Penyebutan kata yang diberikan dijelaskan dari hati, menunjukkan bahwa wahyu ilahi dapat menyembuhkan keraguan, kecemburuan, takabbur dan penyakit mental lainnya. Padahal, menurut Al-Qur'an, hati adalah wadah cinta dan benci, kehendak dan penolakan. Bahkan hati dipandang sebagai alat untuk memahami. Pikiran juga dapat menghasilkan kualitas ketenangan dan kegelisahan, menghasilkan kualitas terpuji (Uprianingsih, 2013)

C. Analisis alternatif pemecahan masalah

Pemberian intervensi yang bisa dilakukan selain dari intervensi utama yaitu kompres hangat. Kompres hangat digunakan untuk memberikan panas pada bagian tubuh yang membutuhkan melalui penggunaan cairan atau peralatan, sehingga memberikan kehangatan pada klien. Pemasangan kompres panas biasanya hanya dilakukan secara topikal pada bagian tubuh tertentu. Penerapan panas melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi darah di jaringan. Dengan cara ini, perjalanan asam dan nutrisi melalui sel ditingkatkan, sehingga meningkatkan pembuangan zat yang diekskresikan. Peningkatan aktivitas seluler mengurangi rasa sakit/nyeri dan mendukung proses penyembuhan luka dan proses inflamasi (Hannan, 2019)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan intervensi pada Ibu hamil selama 3 hari dengan pemberian intervensi satu kali sehari selama 15 menit, Terapi Murottal dan Massage dapat menurunkan skala nyeri pada ibu hamil yang mengalami ketuban pecah dini dengan menjadikan ibu hamil lebih tenang dan rileks. Suara Al Quran meredakan stress dan meningkatkan ketahanan terhadap stress, meningkatkan relaksasi, ketenangan dan kenyamanan. Sedangkan pemberian massage dapat merangsang ketegangan saraf dan otot untuk rileks. Keduanya dapat merangsang pelepasan endorfin dalam tubuh. Endorfin mampu mengontrol rasa sakit dan ketegangan seseorang, dan ini dapat meningkatkan aliran endorfin pada ibu hamil, yang dapat membuat ibu merasa nyaman dan tenang, mengurangi rasa sakit. sehingga didapatkan hasil terjadi penurunan skala nyeri setelah diberikan Terapi Murottal dan Massage

B. Saran

1. Bagi Profesi Keperawatan karya akhir ini sebagai referensi tambahan dalam memberikan asuhan keperawatan dalam Keperawatan Maternitas
2. Bagi Pelayanan Rumah Sakit karya akhir ini menjadi tambahan ataupun masukan dalam memberikan pelayanan Antenatal Care
3. Bagi Instituti Pendidikan diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan non farmakologi. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut dengan kasus yang lain

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. Perdana (2008). *Murotall Al-Qur'an Alternatif Terapi Suara Baru*. Jurnal Prosidding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi-II
- Adrian Kevin. 2018. *Penyebab dan Akibat Ketuban Pecah Dini*. <https://www.alodokter.com/penyebab-dan-akibat-ketuban-pecah-dini>.
- Alyensi Fatiyani, Hafsa Arifin. 2018. *Pengaruh Terapi Murottal Qur'an Terhadap Intensitas Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif Di Bidan Praktik Mandiri (Bpm) Ernita Kota Pekanbaru Tahun 201*. p- ISSN.2089-7669 e-ISSN. 2621-2870. Vol 8 No. 1 October 2018
- Aprilia, Y. d. 2011. *Birth Melahirkan Nyaman Tanpa Rasa Sakit..* Jakarta: Gramedia
- Danuatmaja, B. d. M. 2014. *Persalinan Normal Tanpa Rasa Sakit.. Puspa Swara*.
- Elzaky, Jamal. 2010. *Buku Saku Terapi Baca Al-Qur'an*. Kairo: Syuruq.
- Ernawati, E. W. 2020. *Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020*. Stik Bina Husada Palembang.
- Fadilah Siti, dkk. 2015. *Pengaruh Pijat Oksitosin Terhadap Pengeluaran Asi Pada Ibu Nifas Di Rsud Panembahan Senopati Bantul Tahun 2013*. Bimabi, 3 (1). Pp. 40-47. Issn 2338-6450
- Faridah, V. N. 2015. *Terapi Murottal (Al-Qur'an) Mampu Menurunkan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Laparatomi*. *Jurnal Keperawatan*, 6, 63–70. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.04.074>
- Gozali, dkk. 2020. *Intervensi Nyeri Punggung pada Ibu Hamil di Desa Pengelatan*. *International Journal of Natural Science and Engineering*. Volume 4 Nomor 3 2020, pp 134-139 P-ISSN : 2615-1383 E-ISSN : 2549-6395. DOI: <https://dx.doi.org/10.23887/ijnse.v4i3.29368>
- Hannan Mujib. 2019. *Pengaruh Terapi Kompres Hangat Terhadap Penurunan Nyeri Sendi Osteoarthritis Pada Lansia Di Posyandu Lansia Puskesmas Pandian Sumenep*. *Jurnal Kesehatan "Wiraraja Medika"*
- Henderson, C., & Jones, K. (Eds.). (2006). *Buku ajar-Konsep kebidanan* (Ria Anjarwati, Renata Komalasari & Dian Adiningsih, Penerjemah). Jakarta: EGC
- Hidayah, Taufik N. (2013). *Pengaruh pemberian murottal al-qur'an terhadap tingkat nyeri pasien post operasi fraktur ekstremitas di rumah sakit orthopedi Prof. dr. R.Soeharso Surakarta*. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Ilmiasih Reni, dkk. 2010. *Aplikasi Teori Comfort Kolcaba Dalam Mengatasi Nyeri Pada Anak Pasca Pembedahan Laparatomi Di Ruang Bch Rsupn Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta*. *Jurnal Keperawatan*, P-Issn 2086-3071 E-Issn 2443-0900
- Kartikasari, R I. dan Nuryanti, A. 2016. *Pengaruh Endorphin Massage Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Punggung Ibu Hamil*. Lamongan: STIKES Muhammadiyah Lamongan. *Rakernasaipkema 2016*. Hal:297-304
- Kemenkes RI. 2019. *Laporan Nasional Riskesdas 2018*; Jakarta: Badan Penelitian

dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia

- Kuswanti, Ina .2014. *Asuhan Kebidanan*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar
- Luh Kade,dkk. 2019. *Terapi Pijat Ibu Hamil Untuk Mengurangi Spasme Otot Pada Masa Trimester Akhir Kehamilan*. E-Jurnal Widya Kesehatan ,Volume 1, Nomor ; 2 Oktober 2019
- Manuaba, dkk. 2012. *Pengantar Kuliah Obstetri*. Jakarta: EGC
- Maryani, E D, Hartati, E. 2013. Intervensi terapi audio dengan murottal surah ar-Meirisa, R. 2013. *Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. T dengan Apendisitis di RW 01 Kelurahan Cisalak Pasar Cimanggis Depok*. Naskah Publikasi UI
- Morgan. 2009. *Obstetri dan Ginekologi Panduan Praktik*. Jakarta: EGC
- Negara, dkk. 2017. *Buku Ajar Ketuban Pecah Dini*. Denpasar: RSUP Sanglah
- Nettina, 2002, *Pedoman Praktek Keperawatan*, EGC, Jakarta.
- Nuhan, dkk. 2018. *Pengaruh Murrotal Al-Quran terhadap Intensitas Nyeri pada Pasien Post Operasi Sectio Caesarae*. Jurnal keperawatan, Volume XIV, No. 1, April 2018. ISSN 1907-0357
- Nursalam, 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan* : Jakarta: Salemba Medika
- POGI, 2016. *Pelatihan Klinik Asuhan Persalinan Normal*. Jakarta: JNPK-KR. DEPKES RI
- Post Operasi Fraktur Di RSUD Panembahan Senopati Bantul 4*, Jakarta : Salemba Medika
- Potter & Perry. 2005. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep,Proses dan Praktik edisi 4*. Jakarta: EGC
- Potter & Perry.2006. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan Konsep, Proses, dan Praktik Edisi 4*. Jakarta:EGC.
- Prawirohardjo, S. 2016. *Ilmu Kebidanan Cetakan Kelima*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2010. *Ilmu Kebidanan*. Edisi Keempat. Jakarta: YBP-SP
- Puji Nanik Rochmawati. 2018. *Pengaruh Murottal Qur'an Terhadap Nyeri Post Operasi*. Jombang: Insan Cendekia Medika
- rahman terhadap perilaku anak autis. Jurnal Keperawatan Soedirman *The Soedirman Journal of Nursing*, Volume 8, No.2, Juli 2013
- Situmorang, 2009. *Teknik relaksasi massage*. USU Press. Medan
- Soewarto, S. 2014. *Ketuban pecah dini*. Edisi ke-4. Jakarta : Penerbit PT. Bina Pustaka
- Sulistiyawati dan Nugraheny. 2013. *Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin*.Yogyakarta: Salemba Medika
- Sunarti, S. 2017. *Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny "R" Gestasi 37-38 Minggu dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Suprapti, & Wirawati, M. K. (2017). Upaya Penurunan Intensitas Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif Dengan Murottal Al-Qur'an Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. *Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan*, 1(2), 31–36
- Tahir, Suriani. 2021. *Faktor Determinan Ketuban Pecah Dini*. Bandung: CV.

Media Sains Indonesia

- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. 2016. *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Edisi 1*. Jakarta Selatan: DPP PPNI
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. 2018. *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Edisi 1*. Jakarta Selatan: DPP PPNI
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. 2019. *Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Edisi 1*. Jakarta Selatan: DPP PPNI
- Uprianingsih Ayudia. 2013. *Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia Di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar*. Makassar: Unam
- WHO. 2014. *The World Bank Trends in Maternal Mortality*.
- Wiadnya, A., & Surya, I. G. N. H. W. (2016). Gambaran Ketuban Pecah Dini Pada Kehamilan Aterm Di Rsup Sanglah Tahun 2013. *Medika*, 5(10), 1–4
- Wijaya, M. 2009. *Analisis Perbandingan Spektral Musik Murottal dan Klasik Mozart*. diakses tanggal 27 Agustus 2017.
<<http://mossawijaya.blog.uns.ac.id/2009/09/23/analisis-perbandingan-spektral-musik-murottal-alquran-dengan-musik-klasik-mozzart-sebagai-acuan-untuk-meningkatan-kemampuan-spasial-temporal-seseorang/>>
- Wirasti Unang. 2010. *Aplikasi Teori Comfort Kolcaba Dalam Asuhan keperawatan Pada Anak Dengan Demam Di Ruang Infeksi Anak Rsupn Dr. Cipto Mangunkusumo*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Wulan Diana. 2019. Endorphin Massage Efektif Menurunkan Nyeri Punggung Ibu Hamil Trimester III (Di BPM Lulu Surabaya). Vol. 12, No. 2, Agustus 2019, Hal. 62-70
- Zahrofi. 2013. *Pengaruh Pemberian Terapi Murottal Al Quran Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Pasien Hemodialisa Di Rs Pku*. Muhammadiyah Surakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ade Irma Suhardi, lahir di Kabupaten Bulukumba 25 Februari 1994. Penulis merupakan Anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Suhardi dan Ibu Rohani. Penulis menempuh pendidikan formal pertama pada tahun 2000 di SD Negeri 02 Unggulan Terang – Terang, disekolah tersebut penulis menimba ilmu selama 6 tahun dan selesai pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bulukumba selama 3 tahun. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bulukumba dan selesai pada tahun 2012. Setelah penulis menyelesaikan sekolah di SMA Negeri 1 Bulukumba pada tahun yang sama penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yakni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis mengambil Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan selesai pada tahun 2019. Penulis mengambil profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan selesai pada tahun 2021. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah swt, do'a kedua orang tua dan orang-orang baik di sekitar, serta kerja keras, penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun Tugas Akhir Ners yang berjudul “Intervensi Terapi Murottal Dan Massage Dalam Mengatasi Nyeri Pada Ibu Dengan Ketuban Pecah Dini Di Rs Labuang Baji”. Alamat email: ade.irma25@gmail.com