

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA TN. B DENGAN DIAGNOSA  
FRAKTUR 1/3 TIBIA ET FIBULA DENGAN PEMEBERIAN  
TEKNIK RELAKSASI NAFAS DALAM DAN TERAPI  
MUROTTAL DALAM MANAJEMEN NYERI**



**Tugas Akhir Ners**

**Oleh:**

Asrawati, S.Kep  
70900119042

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS ANGKATAN XVI  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2021**

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA TN. B DENGAN DIAGNOSA  
FRAKTUR 1/3 TIBIA ET FIBULA DENGAN PEMEBERIAN  
TEKNIK RELAKSASI NAFAS DALAM DAN TERAPI  
MUROTTAL DALAM MANAJEMEN NYERI**



**Tugas Akhir Ners**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas  
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:  
**ASRAWATI, S.Kep**  
Nim: 70900119042


**PROGRAM STUDI PROFESI NERS ANGKATAN XVI  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudari Asrawati NIM: 70900119042, Mahasiswi Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kaus tugas akhir ners yang berjudul “Asuhan Keperawatan Pada Tn. B Dengan Diagnosis Fraktur 1/3 Tibia et Fibula Dengan Pemberian Teknik Relaksasi Nafas Dalam dan Terapi Murottal Untuk Manajemen Nyeri”, memandang bahwa Tugas Akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmunan dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 13 Juli 2021



Ns. Musdalifah, S.Kep., M.Kep  
Pembimbing I



Ns. Wahdaniah, S.Kep., M.Kes  
Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asrawati  
NIM : 70900119042  
Tempat/Tgl. Lahir : Tala Sompu, 2 Februari 1997  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Profesi Ners  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Takalar  
Judul : Asuhan Keperawatan Pada Tn. B Dengan Diagnosis Fraktur 1/3 Tibia et Fibula Dengan Pemberian Teknik Relaksasi Nafas Dalam dan Terapi Murottal Untuk Manajemen Nyeri

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini adalah benal karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 15 Juli 2021

Penyusun, Asrawati

.....  
NIM: 70900119042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "Asuhan Keperawatan Pada Tn. B Dengan Diagnosa Fraktur 1/3 Tibia Et Fibula Dengan Pemberian Teknik Relaksasi Nafas Dalam Dan Terapi Murottal Dalam Manajemen Nyeri", yang disusun oleh Asrawati, NIM: 70900119042, mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 15 April 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan.


Samata, November 2021

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.dr. Syatirah, Sp. A., M.Kes	(  )
Sekretaris	: Dr. Patimah, S.Kep., Ns., M.Kep	(  )
Munaqisy I	: Dr. Risnah, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kep	(  )
Munaqisy II	: Dr. Aisyah Arsyad, S. Ag., M. A	(  )
Pembimbing I	: Musdalifah, S.Kep., Ns., M.Kep	(  )
Pembimbing II	: Wahdaniah, S.Kep, Ns, M.Kep,	(  )

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar.



  
Dr.dr. Syatirah, Sp., A., M.Kes  
NIP. 198007012006042002

## KATA PENGANTAR

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah kita diberikan nikmat kesehatan hingga sampai sekarang ini. Dan tak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw serta para sahabat-sahabat-Nya, pengikut-pegikutnya hingga akhir zaman yang telah mengajarkan iman dan islam kepada kita, sehingga kita dapat menikmati indahnya keimanan dan Islam.

Dengan penuh rasa syukur Penulis ucapkan karena dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah Akhir dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Tn. B Dengan Diagnosis Fraktur 1/3 Tibia et Fibula Dengan Pemberian Teknik Relaksasi Nafas Dalam dan Terapi Murottal Untuk Manajemen Nyeri”. mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akhir ini banyak menerima suport moril, saran-saran dan arahan dari berbagai pihak. Penulis mempersembahkan terima kasih setinggi-tingginya untuk kedua orang tua Rahim dan Asmawati yang tak henti-hentinya memberi support moril maupun materil, doa-doa yang selalu ditasbihkan dan usaha-usaha yang tak lelah dilakukan untuk mengantarkan penulis menyelesaikan amanah akademik sebagai Perawat Profesional.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhanis M.A, Ph.D selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.A.,M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta pada wakilt dekan dan staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
3. Ibu Dr. Patimah, S.Kep, Ns, M.Kep selaku ketua Program Studi Profesi Ners sekaligus dan Ns. Syisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep. J selaku sekretaris Program Profesi Ners, beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan.
4. Kepada Ns. Musdalifah, S.Kep., M.Kep selaku pembimbing I dan Ns. Wahdaniah, S.Kep, M.Kes selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian penulisan karya ilmiah, yang telah sabar,

ikhlas meluangkan waktu di tengah rutinitasnya untuk berdiskusi dan memberi arahan kepada dan motivasi bagi penulis.

5. Kepada Dr. Risnah, S. KM, S. Kep., Ns., M.Kep selaku Penguji I dan Ibu Dr. Hj. Aisyah Arsyad, S. Ag., M.A, selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dan kesediaan waktu membimbing sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang terbaik yang diharapkan dapat bermanfaat bagi orang lain.
6. Kepada para perawat di RSUD Labuang Baji Kota Makassar yang telah kebersamai dan membimbing proses praktik pendidikan profesi
7. Kepada teman-teman seperjuangan, Ners Angkatan XVI UINAM yang telah sedia menerima penulis sebagai kawan mulai dari pembelajaran online hingga praktif offline. Semoga ukhuwah yang terjalin tetap dieratkan walau di kemudian hari telah disibukkan dengan urusan masing-masing.

Di samping itu, penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah baik lisan maupun tindakan saat menempuh pendidikan di Kampus Tercinta, Kampus Peradaban UIN Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa menyempurnakan karya tulis ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan karya ilmiah selanjutnya. Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Sekian dan terima kasih

Gowa, 13 Juli 2021

Asrawati

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL.....</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ASLI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Umum dan Khusus .....	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
<b>BAB II KONSEP TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Konsep Medis .....	8
1. Definisi.....	8
2. Etiologi.....	9
3. Patofisiologi .....	10
4. Tanda dan Gejala .....	10
5. Pemeriksaan penunjang .....	11
6. Komplikasi.....	14
7. Penatalaksanaan .....	16
8. Prognosis.....	17
B. Konsep keperawatan .....	18
1. Pengkajian.....	18



2. Diagnosis keperawatan .....	25
3. Intervensi Keperawatan .....	29
4. Penyimpangan KDM .....	39
C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan .....	40
D. <i>Evidence Based Nursing</i> (EBN) .....	41
<b>BAB III LAPORAN KASUS .....</b>	<b>47</b>
A. Pengkajian.....	47
B. Diagnosis Keperawatan .....	70
C. Intervensi Keperawatan .....	72
D. Implementasi Keperawatan.....	78
E. Evaluasi.....	98
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>110</b>
A. Analisa Kasus.....	110
B. Analisa Intervensi .....	111
C. Alternatif penyelesaian Masalah.....	113
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>

## ABSTRAK

**Nama** : Asrawati, S.Kep  
**NIM** : 70900119042  
**Judul** : “Asuhan Keperawatan Pada Tn. B Dengan Diagnosa Fraktur 1/3 Tibia Et Fibula Dengan Pemeberian Teknik Relaksasi Nafas Dalam Dan Terapi Murottal Dalam Manajemen Nyeri“

---

**Latar Belakang:** Fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang baik total, partial yang dapat mengenai tulang panjang dan sendi jaringan otot dan pembuluh darah yang disebabkan oleh trauma langsung ataupun tidak langsung. Fraktur yang terjadi dapat menimbulkan gejala nyeri atau rasa sakit bahkan sampai selesai dilakukan tindakan pembedahan/ operasi. Salah satu terapi non farmakologi yang digunakan yaitu teknik relaksasi dan terapi murottal. **Tujuan Penulisan:** Untuk mengetahui bagaimana asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan rasa nyaman (nyeri) pada Tn.B dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula di ruang Baji Kamase RSUD Labuang Baji Kota Makassar. Teknik relaksasi nafas dalam dan terapi murottal dilakukan sebelum dan setelah dilakukan operasi. **Metode:** Pengkajian nyeri menggunakan skala deskriptif verbal atau *Verbal Descriptor Scale* (VDS) sebelum dan sesudah intervensi dilanjutkan pemberian teknik relaksasi nafas dalam dan terapi murottal surat Ar-Rahman 78 Ayat dengan durasi selama  $\pm$  25 menit beserta evaluasi dan secara mandiri oleh klien apabila nyeri timbul. Terapi diberikan setelah 2 jam setelah klien minum obat nyeri. **Hasil:** Hasil studi menunjukkan bahwa klien mengalami penurunan nyeri dari skala 6 menjadi skala 3. Terapi murottal dan teknik relaksasi nafas dalam mampu menurunkan skala nyeri klien pre op fraktur. Namun hasil yang berbeda saat intervensi diberikan post op fraktur dengan skala nyeri 8 (berat), menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap penurunan nyeri. Nyeri hebat yang dirasakan klien menurun setelah dikolaborasikan pemberian obat analgetik. Diharapkan dalam manajemen nyeri tidak hanya berfokus dalam pemberian terapi farmakologi, akan tetapi terapi non farmakalogi diberikan untuk membantu mengurangi rasa nyeri.

*Kata kunci: Fraktur, Teknik relaksasi nafas dalam, terapi murottal.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang baik total, partial yang dapat mengenai tulang panjang dan sendi jaringan otot dan pembuluh darah yang disebabkan oleh stress pada tulang, jatuh dari ketinggian, kecelakaan kerja, cedera saat olahraga, fraktur degenerative (osteoporosis, kanker, tumor tulang) (Apley & Solomon. 2018). Fraktur tibia fibula distal merupakan fraktur paling umum yang terjadi pada tulang panjang, terdapat 4% dari jumlah populasi fraktur. Cedera ini terutama disebabkan oleh trauma berenergi tinggi seperti kecelakaan bermotor atau trauma torsional berenergi rendah. Dengan lasimnya penggunaan transportasi berkecepatan tinggi insiden cedera ini masih meningkat (Li et al., 2021; Thompson et al., 2020).

*World Health Organization* (WHO) mencatat cedera lalu lintas adalah penyebab kematian nomor 8 di dunia bagi segala usia. Jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas terus meningkat., mencapai angka kematian tertinggi 1,35 juta pada tahun 2018. Tingkat kematian tertinggi di Afrika dengan angka kematian 26.600 orang dan Asia Tenggara dengan angka kematian 20.700 orang (WHO. 2018). Fraktur di Indonesia menjadi salah satu penyebab kematian terbesar ketiga setelah penyakit jantung coroner dan tuberculosi. Menurut data Riskesdas tahun 2018 menemukan ada sebanyak 92.976 kejadian terjatuh yang mengalami fraktur adalah sebanyak 5.144 jiwa (Depkes RI. 2018).

Fraktur yang terjadi dapat menimbulkan gejala nyeri atau rasa sakit bahkan sampai selesai dilakukan tindakan pembedahan/ operasi. Berbagai tindakan akan berlanjut sampai tindakan setelah atau post operasi (Septiani. 2015). Setelah

dilakukan tindakan operasi/ pembedahan, pasien akan merasakan nyeri akibat insisi pembedahan (Cahnyani et al., 2019). Nyeri merupakan suatu pengalaman sensoria tau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan yang sifatnya aktual maupun fungsional dan dengan onset yang mendadak atau disebut juga lambat (SDKI. 2017). Luka insisi pembedahan dapat mengakibatkan impuls nyeri oleh ujung saraf bebas yang diperantara oleh system sensorik (Hermanto et al., 2020). Secara keseluruhan, pembedahan menyumbang 10% sampai 30% nyeri neuropatik klinis. Diperkirakan sekitar 80% pasien mengalami nyeri setelah operasi, dimana 86% mengalami nyeri sedang dan berat atau esktrim. Rasa nyeri (*quality*) yang timbul yang dirasakan pasien pasca bedah fraktur bervariasi seperti menusuk, berdenyut, dan tajam (Handayani et al., 2019).

Penanganan nyeri pada pasien secara umum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan terapi farmakologi dan terapi non farmakologi. Tindakan terapi farmakologi dilakukan dengan pemberian obat analgetik, sedangkan Tindakan terapi non farmakologi yang dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri adalah teknik relaksasi nafas dalam, teknik *massage* atau pijat, kompres, terapi musik, terapi murottal, teknik distraksi dan *guided imaginary* (Smeltzer et al., 2008). Sehubungan dengan penanganan nyeri disarankan untuk menggunakan kombinasi dengan terapi non farmakologi, baik itu digunakan secara sendiri atau kombinasi keduanya (Suyanto & Bangsawan. 2013).

Terapi non farmakologis adalah teknik yang digunakan untuk mendukung teknik farmakologi dengan metode sederhana, murah, praktis dan tanpa efek samping yang merugikan (Pratiwi et al., 2020). Salah satu metode distraksi yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri yaitu dengan cara melakukan teknik relaksasi nafas dalam dan mendengarkan murottal pada pasien fraktur. Teknik

relaksasi merupakan metode yang dapat dilakukan terutama pada pasien yang mengalami nyeri, merupakan latihan pernapasan yang menurunkan konsumsi oksigen, frekuensi pernapasan, frekuensi jantung dan ketegangan otot. Teknik relaksasi perlu diajarkan beberapa kali agar mencapai hasil yang optimal dan perlunya instruksi menggunakan teknik relaksasi untuk menurunkan atau mencegah meningkatnya nyeri (Suwahyu, Romy., et al. 2021). Teknik relaksasi dapat menurunkan nyeri dengan cara merangsang susunan saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang untuk memproduksi endorphin yang berfungsi sebagai penghambat nyeri (Aji., et al. 2015). Selain dapat mengatasi nyeri, teknik relaksasi napas dalam juga dapat membuat pasien dapat mengontrol diri ketika terjadi stress fisik dan emosi (Ayudianingsih & Maliya. 2015).

Selain itu, salah satu intervensi nonfarmakologis dalam praktik keperawatan untuk menurunkan keluhan objektif pasien adalah dalam bentuk stimulasi auditori yang dapat bertindak sebagai rangsangan untuk menciptakan respon fisiologis dan psikologis yang optimal (Rustam et al., 2018). Salah satu jenis stimulus yang dimaksud ialah menggunakan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang merdu dapat memberikan rasa nyaman sehingga dapat menurunkan nyeri dan keseimbangan hemodinamik pasien. Bacaan Al-Qur'am dianggap sebagai perilaku koping agama dimana kalimat- kalimat Allah SWT dapat mempengaruhi roh bagi yang mendengarnya serta merasakan ketenangan vitalitas dan kebebasan dari ikatan dunia. Kekuatan penyembuhan dari Qur'an merujuk untuk kesehatan mental dan fisik (Mirsane et al., 2016).

Terapi murottal dikombinasikan dengan napas dalam terhadap penurunan nyeri menggunakan kekuatan sugesti yang langsung akan merelaksasikan kondisi pasien, sehingga bisa menjadi lebih nyaman, nyeri menimbulkan respon autonomic

berupa peningkatan nadi, peningkatan pernapasan dan tekanan darah, nyeri akut akan memacu peningkatan aktivitas saraf simpatis. Tekanan darah arteri dipertahankan dan diatur oleh tonus vasomotor. Secara normal tonus vasomotor meliputi mekanisme neural dan hormonal. Pengaturan neural diatur oleh pusat vasomotor dari medulla oblongata, dimana pusat ini terdiri dari percabangan vasodepressor dan depressor, vasodepressor menyebabkan vasokonstriksi arteri dan menyebabkan tekanan darah arteri meningkat, sedangkan depressor menurunkan rangsangan simpatis yang menyebabkan vasodilatasi dan menimbulkan tekanan darah arteri menurun (Purwati, E. dkk. 2019). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang menjelaskan bahwa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dapat mempengaruhi emotional intelligence (EQ), intellectual intelligence (IQ) and spiritual intelligence (SQ) seseorang. Mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an juga dapat membuat seseorang menjadi tenang dan rileks sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi penurunan tekanan darah, kecemasan dan intensitas nyeri (Rejeki et al., 2020).

Berdasarkan observasi penulis selama 7 hari di ruang perawatan Baji Kamase RSUD Labuang Baji Makassar, pemberian tindakan non farmakologi untuk mengurangi nyeri fraktur misalnya relaksasi napas dalam masih jarang diimplementasikan sesuai SOP oleh perawat di ruangan. Teknik relaksasi diberikan hanya sebatas memberitahukan kepada klien untuk melakukan relaksasi napas dalam ketika nyeri dirasakan. Perawat lebih cenderung berfokus memberikan penanganan nyeri dengan cara farmakologi dengan pemberian obat analgetik atau obat anti nyeri. Padahal jika kita ketahui bahwa terapi non farmakologis adalah teknik yang dapat digunakan untuk mendukung teknik farmakologi dengan metode sederhana seperti melakukan teknik relaksasi napas dalam dan mendengarkan

murottal. Dalam pelaksanaan terapi non farmakologi, tenaga kesehatan yang memiliki peran dominan adalah perawat karena merupakan tugas mandiri perawat dalam memberikan intervensi keperawatan (Mayasari. 2016).

Berdasarkan kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian terapi farmakologi yang dikombinasikan dengan terapi non farmakologi akan membantu mereleksasikan otot skeletal, dapat menurunkan nyeri dengan merileksasikan ketegangan otot yang dapat menunjang nyeri. Mendengarkan lantunan Al-Qur'an atau murottal dapat memberikan efek tenang, rileks, mengurangi rasa takut, cemas, nyeri dan tegang. Mekanisme ini dapat dilakukan terhadap klien yang mengalami nyeri fraktur. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Fasa, I.F, Firmawati, E (2016), intervensi untuk mengurangi rasa nyeri secara non farmakologi yaitu dengan terapi murottal Ar- Rahman 78 ayat dikombinasikan dengan napas dalam selama 20 menit untuk membantu mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan efek rileks pada klien post sectio caesaria.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian Aini, Lela & Reskita, Reza di RSI Siti Khadijah Palembang menyebutkan bahwa nyeri yang dirasakan sesudah dilakukan teknik relaksasi napas dalam yang sering muncul pada klien fraktur adalah nyeri ringan dengan ciri-ciri yang tidak menimbulkan gelisah dan secara objektif dapat berkomunikasi dengan baik. Hal ini disebabkan melalui pemberian teknik relaksasi napas dalam menciptakan kenyamanan, klien merasa rileks dengan kegiatan tersebut mampu meningkatkan suplai oksigen dalam sel tubuh yang akhirnya dapat mengurangi nyeri yang dialami klien (Aini, Lela & Reskita, Reza. 2018).

Penelitian di Inggris dan Amerika Serikat juga telah menyimpulkan bahwa berdo'a atau mengingat Allah dapat mengurangi gejala penyakit pada klien dan mempercepat proses penyembuhannya (Ratnasari, 2013). Selain dari pada itu, Al-



Qur'an juga dapat menjadi penyembuh sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' Ayat 82:

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahannya :

*“Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang salim selain kerugian”.*

Berdasarkan ayat tersebut, dikatakan bahwa Al-Qur'an dapat menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi, apabila seseorang mengalami sakit, baik itu sakit jasmaniah atau rohaniyah hendaknya menjadikan Al-Qur'an sebagai penawarnya dengan selalu senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Qur'an.

Atas dasar latar belakang inilah maka penulis tertarik untuk memberikan intervensi terapi relaksasi napas dalam dan mendengarkan murottal untuk menguransi rasa nyeri pada Tn.B dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula di ruang Baji Kamase RSUD Labuang Baji Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena gangguan rasa nyaman (nyeri) pada pasien pre-post open fraktur 1/3 tibia fibula yang terdapat pada latar belakang di atas maka rumusan maslaah pada Karya Tulis Ilmiah: Studi Kasus ini adalah bagaimana asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan rasa nyaman (nyeri) pada Tn.B dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula di ruang Baji Kamase RSUD Labuang Baji Kota Makassar.



### **C. Tujuan Umum dan Khusus**

#### **1. Tujuan umum**

Mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan memberikan intervensi teknik relaksasi napas dalam dan terapi murottal untuk mengurangi nyeri pada “Tn. B” dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula di ruang Baji Kamase RSUD Labuang Baji Kota Makassar.

#### **2. Tujuan khusus**

- a. Melaksanakan pengkajian yang komprehensif pada klien diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula
- b. Menegakkan diagnosis keperawatan pada klien dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula
- c. Membuat perencanaan dan implementasi keperawatan pada klien dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula
- d. Melakukan evaluasi keperawatan pada klien dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula

### **D. Manfaat Penulisan**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi referensi penilain dalam proses pembelajaran dalam mengurangi nyeri dapat dilakukan dengan melakukan teknik relaksasi napas dalam dan mendengarkan terapi murottal terhadap pasien yang mengalami nyeri akibat fraktur tibia 1/3 fibula.

#### **2. Manfaat Aplikatif**

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi referensi intervensi dengan melakukan teknik relaksasi napas dalam dan mendengarkan terapi murottal terhadap klien yang mengalami nyeri akibat fraktur tibia 1/3 fibula.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **I. Konsep Teori Fraktur**

##### **A. Definisi**

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang dan ditentukan sesuai jenis dan fraktur terjadi jika tulang dikenai stress yang lebih besar dari yang dapat diabsorbsinya (Kemenkes, 2016). Fraktur merupakan istilah hilangnya kontinuitas tulang rawan, baik yang bersifat total maupun sebagian biasanya disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik (Adrianto. 2019).

Fraktur dapat terjadi di bagian ekstremitas atau anggota gerak tubuh yang disebut dengan fraktur ekstremitas. Fraktur ekstremitas merupakan fraktur yang terjadi pada tulang yang membentuk lokasi ekstremitas atas (tangan, lengan, siku, bahu, pergelangan tangan, dan bawah (pinggul, paha, kaki bagian bawah, pergelangan kaki). Fraktur dapat menimbulkan pembengkakan, hilangnya fungsi normal, deformitas, kemerahan, krepitasi, dan rasa nyeri (Ghassani, 2016).

##### **B. Etiologi**

Menurut Muttaqin (2008) penyebab fraktur antara lain yaitu:

###### **1. Trauma langsung**

Trauma langsung menyebabkan tekanan langsung pada tulang. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya fraktur 7 pada daerah tekan. Fraktur yang terjadi biasanya bersifat kominutif dan jaringan lunak ikut mengalami kerusakan.

## 2. Trauma tidak langsung

Apabila trauma dihantarkan ke daerah yang lebih jauh dari daerah fraktur, trauma tersebut disebut trauma tidak langsung. Misalnya, jatuh dengan tangan ekstensi dapat menyebabkan fraktur pada klavikula. Pada keadaan ini biasanya jaringan lunak tetap utuh.

### C. Patofisiologi

Fraktur gangguan pada tulang biasanya disebabkan oleh trauma gangguan adanya gaya dalam tubuh, yaitu stress, gangguan fisik, gangguan metabolic, patologik. Kemampuan otot mendukung tulang turun, baik yang terbuka maupun tertutup. Kerusakan pembuluh darah akan mengakibatkan perdarahan, maka volume darah menurun. COP menurun maka terjadi perubahan perfusi jaringan. Hematoma akan mengeksudasi plasma dan poliferasi menjadi edem local maka penumpukan di dalam tubuh. Fraktur terbuka atau tertutup akan mengenai serabut saraf yang dapat menimbulkan gangguan rasa nyaman nyeri. Selain itu dapat mengenai tulang dan dapat terjadi neurovaskuler yang menimbulkan nyeri gerak sehingga mobilitas fisik terganggu. Disamping itu fraktur terbuka dapat mengenai jaringan lunak yang kemungkinan dapat terjadi infeksi terkontaminasi dengan udara luar dan kerusakan jaringan lunak akan mengakibatkan kerusakan integritas kulit. Fraktur adalah patah tulang, biasanya disebabkan oleh trauma gangguan metabolic, patologik yang terjadi itu terbuka atau tertutup. Pada umumnya pada pasien fraktur terbuka maupun tertutup akan dilakukan imobilitas yang bertujuan untuk mempertahankan fragmen yang telah dihubungkan tetap pada tempatnya sampai sembuh (Wijaya, 2013).

#### **D. Tanda dan Gejala**

Menurut Kemenkes (2016) Tanda dan gejala yang biasa muncul pada kasus fraktur yakni :

- a. Nyeri terus menerus dan bertambah beratnya sampai fragmen tulang diimobilisasi, hematoma, dan edema
- b. Deformitas karena adanya pergeseran fragmen tulang yang patah
- c. Terjadi pemendekan tulang yang sebenarnya karena kontraksi otot yang melekat diatas dan dibawah tempat fraktur
- d. Krepitasi akibat gesekan antara fragmen satu dengan lainnya
- e. Pembengkakan dan perubahan warna lokal pada kulit.

#### **E. Pemeriksaan Penunjang**

Menurut *American Academy of Orthopaedic Surgeons* (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Sinar X/Pemeriksaan roentgen : untuk menentukan lokasi, luas dan jenis fraktur. Sinar-X memberikan gambar struktur padat, seperti tulang. Rontgen dilakukan dari sejumlah sudut yang berbeda untuk mencari fraktur dan untuk melihat keselarasan tulang. Meskipun jarang, seseorang mungkin dilahirkan dengan tulang ekstra di patela yang belum tumbuh bersama. Kondisi ini disebut patela bipartit dan dapat disalahartikan sebagai fraktur. Sinar-X akan membantu mengidentifikasi patella bipartit. Karena banyak orang mengalami kondisi di kedua lutut.
- b. Scan tulang, tomogram, CT- scan/ MRI : memperlihatkan fraktur dan mengidentifikasi kerusakan jaringan lunak

- c. Pemeriksaan darah lengkap : Ht mungkin meningkat (hemokonsentrasi) atau menurun (perdarahan bermakna pada sisi fraktur atau organ jauh pada trauma multiple). Peningkatan sel darah putih adalah respon stress normal setelah trauma.
- d. Kreatinin : Trauma otot meningkatkan beban kreatinin untuk klirens ginjal. Profil koagulasi : perubahan dapat terjadi pada kehilangan darah, transfuse multiple, atau cedera hati
- e. Pemeriksaan fisik, tepi-tepi fraktur sering dapat dirasakan melalui kulit, terutama jika fraktur tersebut tergeser. Selama pemeriksaan, akan diperiksa apakah terjadi *hemarthrosis*. Dalam kondisi ini, darah dari ujung tulang yang patah terkumpul di dalam ruang sendi, menyebabkan pembengkakan yang menyakitkan. Jika terdapat banyak darah di lutut, maka harus dikeringkan untuk membantu meringankan rasa sakit.

## **F. Komplikasi**

*American Academy of Orthopaedic Surgeons* (2019) menyatakan bahwa komplikasi yang dapat terjadi terbagi menjadi 2, yaitu:

### **1. Pre Operatif**

#### **a. Sindrom Kompartemen**

Kondisi menyakitkan ini berkembang ketika lengan atau tungkai yang terluka membengkak dan tekanan terbentuk di dalam otot. Ketika ini terjadi, operasi segera untuk menghilangkan tekanan diperlukan. Jika tidak diobati, sindrom kompartemen dapat menyebabkan kerusakan jaringan permanen dan kehilangan fungsi.

b. Kerusakan arteri

Pecahnya arteri karena trauma bisa ditandai dengan tidak adanya nadi, CRT menurun, cyanosis bagian distal, hematoma yang lebar dan dingin pada ekstremitas yang disebabkan oleh tindakan emergensi splinting, perubahan posisi pada yang sakit, tindakan reduksi dan pembedahan.

c. Fat Emboli Sindrom

Fat Emboli Sindrom (FES) adalah komplikasi serius yang terjadi pada kasus fraktur tulang ranjang. FES terjadi karena sel lemak yang dihasilkan bone marrow kuning masuk ke aliran darah dan menyebabkan tingkat oksigen dalam darah rendah yang ditandai dengan gangguan pernafasan, takikardi, hipertensi, takipnea dan demam.

d. Infeksi

Sistem pertahanan tubuh rusak bila ada trauma pada jaringan. Pada trauma orthopedic infeksi dimulai pada kulit (superficial) dan masuk ke dalam. Ini biasanya terjadi pada kasus fraktur terbuka, tapi bisa juga karena penggunaan bahan lain dalam pembedahan seperti pin dan plat.

e. Avaskuler nekrosis

Avaskuler Nekrosis (AVN) terjadi karena aliran darah ke tulang rusak atau terganggu yang bisa menyebabkan nekrosis tulang dan diawali dengan adanya Volkman's ischemia.

f. Shock

Shock terjadi karena kehilangan banyak darah dan meningkatnya permeabilitas kapiler yang bisa menyebabkan menurunnya oksigenasi. Ini biasanya terjadi pada fraktur.

2. Post Operatif

a. Infeksi

Infeksi merupakan komplikasi paling umum dari fraktur terbuka. Infeksi adalah hasil dari bakteri memasuki luka pada saat cedera. Infeksi dapat terjadi sejak awal selama penyembuhan atau jauh setelah luka dan patah telah sembuh. Infeksi tulang dapat menjadi kronis (*osteomyelitis*) dan menyebabkan operasi lebih lanjut.

b. Nonunion

Beberapa fraktur terbuka mungkin mengalami kesulitan penyembuhan karena kerusakan suplai darah di sekitar tulang pada saat cedera. Jika tulang tidak sembuh, operasi lebih lanjut, termasuk pencangkokan tulang ke lokasi fraktur dan ulangi fiksasi internal, mungkin diperlukan.

c. Arthritis Pascatrauma

*Arthritis posttraumatic* adalah jenis arthritis yang berkembang setelah cedera. Bahkan ketika tulang Anda sembuh secara normal, tulang rawan artikular yang menutupi tulang bisa rusak, menyebabkan rasa sakit dan kekakuan dari waktu ke waktu. Arthritis parah terjadi pada sebagian kecil pasien dengan fraktur patela. Arthritis ringan hingga sedang suatu kondisi yang disebut *chondromalacia patella* jauh lebih umum.

d. Kelemahan otot

Beberapa pasien mungkin memiliki kelemahan permanen pada otot paha depan di bagian depan paha setelah fraktur. Beberapa kehilangan gerak pada lutut, termasuk meluruskan (ekstensi) dan menekuk (fleksi), juga sering terjadi. Kehilangan gerak ini biasanya tidak melumpuhkan.

e. Sakit kronis

Nyeri jangka panjang di depan lutut sering terjadi pada fraktur patela. Meskipun penyebab nyeri ini tidak sepenuhnya dipahami, ada kemungkinan bahwa hal itu terkait dengan *arthritis posttraumatic*, kekakuan, dan kelemahan otot. Beberapa pasien menemukan bahwa mereka lebih nyaman mengenakan penyangga atau penyangga lutut.

## G. Penatalaksanaan

*American Academy of Orthopaedic Surgeons* (2019) dan (Muttaqin, 2008) menyatakan bahwa penatalaksanaan fraktur terbuka yang dapat dilakukan yaitu:

1. Non operatif

a. Reposisi

Tindakan reposisi dengan cara manipulasi diikuti dengan imobilisasi dilakukan pada fraktur dengan dislokasi fragmen yang berarti seperti pada fraktur radius distal. Reposisi dengan traksi dilakukan terus-menerus selama masa tertentu, misalnya beberapa minggu, kemudian diikuti dengan imobilisasi.



b. Imobilisasi

Pada imobilisasi dengan fiksasi dilakukan imobilisasi luar tanpa reposisi, tetapi tetap memerlukan imobilisasi agar tidak terjadi dislokasi fragmen. Contoh cara ini adalah pengelolaan fraktur tungkai bawah tanpa dislokasi yang penting. Imobilisasi yang lama akan menyebabkan mengecilnya otot dan kakunya sendi.

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi berupaya mengembalikan kemampuan anggota yang cedera atau alat gerak yang sakit agar dapat berfungsi kembali seperti sebelum mengalami gangguan atau cedera. Pasien dianjurkan untuk keluar dari tempat tidur dengan dibantu ahli fisioterapi.

d. Traksi

Traksi adalah tahanan yang dipakai dengan berat atau alat lain untuk menangani kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot. Tujuan traksi adalah untuk menangani fraktur, dislokasi atau spasme otot dalam usaha dan untuk memperbaiki deformitas dan mempercepat penyembuhan.

2. Debridemen dan Irigasi

Debridemen dan irigasi merupakan langkah pertama dalam mengendalikan risiko infeksi. Dalam debridemen, semua bahan asing, bahan yang terkontaminasi dan jaringan yang rusak dari luka akan dikeluarkan. Luka kemudian akan dicuci atau diairi dengan beberapa liter larutan garam. Setelah luka dibersihkan, selanjutnya mengevaluasi fraktur dan menstabilkan tulang. Patah tulang terbuka diobati dengan fiksasi internal atau eksternal.

a. Fiksasi Internal

Fiksasi internal dapat digunakan untuk mengobati fraktur terbuka di mana: lukanya bersih; ada kerusakan kulit atau jaringan minimal; potongan-potongan tulang yang patah bisa disejajarkan dengan baik.

Hal ini dapat dilakukan sebagai operasi awal atau ditunda jika jaringan lunak perlu sembuh. Setelah fiksasi internal, anggota tubuh yang terluka akan diimobilisasi dalam *sling cast* atau belat hingga fraktur sembuh. Selanjutnya dapat diberikan antibiotik untuk jangka waktu tertentu untuk membantu mencegah infeksi. Selama proses penyembuhan, luka harus selalu diperiksa untuk memastikan tidak ada tanda-tanda infeksi.

b. Fiksasi Eksternal

Fraktur terbuka yang parah pertama kali distabilkan dengan fiksasi eksternal. Dalam operasi ini, akan dimasukkan sekrup atau pin logam ke tulang di atas dan di bawah lokasi fraktur. Pin dan sekrup diproyeksikan keluar dari kulit yang menempel pada logam atau batang serat karbon. Fiksasi eksternal memiliki keuntungan menstabilkan tulang yang patah. Dalam beberapa kasus, luka mungkin memerlukan debridemen lebih lanjut atau pencangkokan kulit dan jaringan untuk menutupi tulang yang terluka. Fiksasi eksternal di tempat, pasien sering dapat bangun dari tempat tidur dan bergerak meskipun luka terbuka.

Dalam kebanyakan kasus, fixator eksternal tetap di tempatnya hanya sampai aman untuk melakukan fiksasi

internal. Namun, kadang-kadang, fixator eksternal digunakan untuk menstabilkan tulang sampai penyembuhan selesai. Ini kemudian dihapus selama prosedur kedua ketika fraktur sembuh.

### 3. Penatalaksanaan Pembedahan

- a. Reduksi tertutup dengan fiksasi eksternal atau fiksasi perkutan dengan K-Wire (kawat kirschner), misalnya pada fraktur jari.
- b. Reduksi terbuka dengan fiksasi internal (ORIF: *Open Reduction internal Fixation*).
- c. Reduksi terbuka dengan fiksasi eksternal (OREF: *Open reduction Eksternal Fixation*). Fiksasi eksternal digunakan untuk mengobati fraktur terbuka dengan kerusakan jaringan lunak. Alat ini memberikan dukungan yang stabil untuk fraktur kominitif (hancur atau remuk).

## H. Prognosis

Penyembuhan fraktur merupakan suatu proses biologis yang menakjubkan. Tidak seperti jaringan lainnya, tulang yang mengalami fraktur dapat sembuh tanpa jaringan parut. Pengertian tentang reaksi tulang yang hidup dan periosteum pada penyembuhan fraktur mulai terjadi segera setelah tulang mengalami kerusakan apabila lingkungan untuk penyembuhan memadai sampai terjadi konsolidasi. Faktor mekanis yang penting seperti imobilisasi fragmen tulang secara fisik sangat penting dalam penyembuhan, selain faktor biologis yang juga merupakan suatu faktor yang sangat esensial dalam penyembuhan fraktur.

## II. Konsep Dasar Keperawatan

### A. Pengkajian

1. Anamnesis
2. Identitas klien : Meliputi nama, jenis kelamin, umur, alamat, agama, bahasa yang dipakai, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, asuransi, golongan darah, nomer register, tanggal masuk rumah sakit, diagnosis medis (Padila, 2012).
3. Keluhan utama : Keluhan utamanya adalah rasa nyeri akut atau kronik. Selain itu klien juga akan kesulitan beraktivitas. Untuk memperoleh pengkajian yang lengkap tentang rasa nyeri klien digunakan (Padila 2012).
4. Provoking incident : Apakah ada peristiwa yang menjadi faktor presipitasi nyeri
  - a. Quality of pain : Seperti apa rasa nyeri yang dirasakan atau digambarkan klien. Apakah seperti terbakar, berdenyut, atau menusuk
  - b. Region : Radiation, relief : Apakah rasa sakit bisa reda, apakah rasa sakit menjalar atau menyebar, dan dimana rasa sakit terjadi.
  - c. Severity (scale) of pain : Seberapa jauh rasa nyeri yang dirasakan klien, bisa berdasarkan skala nyeri atau klien menerangkan seberapa jauh rasa sakit memengaruhi kemampuan fungsinya.
  - d. Time : Berapa lama nyeri berlangsung, kapan, apakah bertambah buruk pada malam hari atau siang hari
5. Riwayat penyakit sekarang
6. Riwayat penyakit dahulu

Pada pengkajian ini ditemukan kemungkinan penyebab fraktur dan memberi petunjuk berapa lama tulang tersebut akan menyambung. Penyakit-penyakit tertentu seperti kanker tulang menyebabkan fraktur patologis yang sering sulit untuk menyambung. Selain itu, penyakit diabetes dengan luka sangat beresiko terjadinya osteomyelitis akut maupun kronik dan juga diabetes menghambat proses penyembuhan tulang (Padila, 2012).

**7. Riwayat penyakit keluarga**

Penyakit keluarga yang berhubungan dengan penyakit tulang merupakan salah satu faktor predisposisi terjadinya fraktur, seperti diabetes, osteoporosis yang sering terjadi pada beberapa keturunan dan kanker tulang yang cenderung diturunkan secara genetik (Padila, 2012).

**8. Riwayat psikososial**

Merupakan respon emosi klien terhadap penyakit yang dideritanya dan peran klien dalam keluarga dan masyarakat serta respon atau pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari (Padila, 2012).

**9. Pola-pola**

**a. Pola persepsi dan tata laksana hidup sehat**

Pada kasus fraktur akan timbul ketakutan akan terjadi kecacatan pada dirinya dan harus menjalani penatalaksanaan kesehatan untuk membantu penyembuhan tulangnya. Selain itu, pengkajian juga meliputi kebiasaan hidup klien seperti penggunaan obat steroid yang dapat mengganggu metabolisme kalsium, pengonsumsi alkohol yang

bisa mengganggu keseimbangannya dan apakah klien melaksanakan olahraga atau tidak (Padila, 2012).

b. Pola nutrisi dan metabolisme

Insufisiensi pancreas/DM (predisposisi untuk hipoglikemia atau ketoasidosis), malnutrisi termasuk obesitas, membran mukosa kering karena pembatasan pemasukan atau periode post puasa (Doenges dalam Jitowiyono dan Kristiyanasari, 2010). Pada klien fraktur harus mengonsumsi nutrisi melebihi kebutuhan sehari-harinya seperti kalsium, zat besi, protein, vitamin untuk membantu proses penyembuhan tulang dan pantau keseimbangan cairan (Padila, 2012).

**10. Pola eliminasi**

Pola eliminasi Pantau pengeluaran urine frekuensi, kekekatannya, warna, bau, dan jumlah apakah terjadi retensi urine. Retensi urine dapat disebabkan oleh posisi berkemih yang tidak alamiah, pembesaran prostat dan adanya tanda infeksi saluran kemih Kaji frekuensi, konsistensi, warna, serta bau feses.

**11. Pola tidur dan istirahat**

Klien akan merasakan nyeri, keterbatasan gerak sehingga hal ini dapat mengganggu pola dan kebutuhan tidur klien. Selain itu juga, pengkajian dilaksanakan pada lamanya tidur, suasana lingkungan, kebiasaan tidur, dan kesulitan tidur serta penggunaan obat tidur (Padila, 2012). Tidak dapat beristirahat, peningkatan ketegangan, peka terhadap rangsang, stimulasi simpatis.

## **12. Pola aktivitas**

Timbulnya nyeri, keterbatasan gerak maka semua bentuk kegiatan klien menjadi berkurang dan kebutuhan klien perlu banyak dibantu oleh orang lain. Hal lain yang perlu dikaji adalah bentuk aktivitas (Padila, 2012).

## **13. Pola hubungan dan peran**

Klien akan kehilangan peran dalam keluarga dan masyarakat karena klien harus menjalani rawat inap (Padila, 2012)

## **14. Persepsi dan konsep diri**

Dampak yang timbul pada klien adalah rasa takut akan kecacatan, rasa cemas, rasa ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas secara optimal dan pandangan dirinya yang salah (Padila, 2012).

## **15. Pola sensori dan kognitif**

Klien fraktur daya rabanya berkurang terutama pada bagian fraktur, sedangkan pada indera yang lainnya tidak timbul gangguan begitu juga pada kognitifnya tidak mengalami gangguan (Padila, 2012).

## **16. Pola reproduksi seksual**

Klien tidak bisa melakukan hubungan seksual karena harus menjalani rawat inap dan keterbatasan gerak serta rasa nyeri. Selain itu, klien juga perlu dikaji status perkawinannya termasuk jumlah anak, lama perkawinannya (Padila, 2012).

## **17. Pola penanggulangan stress**

Perasaan cemas, takut, marah, apatis, faktor-faktor stress multiple seperti masalah finansial, hubungan, gaya hidup (Doenges dalam Jitowiyono dan Kristiyanasari, 2010).

**18.** Timbul kecemasan akan kecacatan pada diri dan fungsi tubuhnya.  
Mekanisme koping yang ditempuh klien biasanya tidak efektif (Padila, 2012).

**19.** Pola tata nilai dan keyakinan

Klien tidak dapat melakukan kebutuhan beribadah dengan baik terutama frekuensi dan konsentrasi (Padila, 2012).

**20.** Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik menurut Suratun dkk (2008) antara lain :

a. Keadaan umum :

- 1) Kesadaran penderita : apatis, sopor, koma, gelisah, komposmentis tergantung pada keadaan klien.
- 2) Tanda-tanda vital : Kaji dan pantau potensial masalah yang berkaitan dengan pembedahan : tanda vital, derajat kesadaran, cairan yang keluar dari luka, suara nafas, pernafasan infeksi kondisi yang kronis atau batuk dan merokok.
- 3) Pantau keseimbangan cairan
- 4) Observasi resiko syok hipovolemia akibat kehilangan darah pada pembedahan mayor (frekuensi nadi meningkat, tekanan darah turun, konfusi, dan gelisah)
- 5) Observasi tanda infeksi (infeksi luka terjadi 5-9 hari, flebitis biasanya timbul selama minggu kedua) dan tanda vital
- 6) Kaji komplikasi tromboembolik : kaji tungkai untuk tandai nyeri tekan, panas, kemerahan, dan edema pada betis
- 7) Kaji komplikasi emboli lemak : perubahan pola panas, tingkah laku, dan tingkat kesadaran



- 8) Kaji kemungkinan komplikasi paru dan jantung : observasi perubahan frekuensi nadi, pernafasan, warna kulit, suhu tubuh, riwayat penyakit paru, dan jantung sebelumnya
- 9) Kaji pernafasan : infeksi, kondisi yang kronis atau batuk dan merokok secara sistemik

Menurut Padila (2012) antara lain:

1. Sistem integumen : Terdapat eritema, suhu disekitar daerah trauma meningkat, bengkak, edema, nyeri tekan.
2. Kepala : Tidak ada gangguan yaitu normo cephalik simetris, tidak ada penonjolan, tidak ada nyeri kepala.
3. Leher : Tidak ada gangguan yaitu simetris, tidak ada penonjolan, reflek menelan ada.
4. Muka Wajah : terlihat menahan sakit, tidak ada perubahan fungsi maupun bentuk. Tidak ada lesi, simetris, tak edema
5. Mata : Tidak ada gangguan seperti konjungtiva tidak anemis
6. Telinga : Tes bisik atau weber masih dalam keadaan normal.  
Tidak ada lesi atau nyeri tekan.
7. Hidung: Tidak ada deformitas, tak ada pernafasan cuping hidung.
8. Mulut dan faring : Tak ada pembesaran tonsil, gusi tidak terjadi perdarahan, mukosa mulut tidak pucat.
9. Thoraks : Tak ada pergerakan otot intercostae, gerakan dada simetris
10. Paru

Inspeksi :Pernafasan meningkat, reguler atau tidaknya tergantung pada riwayat penyakit klien yang berhubungan dengan paru.

Palpasi : Pergerakan sama atau simetris, fermitus raba sama

Perkusi : Suara ketok sonor, tak ada redup atau suara tambahan lainnya

Auskultasi : Suara nafas normal, tak ada wheezing atau suara tambahan lainnya seperti stridor dan ronkhi

#### 11. Jantung

Inspeksi : Tidak tampak iktus jantung

Palpasi :Nadi meningkat, iktus tidak teraba

Auskultasi : Suara S1 dan S2 tunggal tak ada mur-mur

#### 12. Abdomen

Inspeksi : Bentuk datar, simetris, tidak ada hernia

Palpasi : Turgor baik, tidak ada defands muskuler hepar tidak teraba

Perkusi : Suara thympani, ada pantulan gelombang cairan

Auskultasi : Kaji bising usus

#### 13. Sistem musculoskeletal

Tidak dapat digerakkan secara bebas dan terdapat jahitan, darah merembes atau tidak.

## B. Diagnosa Keperawatan yang Mungkin Muncul

Berdasarkan SDKI 2017 beberapa diagnose keperawatan yang sesuai dengan kondisi klinis terkait fraktur yaitu:

### 1. Nyeri Akut

#### a. Definisi

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambar dan berintraksi ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan.

#### b. Gejala dan Tanda Mayor

*Subjektif*

Mengeluh Nyeri

*Objektif*

- 1) Tampak meringis
- 2) Bersikap protektif (mis. Posisi menghindari nyeri)
- 3) Gelisah
- 4) Frekuensi nadi meningkat
- 5) Sulit tidur

#### c. Gejala dan tanda Minor

*Subjektif*

Tidak tersedia

*Objektif*

- 1) Tekanan darah meningkat
- 2) Pola napas berubah
- 3) Nafsu makan berubah
- 4) Proses berfikir terganggu

- 5) Menarik diri
- 6) Berfokus pada diri sendiri
- 7) Diaphoresis

## 2. Risiko Infeksi

### a. Definisi

Berisiko mengalami peningkatan terserang organisms patogenik

### b. Faktor Risiko

- 1) Penyakit kronis
- 2) Efek prosedur invasif
- 3) Malnutrisi
- 4) Peningkatan paparan organisme pathogen lingkungan
- 5) Ketidakadekutan pertahanan tubuh primer
  - Gangguan peristaltik
  - Kerusakan integritas kulit
  - Perubahan sekresi pH
  - Merokok
- 6) Ketidakadekutan pertahanan tubuh sekunder
  - a) Penurunan hemoglobin
  - b) Imununosupresi
  - c) Leukopenia

## 3. Gangguan mobilitas fisik

### a. Definisi

Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri

### b. Gejala dan Tanda Mayor

*Subjektif*

Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas

*Objektif*

- 1) Kekuatan otot menurun
- 2) Retang gerak menurun

c. Gejala dan tanda Minor

*Subjektif*

- 1) Nyeri saat bergerak
- 2) Enggan melakukan pergerakan
- 3) Merasa cemas saat bergerak

*Objektif*

- 1) Sendi Kaku
- 2) Gerakan tidak terkoordinasi
- 3) Gerakan terbatas
- 4) Fisik Lemah

**4. Risiko Jatuh**

a. Definisi

Berisiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh

b. Faktor Risiko

- 1) Usia > 65 tahu atau < 2 tahun
- 2) Riwayat jatuh
- 3) Anggota gerak bawah prosetsis
- 4) Penurunan tingkat kesadaran
- 5) Perubahan fungsi kognitif

- 6) Kondisi pasca operasi
- 7) Enemia
- 8) Kekuatan otot menurun
- 9) Gangguan pendengaran
- 10) Gangguan penglihatan

## **5. Risiko Perfusi Perifer Tidak Efektif**

### a. Defenisi

Berisiko mengalami penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh

### b. Faktor Risiko

- 1) Hiperglikemia
- 2) Gaya hidup kurang gerak
- 3) Hipertensi
- 4) Merokok
- 5) Prosedur endovaskuler
- 6) Trauma
- 7) Kurang terpapar informasi tentang faktor pemberat

## **6. Gangguan integritas kulit/jaringan**

### a. Defenisi

Kerusakan kulit (dermis atau epidermis) atau jaringan (membrane mukosa, kornea, fascia, otot, tendon, tulang, ligament)

### b. Gejala dan Tanda Mayor

*Subjektif*

Tidak tersedia

*Objektif*

Kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit

c. Gejala dan tanda Minor

*Subjektif*

Tidak tersedia

*Objektif*

- 1) Nyeri
- 2) Pendarahan
- 3) Kemerahan
- 4) Hematoma

### **C. Perencanaan (SIKI, 2018 ; SLKI, 2019)**

#### **1. Nyeri Akut**

Manajemen Nyeri

##### **a. Tujuan dan kriteria hasil**

Kriteria Hasil

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambar dan berintraksi ringan hingga berat dan konstan dapat menurut dengan kriteria hasil:

- 1) Keluhan nyeri menurun (5)
- 2) Meringis dapat menurun (5)
- 3) Gelisah dapat menurun (5)
- 4) Sikap protektif dapat menurun (5)
- 5) Kesulitan tidur menurun (5)

##### **b. Intervensi keperawatan dan rasional**

1) *Observasi*

a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri

Rasional : mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri dari pasien

b) Identifikasi skala nyeri

Rasional : mengetahui tingkat nyeri yang dirasakan pasien

c) Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri

Rasional : mengetahui hal-hal yang dapat memperberat ataupun memperingan nyeri yang dirasakan pasien

d) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup

Rasional : mengetahui seberapa besar rasa nyeri mempengaruhi kualitas hidup pasien

## 2) *Terapeutik*

a) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam)

Rasional : mengurangi tingkat nyeri pasien/ mengalihkan pasien dari rasa nyerinya

b) Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri

Rasional : mengurangi resiko factor yang dapat memperberat nyeri/menimbulkan nyeri

c) Fasilitasi istirahat dan tidur

Rasional : mengalihkan dan memenuhi kebutuhan istirahat pasien



### 3) *Edukasi*

- a) Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri  
Rasional : memberikan informasi terkait nyeri yang dirasakan pasien
- b) Jelaskan strategi mengatasi nyeri  
Rasional : membantu pasien mengatasi saat rasa nyeri muncul
- c) Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri  
Rasional : pasien dapat mengetahui sendiri karakteristik, penyebab, lokasi saat nyeri muncul
- d) Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri  
Rasional : memudahkan pasien untuk mengontrol nyeri dengan cara sederhana
- 4) *Kolaborasi*
- a) Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu  
Rasional : mengurangi/ menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien

## **2. Risiko Infeksi**

Pencegahan Infeksi

### **a. Tujuan dan Kriteria Hasil**

Kriteria Hasil

Tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil:

- 1) Demam menurun (5)
- 2) Nyeri menurun (5)
- 3) Kadar sel darah putih membaik (5)

### **b. Intervensi Keperawatan dan rasional**

*Observasi*

- 1) Monitor tanda dan gejala infeksi

Rasional :mengetahui tanda dan gejala adanya infeksi

#### *Terapeutik*

- 1) Cuci tangan sesudah dan sebelum kontak dengan pasien

Rasional :mengurangi risiko kontaminasi mikroorganisme

- 2) Pertahankan teknik aseptik

Rasional :mengurangi kontaminasi mikroorganisme

#### *Edukasi*

- 1) Jelaskan tanda dan gejala infeksi

Rasional :memberikan informasi kepada pasien terkait tanda dan gejala infeksi

- 2) Ajarkan etika batuk

Rasional : mencegah penyebaran mikroorganisme saat batuk

#### *Kolaborasi*

- 1) Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi

### 3) **Gangguan Mobilitas Fisik**

Dukungan Mobilisasi

#### a. **Tujuan dan kriteria hasil**

##### **Kriteria Hasil**

Kemampuan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri dapat meningkat dengan kriteria hasil:

- 1) Pergerakan ekstremitas meningkat
- 2) Kekuatan otot meningkat
- 3) Rentang gerak meningkat

## **b. Intervensi keperawatan dan rasional**

### *1) Observasi*

- a) Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya

Rasional : mengetahui keluhan lain pasien dan rencana tindakan berikutnya yang dapat dilakukan

- b) Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan

Rasional : mengetahui kemampuan dan batasan pasien terkait latihan/gerak yang akan dilakukan berikutnya

- c) Monitor frekuensi dan tekanan darah sebelum dan memulai mobilisasi

Rasional : mengetahui adanya perubahan status kerja frekuensi dan tekanan darah pasien

- d) Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi

Rasional: mengetahui kondisi terkini pasien dan perubahan yang dapat terjadi selama melakukan mobilisasi

### *2) Terapeutik*

- a) Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. Berpegang pada pagar tempat tidur)

Rasional : memberikan bantuan kepada pasien saat akan melakukan mobilisasi dan mengurangi resiko jatuh/ sakit saat berpindah

- b) Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu

Rasional : meningkatkan status mobilitas fisik pasien

- c) Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan

Rasional : keluarga dapat secara mandiri membantu pasien melakukan latihan pergerakan.

### 3) *Edukasi*

#### a) Jelaskan tujuan dan Prosedur Tindakan

Rasional : memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan diberikan

#### b) Anjurkan mobilisasi dini

Rasional : untuk mengurangi resiko kekakuan dan kelemahan otot yang berkepanjangan

#### c) Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan (mis. Duduk ditempat tidur, duduk disisi tempat tidur)

Rasional : melatih kekuatan otot dan pergerakan pasien agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi.

## 4) **Risiko Jatuh**

### *Pencegahan Jatuh*

#### **a. Tujuan dan kriteria hasil**

##### **Kriteria Hasil**

Dearajat jatuh berdasarkan observasi atau sumber informasi menurun  
kriteria hasil:

##### 1) Jatuh dari tempat tidur menurun

#### **b. Intervensi keperawatan dan rasional**

##### 1) *Observasi*

#### a) Identifikasi factor risiko jatuh

Rasional :mengetahui factor yang dapat menyebabkan jatuh

#### b) Identifikasi factor lingkungan

Rasional : mengetahui situasi lingkungan sekitar pasien yang dapat menyebabkan jatuh

2) *Terapeutik*

- a) Pasang handrail tempat tidur

Rasional :mencegah pasien jatuh dari tempat tidur

3) *Edukasi*

- a) Anjurkan memanggil perawat saat akan berpindah

Rasional : membantu pasien untuk berpindah dan meminimalisir pasien terjatuh.

5) **Risiko Perfusi Perifer Tidak Efektif**

*Perawatan Sirkulasi*

**a. Tujuan dan kriteria hasil**

**Kriteria Hasil**

Perfusi perifer dapat meningkat dengan kriteria hasil:

- 1) Kekuatan nadi perifer meningkat
- 2) Warna kulit pucat menurun
- 3) Pengisian kapiler membaik
- 4) Akral membaik
- 5) Tugor kulit membaik

**b. Intervensi keperawatan dan rasional**

1) *Observasi*

- a) Periksa sirkulasi perifer (mis. Nadi perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu, ankle brachial index )

Rasional :mengetahui kemungkinan adanya gangguan pada perfusi perifer.

b) Identifikasi factor risiko gangguan sirkulasi

Rasional :beberapa penyakit seperti diabetes , hipertensi , hiperkolesterol dapat menyebabkan gangguan sirkulasi perifer

c) Monitor panas, kemerahan nyeri atau bengkak pada ekstremitas

Rasional : mengetahui adanya masalah atau gangguan yang terjadi pada bagian perifer tubuh

## 2) *Terapeutik*

a) Hindari pemasangan infus atau pengambilan darah diarea keterbatasan perfusi

Rasional :untuk mencegah kekurangan / perubahan sirkulasi perifer

b) Hindari penekana dan pemasangan tourniquet pada area yang cedera

Rasional : sirkulasi perfier yang terganggu dapat memperlambat penyembuhan luka pada area yang cedera

c) Lakukan pencegahan infeksi

Rasional : untuk mencegah munculnya infeksi akibat invasi bakteri

d) Lakukan perawatan kaki dan kuku

Rasional : mencegah terjadinya luka pada kaki

## 3) *Edukasi*

a) Anjurkan berhenti merokok

Rasional :merokok merupakan salah satu pemicu terjadinya ganggaun perfusi perifer

b) Anjurkan berolahraga rutin

Rasional : untuk memperlanjar sikulasi perfusi perifer

- c) Anjurkan minum obat pengotrol tekanan darah

Rasional : penyakit hipertensi merupakan salah satu penyebab gangguan sirkulasi perifer

- d) Anjurkan melakukan perawatan kulit yang tepat

Rasional : mencegah terjadinya luka

## 6) Gangguan integritas kulit

*Perawatan Integritas kulit*

### c. Tujuan dan kriteria hasil

#### Kriteria Hasil

Integritas kulit dapat meningkat dengan kriteria hasil:

- 1) Elastisitas meningkat
- 2) Kerusakan jaringan menurun
- 3) Nyeri menurun
- 4) Pendarahan menurun
- 5) Kemerahan menurun

### d. Intervensi keperawatan dan rasional

#### 1) *Observasi*

- a) Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit/jaringan

Rasional : gangguan integritas kulit/jaringan dapat terjadi karena perubahan sirkulasi, perubahan nutrisi, penurunan kelembaban, suhu lingkungan ekstrim dan penurunan mobilitas

#### 2) *Terapeutik*

- a) Ubah posisi tiap 2 jam tirah baring



Rasional :mencegah terjadinya lesi atau ulkus pada kulit yang tertindis

- b) Gunakan produk berbahan petroleum aatau minyak pada kulit kering

Rasional : untuk menjaga kelembaban kulit

- c) Hindari produk berbahan dasar alcohol

Rasional : produk berbahan dasar alcohol dappat mengiritasi kulit

### 3) *Edukasi*

- a) Anjurkan menggunakan pelembab

Rasional :menjagan kelembaban kulit

- b) Anjurkan minum air yang cukup

Rasional : menjaga status hidrasi kulit

- c) Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi


Rasional : menjaga kesehatan kulit tetap baik

- d) Anjurkan menggunakan tabir surya

Rasional : sinar matahari dapat menyebabkann kerusakn kulit/

senssai terbakar

## PENYIMPANGAN KDM



### 3. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan

Salah satu gejala dari fraktur yaitu nyeri akut. Nyeri merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional yang berlangsung kurang dari 3 bulan (SDKI, 2017). Sehingga berbicara terkait nyeri merupakan salah satu masalah yang muncul di kategori gangguan rasa nyaman (nyeri). Terkait dengan teori keperawatan yang membahas tentang kenyamanan ini sama hal yang disebutkan dalam teori Katharina Kolchaba.

Katharina Colcaba. Menurut Wirastri dalam buku Risnah & Irwan, M. (2021) teori comfort merupakan *middle range theory*, karena memiliki batasan konsep dan proposisi, tingkat abstraksinya rendah dan mudah diterapkan pada pelayanan keperawatan. Teori ini lebih mengedapankan kenyamanan sebagai kebutuhan semua manusia. Kenyamanan yang dimaksud adalah kebutuhan yang diperlukan pada rentang sakit hingga sehat dan kenyamanan merupakan label tahap akhir dari tindakan terapeutik perawat kepada klien (Risnah & Irwan, M. 2021). Secara umum Kolcaba menuliskan di dalam teori comfort yang dikembangkan adanya holistic comfort yang merupakan sebuah bentuk kenyamanan yang mencakup tiga tipe kenyamanan yaitu, *Relief* (kelegaian), *Ease* (ketentraman) dan *Transcendence* (Ilmiasih, Nurhaeni dan waluyanti, 2015; Alligood, 2017).

Menurut Alligood (2017), terdapat beberapa asumsi yang mendasari teori kalkoba yaitu:

1. Setiap individu menunjukkan respons holistic terhadap stimulus kompleks yang diterima
2. Kenyamanan adalah hasil holistic yang ingin dicapai oleh setiap individu dan erat kaitannya dengan disiplin keperawatan

3. Kenyamanan adalah kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan dan harus dipenuhi oleh setiap individu. Hal ini merupakan usaha aktif.
4. Pencapaian kenyamanan seorang individu memberikan kekuatan bagi klien dalam membentuk setiap kesadaran terkait kesehatan dirinya.
5. Klien yang menunjukkan kesadaran terkait kesehatan dirinya yang tinggi cenderung memiliki kepuasan tersendiri dengan asuhan yang diperoleh.
6. Integritas, institusi didasari oleh orinetasi siswa nilai penerima asuhan. Sama pentingnya orientasi terhadap promosi kesehatan, asuhan holistic dalam konteks keluarga dan pemberi asuhan.

#### 4. *Evidence Based Nursing*

##### 1. **Teknik relaksasi nafas dalam**

Teknik relaksasi merupakan metode yang dapat dilakukan pada pasien yang mengalami nyeri, merupakan latihan pernapasan yang menurunkan konsumsi oksigen, frekuensi pernapasan, frekuensi jantung dan ketegangan otot. Teknik relaksasi perlu diajarkan beberapa kali agar mencapai hasil yang optimal dan perlunya instruksi menggunakan teknik relaksasi untuk menurunkan atau mencegah meningkatnya nyeri. Relaksasi nafas dalam merupakan teknik relaksasi yang dapat menurunkan nyeri dengan cara merangsang susunan saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang untuk memproduksi endorphen yang berfungsi sebagai penghambat nyeri. Selain dapat mengatasi nyeri, teknik relaksasi juga dapat membuat pasien dapat mengontrol diri ketika terjadi stress fisik dan emosi (Suwahyu, Romy., et al. 2021).

Menurut Yusuf, Iswari, Sriyono, & Yunitasari dalam hasil penelitiannya, prosedur pelaksanaan relaksasi nafas dalam yang diberikan

adalah ciptakan lingkungan yang tenang, menarik nafas dalam dari hidung dan mengisi paru-paru dengan udara melalui hitungan 1,2,3 (dalam hati), perlahan-lahan udara dihembuskan melalui mulut sambil merasakan ekstremitas atas dan bawah rileks, anjurkan bernapas dengan irama normal 3 kali, menarik napas lagi melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan, membiarkan telapak kaki rileks, usahakan tetap konsentrasi atau mata sambil terpejam, pada saat konsentrasi pusatkan pada daerah yang nyeri, anjurkan untuk mengurangi prosedur hingga nyeri terasa berkurang, ulangi sampai 15 kali, dengan selingi istirahat singkat 5 kali dan bila nyeri hebat pasien dapat bernapas secara cepat dan dangkal (Yusuf, Iswari, Sriyono, & Yunitasari. 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Smeltzer (2010) mengemukakan teknik relaksasi dapat menurunkan nyeri dengan merileksasikan ketegangan otot yang menunjang nyeri. Teknik relaksasi terdiri atas nafas abdomen dengan frekuensi lambat, berirama. Klien dapat memejamkan matanya dan bernafas dengan perlahan dan nyaman.

## **2. Terapi Murottal**

Terapi murottal merupakan terapi baca Al-Qur'an yang dibacakan oleh Qori' atau Qori'ah sesuai dengan tartil dan tajwin yang dialunkan dengan indah yang dibuat dalam bentuk media audio seperti kaset, *Compact Disk* (CD), atau digital. Pemberian terapi murottal terbukti mampu mengaktifkan sel-sel tubuh dengan mengubah suatu getaran menjadi getaran yang dapat diterima tubuh untuk selanjutnya dapat merangsang reseptor nyeri dan merangsang otak untuk mengeluarkan analgetik yang ada dalam tubuh yaitu opioid natural endogen yang dapat memblokade nociseptor (Sulistiyawati & Widodo. 2020). Menurut Rilla E.V., Elwiyah R, Aat S (2014), faktor pendukung pelaksanaan terapi

murottal yaitu bunyi-bunyian dengan frekuensi sedang cenderung merangsang jantung, paru, dan emosi serta untuk meningkatkan relaksasi fisiologis yang diindikasikan dengan penurunan nadi, respirasi dan tekanan darah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh terapi musik dan terapi murottal terhadap penurunan tingkat nyeri dan kestabilan tanda-tanda vital. Lantunan Al-Qur'an mengandung suara manusia, sedangkan suara manusia merupakan instrument penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau yang dapat menurunkan hormone-hormon stress dan menurunkan nyeri (Thalbah, 2013).

Kondisi ini juga telah di sampaikan dalam Al-Qur'an “ *(Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram*” (Qs. Rad: [13]: 28).

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dengan mendengarkan ayat-ayat Allah hati akan menjadi tenang dan nyaman sehingga dapat mengalihkan rasa sakit yang dialami.

### **3. Tujuan**

- a. Pemberian teknik relaksasi nafas dalam bertujuan untuk mereleksasikan otot skeletal, dapat menurunkan nyeri dengan merileksasikan ketegangan otot yang menunjang nyeri. Setelah dilakukan teknik relaksasi nafas dalam terdapat hormone yang dihasilkan yaitu hormone adrenalin dan hormone kortison. Kadar PaCO<sub>2</sub> akan meningkat dan menurunkan PH sehingga akan meningkatkan kadar oksigen dalam darah (Sumahyu, Romi et., al. 2021).

b. Mendengarkan terapi murottal

Bertujuan dapat menurunkan hormone-hormon stress, mengaktifkan hormone endofrin alami (serotonin). Mekanisme ini dapat meningkatkan perasaan rileks, mengurangi perasaan takut, cemas, nyeri dan tegang serta memperbaiki sistem kimia (Susanti, Susi., et al. 2019). Gejala utama yang muncul dan dirasakan klien post operasi yaitu nyeri hebat. Hal ini menjadikan klien akan terganggu dan menjadi faktor stressor bagi klien selama dalam perawatan di rumah sakit. Salah satu teknik manajemen nyeri adalah terapi murottal Al-Qur'an.

**4. Indikasi**

Beberapa kondisi yang mendukung dilakukannya terapi murottal dan teknik relaksasi nafas dalam yaitu klien yang mengalami nyeri, perawat perlu melakukan pengkajian nyeri yang tepat dan pengukuran tingkat nyeri yang tepat dalam memberikan intervensi keperawatan pada klien (Morton & Fontaine. 2013).

**5. Kontraindikasi**

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan intervensi ini yaitu kondisi klien yang bisa mengalami perubahan kapanpun maka akan bisa menghambat pelaksanaan terapi ini, alat yang digunakan seperti handphone dan headphone mengalami kehabisan baterai dan kerusakan juga akan menghambat pelaksanaan terapi ini (Sisnawati H, & Umami K., 2017).

**6. Prosedur pemberian dan rasionalisasi**

Pemberian terapi murottal yang diberikan terdiri dari beberapa tahap yaitu pra interaksi yaitu menyiapkan SOP mendengarkan terapi murottal (Qs. Ar-Rahman), menyiapkan alat, melihat data atau status pasien, melihat

intervensi keperawatan yang telah diberikan perawat, mengkaji kesiapan pasien untuk melakukan terapi mendengarkan murottal Ar-Rahman, menyiapkan ruangan yang tenang dan tidak ada kebisingan, mencuci tangan. Tahap orientasi dengan memberikan salam dan memperkenalkan diri, menanyakan identitas pasien dan menyampaikan kontrak waktu, menjelaskan tujuan dan prosedur, menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien.

Tahap kerja yaitu membaca basmalah, posisikan klien berbaring dengan meletakkan tangan di samping badan, instruksikan klien melakukan teknik nafas dalam 3 kali atau sampai klien merasa rileks. Pasang headset/ headphone yang sudah disambungkan ke Hp di kedua telinga klien, nyalakan murottal sambil menginstruksikan klien untuk menutup mata, instruksikan klien memfokuskan pikirannya pada lantunan ayat-ayat Ar-Rahman 78 ayat selama  $\pm$  20 menit, setelah selesai kemudian instruksikan klien membuka mata dan melakukan teknik nafas dalam sebanyak 3 kali atau sampai pasien merasa rileks. Tahap terminasi melakukan evaluasi Tindakan, menganjurkan klien untuk melakukan Kembali teknik mendengarkan terapi murottal Al-Qur'an dan teknik relaksasi nafas dalam jika nyeri. Berpamitan dengan klien, mencuci tangan, mencatat dalam lembar catatan keperawatan (Fasa, I.F, Firmawati, E., 2016).

Sebelum dan sesudah intervensi dilanjutkan pemberian terapi murottal dan nafas dalam, sehari satu kali intervensi beserta evaluasi Tindakan yang dilakukan perawat selama 25 menit dan secara mandiri oleh klien apabila nyeri timbul. Terapi diberikan 2 jam setelah klien meminum obat analgetik agar respon penurunan nyeri akibat intervensi murottal dan bukan karena efek obat analgetik yang telah diberikan (Dahlan, M.S., 2019).



## 7. Kriteria Evaluasi

Setelah diberikan intervensi teknik relaksasi nafas dalam dan terapi murottal diharapkan klien mampu melakukan, mengontrol nyeri dengan mandiri dan dengan kriteria hasil (SLKI, 2018):

- a. Nyeri menurun (5)
- b. Meringis menurun (5)
- c. Kemampuan meningkatkan aktivitas meningkat (5)



## BAB III

### LAPORAN KASUS

#### ASUHAN KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH DENGAN GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL DENGAN DIAGNOSA OPEN FRAKTUR 1/3 TIBIA ET FIBULA DISTAL DI RUANG PERAWATAN BAJI KAMASE DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR

Nama Mahasiswa : Asrawati, S.Kep

NIM : 70900119042

#### IDENTITAS KLIEN

Nama klien : "Tn. B"

Diagnosa medis : Open fraktur 1/3 tibia et fibula distal

Umur : 57 tahun

Tanggal pengkajian : Rabu, 10 Maret 2021/ 14:25 Wita

#### 1. PENGKAJIAN

##### PENGKAJIAN AWAL

Ruang Rawat : Baji kamse No 212

No. Rekam medik :

Tgl/jam masuk : Selasa, 9 Maret 2021/20:15 Wita

Tgl/jam pengambilan data : Rabu, 10 Maret 2021/14: 25 Wita

Diagnosa masuk : Open fraktur 1/3 tibia et fibula distal

Cara masuk : Brankar

Kiriman dari : RSUD H. Padjong Dg Ngalle Takalar

Pindahan dari : IGD

Perawat/tim yg b. Jawab :

##### A. IDENTITAS

Nama : "Tn. B"

Umur : 57 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Petani

Suku : Makassar

Agama : Islam

Alamat : Ujung Bori, Takalar  
Sumber informasi : Klien dan keluarga

## **B. RIWAYAT KESEHATAN**

Keluhan utama : Nyeri  
Keluhan saat ini : Klien mengatakan nyeri dirasakan pada kaki sebelah kiri sejak dua hari yang lalu setelah mengalami kecelakaan tunggal bermotor. Klien mengatakan skala nyeri sedang (6) dengan frekuensi menetap dengan kualitas perih. Klien mengatakan sulit bergerak dan hanya bisa beraktivitas di atas tempat tidur dan nampak segala aktivitas dibantu oleh keluarga. Klien mengatakan kurang nafsu makan dan hanya makan 2 sendok di setiap jam makan.

## **C. KEADAAN UMUM**

Kesadaran : Composmentis  
GCS : 15, E: 4 V:5 M:6  
Pengetahuan : Pasien mengerti dengan penyakitnya  
Pasca operasi : Open fraktur 1/3 tibia et fibula distal

## **D. KEBUTUHAN DASAR**

### **NYERI**

Suhu : 36,4°C  
Gambaran nyeri : Klien mengatakan nyeri sedang dirasakan pada kaki sebelah kiri dengan kualitas perih dan frekuensi menetap  
P : Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan  
Q : Perih  
R : Ekstremitas bawah sinistra  
S : 6, nyeri sedang

T : Menetap

Respon emosional : Klien nampak meringis kesakitan saat diberi penekanan pada nyeri (Saat ganti verband)

Cara mengatasi nyeri : Tidur

Gambaran nyeri post op : Klien mengatakan nyeri meningkat setelah operasi.

P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan

Q: berat, perih

R: ektermitas bawah sinistra

S: 8, nyeri hebat

T: terus-menerus

Respon emosional post op : Klien nampak meringis kesakitan. Klien nampak menggeleng-gelengkan kepalanya.

**Masalah keperawatan : Nyeri Akut**

#### NUTRISI

TB : 170 cm

BB : 60 kg

Kebiasaan makan : Istri klien mengatakan sebelum sakit klien tidak terbiasa sarapan dengan makanan berat hanya meminum kopi dan makan dengan porsi besar 2x sehari. Istri klien mengatakan sejak sakit klien hanya mampu menghabiskan 2 sendok bubur yang diberikan setiap jam makan. Klien mengatakan tidak mampu menghabiskan porsi makanan yang diberikan. Makanan klien nampak tidak dihabiskan

Keluhan saat ini : Klien mengatakan tidak mampu menghabiskan porsi makanan yang diberikan

Pembesaran tiroid : Tidak ada  
 Massa : Tidak ada  
 Holitosis : Ada  
 Kondisi gigi/gusi : Nampak gigi seri bagian atas depan telah tanggal  
 Penampilan lidah : Permukaan lidah nampak warna putih  
 Bising usus : Tidak ada  
 Jenis cairan terpasang : RL 500 cc 23 tpm  
 Porsi makan yg dihabiskan : Isteri klien mengatakan klien hanya mampu menghabiskan 2 sendok makanan yang diberikan  
 Makanan disukai : -  
 Diet : Tidak ada  
**Masalah keperawatan : Risiko Defisit Nutrisi**

#### CAIRAN

Kebiasaan minum : Klien mengatakan sebelum sakit kadang-kadang hanya minum air putih setelah makan  $\pm$ 1500 cc perhari. Klien mengatakan sering mengkonsumsi kopi  
 Jenis : Air putih dan kopi  
 Turgor kulit : Baik  
 CRT : <2 detik  
 Mata : Cekung  
 Konjungtiva : Tidak anemis  
 Sklera : Berwarna merah, nampak akumulasi darah pada sklera  
 Edema : Tidak ada edema  
 Distensi V.Jugularis : Tidak ada  
 Asites : Tidak ada  
 Spider Navy : Tidak ada  
 Infuse : Terpasang infuse RL 500 CC 23 tpm  
**Masalah keperawatan : Tidak ada**

## PERSONAL HYGNE

- Kebiasaan mandi : Klien mengatakan selama sakit belum pernah mandi. Isteri klien mengatakan selama sakit klien belum pernah mandi menggunakan waslap
- Cuci rambut : Klien mengatakan selama sakit tidak pernah cuci rambut
- Kebiasaan gosok gigi : Klien mengatakan selama dirawat tidak pernah menggosok gigi
- Kebersihan badan : Nampak kotor pada abdomen, kedua tangan dan ekstremitas
- Keadaan rambut : Distribusi rambut normal, dominan beruban
- Keadaan kulit kepala : Kotor
- Keadaan kuku : Kuku nampak kotor dan panjang
- Keadaan vulva/perineal : Tidak dikaji
- Keluhan saat ini : Klien mengatakan merasa tidak nyaman dengan kondisinya
- Integritas kulit : Baik
- Keadaan luka : Open fraktur pada tibia et fibula terpasang verband dan spalak. Terdapat luka terbuka pada occipital dektra
- Masalah keperawatan : Defisit Perawatan diri**

## AKTIVITAS DAN LATIHAN

- Aktivitas waktu luang : Klien mengatakan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Klien nampak berbaring
- Aktivitas/hoby : Klien mengatakan sehari-hari beraktivitas sebagai petani di sawah dan baru-baru ini selesai panen padi
- Kesulitan bergerak : Klien mengatakan sulit menggerakkan kaki sebelah kiri.

- Postur : tidak dapat dikaji secara keseluruhan karena pasien hanya mampu berbaring
- Rentang gerak : Terbatas
- Keluahn saat ini : Klien mengatakan kesulitan bergerak, karena terdapat nyeri pada ekstremitas bawah sinistra pasca kecelakaan
- Penggunaan alat bantu : Tidak ada penggunaan alat bantu. Klien nampak hanya mampu bergerak di atas tempat tidur
- Pelaksanaan aktivitas : Nampak segala aktivitas dibantu oleh keluarga
- Jenis aktivitas yg perlu dibantu : Pemenuhan cairan dan nutrisi, personal hygiene, eliminasi
- Kekuatan otot : 
$$\begin{array}{r|l} 5 & 5 \\ \hline 1 & 5 \end{array}$$
- Masalah keperawatan : Gangguan mobilitas fisik**

#### ELIMINASI

- Kebiasaan BAB :
- Sebelum sakit : 1-2 kali sehari
  - Saat sakit : Klien mengatakan sejak sakit satu kali pernah BAB. klien mengatakan terkahir kali BAB 1 hari yang lalu
- Kebiasaan BAK :
- Sebelum sakit : 1-2 kali sehari
  - Saat sakit : Terpasang cateter urin dengan pengeluaran 300 cc
- Penggunaan diuretic : Tidak ada
- Peristaltik usus : 12x / menit
- Abdomen : Tidak ada pembesaran massa, tidak ada nyeri tekan. Terdapat perbedaan warna abdomen pada kuadran 2 & 3 dengan kuadran lainnya

Kateter urin : Terpasang kateter urin  
**Masalah keperawatan : Tidak ada masalah**

### **OKSIGENASI**

Nadi : 82x/i  
Pernapasan : 24x/i  
Tekanan Darah : 110/60 mmHg  
Respirasi : Tidak ada penggunaan alat bantu napas, tidak suara napas tambahan, tidak ada pernapasan cuping hidung  
Sputum : Tidak ada produksi sputum  
Sirkulasi oksigenasi : Baik, klien tidak merasa pusing  
Dada : Tidak ada penggunaan otot bantu napas  
Oksigen kanul/mask : Tidak terpasang  
WSD : Tidak terpasang  
Riwayat penyakit : Klien mengatakan pernah dirawat di Rumah Sakit tiga tahun yang lalu karena .....

**Masalah keperawatan : Tidak ada**

### **ISTIRAHAT DAN TIDUR**

Kebiasaan tidur malam

- Sebelum sakit : Klien mengatakan sebelum sakit tidur malam mulai pukul 23.00-06.00 dengan kualitas nyenyak
- Saat sakit : Klien mengatakan selama sakit tidak ada gangguan tidur. Klien mengatakan selama sakit lebih banyak tidur

Lama tidur

- Malam : Klien mengatakan tidur malam  $\pm 8$  jam
- Siang : Klien mengatakan tidur siang  $\pm 2$  jam

Cara mengatasi : -

**Masalah keperawatan : Tidak ada masalah**



## NEUROSENSORI

Rasa ingin pingsan	:	Tidak ada, klien mengatakan tidak pusing
Stroke	:	Tidak ada riwayat
Kejang	:	Klien mengatakan tidak memiliki riwayat kejang
Status mental	:	Baik. klien mampu mengenali waktu, tempat dan orang-orang di sekitarnya
Kesadaran	:	Composmentis. GCS 15
Memori	:	Baik, klien mampu mengingat kejadian masa lampau
Kama mata	:	Klien tidak menggunakan kaca mata
Alat bantu dengar	:	Klien tidak menggunakan alat bantu dengar
Ukuran reaksi pupil	:	2 mm kiri dan kanan, isokor, miosis
Facial drop	:	Tidak ada
Genggaman tangan	:	Genggaman kedua tangan kuat
<b>Masalah keperawatan</b>	:	<b>Tidak ada masalah</b>

## PENCEGAHAN TERHADAP BAHAYA

Refleksi	:	Baik
Penglihatan	:	Klien dapat melihat secara normal
Pendengaran	:	Klien dapat mendengar dan merespon suara
Penciuman	:	Penciuman klien baik
Perabaan	:	Kemampuan meraba klien baik
<b>Masalah keperawatan</b>	:	<b>Tidak ada masalah</b>

## KEAMANAN

Alergi	:	Klien mengatakan tidak memiliki riwayat alergi
Riwayat penyakit	:	Klien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit menular
Prilaku risiko tinggi	:	Tidak ada
Transfusi darah	:	Tidak pernah
Riwayat cedera	:	Klien menegatakan mengalami kecelakaan kurang 2 hari yang lalu

Fraktur : Terdapat open fraktur 1/3 tibia et fibula distal sinistra

Atritis sendi : Tidak ada

Masalah punggung : Tidak ada

Kekuatan punggung : Tidak dapat dikaji karena pasien hanya mampu berbaring

ROM : Terbatas

**Masalah keperawatan : Tidak ada**

#### SEKSUALITAS

Hubungan seksual : Aktif

Penggunaan kondom : Klien mengatakan tidak pernah menggunakan

Gangguan prostat : Klien mengatakan tidak memiliki riwayat gangguan prostat

Sirkumsisi : Klien mengatakan melakukan sirkumsisi waktu SD

**Masalah keperawatan : Tidak ada**

#### INTERAKSI SOSIAL

Masalah kesehatan/stres : Klien mengatakan merasa bosan

Cara mengatasi stres : -

Orang pendukung lain : Keluarga

Sosiologis : Komunikasi lancar

Perubahan bicara : Tidak ada

Laringektomi : Tidak ada

Psikologis : Baik

Keputusan : Tidak ada

Komunikasi verbal : Baik. lancar. Klien mampu berkomunikasi dan kooperatif dengan perawat

Spiritual : Klien mengatakan selama sakit tidak pernah melaksanakan shalat

Kegiatan keagamaan : Klien mengatakan tidak mengikuti kegiatan keagamaan di tempat tinggalnya

Gaya hidup : Klien mengatakan aktivitas sehari-harinya adalah berkebun

**Masalah keperawatan : Tidak ada masalah**

#### **E. PENYULUHAN DAN PEMBELAJARAN**

Bahasa dominan : Indonesia

Informasi yang diberikan : Pengaturan jam besuk

: Hak dan kewajiban klien

: Petugas yang merawat

Masalah yang dijelaskan : Perawatan diri di RS

: Obat-obatan yang diberikan

: Modifikasi diet

#### **Obat yang diresepkan**

<b>Obat</b>	<b>Dosis</b>	<b>Waktu</b>	<b>Rute</b>	<b>Tujuan</b>
ceftriaxone	1 gr	06.00 Wita	IV	Infeksi bakteri
Ketocrolac	1 Amp	07.00 Wita	IV	Nyeri
Gentamicin	1 Amp	15. 00 Wita	IV	Infeksi bakteri
Ranitidin	1Amp	06.00 Wita	IV	Asam lambung

Faktor risiko keluarga : Ibu klien mengatakan keluarga klien tidak memiliki riwayat penyakit menular dan tidak menular



**PEMERIKSAAN PENUJANG****HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM****Tgl 13 Maret 2021**

<b>Jenis Pemeriksaan</b>	<b>Hasil</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Satuan</b>
<b>Kimia Klinik</b>			
SGOT	47	L:37 P:31	UI/L
SGPT	18	L:42 P:32	UI/L
Bilirubin Total	-	0.2 1.0	Mg/dl
Bilirubin Direk	-	0.05 0.3	Mg/dl
Bilirubin Indirek	-	-	-
Kolesterol Total	-	200	Mg/dl
Kolesterol LDL	-	130	Mg/dl
Kolesterol HDL	-	L: 35-55 P:45-55	Mg/dl
Trigliserida	-	150	Mg/dl
Ureum	22.8	10-50	Mg/dl
Kreatinin	1.11	0.6-1.1	Mg/dl
Asam Urat	-	L:3.4-7 P:2.4-5.7	Mg/dl
Gula Darah Sewaktu	149	110	Mg/dl
Gula Darah Puasa	-	100	Mg/dl
Gula Darah 2 jam PP	-	140	Mg/dl
Protein Total	-	6.6-8.7	Gr/dl
Albumin	-	3.4-4.8	Gr/dl
Globulin	-	-	-
Natrium	-	135-150	mmoI/L
Kalium	-	3.5-5.5	mmoI/L

**Hasil Pemeriksaan Foto Rontsen:**

**Pre post (Tgl 9/ Maret 2021)**




**Post op (Tgl 14/ Maret 2021)**



**Gambar: 2.1**

## PATOFISIOLOGI PENYIMPANGAN KDM



### KLASIFIKASI DATA

OBJEKTIF	SUBJEKTIF
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran composmentis</li> <li>2. GCS 15</li> <li>3. TTV Suhu: 36.4°C TD: 110/60 mmHg</li> <li>4. Open fraktur 1/3 tibia et fibula disnistra distal</li> <li>5. P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan Q: sedang, perih R: sektermitas bawah sinistra S: 6, nyeri sedang T: menetap</li> <li>6. Klien nampak meringis saat diberi penekanan pada nyeri (Saat ganti verband)</li> <li>7. Makanan klien nampak tidak dihabiskan</li> <li>8. Nampak gigi seri bagian atas depan telah tanggal</li> <li>9. Badan nampak kotor pada abdomen, kedua tangan dan ekstremitas</li> <li>10. Keadaan kulit kepala nampak kotor</li> <li>11. Kuku nampak kotor dan panjang</li> <li>12. Klien nampak berbaring</li> <li>13. Klien nampak hanya mampu bergerak di atas tempat tidur</li> <li>14. Rentang gerak klien terbatas</li> <li>15. Nampak segala aktivitas dibantu oleh keluarga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan nyeri dirasakan pada kaki sebelah kiri sejak dua hari yang lalu setelah mengalami kecelakaan tunggal bermotor</li> <li>2. Klien mengatakan skala nyeri sedang (6) dengan frekuensi menetap dengan kualitas perih</li> <li>3. Klien mengatakan nyeri sedang dirasakan pada kaki sebelah kiri dan terasa perih dengan frekuensi menetap</li> <li>4. Klien mengatakan kesulitan bergerak, karena nyeri pada kaki sebelah kiri setelah kecelakaan</li> <li>5. Klien mengatakan sulit menggerakkan kaki sebelah kirinya</li> <li>6. Klien mengatakan hanya bisa berbaring di tempat tidur.</li> <li>7. Klien mengatakan sulit bergerak dan hanya bisa beraktivitas di atas tempat tidur.</li> <li>8. klien mengatakan kurang nafsu makan dan hanya makan 2 sendok di setiap jam makan</li> <li>9. Isteri klien mengatakan sejak sakit klien hanya mampu menghabiskan 2 sendok bubur yang diberikan setiap jam makan.</li> </ol>



<p>16. Kekuatan otot</p> $\begin{array}{r l} 5 & 5 \\ \hline 1 & 5 \end{array}$ <p>17. Nyeri post op:</p> <p>P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan</p> <p>Q: berat, perih</p> <p>R: ektermitas bawah sinistra</p> <p>S: 8, nyeri hebat</p> <p>T: terus-menerus</p> <p>18. Klien nampak menggeleng-gelengkan kepalanya.</p>	<p>10. Klien mengatakan tidak mampu menghabiskan porsi makanan yang diberikan</p> <p>11. Klien mengatakan selama sakit belum pernah mandi</p> <p>12. Isteri klien mengatakan selama sakit klien belum pernah mandi menggunakan waslap</p> <p>13. Klien mengatakan selama sakit tidak pernah cuci rambut</p> <p>14. Klien mengatakan selama dirawat tidak pernah menggosok gigi</p> <p>15. Klien mengatakan merasa tidak nyaman dengan kondisinya</p> <p>16. Klien mengatakan nyeri meningkat setelah operasi.</p>
---	---

### KATEGORISASI DATA

KATEGORI	SUBKATEGORI	DATA SUBKETIF &OBJEKTIF
Fisiologi	Respirasi	Do: RR: Tidak ada pernapasan cuping hidung Tidak ada penggunaan alat bantu napas
	Sirkulasi	Do: TD: 110/60 mmHg Suhu: 36.4°C CRT: <2 detik
	Nutrisi dan cairan	Ds: 1. Klien mengatakan kurang nafsu makan dan hanya makan 2 sendok di setiap jam makan 2. Isteri klien mengatakan sejak sakit klien hanya mampu menghabiskan 2 sendok bubur yang diberikan setiap jam makan. 3. Klien mengatakan tidak mampu menghabiskan porsi makanan yang diberikan
	Eliminasi	Ds: 1. Klien mengatakan terakhir BAB 1 hari yang lalu Do: 2. Terpasang cateter urin dengan jumlah 300 cc
	Aktivitas dan istirahat	Ds: 1. Klien mengatakan sulit bergerak dan hanya bisa beraktivitas di atas tempat tidur 2. Klien mengatakan hanya bisa berbaring di tempat tidur.

		<p>3. Klien mengatakan sulit menggerakkan kaki sebelah kirinya.</p> <p>4. Klien mengatakan kesulitan bergerak, karena nyeri pada kaki sebelah kiri setelah kecelakaan</p> <p>5. Klien mengatakan selama sakit tidak pernah shalat</p>
	Neurosensori	<p>Do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada penggunaan alat bantu melihat dan mendengar</li> <li>2. Indra penciuman dan perabaan baik</li> </ol>
	Reproduksi dan seksualitas	<p>Ds:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan melakukan sirkumsisi waktu SD</li> </ol>
Psikologis	Nyeri dan kenyamanan	<p>Ds:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan nyeri dirasakan pada kaki sebelah kiri sejak dua hari yang lalu setelah mengalami kecelakaan tunggal bermotor</li> <li>2. Klien mengatakan nyeri sedang dan terasa perih dengan frekuensi menetap</li> </ol> <p>Do:</p> <p>P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan</p> <p>Q: sedang, perih</p> <p>R: sektermitas bawah sinistra</p> <p>S: 6, nyeri sedang</p> <p>T: menetap</p> <p>Ds:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Klien mengatakan nyeri meningkat setelah operasi.</li> </ol>

		<p>Do:</p> <p>P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan</p> <p>Q: berat, perih</p> <p>R: ektermitas bawah sinistra</p> <p>S: 8, nyeri hebat</p> <p>T: terus-menerus</p>
	Integritas ego	Ds: Klien nampak meringis saat diberi penekanan pada nyeri (Saat ganti verband)
	Pertumbuhan dan perkembangan	Tidak ada masalah khusus
Perilaku	Kebersihan diri	<p>Ds:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan selama sakit belum pernah mandi</li> <li>2. Isteri klien mengatakan selama sakit klien belum pernah mandi menggunakan waslap</li> <li>3. Klien mengatakan selama sakit tidak pernah cuci rambut</li> <li>4. Klien mengatakan selama dirawat tidak pernah menggosok gigi</li> <li>5. Klien mengatakan merasa tidak nyaman dengan kondisinya</li> </ol>
	Penyuluhan dan pembelajaran	<p>Do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahasa dominan yang digunakan Bahasa Indonesia</li> <li>2. Informasi yang diberikan: Pengaturan jam besuk, Hak dan kewajiban klien, Petugas yang merawat</li> </ol>
	Interaksi sosial	<p>Ds:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan merasa bosan</li> </ol>

		<p>2. Komunikasi verbal klien Baik. lancar. Klien mampu berkomunikasi dan kooperatif dengan perawat</p> <p>3. Klien mengatakan selama sakit tidak pernah melaksanakan shalat</p>
	Keamanan dan proteksi	<p>Do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open fraktur 1/3 tibia et fibula sinistra distal</li> <li>2. Tidak penggunaan alat bantu penglihatan dan pendengaran</li> </ol>



### ANALISIS DATA

NO	DATA	ETIOLOGI	MASALAH KEPERAWATAN
1	<p><b>Data Subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klien mengatakan nyeri dirasakan pada kaki sebelah kiri sejak dua hari yang lalu setelah mengalami kecelakaan tunggal bermotor</li> <li>Klien mengatakan nyeri sedang dan terasa perih dengan frekuensi menetap</li> </ol> <p><b>Data Objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>TTV Suhu: 36.4°C TD: 110/60 mmHg</li> <li>Open fraktur 1/3 tibia et fibula disnistra distal</li> <li>P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan Q: sedang, perih R: sektermitas bawah sinistra S: 6, nyeri sedang T: menetap</li> <li>Klien nampak meringis saat diberi penekanan pada nyeri (Saat ganti verband)</li> </ol>	<p>Trauma (KKL)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Inflamasi jaringan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pelepasan mediator kimiawi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Rangsangan nosiseptor</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Implus nyeri</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Medulla spinalis</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Hipotalamus</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Korteks serebri</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Nyeri dipersepsikan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Nyeri Akut</p>	<p><b>Nyeri akut</b></p>
2	<p><b>Data subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klien mengatakan sulit bergerak dan hanya bisa beraktivitas di atas tempat tidur</li> </ol>	<p>Trauma (KKL)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Deformitas</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Penurunan fungsi otot dan tulang</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p><b>Gangguan Mobilitas Fisik</b></p>

	<p>2. Klien mengatakan hanya bisa berbaring di tempat tidur.</p> <p>3. Klien mengatakan sulit menggerakkan kaki sebelah kirinya</p> <p>4. Klien mengatakan kesulitan bergerak, karena nyeri pada kaki kiri setelah kecelakaan</p> <p><b>Data objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien nampak berbaring</li> <li>2. Klien nampak hanya mampu bergerak di atas tempat tidur</li> <li>3. Nampak segala aktivitas klien dibantu oleh keluarga</li> <li>4. Jenis aktivitas yang perlu dibantu: pemenuhan cairan dan nutrisi, personall hygne dan eliminasi</li> <li>5. Kekuatan otot</li> </ol> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">1</td> <td style="border-top: 1px solid black;">5</td> </tr> </table>	5	5	1	5	<p>Keterbatasan gerak</p> <p>↓</p> <p>Gangguan Mobilitas Fisik</p>	
5	5						
1	5						
3	<p><b>Data subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan selama sakit belum pernah mandi</li> <li>2. Istri klien mengatakan selama sakit klien belum pernah mandi menggunakan waslap</li> <li>3. Klien mengatakan selama sakit tidak pernah cuci rambut</li> <li>4. Klien mengatakan selama dirawat tidak pernah menggosok gigi</li> </ol>	<p>Trauma (KKL)</p> <p>↓</p> <p>Inflamasi jaringan</p> <p>↓</p> <p>Perubahan status kesehatan</p> <p>↓</p> <p>Stressor dan pola koping</p> <p>↓</p> <p>Kurang pengetahuan</p> <p>↓</p> <p>Defisit Perawatan Diri</p>	<p><b>Defisit perawatan diri</b></p>				

	<p>5. Klien mengatakan merasa tidak nyaman dengan kondisinya</p> <p><b>Data objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan nampak kotor pada abdomen, kedua tangan dan ekstremitas</li> <li>2. Keadaan kulit kepala nampak kotor</li> <li>3. Kuku nampak kotor dan panjang</li> </ol>		
4	<p><b>Data subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. klien mengatakan kurang nafsu makan dan hanya makan 2 sendok di setiap jam makan</li> <li>2. Isteri klien mengatakan sejak sakit klien hanya mampu menghabiskan 2 sendok bubur yang diberikan setiap jam makan.</li> <li>3. Klien mengatakan tidak mampu menghabiskan porsi makanan yang diberikan</li> </ol> <p><b>Data objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makanan klien nampak tidak dihabiskan</li> <li>2. Nampak gigi seri bagian atas depan telah tanggal</li> </ol>	<p>Trauma (KKL)</p> <p>↓</p> <p>Inflamasi jaringan</p> <p>↓</p> <p>Perubahan status kesehatan</p> <p>↓</p> <p>Stressor dan pola koping</p> <p>↓</p> <p>Kurang pengetahuan</p> <p>↓</p> <p>Intake menurun</p> <p>↓</p> <p>Anoreksia</p> <p>Risiko Defisit Nutrisi</p>	Risiko defisit nutrisi



## 2. DIAGNOSIS KEPERAWATAN

- a. Nyeri akut berhubungan dengan kerusakan jaringan yang ditandai dengan:

### Data Subjektif

- 1) Klien mengatakan nyeri dirasakan pada kaki sebelah kiri sejak dua hari yang lalu setelah mengalami kecelakaan tunggal bermotor
- 2) Klien mengatakan nyeri sedang dan terasa perih dengan frekuensi menetap

### Data Objektif

- i. TTV  
Suhu: 36.4°C  
TD: 110/60 mmHg
  - ii. Open fraktur 1/3 tibia et fibula disinistra distal
  - iii. P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan  
Q: sedang, perih  
R: sektermitas bawah sinistra  
S: 6, nyeri sedang  
T: menetap
  - iv. Klien nampak meringis saat diberi penekanan pada nyeri (Saat ganti verband)
- b. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan fungsi otot ditandai dengan:

### Data subjektif

- 1) Klien mengatakan sulit bergerak dan hanya bisa beraktivitas di atas tempat tidur
- 2) Klien mengatakan hanya bisa berbaring di tempat tidur.
- 3) Klien mengatakan sulit menggerakkan kaki sebelah kirinya
- 4) Klien mengatakan kesulitan bergerak, karena nyeri pada kaki kiri setelah kecelakaan

### Data objektif

- 1) Klien nampak berbaring
- 2) Klien nampak hanya mampu bergerak di atas tempat tidur
- 3) Nampak segala aktivitas klien dibantu oleh keluarga

- 4) Jenis aktivitas yang perlu dibantu: pemenuhan cairan dan nutrisi, personall hygiene dan eliminasi
- 5) Kekuatan otot

5	5
1	5

- c. Defisit perawatan diri berhubungan dengan perubahan status kesehatan ditandai dengan:

**Data subjektif**

1. Klien mengatakan selama sakit belum pernah mandi
2. Istri klien mengatakan selama sakit klien belum pernah mandi menggunakan waslap
3. Klien mengatakan selama sakit tidak pernah cuci rambut
4. Klien mengatakan selama dirawat tidak pernah menggosok gigi
5. Klien mengatakan merasa tidak nyaman dengan kondisinya

**Data objektif**

1. Badan nampak kotor pada abdomen, kedua tangan dan ekstremitas
2. Keadaan kulit kepala nampak kotor
3. Kuku nampak kotor dan panjang

- d. Risiko defisit nutrisi berhubungan dengan anoreksia ditandai dengan:

**Data subjektif**

1. klien mengatakan kurang nafsu makan dan hanya makan 2 sendok di setiap jam makan
2. Istri klien mengatakan sejak sakit klien hanya mampu menghabiskan 2 sendok bubur yang diberikan setiap jam makan.
3. Klien mengatakan tidak mampu menghabiskan porsi makanan yang diberikan

**Data objektif**

1. Makanan klien nampak tidak dihabiskan
2. Nampak gigi seri bagian atas depan telah tanggal

## INTERVENSI KEPERAWATAN

Nama : "Tn. B"  
 Ruangan : Baji Kamase  
 No. Rekam Medik : 391008

No	Masalah Keperawatan	Luaran Keperawatan	Intervensi Keperawatan	Rasional
1.	<p>Nyeri akut berhubungan dengan kerusakan jaringan (fraktur) yang ditandai dengan:</p> <p><b>Data Subjektif</b></p> <p>3) Klien mengatakan nyeri dirasakan pada kaki sebelah kiri sejak dua hari yang lalu setelah mengalami kecelakaan tunggal bermotor</p> <p>4) Klien mengatakan nyeri sedang dan terasa perih dengan frekuensi menetap</p> <p><b>Data Objektif</b></p> <p>5. TTV</p> <p>Suhu: 36.4°C</p>	<p><b>Manajemen Nyeri</b></p> <p>Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 x 24 jam maka diharapkan nyeri dapat menurun dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluhan nyeri menurun (5)</li> <li>- Meringis menurun (5)</li> <li>- Kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat (5)</li> </ul>	<p><b>1) Observasi</b></p> <p>a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p> <p>b) Identifikasi skala nyeri</p> <p>c) Identifikasi respon nyeri secara verbal</p> <p>d) Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri</p> <p>e) Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan</p>	<p>1. Mengetahui lokasi dan karakteristik nyeri untuk penentuan intervensi</p> <p>2. Mengurangi skala nyeri dan memberikan efek relaksasi</p> <p>3. Meperbaiki pola koping klien dan keluarga klien</p>

	<p>TD: 110/60 mmHg</p> <p>6. Open fraktur 1/3 tibia et fibula disnistra distal</p> <p>7. P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan</p> <p>Q: sedang, perih</p> <p>R: sektermitas bawah sinistra</p> <p>S: 6, nyeri sedang</p> <p>T: menetap</p> <p>8. Klien nampak meringis saat diberi penekanan pada nyeri (Saat ganti verband)</p>	<p><b>2) Terapeutik</b></p> <p>a. Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (terapi musik, dan relaksasi napas dalam)</p> <p>b. Fasilitasi istirahat dan tidur</p> <p><b>3) Edukasi</b></p> <p>a. Jelaskan penyebab, periode dan penyebab nyeri</p> <p>b. Jelaskan strategi meredakan nyeri</p> <p>c. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri</p> <p>d. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat</p> <p><b>4) Kolaborasi</b></p> <p>Kolaborasi pemberian obat</p>	
--	--	--	--

<p>2</p>	<p>Gangguan Mobilitas Fisik berhubungan dengan penurunan fungsi otot yang ditandai dengan:</p> <p><b>Data subjektif</b></p> <p>5) Klien mengatakan sulit bergerak dan hanya bisa beraktivitas di atas tempat tidur</p> <p>6) Klien mengatakan hanya bisa berbaring di tempat tidur.</p> <p>7) Klien mengatakan sulit menggerakkan kaki sebelah kirinya</p> <p>8) Klien mengatakan kesulitan bergerak, karena nyeri pada kaki kiri setelah kecelakaan</p> <p><b>Data objektif</b></p> <p>6) Klien nampak berbaring</p> <p>7) Klien nampak hanya mampu bergerak di atas tempat tidur</p>	<p><b>Teknik Latihan Penguatan Otot</b></p> <p>Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 x 24 jam maka diharapkan gangguan mobilitas fisik dapat meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekuatan otot meningkat</li> <li>- Rentang gerak (ROM) meningkat</li> <li>- Pergerakan ekstremitas meningkat</li> </ul>	<p><b>1) Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Identifikasi risiko latihan</li> <li>b) Identifikasi jenis dan durasi aktivitas pemanasan/pendinginan</li> <li>c) Monitor efektifitas latihan</li> </ul> <p><b>2) Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Lakukan latihan sesuai program yang ditentukan (ROM)</li> <li>b) Berikan instruksi tertulis tentang pedoman dan bentuk gerakan untuk setiap gerakan otot</li> </ul> <p><b>3) Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jelaskan fungsi otot, fisiologi olahraga dan konsekuensi tidak digunakannya otot</li> <li>b) Ajarkan tanda dan gejala intoleransi selama dan setelah sesi latihan</li> <li>c) Anjurkan menghindari latihan selama suhu ekstrim</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui kemampuan otot dan kemampuan pergerakan klien</li> <li>2. ROM berfungsi untuk mencegah kekakuan sendi dan mengembalikan fungsi otot</li> <li>3. Meningkatkan pengetahuan klien dan keluarga tentang pentingnya penggunaan otot dengan latihan</li> </ol>
----------	--	---	--	---

	<p>8) Nampak segala aktivitas klien dibantu oleh keluarga</p> <p>9) Jenis aktivitas yang perlu dibantu: pemenuhan cairan dan nutrisi, personall hygiene dan eliminasi</p> <p>10) Kekuatan otot</p> <table border="1" data-bbox="264 635 371 746"> <tr> <td>6</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </table>	6	5	1	5			
6	5							
1	5							
3	<p>Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan status kesehatan yang ditandai dengan:</p> <p><b>Data subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan selama sakit belum pernah mandi</li> <li>2. Istri klien mengatakan selama sakit klien belum pernah mandi menggunakan waslap</li> </ol>	<p><b>Perawatan Diri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan perawatan diri</li> <li>b. Kriteria hasil 1) Minta melakukan perawatan diri meningkat</li> </ol>	<p><b>Dukungan Perawatan Diri: Mandi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Observasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Identifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan</li> <li>b) Monitor kebersihan tubuh</li> <li>c) Monitor integritas kulit</li> </ol> </li> <li>2) <b>Terapeutik</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Fasilitasi mandi sesuai kebutuhan</li> <li>b) Fasilitasi menggosok gigi sesuai kebutuhan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui kebutuhan personal hygiene klien</li> <li>2. Mengetahui faktor budaya dan kebiasaan yang menghambat perawatan diri</li> <li>3. Memberikan edukasi kepada aklien dan keluarga agar dapat melakukan tindakan</li> </ol>				

	<p>3. Klien mengatakan selama sakit tidak pernah cuci rambut</p> <p>4. Klien mengatakan selama dirawat tidak pernah menggosok gigi</p> <p>5. Klien mengatakan merasa tidak nyaman dengan kondisinya</p> <p><b>Data objektif</b></p> <p>a. Badan nampak kotor pada abdomen, kedua tangan dan ekstremitas</p> <p>b. Keadaan kulit kepala nampak kotor</p> <p>c. Kuku nampak kotor dan panjang</p>	<p>2) Mempertahankan kebersihan diri meningkat</p> <p>3) Meningkatkan kebersihan mulut</p>	<p><b>3) Edukasi</b></p> <p>a) Jelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi terhadap kesehatan</p> <p>b) Ajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien</p>	<p>perawatan tubuh secara mandiri berikutnya.</p>
4	<p>Risiko deficit nutrisi berhubungan dengan anoreksia yang ditandai dengan:</p>	<p><b>Manajemen Gangguan Makan</b></p> <p>a. Tujuan</p>	<p><b>1) Observasi</b></p>	<p>1. Untuk mengetahui jumlah input dan output makanan dan ciran</p>

<p><b>Data subjektif</b></p> <p>4. klien mengatakan kurang nafsu makan dan hanya makan 2 sendok di setiap jam makan</p> <p>5. Isteri klien mengatakan sejak sakit klien hanya mampu menghabiskan 2 sendok bubur yang diberikan setiap jam makan.</p> <p>6. Klien mengatakan tidak mampu menghabiskan porsi makanan yang diberikan</p> <p><b>Data objektif</b></p> <p>3. Makanan klien nampak tidak dihabiskan</p> <p>4. Nampak gigi seri bagian atas depan telah tanggal</p>	<p>Mengidentifikasi dan mengelola diet yang buruk, olahraga berlebihan dan/atau pengeluaran makanan dan caran berlebihan</p> <p>b. Kriteria hasil</p> <p>1) Fekeunsi makan meningkat</p> <p>2) Nafsu makan membaik</p>	<p>Monitor asupan dan keluarnya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori</p> <p><b>2) Terapeutik</b></p> <p>Berikan penguatan positif terhadap keberhasilan target dan perubahan perilaku</p> <p><b>3) Edukasi</b></p> <p>a) Ajarkan pengaturan diet yang tepat</p> <p>b) Ajarkan keterampilan koping untuk penyelesaian masalah perilaku makan</p>	<p>2. Membantu membantu koping positif terkait pemenuhan nutrisi</p> <p>3. Modifikasi diet untuk mempertahankan nutrisi</p>
--	--	--	---



### IMPLEMENTASI KEPERAWATAN

**NAMA PASIEN : “Tn. B”**

**NO. RM        391008**

**UMUR PASIEN    : 57 Tahun**

**DX. MEDIS : Open fraktur 1/3 tibia et fibula distal**

NO	Masalah Keperawatan	Hari/Tgl/Jam	IMPLEMENTASI	PARAF
1	<p>Nyeri akut berhubungan dengan kerusakan jaringan (fraktur) yang ditandai dengan:</p> <p><b>Data Subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klien mengatakan nyeri dirasakan pada kaki sebelah kiri sejak dua hari yang lalu setelah mengalami kecelakaan tunggal bermotor</li> <li>Klien mengatakan nyeri sedang dan terasa perih dengan frekuensi menetap</li> </ol> <p><b>Data Objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>TTV Suhu: 36.4°C</li> </ol>	<p>Rabu 10 Maret 2021 14:40</p> <p>14:45</p> <p>14:50</p>	<p><b>1 Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</li> <li>Mengidentifikasi skala nyeri</li> </ol> <p>Hasil:</p> <p>P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan</p> <p>Q: sedang, perih</p> <p>R: ektermitas bawah sinistra</p> <p>S: 6, nyeri sedang</p> <p>T: menetap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi respon nyeri secara verbal</li> </ol> <p>Hasil:</p> <p>Klien nampak meringis kesakitan</p>	

<p>TD: 110/60 mmHg</p> <p>2. Open fraktur 1/3 tibia et fibula disnistra distal</p> <p>3. P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan</p> <p>Q: sedang, perih</p> <p>R: sektermitas bawah sinistra</p> <p>S: 6, nyeri sedang</p> <p>T: menetap</p> <p>4. Klien nampak meringis saat diberi penekanan pada nyeri (Saat ganti verband)</p>	<p>15:00</p> <p>15:12</p> <p>15:20</p>	<p>d. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri</p> <p>Hasil:</p> <p>Klien mengatakan nyeri muncul tiba-tiba, walau tanpa digerakkan</p> <p><b>2 Terapeutik</b></p> <p>Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (teknis relaksasi napas dalam dan terapi murottal)</p> <p>Hasil:</p> <p>Klien melakukan teknis relaksasi napas dalam</p> <p><b>3 Edukasi</b></p> <p>a. Menjelaskan penyebab, periode dan penyebab nyeri</p> <p>b. Menjelaskan strategi meredakan nyeri</p> <p>c. Menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri</p> <p>d. Menganjurkan menggunakan analgetik secara tepat</p> <p>Hasil:</p>	
--	--	---	--

			<p>Klien paham penyebab dan cara memonitor nyeri.</p> <p>Klien melakukan Teknik relaksasi dan mendengarkan murottal.</p> <p><b>4 Kolaborasi</b></p> <p>Kolaborasi pemberian analgetik</p> <p>Hasil:</p> <p>Injeksi Ranitidine/ IV/ 8 jam</p>	
2	<p>Gangguan Mobilitas Fisik berhubungan dengan penurunan fungsi otot yang ditandai dengan:</p> <p><b>Data subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan sulit bergerak dan hanya bisa beraktivitas di atas tempat tidur</li> <li>2. Klien mengatakan hanya bisa berbaring di tempat tidur.</li> <li>3. Klien mengatakan sulit menggerakkan kaki sebelah kirinya</li> </ol>	<p>16:00</p> <p>16:10</p>	<p><b>1 Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi risiko latihan</li> <li>b. Mengidentifikasi jenis dan durasi aktivitas pemanasan/pendinginan</li> <li>c. Memonitor efektifitas latihan</li> </ol> <p>Hasil:</p> <p>Latihan ringan yang dapat dilakukan adalah ROM beberapa gerakan untuk ekstremitas atas dan bawah kecuali ekstremitas bawah kiri</p> <p><b>2 Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan latihan sesuai program yang ditentukan (ROM)</li> </ol>	

	<p>4. Klien mengatakan kesulitan bergerak, karena nyeri pada kaki kiri setelah kecelakaan</p> <p><b>Data objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien nampak berbaring</li> <li>2. Klien nampak hanya mampu bergerak di atas tempat tidur</li> <li>3. Nampak segala aktivitas klien dibantu oleh keluarga</li> <li>4. Jenis aktivitas yang perlu dibantu: pemenuhan cairan dan nutrisi, personall hygiene dan eliminasi</li> <li>5. Kekuatan otot</li> </ol> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>	/	5	1	5	16: 15	<p>b. Memberikan instruksi tertulis tentang pedoman dan bentuk gerakan untuk setiap gerakan otot</p> <p>Hasil: ROM dilakukan pada ektremitas kanan (atas bawah) dan ekstremitas atas kiri dengan gerakan fleksi, ekstensi, hiperekstensi adduksi dan abduksi</p> <p><b>3 Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan fungsi otot, fisiologi olahraga dan konsekuensi tidak digunakannya otot</li> <li>b. Mengajarkan tanda dan gejala intoleransi selama dan setelah sesi latihan</li> </ol> <p>Hasil: Perawat memberika edukasi terkait Latihan ROM. Klien dan keluarga klien memahami fungsi dan konsekuensi tidak digunakannya otot</p>	
/	5							
1	5							
3	<p>Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan status kesehatan yang ditandai dengan:</p>	16: 20	<p><b>1) Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mengidentifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan</li> <li>b) Memonitor kebersihan tubuh</li> </ol>					

<p><b>Data subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan selama sakit belum pernah mandi</li> <li>2. Istri klien mengatakan selama sakit klien belum pernah mandi menggunakan waslap</li> <li>3. Klien mengatakan selama sakit tidak pernah cuci rambut</li> <li>4. Klien mengatakan selama dirawat tidak pernah menggosok gigi</li> <li>5. Klien mengatakan merasa tidak nyaman dengan kondisinya</li> </ol> <p><b>Data objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan nampak kotor pada abdomen, kedua tangan dan ekstremitas</li> <li>2. Keadaan kulit kepala nampak kotor</li> <li>3. Kuku nampak kotor dan panjang</li> </ol>	<p>16:25</p> <p>16:30</p>	<p>c) Memonitor integritas kulit</p> <p>Hasil: Badan klien nampak kering, gigi nampak kuning dan rambut berantakan serta kulit kuku panjang.</p> <p><b>2) Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Memfasilitasi mandi sesuai kebutuhan</li> <li>b) Memfasilitasi menggosok gigi sesuai kebutuhan</li> </ol> <p>Hasil: Keluarga klien menyediakan alat mandi dan gosok gigi</p> <p><b>3) Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menjelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi terhadap kesehatan</li> <li>b) Mengajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien</li> </ol> <p>Hasil: Klien dan keluarga klien memahami manfaat mandi untuk kesehatan. Perawat membantu membersihkan badan klien dengan handuk basah.</p>	
---	---------------------------	--	--

4.	<p>Nyeri akut berhubungan dengan kerusakan jaringan (fraktur) yang ditandai dengan:</p> <p><b>Data Subjektif</b></p> <p>3. Klien mengatakan nyeri dirasakan pada kaki sebelah kiri sejak dua hari yang lalu setelah mengalami kecelakaan tunggal bermotor</p> <p>4. Klien mengatakan nyeri sedang dan terasa perih dengan frekuensi menetap</p> <p><b>Data Objektif</b></p> <p>5. TTV</p> <p>Suhu: 36.4°C</p> <p>TD: 110/60 mmHg</p> <p>6. Open fraktur 1/3 tibia et fibula disnistra distal</p> <p>7. P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan</p> <p>Q: sedang, perih</p>	<p>Kamis</p> <p>11 Maret</p> <p>2021</p> <p>09:00</p> <p>09:12</p> <p>09:15</p> <p>09:20</p>	<p><b>1) Observasi</b></p> <p>a. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p> <p>b. Mengidentifikasi skala nyeri</p> <p>Hasil:</p> <p>P: muncul walau tanpa digerakkan</p> <p>Q: Perih</p> <p>R: ektermitas bawah sinistra</p> <p>S: 6, nyeri sedang</p> <p>T: menetap</p> <p>c. Mengidentifikasi respon nyeri secara verbal</p> <p>Hasil:</p> <p>Klien nampak meringis kesakitan</p> <p>d. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri</p> <p>Hasil:</p> <p>Klien mengatakan nyeri kadang-kadang muncul.</p> <p><b>2) Terapeutik</b></p>	
----	---	---	---	--

	<p>R: sektermitas bawah sinistra  S: 6, nyeri sedang  T: menetap</p> <p>8. Klien nampak meringis saat diberi penekanan pada nyeri (Saat ganti verband)</p>	<p>09:25</p> <p>09:30</p>	<p>Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (teknis relaksasi napas dalam)</p> <p>Hasil:  Klien melakukan teknis relaksasi napas dalam dan mendengarkan terapi murottal (Qs. Ar-Rahman, Qori: Salim Bahanan)</p> <p><b>3) Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan penyebab, periode dan penyebab nyeri</li> <li>b. Menjelaskan strategi meredakan nyeri</li> <li>c. Mengajarkan memonitor nyeri secara mandiri</li> <li>d. Mengajarkan menggunakan analgetik secara tepat</li> </ol> <p>Hasil:  Klien melakukan teknik relaksasi dan mendengarkan murottal ketika nyeri muncul. Klien paham penyebab dan cara memonitor nyeri</p> <p><b>4) Kolaborasi</b>  Kolaborasi pemberian analgetik</p>	
--	--	---------------------------	---	--

			<p>Hasil:</p> <p>Injeksi Ranitidine/ IV/ 8 jam (Diberikan jam 06:15)</p>	
5.	<p>Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan status kesehatan yang ditandai dengan:</p> <p><b>Data subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan selama sakit belum pernah mandi</li> <li>2. Istri klien mengatakan selama sakit klien belum pernah mandi menggunakan waslap</li> <li>3. Klien mengatakan selama sakit tidak pernah cuci rambut</li> <li>4. Klien mengatakan selama dirawat tidak pernah menggosok gigi</li> <li>5. Klien mengatakan merasa tidak nyaman dengan kondisinya</li> </ol>	<p>10:20</p> <p>10:25</p> <p>10:30</p> <p>10:35</p>	<p><b>1) Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mengidentifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan</li> <li>b) Memonitor kebersihan tubuh</li> <li>c) Memonitor integritas kulit</li> </ol> <p>Hasil:</p> <p>Badan klien nampak lembab, kondisi gigi dan mulut nampak bersih, rambut nampak rapih dan kulit kuku nampak masih panjang.</p> <p><b>2) Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Memfasilitasi mandi sesuai kebutuhan</li> <li>b) Memfasilitasi menggosok gigi sesuai kebutuhan</li> </ol> <p>Hasil:</p> <p>Keluarga klien menyediakan alat mandi dan gosok gigi</p>	



	<p><b>Data objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan nampak kotor pada abdomen, kedua tangan dan ekstremitas</li> <li>2. Keadaan kulit kepala nampak kotor</li> <li>3. Kuku nampak kotor dan panjang</li> </ol>		<p><b>3) Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menjelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi terhadap kesehatan</li> <li>b) Mengajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien</li> </ol> <p>Hasil:          Keluarga klien nampak membantu klien menggosok gigi dan memotong kuku klien. Keluarga klien dan klien memahami manfaat mandi untuk kesehatan.</p>	
6.	<p>Gangguan Mobilitas Fisik berhubungan dengan penurunan fungsi otot yang ditandai dengan:</p> <p><b>Data subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan sulit bergerak dan hanya bisa beraktivitas di atas tempat tidur</li> </ol>	<p>10:40</p> <p>10:45</p>	<p><b>1) Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi risiko latihan</li> <li>b. Mengidentifikasi jenis dan durasi aktivitas pemanasan/pendinginan</li> <li>c. Memonitor efektifitas latihan</li> </ol> <p>Hasil:</p>	

<p>2. Klien mengatakan hanya bisa berbaring di tempat tidur.</p> <p>3. Klien mengatakan sulit menggerakkan kaki sebelah kirinya</p> <p>4. Klien mengatakan kesulitan bergerak, karena nyeri pada kaki kiri setelah kecelakaan</p> <p><b>Data objektif</b></p> <p>1. Klien nampak berbaring</p> <p>2. Klien nampak hanya mampu bergerak di atas tempat tidur</p> <p>3. Nampak segala aktivitas klien dibantu oleh keluarga</p> <p>4. Jenis aktivitas yang perlu dibantu: pemenuhan cairan dan nutrisi, personall hygne dan eliminasi</p> <p>5. Kekuatan otot</p> <p>5 5   1 5</p>	<p>10:50</p>	<p>Latihan ROM ringan yang dapat dilakuka beberapa gerakan untuk ekstremitas atas dan bawah kecuali ekstremitas bawah kiri</p> <p><b>2) Terapeutik</b></p> <p>a. Melakukan latihan sesuai program yang ditentukan (ROM)</p> <p>b. Memberikan instruksi tertulis tentang pedoman dan bentuk gerakan untuk setiap gerakan otot</p> <p>Hasil: Klien melakukan Latihan ROM dengan dibantu oleh istri / anaknya. Latihan ROM dilakukan pada ekstremitas atas dan bawah kecuali ekstremitas kiri bawah dengan gerakan fleksi, eksistensi, hiperekstensi adduksi dan abduksi</p> <p><b>3) Edukasi</b></p> <p>a. Menjelaskan fungsi otot, fisiologi olahraga dan konsekuensi tidak digunakannya otot</p> <p>b. Mengajarkan tanda dan gejala intoleransi selama dan setelah sesi latihan</p> <p>Hasil:</p>	
--	--------------	---	--

			Perawat memberikan edukasi terkait Latihan ROM yang bisa dilakukan. Keluarga klien dan klien memahami fungsi dan konsekuensi tidak digunakannya otot.	
7.	<p>Nyeri akut berhubungan dengan kerusakan jaringan (fraktur) yang ditandai dengan:</p> <p><b>Data Subjektif</b></p> <p>5. Klien mengatakan nyeri dirasakan pada kaki sebelah kiri sejak dua hari yang lalu setelah mengalami kecelakaan tunggal bermotor</p> <p>6. Klien mengatakan nyeri sedang dan terasa perih dengan frekuensi menetap</p> <p><b>Data Objektif</b></p> <p>9. TTV</p> <p>Suhu: 36.4°C</p> <p>TD: 110/60 mmHg</p>	<p>Jum'at</p> <p>08:00</p> <p>08:05</p> <p>08:10</p> <p>08:15</p> <p>08:20</p>	<p><b>1) Observasi</b></p> <p>a. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p> <p>b. Mengidentifikasi skala nyeri</p> <p>Hasil:</p> <p>P: Muncul kadang-kadang</p> <p>Q: nyut-nyut</p> <p>R: ektermitas bawah sinistra</p> <p>S: 5, nyeri sedang</p> <p>T: kadang-kadang</p> <p>c. Mengidentifikasi respon nyeri secara verbal</p> <p>Hasil:</p> <p>Klien nampak meringis dan sesekali melakukan Teknik relaksasi ketika nyeri muncul</p>	

<p>10. Open fraktur 1/3 tibia et fibula disnistra distal</p> <p>11. P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan Q: sedang, perih R: sektermitas bawah sinistra S: 6, nyeri sedang T: menetap</p> <p>12. Klien nampak meringis saat diberi penekanan pada nyeri (Saat ganti verband)</p>	<p>08:25</p>	<p>d. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri</p> <p>Hasil: Klien mengatakan nyeri kadang-kadang muncul.</p> <p><b>2) Terapeutik</b> Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (teknis relaksasi napas dalam dan mendengarkan terapi murottal)</p> <p>Hasil: Klien melakukan teknis relaksasi napas dalam dan mendengarkan terapi murottal (Qs. Ar-Rahman, Qori: Salim Bahanan)</p> <p><b>3) Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan penyebab, periode dan penyebab nyeri</li> <li>Menjelaskan strategi meredakan nyeri</li> <li>Menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri</li> <li>Menganjurkan menggunakan analgetik secara tepat</li> </ol>	
--	--------------	---	--


			<p>Hasil:</p> <p>Klien melakukan 90 teknik relaksasi dan mendengarkan murottal ketika nyeri muncul. Klien dapat melakukan secara mandiri cara mengontrol nyeri.</p>	
8.	<p>Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan status kesehatan yang ditandai dengan:</p> <p><b>Data subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan selama sakit belum pernah mandi</li> <li>2. Istri klien mengatakan selama sakit klien belum pernah mandi menggunakan waslap</li> <li>3. Klien mengatakan selama sakit tidak pernah cuci rambut</li> <li>4. Klien mengatakan selama dirawat tidak pernah menggosok gigi</li> </ol>	<p>08:25</p> <p>08:30</p> <p>08:35</p>	<p><b>1) Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mengidentifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan</li> <li>b) Memonitor kebersihan tubuh</li> <li>c) Memonitor integritas kulit</li> </ol> <p>Hasil:</p> <p>Badan klien nampak lembab, kondisi gigi dan mulut nampak bersih, rambut nampak rapih dan kulit kuku nampak masih panjang.</p> <p><b>2) Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Memfasilitasi mandi sesuai kebutuhan</li> <li>b) Memfasilitasi menggosok gigi sesuai kebutuhan</li> </ol> <p>Hasil:</p>	

	<p>5. Klien mengatakan merasa tidak nyaman dengan kondisinya</p> <p><b>Data objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan nampak kotor pada abdomen, kedua tangan dan ekstremitas</li> <li>2. Keadaan kulit kepala nampak kotor</li> <li>3. Kuku nampak kotor dan panjang</li> </ol>		<p>Perawat membawakan alat potong kuku. Keluarga klien menyediakan alat mandi dan gosok gigi</p> <p><b>3) Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menjelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi terhadap kesehatan</li> <li>b) Mengajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien</li> </ol> <p>Hasil:          Keluarga klien nampak membantu klien menggosok gigi dan memotong kuku klien. Keluarga klien dan klien memahami manfaat mandi untuk kesehatan.</p>	
9.	<p>Nyeri akut berhubungan dengan kerusakan jaringan (fraktur) yang ditandai dengan:</p> <p><b>Data Subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Klien mengatakan nyeri dirasakan pada kaki sebelah kiri sejak dua hari</li> </ol>	<p>Sabtu, 13 Maret 2021</p>	<p><b>1. Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</li> <li>b. Mengidentifikasi skala nyeri</li> <li>c. Mengidentifikasi respon nyeri secara verbal</li> <li>d. Mengidentifikasi respon nyeri secara verbal</li> </ol> <p>Hasil:</p>	

<p>yang lalu setelah mengalami kecelakaan tunggal bermotor</p> <p>8. Klien mengatakan nyeri sedang dan terasa perih dengan frekuensi menetap</p> <p><b>Data Objektif</b></p> <p>13. TTV</p> <p>Suhu: 36.4°C</p> <p>TD: 110/60 mmHg</p> <p>14. Open fraktur 1/3 tibia et fibula disnistra distal</p> <p>15. P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan</p> <p>Q: sedang, perih</p> <p>R: sektermitas bawah sinistra</p> <p>S: 6, nyeri sedang</p> <p>T: menetap</p> <p>16. Klien nampak meringis saat diberi penekanan pada nyeri (Saat ganti verband).</p>		<p>P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan</p> <p>Q: berat, perih</p> <p>R: ektermitas bawah sinistra</p> <p>S: 8, nyeri hebat</p> <p>T: terus-menerus</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (teknis relaksasi napas dalam dan terai murottal)</p> <p>Hasil: Klien melakukan teknik relaksasi napas dalam dan mendengarkan murottal</p> <p><b>3. Kolaborasi</b></p> <p>Kolaborasi pemberian analgetik</p> <p>Cetoroloac 1 amp IV</p> <p>Hasil:</p> <p>Injeksi Cetorolac 1 amp IV</p>	
--	--	---	--

10	<p>Gangguan Mobilitas Fisik berhubungan dengan penurunan fungsi otot yang ditandai dengan:</p> <p><b>Data subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan sulit bergerak dan hanya bisa beraktivitas di atas tempat tidur</li> <li>2. Klien mengatakan hanya bisa berbaring di tempat tidur.</li> <li>3. Klien mengatakan sulit menggerakkan kaki sebelah kirinya</li> <li>4. Klien mengatakan kesulitan bergerak, karena nyeri pada kaki kiri setelah kecelakaan</li> </ol> <p><b>Data objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien nampak berbaring</li> <li>2. Klien nampak hanya mampu bergerak di atas tempat tidur</li> <li>3. Nampak segala aktivitas klien dibantu oleh keluarga</li> </ol>		<p><b>1. Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi risiko latihan</li> <li>b. Mengidentifikasi jenis dan durasi aktivitas pemanasan/pendinginan</li> <li>c. Memonitor efektifitas latihan</li> </ol> <p>Hasil: Latihan ringan yang dapat dilakukan adalah ROM beberapa gerakan untuk ekstremitas atas dan bawah kecuali ekstremitas bawah kiri</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan latihan sesuai program yang ditentukan (ROM)</li> <li>b. Memberikan instruksi tentang pedoman dan bentuk gerakan untuk setiap gerakan otot</li> </ol> <p>Hasil: ROM dilakukan pada ekstremitas kanan (atas bawah) dan ekstremitas atas kiri dengan gerakan fleksi, ekstensi, hiperekstensi adduksi dan abduksi</p> <p><b>3. Edukasi</b></p>	
----	--	--	---	--



	<p>4. Jenis aktivitas yang perlu dibantu: pemenuhan cairan dan nutrisi, personall hygne dan eliminasi</p> <p>5. Kekuatan otot</p> <p>5 5</p> 		<p>a. Menjelaskan fungsi otot, fisiologi olahraga dan konsekuensi tidak digunakannya otot</p> <p>b. Mengajarkan tanda dan gejala intoleransi selama dan setelah sesi latihan</p> <p>Hasil: Klien memahami fungsi dan konsekuensi tidak digunakannya otot</p>	
11	<p>Nyeri akut berhubungan dengan kerusakan jaringan (fraktur) yang ditandai dengan:</p> <p><b>Data Subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klien mengatakan nyeri dirasakan pada kaki sebelah kiri sejak dua hari yang lalu setelah mengalami kecelakaan tunggal bermotor</li> <li>Klien mengatakan nyeri sedang dan terasa perih dengan frekuensi menetap</li> </ol>	<p>Minggu14 Maret 2021 13:00</p> <p>13:15</p>	<p><b>1. Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</li> <li>Mengidentifikasi skala nyeri</li> <li>Mengidentifikasi respon nyeri secara verbal</li> </ol> <p>Hasil:</p> <p>P: saat digerakkan</p> <p>Q: sedang, perih</p> <p>R: sektermitas bawah sinistra</p> <p>S: 6, nyeri sedang</p> <p>T: menetap</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p>	

	<p><b>Data Objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>TTV Suhu: 36.4°C TD: 110/60 mmHg</li> <li>Open fraktur 1/3 tibia et fibula disnistra distal</li> <li>P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan Q: sedang, perih R: sektermitas bawah sinistra S: 6, nyeri sedang T: menetap</li> <li>Klien nampak meringis saat diberi penekanan pada nyeri (Saat ganti verband)</li> </ol>	13:25	<p>Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (teknis relaksasi napas dalam)</p> <p>Hasil: Klien melakukan teknik relaksasi napas dalam dan mendengarkan murottal (Qs. Ar-Rahman, Qori: Salim bahanan)</p> <p><b>3. Kolaborasi</b> Kolaborasi pemberian analgetik Cetorolac 1 amp IV Hasil: Injeksi Cetorolac diberikan pukul 13:00</p>	
12.	Gangguan Mobilitas Fisik berhubungan dengan penurunan fungsi otot yang ditandai dengan:	13:30	<p><b>1. Observasi</b> Identifikasi jenis latihan yang dapat dilakukan Hasil:</p>	

<p><b>Data subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan sulit bergerak dan hanya bisa beraktivitas di atas tempat tidur</li> <li>2. Klien mengatakan hanya bisa berbaring di tempat tidur.</li> <li>3. Klien mengatakan sulit menggerakkan kaki sebelah kirinya</li> <li>4. Klien mengatakan kesulitan bergerak, karena nyeri pada kaki kiri setelah kecelakaan</li> </ol>	<p>13:35</p>	<p>Klien mampu melakukan posisi semi fowler. Klien mampu melakukan fleksi dan ekstensi pada kedua ekstremitas atas dan bawah sinistra secara mandiri</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan latihan sesuai program yang ditentukan (ROM)</li> <li>b. Memberikan instruksi tentang pedoman dan bentuk gerakan untuk setiap gerakan otot</li> </ol> <p>Hasil:</p>	
<p><b>Data objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien nampak berbaring</li> <li>2. Klien nampak hanya mampu bergerak di atas tempat tidur</li> <li>3. Nampak segala aktivitas klien dibantu oleh keluarga</li> <li>4. Jenis aktivitas yang perlu dibantu: pemenuhan cairan dan nutrisi, personal hygiene dan eliminasi</li> </ol>	<p>13:40</p>	<p>Melakukan ROM pada kaki: fleksi, ekstensi dan hiper ekstensi.</p> <p>Betis : fleksi, ekstensi</p> <p>Lengan: adduksi, abduksi</p> <p>Pergelangan tangan: fleksi, ekstensi dan hiperekstensi</p> <p><b>3. Edukasi</b></p> <p>Menjelaskan fungsi otot, fisiologi olahraga dan konsekuensi tidak digunakannya otot</p> <p>Hasil:</p>	

	<p>5. Kekuatan otot</p> <table border="1" data-bbox="387 308 495 395"> <tr> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </table>	5	5	1	5		<p>Ajarkan tanda dan gejala intoleransi selama dan setelah sesi latihan</p>	
5	5							
1	5							



## EVALUASI KEPERAWATAN

No	No Diagnosa	Hari/Tgl/Jam	Evaluasi (SOAP)	Nama Jelas
1.	1	Rabu, 10 Maret 2021 15:20	<p>S: Klien mengatakan nyeri berat pada kaki kirinya. Klien mengatakan merasa lebih baik setelah melakukan relaksasi napas dalam dan mendengarkan murottal</p> <p>O: Klien nampak masih meringis kesakitan</p> <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</li> <li>2. Mengidentifikasi skala nyeri</li> <li>3. Mengidentifikasi respon nyeri secara verbal</li> <li>4. Mengidentifikasi respon nyeri secara verbal</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p>	Asrawati

			<p>Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (teknis relaksasi napas dalam dan terapi murottal)</p> <p><b>Kolaborasi</b></p> <p>Kolaborasi pemberian analgetik</p>	
2.	2	<p>Rabu, 10 Maret 2021 16:00 WITA</p>	<p>S: klien mengatakan sudah mampu menggerakkan esktremitas kecuali esktremitas bawah sinistra</p> <p>O: Klien mampu menggerakkan lengan kanan atas mengikuti gerakan ROM. Klien masih beraktivitas di atas tempat tidur</p> <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>1. Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Idenntifikasi risiko latihan</li> <li>b. Identifikasi jenis dan durasi aktivitas pemanasan/pendinginan</li> <li>c. Monitor efektifitas latihan</li> </ol> <p><b>D. Terapeutik</b></p> <p>Lakukan latihan sesuai program yang ditentukan (ROM).</p> <p><b>E. Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jelaskan fungsi otot, fisiologi olahraga dan konsekuensi tidak digunakannya otot</li> </ol>	Asrawati

			<p>b. Ajarkan tanda dan gejala intoleransi selama dan setelah sesi latihan</p> <p>c. Anjurkan menghindari latihan selama suhu ekstrim</p>	
3.	3	<p>Rabu, 10 Maret 2021 16: 30 WITA</p>	<p>S: Keluarga klien mengatakan klien belum pernah mandi selama dirawat di rumah sakit.</p> <p>O: Kulit klien nampak lembab, kuku masih nampak panjang dan rambut berantakan</p> <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan Intervensi</p> <p><b>1. Observasi</b></p> <p>a) Monitor kebersihan tubuh</p> <p>b) Monitor integritas kulit</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>a) Fasilitasi mandi sesuai kebutuhan</p> <p>b) Fasilitasi menggosok gigi sesuai kebutuhan</p> <p><b>3. Edukasi</b></p> <p>a) Jelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi terhadap kesehatan</p> <p>b) Ajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien</p>	Asrawati
4.	1	<p>Kamis 11 Maret 2021</p>	<p>S: Klien mengatakan nyeri kadang-kadang muncul. Klien mengatakan Klien mengatakan merasa lebih rileks setelah melakukan relaksasi napas dalam</p>	Asrawati

		09:00	<p>dan mendengarkan murottal. Klien mengatakan skala nyerinya menurun menjadi skala 5.</p> <p>O: Klien nampak melakukan teknik relaksasi saat nyeri tiba-tiba timbul</p> <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>1. Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</li> <li>Mengidentifikasi skala nyeri</li> <li>Mengidentifikasi respon nyeri secara verbal</li> <li>Mengidentifikasi respon nyeri secara verbal</li> </ol> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (teknis relaksasi napas dalam dan terapi murottal).</p> <p><b>3. Kolaborasi</b></p> <p>Kolaborasi pemberian analgetik</p>	
5	3	Kamis 11 Maret 2021 09: 35	<p>S: Keluarga klien mengatakan tadi pagi sudah memandikan klien dengan menggunakan waslap. Klien mengatakan istri klien membantu untuk gosok</p>	Asrawati



			<p>gigi. Istri klien mengatakan belum memotong kuku klien karena tidak punya alat gunting kuku.</p> <p>O: Kulit klien nampak lembab, kuku nampak masih panjang dan mulut bersih.</p> <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi Intervensi</p> <p><b>1. Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Monitor kebersihan tubuh</li> <li>b) Monitor integritas kulit</li> </ol> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Fasilitasi mandi sesuai kebutuhan</li> <li>b) Fasilitasi menggosok gigi sesuai kebutuhan</li> </ol> <p><b>3. Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi terhadap kesehatan</li> <li>b) Ajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien</li> </ol>	
6.	2	<p>Kamis 11 Maret 2021 10:50</p>	<p>S: Klien mengatakan sudah mampu menggerakkan esktremitas dengan dan atau bantuan istri/ anak kecuali esktremitas bawah sinistra</p> <p>O: Klien mampu menggerakkan lengan kanan atas mengikuti gerakan ROM dengan bantuan istri/anak. Klien masih beraktivitas di atas tempat tidur</p> <p>A: Masalah teratasi</p>	Asrawati

			<p>P: Pertahankan intervensi</p> <p><b>1. Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi risiko latihan</li> <li>Identifikasi jenis dan durasi aktivitas pemanasan/pendinginan</li> <li>Monitor efektifitas latihan</li> </ol> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>Lakukan latihan sesuai program yang ditentukan (ROM)</p>	
7.	1	<p>Jum'at 12 Maret 2021 08:25</p>	<p>S: Klien mengatakan nyeri nyut-nyut kadang-kadang muncul. Klien mengatakan Klien mengatakan merasa lebih rileks dan baik setelah melakukan relaksasi napas dalam dan mendengarkan murottal. Klien mengatakan skala nyerinya menurun menjadi skala 3.</p> <p>O: Klien nampak melakukan teknik relaksasi saat nyeri tiba-tiba timbul. Skala nyeri menurun dengan skala 3.</p> <p>A: Masalah teratasi</p> <p>P: Pertahankan intervensi</p> <p><b>1. Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</li> <li>Mengidentifikasi skala nyeri</li> </ol>	Asrawati

			<p>c. Mengidentifikasi respon nyeri secara verbal</p> <p>d. Mengidentifikasi respon nyeri secara verbal</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (teknis relaksasi napas dalam dan terapi murottal).</p> <p><b>3. Kolaborasi</b></p> <p>Kolaborasi pemberian analgetik</p>	
8.	3	Jum'at 12 Maret 2021 08:35	<p>S: Keluarga klien mengatakan tadi pagi sudah memandikan klien dengan menggunakan waslap. Klien mengatakan istri klien membantu memotong kuku dan membantu untuk gosok gigi.</p> <p>O: Kulit klien nampak lembab, kuku nampak masih panjang dan mulut bersih.</p> <p>A: Masalah teratasi</p> <p>P: Pertahankan Intervensi</p> <p><b>3. Observasi</b></p> <p>a. Monitor kebersihan tubuh</p> <p>b. Monitor integritas kulit</p> <p><b>4. Terapeutik</b></p> <p>a. Fasilitasi mandi sesuai kebutuhan</p>	Asrawati


			<p>b. Fasilitasi menggosok gigi sesuai kebutuhan</p> <p><b>5. Edukasi</b></p> <p>a. Jelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi terhadap kesehatan</p> <p>b. Ajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien</p>	
<b>IMPLEMENTASI POST OP FRAKTUR</b>				
9.	1	<p>Sabtu</p> <p>13 Maret 2021</p> <p>09:35</p>	<p>S: Klien mengatakan nyeri meningkat setelah operasi.</p> <p>O: Klien nampak lemah, klien nampak meringis kesakitan. Nampak nyeri tidak berkurang setelah melakukan teknik napas dalam.</p> <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>1. Observasi</b></p> <p>a. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p> <p>b. Identifikasi skala nyeri</p> <p>c. Identifikasi respon nyeri secara verbal</p> <p>d. Identifikasi respon nyeri secara verbal</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (teknis relaksasi napas dalam dan terapi murottal)</p>	Asrawati

			<p><b>3. Kolaborasi</b></p> <p>Kolaborasi pemberian analgetik</p> <p>Cetoroloac 1 amp IV</p>	
10.	2	<p>Sabtu</p> <p>13 Maret 2021</p> <p>11:25</p>	<p>S: Keluarga klien mengatakan melakukan gerakan ROM pada klien dan melakukan massage pada esktremitas klien. Klien mengatakan kedinginan dan pegal</p> <p>O: Klien nampak menggigil (karena baru kembali dari ruang OK). Klien nampak lemah dan kesulitan menggerakkan ekstremitas yang tidak terdapat luka</p> <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>1. Observasi</b></p> <p>Identifikasi jenis latihan yang dapat dilakukan</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>a. Lakukan latihan sesuai program yang ditentukan (ROM)</p> <p>b. Berikan instruksi tentang pedoman dan bentuk gerakan untuk setiap gerakan otot</p> <p><b>3. Edukasi</b></p>	Asrawati

			Jelaskan fungsi otot, fisiologi olahraga dan konsekuensi tidak digunakannya otot	
11.	1	Minggu 14 Maret 2021 13:00	<p>S: Klien mengatakan nyerinya meningkat tadi malam sehingga tidak bisa tidur. Klien mengatakan nyerinya telah berkurang mulai siang tadi dan sudah bisa tidur siang. Klien mengatakan nyeri lebih berkurang dan merasa lebih nyaman setelah melakukan relaksasi napas dalam dan mendengarkan murottal.</p> <p>O: klien sudah mampu menggerakkan ekstremitas, bawah. Klien nampak meringis namun saat kaki (post) digerakkan</p> <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan Intervensi</p> <p><b>1. Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</li> <li>c. Identifikasi skala nyeri</li> <li>d. Identifikasi respon nyeri secara verbal</li> <li>e. Identifikasi respon nyeri secara verbal</li> </ul> <p><b>2. Terapeutik</b></p>	Asrawati

			<p>Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (teknis relaksasi napas dalam dan terapi murottal)</p> <p><b>3. Kolaborasi</b></p> <p>Kolaborasi pemberian analgetik</p> <p>Cetoroloac 1 amp IV</p>	
12	2	<p>Minggu</p> <p>14 Maret 2021</p> <p>13:40</p>	<p>S: Keluarga klien mengatakan klien mampu melakukan sim kanan dengan mandiri, klien mengatakan selalu ingin bergerak krena belakangnya terasa panas</p> <p>O: klien mampu melakukan sim kanan, fleksi ;lutut dengan mandiri. Kebutuhan klien masih dibantu keluarga: peronal hygne, makan, dan eliminasi</p> <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan Intervensi</p> <p><b>1. Observasi</b></p> <p>Identifikasi jenis latihan yang dapat dilakukan</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>a. Lakukan latihan sesuai program yang ditentukan (ROM)</p> <p>b. Berikan instruksi tentang pedoman dan bentuk gerakan untuk setiap gerakan otot</p>	Asrawati

		<b>3. Edukasi</b> Jelaskan fungsi otot, fisiologi olahraga dan konsekuensi tidak digunakannya otot	
--	--	---	--





## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisa Kasus**

Klien dengan identitas “Tn. B” mengalami fraktur 1/3 tibia et fibula distal disebabkan kecelakaan tunggal bermotor yang dialami dua hari yang lalu. Klien merupakan pasien rujukan dari rumah sakit Padjonga Dg.Ngalle, Takalar.

Aktivitas sehari-hari klien adalah bertani dan menggunakan motor sebagai transportasi utama. Benjamin (2020) mengatakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan fraktur adalah kecelakaan bermotor. Kecelakaan dapat mengakibatkan trauma langsung atau tidak langsung dengan energi pada tulang. Sejalan dengan itu, Jessica L. & Aaron (2021) menyebutkan fraktur dapat terjadi karena trauma berenergi tinggi dan dapat berakibat pada kerusakan jaringan lunak.

Keluhan utama yang dirasakan klien adanya nyeri dengan skala 6 sebelum operasi. Setelah dilakukan operasi nyeri klien mengatakan nyeri meningkat menjadi skala 8 (berat). Suriya & Zuriati (2019) dan Thompson et al. (2020) menyebutkan bahwa nyeri merupakan karakteristik utama pada fraktur tibia fibula dengan skala dan kualitas yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keparahan fraktur dan pengalaman subjektif klien. Dalam Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2017) disebutkan nyeri merupakan pengalaman sensorik atau emosional terkait dengan adanya kerusakan jaringan secara aktual maupun fungsional.

Nyeri akut adalah diagnosis keperawatan utama pada kasus ini. Masalah tersebut didapatkan di hari pertama saat klien masuk di rumah sakit. Klien mengatakan nyeri dirasakan pada kaki kiri sejak dua hari yang lalu. Hasil pengkajain komprehensif terhadap nyeri ditemukan P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan, Q: perih, R: extremitas bawah sinistra, S: 6, nyeri sedang, T: Menetap.

Oleh karena itu, klien nampak meringis dan mengalami kesulitan bergerak karena efek nyeri secara emosional dan fisik yang dialami klien.

Nyeri yang dirasakan klien menyebabkan klien merasa terganggu dan tidak nyaman. Klien mengatakan hanya mampu baring diatas tempat tidur. Klien juga mengatakan nyeri muncul walau tanpa digerakkan. Klien mengatakan hanya mampu mengatasi nyeri dengan tidur. Nyeri dirasakan klien akibat benturan keras atau adanya trauma yang mengakibatkan terjadinya fraktur terbuka dengan kerusakan jaringan lunak (otot, kulit, jaringan saraf dan pembuluh darah) (Susanti, Susi., et al. 2019).

Menurut Susanti, Susi., et al. (2019), penanganan terhadap fraktur dapat dengan pembedahan atau tanpa pembedahan, meliputi imobilisasi, reduksi dan rehabilitasi. Kondisi fraktur, baik pada fase awal atau klien dengan fraktur malunion, akan mengidentifikasi Tindakan invasive bedah fiksasi internal reduksi terbuka (*Open Reduction Internal Fixation/ ORIF*) sebagai intervensi untuk memfiksasi kedua ujung fragmen tulang yang patah atau fraktur sedapat mungkin kembali seperti letak asalnya. Hal ini sama dengan tindakan yang diberikan terhadap “Tn. B”.

## **B. Analisis Intervensi**

Intervensi yang diberikan pada kasus ini untuk diagnosis utama nyeri akut adalah memberikan manajemen dengan pemberian teknik relaksasi napas dalam (PPNI, 2018). Namun, penulis disini mencoba untuk memberikan intervensi teknik relaksasi nafas dalam dan mendengarkan terapi murottal pada klien dengan sebelum dan setelah operasi. Manajemen nyeri yang diberikan klien yaitu teknik relaksasi nafas dalam dan terapi murottal.

Sebelum dilakukan intervensi, dilakukan observasi terlebih dahulu dengan mengidentifikasi skala nyeri, respon nyeri dan faktor yang memperberat dan

memperingan nyeri. Pengkajian nyeri menggunakan skala deskriptif verbal atau *Verbal Descriptor Scale* (VDS) sebelum dan sesudah intervensi dilanjutkan pemberian teknik relaksasi nafas dalam dan terapi murottal dengan durasi selama  $\pm$  25 menit dengan menginstruksikan klien untuk melakukan teknik relaksasi sebanyak 3 kali atau sampai klien merasa rileks dengan posisi baring sambil tangan diletakkan di samping. Setelah itu, klien difasilitasi untuk mendengarkan terapi murottal surat Ar- Rahman 78 Ayat (Qari; Salim Bahanan) dengan durasi  $\pm$  25 menit dan di evaluasi dan secara mandiri oleh klien apabila nyeri timbul. Terapi diberikan setelah 2 jam setelah klien minum obat nyeri. Setelah diberikan intervensi klien dapat diajarkan untuk dapat melakukan teknik relaksasi nafas dalam dan terapi murottal untuk mengontrol nyeri. Dan apabila nyeri tidak menurun, dapat dilakukan kolaborasi penggunaan obat analgetik.

Setelah dilakukan intervensi selama 3 x 24 jam, hasil yang di dapatkan nyeri menurun dari skala 6 menjadi skala 3. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wahyuningsih, Endah (2021), menyebutkan bahwa pemberian terapi murottal dikombinasikan dengan terapi teknik relaksasi nafas dalam mampu menurunkan nyeri pada klien post SC dengan penurunan nyeri dengan rata-rata 1 poin dari skala 5 menjadi 1 setelah diberikan intervensi keduanya.

Namun hal berbeda didapatkan ketika intervensi diberikan ketika klien telah melakukan operasi. Setelah operasi, klien mengatakan nyeri meningkat dengan skala 8 (berat). Nampak klien meringis kesakitan. Hal ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Helmi (2012) bahwa gejala utama yang muncul dan dirasakan klien post operasi yaitu nyeri yang hebat. Penulis Kembali memberikan intervensi yang sama yaitu memberikan teknik relaksasi nafas dalam dan terapi murottal namun hasil yang didapatkan tidak memberi efek terhadap penurunan

nyeri yang dialami klien. Nyeri menurun setelah dikolaborasikan dengan pemberian terapi farmakologi yaitu dengan injeksi ceterolac 1 amp/ IV.

Jadi penulis dapat berasumsi bahwa pemberian teknik relaksasi nafas dalam dan terapi murottal pada klien yang mengalami nyeri hebat tidak mampu menurunkan nyeri tanpa kolaborasi analgetik, namun pemberian kedua intervensi dapat membantu meningkatkan pelepasan endorfin. Pelepasan tersebut memberikan suatu pengalihan perhatian dari rasa sakit dan dapat mengurangi kecemasan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rejeki dkk (2020), mengemukakan bahwa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dapat membuat seseorang menjadi tenang dan rileks sehingga hal ini akan mempengaruhi penurunan tekanan darah, tingkat kecemasan dan intensitas nyeri.

### **C. Alternatif Pemecahan Masalah**

Intervensi keperawatan yang diberikan untuk manajemen nyeri dalam kasus ini telah disebutkan di atas yaitu pemberian teknik relaksasi dan terapi murottal sebagai intervensi yang dapat membantu mengurangi penggunaan analgetik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Campbell dalam Zahrofi (2013), menyebutkan efek murottal Al-Qur'an terhadap respon tubuh yaitu rangsangan bunyi meningkatkan pelepasan endorfin dan ini membantu menurunkan kebutuhan akan obat-obatan. Hal yang sama didapatkan oleh Yaban (2019), didapatkan bahwa relaksasi napas dalam efektif dalam menurunkan nyeri pasca operasi fraktur. Penggunaan teknik relaksasi dalam periode pasca operasi akan mengurangi penggunaan analgesik pada klien, mengurangi efek samping yang terkait dengan obat dan memastikan bahwa klien akan merasa puas terhadap perawatan.

Evaluasi hasil implementasi yang dilakukan kepada “Tn. B” selama 6 hari ditemukan masalah nyeri akut akibat kecelakaan. 3 hari sebelum dilakukan operasi, klien mampu melakukan teknik relaksasi dan mendengarkan terapi murottal. Hasil yang didapatkan setelah 3 hari berturut-turut dilakukan, nyeri menurun dari skala 6 menjadi skala 3. Namun, hari selanjutnya setelah dilakukan operasi, klien kembali diberikan intervensi yang sama akan tetapi nyeri meningkat setelah operasi dengan skala 8 (berat) yang membuat klien meringis sangat kesakitan. Sehingga intervensi yang diberikan tidak memberikan pengaruh terhadap penurunan nyeri. Nyeri hebat yang dirasakan klien menurun setelah dikolaborasikan pemberian terapi farmakologi yaitu pemberian obat analgetik. Hal ini sejalan dengan hasil studi lain yang menerapkan terapi bacaan Al-Qur’an dengan teknik nafas dalam dapat bersinergi dengan terapi farmakologi dalam menurunkan nyeri. Pemberian terapi Al-Qur’an memberikan efek non farmakologi adjuvant dalam mengatasi nyeri. Hal ini sejalan dengan teori nyeri yaitu keseimbangan antara analgetik akan memberikan efek samping sehingga dibutuhkan terapi komplementar (Purwati dkk., 2019).

Terkait dengan ayat-ayat Allah, sungguh suatu kebahagiaan dan merupakan kenikmatan yang besar, manusia memiliki Al-Qur’an. Selain menjadi ibadah dalam membacanya, bacaannya memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jasmani dan rohani manusia. Jika musik klasik dapat memberikan pengaruh kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan seseorang (EQ). Maka bacaan Al-Qur’an dapat mempengaruhi kecerdasan spiritual, menenangkan batin dan menurunkan tingkat depresi (Said. 2012).

Maha benar Allah yang telah berfirman dalam QS. Al-A’raf/ 7:204:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٤﴾

*“Dan apabila dibacakan Al-Qur’an, simaklah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat”.*



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pemberian asuhan keperawatan pada “Tn.B” dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula distal dapat disimpulkan yaitu:

1. Hasil pengkajian ditemukan keluhan utama adalah nyeri
2. Diagnosis keperawatan yang muncul berjumlah 5 yaitu: nyeri akut, gangguan mobilitas fisik, defisit perawatan diri, dan risiko defisit nutrisi
3. Intervensi dan implementasi yang dilakukan pada klien dengan fraktur 1/3 tibia et fibula distal yaitu: manajemen nyeri, teknik latihan penguatan, perawatan diri, dan manajemen gangguan makan
4. Proses evaluasi keperawatan pada klien dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula yaitu: nyeri akut menurun, gangguan mobilitas fisik belum teratasi (klien telah menjalani operasi), defisit perawatan diri teratasi, dan risiko defisit nutrisi teratasi.

#### **B. Saran**

##### **1. Bagi Profesi Keperawatan**

Hasil studi kasus ini dapat dijadikan referensi dalam memenuhi intervensi manajemen nyeri klien. Perawat tidak boleh hanya berfokus pada pengobatan farmakologi saja dalam asuhan keperawatan manajemen nyeri. Perawat perlu menggunakan intervensi non farmakologi untuk mengurangi penggunaan analgesik pada klien yang mengalami nyeri.

## **2. Bagi Rumah Sakit**

Hasil studi kasus ini dapat dijadikan acuan dalam penerapan manajemen keperawatan yang harus diimplementasikan secara komprehensif sesuai dengan disiplin ilmu keperawatan.

## **3. Bagi Institusi Pendidikan**

Hasil studi kasus ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien fraktur 1/3 tibia et fibula distal dalam manajemen nyeri.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianti, Hebert. 2019. *Modul Workshosp Biologi Abdimas*. Jawa Barat: CV Jejak
- Aini, Lela & Reskita, Reza. (2018). *Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien Fraktur*. *Jurnal Kesehatan: Program Studi Ners, STIK Siti Khadijah Palembang, Indonesia*. Volume 9, Nomor 2.
- Aji, S. B., Armiyati, Y., & Sn, S. A. (2015). Efektifitas Antara Relaksasi Autogenik Dan Slow Deep Breathing Relaxation Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien Post Orif Di Rsud Ambarawa. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan (JIKK)*, 002.
- Alligood. (2017). *Pakar Teori Keperawatan Dan Karya Mereka*. Elsevier: Singapore.
- American Academy of Orthopaedic Surgeons . 2019. Distal Femur (Thighbone) Fractures of The Knee. Tersedia di <https://www.orthoinfo.org>
- Apley, A. G., & Solomon, L. (2018). *System of Orthopaedics and Trauma* (A. Blom, D. Warwick, & M. R. Whitehouse (eds.); 10th Editi). CRC Press.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315118192>
- Asikin, M. dkk., (2016). *Keperawatab Medikal Bedah: Sistem Muskuloskeletal*. Jakarta: Erlangga
- Ayudianingsih, N. G., & Maliya, A. (2015). *Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Pada Pasien Pasca Operasi Fraktur Femur Di Rumah Sakit Karima Utama Surakarta*. 191–199
- Balitbangkes RI. (2013). *Riset dan Kesehatan Dasar*. Badan Penelitian dan Kesehatan Kemenkes RI.
- Benjamin. (2020, June 20). What is Bone Fracture? [Kesehatan]. Penn Medicine.
- Cahyanti, E. I., Anugrahanti, W., & Wibowo. (2019). *Asuhan Keperawatan Pada Klien Gastritis Dengan Masalah Nyeri Akut*
- Dahlan, M. S. (2019). *Besar sampel: Cara pengambilan sampel dalam penelitian kedokteran dan kesehatan (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Medika
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia 2018*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Fasa, I.F, Firmawati, E.,. (2016). *Pengaruh Murotal AlQur'an Terhadap Tingkat Depresi Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis Di Pku Muhammadiyah Gamping*.
- Handayani, S., Arifin, H., & Manjas, M. (2019). *Kajian penggunaan analgetik Pada Pasien Pasca Bedah Fraktur di Trauma Centre RSUP M. Djamil Padang*. *JSFK (Jurnal Sains Farmasi & Klinis)*, 6(2), 113–120.  
<https://doi.org/10.25077/JSFK.6.2.113-120.2019>

- Hermanto, R., Isro'in, L., & Nurhidayat, S. (2020). Studi Kasus : Upaya Penurunan Nyeri Pada Pasien Post Operasi Fraktur Femur. *Health Sciences Journal*, 4(1), 112–123. <https://doi.org/10.1080/19325037.2018.1486755> Kemenkes. 2016. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah 2 . Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Li, C., Li, Z., Wang, Q., Shi, L., Gao, F., & Sun, W. (2021). The Role of Fibular Fixation in Distal Tibia-Fibula Fractures: A Meta-Analysis. *Advances in Orthopedics*, 2021, 6668467. <https://doi.org/10.1155/2021/6668467>
- Majed & Hassan. (2021). A review of the literature on the health benefits of Salat (Islamic prayer). *Med Journal Malaysia*, 76(1), 93–97.
- Mayasari, C. D. (2016). Pentingnya Pemahaman Manajemen Nyeri Non Farmakologi bagi Seorang Perawat. *Jurnal Wawasan Kesehatan*, 1(1). <https://doi.org/10.1016/j.hsag.2015.08.002>
- Mirsane, S. A., Kheirkhah, D., Shafagh, S., Mirbagher-Ajorpaz, N., & Aminpour, J. (2016). The Effect of Listening to Vaghe'a Surah And Its Translation on the State and Trait Anxiety Before General Surgeries: A Randomized Controlled Controlled Trial. *Health, Spirituality and Medical Ethics*, 3(3), 12–17. <http://jhsme.muq.ac.ir/article-1-117-fa.html>
- Muttaqin, Arif. 2008 .Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien Dengan Gangguan Sistem muskuloskeletal Jakarta: Salemba Medika.
- Purwati, E. Dkk. (2019). Terapi Murottal Al-Qur'an Menurunkan Intensitas Nyeri Post Sectio Caesarea. *Jurnal Ilmu Keperawatan Maternitas*, Vol 2 No 1, page 35-43
- Pratiwi, A., Susanti, E. T., & Astuti, W. T. (2020). Penerapan Teknik Relaksasi Genggam Jari Terhadap Skala Nyeri Pada Sdr . D Dengan Paska Open Reduction Internal Fixation ( ORIF ). *Jurnal Keperawatan Karya Bhakti*, 6(1), 1–7
- Rejeki, S., Trimuliani, S., Machmudah, M., & Khayati, N. (2020). Therapeutic effect of Al-Quran murattal (surah yusuf) on blood pressure level in pregnant women with preeclampsia. *South East Asia Nursing Research*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.26714/seanr.2.1.2020.27-32>
- Rilla E.V., Elwiyah R, Aat S. (2014). Terapi Murottal Efektif Menurunkan Tingkat Nyeri Dibanding Terapi Musik Pada Pasien Pascabedah. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 17, hal 74-80.
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) (2018). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan, Republik Indonesia
- Risnah & Irwan, M. (2021). Falsafah dan Teori Keperawatan Dalam Integrasi Keilmuan: UPT Perpustakaan UIN Alauddin. Alauddin University Press

- Rustam, J. S., Kongsuwan, W., & Kitrungrote, L. (2018). Comfort in Patients Receiving Mechanical Ventilation: A Literature Review. *Critical Care Nursing*, 11(2), 1–7. <https://doi.org/10.5812/ccn.64159>
- Said. (2012). Cara Islami Mencegah dan Mengobati Gangguan Otak, Stress dan Depresi. Jakarta : Qultum Media.
- Septiani, L. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri Pada Klien Fraktru Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta.
- Siswanti H. & Umami K. (2017). Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Nyeri Pasien Post Seksio Sesaria Di Rsi Sunan Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2016.
- Smeltzer, S. C., Bare. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. 2008. Brunner and Suddarth textbook of medical surgical nursing. (11thed). Philadelphia: Lippincot Williams.
- Suwahyu, Romy., Sahputra, Eka. Roni & Fatmadona, Rika. (2021). Systemtic Review: Penurunan Nyeri Pada Pasien Pasca Operasi Fraktur Melalui Penggunaan Teknik Napas Dalam. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* Volume 11 No 1, Hal 193-206.
- Suyanto, & Bangsawan, M. (2013). Efek Kombinasi Bacaan Al quran dan Terapi Farmakologis Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Fraktur Ekstremitas. *Jurnal Keperawatan*, IX(1), 57–62. <https://doi.org/10.1186/1687-9856-2014-3>
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. 2018. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) Edisi 1 Cetakan 2. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat PPNI
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. 2019. Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) Edisi 1 Cetakan 2. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat PPNI
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. 2017. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) Edisi 1 Cetakan 3(Revisi) . Jakarta : Dewan Pengurus Pusat PPNI
- Yaban, Z. S. (2019). Usage of NonPharmacologic Methods on Postoperative Pain Management by Nurses : Sample of Turkey. 12(1), 529–541. <https://doi.org/10.4103/2230-8598.151234>
- Wahyuningsih, Endah & Khayati, Nikmatul. (2021). Terapi Murottal Menurunkan Nyeri Pasien Post Sectio Caesaria. Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan :Universitas Muhammadiyah Semarang
- World Health Organization. Global Status Report on Projections of Mortality and Cause of Death 2018.

- WHO. (2021a, February 8). Musculoskeletal Condition [Kesehatan]. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions>
- WHO. (2021b, June 21). Road Traffic Injuries [Kesehatan]. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>
- Wijaya AS dan Putri YM. 2013. KMB 2 Keperawatan Medikal Bedah (Keperawatan Dewasa). Yogyakarta: Nuha Medika





## DOKUMENTASI



# UJI TURNITIN

## TUGAS AKHIR ASRAWATI

ORIGINALITY REPORT

**22%**

SIMILARITY INDEX

**22%**

INTERNET SOURCES

**1%**

PUBLICATIONS

**9%**

STUDENT PAPERS

INTERNET SOURCES

1	eprints.poltekkesjogja.ac.id <small>Internet Source</small>	7%
2	es.scribd.com <small>Internet Source</small>	3%
3	journal.stikeskendal.ac.id <small>Internet Source</small>	2%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id <small>Internet Source</small>	2%
5	digilib.ukh.ac.id <small>Internet Source</small>	2%
6	www.scribd.com <small>Internet Source</small>	1%
7	jurnal.unimus.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
8	docobook.com <small>Internet Source</small>	1%
9	repository.poltekkes-kaltim.ac.id <small>Internet Source</small>	1%

10	repository.unissula.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
11	repository.unej.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
12	repo.stikesperintis.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
13	perirusli.blogspot.com <small>Internet Source</small>	1%
14	repositori.usu.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
15	itdafriyenny.wordpress.com <small>Internet Source</small>	1%

111/112

Exclude quotes:

Exclude matches:

Spindora.com Caricane

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Asrawati**, Lahir di Tala Sompu, Takalar, Sulawesi Selatan pada tanggal 02 Februari 1997. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Rahim dan ibu Asmawati. Mulai menempuh pendidikan formal pada jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN No. 7 Tala pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Takalar dan tamat pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Takalar. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Keperawatan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2015 lulus melalui jalur SNMPTN. Pada tahun 2019 penulis menyelesaikan studi Strata 1 (S1) Keperawatan dan tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa program Profesi Ners angkatan XVI dan selesai pada Tahun 2021.