

**INTERVENSI KOMPRES HANGAT DENGAN  
AROMATERAPI *PEPPERMINT* PADA PASIEN NYERI POST  
OPERASI *SECTIO CAESAREA* (EKLAMPSIA)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Tugas Akhir Ners**

**Oleh:**

IKRIMAH SYAM, S. Kep

NIM: 70900120003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2021**

**INTERVENSI KOMPRES HANGAT DENGAN  
AROMATERAPI *PEPPERMINT* PADA PASIEN NYERI POST  
OPERASI *SECTIO CAESAREA* (EKLAMPSIA)**



**Tugas Akhir Ners**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Ners Jurusan Ilmu Keperawatan pada Fakultas  
Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

IKRIMAH SYAM, S. Kep  
NIM: 70900120003

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikrimah Syam, S. Kep  
NIM : 70900120003  
Tempat/Tgl, Lahir : Mamuju, Baras IV, 05 Agustus 1998  
Jurusan/Prodi : Profesi Ners  
Konsentrasi : Keperawatan Gawat Darurat  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Dusun Pancana, Desa Julukanaya, Kec. Pallangga, Kab. Gowa  
Judul : Intervensi Kompres Hangat Dengan Aromaterapi *Peppermint* Pada Pasien Nyeri Post Operasi *Sectio Caesarea* (Eklampsia)

Dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tugas akhir ini benar adalah hasil karya tulis ilmiah penyusunan sendiri. Jika di kemudian hari tugas akhir ini adalah duplikat, plagiat, tiruan dari hasil kerja orang lain, maka karya tulis dan gelar yang diperoleh tidak sah/batal dimata hukum.

Gowa, 14 Juli 2021  
Penyusun,

IKRIMAH SYAM, S.Kep  
70900120003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudari: Ikrimah Syam NIM: 70900120003, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Intervensi Kompres Hangat Dengan Aromaterapi *Peppermint* Pada Pasien Nyeri Post Operasi *Sectio Caesarea* (Eklampsia)”, memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 14 Juli 2021

Ns. Eva Yustilawati, S.Kep., M.Kep  
**Pembimbing I**

Ns. Ardian Adhiwijaya, S.Kep  
**Pembimbing II**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul “Intervensi Kompres Hangat Dengan Aromaterapi *Peppermint* Pada Pasien Nyeri Post Operasi *Sectio Caesarea* (Eklampsia)” yang disusun oleh Ikrimah Syam NIM : 70900120003, Mahasiswa jurusan keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 15 juli 2021 M, bertepatan dengan 05 Dzulhijjah 1442 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi Profesi Ners, Jurusan Keperawatan.

**Makassar, 15 Juli 2021 M**  
**05 Dzulhijjah 1442 H**

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes (.....)

Sekretaris : Dr. Patimah. S.Kep.,Ns., M.Kes (.....)

Munaqisy I : Ns. Ilhamsyah. S.Kep., M.Kep (.....)

Munaqisy II : Dr. H. M. Dahlan (.....)

Pembimbing I : Ns. Eva Yustilawati, S.Kep., M.Kep (.....)

Pembimbing II: Ns. Ardian Adhiwijaya, S.Kep., M.Kep (.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP:198007012006042002

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., Tuhan semesta alam karena berkat rahmat keimanan, kesehatan, kesabaran dan hidayah-Nyalah yang masih tercurah kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Sholawat beserta salam kita limpahkan untuk junjungan Nabi Muhammad saw.

Tugas akhir ners yang berjudul “Intervensi Kompres Hangat Dengan Aromaterapi *Peppermint* Pada Pasien Nyeri Post Operasi *Sectio Caesarea* (Eklampsia)” ini dibuat memenuhi syarat ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. dr. Syatirah, S.Ked., M.Kes., Sp.A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep dan Hj. Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ns. Eva Yustilawati, S.Kep., M.Kep dan Ns. Ardian Adhiwijaya, S.Kep., M.Kep selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini
4. Ns. Ilhamsyah, S.Kep., M.Kep dan Dr. H.M. Dahlan selaku penguji I dan II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membangun bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ners ini.

5. Seluruh Dosen Jurusan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Keluarga tercinta terimakasih yang tak terhingga atas doa dan dukungannya selama ini
7. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang begitu banyak membantu dalam penyusunan tugas akhir ners ini.

Penulis mengharapkan karya ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik diwaktu yang akan datang.

Gowa, 14 Juli 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Sampul .....	1
Halaman Sampul.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian.....	iii
Halaman Persetujuan .....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel .....	xi
Halaman Abstrak (Indonesia).....	xii
Halaman Abstract (Inggris) .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan .....	5
D. Manfaat .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Konsep Teori (Penyakit/Masalah) .....	7
B. Konsep Keperawatan.....	16
C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan .....	33
D. Evidence Based Nursing .....	42
<b>BAB III LAPORAN KASUS.....</b>	<b>49</b>
A. Pengkajian.....	49
B. Analisa Data.....	62
C. Diagnosis Keperawatan.....	63
D. Intervensi Keperawatan .....	64
E. Implementasi Keperawatan .....	68
F. Evaluasi.....	76
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>80</b>
A. Analisis Kasus.....	80

B. Analisis Intervensi.....	81
C. Alternative Pemecahan Masalah .....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>92</b>
Lampiran 1: Jurnal Rujukan Utama .....	95
Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup.....	115
Lampiran 3 Dokumentasi Pemberian Tindakan .....	116



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 2.1. Kerangka Konsep Theory of Comfort Kolcaba .....	33
Gambar 2.2. Numerical Rating Scale (NRS) .....	40
Gambar 3.1. Genogram Klien .....	58



## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 2.1. Klasifikasi Hipertensi .....	9
Tabel 3.1. Analisis Data .....	62
Tabel 3.2. Intervensi Keperawatan.....	64
Tabel 3.3. Implementasi Keperawatan .....	68
Tabel 3.4. Evaluasi .....	76



## ABSTRAK

Nama : Ikrimah Syam  
NIM : 70900120003  
Judul : Intervensi Kompres Hangat Dengan Aromaterapi *Peppermint* Pada Pasien Nyeri Post Operasi *Section Caesarea* (Eklampsia)

**Latar Belakang:** Menurut WHO Preeklampsia dan Eklampsia merupakan salah satu penyebab utama kematian pada ibu di dunia didalam preeklampsia dan eklampsia terdapat 211 per 100.000 kelahiran hidup dan diperkirakan jumlah kematian ibu adalah 295.000-340.000 kematian ibu terjadi setiap tahunnya. Eklampsia merupakan salah satu komplikasi dari preeklampsia dengan adanya kejang dan penurunan kesadaran, dan tindakan operasi *section caesarea* adalah tindakan terminasi kehamilan untuk menyelamatkan ibu dan anaknya. Nyeri merupakan rasa yang muncul pada pasien setekah dilakukan tindakan operasi *section caesarea* pada daerah insisi sehingga menyebabkan robeknya jaringan pada dinding perut dan dinding uterus. Salah satu intervensi non farmakologi yang dapat dilakukan dalam menurunkan nyeri adalah kompres hangat dengan aroma terapi *peppermint* pada pasien. **Tujuan penulisan:** adalah melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami eklampsia post operasi *section caesarea* dengan masalah nyeri di ruang ICU dengan menggunakan kompres hangat dengan aromaterapi *peppermint*. **Metode:** yang digunakan adalah study kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan pendokumentasian. Pelaksanaan kompres hangat dengan aromaterapi *peppermint* 1 kali sehari dalam 2 hari pemberian. **Hasil:** analisis data menunjukkan beberapa diagnosis yaitu nyeri akut, gangguan mobilitas fisik dan resiko infeksi. Pemberian kompres hangat dengan aromaterapi *peppermint* adalah intervensi yang bisa digunakan dalam menurunkan nyeri. **Kesimpulan:** berdasarkan hasil evaluasi kasus yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa penerapan kompres hangat dengan aromaterapi *peppermint* yang dilakukan 1 kali sehari dalam 2 hari menunjukan bahwa terjadi penurunan pada masalah nyeri pasien setelah pemberian, hal ini menunjukkan bahwa kompres hangat dengan aromaterapi *peppermint* efektif dilakukan dalam membantu menurunkan nyeri pada pasien.

**Kata Kunci :** Eklampsia, Nyeri, Kompres Hangat dengan Aromaterapi *Peppermint*

## ABSTRACT

Name : Ikrimah Syam

NIM : 70900120003

Title : *Intervention of warm compresses with peppermint aromatherapy in postoperative pain patients with cesarean section (eclampsia)*

**Background:** According to WHO Preeclampsia and Eclampsia are one of the main causes of maternal death in the world, in preeclampsia and eclampsia there are 211 per 100,000 live births and it is estimated that the number of maternal deaths is 295,000-340,000 maternal deaths occur annually. Eclampsia is one of the complications of preeclampsia with seizures and decreased consciousness, and cesarean section is an act of termination of pregnancy to save the mother and child. Pain is a symptom that appears in patients who undergo cesarean section surgery in the incision area caused by tearing of tissue in the abdominal wall and uterine wall. One of the non-pharmacological interventions that can be done in reducing pain is a warm compress with peppermint aroma therapy on the patient. The purpose of writing: is to carry out nursing care in patients with postoperative eclampsia with cesarean section with pain problems in the ICU using warm compresses with peppermint aromatherapy. **Method:** used is a case study with data collection techniques through interviews, observation, physical examination and documentation. Implementation of warm compresses with peppermint aromatherapy 1 time a day for 2 days of administration. **Results:** data analysis showed several diagnoses, namely acute pain, impaired physical mobility and risk of infection. Giving a warm compress with peppermint aromatherapy is an intervention that can be used to reduce pain. **Conclusion:** based on the results of the case evaluation, it was concluded that the application of warm compresses with peppermint aromatherapy which was carried out 1 time a day for 2 days showed that there was a decrease in the patient's pain problems after administration, this indicates that warm compresses with peppermint aromatherapy are effective in helping reduce pain in the patient.

**Keywords :** Eclampsia, Acute Pain, Warm Compress with Peppermint Aromatherapy

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu penyebab kematian terbesar pada ibu yaitu preeklamsia disertai dengan eklamsia yang mencapai lebih dari 1,5 juta dari 8 juta ibu yang mengalami komplikasi kehamilan di setiap tahunnya. Angka kematian ibu akibat dari komplikasi kehamilan dan persalinan jauh lebih rendah terjadi pada negara maju yaitu sekitar 1 dari 5000 perempuan, sedangkan di negara berkembang 1 dari 11 perempuan meninggal akibat dari komplikasi kehamilan (Ginekologi, 2018).

Menurut data *World Health Organization* (WHO), angka kematian ibu di dunia pada tahun 2017 adalah 211 per 100.000 kelahiran hidup atau diperkirakan jumlah kematian ibu adalah 295.000-340.000 kematian. Di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan merupakan negara berkembang penyumbang angka kematian ibu terbesar yaitu sebanyak 243 dari 100.000 kelahiran, dibandingkan dengan negara maju di bagian benua Amerika hanya 5 dari 100.000 kelahiran. (WHO, *World Health Statistics 2020*, 2020). Di negara bagian *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) angka kematian ibu mencapai 300 dari 100.0000 kelahiran (WHO, 2019).

Negara Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang masuk kategori tinggi pada kasus kematian pada ibu. Menurut WHO angka kematian ibu di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 177 dari 100.00 kelahiran. Hal ini masih sangat jauh dari target dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup Berdasarkan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 1991-2010 angka kematian ibu mengalami penurunan dari

390 menjadi 228 dari 100.000 kelahiran, pada tahun 2012 angka kematian ibu mengalami penurunan menjadi 214 dari 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2013 angka kematian ibu sebanyak 209 dari 100.000 kelahiran, tahun 2014 angka kematian ibu sebesar 199 dari 100.000 kelahiran, tahun 2015 sebesar 192 dari 100.000 kelahiran, tahun 2016 sebesar 184 dari 100.000 kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Indonesia mengalami penurunan di setiap tahunnya, namun belum mencapai target dari SDGs (Kemenkes RI, Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2015 menyatakan bahwa preeklampsia menempati urutan kedua penyebab kematian ibu di Sulawesi Selatan. Hasil laporan tahunan Bidang Kesehatan Masyarakat tahun 2010 menyebutkan jumlah kematian ibu akibat komplikasi selama kehamilan dan persalinan sebanyak 121 kasus, dimana diantaranya disebabkan karena pendarahan sebanyak 63 kasus (52,07%), hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia/eklampsia) sebanyak 28 kasus (31,65%) dan infeksi 2 kasus (0,02%). Angka kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 sebanyak 115 kasus atau 78,38 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 138 kasus atau 93,20 per 100.000 kelahiran hidup (Dinkes Sulsel, 2015).

Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan selama dinas di RSUD Labuang Baji Makassar, dalam sebulan terdapat kasus 4 kasus post operasi SC, 2 diantaranya dengan ibu preeklamsia disertai eklamsia, 1 kasus akibat partus yang lama indikasi panggul sempit dan 1 kasus plasenta previa (plasenta menutup jalan lahir). Hal ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan tindakan operasi *section caesarea* maka di butuhkan perawatan yang intensif untuk memantau keadaan pasien selama 3 kali dalam 24 jam agar tidak terjadi

komplikasi yang lebih berat sehingga kasus yang dapat ditemukan di ruang *Intensif care Unit (ICU)*.

Preeklampsia adalah kondisi spesifik pada kehamilan yang ditandai dengan adanya hipertensi dan proteinuria yang baru terjadi pada kehamilan dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu, pada ibu bersalin dan nifas (POGI, 2016). Eklampsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai tekanan darah tinggi dan kejang sebelum, selama, atau setelah persalinan. Kondisi serius ini selalu di dahului dengan preeklamsia sebelumnya (Pane, 2020)

*Sectio Cesarea (SC)* merupakan salah satu tindakan terminasi kehamilan untuk menyelamatkan kondisi ibu dan janin. Ada beberapa indikasi dilakukan tindakan operasi *sectio caesarea* di antaranya: preeklamsia, plasenta previa, gawat janin, persalinan tidak maju, letak lintang, prolapsus tali pusat, panggul sempit dan diproporsi sepalopelvik, (Nurhayati, Andriani, & Malisa, 2015; Padila, 2015). Tindakan setelah operasi *section caesarea* dapat menyebabkan masalah akibat insisi dari robekan jaringan dinding perut dan dinding uterus dapat terjadinya perubahan kontinuitas karena adanya pembedahan sehingga ibu merasa nyeri dan mengeluhkan nyeri tersebut (Putri, 2015).

Nyeri merupakan suatu rasa yang tidak nyaman, baik ringan maupun berat. Nyeri bersifat individual dan tidak dapat di ukur secara objekif namun dapat diukur secara subjektif karena hanya pasien yang dapat merasakan adanya nyeri. Nyeri merupakan mekanisme fisiologis yang bertujuan untuk melindungi diri. Nyeri dapat memenuhi seluruh pikiran seseorang, mengatur aktivitasnya, dan mengubah kehidupan orang tersebut (Heriana, 2014).

Pasien mengeluhkan rasa nyeri pada daerah luka sayatan setelah efek anestesi hilang dan hal itu sangat mengganggu, pasien akan merasa tidak nyaman. Dampak negatif akibat dari nyeri yaitu terbatasnya mobilitas fisik,

activity daily living terbatas, dan bonding attachment an ibu dan anak pun terganggu (Wahyu, Lina, & Fitri, 2019).

Penanganan yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah nyeri yang dirasakan oleh pasien yaitu manajemen nyeri secara farmakologi dengan menggunakan obat analgesik untuk mengontrol rasa nyeri dan manajemen nyeri secara non farmakologi dapat berupa kompres dengan suhu dingin/ panas dan aromaterapi (SIKI, 2018).

Berdasarkan penelitian (Wahyu, Lina, & Fitri, 2019) mengemukakan bahwa pemberian kompres hangat dengan aromaterapi dapat menurunkan tingkat nyeri pada pasien post operasi *sectio caesarea*. Intensitas nyeri pasien post operasi *section caesarea* sebelum dilakukan kompres hangat dengan aroma jasmine essential oil yaitu 15 orang (100%) responden mengalami nyeri sedang dengan rentang skala 4-6. Sedangkan intensitas nyeri pasien post operasi *sectio caesarea* sesudah dilakukan kompres hangat dengan jasmine essential oil yaitu 12 Orang (80,0%) responden mengalami nyeri ringan dengan rentang skala 1-3, dan 3 Orang (20,0%) responden dengan intensitas nyeri sedang dengan rentang skala 4-6.

Menurut (Susilarini, Winarsih, & Idhayanti, 2017) aromaterapi yang diberikan dengan kompres hanya sedikit menggunakan minyak essensial. Aromaterapi atau minyak essensial yang digunakan memiliki konsentrasi tinggi yang di ekstrasi dari berbagai tumbuhan. Pemberiannya pun dapat dilakukan melalui pijat, kompres, inhalasi, di campuran kedalam air untuk mandi, serta melalui mukosa melalui membran mukosa dalam bentuk pesarium atau supositoria dan terkadang dalam bentuk murni.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan intervensi keperawatan kompres hangat dengan *aromaterapi peppermint* pada

pasien yang mengalami nyeri post operasi *section caesarea* (SC) eklampsia di ruangan *Intensif Care Unit* (ICU) RSUD Labuang Baji Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka rumusan masalah pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah Bagaimana pelaksanaan intervensi kompres hangat dengan aromaterapi *peppermint* pada pasien yang mengalami preeklampsia post operasi *section caesarea* dengan masalah nyeri.

## **C. Tujuan**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada klien yang mengalami eklampsia post operasi *section caesarea* dengan masalah nyeri di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Labuang Baji Pada Tahun 2021

### **2. Tujuan Khusus**

- a) Untuk Mengetahui gambaran hasil pengkajian pada pasien yang mengalami eklampsia post operasi *section caesarea*
- b) Untuk Mengetahui diagnosis keperawatan pada pasien yang mengalami eklampsia post operasi *section caesarea*
- c) Untuk Mengetahui intervensi keperawatan pada pasien yang mengalami eklampsia post operasi *section caesarea*
- d) Untuk mengetahui implementasi keperawatan pada pasien yang mengalami eklampsia post operasi *section caesarea*
- e) Untuk mengetahui evaluasi tindakan keperawatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana keperawatan pada pasien yang mengalami eklampsia post operasi *section caesarea*

- f) Untuk Menganalisis intervensi kompres hangat dengan aromaterapi *peppermint* pada pasien yang mengalami preeklamsia post *section caesarea* dengan masalah nyeri.

## **D. Manfaat**

### **1. Manfaat teoritis**

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan praktik asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami eklampsia post operasi *section caesarea* di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Labuang Baji Makassar.

### **2. Manfaat aplikatif**

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat digunakan pada intervensi masalah nyeri pada pasien dengan eklampsia post operasi *section caesarea*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Teori (Penyakit/Masalah)**

##### **1. Pengertian**

Preeklampsia adalah kondisi kehamilan dimana terjadi disfungsi plasenta dan respon pada kehamilan ketika terjadi inflamasi sistemik dengan adanya aktivasi endotel dan koagulasi. Penegakan diagnosis preeklampsia ketika terjadi hipertensi selama masa kehamilan dengan usia kehamilan 20 minggu keatas yang disertai dengan adanya gangguan sistem organ lainnya, dan disertai dengan adanya proteinuri yang baru terjadi pada masa kehamilan. Preeklampsia adalah sekumpulan gejala yaitu hipertensi, edema dan proteinuria yang timbul pada wanita hamil dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu, pada ibu bersalin dan nifas (POGI, 2016).

Menurut (Wiknjosatno, 2011) Pre-eklampsia adalah suatu penyakit yang terjadi pada masa kehamilan dan di tandai dengan adanya hipertensi, proteinuria, dan edema. Pre-eklampsia berat adalah penyulit kehamilan yang akut serta dapat terjadi antenatal, intranatal, dan post natal pada ibu. (Prawihardjo, 2013)

Eklampsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai tekanan darah tinggi dan kejang sebelum, selama, atau setelah persalinan. Kondisi serius ini selalu di dahului dengan preeklampsia sebelumnya (Pane, 2020).

##### **2. Etiologi**

Etiologi penyakit ini belum diketahui dengan pasti Menurut Nita dan Mustika (2013). Ada beberapa factor risiko tertentu yang berkaitan dengan perkembangan penyakit :

- a. Jumlah umur ibu di atas 35 tahun
- b. Pada ibu yang mengalami hipertensi kronis atau penyakit ginjal, insiden dapat mencapai 25%
- c. Primigravida, kira-kira 85% preeklamsia terjadi pada kehamilan pertama
- d. Grand multigravida
- e. Janin besar
- f. Morbid obesitas atau kegemukan dan penyakit yang menyertai hamil seperti diabetes mellitus
- g. Distensi rahim berlebihan: hindramnion, hamil ganda, mola hidatidosa. Preeklamsia terjadi pada 14% sampai 20% kehamilan dengan janin lebih dari Satu

Menurut Wiknjastro (2011) faktor predisposisi/risiko tersebut antara lain:

- 1) Usia/umur: primigravida dengan usia dibawah 20 tahun dan semua ibu dengan usia diatas 35 tahun dianggap lebih rentan.
- 2) Paritas: primigravida memiliki insiden hipertensi hampir dua kali lipat
- 3) Faktor keturunan (*genetic*): bukti adanya pewarisan secara genetik paling mungkin disebabkan oleh turunan resesif.
- 4) Status sosial ekonomi: pre eklamsia dan eklamsia lebih umum ditemui pada kelompok sosial ekonomi rendah.
- 5) Komplikasi obstetrik: kehamilan kembar, kehamilan mola atau *hidrops fetalis*.
- 6) Riwayat penyakit yang sudah ada sebelumnya: Hipertensi, Diabetes Melitus, penyakit ginjal, *System Lupus Erytematosus (SLE)*, *sindrom antifosfolipid antibody*.

### 3. Klasifikasi

Pre-eklampsia menurut Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI, 2016) terbagi atas dua klasifikasi, yaitu preeklampsia ringan dan preeklampsia berat.

#### a. Preeklampsia ringan

##### 1) Hipertensi :

Pada ibu hamil akan mengalami peningkatan tekanan darah minimal 140 mmHg sistolik atau 90 mmHg diastolic yang dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 15 menit pada lengan yang sama.

**Tabel 2.1** klasifikasi hipertensi menurut JNC VII

Kategori	Sistolik (mmHg)	Diastolik (mmHg)
Normal	<120	<80
<b>Hipertensi</b>		
• Pre hipertensi	120-139	80-89
• Hipertensi tahap 1	140-159	90-99
• Hipertensi tahap 2	>/ 160	>/ 100
<b>Hipertensi Sistolik Terisolasi &gt;140 dan &lt;90</b>		

*Joint National Committee on Prevention Detection, Evaluation, and Treatment of High Pressure VII/JNC - VII, 2003*

Sumber: (Kemenkes RI, 2018)

##### 2) Protein dalam urin :

Protein urin melebihi 300 mg dalam 24 jam atau tes urin dipstik > positif 1. Jika tidak didapatkan protein urin, hipertensi dapat diikuti salah satu dibawah ini:

- Trombositopeni : Trombosit < 100.000 / mikroliter
- Gangguan ginjal

Terdapat peningkatan kreatinin serum sebanyak 1,1 mg/dL, yang normalnya kondisi ginjal tidak mengalami kelainan.

- Gangguan Liver :

Terjadi nyeri pada epigastrium region kanan atas pada abdomen yang di tandai adanya peningkatan konsentrasi transaminase 2 kali normal.

- Edema Paru
- Gejala Neurologis :

Ditandai dengan adanya nyeri kepala, gangguan penglihatan bahkan hingga mengalami stroke

- Gangguan Sirkulasi Uteroplasenta :

Oligohidramnion, *Fetal Growth Restriction* (FGR) atau didapatkan adanya *absent or reversed end diastolic velocity* (ARDV)

**b. Preeklamsia berat**

1) Hipertensi :

Pada ibu hamil akan mengalami peningkatan tekanan darah minimal 160 mmHg sistolik atau 110 mmHg diastolic yang dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 15 menit pada lengan yang sama.

2) Trombositopeni : Trombosit < 100.000 / mikroliter

3) Gangguan ginjal :

Terdapat peningkatan kreatinin serum sebanyak 1,1 mg/dL, yang normalnya kondisi ginjal tidak mengalami kelainan.

4) Gangguan Liver :

Terjadi nyeri pada epigastrium region kanan atas pada abdomen yang di tandai adanya peningkatan konsentrasi transaminase 2 kali normal.

5) Edema Paru

6) Gejala Neurologis :

Ditandai dengan adanya nyeri kepala, gangguan penglihatan bahkan hingga mengalami stroke

7) Gangguan Sirkulasi Uteroplasenta :

Oligohidramnion, *Fetal Growth Restriction* (FGR) atau didapatkan adanya *absent or reversed end diastolic velocity* (ARDV)

**c. Eklampsia merupakan komplikasi dari preeklampsia dengan adanya kejang dan/atau koma pada ibu hamil  $\geq$  20 minggu yang disebabkan selain karena gangguan neurologik.**

#### 4. Patofisiologi

Pada preeklampsia terjadi spasme pembuluh darah yang disertai dengan retensi air dan garam. Pada biopsi ginjal ditemukan spasme hebat arteriola glomerulus. Pada beberapa kasus, lumen arteriola sedemikian sempitnya sehingga nyata dilalui oleh satu sel darah merah. Jadi jika semua arteriola di dalam tubuh mengalami spasme maka tekanan darah akan naik, sebagai usaha untuk mengatasi kenaikan tekanan perifer agar oksigen jaringan dapat dicukupi. Sedangkan kenaikan berat badan dan edema yang disebabkan oleh penimbunan air yang berlebihan dalam ruangan interstisial belum diketahui sebabnya, mungkin karena retensi air dan garam. Proteinuria dapat disebabkan oleh spasme arteriola sehingga terjadi perubahan pada glomerulus.

Peningkatan sensitivitas vaskuler terhadap angiotensin II. Peningkatan ini menyebabkan hipertensi dan kerusakan vaskuler, akibatnya akan terjadi vasospasme. Vasospasme menurunkan diameter pembuluh darah ke semua organ, fungsi organ seperti plasenta, ginjal, hati dan otak menurun sampai 40-60 %. Gangguan plasenta menimbulkan degenerasi pada plasenta dan kemungkinan terjadi IUGR dan IUFD pada fetus. Aktivitas uterus dan sensitivitas terhadap oksitosin meningkat.

Penurunan perfusi ginjal menurunkan GFR dan menimbulkan perubahan glomerulus, protein keluar melalui urin, asam urat menurun, garam dan air di tahan, tekanan osmotik plasma menurun, cairan keluar dari intravaskuler, menyebabkan hemokonsentrasi. Peningkatan viskositas darah dan edema jaringan berat dan peningkatan hematokrit. Pada preeklampsia berat terjadi penurunan volume darah, edema berat dan berat badan naik dengan cepat.

Penurunan perfusi hati menimbulkan gangguan fungsi hati, edema hepar dan hemoragik sub-kapsular menyebabkan ibu hamil mengalami nyeri epigastrium atau nyeri pada kuadran atas. Ruptur hepar jarang terjadi tetapi merupakan komplikasi yang hebat dari PIH, enzim hati seperti SGOT dan SGPT meningkat. Vasospasme arteriola dan penurunan aliran darah ke retina menimbulkan symptom visual seperti skotoma (blind spot) dan pandangan kabur.

Patologi yang sama menimbulkan edema cerebral dan hemoragik serta peningkatan iritabilitas susunan saraf pusat (sakit kepala, hiperfleksia, klonus pergelangan kaki dan kejang serta perubahan efek). Pulmonari edema dihubungkan dengan edema umum yang berat, komplikasi ini biasanya disebabkan oleh dekompensasi kordis kiri (Nuraini, 2011).

## 5. Manifestasi Klinik

Tanda dan gejala utama dari preeklampsia adalah peningkatan tekanan darah secara terus menerus, peningkatan tekanan darah mencapai 140/90 mmHg atau lebih yang biasa ditemukan 2 kali dalam pemeriksaan ruti yang berbeda. Selain hipertensi, tanda dan gejala lainnya dari preeklampsia yaitu :

- 1) Trombositopenia : trombosit  $< 100.000$  / mikroliter.
- 2) Nyeri pada daerah epigastrium regio kanan atas abdomen.
- 3) Mual atau muntah
- 4) Emosi dan mudah marah
- 5) Edema Paru.
- 6) Terdapat gejala neurologis : nyeri kepala, gangguan penglihatan, hingga terjadi stroke
- 7) Oligohidramnion (POGI, 2016).
- 8) Syok hingga terjadi kematian dapat terjadi pada preeklampisa berat.

## 6. Komplikasi

Menurut Mitayani (2012), komplikasi yang dialami bergantung pada derajat preeklampsia yaitu antara lain:

1. Komplikasi pada ibu
  - a. Eklamsia
  - b. Solusio plasenta.
  - c. Perdarahan *subkapsula hepar*.

- d. Kelainan pembekuan darah *disseminated intravascular coagulation* (DIC).
  - e. Sindrom HELLP (*hemolysis, elevated, liver, enzymes, dan low platelet count*).
  - f. Ablasio retina.
  - g. Gagal jantung hingga syok dan kematian.
2. Komplikasi pada janin
- a. Terhambatnya pertumbuhan dalam uterus.
  - b. Premature
  - c. Asfiksia neonatorum.
  - d. Kematian janin dalam uterus.
  - e. Peningkatan angka kematian dan kesakitan perinatal.

## 7. Pencegahan

### Pencegahan Pre Eklampsia

- 1) Pre Eklampsia Ringan menurut POGI (2016) adalah :
- a. Jika kehamilan kurang dari 37 minggu dan tidak ada tanda-tanda perbaikan, lakukan penilaian 2 kali seminggu rawat jalan.
  - b. Pantau tekanan darah 2x sehari, proteinuria 1x sehari, reflex, dan kondisi janin.
  - c. Lebih banyak istirahat.
  - d. Diet biasa.
  - e. Tidak perlu diberi obat-obatan.
  - f. Jika rawat jalan tidak mungkin, rawat di rumah sakit.
  - g. Tidak perlu diuretik kecuali jika terdapat edema paru, atau gagal akut.
  - h. Jika terdapat tanda-tanda pertumbuhan janin terhambat, pertimbangkan terminasi kehamilan.
- 2) Pre Eklampsia Berat menurut (Lisnawati, 2011) adalah :
- a. Memasang infus RL dan memasang kateter untuk memantau produksi urin setiap 4 jam.

- b. Pemberian terapi MgSO<sub>4</sub> 40% 10cc/IV dan terapi oral nifedipin 10 mg.
- c. Observasi keadaan umum, tanda vital, his dan BJJF.
- d. Jika proteinuria meningkat, tangani sebagai Pre Eklampsia Berat .
- e. Jika kehamilan lebih dari 37 minggu pertimbangkan terminasi.
- f. Jika serviks matang, lakukan induksi dengan oksitoksin 5 IU dengan 500 ml dekstrose IV 10 tetes.
- g. Jika serviks belum matang berikan prostaglandin, misoprostol atau terminasi dengan *sectio caesarea*.

## 8. Penatalaksanaan

Tujuan utama penanganan preeklampsia adalah mencegah terjadinya preeklampsia berat atau eklampsia, melahirkan janin hidup dan melahirkan janin dengan trauma sekecil-kecilnya.

- 1) Penatalaksanaan preeklampsia ringan :
  - a. Tirah baring
  - b. Monitoring tekanan darah
  - c. Pemberian obat antihipertensi
  - d. Memeriksa kadar proteinuria rutin setiap hari dengan tes carik celup
  - e. Dua kali seminggu dilakukan pengukuran denyut jantung janin antepartum dan pengukuran kadar protein urin dalam 24 jam
  - f. Pasien diperingatkan untuk mengenali tanda bahaya, seperti nyeri kepala, nyeri epigastrium, atau gangguan visual
  - g. Apabila terjadi peningkatan tekanan darah atau proteinuria periksa ke dokter dan pertimbangkan rawat inap
- 2) Tatalaksana pada preeklampsia berat mencakup pengelolaan medikamentosa dan pengelolaan persalinan. Pengelolaan medikamentosa terdiri atas :
  - a. Segera masuk rumah sakit
  - b. Tirah baring
  - c. Infus larutan Ringer Laktat 60-125 cc/jam

- d. Pemberian obat anti kejang: MgSO<sub>4</sub>
- Dosis awal: 4 g MgSO<sub>4</sub> dilarutkan dalam cairan saline intravena selama 10-15 menit
  - Dosis perawatan: 1-2 g/ jam iv, evaluasi tiap 4-6 jam
- Syarat pemberian MgSO<sub>4</sub>:
- Reflek patela positif
- Tidak ada depresi pernafasan (frekuensi pernafasan > 16 kali/ menit)
- Produksi urin . 100 ml/ 4 jam - Tersedia kalsium glukonas
- e. Diuretikum tidak diberikan kecuali jika ada ;
- Edema paru
  - Gagal jantung kongestif
  - Edema anasarka
- f. Antihipertensi diberikan bila :
- Tekanan sistolik  $\geq$  180 mmHg atau tekanan diastolik  $\geq$  110 mmHg
- g. Kardiotonika
- Indikasi pemberian kardiotonika ialah bila ada tanda-tanda gagaj jantung dan dilakukan perawatan bersama bagian penyakit jantung
- h. Diet
- Nutrisi yang disarankan antara lain cupkup protein, rendah karbohidrat, dan rendah garam (POGI, 2016).

## 9. Pemeriksaan Penunjang

Penegakan diagnosis, mengidentifikasi komplikasi dan menghilangkan diagnosis banding dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang unruk mendiagnosis preeklampsia diantaranya:

### 1) Laboratorium

Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil :

- Protein urin: terdapat *dipstick*  $\geq 1 +$ ,  $\geq 300$  mg pada spesimen urin 24 jam, rasio protein/kreatin  $\geq 3$
- Enzim hepar: ALT/AST dapat ditemukan meningkat hingga dua kali lipat nilai normal
- Terdapat serum kreatinin  $>1.1$  mg/dL atau kenaikan level serum kreatinin dua kali lipat tanpa penyakit ginjal lainnya

## 2) USG

Pada preeklampsia, USG digunakan untuk menilai adanya IUGR (*Intrauterine Growth Restriction*)

## 3) Cardiotocography (CTG)

*Cardiotocography* (CTG) digunakan untuk menilai adanya gawat janin (monitoring janin)

## 4) Radiologi

MRI atau CT Scan dapat digunakan pada pasien eklampsia untuk mengetahui terdapat kondisi seperti edema serebral atau perdarahan intrakranial, tetapi tidak begitu dibutuhkan untuk penegakan diagnosis dan tatalaksana. (POGI, 2016)

## B. Konsep Keperawatan

### 1. Pengkajian

Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien, untuk mengidentifikasi, mengenal masalah kebutuhan kesehatan, keperawatan pasien baik fisik, mental, sosial dan lingkungan. Pengkajian yang dilakukan pada ibu preeklampsia menurut Mitayani (2012), yaitu sebagai berikut.

#### 1. Identitas pasien

Melakukan pengkajian pada pasien dengan menanyakan nama, umur, Pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, agama, suku, alamat, nomer

rekam medis (RM), tanggal masuk rumah sakit, (MRS), dan tanggal pengkajian, dan kaji identitas penanggung jawab atas pasien.

2. Data riwayat kesehatan

Melakukan pengkajian keluhan utama pada pasien, keluhan yang paling dirasakan pada pasien saat dilakukan pengkajian.

3. Riwayat kesehatan dahulu

- Kemungkinan ibu menderita penyakit hipertensi sebelum hamil.
- Kemungkinan ibu mempunyai riwayat preeklamsia pada kehamilan terdahulu.
- Biasanya mudah terjadi pada ibu dengan obesitas.
- Ibu mungkin pernah menderita penyakit ginjal kronis.

4. Riwayat kesehatan sekarang

- Ibu merasa sakit kepala di daerah frontal.
- Terasa sakit di ulu hati/nyeri epigastrium.
- Gangguan visual: penglihatan kabur, scotoma, dan diplopia.
- Mual dan muntah, tidak ada nafsu makan.
- Gangguan serebral lainnya: terhuyung-huyung, reflex tinggi, dan tidak tenang
- Edema pada ekstremitas.
- Tenguk terasa berat.
- Kenaikan berat badan mencapai 1 kg seminggu.

5. Riwayat kesehatan keluarga

Mengkaji riwayat penyakit pada pasien dan keluarganya, apakah pasien dan keluarga memiliki penyakit keturunan seperti hipertensi, atau diabetes melitus (DM) serta kemungkinan memiliki riwayat preeklamsia serta eklamsia dalam keluarga.

## 6. Riwayat obstetrik dan ginekologi

Melakukan pengkajian pada pasien dengan menanyakan riwayat menstruasi, riwayat pernikahan, riwayat kehamilan, persalinan, nifas yang lalu, riwayat kehamilannya saat ini, dan riwayat keluarga berencana.

## 7. Pola kebutuhan sehari-hari

Melakukan pengkajian pola kebutuhan sehari-hari pada pasien seperti pengkajian pada pernafasan, nutrisi I (makan dan minum), eliminasi (BAB dan BAK), gerak badan atau aktivitas, istirahat tidur, berpakaian, rasa nyaman (pasien merasakan adanya dorongan meneran, tekanan ke anus, perinium menonjol). Kebersihan diri, rasa aman, pola komunikasi atau hubungan pasien dengan orang lain, ibadah, produktivitas, rekreasi, kebutuhan belajar.

### 1) Pemeriksaan fisik biologis:

- a. Keadaan umum: lemah.
- b. Kepala: sakit kepala, wajah edema.
- c. Mata: konjungtiva sedikit anemis, edema pada retina.
- d. Pencernaan abdomen: nyeri daerah epigastrium, anoreksia, mual, dan muntah.
- e. Ektremitas: edema pada kaki, tangan, dan jari-jari.
- f. System pernafasan: hiper refleksia, klonus pada kaki.
- g. Genitourinaria: oliguria, proteinuria.
- h. Pemeriksaan janin: bunyi jantung janin tidak teratur, gerakan janin melemah.

## 2) Pemeriksaan penunjang

Data penunjang dilakukan atas indikasi tertentu yang digunakan untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan ultrasonography (USG).

- a. Pemeriksaan darah lengkap dengan hapusan darah.
- b. Penurunan hemoglobin (nilai rujukan atau kadar normal hemoglobin untuk wanita hamil adalah 12-14 gr%).
- c. Hematokrit meningkat (nilai rujukan 37-43 vol%).
- d. Trombosit menurun (nilai rujukan 150-450 ribu/mm<sup>3</sup>).
- e. Pemeriksaan fungsi hati.
- f. Bilirubin meningkat
- g. LDH (laktat dehydrogenase) meningkat.
- h. Serum glutamate oirufat transaminase (SGOT) meningkat.
- i. Total protein serum menurun.
- j. Tes kimia darah: asam urat meningkat.
- k. Pemeriksaan Radiologi:
  - Ultrasonografi Ditemukannya retardasi pertumbuhan janin intrauterus, pernafasan intrauterus lambat, aktivitas janin lambat, serta volume cairan ketuban sedikit.
  - Kardiotografi: diketahui denyut jantung bayi lemah.

## 3) Data social ekonomi

Preeklamsia berat lebih banyak terjadi pada wanita serta golongan ekonomi rendah, karena mereka kurang mengonsumsi makanan yang mengandung protein serta kurang melakukan perawatan antenatal yang teratur.

#### 4) Data psikologis

Preeklamsia berada dalam kondisi yang labil serta mudah marah, ibu merasa khawatir dengan keadaan dirinya serta keadaan janin dalam kandungannya, karena ibu akan merasa takut dengan anaknya akan lahir cacat atau meninggal dan takut untuk melahirkan.

## 2. Diagnosis Keperawatan

### 1) Risiko Cedera Pada Janin

Definisi:

Berisiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik pada janin selama (RI, 2018) proses kehamilan dan persalinan

Factor Resiko

- a. Usia ibu (<15 tahun atau >35 tahun)
- b. Paritas banyak
- c. Riwayat persalinan sebelumnya
- d. Pola makan yang tidak sehat

Kondisi klinis terkait

- a. Ketuban pecah sebelum waktunya (KPSW)
- b. infeksi
- c. penyakit penyerta
- d. masalah kontraksi
- e. efek pengobatan pada ibu

### 2) Nyeri akut

Definisi:

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambar dan berintraksi ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan

Penyebab:

- 1) Agen pencedera fisiologis ( mis. Inflamasi, iskemia, neoplasma)
- 2) Agen pencedera kimiawi (mis. Terbakar, bahan kimia iritan)
- 3) Agen pencedera fisik (mis. Abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan)

### **Gejala dan Tanda Mayor**

#### **Subjektif**

- Mengeluh Nyeri

#### **Objektif**

- Tampak meringis
- Bersikap protektif (mis. Posisi menghindari nyeri)
- Gelisah
- Frekuensi nadi meningkat
- Sulit tidur

### **Gejala dan tanda Minor**

#### **Subjektif**

- Tidak tersedia

#### **Objektif**

- Tekanan darah meningkat
- Pola napas berubah
- Nafsu makan berubah
- Proses berfikir terganggu

- Menarik diri
- Berfokus pada diri sendiri
- Diaphoresis

### **Kondisi klinis terkait**

- Kondisi pembedahan
  - Cedera traumatis
  - Infeksi
  - Sindrom korener akut
  - Glaucoma
- 3) Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan laserasi jalan lahir.\
- Definisi :
- Peningkatan resiko masuknya orgaanisme patogen.
- Faktor resiko :
- a. Prosedur invasive
  - b. Ketidalcukupan pengetahuan untuk menghindarai paparan pathogen
  - c. Kerusakan jaringan dan peningkatan paparan lingkungan
  - d. Peningkatan paparan lingkungan pathogen
  - e. Tidak adekuat pertahanan sekunder (penurunan Hb, leukopenia, penekanan respon inflamasi)
  - f. Tidak adekuat pertahanan tubuh primer (kulit tidak utuh, trauma jaringan, penurunan kerja silia, cairan tubuh statis, perubahan sekresi PH, perubahan peristaltik)
- 4) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan aktivitas fisik menurun.
- Definisi:

Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih Ekstremitas secara Mandiri

### **Penyebab**

- 1) Kerusakan integritas struktur tulang
- 2) Perubahan metabolisme
- 3) Ketidakbugaran fisik
- 4) Penurunan kendali otot
- 5) Penurunan kekuatan otot
- 6) Keterlambatan perkembangan
- 7) Kekakuan sendi
- 8) Kontraktur
- 9) Malnutrisi
- 10) Gangguan muskuloskeletal
- 11) Gangguan neuromuscular
- 12) Efek agen farmakologis
- 13) Program pembatasan gerak
- 14) Nyeri
- 15) Kecemasan
- 16) Keengganan melakukan pergerakan
- 17) Kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik

### **Gejala dan Tanda Mayor**

#### **Subjektif**

- 1) Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas

#### **Objektif**

- 1) Kekuatan otot menurun
- 2) Rentang Gerak (ROM) Menurun

## **Gejala dan Tanda Minor**

### **Subjektif**

- 1) Nyeri saat bergerak
- 2) Enggan melakukan pergerakan
- 3) Merasa cemas saat bergerak

### **Objektif**

- 1) Sendi Kaku
- 2) Gerakan tidak terkoordinasi
- 3) Gerakan terbatas
- 4) Fisik Lemah

### **Kondisi Klinis Terkait**

- 1) Stroke
- 2) Cedera medulla spinalis
- 3) Trauma
- 4) Fraktur
- 5) Osteoarthritis
- 6) Ostemalasia
- 7) Keganasan

## **3. Intervensi Keperawatan**

- 1) Risiko Cedera pada Janin dibuktikan dengan faktor risiko usia ibu (<15 tahun atau >35 tahun), paritas banyak, riwayat persalinan sebelumnya, pola makan yang tidak sehat, dibuktikan dengan hipertensi (preeklamsia).

### **Tujuan dan Kriteria Hasil**

#### **Tingkat cedera:**

Setelah diberikan asuhan keperawatan selama 1 x 30 menit diharapkan risiko cedera pada janin tidak terjadi dengan kriteria hasil:

1. Kejadian cedera menurun (DJJ membaik 120-160x/menit)
2. Frekuensi gerak janin membaik
3. Berat badan membaik
4. Tanda – tanda vital dalam rentang normal

### **Status Antepartum**

setelah diberikan asuhan keperawatan selama 1 x 30 menit diharapkan status antepartum membaik dengan kriteria hasil:

1. Berat badan membaik
2. Tekanan darah dalam rentang normal (100 – 140 mmHg)
3. Frekuensi nadi dalam rentang normal (60 – 100 kali per menit)
4. Suhu tubuh dalam rentang normal (36,5 ° - 37,5 °)

### **Intervensi :**

#### **1. Pemantauan denyut jantung janin**

Observasi

- a. Identifikasi status obstetrik
- b. Identifikasi riwayat obstetric
- c. Identifikasi adanya penggunaan obat, diet dan merokok
- d. Identifikasi pemeriksaan kehamilan sebelumnya
- e. Periksa denyut jantung janin selama 1 menit
- f. Monitor tanda vital ibu

Terapeutik

- a. Atur posisi pasien
- b. Lakukan maneuver leopold untuk menentukan posisi janin

Edukasi

- a. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan
  - b. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu
- 2) Nyeri akut berhubungan dengan Agen pencedera fisik

### **Manajemen Nyeri**

#### **a. Tujuan dan kriteria hasil**

##### **Tujuan**

Mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambar dan berintraksi ringan hingga berat

##### **Kriteria Hasil**

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambar dan berintraksi ringan hingga berat dan konstan dapat menurut dengan kriteria hasil:

- 1) Keluhan nyeri menurun
- 2) Meringis dapat menurun

#### **b. Intervensi keperawatan dan rasional**

##### *1) Observasi*

- a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri

Rasional : mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri dari pasien

- b) Identifikasi skala nyeri

Rasional : mengetahui tingkat nyeri yang dirasakan pasien

- c) Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri

Rasional : mengetahui hal-hal yang dapat memperberat ataupun memperingan nyeri yang dirasakan pasien

- d) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup

Rasional : mengetahui seberapa besar rasa nyeri mempengaruhi kualitas hidup pasien

## 2) *Terapeutik*

- a) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam)

Rasional : mengurangi tingkat nyeri pasien/ mengalihkan pasien dari rasa nyerinya

- b) Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri

Rasional : mengurangi resiko factor yang dapat memperberat nyeri/menimbulkan nyeri

- c) Fasilitasi istirahat dan tidur

Rasional : mengalihkan dan memenuhi kebutuhan istirahat pasien

## 3) *Edukasi*

- a) Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri

Rasional : memberikan informasi terkait nyeri yang dirasakan pasien

- b) Jelaskan strategi mengatasi nyeri

Rasional : membantu pasien mengatasi saat rasa nyeri muncul

- c) Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri

Rasional : pasien dapat mengetahui sendiri karakteristik, penyebab, lokasi saat nyeri muncul

d) Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri

Rasional : memudahkan pasien untuk mengontrol nyeri dengan cara sederhana

#### 4) Kolaborasi

a) Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu

Rasional : mengurangi/ menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien

### 3) Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan laserasi jalan lahir.

Tujuan

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama .....x24 jam tingkat infeksi:

- a. Tidak didapatkan infeksi berulang
- b. Tidak didapatkan tumor
- c. Status respirasi sesuai yang diharapkan
- d. Temperatur badan sesuai yang diharapkan

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama .....x24 jam pasien mengetahui cara cara mengontrol infeksi dengan indikator:

- a. Mendeskripsikan proses penularan penyakit
- b. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi terhadap proses penularan penyakit
- c. Mendeskripsikan tindakan yang dapat dilakukan untuk pencegahan proses penularan penyakit
- d. Mendeskripsikan tanda dan gejala infeksi

- e. Mendeskripsikan penatalaksanaan yang tepat untuk infeksi

#### Intervensi

##### Kontrol Infeksi

Definisi: meminimalkan mendapatkan infeksi dan transmisi agen infeksi

Intervensi :

- a. Bersihkan lingkungan setelah dipakai pasien lain
  - R : untuk menghindari penyebaran kuman penyebab infeksi
- b. Observasi dan laporkan tanda dan gejala infeksi seperti kemerahan, panas, nyeri, tumor
  - R : untuk mengetahui secara dini tanda-tanda infeksi sehingga dapat segera diberikan tindakan yang cepat
- c. Berikan antibiotik sesuai aturan
  - R : menghambat perkembangan sehingga tidak terjadi proses infeksi
- d. Ajari pasien dan keluarga tanda dan gejala infeksi dan kalau terjadi melaporkan pada perawat
  - R : agar keluarga dan pasien dapat mengetahui dan mengidentifikasi terjadinya infeksi
- e. Ajarkan klien dan anggota keluarga bagaimana mencegah infeksi
  - R : agar klien dan keluarga dapat terhindar dari kuman penyebab infeksi

##### Proteksi Infeksi

Definisi : pencegahan dan deteksi dini pada pasien yang beresiko

Intervensi :

- a. Monitor tanda dan gejala infeksi

R : agar dapat segera di berikan tindakan

b. Monitor kerentanan terhadap infeksi

R : agar dapat mengontrol aktivitas klien sehingga tidak terjadi infeksi

4) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan aktivitas fisik menurun

Dukungan Mobilisasi

**a. Tujuan dan kriteria hasil**

**Tujuan**

Menfasilitasi pasien untuk meningkatkan aktivitas pergerakan fisik

**Kriteria Hasil**

Kemampuan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri dapat meningkat dengan kriteria hasil:

- 1) Pergerakan ekstremitas meningkat
- 2) Kekuatatan otot meningkat
- 3) Rentang gerak meningkat

**b. Intervensi keperawatan dan rasional**

1) *Observasi*

- a) Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya

Rasional : mengetahui keluhan lain pasien dan rencana tindakan berikutnya yang dapat dilakukan

- b) Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan

Rasional : mengetahui kemampuan dan batasan pasien terkait latihan/gerak yang akan dilakukan berikutnya

- c) Monitor frekuensi dan tekanan darah sebelum dan memulai mobilisasi

Rasional : mengetahui adanya perubahan status kerja frekuensi

dan tekanan darah pasien

d) Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi

Rasional: mengetahui kondisi terkini pasien dan perubahan yang dapat terjadi selama melakukan mobilisasi

2) *Terapeutik*

a) Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. Berpegang pada pagar tempat tidur)

Rasional : memberikan bantuan kepada pasien saat akan melakukan mobilisasi dan mengurangi resiko jatuh/ sakit saat berpindah

b) Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu

Rasional : meningkatkan status mobilitas fisik pasien

c) Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan

Rasional : keluarga dapat secara mandiri membantu pasien melakukan latihan pergerakan

3) *Edukasi*

a) Jelaskan tujuan dan Prosedur Tindakan

Rasional : memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan diberikan

b) Anjurkan mobilisasi dini

Rasional : untuk mengurangi resiko kekakuan dan kelemahan otot yang berkepanjangan

c) Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan (mis. Duduk ditempat tidur, duduk disisi tempat tidur)

Rasional : melatih kekuatan otot dan pergerakan pasien agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi.

#### **4. Implementasi**

Implementasi adalah inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan disusun dan ditunjukkan pada nursing orders untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari pelaksanaan adalah membantu klien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan dan memfasilitasi koping. Terdapat 3 tahap dalam tindakan keperawatan, yaitu persiapan, perencanaan, dan dokumentasi (Hockenberry M, 2011).

#### **5. Evaluasi**

Evaluasi keperawatan adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan perbandingan sistematis dan terencana antara hasil akhir yang teramati dan tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan klien dan keluarga. Evaluasi bertujuan untuk melihat kemampuan keluarga dalam mencapai tujuan.

Evaluasi berfokus pada aktivitas proses keperawatan dan hasil tindakan keperawatan. Evaluasi ini dilakukan segera setelah perawat mengimplementasikan rencanan keperawatan guna menilai keefektifan tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. Perumusan evaluasi formatif ini meliputi empat komponen yang dikenal dengan istilah SOAP, yakni Subjektif (data berupa pemeriksaan), Analisa data (perbandingan data dengan teori), dan Planning (perencanaan) (Wilkinson, 2014).

## C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan

### 1. Konsep Teori *Comfort* Kolcaba

Ada tiga tipe kenyamanan menurut Kolcaba, yaitu: *relief* yang berarti ketika kenyamanan spesifik yang dibutuhkan klien terpenuhi, *ease* berarti ketika klien merasa tenang dan puas, dan yang terakhir adalah *transcendence* ketika klien berhasil melampaui kebutuhan nyaman (Alligood & Tomey, 2010). Ada empat konteks dimana tiga tipe kenyamanan ini dapat terjadi yaitu fisik (sensai tubuh, mekanisme homeostatik, fungsi kekebalan tubuh), psikospiritual (kesadaran diri, identitas seksual, makna hidup seseorang), sosiokultural (hubungan interpersonal, keluarga, tradisi keluarga, ritual, dan praktik keagamaan), dan lingkungan (suhu, cahaya, suara, bau, warna, furniture). Hubungan antara tipe kenyamanan dan empat konteks digambarkan dalam sebuah struktur taksonomi.




FIGURE 33-2 Conceptual framework for the Theory of Comfort. (Copyright Kolcaba, 2007. Retrieved from [www.thecomfortline.com](http://www.thecomfortline.com).)

Gambar 2.1 Kerangka Kerja Konsep *Theory of Comfort*

Menurut Tomey & Alligood (2010) definisi dari masing-masing konsep *Theory of Comfort*, adalah:

- a. *Health Care Needs*: diidentifikasi oleh klien/keluarga
- b. *Intervening Variabels*: faktor-faktor yang tidak mungkin berubah dan klien hanya memiliki sedikit kekuatan untuk mengontrolnya seperti prognosis, situasi keuangan, dukungan sosial.
- c. *Comfort* : konsep yang sangat erat dengan perawat. Perawat memberikan kenyamanan pada klien dan keluarganya melalui tindakan pengukuran kenyamanan. Tujuan pemberian kenyamanan adalah untuk menguatkan klien dan keluarga sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik pada *health seeking behaviors* (HSBs).
- d. *Enhanced comfort*: tujuan pelayanan keperawatan yang utama menurut *Theory of Comfort*. Jika intervensi kenyamanan dilakukan terus menerus, maka secara teori akan berpengaruh pada peningkatan level kenyamanan sepanjang waktu dengan keinginan untuk perilaku pencarian kesehatan (HSBs). HSBs bisa internal (penyembuhan, fungsi kekebalan tubuh, jumlah T sel, dll), bisa juga eksternal (kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan, hasil yang fungsional), atau kematian yang penuh kedamaian.
- e. *Institutional Integrity* (InI): didefinisikan sebagai nilai, kestabilan keuangan, dan keutuhan organisasi kesehatan di level lokal, regional, dan nasional.
- f. *Best Policies* : protokol dan prosedur yang ditetapkan oleh institusi untuk semua penggunaan setelah bukti terkumpul.

- g. *Best Practices* : semua protokol dan prosedur yang ditetapkan institusi untuk praktik pada klien dan keluarga secara spesifik setelah bukti terkumpul.

### 1) Konsep Metaparadigma

Berikut adalah konsep sentral keperawatan menurut Kolcaba:

- a) Perawat: pengkaji kebutuhan kenyamanan, pendesain pengukuran kenyamanan untuk menangani kebutuhan klien, dan pengkaji ulang kenyamanan klien, keluarga dan komunitas setelah implementasi dari hasil pengukuran dilaksanakan untuk kemudian dibandingkan pada pengalaman kenyamanan sebelumnya.
- b) Klien: bisa individu, keluarga atau komunitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- c) Lingkungan: faktor luar yang dapat mempengaruhi (lingkungan fisik rumah, kebijakan dan institusi) yang mana bisa dimanipulasi untuk mencapai kenyamanan.
- d) Kesehatan: fungsi yang maksimal dari klien/keluarga/ komunitas yang terfasilitasi karena perhatian yang besar pada kebutuhan kenyamanan.

### 2) *Theory of Comfort* dan Praktik Keperawatan

Kolcaba menyatakan bahwa menentukan dalam konteks yang mana kebutuhan kenyamanan klien dan keluarga terjadi merupakan hal yang penting untuk bisa mengaplikasikan teori secara benar. Mereka membuat pedoman pengkajian kebutuhan kenyamanan pada klien dan keluarga, yaitu:

#### 1. Kebutuhan kenyamanan fisik

Resiko gangguan atau gangguan aktual mekanisme fisiologis akibat dari penyakit atau prosedur invasif. Kebutuhan fisik yang tidak disadari

klien dan keluarga seperti keseimbangan cairan dan elektrolit, oksigenasi, termoregulasi, nutrisi, imunitas, kimia darah, istirahat dan tidur (Kolcaba, 1992). Kebutuhan fisik yang nyata seperti nyeri, mual-muntah, menggigil, gatal yang mudah diintervensi dengan atau tanpa obat.

## 2. Kebutuhan kenyamanan psikospiritual

Kebutuhan akan rasa percaya diri, motivasi, dan kepercayaan untuk anak dan keluarga agar lebih damai menghadapi prosedur yang menimbulkan trauma, ketidaknyamanan, dan nyeri yang mana tidak dapat segera sembuh. Kebutuhan ini dapat diatasi dengan intervensi *comfort food for the soul* seperti kompres hangat/ dingin, perawatan mulut, kunjungan dari orang yang spesial, sentuhan, kata-kata bijak (Kolcaba, 1992).

## 3. Kebutuhan kenyamanan sosiokultural

Merupakan kebutuhan untuk jaminan kebudayaan yang sensitif, bahasa tubuh yang positif, dan *caring*. Kebutuhan ini terpenuhi dengan pembinaan, yang mencakup perilaku “bisa melakukan”, pesan kesehatan, dan dukungan semangat. Hubungan yang baik dengan perawat, dan pemberian informasi yang tepat untuk setiap prosedur tindakan. Kebutuhan sosial juga termasuk kebutuhan keluarga akan keuangan, penghormatan terhadap tradisi budaya.

## 4. Kebutuhan kenyamanan lingkungan

Termasuk ketertiban, ketenangan, perbotan yang nyaman, bau yang minimal, dan keamanan. Termasuk juga perhatian terhadap seting ruangan perawatan. Jika perawat tidak bisa maksimal dalam menyediakan lingkungan yang nyaman, maka perawat dapat melakukan

hal dalam mengurangi kebisingan, pencahayaan, dan menjaga kenyamanan tidur.

## **2. Konsep Teori Nyeri**

### **a. Pengertian**

Nyeri merupakan suatu rasa yang tidak nyaman, baik ringan maupun berat. Nyeri bersifat individual dan tidak dapat diukur secara objektif namun dapat diukur secara subjektif karena hanya pasien yang dapat merasakan adanya nyeri. Nyeri merupakan mekanisme fisiologis yang bertujuan untuk melindungi diri. Nyeri dapat memenuhi seluruh pikiran seseorang, mengatur aktivitasnya, dan mengubah kehidupan orang tersebut. Nyeri dapat memenuhi seluruh pikiran seseorang, mengatur aktivitasnya, dan mengubah kehidupan orang tersebut. Terdapat dua nyeri yaitu nyeri akut dan nyeri kronis (Heriana, 2014).

Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Sedangkan nyeri kronis adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan yang berlangsung lebih dari 3 bulan (SDKI, 2017).

### **b. Penyebab**

Menurut standar diagnosis keperawatan Indonesia terdapat 2 faktor terjadinya nyeri, yaitu:

#### **a. Faktor resiko**

- 1) Nyeri akut
  - a) Melaporkan nyeri secara verbal dan non verbal
  - b) Menunjukkan kerusakan
  - c) Posisi untuk mengurangi nyeri
  - d) Muka dengan ekspresi nyeri
  - e) Respon otonom (penurunan tekanan darah, suhu, nadi)
  - f) Tingkah laku ekspresif (gelisah, merintih, nafas panjang, mengeluh)
- 2) Nyeri kronis
  - a) Perubahan berat badan
  - b) Melaporkan secara verbal dan non verbal
  - c) Menunjukkan gerakan melindungi, gelisah, depresi, focus pada diri sendiri
  - d) Kelelahan
  - e) Perubahan pola tidur
  - f) Takut cedera
  - g) Interaksi dengan orang lain menurun
- b. Faktor predisposisi
  - 1) Trauma
  - 2) Peradangan
  - 3) Trauma psikologis
- c. Faktor presipitasi
  - 1) Lingkungan
  - 2) Suhu ekstrim
  - 3) Kegiatan
  - 4) Emosi

### c. Fisiologi Nyeri

Nyeri yang muncul berhubungan erat dengan reseptor serta adanya rangsangan. Pada kulit dan mukosa tersebar banyak reseptor nyeri sehingga jika ada stimulasi atau rangsangan maka reseptor nyeri akan memberikan respon, stimulasi tersebut berupa zat-zat kimia seperti bradikinin, serotonin, histamin dan berbagai macam asam yang dapat terlepas ketika terjadi kerusakan jaringan. Stimulasi ini dapat berupa termal, mekanisme, atau impuls listrik (Smeltzer & Bare, 2013).

Nyeri dapat dipersepsikan ketika reseptor nyeri menginduksi serabut saraf perifer aferen yaitu serabut saraf A-delta dan serabut saraf C. Pada serabut saraf A-delta terdapat myelin, sehingga impuls nyeri dapat cepat sampai ke korteks serebri, memiliki sensasi yang tajam dan melokalisasi sumber nyeri dan intensitas nyeri dengan jelas. Sedangkan serabut C berukuran kecil dan tidak memiliki myelin, sehingga hantaran impuls nyeri lambat, serta melokalisasi nyeri sangat buruk, sensasinya visceral dan terus-menerus (Potter & Perry, 2010).

Ketika terjadi stimulasi dari luar maka serabut A-delta dan serabut C akan menyampaikan rangsangan tersebut untuk mengeluarkan mediator kimia seperti prostaglandin, kalium, bradikinin, histamin, serotonin untuk aktif terhadap respon nyeri. Jika terdapat jaringan yang rusak maka perjalanan stimulus nyeri akan terus berlanjut dari serabut saraf aferen sampai ke bagian kornus dorsalis pada medulla spinalis. Ketika sudah sampai di kornus dorsalis, penghantar impuls neurotransmitter (substansi P) akan dilepas sehingga terjadi transmisi dari sinaps yang berada di 16 saraf perifer menuju ke saraf traktus spinothalamus, kemudian informasi akan di bawa dengan cepat ke

hipotalamus dan di korteks serebri mempersepsikan nyeri, sehingga terjadilah nyeri pada daerah yang terjadi kerusakan jaringan. (Potter & Perry, 2010)


#### d. Mengkaji Intensitas Nyeri

##### 1. *Verbal Descriptif Scale* (VDS)

Skala deskriptif verbal (VDS) adalah garis yang terdiri tiga hingga lima kata deskripsi yang tersusun di sepanjang garis. Pendeskripsian nya dimylai dari “tidak nyeri” hingga ke “nyeri yang tidak tertahankan”. Perawat akan memberikan skala tersebut kepada pasien dan pasien akan memilih intensitas nyeri yang dirasakan (Potter & Perry, 2010).

##### 2. *Numerical Rating Scale* (NRS)

*Numerical rating scale* (NRS) atau skala penilaian numerik. Biasa digunakan untuk mengganti alat pendeskripsian kata, pasien



akan di minta menilai nyeri dengan menggunakan skala 0-10 (Potter & Perry, 2010)

**Gambar 2.2 Numerical Rating Scale**

## e. Penanganan Nyeri

### 1. Farmakologi

Cara yang efektif untuk menurunkan rasa nyeri yaitu teknik farmakologi dengan memberikan obat-obatan sebagai Pereda nyeri terutama pada nyeri hebat dan berlangsung selama beberapa jam atau sehari-hari. Metode yang sangat umum di gunakan dalam mengatsi nyeri yaitu penggunaan obat analgesic. Menurut Smeltzer & Bare (2013), terdapat tiga jenis analgesik yakni:

- a) Non-narkotik dan anti inflamasi nonsteroid (NSAID): dapat mengurangi pada rasa nyeri ringan dan sedang. NSAID dapat sangat berguna bagi pasien yang rentan terhadap efek pendepresi pernafasan.
- b) Analgesik narkotik atau opiad: analgesik ini umumnya diresepkan untuk nyeri yang sedang sampai berat, seperti nyeri pasca operasi. Efek samping dari opiad ini dapat menyebabkan depresi pernafasan, sedasi, konstipasi, mual muntah.
- c) Obat tambahan atau ajuvant (koanalgesik): ajuvant seperti sedative, anti cemas, dan relaksan otot meningkatkan control nyeri atau menghilangkan gejala lain terkait dengan nyeri seperti depresi dan mual (Potter & Perry, 2010).

### 2. Non farmakologi

Teknik non farmakologi merupakan salah satu tindakan keperawatan. Menurut Smeltzer dan Bare (2013) pemebrian asuhan keperawatan dengan teknik nonfarmakologi dalam mengurangi tingkat nyeri, teknin nonfarmakologi ini memiliki resiko yang rendah, walaupun tindakan ini bukan tindakan yang dapat

menggantikan penggunaan obat analgesik. Berikut beberapa tindakan non farmakologi untuk mengatasi nyeri:

- a. Masase (terapi pijat)
- b. Distraksi
- c. Terapi musik
- d. Imajinasi terbimbing
- e. Relaksasi nafas dalam
- f. Kompres hangat/ dingin
- g. Aroma terapi
- h. Terapi Murottal
- i. Terapi akupressur.

#### **D. Evidance Based Nursing**

##### **Kompres Hangat dengan Aromaterapi**

###### **1. Pengertian**

- a. Kompres hangat

Kompres panas/ hangat merupakan cara menstimulus kulit dan jaringan menggunakan air hangat sehingga dapat mengurangi rasa nyeri, spasme pada otot serta efek terapeutik lainnya (SIKI, 2018).

Kompres adalah salah satu cara untuk memperbaiki kondisi fisik dengan memampulasi suhu dari luar terhadap suhu tubuh dan memblokir rasa sakit/ nyeri (Sari & Rina, 2015).

Kompres hangat selain dapat mengurangi rasa nyeri, juga dapat meningkatkan proses penyembuhan pada jaringan yang rusak, dimana dengan menggunakan air hangat maka reaksi fisiologis yang terjadi yaitu meningkatnya aliran darah pada jaringan, respon inflamasi dan

pembentukan edema meningkat (Putri, 2015).

Berdasarkan penelitian (Putri, 2015) kompres hangat dapat menurunkan skala nyeri yang dirasakan oleh pasien, dengan menstimulus kulit dari rasa panas yang mengalihkan perhatian klien sehingga klien berfokus pada stimulus taktil dan mengabaikan sensasi nyeri, yang pada akhirnya dapat menurunkan persepsi nyeri.

b. Aromaterapi

Aromaterapi adalah salah satu tindakan terapeutik dengan menggunakan minyak esensial wangi yang dapat mengurangi rasa sakit, mengurangi stress, merelaksasi dan meningkatkan mekanisme koping dan meningkatkan kebugaran.

Aromaterapi yang diberikan melalui cara kompres dengan hanya sedikit menggunakan minyak esensial dapat mengurangi rasa nyeri pada punggung dan nyeri perut. Pada penelitian Susilarini tahun 2017 dalam (Agustina, Meirita, & Fajria, 2019) menyatakan bahwa pemberian minyak esensial yang memiliki konsentrasi tinggi dan di ekstraksi dari berbagai macam tumbuhan dapat di berikan dengan cara kompres, pijat, inhalasi, dimasukkan kedalam air untuk mandi dan bisa juga melalui membran mukosa dalam bentuk supositoria atau pessarium. Dengan pemberian aromaterapi tersebut dinilai dapat mengurangi serta mengatasi gangguan psikologis, cemas, depresi, dan meningkatkan rasa nyaman serta mengurangi rasa nyeri.

Pemberian kompres hangat dengan aromaterapi dimana aromaterapi tersebut bekerja melalui kompres, aromaterapi atau minyak esensial dapat memanaskan kulit hingga ke otot sehingga terjadi rasa nyaman dan mengurangi rasa nyeri. Kompres hangat dengan minyak esensial lavender dapat merangsang dan melemaskan otot sehingga stimulus

menuju ujung saraf berkurang sehingga saraf yang membawa rasa nyeri berkurang dan hantaran implus nyeri ke saraf pusat berkurang sehingga nyeri yang tersampaikan berkurang. Kompres hangat dengan aromaterapi dikenal sebagai terapi komplementer, terapi modalitas, terapi alternative, terapi nonmedis, terapi holistik, dan terapi tradisional dan biasanya di gunakan dalam bidang ilmu keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Terapi komplementer dapat digunakan mandiri atau tidak berhubungan terapi biomedis karena diposisikan sebagai upaya promosi kesehatan (Sari & Rina 2015).

Proses kerja pada aromaterapi dalam tubuh dapat berlangsung melalui dua sistem yaitu sistempensiuman dan sirkulasi tubuh. Pada sistem sirkulasi, aromaterapi yang diberikan melalui kompres dapat memberikan rasa panas pada kulit dan otot serta memperlebar pembuluh darah sehingga impuls nyeri dari ujung saraf berkurang dan yang di hantarkan ke hipotalamus dan korteks serebri yang mempersepsikan rasa nyeri pun berkurang. Salah satu aromaterapi yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri adalah aromaterapi *peppermint*.

Aromaterapi *Peppermint* berfungsi sebagai anti konvulsi. Salah satu mekanisme anti konvulsi adalah anti kejang kontraksi otot. *Peppermint* mempunyai aktifitas spasmolitik secara *in vitro* dan serta dapat mengurangi regangan otot skeletal (Agustina, Meirita, & Fajria, 2019).

## 2. Tujuan

- a. Meningkatkan sirkulasi darah pada bagian nyeri akibat dari vasodilatasi pembuluh darah.
- b. Mengurangi nyeri akibat spasme otot atau kekuatan otot serta menurunkan

ketegangan otot.

- c. Meningkatkan aliran darah dalam jaringan
- d. Menurunkan pembentukan edema
- e. Memberikan rasa nyaman

### 3. Indikasi

- 2. Pasien yang mengalami nyeri, cemas, depresi
- 3. Pasien yang sudah di berikan 6 jam setelah pemberian analgesic
- 4. Sakit kepala
- 5. Nyeri atau kram otot
- 6. Nyeri punggung
- 7. Nyeri kronis, misalnya pada kondisi *fibromyalgia*
- 8. Cedera otot atau persendian, seperti keseleo
- 9. Demam

### 4. Kontra Indikasi

Kondisi yang tidak dapat dilakukan kompres:

- a. Gangguan pada kulit / iritasi yang dapat menyebabkan kemerahan atau lepuh karena rasa panas tersebut dapat membakar atau menyebabkan kerusakan kulit lebih jauh.
- b. 24 jam pertama setelah terjadi cedera atau trauma berat karena rasa panas pada kompres dapat menimbulkan efek vasodilatasi sehingga dapat meningkatkan perdarahan dan pembengkakan pada bagian tubuh yang dikompres
- c. Perdarahan yang masih aktif karena bisa menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan akan meningkatkan terjadinya perdarahan (Fahrinheit, 2019).

## 5. Prosedur Tindakan

### a. Tahap persiapan

#### 1) Persiapan pasien

- Pastikan pasien yang akan dilakukan tindakan
- Kaji kondisi pasien
- Jelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan

#### 2) Persiapan alat

- Air hangat suhu 38-40°C
- Minyak Aromaterapi Peppermint
- Handuk/ washlap 2 buah
- Wadah/ baskom kecil 1 buah

### b. Tahap kerja

- 1) Mengucapkan salam terapeutik
- 2) Menanyakan perasaan pasien hari ini
- 3) Menjelaskan prosedur dan tujuan tindakan
- 4) Berikan kesempatan pasien untuk bertanya sebelum di lakukan tindakan
- 5) Pertahankan privasi pasien selama melakukan tindakan
- 6) Mendekatkan alat dan bahan
- 7) Mencuci tangan
- 8) Membaca basmalah
- 9) Tuang air hangat dengan suhu 38-40 °C ke dalam wadah

Beberapa faktor yang harus diperhatikan agar efektivitas dari kompres hangat dengan aromaterapi dalam menurunkan rasa nyeri antara lain suhu air yang di gunakan agar efektif untuk mengurangi rasa nyeri yaitu 38-40°C, media yang digunakan yaitu handuk untuk

media kompres. Dampak fisiologi dari kompres hangat adalah pelunakan jaringan fibrosa membuat otot tubuh lebih rileks, menurunkan suhu tubuh, menghilangkan rasa nyeri dan memperlancar aliran darah

10) Tuangkan minyak aroma peppermint secukupnya (5-10 tetes)

Peppermint berfungsi sebagai anti konvulsi. Salah satu mekanisme anti konvulsi adalah spasmolitik atau anti kejang kontraksi otot. Peppermint mempunyai aktifitas spasmolitik secara in vitro dan juga dapat menurunkan regangan otot skeletal.

Bau merupakan suatu molekul yang mudah menguap ke udara dan akan masuk ke rongga hidung melalui penghirupan sehingga akan direkam oleh otak sebagai proses penciuman. ketika aromaterapi tercium, maka zat aktif tersebut merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan hormone endorpin. Yang dapat memberikan rasa nyaman, tenang, relaks dan bahagia.

11) Atur posisi klien

12) Lakukan kompres hangat pada bagian punggung dan perut selama 15-20 menit/ sampai hangat handuk hilang

Berdasarkan penelitian kompres hangat dilakukan selama 20 menit untuk mendapatkan efektifitas dari kompres hangat terhadap pengurangan nyeri.

13) Lakukan berulang

14) Setelah terapi selesai bereskan alat dan bahan kemudian atur posisi nyaman untuk klien

15) Mengucapkan hamdalah

16) Mencuci tangan

17) Dokumentasi

c. Hasil

- 1) Evaluasi respon pasien
- 2) Simpulkan hasil kegiatan
- 3) Berikan reinforcement positif
- 4) Dokumentasikan tindakan telah dilakukan



**BAB III**  
**LAPORAN KASUS**

**A. Pengkajian**

**Identitas Klien**

Nama inisial klien : Ny. S  
Umur : 35 Tahun  
Alamat : Kalukuang  
Pekerjaan : IRT  
Agama : Islam  
Tanggal masuk RS : 14 April 2021 / Jam 02.00 wita  
Nomor Rekam Medis : 39 19 51  
Diagnosa Medis : Pre-eklamsia + Eklamsia Post Operasi *Sectio  
Caesarea*

**PENGAJIAN UMUM**

1. Keluhan utama klien masuk ICU : Pasien mengeluh nyeri pada perut  
bawah bekas operasi

**Pengkajian Nyeri:**

P (Problem) : Pasien mengatakan nyeri pada perut bagian  
bawah bekas operasi

Q (Quality) : Pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-  
tusuk

R (Region) : Perut bagian bawah

- S (Skala) : Pasien mengatakan nyeri dengan skala 5 (nyeri sedang)
- T (Time) : pasien mengatakan nyeri hilang timbul  $\pm$  5 menit
2. Riwayat Penyakit Sekarang : Pasien mengatakan masuk ke rumah sakit karena di rujuk dari RS. Thalia Irham ke RS Labuang baji dengan G4P1A2, proses melahirkan berjalan lama sehingga pada kala II, sehingga ia di rencanakan untuk operasi *section caesarea*. Pada pemeriksaan fisik di RS Thalia Irham didapatkan hasil TTV: 140/90 mmHg, Nadi: 80x/ menit, P: 20x/menit, dan Suhu: 36°C. Pada saat itu pasien datang dengan mengeluh nyeri perut tembus kebelakang di rasakan 1 hari sebelum masuk RS. Pasien juga memiliki riwayat kejang 2 kali yaitu di RS Thalia Irham dan mobil Ambulans selama perjalanan saat itu pasien mengeluh nyeri kepala dan nyeri ulu hati.
3. Riwayat Penyakit Dahulu : Tidak ada
4. Apakah klien pernah dirawat di Rumah Sakit : Tidak pernah
5. Riwayat Sosial :
- a. Apakah klien merokok : Tidak
- b. Apakah klien mengkonsumsi analgetik : Tidak
5. Riwayat Penyakit Keluarga : Tidak ada
6. Tanda-tanda vital
- a) Tekanan darah : 154/98 mmHg
- b) Suhu : 36,5 °C

- c) Nadi : 140 x/m  
 d) Pernapasan : 20 x/m  
 e) SpO2 : 99 %

## PEMERIKSAAN FISIK KHUSUS

### 1. AIRWAY

- a) Bebas : Ya  
 b) Sumbatan (benda asing,sputum,darah,lendir) : Tidak ada  
 c) Suara nafas : Tidak ada  
 d) Kejang : Tidak, tapi memiliki riwayat mengalami kejang 2x sebelum melahirkan.

**Masalah Keperawatan: Tidak terdapat masalah keperawatan**

### 2. BREATHING

- a) Spontan : Ya  
 b) Takipnea (Nafas cepat) : Tidak Ada  
 c) Wheezing (mengi) : Tidak Ada  
 d) Apnea(henti nafas sementara) : Tidak Ada  
 e) Dispnea (susah nafas) : Tidak ada  
 f) Lain-lain : Tidak ada

**Masalah Keperawatan: Tidak ada masalah keperawatan**

### 3. CIRCULATION

- a) Nadi : Teraba kuat  
 b) Irama : Reguler  
 c) Frekuensi : 140/m

- d) Kulit : pucat
- e) Perdarahan : Tidak
- f) Turgor : elastis
- g) CRT : 2/detik

**Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan**

#### 4. DISABILITY

- a) GCS : 15 (E 4 V 5 M 6)
- b) Kesadaran : Composmentis
- c) Pupil : isokor 2,5 mm/ 2,5 mm (normal)
- d) Reflek cahaya : (+/+)
- e) Motorik : Pasien mengatakan sulit meggerakkan kedua kakinya setelah di lakukan SC.
- f) Kekuatan otot : lemah 

5	5
4	4

**Masalah Keperawatan: Gangguan Moblitas Fisik**

#### 5. Exposure

- a) Deformitas : Tidak ada
- b) Contusio : Tidak ada
- c) Abrasi : Tidak ada
- d) Penetrasi : tidak ada
- e) Laserasi : Tidak ada
- f) Edema : Tidak ada

**Masalah keprawatan: Tidak ada masalah keperawatan**

**PEMERIKSAAN FISIK UMUM (Kepala dan Leher)**

## a. Bagian kepala atas

- 1) Hematom/post trauma : tidak ada
- 2) Tipe rambut : Gelombang
- 3) Warna rambut : hitam
- 4) Distribusi rambut : Normal
- 5) Alopesia/Kebotakan : Tidak ada

## b. Mata

- 1) Pupil isokor (diameter kedua pupil sama) : 2,5/2,5 mm
- 2) Sklera ikterik (kekuningan) : tidak
- 3) Conjunctiva anemis (pucat) : Ya (+/+)

## c. Telinga

- 1) Cerumen : Tidak ada
- 2) Terpasang alat bantu dengar : Tidak

## d. Malar / Pipi

- 1) Acne (jerawat) : Tidak ada

## e. Hidung

- 1) Nafas cuping hidung : tidak
- 2) Pilek : tidak
- 3) Terpasang alat bantu nafas: Ya, terpasang kanul nasal
- 4) Tipe: dewasa ukuran pemberian: 2 L/menit

## f. Bibir dan Mulut

- 1) Sianosis : tidak

- 2) Sariawan : tidak
- 3) Gigi palsu : tidak
- 4) Mukosa bibir : Lembab
- 5) Gangguan gigi dan gusi : tidak

g. Leher

- 1) Pembesaran kelenjar tiroid (gondok) : Tidak.
- 2) Limfonodi (kelenjar limfe) : Teraba
- 3) Nadi karotis : Teraba

**PEMERIKSAAN FISIK UMUM (Thoraks)**

a. Pre-kordium (lapisan luar dinding dada yang melindungi organ jantung)

1. Inspeksi

- Ictus cordis terlihat di intercosta 4-5 : tidak
- Luka parut (post operasi jantung) : tidak

2. Palpasi

- Ictus cordis teraba di intercosta 4-5 : tidak

3. Perkusi

- Redup (normal) : Ya

4. Auskultasi

- Bising jantung : Ada
- Bunyi S1 (lup) dan S2 (dup) : Ada/ reguler

b. Pulmonal

1. Inspeksi

- a) Retraksi (normalnya tidak ada) : tidak

b) Simetris kanan dan kiri : Ya

c) Ekspansi dada kanan dan kiri sama : Ya

## 2. Palpasi

a) Krepitasi (suara retakan tulang) : tidak

b) Vocal fremitus kanan kiri sama : tidak

## 3. Perkusi

a) Sonor (normal) : Ya

## 4. Auskultasi

a) Vesikuler (normal) : Ya

b) Wheezing : tidak

c) Vesikuler : Ya

## PEMERIKSAAN FISIK UMUM (Abdomen)

a. Inspeksi :

1) Datar : Ya

2) Bekas operasi : Ya

b. Auskultasi

1) Peristaltik : 30 x/menit

c. Palpasi:

1) Massa : tidak

2) Turgor kulit : Elastis

3) Nyeri tekan di lapang abdomen : Ya

d. Perkusi:

1) Timpani : Ada

### PEMERIKSAAN FISIK UMUM (Ekstrimitas)

#### a. Superior (atas):

- 1) Edema : tidak
- 2) Infus:
  - a) Terpasang : Di lengan dextra dan sinistra
  - b) Jenis infus : Ringer laktat dan Dextrosa 5% +  
Oksitosin 2 amp
  - c) Faktor tetesan : 18 tetes/menit
  - d) Nyeri di area tusukan infus : tidak
- 3) Nadi radialis (pergelangan tangan): 136x/menit
- 4) Palmar (telapak tangan) : Kemerahan
- 5) Kekuatan otot : kuat
- 6) CRT (capillary refill time) < 3 detik : Ya
- 7) Refleks fisiologis biceps/triseps : (+/+)
- 8) Refleks patologis : (-/-)
- 9) Deformitas (kelainan bentuk) : tidak
- 10)Fraktur : tidak

#### b. Inferior (bawah):

- 1) Edema : Ya
- 2) Akral (bagian kaki paling bawah) : Hangat
- 3) Kekuatan otot : lemah
- 4) Refleks patela : (+/+)
- 5) Refleks patologis : (-/-)

### c. Pengkajian Nutrisi

Hari/Tanggal : Kamis, 15 april 2021

a. A (Antropometri) meliputi

BB : 60 Kg

TB : 160 cm

IMT : 23,4

b. C (Clinical)

Rambut : Hitam

Turgor kulit : elastis

Mukosa bibir : kering terdapat lendir yang menempel dibibir

Conjungtiva : anemis

c. D (Diet) meliputi jenis makanan yang diberikan selama di rumah sakit

Makanan : Susu 100-300<sup>cc</sup> dan makanan rendah garam

d. E (Energy) : Pasien belum mampu melakukan aktivitas dan terbaring ditempat tidur sehingga kebutuhannya perlu dibantu

e. F (Factor) : Pasien dirawat di rumah sakit karena telah dilakukan persalinan secara operasi sectio caesarea, dan membutuhkan pemantauan dan perawatan :

f. Lain –lain


1) Pasien tambah belum bisa menggerakkan ekstremitas bawahnya

2) Tampak pemenuhan ADL dibantu oleh keluarga

## g. Obat-obatan yang digunakan

Nama obat	Jadwal Pemberian	Dosis	Jenis Pemberian
Infus RL + MgSO <sub>4</sub> 40%	24 jam	6 gr	28 tpm/ IV
Cefotaxime	12 jam	1 gr	IV
As.Texanamat	8 jam	500 gr	IV
Ranitidine	8 jam	50 mg	IV
Dexketoprofen	8 jam	100 mg	IV

## h. Genogram



Gambar 3.1 Genogram Klien

Keterangan :

□ : Laki-laki

○ : Perempuan

— : Garis pernikahan

┆ : Garis keturunan

? : Tidak diketahui umur

X : Meninggal

- - - : Garis serumah

↗ : Klien

**G1:** Generasi pertama adalah nenek dan kakek klien baik dari ayah maupun ibu yang sudah lama meninggal dan tidak diketahui umurnya serta tidak memiliki penyakit seperti penyakit yang diderita klien

**G2:** Generasi Kedua adalah kedua orang tua klien yang ayah klien berusia 70 tahun dan ibu klien berusia 69 tahun serta saudara orang tua klien baik dari ayah maupun dari ibu klien yang tidak diketahui umurnya

**G3:** Generasi Ketiga adalah klien yang merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara yang sudah berusia 35 tahun telah menikah dan memiliki 1 anak laki-laki yang tinggal serumah.

### Pemeriksaan penunjang

#### 6. Hasil pemeriksaan laboratorium (15/04/2021)

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
Darah Rutin			
WBC	<b>28.14</b>	4.0-10.0	$10^3/uL$
LYM	1.13	0.6-3.5	$10^3/uL$
MON	1.15	0.1-0.9	$10^3/uL$
GRA	25.68	1.3-6.7	$10^3/uL$
*LYM	4.0	20.0-40.0	%
*MON	4.1	2.0-8.0	%
*GRA	91.9	50-70	%
RBC	<b>4.35</b>	3.50-5.50	$10^6/uL$
HGB	<b>11.7</b>	11.0-17.9	g/dL
HCT	34.3	40-50	%
MCV	78.8	80.0-96.0	fL
MCH	26.8	23.2-38.7	pg

MCHC	34.1	32-37	g/dL
RDW-SD	42.1	37.0-54.0	fL
RDW-CV	13.2	10.0-18.0	%
PLT	375	150-400	10 <sup>3</sup> /uL
PCT	0.3	0.15-0.50	%
MPV	9.2	6.5-11.0	fL
PDW	16.4	10.0-18.0	fl
P-LCR	22.3	13.0-43.0	%

#### 7. Pemeriksaan kimia darah

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
<b>Kimia Darah</b>			
GDS	199	<200	Mg/dl

#### 8. Pemeriksaan Hematologi

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
<b>Hematologi</b>			
Clotting Time (CT)	6.30	<10	Menit
Bleeding Time (BT)	3.30	<5	Menit

#### 9. Pemeriksaan Urine

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
<b>Urine</b>			
Warna	Kuning Tua	Kuning Muda	
Kejernihan	Keruh	Jernih	
Berat Jenis	1.020	1.005-1.035	
pH	5.5	5.0-7.5	
Protein	++	Negatif	
Glukosa	+-	Negatif	
Keton	++	Negatif	
Bilirubin	Negatif	Negatif	
Urobilinogen	+-	Negatif	
Nitrit	Negatif	Negatif	
Darah/Hb	+++	Negatif	
Leukosit	Negatif	Negatif	
*Sel Epitel	2-3	0-5	/lpk

*Eritrosit	5-7	0-5	/lpk
*Luekosit	0-2	0-5	/lpk
*Bakteri	Negatif	Negatif	
*Kristal	Negarif	Negatif	

#### 10. Pemeriksaan Imunologi

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
<b>Imunologi</b>			
HbsAg	Non Reaktif	Non Reaktif	



## B. Analisa Data

Tab 3.1 Analisa Data

Data	Etiologi	Masalah Keperawatan
<p><b>Data subjektif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pasien mengeluh nyeri</li> <li>4. Pasien mengatakan nyeri pada perut bagian bawah, post operasi</li> <li>5. Pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk</li> <li>6. Pasien mengatakan skala nyeri : 5</li> <li>7. Pasien mengatakan nyeri hilang timbul <math>\pm</math> 5 menit</li> </ol> <p><b>Data objektif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tampak meringis</li> <li>2. TTV:            TD: 154/98 mmHg            N: 140x/menit            P: 20x/menit            S: 36.5°C            SpO2: 99%</li> </ol>	<p>Prosedur Tindakan operasi (Post SC)</p> <p>↓</p> <p>Luka Post SC</p> <p>↓</p> <p>Terputusnya jaringan kontinuitas</p> <p>↓</p> <p>Nyeri Akut</p>	<p>Nyeri Akut</p>
<p><b>Data subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengatakan masih sulit menggerakkan kedua kakinya</li> <li>2. Pasien mengatakan masih lemas</li> </ol> <p><b>Data objektif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KU : Tampak lemah</li> <li>2. Pasien tampak terbaing di tempat tidur</li> <li>3. Kekuatan otot ekstremitas bawah menurun</li> <li>4. Tampak ADL di bantu oleh keluarga</li> </ol>	<p>Post SC)</p> <p>↓</p> <p>Luka Post SC</p> <p>↓</p> <p>Nyeri dan Efek Anestesi</p> <p>↓</p> <p>Rentang gerak menurun</p> <p>↓</p> <p>Gangguan Mobilitas fisik</p>	<p>Gangguan mobilitas fisik</p>
<p><b>Data subjektif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengatakan nyeri pada luka post operasi</li> </ol> <p><b>Data objektif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tampak luka operasi diverban</li> <li>2. Tampak meringis</li> <li>3. Pemeriksaan lab:            WBC: 20.22 (<math>10^3/uL</math>)            RBC: 3.18 (<math>10^6/uL</math>)            HGB: 8.2 g/dL            HCT: 24.6 %</li> </ol>	<p>Post Op SC</p> <p>↓</p> <p>Tindakan Insisi</p> <p>↓</p> <p>Terputusnya Kontinuitas jaringan</p> <p>↓</p> <p>Luka Post Op</p> <p>↓</p> <p>Invasi Bakteri</p>	<p>Resiko Infeksi</p>

	↓ Resiko infeksi	
--	---------------------	--

### C. Diagnosis Keperawatan

Penarikan diagnosis keperawatan berdasarkan SDKI DPP PPNI (SDKI, 2017)

1. Nyeri Akut berhubungan dengan Agen pencedera fisik ditandai dengan mengeluh nyeri, skala 5, tampak meringis (D.0077)
2. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, penurunan kekuatan otot ditandai dengan mengeluh sulit menggerakkan ekstermitas, ROM Menurun (D.0054)
3. Resiko Infeksi ditandai dengan prosedur tindakan invasif (D.0142)

## D. Intervensi Keperawatan

Penentuan intervensi keperawatan berdasarkan (SDKI DPP PPNI, 2016), (SLKI PPNI, 2018), dan (SIKI DPP PPNI, 2018)

Tabel 3.2 Rencana Tindakan Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan Dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
1	Nyeri Akut berhubungan dengan Agen pencedera fisik ditandai dengan mengeluh nyeri, skala 5, tampak meringis	<p><b>Tingkat nyeri (L.08066)</b></p> <p><b>Tujuan:</b> Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2x24 jam maka tingkat nyeri menurun</p> <p><b>Kriteria Hasil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan: 1</li> <li>• Cukup meningkat: 2</li> <li>• Sedang: 3</li> <li>• Cukup menurun: 4</li> <li>• Menurun: 5               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keluhan Nyeri</li> <li>▪ Meringis</li> </ul> </li> <li>• Memburuk: 1</li> <li>• Cukup memburuk: 2</li> <li>• Sedang: 3</li> <li>• Cukup membaik: 4</li> <li>• Membaik: 5               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frekuensi nadi</li> <li>▪ Tekanan darah</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Manajemen Nyeri (I.08238)</b></p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri</li> <li>▪ Identifikasi skala nyeri</li> <li>▪ Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri</li> </ul> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (kompres hangat dengan aromaterapi)</li> <li>▪ Kontrol lingkungan yang memperberat nyeri</li> <li>▪ Fasilitasi istirahat dan tidur</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jelaskan penyebab dan periode dan pemicu nyeri</li> <li>▪ Anjurkan monitor nyeri secara mandiri</li> <li>▪ Ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</li> </ul> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kolaborasi pemberian analgesik, <i>jika perlu</i></li> </ul>	<p><b>Manajemen Nyeri</b></p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri dari pasien</li> <li>▪ Mengetahui tingkat nyeri yang dirasakan pasien</li> <li>▪ Mengetahui hal-hal yang dapat memperberat ataupun memperingan nyeri yang dirasakan pasien</li> </ul> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengurangi tingkat nyeri pasien/mengalihkan pasien dari rasa nyerinya</li> <li>▪ Mengurangi resiko factor yang dapat memperberat nyeri/menimbulkan nyeri</li> <li>▪ Mengalihkan dan memenuhi kebutuhan istirahat pasien</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan informasi terkait nyeri yang dirasakan pasien</li> <li>▪ Pasien dapat mengetahui sendiri karakteristik, penyebab, lokasi saat nyeri muncul</li> </ul>

			 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memudahkan pasien untuk mengontrol nyeri dengan cara sederhana</li> </ul> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengurangi/ menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien</li> </ul>
--	--	--	--	---

No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan Dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
2	Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, penurunan kekuatan otot ditandai dengan mengeluh sulit menggerakkan ekstermitas, ROM Menurun	<b>Mobilitas Fisik (L.05042)</b> <b>Tujuan:</b> Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x4 jam maka mobilitas fisik meningkat. <b>Kriteria Hasil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurun: 1</li> <li>• Cukup menurun: 2</li> <li>• Sedang: 3</li> <li>• Cukup meningkat: 4</li> <li>• Meningkatkan: 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pergerakan ekstermitas</li> <li>▪ Kekuatan otot</li> <li>▪ Rentang gerak</li> </ul> </li> <li>• Meningkatkan: 1</li> <li>• Cukup meningkat: 2</li> <li>• Sedang: 3</li> <li>• Cukup menurun: 4</li> <li>• Menurun: 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelemahan fisik</li> </ul> </li> </ul>	<b>Dukungan Mobilisasi (I.05173)</b> <b>Observasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya</li> <li>▪ Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan</li> <li>▪ Monitor tekanan darah dan frekuensi sebelum dan sesudah mobilisasi</li> <li>▪ Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi</li> </ul> <b>Terapeutik:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitasi aktivitas dengan alat bantu (mis: pagar di tempat tidur untuk memegang)</li> <li>▪ Fasilitasi melakukan pergerakan, <i>jika perlu</i></li> <li>▪ Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan</li> </ul> <b>Edukasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anjurkan mobilisasi dini</li> <li>▪ Ajarkan mobilisasi sederhana (mis: miring kanan dan miring kiri, duduk di tempat tidur)</li> </ul>	<b>Dukungan Mobilisasi</b> <b>Observasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengetahui keluhan lain pasien dan rencana tindakan berikutnya yang dapat dilakukan</li> <li>▪ Mengetahui kemampuan dan batasan pasien terkait latihan/gerak yang akan dilakukan berikutnya</li> <li>▪ Mengetahui adanya perubahan status kerja frekuensi dan tekanan darah pasien</li> <li>▪ Mengetahui kondisi terkini pasien dan perubahan yang dapat terjadi selama melakukan mobilisasi</li> </ul> <b>Terapeutik:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan bantuan kepada pasien saat akan melakukan mobilisasi dan mengurangi resiko jatuh/ sakit saat berpindah</li> <li>▪ Meningkatkan status mobilitas fisik pasien</li> <li>▪ Keluarga dapat secara mandiri membantu pasien melakukan latihan pergerakan</li> </ul> <b>Edukasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengurangi resiko kekakuan dan kelemahan otot yang berkepanjangan</li> <li>▪ Melatih kekuatan otot dan pergerakan pasien agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi</li> </ul>

No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan Dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
3	Resiko Infeksi ditandai dengan prosedur tindakan invasif	<p><b>Tingkat Infeksi (L.14137)</b> Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam maka tingkat infeksi menurun</p> <p><b>Kriteria Hasil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan: 1</li> <li>• Cukup meningkat: 2</li> <li>• Sedang: 3</li> <li>• Cukup menurun: 4</li> <li>• Menurun: 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nyeri</li> </ul> </li> <li>• Memburuk: 1</li> <li>• Cukup memburuk: 2</li> <li>• Sedang: 3</li> <li>• Cukup membaik: 4</li> <li>• Membaik: 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kadar sel darah putih</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Pencegahan Infeksi (I14539)</b></p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</li> </ul> <p>Terapeutik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien</li> <li>▪ Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ajarkan tanda dan gejala infeksi</li> <li>▪ Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi</li> </ul>	<p><b>Pencegahan Infeksi</b></p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengetahui dan menilai tanda dan gejala infeksi</li> </ul> <p>Terapeutik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mencegah terjadinya infeksi silang</li> <li>▪ Mencegah terjadinya resiko infeksi pada pasien</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menbefrikan pengetahuan kepada pasien tanda dan gejala</li> <li>▪ Memenuhi kebutuhan nutrisi dan mempercepat proses penyembuhan</li> </ul>

## E. Implementasi Keperawatan

Kamis, 15 April 2021

Tabel 3.3 Implementasi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Hari, Tgl/ Jam	Implemntasi	Nama Jelas
1	Nyeri Akut berhubungan dengan Agen pencedera fisik ditandai dengan mengeluh nyeri, skala 5, tampak meringis	<p><b>Kamis, 15 april 2021</b>  <b>Jam : 14:00-21.00 wita</b></p> <p><b>Jam 14.05 wita</b></p> <p><b>Jam 14.07 wita</b></p> <p><b>Jam 14.08 wita</b></p> <p><b>Jam 15.00 wita</b></p> <p><b>Jam 14.11 wita</b></p>	<p><b>Manajemen Nyeri</b>            Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri              Hasil:              Pasien mengatakan nyeri pada luka post operasi bagian perut bawah              Kualitas nyeri seperti tertusuk-tusuk              Nyeri hilang timbul ± 5 menit</li> <li>▪ Mengidentifikasi skala nyeri              Hasil:              Skala nyeri : 5 (sedang)</li> <li>▪ Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri              Hasil:              Pasien mengatakan tidak melakukan apa-apa ketika nyerinya muncul</li> </ul> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (kompres hangat dengan aromaterapi peppermint)              Hasil:              Pasien diberikan kompres hangat, evaluasi: pasien mengatakan merasa lebih nyaman dan mencium bau wangi jadi sedikit lebih rileks, nyeri sedikit berkurang setelah di kompres, skala nyeri: 4</li> <li>▪ Mengontrol lingkungan yang memperberat nyeri</li> </ul>	Ikrimah Syam, S.Kep

		<p><b>Jam 14.12 wita</b></p> <p><b>Jam 14.09 wita</b></p>	<p>Hasil: Pasien mengatakan lingkungan sudah nyaman dan tidak berisik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menfasilitasi istirahat dan tidur Hasil: Pasien mengatakan ingin tidur siang sejenak</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menganjurkan monitor nyeri secara mandiri Hasil: Telah dilakukan Pasien mengatakan akan memonitor nyeri</li> </ul> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kolaborasi pemberian analgesic Hasil: Di berikan Obat Dexketoprofen/IV/8 jam (belum diberikan)</li> </ul>	
2	Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, penurunan kekuatan otot ditandai dengan mengeluh sulit menggerakkan ekstermitas, ROM Menurun	<p><b>Jam 16.00 wita</b></p> <p><b>Jam 16.02 wita</b></p>	<p><b>Dukungan Mobilisasi</b></p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya Hasil: Pasien belum bisa menggerakkan ekstermitas bawah</li> <li>▪ Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan Hasil: Pasien belum bis melakukan pergerakan, tampak aktivitas harian di bantu oleh keluarga (suami)</li> </ul>	

		<b>Jam 16.03 wita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitor tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah mobilisasi</li> </ul> <p>Hasil: TD: 156/90 mmHg N: 130 x/menit</p>	Ikrimah Syam, S.Kep
		<b>Jam 16.05 wita</b>	<p>Terapeutik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memfasilitasi aktivitas dengan alat bantu (mis: pagar di tempat tidur untuk memegang)</li> </ul> <p>Hasil: Tersedia pagar di sisi kanan dan kiri tempat tidur</p>	
		<b>Jam 16.06 wita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan</li> </ul> <p>Hasil: Tampak aktivitas dibantu oleh keluarga</p>	
		<b>Jam 16.08 wita</b>	<p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menganjurkan moilisasi dini</li> </ul> <p>Hasil: Pasien belum bisa melakukan pergerakan</p>	



**Jumat, 16 April 2021**

**Tabel 3.3 Implementasi Keperawatan**

No	Diagnosis Keperawatan	Hari, Tgl./ Jam	Implementasi	Nama Jelas
1	Nyeri Akut berhubungan dengan Agen pencedera fisik ditandai dengan mengeluh nyeri, skala 5, tampak meringis	<b>Jum'at, 16 april 2021</b> <b>Jam : 08.00-14.00 wita</b>  <b>Jam 08.35 wita</b>   <b>Jam 08.37 wita</b>   <b>Jam 08.38 wita</b>   <b>Jam 10.00 wita</b>   <b>Jam 14.00 wita</b>	<b>Manajemen Nyeri</b> Observasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri                Hasil:                Pasien mengatakan masih nyeri pada luka post operasi bagian perut bawah                Kualitas nyeri seperti tertusuk-tusuk                Nyeri hilang timbul ± 2 menit</li> <li>▪ Mengidentifikasi skala nyeri                Hasil:                Pasien mengatakan skala nyeri : 4 (sedang)</li> <li>▪ Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri                Hasil:                Pasien mengatakan melakukan relaksasi nafas dalam ketika nyeri muncul</li> </ul> Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (kompres hangat dengan aromaterapi peppermint)                Hasil:                Pasien diberikan kompres hangat, evaluasi: pasien mengatakan merasa lebih nyaman dan mencium bau wangi jadi sedikit lebih rileks, nyeri sedikit berkurang setelah di kompres, skala nyeri: 2</li> <li>▪ Memfasilitasi istirahat dan tidur</li> </ul>	Ikrimah Syam, S.Kep

		<p><b>Jam 14.12 wita</b></p> <p><b>Jam 14.09 wita</b></p> <p><b>Jam 13.00 wita</b></p>	<p>Hasil: Pasien saat ini sedang beristirahat</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjelaskan penyebab dan periode dan pemicu nyeri Hasil: Pasien mengerti tentang nyeri yang dirasakan dan apa yang telah di jelaskan</li> <li>▪ Mengajarkan teknik non farmakologis untuk mengruangi rasa nyeri Hasil: Telah di ajarkan teknik relaksasi nafas dalam pada pukul 14.10 wita</li> </ul> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kolaborasi pemberian analgesic Hasil: Di berikan Obat Dexketoprofen/IV/8 jam</li> </ul>	
2	<p>Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, penuruna kekuatan otot ditandai dengan mengeluh sulit menggerakkan ekstermitas, ROM Menurun</p>	<p><b>Jam 09.00 wita</b></p> <p><b>Jam 09.02 wita</b></p>	<p><b>Dukungan Mobilisasi</b></p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya Hasil: Pasien masih mengeluh nyeri pada luka post op</li> <li>▪ Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan Hasil: Pasien sudah bisa miring kanan dan kiri jika di bantu keluarga</li> </ul>	

		<b>Jam 11.03 wita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitor tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah mobilisasi</li> </ul> <p>Hasil: TD: 150/84 mmHg N: 128 x/menit</p>	Ikrimah Syam, S.Kep
		<b>Jam 11.05 wita</b>	<p>Terapeutik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memfasilitasi aktivitas dengan alat bantu (mis: pagar di tempat tidur untuk memegang)</li> </ul> <p>Hasil: Terpasang pagar di sisi kanan dan kiri tempat tidur</p>	
		<b>Jam 12.00 wita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan</li> </ul> <p>Hasil: Tampak aktivitas dibantu oleh suami</p>	
		<b>Jam 12.02 wita</b>	<p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menganjurkan mobilisasi dini</li> </ul> <p>Hasil: Pasien sudah bisa miring kanan dan kiri</p>	



## F. Evaluasi

**Tabel 3.4 Evaluasi Keperawatan**

No	Diagnosis	Hari, Tgl./ Jam	Evaluasi	Nama Jelas
1	Nyeri Akut berhubungan dengan Agen pencedera fisik ditandai dengan mengeluh nyeri, skala 5, tampak meringis	<b>Kamis, 15 April 2021</b> <b>Jam 20.00 wita</b>	<p>S:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien mengatakan masih nyeri pada luka post operasi, tapi sudah mulai berkurang</li> <li>Pasien mengatakan nyeri hilang timbul <math>\pm</math> 4 menit</li> <li>Skala nyeri 4</li> </ol> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keadaan umum: tampak lemah</li> <li>Tampak masih meringis</li> <li>Kesadaran: Composmentis</li> <li>TTV TD: 139/79 mmHg N: 126 x / menit P: 22 x/ menit S: 36,0°C SpO2: 99</li> <li>Skala nyeri : 4</li> </ol> <p>A: Masalah nyeri akut belum teratsi</p> <p>P: Lanjutkan Intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitor skala nyeri</li> <li>Berikan kompres hangat</li> <li>Obsevasi KU TTV pasien/ jam</li> <li>Tindakan kolaborasi analgesic dexketoprofen/IV/8 jam</li> </ol>	Ikirmah Syam, S.Kep
2	Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, penurunan kekuatan otot ditandai dengan mengeluh	<b>Jam 20:45 wita</b>	<p>S:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien mengatakan belum bisa menggerakkan ekstremitasnya karena masih nyeri</li> <li>Pasien mengatakan masih merasa lemas</li> </ol>	

	sulit menggerakkan ekstermitas, ROM Menurun		<p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tampak lemah</li> <li>2. Tampak aktivitas harian di bantu oleh perawat dan keluarga</li> </ol> <p>A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi keluhan nyeri atau keluhan fisik lainnya</li> <li>2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan</li> <li>3. Monitor kondisi umum pasien</li> <li>4. Anjurkan mobilisasi dini</li> </ol>	Ikirmah Syam, S.Kep
3	Resiko Infeksi ditandai dengan prosedur tindakan invasive	Jam 20:55 wita	<p>S:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengatakan masih nyeri pada luka post operasi</li> </ol> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tampak luka operasi di verban</li> <li>3. WBC: <math>20.22 \times 10^3 / \text{uL}</math></li> <li>4. HGB: 8.2 g/dL</li> </ol> <p>A: Masalah resiko belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor tanda dan gejala infeksi</li> <li>2. Pertahankan teknik aseptik</li> <li>3. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi</li> <li>4. Injeksi antibiotic Ceftriaxone 1 gr/ 12 jam</li> </ol>	Ikrimah Syam, S.Kep
1	Nyeri Akut berhubungan dengan Agen pencedera fisik ditandai dengan mengeluh nyeri, skala 4, tampak meringis	<b>Jum'at, 16 April 2021</b> <b>Jam 13.45 wita</b>	<p>S:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengatakan masih nyeri pada luka post operasi, tapi sudah mulai berkurang</li> <li>2. Pasien mengatakan nyeri hilang timbul <math>\pm</math> 2 menit</li> </ol> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadaan umum: mulai membaik</li> </ol>	

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tampak meringis menurun sambil memegang sekitar area yang nyeri</li> <li>3. Kesadaran: Composmentis</li> <li>4. TTV            TD: 139/89 mmHg            N: 128 x / menit            P: 22 x/ menit            S: 36,3°C            SpO2: 99 5</li> <li>5. Skala nyeri :2</li> </ol> <p>A: Masalah nyeri akut mulai teratasi            P: Lanjutkan Intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor skala nyeri</li> <li>2. Berikan kompres hangat</li> <li>3. Obsevasi KU TTV pasien/ jam</li> <li>4. Tindakan kolaborasi analgesic dexketoprofen/IV/8 jam</li> </ol>	
2	Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, penurunan kekuatan otot ditandai dengan mengeluh sulit menggerakkan ekstermitas, ROM Menurun	Jam 13.50 wita	<p>S:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengatakan nyeri luka post op sudah mulai berkurang</li> <li>2. Pasien mengatakan sudah bisa menggerakkan ekstremitas bawahnya</li> <li>3. Pasien mengatakan sudah bisa makan sendiri.</li> </ol> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tampak membaik</li> <li>2. Tampak aktivitas harian selalu di bantu oleh suami</li> <li>3. Pasien sudah mulai mampu melakukan aktivitas secara perlahan</li> </ol> <p>A: Masalah gangguan mobilitas fisik sebagian teratasi            P : lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi keluhan nyeri atau keluhan fisik lainnya</li> <li>2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan</li> <li>3. Monitor kondisi umum pasien</li> </ol>	

			4. Anjurkan mobilisasi dinisperti duduk di atas tempat tidur	
3	Resiko Infeksi ditandai dengan prosedur tindakan invasive	Jam 14.00	<p>S:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengatakan masih nyeri pada luka post operasi</li> </ol> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tampak luka operasi di verban</li> <li>2. WBC: <math>15.59 \times 10^3 / \mu\text{L}</math></li> <li>3. HGB: 8.2 g/dL</li> </ol> <p>A: Masalah resiko mulai teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor tanda dan gejala infeksi</li> <li>2. Pertahankan teknik aseptik</li> <li>3. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi</li> <li>4. Injeksi antibiotic Ceftriaxone 1 gr/ 12 jam</li> </ol>	

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Kasus**

Pada laporan akhir kasus ini pasien mengalami preeklamsia disertai dengan eklamsia (kejang) post operasi *Sectio caesarea* yang disebabkan beberapa faktor yaitu peningkatan tekanan darah, terdapat proteinuria, edema, faktor usia >35 tahun, dan kadang disertai komplikasi kejang dan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian yang didapatkan pasien mengalami hipertensi sebelum melahirkan ditandai dengan tekanan darah 140/90 mmHg, terdapat proteinuria : 2+, terdapat keluhan nyeri pada kepala dan nyeri perut tembus kebelakang, kemudian pasien juga mengalami kejang sebanyak 2 kali yaitu saat di Rumah sakit sebelumnya dan saat di mobil ambulans ketika di rujuk ke RS labuang baji. Sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa preeklamsia adalah sekumpulan gejala yaitu hipertensi, edema dan proteinuria yang timbul pada wanita hamil dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu, pada ibu bersalin dan nifas (POGI, 2016). Hal ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Aprina & Puri, 2016) bahwa faktor yang menyebabkan tindakan operasi section caesarea yaitu preeklamsia berat.

Keluhan utama yang disampaikan oleh pasien adalah nyeri pada daerah luka sayatan post operasi section caesarea. Nyeri adalah kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan bersifat sangat subyektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang dalam hal skala atau tingkatannya, dan hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan atau mengevaluasi rasa nyeri yang dialaminya. Nyeri dapat memenuhi seluruh pikiran seseorang, mengatur aktivitasnya, dan mengubah kehidupan orang tersebut (Heriana, 2014).

Nyeri yang dirasakan pada pasien merupakan akibat dari tindakan prosedur invasif yaitu operasi *section caesarea*. Tindakan setelah operasi *section caesarea* dapat menyebabkan masalah akibat insisi dari robekan jaringan dinding perut dan dinding uterus dapat terjadinya perubahan kontinuitas karena adanya pembedahan sehingga ibu merasa nyeri dan mengeluhkan nyeri tersebut (Wahyu, Lina, & Fitri, 2019).

Diagnosis keperawatan utama pada kasus ini adalah nyeri akut yang berhubungan dengan tindakan prosedur invasive. Masalah ini didapatkan saat dilakukan pengkajian pada tanggal 15/04/2021 di ruang ICU, hari pertama pasien pasca bedah operasi section caesarea dengan keluhan nyeri, pasien mengatakan nyeri pada luka sayatan di abdomen post operasi SC, dengan skala 4 (sedang), kualitas nyeri seperti tertusuk-tusuk, intensitas hilang timbul dengan durasi  $\pm$  5 menit, pasien tampak meringis menahan nyeri yang dirasakan, tekanan darah meningkat : 154/98 mmHg, nadi: 140x/menit. nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan (SDKI, 2017). Nyeri pada post SC akibat dari trauma jaringan dengan terputusnya kontinuitas jaringan akibat dari pembedahan.

Proses fisiologi nyeri terjadi akibat adanya trauma pada jaringan yang kemudian terbentuk zat-zat kimia seperti, serotonin, bradykinin, histamin, dan enzim proteolitik. Zat-zat kimia tersebut akan merangsang dan merusak ujung saraf-saraf reseptor nyeri kemudian rangsangan tersebut akan dihantarkan ke hipotalamus melalui saraf assenden kemudian di hantarkan ke kortek serebri untuk menerima dan mempersiapkan untuk mempersepsikan rasa nyeri yang dialami oleh individu. (Tarwoto & wartonah, 2010) Sehingga nyeri yang semakin sering terjadi dan semakin lama dapat menyebabkan pasien tidak nyaman, gelisah, tegang, takut, stress bahkan sampai mengalami gangguan psikologis.

## **B. Analisis Intervensi**

Tindakan keperawatan utama yang diberikan pada diagnosis keperawatan nyeri akut adalah Manajemen nyeri dengan melakukan kompres panas/ hangat (SIKI, 2018). Kompres panas/ hangat merupakan cara menstimulus kulit dan jaringan menggunakan air hangat sehingga dapat mengurangi rasa nyeri, spasme pada otot serta efek terapeutik lainnya (SIKI, 2018). Kompres hangat

yang dikombinasikan dengan aromaterapi. Aromaterapi adalah tindakan memerikan minyak esensial inhalasi, pemijatan, uap, atau kompres untuk menangani nyeri, menurunkan tekanan darah dan meningkatkan relaksasi dan kenyamanan (SIKI, 2018).

Pemberian kompres hangat dengan aromaterapi di lakukan selama 2 hari pada tanggal 15-16 April 2021 di ruang ICU RSUD Labuang Baji Makassar dan didapatkan hasil :

1. Fase I : tanggal 15 April 2021 jam 15.00 WITA, Sebelum dilakukan tindakan kompres terlebih dahulu pasien di evaluasi perasaan dan keluhan nyeri, dan didapatkan hasil: pasien mengeluh nyeri pada perut bekas operasinya, dengan skala nyeri 5. Dan setelah dilakukan kompres hangat dengan aromaterapi peppermint dievaluasi kembali, dapatkan hasil : pasien mengatakan merasa lebih nyaman dan mencium bau wangi jadi sedikit lebih rileks, nyeri sedikit berkurang setelah di kompres, skala nyeri: 4, tampak meringis menurun, tampak status hemodinak mengalami perubahan: Tekanan Darah menjadi 139/79 mmHg, HR: 126x /menit.
2. Fase II : tanggal 16 April 2021 jam 10.00 WITA, Sebelum dilakukan tindakan kompres terlebih dahulu pasien di evaluasi perasaan dan keluhan nyeri, dan didapatkan hasil: pasien mengeluh nyeri pada perut bekas operasinya, dengan skala nyeri 4. Dan setelah dilakukan kompres hangat dengan aromaterapi peppermint dievaluasi kembali, dapatkan hasil : pasien mengatakan merasa lebih nyaman dan mencium bau wangi jadi sedikit lebih rileks, nyeri mulai berkurang setelah di kompres, skala nyeri: 2. Tampak meringis menurun, tampak status hemodinak mengalami perubahan: Tekanan Darah menjadi 139/89 mmHg, HR: 128x /menit.

Selama pemberian intervensi kompres hangat dengan aromateapi

*peppermint* selama 2 hari didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan tingkat nyeri yang dirasakan oleh pasien dari skala nyeri 5, setelah di berikan intervensi hari pertama menjadi skala 4 dan hari kedua menjadi skala nyeri 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompres hangat dengan aromaterapi efektif menurunkan nyeri pada pasien post operasi section caesarea.

Sejalan dengan penelitian Wahyu et.al (2019) menyatakan bahwa kompres hangat menggunakan aromaterapi *jasmine oil* dapat menurunkan skala nyeri pada pasien *post* operasi *sectio caesarea*, dimana didapatkan dari hasil analisis univariat intensitas nyeri pada pasien post operasi *sectio caesarea* sebelum sebagian besaar responden mengalami nyeri dengan rentang skala 4-6 sebelum responden di lakukan intervensi kompres hangat. Dan setelah dilakukan intervensi kompres hangat pada pasien post operasi *sectio caesarea* intensitas nyeri yang dirasakan oleh responden berada dalam rentang skala 1-3 (nyeri ringan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompres hangat dengan *jasmine essential oil* berpengaruh terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi *sectio caesarea* di RS. Bhayangkara Bengkulu.

Pemberian kompres hangat dengan aromaterapi dimana aromaterapi tersebut bekerja melalui kompres, aromaterapi atau minyak essensial dapat memanaskan kulit hingga ke otot sehingga terjadi rasa nyaman dan mengurangi rasa nyeri. hal ini juga dikemukakan oleh Sari dan Rina (2015) bahwa kompres hangat dengan minyak essensial lavender dapat merangsang dan melemaskan otot sehingga stimulus menuju ujung saraf berkurang sehingga saraf yang membawa rasa nyeri berkurang dan hantaran implus nyeri ke saraf pusat berkurang sehingga nyeri yang tersampaikan berkurang.

Kompres hangat selain dapat mengurangi rasa nyeri, juga dapat meningkatkan proses penyembuhan pada jaringan yang rusak, dimana dengan

menggunakan air hangat maka reaksi fisiologis yang terjadi yaitu meningkatnya aliran darah pada jaringan, respon inflamasi dan pembentukan edema meningkat. (Andreinie, 2016)

Pada penelitian Putri tahun 2015 menyatakan bahwa terdapat pengaruh kompres hangat terhadap skala nyeri menurun pada pasien post operasi *section caesarea*, dan di dapatkan hasil bahwa setelah dilakukan kompres hangat pada 34 responden terdapat 27 responden (79,41%) mengalami penurunan nyeri dari skala berat menjadi skala sedang dan 7 responden (20,59%) mengalami penurunan pada nyeri ringan. Penelitian ini sejalan dengan Agustina (2019) didapatkan perbedaan tingkat nyeri sebelum dan sesudah diberi perlakuan aromaterapi peppermint pada kelompok intervensi pada pasien post operasi *sectio caesarea* dengan nilai P value = 0,000 ( $< 0,05$ ) dengan penurunan rata-rata 4,00. Tidak adanya perbedaan tingkat nyeri pada 6 jam dan 12 jam post anestesi pada kelompok kontrol dengan nilai P value = 0,317 ( $> 0,05$ ). Kesimpulannya ialah Adanya pengaruh antara aromaterapi peppermint terhadap perubahan tingkat nyeri pada pasien post operasi *sectio caesarea* nilai P value = 0,000 ( $< 0,05$ ) (Agustina, Meirita, & Fajria, 2019).

Kompres hangat dengan aromaterapi dapat dilihat keefektifannya ketika pemberian dilakukan 6 jam setelah pasien diberikan obat analgesik, terlebih dahulu dilakukan *pre-test*, kemudian melakukan kompres hangat dengan aromaterapi *jasmine oil* yang di aplikasikan selama 20 menit di daerah punggung bawah pasien. Pada penelitian ini menggunakan Lembaran Instrumen dengan skala nyeri deskripsi verbal (Verbal Descriptor Scale, VDS) untuk mendapatkan data primer dari hasil observasi dan wawancara pada pasien sebagaimana yang dikemukakan oleh (Wahyu, Lina, & Fitri, 2019). Pada penelitian ini juga melakukan hal yang sama pada pasien post operasi *section*

*caesarea* tapi alat instrument yang digunakan yaitu menggunakan NRS (*Numerical Rating Scale*) sebelum di lakukan intervensi kompres hangat dengan aromaterapi pada pasien.

Kesehatan merupakan nikmat utama yang dianugerahkan oleh Allah SWT kita, sebagai manusia patutnya untuk mensyukuri terhadap apa yang telah diberikan. Salah satu cara mensyukuri nikmat kesehatan tersebut dengan cara menjaganya dari penyakit, menggunakan kesempatan dalam hidup dalam beribadah pada Allah SWT. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝

Terjemahnya:

“dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(QS: Ibrahim/14: 7)

Dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. lebih jauh diperintahkan agar mengingat juga ucapan lain yang disampaikan Nabi Musa as. kepada umatnya, agar beliau pun menyampaikannya kepada umat Islam. Nabi Musa as. berkata kepada kaumnya: “Dan ingat jugalah nikmat Allah kepada kamu semua tatkala Tuhan Pemelihara dan Penganugerah aneka kebajikan kepada kamu memaklumkan: “Sesungguhnya Aku yakni Allah bersumpah demi kekuasaan-Ku, jika kamu bersyukur pasti Aku tambah nikmat-nikmat-Ku kepada kamu karena sungguh amat melimpah nikmat-Ku. Karena itu maka berharaplah yang banyak dari-Ku dengan mensyukurinya dan jika kamu kufur yakni mengingkari nikmat-nikmat yang telah Ku-anugerahkan, dengan tidak menggunakan memanfaatkannya sebagaimana Ku-kehendaki, maka akan Ku-kurangi nikmat itu bahkan kamu terancam mendapat siksa-Ku sesungguhnya

siksa-Ku dengan berkurang atau hilangnya nikmat itu, atau jatuhnya petaka atas kamu akan kamu rasakan amat pedih. ”

Sementara ulama tidak menilai ayat ini sebagai lanjutan ucapan Nabi Musa as., tetapi ini adalah pernyataan langsung dari Allah swt. sebagai salah satu anugerah-Nya. Ia merupakan anugerah karena mengetahui hakikat yang dijelaskan ayat ini menimbulkan optimisme dan mendorong untuk giat beramal guna memperoleh nikmat lebih banyak lagi.

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa jika bersyukur maka pasti nikmat Allah akan ditambahnya, tetapi ketika berbicara tentang kufur nikmat, tidak ada penegasan bahwa pasti siksa-Nya akan jatuh. Ayat ini hanya menegaskan bahwa siksa Allah pedih. Jika demikian, penggalan akhir ayat ini dapat dipahami sekedar sebagai ancaman. Disisi lain, tidak tertutup kemungkinan keterhindaran dari siksa duniawi bagi yang mengkufuri nikmat Allah, bahkan boleh jadi nikmat tersebut ditambah-Nya dalam rangka mengulur kedurhakaan (Shihab, 2002).

Keterikatan dan keterkaitan intervensi *evidence bance nursing* dapat ditambahkan dengan kondisi tubuh yang relaks sebelum diberikan intervensi. Kondisi tubuh yang relaks bisa di modifikasi dengan cara berzikir, entah zikir asmaul husnah, sholawat, kalimat tahmid atau bahkan mendengarkan murottal. Harapannya setelah memodifikasi pikiran dengan keadaan tenang akan membantu persiapan klien menerima intervensi. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah, dengan berzikir akan membuat hati dan pikiran menjadi tenang. Sebagaimana Allah SWT. berfirman (QS : Ar-Ra'd/13:28) yang berbunyi:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝۲۸

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”

Tafsir Al-Azhar menjelaskan ayat ini kepada kita dijelaskan bahwa Iman adalah menyebabkan senantiasa ingat kepada Tuhan, atau zikir. Iman menyebabkan hati kita mempunyai pusat ingatan atau tujuan ingatan. Dan ingatan kepada Tuhan itu menimbulkan tenteram, dan dengan sendirinya hilanglah segala macam kegelisahan, fikiran kusut, putus asa, ketakutan, kecemasan, keragu-raguan dan dukacita. Ketenteraman hati adalah pokok kesihatan rohani dan lasmini. Ragu dan gelisah adalah pangkal segala penyakit. orang lain kurang sekali dapat menolong orang yang meracun hatinya sendiri dengan kegelisahan. Kalau hati telah ditumbuhi penyakit, dan tidak segera diobat dengan Iman, yaitu iman yang menimbulkan zikir dan zikir yang menimbulkan Thuma'ninoh, maka celakalah yang akan rnenimpa. Hati yang telah sakit akan bertambah sakit. Dan puncak segala penyakit hati ialah kufur akan nikmat Allah (Hamka, 1983).

### **C. Alternative Pemecahan Masalah**

Beberapa intervensi yang dilakukan selain implementasi utama yaitu Memonitor skala nyeri, mengajarkan teknik relaksasi, mengontol lingkungan yang memperberat nyeri. Intervensi ini sesuai dengan masalah keperawatan nyeri. tindakan memonitor skala nyeri agar mengetahui skala nyeri yang dirasakan oleh pasien, pemberian teknik relaksasi dapat mengurangi tanda dan gejala ketidaknyamanan seperti nyeri, ketegangan otot, dan kecemasan. Setelah dilakukan mengajarkan teknik relaksasi dan dipraktekkan oleh pasien didapatkan bahwa pasien mengatakan nyeri sedikit berkurang setelah dilakukan teknik relaksasi yang awalnya dari skala nyeri 4 menjadi skala nyeri antara 3-4. Seperti yang telah dikemukakan oleh (Yuwanita, 2019) bahwa didapatkan intensitas nyeri sebelum dan sesudah di lakukan rileksasi pada pasien post *Sectio Caesarea* dengan nilai P value 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penurunan intesitas nyeri pada pasien pasca persalinan post SC.

Selain tindakan memberikan teknik relaksasi dapat juga di berikan terapi murottal pada pasien post SC dengan masalah nyeri. Penelitian yang dilakukan oleh Purwati dkk (2019) di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang menyatakan terapi bacaan Al-Quran dapat bersinergi dengan terapi farmakologi dalam menurunkan nyeri. Pendekatan spiritual dapat membantu mempercepat pemulihan atau penyembuhan klien. Terapi music adalah salah satu teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien post SC adalah dengan teknik distraksi salah satunya yaitu distraksi suara dan salah satu jenis music adalah terapi murottal Al-Qur'an yang mempengaruhi pusat saraf dengan mengaktifkan hormon endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa nyeri. Hal ini sejalan dengan studi kasus yang dilakukan oleh (Wahyuningsih & Khayati1, 2021) bahwa pasien mengalami penurunan nyeri dengan rata-rata 1 poin dari skala 5 menjadi 4 setelah terapi murottal. Terapi murottal yang dikombinasikan dengan napas dalam mampu menurunkan skala nyeri pasien post SC. Hal ini terjadi karena musik dapat memproduksi zat endorphin dan bekerja pada sistim limbik dihantarkan kepada sistem saraf dan merangsang organ-organ tubuh untuk memproduksi sel-sel yang rusak akibat pembedahan sehingga nyeri berkurang. Dengan

Setelah dilakukan berbagai implementasi yaitu kompres hangat dengan aromaterapi peppermint dan teknik relaksasi merupakan tindakan yang efektif dalam menurunkan nyeri pada pasien post SC. Didapatkan hasil setelah dilakukan tindakan kompres hangat dengan aromaterapi selama 2 hari maka didapatkan bahwa terjadi penurunan nyeri dari skala 4 (sedang) menjadi skala nyeri 2, dan tampak meringis menurun. Pasien mengatakan bahwa nyeri pada luka post SC telah berkurang dan dengan adanya aromaterapi yang diberikan dengan cara dikompres, ia merasakan nyaman dan rileks mencium bau aromaterpi tersebut. Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah menganjurkan pasien untuk mengontrol nyeri secara mandiri baik itu dengan teknik relaksasi maupun kompres hangat dengan aromaterapi yang dibantu oleh keluarga. Perlunya dilakukan pengadaan bahan kompres hangat di Rumah sakit khususnya di ICU, kemudian mengkombinasi kompres hangat dengan

pemberian anti piretik atau mengkombinasi terapi farmakologi dan nonfarmakologi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pemberian intervensi pada pasien eklampsia dengan post operasi *section caesarea* dengan masalah nyeri akut mulai teratasi dengan teknik non farmakologi yaitu pemberian tindakan kompres hangat dengan aromaterapi *peppermint* selama 2 hari, maka masalah yang terjadi dapat teratasi dengan hasil:

1. Keluhan nyeri menurun di tandai dengan:
  - Fase I : tanggal 15 April 2021 jam 15.00 WITA didapatkan hasil pasien mengatakan merasa lebih nyaman dan mencium bau wangi jadi sedikit lebih rileks, nyeri sedikit berkurang setelah di kompres, skala nyeri: 4, tampak meringis menurun.
  - Fase II : tanggal 16 April 2021 jam 10.00 WITA, dapatkan hasil : pasien mengatakan merasa lebih nyaman dan mencium bau wangi jadi lebih rileks, nyeri mulai berkurang setelah di kompres, skala nyeri: 2. Tampak meringis menurun
2. Terdapat perbedaan tingkat nyeri yang di rasakan oleh pasien dari skala nyeri 5, setelah di berikan intervensi hari pertama menjadi skala 4 dan hari kedua menjadi skala nyeri 2.
3. Intervensi kompres hangat dengan aromaterapi *peppermint* efektif dalam menurunkan nyeri pada pasien post operasi *section caesarea*
4. Intervensi ini sekaligus dapat mengatasi 2 masalah keperawatan yang ada yaitu nyeri akut dan gangguan mobilitas fisik yang di akibatkan oleh nyeri yang dirasakan pasien serta dapat memperbaiki status hemodinamik pasien. Maka dapat disimpulkan tindakan implementasi yang dilakukan berhasil memperbaiki keadaan pasien dan mengatasi masalah yang pada pasien.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Profesi Keperawatan

Penulisan karya akhir ini bisa dijadikan bahan referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi non farmakologi

### 2. Bagi Pelayanan Rumah Sakit

Penulisan karya akhir ini menjadi masukan bagi bidang keperawatan dan para perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien preeklamsia *post op section caesarea* dengan masalah nyeri dan melihat keefektifan pemberian kompres hangat dengan aroma terapi *peppermint* dalam mengatasi nyeri.

### 3. Bagi Institusi Pendidikan

Penulisan karya akhir ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien eklamspia *post op section caesarea*. Perlu dilakukannya penelitian yang lebih lanjut dengan kasus yang lain.

## Daftar Pustaka

- Agustina, E. N., Meirita, D. N., & Fajria, S. H. (2019). Pengaruh Aroma terapi Peppermint Terhadap Perubahan Tingkat Nyeri pada Pasien Post operasi Sectio Caesarea di RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Wijaya*, 11(2), 17-25. doi:; ISSN : 2301-4113
- Alligood, M., & Tomey, A. (2010). *Nursing Theorist And Their Work. Edisi 7th*. St. Louis, missouri: MOSBY INC.
- Andreinie, R. (2016). Analisis Efektivitas Kompres Hangat terhadap Penurunan Nyeri Peraslinan. *Jurnal Kebidanan*, 1(1).
- Aprina, & Puri, A. (2016). Faktor-faktor Yang Behubungan dengan Persalinan Secti Caesarea di RSUD. *Jurnal Kesehatan*, 90-96.
- Dinkes Sulsel. (2015). *Profil Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Fahrinheit. (2019, Maret 20). *Tujuan, Indikasi, Kontra Indikasi Kompres*. From Fahrinheit: <https://www.fahrinheit.com/2019/03/jenis-tujuan-indikasi-kontra-indikasi-pemberian-kompres.html>
- Ginekologi, D. O. (2018, Juni 28). *Preeklamsia*. From Obgin UGM: <http://obgin-ugm.com/preeklamsia/>
- Hamka, A. A. (1983). *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*. Singapura: Pustaka Nasional PTRE LTD Singapura.
- Heriana, P. (2014). *Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia*. Tangerang Selatan: Bina Aksara Publisher.
- Indireni, S. (2020). *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Preeklamsia*. Samarinda: Repository Poltekkes Kaltim.
- Kemendes RI. (2018, Mei 12). *Klasifikasi Hipertensi*. From Web P2PTM: <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/hipertensi-penyakit-jantung-dan-pembuluh-darah/page/28/klasifikasi-hipertensi#>
- Kemendes RI. (2020). *Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*. Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan RI.
- Ladewig, M., & W, P. (2013). *Buku Saku Asuhan Ibu dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: EGC.

- Mitayani. (2012). *Asuhan Keperawatan Maternitas*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nita, N., & Mustika. (2013). *Asuhan kebidanan patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Novianti, R. (2019). *KTI : Asuhan Keperawatan pada Pasien Post Sectio Sesarea Atas Indikasi Eklamsi + HELLP Sindrome dan Penerapan Mobilisasi Progresif Level I di Intensive Care Unit (ICU) RSUP DR. M. Djamil Padang*. Sumatera Barat: Universitas Andalas.
- Nuraini. (2011). *Preeklamsia*. From Repository UMP: [http://repository.ump.ac.id/846/3/Affifah Nur Ariani BAB II.pdf](http://repository.ump.ac.id/846/3/Affifah%20Nur%20Ariani%20BAB%20II.pdf)
- Nurarif, & Kusuma. (2015). *Aplikasi Asuhan Keperawat Berdasarkan Diagnose Medic Dan NANDA NIC NOC*. Yogyakarta: Mediaction.
- Nurhayati, N. A., Andriani, S., & Malisa, N. (2015). Relaksasi Autogenik terhadap Penurunan Skala Nyeri pada Ibu Post Operasi Sectio Caesarea. *Jurnal Skolatik Keperawatan*, 1(2), 52-61.
- Padila, P. (2015). *Asuhan Keperawatan Maternitas 1*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Pane, M. D. (2020). *Eklamsia*. From Alodokter: <https://www.alodokter.com/eklamsia>
- POGI. (2016). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Diagnosis dan Tata laksana Pre-eklamsia*. Jakarta: Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Himpunan Kedokteran Feto Maternal .
- Potter, A. G., & Perry, A. G. (2010). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik Edisi 4 Volume 2*. Jakarta: EGC.
- Prawihardjo, S. (2013). *Ilmu kebidanan*. Jakarta: PT BIna Pustaka.
- Putri, D. (2015). Pengaruh Kompres Panas terhadap Penurunan Skala Nyeri pada Ibu Primipara Post Sectio Caesarea. *Jurnal Kesehatan Stikes Prima Nusantara Bukittinggi*, 6(2), 25-30.
- RI, K. (2018). *Klasifikasi Hipertensi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Sari, Y. P., & Rina, R. (2015). Pengaruh Kompres Hangat Aromaterapi Lavender terhadap Penurunan Skala Nyeri Pasien Rematik (Osteoarthritis) pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Tahun 2014. *Jurnal Kesehatan STIKes Prima Nusantara Bukittinggi*, 6(1), 102-110.

- SDKI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Jakarta Selatan: Tim Pokja SDKI DPP PPNI.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran. Volume 6*. Jakarta: Lentera Hati.
- SIKI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Jakarta Selatan: Tim Pokja DPP PPNI.
- SLKI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*. Jakarta Selatan: Tim Pokja DPP PPNI.
- Smeltzer, S., & Bare, B. (2013). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarth, edisi 8*. Jakarta: EGC.
- Susilarini, S., Winarsih, S., & Idhayanti, R. (2017). Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lavender terhadap Pengendalian Nyeri Peersalinan Kala I pada Ibu bersalin. *Jurnal Kebidanan*, 6(2), 47-54.
- Tarwoto, & wartonah. (2010). *Kebuuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan Edisi 4*. Jakarta: Salemba Medika.
- Wahyu, H., Lina, & Fitri, L. (2019). Terapi Kompres Hangat dengan Aroma Jasmine Essential Oil Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Pasien Post Sectio Caesarea. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 1(2), 406-416. doi:<https://doi.org/10.31539/joting.v1i2.860>
- Wahyuningsih, E., & Khayati1, N. (2021). Terapi Murottal Menurunkan Tingkat Nyeri Pasien Post Sectio Caesaria. *Ners Muda*, 2(1), 1-8.
- WHO. (2019). *World Health Statistic 2019*. World Health Organization.
- WHO. (2020). *World Health Statistics 2020*. World Health Organization. Retrieved Juli 13, 2021 from <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332070/9789240005105-eng.pdf>
- Wiknjosatno, H. (2011). *Ilmu Bedah Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina.
- Yuwanita, C. (2019, Maret 03). fektifitas Teknik Relaksasi Pernapasan Dan Teknik Foot and Hand Massage Pada Pasien Pasca Persalinan Sectio Caesarea(Sc) Di RSUDLangsa, Aceh. *Indonesian Journal for Health Sciences*, 3(1), 32-36.

## LAMPIRAN TUGAS AKHIR

### Lampiran 1: Jurnal Rujukan Utama Artikel 1

Journal of Telenursing  
(JOTING) Volume 1,  
Nomor 2, Desember 2019  
e-ISSN: 2684-8988  
p-ISSN: 2684-8996  
DOI: <https://doi.org/10.31539/joting.v1i2.860>



### TERAPI KOMPRES HANGAT DENGAN AROMA *JASMINE ESSENTIAL OIL* TERHADAP PENURUNAN INTENSITAS NYERI PADA PASIEN POST *SECTIO CAESAREA*

Haifa Wahyu<sup>1</sup>, Liza Fitri Lina<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah  
Bengkulu<sup>1,2</sup>  
[haifa\\_wahyu@yahoo.co.id](mailto:haifa_wahyu@yahoo.co.id)<sup>1</sup>

#### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi kompres hangat dengan aroma *jasmine essential oil* terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post *SC* di RS. Bhayangkara TK III Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan metode penelitian *pre eksperimen*, menggunakan rancangan *one group pre test - post test design*. Hasil analisis univariat diperoleh intensitas nyeri pasien post *SC* sebelum dilakukan kompres hangat dengan aroma *jasmine essential oil* yaitu 15 orang (100%) responden mengalami nyeri sedang dengan rentang skala 4-6. Sedangkan intensitas nyeri pasien post *SC* sesudah dilakukan kompres hangat dengan *jasmine essential oil* yaitu 12 Orang (80,0%) responden mengalami nyeri ringan dengan rentang skala 1-3, dan 3 Orang (20,0%) responden dengan intensitas nyeri sedang dengan rentang skala 4-6. Simpulan, menunjukkan ada pengaruh terapi kompres hangat dengan *jasmine essential oil* terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post *SC* di RS. Bhayangkara Kota Bengkulu.

Kata Kunci : Intensitas Nyeri, *Jasmine Essential Oil*, *Sectio Caesaria*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of warm compress therapy with the aroma of jasmine essential oil on the decrease in pain intensity in post SC patients in the hospital. Bhayangkara Kindergarten III Bengkulu City. This type of research is quantitative research, with pre-experimental research methods, using the design of one group pre-test - post test design. Univariate analysis results obtained pain intensity of post SC patients before warm compresses performed with the aroma of jasmine essential oil are 15 people (100%) of respondents experienced moderate pain with a range of 4-6 scale. While the intensity of post SC patients' pain after warm compresses with jasmine essential oil were 12 people (80.0%) of respondents experienced mild pain with a scale range of 1-3, and 3 people (20.0%) of respondents with moderate pain intensity with a range scale 4-6. In conclusion, there is an effect of warm compress therapy with jasmine essential oil on the decrease in pain intensity in post SC patients in the hospital. Bhayangkara Bengkulu City.*

*Keywords: Pain Intensity, Jasmine Essential Oil, Sectio Caesaria*

### **PENDAHULUAN**

Tindakan *Sectio caesarea* (SC) merupakan pilihan utama bagi tenaga medis untuk menyelamatkan ibu dan janin saat menghadapi persalinan yang disertai penyulit. Ada beberapa indikasi dilakukan tindakan SC di antaranya: gawat janin, diproporsi sepelopelvik, persalinan tidak maju, plasenta previa, prolapsus tali pusat, letak lintang, panggul sempit dan preeklamsia (Nurhayati et al., 2015, Padila, 2015). Masalah yang muncul pada tindakan setelah SC akibat insisi oleh robekan jaringan dinding perut dan dinding uterus dapat menyebabkan terjadinya perubahan kontinuitas sehingga ibu merasa nyeri karena adanya pembedahan. Pasien post SC akan mengeluh nyeri pada daerah insisi yang disebabkan oleh robeknya jaringan pada dinding perut dan dinding uterus. Nyeri punggung atau nyeri pada bagian tengkuk juga merupakan keluhan yang biasa dirasakan oleh ibu post SC, hal itu dikarenakan efek dari penggunaan anastesi epidural saat operasi. Rasa nyeri yang dirasakan ibu post SC akan menimbulkan berbagai masalah, diantaranya adalah masalah mobilisasi dini dan laktasi. Rasa nyeri tersebut akan menyebabkan pasien menunda melakukan mobilisasi dini dan pemberian ASI sejak awal pada bayinya, karena rasa tidak nyaman atau peningkatan intensitas nyeri setelah operasi (Putri, 2015).

Nyeri yang dialami pasien post operasi bersifat akut dan harus segera ditangani, Strategi penatalaksanaan nyeri mencakup baik pendekatan farmakologis dan non farmakologis. Semua intervensi akan sangat berhasil bila dilakukan sebelum nyeri menjadi lebih parah dan keberhasilan sering dicapai jika beberapa intervensi diterapkan secara simultan (Nurhayati et al., 2015). Rasa nyeri yang dirasakan ibu post SC akan menimbulkan berbagai masalah, diantaranya adalah masalah mobilisasi dini dan laktasi. Rasa nyeri tersebut akan

menyebabkan pasien menunda melakukan mobilisasi dini dan pemberian ASI sejak awal pada bayinya, karena rasa tidak nyaman atau peningkatan intensitas nyeri setelah operasi (Putri, 2015).

Persalinan SC memberikan dampak positif dan juga negatif pada ibu. Dampak positif tindakan SC dapat membantu persalinan ibu, apabila ibu tidak dapat melakukan persalinan secara pervaginam. Tetapi tindakan operasi SC mempunyai efek negatif pada ibu baik secara fisik maupun psikologis. Secara psikologis tindakan SC berdampak terhadap rasa takut dan cemas terhadap nyeri yang dirasakan setelah analgetik hilang. Selain itu, juga memberikan dampak negatif terhadap konsep diri ibu. Karena Ibu kehilangan pengalaman melahirkan secara normal serta kehilangan harga diri yang terkait dengan perubahan citra tubuh akibat tindakan operasi (Adhi et al., 2016). Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan karena nyeri, yaitu mobilisasi fisik menjadi terbatas, terganggunya *bonding attachment*, terbatasnya *activity daily living* (ADL), Inisiasi Menyusu Dini (IMD) tidak terpenuhi dengan baik, berkurangnya nutrisi bayi karena ibu masih nyeri akibat SC, menurunnya kualitas tidur, menjadi stres dan cemas atau ansietas, dan takut apabila dilakukan pembedahan kembali. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan tentang dampak negatif dari nyeri.

Manajemen nyeri nonfarmakologi merupakan tindakan menurunkan respon nyeri tanpa menggunakan agen farmakologi. Dalam melakukan intervensi keperawatan/ kebidanan, manajemen nonfarmakologi merupakan tindakan dalam mengatasi respon nyeri klien (Andarmoyo, 2013). Penatalaksanaan nyeri secara nonfarmakologis terdiri dari penanganan nyeri berdasarkan stimulasi fisik dan perilaku kognitif, Penanganan fisik meliputi stimulasi kulit, stimulasi elektrik saraf kulit transkutan (TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), akupunktur, dan pemberian plasebo. Intervensi perilaku kognitif meliputi tindakan distraksi, teknik relaksasi, imajinasi terbimbing, umpan balik biologis, hipnosis, dan sentuhan terapeutik, yang termasuk teknik stimulasi kulit meliputi masase, kompres panas dan dingin, akupunktur dan stimulasi kontralateral, Kompres panas merupakan stimulasi kulit yang dapat memberikan efek penurunan nyeri yang efektif. Tindakan ini mengalihkan perhatian klien sehingga klien berfokus pada stimulus taktil dan mengabaikan sensasi nyeri, yang pada akhirnya dapat menurunkan persepsi nyeri (Putri, 2015).

Kompres merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kondisi fisik dengan cara memanipulasi suhu tubuh atau dengan memblokir efek rasa sakit (Sari & Rina 2015). Kompres hangat selain menurunkan sensasi nyeri juga dapat meningkatkan proses penyembuhan jaringan yang mengalami kerusakan. Penggunaan panas selain memberi efek mengatasi atau menghilangkan sensasi nyeri, teknik ini juga memberikan reaksi fisiologis antara lain meningkatkan respons inflamasi, meningkatkan aliran darah dalam jaringan dan meningkatkan pembentukan edema (Putri, 2015).

Kompres hangat selain menurunkan sensasi nyeri juga dapat meningkatkan proses penyembuhan jaringan yang mengalami kerusakan. Penggunaan panas selain memberi efek mengatasi atau menghilangkan sensasi nyeri, teknik ini juga memberikan reaksi fisiologis antara lain meningkatkan respons inflamasi, meningkatkan aliran darah dalam jaringan dan meningkatkan pembentukan

edema (Putri, 2015).

Kompres hangat pada abdomen bawah mengurangi nyeri karena panas meningkatkan sirkulasi darah sehingga menurunkan anoksia jaringan yang disebabkan kontraksi dan ketegangan. Namun, untuk memperoleh cukup panas demi keefektifan, maka perlu menggunakan kompres panas khusus atau handuk mandi. Apabila handuk tersebut basah, bahkan setelah diperas, seringkali handuk ini terlalu berat untuk ditoleransi wanita. Namun kompres panas merupakan tindakan yang tepat untuk meredakan nyeri pada beberapa wanita (Andreinie, 2016).

Kompres hangat selain menurunkan sensasi nyeri juga dapat meningkatkan proses penyembuhan jaringan yang mengalami kerusakan, penggunaan panas mempunyai keuntungan meningkatkan aliran darah ke suatu area dan kemungkinan dapat turut menurunkan nyeri dengan mempercepat penyembuhan. Penggunaan panas, selain memberi efek mengatasi atau menghilangkan sensasi nyeri, teknik ini juga memberikan reaksi fisiologis antara lain, meningkatkan respons inflamasi, meningkatkan aliran darah dalam jaringan dan meningkatkan pembentukan edema. Panas yang diaplikasikan pada perut bagian bawah, punggung, lipat paha, atau perineum dapat sangat menenangkan. Pemanas listrik, botol berisi air hangat, dan kompres panas adalah sumber panas yang baik (Putri, 2015).

Kompres hangat pada abdomen bawah mengurangi nyeri karena panas meningkatkan sirkulasi darah sehingga menurunkan anoksia jaringan yang disebabkan kontraksi dan ketegangan. Namun, untuk memperoleh cukup panas demi keefektifan, maka perlu menggunakan kompres hangat khusus atau handuk mandi. Apabila handuk tersebut basah, bahkan setelah diperas, seringkali handuk ini terlalu berat untuk ditoleransi wanita. Namun kompres panas merupakan tindakan yang tepat untuk meredakan nyeri pada beberapa wanita. Kompres hangat dapat diberikan dengan menggunakan handuk panas atau silika gel yang telah dipanaskan atau botol yang telah diisi air panas atau bantal pemanas. Dapat juga langsung dengan menggunakan shower air panas langsung pada bahu, perut atau punggungnya jika ibu merasa nyaman, kompres hangat yang paling efektif untuk mengurangi nyeri adalah menggunakan handuk yang direndam dalam air kemudian diperas dan dikompreskan ke punggung bawah atau perut ibu (Andreinie, 2016)

Selain terapi dengan kompres hangat penanganan yang sering digunakan untuk menurunkan nyeri post SC berupa penanganan farmakologi dan non farmakologi. Namun penggunaan secara farmakologi sering menimbulkan efek samping dan kadang tidak memiliki kekuatan efek yang diharapkan. Aromaterapi digunakan sebagai salah satu alternatif penanganan nyeri non farmakologi (Widayani, 2016).

Pemberian aromaterapi melalui dikompres hanya sedikit membutuhkan minyak aroma terapi. Kompres hangat dengan aromaterapi dapat digunakan untuk menurunkan nyeri punggung dan nyeri perut. Aroma terapi menurut Susilarini et al., (2017) adalah penggunaan minyak esensial konsentrasi tinggi yang diekstraksi dari tumbuh-tumbuhan dan diberikan melalui pijat, inhalasi, dicampur ke dalam air mandi, untuk kompres, melalui membran mukosa dalam

bentuk pesarium atau supositoria dan terkadang dalam bentuk murni. Aroma terapi adalah terapi yang menggunakan minyak esensial yang dinilai dapat membantu mengurangi bahkan mengatasi gangguan psikologis dan gangguan rasa nyaman seperti cemas, depresi, nyeri, dan sebagainya.

Aroma terapi bekerja sebagai liniments dengan cara dikompreskan, minyak tersebut bekerja dengan memanaskan kulit dan otot kemudian mengurangi nyeri. Otot yang dirangsang dengan kompres panas minyak esensial lavender akan melemaskan sehingga stimulus menuju ujung saraf akan berkurang. Akibatnya, saraf akan sedikit menghantarkan implus nyeri ke saraf pusat, penggunaan kompres hangat aroma terapi dalam ilmu keperawatan lebih dikenal dengan terapi modalitas, terapi komplementer, terapi alternatif, terapi holistik, terapi nonbiomedis, perawatan nonalopati, dan perawatan nontradisional. Konsep ini menekankan pentingnya sistem perawatan yang menerapkan pendekatan kepedulian secara holistik akibat pergeseran budaya terhadap perawatan klien yang akan meningkatkan pelayanan kesehatan. Terapi komplementer dapat digunakan mandiri atau tidak berhubungan terapi biomedis karena diposisikan sebagai upaya promosi kesehatan (Sari & Rina 2015).

Aroma *jasmine essential oil* akan ditangkap oleh indera penciuman dan diteruskan ke susunan saraf pusat, lalu pesan akan diteruskan ke seluruh tubuh melalui sistem sirkulasi darah dan limfatik. Tandanya berupa pelepasan substansi neurokimia yang menimbulkan perasaan senang, rileks, tenang atau terangsang.

Melati merupakan salah satu jenis bunga yang berasal dari Indonesia. Penggunaan melati dalam berbagai kegiatan kebudayaan sudah menjadi ciri khas di negara kita, sehingga dengan terbiasanya masyarakat Indonesia dengan aroma melati, diharapkan dapat memberikan rasa tenang dan rileksasi kepada yang menghirupnya. Melati yang merupakan salah satu jenis bunga dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengurangi nyeri persalinan. Selain tanpa efek samping, aroma melati juga merupakan wewangian yang sering dirasakan dan disukai oleh wanita. Di samping itu aroma melati merupakan terapi nonfarmakologi yang aman dan tidak membahayakan ibu dan janin (Purdue, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompres hangat dengan aroma *Jasmine essential oil* terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post *sectio caesarea* (SC) di RS. Bhayangkara TK III Kota Bengkulu.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, metode penelitian yaitu pre eksperimen, penelitian ini menggunakan rancangan *one group pre test - post test design*, yaitu mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok subjek. Penelitian dilakukan di RS. Bhayangkara TK III Kota Bengkulu.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan juli-agustus 2019. Populasi sasaran dalam penelitian adalah semua pasien post operasi *sectio caesarea*, sedangkan populasi sumber adalah semua pasien post operasi *sectio caesarea* di RS. Bhayangkara TK III Kota Bengkulu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 pasien post operasi *sectio caesarea* yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*. Teknik

pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari RS. Bhayangkara TK III Kota Bengkulu, meliputi jumlah *pasien post operasi sectio caesarea*. Teknik analisa data menggunakan analisis univariat dan uji normalitas data.

Pemberian kompres hangat dengan aroma *jasmine essential oil* di berikan 6 jam setelah pasien diberikan terapi analgesik, kemudian dilakukan pre-test terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan pemberian kompres hangat dengan aroma *jasmine essential oil* yang diaplikasikan pada punggung bawah pasien dilakukan selama 20 menit. Data primer berupa data yang diperoleh dari pengamatan langsung menggunakan observasi dan wawancara dengan perincian sebagai berikut, sebelum perlakuan selama 20 menit responden dinilai, menggunakan skala ukur ordinal dengan Lembar Instrumen menggunakan Skala pendeskripsi verbal (Verbal Descriptor scale, VDS). ordinal hasilnya dicatat pada format (instrument) kemudian responden diberikan kompres hangat dengan aroma *jasmine essential oil*, pelaksanaan penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi *sectio caesarea* di RS. Bhayangkara TK III Bengkulu, menggunakan skala ukur ordinal hasilnya dicatat kembali pada format (instrumen) kemudian data yang diperoleh ini dimasukkan ke dalam format pengumpulan data, tabulasi untuk diolah.

Setelah data lengkap mencapai target, data dimasukkan ke dalam format tabulasi data untuk mempermudah dalam pengolahan data secara statistik. Hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka dilakukan deskripsi data hasil penelitian yang akan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran mengenai gambaran data yang di peroleh. Selanjutnya akan diketahui pengaruh pemberian kompres hangat dengan aroma *Jasmine essential oil* terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi *sectio caesarea* di RS. Bhayangkara Bengkulu.

## HASIL PENELITIAN

### Analisis Univariat

Tabel. 1

Skala Nyeri Pasien Post SC Sebelum Dilakukan  
Kompres Hangat dengan Aroma *Jasmine Essential Oil*

No	Skala Nyeri	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Sedang	15	100
	Total	15	100

Sumber : Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa skala nyeri pasien post SC sebelum dilakukan kompres hangat dengan aroma *jasmine essential oil* di RS. Bhayangkara TK III Kota Bengkulu yaitu 15 (100%) responden mengalami nyeri sedang.

Tabel. 2

Skala Nyeri Pasien Post SC Sesudah Dilakukan  
Kompres Hangat dengan Aroma *Jasmine Essential Oil*

No	Skala Nyeri	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Ringan	12	80
2	Sedang	3	20
	Total	15	100

Sumber : Data primer (2019)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa skala nyeri pasien post *SC* sesudah dilakukan kompres hangat dengan aroma *jasmine essential oil* di RS. Bhayangkara TK III Kota Bengkulu yaitu 12 (80,0%) responden mengalami skala nyeri ringan, dan 3 (20,0%) responden dengan skala nyeri sedang.

#### Analisa Bivariat

Tabel. 3  
Wilcoxon Signed Ranks Test Pengaruh Terapi Kompres Hangat dengan Aroma *Jasmine Essential Oil* terhadap Penurunan Intensitas Nyeri

Variabel	skala nyeri pre - skala nyeri post
Z	-3.464
P Value	0,001

Sumber : Data primer (2019)

Berdasarkan tabel 3 setelah dilakukan uji *wilcoxon* berdasarkan hasil uji statistik didapatkan *P value* = 0,001. Dengan demikian nilai *p* 0,01<0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan kompres hangat dengan aroma *jasmine essential oil*.

### PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Skala nyeri pasien post *SC* sebelum dilakukan kompres hangat dengan aroma *Jasmine essential oil* di RS. Bhayangkara TK III Kota Bengkulu tahun 2019 yaitu 15 (100%) Responden mengalami nyeri sedang. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden mengalami nyeri sedang.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yg dilakukan oleh Lukman (2013) menunjukkan bahwa skala nyeri pasien post-operasi *sectio caesaria* sebelum dilakukan intervensi, frekuensi terbanyak yakni pada skala nyeri 5 (nyeri hebat) dengan frekuensi 29 responden atau presentase 74,36% dan 10 responden lainnya menunjukkan pada skala nyeri 4 (sangat nyeri) dengan presentase 25,64%. Sebelum dilakukan intervensi, skala nyeri yang dirasakan oleh pasien sangat nyeri, menurut peneliti bahwa setiap nyeri yang dirasakan oleh individu masing-masing sangatlah berbeda-beda, sesuai dengan persepsi individu dalam merasakan nyeri yang dialaminya, berdasarkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas nyeri itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skala nyeri pasien post *Sc* sesudah dilakukan kompres hangat dengan aroma *jasmine essential oil* di RS.

Bhayangkara TK III Kota Bengkulu tahun 2019 yaitu 12 (80%) Responden mengalami skala nyeri ringan, dan 3 (20%) responden dengan skala nyeri sedang. Hal ini berarti setelah diberikan kompres hangat dengan aroma *jasmine essential oil* terdapat penurunan skala nyeri pada pasien.

*Jasmine* atau bunga melati memiliki manfaat yang banyak, antara lain mengatasi ketegangan, nyeri, mempengaruhi emosi, mengurangi kecemasan, meningkatkan percaya diri, energi, dan euforia yang semuanya itu diperlukan seorang ibu ketika melalui proses persalinan dan kelahiran bayinya. Maka penggunaan melati pada penelitian ini sangat tepat, karena semua manfaat melati dibutuhkan ibu. Untuk itu perlu ada suatu usaha yang dilakukan oleh orang-orang terdekat ibu, baik oleh tenaga kesehatan, suami, maupun keluarga lainnya. Memberikan terapi yang aman dan menguntungkan adalah cara yang tepat.

Penggunaan melati yang telah dijadikan *essential oil* memudahkan ibu dengan cara menghirup aromanya sehingga ibu tidak repot dan tidak harus dipusingkan dengan peralatan atau tindakan yang membuat dia terganggu dengan proses adaptasi post SC yang sedang dijalannya. Metode aromaterapi ada berbagai macam. *Essensial oil* diserap oleh tubuh melalui inhalasi/ penghirupan, topikal, oral, rektal, atau vagina. Penyerapan melalui aplikasi topikal dan inhalasi merupakan dua metode yang paling umum digunakan. Zat aromatik dalam minyak esensial mudah menguap dan memiliki wangi yang khas. Indera penciuman akan menangkap aroma ini dan meneruskan pesan elektrokimia ke susunan saraf pusat, lalu pesan akan diteruskan ke seluruh tubuh melalui sistem sirkulasi darah dan limfatik. Tandanya berupa pelepasan substansi neurokimia yang menimbulkan perasaan senang, rileks, dan tenang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2015) tentang pengaruh kompres panas terhadap penurunan skala nyeri pada ibu primipara post *Sectio caesarea* dimana hasil penelitian menunjukkan skala nyeri ibu post SC setelah diberikan kompres panas diketahui bahwa dari 34 responden yang diteliti, terdapat 27 orang (79,41%) responden mengalami nyeri sedang dan ada 7 orang (20,59%) responden mengalami nyeri ringan. Dari data yang telah diperoleh diketahui semua responden mengalami penurunan skala nyeri kecuali 6 orang (17,6%) responden pada nyeri sedang.

Kompres hangat selain menurunkan sensasi nyeri juga dapat meningkatkan proses penyembuhan jaringan yang mengalami kerusakan. Penggunaan panas selain memberi efek mengatasi atau menghilangkan sensasi nyeri, teknik ini juga memberikan reaksi fisiologis antara lain meningkatkan respons inflamasi, meningkatkan aliran darah dalam jaringan dan meningkatkan pembentukan edema.

Menurut Nurhayati et al., (2015) keberhasilan penatalaksanaan terhadap nyeri *post* operasi dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh perawat (tenaga kesehatan) didapatkan kesimpulan bahwa dengan adanya kesadaran dan perhatian terhadap nyeri yang dirasakan oleh pasien *post* operasi serta dilakukannya intervensi untuk mengurangi keluhan nyeri akan

meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan walaupun nyeri yang dialaminya dikategorikan nyeri sedang sampai berat dan harus beraktivitas saat mengalami sensasi nyeri tersebut.

Berdasarkan hasil uji *wilcoxon* didapatkan nilai  $p = 0,001$ . Dengan demikian nilai  $p$   $0,01 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan kompres hangat dengan aroma *jasmine essential oil*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktavia & Faridah (2016) tentang efek aroma ekstrak melati terhadap pengurangan nyeri persalinan kala 1 fase aktif pada parturient. Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji *wilcoxon* didapatkan nilai  $p$   $0,000 < 0,05$  sehingga dapat diasumsikan bahwa pemberian aromaterapi ekstrak melati berpengaruh terhadap penurunan intensitas nyeri persalinan kala 1 fase aktif. Pada penelitian ini, penghirupan aroma ekstrak melati pada ibu parturient kala I fase aktif untuk mengurangi nyeri yang dirasakannya, cara kerjanya seperti teori *gate control*. Masuknya sensasi somatik normal ketika ada stimulasi pada serabut yang lebih besar atau hanya stimulasi pada serabut saraf besar maka saraf inhibitor dan saraf proyektor akan terstimulasi, namun saraf inhibitor mencegah saraf proyektor menyalurkan sinyal menuju otak (*gate* menutup). Menghirup aroma ekstrak melati mampu mengaktifkan saraf inhibitor sehingga saraf proyektor tidak menyalurkan sinyal nyeri menuju otak. Pengertiannya, aroma terapi mampu mengurangi konsentrasi ibu parturient terhadap nyeri yang dirasakannya.

Penurunan nyeri dengan aromaterapi mengacu pada konsep *gate control* yang terletak pada fisiologi mekanisme penghantaran impuls nyeri yang terjadi saat sistem pertahanan dibuka, dan sebaliknya penghantaran impuls nyeri dapat dihambat saat sistem pertahanan ditutup.

Aromaterapi merupakan salah satu upaya untuk menutup sistem pertahanan tersebut. Selain itu, aromaterapi memengaruhi kelancaran sirkulasi darah, sehingga suplai nutrisi ke jaringan luka tercukupi dan proses penyembuhan akan lebih cepat. Saat aromaterapi dihirup, zat aktif yang terdapat di dalamnya akan merangsang hipotalamus (kelenjar hipofise) untuk mengeluarkan hormon endorpin. Endorpin diketahui sebagai zat yang menimbulkan rasa tenang, relaks, dan bahagia.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sari et al., (2015) tentang pengaruh aromaterapi *jasmine* terhadap penurunan skala nyeri pada remaja putri yang mengalami dismenorae, dimana hasil penelitian menunjukkan  $p$  value  $0,000 < 0,05$ , maka terdapat pengaruh aroma terapi *jasmine* terhadap penurunan skala nyeri menstruasi pada remaja putri di SMAN 2 Pontianak tahun 2015. Implikasinya bahwa aroma terapi *jasmine* dapat menjadi salah satu terapi non-farmakologi untuk menurunkan nyeri menstruasi.

Kompres panas pada abdomen bawah mengurangi nyeri karena panas meningkatkan sirkulasi darah sehingga menurunkan anoksia jaringan yang

disebabkan kontraksi dan ketegangan. Efektivitas kompres hangat terhadap penurunan nyeri persalinan ditunjang oleh beberapa faktor, diantaranya adalah media yang digunakan, yaitu dengan menggunakan handuk sebagai media pengompresan; suhu air, dimana suhu yang paling efektif untuk menurunkan nyeri dan aman adalah pada suhu kehangatan 38-40°C dan terakhir adalah lamanya pengompresan, waktu pengompresan yang efektif adalah 20 menit.

Aroma melati (*jasmine*) yang dihirupakan disampaikan menuju nukleus *olfactorius anterior* melalui *nervus olfaktorius* dan *bulbus olfaktorius*, di mana senyawa tersebut akan sampai ke *hipotalamus* yang berhubungan dengan sistem saraf otonom. Oleh karena itu, stimulasi olfaktorius bisa memengaruhi aktivitas saraf otonom melalui hipotalamus. Selanjutnya hipotalamus mempunyai hubungan dengan amigdala terkait emosi (perasaan). Inhalasi dari partikel aroma melati (*jasmine*) dapat menurunkan aktivitas vasokonstriktor simpatis pada otot dan menurunkan tekanan darah. Selain itu,

kandungan senyawa pada aroma melati (*jasmine*) dapat meningkatkan aktivitas saraf parasimpatis dan menurunkan *heart rate* seseorang, dan adanya kandungan sedatif (linalool) dapat meningkatkan relaksasi seseorang. Adanya kandungan *linalool* pada aroma melati (*jasmine*) akan merangsang hipotalamus untuk menghasilkan zat-zat sedatif dalam tubuh seperti *endorfin*, *enkefalin*, *serotonin* sehingga dapat memunculkan rasa gembira, senang, dan rileks (Kusnaldi et al., 2011).

### SIMPULAN

Hasil analisis univariat diperoleh intensitas nyeri pasien post SC sebelum dilakukan kompres hangat dengan aroma *jasmine essential oil* yaitu sebagian besar responden mengalami nyeri sedang dengan rentang skala 4-6. Sedangkan intensitas nyeri pasien post SC sesudah dilakukan kompres hangat dengan aroma *jasmine essential oil* yaitu sebagian besar responden mengalami nyeri ringan dengan rentang skala 1-3. Hasil analisis bivariat menunjukkan ada pengaruh terapi kompres hangat dengan aromajasmine *essential oil* terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post SC di RS. Bhayangkara TK III Kota Bengkulu.

### SARAN

Disarankan kepada RS. Bhayangkara TK III Kota Bengkulu untuk menerapkan terapi kompres hangat dengan *jasmine essential oil* dalam penatalaksanaan nyeri pada pasien post SC.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, K. T., Utami, N. W. A., & Adnyana, I. M. S. (2016). Pemberdayaan Kader Desa dan Tokoh Masyarakat dalam Implementasi Strategi Deteksi Dini Kasus Malnutrisi Anak Balita di Desa Bukit Karangasem. *Jurnal Udayana Mengabdi 1*
- Andarmoyo, S. (2013). *Konsep dan Proses Keperawatan Nyeri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Andreinie, R. (2016). Analisis Efektivitas Kompres Hangat terhadap

### Penurunan Nyeri

- Persalinan. *Jurnal kebidanan*, 1(1)
- Kusnaldi, H., Haryanto, J., & Makhfudli, M. (2011). Aroma Care Melati Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Tidur pada Lansia. *Jurnal Ners*, 6(2), 192–200
- Lukman, T. V. (2013). *Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam terhadap Intensitas Nyeri pada Pasien Post Operasi Sectio Caesarea di RSUD. Prof. Dr. Hi. Aloe Saboe Kota Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo
- Nurhayati, N. A., Andriani, S., & Malisa, N. (2015). Relaksasi Autogenik terhadap Penurunan Skala Nyeri pada Ibu Post Operasi Sectio Caesarea. *Jurnal Skolastik Keperawatan*, 1(2), 52-61
- Oktavia, N. S., & Faridah, B. D. (2016). Efek Aroma Ekstrak Melati terhadap Pengurangan Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif pada Parturient. *Jurnal IPTEKS Terapan. Research of Applied Science and Education*, VII(4), 323- 330
- Padila, P. (2015). *Asuhan Keperawatan Maternitas 1*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Purdue, P. (2010). *Pain Assessment Scale*. Stamford [online article]: <http://www.partnersagainstpain.com>
- Putri, D. (2015). Pengaruh Kompres Panas terhadap Penurunan Skala Nyeri pada Ibu Primipara Post Sectio Caesarea. *Jurnal Kesehatan Stikes Prima Nusantara Bukittinggi*, 6(2), 25-30
- Sari, D. P., Hendra., & Dewi, A. P. (2015). *Pengaruh Aromaterapi Jasmine terhadap Penurunan Skala Nyeri pada Remaja Putri yang Mengalami Dismenore tahun 2015*. Universitas Tanjungpura Pontianak
- Sari, Y. P., & Rina, R. (2015). Pengaruh Kompres Hangat Aromaterapi Lavender terhadap Penurunan Skala Nyeri Pasien Rematik (Osteoarthritis) pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Tahun 2014. *Jurnal Kesehatan STIKes Prima Nusantara Bukittinggi*, 6(1), 102-110
- Susilarini, S., Winarsih, S., & Idhayanti, R.I. (2017). Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lavender terhadap Pengendalian Nyeri Peersalinan Kala I pada Ibu bersalin. *Jurnal Kebidanan*, 6(12), 47-54
- Widayani, W. (2016). Aromaterapi Lavender dapat Menurunkan Intensitas Nyeri Perineum pada Ibu Post Partum. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 4(3), 123- 128

## Artikel 2

*Jurnal Ilmiah Wijaya Volume 11 Nomor 2, Juli-Desember 2019*  
*Hal 17 - 25; website : www.jurnalwijaya.com; ISSN : 2301-4113*

### **PENGARUH AROMATERAPI *PEPPERMINT* TERHADAP PERUBAHAN TINGKAT NYERI PADA PASIEN *POST OPERASI SECTIO CAESAREA* DI RSUD LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR**

**Elis Nurhayati Agustina, Desi Nurseha Meirita, Siti Hanifatun Fajria**

STIKes Wijaya Husada Bogor  
 Email : wijayahusada@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Studi pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2017 di RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor dari 9 responden yang mengalami nyeri *postsectio caesarea* didapatkan 5 responden dengan kriteria nyeri berat terkontrol dan 4 responden dengan nyeri sedang. Ke 9 responden tersebut setelah diberikan aromaterapi *peppermint* didapatkan hasil dari 5 responden dengan kriteria nyeri berat terkontrol, mengalami perubahan tingkat nyeri menjadi nyeri sedang. Sedangkan 4 responden lainnya dengan kriteria nyeri sedang mengalami perubahan 3 diantaranya nyeri ringan dan 1 responden lainnya tetap. Dari data tersebut maka kemungkinan adanya perbedaan tingkat nyeri sebelum pemberian aromaterapi *peppermint* dan sesudah pemberian aromaterapi *peppermint*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh aroma terapi *peppermint* terhadap perubahan tingkat nyeri pada pasien *postoperasi sectio caesarea* di RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Jenis penelitian Quasi eksperimen dengan metode non randomised pretest and posttest control group design. Lokasi penelitian di RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor tanggal 13 April 2018. Jumlah sampel sebanyak 32 responden pasien post operasi sectio caesarea dengan pengambilan sampel purposive sampling. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tungku aromaterapi elektrik dan lembar observasi. Teknik analisa data adalah analisa bivariat dengan program SPSS.

Hasil penelitian ini melaporkan perbedaan tingkat nyeri sebelum dan sesudah diberi perlakuan aromaterapi *peppermint* pada kelompok intervensi pada pasien *post operasi sectio caesarea* dengan nilai  $P\text{ value} = 0,000 (< 0,05)$  dengan penurunan rata-rata 4,00. Tidak adanya perbedaan tingkat nyeri pada 6 jam dan 12 jam post anastesi pada kelompok kontrol dengan nilai  $P\text{ value} = 0,317 (>0,05)$ .

Kesimpulannya ialah Adanya pengaruh antara aromaterapi *peppermint* terhadap perubahan tingkat nyeri pada pasien *post operasi sectio caesarea* nilai  $P\text{ value} = 0,000 (<0,05)$ .

**Kata kunci** : Aromaterapi *Peppermint*, tingkat nyeri

#### **THE EFFECT OF PEPPERMINT AROMATHERAPY ON REDUCING PAIN IN POST OPERATING SECTIO CAESAREA PATIENTS AT LEUWILIANG HOSPITAL, BOGOR**

#### **ABSTRACT**

*A preliminary study conducted on December 9, 2017 at the Leuwiliang Hospital in Bogor District from 9 respondents who experienced pain in the sectio Caesarea post obtained 5 respondents with severe controlled pain criteria and 4 respondents with moderate pain. The 9 respondents after being given peppermint aromatherapy showed that 5 respondents with severe pain criteria controlled, experienced changes in the level of pain to moderate pain. While the other 4 respondents with pain criteria were experiencing changes 3 including mild pain and 1 other respondent remained. From these data, it is possible that there is a difference in the level of pain before giving peppermint aromatherapy and after peppermint aromatherapy administration. This study aims to determine the effect of peppermint aromatherapy on changes in pain levels in caesarean section surgical patients in the Bogor District. The Type of this research is Quasi experiment with non-randomized pretest and posttest control group design method. The location of*

*Jurnal Ilmiah Wijaya Volume 11 Nomor 2, Juli-Desember 2019*  
*Hal 17 - 25; website : www.jurnalwijaya.com; ISSN : 2301-4113*

*the study was at the Leuwiliang Hospital Bogor on April 13, 2018. The number of samples was 32 respondents, patients with postoperative caesarean section with purposive sampling. The tools used in data collection are electric aromatherapy furnaces and observation sheets. The data analysis technique is bivariate analysis with the SPSS program. The results of this study reported differences in the level of pain before and after treatment of peppermint aromatherapy in the intervention group in patients with postoperative caesarean section with a P value = 0,000 (<0.05) with an average decrease of 4.00. There was no difference in pain level at 6 hours and 12 hours post anesthesia in the control group with a P value = 0.317 (> 0.05).*

*The conclusion is that the influence of peppermint aromatherapy on changes in pain level in patients with sectio caesarean surgery P value = 0,000 (<0.05).*

**Keywords** : Aromaterapi Peppermint, tingkat nyeri

DOI :

Received : ; Accepted : ; Published :

## PENDAHULUAN

*Sectio caesaera* adalah suatu pembedahan guna melahirkan anak lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus. *World Health Organization* (WHO) menetapkan standar rata-rata *sectio caesarea* di sebuah Negara adalah sekitar 5-15 % per 1000 kelahiran di dunia. Rumah Sakit pemerintah kira – kira 11 % sementara Rumah Sakit swasta bisa lebih dari 30%. Menurut WHO peningkatan persalinan dengan *section caesareadi* seluruh Negara selama tahun 2007 – 2008 yaitu 110.000 per kelahiran di seluruh Asia

Komplikasi ibu pada *sectio caesarea* mencakup komplikasi periode masa nifas yang normal dan komplikasi setiap prosedur pembedahan utama, antara lain perdarahan, sepsis dan cedera di sekeliling struktur. Pada pemulihan akibat pembedahan *sectio caesarea* pasien akan mengalami nyeri di sekitar sayatan bedah. Ketika efek anestesi hilang, luka akan terasa nyeri.<sup>[2]</sup>

Nyeri adalah sensasi yang tidak menyenangkan dan sangat individual yang tidak dapat dibagi dengan orang lain. Nyeri dapat memenuhi seluruh pikiran seseorang, mengatur aktivitasnya, dan mengubah

kehidupan orang tersebut. Akan tetapi nyeri adalah konsep yang sulit dikomunikasikan oleh klien, perawat tidak dapat merasakan atau melihat nyeri klien.<sup>[3]</sup>

Proses operasi menggunakan anestesi agar pasien tidak nyeri saat dibedah. Namun setelah operasi selesai dan pasien mulai sadar, akan merasakan nyeri di daerah sayatan yang membuat pasien sangat terganggu. Nyeri merupakan suatu gejala kompleks dengan aspek psikologis (nonsisepsi: deteksi syaraf terhadap nyeri), dan psikologis (ansietas, depresi) dan merupakan konsekuensi pembedahan yang tidak dapat dihindari.<sup>[4]</sup>

Penanganan yang sering digunakan untuk menurunkan nyeri *postsectio caesarea* berupa penanganan farmakologi. Pengendalian nyeri secara farmakologi efektif untuk nyeri sedang dan berat. Namun demikian pemberian farmakologi tidak bertujuan untuk meningkatkan kemampuan klien sendiri untuk mengontrol nyerinya. Sehingga dibutuhkan kombinasi farmakologi untuk mengontrol nyeri dengan non farmakologi agar sensasi nyeri

*Jurnal Ilmu Kesehatan Wijaya Volume 11 Nomor 2, Juli-Desember 2019*  
*Hal 17 - 25; website : www.lppmwijayahusada.com; ISSN : 2301-4113*

dapat berkurang serta masa pemulihan tidak memanjang.<sup>[5]</sup>

Teknik non farmakologi yang dapat diterapkan dalam mengatasi nyeri yaitu teknik pernafasan, *audonalgesia*, akupuntur, *transcutaneous electric nerve stimulations* (TENS), kompres dengan suhu dingin panas, sentuhan pijatan, hipnotis dan aromaterapi.<sup>[6]</sup>

Aromaterapi berarti penggunaan minyak wangi esensial untuk tujuan terapeutik atau medis. Hal itu efektif untuk relaksasi, mengurangi rasa sakit dan stres, meningkatkan mekanisme koping dan meningkatkan kebugaran.<sup>[7]</sup>

Mekanisme kerja perawatan aromaterapi dalam tubuh manusia berlangsung melalui dua sistem fisiologis, yaitu sistem sirkulasi tubuh dan sistem penciuman. Wewangian dapat mempengaruhi kondisi psikis, daya ingat dan emosi seseorang. Organ penciuman merupakan sarana komunikasi alamiah 5 pada manusia. Hanya sejumlah 8 molekul yang dapat memacu impuls elektrik pada ujung saraf. Sedangkan secara kasar terdapat 40 ujung saraf yang harus dirangsang sebelum seseorang sadar bau apa yang dicium. Bau merupakan suatu molekul yang mudah menguap ke udara dan akan masuk ke rongga hidung melalui penghirupan sehingga akan direkam oleh otak sebagai proses penciuman. Ialah salah satu kinerja aromaterapi yang dapat mengurangi nyeri adalah aromaterapi *peppermint*.<sup>[8]</sup>

*Peppermint* berfungsi sebagai anti konvulsi. Salah satu mekanisme anti konvulsi adalah spasmolitik atau anti kejang kontraksi otot. *Peppermint* mempunyai aktifitas spasmolitik secara *in vitro* dan juga dapat menurunkan regangan otot skeletal.

Mekanisme aksi pengaruh spasmolitik dari minyak lavender telah diterangkan oleh hasil penelitian Lis Bachim, dkk. Menurutnya, efek lavender sebagai spasmolitik menjadi perantara lepasnya enzim yang mengurangi kontraksi otot. Mode aksi dari linalool salah satu komponen yang dominan dalam lavender memberikan rasa refleksi. Mode aksi lavender menurutnya sama dengan deranium dan *peppermint oil*.<sup>[9]</sup>

Tindakan keperawatan yang dilakukan di RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor untuk mengurangi nyeri *postsectio caesarea* selama ini masih menggunakan tindakan keperawatan penatalaksanaan nyeri farmakologi yaitu pemberian obat pengurang rasa nyeri *ketorolak*. Penggunaan obat pengurang rasa nyeri dan sebagai pendukung terkadang perawat memberikan penatalaksanaan non farmakologi seperti teknik relaksasi nafas dalam. Penggunaan obat pengurang rasa nyeri dapat menimbulkan efek samping seperti mengantuk, mual dan muntah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2017 di RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor dari 9 responden yang mengalami nyeri *postsectio caesarea* didapatkan 5 responden dengan kriteria nyeri berat terkontrol dan 4 responden dengan nyeri sedang. Ke 9 responden tersebut setelah diberikan aromaterapi *peppermint* didapatkan hasil dari 5 responden dengan kriteria nyeri berat terkontrol, mengalami perubahan tingkat nyeri menjadi nyeri sedang. Sedangkan 4 responden lainnya dengan kriteria nyeri sedang mengalami

*Jurnal Ilmu Kesehatan Wijaya Volume 11 Nomor 2, Juli-Desember 2019*  
*Hal 17 - 25; website : www.lppmwijayahusada.com; ISSN : 2301-4113*

perubahan 3 diantaranya nyeri ringan dan 1 responden lainnya tetap. Dari data tersebut maka kemungkinan adanya perbedaan tingkat nyeri sebelum pemberian aromaterapi *peppermint* dan sesudah pemberian aromaterapi *peppermint*.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh aromaterapi *peppermint* terhadap perubahan tingkat nyeri pada pasien *post* operasi *sectio caesarea* di RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor”

#### METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan *Quasi Eksperimen*, *Quasi Eksperimen* adalah eksperimen yang dilakukan dengan tidak mempunyai batasan-batasan yang ketat terhadap randomisasi, pada saat yang sama dapat mengontrol ancaman-ancaman validitas. Penelitian ini menggunakan desain eksperiment *Non randomized pretest and posttest control group design* yaitu desain eksperimen yang dilakukan dengan pretest

N Tingkat o. Nyeri	N	Mean ± Sd	Beda	95% CI	P value
1. Pre test	16	8,25 ± 0,577	4	7,94 – 8,56	
2. Post test	16	4,25 ± 0,577		3,94 – 4,56	0,000

sebelum dilakukan perlakuan dan posttest setelah diberikan perlakuan, dan untuk mengetahui pengaruh aromaterapi *peppermint* terhadap perubahan tingkat nyeri pada pasien *post* operasi *sectio caesarea* yang diberikan perlakuan aromaterapi *peppermint*. Rancangan penelitian initerdapat kelompok pembanding

(kontrol), dan tidak dilakukan perlakuan aromaterapi *peppermint*.

Tempat penelitian ini dilaksanakan di ruang seruni RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor. Dengan data primer pengukuran skala nyeri pada responden kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Penelitian ini dilaksanakan pada 13 April sampai 9 Mei 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh aromaterapi *peppermint* terhadap perubahan tingkat nyeri pada pasien *post* operasi *sectio caesarea* di Ruang Seruni RS PMI Bogor. Variabel yang diteliti antara lain perubahan tingkat nyeri (variabel dependen) dan perlakuan aromaterapi *peppermint* (variabel independen). Populasi dalam penelitian ini adalah pasien *post* operasi *sectio caesarea* di RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

#### HASIL PENELITIAN

Analisa tingkat nyeri sebelum dan sesudah diberi perlakuan aromaterapi *peppermint* pada kelompok intervensi 6 jam dan 12 jam *post* operasi *sectio caesarea*.

Tabel 1 tingkat nyeri *pre test* dan *post test* diberi perlakuan aromaterapi *peppermint* pada kelompok intervensi setelah 6 jam dan 12 jam *post* operasi *sectio caesarea*.

Sumber : *output* olahan spss 16

Berdasarkan tabel 1 Tingkat nyeri *pre test* dan *post test* aromaterapi *peppermint* pada kelompok intervensi diatas, didapatkan bahwa nilai *Pvalue* perbedaan tingkat nyeri *pre test* dan *post test* aromaterapi *peppermint* pada kelompok

intervensi yaitu 0.000. Dapat disimpulkan bahwa pada kelompok intervensi ada perbedaan nilai yang signifikan antara tingkat nyeri pre test dan post test aromaterapi *peppermint* dengan penurunan tingkat nyeri sebesar 4,00. Hal ini dapat dilihat dari nilai *P value* (<0.05).

Tabel 2 tingkat nyeri 6 jam dan 12 jam post operasi *sectio caesarea* pada kelompok kontrol

N Tingkat Nyeri	N	Mean ± Sd	Beda	95% CI	<i>P value</i>
1. Pre test	16	8,31 ± 0,602		7,99 – 8,63	
2. Post test	16	8,19 ± 0,403	0,12	7,97 – 8,40	0,317

Sumber : *output* olahan spss 16

Berdasarkan tabel 2 Tingkat nyeri 6 jam dan 12 jam post operasi *sectio caesarea* pada kelompok kontrol diatas, didapatkan bahwa nilai *P value* pada perbedaan tingkat nyeri 6 jam dan 12 jam post anastesi dengan kriteria nyeri berat terkontrol yaitu 0.317, dan adanya penurunan tingkat nyeri sebesar 0,12 tetapi masih dalam kriteria nyeri berat terkontrol. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat nyeri 6 jam dan 12 jam post anastesi dengan *P value* (>0.05).

Tabel 3 perubahan tingkat nyeri pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol

Berdasarkan tabel 3 perubahan tingkat nyeri pada kelompok intervensi dan kontrol diatas, didapatkan bahwa nilai *p value* perbedaan tingkat nyeri antara kelompok intervensi dan kontrol adalah 0,000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh aromaterapi *peppermint* terhadap perubahan

tingkat nyeri pada kelompok intervensi. Hal ini dikarenakan nilai *P value* (< 0.05).

## PEMBAHASAN

### 1. Tingkat nyeri sebelum dan sesudah diberi perlakuan aromaterapi *peppermint* pada kelompok intervensi 6 jam dan 12 jam post operasi *sectio caesarea*

Berdasarkan tabel 1 Tingkat nyeri pre test dan post test perlakuan aromaterapi *peppermint* pada kelompok intervensi diatas, didapatkan bahwa nilai *P value* perbedaan tingkat nyeri pre test dan post test perlakuan aromaterapi *peppermint* pada kelompok intervensi yaitu 0.000. Dapat disimpulkan bahwa pada kelompok intervensi ada perbedaan nilai yang signifikan antara tingkat nyeri pre test dan post test perlakuan aromaterapi *peppermint* dengan penurunan tingkat nyeri sebesar 4,00. Hal ini dapat dilihat dari nilai *P value* (<0.05).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Isa Khasani (2013) menunjukkan perbedaan skala nyeri sebelum dan sesudah pemberian aromaterapi di RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan, Rata-rata skala nyeri sebelum pemberian aromaterapi adalah

N Tingkat Nyeri	N	Mean ± Sd	Beda	95% CI	<i>P value</i>
1. Intervensi	16	4,00 ± 0,508		1,32 – 1,68	
2. Kontrol	16	0,12 ± 0,564	4,12	2,36 – 2,77	0,000

5,36, terendah pada skala nyeri 3 yaitu 1

*Jurnal Ilmu Kesehatan Wijaya Volume 11 Nomor 2, Juli-Desember 2019*  
*Hal 17 - 25; website : www.lppmwijayahusada.com; ISSN : 2301-4113*

orang (3%) dan tertinggi pada skala 6 yaitu 22 orang (66,7%) dan merupakan skala nyeri dengan respon terbanyak. Rata-rata skala nyeri sesudah pemberian aromaterapi adalah 2,58, terendah pada skala nyeri 1 yaitu 1 orang (3%) dan tertinggi pada skala nyeri 5 yaitu 6 orang (18,2%) dan skala nyeri dengan responden terbanyak yaitu skala nyeri 2 sebanyak 15 orang (45,5%) yang artinya menunjukkan bahwa pemberian aromaterapi dapat menurunkan skala nyeri yang signifikan pada pasien *post operasi sectio caesarea*.

Hal ini jelas terjadi karena aromaterapi dapat menghilangkan nyeri, perawatan kulit, mengurangi ketegangan dan kelelahan, serta memperkuat kondisi tubuh secara keseluruhan. Minyak esensial dapat mempengaruhi suasana hati, mengurangi kelelahan, mengurangi kecemasan dan mengurangi relaksasi. Ketika dihirup, minyak esensial bekerja pada otak dan sistem saraf melalui stimulus dari saraf penciuman. Minyak esensial diekstrak dari tanaman, bunga pohon, buah-buahan, kulit kayu, rumput, serta biji yang memiliki sifat terapeutik, psikologi dan fisiologis yang spesifik, yang dapat meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit.<sup>[10]</sup>

Minyak esensial mampu meredakan ketegangan pada otot-otot yang sedang mengalami kelelahan akibat aktivitas yang berlebihan. Minyak esensial juga dapat mempengaruhi implus dan refleksi saraf yang diterima oleh ujung-ujung reseptor saraf pada lapisan terluar dari kulit, dibawah lapisan epidermis. Selain itu minyak esensial ini dapat mempengaruhi aktivitas fungsi kerja otak melalui sistem

saraf yang berhubungan melalui indra penciuman. Respon ini akan dapat merangsang peningkatan produksi masa penghantar saraf otak (*neurotransmitter*), yaitu yang berkaitan dengan pemulihan kondisi psikis seperti emosi, perasaan, pikiran dan keinginan.<sup>[10]</sup>

Hasil penelitian sesudah diberikan aromaterapi peppermint menunjukkan bahwa rata-rata skala nyeri responden sebesar 4,25. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diberikan aromaterapi peppermint skala nyeri responden mengalami penurunan.

Dari pengamatan peneliti selama pemberian aromaterapi peppermint dapat diketahui responden mengalami rileks dan rasa nyeri *post sectio caesarea* berangsur-angsur berkurang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara tingkat nyeri sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Karena aromaterapi *peppermint* dapat mengubah persepsi dan motivasi efektif dan dapat memberikan individu kontrol nyeri, stress fisik dan emosi pada nyeri dengan cara memberikan efek ketenangan, menurunkan hormon stress serta meningkatkan hormon bahagia yang dapat menurunkan tingkat nyeri. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik responden meliputi pekerjaan responden sebagai IRT dan riwayat obstetri. Pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga semakin berpengaruh terhadap penurunan intensitas nyeri, karena ibu rumah tangga sudah terbiasa mengalami nyeri akibat aktivitas rumah tangga,

*Jurnal Ilmu Kesehatan Wijaya Volume 11 Nomor 2, Juli-Desember 2019*  
*Hal 17 - 25; website : www.lppmwijayahusada.com; ISSN : 2301-4113*

selain itu ibu juga memiliki banyak waktu untuk istirahat sehingga sedikit resiko untuk mengalami cedera yang dapat meningkatkan nyeri. Dilihat dari riwayat obstetri menunjukkan bahwa ibu melahirkan anak kedua lebih tinggi mengalami penurunan intensitas nyeri, karena ibu yang sudah melahirkan anak kedua dengan kondisi fisik yang lebih kuat sehingga mampu mengkompensasi nyeri.

## **2. Tingkat nyeri pada 6 jam dan 12 jam post operasi *sectio caesarea* pada kelompok kontrol**

Berdasarkan tabel 2 Tingkat nyeri 6 jam dan 12 jam post operasi *sectio caesarea* pada kelompok kontrol diatas, didapatkan bahwa nilai *P value* pada perbedaan tingkat nyeri 6 jam dan 12 jam post anastesi dengan kriteria nyeri berat terkontrol yaitu 0.317, dan adanya penurunan tingkat nyeri sebesar 0,12 tetapi masih dalam kriteria nyeri berat terkontrol. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat nyeri 6 jam dan 12 jam post anastesi dengan *P value* ( $>0.05$ ).

Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian sebelumnya tentang efektivitas aromaterapi *bitter orange* terhadap nyeri post partum *sectio caesarea* oleh Sri utami 2016 dengan hasil penelitian melaporkan untuk responden kontrol, nilai rata-rata tingkat nyeri pretest ialah 4,82 dan tingkat nyeri post test ialah 4,82 dengan standar deviasi 0,660, hal ini menunjukkan bahwa skala nyeri tidak mengalami perubahan yang signifikan pada kelompok kontrol.

Pengobatan non farmakologis kadang-kadang dapat mengontrol tingkat nyeri

sehingga pengobatan farmakologis sekurang-kurangnya dapat ditunda, terdapat berbagai macam teknik non farmakologi yang dapat diterapkan dalam mengatasi nyeri yaitu teknik pernafasan, *audonalgesia*, akupuntur, *transcutaneous electric nerve stimulations* (TENS), kompres dengan suhu dingin panas, sentuhan pijatan, hipnotis dan aromaterapi, dapat mengontrol sistem saraf yang akhirnya dapat menurunkan tingkat nyeri.<sup>[6]</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat nyeri pada kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan tidak mengalami perubahan atau penurunan tingkat nyeripada saat *post test*. Selain karena responden tidak dilakukan intervensi non farmakologis berupa perlakuan untuk mengontrol tingkat nyeri, juga disebabkan oleh usia dan tingkat pendidikan.

Tingkat nyeri yang tidak mengalami perubahan terjadi pada kelompok kontrol disebabkan oleh sebagian besar responden penelitian berumur 26-35 tahun, hal ini karena usia mempengaruhi derajat nyeri, semakin muda usia ibu maka akan semakin nyeri bila di dibandingkan dengan usia ibu yang lebih tua. Selain itu sebagian besar karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan ialah menengah kebawah. Semakin rendah pendidikan menyebabkan peningkatan intensitas nyeri dan disabilitas akibat nyeri. Hal tersebut berhubungan dengan strategi coping, yaitu konsekuensi masing-masing individu untuk menilai suatu

*Jurnal Ilmu Kesehatan Wijaya Volume 11 Nomor 2, Juli-Desember 2019*  
*Hal 17 - 25; website : www.lppmwijayahusada.com; ISSN : 2301-4113*

keadaan. Jadi ibu yang berpendidikan rendah kurang memiliki pengetahuan untuk mentoleransi nyeri yang di alaminya.

### **3. Tingkat nyeri pada pasien post operasi sectio caesarea pada kelompok intervensi dan kontrol**

Berdasarkan tabel 3 perubahan tingkat nyeri pada kelompok intervensi dan kontrol diatas, didapatkan bahwa nilai *p value* perbedaan tingkat nyeri antara kelompok intervensi dan kontrol adalah 0,000 (<0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh aromaterapi peppermint terhadap perubahan tingkat nyeri pada kelompok intervensi dan kontrol.

Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian sebelumnya oleh pratiwi (2012) menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan dari intensitas nyeri sebelum dan setelah dilakukan latihan teknik relaksasi pernafasan menggunakan aromaterapi lavender dengan *P value* = 0,000 taraf signifikan < 0,05. Wijayanti, L, (2012) menyatakan bahwa ada pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap intensitas nyeri pada ibu primigravida post sectio caesarea hari I-II di ruang flamboyan RS Waluyo Blita dengan *P Value* = 0,000.

Setiap individu belajar dari pengalaman nyeri, akan tetapi pengalaman yang telah dirasakan individu tersebut tidak berarti bahwa individu tersebut mudah dalam menghadapi nyeri pada masa yang mendatang. Seseorang yang terbiasa merasakan nyeri akan lebih siap dan mudah mengantisipasi nyeri daripada individu yang mempunyai pengalaman sedikit tentang nyeri.<sup>[11]</sup>

Hasil penelitian sebelum dan sesudah diberikan aromaterapi peppermint tidak terdapat responden yang mengalami nyeri skala ringan. Hal ini dikarenakan banyak pasien post sectio caesarea yang mengeluhkan rasa nyeri akibat bekas sayatan dan jahitan, selain itu luka tersebut tergolong panjang dan dalam.

Hasil penelitian ini pun terbukti bahwa pemberian aromaterapi *peppermint* mampu mempengaruhi perubahan tingkat nyeri post sectio caesarea dengan waktu singkat. Apabila penggunaan tepat dan sesuai ketentuannya dan daya konsentrasinya terkendali dengan baik. Hasil penelitian yang telah dilakukan mendukung teori potter & perry (2005) sebelumnya yang menyebutkan bahwa pemberian aromaterapi dapat mengubah persepsi dan motivasi efektif dan dapat memberikan individu kontrol diri ketika nyeri, stress fisik dan emosi pada nyeri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara tingkat nyeri sebelum dan sesudah diberikan perlakuan pada kelompok intervensi, sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada perubahan yang signifikan karena tidak di beri perlakuan. Hal ini dilihat dari karakteristik responden berdasarkan riwayat obstetri menunjukkan bahwa ibu melahirkan anak kedua lebih tinggi mengalami penurunan intensitas nyeri. Hal ini karena ibu yang sudah melahirkan anak kedua kondisi fisik lebih kuat sehingga mampu mengkompensasi nyeri. Dilihat dari

*Jurnal Ilmu Kesehatan Wijaya Volume 11 Nomor 2, Juli-Desember 2019*  
Hal 17 - 25; website : [www.lppmwijayahusada.com](http://www.lppmwijayahusada.com); ISSN : 2301-4113

riwayat *sectio caesarea* menunjukkan bahwa yang sudah pernah mengalami *sectio caesarea* lebih tinggi mengalami penurunan intensitas nyeri dibandingkan dengan yang belum pernah mengalami *sectio caesarea*.

### SIMPULAN

1. Ada perubahan tingkat nyeri sebelum dan sesudah diberi perlakuan aromaterapi *peppermint* pada kelompok intervensi pada pasien *post* operasi *sectio caesarea* dengan nilai *P value* = 0,000 ( $\leq 0,05$ ) dengan penurunan rata-rata 4,00.
2. Tidak adanya perbedaan tingkat nyeri pada 6 jam dan 12 jam *post* anastesi pada kelompok kontrol dengan nilai *P value* = 0,317 ( $> 0,05$ )
3. Adanya pengaruh antara aromaterapi *peppermint* terhadap perubahan tingkat nyeri pada pasien *post* operasi *sectio caesarea* nilai *P value* = 0,000 ( $\leq 0,05$ ).

### SARAN

1. Institusi pendidikan  
Diharapkan untuk menambah pengetahuan yang menunjang dalam penelitian dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah sumber referensi dan informasi kepada mahasiswa di STIKes Wijaya Husada Bogor sehingga menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya
2. Tempat penelitian  
Diharapkan dapat memberikan informasi melalui seminar maupun penyuluhan, khususnya seputar penatalaksanaan tingkat nyeri non farmakologi yaitu dengan aromaterapi *peppermint*

### DAFTAR PUSTAKA

1. Bab 1 pendahuluan. Universitas andalas. <http://repo.unand.ac.id/214/3/bab%25201.pdf>. Diunduh tanggal 19 oktober 2017, 08:00
2. Berman, Snyder, Kozier, Erb. 2009. *Buku Ajar Keperawatan Klinis Kozier & Erb*. Edisi 5. Jakarta: EGC.
3. Bobak, L. 2004. *Keperawatan Maternitas*. Jakarta : EGC.
4. Dr. Rachmi Primadiati. 2002. *Aromaterapi Perawatan Alami untuk Sehat dan Cantik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
5. Gondo, H.K. 2011. *Pendekatan non farmakologis untuk mengurangi nyeri saat persalinan*. Jurnal CKD 185 vol. 38 no. 4 <http://www.kalbemed.com>. Diunduh tanggal 19 oktober 2017, 08:00
6. Grace & Borley. 2007. *At a Glance Ilmu Bedah*. Jakarta: Penerbit Airlangga.
7. Jaelani. 2009. *Aromaterapi*. Jakarta : pustaka populer obor
8. Jaelani. 2009. *Aromaterapi*. Jakarta : pustaka populer obor
9. Karen A, dkk. 2008. *Standar perawatan pasien : perencanaan kolaboratif & intervensi keperawatan*, ed. 7, vol. 2. Jakarta :EGC
10. Kounteya, Sintha. 2010. *ArticleTimesOfIndia*. [Hhttp://timesofindia.indiatimes.com/india/caesarian.section.accountsfor9ofallbirthinindia/articles/1325244](http://timesofindia.indiatimes.com/india/caesarian.section.accountsfor9ofallbirthinindia/articles/1325244). Diunduh tanggal 19 oktober 2017, 08:00
11. Priyono. 2010. *Merawat Bayi Tanpa Baby Sitter*. Yogyakarta: MedPres.

## Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup

### RIWAYAT HIDUP



**Ikrimah Syam**, lahir di Mamuju, Baras IV, 05 Agustus 1998. Anak kedua dari 6 bersaudara dari pasangan **H. Bustamin, SKM., M.Kes** dan **Hj. Syamsiah**. Memulai pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar di SDN 6 BONTOKAMASE pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010, pada tahun yang sama pula melanjutkan pendidikan menengah pertama di Pondok Pesantren Putri (SMP UMMUL MUKMININ) dan tamat pada tahun 2013, setelah itu melanjutkan pendidikan menengah atas di Pondok Pesantren Putri (MA UMMUL MUKMININ) pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2016. Terdaftar sebagai mahasiswa jurusan keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar tahun 2016-2020 melalui jalur UMPTKIN dan Mahasiswa Profesi Ners XVII Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar tahun 2020. Selama kuliah di jurusan keperawatan penulis membuat karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul “Analisis Faktor yang Berkontribusi Terhadap Perilaku Konsumsi Buah dan Sayur pada Remaja: Aplikasi Sunrise Model”

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di beberapa organisasi yakni:

1. Anggota Divisi Dana dan Usaha HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017-2018
2. Ketua Divisi Dana dan Usaha HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2018-2019
3. Ketua Dirjen Keuangan Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia (ILMIKI) pada tahun 2017-2019
4. Anggota Organisasi Perempuan di Makassar (PdM) pada tahun 2019-Sekarang

### Lampiran 3 Dokumentasi Pemberian Tindakan

**Hari 1**



**Hari 2**

