

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN EPIDURAL
HEMATOMA DENGAN MASALAH HIPERTERMI
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tugas Akhir Ners

Oleh:

JUMASING, S. Kep
NIM: 70900120001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN EPIDURAL
HEMATOMA DENGAN MASALAH HIPERTERMI
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tugas Akhir Ners

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Ners Jurusan Ilmu Keperawatan Pada
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

JUMASING, S. Kep
NIM: 70900120001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jumasing, S. Kep
NIM : 70900120001
Tempat/Tgl, Lahir : Bantaeng, 16 Agustus 1996
Jurusan : Profesi Ners
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Btn Minasa Upa Blok M18 No 5
Judul : Asuhan Keperawatan Pada Pasien Epidural Hematoma Post Op Craniactomy Dengan Masalah Hipertermi

Dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tugas akhir ini benar adalah hasil karya tulis ilmiah penyusunan sendiri. Jika di kemudian hari tugas akhir ini adalah duplikat, plagiat, tiruan dari hasil kerja orang lain, maka karya tulis dan gelar yang diperoleh tidak sah/batal dimata hukum.

Makassar, 15 Juli 2021

Penyusun

JUMASING, S. Kep
NIM:70900120001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Nama: Jumasing, S.Kep NIM: 70900120001, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “**Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Op Epidural Hematoma Dengan Masalah Hipertermi**”, memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 14 Juli 2021

Pembimbing I



Ahmad J,
S.Kep.,Ns.M.Kep.Sp.Kep.KMB

Pembimbing II



Musdalifah, S.Kep.,Ns.M.Kep

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN KTI NERS

Skripsi yang berjudul “Asuhan Keperawatan Pada Pasien Epidural Dengan Masalah Hipertermi Di RSUD Labuang Baji Makassar” yang disusun oleh **JUMASING, S. Kep NIM : 70900120001**, Mahasiswa jurusan keperawatan Program Studi Profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan di pertahankan dalam Ujian Akhir KTI yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ners dalam ilmu kesehatan, jurusan keperawatan.

Makassar, 15 Juli 2021 M
5 Zulhijah 1442 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patimah. S.Kep.,Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Risnah. S.Kep.,Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Aisyah Arsyad. M.A	(.....)
Pembimbing I	: Ahmad J , S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.,KMB	(.....)
Pembimbing II	: Musdalifah, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP:198007012006042002

KATA PENGANTAR

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

Segala puji syukur kehadirat Allah swt. berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan KTI dengan judul “Intervensi Kompres Hangat Pada Pasien Epidural Hematoma Post Op Craniotomy dengan Masalah Hipertermia” Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikut setianya.

Tujuan penyusunan KTI ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program Profesi (Ners) Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2020/2021.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan KTI ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta. Ayahanda tercinta Jari dan Ibunda tercinta Ria atas kasih sayang, do'a dan dukungan semangat serta moril dan materinya, sehingga penulis dapat berada ditahap ini, merai gelar Ns (Ners). Ucapan terima kasih yang tulus kepada pembimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
3. Dr. Patima, S.Kep.,Ns., M.Kep selaku ketua Prodi Ners Jurusan Keperawatan dan Syisnawati, S.Kep.,Ns., M.Kep. Sp.Kep.Jiwa selaku sekretaris Prodi Ners jurusan keperawatan beserta Staf dan Dosen pengajar yang tidak bosan-bosannya memberikan ilmu, dan membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan KTI.
4. Ahmad Jamaluddin S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. KMB selaku Pembimbing I dan Musdalifah S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing II yang selama ini telah sabar membimbing saya dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk penulisan KTI, motivasi yang membangung sehingga peneliti bisa ketahap ini serta informasi yang ter update.
5. Dr. Risnah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Penguji I dan Dr. Aisyah Arsyad M.Ag selaku Penguji II yang sabar dan iklas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang berkualitas.


6. kepada saudara orang tua saya Umi dan Abah Sanawi yang selalu memotivasi saya akan pentingnya pendidikan dan yang tak henti-hentinya memberikan saya bantuan material yang sangat melebihi dari cukup
7. Kepada keluarga besar UKM RITMA UIN ALAUDDIN tercinta yang memberikan saya ilmu dan pelajaran tentang penelitian, pengabdian masyarakat yang begitu berharga sehingga saya bisa ketahap ini

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik lisan maupun tulisan saat saya menempuh pendidikan di kampus peradaban yang saya cintai dan banggakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian, jangan berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian dan terimakasih

Samata, 15 Juli 2021

Penulis,

Jumasing , S.Kep
NIM: 70300116039



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Jumasing

NIM : 70900120001

Judul : Asuhan Keperawatan pada pasien epidural hemtoma dengan masalah hipertermi di RSUD Labuang Baji Makassar

Latar Belakang: Menurut (World Health Organization, 2016) sekitar 16.500 orang meninggal di seluruh dunia setiap hari yang diakibatkan oleh semua jenis cedera. Cedera mewakili 12% dari beban keseluruhan penyakit, sehingga cedera penyebab penting ketiga kematian secara keseluruhan. Kecelakaan lalu lintas di dunia pada tahun 2018 telah merenggut satu juta orang setiap tahunnya sampai sekarang dan dari 50 juta orang mengalami luka dengan sebagian besar korbannya adalah pemakai jalan yang rentang seperti pejalan kaki, pengendara sepeda motor. Faktor yang memperburuk keadaan pasien pasca kraniotomi selama di rawat di ICU seperti penurunan kesadaran, edema serebri, dilatasi pupil, peningkatan tekanan intrakranial, kejang, demam/peningkatan suhu tubuh. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan dalam menurunkan suhu tubuh adalah kompres hangat pada pasien menggunakan kain dengan air hangat. **Tujuan penulisan:** adalah melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami epidural hematoma post op craniactomy dengan masalah hipertermi di ruang ICU dengan menggunakan kompres hangat **Metode:** yang digunakan adalah study kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan pendokumentasian. Pelaksanaan kompres hangat dilakukan selama pasien mengalami hipertermi dan dihentikan ketika suhu tubuh menurun. **Hasil:** analisis data menunjukkan beberapa diagnosis yaitu hipertermi, bersihan jalan nafas tidak efektif dan defisit perawatan diri. Pemberian kompres hangat adalah intervensi yang bisa digunakan dalam menurunkan suhu tubuh. **Kesimpulan:** berdasarkan hasil evaluasi kasus yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa penerapan kompres hangat yang dilakukan selama pasien mengalami hipertermi efektif dilakukan dalam menurunkan suhu tubuh pasien

Kata Kunci : Epidural Hematoma, Hipertermi, Kompres Hangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Name : Jumasing

NIM : 70900120001

*Title : Intervention Of Giving Warm Compresses To Post-Op Craniotomy
Epidural Hematoma Patients With Hyperthermia Problems*

Background: According to (World Health Organization, 2016) around 16,500 people die worldwide every day due to all types of injuries. Injuries represent 12% of the overall burden of disease, making injuries the third most important cause of death overall. Traffic accidents in the world in 2018 have claimed one million people every year until now and out of 50 million people have been injured with most of the victims being road users who range like pedestrians, motorcyclists. Factors that worsen the patient's condition after craniotomy during hospitalization in the ICU such as decreased consciousness, cerebral edema, pupillary dilation, increased intracranial pressure, seizures, fever/increased body temperature. One of the interventions that can be done in lowering body temperature is a warm compress on the client using a cloth with warm water **The purpose of writing:** is to carry out nursing care in patients who experience post-op craniotomy epidural hematoma with hyperthermia problems in the ICU using warm compresses. **Method:** used is a case study with data collection techniques through interviews, observation, physical examination and documentation. The implementation of warm compresses is carried out while the patient is hyperthermic and is stopped when the body temperature decreases. **Results:** data analysis showed several diagnoses, namely hyperthermia, ineffective airway clearance and self-care deficit. Giving warm compresses is an intervention that can be used to lower body temperature. **Conclusion:** based on the results of the case evaluation, it was concluded that the application of warm compresses during the client's hyperthermia was effective in reducing the patient's body temperature.

Keywords: Epidural Hematoma, Hyperthermia, Warm Compress



DAFTAR ISI


SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS AKHIR	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-6
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Mamfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORI	7-48
A. Konsep Teori.....	7
1. Defenisi.....	7
2. Etiologi	8
3. Manifestasi Klinis	9
4. Patofisiologi.....	9
5. Komplikasi.....	12
6. Pemeriksaan Penunjang.....	13
7. Penatalaksanaan	14
B. Konsep Keperawatan.....	15
1. pengkajian.....	15
2. Diagnosis	22
3. Intervensi Keperawatan.....	25
C. Teori Virginia Henderzon 14 Kebutuhan Dasar	45
1. Konsep Utama Teori Henderzon	45

2. Aplikasi Teori Henderson.....	49
D. Evidence Based Nursing	51
1. Kompres Hangat	51
2. Tujuan	52
3. Indikasi	52
4. Kontra Indikasi	53
5. Prosedur Pemberian	53
BAB III ANALISIS KASUS.....	55-92
A. Pengkajian	55
B. Diagnosis	70
C. Intervensi Keperawatan	73
D. Implementasi	78
E. Evaluasi	88
BAB IV PEMBAHASAN	93-105
A. Analisis Kasus	93
B. Analisis Intervensi.....	99
C. Alternatif Pemecahan Masalah	102
BAB V PENUTUP.....	106-108
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....




DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Kajian Intervensi Keperawatan	7
Tabel 1.2 Daftar Obat Pasien.....	8
Tabel 1.3 Hasil Pemeriksaan Lab dan Kimia darah.....	65
Tabel 1.4 Kategorisasi Data	66
Tabel 1.5 Klasifikasi Data.....	69
Tabel 1.6 Analisa Data.....	70
Tabel 1.7 Intervensi Keperawatan	73
Tabel 1.8 Implementasi Keperawatan.....	78
Tabel 1.9 Evaluasi Keperawatan	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Fraktur Meningen Kepala.....	8
Gambar 2.1 Arteri Meningea.....	10
Gambar 3.1 CT-Scan Epidural Hematoma.....	14





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cedera kepala merupakan kasus yang banyak ditemukan di Ruang ICU. Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan saat dinas di RSUD Labuang Baji Makassar dari 13 bed yang tersedia ada 13 pasien dan 10 diantaranya adalah kasus cedera kepala dengan jenis epidural hematoma. Hal ini menunjukkan bahwa pasien di ICU didominasi kasus cedera kepala.

Epidural Hematoma (EDH) adalah penumpukan darah di antara tulang tengkorak dengan duramater, kejadiannya 1-5 % dari seluruh pasien cedera kepala (Cherie Mininger, 2012). Cedera otak sekunder akibat epidural hematoma diakibatkan iskemia atau hipoksia. Iskemia memungkinkan terjadinya penurunan ATP sehingga mengakibatkan kegagalan pompa membran sel. Sel akan mati dan menjadi bengkak (edema sitotoksik). Hipoksia menyebabkan kehilangan neuron yang akan menimbulkan atrofi kortek pada pasien. Hipoksia atau iskemia pada cedera kepala berat mengakibatkan tekanan intrakranial akan meningkat sehingga cerebral perfusion pressure akan berkurang.

Secara global angka kejadian kasus cedera masih cukup tinggi. Berdasarkan laporan dari sekitar (World Health Organization, 2016) 16.500 orang meninggal di seluruh dunia setiap hari yang diakibatkan oleh semua jenis cedera. Cedera mewakili 12% dari beban keseluruhan penyakit, sehingga cedera penyebab penting ketiga kematian secara keseluruhan.

Kecelakaan lalu lintas di dunia pada tahun 2018 telah merenggut satu juta orang setiap tahunnya sampai sekarang dan dari 50 juta orang mengalami luka dengan sebagian besar korbannya adalah pemakai jalan yang rentang seperti pejalan kaki, pengendara sepeda motor, anak-anak, dan penumpang (Riskesdas, 2018)

Jumlah pasien cedera kepala yang masuk rumah sakit sekitar satu juta orang setiap tahun di Eropa. Sekitar 50% disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor. Cedera kepala yang disebabkan oleh kecelakaan kerja diperkirakan sekitar 300.000 orang tiap tahunnya. Jumlah pasien cedera kepala yang dirawat dan dibolehkan pulang dari UGD sekitar 1 juta orang tiap tahun di Amerika. Sebanyak 230.000 orang dirawat inap dan hidup, sekitar 80.000 orang dipulangkan dengan cacat yang disebabkan oleh cedera kepala, dan 50.000 orang meninggal karena cedera kepala. Diperkirakan saat ini ada 5,3 juta rakyat Amerika yang hidup dalam keadaan cacat yang disebabkan oleh cedera kepala. Umur rata-rata terjadi cedera kepala adalah 15-24 tahun (Trevana L, 2011). Sekitar 500.000 orang anak dengan cedera kepala datang ke rumah sakit tiap tahun di Inggris, dan sekitar 10% kasus setiap rumah sakit anak merupakan kasus cedera kepala (Norman, 2015). Prevalensi cedera di Indonesia tahun 2017 adalah 8,2%, dengan prevalensi tertinggi ditemukan di Sulawesi Selatan (12,8%) dan terendah di Jambi (4,5%). Provinsi yang mempunyai prevalensi cedera kepala lebih tinggi dari angka nasional sebanyak 15 provinsi. Riskesdas 2013 pada provinsi Jawa Tengah menunjukkan kasus cedera sebesar 7,7% yang disebabkan oleh kecelakaan

sepeda motor sebesar 40,1%. Cedera mayoritas dialami oleh kelompok umur dewasa yaitu sebesar 38,8% dan lanjut usia (lansia) yaitu 13,3% dan anak-anak sekitar 11,3% (Risikesdas, 2018)

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja menjadi penyebab utama kasus cedera kepala. Berdasarkan data pasien yang didapatkan pada saat dinas di Ruang Perawatan Intensif (ICU) RSUD Labuang baji Makassar perbulan adalah 120 pasien yang masuk ICU menjalani perawatan, 100 diantaranya adalah kasus cedera kepala dengan rata2 penyebabnya adalah kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja.

Beberapa faktor dapat memperburuk kondisi pasien yang melakukan perawatan dengan kasus epidural hematoma pasca bedah kraniotomi dilakukan di ruang perawatan intensif (ICU). Faktor yang memperburuk keadaan pasien pasca kraniotomi selama di rawat di ICU seperti penurunan kesadaran, edema serebri, dilatasi pupil, peningkatan tekanan intrakranial, kejang, demam/peningkatan suhu tubuh, nyeri hebat, terjadinya cedera lain akibat penggunaan alat-alat life support (ventilator, monitor, CVP, dan lainnya), dan gangguan pernapasan akibat penggunaan sedasi selama proses operasi dilakukan (Hoffman J, 2011).

Peningkatan suhu tubuh merupakan masalah yang sering terjadi pada kasus epidural hematoma. Dari hasil pengamatan diruangan ICU RSUD Labuang baji dari 10 pasien cedera keseluruhan mengalami kasus hipertermi. Banyaknya kejadian hipertermi pada kasus cedera kepala dan angka kecacatan serta kematian yang masih tinggi pada pasien dengan cedera kepala

sehingga diperlukan penanganan yang tepat. Berdasarkan masalah diatas Maka dibutuhkan perawatan intensif untuk mengatasi masalah hipertermi pada kasus ini. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi peningkatan suhu tubuh atau penatalaksanaan yang dilakukan untuk mengatasi hipertermi adalah dengan melakukan kompres hangat (Ika Rahmawati, 2018)

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hipertermia adalah dengan kompres hangat. Dalam penelitian (Sarah Fadillah, 2019) mengatakan bahwa studi dalam penatalaksanaan pada pasien rawat inap yang mengalami hipertermi adalah dengan menggunakan kompres hangat yang terbukti dapat mengatasi beberapa masalah yang dapat memicu hipertermi seperti kejang, nyeri dan demam. Penelitian lainnya juga mengatakan kompres hangat yang dilakukan pada pasien selama pasien mengalami peningkatan suhu tubuh mampu menurunkan suhu tubuh pasien dari 38 cecius menjadi 36.5 cecius dengan memberikan kompres hangat selama 3 jam (Kahinedan, 2017). Menurut (Prastiwi, 2020) pengaruh penerapan kompres hangat pada pasien dengan masalah hipertermi menurunkan angka pasien yang mengalami hipertermi sebanyak 30 pasien dari 30 responden. Kompres hangat adalah tindakan yang dilakukan dengan memberikan cairan atau air hangat dan menggunakan handuk atau spons untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman, menurunkan suhu tubuh, mengurangi nyeri, melancarkan aliran darah kebagian tubuh yang mengalami cedera dan mencegah terjadinya spasme otot. Selain itu kompres air hangat juga merupakan pemberian terapi non farmakologi (Fuad Toyib, 2018)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan intervensi kompres hangat pada pasien epidural hematoma post op craniotomy dengan masalah hipertermi di Ruang perawatan Intensif care (ICU) RSUD Labuang Baji Makassar

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka rumusan masalah pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah Bagaimana Pelaksanaan intervensi kompres hangat pada Pasien epidural hematoma Post Op craniactomy dengan masalah hipertermi

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami epidural hematoma post op craniotomy dengan masalah hipertermi di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD LABUANG BAJI Pada Tahun 2021

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk Mengetahui gambaran hasil pengkajian pada pasien dengan epidural hematoma post kraniotomi
- b) Untuk Mengetahui diagnosis keperawatan pada pasien dengan epidural hematoma post kraniotomi
- c) Untuk Mengetahui intervensi keperawatan pada pasien dengan epidural hematoma post kraniotomi
- d) Untuk mengetahui implementasi keperawatan pada pasien dengan

epidural hematoma post kraniotomi

- e) Untuk mengetahui evaluasi tindakan keperawatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana keperawatan pada pasien epidural hematoma post kraniotomy
- f) Untuk mengetahui dan menganalisis intervensi kompres air hangat pada pasien epidural hematoma post op craniotomy dengan masalah hipertermi.
- g) Untuk mengetahui teori keperawatan yang digunakan dalam analisis kasus pasien epidural hematoma post op craniotomy

D. Manfaat

1. Manfaat teoritis

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan praktik asuhan keperawatan pada pasien epidural hematoma post op craniotomy di *Intensive Care Unit (ICU) RSUD Labuang Baji Makassar*.

2. Manfaat aplikatif

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat digunakan pada intervensi masalah hipertermi pada pasien dengan epidural hematoma post op craniotomy.

BAB II

TINJAUAN TEORI


A. Konsep Teori

1. Defenisi

Epidural hematom adalah cedera kepala yang mengakibatkan perdarahan intrakranial yang paling sering terjadi karena fraktur tulang tengkorak. Dimana otak ditutupi oleh tulang tengkorak yang keras. Otak juga dikelilingi oleh pembungkus yang disebut dura yang fungsinya untuk melindungi otak, menutupi sinus-sinus vena, dan membentuk periosteum tabula interna. Epidural hematom (EDH) adalah adanya darah di ruang epidural yaitu ruang potensial antara tabula interna tulang tengkorak dan duramater (Setiyohadi, 2010).

Sedangkan menurut (Anderson, 2012) epidural hematoma adalah terjadinya pendarahan atau berkumpulnya darah akibat benturan yang ada didalam ruang epidural, terletak diantara tengkorak dan duramater. Kasus ini sering didapat pada kecelakaan yang mengakibatkan fraktur tulang tengkorak ataupun tidak yang menyebabkan arteri maningeal tengah putus atau rusak (laserasi) dan mneyebabkan penurunan kesadaran bahkan kematian.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa epidural hematoma adalah pengumpulan darah dalam ruang epidural yang disebabkan oleh adanya benturan yang keras pada kepala.



Gambar: 1.1 fraktur meningen kepala

2. Etiologi

Epidural hematom terjadi benturan yang mengakibatkan laserasi atau robekan pembuluh darah yang ada diantara durameter dan tulang tengkorak bisa akibatkan karena fraktur tengkorak seperti kecelakaan kendaraan dan trauma ataupun benturan yang tidak menyebabkan fraktur tapi menyebabkan pendarahan di durameter.

Menurut Smeltzer (2013) penyebab cedera kepala tersebut adalah:

- a. Kecelakaan kerja (buruh bangunan atau pekerja fisik)
- b. Kecelakaan lalu lintas (kendaraan bermotor)
- c. Jatuh dari ketinggian (tertimpa benda berat, benda tumpul).
- d. Serangan dan kejahatan kejahatan (benda tajam).
- e. Pukulan dan benturan (kekerasan, akibat luka tembak).
- f. Kecelakaan pada saat olahraga.

Dijelaskan juga oleh Hafid, (2013) dalam bukunya bahwa penyebab

paling umum pada kasus cedera kepala adalah jatuh (28%), kecelakaan kendaraan bermotor (20%), tertabrak benda (19%), perkelahian (11%). Kemudian kelompok paling beresiko adalah usia 20 sampai >50 tahun dengan perbandingan laki-laki dengan perempuan 2:1

3. Manifestasi klinis

- a. Terjadi penurunan kesadaran sampai koma
- b. Keluarnya darah yang bercampur cairan serebrospinal dari hidung
- c. Terjadi nyeri kepala berat
- d. Susah diajak berkomunikasi
- e. Dilatasi pupil dan ptosis
- f. Mual
- g. Hemiparesis
- h. Pernafasan dalam dan cepat kemudian dangkal irregular
- i. Battle sign
- j. Terjadi peningkatan suhu
- k. Lucid interval (mula-mula tidak sadar lalu sadar dan kemudian tidak sadar).


4. Patofisiologi

Cedera disebabkan yang oleh laserasi *arteri meningeal media* atau sinus dura, dengan atau tanpa disertai fraktur tengkorak. Perdarahan dari EDH dapat menyebabkan kompresi, pergeseran, dan peningkatan tekanan intrakranial (TIK)

Pada EDH, perdarahan terjadi di antara tulang tengkorak dan

duramater. Perdarahan ini lebih sering terjadi di daerah temporal bila salah satu cabang *arteria meningea media* robek. Robekan ini sering terjadi bila fraktur tulang tengkorak di daerah bersangkutan. Hematom dapat pula terjadi di daerah frontal atau oksipital (Anderson, 2012)

Arteri meningea media masuk di dalam tengkorak melalui *foramen spinosum* melalui durameter dan tulang di permukaan dan *os temporale*. Perdarahan yang terjadi menimbulkan EDH, desakan oleh hematoma akan melepaskan durameter lebih lanjut dari tulang kepala sehingga hematoma bertambah besar (Anderson, 2012)



Gambar: 2. 1 *Arteri meningea media*

Hematoma yang membesar pada daerah temporal menyebabkan terjadinya tekanan pada lobus temporalis otak ke arah bawah dan dalam. Tekanan ini mengakibatkan bagian medial lobus mengalami herniasi di bawah pinggiran tentorium. Keadaan ini menyebabkan timbulnya tanda-tanda neurologik (Anderson, 2012)

Tekanan dari herniasi pada sirkulasi *arteria* yang mengatur *formation retikularis* di *medulla oblongata* menyebabkan hilangnya kesadaran. Di

tempat ini terdapat nuklei saraf cranial ketiga (*oculomotorius*). Tekanan pada saraf ini mengakibatkan dilatasi pupil dan ptosis kelopak mata. Tekanan pada lintasan kortikospinalis yang berjalan naik pada daerah ini, menyebabkan kelemahan respons motorik kontralateral, refleks hiperaktif atau sangat cepat, dan tanda Babinsky positif (Anderson, 2012)

Dengan makin membesarnya hematoma, maka seluruh isi otak akan terdorong kearah yang berlawanan, menyebabkan tekanan intrakranial yang besar. Timbul tanda-tanda lanjutan peningkatan tekanan intrakranial antara lain gangguan tanda-tanda vital dan fungsi pernafasan

Karena perdarahan ini berasal dari arteri, maka darah akan terpompa terus keluar hingga makin lama makin besar. Ketika kepala terbanting atau terbentur mungkin penderita pingsan sebentar dan segera sadar kembali. Dalam waktu beberapa jam, penderita akan merasakan nyeri kepala yang progresif memberat, kemudian kesadaran berangsur menurun. Masa antara dua penurunan kesadaran ini selama penderita sadar setelah terjadi kecelakaan disebut *lucid interval*. Fenomena *lucid interval* terjadi karena cedera primer yang ringan pada EDH. Kalau pada subdural hematoma cedera primernya hampir selalu berat atau epidural hematoma dengan trauma primer berat tidak terjadi *lucid interval* karena pasien langsung tidak sadarkan diri dan tidak pernah mengalami (Anderson, 2012)

fase sadar

Sumber perdarahan :

a. *Arteri meningeae media* (*lucid interval* : 2 – 3 jam)

- b. Sinus duramatis
- c. Diploe (lubang yang mengisi kalvaria kranii) yang berisi *a.diploica* dan *v.diploica*

Epidural hematoma merupakan kasus yang paling emergensi dan merupakan kasus bedah saraf karena progresifitasnya yang cepat karena durameter melekat erat pada sutura sehingga langsung mendesak ke parenkim otak menyebabkan mudah herniasi trans dan infra tentorial. Karena itu setiap penderita dengan trauma kepala yang mengeluh nyeri kepala yang berlangsung lama, apalagi progresif memberat, harus segera di rawat dan diperiksa dengan teliti serta dilakukan tindakan bedah

5. Komplikasi

Komplikasi yang terjadi pada cedera kepala menurut Ahmadsyah, (2010) yaitu :

a. Epilepsi Pasca Trauma

Epilepsi pasca trauma adalah suatu kelainan dimana kejang beberapa waktu setelah otak mengalami cedera karena benturan di kepala. Kejang ini terjadi sekitar 10% penderita yang mengalami cedera kepala hebat tanpa adanya luka tembus dan pada sekitar 40% penderita yang memiliki luka tembus di kepala.

b. Edema Paru

Komplikasi paru-paru yang paling serius pada pasien cedera kepala adalah edema paru. Ini mungkin terutama berasal dari gangguan neurologis atau akibat dari sindrom distres pernapasan dewasa. Edema

paru dapat akibat dari cedera pada otak yang menyebabkan adanya refleks cushing. Peningkatan pada tekanan darah sistemik terjadi sebagai respons dari sistem saraf simpatis pada peningkatan TIK. Peningkatan vasokonstriksi tubuh umum ini menyebabkan lebih banyak darah dialirkan ke paru-paru. Perubahan permeabilitas pembuluh darah paru-paru berperan dalam proses dengan memungkinkan cairan berpindah ke dalam alveolus. Kerusakan difusi oksigen dan karbon dioksida dari darah dapat menimbulkan peningkatan TIK lebih lanjut (Mary Fran Hazinski, 2011)


- c. Afasia adalah hilangnya kemampuan untuk menggunakan bahasa karena terjadinya cedera pada area bahasa dan otak. Penderita tidak mampu memahami atau mengekspresikan kata-kata. Bagian otak yang mengendalikan fungsi bahasa adalah Lobus Temporalis sebelah kiri dan bagian lobus frontalis di sebelahnya.

6. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang yang diperlukan pada pasien dengan cedera kepala menurut Wijaya, (2013) yaitu :

- a. Mengidentifikasi luasnya lesi, perdarahan, determinan ventrikuler, dan perubahan jaringan otak (CT-Scan atau MRI (tanpa kontras) :
- b. Melihat keberadaan dan perkembangan gelombang patologis. EEG (Elektroensefalografi)
- c. Mendeteksi perubahan struktur tulang (fraktur), perubahan struktur garis (perdarahan/edema), fragmen tulang (Foto rontgen)

- d. Mendeteksi perubahan aktifitas metabolisme otak PET (Positron Emission Tomography)
- e. Menunjukkan kelainan sirkulasi serebral seperti pergeseran jaringan otak sekunder menjadi edema, perdarahan, dan trauma Angiografi serebral
- f. Mengoreksi keseimbangan elektrolit sebagai peningkatan tekanan intrakranial (TIK) Kadar elektrolit



Gambar : 3.1 Epidural Hematoma (CT-SCAN)

7. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan epidural hematom (Cherie Mininger, 2012) terdiri dari:

a. Terapi Operatif

Terapi operatif bisa menjadi penanganan darurat yaitu dengan melakukan kraniotomi. Terapi ini dilakukan jika hasil CT Scan menunjukkan volume perdarahan/hematoma sudah lebih dari 20 CC atau tebal lebih dari 1 cm atau dengan pergeseran garis tengah (midline shift) lebih dari 5 mm. Operasi yang dilakukan adalah evakuasi hematoma untuk menghentikan sumber perdarahan sedangkan tulang

kepala dikembalikan. Jika saat operasi tidak didapatkan adanya edema serebri sebaliknya tulang tidak dikembalikan.

b. Terapi Medikamentosa.

Terapi medikamentosa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengelevasikan kepala pasien 30° setelah memastikan tidak ada cedera spinal atau posisikan trendelenburg terbalik untuk mengurangi TIK.
- 2) Berikan dexametason (pemberian awal dengan dosis 10 mg kemudian dilanjutkan dengan dosis 4 mg setiap 6 jam).
- 3) Berikan manitol 20% untuk mengatasi edema serebri.
- 4) Berikan barbiturat untuk mengatasi TIK yang meninggi.

B. Konsep Keperawatan

1. Pengkajian

a. Identitas Pasien

Meliputi nama, umur (kebanyakan terjadi pada usia tua), jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal dan jam MRS, nomor register, dan diagnosis medis .

b. Keluhan utama

Sering menjadi alasan pasien untuk meminta pertolongan kesehatan adalah kelemahan anggota gerak badan, gelisah, tidak dapat berkomunikasi, dan penurunan tingkat kesadaran.

c. Riwayat penyakit sekarang

Adanya penurunan kesadaran, gelisah.

d. Riwayat penyakit dahulu

Adanya riwayat hipertensi, riwayat stroke, diabetes melitus, penyakit jantung, anemia, riwayat trauma kepala. Pengkajian pemakaian obat-obat yang sering digunakan pasien, seperti pemakaian obat antihipertensi, antilipidemia, penghambat beta, dan lainnya. Adanya riwayat merokok, penggunaan alkohol. Pengkajian riwayat ini dapat mendukung pengkajian dari riwayat penyakit sekarang dan merupakan data dasar untuk mengkaji lebih jauh dan untuk memberikan tindakan selanjutnya.

e. Riwayat penyakit keluarga

Biasanya ada riwayat keluarga yang menderita hipertensi, diabetes melitus, atau penyakit menurun lainnya.

f. Pengkajian Primer

Airway (Jalan Napas)

- 1) Sumbatan atau penumpukan secret.
- 2) Wheezing atau krekles.
- 3) Kepatenan jalan nafas.

Breathing (Pernapasan)

- 1) Sesak dengan aktifitas ringan atau istirahat.
- 2) RR lebih dari 24 kali/menit, irama ireguler dangkal.
- 3) Ronchi, krekles.
- 4) Ekspansi dada tidak penuh.

5) Penggunaan otot bantu nafas.

Circulation

- 1) Nadi lemah, tidak teratur
- 2) Capillary refill
- 3) Takikardi
- 4) TD meningkat / menurun.

5) Edema

6) Gelisah

7) Akral dingin

8) Kulit pucat, sianosis

9) Output urine menurun

Disability

Status mental : Tingkat kesadaran secara kualitatif dengan Glasgow

Coma Scale (GCS) dan secara kuantitatif yaitu

Composmentis : Sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Apatis : keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan kehidupan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh. Somnolen : keadaan kesadaran yang mau tidur saja. Dapat dibangunkan dengan rangsang nyeri, tetapi jatuh tidur lagi.

Delirium : keadaan kacau motorik yang sangat, memberontak, berteriak-teriak, dan tidak sadar terhadap orang lain, tempat, dan waktu.

Sopor/semi koma : keadaan kesadaran yang menyerupai koma, reaksi

hanya dapat ditimbulkan dengan rangsang nyeri.

Koma : keadaan kesadaran yang hilang sama sekali dan tidak dapat dibangunkan dengan rangsang apapun.

Exposure

Keadaan kulit, seperti turgor / kelainan pada kulit dan keadaan ketidaknyamanan (nyeri) dengan pengkajian PQRST.

g. Pemeriksaan Sekunder

1) B1 (Breathing)

Pada inspeksi didapatkan pasien batuk apa tidak, peningkatan produksi sputum, sesak napas, penggunaan otot bantu napas, dan peningkatan frekuensi pernapasan. Auskultasi bunyi napas tambahan seperti ronchi pada pasien dengan peningkatan produksi sekret ataupun adanya sumbatan. Pada pasien dengan tingkat kesadaran *compos mends*, pengkajian inspeksi pernapasannya tidak ada kelainan. Palpasi toraks didapatkan taktil premitus seimbang kanan dan kiri. Auskultasi tidak didapatkan bunyi napas tambahan.

2) B2 (Blood/ Kardiovaskuler)

Pengkajian tekanan darah biasanya terjadi peningkatan dan dapat terjadi hipertensi masif (tekanan darah >200 mmHg). Kaji adanya nyeri dada dengan pengkajian P, Q, R, S, T. Raba akral pasien apakah teraba dingin atau hangat, lakukan pemeriksaan EKG, auskultasi suara jantung apakah ada kelainan.

3) B3 (Brain/ Sistem Persyarafan)

Lesi otak yang rusak tidak dapat membaik sepenuhnya. Pengkajian B3 (Brain) merupakan pemeriksaan yang terfokus dan harus lebih lengkap dibandingkan pengkajian pada sistem lainnya.

4) B4 (Bladder/ Sistem Pencernaan)

Setelah cedera otak pasien mungkin mengalami inkontinensia urine sementara karena konfusi, ketidakmampuan mengomunikasikan kebutuhan, dan ketidakmampuan untuk mengendalikan kandung kemih karena kerusakan kontrol motorik dan postural. Kadang kontrol sfingter urine eksternal hilang atau berkurang. Selama periode ini, dilakukan kateterisasi intermiten dengan teknik steril. Inkontinensia urine yang berlanjut menunjukkan kerusakan neurologis luas.

5) B5 (Bowel/ Sistem Pencernaan)

Didapatkan adanya keluhan kesulitan menelan, nafsu makan menurun, mual muntah pada fase akut, adanya perdarahan. Mual sampai muntah disebabkan oleh peningkatan produksi asam lambung sehingga menimbulkan masalah pemenuhan nutrisi. Pola defekasi biasanya terjadi konstipasi akibat penurunan peristaltik usus. Adanya inkontinensia alvi yang berlanjut menunjukkan kerusakan neurologis luas.

6) B6 (Bone)

Pada kulit, jika pasien kekurangan O_2 kulit akan tampak pucat dan jika kekurangan cairan maka turgor kulit akan buruk. Selain itu,

perlu juga dikaji tanda-tanda dekubitus. Adanya kesulitan untuk beraktivitas karena kelemahan, gangguan mobilitas, serta masalah pada pola aktivitas dan istirahat.

h. Pengkajian Tingkat Kesadaran

Kualitas kesadaran pasien merupakan parameter yang paling mendasar dan parameter yang paling penting yang membutuhkan pengkajian. Tingkat keterjagaan pasien dan respons terhadap lingkungan adalah indikator paling sensitif untuk disfungsi sistem persarafan. Beberapa sistem digunakan untuk membuat peringkat perubahan dalam kewaspadaan dan keterjagaan. Jika pasien sudah mengalami koma maka penilaian GCS sangat penting untuk menilai tingkat kesadaran pasien dan bahan evaluasi untuk pemantauan pemberian asuhan.

i. Pengkajian Fungsi Serebral

Pengkajian ini meliputi status mental, fungsi intelektual, kemampuan bahasa, lobus frontal, dan hemisfer.

1) Status Mental

Observasi penampilan, tingkah laku, nilai gaya bicara, ekspresi wajah, dan aktivitas motorik pasien.

2) Fungsi Intelektual

Didapatkan penurunan dalam ingatan dan memori, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penurunan kemampuan berhitung dan kalkulasi. Pada beberapa kasus pasien mengalami brain damage yaitu kesulitan untuk mengenal persamaan dan perbedaan yang

tidak begitu nyata.

3) Kemampuan Bahasa

Penurunan kemampuan bahasa tergantung daerah lesi yang memengaruhi fungsi dari serebral. Lesi pada daerah hemisfer yang dominan pada bagian posterior dari girus temporalis superior (area Wernicke) didapatkan disfasia reseptif, yaitu pasien tidak dapat memahami bahasa lisan atau bahasa tertulis. Sedangkan lesi pada bagian posterior dari girus frontalis inferior (Area Broca) didapatkan disfasia ekspresif, yaitu pasien dapat mengerti, tetapi tidak dapat menjawab dengan tepat dan bicaranya tidak lancar. Disartria (kesulitan berbicara), ditunjukkan dengan bicara yang sulit dimengerti yang disebabkan oleh paralisis otot yang bertanggung jawab untuk menghasilkan bicara.

j. Pengkajian Saraf Kranial

Menurut Muttaqin, (2008) Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan saraf kranial I-XII :

- 1) Saraf I: Kaji adanya kelainan pada fungsi penciuman
- 2) Saraf II: Disfungsi persepsi visual karena gangguan jarak sensori primer di antara mata dan korteks visual
- 3) Saraf III, IV, dan VI: Adakah kelainan pada pupil, lapang pandang pasien
- 4) Saraf V: Pada beberapa keadaan EDH menyebabkan paralisis saraf trigemimus, penurunan kemampuan koordinasi gerakan mengunyah,

penyimpangan rahang bawah ke sisi ipsilateral, serta kelumpuhan satu sisi otot pterigoideus internus dan eksternus

- 5) Saraf VII: Persepsi pengecapan dalam batas normal, wajah asimetris, dan otot wajah tertarik ke bagian sisi yang sehat
- 6) Saraf VIII: Tidak ditemukan adanya tuli konduktif dan tuli persepsi.
- 7) Saraf IX dan X: Kemampuan menelan kurang baik dan kesulitan membuka mulut
- 8) Saraf XI: Tidak ada atrofi otot sternokleidomastoideus dan trapezius.
- 9) Saraf XII: Lidah simetris, terdapat deviasi pada satu sisi dan fasikulasi, serta indra pengecapan normal

k. Pengkajian Sistem Motorik


- 1) Inspeksi Umum
- 2) Fasikulas
Didapatkan pada otot-otot ekstremitas.
- 3) Tonus Otot

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan (SDKI DPP PPNI, 2016) adalah sebagai berikut:

- a. Gangguan pola napas
- b. bersihan jalan napas tidak efektif
- c. Hipertermia
- d. Nyeri Akut
- e. Defisit nutrisi

- f. Hambatan mobilitas fisik
- g. Defisit perawatan diri
- h. Risiko infeksi
- i. Ansietas keluarga



3. Intervensi keperawatan

Tabel 1.1 Intervensi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan Dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
1	Nyeri Akut	<p>Tingkat Nyeri Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun</p> <p>Kriteria Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memburuk: 1 2. Cukup memburuk: 2 3. Sedang: 3 4. Cukup membaik: 4 5. Membaik: 5 <ol style="list-style-type: none"> a) Frekuensi nadi b) Pola nafas 1. Meningkatkan: 1 2. Cukup meningkat: 2 3. Sedang: 3 4. Cukup menurun: 4 5. Menurun: 5 <ol style="list-style-type: none"> a) Keluhan nyeri b) Meringis c) gelisah d) kesulitan tidur 	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi respons nyeri non verbal 4. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri 5. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri 6. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup 7. Monitor efek samping penggunaan analgetik <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi rasa nyeri 2. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri 3. Fasilitasi istirahat dan tidur 4. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 2. Jelaskan strategi meredakan nyeri 3. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu 	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. Megetahui skala nyeri 3. Mengetahui respons nyeri non verbal 4. Mengetahui faktor yang memperberat dan memperingan nyeri 5. Mengetahui pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri 6. Mengetahui pengaruh nyeri pada kualitas hidup 7. Mengetahui efek samping penggunaan analgetik <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengurangi rasa nyeri 2. Mengetahui lingkungan yang memperberat rasa nyeri 3. Untuk mencukupi istirahat dan tidur 4. Mengetahui sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui penyebab, periode, dan pemicu nyeri 2. Mengetahui strategi meredakan nyeri 3. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemberian analgetik,

No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan Dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
2	Bersihkan Jalan Napas Tidak Efektif	<p>Pertukaran Gas Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam oksigenasi dan/atau eliminasi karbondioksida pada membran alveolus-kapiler Normal. Kriteria Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memburuk: 1 2. Cukup memburuk: 2 3. Sedang: 3 4. Cukup membaik: 4 5. Membaik: 5 <ol style="list-style-type: none"> a) Batuk efektif b) Produksi sputum c) Mengi d) Sianosis e) Gelisah f) Pola napas 	<p>Manajemen Jalan Napas Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor pola napas 2. Monitor bunyi napas tambahan 3. Monitor sputum (jumlah,warna,aroma) <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertahankan kepatenan jalan napas 2. Posisikan semi fowler atau fowler 3. Lakukan fisioterapi dada, <i>jika perlu</i> 4. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik 5. Berikan oksigen, <i>jika perlu</i> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, <i>jika tidak kontraindikasi</i> <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, <i>jika perlu</i> 2. Pemantauan Respirasi <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor pola nafas 2. Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas 3. Monitor saturasi oksigen, monitor nilai AGD 4. Monitor adanya sumbatan jalan nafas 5. Monitor produksi sputum <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atur Interval pemantauan respirasi sesuai kondisi ps <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan 2. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 	<p>Manajemen Jalan Napas Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pola nafas pasien 2. Mengetahui bunyi nafas tambahan pasien 3. Mengetahui jumlah dan warna sputum pasien <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kebersihan jalan nafas pasien 2. Pmenatur posisi pasien dengan kepala lebih tinggi 3. Membersihkan jalan nafas kurang dari 15 detik 4. Untuk Membersihkan lender 5. Mempertahankan kebutuhan oksigen pasien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyarankan pemberian asupan cairan 2000ml <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dalam pemberian obat pengencer lendir 2. Memantau pernapasan

No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan Dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
3	Gangguan Mobilitas Fisik	<p>Mobilitas fisik Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan mobilitas fisik meningkat</p> <p>Kriteria Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memburuk: 1 2. Cukup memburuk: 2 3. Sedang: 3 4. Cukup membaik: 4 5. Membaik: 5 <ol style="list-style-type: none"> a) Pergerakan ekstremitas b) Kekuatan otot <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan: 1 2. Cukup meningkat: 2 3. Sedang: 3 4. Cukup menurun: 4 5. Menurun: 5 <ol style="list-style-type: none"> a) Nyeri b) Kaku sendi c) Gerakan terbatas d) Kelemahan fisik 	<p>Dukungan mobilisasi</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi 4. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu 2. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu 3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi 2. Anjurkan melakukan mobilisasi dini 3. Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (mis. Duduk di tempat tidur) 	<p>Dukungan mobilisasi</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui adanya masalah adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. mengetahui toleransi fisik melakukan pergerakan 3. Mengetahui frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi 4. Mengetahui kondisi umum selama melakukan mobilisasi <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan aktivitas mobilisasi dengan alat bantu 2. memberikan pemahaman melakukan pergerakan, jika perlu 3. bantu pasien lewat keluarga dalam meningkatkan pergerakan <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tujuan dan prosedur mobilisasi 2. Untuk memperlancar pergerakan 3. Untuk memberikan aktivitas pada pasien

No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan Dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
4	Anxietas	<p>Tingkat Anxietas Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan tingkat anxietas menurun</p> <p>Kriteria Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memburuk: 1 2. Cukup memburuk: 2 3. Sedang: 3 4. Cukup membaik: 4 5. Membaik: 5 <ol style="list-style-type: none"> a) Konsentrasi b) Pola tidur 1. Meningkat: 1 2. Cukup meningkat: 2 3. Sedang: 3 4. Cukup menurun: 4 5. Menurun: 5 <ol style="list-style-type: none"> a) Perilaku gelisah b) Verbalisasi kebingungan c) Verbalisasi khawatir terhadap situasi yang dialami d) Perilaku tegang 	<p>Reduksi Anxietas</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi saat tingkat anxietas berubah 2. Identifikasi kemampuan mengambil keputusan 3. Monitor tanda-tanda anxietas <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan 2. Temani pasien untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan 3. Pahami situasi yang membuat anxietas 4. Dengarkan dengan penuh perhatian 5. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan 6. Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan prosedur, termasuk sensasi yang mungkin dialami 2. Informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis 3. Anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien 4. Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan 5. Latih teknik relaksasi 	<p>Reduksi Anxietas</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui saat tingkat anxietas berubah 2. Mengetahui kemampuan mengambil keputusan 3. Memperhatikan tanda-tanda anxietas <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menumbuhkan kepercayaan 2. Berkomunikasi dengan keluarga/pasien untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan 3. Mengetahui situasi yang membuat anxietas yang membuat anxietas 4. Ajak keluarga berbicara penuh perhatian 5. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan 6. Mengetahui situasi yang memicu kecemasan <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami 2. Menjelaskan diagnosis, pengobatan, dan prognosis dengan jelas 3. Memberitahukan kepada keluarga agar tetap bersama pasien 4. Memberikan distraksi pengalihan untuk mengurangi ketegangan

No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan Dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
5	Resiko Infeksi	<p>Tingkat Infeksi Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam glukosa derajat infeksi menurun. Kriteria Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkat: 1 2. Cukup meningkat: 2 3. Sedang: 3 4. Cukup menurun: 4 5. Menurun: 5 <ol style="list-style-type: none"> a) Demam b) Kemerahan c) Nyeri d) Bengkak 1. Memburuk: 1 2. Cukup memburuk: 2 3. Sedang: 3 4. Cukup membaik: 4 5. Membaik: 5 <ol style="list-style-type: none"> a) Kadar sel darah Putih 	<p>Pencegahan infeksi Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor tanda gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batasi jumlah pengunjung 2. Berikan perawatan kulit pada daerah edema 3. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien 4. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tanda dan gejala infeksi 2. Ajarkan cara memeriksa luka 3. Anjurkan meningkatkan asupan cairan <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian imunisasi, <i>Jika perlu</i> 	<p>Pencegahan infeksi Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memeriksa tanda gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk mencegah adanya infeksi 2. melakukan perawatan kulit pada daerah edema 3. mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien 4. selalu menjaga kebersihan dan mencegah infeksi silang <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. mengetahui tanda dan gejala infeksi 5. mengetahui cara memeriksa luka 6. mengetahui meningkatkan asupan cairan <p>Kolaborasi</p> <p>Bekerja sama pemberian imunisasi, <i>Jika perlu</i></p>

No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan Dan Kriteria Hasil	Intervensi	
7	Defisit Nutrisi	<p>Status Nutrisi Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam status nutrisi terpenuhi.</p> <p>Kriteria Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurun 2. Cukup menurun 3. Sedang 4. Cukup meningkat 5. Meningkatkan <ol style="list-style-type: none"> a) Porsi makanan yang dihabiskan b) Berat badan atau IMT c) Frekuensi makan d) Nafsu makan e) Cepat kenyang 	<p>Manajemen Nutrisi</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi status nutrisi 2. Identifikasi alergi dan intoleransi makanan 3. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastric 4. Monitor asupan makanan 5. Monitor berat badan <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan oral hygiene sebelum makan, <i>Jika perlu</i> 2. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai 3. Hentikan pemberian makanan melalui selang nasogastric jika asupan oral dapat ditoleransi <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan posisi duduk, jika mampu 2. Ajarkan diet yang diprogramkan <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan 	<p>Manajemen Nutrisi</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui status nutrisi 2. Mengetahui alergi dan intoleransi makanan 3. Mengetahui perlunya penggunaan selang nasogastric 4. Mengetahi asupan makanan 5. Memeriksa berat badan <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kebersihan mulut sebelum makan, <i>Jika perlu</i> 2. Membuat makanan secara menarik dan suhu yang sesuai 3. Melakukan penghentian pemberian makanan melalui selang nasogastric jika asupan oral dapat ditoleransi <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui posisi duduk, jika mampu 2. Mengetahui diet yang diprogramkan <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bekerja sama dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan

No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan Dan Kriteria Hasil	Intervensi	
8	<p>Hipertermia</p>	<p>Termoregulasi Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x8 jam diharapkan suhu tubuh tetap berada pada rentang normal Kriteria Hasil: 1. Meningkatkan: 1 2. Cukup meningkat: 2 3. Sedang: 3 4. Cukup menurun: 4 5. Menurun: 5 a) Mengigil 1. Memburuk: 1 2. Cukup memburuk: 2 3. Sedang: 3 4. Cukup membaik: 4 5. Membaik: 5 a) Suhu tubuh b) Suhu kulit</p>	<p>Manajemen Hipertermia Observasi: 1. Identifikasi penyebab hipertermia (mis. dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator) 2. Monitor suhu tubuh 3. Monitor kadar elektrolit 4. Monitor haluaran urine 5. Monitor komplikasi akibat hipertermia Terapeutik: 1. Sediakan lingkungan yang dingin 2. Longgarkan atau lepaskan pakaian 3. Basahi dan kipasi permukaan tubuh 4. Berikan cairan oral 5. Hindari pemberian antipiretik atau aspirin 6. Berikan oksigen, jika perlu Edukasi 1. Anjurkan tirah baring Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu</p>	<p>Manajemen Hipertermia Observasi: 1. Mengetahui penyebab hipertermia 2. Memeriksa setiap saat suhu tubuh 3. Memeriksa setiap saat kadar elektrolit 4. Memeriksa setiap saat haluaran urine 5. Memeriksa setiap saat komplikasi akibat hipertermia Terapeutik: 1. tersedia lingkungan yang dingin 2. memakai pakaian longgar atau lepaskan pakaian 3. untuk menurunkan suhu tubuh 4. untuk memenuhi kebutuhan cairan 5. tidak memakai pemberian antipiretik atau aspirin 6. memenuhi kebutuhan oksigen Edukasi 1. untuk memenuhi istirahat Kolaborasi 1. bekerja sama pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu</p>

No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan Dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
9	Defisit Perawatan Diri	Perawatan Diri Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan perawatan diri meningkat Kriteria Hasil: 1. Menurun: 1 2. Cukup menurun: 2 3. Sedang: 3 4. Cukup meningkat: 4 5. Meningkatkan: 5 a) Kemampuan mandi b) Kemampuan mengenakan pakaian c) Kemampuan makan d) Kemampuan ke toilet (BAK dan BAB) e) Verbalisasi diri keinginan untuk melakukan perawatan diri f) Mempertahankan kebersihan mulut	Dukungan Perawatan Diri Observasi: 1. Identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia 2. Monitor tingkat kemandirian 3. Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan Terapeutik: 1. Sediakan lingkungan yang terapeutik 2. Siapkan keperluan pribadi 3. Dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri 4. Fasilitasi untuk menerima keadaan ketergantungan 5. Jadwalkan rutinitas perawatan diri Edukasi 1. Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan	Dukungan Perawatan Diri Observasi: 1. Memeriksa kebersihan tubuh pasien 2. Mengetahui kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan Terapeutik: 1. Sediakan lingkungan yang terapeutik 2. Siapkan keperluan pribadi pasien 3. Jadwalkan perawatan diri pasien Edukasi 1. Anjurkan melakukan keluarga melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan kepada pasien 2. Ajarkan cara membersihkan diri pasien

Penyimpangan KDM



C. Teori Keperawatan Menurut Virginia Henderson

Teori keperawatan yang digunakan dalam analisis kasus ini adalah teori Virginia Henderson yaitu 14 kebutuhan dasar manusia dalam memberikan asuhan keperawatan yang telah di tuangkan dalam buku Falsafah Dan Teori Keperawatan Dalam Integrasi Keilmuan (Risnah & Muhammad Irwan, 2021) Henderson menegaskan pentingnya seni dalam keperawatan dan mengenalkan 14 kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar asuhan keperawatan. Sebagaimana dalam buku Virginia Henderson berjudul *The Nature of Nursing: A Definition and Its Implications for Practice, Research, and Education*, yang memperkenalkan 14 kebutuhan dasar manusia yang merupakan dasar untuk dikatakan sehat dan harus diaplikasikan dalam pemberian asuhan keperawatan:

1. Kebutuhan oksigen yang terpenuhi secara alami tanpa bantuan alat pernapasan (bernapas secara alami)
2. Terpenuhinya kebutuhan nutrisi dan cairan yang dibutuhkan tubuh.
3. Proses pengeluaran hasil absorpsi tubuh atau yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh secara alami tanpa keluhan dan tanpa bantuan.
4. Melakukan aktivitas tubuh secara alami tanpa bantuan dan mempunyai bentuk tubuh yang ideal
5. Terpenuhinya kebutuhan istirahat dan tidur secara alami
6. Mampu menyesuaikan diri dalam menggunakan pakaian dan mampu mengganti dan berhias diri secara mandiri.
7. Mampu menjaga kestabilan suhu tubuh dan mengatasi dengan menggunakan terapi nonfarmakologi.

8. Mampu melakukan personal heigiene secara mandiri tanpa bantuan orang lain atau orang terdekat.
9. Menjahui lingkungan atau aktivitas yang bisa merugikan atau membahayakan dirinya orang lain dan masyarakat.
10. Mampu bekromunikasi dengan baik pada diri sendiri, orang lain dan masyarakat serta dapat mengeluarkan pendapat dan memberi balasan orang lain
11. Mampu melakukan kegiatan keagamaan sesuai dengan agamanya dan mempunyai jiwa spiritual yang tinggi
12. Mampu bekerja sama dengan orang lain, berkarir dan mendapatkan prestasi atau penghargaan atas jasanya
13. Mampu berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan memanfaatkan waktu luang untuk liburan
14. Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi seperti melakukan proses belajar apa yang terjadi pada dirinya dan mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia

Dalam keempat belas kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi menurut Virginia henderson terbagi menjadi empat kategori, yaitu kebutuhan biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual kebutuhan dasar pada nomor 1-9 adalah komponen kebutuhan biologis, nomor 10 dan 14 adalah komponen kebutuhan psikologis, nomor 11 adalah kebutuhan spiritual, nomor 12 dan 13 adalah komponen kebutuhan sosiologis. Selain itu, Henderson juga menyatakan bahwa pikiran dan tubuh manusia tidak dapat dipisahkan satu

sama lain (inseparable). Sama halnya dengan pasien dan keluarga, mereka merupakan satu kesatuan (unit) yang harus satu karena keluarga klien dapat membantu seorang perawat atau tenaga medis untuk menggali lebih dalam masalah yang ada pada pasien dan membantu proses penyembuhan melalui semangat dan keikut sertaannya dalam melakukan perawatan kepada keluarga klien sehingga penyembuhan klien lebih cepat.

Menurut Virginia Henderson ada tiga tahap hubungan perawat dengan pasien, yaitu saat perawat berperan sebagai pengganti keluarga, penyelamat, dan mitra bagi pasien. Melalui proses interpersonal, perawat harus mempunyai instin, komunikasi yang baik dan hubungan yang baik kepada pasiennya untuk menggali lebih dalam bantuan apa yang dibutuhkan klien. Walaupun fungsi perawat dan dokter saling berkaitan dan Henderson mempercayai itu, tetapi ia kembali menegaskan bahwa perawat bekerja saling ketergantungan dengan tenaga kesehatan profesional lainnya juga pasien dan keluarga (Yani Achir, 2018: dalam Risnah, 2021)

Seorang perawat melaksanakan peran pengganti dalam upaya memenuhi kebutuhan pasien diakibatkan berkurangnya kekuatan fisik dan kemampuan pasien dalam situasi pasien yang gawat. Dalam hal ini perawat berfungsi untuk “melengkapi”. Pasien berada pada fase pemulihan setelah kondisi gawat terlewati. Perawat memiliki peran sebagai penolong yang membantu pasien mendapatkan kemandiriannya. Kemandirian yang bersifat relatif, sebab tak ada manusia yang tidak bergantung pada orang lain. Walaupun demi untuk mewujudkan kesehatan pasien perawat berusaha keras saling bergantung yang

sejatinya manusia adalah makhluk simbiosis mutualisme. Meski klien mempunyai diagnosis berbeda, akan tetapi sama-sama memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dan kebutuhan dasar dimodifikasi berdasarkan kondisi patologis dan faktor lainnya, seperti lanjut usia, tabiat, kondisi emosional, status sosial atau budaya, serta kekuatan fisik dan intelektual.

Adapun filosofi henderson yang memperbolehkan seorang dokter memberi instruksi kepada pasien atau tenaga kesehatan. Merupakan tugas perawat membantu pasien dalam melakukan manajemen kesehatan ketika dokter tidak ada.

D. Konsep Utama Teori Henderson

Adapun konsep utama dari teori Henderson sebagaimana yang telah dituangkan dalam buku yang berjudul Falsafah dan teori keperawatan dalam integrasi keilmuan (Risnah dan Muhammad Irwan, 2021) yaitu; manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan.

1. Manusia

Menurut Henderson, manusia sebagai individu yang butuh bantuan untuk memperoleh kesehatan, kebebasan, kematian yang damai dan meraih kemandirian untuk hal tersebut manusia harus memenuhi 14 kebutuhan dasar manusia yang merupakan komponen penanganan dalam perawatan.

2. Keperawatan

Keperawatan adalah profesi profesional yang melakukan pelayanan kesehatan pada pasien yang mengalami sakit maupun sehat yang disebut sebagai Perawat dan memiliki fungsi yang unik dalam membantu individu.

Sebagai salah satu tim kesehatan perawat memiliki fungsi independen di dalam penanganan perawatan berdasarkan pada 14 kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Henderson.

3. Kesehatan

Sehat menurut Henderson adalah terpenuhinya 14 kebutuhan dasar manusia dan terpenuhinya kebutuhan biologis, psikologis, sosiologis, sipritual dengan kualitas hidup yang mendasari seseorang dapat berfungsi pada kemanusiaan. Diperlukan kemandirian dan sikap saling ketergantungan, untuk mencapai kondisi sehat. Bila memiliki kekuatan, kehendak, serta pengetahuan yang cukup maka Individu akan meraih atau mempertahankan kesehatan.

4. Lingkungan

Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan terkait pada aspek lingkungan.

- a) Ketidakmampuan individu mengontrol lingkungan akibat kondisi sakit.
- b) Memberikan perlindungan cedera pada pasien yang membutuhkan perawatan yang harus dilakukan perawat.
- c) Penjagaan lingkungan yang aman dan baik harus dilakukan oleh seorang perawat untuk dirinya dan orang lain atau pasien.
- d) Perawat melakukan observasi, penilaian terhadap pasien untuk mendapatkan hasil agar dapat menjadi dasar dalam penulisan resep dokter.

- e) Konstruksi bangunan dan pemeliharannya harus dirutinkan untuk mencegah terjadinya luka akibat jatuh yang terjadi pada pasien perlu dimasukkan dalam saran-saran perawat
- f) Kemampuan mengetahui tentang politik, keagamaan, dan pirsat akan adanya bahaya harus dimiliki oleh perawat

E. Aplikasi Teori Henderson dalam Proses Keperawatan

Teori henderson berkaitan dengan ilmu keperawatan dalam memberi asuhan keperawatan yang merupakan tugas utama perawat. Manfaat dari asuhan keperawatan ini dapat dilihat dari perubahan kesehatan klien dari sakit menjadi sehat, yang awalnya mengalami ketergantungan pada orang lain hingga pada akhirnya menjadi mandiri dalam merawat diri. Perawat melakukan tugasnya membantu pasien dengan melakukan pengkajian, merencanakan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi hal yang terjadi pada pasien setelah diberikan asuhan keperawatan berdasar pada 14 komponen kebutuhan dasar manusia (Asmadi, 2008 dalam: Risnah, 2021)

Pada tahapan pengkajian, perawat menilai 14 kebutuhan dasar manusia yang ada pada pasien, setelah selesai dikumpulkan data yang perawat peroleh melalui metode observasi, indera penciuman, peraba, dan pendengaran, jika telah selesai, selanjutnya perawat mengkategorisasikan data, mengklasifikasikan data dan menganalisis data serta melakukan penegakan diagnosis keperawatan berdasarkan masalah yang didapatkan pada proses pengkajian.

Pada tahap perencanaan, perawat melakukan penyusunan rencana

kebutuhan yang disesuaikan pada kebutuhan atau masalah yang akan diatasi, termasuk rencana perbaikan apabila didapatkan adanya masalah kesehatan, dan dokumentasi bagaimana perawat melakukan upaya dalam membantu individu kelompok dan lingkungan di saat kondisi sehat atau sakit.

Pada tahap implementasi, dilaksanakan berdasarkan apa yang telah direncanakan ditahap intervensi dalam membantu individu memenuhi kebutuhan yang bermasalah dan setelah selesai melakukan proses implementasi maka dilakukan evaluasi untuk melihat apakah masalah sudah teratasi atau masih memerlukan tindakan lanjutan atau intervensi lanjutan serta mendokumentasikan apa yang telah dilakukan untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah kita lakukan agar dikemudian hari akan melindungi kita dari jeratan hukum apa bila ada keluarga pasien yang komplain terhadap tindakan yang kita lakukan.

F. Evidence Based Nursing

Evidence Based Nursing dalam analisis kasus pasien cedera kepala epidural hematoma post op craniactomy dengan masalah hipertermi adalah kompres hangat yang efektif menurunkan suhu tubuh klien berdasarkan apa yang telah dilakukan pada klien yang mengalami hipertermi. Jalan dengan penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian kompres hangat untuk mengatasi hipertermi pada pasien trauma kepala dengan masalah hipertermi dengan beberapa kelompok usia mulai dari umur 5 tahun sampai dengan umur > 50 tahun (Ika Rahmawati, 2018) selain itu banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengatasi hipertermi seperti penelitian yang telah dilakukan

(Kurnia Dewi Anisa, 2019) yang melakukan penelitian kompres hangat pada anak untuk mengatasi hipertermi dan terbukti kompres hangat dapat menurunkan hipertermi dan masih banyak lagi penelitian-penelitian yang memberikan kompres hangat pada pasien yang mengalami masalah hipertermi. Berikut SOP terkait dengan kompres hangat:

1. Kompres Hangat

Kompres hangat adalah tindakan yang dilakukan dengan memberikan cairan atau air hangat dan menggunakan handuk atau spons untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman, menurunkan suhu tubuh, mengurangi nyeri, melancarkan aliran darah kebagian tubuh yang mengalami cedera dan mencegah terjadinya spasme otot. Selain itu kompres air hangat juga merupakan pemberian terapi non farmakologi

2. Tujuan

- a. memperlancar sirkulasi darah
- b. mengurangi nyeri
- c. merangsang peristaltik usus
- d. memperlancar pengeluaran getah radang (eksudat)
- e. menurunkan suhu tubuh

3. Indikasi

Kompres hangat diberikan pada pasien:

- a. Pasien yang mengalami peningkatan suhu tubuh
- b. Cedera lama atau kondisi kronis
- c. Pengobatan nyeri dan merelaksasikan otot-otot yang tegang

- d. Perut kembung dan radang sendi

4. Kontraindikasi

Kondisi yang tidak bisa di berikan kompres hangat:

- a. Radang kulit
- b. Dermatitis atau luka terbuka
- c. Mati rasa
- d. Neuropati perifer yang menyebabkan individu tidak peka terhadap rasa panas

5. Prosedur Pemberian Dan Rasional

Cara pemberian kompres hangat:

- a. persiapkan bahan kompres hangat:
 - 1) waskom berisi air hangat
 - 2) handuk/botol atau spons
 - 3) termometer/ pengukur suhu
 - 4) jam tangan
- b. prosedur kerja
 - 1) tempelkan kebagian tubuh yang nyeri dengan kantong karet/botol yang berisi air hangat atau handuk yang telah di celupkan kedalam air hangat dengan temperatur 40-50 derajat celsius atau bilaulit untuk mengukurnya dapat dicoba padahi terlebih dahulu. Jangan sampai terlalu panas atau sesuaikan panasnya dengan kenyamanan yang akan dikompres
 - 2) peras kain yang akan digunakan untuk mengompres. Jangan terlalu

basah

- 3) lama kompres sekitar 10-20 menit dan dapat di perpanjang
- dampak fisiologi dari kompres hangat adalah pelunakan jaringan fibrosa membuat otot tubuh lebih rileks, menurunkan suhu tubuh, menghilangkan rasa nyeri dan memperlancar aliran darah



BAB III
LAPORAN KASUS

A. Pengkajian

Identitas Pasien

Nama inisial pasien : Tn. J
Umur : 42 Tahun
Alamat : BTN Restika Indah Blok B5 No.7
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Tanggal masuk RS : 30 Maret 2021 / Jam 16:45 wita
Nomor Rekam Medis : 39 15 65
Diagnosa Medis : Epidural Hematoma

PENGAJIAN UMUM

1. Keluhan utama pasien masuk ICU : Penurunan Kesadaran Epidural hematoma Post op craniactomy
2. Riwayat Penyakit Sekarang : Keluarga pasien mengatakan pasien post op craniactomy belum sadarkan diri, tampak terdapat banyak sekret (bunyi nafas wheezing) dan suhu tubuh pasien meningkat
3. Riwayat Penyakit Dahulu : tidak ada
4. Apakah pasien pernah dirawat di Rumah Sakit: tidak pernah
5. Riwayat Sosial :
 - a. Apakah pasien merokok : Ya, 1 bungkus perhari
 - b. Apakah pasien mengkonsumsi analgetik : tidak

5. Riwayat Penyakit Keluarga : tidak ada

6. Tanda-tanda vital

a) Tekanan darah : 100/70 mmHg

b) Suhu : 39.8 °C

c) Nadi : 104 x/m

d) Pernapasan : 26 x/m

Masalah keperawatan : Hipertermia

PEMERIKSAAN FISIK KHUSUS

1. AIRWAY

- a) Bebas : tidak
- b) Sumbatan (benda asing, sputum, darah, lendir) : Ya, terdapat sputum, lendir, alat bantu pernapasan seperti selang ETT dan OPA
- c) Suara nafas : wheezing
- d) Kejang : Ya, pasien mengalami kejang

2. BREATHING

- a) Spontan : Tidak
- b) Takipnea (Nafas cepat) : Tidak
- c) Wheezing (mengi) : Ya, tampak terdengar suara mengi, dan terdapat banyak sputum pada jalan napas serta terjadi penurunan kesadaran
- d) Apnea (henti nafas sementara) : tidak

- e) Dispnea (susah nafas) : Ya, pasien tidak bisa bernapas dengan spontan karena menggunakan ventilator untuk bernapas
- f) Lain-lain : dilakukan tindakan section kepada pasien setiap 20 menit

Masalah Keperawatan: ketidak efektifan bersihan jalan nafas

3. CIRCULATION

- a) Nadi : teraba
- b) Frekuensi : 100x/m
- c) Kulit : pucat
- d) Perdarahan : Ya, terjadi pendarahan di kepala sebelum post op dan setelah post op dilakukan transfusi darah sebanyak 2 kantong
- e) Turgor : elastis
- f) CRT : 2/detik

Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan

4. DISABILITY

- a) GCS : E 2 V 1 M 4
- b) Kesadaran : coma
- c) Pupil : isokor (normal)
- d) Reflek cahaya : (+/+)
- e) Motorik : hemiplegi (kelemahan)
- f) Kekuatan otot : lemah

PEMERIKSAAN FISIK UMUM (Kepala dan Leher)

a. Bagian kepala atas

- 1) Hematom/post trauma : Ada, sebelum operasi
- 2) Tipe rambut : botak
- 3) Warna rambut : hitam

b. Mata

- 1) Pupil isokor (diameter kedua pupil sama) : Ya
- 2) Sklera ikterik (kekuningan) : tidak
- 3) Conjunctiva anemis (pucat) : (+/+)

c. Telinga

- 1) Cerumen : tidak
- 2) Terpasang alat bantu dengar: tidak

d. Malar / Pipi

- 1) Acne (jerawat) : tidak

e. Hidung

- 1) Nafas cuping hidung : tidak
- 2) Pilek : tidak
- 3) Terpasang alat bantu nafas: ya, maka: ventilator
- 4) Tipe: dewasa ukuran pemberian: 10 L/menit

f. Bibir dan Mulut

- 1) Sianosis : tidak
- 2) Sariawan : tidak
- 3) Gigi palsu : tidak
- 4) Mukosa bibir : kering dan kotor terdapat lendir dan daki

5) Gangguan gigi dan gusi : tidak

g. Leher

1) Pembesaran kelenjar tiroid (gondok) : tidak.

2) Limfonodi (kelenjar limfe) : Teraba

3) Nadi karotis : Teraba

h. Lain –lain :

1) Pasien tampak kurang bersih terdapat daki pada daerah lipatan leher

2) Tampak terpasang NGT, ETT, dan ventilator

3) keluarga pasien mengatakan semenjak pasien masuk rumah sakit ia belum pernah mandi ataupun di waslap

4) keluarga pasien mengatakan suara nafas pasien seperti banyak dahak

5) keluarga pasien juga mengatakan dibibir/di mulut pasien banyak kotoran dan lendir

masalah keperawatan : defisit perawatan diri

PEMERIKSAAN FISIK UMUM (Thoraks)

a. Pre-kordium (lapisan luar dinding dada yang melindungi organ jantung)

1. Inspeksi

Ictus cordis terlihat di intercosta 4-5 : tidak

Luka parut (post operasi jantung) : tidak

2. Palpasi

Ictus cordis teraba di intercosta 4-5 : tidak

3. Perkusi

Redup (normal) : Ya

4. Auskultasi

Bising jantung : Ada

Bunyi S1 (lup) dan S2 (dup) : Ada/ reguler

b. Pulmonal

1. Inspeksi

a) Retraksi (normalnya tidak ada) : tidak

b) Simetris kanan dan kiri : Ya

c) Ekspansi dada kanan dan kiri sama : Ya

2. Palpasi

a) Krepitasi (suara retakan tulang) : tidak

b) Vocal fremitus kanan kiri sama : tidak

3. Perkusi

a) Sonor (normal) : Ya

4. Auskultasi

a) Vesikuler (normal) : Ya

PEMERIKSAAN FISIK UMUM (Abdomen)

a. Inspeksi :

1) Datar : Ya

2) Bekas operasi : tidak

b. Auskultasi

1) Peristaltik : 35 x/menit

c. Palpasi:

1) Massa : tidak

2) Turgor kulit : Elastis

3) Nyeri tekan di lapang abdomen : tidak

d. Perkusi:

1) Timpani : Ada

PEMERIKSAAN FISIK UMUM (Ekstremitas)

a. Superior (atas):

1) Edema : tidak

2) Infus:

a) Terpasang : Di lengan sinistra

b) Jenis infus : NaCL dan KN 3B

c) Faktor tetesan : 28 tetes/menit

d) Nyeri di area tusukan infus : tidak

3) Nadi radialis (pergelangan tangan): 65x/menit

4) Palmar (telapak tangan) : Kemerahan

5) Kekuatan otot : lemah

6) CRT (capillary refill time) < 2 detik : Ya, Tampak
ekstremitas bagian kiri pasien tidak ada respon sama sekali

7) Refleks fisiologis biseps/triseps : (+/-) tidak terdapat respon
pada bagian ekstremitas kiri

8) Refleks patologis : (-/+) pada ekstremitas kiri

9) Deformitas (kelainan bentuk) : tidak

10)Fraktur : tidak

b. Inferior (bawah):

- 1) Edema : tidak
- 2) Akral (bagian kaki paling bawah) : dingin
- 3) Kekuatan otot : lemah
- 4) Refleks patela : (+/-) pada patella bagian kiri tidak ada refleks sama sekali
- 5) Refleks patologis : (-/+) terdapat refleks patologi pada bagian ekstremitas kiri

c. Pengkajian Nutrisi

- 1) A (Antropometri) meliputi
 - BB : 75 Kg
 - TB : 170 cm
 - IMT : 25
- 2) C (Clinical)
 - Rambut : Hitam
 - Turgor kulit : elastis
 - Mukosa bibir : kering terdapat lendir yang menempel dibibir
 - Conjungtiva : anemis
- 3) D (Diet) meliputi jenis makanan yang diberikan selama di rumah sakit
 - Makanan : Susu 100-300^{cc} setiap 1 kali pemberian dan diberikan 3 sehari
- 4) E (Energy) : Pasien tidak bisa melakukan aktivitas dan hanya berbaring di tempat tidur


- 5) F (Factor) : Keluarga Klein mengatakan pasien mengalami Kecelakaan kerja yang membuat pasien jatuh dari lantai 3 ke lantai dasar dan menyebabkan pendarahan pada epidural :
- 6) Lain –lain
- 1) Pasien tampak kurang bersih terdapat daki pada daerah lipatan ekstremitas dan sarung pasien tampak kotor
 - 2) Keluarga pasien mengatakan pasien belum pernah diganti sarung yang di pakai
- 7) Obat obatan yang digunakan

Tabel 1. 2 Daftar Obat pasien

Nama obat	Jadwal Pemberian	Dosis	Jenis Pemberian
Omeprazole	24 jam	40 mg	IV
Manitol	8 jam	150 cc	IV
As.Trimefinamat	8 jam	500 mg	IV
Dexkoprofen	8 jam	1 amp	IV
Cefadrozale	12 jam	1 gr	IV

8) Genogram

Bagan 2.3 Genogram



Keterangan :

□ : Laki-laki

○ : Perempuan

— : Garis pernikahan

| : Garis keturunan

? : Tidak diketahui umur

X : Meninggal

--- : Garis serumah

↗ : Pasien

G1: Generasi pertama adalah nenek dan kakek pasien baik dari ayah maupun ibu yang sudah lama meninggal dan tidak diketahui umurnya serta tidak memiliki penyakit seperti penyakit yang diderita pasien

G2: Generasi Kedua adalah kedua orang tua pasien yang ayah pasien berusia

70 tahun dan ibu pasien berusia 69 tahun serta saudara orang tua pasien baik dari ayah maupun dari ibu pasien yang tidak diketahui umurnya

G3: Generasi Ketiga adalah pasien yang merupakan anak ke 3 dari 9 bersaudara yang sudah berusia 42 tahun dan masih hidup serumah oleh orang tua dan ke 2 adeknya.

Pemeriksaan penunjang

1. Hasil pemeriksaan laboratorium

Tabel 1.3 Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tgl 10 april 2021

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
Darah Rutin			
WBC	9.1	4.0-10.0	$10^3/uL$
LYM	1.8	0.6-3.5	$10^3/uL$
MON	0.9	0.1-0.9	$10^3/uL$
GRA	6.4	1.3-6.7	$10^3/uL$
*LYM	20.0	20.0-40.0	%
*MON	10.3	2.0-8.0	%
*GRA	69.7	50-70	%
RBC	2.57	3.50-5.50	$10^6/uL$
HGB	7.5	11.0-17.9	g/dL
HCT	23.3	40-50	%
MCV	90.7	80.0-96.0	fL
MCH	29.2	23.2-38.7	pg
MCHC	32.2	32-37	g/dL
RDW-SD	47.2	37.0-54.0	fL
RDW-CV	13.6	10.0-18.0	%
PLT	274	150-400	$10^3/uL$
PCT	0.24	0.15-0.50	%
MPV	8.8	6.5-11.0	fL
PDW	10.6	10.0-18.0	fl
P-LCR	16.4	13.0-43.0	%

2. pemeriksaan kimia darah

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
-------------------	-------	---------	--------

Kimiah Darah			
GDS	146	<200	Mg/dl

Pemeriksaan kepala

Ct Scan : Epidural hematoma

Tabel 1.4 Kategorisasi Data

Kategorisasi Data

Kategori Dan Sub Kategori		Data Subjektif Dan Objektif
Fisiologis	Respirasi	P : 26 x/i Bunyi nafas : wheezing Sirkulasi oksigenasi : terpasang alat bantu pernapasan ventilator Dada : simetris Sumbatan: Ya, terdapat sputum, lendir, alat bantu pernapasan seperti selang ETT dan OPA Kejang : Ya, pasien mengalami kejang
	Sirkulasi	TD : 120 x/i Nadi : 100 x/i Klien mengeluh nyeri Kesadaran: coma Gcs: 7 : E 2 V 1 M 4 MON : 10,3
	Nutrisi dan Cairan	Mukosa bibir : kering terdapat lendir yang menempel dibibir Conjungtiva : anemis Makanan : Susu 100-300 ^{cc} setiap 1 kali pemberian dan diberikan 3 sehari (Energy) : Pasien tidak bisa melakukan aktivitas dan hanya berbaring di tempat tidur BB : 75 Kg TB : 170 cm IMT : 25
	Eliminasi	BAK : 1500/hari BAB : klien belum BAB Pristraltik : 35x/m Terpasang kateter : terpasang

	Aktivitas dan Istirahat	Motorik : hemiplegi (kelemahan) Kekuatan otot : lemah
	Neurosensori	Kejang : ya kejang sebelum mengalami demam Kesadaran : coma Pupil : isokor
	Reproduksi dan Seksualitas	-
Psikologis	Nyeri Dan Kenyamanan	-
	Integritas Ego	-
	Pertumbuhan dan Perkembangan	-
Perilaku	Kebersihan Diri	Kesadaran : coma Kebersihan : Pasien tampak kurang bersih terdapat daki Mukosa bibir: tampak kering kototr terdapat lendir dan daki

	Penyuluhan dan Pembelajaran	-
Relasional	Interaksi Sosial	-
Lingkungan	Keamanan dan Proteksi	

Tabel 1.5 Klasifikasi Data

Klasifikasi Data

Data Subjektif	Data Objektif
<p>Data subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keluarga pasien mengatakan suara nafas pasien seperti banyak dahak 2. keluarga pasien mengatakan di mulut pasien banyak kotoran dan lendir 	<p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mulut pasien tampak kurang bersih, terdapat kotoran dan lendir atau sputum 2. suara nafas pasien berbunyi wheezing 3. terpasang alat penunjang pernapasan seperti, OPA, ETT, dan ventilator 4. pasien tampak mengalami penurunan kesadaran 5. prekuensi napas 26x/m
<p>Data subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keluarga pasien mengatakan awalnya pasien kejang lalu mengigil 2. keluarga pasien mengatakan badan pasien hangat sekali 	<p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasien tampak mengigil 2. suhu tubuh pasien 39.8 3. tampak luka bekas operasi pada bagian kepala kanan 4. pemeriksaan lab MON 10,3
<p>Data subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien tampak kurang bersih terdapat daki pada daerah lipatan leher 2. keluarga pasien mengatakan semenjak pasien masuk rumah sakit ia belum pernah mandi ataupun di waslap 2. Keluarga pasien mengatakan pasien belum pernah diganti sarung yang di pakai 	<p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien tampak kurang bersih terdapat daki pada daerah kepala, leher, lipatan ekstremitas dan sarung pasien tampak kotor

Analisa Data

Tabel 1.6 Analisa Data

Data	Etiologi	Masalah
<p>Data subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keluarga pasien mengatakan suara nafas pasien seperti banyak dahak 2. keluarga pasien mengatakan di mulut pasien banyak kotoran dan lendir <p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mulut pasien tampak kurang bersih, terdapat kotoran dan lendir atau sputum 2. suara nafas pasien berbunyi wheezing 3. terpasang alat penunjang pernapasan seperti, OPA, ETT, dan ventilator 4. pasien tampak mengalami penurunan kesadaran 5. prekuensi napas 26x/m 	<p>Cedera kepala</p> <p>↓</p> <p>Cedera otak primer</p> <p>↓</p> <p>kerusakan sel otak meningkat</p> <p>↓</p> <p>meningkatkan tahanan simpatik dan naskuler</p> <p>↓</p> <p>penurunan tekanan pembuluh darah pulmonal</p> <p>↓</p> <p>peningkatan tekanan hidrostatik</p> <p>↓</p> <p>kebocoran cairan kapiler</p> <p>↓</p> <p>edema paru</p> <p>↓</p> <p>penumpukan cairan atau sekret</p> <p>↓</p> <p>disfusi O₂ Terlambat</p> <p>↓</p> <p>ketidak efektifan bersihan jalan nafas</p>	<p>Bersihan jalan napas tidak efektif</p>
<p>Data subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keluarga pasien mengatakan awalnya pasien kejang lalu mengigil 2. keluarga pasien mengatakan badan pasien hangat sekali <p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasien tampak mengigil 2. suhu tubuh pasien 39.8 3. tampak luka bekas operasi 	<p>Cedera kepala</p> <p>↓</p> <p>Pendarahan pada epidural</p> <p>↓</p> <p>MON meningkat</p> <p>↓</p> <p>Peningkatan suhu tubuh</p>	<p>Hipertermia</p>

<p>pada bagian kepala kanan 4. pemeriksaan lab MON 10,3</p>	<p>Hipertermia</p>	
<p>Data subjektif: 1. Pasien tampak kurang bersih terdapat daki pada daerah lipatan leher 2. keluarga pasien mengatakan semenjak pasien masuk rumah sakit ia belum pernah mandi ataupun di waslap 2. Keluarga pasien mengatakan pasien belum pernah diganti sarung yang di pakai</p> <p>Data objektif: 1. Pasien tampak kurang bersih terdapat daki pada daerah kepala, leher, lipatan ekstremitas dan sarung pasien tampak kotor</p>	<p>Penurunan kesadaran ↓ Ketidak mampuan membersihkan diri ↓ Terdapat daki pada daerah lipatan leher dan ekstremitas ↓ Defisit perawatan diri</p>	<p>Defisit perawatan diri</p>

Berdasarkan teori keperawatan Virginia Henderson yang memandang sebagai 14 kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi dalam memperoleh sehat maka didapatkan masalah dalam proses kategorisasi data, klasifikasi data dan analisa data kasus ini mempunyai masalah pada bagian biologis, dengan masalah:

1. tidak mampu bernafas secara normal
2. tidak mampu mempertahankan suhu tubuh
3. tidak mampu mempertahankan kebersihan tubuh

Maka dapat di tegakkan 3 diagnosis keperawatan diantara:


B. Diagnosis Keperawatan

Penentuan diagnosis berdasarkan SDKI DPP PPNI, (2016)

1. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran buktikan dengan terpasangnya alat bantu kepatenan jalan nafas

seperti, OPA, ETT, ventilator dan tampak banyak lendir di jalan napas berwarna coklat

2. Hipertermi berhubungan dengan proses inflamasi atau infeksi buktikan dengan pasien tampak mengigil dan suhu 39.8
3. Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan kesadaran dibuktikan dengan pasien tidak mampu melakukan perawatan secara mandiri



C. Intervensi Keperawatan

Penentuan intervensi keperawatan berdasarkan (SDKI DPP PPNI, 2016), (SLKI PPNI, 2018), dan (SIKI DPP PPNI, 2018)

Tabel 1. 7 Intervensi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan Dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
1	<p>Bersihkan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran ditandai dengan terpasangnya alat bantu kepatenan jalan nafas seperti, OPA, ETT, ventilator dan tampak banyak lendir di mulut serta bunyi nafas wheezing</p> <p>Data subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keluarga pasien mengatakan suara nafas pasien seperti banyak dahak 2. keluarga pasien mengatakan di mulut pasien banyak kotoran dan lendir <p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mulut pasien tampak kurang bersih, terdapat kotoran dan lendir atau sputum 2. suara nafas 	<p>Pertukaran Gas Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam oksigenasi dan/atau eliminasi karbondioksida pada membran alveolus-kapiler Normal.</p> <p>Kriteria Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memburuk: 1 2. Cukup memburuk: 2 3. Sedang: 3 4. Cukup membaik: 4 5. Membaik: 5 <ol style="list-style-type: none"> a) Batuk efektif b) Produksi sputum c) Mengi d) Sianosis e) Gelisah f) Pola nafas 	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor pola napas 2. Monitor bunyi napas tambahan (mis:gurgling, mengi, wheezing, ronghi) 3. Monitor sputum (jumlah,warna,aroma) <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertahankan kepatenan jalan napas 2. Posisikan semi fowler atau fowler 3. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, <i>jika tidak kontraindikasi</i> <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, <i>jika perlu</i> 2. Pemantauan Respirasi 	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengetahui pola nafas pasien 5. Mengetahui bunyi nafas tambahan pasien 6. Mengetahui jumlah dan warna sputum pasien <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Menjaga kebersihan jalan nafas pasien 7. Pmengatur posisi pasien dengan kepala lebih tinggi 8. Membersihkan jalan nafas kurang dari 15 detik <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyarankan pemberian asupan cairan 2000ml <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bekerjasama dalam pemberian obat pengencer lendir 4. Memantau pernapasan

	<p>pasien berbunyi wheezing</p> <p>3. terpasang alat penunjang pernapasan seperti, OPA, ETT, dan ventilator</p> <p>4. pasien tampak mengalami penurunan kesadaran</p> <p>5. prekuensi napas 26x/m</p>			
--	---	--	---	--


No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan Dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
2	Hipertermi berhubungan dengan proses	Termoregulasi Tujuan: Setelah dilakukan tindakan	Manajemen Hipertermia Observasi: 1. Identifikasi penyebab hipertermia (mis.	Manajemen Hipertermia Observasi: 1. Mengetahui Penyebab hipertermia

<p>inflamasi atau infeksi ditandai dengan pasien tampak mengigil suhu 39.8</p> <p>Data subjektif</p> <p>1. keluarga pasien mengatakan awalnya pasien kejang lalu mengigil</p> <p>2. keluarga pasien mengatakan badan pasien hangat sekali</p> <p>Data objektif:</p> <p>1. pasien tampak mengigil</p> <p>2. suhu tubuh pasien 39.8</p> <p>3. tampak luka bekas operasi pada bagian kepala kanan</p> <p>4.</p>	<p>keperawatan 1x8 jam diharapkan suhu tubuh tetap berada pada rentang normal</p> <p>Kriteria Hasil:</p> <p>Meningkat: 1 Cukup meningkat: 2 Sedang: 3 Cukup menurun: 4 Menurun: 5</p> <p>Mengigil</p> <p>Memburuk: 1 Cukup memburuk: 2 Sedang: 3 Cukup membaik: 4 Membaik: 5</p> <p>Suhu tubuh Suhu kulit</p>	<p>dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Monitor suhu tubuh 3. Monitor kadar elektrolit 4. Monitor haluaran urine 5. Monitor komplikasi akibat hipertermia <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan lingkungan yang dingin 2. Longgarkan atau lepaskan pakaian 3. Basahi atau kompres hangat 4. Berikan cairan oral <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan tirah baring <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memperhatikansuhu tubuh 3. Memperhatikan kadar elektrolit 4. Meghitung pengeluaran urine 5. memperhatikan komplikasi akibat hipertermia <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sediakan lingkungan dingin 2. Longgarkan atau lepaskan pakaian 3. Basahi atau kompres hangat 4. Berikan cairan oral <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyarangkan istirahat total <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemberian cairan dan elektrolit intravena
--	---	--	--

	pemeriksaan lab MON 10,3		
--	-----------------------------	--	--

No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan Dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
3	<p>Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan kesadaran ditandai dengan pasien tampak kurang bersih dan belum di waslap</p> <p>Data subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien tampak kurang bersih terdapat daki pada daerah lipatan leher keluarga pasien mengatakan semenjak pasien masuk rumah sakit ia belum pernah mandi ataupun di waslap Keluarga pasien mengatakan pasien belum pernah diganti sarung yang di pakai <p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien tampak kurang bersih terdapat daki pada daerah kepala, 	<p>Perawatan Diri Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan perawatan diri meningkat</p> <p>Kriteria Hasil: Menurun: 1 Cukup menurun: 2 Sedang: 3 Cukup meningkat: 4 Meningkat: 5</p> <ol style="list-style-type: none"> Kemampuan mandi Kemampuan mengenakan pakaian Kemampuan makan Kemampuan ke toilet (BAK dan BAB) Verbalisasi diri keinginan untuk melakukan perawatan diri Mempertahankan kebersihan mulut 	<p>Dukungan Perawatan Diri Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi kebersihan tubuh pasien Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sediakan lingkungan yang terapeutik Siapkan keperluan pribadi pasien Jadwalkan perawatan diri pasien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Anjurkan melakukan keluarga melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan kepada pasien Ajarkan cara membersihkan diri pasien 	<p>Dukungan Perawatan Diri Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memeriksa kebersihan tubuh pasien Mengetahui kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sediakan lingkungan yang terapeutik Siapkan keperluan pribadi pasien Jadwalkan perawatan diri pasien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Anjurkan melakukan keluarga melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan kepada pasien Ajarkan cara membersihkan diri pasien

	leher, lipatan ekstremitas dan sarung pasien tampak kotor			
--	--	--	--	--



D. Implementasi

Rabu 13 April 2021

Tabel 1. 8 Implementasi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Hari, Tgl./ Jam	Implementasi	Nama Jelas
1	<p>Bersihkan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran ditandai dengan terpasangnya alat bantu kepatenan jalan nafas seperti, OPA, ETT, ventilator dan tampak banyak lendir di mulut serta bunyi nafas ronghi</p> <p>Data subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keluarga pasien mengatakan suara nafas pasien seperti banyak dahak 2. keluarga pasien mengatakan di mulut pasien banyak kotoran dan lendir <p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mulut pasien tampak kurang bersih, terdapat kotoran dan lendir atau sputum 2. suara nafas 	<p>Rabu 13 april 2021 Jam : 09:00-14:00 wita</p> <p>Jam 09:40 wita</p> <p>Jam 09:45 wita</p> <p>Jam 09:55</p>	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor pola napas Hasil :pernapasan 26 x/m 2. Monitor bunyi napas tambahan (mis:gurgling, mengi, wheezing, ronghi) Hasil : terdengar bunyi nafas pasien ronghi 3. Monitor sputum (jumlah,warna,aroma) Hasil : warna coklat <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertahankan kepatenan jalan napas Hasil : terpasang OPA dan alat bantu pernapasan 2. Posisikan semi fowler atau fowler Hasil : posisi pasien fowler 30-45 derajat 3. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik Hasil : section pasien atau lakukan penghisapan lendir dan lendir berkurang <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, <i>jika tidak kontraindikasi</i> Hasil: pasien minum 1000 cc ditambah susu 1000 cc/hari <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, <i>jika perlu</i> Hasil : pemberian obat section brogkodilator memperlebar dan melemaskan jalan nafas 2. Pemantauan Respirasi Hasil : observasi ttv setiap jam termasuk dan saturasi O2 TD 100/70 mmHg, N 74x/i, S 36.8 celcius, P 26x/i, GCS 10, SPO₂ 96% 	Jumasing

	<p>pasien berbunyi wheezing</p> <p>3. terpasang alat penunjang pernapasan seperti, OPA, ETT, dan ventilator</p> <p>4. pasien tampak mengalami penurunan kesadaran</p> <p>5. frekuensi napas 26x/m</p>			
2	<p>Hipertermia berhubungan dengan proses inflamasi atau infeksi ditandai dengan pasien tampak menggigil suhu 39.8</p> <p>Data subjektif</p> <p>1. keluarga pasien mengatakan awalnya pasien kejang lalu menggigil</p> <p>2. keluarga pasien</p>	<p>Jam 10:06 wita</p> <p>Jam 10:10 wita</p> <p>Jam 10: 20 wita</p>	<p>Manajemen Hipertermia</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi penyebab hipertermia (mis. dehidrasi, terpapar lingkungan panas, cedera, inflamasi penggunaan inkubator) Hasil : Pasien mengalami cedera kepala dan post op craniotomi 2. Monitor suhu tubuh setiap jam Hasil : periksa suhu tubuh setiap jam 1 38.9, jam 2 38.4, jam ke 3 38.0, jam keempat 37,5, jam kelima 36,9 celcius 3. Monitor haluaran urine Hasil : urine di buang setiap jam 7 pagi 1000-1500 cc/ 1kali buang 4. Monitor komplikasi akibat hipertermia Hasil : periksa tanda tanda sesudah terjadi hipertermia <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan lingkungan yang menyesuaikan suhu seperti dingin 	Jumasing


	<p>mengatakan badan pasien hangat sekali</p> <p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasien tampak mengigil 2. suhu tubuh pasien 39.8 3. tampak luka bekas operasi pada bagian kepala kanan 4. pemeriksaan lab MON 10,3 	<p>Jam 10: 30</p> <p>Jam 10 :40</p>	<p>Hasil : menurunkan temperature ruangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Longgarkan atau lepaskan pakaian Hasil : pakaian pasien dilonggarkan dan diberikan edukasi terkait cara tidak menggunakan pakaian tebal kalau perlu tidak menggunakan bahu dan celana 3. Basahi atau kompres hangat Hasil : kompres pasien menggunakan kain dan air hangat <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan tirah baring Hasil : pasien bedres total <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena Hasil : Terpasang cairan infus RL dan KN3B 	
3	<p>Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan kesadaran ditandai dengan pasien tampak kurang bersih dan belum di waslap</p> <p>Data subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien tampak kurang bersih terdapat daki pada daerah lipatan leher 2. keluarga pasien mengatakan semenjak pasien masuk rumah sakit ia belum pernah mandi ataupun di waslap 2. Keluarga pasien 	<p>Jam 11:00 wita</p> <p>Jam 11: 10 wita</p> <p>Jam 11: 20 wita</p>	<p>Dukungan Perawatan Diri</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kebersihan tubuh pasien Hasil : Keluarga pasien mengatakan belum pernah mandi semenjak di rs 2. Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan Hasil : pasien dibantu secara full krna pasien merupakan pasien dengan penurunan kesadaran <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan keperluan pribadi pasien Hasil : disiapkan tissue basa dengan keluarga 2. Jadwalkan perawatan diri pasien Hasil : 2 kali sehari melakukan lap pake tissue basa <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan keluarga melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan kepada pasien Hasil : keluarga membersihkan pasien setiap pagi dan sore 2x1 2. Ajarkan cara membersihkan diri pasien Hasil : membersihkan diri pasien dengan menggunakan tissue basa 	Jumasing

	<p>mengatakan pasien belum pernah diganti sarung yang di pakai</p> <p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien tampak kurang bersih terdapat daki pada daerah kepala, leher, lipatan ekstremitas dan sarung pasien tampak kotor			
--	--	--	---	--

Kamis 14 April 2021

No	Diagnosis Keperawatan	Hari, Tgl./ Jam	Implementasi	Nama Jelas
1	<p>Bersihkan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran ditandai dengan terpasangnya alat bantu kepatenan jalan nafas seperti, OPA, ETT, ventilator dan tampak banyak lendir di mulut serta bunyi nafas ronghi</p> <p>Data subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keluarga pasien mengatakan suara nafas pasien seperti banyak dahak 2. keluarga pasien mengatakan di mulut pasien banyak kotoran dan lendir <p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mulut pasien tampak kurang bersih, terdapat kotoran dan lendir atau sputum 2. suara nafas pasien berbunyi wheezing 3. terpasang alat penunjang 	<p>Kamis 14 april 2021 Jam : 14:00-21:00 wita</p> <p>Jam 14:30 wita</p> <p>Jam 15:40 wita</p> <p>Jam 16:00</p>	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor pola napas Hasil :pernapasan 26 x/m 2. Monitor bunyi napas tambahan Hasil : bunyi nafas tambahan sudah tidak ada lagi 3. Monitor sputum (jumlah,warna,aroma) Hasil : sputum berkurang dan warna sputum coklat <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertahankan kepatenan jalan napas Hasil : Terpasang alat bantu pernapasan (Rencana Pelepasan Ventilator dan ETT) 2. Posisikan semi fowler atau fowler Hasil : posisi pasien fowler 30-45 derajat 3. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 5-10 detik Hasil : lendir dan lendir berkurang <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, <i>jika tidak kontraindikasi</i> Hasil: pasien minum 1000 cc ditambah susu 1000 cc/hari 2. Pemantauan Respirasi Hasil : observasi ttv setiap jam termasuk dan saturasi O2 TD 100/70 mmHg, N 74x/i, S 36.8 celcius, P 26x/i, GCS 12, SPO₂ 98% 	<p>Jumasing</p>

	<p>pernapasan seperti, OPA, ETT, dan ventilator</p> <p>4. pasien tampak mengalami penurunan kesadaran</p> <p>5. prekuensi napas 26x/m</p>			
2	<p>Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan kesadaran ditandai dengan pasien tampak kurang bersih dan belum di waslap</p> <p>Data subjektif:</p> <p>1. Pasien tampak kurang bersih terdapat daki pada daerah lipatan leher</p> <p>2. keluarga pasien mengatakan semenjak pasien masuk rumah sakit ia belum pernah mandi ataupun di waslap</p> <p>2. Keluarga pasien mengatakan pasien belum pernah diganti sarung yang di pakai</p>	<p>Jam 19:10wita</p> <p>Jam 19: 30 wita</p> <p>Jam 20: 20 wita</p>	<p>Dukungan Perawatan Diri</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kebersihan tubuh pasien Hasil : Keluarga pasien mengatakan belum pernah mandi semenjak di rs 2. Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan Hasil : pasien dibantu secara full karena pasien merupakan pasien dengan penurunan kesadaran <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan keperluan pribadi pasien Hasil : disiapkan tissue basa dengan keluarga 2. Jadwalkan perawatan diri pasien Hasil : 2 kali sehari melakukan lap pake tissue basa <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan keluarga melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan kepada pasien Hasil : keluarga membersihkan pasien setiap pagi dan sore 2x1 2. Ajarkan cara membersihkan diri pasien Hasil : membersihkan diri pasien dengan menggunakan tissue basa 	Jumasing

	<p>Data objektif:</p> <p>1. Pasien tampak kurang bersih terdapat daki pada daerah kepala, leher, lipatan ekstremitas dan sarung pasien tampak kotor</p>			
--	--	--	---	--

Jum'at 15 April 2021

No	Diagnosis Keperawatan	Hari, Tgl./ Jam	Implementasi	Nama Jelas
1	<p>Bersihkan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran ditandai dengan terpasangnya alat bantu kepatenan jalan nafas seperti, OPA, ETT, ventilator dan tampak banyak lendir di mulut serta bunyi nafas ronchi</p> <p>Data subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keluarga pasien mengatakan suara nafas pasien seperti banyak dahak 2. keluarga pasien mengatakan di mulut pasien banyak kotoran dan lendir <p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mulut pasien tampak kurang bersih, terdapat kotoran dan lendir atau sputum 2. suara nafas pasien berbunyi wheezing 3. terpasang alat penunjang 	<p>Rabu 13 april 2021 Jam : 09:00-14:00 wita</p> <p>Jam 09:40 wita</p> <p>Jam 09:45 wita</p> <p>Jam 09:55</p>	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor pola napas Hasil :pernapasan 25 x/m 2. Monitor bunyi napas tambahan Hasil : Bunyi napas tambahan berkurang <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertahankan kepatenan jalan napas Hasil : selang ETT sudah di aff terapi oksigen nasal canul lanjut 2. Posisikan semi fowler atau fowler Hasil : posisi pasien fowler 30-45 derajat 3. Lakukan pehisapan Saat terdengar bunyi napas tambahan Hasil : lakukan section <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, <i>jika tidak kontraindikasi</i> Hasil: pasien minum 1000 cc ditambah susu 1000 cc/hari <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian terapi O₂ 2. Hasil : pemberian menggunakan nasal Canul 3. Pemantauan Respirasi Hasil : observasi ttv setiap jam termasuk dan saturasi O₂ TD 100/70 mmHg, S 36,7 celcius, N 76x/i, P 26x/i, GCS 12, SPO₂ 98% 	Jumasing

	<p>pernapasan seperti, OPA, ETT, dan ventilator</p> <p>4. pasien tampak mengalami penurunan kesadaran</p> <p>5. prekuensi napas 26x/m</p>			
--	---	--	--	--

2	<p>Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan kesadaran ditandai dengan pasien tampak kurang bersih dan belum di waslap</p> <p>Data subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien tampak kurang bersih terdapat daki pada daerah lipatan leher 2. keluarga pasien mengatakan semenjak pasien masuk rumah sakit ia belum pernah mandi ataupun di waslap 2. Keluarga pasien mengatakan pasien belum pernah diganti sarung yang di pakai <p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien tampak kurang bersih terdapat daki pada daerah kepala, leher, lipatan ekstremitas dan sarung pasien tampak kotor 	<p>Jam 11:00 wita</p> <p>Jam 11: 10 wita</p> <p>Jam 11: 20 wita</p>	<p>Dukungan Perawatan Diri</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kebersihan tubuh pasien Hasil : Keluarga pasien mengatakan belum pernah mandi semenjak di rs 2. Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan Hasil : kebutuhan pasien dibantu secara full <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan keperluan pribadi pasien Hasil : disiapkan tissue basa dengan keluarga 2. Jadwalkan perawatan diri pasien Hasil : 2 kali sehari melakukan lap pake tissue basa <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan keluarga melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan kepada pasien Hasil : keluarga membersihkan pasien setiap pagi dan sore 2x1 2. Ajarkan cara membersihkan diri pasien Hasil : membersihkan diri pasien dengan menggunakan tissue basa 	Jumasing
---	--	--	--	----------

E. Evaluasi

Rabu 13 April 2021

Tabel 1.9 Evaluasi Keperawatan

No	Diagnosis	Hari, Tgl./ Jam	Evaluasi	Nama Jelas
1	Bersihkan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran ditandai dengan terpasangnya alat bantu kepatenan jalan nafas seperti, OPA, ETT, ventilator dan tampak banyak lendir di mulut serta bunyi nafas ronghi	Rabu 13 April 2021 Jam 13:00 wita	<p>S: Keluarga pasien mengatakan pasien mulai merespon ketika diberikan sentuhan</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum: lemah, Kesadaran pasien membaik 2. Terpasan oksigen ventilator 3. Terpasang alat monitor 4. Dilakukan section 5-10 detik 5. Kesadaran menurun 6. Nilai GCS: 10 7. RR: 26x/m 8. Suhu: 36.8 celcius 9. TD: 100/70 mmHg 10. SPO₂ 96% <p>A: Ketidak efektifan bersihan jalan nafas mulai teratasi</p> <p>P: Lanjutkan Intervensi Kamis Tgl 14 April 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor jalan nafas dan pola pernapasan 2. Pertahankan kepatenan jalan nafas Rencana Pelepasan Selang ETT 3. Obsevasi KU TTV pasien/ jam 4. Lakukan intervensi head up 5. Tindakan kolaborasi section 5-10 detik 	Jumasing
2	Hipertermi berhubungan dengan proses inflamasi atau infeksi ditandai dengan pasien tampak mengigil suhu 39.8	Jam 13:10 wita	<p>S: keluarga pasien mengatakan pasien sudah tidak demam lagi</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum kesadaran menurun 2. Nilai GCS:12 3. Suhu: 36,8 celcius 	Jumasing

			<p>4. TD: 100/70 mmHg 5. N: 74x/m 6. RR: 26x/m 7. SPO₂ 96%</p> <p>A: masalah hipertermia Teratasi P : Hentikan Intervensi</p>	
3	Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan kesadaran ditandai dengan pasien tampak kurang bersih dan belum di waslap	Jam 13: 30 wita	<p>S: Keluarga pasien mengatakan ia rajin membersihkan bagian tubuh pasien dengan waslap O: 1. pasien tampak bersih 2. bagian tubuh pasien yang kotor sudah di bersikan 3. perawatan diri rutin dilakukan keluarga untuk menjaga kebersihan tubuh pasien A: Masalah devisit perawatan diri Mulai teratasi P: Lanjutkan intervensi Kamis Tgl 14 April 2021 1. menganjurkan keluarga melakukan perawatan diri kepada pasien sebanyak 2x1sehari</p>	Jumasing

Kamis 14 April 2021

No	Diagnosis	Hari, Tgl./ Jam	Evaluasi	Nama Jelas
1	Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran ditandai dengan terpasangnya alat bantu kepatenan jalan nafas seperti, OPA, ETT, ventilator dan tampak banyak lendir di mulut serta bunyi nafas ronghi	Kamis 14 April 2021 Jam 20:00 wita	S:- O: 1. Keadaan umum: lemah, Kesadaran mulai membaik 2. Terpasan oksigen 3. Terpasang alat monitor 4. Dilakukan section 5-10 detik 5. Nilai GCS: 12 6. RR: 25x/m 7. Suhu: 36.7 celcius 8. TD: 100/70 mmHg 9. SPO ₂ 96% A: Ketidak efektifan bersihan jalan nafas mulai teratasi P: Lanjutkan Intervensi Jum'at Tgl 15 April 2021 1. Monitor jalan nafas dan pola pernapasan 2. Pertahankan kepatenan jalan nafas 3. Obsevasi KU TTV pasien/ jam 4. Lakukan intervensi head up 5. Tindakan kolaborasi section setiap 20 menit	Jumasing
2	Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan kesadaran ditandai dengan pasien tampak kurang bersih dan belum di waslap	Jam 17: 00 wita	S: Keluarga pasien mengatakan ia rajin membersihkan bagian tubuh pasien dengan waslap O: 1. pasien tampak bersih 2. bagian tubuh pasien yang kotor sudah di bersikan 3. perawatan diri rutin dilakukan keluarga untuk menjaga kebersihan tubuh pasien yang mengami coma A: Masalah devisit perawatan diri mulai teratasi P: Lanjutkan intervensi Jum'at Tgl 15 April 2021 1. menganjurkan keluarga melakukan perawatan diri kepada pasien sebanyak 2x1 sehari	Jumasing

Jum'at 15 April 2021

No	Diagnosis	Hari, Tgl./ Jam	Evaluasi	Nama Jelas
1	Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran ditandai dengan terpasangnya alat bantu kepatenan jalan nafas seperti, OPA, ETT, ventilator dan tampak banyak lendir di mulut serta bunyi nafas ronghi	Jum'at 15 April 2021 Jam 22:00 wita	<p>S: keluarga pasien mengatakan pasien mulai merasakan respon ketikan diajak berkomunikasi</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum: lemah 2. Terpasan oksigen 3. Terpasang alat monitor 4. Nilai GCS: 12 5. RR: 25x/m 6. Suhu: 36.7 celcius 7. TD: 100/70 mmHg 8. SPO₂: 98% <p>A: Ketidak efektifan bersihan jalan nafas mulai teratasi</p> <p>P: Lanjutkan Intervensi Sabtu 16 April 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor jalan nafas dan pola pernapasan 2. Pertahankan kepatenan jalan nafas 3. Obsevasi KU TTV pasien/ jam 4. Lakukan intervensi head up 5. Lakukan section saat terdengar bunyi nafas tambahan 	Jumasing
2	Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan kesadaran ditandai dengan pasien tampak kurang bersih dan belum di waslap	Jam 07: 30 wita	<p>S: Keluarga pasien mengatakan ia rajin membersihkan bagian tubuh pasien dengan waslap</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasien tampak bersih 2. bagian tubuh pasien yang kotor sudah di bersikan 3. perawatan diri rutin dilakukan keluarga untuk menjaga kebersihan tubuh pasien yang mengami coma <p>A: Masalah devisit perawatan diri mulai teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi Sabtu 16 April 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menganjurkan keluarga melakukan perawatan diri kepada pasien sebanyak 2x1 sehari 	Jumasing

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Kasus

1. Pengkajian

Pada kasus laporan akhir ners ini pasien mengalami epidural hematoma post op craniotomy yang disebabkan oleh faktor kecelakaan kerja. Hasil pengkajian Tn. J umur 40 tahun masuk ICU dengan keluhan penurunan kesadaran, TD 100/70mmHg, Nadi 100x/m, suhu 39.8 cecius, pernapasan 26x/m saturasi oksigen 98x/m, GCS: 7 kesadaran coma, pemeriksaan Labolatorium MON 10,3, pasien memiliki riwayat pekerjaan sebagai buruh bangunan dan riwayat jatuh yang mengakibatkan retak pada kepala bagian kanan sehingga dilakukan pemeriksaan MRI atau CT Scan kepala yang menemukan hasil adanya cedera kepala epidural hematoma dan dilakukan operasi craniotomy setelah dilakukan operasi klien masih mengalami coma, klien dibantu pernapasannya dengan menggunakan ventilator, terpasang selang ETT, OPA, klien sudah beberapa hari tidak mandi, klien tampak terlihat kurang bersih, terdapat sekret pada jalan nafas, kotoran di daerah lipatan, dinstruksikan untuk dilakukan section. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, (2013) yang mengatakan bahwa pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien yang dicurigai cedera kepala adalah CT-Scan atau MRI (tanpa kontras) yang mengidentifikasi luasnya lesi, perdarahan, determinan ventrikuler, dan perubahan jaringan otak sebelum ditegakkan diagnosa dan dilakukan

operasi. (Luci Riani Br, 2020) mengatakan dalam bukunya bahwa tindakan yang dilakukan pada kasus epidural hematoma adalah operasi craniotomy yang merupakan tindakan pelepasan basis cranii pada kepala dan mengatasi pendarahan yang ada pada lapisan epidural guna sebagai tindakan yang dilakukan untuk menghentikan pendarahan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya cedera kepala seperti, kecelakaan lalulintas, kecelakaan kerja, cedera berolahraga, kekerasan dalam rumah tangga, penggunaan alat peledak, guncangan tubuh yang berlebihan (*shaken baby syndrome*). Penyebab lain yang mengakibatkan

Terjadinya cedera kepala dengan klasifikasi epidural hematoma selain kecelakaan kerja adalah kerja kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan bermotor, jatuh atau tertimpa benda berat (benda tumpul), serangan atau kejahatan (benda tajam), pukulan (kekerasan, akibat luka tembak) dan kecelakaan olahraga. sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Hoffman, J.M., Lucas, S., Dikmen, S., 2011) yang mengatakan bahwa Jumlah pasien cedera kepala yang masuk rumah sakit sekitar satu juta orang setiap tahun di Eropa. Sekitar 50% disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor dan cedera kepala yang disebabkan oleh kecelakaan kerja diperkirakan sekitar 300.000 orang tiap tahunnya. Kondisi ini telah disampaikan dalam Al-Qur'an

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

“Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh

perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah swt memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)” (QS: Asy-shura:30)

2. Diagnosis Keperawatan

Teori Virginia Henderson mengatakan dalam teorinya mengatakan bahwa 14 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi untuk dikatakan sehat yang memandang manusia sebagai makhluk yang membutuhkan bantuan, yang terdiri dari bagian biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai sehat berdasarkan hasil proses pengkajian sampai dengan analisa data pada kasus ini didapatkan, dari 14 kebutuhan dasar Manusia menurut Virginia Henderson terdapat masalah pada bagian psikologis dengan 3 masalah yaitu pasien yang tidak mampu bernapas secara normal, suhu tubuh pasien tidak mampu dipertahankan yaitu 39,8 celcius, dan tidak mampu mempertahankan kebersihan tubuh secara mandiri Maka diagnosis keperawatan yang ditegakkan pada kasus ini adalah

- a. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran buktikan dengan terpasangnya alat bantu kepatenan jalan nafas seperti, OPA, ETT, ventilator dan tampak banyak lendir di jalan napas berwarna coklat.

Keluhan utama pasien yang didapatkan dari hasil pengkajian adalah penurunan kesadaran. Hasil pengkajian didapatkan nilai GCS: 7, E: merespon nyeri (2), M:menarik area yang nyeri (4), V: tidak ada respon (1). Penurunan kesadaran adalah suatu keadaan dimana tidak

adanya respon fisiologis terhadap stimulus eksternal atau kebutuhan dalam diri sendiri yang disebabkan oleh cedera kepala, misalnya pendarahan serebral menimbulkan hematoma pada kasus epidural hematoma (Sarasawati, 2020). Pada kejadian cedera kepala akan mengganggu fungsi retikular activating system secara langsung maupun tidak langsung, seperti disfungsi otak difus yang dimana terjadinya kerusakan thalamus yang berat akan mengakibatkan terputusnya impuls talamokortikal atau destruksi neuron-neuron yang diakibatkan oleh cedera ataupun hematoma yang akan mempengaruhi kesadaran sehingga pasien yang menderita cedera kepala mengalami penurunan kesadaran yang durasinya sesuai dengan tingkat cedera, tingkat cedera kepala ringan dengan nilai GCS 13-15 kehilangan kesadaran <20 menit, cedera kepala sedang GCS 9-12 kehilangan kesadaran >20 menit dan dibawah <36 jam, cedera kepala berat dengan GCS 3-8 kehilangan kesadaran >36 jam (Ika Rahmawati, 2018). penjelasan diatas sesuai dengan realita yang didapatkan pada kasus cedera kepala yang ada pada ICU rumah sakit yang dimana rata-rata pasien cedera kepala berat mengalami penurunan kesadaran diatas 36 jam.

Diagnosis keperawatan utama pada kasus ini adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Masalah ini didapatkan pada saat selesai dilakukan pengkajian pada pasien saat di rawat di ruang ICU dengan data pernapasan 30x/m, sputum/ sekret yang berlebihan ditandai dengan suara napas wheezing. Hal ini sejalan dengan Anderson, (2012) yang

menuliskan dalam bukunya bahwa pasien yang mengalami cedera kepala dengan cedera otak primer mengakibatkan kerusakan sel otak yang memicu terjadi peningkatan tahanan sistemik dan vaskuler sehingga terjadi penurunan tekanan pembuluh darah pulmonal, peningkatan tekanan hidrostatik, kebocoran cairan kapiler, oedema paru, penumpukan cairan atau sekret, dan difusi O₂ terlambat yang akan meningkatkan frekuensi pernapasan pasien serta penumpukan sekret menyebabkan jalan napas cenderung menyempit sehingga udara yang masuk kedalam tubuh lebih sedikit

- b. Hipertermi berhubungan dengan proses inflamasi atau infeksi buktikan dengan pasien tampak mengigil dan suhu 39.8

Diagnosis keperawatan kedua pada kasus ini adalah hipertermia. Diagnosis ini juga didapatkan setelah dilakukan pengkajian dengan data pasien tampak mengigil, mengigil adalah respon alamiah tubuh terhadap berbagai kondisi yang menyebabkan otot tubuh berkontraksi secara cepat dan berulang untuk meningkatkan suhu tubuh, mengigil bukan penyakit akan tetapi jika mengigil disertai dengan peningkatan suhu tubuh, maka dapat menjadi tanda bahwa tubuh sedang mengalami peradangan atau infeksi (Padila, 2012). Hasil pemeriksaan lab di dapatkan MON 10,3 yang artinya meningkat keadaan ini perlu di waspadai karena tingginya kadar monosit sel darah putih keseluruhan dapat menyebabkan terjadinya infeksi yang akan memicu terjadinya peningkatan suhu tubuh. Peningkatan suhu tubuh 39,8 derajat celcius.

Peningkatan suhu tubuh pada pasien cedera kepala disebabkan oleh inflamasi, kerusakan bagian otak atau infeksi sekunder ditandai dengan tampak luka bekas operasi. Hal ini mengakibatkan peningkatan metabolisme yang dapat memperburuk kondisi pasien, meningkatkan lama hari rawat, dan menambah resiko kematian (Cherie Mininger, 2012). Oleh karena itu pada pasien epidural hematoma sangat rentang terjadi infeksi yang mengakibatkan peningkatan suhu tubuh seperti pada kasus diatas mengalami peningkatan suhu tubuh 39,8 celcius yang ketika tidak diatasi dengan cepat akan mengakibatkan kerusakan otak yang mengakibatkan kecatatan seumur hidup bahkan kematian. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa sebanyak 230.000 orang dirawat inap dan hidup, sekitar 80.000 orang dipulangkan dengan cacat yang disebabkan oleh cedera kepala, dan 50.000 orang meninggal karena cedera kepala (Trevana L, 2011)

- c. Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan kesadaran dibuktikan dengan pasien tidak mampu melakukan perawatan secara mandiri.

Diagnosis keperawatan yang ketiga adalah defisit perawatan diri dengan data subjektif pasien tampak kurang bersih terdapat daki pada daerah lipatan leher, keluarga pasien mengatakan semenjak pasien masuk rumah sakit ia belum pernah mandi ataupun di waslap, keluarga pasien mengatakan pasien belum pernah diganti sarung yang di pakai. Sedangkan Data objektif adalah pasien tampak kurang bersih terdapat

daki pada daerah kepala, leher, lipatan ekstremitas dan sarung pasien tampak kotor, berdasarkan ketiga diagnosis keperawatan yang ada maka akan dilanjutkan pada tahap intervensi keperawatan

B. Analisis Intervensi, Implementasi dan Evaluasi

Analisis intervensi hipertermia pada pasien epidural hematoma post op berdasarkan (SIKI DPP PPNI, 2018) adalah Manajemen Hipertermia dengan Observasi: penyebab, Monitor suhu tubuh, Monitor kadar elektrolit, Monitor haluaran urine, Monitor komplikasi akibat hipertermia. Terapeutik: Sediakan lingkungan yang dingin, Longgarkan atau lepaskan pakaian, Basahi atau kompres hangat, Berikan cairan oral. Edukasi: Anjurkan tirah baring, Kolaborasi: Kolaborasi pemberian cairan elektrolit intravena dan anti piretik jika perlu. Tindakan utama yang diberikan pada diagnosis hipertermia adalah kompres hangat.

Sejalan dengan penelitian Sarah Fadillah, (2019) bahwa penanganan pada pasien dewasa yang mengalami masalah hipertermi adalah kompres hangat yang dilakukan selalama tiga hari dengan terbukti dapat menurunkan suhu tubuh. Studi yang dilakukan oleh Kahinedan, (2017) untuk membuktikan apakah kompres hangat dapat menurunkan suhu tubuh, hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil perawatan menunjukkan bahwa terjadi penurunan setelah dilakukan kompres air hangat setiap jamnya jam pertama 38,9 celcius, jam kedua 38,5 celcius, jam ketiga 38,0. Berdasarkan hasil penurunan suhu tubuh pada pasien yang diberikan kompres hangat. Sejalan dengan penitian sebelumnya yang mengatakan bahwa penurunan suhu tubuh

pada kompres hangat menurun 0,4 setiap jamnya (Windawati, 2020).

Sedangkan penelitian yang dilakukan (Ika Rahmawati, 2018) mengatakan terjadi penurunan suhu tubuh pada pasien trauma kepala yang di berikan kompres hangat dengan hasil uji *Mann whitney* menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang artinya kompres hangat efektif untuk menurunkan suhu tubuh pasien trauma kepala. Intervensi Kompres hangat ini tidak berjalan sendiri, kolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya juga dilakukan seperti pemberian obat untuk mengatasi hipertermi yang dialami pasien. Penelitian lainnya yang mengatakan bahwa kompres hangat dengan teknik seka dapat menurunkan suhu tubuh dengan satu kali pemberian yang dilakukan oleh 20 responden dan dari 20 responden semuanya mengalami penurunan suhu tubuh yang signifikan dengan hasil $p\text{-value} = 0.000$ yang artinya kompres hangat terbukti menurunkan suhu tubuh pada pasien yang mengalami hipertermi (Irmachatshalihah & Alfiyanti, 2020)

Intervensi yang diberikan untuk mengatasi bersihan jalan nafas adalah yang pertama indentifikasi jalan nafas, monitor jalan nafas, lakukan section 5-10 detik kemudian berikan posisi head up 30-45 derajat untuk mempertahankan ekspansi paru selain itu juga perlunya pengobservasian setiap 1 jam terkait TTV. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan pentingnya mempertahankan jalan nafas, memberikan posisi head up pada pasien dengan cedera kepala (Sumira Budi Pertami, 2017). Sedangkan penelitian (Luci Riani Br. Ginting, 2020) sedangkan dalam penelitian ini pentingnya melakukan posisi head up bagi pasien dengan cedera

kepala karena dapat memberikan elefasi pada pada kepala dan membantu dalam memperbaiki tingkat kesadaran.

Berdasarkan setelah dilakukan implementasi dilakukanlah evaluasi keperawatan untuk mengetahui hasil yang dapatkan dari implementasi dan didapatkan hasil setelah selesai melakukan implementasi adalah pada pasien dengan tiga diagnosis keperawatan masalah hipertermi teratasi dengan satu kali pemberian intervensi dan dilakukan implementasi sedangkan kedua diagnosis lainnya sudah membaik termasuk pola pernapasan kesadarannya yang meningkat yang awalnya GCS 7 menjadi GCS 10, bersihan jalan napas yang setiap jam dipantau dan di section secara rutin dan diagnosa defisit perawatan diri yang awalnya pasien kotor dantidak pernah mandi menjadi bersih karena rutin dibersihkan dengan menggunakan tissue dan waslap untuk mempertahankan kebersihan tubuh klien akan tetapi intervensi dan implementasi dari kedua diagnosis tersebut harus tetap dilanjutkan sampai pasien dapat bernapas secara normal tanpa bantuan alat bantu dan kemandirian pasien melakukan perawatan dirinya.

C. Alternatif Pemecahan Masalah

Beberapa intervensi keperawatan telah dilakukan seperti pemberian oksigen 100% dan posisi head up 30°, pemberian nutrisi enteral (NGT). Intervensi ini sesuai untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada pasien seperti pemberian oksigen 100% dan posisi head up 30°, pemberian oksigen 100% dan mengatur posisi pasien dengan posisi head up dapat mempertahankan kebutuhan oksigen pada pasien, meningkatkan saturasi,

meningkatkan nilai gcs, mencegah terjadinya perfusi jaringan serebral, memperbaiki drainase vena, perfusi serebral dan menurunkan tekanan intra kranial dan semua pasien di RSUD Labuang baji yang mengalami cedera kepala dilakukan head up hanya saja mempunyai kontra indikasi terhadap pasien yang mengalami fraktur servikal yang tidak dianjurkan untuk di head up serta tindakan kolaborasi dengan tenaga nemis lainnya yaitu melakukan section selama 5-10 detik guna untuk mengeluarkan secret yang menumpuk pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran.

Seperti yang telah dikemukakan oleh (Luci Riani Br, 2020) bahwa dari hasil penelitiannya dari 80 responden pasien cedera kepala yang dirawat di RS yang semua dilakukan head up 30° keseluruhan mengalami penurunan tekanan intrakranial yang sebelumnya semua pasien cedera kepala mengalami peningkatan intra kranial dan untuk membersihkan jalan nafas perlunya dilakukan tindakan kolaborasi section untuk mengeluarkan secret yang ada pada pasien, pemberian intervensi keperawatan pemenuhan nutrisi enteral dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien dengan pemberian susu per NGT 150 sampai 300cc per 8 jam. Sebagaimana dalam QS Al-Baqarah Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahan:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Tafsir Kemenag RI: wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya dan selain halal, makanan juga harus baik, yaitu yang sehat aman, dan tidak berlebihan. Makanan yang dimaksud disini adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah swt untuk seluruh umat manusia, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walau dengan cara yang tidak dengan ketentuan Allah. Waspadalilah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dalam segala tipu dayanya. Allah mengingatkan sungguh setan musuh nyata bagimu, wahai manusia hubungannya dengan ayat adalah pentingnya kita mengonsumsi makanan yang halal yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan tidak berlebihan dan memasukkan nutrisi ke dalam tubuh kita sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ketika stabilitas hemodinamik dicapai, nutrisi juga dapat menentukan outcome bagi pasien dari keberlangsungan hidup. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengemukakan bahwa pemberian nutrisi lebih awal secara agresif dapat meningkatkan sel CD4-CD8 dan kepekaan limfosit T, jalur pemberian nutrisi pasien disesuaikan sesuai dengan kondisi pasien formula enteral lebih dipilih karena lebih fisiologis namun perlu pengawasan metabolisme yang baik untuk mencegah efek samping seperti hiperglikemia, ketosidosis, intoleransi gaster yang mengganggu stabilitas hemodinamik (Sumira Budi Pertami, 2017). Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

Tafsir (Hai manusia) yakni penduduk mekah (sesungguhnya telah datang kepadamu kalian pelajaran dari Rabb kalian) berupa Alkitab yang didalamnya dijelaskan hal-hal yang mudarat bagi diri kalian, yaitu berupa kitab Al-Qur'an (dan penyembuh) penawar bagi penyakit-penyakit yang ada didalam dada) penyakit akidah yang merusak dan keragu-raguan (dan petunjuk) dari kesesatan (serta rahmat bagi orang-orang yang beriman) kepadanya, hubungannya dengan penelitian ini adalah sesungguhnya setiap manusia diberikan penyakit adalah suatu pembelajaran bagi kita dan diturunkan pula obat dan penawarnya bagi orang-orang yang beriman.

Setelah dilakukan implementasi keperawatan didapatkan hasil dari implementasi pemberian oksigen 100% dan head up 30° yaitu saturasi yang meningkat sampai 98%, terjadi peningkatan kesadaran atau peningkatan nilai Gcs yang awalnya 8 menjadi 12 dan tetap menjaga kebersihan jalan nafas dengan melakukan section untuk mengeluarkan secret serta menjaga kebutuhan nutrisi dengan pemberian nutrisi per enteral melalui selang NGT susu 150 sampai 300cc per 8 jam. Alternatif intervensi yang dilakukan untuk mengatasi ketiga diagnosis adalah diagnosis bersihan jalan nafas dapat dilakukan pemberian obat brongkodilator untuk memperlebar saluran pernapasan dan pemberian oksigen untuk menunjang pernapasan klien

sedangkan untuk dianosis hipertermia adalah kolaborasi pemberian antipiretik untuk menurungkan suhu tubuh jika suhu tubuh tidak kunjung turun dan devisit perawatan diri perlunya merawat atau memebersihkan dan mempertahankan kebersihan tubuh pasien untuk menunjang percepatan penyembuhan dan memenuhi salah satu item dari 14 kebutuhan dasar manusia menurut Hederson yang mengatakan seseorang dikatakan sehat apa bila memenuhi 14 kebutuhan dasar salah satunya dengan melakukan perawatan diri atau menjaga kebersihan tubuh sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Muddaththir ayat 4:

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

Terjemahan:

“dan pakaianmu bersihkanlah”.

Dimana dalam tafsir dijelaskan hendaklah engkau memakai pakin yang bersih dan bersihkanlah dirimu agar terhindar dari najis hubungannya dengan penelitian adalah dimana kita harus selalu menjaga kebersihan diri kita untuk menjahui najis

Perlunya dilakukan pengadaan bahan kompres hangat di Rumah sakit khususnya di ICU, kemudian mengkombinasi kompres hangat dengan pemberian anti piretik atau mengkombinasi terapi farmakologi dan nonfarmakologi dan pemberian terapi spiritual sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh pasien walaupun pasien mengalami penurunan kesadaran contohnya pemberian terapi murottal atau memanggil uztas pada setiap pasien di ICU dan memberikan terapi rohani dan memanggil rohanian bagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan proses asuhan keperawatan dengan pemberian kompres hangat pada pasien epidural hematoma post op craniotomy dengan masalah-masalah yang ada pada pasien teratasi dan didapatkan hasil pengkajian sampai dengan evaluasi

1. Didapatkannya pengkajian pada Tn. J umur 40 tahun masuk ICU dengan keluhan penurunan kesadaran, TD 100/70mmHg, Nadi 100x/m, suhu 39.8 cecius, pernapasan 26x/m saturasi oksigen 98x/m, GCS: 7 kesadaran coma, pemeriksaan Laboratorium MON 10,3, pasien memiliki riwayat pekerjaan sebagai buruh bangunan dan riwayat jatuh yang mengakibatkan retak pada kepala bagian kanan sehingga dilakukan pemeriksaan MRI atau CT Scan kepala yang menemukan hasil adanya cedera kepala epidural hematoma dan dilakukan operasi craniotomy setelah dilakukan operasi klien masih mengalami coma, klien dibantu pernapasannya dengan menggunakan ventilator, terpasang selang ETT, OPA, klien sudah beberapa hari tidak mandi, klien tampak terlihat kurang bersih, terdapat sekret pada jalan nafas, kotoran di daerah lipatan, dinstruksikan untuk dilakukan section
2. Didapatkan diagnosis keperawatan bersihan jalan nafas, hipertermia dan defisit perawatan diri
3. Intervensi yang digunakan adalah manajemen jalan napas, manajemen hipertermia dan dukungan perawatan diri


4. Dalam melakukan implementasi didapatkan Bersihan jalan nafas tidak efektif yang dilakukan adalah pemberian oksigen , head up dan tindakan kolaborasi dengan tenaga medis lainnya dengan melakukan section maka masalah yang terjadi dapat teratasi dengan hasil: mempertahankan jalan nafas, meningkatkan saturasi, membantu ekspansi dan menurunkan resiko terjadinya peningkatan tekanan intra kranial dan defisit perawatan diri teratasi dengan melakukan intervensi dukungan perawatan diri
5. Berdasarkan dari hasil implementasi yang sudah dilakukan pada pasien dengan tiga diagnosis keperawatan masalah hipertermi teratasi dengan satu kali pemberian intervensi dan dilakukan implementasi sedangkan kedua diagnosis lainnya sudah membaik termasuk pola pernapasan kesadarannya yang meningkat yang awalnya GCS 7 menjadi GCS 10, bersihan jalan napas yang setiap jam dipantau dan di section secara rutin dan diagnosa defisit perawatan diri yang awalnya pasien kotor dantidak pernah mandi menjadi bersih karena rutin dibersihkan
6. Hipertermi yang dilakukan adalah pemberian kompres hangat dan melonggarkan pakaian maka masalah hipertermi yang ada teratasi dengan hasil: suhu tubu sebelum di kompres adalah 39,8 dan menurun 36.7 saat dilakukan kompres hangat, maka dapat disimpulkan tindakan implementasi yang dilakukan berhasil memperbaiki keadaan pasien dan mengatasi masalah yang pada pasien

B. Saran

1. Bagi Profesi Keperawatan karya akhir ini bisa dijadikan bahan referensi

bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi non farmakologi

2. Bagi Pelayanan Rumah Sakit karya akhir ini menjadi masukan bagi bidang



keperawatan dan para perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien epidural hematoma post op dengan masalah hipertermi dan melihat keefektifan pemberian kompres hangat dalam mengatasi hipertermi atau peningkatan suhu tubuh

3. Bagi Institusi Pendidikan Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien epidural hematoma post operasi craniactomy. Perlu dilakukannya penelitian yang lebih lanjut dengan kasus yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadsyah Ibrahim. (2010). *Trauma dan Bencana. Dalam: Buku Ajar Ilmu Bedah* (Edisi 6; J. W. De, ed.). Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC.
- Anderson, M. (2012). *Cedera Susunan Saraf Pusat Patofisiologi* (edisi 4).
- Cherie Mininger. (2012). *Epidural Hematoma* (Greenberg). Jakarta: Erlangga.
- Fuad Toyib. (2018). Analisis praktik klinik keperawatan dengan pengaruh pemberian kompres hangat terhadap penurunan skala nyeri pada pasien cedera kepala di IGD RSUD Abdul Wahab Samarinda. *KTI Universitas Muhammadiyah Samarinda*.
- Hafid. (2013). *Epidural Hematoma, Buku Ajar Ilmu Bedah* (edisi ke 1; Jong W.D, ed.). Jakarta: EGC.
- Hoffman, J.M., Lucas, S., Dikmen, S., et al. (2011). Natural History of Headache after Traumatic Brain Injury. *Journal of Neurotrauma*, XXVIII, 1719–1725.
- Ika Rahmawati & Yoseph Agung. (2018). KOMPRES HANGAT SEBAGAI PENURUN SUHU TUBUH PASIEN TRAUMA KEPALA. *Journal Nursing ADI HUSADA, VOL.4, NO.*
- Irmachatshalihah, R., & Alfiyanti, D. (2020). Kombinasi Kompres Hangat Dengan Teknik Blok Dan Teknik Seka (Tepid Sponge Bath) Menurunkan Suhu Tubuh Pada Anak Penderita Gastroenteritis. *Jurnal Unimus, vol 1 no 3*. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.26714/nm.v1i3.6215>
- Kahinedan, V. A., & Gobel, I. (2017). Studi penatalaksanaan tindakan keperawatan pada pasien hipertermi di ruang rawat inap RSUD Liun Kendage Tahuna. *P3M POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA*, 1(November), 64–68.
- Kurnia Dewi Anisa. (2019). Efektifitas kompres hangat untuk menurunkan suhu tubuh pada an.d dengan hipertermia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 5, 122–127. <https://doi.org/10.33485/jiik-wk.v5i2.112>
- Luci Riani Br. Ginting, dkk. (2020). PENGARUH PEMBERIAN OKSIGEN DAN ELEVASI KEPALA 30° TERHADAP TINGKAT KESADARAN PADA PASIEN CEDERA KEPALA. *Jurnal Keperawatan Dan Fisioterapi (JKF)*, 2(2).
- Mary Fran Hazinski, RN, M. (2011). Highlights of the 2011 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency

Cardiovascular. *Heart Association*.

- Padila. (2012). *Buku Ajar : Keperawatan Medikal Bedah*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- PPNI, S. D. (2016). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- PPNI, S. D. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Prastiwi, A. K. (2020). PENGELOLAAN HIPERTERMI PADA TN . N DENGAN TYPHOID FEVER DIRUANG DAHLIA DI RSUD UNGARAN. *Universitas Ngudi Waluyo, Vol 1*.
- Riskesdas. (2018). Laporan Nasional Riskesdas: kasus cedera kepala. *Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*. Retrieved from http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/La%0Aporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf.%0A
- Risnah dan Muhammad Irwan. (2021). *Falsafah dan teori keperawatan dalam integrasi keilmuan*.
- Sarah Fadillah. (2019). ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DEWASA PENDERITA THYPOID FEVER DENGAN MASALAH KEPERAWATAN HIPERTERMI. *FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO*.
- Sarasawati, M. F. H. & M. (2020). *Buku Ajar Patologi Dasar Robbins (Edisi indonesia)* (10th ed.; M. F. H. & M. Sarasawati, ed.). singapore: Elsevier Ireland Ltd.
- SLKI PPNI, D. (2018). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*. jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. (2013). *Buku Ajar Keperawatan Medikal-Bedah Brunner & Suddarth* (12th ed.; E. Mardela, ed.). jakarta: EGC.
- Sudoyo, A. W., Setiyohadi, B., Alwi, I., K. marcellus simadibrata, & Setiati, S. (2010). *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam* (5th ed.). jakarta: InternaPublishing.
- Sumira Budi Pertami, dkk. (2017). EFFECT OF 30 ° HEAD-UP POSITION ON INTRACRANIAL PRESSURE CHANGE IN PATIENTS WITH HEAD INJURY IN SURGICAL WARD OF GENERAL HOSPITAL OF Dr . R . *Public Health of Indonesia*, 3(3), 89–95.

- Trevana, L & Cameron, I. (2011). *Traumatic Brain Injury Long Term Care of Patients in General Practice. Focus Neurology, XL* (12th ed.). Amerika.
- Wijaya, dkk. (2013). *KMB 2 Keperawatan Medikal Bedah (Keperawatan Dewasa)*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Windawati dan Dera Alfiyanti. (2020). Penurunan Hipertermia Pada Pasien Kejang Demam Menggunakan Kompres Hangat. *Jurnal Unimus (Ners Muda), Vol 1 No 1*, 59–67.
- World Health Organization. (2016). Global Status Report on Road Safety. *WHO Librar. Ed.* [https://doi.org/Doi:978 92 4 156506 6](https://doi.org/Doi:978%204%20156506%206). WHO/NMH/NVI/15.6.
- Yani Achir dan Ibrahim, K. (2018). *Pakar Teori Keperawatan dan Karya Mereka*. Indonesia.



LAMPIRAN

1. Riwayat Hidup



NAMA : JUMASING

Lahir di Bantaeng, 16 Agustus 1997, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Jari dan Ibu Ria. Penulis akrab di panggil **Jems** ini mengawali pendidikan sekolah dasar di SD INP Bonto Sapiri, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPS LATENRI RUWA dan sekolah di SMK Negeri 3 Bantaeng dengan jurusan keperawatan. Setelah itu penulis memasuki bangku kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan dan lulus kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang profesi. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah, Do'a kedua orang tua, kerja keras, bantuan keluarga, dan do'a teman-teman. Penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun karya tulis akhir (KTI) yang berjudul "Asuhan Keperawatan Pada Pasien Epidural Hematoma Post Op Craniotomy Dengan Masalah Hipertermi".

Pada masa SD penulis bergabung dalam organisasi Pramuka.

Pada masa SMK penulis bergabung dalam organisasi Sanggar Seni Tu'Ma Buttayya SMK Negeri 3 Bantaeng (SSTB). Selanjutnya, selama di perguruan tinggi penulis memasuki organisasi dan mempunyai beberapa pencapaian, yaitu:

1. Forum Komunikasi Mahasiswa Butta Toa Bantaeng (FKM-BT) sekertaris umum periode 2018-2019
2. Unit Kegiatan Mahasiswa Riset Keilmuan Kemitraan Masyarakat (UKM RITMA) Koordinator Departemen Kewirausahaan periode 2019-2020
3. Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo (UKM Taekwondo) anggota periode 2017-2018
4. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pikom FKIK (IMM FKIK) Koordinator Divisi Hikma Dan Advokasi periode 2016-2017
5. Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan (HMJ Keperawatan) Anggota Divisi Danus periode 2017-2018
6. Interprofessional Healt Student Community (INHESTY) Anggota periode 2020

2. Jurnal EBN

KOMPRES HANGAT SEBAGAI PENURUN SUHU TUBUH PASIEN TRAUMA KEPALA

Ika Rahmawati, Yoseph Agung
Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri
ika_rahma23@yahoo.com

ABSTRAK

Trauma kepala merupakan salah satu penyebab utama kematian. Selain itu trauma kepala juga dapat menyebabkan kecacatan. Pasien trauma kepala seringkali mengalami peningkatan suhu tubuh. Kompres hangat dapat menurunkan suhu tubuh pasien sehingga peningkatan metabolisme dapat teratasi dan mencegah kondisi lebih buruk pada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kompres hangat dapat menurunkan suhu tubuh pada pasien yang mengalami trauma kepala. Desain penelitian yang digunakan adalah *quasy eksperimental*. Teknik sampling yang digunakan adalah *accidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 20 responden. Alat ukur yang digunakan adalah lembar observasi. Hasil analisis menggunakan uji *Mann whitney* menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang artinya kompres hangat efektif untuk menurunkan suhu tubuh pasien trauma kepala. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kompres hangat dapat digunakan sebagai penurun suhu tubuh pasien trauma kepala.

Kata Kunci : Trauma Kepala, Suhu Tubuh, Kompres Hangat

ABSTRACT

Head injury wis the main cause death. Besides, head injury also cause disability. Head injury patients often cause the body temperature increasing. Warm compress were able to lower the body temperature, so that metabolism increasing can be overcome and prevent the condition of patient from getting worse. This study aims was to konow whether warm compress are able to lower the body temperature of head injury patients. Design of study used was quasy experiment. Sampling technique used was accidental sampling, and the sample size was 20 respondents. The instrument used was observational sheet. The result of analysis using Mann whitney statistic test demonstrated the significant value was 0,000, which means warm compress are effective to lower the body temperature of head injury patients. Based on explanation, it can be conclude that warm compresses are able to used as the body temperature lowering on head injury patients.

Keywords : Head Injury, Body Temperature, Warm Compress

PENDAHULUAN

Trauma kepala adalah proses kerusakan jaringan otak yang disebabkan karena trauma. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kegagalan kompensasi yang dapat menyebabkan kematian pada pasien trauma kepala (Retnaningsih, 2008). Trauma kepala merupakan salah satu penyebab paling sering terjadinya mortalitas pada anak dan dewasa (Lalenoh, 2014). Selain terjadinya kecacatan juga merupakan kondisi yang bisa terjadi pada pasien trauma kepala (Mitchell, 2008). Saat ini, angka kejadian trauma kepala di beberapa negara termasuk di Indonesia tergolong masih tinggi (Japardi, 2006). Di ruang gawat darurat suatu pelayanan kesehatan seperti di ruang Instalasi gawat darurat atau ruang Intensif Care Unit, kasus yang banyak dijumpai salah satunya adalah trauma kepala. Prevalensi trauma kepala setiap tahun di Amerika Serikat terdapat lima ratus ribu kasus dan empat ratus ribu kasus mengalami kematian (Iavagnilio, 2011). Prevalensi trauma kepala pada orang berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi bahkan sampai tiga kali lipatnya dibandingkan angka kejadian pada perempuan (Hawley, 2010). Berdasarkan data Riskesdas (2013) angka kejadian trauma kepala di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu kematian sebanyak seratus ribu jiwa. Penyebab tersering kejadian trauma kepala di Indonesia adalah karena kecelakaan sepeda motor (Kurniasih, 2013).

Peningkatan suhu tubuh merupakan salah satu gangguan fisiologis yang sering terjadi pada pasien trauma kepala. Penanganan pasien trauma kepala di lokasi kejadian, transportasi pasien ke rumah sakit, primary survey, secondary survey, dan tindakan awal akan menentukan prognosis pasien (Tobing, 2011). Kematian pasien trauma kepala setidaknya dapat dicegah dengan penanganan awal yang cepat dan tepat (Stiver, *et al*, 2009).

Pada pasien trauma kepala seringkali mengalami peningkatan suhu tubuh atau hipertermia. Peningkatan suhu tubuh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prognosis pasien trauma kepala (Vogelzang, *et al*, 2006 & aritonang, 2007). Peningkatan suhu tubuh pasien trauma kepala pada beberapa kasus seringkali disebabkan oleh karena infeksi, reaksi obat/defek pada sistem termoregulator.

Peningkatan suhu tubuh dapat memperburuk trauma iskemik neuronal sehingga menyebabkan trauma otak sekunder, yang mana hal tersebut dapat memperburuk keadaan patologis pasien trauma kepala (Riseri, 2012). Sedangkan menurut Thomp (2005) peningkatan suhu tubuh oleh karena serebral mengalami infeksi sekunder, maupun hipotalamus.

Pasien trauma kepala yang mengalami peningkatan suhu tubuh akan semakin meningkatkan resiko kematian. Dalam penanganan pasien trauma kepala terdapat berbagai penyulit, salah satu penyulit tersebut adalah apabila pasien mengalami peningkatan suhu tubuh karena peningkatan suhu tubuh dapat memperburuk kondisi pasien.

Kompres hangat merupakan metode memelihara suhu tubuh dengan memberikan cairan atau alat hangat yang dapat memberikan efek hangat pada tubuh. Pemberian kompres hangat yang dilakukan di aksila efektif dilakukan, mengingat aksila merupakan daerah yang letak pembuluh darahnya cukup banyak. Dengan memberikan kompres hangat pada aksila akan memberikan rangsangan area preoptik hipotalamus. Sinyal berupa sinyal hangat yang dibawa oleh darah ke hipotalamus akan merangsang area preoptik mengeluarkan sinyal oleh sistem efektor (Asmadi, 2008). Cara pemberian kompres hangat dilakukan dengan menempelkan kantong karet yang telah diisi air hangat dengan suhu 34-37°C. Kompres hangat dapat juga diberikan dengan merendam handuk ke dalam air hangat. Kantong karet atau handuk hangat kemudian ditempelkan ke daerah aksila (Tamsuri, 2006). Banyaknya kasus trauma kepala dan angka kecacatan serta kematian yang masih tinggi pada pasien dengan trauma kepala sehingga diperlukan penanganan yang tepat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui efektifitas kompres hangat untuk menurunkan suhu tubuh pasien trauma kepala.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan desain *Quasy eksperimental*. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Accidental Sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 20 responden yang terbagi menjadi 10 responden sebagai kelompok perlakuan (Kompres hangat) dan 10

2/5

responden sebagai kelompok Kontrol. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah pasien yang mengalami trauma kepala dan hipertermi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. Setelah data terkumpul kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan uji *Mann Whitney*.

HASIL

Data Umum Penelitian

Tabel 1 Karakteristik responden

Karakteristik Subyek	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	11	55
Perempuan	9	45
Usia		
5-11	1	5
12-16	1	5
17-25	3	15
26-35	5	25
36-45	3	15
46-55	4	20
56-65	3	15

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (55%) dan sebagian besar berusia dewasa muda sebanyak 25%.

Data Khusus Penelitian

Tabel 2 Distribusi responden berdasarkan suhu tubuh

Suhu Tubuh	Jumlah (Orang)
38,1 ⁰ C	2
38,3 ⁰ C	2
38,4 ⁰ C	5
38,5 ⁰ C	3
38,7 ⁰ C	2
38,9 ⁰ C	1
39 ⁰ C	2
39,4 ⁰ C	1
39,9 ⁰ C	1
40 ⁰ C	1

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pasien trauma kepala suhu tubuhnya adalah 38,4⁰C.

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pasien trauma kepala suhu tubuhnya adalah 38,4⁰C.

Tabel 2 Penurunan suhu tubuh pasien trauma kepala sebelum dan sesudah diberikan kompres hangat (Kelompok Perlakuan)

No Responden	Sebelum	Sesudah	Selisih
1	38,7 ⁰ C	38 ⁰ C	0,7
2	38,9 ⁰ C	38,3 ⁰ C	0,6
3	40 ⁰ C	38,6 ⁰ C	1,4
4	38,5 ⁰ C	37,9 ⁰ C	0,6
5	38,4 ⁰ C	37,6 ⁰ C	0,8
6	38,4 ⁰ C	37,2 ⁰ C	1,2
7	38,1 ⁰ C	37,6 ⁰ C	0,5
8	38,2 ⁰ C	37,6 ⁰ C	0,6
9	38,5 ⁰ C	37,7 ⁰ C	0,8
10	39 ⁰ C	38,2 ⁰ C	0,8

Berdasarkan dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada kelompok perlakuan mengalami penurunan suhu tubuh setelah diberikan kompres hangat. Selisih penurunan tertinggi adalah 1,4⁰C dan terendah adalah 0,5⁰C.

Tabel 3 Penurunan suhu tubuh pasien trauma kepala sebelum dan sesudah diberikan kompres air biasa (Kelompok Kontrol)

No Responden	Sebelum	Sesudah	Selisih
1	39 ⁰ C	38,6 ⁰ C	0,3
2	39,4 ⁰ C	39,3 ⁰ C	0,1
3	39,9 ⁰ C	39,7 ⁰ C	0,2
4	38,4 ⁰ C	38 ⁰ C	0,4
5	39 ⁰ C	38,7 ⁰ C	0,3
6	38,3 ⁰ C	38,1 ⁰ C	0,2
7	38,5 ⁰ C	38 ⁰ C	0,5
8	38,1 ⁰ C	37,7 ⁰ C	0,4
9	38,7 ⁰ C	38,4 ⁰ C	0,3
10	38,3 ⁰ C	38,2 ⁰ C	0,1

Berdasarkan dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada kelompok kontrol mengalami penurunan suhu tubuh setelah diberikan kompres air biasa. Selisih penurunan tertinggi adalah 0,5⁰C dan terendah adalah 0,1⁰C.

Tabel 4 Penurunan suhu tubuh pasien trauma kepala sebelum dan sesudah diberikan kompres air biasa (Kelompok Kontrol)

No Responden	Sebelum	Sesudah	Selisih
1	39 ^o C	38,6 ^o C	0,3
2	39,4 ^o C	39,3 ^o C	0,1
3	39,9 ^o C	39,7 ^o C	0,2
4	38,4 ^o C	38 ^o C	0,4
5	39 ^o C	38,7 ^o C	0,3
6	38,3 ^o C	38,1 ^o C	0,2
7	38,5 ^o C	38 ^o C	0,5
8	38,1 ^o C	37,7 ^o C	0,4
9	38,7 ^o C	38,4 ^o C	0,3
10	38,3 ^o C	38,2 ^o C	0,1

Berdasarkan dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada kelompok kontrol mengalami penurunan suhu tubuh setelah diberikan kompres air biasa. Selisih penurunan tertinggi adalah 0,5^oC dan terendah adalah 0,1^oC.

Tabel 5 Perbedaan rata-rata selisih penurunan suhu tubuh pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol

Kelompok	Rata-rata penurunan
Perlakuan	0,8
Kontrol	0,28

Berdasar tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata penurunan suhu tubuh pada kelompok yang diberikan perlakuan kompres hangat lebih tinggi (0,8^oC) dibandingkan penurunan suhu tubuh pada kelompok kontrol (0,28^oC)

PEMBAHASAN

Efektifitas kompres hangat sebagai penurun suhu tubuh pasien trauma kepala

Berdasarkan data yang didapat menunjukkan bahwa dari 10 responden yang diberikan perlakuan kompres hangat menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada kelompok perlakuan telah mengalami penurunan suhu tubuh yang cukup signifikan. Selisih penurunan suhu tubuh adalah 0,5 sampai dengan 1,4^oC. Rata-rata penurunan suhu pada kelompok perlakuan adalah sebesar 0,8^oC. Sedangkan 10

responden pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami penurunan suhu tubuh, akan tetapi penurunan suhu tubuh tersebut kurang signifikan yaitu antara 0,15 sampai dengan 0,5^oC. Rata-rata penurunan suhu tubuhnya adalah 0,2^oC.

Efektifitas kompres hangat berdasarkan data yang ada didapatkan semua responden yang dilakukan kompres air hangat, mengalami penurunan suhu tubuh. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Sodikin (2012) bahwa penggunaan kantung karet atau handuk yang direndam air hangat yang digunakan sebagai kompres, dapat mencegah pasien menggigil dan dapat merangsang pelebaran pembuluh darah sehingga mempercepat proses evaporasi dan konduksi yang pada akhirnya dapat menurunkan suhu tubuh dan mencegah resiko kematian pada pasien trauma kepala.

Pemberian kompres hangat pada tubuh pasien yang mengalami trauma kepala akan memberikan rangsangan ke hipotalamus. Ketika dirangsang panas, sistem efektor kemudian mengeluarkan sinyal tubuh untuk mengeluarkan keringat melalui kulit dan mengalami pelebaran pembuluh darah.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji *Mann Whitney* yang ada didapatkan hasil *p-value* 0,000 yang artinya kompres hangat efektif digunakan sebagai penurun suhu tubuh pasien trauma kepala.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa kompres hangat efektif untuk menurunkan suhu tubuh pasien trauma kepala. Kompres hangat dapat digunakan sebagai penurun suhu tubuh pada pasien trauma kepala.

SARAN

1. Bagi profesi keperawatan
Kompres hangat dapat dilakukan sebagai alternatif untuk menurunkan suhu tubuh pasien trauma kepala.
2. Bagi Lahan Penelitian
Diharapkan dapat menerapkan pemberian kompres hangat untuk menurunkan suhu tubuh pasien kepala.
3. Bagi peneliti selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian dengan menambah jumlah responden agar lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi (2008). *Buku Ajar Teknik Prosedur Keperawatan Konsep Dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien. Cetakan kedua*. Jakarta : Salemba Medika
- Bisri, T. (2012). *Penanganan neuroanestesia dan critical care cedera otak traumatik. 3th ed*. Bandung : Saga Olahcitra
- Dinarello, C.A., and Gelfand, J.A., (2005). *Fever and Hyperthermia. In: Kasper, D.L., et. al., ed. Harrison's Principles of Internal Medicine. 16th ed*. Singapore: The McGraw-Hill Company, 104-108.
- Hawley, C. (2010). *Management of minor head injury in adults*. Emergency Nurse. Health Sciences Research Institute, Warwick Medical School, University of Warwick
- Hidayat, A. Aziz Alimul, (2008). *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika
- Iavagnilio, C.L. (2011). Traumatic Brain Injury : Improving the Patient's Outcome Demands Timely and Accurate Diagnosis. *Journal of Legal Nurse Consulting*, 22(3), 3-9
- Kemenkes RI. (2013). *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta : Balitbang Kemenkes RI
- Kurniasih D AW. (2013). Analisa Perilaku dan Lingkungan Berkendara Sepeda Motor Pada Pelajar SMA di Surabaya Untuk Menentukan Metode Sosialisasi dan Pembelajaran Safety Riding Yang Efektif. *J Pendidik Prof.* (3): 1-7.
- Laleno, Bisri, Yusuf. (2014). Baron Ptotection Effect of Lidocaine Measured by Interleukin-6 and Phospholipase A2 Concentration in Epidural Haematoma with Moderate Head Injury Patient. *Journal Anesthesia & Clinical Research* . 5(3)
- Mitchell, Abelson. (2008). Epidemiology and prevention of head Injuries : Literature Review. *J Lin Nurs*, 17 : 46-57
- Retnaningsih. (2008). *Cedera Kepala Traumatic*. www.kabarindonesia.com. Diakses tanggal 16 Januari 2016
- Sodikin. (2012). *Prinsip Perawatan Demam Pada Anak*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Stiver, S.I., Gean, A.D., Manley, G.T. (2009). *Survival with good outcome after cerebral herniation and duret hemorrhage caused by traumatic brain injury*. *J. Neurosurg.* 110, 1242-1246
- Tamsuri, Anas. (2006). *Konsep dan Penatalaksanaan Nyeri*. Jakarta : ECG
- Yohmi, E. (2008). *Kompres Hangat*. Diakses tanggal 16 Januari 2016



Studi Kasus

Penurunan Hipertermia Pada Pasien Kejang Demam Menggunakan Kompres Hangat

Windawati¹, Dera Alfiyanti²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

- Submit 27 Februari 2020
- Diterima 21 Juli 2020

Kata kunci:

Kejang demam; Hipertermia;
Kompres hangat

Abstrak

Kejang demam adalah kelainan neurologis yang paling sering ditemukan pada anak-anak, karena munculnya kejang demam yang berhubungan dengan usia, tingkat suhu dan kecepatan kenaikan suhu, termasuk faktor keturunan yang juga berperan dalam peningkatan kejang demam di mana anggota keluarga pasien memiliki kesempatan untuk mengalami kejang lebih banyak daripada anak-anak normal. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memahami konsep dasar, mendapatkan informasi, dan memberikan asuhan keperawatan mengenai kejang demam pada anak-anak. Penulis menggunakan metode deskripsi, sedangkan sampelnya adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara, pemeriksaan fisik, pengamatan kegiatan, memperoleh catatan dan laporan diagnostik. Setelah tindakan keperawatan selama 3 hari diagnosis utama hipertermia berhubungan dengan penyakit, dan selama intervensi kompres hangat selama tiga hari berturut-turut masalah keperawatan utama hipertermia tidak dapat diatasi. Kolaborasi antara tim kesehatan dan pasien atau keluarga sangat diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan kepada pasien sehingga masalah keperawatan pasien mengenai hipertermia dapat diimplementasikan dengan baik dan masalah dapat diselesaikan.

PENDAHULUAN

Kejang demam merupakan kelainan neurologis yang paling sering terjadi pada anak, 1 dari 25 anak akan mengalami satu kali kejang demam. Hal ini dikarenakan, anak yang masih berusia dibawah 5 tahun sangat rentan terhadap berbagai penyakit disebabkan sistem kekebalan tubuh belum terbangun secara sempurna (Harjaningrum, 2011). Berdasarkan penelitian Dewi (2016) responden yang paling banyak mengalami demam adalah umur 1- 3 tahun, baik kelompok pemberian kompres air hangat, Hampir 90% dari total anak yang dirawat karena demam, diberikan kompres air hangat saja selain

pemberian antipiretik. Menurut penelitian dari Wardiyah, Setiawati, & Romayati (2016) usia yang paling banyak menjadi responden yaitu pada usia 2 tahun sebanyak 9 orang (30.0%) dan pada usia 4 tahun sebanyak 9 orang (30.0%).

Kejang demam adalah serangan kejang yang terjadi karena kenaikan suhu tubuh suhu rektal di atas 38 °C (Riyadi dan Sujono, 2009). Berdasarkan penelitian Aryanti (2015) menunjukkan bahwa rerata suhu tubuh sebelum dilakukan kompres hangat (mean) suhu tubuh sebelum diberi tindakan kompres hangat adalah 38,5°C dengan standar deviasi 0,6638 dan nilai minimum

Corresponding author:

Windawati

winsafir@gmail.com

Ners Muda, Vol 1 No 1, April 2020

e-ISSN:

DOI: 10.26714/nm.v1i1.5499

serta maksimumnya adalah 37,7°C dan 39,5°C.

Serangan kejang demam pada anak yang satu dengan yang lain tidaklah sama, tergantung nilai ambang kejang masing-masing. Oleh karena itu, setiap serangan kejang harus mendapat penanganan yang cepat dan tepat, apalagi kejang yang berlangsung lama dan berulang. Sebab, keterlambatan dan kesalahan prosedur bisa mengakibatkan gejala sisa pada anak, bahkan bisa menyebabkan kematian (Fida & Maya, 2012).

Kejang yang berlangsung lama biasanya disertai apneu (henti nafas) yang dapat mengakibatkan terjadinya hipoksia (berkurangnya kadar oksigen jaringan sehingga meninggikan permeabilitas kapiler dan timbul edema otak yang mengakibatkan kerusakan sel neuron otak. Apabila anak sering kejang, akan semakin banyak sel otak yang rusak dan mempunyai risiko menyebabkan keterlambatan perkembangan, retardasi mental, kelumpuhan dan juga 2-10% dapat berkembang menjadi epilepsi (Mohammadi, 2010).

World Health Organization memperkirakan pada tahun 2010 terdapat lebih dari 21,65 juta penderita kejang demam dan lebih dari 216 ribu diantaranya meninggal. Di Amerika pada tahun 2008, kejadian kejang demam, hampir sebanyak 1,5 juta dan sebagian besar lebih sering terjadi pada rentang usia 6 bulan hingga 36 bulan. Di Indonesia dilaporkan angka kejadian kejang demam pada tahun 2012 - 2013, terjadi 3-4% dari anak yang berusia 6 bulan - 5 tahun (Depkes, 2013). Untuk Angka kejadian di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2010, 2-5% pada anak usia 6 bulan- 5 tahun dan 25-50% kejang demam akan mengalami bangkitan kejang demam berulang (Gunawan, 2009). Sedangkan pada tahun 2013 angka kejadian kejang demam pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun mengalami penurunan yaitu 2-3% (Depkes, 2013). Sedangkan Di Rumah Sakit Umum

Pusat (RSUP) dr. Kariadi Semarang pada Januari 2008-Maret 2009 mendapatkan 82 kasus. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengidentifikasi efektifitas kompres hangat terhadap penurunan hipertermia pada kasus kejang demam.

Penanganan terhadap kejang demam dapat dilakukan dengan tindakan farmakologis, tindakan non farmakologis maupun kombinasi keduanya. Tindakan farmakologis yaitu memberikan obat antipiretik. Sedangkan tindakan non farmakologis yaitu tindakan tambahan dalam menurunkan panas setelah pemberian obat antipiretik. Tindakan non farmakologis antara lain memberikan minuman yang banyak, ditempatkan dalam ruangan bersuhu normal, menggunakan pakaian yang tidak tebal, dan memberikan kompres hangat (Rahmasari & Lestari, 2018)

Kompres hangat adalah tindakan dengan menggunakan kain atau handuk yang telah dicelupkan pada air hangat, yang ditempelkan pada bagian tubuh tertentu sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan menurunkan suhu tubuh (Masruroh, Hartini, & Astuti, 2017). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti & Ambarwati, 2008) di RSUD dr. Moewardi Surakarta menunjukkan bahwa kompres hangat dapat menurunkan suhu tubuh melalui proses evaporasi.

METODE

Penulisan karya ilmiah akhir ners ini dengan jenis studi pendekatan kuantitatif dengan pengambilan dua pasien dengan diagnosa medis yang sama. Penulis menggunakan metode deskriptif, adapun sampelnya adalah data ini diperoleh dengan cara yaitu : wawancara, pemeriksaan fisik, observasi aktivitas, memperoleh catatan dan laporan diagnostik. Pasien dikelola selama 3 hari.

HASIL

Hasil evaluasi pada kedua pasien An. R dan An. D setelah dilakukan implementasi keperawatan dengan masalah utama keperawatan hipertermia berhubungan dengan proses infeksi selama 3 hari belum teratasi secara menyeluruh, karena kedua anak pada kasus kelolaan masih mengalami penurunan dan peningkatan suhu setiap harinya selama di rawat di ruang Anak Lantai 1 RSUP Dr. Kariadi Semarang. Evaluasi pasien kelolaan pada kasus I An. R dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019 jam 14.00 WIB setelah 3 hari masa perawatan, evaluasi tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah hipertermia berhubungan dengan proses infeksi dilakukan selama 3 hari. Berdasarkan hasil evaluasi tindakan keperawatan yang dilakukan pada An.R yaitu berupa pemberian tindakan non farmakologi yaitu kompres hangat untuk menurunkan suhu tinggi pada An.R didapatkan hasil data subyektif yaitu ibu An. R mengatakan anaknya sudah tidak demam dan kejang lagi. Data obyektif yaitu kondisi umum An. R saat dilakukan evaluasi adalah An.R baik, tingkat kesadaran composmentis HR: 100 x/menit, RR: 22 x/menit, SpO₂: 99%, suhu anak sudah turun 36,5 °C, badan An. R teraba hangat, klien sudah aktif bermain kembali. Perencanaan selanjutnya pada pasien An.R diantaranya memberikan kompres hangat jika suhu An. R kembali tinggi, meningkatkan intake cairan dan nutrisi sesuai dengan kebutuhan, memonitor suhu setiap 3 jam, memonitor intake dan output, dan memberikan terapi sesuai dengan advis Dokter. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Anisa, 2019) sehingga ada pengaruh kompres hangat terhadap perubahan suhu tubuh pada pasien febris. Berdasarkan perawatan yang telah dilakukan terhadap anak demam dengan cara dikompres air hangat didapatkan rata-rata penurunan suhu sebesar 0.4 °C per hari dan dilakukan selama 3 hari. Hasil perawatan menunjukkan bahwa terjadi penurunan setelah dilakukan kompres air hangat sesuai target yang ingin dicapai.

Dapat disimpulkan bahwa kompres hangat efektif menurunkan demam pada klien di RSUD Temanggung, penelitian ini menunjukkan bahwa ada perubahan signifikan akibat pengaruh kompres hangat terhadap perubahan suhu tubuh pada pasien anak dengan hipertermia.

Sedangkan pasien kelolaan pada kasus II An. D evaluasi dilakukan tanggal 08 September 2019 jam 13.00 WIB setelah 3 hari masa perawatan, evaluasi tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah hipertermia berhubungan dengan proses infeksi dilakukan selama 3 hari. Berdasarkan hasil evaluasi tindakan keperawatan yang dilakukan pada An. D yaitu berupa pemberian tindakan non farmakologi yaitu kompres hangat untuk menurunkan suhu tinggi pada An. D didapatkan hasil data subyektif yaitu ibu An. D mengatakan anaknya sudah tidak demam dan kejang lagi. Data obyektif yaitu kondisi umum An. D saat dilakukan evaluasi adalah An.R lemah, tingkat kesadaran composmentis HR: 100 x/menit, RR: 24 x/menit, SpO₂: 99%, suhu anak sudah turun 36,4 °C, badan An. D teraba hangat. Perencanaan selanjutnya pada pasien An. D diantaranya memberikan kompres hangat jika suhu An. D kembali tinggi, meningkatkan intake cairan dan nutrisi sesuai dengan kebutuhan, memonitor suhu setiap 3 jam, memonitor intake dan output, dan memberikan terapi sesuai dengan advis Dokter. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Wowor, Katuuk, & Kallo, 2017) didapatkan data yang diperoleh dari 34 responden penurunan rata-rata setelah dilakukan kompres air hangat adalah 0.8 dengan hasil tersebut berarti pemberian kompres air suhu hangat lebih efektif menurunkan suhu tubuh pada anak demam.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama 3 hari masa perawatan, masalah keperawatan utama yaitu hipertermia belum teratasi sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena kedua anak pada kasus kelolaan masih mengalami penurunan dan peningkatan

suhu setiap harinya selama di rawat di ruang Anak Lantai 1 RSUP Dr. Kariadi Semarang.

PEMBAHASAN

Hasil pengkajian yang didapat pada pasien An. R berjenis kelamin Perempuan dengan usia 3,5 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik didapatkan data sebagai berikut : klien tampak lemah, kesadaran composmentis, suhu tubuh tinggi 38.3 °C, kulit teraba hangat, klien tampak pucat, dan badan lemah, keluhan saat ini pada kasus I Ibu An. R mengatakan anaknya sudah mengalami demam sejak 4 hari ini turun naik suhu badannya.

Manifestasi klinis sehari sebelum masuk rumah sakit Ibu An. R mengatakan anaknya mengalami perubahan tingkah laku seperti tidak aktif bermain dan mendadak badannya panas dan suhu naik. Penyakit febris (demam) merupakan salah satu penyebab masalah kesehatan di Indonesia. Demam sebagian disebabkan karena infeksi atau virus. Namun data menunjukkan bahwa justru sebagian besar tenaga medis mendiagnosisnya sebagai infeksi bakteri (Sodikin 2012). Kesokan harinya An. R mengalami kejang demam dengan karakteristik kejang demam sederhana dengan durasi kejang, ±3 menit waktu awal masuk Igd, Kondisi pasca terjadinya kejang Ibu An. R mengatakan pasien dalam keadaan sadar dan dengan kondisi lemah.

Walaupun kejang demam tidak berbahaya jika gejalanya tidak lebih dari 10 menit, namun kejang demam dapat membuat kondisi kegawatdaruratan pada anak. Kondisi kegawatdaruratan dapat terjadi jika kejang demam tidak segera ditangani. Kegawatdaruratan yang mungkin saja terjadi adalah sesak nafas, kenaikan suhu yang terus menerus, dan cedera fisik. Penyebab kejang demam pada An. R diperkuat dengan adanya data hasil laboratorium yang abnormal yaitu leukosit meningkat $21.8 \times 10^3/\mu\text{l}$ hal ini menandakan bahwa adanya infeksi. Pemeriksaan jumlah

leukosit merupakan salah satu parameter pemeriksaan untuk mendeteksi adanya infeksi. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan darah rutin yang sering dilakukan, karena jumlah leukosit dapat memberikan petunjuk apakah terdapat suatu infeksi atau peradangan yang disebabkan oleh mikroorganisme atau suatu reaksi inflamasi terhadap masuknya antigen ke dalam tubuh. Ment... jumlah leukosit ($>10.000/\text{mm}^3$) leukositosis merupakan indik... suatu peradangan. Selama diraw... tidak timbul lagi. Ibu An. R mengatakan ini merupakan sudah keempat kalinya dalam periode tahun 2019 ini klien masuk RS dengan keluhan yang sama. Riwayat kejang demam sebelumnya 3x di rawat di RS William Both dan pada saat dibawa ke RSUP dr. Kariadi Semarang untuk diperiksa langsung klien dianjurkan untuk dirawat di RS pada tanggal 10 Agustus 2019.

Pada pasien An. D berjenis kelamin laki-laki dengan usia 1 tahun yaitu usia kanak-kanak. Usia merupakan suatu faktor risiko utama pada beberapa penyakit. Hal ini disebabkan karena usia dapat memperlihatkan kondisi kesehatan seseorang. Usia balita rentan terhadap penyakit karena daya tahan tubuh yang belum stabil (Potter & Perry, 2010). Masa balita menjadi periode yang penting dalam tumbuh kembang anak. Pertumbuhan dan perkembangan di masa balita menjadi penentu keberhasilan tumbuh kembang di periode selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian (Kakalang, Masloman, & Manoppo, 2016) kasus kejang demam di Bagian Ilmu Kesehatan Anak RSUP Prof. DR. R.D. Kandou Manado periode Januari 2014 - Juni 2016 dapat disimpulkan bahwa kejang demam lebih banyak ditemukan pada usia 1 - <2 tahun, jenis kelamin laki-laki, tanpa riwayat keluarga, suhu badan $>38^{\circ}\text{C}$, riwayat penyakit yang mendasari infeksi saluran pernapasan akut, tipe kejang demam kompleks, status gizi normal, riwayat berat badan lahir normal, serta riwayat jenis persalinan normal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik didapatkan data sebagai berikut : klien tampak lemah, kesadaran composmentis, terdapat suhu tubuh 37,7 °C , kulit teraba hangat, klien tampak pucat, dan badan lemah. Keluhan saat ini ibu An. D mengatakan anaknya mengalami kejang demam dan panas tinggi sudah 4 hari turun naik. Kejang Demam merupakan masalah kesehatan yang serius dan menjadi penyebab kematian nomor lima di Indonesia pada tahun 2018 Untuk Angka kejadian di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2010, 2-5% pada anak usia 6 bulan- 5 tahun dan 25-50% kejang demam akan mengalami bangkitan kejang demam berulang (Profil Kesehatan Kota Semarang 2018). Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wibisono, 2015) responden dengan usia 1 tahun berjenis kelamin laki – laki dengan diagnosa medis Kejang Demam. Keluhan Utama, pasien panas, suhu : 37,9 °C.

Manifestasi klinis Sehari Sebelum masuk rumah sakit Ibu An. D mengatakan anaknya mengalami perubahan tingkah laku seperti tidak aktif bermain dan mendadak badannya panas dan suhu naik, dan mengalami sesak nafas. Kejang demam merupakan gangguan transier pada anak-anak yang terjadi bersamaan dengan demam. Keadaan ini merupakan salah satu gangguan neurologic yang paling sering di jumpai anak-ana. Bila kejang demam tidak ditangani akan terjadi kerusakan sel-sel otak akibat kekurangan oksigen dalam otak, pengeluaran sekret lebih dan resiko kegawatdaruratan untuk aspirasi jalan nafas. Jika tidak dijalan dengan baik maka beresiko kematian (Sodikin, 2012). Kejang demam berdampak serius seperti deficit neurologi, epilepsi, retradasi mental, atau perubahan perilaku (Wong, 2009). Keesokan harinya An. D mengalami kejang demam dengan karakteristik kejang demam sederhana dengan durasi kejang, ± 2 menit waktu awal masuk igd. Selama pindah ke rawat inap An. D pernah kembali kejang dengan durasi waktu yang sama. Kondisi pasca terjadinya kejang Ibu An. D

mengatakan pasien dalam keadaan sadar dengan kondisi lemah serta mengalami kesulitan bernafas. Proses Perjalanan Penyakit kejang demam yaitu infeksi yang terjadi pada jaringan di luar kranial seperti tonsilitis, otitis media akut, bronkitis penyebab terbanyaknya adalah bakteri yang bersifat toksik. Toksis yang dihasilkan oleh mikro organisme dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui hematogen maupun limfogen. Penyebaran toksis ke seluruh tubuh akan direspon oleh hipotalamus dengan menaikkan pengaturan suhu di hipotalamus sebagai tanda tubuh dalam bahaya secara sistemik. Naiknya pengaturan suhu di hipotalamus akan merangsang kenaikan suhu di bagian tubuh yang lain se kulit sehingga terjadi kontraksi otot. Naiknya suhu di hipotalamus, otot, kulit, dan bagian tubuh yang lain akan disertai pengeluaran mediator kimia seperti epinefrin dan prostagladin. Pengeluaran mediator kimia ini dapat merangsang peningkatan potensial aksi pada neuron. Peningkatan potensial inilah yang merangsang perpindahan ion Natrium, ion Kalium dengan cepat dari luar sel menuju ke dalam sel. peristiwa inilah yang diduga dapat menaikkan fase depolarisasi neuron dengan cepat sehingga timbul kejang. Serangan yang cepat itulah yang dapat menjadikan anak mengalami penurunan respon kesadaran, otot ekstremitas maupun bronkus juga dapat mengalami spasme sehingga anak beresiko terhadap injuri dan kelangsungan jalan nafas oleh penutupan lidah dan spasme bronkus. (Riyadi dan sujono, 2009). Penyebab kejang demam pada An. D diperkuat dengan adanya data hasil laboratorium yang abnormal yaitu hematokrit mengalami penurunan 33,7 % yang berarti rendah/kurang dari batas normal, hal ini menandakan bahwa adanya infeksi. Pemeriksaan hematokrit adalah pengukuran yang mengidentifikasi defisiensi berbagai bahan nutrisi. Pengukuran hematokrit menggunakan satuan persen, nilai normal hematokrit 36-

5/9

44% (Nurachman, 2009). Ibu klien mengatakan ini merupakan ketiga kalinya dalam periode tahun 2019 ini klien masuk RS dengan keluhan yang sama. Riwayat kejang demam sebelumnya 1x di rawat di RS Panti Wiloso selama 4 hari lalu di rujuk ke RSWN di rawat selama 3 Minggu di Hcu tanggal 05 Juli 2019 pulang. Dan setelah itu kambuh lagi pada tanggal 02 September 2019 klien panas tinggi dan kejang di IGD RSUP dr.Kariadi selama 2 menit oleh dokter jaga di IGD klien dianjurkan untuk dirawat di RS pada tanggal 02 September 2019. Pendidikan kesehatan selama ibu hamil juga penting untuk mempersiapkan kelahiran anak jika terjadi demam (Al Jihad, Hartati, & Rejeki, 2019). Terutama motivasi ibu untuk pemberian ASI eksklusif pada anak dalam rangka meningkatkan gizi pada bayi (Rejeki, 2008).

Farmakoterapi yang diberikan untuk menurunkan suhu tubuh pada kedua pasien sama yaitu dengan parasetamol (asetaminofen) merupakan metabolit fenasetin dengan efek antipiretik yang sama dan telah digunakan sejak tahun 1893. Efek anti inflamasi parasetamol hampir tidak ada. Asetaminofen di Indonesia lebih dikenal dengan nama parasetamol, dan tersedia sebagai obat bebas, misalnya Panadol®, Bodrex®, INZA®, dan Termorex®. Parasetamol menurunkan suhu tubuh dengan mekanisme yang diduga juga berdasarkan efek sentral. Parasetamol merupakan penghambat prostaglandin yang lemah. Efek iritasi, erosi, dan perdarahan lambung tidak terlihat pada obat ini, demikian juga gangguan pernafasan dan keseimbangan asam basa. Parasetamol diberikan secara oral. Penyerapan dihubungkan dengan tingkat pengosongan perut, konsentrasi darah puncak biasanya tercapai dalam 30- 60 menit. Parasetamol sedikit terikat pada protein plasma dan sebagian dimetabolisme oleh enzim mikrosomal hati dan diubah menjadi sulfat dan glikoronida asetaminofen, yang secara farmakologis tidak aktif. Kurang dari 5% diekskresikan dalam keadaan tidak berubah. Metabolit

minor tetapi sangat aktif (N-acetyl-p-benzoquinone) adalah penting dalam dosis besar karena efek toksiknya terhadap hati dan ginjal. Waktu paruh asetaminofen adalah 2-3 jam dan relatif tidak terpengaruh oleh fungsi ginjal. Reaksi alergi terhadap parasetamol jarang terjadi. Manifestasinya berupa eritema atau urtikaria dan gejala yang lebih berat berupa demam dan lesi pada mukosa. Methemoglobinemia dan sulfhemoglobinemia jarang menimbulkan masalah pada dosis terapi karena hanya kira-kira 1-3 % Hb yang diubah menjadi met-Hb. Penggunaan sebagai analgesik dalam dosis besar secara menahun terutama dalam kombinasi berpotensi menyebabkan nefropati diabetik (Wilwana dan Gan, 2009). Penurunan suhu tubuh menurut penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti & Ambarwati, 2008) dalam penelitian (Wowor et al., 2017) bahwa akan lebih efektif jika diberikan obat antipiretik seperti paracetamol yang mampu menurunkan sampai 0.2°C, jika diberikan bersamaan dengan kompres hangat dalam menurunkan suhu tubuh pada penderita demam.

Dari hasil pengkajian yang diperoleh dari kedua pasien maka diangkat masalah keperawatan utama yaitu hipertermia. Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses yang dialami. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi klien, individu, keluarga dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Diagnosa keperawatan sebagai dasar pengembangan rencana intervensi keperawatan (SDKI, 2016). Diagnosa keperawatan utama yang muncul pada kedua pasien adalah hipertermia. Menurut SDKI (2016) hipertermia adalah Suhu tubuh meningkat di atas rentang normal tubuh. Penyebab terjadinya hipertermia diantaranya adalah dehidrasi, terpapar lingkungan panas, proses penyakit (misal : infeksi, kanker), Ketidaksiuaian pakaian dengan suhu lingkungan, peningkatan laju metabolisme, respon

6/9

trauma Aktivitas berlebihan, dan Penggunaan inkubator. Gejala dan tanda mayor dengan masalah hipertermia berdasarkan data subektif adalah tidak tersedia, sedangkan data objektif adalah suhu tubuh di atas nilai normal. Gejala dan tanda minor dengan masalah hipertermia berdasarkan data subektif adalah tidak tersedia, sedangkan data objektif adalah kulit merah, kejang, takikardi, takipnea, dan kulit terasa hangat. Kondisi klinis terkait diantaranya adalah proses infeksi, hipertiroid, stroke, dehidrasi, trauma, dan prematuritas. Alasan peneliti memprioritaskan hipertermia pada kasus kejang demam ini yaitu karena kedua kasus mempunyai masalah keperawatan yang sama dan apabila terjadi keterlambatan dalam penanganan akan menyebabkan resiko kejang berulang, epilepsi,

Intervensi keperawatan yang harus dilakukan oleh perawat untuk membantu mengatasi masalah keperawatan hipertermia adalah kedua kasus kelolaan intervensi yang dilakukan yaitu dengan fever treatment : Lakukan kompres hangat, Penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti & Ambarwati, 2008) di RSUD dr. Moewardi Surakarta menunjukkan bahwa kompres hangat dapat menurunkan suhu tubuh melalui proses evaporasi. Tingkatkan intake cairan dan nutrisi, Tekstur makanan yang dikonsumsi harus mudah dikunyah, lembut, bentuk menarik dan bervariasi dan kandungan gizi sesuai dengan AKG (Rosandy, 2013), monitor suhu setiap 3 jam sekali, Monitor intake dan output, dan berikan terapi sesuai advis Dokter. Intervensi keperawatan ini juga sejalan dengan penelitian (Wibisono, 2015) adalah Monitoring ttv tiap 2-4 jam, berikan kompres hangat, tingkatkan intake cairan, kolaborasi pemberian antipiretik dan antibiotik, berikan pakaian anak yang hangat dan tipis. Kader kesehatan juga penting perannya dalam mendeteksi bayi yang sehat (Mariyam & Yosafianti Pohan, 2017).

Implementasi keperawatan dilakukan selama 3 hari pada masing-masing klien. Sebelum melakukan implementasi terlebih dahulu dilakukan pengkajian, pemeriksaan fisik, analisa data, diagnosa keperawatan, menyusun intervensi dan baru melakukan implementasi. Implementasi yang dilakukan pada kedua pasien hampir sama, diantaranya yang telah dilakukan sesuai dengan intervensi untuk hipertermia adalah menanyakan keluhan pasien, melakukan kompres hangat, meningkatkan intake cairan dan nutrisi, memonitor intake-output pasien, memonitor suhu setiap 3 jam sekali, dan memberikan terapi sesuai advis Dokter. Berdasarkan analisa peneliti, pelaksanaan implementasi melakukan kompres hangat dan memonitor suhu setiap 3 jam sekali serta berkolaborasi dalam pemberian obat dan cairan intravena sudah sesuai dengan teori. Pemberian kompres hangat memberikan reaksi fisiologis berupa vasodilatasi dari pembuluh darah besar dan meningkatkan evaporasi panas dari permukaan kulit. Hipotalamus anterior memberikan sinyal kepada kelenjar keringat untuk melepaskan keringat melalui saluran kecil pada permukaan kulit. Keringat akan mengalami evaporasi, sehingga akan terjadi penurunan suhu tubuh (Potter & Perry, 2010).

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti & Ambarwati, 2008) di RSUD dr. Moewardi Surakarta tentang pengaruh kompres hangat terhadap perubahan suhu tubuh pada pasien anak hipertermia, didapatkan hasil p value = 0,001 yang artinya ada pengaruh kompres hangat terhadap perubahan suhu tubuh pasien anak hipertermi. Berdasarkan penelitian (Wardiyah et al., 2016) rerata suhu tubuh sesudah dilakukan kompres hangat menunjukkan bahwa rerata (mean) suhu tubuh sesudah diberi tindakan kompres hangat adalah 38,0°C dengan standar deviasi 0,5506 dan nilai minimum serta maksimum adalah 37,2°C dan 38,9°C. Suhu tubuh pada anak yang mengalami demam dipengaruhi proses penyakit yang terjadi

pada anak. Pola demam bergantung pada pirogen penyebab. Peningkatan atau penurunan aktivitas pirogen mengakibatkan peningkatan dan penurunan demam pada waktu yang berbeda. Ada perbedaan rerata suhu tubuh sebelum dan sesudah tindakan kompres hangat dengan mean 0,5°C (p value < α , 0,000 < 0,05). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Hasan, 2018) Rerata suhu tubuh sebelum di berikan tindakan kompres hangat pada pasien febris di ruangan instalasi gawat darurat puskesmas Puskesmas Tanru Tedong kabupaten Sidrap dengan nilai mean 38,14 dan rerata suhu tubuh sesudah di berikan tindakan kompres hangat pada pasien febris di ruangan instalasi gawat darurat puskesmas Puskesmas Tanru Tedong kabupaten Sidrap dengan nilai hasil mean 37,54. Sedangkan Pada analisis bivariat didapatkan nilai selisih rerata 0,65 dan nilai $p = 0,0001$.

SIMPULAN

Pasien memiliki keluhan kejang dan demam berhari-hari dengan suhu diatas rentang normal. Diagnosa keperawatan utama yang diangkat pada kedua kasus ini adalah hipertermia. Implementasi keperawatan yang dilakukan adalah dengan pemberian kompres hangat untuk mengatasi dan menurunkan suhu panas tubuh pada anak selama 3 hari. Evaluasi yang diperoleh pada kedua pasien selama 3 hari perawatan di ruang rawat inap anak masalah keperawatan hipertermia belum teratasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pasien yang telah bersedia menjadi subjek dalam studi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi ini.

REFERENSI

- Al Jihad, M. N., Hartati, E., & Rejeki, S. (2019). Pengalaman ibu hamil tentang peran perawat pada perilaku sehat ibu hamil di kota semarang. Universitas Diponegoro.
- Anisa, K. (2019). Efektifitas Kompres Hangat Untuk Menurunkan Suhu Tubuh Pada an.D Dengan Hipertermia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan: Wawasan Kesehatan*, 5(2), 122-127. <https://doi.org/10.33485/jiik-wk.v5i2.112>
- Depkes, R.I. (2013). *Profile Kesehatan Indonesia tahun 2013*. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Dewi, A. K. (2016). Perbedaan Penurunan Suhu Tubuh Antara Pemberian Kompres Hangat Dengan Tepid Sponge Bath Pada Anak Demam. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 1(1), 63-71.
- Fida & Maya.(2012). *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak*.Jogjakarta : D-Medika.
- Gan, Wilwana., Soetjningsih (2009, July). Knowledge, attitude, and practices of parents with children of first time and recurrent febrile seizure. *Pediatrica Indonesiana*, 48, 193-198.
- Harjaningrum, A. (2011). *Smart Patient : Mengupas Rahasia Menjadi Pasien Cerdas*.Jakarta : PT. Lingkar Pena Kreative
- Hasan, A. (2018). Pengaruh kompres hangat terhadap perubahan suhu tubuh pada pasien febris. 7, 1-6.
- Kakalang, J. P., Masloman, N., & Manoppo, J. I. C. (2016). Profil kejang demam di Bagian Ilmu Kesehatan Anak RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado periode Januari 2014 – Juni 2016. *E-Clinic*, 4(2), 0-5. <https://doi.org/10.35790/ecl.4.2.2016.14396>
- Mariyam, M., & Yosafianti Pohan, V. (2017). Optimalisasi Kualitas Balita Melalui Peningkatan Kemampuan Kader BKB Dalam Deteksi Dini Gangguan Perkembangan Balita. *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*, 1(1). Retrieved from <http://103.97.100.145/index.php/psn12012010/article/view/2926>
- Masruroh, R., Hartini, S., & Astuti, R. (2017). Efektivitas Pemberian Kompres Hangat Di Axilla Dan Di Femoral Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak Demam Usia Prasekolah Di Rsud Ambarawa. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan (JIKK)*, III(2).
- Mohammadi, M. (2010). *Febrile Seizures : Four Steps Alogarithmic Clinical Approach*.Iranian

- Journal of Pediatrics, volume 20 (No 1), page 5-15. <http://journals.tums.ac.ir>
- Nurachman E. (2009). Asuhan Keperawatan Bermutu di Rumah Sakit. Sumber: <http://www.pdpersi.co.id/?show=detailnews=artikel>
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2010). Buku ajar fundamental keperawatan: konsep, proses, dan praktik. Jakarta: EGC.
- PPNI. (2016). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Indikator Diagnostik. Jakarta: DPP PPNI
- Profil Kesehatan Kota Semarang Tahun 2018. Semarang: Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2018.
- Purwanti, S., & Ambarwati, W. N. (2008). Pengaruh kompres hangat terhadap perubahan suhu tubuh pada pasien anak hipertermia di ruang rawat inap RSUD DR. Moewardi surakarta. Berita Ilmu Keperawatn, 1(2), 81-86.
- Rahmasari, V., & Lestari, K. (2018). Review: Manajemen Terapi Demam Tifoid: Kajian Terapi Farmakologis dan Non Farmakologis. Farmaka, 16(1), 184-195. <https://doi.org/10.24198/JF.V16I1.17445>
- Rejeki, S. (2008). Studi Fenomenologi: Pengalaman Menyusui Eksklusif Ibu Bekerja Di Wilayah Kendal Jawa Tengah. Nurse Media: Journal of Nursing, 2(1), 1-44. <https://doi.org/10.14710/nmjn.v2i1.734>
- Rosandy, RT dan Ismawati, Rita. 2013. Pengembangan Buku Perencanaan Menu Untuk Penderita Penyakit Kejang Demam. Ejournal boga. Volume 2, nomor 1, tahun 2013, edisi yudisium periode Februari 2013, hal 109-117.
- Sodikin. (2012). Prinsip Perawatan Demam Pada Anak. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujono Riyadi, Sukarmin (2009), Asuhan Keperawatan Pada Anak, Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Wardiyah, A., Setiawati, & Romayati, U. (2016). Perbandingan Efektifitas Pemberian Kompres Hangat Dan Tepid Sponge Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Anak Yang Mengalami Demam Di Ruang Alamanda Rsud Dr . H . Abdul Moeloek. Jurnal Kesehatan Holistik, 10(1), 36-44.
- Wibisono, A. (2015). Asuhan Keperawatan Pada An.M Dengan Gangguan Sistem Persarafan : Kejang Demam Di Ruang Mawar RSUD Banyudono Boyolali. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wong, DL Dkk (2009). Buku Ajar Keperawatan Pediatric Wong Ed.6, Vol.2, Jakarta : EGC
- Wowor, M. S., Katuuk, M. E., & Kallo, V. D. (2017). Efektivitas Kompres Air Suhu Hangat Dengan Kompres Plester Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Anak Demam Usia Pra-Sekolah Di Ruang Anak Rs Bethesda Gmim Tomohon. Jurnal Keperawatan, 5(2).

DRAFT KTI JUMASING

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

21 %
INTERNET SOURCES

1 %
PUBLICATIONS

7 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
2	www.scribd.com Internet Source	2%
3	scholar.unand.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%
5	lomboksehat.blogspot.com Internet Source	1%
6	wendygoxil.blogspot.com Internet Source	1%
7	repo.stikesperintis.ac.id Internet Source	1%
8	sharekeperawatan.blogspot.com Internet Source	1%
9	med.unhas.ac.id Internet Source	1%

10	idoc.pub Internet Source	1%
11	asuhankeperawatanonline.blogspot.com Internet Source	1%
12	refinadewiangraeni.blogspot.com Internet Source	1%
13	repository.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	1%
14	quranpustaka.com Internet Source	1%
15	id.scribd.com Internet Source	1%
16	pt.scribd.com Internet Source	1%
17	documents.mx Internet Source	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

3. Patway

