


**INTERVENSI RENDAM KAKI AIR HANGAT PADA ASUHAN
KEPERAWATAN PASIEN PREKLAMSI DENGAN
MASALAH UTAMA HIPERTENSI**



Tugas Akhir Ners

Oleh:

Mustika Muin, S.Kep
NIM: 70900119039

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

**INTERVENSI RENDAM KAKI AIR HANGAT PADA ASUHAN
KEPERAWATAN PASIEN PREKLAMSI DENGAN
MASALAH UTAMA HIPERTENSI**



Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin makassar

Oleh:

Mustika Muin, S.Kep
NIM: 70900119039

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustika Muin, S.Kep
NIM : 70900119039
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang/ 10 November 1997
Jurusan/Prodi : Keperawatan/Ners
Fakultas : kedokteran dan Ilmu kesehatan
Alamat : Btn Nusa Indah
Judul : Intervensi Rendam Kaki Air Hangat Pada Asuhan Keperawatan
Pasien Preeklamsia Dengan Masalah Utama Hipertensi

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Juli 2021

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Mustika Muin

70900119039

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing tugas akhir ners Saudara(i) Mustika Muin Nim: 70900119039, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Intervensi Rendam Kaki Air Hangat Pada Asuhan Keperawatan Pasien Preeklamsia Dengan Masalah Utama Hipertensi”, memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, Juli 2021



Ns. Nurhidayah, S.Kep., M.Kep



Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "Intervensi Rendam Kaki Air Hangat Pada Asuhan Keperawatan Pasien Preeklamsia Dengan Masalah Utama Hipertensi", yang disusun oleh Mustika Muin, NIM : 70900119039 mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis 15 Juli 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, November 2021.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Ns. Huriati, S.Kep., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Wahyudin G, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Ns. Nurhidayah, S. Kep., M. Kep	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hasnah, S. Kep., Ns., M. Kes	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes

NIP. 198007012006042002

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir mers ini dengan tepat waktu. Shalawat beserta salam kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Tugas akhir ners yang berjudul “Intervensi Rendam Kaki Air Hangat Pada Asuhan Keperawatan Pasien Preeklamsia Dengan Masalah Utama Hipertensi” ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan di Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. dr. Syatirah, S. Ked.,M. Kes., Sp.A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. Patimah, S. Kep.,Ns.,M. Kep selaku Kepala Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ns. Nurhidayah, S. Kep., M. Kep dan Dr. Hasnah, S. Kep., Ns., M. Kes selaku Pembimbing I dan II yang selalu memberikan motivasi dan telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini.
4. Ns. Huriati, S.Kep., M.Kes dan Dr. Wahyudin G, M.Ag selaku penguji I dan penguji II atas pengajaran ilmu yang tiada henti, pengarahan dan bimbingan selama berlangsungnya penyelesaian tugas akhir ini
5. Seluruh Dosen Jurusan Keperawatan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah berjasa memberikan bekal pengetahuan kepada saya.

6. Keluarga tercinta terima kasih yang tak terhingga atas cinta dan kasih sayang, dukungan baik materil, moril maupun spiritual serta motivasi yang diberikan kepada saya selama ini.
7. Sahabat yang membantu serta selalu menyemangati selama proses penugasan tugas akhir ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu dalam penyusunan proposal tugas akhir ners ini.

Penulis mengharapkan tugas ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang baik di waktu yang akan datang.

Gowa, Juli 2021

Mustika Muin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Halaman Sampul.....	ii
Pernyataan Keaslian Tugas Akhir Ners.....	iii
Persetujuan Pembimbing.....	iv
Pengesahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Abstrak.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.....	3
D. Manfaat.....	3
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Konsep Teori.....	4
B. Konsep Keperawatan.....	11
C. <i>Evidence Based Nursing</i> (EBN).....	18
BAB III LAPORAN KASUS	
A. Pengkajian.....	24
B. Klasifikasi Data.....	30
C. Analisis Data.....	31
D. Diagnosis Keperawatan.....	33
E. Intervensi Keperawatan.....	34
F. Implementasi Keperawatan.....	36
G. Evaluasi.....	38
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Analisis Kasus.....	41
B. Analisis Intervensi.....	44
C. Alternatif Pemecahan Masalah.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 47
B. Saran-saran..... 47

DAFTAR PUSTAKA` 48

LAMPIRAN.....51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Prosedur Tindakan Terapi Merendam Kaki Menggunakan Air Hangat Untuk Menurunkan TD.....	20
Tabel 2.1	Klasifikasi Data.....	30
Tabel 2.2	Analisa Data.....	31
Tabel 2.3	Diagnosa Keperawatan.....	33
Tabel 2.4	Rencana Asuhan Keperawatan.....	34
Tabel 2.5	Implementasi Keperawatan.....	36
Tabel 2.6	Evaluasi.....	38



ABSTRAK

Nama : Mustika Muin

NIM : 70900119039

Judul : Intervensi Rendam Kaki Air Hangat Pada Asuhan Keperawatan
Pasien Preklamsia Dengan Masalah Utama Hipertensi

Latar belakang: Preeklamsia merupakan salah satu penyebab kematian maternal terbesar. Preeklamsia adalah komplikasi persalinan maupun kehamilan yang kita tandai karena meningkatnya tekanan darah, proteinuria serta adanya penumpukan cairan didalam jaringan, sehingga kadang membuat seseorang menjadi koma. salah satu cara yang dapat menurunkan tekanan darah yaitu menggunakan terapi non farmakologi yaitu merendam kaki air hangat untuk menurunkan tekanan darah air hangat banyak memiliki manfaat bagi tubuh, khususnya dalam memperlancar peredaran darah. **Tujuan:** Mengetahui asuhan Keperawatan pada pasien yang mengalami preeklamsia dengan masalah hipertensi. **Metode** yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan pemeriksaan fisik. **Hasil** analisis menunjukkan terdapat beberapa diagnosis yaitu nyeri akut dan ansietas serta tekanan darah yang tinggi yaitu 200/160 mmHg. Salah satu intervensi yang dapat diberikan untuk menurunkan tekanan darah serta ansietas dan nyeri yaitu merendam kaki menggunakan air hangat. **Kesimpulan:** berdasarkan hasil evaluasi pada studi kasus yang dilakukan terapi nonfarmakologi merendam kaki menggunakan air hangat dapat menurunkan tekanan darah pada ibu preklamsia karena menggunakan air hangat akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang dapat meningkatkan sirkulasi darah, sehingga efektif menurunkan tekanan darah ibu hamil dan di dapatkan hasil terjadi perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah dilakukan perendaman kaki menggunakan air hangat dimana tekanan pasien menurun.

Kata kunci: Rendam Kaki, Air Hangat, Preklamsia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Mustika Muin

NIM : 70900119039

Title : Warm Water Foot Soak Intervention in Nursing Care of

Preeclampsia Patients With Hypertension as a Main Problem

Background: Preeclampsia is one of the biggest causes of maternal death. Preeclampsia is a complication of labor and pregnancy that is characterized by increased BP, proteinuria and the accumulation of fluid in the tissues, so that sometimes a person goes into a coma. One way that can reduce blood pressure is using non-pharmacological therapy, namely soaking the feet in warm water to lower blood pressure. Warm water has many benefits for the body, especially in improving blood circulation. **Objective:** To know nursing care in patients with preeclampsia with hypertension problems. The method used is a case study with data collection techniques through observation, interviews and physical examination. **The results** of the analysis showed that there were several diagnoses, namely acute pain and anxiety and high blood pressure, namely 200/160 mmHg. One of the interventions that can be given to reduce blood pressure as well as anxiety and pain is soaking the feet using warm water. **Conclusion:** based on the evaluation results in case studies conducted by non-pharmacological therapy, soaking the feet using warm water can reduce blood pressure in preeclampsia mothers because using warm water will cause dilation of blood vessels which can improve blood circulation, so it is effective in lowering blood pressure in pregnant women and the results are obtained. there was a difference in blood pressure before and after soaking the feet using warm water where the patient's pressure decreased.

Keywords: Foot Soak, Warm Water, Preeclampsia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Preeklamsia merupakan salah satu penyebab kematian maternal terbesar (Inayah, 2021). Tekanan darah tinggi adalah *Silent Killer* atau pembunuh diam-diam penyakit ini tidak menampak menunjukkan gejalanya yang khas. Preeklamsia adalah komplikasi persalinan maupun kehamilan yang kita tandai karena meningkatnya TD, proteinuria serta adanya penumpukan cairan didalam jaringan, sehingga kadang membuat seseorang menjadi koma. Adapun gejala yang kita temui pada penderita praeklamsi yaitu tekanan darah tinggi, adanya penumpukan cairan di suatu jaringan serta proteinuria yang tidak kita perhatikan, dari dampak tersebut kita tidak menyadari akan timbul menjadi preeklamsi berat, serta bisa menjadi eklamsi (Sarwono, 2014:532).

Menurut *World Health Organization* Mangrasah,dkk (2020) di seluruh dunia kejadian preeklamsia yaitu 0,51% - 38,4%, Berdasarkan data dari WHO pada tahun 2015 AKI sangat tinggi sekitar 830 wanita disetiap hari meninggal di seluruh dunia dikarenakan komplikasi terkait persalinan serta kehamilan. Di tahun 2015 terdapat 303.000 perempuan kehilangan nyawa setelah maupun sebelum persalinan dan pada masa kehamilan. Akibat dari kematian ibu karena disebabkan oleh infeksi, terjadi pendarahan yang sangat hebat, hipertensi saat ibu mengandung (*preeklamsia* dan *eklamsia*).

Di indonesia prevalensi kematian ibu yang disebabkan Tekanan darah tinggi Dalam Kehamilan (HDK) di Indonesia terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2010 angka kematian ibu akibat dari HDK 21,5%, tahun 2011 24,7 %, tahun 2012 26,9 % dan tahun 2013 27,1% serta hasil Sensus (SUPAS) tahun 2015 tercatat AKI sebanyak 305/100.000 KH di Indonesia (Kemenkes, 2016).

Hasil data yang didapatkan dari Rekam medik RS Syekh Yusuf kab. Gowa didapatkan hasil bahwa pada periode 2013 jumlah persalinan yaitu 246 persalinan didapatkan 71 kasus melahirkan *preeklamsi*. Pada tahun 2014

yaitu 398 persalinan terdapat 18 kasus persalinan dengan *preeklampsia*. Tahun 2015 yaitu 1.011 persalinan terdapat 21 kasus persalinan dengan *preeklampsia*. Tahun 2016 yaitu 1.143 persalinan terdapat 14 kasus persalinan dengan *preeklampsia*. serta pada tahun 2017 yaitu 558 persalinan terdapat 18 kasus persalinan dengan *preeklampsia*. Keseluruhan jumlah persalinan dari tahun 2013 – 2017 (Kasnur, 2019) Serta hasil observasi yang saya lakukan di puskesmas bajeng di dapatkan 4-5 ibu hamil yang menderita preeklamsia.

Sudah banyak dikembangkan cara dapat dilakukan untuk mengatasi preeklamsia, salah satu cara yaitu terapi farmakologi serta terapi non farmakologi. Cara yang dapat dilakukan dalam terapi non farmakologi yaitu merendam kaki air hangat untuk menurunkan TD air hangat banyak memiliki manfaat bagi tubuh, khususnya dalam memperlancar peredaran darah. rendam kaki menggunakan air hangat dapat meningkatkan sirkulasi, meningkatkan relaksasi otot. Terapi merendam kaki (hidroterapi kaki) ini juga mampu meningkatkan sirkulasi darah dengan mendilatasi pembuluh darah sehingga lebih banyak oksifgen ke jaringan yang mengalami edema. (Wulandari, dkk. 2017).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Malibel (2020) pemberian rendaman kaki air hangat sangat berpengaruh untuk menurunkan TD karena terapi air hangat rendam kaki berdampak fisiologis bagi tubuh yang dapat membuat sirkulasi darah lancar.

Penelitian yang dilakukan oleh Inayah (2019) dimana merendam kaki dengan air hangat sangat berpengaruh oleh penurunan Tekanan Darah pada ibu hamil, karena akan merangsang syaraf yang ada di kaki untuk bekerja dan berfungsi mendilatasi pembuluh darah serta melancarkan peredaran darah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada study kasus ini adalah “Intervensi Rendam Kaki Air Hangat Pada Asuhan Keperawatan Pasien Preeklamsia Dengan Masalah Utama Hipertensi”

C. Tujuan Umum dan Khusus

1. Tujuan Umum

Mengetahui asuhan Keperawatan pada pasien yang mengalami preeklamsia dengan masalah hipertensi

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hasil pengkajian pada klien yang mengalami preeklamsia dengan masalah tekanan darah tinggi.
- b. Untuk mengetahui diagnosis keperawatan pada klien dengan diagnosa preeklamsia
- c. Untuk mengetahui pengaruh intervensi keperawatan pada pasien dengan diagnosa preeklamsia
- d. Untuk mengetahui implementasi keperawatan pada klien dengan diagnosa preeklamsia
- e. Untuk mengetahui evaluasi keperawatan pada klien dengan diagnosa preeklamsia
- f. Untuk mengetahui pengaruh intervensi rendam kaki air hangat pada pasien yang mengalami preeklamsia dengan masalah hipertensi

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Karya Ilmiah akhir ners ini di harapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan praktik asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan diagnosa preeklamsia

2. Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ners ini di harapkan dapat digunakan pada intervensi masalah Ansietas ibu yang mengalami preeklamsia.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Pengertian

Preeklamsia adalah suatu kelainan multiorgan spesifik pada ibu hamil dapat dilihat karena meningkatnya tekanan darah, pembengkakan, dan proteinuria dan tidak adanya tanda-tanda kelainan vaskuler atau tekanan darah tinggi sebelumnya, tetapi gejalanya biasa akan terlihat usia kehamilan 20 minggu. (Nurarif & Kusuma, 2015)

Preeklamsia merupakan tekanan darah tinggi yang muncul saat usia kehamilan 20 minggu yang di sertai protenuria. Preeklamsia merupakan penyakit tekanan darah tinggi pada ibu hamil spesifik dengan keterlibatan multisistem. Yang akan terjadi saat usia kehamilan 20 minggu, sering terjadi pada usia kehamilan yang lebih matang, serta dapat tumpang tindih karena adanya gangguan tekanan darah tinggi lainnya (Septiasih, 2017)

Preeklamsia adalah berbagai gejala yang dapat timbul pada ibu yang hamil, melahirkan, serta dalam masa nifas yang terdiri dari trias yaitu tekanan darah tinggi, proteinuria serta oedema yang kadang-kadang disertai konvulsi sampai koma, ibu tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan vaskular atau tekanan darah tinggi sebelumnya (Kasnur, 2019)

2. Etiologi

Preeklamsia belum diketahui penyebab terjadinya sampai saat ini, tetapi ada yang mengatakan bahwa preeklampsia dapat terjadi pada kelompok tertentu diantaranya yaitu ibu yang mempunyai faktor penyebab dari dalam diri seperti usia yang semakin bertambah lebih rentan terjadinya peningkatan tekanan darah tinggi kronis dan resikonya lebih besar untuk menderita tekanan darah tinggi karena kehamilan, riwayat melahirkan, keturunan, riwayat kehamilan dan riwayat preeklamsia (Abineno, 2021). Adapun factor risiko penyebab preeklamsia menurut Prawirohardjo, 2014:

a. Teori kelainan vaskularisasi plasenta

Tekanan darah tinggi yang terjadi pada kehamilan tidak mengakibatkan invasi sel-sel trofoblas pada lapisan otot arteri spiralis serta sekitar jaringan matriks. Lapisan otot spiralis akan tetap mengeras dan kaku yang mengakibatkan lumen arteri spiralis tidak dapat terjadi distensi dan vasodilatasi. Dari hal tersebut mengakibatkan arteri spiralis terjadi vasokonstriksi dan kegagalan dalam remodeling arteri spiralis, sehingga menurunnya aliran darah uteroplasenta yang mengakibatkan hipoksia serta iskemi plasenta (Prawirohardjo, 2014).

b. Teori iskemia plasenta, radikal bebas, dan disfungsi endotel

Kegagalan dalam remodeling arteri spiralis menyebabkan plasenta yang iskemia dan hipoksia dan menghasilkan oksidan. Rusaknya sel endotel karena peroksida lemak yang perannya sebagai oksidan akan beredar di seluruh tubuh dalam aliran darah hal ini akan menyebabkan rusaknya struktur sel endotel atau disebut dengan disfungsi endotel (Prawirohardjo, 2014).

c. Teori intoleransi imunologik antara ibu dan janin

Plasenta hipertensi yang terjadi dalam kehamilan menyebabkan penurunan ekspresi HLA-G dan berkurang didaerah plasenta yang dapat menghambat invasi trofoblas ke dalam desidua (Prawirohardjo, 2014).

d. Teori adaptasi kardiovaskular

Pembuluh darah pada kehamilan normal tidak peka akan rangsangan bahan vasopresor, namun hipertensi yang terjadi pada kehamilan mengakibatkan peningkatan kepekaan pada bahan vasopressor (Prawirohardjo, 2014).

e. Teori Stimulus Inflamasi

Plasenta akan melepaskan debris trofoblas pada kehamilan normal sebagai sisa dari proses apoptosis dan neurotik trofoblas akibat dari reaksi stres oksidatif. Jumlah debris trofoblas pada kehamilan normal masih dalam batas wajar yang mengakibatkan reaksi inflamasi dalam batas normal namun pada proses apoptosis pada preeklamsia terjadi

peningkatan stress oksifatif sehingga debris apoptosis serta neurotik trofoblas ikut meningkat (Prawirohardjo, 2014).

Terdapat beberapa faktor penyebab preeklamsia salah satunya karena faktor makanan, sebagaimana yang terdapat pada firman Allah Swt adalah surah Al-Baqarah (2):8 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya :

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”

Salah satu penyebab terjadinya tekanan darah tinggi yaitu faktor makanan, dimana kita harus menjaga pola makan serta memakan makanan yang sehat sehingga terhindar dari penyakit. .

Tafsiran pada ayat diatas merupakan apa yang dikandung oleh perempuan atau istri, Allah mengetahuinya setelah bertemunya ovum dan sperma dan menempel pada dinding rahim ibu. Dan Allah Swt mengetahui jenis kelamin serta BB, seperti apa bentuk calon bayi tersebut, serta keindahan maupun kejelakan, umur dan rezekinya, sekarang maupun yang akan datang dll. Serta Allah Swt mengetahui juga apa yakni serta ovum yang berkurang dalam rahim sehingga akan menyebabkan kecacatan pada janin saat lahir atau terjadi keguguran dan Allah Swt mengetahui juga yang bertambah yakni tumbuh yang dalam keadaan kembar. Serta semua yang menyangkut maslaah kehamilan ataupun masalah lainnya, pada sisi-Nya dan ukuran-Nya yang sangat teliti baik dalam kualitas, kuantitas maupun kadar, waktu dan tempatnya. Allah Swt yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi, sehingga pada akhirnya tidak ada sesuatu pun yang ghaib bagi-Nya.

Ibu yang mengandung tidak dibolehkan memiliki pemikiran dan khawatir yang berlebihan tentang nasib bayi yang dikandung, Allah swt

sudah mentakdirkan segala sesuatu sehingga ibu yang mengandung tidak perlu memikirkan tentang kecatatan serta kesempurnaan bayi yang akan dilahirkan. Lahirnya bayi dalam keadaan sehat merupakan suatu anugerah yang patut disyukuri serta meskipun bayi lahir dalam keadaan mengalami kecatatan kita tetap harus bersyukur karena dibalik ujian pasti terdapat hikmah yang terkandung, segala sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah Swt atas nasib manusia harus kita yakini itulah yang terbaik untuk kita sehingga kita dapat mengambil hikmahnya setiap masalah yang menimpah kita serta tetap bersyukur tiap nikmat yang kita dapatkan..

3. Manifestasi Klinis

Tanda-tanda preeklamsi yaitu, penambahan BB yang berlebihan, pembengkakan, tekanan darah tinggi, dan proteinuria. Pada preeklampsia ringan tidak didapatkan gejala-gejala subyektif. Pada preeklampsia berat kita temukan nyeri pada kepala di daerah frontal, diplopia, penglihatan jadi kabur, sakit didaerah epigastrium, mual yang disertai muntah, tanda dan gejala ini sering didapatkan pada preeklampsia yang mengalami peningkatan dan suatu tanda akan munculnya eklamsi. (Sahbiyah, 2019)

4. Patofisiologis

Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya preeklamsi. Namun, bukti klinisnya dapat terlihat sejak trimester pertama ibu hamil, yaitu adanya perubahan patofisiologi tersamar yang terakumulasi sepanjang kehamilan, dan akhirnya menjadi nyata. Perubahan utama yang terlihat pada penderita preeklamsi yaitu adanya spasme pembuluh darah yang disertai adanya retensi garam dan air. Bila spasme arteriolardidapatkan di seluruh tubuh, maka dapat dipahami bahwa peningkatan TD adalah kompensasi mengatasi kenaikan tahanan perifer agar oksigenasi jaringan tetap tercukupi. Meningkatnya BB serta pembengkakan yang diakibatkan oedema yang berlebihan dalam ruang interstitial belum diketahui penyebabnya. Beberapa peneliti mengatakan pada preeklampsia didapatkan penurunan kadar aldosteron dan peningkatan kadar prolaktin dibandingkan pada kehamilan normal. Aldosteron penting untuk mempertahankan volume

plasma dan mengatur retensi air serta natrium. Pada preeklampsia permeabilitas pembuluh darah terhadap peningkatan protein (Fadli, 2017)

Vasodilati perifer dapat menyebabkan menurunnya TD karena akibat turunnya tonus otot polos arteriol. Kemungkinan ini terjadi karena terjadi peningkatan kadar progesteron di sirkulasi, atau terjadi penurunan kadar vasokonstriktor seperti angiotensin II, adrenalin, dan noradrenalin, serta dapat juga terjadi karena terjadinya penurunan respon terhadap zat-zat vasokonstriktor. Semua hal tersebut akan meningkatkan produksi vasodilator atau prostanoid seperti PGE₂ atau PGI₂. Pada trimester ketiga akan terjadi peningkatan tekanan darah yang normal seperti TD sebelum hamil (Fadli, 2017)

5. Penatalaksanaan

Adapun penanganan preeklampsia sebagai berikut:

a. Preeklampsia ringan

Beristirahat ditempat tidur adalah salah satu terapi yang dapat ditangani pada penderita preeklamsia ringan. Pada saat kita beristirahat dengan berbaring pada sisi tubuh akan terjadi peningkatan pada aliran darah menuju plasenta serta aliran darah ke ginjal. Tekanan vena pada ekstremitas bawah menurun dan reabsorpsi cairan bertambah. Selain itu dengan beristirahat ditempat tidur mengurangi kebutuhan volume darah yang beredar dan juga dapat menurunkan tekanan darah. Apabila preeklamsia tersebut tidak membaik dengan penanganan konservatif, apabila mengancam nyawa maka kehamilan harus di terminasi (Nurarif & Kusuma, 2015)

b. Preeklamsia berat

Pada klien yang menderita preeklamsia berat harus segera memberikan obat sedative kuat dimana pemberian obat ini kejang dapat dicegah. Jika bahaya akut sudah kita atasi pada waktu 12-24 jam, tindakan yang baik/tepat yaitu menghentikan kehamilan sebagai pengobatan mencegah timbulnya kejang, kita memberikan larutan magnesium sulfat (MgSO₄) 20% dengan dosis 4 gram secara intravena loading dose dalam 4-5 menit.

Kemudian dilanjutkan dengan MgSO_4 40% sebanyak 12 gr dalam 50 cc ringer laktat (RL) atau sekitar 14 tetes/menit. Tambahan magnesium sulfat hanya dapat diberikan jika diuresis pasien baik, reflex patella positif dan frekuensi pernafasan 16x/menit. Efek obat ini dapat menenangkan, TD dapat menurun dan meningkatkan diuresis. Selain magnesium sulfat, dosis 50 mg secara intramuscular ataupun diazepam 20 mg secara intramuscular (Nurarif & Kusuma, 2015)

Terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah serta mengatasi masalah preeklamsia yaitu:

1. Melakukan senam Aerobik
2. Diet rendah garam dan pemberian buah pisang
3. Relaksasi nafas dalam
4. Mendengarkan musik klasik dapat menurunkan tekanan darah
5. Manajemen stres (*Hypnobirthing* dapat dilakukan)

6. Pemeriksaan Penunjang

a. Pemeriksaan Lab

- 1) Pemeriksaan Darah Lengkap
 - a) Hb menurun (Hb normal pada wanita 12-14 gr/dl)
 - b) Hematokrit mengalami peningkatan (normal 37-43 vol%)
 - c) Serum kreatinin meningkat
 - d) Trombosit menurun (normal 150-450 mm^3)
 - e) hasil uric acid >7 mg/100 ml
- 2) Ultrasonography : dapat kita ketahui bagaimana keadaan janin
- 3) NST : Untuk mengetahui kesejahteraan janin
- 4) Urinalisasi : Untuk menilai adanya protein dalam urin

b. Pemeriksaan Radiologi

1) Pemeriksaan Ultrasonografi

Terdapat adanya pertumbuhan janin intrauterus. Pernafasan lambat intrauterus menjadi lambat, melambatnya kativitas janin, serta volume cairan ketuban sedikit.

1) Pemeriksaan Kardiografi

Melemahnya denyut jantung bayi (Nurarif & Kusuma, 2015)

7. Komplikasi

- a. Terjadi perubahan pada uterus dan plasenta. Terjadi penurunan aliran darah keplasenta yang akibatnya terjadi gangguan fungsi plasenta. Pada tekanan darah tinggi yang agak lama pertumbuhan janin akan terganggu. Sedangkan tekanan darah rendah bisa mengalami gawat janin sampai kematiannya karena kekurangan oksigenasi
- b. Terjadi perubahan pada ginjal. Terjadinya perubahan di ginjal terjadi karena aliran darah ke dalam ginjal mengalami penurunan, yang dapat menyebabkan filtrasi glomerulus berkurang. Pada penyelidikan biopsi menunjukkan kelainan pre eklamsi berupa : kelainan glomerulus, hiperplasia sel-sel jukstaglomerulus, kelainan pada tubulus-tubulus Henle, dan spasmus pembuluh darah ke glomerulus.
- c. Hepar. Saat pemeriksaan mikroskopik ditemukan adanya perdarahan dan nekrosis pada tepi lobulus, disertai trombosis pada pembuluh darah kecil, terutama disekitar vena porta.
- d. Pada Otak. Pada pemeriksaan yang belum lanjut hanya ditemukan pembengkakan serta anemia pada korteks serebri, pada keadaan lanjut dapat ditemukan perdarahan.
- e. Retina. Pada retina sering ditemui kelainan yaitu spasmus pada arteriola-arteriola, terutama pada siklus optikus dan retina.
- f. Paru. Dapat menunjukkan berbagai tingkat pembengkakan serta perubahan karena bronkopneumonia sebagai akibat aspirasi.
- g. Pada jantung. Biasa akan terjadi perubahan degeneratif pada miokardium. Biasa terdapat degenerasi lemak serta nekrosis dan terjadi perdarahan (Nurarif & Kusuma, 2015)

B. Konsep Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian

Pengkajian adalah suatu tahapan utama dalam memberikan asuhan keperawatan. Merupakan suatu kerja tim yang dapat melibatkan perawat, bu serta tim kesehatan lainnya. Berbagai cara yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan fisik dan wawancara/anamnesa. Yang dapat dilakukan pada ibu hamil kita dapat mengkaji hal-hal yaitu: (Sahbiyah, 2019) :

a. Riwayat kesehatannya

Dimana preeklamsia dapat ditemui pada primigravida, yakni umur dibawah 20 tahun atau diatas 35 tahun

- 1) Yang sering dikeluhkan ibu hamil sering muncul: ibu yang menderita preeklamsia sering mengeluh panas hingga nyeri kepala.
- 2) Riwayat kesehatan sekarang : tekanan darah mengalami peningkatan, pada ekstremitas terjadi oedema, seseorang mengalami pusing, sakit pada epigastrium, mual muntah, kaburnya penglihatan.
- 3) Riwayat Kesehatan terdahulu : pasien pernah mengalami penyakit ginjal , anemia, vaskular esensial, tekanan darah tinggi kronik serta DM.
- 4) Riwayat Kesehatan Keluarga: Keluarga yang menderita preeklamsia dan eklamsia.
- 5) Riwayat kehamilan: Ibu memiliki riwayat kehamilan ganda, mola hidatidosa, hidramnion serta riwayat kehamilan dengan preeklamsia atau eklamsia sebelumnya.
- 6) Status Nutrisi : apa-apa saja makanan yang seribu konsumsi baik makanan pokok maupun selingan.
- 7) Psikososial dan spiritual: emosi yang sulit dikontrol di kontrol sehingga timbulnya kecemasan pada ibu, sehingga perlu kesiapan moril untuk menghadapi resikoanya. (Sahbiyah, 2019)

b. Riwayat kehamilan ibu

Riwayat mola hidatidosa, kehamilan ganda, hidramnion dan riwayat kehamilan dengan eklamsia sebelumnya

- 1) Adanya riwayat pernah menggunakan alat kontrasepsi, apakah pasien pernah mengikuti kontrasepsi atau belum jika pasien dulunya memakai kontrasepsi kita tanyakan jenisnya, efek sampingnya, serta mengapa berhenti menggunakan alat tersebut (bila tidak memakainya kembali dan berapa lama menggunakan kontrasepsi).
- 2) Kaji sehari-hari aktivitas ibu. Pasien yang menderita preeklampsia biasa akan muncul ibu merasa lemah, peningkatan atau bisa jadi karena menurunnya BB, serta dapat di tandai dengan terjadinya edema pada wajah serta bagian ekstremitas. (Sahbiyah, 2019).

c. Pola eliminasi

Ibu yang mengalami preeklampsia sering ditemui gejala berupa proteinuria $+ \geq 5$ g/24 jam atau ≥ 3 pada tes celup, oliguria. (Sahbiyah, 2019)

d. Pola nutrisi

Pada pasien dengan preeklampsia sering terjadi meningkatnya BB atau menurunnya BB, dan terkadang sakit pada epigastrium (Sahbiyah, 2019)

e. Neurosensory

Pada pasien dengan preeklampsia sering mengalami tekanan darah tinggi, terkadang terjadi kejang atau koma. (Sahbiyah, 2019)

f. Pemeriksaan fisik

1) Keadaan umum : baik, cukup, lemah.

a) Tingkat kesadaran : composmentis (E: 4, V: 5, M: 6)

b) Leher dan kepala: pasien yang menderita preeklampsia terkadang terjadi oedem pada bagian wajah, bahkan leher terkadang terdapat pembesaran vena jugularis

c) Pemeriksaan thorax: dilihat adanya lesi, lecet, masa abnormal, dan adanya nyeri tekan pada payudara.

d) Pemeriksaan sistem pernafasan. Pasien yang menderita preeklampsia biasanya pernapasan < 16 x/I, setelah melakukan aktivitas klien akan sesak, serta adanya suara napas tambahan (Sahbiyah, 2019)

e) Pemeriksaan sistem kardiovaskuler

1) Inspeksi: tampak kebiruan, kulit pucat.

- 2) Palpasi: akan terjadi peningkatan dan TD, nadi meningkat atau menurun.
 - 3) Auskultasi: dilakukan untuk mengetahui/mendengarkan irama jantung
 - 4) Perkusi: untuk mengetahui apakah ada kelainan pada resonansi jantung. (Sahbiyah, 2019)
- f) Pemeriksaan ekstremitas pada pasien dengan preeklamsi sering terdapat oedem pada ekstremitas akibat gangguan filtrasi glomerulus yang meretensi garam dan natrium (Sahbiyah, 2019)
- g) Pemeriksaan sistem persyarafan: pada klien dengan preeklampsia kadang terjadi hiperfleksi, dan klonus pada kaki. (Sahbiyah, 2019)
- h) Pemeriksaan abdomen: pada klien ntranatal terjadi pembesaran pada perut sesuai usia kehamilan, apakah adanya sikatrik bekas operasi atau tidak. Pada pemeriksaan dengan cara palpasi maka akan ditemukan hasil:
- 1) Leopold I : akan teraba fundus uteri tiga jari di bawah procecus xyphoideus, lunak noduler, teraba massa lebar
 - 2) Leopold II : teraba tahanan terbesar di sebelah kiri, bagianbagian kecil janin disebelah kanan. Pada pemeriksaa n ni berfungsi untuk mendengar kan detak jantung janin, nilai normal detak jantung janin alah 142 kali dan terdengar regular.
 - 3) Leopold III: adanya teraba masa keras.
 - 4) Leopold V: Bagian terbawah janintelah masuk pintu atas panggul.
- i) Pemeriksaan genitalia: dengan klien yang mengalami preeklampsi harus diketeahui apakah terdapat cairan yang keluar melalui vagina yaitu lender yang bercampur darah. (Sahbiyah, 2019)

1. Diagnosis Keperawatan

- a) Nyeri Akut
- b) Gangguan pertukaran gas
- c) Hypervolemia
- d) Perfusi perifer tidak efektif
- e) Kecemasan

2. Intervensi Keperawatan

No	DIAGNOSA KEPERAWATAN	TUJUAN/KRITERIA HASIL	RENCANA TINDAKAN
1	<p>Nyeri Akut</p> <p>Data subjektif mayor</p> <p>1. Mengeluh nyeri</p> <p>Data objektif mayor</p> <p>1. Tampak meringis</p> <p>2. Gelisah</p> <p>3. Susah tidur</p> <p>Data subjektif minor</p> <p>1. Tidak tersedia</p> <p>Data objektif minor</p> <p>1. Tekanan darah meningkat</p> <p>2. Nafsu makan berubah</p> <p>3. Berfokus pada diri sendiri</p>	<p>Setelah dilakuakn asuhan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan sakit dapat teratasi dengan kroteria hasil:</p> <p>1. Keluhan sakit dapat menurun</p> <p>2. Meringis menurun</p> <p>3. Gelisah menurun</p> <p>4. Kesulitan tidur menurun</p> <p>5. Nafsu makan membaik</p> <p>6. Tekanan darah membaik</p>	<p>Observasi</p> <p>1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p> <p>2. Identifikasi skala nyeri</p> <p>3. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri</p> <p>4. Monitor efek samping penggunaan analgesik</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>2. Fasilitasi istirahat dan tidur</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Jelaskan periode, penyebab dan pemicu nyeri</p> <p>2. ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri.</p> <p>Kolaborasi</p> <p>1. Pemberian analgetik</p>
2	<p>Gangguan pertukaran gas</p>	<p>Setelah dilakukan ntervensi keperawatan selama 1x 24 jam</p>	<p>Observasi</p> <p>1. Monitor jalan napas (frekuensi, kedalaman,</p>

	<p>Data subjektif mayor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dispnea <p>Data objektif mayor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PCO2 meningkat/menurun 2. PO2 menurun 3. Takikardi 4. pH arteri meningkat/menurun 5. Bunyi nafas tambahan <p>Data subjektif minor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusing 2. Penglihatan kabur <p>Data objektif minor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sianosis 2. Diaphoresis 3. Gelisah 4. Nafas cuping hidung 5. Pola nafas abnormal (cepat/lambat, reguler/ireguler, dalam/dangkal) 6. Warna kulit abnormal (pucat, kebiruan) 7. Kesadaran menurun 	<p>dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernafasan cuping hidung menurun 2. Pco2 dan Po2 membaik 3. Sianosis menurun 4. Pola nafas membaik 	<p>usaha napas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Monitor bunyi napas tambahan <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertahankan kepatenan jalan napas 2. Berikan oksigen <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu
3	<p>Hypervolemia</p> <p>Data subjektif mayor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ortopnea 2. Dispnea 3. Paroxysmal nocturnal dispnea <p>Data objektif mayor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oedema anasarca/oedema perifer 	<p>Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3x24 jam maka diharapkan pasien mampu memenuhi</p> <p>Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oedema menurun 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa tanda dan gejala hypervolemia (mis: edema) 2. Identifikasi penyebab hypervolemia 3. Monitor intake dan output cairan 4. Monitor tanda peningkatan tekanan onkotik (mis kadar protein dan albumin

	<p>2. Berat badan meningkat dalam waktu singkat</p> <p>3. JVP/CVP meningkat</p> <p>4. Reflex hepatojugular positif</p> <p>Data subjektif minor</p> <p>1. Tidak tersedia</p> <p>Data objektif minor</p> <p>1. Distensi vena jugularis</p> <p>2. Terdengar suara nafas tambahan</p> <p>3. Hepatomegali</p> <p>4. Kadar Hb/ht turun</p> <p>5. Oliguria</p> <p>6. Intake lebih banyak dari output</p> <p>7. Kongesti patu</p>		<p>meningkat)</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Batasi asupan cairan dan garam</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Anjurkan melapor jika haluaran urin <0,5 mL/kg/jam dalam 6 jam</p> <p>2. Anjurkan cara membatasi cairan</p> <p>Kolaborasi</p> <p>1. Kolaborasi pemberian deuretik</p>
4	<p>Perfusi perifer tidak efektif</p> <p>Data subjektif mayor</p> <p>1. Tidak tersedia</p> <p>Data objektif mayor</p> <p>1. Pengesihan kapiler >3 detik</p> <p>2. Nadi perifer menurun dan tidak teraba</p> <p>3. Akral dingin</p> <p>4. Warna kulit pucat</p> <p>5. Turgor kulit menurun</p> <p>Data subjektif minor</p> <p>1. Parastesia</p> <p>2. Nyeri ekstremitas (klaudikasi ntermitten)</p>	<p>Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil:</p> <p>1. Warna kulit pucat menurun</p> <p>2. Kelemahan otot membaik</p>	<p>Observasi</p> <p>1. Periksa sirkulasi perifer (mis. nadi perifer, pengisian kapiler, warna, suhu)</p> <p>2. Identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Lakukan hidrasi</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Informasikan tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan (mis rasa sakit yang tidak hilang saat istirahat)</p>

	<p>Data objektif minor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oedema 2. Penyembuhan luka lambat 3. Indeks ankle-brachial <0,90 4. Bruit femoral 		
5	<p>Ansietas</p> <p>Data subjektif mayor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merasa bingung 2. Merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi 3. Sulit berkonsentrasi <p>Data objektif mayor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tampak gelisah 2. Tampak tegang 3. Susah tidur <p>Data subjektif minor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluh pusing 2. Anoreksia 3. Palpitasi 4. Merasa tidak berdaya <p>Data objektif minor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Frekuensi napas meningkat 2. Frekuensi nadi meningkat 3. TD meningkat 4. Diaforesis 5. Gemetar 6. Muka tampak pucat 7. Suara bergetar 8. Kontak mata buruk 9. Sering berkemih 10. Berorientasi pada masa lalu 	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4x24 jam diharapkan masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluh pusing menurun 2. Perilaku gelisah menurun 3. Perilaku tegang menurun 4. Pola tidur membaik 5. Tekanan darah sedang 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui apakah pasien mengalami kelemahan 1. Untuk memberi rasa nyaman dan rileks pada pasien 2. Untuk mengetahui apakah pasien dapat beradaptasi dengan terapi yang diberikan atau tidak 3. Untuk mengetahui adanya peningkatan tekanan darah dan kenaikan suhu pasca latihan 4. Untuk mengetahui apakah ada perubahan pada pasien setelah melakukan terapi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memberikan rasa nyaman dan aman pada pasien 2. Agar klien dan keluarga dapat melakukan prosedur yang baik dan benar 3. Agar klien lebih nyaman dan bebas bergerak 4. Agar pasien merasa lebih rileks 5. Untuk mempercepat penyembuhan <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar pasien dan keluarga dapat tahu apa tujuan dan manfaat yang dilakukan untuk mengatasi kecemasan

			<p>2. Agar pasien mengerti dan dapat mengulang-ulang ntervensi yang telah diberikan</p> <p>3. Untuk memberikan rasa tenang pada pasien</p> <p>4. Agar pasien merasa lebih santai</p> <p>5. Agar ansietas berkurang</p> <p>6. Agar pasien dapat mengikuti teknik, tersebut.</p>
--	--	--	--

3. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan terapan dari intervensi keperawatan dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengumpulkan data, mengobservasi bagaimana respon dari klien selama dan setelah pemberian tindakan (Purnomo 2016).

4. Evaluasi

Evaluasi keperawatan adalah tahapan akhir proses asuhan keperawatan dengan memberikan penilaian dengan melihat perubahan pada klien untuk tujuan dari kriteria hasil yang dibuat pada tahapan perencanaan (Purnomo, 2016).

C. Evidence Based Nursing

1. Pengertian

Rendam kaki menggunakan air hangat merupakan metode perawatan kesehatan yang terkenal di kalangan masyarakat china. Pengobatan tradisional china menyarankan melakukan rendam kaki menggunakan air hangat setiap harinya untuk meningkatkan sirkulasi darah serta dapat membuat tubuh lebih rileks (Gunawan, 2014).

Rendam kaki menggunakan air yang hangat mempunyai efek fisik panas atau hangat yang dapat menyebabkan zat cair, padat, dan gas mengalami pemuaian ke segala arah dan dapat meningkatkan reaksi kimia. Pada jaringan akan terjadi metabolisme seiring dengan peningkatan pertukaran antara zat kimia tubuh dengan cairan tubuh. Efek biologis

panas/hangat dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan meningkatnya sirkulasi darah. Secara fisiologis respon tubuh terhadap panas adalah menyebabkan dilatasi pembuluh darah, menurunkan kekentalan darah, menurunkan ketegangan otot, meningkatkan metabolisme jaringan dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Sehingga efek panas atau hangat pada terapi merendam kaki dengan air hangat dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang dapat meningkatkan sirkulasi darah, sehingga efektif menurunkan TD ibu hamil dengan TD tinggi bila dilakukan terus menerus (Asrofin, 2020).

2. Tujuan

- a. Untuk menurunkan tekanan darah (Hardianti, dkk. 2018).
- b. Untuk mengurangi kecemasan

3. Indikasi

Terapi merendam kaki air hangat dapat diberikan pada pasien yang mengalami:

- a. Hipertensi
- b. Ansietas
- c. Gangguan Pola Tidur

4. Kontraindikasi

- a. Seseorang yang menderita hipotensi
- b. Orang yang sakit DM (Damayanti, dkk. 2014)

5. Prosedur pemberian dan rasionalisasi

Prosedur serta persiapan alat dan bahan dalam melakukan terapi merendam kaki menggunakan air hangat dalam menurunkan TD menurut (Harnani, dkk. 2017).

Tabel 1.1

Prosedur Tindakan Terapi Merendam Kaki Menggunakan Air Hangat Untuk Menurunkan TD

Prosedur Tindakan	Rasional
<p>1. Persiapan alat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tempat duduk b. Baskom c. Pengukur suhu d. Air yang sudah dipanaskan e. Air yang Dingin f. Handuk g. Stopwatch h. Tensi i. Stetoskop 	<p>Persiapan untuk melakukan tindakan</p>
<p>a. Tahap Orientasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengucapkan salam, serta memperkenalkan diri 2. Menjelaskan tujuan, berapa lama dilakukan tindakan kepada pasien serta prosedur tindakan.  <p>a. Tahap Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mendekatkan peralatan ke pasien 2. Posisi pasien duduk di kursi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membangun hubungan saling percaya dengan komunikasi terapeutik 2. Agar pasien mengetahui tindakan yang akan diberikan. <p>Agar lebih mudah dilakukan intervensi dan membuat klien merasa nyaman</p>

	
<p>3. Memeriksa TD 10 menit sebelum merendam kaki</p> <p>4. Membersihkan kaki jika tampak kotor</p> 	<p>Untuk mengetahui tekanan darah klien sebelum dilakukan intervensi sehingga dapat dilihat apakah ada perubahan setelah diberikan intervensi</p>
<p>5. Memasukkan air hangat dengan suhu 38-40°C kedalam baskom dengan menggunakan termometer</p> 	<p>Merendam kaki menggunakan air hangat dapat merangsang syaraf yang terdapat di kaki sehingga dapat bekerja serta berfungsi memperlebar pembuluh darah dan melancarkan peredaran darah.</p>
<p>6. Memasukkan serta merendam kaki sampai mata kaki membiarkan selama 20-30 menit, ketika air sudah mulai dingin tambahkan air hangat kembali..</p>	<p>Merendam kaki dengan air hangat maka syaraf yang berada di kaki akan terangsang untuk bekerja dan berfungsi</p>

	<p>memperlebar pembuluh darah serta melancarkan peredaran darah dan merendam kaki air hangat membuat seseorang merasa nyaman, dimana rasa hangat yang menyentuh kulit merangsang hormon endorphin yang dapat menimbulkan rasa rileks.</p>
<p>7. Setelah selesai maka angkat kaki dan keringkan menggunakan handuk</p> 	<p>Untuk menghindari resiko jatuh pada klien</p>
<p>8. Ukur kembali tekanan darah selama 10 menit sesudah melakukan terapi merendam kaki menggunakan air hangat</p> 	<p>Untuk melihat apakah terjadi perubahan TD setelah dilakukan terapi rendam kaki</p>
<p>b. Tahap Terminasi</p> <p>1. Mengevaluasi hasil tindakan yang dilakukan</p>	<p>1. Untuk mengetahui hasil tindakan intervensi</p>

<p>2. Kontrak waktu untuk melakukan kegiatan selanjutnya</p> <p>3. Rapikan peralatan</p> <p>4. Lakukan pendokumentasian</p>	<p>yang telah dilakukan</p> <p>2. Menjadwalkan kembali kegiatan berikutnya</p> <p>3. Mengembalikan alat ketempat semula</p>
	

6. Kriteria evaluasi

- a. Setelah dilakukan ntervensi tekanan darah menurun
- b. Setelah dilakukan ntervensi klien tidak merasakan cemas

BAB III
LAPORAN KASUS

A. Pengkajian

IDENTITAS KLIEN

Nama klien : Ny. "R"
Umur : 21 Tahun
Tanggal pengkajian : 07 April 2021

I. DATA UMUM

Inisial klien : Ny. "R"
Umur : 21 Tahun
Status perkawinan : Menikah
Pekerjaan : IRT
Pendidikan terakhir : SMA

Riwayat kehamilan dan persalinan lalu

Klien mengatakan ini adalah kehamilan yang pertama

Riwayat Ginekologi

Masalah ginekologi : -
Pengalaman KB : Klien mengatakan belum pernah menggunakan KB

Riwayat Kehamilan Saat ini

HPHT : 20-08-2020
Taksiran partus : 27-05-2021
Berat Badan Sebelum hamil : 50 kg
Tekanan Darah Sebelum Hamil : Klien mengatakan tekanan darah sebelum hamil 140/100 mmHg sampai 160/80 mmHg.

TD	BB/TB	TFU	Letak/ presentasi janin	DJJ	Usia gestasi	Keluhan
200/100 mmHg	62 kg 152,5 cm	26 cm	Kepala BAP	138 x/i	34 minggu	<p>Klien mengatakan kadang sakit atau pegal pada bagian punggungnya</p> <p>P: Pasien mengatakan kadang sakit dirasakan</p> <p>Q:Pasien mengatakan sakit yang di rasakan seperti tertusuk-tusuk</p> <p>R:Pasien mengatakan sakit yang dirasakan bagian punggung</p> <p>S: Klien mengatakan skala nyeri yang dirasakan 3 (ringan)</p> <p>T:Klien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul , dan merasa gatal pada perut dan pahanya. Klien mengatakan sulit tidur pada malam hari, klien mengatakan biasa</p>

						tidurnya hanya 3-4 jam, serta klien mengatakan merasa pusing.
--	--	--	--	--	--	---

DATA UMUM KESEHATAN SAAT NI

- Status obstetri : G: 1 P:0 A:0 H:34
- Keadaan umum : Baik, klien mampu berkomunikasi secara kooperatif dan klien mampu berjalan tanpa di bantu.
- Kesadaran : Komposmentis GCS: 15
E:4 M:6 V:5
- BB/TB : 62 kg/152,5 cm
- Tanda-tanda vital
- TD : 200/100 mmHg
- N : 84 x/i
- S : 36,2°C
- P : 22 x/i
- Kepala dan leher**
- Kepala : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan. Klien mengatakan tidak mengalami rambut rontok selama kehamilan.
- Mata : Sklera tidak kteris, konjungtiva berwarna merah muda, dan penglihatan klien masih bagus dan tidak ada penggunaan alat bantu penglihatan
- Hidung : Tidak ada kelainan kongetital, simetris, nares nasal bersih, septum utuh dan tidak ada nyeri.
- Mulut : Lidah berwarna merah muda, tidak ada gigi yang berlubang tidak terdapat halitosis

Telinga	:	Pendengaran klien masih bagus, tidak ada nyeri tekan
Leher	:	Tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid, kesulitan menelan tidak ada
Masalah khusus	:	Tidak ada masalah
Dada		
Jantung	:	Perkusi pekak, klien mengatakan tidak ada riwayat penyakit jantung
Paru	:	Tidak ada suara napas tambahan. Klien mengatakan tidak memiliki riwayat sesak napas.
Payudara	:	Simetris. Tidak ada nyeri tekan. Puting susu sudah nampak.
Puting susu	:	Kedua puting susu nampak keluar
Pengeluaran ASI	:	Terdapat pengeluaran ASI sedikit pada kedua puting susu
Masalah khusus	:	Tidak ada masalah khusus
Abdomen		
Uterus		
TFU	:	26 cm
Kontraksi	:	Tidak ada kontraksi
Leopold I	:	TFU 26 cm, LP: 90 cm, TBJ: 2.340 g
Leopold II	:	PUKA
Leopold III	:	Presentasi kepala
Leopold V	:	BAP
Pigmentasi		
Linea nigra	:	Tidak terdapt linea nigra pada abdomen klien
Striae	:	Terdapat striae di liaka dekstra dan sinistra
Fungsi pencernaan	:	Klien mengatakan BAB lancar biasanya 2 kali sehari, klien mengatakan tidak ada

kesulitan menelan dan nafsu makan baik
Masalah khusus : Tidak ada

Perineum dan genetalia

Vagina : Tidak terdapat varises di sekitar vagina.
Klien mengatakan kadang mengalami keputihan.

Hemoroid : Klien mengatakan tidak memiliki riwayat hemoroid

Masalah khusus : Tidak ada masalah khusus

Ekstremitas

Ekstremitas atas : Tidak terdapat edema pada kedua esktremitas

Ekstremitas bawah : Klien mengatakan biasa kram pada kaki.
terdapat edema pada kedua esktremitas.

Masalah khusus : Tidak ada masalah khusus

Eliminasi

Urin : Klien mengatakan sering BAK 6 kali sehari bahkan lebih.

Fekal : Klien mengatakan BAB lancar biasanya 2 kali sehari

Mobilisasi dan latihan

Tingkat mobilisasi : Kemampuan mobilisasi baik, klien tidak menggunakan alat bantu dan klien mampu melakukan aktivitas secara mandiri.

Latihan/senam : Klien mengatakan selama hamil tidak pernah mengikuti senam kehamilan tetapi sering melihat di Hp gerakan senam hamil dan mengikuti gerakannya.

Masalah khusus : Tidak ada masalah

Nutrisi dan Cairan

Asupan nutrisi : Klien mengatakan mengonsumsi berbagai sayur, klien mengatakan sering makan sayur kelor dan buah (pepaya, apel, pir dan anggur). Klien mengatakan pernah meminum susu khusus ibu hamil tapi sekarang sudah tidak.

Nafsu makan : Klien mengatakan nafsu makan baik, makan 3x sehari

Asupan cairan : Klien mengatakan kuat minum, minum air 5-8 gelas/hari

Keadaan mental

Adaptasi psikologis : Klien mengatakan cemas memikirkan tekanan darahnya yang tinggi.

Penerimaan terhadap kehamilan : Klien menerima kehamilannya dan klien mengatakan sangat senang dengan kehamilan pertamanya dan tidak sabar menunggu kelahiran buah hatinya.

Masalah khusus : tidak ada

Pola hidup yang meningkatkan risiko kehamilan

Tidak ada

Persiapan persalinan

Klien sudah menyiapkan berbagai macam kebutuhan bayinya, dan klien mengatakan rencana melahirkan di Puskesmas atau RS

Obat-obatan yang dikonsumsi

1. SF 1x1
2. Kalk 1x1
3. Vitamin 1x1
4. Nifedipine 20 mg 1x1

B. Klasifikasi Data

2.1 Klasifikasi Data

Data Subjektif	Data Objektif
<p>1. Klien mengatakan kadang sakit atau pegal pada bagian punggungnya P:pasien mengatakan kadang sakit dirasakan Q:pasien mengatakan sakit yang di rasakan seperti tertusuk-tusuk R:Klien mengatakan sakit yang dirasakan bagian punggung S:Klien mengatakan skala nyeri yang dirasakan 3 (ringan) T:Klien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul</p> <p>2. Klien mengatakan sulit tidur pada malam hari</p> <p>3. Klien mengatakan cemas memikirkan tekanan darahnya yang tinggi</p> <p>4. Klien mengatakan merasa pusing</p> <p>5. Pasien mengatakan pada malam hari dia sulit tidur</p> <p>6. Pasien mengatakan tekanan darah sebelum hamil 140/100 mmHg sampai 160/80</p>	<p>1. Klien tampak lemas</p> <p>2. TD: 200/160 mmHg</p> <p>3. pasien tampak gelisah</p> <p>4. pasien tampak meringis</p> <p>5. pasien tampak cemas</p>

mmHg.	
-------	--

C. Analisis Data

Tabel 2.2 Analisa Data

No	Data	Etiologi	Masalah Keperawatan
1.	<p>DS</p> <p>1. Klien mengatakan kadang sakit atau pegal pada bagian punggungnya</p> <p>P:pasien mengatakan kadang sakit dirasakan</p> <p>Q:pasien mengatakan sakit yang di rasakan seperti tertusuk-tusuk</p> <p>R:pasien mengatakan sakit yang dirasakan bagian punggung</p> <p>S:Klien mengatakan skala nyeri yang dirasakan 3 (ringan)</p> <p>T:Klien</p>	<pre> graph TD A[Bertambahnya usia kehamilan] --> B[Perubahan berat badan dan titik berat badan pindah kedepan/ peningkatan tinggi fundus uteri] B --> C[Tulang belakang harus menopang beban tubuh ibu hamil dan janin] C --> D[Dapat menyebabkan nyeri atau pegal pada punggung] D --> E[Nyeri Akut] </pre>	Nyeri Akut

	<p>mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul</p> <p>DO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak lemas 2. TD: 200/160 mmHg 3. Klien tampak meringis 		
2.	<p>DS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengatakan cemas memikirkan tekanan darahnya yang tinggi 2. Klien mengatakan merasa pusing 3. Pasien mengatakan pada malam hari dia sulit tidur 7. Klien mengatakan tekanan darah sebelum hamil 140/100 mmHg sampai 160/80 mmHg. <p>DO</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Terjadi <i>blocking antibodies</i> terhadap antigen plasenta yang terbentuk pada kehamilan pertama menjadi penyebab hipertensi</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Tekanan darah yang meningkat menjadi masalah besar pada kehamilan ibu</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Ansietas</p> </div>	<p>Ansietas</p>

1.	TD: 200/160 mmHg		
2.	Klien tampak gelisah		
3.	Klien tampak cemas		

D. Diagnosa Keperawatan

Tabel 2.3
Diagnosa Keperawatan

No	Diagnosa
1	Nyeri Akut
2	Ansietas

E. Intervensi Keperawatan

Tabel 2.4
Rencana Asuhan Keperawatan

No	Diagnosa Keperawatan	Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
1.	Nyeri Akut	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun dengan Kriteria Hasil: 1. keluhan nyeri menurun (5) 2. Kesulitan tidur menurun (5)	Manajemen Nyeri Observasi 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan ntensitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri Terapeutik 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam)	Observasi 1. Mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan ntensitas sakit dari pasien 1. Mengetahui tingkat sakit yang dirasakan Terapeutik 1. Mengetahui tingkat nyeri yang dirasakan

			<p>Edukasi</p> <p>1. Menjelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri</p>	<p>Edukasi</p> <p>1. Memberikan informasi terkait nyeri yang dirasakan klien</p>
2	Ansietas	<p>Setelah melakukan tindakan keperawatan selama 4x24 jam diharapkan tingkat ansietas dan tekanan darah menurun</p> <p>1. Keluhan pusing menurun (5)</p> <p>2. Tekanan darah menurun (5)</p>	<p>Pemberian terapi merendam kaki air hangat dalam menurunkan kecemasan dan TD tinggi</p>	<p>Untuk mengurangi kecemasan dan tekanan darah tinggi</p>

F. Implementasi keperawatan

Tabel 2.5
Implementasi Keperawatan

No	Diagnosa	Hari/Tgl	Implementasi	Nama Jelas
1	Nyeri Akut	Jum'at, 9 April 2021 14:13	<p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan ntensitas nyeri</p> <p>Hasil:</p> <p>P: Klien mengatakan nyeri</p> <p>Q: Klien mengatakan nyeri seperti tertusuk”</p> <p>R: Klien mengatakan nyeri yang dirasakan bagian punggung</p> <p>S: Klien mengatakan skala nyeri 3 (ringan)</p> <p>T: Nyeri hilang timbul</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (Gosok Punggung)</p> <p>Hasil: Melakukan pijat punggu pada klien</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Menjelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri</p> <p>Hasil : Klien diberikan penjelasan penyebab nyeri yang dirasakan</p>	Mustika
		14:18		
		14:33		

2	Ansietas	Jum'at, 9 April 2021 14:43	Memberikan terapi rendam kaki air hangat dalam menurunkan kecemasan dan tekanan darah Hasil : Klien melakukan rendam kaki air hangat	Mustika
3	Nyeri	Sabtu, 10 April 2021 16:00	Mengedukasi melakukan gosok punggung ketika nyeri dirasakan Hasil: Klien tampak mengerti penjelasan yang diberikan	Mustika
4	Ansietas	Sabtu, 10 April 2021 17:29	Memberikan terapi rendam kaki air hangat dalam menurunkan kecemasan dan tekanan darah Hasil : Klien melakukan rendam kaki air hangat	Mustika
5	Ansietas	Minggu, 11 April 2021 16:00	Memberikan terapi rendam kaki air hangat dalam menurunkan kecemasan dan tekanan darah Hasil : Klien melakukan rendam kaki air hangat	Mustika
6	Nyeri	Minggu, 11 April 2021 17:15	Mengedukasi melakukan gosok punggung ketika nyeri dirasakan Hasil: Klien tampak mengerti	

UNIVERSITAS ALAUDDIN
MAKASSAR

G. Evaluasi

Tabel 2.6 Evaluasi

No	Diagnosa	Waktu	Evaluasi	Nama Jelas
1	Nyeri Akut	Jum'at 9 April 2021	<p>S : Klien mengatakan agak mendingan dan sakitnya berkurang</p> <p>O: Klien tidak meringis</p> <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan ntervensi</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan ntensitas nyeri <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (Gosok Punggung) <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri 	Mustika
2	Ansietas	Jum'at 9 April 2021	<p>S: Klien mengatakan cemas memikirkan tekanan darahnya yang selalu tinggi dan merasa pusing</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TD sebelum rendam kaki air hangat : 200/110 2. TD sesudah merendam kaki air hangat : 190/110 <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan ntervensi</p>	Mustika

			1. Pemberian terapi rendam kaki air hangat dalam menurunkan kecemasan dan TD tinggi	
3	Nyeri	Sabtu, 10 April 2021	<p>S: Klien mengatakan akan melakukan gosok punggung saat timbul rasa nyeri</p> <p>O : Klien tampak mengerti penjelasan yang diberikan</p> <p>A: Masalah teratasi</p> <p>P: Lanjutkan ntervensi</p> <p>1. Edukasi melakukan gosok punggung ketika nyeri timbul</p>	Mustika
4	Ansietas	Sabtu, 10 April 2021	<p>S: Klien mengatakan cemas tekanan darahnya masih tinggi</p> <p>O:</p> <p>1. TD sebelum rendam kaki air hangat : 200/130</p> <p>2. TD sesudah rendam kaki air hangat : 190/100</p> <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Melanjutkan ntervensi</p> <p>1. Pemberian terapi rendam kaki air hangat dalam menurunkan kecemasan dan TD tinggi</p>	Mustika
5	Ansietas	Minggu, 10 April 2021	<p>S: Klien mengatakan</p> <p>O</p> <p>1. TD sebelum rendam kaki air hangat : 180/130</p>	Mustika

			<p>2. TD sesudah rendam kaki air hangat : 180/100</p> <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan ntervensi</p> <p>1. Edukasi melakukan gosok punggung ketika nyeri muncul</p>	
6	Nyeri	Minggu, 10 April 2021	<p>S: Klien mengatakan melakukan gosok punggung ketika nyeri timbul</p> <p>O: Klien tampak paham yang di jelaskan</p> <p>A: Masalah teratasi</p> <p>P: Pertahankan ntervensi</p> <p>1. Pemberian terapi merendam kaki menggunakan air hangat dalam mengurangi kecemasan dan TD tinggi</p>	Mustika

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisa Kasus

Pengkajia merupakan pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien, agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah-masalah, kebutuhan kesehatan dan keperawatan pasien, baik fisik, mental, sosial dan lingkungan (Dermawan, 2012).

Pasien Ny. R berusia 21 tahun melakukan kunjungan ke puskesmas bajeng untuk memeriksakan kehamilannya pada tanggal 07 April 2021. saat dilakukan pengkajian didapatkan Leopold : TFU 26 cm, LP: 90 cm, TBJ: 2.340 g, dan Leopold PUKA, Leopold : Presentasi Kepala dan Leopold V : BAP. Klien juga mengatakan kadang sakit atau pegal pada bagian punggungnya, dan merasa gatal pada perut dan pahanya. Klien mengatakan sulit tidur pada malam hari, dan biasa tidurnya hanya 3-4 jam serta klien mengatakan merasa pusing. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada saat pengkajian di dapatkan kondisi klien composmentis dengan GCS E4 M6 V5: 15. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan TD: 200/100 mmHg, N: 84x/i, S: 36,2°C, P: 22x/i.

Seseorang yang mengalami preeklamsia banyak masalah diagnosa keperawatan yang dapat muncul yaitu Gangguan rasa nyaman nyeri, Gangguan pertukaran gas, Hypervolemia, Perfusi perifer tidak efektif , Kecemasan dan pada hasil pengkajian peneliti mendapatkan dua diagnosa yaitu Nyeri akut dan Ansietas.

Dalam teori pada ibu hamil tu akan mengalami nyeri, dimana Nyeri punggung pada ibu hamil trimester dan merupakan keluhan umum yang sering terjadi di kalangan ibu hamil. Sakit punggung bawah adalah ketidaknyamanan yang terjadi dibawah *costa* dan di atas bagian *inferior gluteal*. Sakit punggung bawah merupakan gangguan yang umum terjadi, dan ibu hamil mungkin saja memiliki riwayat “sakit punggung” dimasa lalu. Sakit punggung bawah sangat sering terjadi dalam kehamilan sehingga digambarkan sebagai salah satu gangguan minor dalam kehamilan, gejala sakit biasanya terjadi antara empat

sampai tujuh bulan kehamilan dan sakit biasanya terasa di punggung bagian bawah, terkadang menyebar ke bokong dan paha, dan terkadang turun ke kaki sebagai siatika (Robson & Jason, 2012).

Banyak bu hamil mengalami sakit pada punggung bawah selama masa kehamilan. Secara umum sakit punggung bawah pada bu hamil dipengaruhi beberapa faktor yaitu 1) Peningkatan berat badan dan fisiologi tulang belakang. 2) Adanya kelengkungan tulang belakang bu hamil meningkat ke arah akhir kehamilan dan perubahan postur tubuh. 3) Adanya ketidakseimbangan antara otot agonis dan antagonis, yaitu M. erector spine dan kelompok neksoor lumbalis. Keadaan atau posisi yang salah tersebut jika berlangsung lama akan menimbulkan ketegangan pada ligament dan otot yang menyebabkan kelelahan pada M. abdomanalis (Latief, 2016). 4) Uterus yang membesar akan memperbesar derajat lordosis sehingga sering menyebabkan sakit pinggang (Schroder et al, 2016).

Kesulitan tidur pada malam hari. Pada bu hamil trimester umumnya mengalami perubahan fisiologis, salah satunya yakni kesulitan tidur. Perubahan selama kehamilan akan mempengaruhi pemenuhan istirahat tidur karena sulit menentukan posisi tidur yang nyaman, perubahan hormonal juga menyebabkan perubahan psikis sehingga bu hamil sulit tidur dan seiring membesarnya perut bu, gerakan janin dalam rahim dan rasa tidak enak di ulu hati (Mediarti, dkk. 2014). Dalam teori orang yang mengalami preeklamsia akan terdapat tanda dan gejala yaitu terjadinya peningkatan tekanan darah, dimana pada saat pemeriksaan di dapatkan TD: 200/100 mmHg. Klien mengatakan tekanan darah sebelum hamil 140/100 mmHg sampai 160/80 mmHg. Menurut teori preeklamsia dapat dideteksi ketika kehamilan \leq 34 minggu dan ditemukan tekanan darah sistol $<$ 110 mmHg maka pasien memiliki komplikasi kehamilan yaitu preeklamsia (Pratiwi, 2020).

Penyebab utama dari preeklamsia masih belum diketahui. Namun, bukti klinisnya tampak sejak awal kehamilan, berupa perubahan patofisiologi tersamar yang terakumulasi sepanjang kehamilan, dan akhirnya menjadi nyata. Perubahan utama yang didapatkan di preeklamsia yaitu terdapatnya spasme

pembuluh darah disertai dengan retensi garam dan air. Bila spasme arteriolar juga ditemukan di seluruh tubuh, maka dapat dipahami bahwa TD yang meningkat adalah kompensasi mengatasi kenaikan tahanan perifer agar oksigenasi jaringan tetap tercukupi.

Faktor primigravida sering dialami stres dalam menghadapi persalinan sehingga stres emosi yang terjadi menyebabkan pelepasan *corticotropic releasing hormone* (CRH) oleh hipotalamus, yang kemudian menyebabkan peningkatan kortisol. Efek kortisol akan merespon tubuh untuk meningkatkan simpatis dalam meningkatkan curah jantung untuk mempertahankan tekanan darah, hipertensi terjadi apabila ada peningkatan curah jantung dan resistensi perifer total (Pratiwi, 2020).

Dalam teori orang yang mengalami preeklamsia akan terdapat tanda dan gejala berupa bertambahnya BB yang berlebihan, pembesaran, dan proteinuria. Pada preeklamsia ringan tidak ditemukan gejala-gejala subyektif. Pada preeklamsia berat didapatkan nyeri kepala di daerah frontal, diplopia, penglihatan kabur, sakit di daerah epigastrium, mual atau muntah. Gejala-gejala ini sering ditemukan pada preeklamsia yang meningkat dan merupakan petunjuk bahwa eklamsia akan timbul (Sahbiyah, 2019).

Dalam hasil pengkajian yang peneliti lakukan pasien tidak mengalami penambahan berat badan yang berlebihan dan tidak terlalu nampak terjadinya edema sedangkan kita ketahui orang yang mengalami preeklamsia terjadi peningkatan BB dan pembengkakan yang disebabkan penimbunan cairan yang berlebihan dalam ruang interstitial belum diketahui penyebabnya. Beberapa literatur menyebutkan bahwa pada preeklamsia dijumpai kadar aldosteron yang rendah dan kadar prolaktin yang tinggi dibandingkan pada kehamilan normal. Aldosteron penting untuk mempertahankan volume plasma dan mengatur retensi air serta natrium. Pada preeklamsia permeabilitas pembuluh darah terhadap protein meningkat (Fadli, 2017).

B. Analisis Intervensi

Intervensi yang diberikan yaitu terapi merendam kaki menggunakan air hangat dalam menurunkan TD pada pasien preeklamsi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh nayah, dkk (2021), dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perubahan TD baik sistolik maupun diastolik sebelum dan sesudah di berikan perlakuan terapi rendam kaki air hangat pada kelompok ntervensi. Hasil analisis data di peroleh bahwa rata-rata tekanan darah sistolik sebelum perlakuan adalah 153 mmHg dengan standar deviasi 14,94 dan tekanan darah diastolik 96 mmHg dengan standar deviasi 10,75, sedangkan rata-rata TD sistolik setelah perlakuan 135 mmHg dengan standar deviasi 8,49 dan tekanan darah diastolik 88 mmHg dengan standar deviasi 7,88. Karena merendam kaki menggunakan air hangat dapat merangsang syaraf yang ada di kaki untuk bekerja dan berfungsi mempelebar pembuluh darah serta melancarkan peredaran darah.

Melakukan rendam kaki menggunakan air yang hangat merupakan salah satu cara terapi kesehatan yang terkenal di kalangan masyarakat China. Pengobatan tradisional China menyarankan melakukan merendam kaki menggunakan air hangat setiap hari untuk meningkatkan sirkulasi darah dan dapat membuat tubuh menjadi rileks, kaki merupakan jantung kedua tubuh manusia menurut pengobatan tradisional China, karena kaki dapat dijadikan barometer yang mencerminkan kesehatan badan. Terdapat banyak titik akupuntur di telapak kaki. Rendam kaki dengan air hangat dapat mengambil alih fungsi herbal utnuk mamanankan badan, membuat badan menjadi rileks dan meningkatkan sirkulasi darah ke bagian tubuh atas (Gunawan, 2014).

Melakukan merendam kaki menggunakan air hangat mempunyai efek fisik panas atau hangat yang dapat menyebabkan zat cair, padat, dan gas mengalami pemuaiian ke segala arah dan dapat meningkatkan reaksi kimia. Pada jaringan akan terjadi metabolisme seiring dengan peningkatan pertukaran antara zat kimia tubuh dengan cairan tubuh. Efek biologis panas/hangat dapat menyebabkan dilatasi pembuluh darah sehingga mengakibatkan peningkatan

sirkulasi darah. Secara fisiologis respon tubuh terhadap panas yaitu menyebabkan dilatasi pembuluh darah, menurunkan kekentalan darah, menurunkan ketegangan otot, meningkatkan metabolisme jaringan dan meningkatkan permeabilitas kapiler

Sehingga efek panas atau hangat pada terapi merendam kaki menggunakan air hangat dapat menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan sirkulasi darah, sehingga efektif menurunkan TD bu hamil dengan tekanan darah tinggi bila dilakukan secara rutin(Asrofin, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh rustanti, dkk (2020) Secara ilmiah perendaman kaki terutama dalam menggunakan air yang hangat memiliki begitu banyak manfaat bagi tubuh, terutama memperlancar peredaran darah.. rendam kaki menggunakan air hangat dapat meningkatkan sirkulasi, mengurangi pembengkakan, meningkatkan relaksasi otot. Terapi merendam kaki (hidroterapi kaki) ni juga mampu meningkatkan sirkulasi darah dengan memperlebar pembuluh darah sehingga lebih banyak oksigen ke jaringan yang mengalami edema. Banyak metode yang dapat dilakukan dengan rendam kaki menggunakan air hangat dan serai. serai juga dapat memperlancar peredaran darah serta dalam relaksasi otot serta sendi.

C. Alternatif Pemecahan Masalah

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengendalikan hipertensi, dengan menggunakan cara farmakologis maupun non farmakologis. Cara non farmakologis yang dapat digunakan dalam menurunkan hipertensi pada penderita preeklamsia adalah:

Mendenarkan musik klasik, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Ambarsari, dkk (2020) bahwa terdapat pengaruh pemutaran musik klasik terhadap penurunan TD bu hamil dengan tekanan darah tinggi. Karena pemberian musik klasik yang termasuk alkaline juga memberikan dampak baik terhadap penurunan tekanan darah bu hamil dengan tekanan darah tinggi. Hal ni terjadi karena dalam otak terdapat pusat asosiasi penglihatan dan pendengaryang berfungsi untuk menginterpretasi objek yang dilihat dan

didengar. Informasi dari pusat asosiasi yang berada pada permukaan otak akan dihantarkan ke pusat emosi yaitu sistem limbik.

Pemberian pisang dan diet rendah garam, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari, dkk (2018) Dengan memberikan pisang serta diet rendah garam sangat efektif menurunkan TD pada ibu hamil dengan tekanan darah tinggi. Manfaat dari diet rendah garam yakni membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan TD pada klien. TD tinggi terjadi karena kurangnya kalium dalam tubuh karena kalium dapat menormalkan rama jantung serta membantu peredaran oksigen ke otak. Kandungan kalium pada pisang kepok dapat menyebabkan dilatasi pembuluh darah, menghambat sekresi rennin (hormon yang berperan terhadap peningkatan tekanan darah) serta meningkatkan pembuangan natrium.

Kita juga dapat melakukan senam aerobik terhadap TD pada ibu hamil, dimana penelitian yang dilakukan oleh Hutagaol (2019). Senam hamil direkomendasikan untuk ibu hamil dengan hipertensi atau ibu hamil dengan resiko Pre-eklamsia untuk menurunkan efek buruk hipertensi termasuk menurunkan kejadian pre-eklamsia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah pasien 200/100 mmHg dimana pasien merasa pusing, nyeri dan cemas sehingga muncul masalah diagnosa keperawatan nyeri dan ansietas akibat dari tekanan darahnya yang tinggi sehingga peneliti memberikan ntervensi merendam kaki menggunakan air hangat dapat menurunkan TD pasien dimana merendam kaki merupakan terapi nonfarmakalogi yang dapat digunakan dalam menurunkan tingkat ansietas pada ibu hamil serta perendaman kaki air hangat dapat menurunkan TD pada ibu preeklampsia karena terjadi menggunakan air hangat akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang dapat meningkatkan sirkulasi darah, sehingga efektif menurunkan TD ibu hamil dan di dapatkan hasil terjadi perbedaan TD sebelum dan sesudah dilakukan perendaman kaki menggunakan air hangat dimana TD pasien menurun.

B. Saran-saran

Berdasarkan tingkat risiko yang dapat disebabkan preeklampsia pada saat melahirkan makadari itu saran dari penulis::

1. Upaya pencegahan dapat ditingkatkan yang dapat menyebabkan terjadinya preeklamsia pada ibu yang akan dalam tahap proses melahirkan dengan melakukan pemeriksaanantenatal care yang sudah sesuai dengan standar
2. Mengetahui komplikasi-komplikasi secepat mungkin yang terjadi pada kehamilan dan cara penanganannya.
3. Membantu pertolongan preeklampsi pada persalinan dengan baik adalah salah satunya dengan membangun hubungan saling percaya yang baik dengan keluarga klien,klien serta tenaga kesehatan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abineno, Y. (2021). Faktor- faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencegahan Preeklampsia Pada bu Hamil Di Puskesmas Oepoi Kota Kupang. Kupang: Universitas Citra Bangsa Kupang.
- Asrofin, Binti. Dkk. 2020. Pengaruh Pemberian Terapi Air Hangat dan Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada bu Hamil Hipertensi. Jurnal kebidanan. Vol. 9. No. 1. P-ISSN: 2302-3082.
- Damayanti, D. Dkk. 2014. Perbedaan TD Sebelum dan Sesudah Dilakukan Hidroterapi Rendam Hangat Pada penderita Tekanan Darah tinggi. Semarang: Stikes Nhudi Waluyo.
- Damarsanti putri, dkk. 2018. Pengaruh Merendam kaki Menggunakan Air Hangat terhadap Tingkat Kecemasan Pada bu hamil trimester Di Puskesmas Pegandon Kendal. Jurnal keperawatan dan pemikiran Imiah.
- Dermawan, deden. 2012. Proses Keperawatan Penerapan Konsep Dan Kerangka Kerja. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-qur'an tajwid dan terjemahan*. CV : penerbit Diponegoro
- Fadli, K. H. (2017). Karakteristik Penderita Preeklampsia Berdasarkan Faktor Risikonya Di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Tahun 2015. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Gunawan, D. 2014. Cara Mudah dan Lengkap Pijatan Refleksi Cepat sembuh Dari Berbagai Penyakit kronis. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hardianti, . Dkk. 2018. Manfaat Metode dilakukan rendam Menggunakan Air hangat Dalam menurunkan TD Pada Penderita Tekanan Darah tinggi . Jakarta.
- Inayah Maslahatul. Dkk. 2021. “Efektivitas Terapi Rendam Kaki Air Hangat Terhadap Perubahan Penurunan Tekanan Darah bu Hamil Preeklampsia”. Vol. 8 no. 1:h.1. Pekalongan.
- Kasnur. 2019. Manajemen Kebidanan ntranatal Berkelanjutan Pada Ny.M Dengan Preeklampsia Berat Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 15 Oktober 21- November 2019. Makassar: Universitas slam Negeri Alauddin Makassar.
- Kemenkes. 2016. Profil Kesehatan ndonesi. n. RI, K. (ed). Jakarta: Kemenkes RI

- Kemenkes. 2010. Pedoman Pelayanan *Antenatal Care* Terpadu. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
- Latief, A. 2016. Fisioterapy Obstetri-Ginekologi. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Mangrasah, Rhozy. Dkk. 2020. *The Effect Of Foot Soak Therapy Using Warm Water Toward Anxiety Level Of Preeclampsia Mother n Public Health Of Tempurejo Jember Regency. Journal Of Nursing Science.*Vol. 8, No. 1. P-ISSN: 2088-6012 E-ISSN: 2598-8492
- Mediarti, D., dkk. 2014. Pengaruh Yoga Antenatal Terhadap Pengurangan Keluhan bu Hamil Trimester . Vol 1, No 1
- Muttaqin, Arif. 2015. Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem Persyarafan. Jakarta: Salemba Medika.
- Nurarif AH, Kusuma H. 2015. *Aplikasi Asuhan Keperawatan berdasarkan Diagnosa Medis, NANDA, dan NIC-NOC.* Yogyakarta : Media Action.
- Pratiwi Dian. 2020. Faktor Maternal Yang Mempengaruhi Kejadian Preeklamsia Pada Kehamilan, Jurnal Medika Utama. Vol 02 N0. 01.
- Purnomo. 2016. Dasar-dasar Sistem Perkemihan Edisi 3. Bandung: Refika Aditama.
- Rustanti, sneni, dkk. 2020. Penurunan Tekanan Darah Pada bu Dengan Preeklamsia Berat Dengan Terapi Rendam Kaki Air Sereh. Ners Muda, Vol 1 No 2, Agustus 2020 e-ISSN: 2723-8067.
- Robson, S., E., & Jason. 2012. Patologi Pada Kehamilan: Manajemen & Asuhan Kebidanan. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Sahbiyah, M. F. (2019). Askep pada Ny. U G1P0A0 Dengan Komplikasi (PEB) Preeklamsia berat Di Ruangn Kenari RSUD. Kalisat Jember. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Sarwono, Prawihardjo. 2014. *Imu Kebidanan.* Jakarta: Bina Pustaka .
- Schroder, G., dkk. 2016. *mpact Of Pregnancy On Back Pain and Body Poatur n Women. Journal Phys. Ther. Sci.* Vol. 28 Nomor 04.
- Septiasih. (2017). Faktor Risiko Kejadian Preeklamsia Pada bu Bersalin Di RSUD Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2017. Yogyakarta: Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta.
- Shihab,M.Quraish.pesan, kesan, dan keserasian *Al-qur'an* (Tafsir Al-Misbah). Jakarta: Lentera Hati,2009.

Ulya Fitria Hikmatul, dkk. 2019. Pengaruh Rendam kaki Dengan Air Hangat terhadap Tingkat Kecemasan Pada bu hamil. Jurnla kebidanan Vol XI No.2.

PPNI, T. P. S. D. 2017. Standar Diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator Diagnostik. DPP PPNI.

PPNI, T. P. S. D. 2018. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. DPP PPNI.

PPNI, T. P. S. D. 2019. Standar Luaran Keperawatan Indonesia. DPP PPNI

Prawirohardjo, S. 2014, Ilmu Kandungan, Yayasan Bina Sarwono, Jakarta

Wulandari, P., & Arifianto, D. S. (2017). Pengaruh Merendam Kaki Menggunakan Air Hangat dengan Campuran Garam dan Serai Terhadap Penurunan TD Pada Penderita tekanan darah tinggi di Wilayah Poderejo Rw 8 Ngaliyan.



L

A

M

P

I

R

A

N



DOKUMENTASI



UJI TURNITIN

KTI MUSTIKA MUIN

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	4%
2	repo.stikesperintis.ac.id Internet Source	2%
3	docobook.com Internet Source	2%
4	www.scribd.com Internet Source	2%
5	akbidhipekalongan.ac.id Internet Source	2%
6	es.scribd.com Internet Source	2%
7	prosiding.unimus.ac.id Internet Source	1%
8	id.123dok.com Internet Source	1%
9	repository.poltekkes-kaltim.ac.id Internet Source	1%

10	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
11	repository.bku.ac.id Internet Source	1%
12	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
13	docplayer.info Internet Source	1%
14	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	1%
15	idoc.pub Internet Source	1%
16	jik.ub.ac.id Internet Source	1%
17	www.researchgate.net Internet Source	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mustika Muin, Lahir di Ujung Pandang Sulawesi Selatan, Pada tanggal 10 november 1997. Merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Abd Muin Hamid dan Ibu Subaeda. Mulai menempuh pendidikan formal pada jenjang pendidikan **Sekolah Dasar di SD Negeri Center Mangalli** pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009, kemudia pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan Menegah Pertama di **SMP Negeri 1 Pallangga** dan tamat pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di **SMA Negeri 1 Sungguminasa** pada tahun 2012 selesai pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa **Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar** pada tahun 2015 lulus melalui jalur UM-PTKIN. Pada tahun 2019 penulis menyelesaikan studi Strata 1 (S1) Keperawatan dan tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa program Profesi Ners angkatan XVI dan selesai pada tahun 2021.