


**INTERVENSI JALAN TANDEM PADA LANSIA YANG
MENGALAMI *INSTABILITY* DENGAN
MASALAH RISIKO JATUH**



Tugas Akhir Ners

Oleh :

NUR FITRIANI


NIM : 70900119038

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

**INTERVENSI JALAN TANDEM PADA LANSIA YANG
MENGALAMI *INSTABILITY* DENGAN
MASALAH RISIKO JATUH**



Tugas Akhir Ners

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan Pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Oleh:
NUR FITRIANI
NIM : 70900119038

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR FITRIANI
NIM : 70900119038
Tempat/ Tgl. Lahir : 23 September 1997
Jurusan/ Prodi/ Konsentrasi : NERS
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : JL.Baji Pa'mai 5/18A Makassar
Judul : **INTERVENSI JALAN TANDEM PADA LANSIA
YANG MENGALAMI *INSTABILITY* DENGAN
MASALAH RISIKO JATUH**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 16 Juli 2021
Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



NUR FITRIANI, S.Kep
NIM: 70900119038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Nur Fitriani NIM: 70900119038, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Intervensi Jalan Tandem Pada Lansia Yang Mengalami *Instability* Dengan Masalah Risiko Jatuh ”, memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 14 Juli 2021

MENYETUJUI


Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kes

Pembimbing I


Aidah Fitriani, S.Kep.,Ns.,M.Kep

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul “Intervensi Jalan Tandem Pada Lansia Yang Mengalami *Instability* Dengan Masalah Risiko Jatuh”, yang disusun oleh Nur Fitriani S.Kep, NIM : 70900119038 mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat 16 Juli 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam ilmu kesehatan, Jurusan Keperawatan.


Gowa, 16 Juli 2021 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Dr .dr.Syatirah, M.Kes.,Sp.A	(.....)
Sekretaris	:	Dr. Patimah, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy I	:	Muthaharah, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy II	:	Dr. Muhaemin, S.Ag.,M.Th.I.,M.Ed	(.....)
Pembimbing I	:	Eny Sutria,S.kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	:	Aidah Fitriani,S.Kep.,Ns.,M.kep	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar, 12 November 2021



Dr .dr.Syatirah, M.Kes.,Sp.A

NIP : 198007012006042002

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Shalawat beserta salam kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Tugas akhir Ners yang berjudul “Intervensi Jalan Tandem Pada Lansia Yang Mengalami *Instability* Dengan Masalah Risiko Jatuh” ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan di program studi. Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr.dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. Patimah, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Kepala Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Eny Sutria,S.Kep.,Ns.,M.Kes & Aidah Fitria, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini.
4. Seluruh Dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Keluarga tercinta terimakasih yang tak terhingga atas doa dan dukungannya selama ini.
6. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu dalam penyusunan proposal tugas akhir ners ini.

Penulis mengharapkan tugas ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Gowa, 16 Juli 2021

Penulis



DAFTAR ISI

Sampul	
Halaman Sampul	
Halaman Pernyataan Keaslian.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel... ..	viii
Halaman Abstrak (Indonesia).....	ix
Halaman Abstract (Inggris).....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.....	3
D. Manfaat... ..	3
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Konsep Teori.....	5
B. Konsep Keperawatan.....	19
C. Pendekatan Teori Keperawatan Yang Digunakan.....	28
D. Evidence Based Nursing (EBN).....	28
BAB III LAPORAN KASUS	
A. Pengkajian.....	33
B. Analisa Data.....	55
C. Diagnosa Keperawatan.....	56
D. Intervensi Keperawatan.....	58
E. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan.....	62
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Analisa Kasus.....	80
B. Analisa Intervensi.....	83

C. Alternatif Pemecahan Masalah.....	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1.3	Indeks Katz.....	42
Tabel 2.3	Pengkajian Satus Kognitif dan Efektif.....	42
Tabel 3.3	Skala Depresi.....	44
Tabel 4.3	Skala Jatuh Morse.....	45
Tabel 5.3	Keterangan.....	46
Tabel 6.3	Pengkajiam Status Sosial.....	46
Tabel 7.3	Barthel Indeks.....	47
Tabel 8.3	Mini Mental Stus Exam.....	50
Tabel 9.3	Waktu Duduk dan Berdiri.....	56
Tabel 10.3	Analisa Data.....	57
Tabel 11.3	Diagnosa Keperawatan.....	58
Tabel 12.3	Intervensi Keperawatan.....	60
Tabel 13.3	Implementasi Keperawatan.....	64



ABSTRAK

Nama : Nur Fitriani
Nim : 70900119038
Judul : INTERVENSI JALAN TANDEM PADA LANSIA YANG
MENGALAMI INSTABILITY DENGAN MASALAH RISIKO
JATUH

Latar Belakang, Menurut Menurut world Health Organization (WHO), di kawasan Asia Tenggara populasi Lansia sebesar 8% atau sekitar 142 juta jiwa. Pada tahun 2050 diperkirakan populasi Lansia meningkat 3 kali lipat dari tahun ini. Pada tahun 2000 jumlah Lansia sekitar 5,3 Juta (7,4%) dari total populasi, sedangkan pada tahun 2010 jumlah Lansia 24 Juta (9,77%) dari total populasi, dan tahun 2020 diperkirakan jumlah Lansia mencapai 28,8 juta (11,34%) dari total populasi. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2020 diperkirakan jumlah Lansia sekitar 80 juta jiwa. Salah satu masalah fisik yang dapat mengakibatkan kecacatan atau kematian yang sering terjadi pada lansia yang harus dicegah dan perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat keperawatan adalah jatuh, sebab kecelakaan dan jatuh merupakan masalah yang sering menyebabkan kecacatan, cedera, depresi, dan cedera fisik terhadap lansia, karena bertambahnya usia kondisi fisik, mental, dan fungsi tubuh pun menurun. Salah satu intervensi yang dapat diberikan untuk mencegah terjadinya jatuh dan untuk meminimalisir terjadinya jatuh yaitu dengan latihan jalan tandem yang dilakukan 3 kali dalam 1 minggu. **Tujuan** penulisan adalah memberikan asuhan keperawatan terhadap pasien dengan sindrom geriatri *instability* Di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa. **Metode** yang digunakan pada studi kasus ini yaitu dengan mengumpulkan hasil wawancara, data pengkajian dan hasil observasi tindakan yang diberikan 3 kali dalam 1 pekan. **Hasil** intervensi yang diberikan yaitu jalan tandem yang dilakukan 3 kali dalam 1 pekan pasien merasakan manfaat dari latihan jalan tandem dimana keseimbangan/*instability* klien dapat terkontrol dengan baik. **Kesimpulan** berdasarkan hasil evaluasi pada intervensi yang telah dilakukan dalam 3 hari didapatkan bahwa jalan tandem dapat meminimalisir terjadinya jatuh pada lansia dan menambah kekuatan otot pada lansia, hal tersebut mengindikasikan bahwa jalan tandem dapat menjadi salah satu intervensi yang bisa digunakan untuk melatih dan meningkatkan keseimbangan pada lansia

Kata Kunci : Lansia, Instability, Jalan Tandem

ABSTRACT

Name : Nur Fitriani

Nim 70900119038

Title : TANDEM ROAD INTERVENTION IN ELDERLY INSTABILITY
WITH THE PROBLEM OF FALL RISK

Background According to the World Health Organization (WHO), in the Southeast Asian region, the elderly population is 8% or around 142 million people. In 2050 it is estimated that the elderly population will increase 3 times from this year. In 2000 the number of elderly people was around 5.3 million (7.4%) of the total population, while in 2010 the number of elderly people was 24 million (9.77%) of the total population, and in 2020 it is estimated that the number of elderly people will reach 28.8 million (11.34%) of the total population. While in Indonesia alone in 2020 it is estimated that the number of elderly people is around 80 million people. One of the physical problems that can result in disability or death that often occurs in the elderly that must be prevented and needs attention from the nursing community is falls, because accidents and falls are problems that often cause disability, injury, depression, and physical injury to the elderly. As we age, our physical, mental, and bodily functions decline. One of the interventions that can be given to prevent falls and to minimize the occurrence of falls is by doing tandem walking exercises three times in one week. **The purpose** of writing is to provide nursing care to patients with geriatric instability syndrome in Samata Village, Gowa Regency. **The method** used in this case study is to collect the results of interviews, assessment data and results of observations of actions given three times in one week. **The results** of the intervention given are tandem walking which is carried out three times in one week, patients feel the benefits of tandem walking exercises where the client's balance / instability can be well controlled. **The conclusion** based on the results of the evaluation of the intervention that had been carried out in three days it was found that tandem walking can minimize the occurrence of falls in the elderly and increase muscle strength in the elderly, this indicates that tandem walking can be a reference that can be used to train and improve balance in the elderly.

Keywords: Elderly, Instability, Tandem Road

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut World Health Organization (WHO) di kawasan asia yenggara populasi lansia sebesar 8% atau 142 juta jiwa. Pada tahun 2050 diperkirakan populasi lansia meningkat 3 kali lipat dari tahun ini. Pada tahun 2000 jumlah lansia sekitar 5,3 juta (7,4%) dari total populasi, sedangkan pada tahun 2010 jumlah lansia 24 juta (11,34%) dari total populasi, sedangkan dindonesia sendiri pada tahun 2020 diperkirakan jumlah lansia sekitar 80 juta jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk lansia menimbulkan konsekuensi yang kompleks. Berbagai tantangan yang diakibatkan penuaan penduduk telah mencakup setiap aspek kehidupan. Untuk dapat menyikapi kondisi tersebut, dibutuhkan suatu program pembangunan kelanjutusiaan yang mampu mengayomi kehidupan lansia diindonesia. Berangkat dari fenomena tersebut, BPS berusaha berusaha mengakomodasi adanya kebutuhan terhadap data kelanjutusiaan yang konkret dan komprehensif dengan mewujudkan dalam bentuk publikasi statistik penduduk lanjut usia 2020. melalui publikasi ini dapat diketahui sejauh mana potensi dan sumber daya penduduk lansia di indonesia. Buku ini merupakan publikasi tahunan yang memuat informasi mikro mengenai kelanjutusiaan di antaranya kondisi dan akses penduduk lanjut usia terhadap berbagai fasilitas perlindungan dan pemberdayaan bagi peningkatan kualitas hidupnya. Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) maret 2020, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020 dan data sekunder dari kementerian/lembaga.

Jumlah total lanjut usia di Sulawesi selatan adalah 721.353 jiwa (9,19%) dari jumlah penduduk Sul-sel. Menurut BPS Provinsi Sulawesi selatan tahun 2008, jumlah lansia mencapai 444.805 dari 7.771.671 penduduk sulawesi selatan (Dinkes Sulsel, 2009). sedangkan jumlah penduduk yang tergolong lansia di kota makassar mencapai 40.508 dari 1.248.436 penduduk makassar.

Salah satu masalah fisik yang dapat mengakibatkan kecacatan dan kematian yang sering terjadi pada lansia yang harus dicegah dan perlu

mendapatkan perhatian dari masyarakat dan keperawatan adalah jatuh, sebab kecelakaan dan jatuh merupakan masalah yang sering menyebabkan kecacatan, cidera, depresi dan cidera fisik terhadap lansia, karena bertambahnya usia kondisi fisik, mental, dan fungsi tubuhpun menurun (Nugroho.2012)

Berdasarkan survei masyarakat di Amerika Serikat didapatkan sekitar 30% lansia umur lebih dari 65 tahun jatuh setiap tahunnya. Separuh dari angka tersebut mengalami jatuh berulang. Insiden jatuh di Masyarakat Amerika Serikat pada umur lebih dari 65 tahun sebanyak 1.800 kejadian pertahun yang menyebabkan kematian (*Centers for Disease Control and Prevention, CDC.2014*)

Terdapat banyak masalah fisik yang sering terjadi pada lansia, salah satunya yaitu jatuh (Sitepu dan Iwan.2012). pada lanjut usia akan terjadi penurunan fisiologis sistem muskuloskeletal, terutama yang berpengaruh pada pengontrol keseimbangan, sehingga akan terjadi penurunan proprioseptif, vestibular dan visual yang akan menyebabkan risiko jatuh pada lansia meningkat (Munawwarah dan Nindya. 2015). sekitar 30% dari lansia berusia 65 tahun dan 50% dari lansia yang berusia 85 tahun, akan jatuh setidaknya sekali setiap tahun (WHO.2015)

Presentase jatuh pada lansia 2017 adalah 49,4% pada usia 55-64 tahun, 67,1% pada usia 65-74 tahun dan 78,2% pada usia >75 tahun. Sekitar 30% dari komunitas lansia di negara berkembang jatuh setiap tahunnya dengan presentase 10%-20% jatuh lebih dari sekali. Kongres XII PERSI di Jakarta pada tanggal 8 November 2012 melaporkan bahwa kejadian pasien jatuh di Indonesia pada bulan Januari-September 2012 sebesar 14%. Hal ini membuat presentase pasien jatuh termasuk dalam lima besar insiden medis selain medicine error (Utami.2017)

Hasil penelitian yang dilakukan Ediawati (2012), tentang “*Gambaran tingkat kemandirian Activity Daily Living*” (ADL) dengan risiko jatuh pada lansia di panti sosial Tresna Werda Jakarta Timur menunjukkan lansia yang memiliki tingkat kemandirian sekitar (97,9%) dalam melakukan ADL pada indeks Katz dan risiko jatuh sekitar (44,1%) pada *skala morese falls*.

B. Rumusan Masalah

Penulis merasa penting untuk melaksanakan intervensi jalan tandem terhadap lansia yang mengalami instability dengan masalah risiko jatuh

C. Tujuan

1. Tujuan umum

Memberikan asuhan keperawatan terhadap pasien dengan sindrom geriatri *instability* Di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

2. Tujuan khusus

- a. Melakukan pengkajian terhadap lansia dengan sindrom geriatri *instability*
- b. Merumuskan diagnosa keperawatan terhadap lansia dengan sindrom geriatri *instability*
- c. Menyusun asuhan keperawatan pada lansia dengan sindrom geriatri *instability*
- d. Melakukan implementasi pada lansia dengan sindrom geriatri *instability*
- e. Melakukan evaluasi keperawatan pada lansia dengan sindrom geriatri *instability*

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Tugas akhir ini diharapkan menjadi referensi dalam melakukan asuhan keperawatan dan pembelajaran dalam menyusun konsep asuhan keperawatan khususnya pada lansia dengan masalah risiko jatuh

2. Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi patokan atau referensi dalam melakukan intervensi asuhan keperawatan pada lansia dengan masalah risiko jatuh

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Pasien dan Keluarga

Mendapatkan informasi dan pemahaman yang baru terkait lansia dengan risiko jatuh dan dapat menerapkan pada lansia tentang informasi yang telah didapatkan

b. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil analisis yang telah dilakukan dapat menjadi salah satu referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan keperawatan khususnya keperawatan gerontik dengan *instability*

c. Bagi Perawat

Asuhan keperawatan ini dapat menjadi bahan acuan dalam menerapkan proses asuhan keperawatan baik di klinik maupun di komunitas pada pasien lansia yang mengalami *instability* dengan masalah risiko jatuh



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. KONSEP MENUA

1. Konsep menua

a. Lansia

Proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah baik secara fisik, biologi, mental maupun sosial ekonomi. Semakin seseorang berusia lanjut makan akan semakin mengalami kemunduran terutama di bidang kemampuan fisik, yang dapat mengakibatkan penurunan dalam peranan sosialnya. Dengan banyaknya perubahan yang terjadi pada lansia terutama perubahan fisik dapat mengakibatkan lansia lebih berisiko jatuh. Kurangnya pengetahuan pada lansia dan keluarga tentang penyebab kejadian jatuh pada lansia yang menyebabkan lansia mudah mengalami jatuh (Iswan & Oktaviana, 2012)

Lansia adalah seorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses berangsur-angsur mengakibatkan perubahan kumulatif, merupakan proses penurunan daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam maupun luar tubuh, banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya peningkatan kesejahteraan lansia pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai dan budaya bangsa.

Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi didalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanyadimulai dari suatu proses alamiah yang berarti seorang telah memulai tiga tahap kehidupan yaitu, anak, dewasa dan tua (Nugroho, 2006)

b. Batasan Lansia

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO.2007) lanjut usia meliputi:

1) Usia pertengahan (middle age) adalah kelompok usia antara 60-74 tahun

2) Usia lanjut tua (old) adalah usia antara 75-90 tahun

3) Usia sangat tua (very old) adalah kelompok usia di atas 90 tahun

DEPKES RI (2005) menjelaskan bahwa batas lansia dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

1) Usia lanjut presenilis yaitu usia 45-59 tahun

2) Usia lanjut yaitu 60 tahun keatas

3) Usia lanjut berisiko yaitu usia 70 tahun ke atas atau usia 60 tahun keatas dengan masalah kesehatan

c. Ciri-ciri Lansia

1). Lansia merupakan prode kemunduran

Kemunduran pada lansia sebgaaian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Motivasi memiliki peran penting dalam kemunduran lansia. Misalnya lansia yang memiliki motivasi rendah melakukan kegiatan, maka akan mempercepat proses kemunduran fisik, maka kemunduran fisik pada lansia akan lebih lama terjadi.

2). Lansia memiliki status kelompok minoritas

Kondisi ini sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap lansia dan diperkuat oleh pendapat yang kurang baik, misalnya lansia yang lebih senang mempertahankan pendapatnya maka sikap sosial masyarakat menjadi negatif, tetapi ada juga lansia yang mempunyai tenggang rasa kepada orang lain sehingga sikap sosial masyarakat menjadi positif

3). Menua membutuhkan perubahan peran

Perubahan perubahan tersebut dilakukan karena mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada lansia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan atas dasar tekanan dari lingkungan. Misalnya lansia menduduki jabatan sosial di masyarakat sebagai ketua RW, sebaiknya

masyarakat tidak memberhentikan lansia sebagai ketua RW karena usianya

4). Penyesuaian yang buruk pada lansia

Perlakuan yang buruk pada lansia membuat mereka cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga dapat memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk pula contoh : lansia tinggal bersama keluarga sering tidak dilibatkan untuk mengambil keputusan karena dianggap pola pikirnya kuno, kondisi inilah yang menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan, cepat tersinggung dan bahkan memiliki harga diri yang rendah.

d. Perubahan Fisik pada Lansia

Menurut Maryam (2008), perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada lanjut usia adalah :

1) Sel

Perubahan sel pada lanjut usia meliputi : terjadinya penurunan jumlah sel, terjadi perubahan ukuran sel, berkurangnya jumlah cairan dalam tubuh dan berkurangnya cairan intra seluler, menurunnya proporsi protein di otak, otot, ginjal, darah dan hati, penurunan jumlah sel pada otak, terganggunya mekanisme perbaikan sel, serta otak menjadi atrofis beratnya berkurang 5-10%.

2) Sistem Persyarafan

Perubahan persyarafan meliputi: berat otak yang menurun 10-20% (setiap orang berkurang sel syaraf otaknya dalam setiap harinya), cepat menurunnya hubungan syaraf, lambat dalam respon dan waktu untuk bereaksi khususnya dengan stres, mengecilnya syaraf panca indra, berkurangnya penglihatan, hilangnya pendengaran, mengecilnya syaraf penciuman dan perasa lebih sensitif terhadap perubahan suhu dengan ketahanan terhadap sentuhan, serta kurang sensitif terhadap sentuhan.

3) Sistem pendengaran

Perubahan pada sistem pendengaran meliputi : terjadinya presbiakusis (gangguan dalam pendengaran) yaitu gangguan dalam pendengaran pada telinga dalam terutama bunyi suara, nada-nada yang tinggi, suara yang tidak jelas, sulit mengerti kata-kata, 50% terjadi pada umur diatas 65 tahun. Terjadi otosklerosis akibat atropi membran timpani. Terjadinya pengumpulan serumen dapat mengeras karena meningkatnya keratinin. Terjadinya perubahan penurunan pendengaran pada lansia yang mengalami ketegangan jiwa atau stres

4) Sistem Penglihatan

Perubahan sistem penglihatan meliputi : timbulnya sklerosis dan hilangnya respon terhadap sinar, kornea lebih terbentuk sferis (bola), terjadi kekeruhan pada lensa yang menyebabkan katarak, meningkatnya ambang, pengamatan sinar, daya adaptasi terhadap gelap lebih lambat dan susah melihat pada cahaya gelap, hilangnya daya akomodasi, menurunnya lapang pandang, serta hilangnya daya untuk membedakan warna biru atau hijau. Pada mata bagian dalam, perubahan yang terjadi adalah ukuran pupil menurun dan reaksi terhadap cahaya berkurang dan juga terhadap akomodasi, lensa menguning dan berangsur-angsur menjadi lebih buram mengakibatkan katarak, sehingga memengaruhi kemampuan untuk menerima dan membedakan warna-warna. Kadang warna gelap seperti coklat, hitam, dan maron rampak sama. Pandangan dalam area yang suram dan adaptasi terhadap kegelapan berkurang (sulit melihat dalam cahaya gelap) menempatkan lansia pada risiko cedera. Sementara cahaya menyilaukan dapat menyebabkan nyeri dan membatasi kemampuan untuk membedakan objek dengan jelas, semua hal itu dapat mempengaruhi kemampuan fungsional para lansia sehingga dapat menyebabkan lansia terjatuh.

5) Sistem Kardiovaskuler

Perubahan pada sistem kardiovaskuler meliputi : terjadinya penurunan elastisitas dinding aorta, katup jantung menebal dan menjadi kaku menurunnya kemampuan jantung memompa darah yang

menyebabkan menurunnya konsentrasi dan volumenya, kehilangan elastisitas pembuluh darah, kurangnya efektifitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi, perubahan yang dapat mengakibatkan tekanan darah menurun (dari tidur ke duduk dan dari duduk ke berdiri) yang mengakibatkan resistensi pembuluh darah perifer.

6) Sistem pengaturan temperatur tubuh

Perubahan pada sistem pengaturan temperatur tubuh meliputi : hipotalamus bekerja sebagai thermostat, yaitu menetapkan suatu suhu tertentu, kemudian terjadi beberapa faktor yang mempengaruhinya, perubahan yang sering ditemui antara lain suhu tubuh menurun (hipotermia) secara fisiologik kurang lebih 35°C ini akan mengakibatkan metabolisme yang menurun. Keterbatasan refleks menggigil dan tidak dapat memproduksi panas yang banyak sehingga terjadi rendahnya aktivitas otot.

7) Sistem Respirasi

Perubahan sistem respirasi meliputi : otot pernafasan mengalami kelemahan akibat atropi, aktivitas silia menurun, paru kehilangan elastisitas, berkurangnya elastisitas bronkus, oksigen pada arteri menurun, karbon dioksida pada arteri tidak berganti, reflek dan kemampuan batuk berkurang, sensitivitas terhadap hipoksia dan hiperkarbia menurun, sering terjadi emfisema senilis, kemampuan pegas dinding dada dan kekuatan otot pernafasan menurun seiring bertambahnya usia.

8) Sistem Pencernaan

Perubahan pada sistem pencernaan meliputi : kehilangan gigi, penyebab utama *periodontal disease* yang bisa terjadi setelah umur 30 tahun, indra pengecap menurun, hilangnya sensitivitas saraf pengecap terhadap rasa asin, asam dan pahit, esofagus melebar, rasa lapar menurun, asam lambung menurun, motilitas dan waktu pengosongan lambung menurun, peristaltik lemah dan biasanya timbul konstipasi, fungsi absorpsi melemah, hati semakin mengecil dan tempat penyimpanan menurun, aliran darah berkurang.

9) Sistem perkemihan

pada sistem perkemihan antara lain ginjal yang merupakan alat bantu untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh melalui urine, darah masuk keginjal disaring oleh satuan unit kecil dari ginjal yang disebut nefron (tempatnya di glomerulus), kemudian mengecil dan nefron menjadi atrofi, aliran darah keginjal menurun sampai 50% sehingga fungsi tubulus berkurang, akibatnya kemampuan konsentrasi urine menurun, berat jenis urine menurun. Otot vesika urinaria menjadi lemah, sehingga kapasitasnya menurun menjadi 200ml atau menyebabkan buang air meningkat. Vesika urinaria sulit dikosongkan sehingga terkadang menyebabkan retensi urine.

10) Sistem endokrin

Perubahan yang terjadi pada sistem endokrin meliputi : produksi semua hormon turun, kativitas tiroid, BMR (basal matabolic ratr), dan daya pertukarn zat menurun, produksi aldosteron menurun, sekresi hormon kelamin, misalnya progesteron, estrogen dan testoteron menurun.

11) Sistem integumen

Perubahan pada sistem integumen, meliputi : kulit mengerut, atau keriput akibat kehilangan jaringan lemak, permukaan kulit cenderung kusam, kasar, bersisi. Timbul bercak pigmentasi, kulit kepala dan rambut menipis dan berwarna kelabu, berkurangnya elastisitas akibat menurunnya cairan dan vaskularisasi, kuku jari menjadi keras dan rapuh, jumlah dan fungsi kelenjar keringat berkurang.

12) Sistem muskuloskeletal

Perubahan pada sistem muskuloskeletal meliputi : tulang kehilangan densitas (cairan) dan semakin rapuh, kekuatan dan stabilitas tulang menurn, terjadi kifosis, gangguan gaya berjalan, tendon mengerut, dan mengalami sklerosis, atrofi serabut otot, serabut otot mengecil sehingga gerakan menjadi lamban, otot kram, dan menjadi tremor, aliran darah ke otot berkurang sejalan dengan proses menua, semua perubahan tersebut dapat mengakibatkan kelambanan dalam bergerak, langkah kaki yang pendek, penurunan irama. Kaki yang tidak dapat menapak dengan

kuat dan cenderung gampang goya, perlambatan reaksi mengakibatkan seorang lansia susah atau terlambat mengantisipasi bila terjadi gangguan terpeleset, tersandung, sehingga memudahkan jatuh.

e. Perubahan psikososial pada lansia

Berdasarkan beberapa evidence based yang telah dilakukan terdapat perubahan psikososial yang dapat terjadi pada lansia diantaranya yaitu :

1) Kesepian

Septianingsih dan Na'imah (2012) menjelaskan dalam studinya bahwa lansia rentan sekali mengalami kesepian. Kesepian yang dialami dapat berupa kesepian emosional, situasional, kesepian sosial, atau gabungan ketiga-tiganya. Berdasarkan penelitian tersebut beberapa hal yang dapat mempengaruhi perasaan kesepian pada lansia diantaranya yaitu merasakan tidak adanya figur kasih sayang yang diterima seperti dari suami, istri atau anaknya, kehilangan integrasi secara sosial atau tidak terintegrasi dalam suatu komunikasi seperti yang dapat diberikan oleh kelompok teman, atau masyarakat dilingkungan sekitar. Hal itu disebabkan karena tidak mengikuti pertemuan-pertemuan yang dilakukan di kompleks, mengalami perubahan situasi, yaitu ditinggal wafat pasangan hidup suami atau istri dan hidup sendirian karena anaknya tidak tinggal serumah

2) Kecemasan menghindari kematian

Ernawati dan Sudarji (2013) menyimpulkan dalam hasil penelitiannya bahwa terdapat 2 tipe lansia memandang kematian. Tipe pertama lansia yang cemas ringan hingga sedang dalam menghadapi kematian ternyata memiliki tingkat religiusitas yang cukup tinggi. Sementara tipe kedua adalah lansia yang cemas berat menghadapi kematian dikarenakan takut akan kematian itu sendiri, takut mati karena banyak tujuan hidup yang belum tercapai, juga cemas karena sendirian dan tidak akan ada yang menolong saat sekarat nantinya.

3) Depresi

Lansia merupakan agregat yang cenderung depresi. Menurut Jayanti, Sedyowiranso, dan Madyanigrum (2008) beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya depresi lansia adalah jenis kelamin, dimana angka lansia perempuan lebih tinggi terjadi depresi dibanding lansia laki-laki, hal tersebut dikarenakan adanya kelebihan hormonal, perbedaan atressor psikososial bagi wanita dan laki-laki, serta model perilaku tentang keputusan yang dipelajari, status perkawinan, dimana lansia yang tidak menikah/tidak pernah menikah lebih tinggi berisiko mengalami depresi, hal tersebut dikarenakan orang lanjut usia yang berstatus tidak awin sering kehilangan dukungan yang cukup besar (dalam hal ini dari orang terdekat yaitu pasangan) yang menyebabkan suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan kesendirian dan rendahnya dukungan sosial.

f. Perkembangan lansia

Usia lanjut merupakan usia yang mendekati akhir siklus kehidupan manusia di dunia. Tahap ini dimulai dari usia 60 tahun sampai akhir kehidupan. Lansia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan, semua akan mengalami proses menjadi tua (tahap penuaan), masa tua merupakan masa kehidupan manusia yang terakhir, dimana pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial sedikit demi sedikit sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari lagi (tahap penurunan). penurunan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan, dan sel. Yang mengalami penurunan kapasitas fungsional. Pada manusia penurunan dihubungkan dengan perubahan degeneratif pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah, paru-paru, saraf dan jaringan tubuh lainnya. Dengan kemampuan regeneratif yang terbatas, mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit, sindroma, dan kesakitan dibandingkan dengan orang dewasa lainnya.

Seperti firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 54 *"Dialah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, lalu Dia*

menjadikan (kalian) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kalian) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban”. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa semua orang pasti akan bertambah usianya, mengalami proses penuaan, dan juga akan mengalami penurunan kondisi fisik. Sebagai seorang fisioterapis yang merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan berhubungan dengan gerak dan fungsi, pada penurunan keseimbangan lanjut usia berperan penting dalam memperbaiki dan meningkatkan keseimbangan lanjut usia.

g. Sindrom Geriatri

Menua (menjadi tua : aging) adalah proses hilangnya secara perlahan kemampuan suatu jaringan untuk memperbaiki dan mempertahankan struktur serta fungsi normalnya sehingga tidak mampu bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dengan begitu cara progresif akan menghilangkan daya tahan terhadap infeksi dan akan banyak terjadi distorsi metabolik dan struktural, yang disebut sebagai penyakit degeneratif seperti (hipertensi, arterosklerosis, diabetes, dan kanker). (Pranarka. 2011)

Sifat penyakit geriatri berbeda dengan penyakit pada umumnya dan kesehatan pada populasi jenis lain. Penyakit pada geriatri cenderung bersifat multipel, merupakan gabungan antara penurunan fisiologi/alamiah dan berbagai proses patologi/penyakit. Penyakit biasanya berjalan kronik, menimbulkan kecacatan dan secara lambat akan menyebabkan kematian. Geriatri juga sangat rentan terhadap berbagai penyakit akut, yang diperberat dengan kondisi daya tahan yang menurun. Kesehatan geriatri juga sangat rentan oleh faktor psikis, sosial dan ekonomi. Pada geriatri sering terjadi penyakit atrogenik akibat banyak obat-obatan yang dikonsumsi (polifarmasi). sehingga kumpulan dari semua masalah ini menciptakan suatu kondisi yang disebut sindrom geriatri (Pranarka.2011)

Menua (menjadi tua: aging) adalah proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan suatu jaringan untuk memperbaiki dan mempertahankan struktur serta fungsi normalnya sehingga tidak mampu bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dengan begitu secara progresif akan kehilangan daya tahan terhadap infeksi dan akan banyak terjadi distorsi metabolik dan struktural, yang disebut sebagai penyakit degeneratif seperti (hipertensi, aterosklerosis, diabetes mellitus dan kanker) (Pranarka. 2011)

Konseptualisasi geriatri telah berkembang dari waktu ke waktu secara umum sindrom di definisikan sebagai kelompok, tandan dan gejala yang terjadi bersama-sama dan mengarakterisasikan kelainan tertentu atau kumpulan gejala dan tanda yang terjadi dengan proses morbid, dan merupakan gambaran dari suatu penyakit dengan demikian dalam penggunaan medis saat ini sindrom mengacu pada pola gejala tanda dengan mendasari pada penyebab tunggal dan mungkin belum diketahui. (Sharon et al.2007)

Dalam bidang geriatri dikenal beberapa masalah pada geriatri yang sering di jumpai baik mengenai fisik ataupun psikis pasien usia lanjut. Menurut Salomon dkk, 14 sindrom terdiri dari *immobility* (mobilisasi), *Instability* (instabilitas dan jatuh), *intellectual impairment* (gangguan intelektual seperti demensia dan delirium), *incontinence* (inkontinensi urin dan alvi), *isolation* (depresi), *impotence* (impotensi), *immuno-deficiency* (penurunan imunitas), *infection* (infeksi), *inanon* (malnutrisi), *impaction* (konstipasi), *insomnia* (gangguan tidur), *iatrogenic disorder* (gangguan iatrogenik), dan *impairment of hearing, vision and smell* (gangguan pendengaran, penglihatan dan penciuman).

Berikut 14 sindrom geriatri yang biasa terdapat di beberapa keluhan lansia :

1) Immobilitas

Didefinisikan sebagai keadaan tidak bergerak/tirah baring selama 3 hari atau lebih dengan gerak anatomi, penyebab utama imobilitas yaitu

adanya rasa nyeri, lemah, kekuatan otot, ketidakseimbangan dan masalah psikologis. Beberapa informasi penting meliputi lamanya menderita disabilitas yang menyebabkan imobilitas, penyakit yang mempengaruhi kemampuan mobilisasi dan pemakaian obat-obatan untuk mengeliminasi iatrogenik yang menyebabkan immobilisasi.

2) *Instability* (instabilitas dan jatuh)

Gangguan keseimbangan (instabilitas) akan memudahkan pasien geriatri terjatuh dan dapat mengalami patah tulang. Terhadap banyak faktor yang berperan untuk terjadinya instabilitas dan jatuh pada lansia. Berbagai faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai faktor enstrinsik (faktor risiko yang ada pada pasien) dan faktor ekstrinsik (faktor yang terdapat di lingkungan). prinsip dasar tatalaksana usia lanjut dengan masalah instabilitas dari riwayat jatuh adalah mengobati berbagai kondisi yang mendasari instabilitas dan jatuh, memberikan terapi fisik dan penyuluhan berupa latihan cara berjalan, penguatan otot, alat bantu, sepatu atau sandal yang sesuai, serta mengubah lingkungan agar lebih aman seperti pencahayaan yang cukup, pegangan, lantai yang tidak licin.

3) *Inrelektual impairment* (gangguan kognitif)

Keadaan yang terutama menyebabkan gangguan intelektual pada pasien lanjut usia adalah delirium dan demensia. Demensia adalah gangguan fungsi intelektual dan memori yang dapat disebabkan oleh penyakit otak, yang tidak berhubungan tingkat kesadaran. Demensia tidak hanya masalah memori. Demensia mencakup kemampuan untuk mengenal, berfikir, menyimpan atau mengingat pengalaman yang lalu dan juga kehilangan pola sentuh, pasien menja perasa dan terganggunya aktivitas.(Dini.2013)

4) *Isolation* (depsresi)

Penyebabnya : kehilangan orang/objek yang dicintai, sikap pesimistik, kecenderungan berasumsi negatif terhadap suatu pengalaman yang mengecewakan, kehilangan integritas pribadi, penyakit degeneratif kronik tanpa dukungan sosial yang adekuat.

5) *Impeccunity* (kemiskinan)

Berbagai teori telah menyebutkan dan fakta telah menimbulkan bahwa ketika seorang memasuki usia lanjut maka akan terjadi proses penurunan fungsi tubuh. Penurunan fungsi tubuh tersebut dapat mempengaruhi produktivitas lansia ketika bekerja. Sehingga fenomena yang terjadi pada lansia adalah adanya fase pension baik bagi pekerja formal maupun informal. Pada lansia pekerja formal terdapat sistem batasan usia maksimum seorang dipekerjakan sehingga akan diberhentikan dari pekerjaannya. Sedangkan orang dengan pekerjaan informal (misal berdagang) memang tidak ada pensiun atau pemberhentian bekerja namun penurunan fungsi tubuh seiring bertambahnya usia pasti akan memaksa seorang untuk menurunkan intensitas pekerjaannya atau justru menghentikannya sendiri.

Miler (2009) mengemukakan bahwa fase berhenti kerja atau pensiun pasti akan dialami oleh seluruh lansia dan pada saat itu mengakibatkan pendapatan (uang) menurun serta perubahan peran dan status sosial. Pada fase tersebut tugas lansia adalah harus mampu beradaptasi dengan masa pensiun dan penurunan yang terjadi (Rosdahl dan Kowalski, 2012)

6) Iatrogenik (penyakit karena obat-obatan)

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) penyakit iatrogenik dapat didefinisikan sebagai reaksi yang merugikan atau komplikasi yang disebabkan oleh tindakan intervensi tanpa obat. Selain itu penyakit iatrogenik telah didefinisikan oleh Davy (1998) sebagai penyakit yang disebabkan oleh obat yang diresepkan oleh dokter setelah prosedur medis atau bedah. Risiko komorbiditas pada lansia lebih tinggi angka terjadinya dibandingkan risiko komorbiditas pada dewasa muda. Hal ini mengakibatkan lansia harus mengonsumsi obat dalam jumlah banyak dan dengan waktu yang panjang. Untuk menghindari risiko penyakit iatrogenik dapat mengenali faktor risiko ialah polifarmasi, multipatologi ditangani

oleh lebih dari satu dokter, dirawat di rumah sakit dan ada riwayat pembedahan.

7) Inkontinensi urin

Didefinisikan sebagai keluarnya urin yang tidak direncanakan dalam jumlah dan frekuensi tertentu sehingga menimbulkan masalah sosial dan kesehatan. Inkontinensia urin merupakan salah satu sindroma geriatri yang sering dijumpai pada lansia. Diperkirakan satu dari tiga wanita 15-20% pria di atas 65 tahun mengalami inkontinensia urin. Inkontinensia urin merupakan fenomena yang tersembunyi. Disebabkan oleh ketidakmampuan pasien menyampaikan kepada dokter dan dilain sisi dokter jarang mendiskusikan hal ini kepada pasien (Kane et.al. 2008)

8) Impotence

- a) Organik akibat gangguan endokrin, neurogenik, vaskuler
- b) Psikogenik merupakan penyebab utama pada gangguan organik, walaupun faktor risiko psikogenik ikut memegang peran. Jenis ini yang berpotensi reversible potensial biasanya yang disebabkan oleh kecemasan, depresi, rasa bersalah, masalah perkawinan, atau juga akibat dari rasa takut akan gagal dalam hubungan seksual.

9) Immuno defisiensi

Daya tahan tubuh yang menurun pada lansia merupakan fungsi tubuh yang tergantung dengan bertambahnya usia seorang, walaupun tidak selamanya hal ini disebabkan oleh proses menua, tapi dapat pula karena berbagai keadaan seperti penyakit menahun maupun penyakit akut yang dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh seseorang, demikian juga penggunaan berbagai obat, gizi yang kurang, penurunan fungsi organ tubuh dan lain-lain.

10) Infeksi

Infeksi pada lanjut usia merupakan penyebab kesakitan dan kematian nomor 2 setelah penyakit kardiovaskuler di dunia. Hal ini terjadi akibat beberapa hal antara lain : adanya penyakit komorbid kronik yang cukup banyak, menurunnya daya tahan atau imunitas terhadap

infeksi, ,menurunnya daya komunikasi lansia sehingga sulit atau jarang mengeluh, sulitnya mengenal tanda infeksi secara dini. Ciri utama pada penyakit infeksi biasanya ditandai dengan meningkatnya termperatur tubh, dan hal ini sering di jumpai pada lanjut usia, 30-65% usia lanjut yang terinfeksi sering tidak disertai dengan meningkatnya suhu tubuh, masalah suhu badan dibawah 36°C lebih sering dijumpai. Keluhan dan gejala infeksi semakin tidak khas antara lain berupa konfusi/delirium sampai koma, adanya penurunan nafsu makan tiba-tiba, badan menjadi lemasa dan adanya perubahan tingkah laku pada lansia (Kane at al.2008)

11) Malnutrisi

Kelemahan nutrisi merujuk pada yang terjadi pada lansia karena hilangnya berat badan fisiologis dan patologis yang tidak sengaja. Anoreksia pada lansia merupakan penurunan fisiologis nafsu makan dan asupan makan yang menyebabkan hilangnya berat badan yang tidak diinginkan (Kane et al, 2008)

12) Impaction

Konstipasi yang terjadi pada lansia disebabkan karena pergerakan fisik pada lansia yang kurang mengonsumsi makanan berserat, kerang minum, juga akibat pemberian obat-obatan tertentu.

13) Insomnia

Pada lansia dapat disebabkan oleh faktor yang terdiri dari nyeri kronis, sesak nafas pada penyakit obstruksi kronis, gangguan pristolik (gangguan cemas, dan depresi), pnyakit neurologi (parkinson dan alzheimer) dan obat-obatan kortikosteroid dan diuretik).(Dini. 2013)

14) Impairment of Hearing, Vision and Smell

Prevalensi gangguan pendengaran sedang atau berat meningkat 21% pada kelompok usia 70 tahun sampai 39% pada kelompok usia 85 tahun. Pada dasarnya, etiologi gangguan pendengaran sama untuk semua umur kecuali ditambah presbikusis untuk kelompok geriatri. Otosklerosis biasanya ditemui pada usia dewasa muda, ditandai dengan terjadinya remodeling tulang kapsul otak menyebabkan gangguan pendengaran

kondusif dan jika menyebar ke telinga bagian dalam juga dapat menimbulkan gangguan sensori renal. Penyakit meniere adalah penyakit telinga bagian dalam yang menyebabkan gangguan pendengaran berfluktuasi, tinnitus dan pusing. Gangguan pendengaran karena bising yang disebabkan oleh energi akustik yang berlebihan yang menyebabkan trauma permanen pada sel-sel rambut. Presbikusis sensori yang sering sekali ditemukan pada geriatri disebabkan oleh degeneratif dari organ kortim dan ditandai gangguan pendengaran dengan frekuensi tinggi. Penatalaksanaan untuk gangguan pendengaran geriatri adalah dengan cara memasang alat bantu dengar atau dengan tindakan bedah berupa implantasi koklea. (Salomen, 2013)

A. Konsep Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian

a. Pengkajian

Pengkajian merupakan langkah awal dalam asuhan keperawatan melalui pendekatan proses keperawatan yang bertujuan untuk pengumpulan data atau informasi, Analisa data, dan penentuan masalah atau diagnosis keperawatan. Manfaat pengkajian keperawatan adalah membantu mengidentifikasi status kesehatan, pola pertahanan klien, kekuatan serta kebutuhan klien serta merumuskan diagnosa keperawatan, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu pengumpulan, pengelompokan dan pengorganisasian serta menganalisa dan merumuskan diagnosa keperawatan.

b. Anamnesis

Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam anamnesis sebagai berikut:

1) Meliputi

Meliputi nama, umur, jenis kelamin, Pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal masuk panti, nomor register, dan diagnose medis

2) Alasan datang kepanti

Meliputi apakah klien masuk kepanti dengan alasan sudah tidak mempunyai keluarga atau kemauan klien sendiri

3) **Keluhan utama**

Pada umumnya keluhan utama pada kasus arthritis rematoid dengan resiko jatuh adalah rasa nyeri yang menyebabkan jatuh. Untuk memperoleh pengkajian yang lengkap tentang rasa nyeri pasien, digunakan :

- a.) *Provoking incident*: apakah ada peristiwa yang menjadi factor presipitasi nyeri
- b.) *Quality of pain*: seperti apa rasa nyeri yang dirasakan pasien. Umumnya rasa nyeri yang dirasakan pasien seperti tertimpah beban berat atau seperti tertusuk benda tajam
- c.) *Region radiation*: apakah rasa sakit bisa reda, apakah rasa sakit menjalar/ menyebar dan dimana rasa sakit terjadi.
- d.) *Severity (scale of pain)*: seberapa jauh rasa nyeri yang dirasakan pasien. berdasarkan skala nyeri.
- e.) *Time*: berapa lama nyeri berlangsung, kapan, apakah bertambahburuk pada malam/siang hari.

4) **Data Riwayat Kesehatan**

a) **Riwayat kesehatan sekarang**

Meliputi:

- 1) Sumber kecelakaan: penyebab dari sumber masalah
- 2) Gambaran yang mendalam bagaimana resiko jatuh itu terjadi: pasien dapat menceritakan bagaimana ia dapat mengalami jatuh tersebut
- 3) Factor yang mungkin berpengaruh seperti alcohol, obat-obatan
- 4) Keadaan fisik disekitar

5) Peristiwa yang terjadi saat belum terjatuh sampai terjadinyajatu

6) Beberapa keadaan lain yang memperbea berjalan

b) Riwayat penyakit dahulu

Penting untuk menentukan apakah pasien mempunyai penyakit yang merubah kemampuan gaya berjalan yang menyebabkan resiko jatuh pada klien rematoid atritis

c) Riwayat jatuh

Anamesis ini meliputi:

1) Seputar jatuh: mencari penyebab jatuh misalnya terpeleset, tersandung, berjalan, perubahan posisi badan, waktu mau berdiri dari jongkok, sedang makan, sedang buang air kecil atau besar, sedang batuk atau bersin.

2) Gejala yang menyertai: nyeri dada, berdebar-debar, nyeri kepala tiba-tiba, vertigo, pingsan, lemas, sesak nafas.

3) Kondisi komorbid yang relevan: pernah stroke, penyakit jantung, sering kejang, rematik, depresi, deficit sensorik.

4) Riview obat-obatan yang diminum: antihipertensi, diuretic, autonomic bloker, antidepresan, hipnotik, anxiolitik, analgetik, psikotropik

d) Riwayat psikososial dan spiritual

Peranan pasien dalam keluarga, status emosi meningkat, interaksi meningkat, interaksi sosial terganggu, adanya rasa cemas yang berlebihan, hubungan tetangga yang tidak harmonis, status dalam berkerja. Dan apakah klien rajin melakukan ibadah sehari-hari

5) **Aktivitas/ istirahat**

Gejala: nyeri sendi karena gerakan, nyeri tekan, memburuk dengan stres pada sendi, kekakuan pada pagi hari, biasanya terjadi bilateral dan simetris. limitasi fungsional yang berpengaruh pada gaya hidup, waktu senggang, pekerjaan, kelelahan.

6) **Keamanan (spesifikasi pada lansia dirumah)**

Gangguan keamanan berupa jatuh dirumah pada lansia memiliki insiden yang cukup tinggi, banyak diantara lansia tersebut yang akhirnya cedera berat bahkan meninggal. Bahaya yang menyebabkan jatuh cenderung mudah dilihat tetapi sulit untuk diperbaiki, oleh karena itu diperlukan pengkajian yang spesifik tentang keadaan rumah yang terstruktur. Contoh pengkajian checklist pencegahan jatuh pada lansia yang dilakukan oleh departemen kesehatan dan pelayanan masyarakat amerika

7) **Pemeriksaan fisik**

Status mental

a) Kesadaran

Tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan dari lingkungan, tingkat kesadaran dibedakan menjadi : composmetis, apatis delirium, samnolen, stupor, dan coma

b) *Glas coma scale*

Skala yang digunakan untuk menilai kesadaran pasien. respon yang perlu diperhatikan mencapai tiga hal yaitu reaksi membuka mata, bicara dan motoric.

Hasil pemeriksaan gcs disajikan dalam bentuk simbol E, V, M dan selanjutnya nilai gcs tersebut dijumlahkan.

8) Tanda tanda vital

Batas suhu normal suhu saat ini irama dan frekuensi jantung abdomen tekanan darah abdomen, pernafasan abdomen

9) Integritas ego

Gejala: factor-faktor stres akut/kronis: mis, finansial, pekerjaan, ketidak mampuan, factor-faktor hubungan, keputusan dan ketidak berdayaan (situasi ketidak mampuan) ancaman pada konsep diri, citra tubuh, identitas pribadi (misalnya tergantung pada orang lain).

10) Makana/cairan

Gejala: ketidak mampuan untuk menghasilkan/ mengkonsumsi makanan/ cairan adekuat : mual, anoreksia, kesulitan untuk mengunyah

Tanda: penurunan berat badan, kekeringan pada membran mukosa

11) Hygiene

Gejala: berbagai kesulitan untuk melaksanakan aktivitas perawatan pribadi, ketergantungan.

12) Neurosensory

Gejala: kebas, semutan, pada tangan dan kaki, hilangnya sensasi pada jari tangan

Tanda: pembengkakan sendi simetris

13) Nyeri/kenyamanan

Gejala: fase akut dari nyeri (mungkin tidak disertai oleh pembengkakan jaringan lunak pada sendi).

14) Keamanan

Gejala: kulit mengkilat, tegang, nodul sukutan, lesi kulit, ulkus kaki. Kesulitan dalam ringan dalam menangani tuga/pemeliharaan rumah tangga. Demam ringan menetap kekeringan pada mata dan memberan mukosa.

15) Interaksi sosial

Gejala: kerusakan interaksi sosial dengan keluarga/orang lain, perubahan peran, isolasi

c. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialami baik yang berlangsung actual maupun potensial. Doagnosa keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien individu, keluarga dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan (SDKI, 2016)

Dalam Setandar Keperawatan Indonesia (SDKI) yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh PPNI (persatuan perawat nasional Indonesia), muncul diagnose keperawatan dengan kerusakan fisik, yaitu :

- a. Nyeri akut
- b. Hambatan mobilits fisik
- c. Resiko jatuh
 - 1)Definisi: beriko mengalami kerusakan fisik dengan gangguan kesehatan akibat terjatuh
 - 2) Etiologi

- a) Usia > 65 tahun (pada dewasa) atau <2 tahun (pada anak)
- b) Riwayat jatuh
- c) Anggota gerak bawah prosthesis (buatan)
- d) Penggunaan alat bantu berjalan
- e) Penurunan tingkat kesadaran
- f) Perubahan fungsi kognitif
- g) Lingkungan tidak aman (licin, gelap, lingkungan asing)
- h) Kondisi paska oprasi
- i) Hipotensi ortostatik
- j) Perubahan kadar glukosa darah
- k) Anemia
- l) Kekuatan otot menurun
- m) Gangguan pendengaran
- n) Gangguan keseimbangan
- o) Gangguan penglihatan (katarak, ablasio retina, neuritisaptikus)
- p) Neuropati
- q) Efek agen farmakologi (sedasi, alcohol, anasteri umum)

3) Batasan karakteristik

- a) Osteoporosis
- b) Kejang
- c) Penyakit sebrovaskuler
- d) Katarak
- e) Glukoma
- f) Demensai
- g) Hipotensi
- h) Amputasi
- i) intoksisasi

d. Perencanaan Asuhan Keperawatan (SDKI, 2016)

Perencanaan keperawatan adalah pencatatan tentang kegiatan perencanaan keperawatan (langkah pemecahan serta urutan prioritasnya, perumusan tujuan, perencanaan tindakan , dan penelitian) yang dapat dipertanggung jawabkan secara massal, teknis, dan hukum yang bertujuan untuk mengomunikasikan secara tertulis langkah yang perlu diambil serta urutan prioritasnya, tujuan yang ingin dicapai, rencana tindakan pemecahan masalah klien, dan rencana penilaiannya

1). Resiko jatuh

a). Tujuan: klien terbebas dari jatuh dan klien melakukan tindakan keamanan

2). kriteria hasil

- a) klien dapat menggunakan alat bantu dengan benar
- b) klien dapat menempatkan penopang untuk mencegah jatuh
- c) klien dapat memodifikasi lingkungan untuk mencegah jatuh
- d) klien dapat menggunakan fasilitas kesehatan yang ada
- e) klien dapat menempatkan susunan pegangan tangan sesuaikebutuhan

e. Intervensi keperawatan

- 1) Sediakan lingkungan yang aman untuk pasien
- 2) Identifikasi kebutuhan keamanan pasien, sesuai dengan kondisi fisik dan fungsi kognitif pasien dan riwayat penyakit dahulu pasien
- 3) Identifikasi factor lingkungan yang memungkinkan resiko jatuh (misalnya, lantai licin, karpet yang licin,

anak tangga tanpa pegangan , jendela, dan kolam renang)

- 4) Menghindarkan lingkungan yang bahaya(misalnya:memindahkan perabotan)
- 5) Bila diperlukan gunakan reteksis fisik untuk membatasi resikojatuh
- 6) Memasang side rail tempat tidur
- 7) Menyediakan tempat tidur yang nyaman dan bersih
- 8) Menempatkan saklar lampu ditempat yang mudah dijangkaupasien
- 9) Memberikan penerangan yang cukup
- 10) Memindahkan barang-barang yang dapat membahayakan
- 11) Berikan materi edukasi yang berhubungan dengan strategi dantindakan untuk mencegah cedera

f. Penatalaksanaan /Impelementasi

Impelementasi keperawatan ditunjukan untuk meningkatkan dan mempertahankan kemandirian klien. Karena sebagian besar tindakan keperawatan dapat diterapkan pada semua lingkungan, maka intervensi tersebut harus terdiri dari dua bagian, yaitu: pertimbangan tahap perkembangan dan perlindungan lingkungan. Katagori pertama dari intervensi mencakup intervensi yang spesifik untuk mengurangi resiko pada setiap kelompok perkembangan usia (potter dan perry, 2005)

g. Evaluasi

Rencana keperawatan yang dirancang untuk mengurangi resiko cedera pada klien, di evaluasi dengan cara membandingkan kriteria hasil dengan tujuan yang diciptakan selama tahap perencanaan. Jika tujuan telah

dicapai, maka intervensi keperawatan dengan efektif dan tepat. Jika tidak tercapai, maka perawat harus menentukan apakah ada resiko baru yang berkembang pada klien atau apakah resiko sebelumnya tetap ada.

A. Teori Pendekatan

Teori adaptasi Roy merupakan teori model keperawatan yang menguraikan bagaimana individu mampu meningkatkan kesehatannya dengan cara mempertahankan perilaku adaptif serta mampu merubah perilaku yang inadaptif. Roy menyatakan jika manusia merupakan system yang adaptif. Sehingga makhluk biopsikososial, dalam memenuhi kebutuhannya, selalu dihadapkan berbagai persoalan yang kompleks, sehingga dituntut untuk mampu beradaptasi.

Model Adaptasi dari Roy ini dipublikasikan pertama pada tahun 1970 dengan beberapa asumsi dasar. Asumsi pertama adalah setiap orang selalu menggunakan coping yang bersifat positif maupun negatif. Kemampuan beradaptasi seseorang dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu ; penyebab utama terjadinya perubahan, terjadinya perubahan dan pengalaman beradaptasi. Asumsi selanjutnya Roy meyakini jika manusia selalu berada dalam rentang sehat – sakit, yang berhubungan erat dengan keefektifan coping yang dilakukan untuk memelihara kemampuan adaptasi. Dalam penjelasannya Roy mengatakan bahwa setiap manusia selalu berusaha menanggulangi perubahan status kesehatan dan perawat harus merespon untuk membantu manusia beradaptasi terhadap perubahan ini.

C.Evidence Based (EBN)

1. Pengertian

Jatuh merupakan suatu kejadian yang menyebabkan subjek yang sadar menjadi berada di permukaan tanah tanpa disengaja dan tidak termasuk jatuh akibat pukulan keras, kehilangan kesadaran, atau kejang.

Kejadian jatuh tersebut adalah dari penyebab yang spesifik yang jenis dan konsekuensinya berbeda dari mereka yang dalam keadaan sadar mengalami jatuh (Stanley, 2006).

Jatuh merupakan hasil dari campuran interaktif dan kompleks dari factor biologis , perilaku dan lingkungan dan diantaranya dapat dicegah (Kamel, Abdulmajeed& Ismail, 2013). Duapuluh hingga tiga puluh persen dari lansia yang memiliki derajat kecacatan tinggi terkait jatuh akan mengalami kehilangan kebebasan akan ADL (aktivitas hidup sehari-hari), penurunan kualitas hidup dan yang paling memprihatinkan adalah kematian (Jamebozorgi et al, 2013)

Jatuh adalah kejadian tiba-tiba dan tidak sengaja yang mengakibatkan seseorang terbaring atau terduduk dilantai yang lebih rendah tanpa kehilangan kesadaran (Maryam, 2010).

Terdapat banyak masalah fisik yang sering terjadi pada lansia, salah satunya yaitu jatuh (Sitepu dan Iwan, 2012). Pada lanjut usia akan terjadi penurunan fisiologis sistem muskuloskeletal, terutama yang berpengaruh pada pengontrol keseimbangan. Sehingga akan terjadi penurunan propioseptif, vestibular dan visual yang akan menyebabkan risiko jatuh pada lanjut usia semakin meningkat (Munawwarah dan Nindya, 2015). Sekitar 30% dari lansia yang berusia 65 tahun, dan 50% dari lansia yang berusia 85 tahun, akan jatuh setidaknya sekali setiap tahun (WHO, 2015)

Lemahnya kekuatan otot extremitas bawah, kerusakan saraf ganglia basal, dan serebelum, diabetes, dan neuropati perifer adalah beberapa faktor penyebab yang lebih sering risiko jatuh yang telah diakui. Untuk itu sangat perlu dilakukan intervensi untuk meningkatkan keseimbangan tubuh lansia untuk mencegah resiko jatuh tersebut. Manajemen jatuh pada lansia memerlukan pendekatan multisistem struktural yang mencakup spektrum kelemahan (*frailty*). Dengan demikian, intervensi untuk mencegah atau mengurangi risiko kejadian jatuh pada lansia sangat dibutuhkan. (Siregar.20201)

Berdasarkan survey awal tepatnya di UPT pelayanan sosial lanjut usia Binjai, Sumatera Utara mendapatkan sekitar 80% lansia mengalami resiko jatuh, separuh dari angka tersebut mengalami masalah keseimbangan tubuh. Sehingga setiap tahunnya lansia yang ada di panti jompo tersebut mengalami peningkatan kejadian jatuh.

2. Tujuan

Latihan jalan tandem merupakan salah satu latihan yang bertujuan melatih sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot dan gerakan tubuh. Latihan jalan tandem digunakan juga untuk melatih parameter yang terkait dengan keseimbangan mobilitas. Namun masih sedikit ditemukan penelitian tentang efek jalan tandem terhadap keseimbangan tubuh lansia.(Siregar.2020)

3. Indikasi

Mebutuhkan intervensi untuk meningkatkan keseimbangan tubuh lansia sehingga dapat menurunkan resiko jatuh, khususnya bagi lansia yang mengalami penyakit degeneratif seperti RA, OA, DM dan hipertensi. Terkait dengan tingginya angka penderita penyakit degeneratif pada kelompok lansia yang tentunya dapat meningkatkan potensial jatuh pada lansia, peneliti tertarik untuk menguji intervensi apakah latihan jalan tandem dapat meningkatkan keseimbangan tubuh lansia di UPT Pelayanan Sosial lanjut usia di Binjai Sumatera Utara?. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia khususnya petugas kesehatan agar dapat mengatasi masalah resiko jatuh ada lansia.(Siregar,2020)

4. Kontraindikasi

Kontraindikasi jalan tandem yaitu seseorang dengan kondisi ataksia cerebellar tidak mampu menjaga keseimbangan bahkan dengan kondisi mata

terbuka, bahkan ketika langkah pertamanya. Orang yang mengalami suatu kelumpuhan pada ekstremitas bawah (Batson *et al*, 2009)

5. Prosedur Pemberian Intervensi

Latihan jalan tandem ini dilakukan 3 kali seminggu dengan waktu 10 menit dengan jarak 3-6 meter. Latihan ini mengharuskan lansia berjalan sesuai dengan garis serta jari kaki harus berada di belakang tumit kaki lainnya dan mengontrol postur tubuh langkah demi langkah yang dilakukan dengan bantuan kognisi dan koordinasi otot *trunk, lumbal spine, pelvic, hip*, otot-otot perut hingga *ankle*. Dalam penelitian ini latihan ini dilakukan selama 8 minggu. Sebelum dilakukan latihan jalan tandem, keseimbangan tubuh lansia diukur dan sesudah dilakukan latihan jalan tandem, keseimbangan tubuh lansia diukur kembali. Latihan jalan tandem ini dilakukan satu persatu oleh responden dengan pengawasan peneliti selama 8 minggu. Penelitian ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari responden.

Tehnik Pelaksanaan Latihan Jalan *Tandem* menurut Batson *et al.*, 2009 adalah :

- a. Teknik pertama: Kedua kaki bersampingan ditujukan untuk melatih keseimbangan kaki yang dilakukan dengan cara merapatkan kedua kakinya dan berdiri tegak selama 10 detik atau semampunya. Selama 10 detik klien dapat sambil menggerak-gerakkan kepala ke kiri, kanan, atas, dan bawah. Selanjutnya, teknik yang sama dilakukan namun dengan kondisi mata tertutup
- b. Teknik kedua: Semi tendem standing adalah gerakan untuk melatih keseimbangan kaki yang dilakukan dengan cara meletakkan tumit kaki di sebelah ibu jari kaki sebelahnya dan bertahan selama 10 detik atau semampunya. Selama 10 detik klien dapat sambil menggerak-gerakkan kepala ke kiri, kanan, atas, dan bawah.

c. Teknik ketiga: full tandem standing adalah gerakan untuk melatih keseimbangan kaki yang dilakukan dengan cara meletakkan tumit kaki di ujung ibu jari kaki sebelahnya. Selama 10 detik klien dapat sambil menggerak-gerakkan kepala ke kiri, kanan, atas, dan bawah. Subjek diminta untuk berjalan maju pada jalur (satu garis lurus) dengan menempatkan kaki kanan menyentuh tumit kaki kiri dan berjalan sejauh 3-6 meter. Lakukan sebanyak 10 kali kemudian istirahat.

Latihan Jalan *Tandem* dapat dilakukan dengan mata terbuka dan tertutup. Latihan Jalan *Tandem* yang dilakukan dengan mata yang terbuka akan lebih mudah untuk dilakukan karena adanya korelasi visual terhadap vestibular dan *proprioseptif*. Sedangkan Jalan *Tandem* yang dilakukan dengan mata tertutup dilakukan untuk menguji fungsi vestibular. Latihan dan tes ini akan berhasil dilakukan jika *input* dari cerebelar dan *proprioseptif* normal. Dosis yang dianjurkan untuk dapat menghasilkan keseimbangan yang adekuat adalah 2-4 minggu (Batson *et al.*, 2009).

6. Pengaruh

Dari penelitian yang dilakukan oleh Rinco siregar 2020 menunjukkan bahwa penurunan resiko jatuh setelah dilakukan latihan jalan tandem dikarenakan latihan jalan tandem dapat meningkatkan keseimbangan postural bagian lateral yang berperan dalam mengurangi risiko jatuh pada lansia, serta merupakan salah satu dari jenis latihan keseimbangan (*balance exercise*) yang melibatkan proprioseptif terhadap kestabilan tubuh. (Siregar, 2020)

BAB III

LAPORAN KASUS

A. Identitas

1. Data Demografi

- a. Nama lansia : Abdul. Rasid
- b. Umur : 71 tahun
- c. Alamat : Kelurahan samata, kab.Gowa
- d. Jenis kelamin : laki-laki
- e. Jumlah keturunan : anak 5 orang dan cucu 6 orang
- f. Nama istri : Saleha
- g. Umur : 56 tahun

2. Pengkajian

- a. Keluhan utama :Klien mengatakan pusing
- b.Riwayat keluhan utama : klien mengalami hipetensi dan klien memeriksa gula darahnya ke fakes klien mengatakan gulanya sering tinggi dan hanya diberi obat

c. Fisik

Wawancara

- 1) Pandangan lanjut usia tentang kesehatannya : Klien mengatakan kesehatan harus dikontrol agar mengetahui kondisinya lebih sering lagi, klien juga mengatakan ada beberapa penyakit yang diderita mungkin dikarenakan faktor usia
- 2) Kegiatan yang mampu dilakukan lanjut usia : Toileting, makan, makndi, berpakaian, membersihkan rumah, menjaga cucu
- 3) Kebiasaan lanjut usia merawat diri sendiri : Klien masih mampu merawat diri sendiri dan memenuhi kebutuhan aktivitasnya
- 4) Kekuatan fisik lanjut usia : sendi, otot, penglihatan dan pendengaran : Klien mengatakan masih kuat melakukan aktivitas dan pendengarannya masih baik tetapi pada penglihatan kemampuan klien sudah menurun dalam penglihatan

- 5) Kebiasaan makan, minum, istirahat/tidur, BAB/BAK : Klien mengatakan makan 3 kali sehari dengan lauk-pauk, istirahat klien tidak tentu berapa jam, BAB dan BAK klien mengatakan lancar
- 6) Kebiasaan gerak badan.olahraga/senam lanjut usia : Klien hanya olahraga apabila diadakan oleh posyandu selebihnya pasien hanya jalan-jalan santai sekitar rumah pada pagi hari
- 7) Kebiasaan lansia dalam memelihara kesehatan dan kebiasaan dalam makan dan minum obat : Klien dengan teratur dan rutin minum obat yang diberikan oleh dokter
- 8) Masalah seksualitas yang dirasakan: -

3. Pemeriksaan fisik

- a. Pemeriksaan fisik dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi untuk mengetahui adanya perubahan atau rasa sakit pada sistem tubuh
- b. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu :
 - 1) Temperatur : 36,1°C
Tampat pengukuran : axilla
 - 2) Pulse (nadi)
Kecepatan : 80x/I
Irama : regular
Tempat pengukuran : radialis
 - 3) Respirasi (nafas)
Kecepatan : 24x/I
Irama : bradipnea
Kedalaman : konstan
Bunyi : normal
 - 4) Tekanan darah : 170/80 mmHg
Posisi pengukuran : duduk
 - 5) Berat dan tinggi badan terakhir : BB 68 KG, TB 170 cm
 - 6) Tingkat orientasi
Waktu : klien tahu waktu saat ini

Tempat ; klien mengenal tempat

Orang : klien mengenali orang

7) Memory (ingatan) : klien mengingat masa lalu dan saat ini

8) Tidur

Kuantitas (lama tidur) : 5-6 jam

Kuantitas : klien tidur dengan nyaman dan nyenyak

Pola : tidak menentu

9) Istirahat :

Kualitas : 5-6 jam

Kualitas : sering

Pola : tidak tentu

10) Penyesuaian psikososial : Klien dapat menyesuaikan dirinya dan juga keluarganya, klien juga tampak sabar dan memiliki hubungan yang baik dengan tetangga

4. Sistem persyarafan

a. Kesimetrisan raut wajah : simetris

b. Tingkat kesadaran :

Snile (pikun) : klien tidak pikun

Daya ingat : klien memiliki ingatan yang cukup baik

c. Mata

Pergerakan : normal

Penglihatan : klien merasa kemampuan melihatnya sudah mulai buram atau menurun

Penyakit penyerta : klien tidak menderita penyakit mata sebelumnya

d. Pupil

Kesamaan : isokor

e. Ketajaman penglihatan : klien tidak dapat melihat dengan jarak 1,5 meter

f. Sensorik : deprivation (gangguan sensori) : tidak terdapat

g. Ketajaman pendengaran “ klien masih mendengar dengan baik

Apakah penggunaan alat bantu denganr : tidak

Tinitus : tidak ada

Serumen : tidak ada

h. Rasa sakit atau nyeri : klien mengeluh sakit kepala

5. Sistem kardiovaskuler

a. Sirkulasi periper : 2 detik

Warna : merah mudah

Kehangatan : hangat

b. Denyut nadi apikal : -

c. Pembengkakan vena jugularis : tidak ada pembengkakan vena jugularis

d. Pusing : klien mengeluh pusing

e. Nyeri dada : klien merasa nyeri dada sesekali

f. Edema : tidak terdapat edema saat dilakukan palpasi

6. Sistem gastrointestinal

a. Status gizi : IMT 23,5

b. Pemasukan diet : klien diet gula

c. Anoreksia : tidak ada

d. Mual : tidak

e. Muntah : tidak

f. Mengunyah dan menelan : baik

g. Keadaan gigi : tidak lengkap

h. Rahang : simetris

i. Ronggam mulut : simetris

j. Bising usus : tidak ada

k. Keadaan perut : tidak ada pembesaran rongga

l. Konstipasi : tidak ada

m. Diare : tidak ada

7. Sistem Genitourinarius

- a. Waran dan bau urine : kuning gelap
- b. Distensi kandung kemih : tidak
- c. Inkontinensia : memiliki riwayat
- d. Frekuensi : sering
- e. Tekanan/desakan : adanya tekanan
- f. Pemasukan cairan : 1,5 L
- g. Pengeluaran cairan : klien sering keluar masuk WC
- h. Disuria : klien sering pilang balik WC untuk BAK
- i. Seksualitas Minat melaksanakan hubungan sekas : -

8. Sistem kulit

a. Kulit

Temperatur : normal

Turgor : lembab

Pigmen : terdapat pigmentasi pada beberapa bagian tubuh klien

b. Jaringan parut : terdapat

c. Keadaan kuku : pendek

d. Keadaan rambut : klien berambut, tidak ada ketombe, tidak da massa pada kulit, terdapat uban pada sebagian besar rambut klien

9. Sistem muskuloskeletal

a. Kontraktur

Otot : klien masih kuat dalam melakukan aktivitas

Tendon : normal

Gerakan sendi : aktif

b. Tingkat mobilisasi

Ambulasi : tanpa bantuan

Gerakan : teorientasi

Kekuatan otot : menahan beban minimal

Kemampuan melangkah atau berjalan : klien dapat berjalan tanpa bantuan

c. Gerakan sendi : aktif

10. Psikologis

- a. Pengenalan masalah utama : klien mengerti dengan masalah utama khususnya masalah kesehatan
- b. Sikap terhadap proses penuaan : klien menyadari jika umur bertambah penyakit tidak dapat dihindari juga
- c. Perasaan dibutuhkan : klien merasa sangat dibutuhkan oleh keluarga
- d. Pandangan terhadap kehidupan : klien mengatakan bahwa hidup ini punya masanya dan sekarang klien berada dimasa tua
- e. Koping stressor : klien dapat dengan sabar melewati semua keadaan dalam kehidupannya
- f. Penyesuaian diri : klien mampu menyesuaikan diri dengan orang baru atau orang yang baru ditemui
- g. Kegagalan : klien tidak menyerah terhadap kegagalan
- h. Harapan saat ini dan yang akan datang : klien berharap bisa sehat dan hidup bahagia dengan keluarga
- i. Fungsi kognitif :
 - Daya ingat : klien memiliki ingatan yang cukup baik
 - Proses pikir : baik
 - Alam perasaan : bahagia
 - Orientasi : baikKemampuan dalam menyelesaikan masalah : klien mampu menyelesaikan masalah diri sendiri dan keluarga

11. Sosial ekonomi

- a. Sumber keuangan : anak kandung
- b. Kesibukan dalam mengisi waktu luang : bermain dengan cucu
- c. Teman tinggal : istri dan cucu klien

- d. Kegiatan organisasi : tidak ada
- e. Pandangan terhadap lingkungan : klien menganggap lingkungan tempat tinggal baik mempunyai tetangga yang baik
- f. Hubungan dengan orang lain diluar rumah : baik dan akrab
- g. Yang biasa mengunjungi klien : anak klien
- h. Penyalur hobi atau keinginan ksesuai fasilitas yang ada : tidak ada
- i. Spiritual : klien melaksanakan sholat 5 waktu setiap harinya
- j. Agama : klien beragama islam
- k. Kegiatan ibadah : dzikir sehabis sholat atau ditengah waktu luang
- l. Cara lanjut usia menyelesaikan masalah : dengan memohon petunjuk kepada pemberi kehidupan Allah SWT
- m. Penampilan lansia : sesuai usia

12. Psikososial

- a. Tingkat ketergantungan : minimal care
- b. Fokus diri : klien memahami kondisi sendiri
- c. Perhatian : klien memperhatikan diri,kesehatannya dan keluarganya
- d. Rasa kasih sayang : klien sayang dengan dirinya dan keluarga

13. Pengkajian Fungsional

- a. **Indeks katz** : Skor A (Kemandirian dalam hal makan, kontinen, berpindah, ke kamar kecil, berpakaian. Mandi)
- b. **Status kognitif** : kesalahan 2 (fungsi intelektual utuh)
- c. **Skala depresi** : skor 10 (kemungkinan depresi)
- d. **Skala jatuh morese** : skor 45 (resiko rendah)
- e. **Status sosial** : 7 (status sosial baik)
- f. **Barthel indeks** : skor 120 (ketergantungan sebagian)
- g. **Penilaian potensi dekubitus** : 18 (tidak terjadi)
- h. **Mini metal status exam** : skor 21 (aspek kognitif dari fungsi mental ringan)
- i. **Pengkajian keseimbangan** : 5 (resiko jatuh tendah)

Tabel Pengkajian Status Fungsional

Tabel 1.3

INDEKS KATZ

INDEKS KATZ	
Score	Kriteria
A	Kemandirian dalam hal makan, kontinen, berpindah, ke kamar kecil, berpakaian, mandi
B	Kemandirian dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali satu dari fungs tersebut
C	Kemandirian dalam hal aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi dan satu dari fungsi tambahan
D	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian dan satu fungsi tambahan
E	Kemandirian dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil dan satu fungsi tambahan
F	Kemandirian dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian, berpindah dan satu fungsi tambahan
G	Ketergantungan pada semua fungsi

Interpretasi : Score A

Analisis hasil :

- a) Mandiri dalam makan, kontinensia (BAB dan BAK), menggunakan pakaian, pergi ke toilet, berpindah dan mandi
- b) Mandiri semua kecuali salah satu dari satu fungsi
- c) Mandiri, kecuali mandi dan satu fungsi lainnya
- d) Mandiri, kecuali mandi, berpakaian dan satu fungsi lainnya
- e) Mandiri, kecuali, berpakaian, toilet, dan satu fungsi lainnya
- f) Mandiri, kecuali maandi, pakaian, ke toilet, berpindah, dan satu fungsi lainnya
- g) Ketergantungan untuk semua fungsi

Keterangan :

Mandiri berarti, pengarahan atau bantuan aktif dari orang lain. Seseorang yang menolak melakukan suatu fungsi dianggap tidak melakukan fungsi meskipun ia dianggap sanggup

Tabel 2.3
PENGAJIAN STATUS KOGNITIF DAN EFEKTIF

Skor portable mental score questionnaire (SPMQ)				
Score			Pertanyaan	Jawab
+	-			
		1.	Tanggal berapa hari ini.?	X
		2.	Hari apa sekarang ini.?	√
		3.	Apa nama tempat ini.?	√
		4a.	Berapa nama telephone anda.?	X
		4b.	Dimana alamat anda.?(tanyakan hanya bila klien mempunyai No.tlpn	√
		5.	Berapa umur anda.?	√
		6.	Kapan anda lahir .?	√
		7.	Sia[a [resode sekarang.?	√
		8.	Siapa presiden sebelumnya.?	√
		9.	Siapa nama kecil ibu anda.?	√
		10.	Kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap angka bari semua secara menurun	Kesalahan 2

Penilaian : fungsi intelektual utuh

1. Kesalahan 0 – 2 fungsi intelektual utuh
2. Kesalahan 3 – 4 fungsi intelektual ringan
3. Kesalahan 5 – 7 fungsi intelektual sedang
4. Kesalahan 8 – 10 fungsi intelektual berat

NB

- Bisa dimaklumi bila lebih dari satu kesalahan bila subjek hanya berpendidikan sekolah dasar
- Bisa dimaklumi bila kurang dari satu kesalahan bila subjek mempunyai pendidikan di atasekolah menengah atas

Tabel 3.3**SKALA DEPRESI GERIATRIK (*GERIATRIC DEPRESSION SCALE GDS*)****(Short Form)**

No	Pertanyaan	Ya	Tdk
1	Apakah pada dasarnya anda puas dengan kehidupan anda ?	0	1
2	Apakah anda telah banyak meninggalkan kegiatan dan minat/kesenangan anda?	0	1
3	Apakah anda merasa kosong dengan kehidupan yang dijalani saat ini?	0	1
4	Apakah anda sering bosan ?	0	1
5	Apakah anda mempunyai semangat yang baik setiap waktu ?	0	1
6	Apakah anda takut sesuatu akan terjadi pada anda ?	0	1
7	Apakah anda merasa bahagia di setiap waktu ?	1	0
8	Apakah anda merasa tidak berdaya?	1	0
9	Apakah anda lebih suka tinggal di rumah pada malam hari, daripada pergi dan melakukan sesuatu yang baru ?	0	1
10	Apakah anda memiliki banyak masalah dengan daya ingat dibandingkan kebanyakan orang	0	1
11	Apakah anda berfikir sangat menyenangkan hidup sekarang ini?	1	0
12	Apakah anda merasa Saya sangat tidak berharga/ berguna?	1	0
13	Apakah anda merasa penuh semangat?	1	1
14	Apakah anda merasa tidak memiliki harapan?	0	1
15	Apakah anda berpikir keadaan orang lain lebih baik daripada anda?	0	1
	Skor	4	10

Penilaian : kemungkinan depresi skor 10

0 – 5 : Normal

6 – 10 : Kemungkinan depresi

>10 : Depresi

Tabel 4.3

SKALA JATUH MORSE (MORSE FALL SCALE/ MFS)

No.	Item	Skala		Skor
1	Riwayat jatuh Apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir?	Tidak	0	0
		Ya	25	
2	Diagnosis sekunder Apakah lansia memiliki lebih dari satu penyakit?	Tidak	0	
		Ya	15	15
3	Alat bantu pergerakan <i>Bed rest/</i> dibantu perawat		0	0
	Walker/kruk/tongkat		15	
	Berpegangan pada benda sekitar (kursi, meja, lemari)		30	
4	Terapi intravena: Apakah saat ini lansia terpasang infus?	Tidak	0	0
		Ya	20	20
5	Gaya berjalan/cara berpindah Normal		0	0
	Lemah		10	10
	Gangguan/ tidak normal		20	
6	Status mental Lansia menyadari kondisinya		0	0
	Lansia mengalami keterbatasan daya ingat		15	
Total nilai				45: beresiko rendah (pencegahan standar)

Tabel 5.3

Keterangan:

Tingkat Risiko	Nilai MPS	Tindakan
Tidak berisiko	0 -24	Perawatan dasar
Risiko rendah	25 – 50	Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh standar
Risiko tinggi	≥ 51	Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi

Tabel 6.3

PENGAJIAN STATUS SOSIAL

APGAR Keluarga					
No	Fungsi	Uraian	Selalu	Kadang	Hampir tidak pernah
			2	1	0
1	Adaptasi	Saya puas bahwa saya dapat kembali pada keluarga (teman-teman) saya untuk membantu pada waktu sesuatu menyusahkan saya	2		
2	Hubungan	Saya puas dengan cara keluarga (teman- teman) saya membicarakan sesuatu dengan saya dan mengungkapkan masalah dengan saya		1	
3	Pertumbuhan	Saya puas bahwa keluarga (teman-teman) saya menerima dan mendukung keinginan saya untuk melakukan aktifitas atau arah baru	2		

4	Afeksi	Saya puas dengan cara keluarga (teman-teman) saya mengekspresikan afek dan berespons terhadap emosi-emosi saya, seperti marah, sedih atau mencintai	2		
5	Pemecahan	Saya puas dengan cara teman-teman saya dan saya menyediakan waktu bersama-sama			0
Skor			7 (fungsi sosial baik)		

Penilaian : 7 fungsi sosial baik

0 – 5 Fungsi sosial kurang

6 – 10 Fungsi sosial baik

Tabel 7.3

BARTHEL INDEKS

No	Kriteria	Dengan Bantuan	Mandiri	Keterangan
1	Makan	5	10	Frekuensi : 3x sehari Jumlah : tidak tentu Jenis : makanan berat
2	Minum	5	10	Frekuensi : sering Jumlah : 1,5/hari Jenis : air putih
3	Berpindah dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya	5 – 10	15	15
4	Personal toilet (cuci muka, menyisir rambut, gosok gigi)	0	5	Frekuensi : setiap hari
5	Keluar masuk toilet (membuka pakaian, menyeka tubuh, menyiram)	5	10	10
6	Mandi	5	15	Frekuensi : 1x sehari
7	Jalan di permukaan datar	0	5	5
8	Naik turun tangga	5	10	10

9	Mengenakan pakaian	5	10	10
10	Kontrol bowel (BAB)	5	10	Frekuensi : 1-2x sehari Konsistensi : ya
11	Kontrol bladder (BAK)	5	10	Frekuensi : sering Warna : kuning gelap
12	Olahraga/latihan	5	10	Frekuensi : jarang Jenis : senam
13	Rekreasi/pemanfaatan waktu luang	5	10	Jenis : - Frekuensi :-

Keterangan : 120 (ketergantungan sebagian)

- 130 : Mandiri
- 60-125 : Ketergantungan sebagian
- 55 : Ketergantungan total

PENILAIAN POTENSI DEKUBITUS (SKOR NORTON)

Kondisi Fisik Umum : 3

- a) Baik 4
- b) Lumayan 3
- c) Buruk 2
- d) Sangat buruk 1

Kesadaran : 4

- a) Komposmentis 4
- b) Apatis 3
- c) Sopor 2
- d) Koma 1

Tabel 8.3

MMSE (*Mini MentalStatus Exam*)

1) Orientasi

2) Registrasi

3) Perhatian

4) Kalkulasi

5) Mengingat kembali


No.	Aspek Kognitif	Nilai Maks	Nilai Klien	Kriteria
1	Orientasi Waktu	5	4	Menyebutkan dengan benar : (Nilai 1 untuk tiap jawaban) <input type="checkbox"/> Tahun <input type="checkbox"/> Bulan <input type="checkbox"/> Hari <input type="checkbox"/> Musim <input type="checkbox"/> Tanggal
	Orientasi Tempat	5	3	Dimana kita sekarang berada? (Nilai 1 untuk setiap jawaban) <input type="checkbox"/> Kota <input type="checkbox"/> Propinsi/Kabupaten/Kecamatan <input type="checkbox"/> Di ruangan mana <input type="checkbox"/> Di lantai berapa <input type="checkbox"/> Nama wisma.....

2	Registrasi	3	3	<p>Sebutkan nama 3 obyek/benda (oleh pemeriksa), 1 detik untuk menyebutkan masing-masing obyek. Kemudian tanyakan kepada klien ketiga obyek yang disebutkan tadi.</p> <p>(Nilai 1 untuk setiap jawaban)</p>
---	------------	---	---	---

				<input type="checkbox"/> Obyek : pulpen <input type="checkbox"/> Obyek : tensi <input type="checkbox"/> Obyek : buku catatan
3	Perhatian dan kalkulasi	5	1	<p>Minta klien mengeja 5 kata dari belakang, misal "BAPAK"</p> <ul style="list-style-type: none"> • K • A • P • A • B <p>Minta klien hitung mundur dari 100 ke bawah dengan pengurangan 5. Berhenti setelah mendapat nilai 75.</p> <p>(Nilai 1 setiap jawaban benar)</p>
4	Mengingat	3	2	<p>Minta klien untuk mengulangi ketiga obyek pada No.2 (registrasi) tadi. Bila benar, 1 poin untuk masing- masing obyek</p>

5	Bahasa (9) Menamai	2	2	Tunjukkan pada klien suatu benda dan tanyakan namanya pada klien. <input type="checkbox"/> (misal jam tangan) <input type="checkbox"/> (missal pensil)
	Pengulangan	1	0	Minta klien untuk mengulang kata berikut : “Tak ada jika, dan, atau, tetapi.” Bila benar, nilai satu poin. <input type="checkbox"/> Pernyataan benar 2 buah (contoh : tak ada, tetapi)

	Pemahaman	3	3	Minta klien untuk mengikuti perintah berikut yang terdiri dari 3 langkah : Ambil kertas di tangan anda, lipat dua, dan taruh di lantai.” <input type="checkbox"/> Ambil kertas di tangan anda <input type="checkbox"/> Lipat dua <input type="checkbox"/> Taruh di lantai
	Membaca	1	1	Perintahkan pada klien untuk hal Berikut (bila aktivitas sesuai perintah nilai 1 point) <input type="checkbox"/> “Tutup mata Anda”
	Menulis Menggambar	1	1	Perintahkan pada klien untuk menulis satu kalimat dan menyalingambar. <input type="checkbox"/> Tulis satu kalimat

		1	1	Perintahkan klien untuk menggambar, gambar dibawa ini : 
--	--	---	---	--

Interpretas hasil : skor 21 (aspek kognitif dari fungsi mental ringan)

26-30 : Aspek kognitif dan fungsi mental baik

21-25 : Aspek kognitif dari fungsi mental ringan

11-20 : Kerusakan aspek fungsi mental sedang

0-10 : Terdapat kerusakan aspek fungsi mental berat

PENGAJIAN KESEIMBANGAN

a) ialah dari dua komponen utama dalam bergerak, dari kedua komponen tersebut dibagi dalam beberapa gerakan yang perlu di observasi oleh perawat. Kedua komponen tersebut adalah:

- 1) Perubahan posisi atau gerakan keseimbangan

Beri nilai 0 jika klien tidak menunjukkan kondisi di bawah ini, dan 1 bila menunjukkan kondisi berikut ini.

- *Bangun dari tempat duduk (dimasukkan dalam analisis) dengan mata terbuka*

Tidak bangun dari tempat tidur dengan sekali gerakan, akan tetapi lansia mendorong tubuhnya ke atas dengan tangan atau bergerak ke bagian depan kursi terlebih dahulu, tidak stabil pada saat berdiri pertama kali : 1

- *Duduk ke kursi (dimasukkan ke dalam analisis) dengan mata terbuka*
Menjatuhkan diri ke kursi, tidak duduk di tengah kursi : 0
- *Bangun dari tempat duduk (dimasukkan ke dalam analisis) dengan mata tertutup* Tidak bangun dari tempat duduk dengan sekali gerakan, akan tetapi lansia mendorong tubuhnya ke atas dengan tangan atau bergerak ke bagian depan kursi terlebih dahulu, tidak stabil pada saat berdiri pertama kali : 0
- *Duduk ke kursi (dimasukkan ke dalam analisis) dengan mata tertutup*
Menjatuhkan diri ke kursi, tidak duduk ke tengah kursi
Keterangan : Kursi harus yang keras tanpa lengan : 0
- *Menahan dorongan pada sternum (Pemeriksa mendorong sternum sebanyak 3 kali dengan hati-hati) dengan mata terbuka*
Klien menggerakkan kaki, memegang objek untuk dukungan, kaki tidak menyentuh sisi-sisinya. : 0
- *Menahan dorongan pada sternum (pemeriksa mendorong sternum sebanyak 3 kali dengan hati-hati) dengan mata tertutup*
Klien menggerakkan kaki, memegang objek untuk dukungan, kaki tidak menyentuh sisi-sisinya. : 0
- *Perputaran leher (klien sambil berdiri)*
Menggerakkan kaki, menggenggam objek untuk dukungan kaki :
keluhan vertigo, pusing, atau keadaan tidak stabil : 0
Gerakan menggapai sesuatu
Tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi sepenuhnya sementara berdiri pada ujung-ujung jari kaki, tidak stabil memegang sesuatu untuk dukungan : 0
- *Membungkuk*

Tidak mampu membungkuk untuk mengambil objek-objek kecil (misalnya pulpen) dari lantai, memegang objek untuk bias berdiri lagi, dan memerlukan usaha-usahayang keras untuk bangun : 1

2) Komponen gaya berjalan atau pergerakan

Beri nilai 0 jika klien tidak menunjukkan kondisi di bawah ini, atau beri nilai 1 jika klien menunjukkan salah satu dari kondisi di bawah ini :

- *Minta klien untuk berjalan ke tempat yang ditentukan*

Ragu-ragu, tersandung, memegang objek untuk pegangan : 1

- *Ketinggian langkah kaki (mengangkat kaki saat melangkah)*

Kaki tidak naik dari lantai secara konsisten (menggeser atau menyeret kaki), mengangkat kaki terlalu tinggi (> 5 cm) : 0

- *Kontinuitas langkah kaki (lebih baik di observasi dari samping klien)*

Setelah langkah-langkah awal menjadi tidak konsisten, memulai mengangkat satu kaki sementara kaki yang lain menyentuh lantai : 1

- *Kesimetrisan langkah (lebih baik di observasi dari samping klien)*

Langkah tidak simetris, terutama pada bagian yang sakit : 1

- *Penyimpangan jalur pada saat berjalan (lebih baik di observasi dari samping kiri klien)*

Tidak berjalan dalam garis lurus, bergelombang dari sisi ke sisi : 0

- *Berbalik*

Berhenti sebelum mulai berbalik, jalan sempoyongan, bergoyang, memegang objek untuk dukungan. : 0

Interpretasi hasil :

Jumlahkan semua nilai yang diperoleh klien, kemudian diinterpretasikan sebagai berikut : 5 (resiko jatuh rendah)

0 – 5 resiko jatuh rendah

6 – 10 resiko jatuh sedang

11 – 15 resiko jatuh tinggi

Tabel 9.3

Waktu duduk dan berdiri klien

No	Langkah
1.	Posisi klien duduk di kursi
2.	Minta klien berdiri dari kursi, berjalan 10 langkah (3 meter), kembali ke kursi, ukur waktu dalam detik

Interpretasi : <10 detik

≤ 10 detik :

Resiko jatuh

rendah 11-19

detik : Resiko

jatuh sedang

20-29 detik :

Resiko jatuh

tinggi

≥ 30 detik : Gangguan mobilitas dan resiko jatuh tinggi

B. ANALISIS DATA (Tabel 10.3)

NO	DATA	ETIOLOGI	MASALAH
<p>1</p>	<p>Ds :</p> <p>1. Klien mengatakan kemampuan penglihatan sudah mulai berkurang/menurun dengan perlahan</p> <p>2. Klien sudah tidak dapat melihat dari jarak 1 meter dan kalupun melihat itu terkesan kabur</p> <p>3. Klien mengatakan lututnya biasa tiba-tiba bergerak sendiri dikarenakan penyakit yang diderita klien</p> <p>Do :</p> <p>1. Klien mengandalkan kursi untuk berpegangan</p> <p>2. Klien meraba-raba saat melihat orang atau gambar dari jarak 1 meter</p>	<p>Bola mata panjang</p> <p>↓</p> <p>Cahaya masuk melalui lensa depan retina</p> <p>↓</p> <p>Cahaya yang difokuskan tidak tepat di retina</p> <p>↓</p> <p>Pandangan kabur saat melihat</p> <p>↓</p> <p>Penurunan penglihatan</p> <p>Gangguan presepsi</p>	<p>Gangguan Presepsi Sensori</p>
<p>2.</p>	<p>Faktor Risiko</p> <p>1. Klien mengatakan matanya perlahan sudah kehilangan kemampuan melihatnya</p> <p>2. Klien merasa kabur</p>	<p>Usia</p> <p>↓</p> <p>Faktor penyakit</p> <p>↓</p> <p>Berkurangnya kemampuan sistem organ</p>	<p>Risiko Jatuh</p>

	melihat petugas yang berhadapan langsung di depannya	tubuh ↓ Berkurangnya kemampuan klien dalam melihat ↓ Resiko jatuh	
3	<p>Ds :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengatakan saat memeriksakan gula darahnya 3 bulan lalu sangat tinggi 470 2. Klien mengatakan jarang memeriksa kesehatan 3. Klien mengatakan jika merasa sakit hanya membeli obat warung saja <p>Do :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak bingung saat menjelaskan 2. Klien menunjukkan obat-obatnya yang ia simpan 3. Kadar gula darah klien tinggi 	<p>Kurangnya informasi</p> <p>↓</p> <p>Kebiasaan/perilaku yang tidak tepat</p> <p>↓</p> <p>Timbul masalah</p> <p>↓</p> <p>Tanda dan gejala muncul</p> <p>↓</p> <p>Klien tidak tahu tindakan apa yang dapat dilakukan</p> <p>↓</p> <p>Defisit pengetahuan</p>	Defisit pengetahuan

C. DIAGNOSA KEPERAWATAN (Tabel 11.3)

No	Diagnosa
1	Gangguan Presepsi Sensori
2	Risiko Jatuh

D. PENYIMPANGAN KDM


E. RENCANA KEPERAWATAN (Tabel 12.3)

No	Diagnosa	Kriteria evaluasi	Intervensi	Rasional
1	Gangguan Presepsi Sensori	Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x23 jam sensori persepsi penglihatan membaik dengan kriteria : 1. Ketajaman penglihatan meningkat 2. Konsetrasi orientasi membaik	<p>Terapi aktivitas</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi sumber daya untuk aktivitas yang diinginkan 2. Identifikasi strategi untuk maningkatkan partisipasi aktivitas 3. Identifikasi makna aktivitas rutin <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pemelihan aktivitas sesuai usia 2. Fasilitasi aktivitas fisik rutin 3. Libatkan keluarga dalam aktivitas <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jelaskan metode aktivitas sehari-hari jika perlu 2. Ajarkana cara melakukan aktivitas yang dipilih <p>Anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi jika sesuai</p>	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui aktivitas ayng diinginkan 2. Agar klien dapat berpartisipasi dalam aktivitas 3. Agar aktivitas klien dapat lebih bermakna <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menyesuaikan aktivitas dan usia 2. Untuk membantu aktivitas klien 3. Agar dapat membantu klien dalam melakukan aktivitas <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menambah informasi klien

2	<p>Risiko Jatuh</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam resiko jatuh pada klien menurun dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketajaman pendengaran meningkat 2. Ketajaman peglihatan meningkat <p>Persepsi posisi tubuh meingka</p>	<p>Pencegahan jatuh</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi faktor risiko jatuh (mis, usia, penurunan tingkat kesadaran, gangguan keseimbangan) 2. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan resiko jatuh 3. Hitung skala jatuh dengan menggunakan skor <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi ruang dan lingkungan pada keluarga 2. Pastikan roda tempat tidur telah terkunci 3. Pasang hendrall tempat tidur 4. Dekatkan bel pemanggil dalam jangkauan pasien 5. Latihan jalan tandem pada pasien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan berpindah 2. Anjurkan berkonsentrasi dengan 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui faktor jatu pada pasein 2. Untuk menjaga keamanan pasien 3. Untuk mengetahui tingkat jatuh pasien <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar pasien dan keluarga tahu posisi dan fungsi dari suatu ruangan 2. Memastikan agar tempat tidur tidak bergeser 3. Untuk menambah keamanan pasien saat berada diatas tempat tidur 4. Untuk memudahkan pasien meminta tolong saat terjadi sesuatu
---	---------------------	---	--	---

			<p>keseimbangan tubuh</p> <p>3. Anjurkan cara menggunakan bel pemanggil untuk memanggil perawat</p> <p>Ajarakan keluarga untuk melatih lansia</p>	<p>dikamar pasien</p> <p>5. Untuk melatih keseimbangan dan meminimalisir risiko jatuh pasien.</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Mengurangi risiko jatuh</p> <p>2. Untuk mengurangi risiko jatuh ada saat pasien berdiri atau ingin berpindah</p> <p>3. Untuk memudahkan pasien saat terjadi sesuatu dikamar pasien</p> <p>Agar keluarga dan pasien dapat lebih mandiri dalam meminimalisir risiko jatuh</p>
3	Defisit pengetahuan	Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam tingkat pengetahuan klien meningkat	<p>Edukasi kesehatan</p> <p>Observasi</p> <p>1. Identifikasi kesiapan dan</p>	<p>Observasi</p> <p>1. Untuk mengetahui kesiapan klien dalam</p>

		<p>dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menjelaskan tentang suatu topik meningkat 2. Perilaku sesuai anjuran meningkat 3. Persepsi yang keliru menurun 4. Perilaku membaik 	<p>kemampuan menerima informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan 2. Jadwalkan pendidikan sesuai kesepakatan 3. Berikan kesempatan untuk bertanya <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan 2. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat 	<p>menerima informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar informasi mudah terampaikan 2. Agar pasien tidak erasa diganggu waktunya 3. Agar klien dapat lebih interaktif <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar klien dapat mengetahui faktor risiko yang dapat memengaruhi 2. Untuk mengurangi raktor risiko yang mempengaruhi
--	--	---	---	--



		<p>usia dan kemampuannya</p> <p>2. Memfasilitasi aktivitas fisik rutin</p> <p>Klien : klien rutin melakukan senam kaki diabetik</p> <p>3. Melibatkan keluarga dalam aktivitas</p> <p>Hasil : keluarga klien sangat mendukung kegiatan yang dilakukan</p> <p>09:25 Edukasi</p> <p>1. Menjelaskan metode aktivitas sehari-hari jika perlu</p> <p>Hasil : klien mengetahui aktivitas sehari-hari yang dapat dilakukan</p> <p>2. Mengajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih</p> <p>Hasil : klien mengetahui cara melakukan aktivitas yang dipilih</p> <p>3. Menganjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi jika sesuai</p>	<p>Anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi jika sesuai</p>
--	--	--	---

		<p>2. Memastikan roda tempat tidur telah terkunci</p> <p>Hasil : karena pengaman tempat tidur rusak tempat tidur pasti selalu terkunci dan dijaga keamanannya</p> <p>3. Memasang hendrall tempat tidur</p> <p>Hasil : hendrall tempat tidur suda rusak maka hanya roda yang selalu di observasi agar selalu terkunci</p> <p>4. Melatih Klien dengan memasang garis lurus pada lantai dan menganjurkan klien berjalan di atasnya.</p> <p>10:20</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Menganjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan berpindah</p> <p>Hasil : jika memerlukan sesuatu keluarga pasien ke ruang perawat untuk memita bantuan</p> <p>2. Menganjurkan berkonsentrasi dengan keseimbangan tubuh</p>	<p>bantuan berpindah</p> <p>2. Anjurkan berkonsentrasi dengan keseimbangan tubuh</p> <p>3. Anjurkan cara menggunakan bel pemanggil untuk memanggil perawat</p> <p>4. Ajarakan keluarga untuk melatih lansia</p>
--	--	--	---

			<p>Hasil : pasien akan mencoba setelah sembuh</p> <p>3. Menganjurkan keluarga untuk melatih jalan tandem pada lansia</p> <p>Hasil : keluarga dapat mengerti cara melakukan latihan</p>	
27 mei 2021	D.0111	10:00	<p>Edukasi kesehatan</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi</p> <p>Hasil : klien mampu menerima informasi</p> <p>2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat</p> <p>Hasil : lingkungan klien banyak mempengaruhi</p>	<p>S : klien mengatakan dapat mengerti dengan penjelasan</p> <p>O : klien tampak masih bingung untuk mengimplementasikan</p> <p>A : masalah belum teratasi</p> <p>P : optimalkan intervensi</p> <p>Edukasi kesehatan</p> <p>Observasi</p> <p>1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi</p> <p>2. Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan</p> <p>2. Jadwalkan pendidikan sesuai kesepakatan</p> <p>3. Berikan kesempatan untuk bertanya</p> <p>Edukasi</p>
		10:15	<p>Terapeutik</p> <p>1. Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan</p> <p>Hasil : media akan disediakan</p>	

		10:45	<p>2. Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan</p> <p>Hasil : akan dilaksanakan pada pagi hari</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Menjelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan</p> <p>Hasil : klien mengerti tentang penjelasan klien</p> <p>2. Mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat</p> <p>Hasil : klien mengerti tentang hidup bersih dan sehat</p>	<p>1. Jelaskan faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan</p> <p>2. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat</p>
28 mei 2021	D.0143	11:00	<p>Terapi aktivitas</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi sumber daya untuk aktivitas yang diinginkan</p> <p>Hasil : klien sangat ingin beraktivitas dengan bebas</p> <p>2. Mengidentifikasi strategi untuk maningkatkan partisipasi aktivitas</p> <p>Hasil : klien sangat ingin</p>	<p>S : klien mengatakan penglihatannya kabur</p> <p>O : klien tampak menebak-nebak gambar atau irang dari jauh</p> <p>A : masalah belum teratasi</p> <p>P : optimalkan intervensi</p> <p>Terapi aktivitas</p> <p>Observasi</p> <p>1. Identifikasi sumber daya untuk aktivitas yang diinginkan</p>

		<p>berpartisipasi dalam kegiatan dan aktivitas</p> <p>3. Mengidentifikasi makna aktivitas rutin</p> <p>Hasil : klien sering berdzikir saat waktu luang</p> <p>11:10</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Mengkoordinasikan pemeliharaan aktivitas sesuai usia</p> <p>Hasil : klien beraktivitas sesuai usia dan kemampuannya</p> <p>2. Memfasilitasi aktivitas fisik rutin</p> <p>Klien : klien rutin melakukan senam kaki diabetik</p> <p>3. Melibatkan keluarga dalam aktivitas</p> <p>Hasil : keluarga klien sangat mendukung kegiatan yang dilakukan</p>	<p>2. Identifikasi strategi untuk meningkatkan partisipasi aktivitas</p> <p>3. Identifikasi makna aktivitas rutin</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Koordinasi pemeliharaan aktivitas sesuai usia</p> <p>2. Fasilitasi aktivitas fisik rutin</p> <p>3. Libatkan keluarga dalam aktivitas</p> <p>Edukasi</p> <p>1. jelaskan metode aktivitas sehari-hari jika perlu</p> <p>2. Ajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih</p> <p>3. Anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi jika sesuai</p>
		<p>11:20</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Menjelaskan metode aktivitas</p>	

			<p>sehari-hari jika perlu</p> <p>Hasil : klien mengetahui aktivitas sehari-hari yang dapat dilakukan</p> <p>2. Mengajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih</p> <p>Hasil : klien mengetahui cara melakukan aktivitas yang dipilih</p> <p>3. Menganjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi jika sesuai</p> <p>Hasil : klien sangat ingin terlibat dalam aktivitas di sekitar lingkungan tempat tinggal</p>	
28 mei 2021	D.0085	11:30	<p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi faktor risiko jatuh (mis, usia, penurunan tingkat kesadaran, gangguan keseimbangan)</p> <p>Hasil : pasien beresiko jatuh karena faktor gangguan keseimbangan</p> <p>2. Mengidentifikasi faktor</p>	<p>S : klien mengatakan sudah mengetahui cara untuk mencegah jatuh</p> <p>O : klien mengandalkan kursi untuk berpegangan</p> <p>A : masalah teratasi</p> <p>P : pertahankan intervensi</p> <p>Pencegahan jatuh</p> <p>Observasi</p> <p>1. Identifikasi faktor risiko jatuh (mis, usia, penurunan tingkat kesadaran, gangguan keseimbangan)</p>

		11:45	<p>lingkungan yang meningkatkan resiko jatuh</p> <p>Hasil : penyangga tempat tidur yang sudah rusak yang beresiko pasien jatuh</p> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengorientasi ruang dan lingkungan pada keluarga <p>Hasil : pasien mengenal lingkungan dengan baik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memastikan roda tempat tidur telah terkunci <p>Hasil : karena pengaman tempat tidur rusak tempat tidur pasti selalu terkunci dan dijaga keamanannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memasangkan hendrall tempat tidur <p>Hasil : hendrall tempat tidur sudah rusak maka hanya roda yang selalu di observasi agar selalu terkunci</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajarkan klien latihan jalan tandem dengan menempelkan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan resiko jatuh 3. Hitung skala jatuh dengan menggunakan skor <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi ruang dan lingkungan pada keluarga 2. Pastikan roda tempat tidur telah terkunci 3. Pasang hendrall tempat tidur 4. Dekatkan bel pemanggil dalam jangkauan pasien 5. Latihan jalan tandem pada pasien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan berpindah 2. Anjurkan berkonsentrasi dengan keseimbangan tubuh 3. Anjurkan cara menggunakan bel pemanggil untuk memanggil perawat 4. Ajarakan keluarga untuk melatih lansia
--	--	-------	---	--

		11:50	<p>garis lurus pada darah yang dapat dan menganjurkan klien berjalan di atas garis tersebut</p> <p>Hasil : klien dapat berjalan dengan baik dan menjaga keseimbangan</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Mengajarkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan berpindah</p> <p>Hasil : jika memerlukan sesuatu keluarga pasien ke ruang perawat untuk memita bantuan</p> <p>2. Mengajarkan berkonsetrasi dengan keseimbangan tubuh</p> <p>Hasil : pasien akan mencoba setelah sembuh</p> <p>3. Mengajarkan keluarga untuk melakukan jalan tandem pada lansia</p> <p>Hasil : keluarga mengerti dengan prosedur jalan tandem</p>	
28 mei	D.0111	12:00	Edukasi kesehatan	S : klien mengatakan sudah tahu lebih banyak tentang

2021			<p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi</p> <p>Hasil : klien mampu menerima informasi</p> <p>2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat</p> <p>Hasil : lingkungan klien banyak mempengaruhi</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan</p> <p>Hasil : media akan disediakan</p> <p>2. menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan</p> <p>Hasil : akan dilaksanakan pada pagi hari</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Menjelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan</p>	<p>kesehatan dan cara memelihara</p> <p>O : klien dapat menjelaskan dengan baik</p> <p>A : masalah teratasi</p> <p>P : pertahankn intervensi</p> <p>Edukasi kesehatan</p> <p>Observasi</p> <p>1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi</p> <p>2. Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan</p> <p>2. Jadwalkan pendidikan sesuai kesepakatan</p> <p>3. Berikan kesempatan untuk bertanya</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Jelaskan faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan</p> <p>2. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat</p>
		12:10		
		12:15		

			<p>Hasil : klien mengerti tentang penjelasan klien</p> <p>2. Mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat</p> <p>Hasil : klien mengerti tentang hidup bersih dan sehat</p>	
29 mei 2021	D.0085	10:00	<p>Terapi aktivitas</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi sumber daya untuk aktivitas yang diinginkan</p> <p>Hasil : klien sangat ingin beraktivitas dengan bebas</p> <p>2. Mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan partisipasi aktivitas</p> <p>Hasil : klien sangat ingin berpartisipasi dalam kegiatan dan aktivitas</p> <p>3. Mengidentifikasi makna aktivitas rutin</p> <p>Hasil : klien sering berdzikir saat waktu luang</p>	<p>S : klien mengatakan penglihatannya kabur</p> <p>O : klien tampak menebak-nebak gambar atau irang dari jauh</p> <p>A : masalah belum teratasi</p> <p>P : optimalkan intervensi</p> <p>Terapi aktivitas</p> <p>Observasi</p> <p>1. Identifikasi sumber daya untuk aktivitas yang diinginkan</p> <p>2. Identifikasi strategi untuk meningkatkan partisipasi aktivitas</p> <p>3. Identifikasi makna aktivitas rutin</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Koordinasi pemeliharaan aktivitas sesuai usia</p> <p>2. Fasilitasi aktivitas fisik rutin</p> <p>3. Libatkan keluarga dalam aktivitas</p>
		10:20	<p>Terapeutik</p>	


		<p>1. Mengkoordinasikan pemeliharaan aktivitas sesuai usia Hasil : klien beraktivitas sesuai usia dan kemampuannya</p> <p>2. Memfasilitasi aktivitas fisik rutin Klien : klien rutin melakukan senam kaki diabetik</p> <p>3. Melibatkan keluarga dalam aktivitas Hasil : keluarga klien sangat mendukung kegiatan yang dilakukan</p> <p>10:30 Edukasi</p> <p>1. Menjelaskan metode aktivitas sehari-hari jika perlu Hasil : klien mengetahui aktivitas sehari-hari yang dapat dilakukan</p> <p>2. Mengajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih Hasil : klien mengetahui cara melakukan aktivitas yang dipilih</p>	<p>Edukasi</p> <p>1. jelaskan metode aktivitas sehari-hari jika perlu</p> <p>2. Ajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih</p> <p>3. Anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi jika sesuai</p>
--	--	--	--


			<p>3. Menganjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi jika sesuai</p> <p>Hasil : klien sangat ingin terlibat dalam aktivitas di sekitar lingkungan tempat tinggal</p>	
29 mei 2021	D.0143	11:00	<p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi faktor risiko jatuh (mis, usia, penurunan tingkat kesadaran, gangguan keseimbangan)</p> <p>Hasil : pasien beresiko jatuh karena faktor gangguan keseimbangan</p> <p>2. Mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan resiko jatuh</p> <p>Hasil : penyangga tempat tidur yang sudah rusak yang beresiko pasien jatuh</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Mengorientasikan ruang dan</p>	<p>S : klien mengatakan sudah mengetahui cara untuk mencegah jatuh</p> <p>O : klien dapat menjelaskan dengan baik</p> <p>A : masalah teratasi</p> <p>P : pertahankan intervensi</p> <p>Pencegahan jatuh</p> <p>Observasi</p> <p>1. identifikasi faktor risiko jatuh (mis, usia, penurunan tingkat kesadaran, gangguan keseimbangan)</p> <p>2. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan resiko jatuh</p> <p>3. Hitung skala jatuh dengan menggunakan skor</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Orientasi ruang dan lingkungan pada keluarga</p> <p>2. Pastikan roda tempat tidur telah terkunci</p> <p>3. Pasang hendrall tempat tidur</p>
		11:10		

		<p>11:20</p>	<p>lingkungan pada keluarga</p> <p>Hasil : pasien mengenal lingkungan dengan baik</p> <p>2. Memastikan roda tempat tidur telah terkunci</p> <p>Hasil : karena pengaman tempat tidur rusak tempat tidur pasti selalu terkunci dan dijaga keamanannya</p> <p>3. Memasang hendrall tempat tidur</p> <p>Hasil : hendrall tempat tidur sudah rusak maka hanya roda yang selalu di observasi agar selalu terkunci</p> <p>4. Menganjurkan klien berlatih jalan tandem</p> <p>Hasil : klien dapat berjalan dengan baik dan menjaga keseimbangan</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Menganjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan berpindah</p> <p>Hasil : jika memerlukan sesuatu</p>	<p>4. Dekatkan bel pemanggil dalam jangkauan pasien</p> <p>5. Latihan jalan tandem pada pasien</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan berpindah</p> <p>2. Anjurkan berkonsentrasi dengan keseimbangan tubuh</p> <p>3. Anjurkan cara menggunakan bel pemanggil untuk memanggil perawat</p> <p>4. Ajarakan keluarga untuk melatih lansia</p>
--	--	--------------	--	---

			<p>keluarga pasien ke ruang perawat untuk memita bantuan</p> <p>2. Menganjurkan berkonsetrasi dengan keseimbangan tubuh</p> <p>Hasil : pasien akan mencoba setelah sembuh</p> <p>3. Mengajarkan keluarga tentang prosedur jalan tandem</p> <p>Hasil : keluarga dapat mengerti prosedur jalan tandem</p>	
29 mei 2021	D.0111	12:00	<p>Edukasi kesehatan</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi</p> <p>Hasil : klien mampu menerima informasi</p> <p>2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat</p> <p>Hasil : lingkungan klien banyak mempengaruhi</p>	<p>S : klien mengatakan sudah tahu lebih banyak tentang kesehatan dan cara memelihara</p> <p>O : klien dapat menjelaskan dengan baik</p> <p>A : masalah teratasi</p> <p>P : pertahankn intervensi</p> <p>Edukasi kesehatan</p> <p>Observasi</p> <p>1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi</p> <p>2. Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat</p> <p>Terapeutik</p>

		12:20	<p>Terapeutik</p> <p>1. Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan</p> <p>Hasil : media akan disediakan</p> <p>2. Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan</p> <p>Hasil : akan dilaksanakan pada pagi hari</p>	<p>1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan</p> <p>2. Jadwalkan pendidikan sesuai kesepakatan</p> <p>3. Berikan kesempatan untuk bertanya</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Jelaskan faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan</p> <p>2. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat</p>
		12:30	<p>Edukasi</p> <p>1. Menjelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan</p> <p>Hasil : klien mengerti tentang penjelasan klien</p> <p>2. Mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat</p> <p>Hasil : klien mengerti tentang hidup bersih dan sehat</p>	





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Kasus

Berdasarkan pada kasus ini pasien lansia dengan inisial 'R' di Kelurahan Samata dengan penyakit diabetes melitus yang dikarenakan kadar gula yang tinggi, faktor keturunan, dan makanan yang tidak direkomendasikan bagi penderita, setelah dilakukan pengkajian di dapatkan beberapa masalah keperawatan utama pada pasien yaitu diagnosa risiko jatuh dengan hasil pengkajian skala morse yaitu score 45 atau risiko jatuh rendah, klien memiliki penyakit lain selain diabetes yaitu asam urat dimana asam urat ini menyerang sistem persendian seorang dimana jika klien memakan makan yang dapat menyebabkan kadar asam urat naik maka klien sering merasakan nyeri pada daerah persendian seperti lutut dimana hal ini akan memperparah jatuh terjadi pada lansia, jatuh di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu sistem sensorik sistem sensorik yang berperan sebagai sistem penglihatan (visus) dan pendengaran, perubahan pada mata akan menimbulkan gangguan pendengaran dan pada telinga akan menimbulkan gangguan pendengaran, Sistem saraf pusat Penyakit pada susunan saraf pusat, seperti stroke dan parkinson, sering diderita oleh lanjut usia dan menyebabkan gangguan fungsi sistem sehingga tidak baik terhadap sensorik, Kognitif dimensia diasosiasikan dengan risiko jatuh pada lansia, Muskuloskeletal Faktor ini sangat berperan terhadap kejadian jatuh pada lansia. Gangguan muskuloskeletal menyebabkan gangguan gaya berjalan dan ini berhubungan dengan proses menua yang fisiologis, misalnya kekakuan jaringan penghubung, berkurangnya massa otot, perlambatan konduksi saraf dan lapang pandang dapat menyebabkan penurunan kualitas sendi.

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat jatuh pada lansia di Kelurahan Samata yaitu dengan menilai skala jatuh lansia dengan menggunakan skala morse atau morse fall scale dengan cara itu kita akan mengetahui tingkat atau risiko jatuh pada pasien lansia.

Pada pengkajian keluhan utama didapatkan Tn.R mengeluh pusing dikarenakan klien juga menderita hipertensi dan gula darah yang sering

tinggi, pusing dapat dikarenakan beberapa faktor seperti konsumsi kafein yang terlalu banyak hal ini yang dapat menjadi bahan perhatian bagi keluarga dan Tn.R dimana klien sangat kuat dalam minum kopi setiap hari klien pasti minum kopi di pagi ataupun siang hari dengan takaran gula yang tidak diatur hal ini pula yang dapat menaikkan kadar glukosa dalam darah klien

Diagnosa utama yang didapatkan pada pengkajian yaitu diagnosa risiko jatuh. Diagnosa risiko jatuh didapatkan pada hari pertama 26 Juni 2021 pengkajian dengan berdasarkan hasil observasi pada saat pengkajian dengan menggunakan format pengkajian skala jatuh morese dimana tampak klien saat ingin berdiri dari kursi memenggang kedua sudut kursi, klien juga tampak berjalan dengan sesekali memenggang pintu dan dinding untuk menjaga keseimbangan saat klien berjalan di mana didapatkan skala jatuh pada pasien yaitu 45 atau skala jatuh rendah dimana dapat terjadi risiko jatuh di kemudian hari seiring penurunan fungsi sistem tubuh karena faktor usia dan penyakit pada klien. Hal inipun sejalan dengan perjalanan hidup manusia dalam Q.S Gafir 40: 67 sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ
ثُمَّ لِيَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِيَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَآلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : “Dia-lah menciptakanmu dari tanah dan kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah kemudian dilahirkanlah kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa dewasa kemudian di biarkan kamu hidup lagi sampai tua diantara kamu ada yang diwakafkan sebelum itu (kapu perbuat demikian) supaya kamu sampai pada ajal yang telah ditentukan dan suoaaya kamu memahaminya”

B. Analisis Intervensi

Tindakan keperawatan yang diberikan pada diagnosa keperawatan risiko jatuh adalah pencegahan jatuh hal yang biasa dilakukan adalah memodifikasi lingkungan rumah seperti membuat lantai tidak licin, lantai yang rata, tidak ada barang-barang yang berserakan di lantai, pencahayaan yang cukup dan tidak menyilaukan serta mengurangi tangga yang ada di jalur lansia berjalan. Sekitar 24% lansia jatuh ditangga dan 36 % jatuh terjadi diluar (Kamel, Abdulmajeed & Ismail, 2013).

Berdasarkan kasus Tn.R ini beberapa intervensi telah dilakukan pada diagnosa utama telah dilakukan edukasi pencegahan jatuh adalah hal yang biasa dilakukan adalah memodifikasi lingkungan rumah seperti membuat lantai tidak licin, lantai yang rata, tidak ada barang-barang yang berserakan di lantai, pencahayaan yang cukup dan tidak menyilaukan serta mengurangi tangga yang ada di jalur lansia berjalan. Sekitar 24% lansia jatuh ditangga dan 36 % jatuh terjadi diluar (Kamel, Abdulmajeed & Ismail, 2013) , pencegahan risiko jatuh pada lansia dapat juga di modifikasi dengan memberikan pelatihan Jalan Tandem pada lansia jalan tandem merupakan tes dan juga latihan yang dilakukan dengan cara berjalan menentukan garis lurus dan posisi tumit dan jari kaki menyentuh lantai atau area yang datar sejauh 3-6 meter (Batson et.al,2009)

Jalan tandem juga merupakan salah satu cara untuk mempertahankan postur tubuh langkah demi langkah dan dibantu oleh kognisi dan kordinasi otot trunk, lumbal, pelvis, hip otot-otot perut hingga ankle (Buston et.al, 2009)

Dari beberapa intervensi yang telah diimplementasi yaitu intervensi pada diagnosa risiko jatuh dengan melakukan edukasi pencegahan jatuh dan menambahkan atau memodifikasi intervensi dengan melakukan latihan jalan tandem dimana dalam pemberian intervensi dan implementasi selama 3 hari pemberian di dapatkan hasil bahwa adanya pemahaman yang lebih terhadap risiko jatuh yang di dapatkan oleh lansia dan keluarga serta adanya perubahan dari cara berjalan klien setelah dilakukan intervensi jalan tandem dimana klien sudah tidak banyak meraba-raba dinding saat ingin berjalan dan klien dapat berjalan keluar rumah, latihan jalan tandem ini dapat terus klien latih dengan tujuan untuk menguatkan kembali otot klien khususnya pada ekstremitas bawah dan untuk meminimalisir risiko jatuh pada klien serta klien dapat

melakukan pencegahan jatuh dengan memodifikasi lingkungan seperti menambah pencahayaan di dalam rumah, memakai alat bantu berjalan jika diperlukan dan mengepel lantai jika lansia merasa licin agar risiko jatuh dapat berkurang.

Latihan jalan tandem ada manfaat yang diperoleh sama dengan latihan balance strategy hanya saja latihan jalan tandem ini memiliki kelebihan yaitu dapat meningkatkan integrasi sensoris (vision, vestibular, somatosensoris) serta berpengaruh terhadap perbaikan sistem kognitif (Nugrahani, 2014). Oleh karena itu, latihan jalan tandem lebih efektif dalam meningkatkan keseimbangan.

Peningkatan keseimbangan pada jalan tandem dilakukan dengan meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan berupa peningkatan integrasi sensoris, sistem muskuloskeletal, serta perbaikan kontrol postural. Pada saat melakukan jalan tandem lansia melakukan jalan dengan melihat ke depan hal itu akan mengaktifkan *vestibule-ocular reflex* dan gerakan berjalan akan menimbulkan eksitasi pada *apparatus vestibular* dan memberikan tambahan informasi pada somatosensoris tubuh sehingga tercapailah konsep integrasi sensori dalam hal menjaga keseimbangan yaitu: visual, vestibular, dan somatosensori termasuk proprioseptif.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Gaur (2012) yang meneliti efek dari *walking exercise* terhadap keseimbangan didapatkan hasil bahwa latihan berjalan dapat meningkatkan integrasi sensori yang berdampak pada keseimbangan.¹⁸ Peningkatan kontrol dinamik pada latihan ini berkaitan dengan *gait and locomotion*. Lansia mengalami peningkatan perubahan posisi ketika berjalan dengan landasan tumpu yang lebih lebar, fase menumpu yang berlangsung singkat oleh adanya kekuatan otot yang menurun, serta fase mengayun yang memendek.

Kontrol dinamik didapatkan dengan mengaktifkan dan meningkatkan kekuatan otot-otot yang digunakan saat melangkah. Selain peningkatan kekuatan otot, latihan ini juga dapat memperbaiki koordinasi lansia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani (2014) yang mengatakan bahwa koordinasi lansia akan meningkat karena latihan ini mengharuskan lansia berjalan sesuai dengan garis serta jari kaki harus berada di belakang tumit kaki lainnya dan mengontrol postur tubuh langkah demi

langkah yang dilakukan dengan bantuan kognisi dan koordinasi otot *trunk, lumbar spine, pelvic, hip*, otot-otot perut hingga *ankle*.

Adapun firman Allah SWT tentang Al-Quran, “katakanlah, Al-quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman” (Fushilat : 44). yang dimaksud penawar yaitu penawar spiritual bukan material ataupun fisik, penyembuhan akan dari kesesatan, penyembuhan hati dari kebutaan karena itu Allah berfirman di ayat ini :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

Ayat ini menjelaskan bahwa penyembuhan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada atau penyembuhan spiritual yang membawahkan hidayah bagi orang-orang yang sesat dan cahaya bagi orang-orang yang bingung

C. Alternatif Pemecahan Masalah

Adapun intervensi alternatif intervensi lainnya yang dapat dilakukan selain jalan tandem yaitu *Cawthorne-Cooksey* atau dikenal dengan terapi kepala *Cawthorne*, merupakan Gerkin, 2005). Latihan ini bentuk pada latihan keseimbangan pada lansia dalam penelitian (Umi Budi & Itoh, 2006, Danar,2015). Keselamatan adalah normal.

Latihan *Cawthorne-cooksey* menurut (Shahanawaz, 2015) dalam jurnal yang berjudul *Effect Of Vestibular Rehabilitation In Improving Daily Life Functions In Elderly* didapatkan bahwa efektifitas latihan ini sudah signifikan pada 2 minggu dilakukannya penelitian. Berdasarkan hasil analisis statistik studi ini menemukan bahwa program latihan sederhana rehabilitasi vestibular yang melibatkan gerakan kepala latihan dengan latihan stabilitas postural, efektif dalam meningkatkan kemandirian saat melakukan aktivitas sehari-hari.

Tidak dipungkiri ada juga mereka yang kurang beruntung di hari tuanya. Di saat badan sudah rentan mereka masih harus bekerja keras memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencari sesuap nasi, mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukan ibadah, berdzikir, bertasbih, membaca

Al-Qur'an dan mengerjakan solat sunah lainnya. Hari-hari mereka habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah letih merekapun tidur. Ada pula yang hari-harinya dihabiskan hanya ditempat tidur karena menderita sakit menahun yang tak kunjung sembuh. Sebagaimana yang bisa kita temui dalam firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah 62 ayat 8 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu dikembalikan kepadanya Allah SWT yang mengetahui yang Gaib dan yang nyata lalu dia berikan kepadamu apa yang kamu kerjakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian kasus lansia Tn.R dapat disimpulkan bahwa :

1. Asuhan keperawatan yang telah penulis buat terdapat beberapa diagnosa yang muncul pada lansia dengan diagnosa utama yaitu risiko jatuh pada lansia berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya risiko jatuh pada lansia diantaranya disebabkan oleh resiko penyakit yang diderita dimana pada pengkajian pasien mengatakan menderita asam urat yang sudah lama diderita dan jarang mengontrol kesehatan ke fasilitas kesehatan karena kendala ekonomi dimana klien mengatakan saat asam urat persendiannya khususnya lutut menjadi nyeri dan sakit saat berjalan hal inilah yang menjadi bahan perhatian dalam menetapkan diagnosa dan intervensi serta melihat data yang lain pada pasien tidak hanya faktor penyakit yang menyebabkan risiko jatuh, risiko jatuh terjadi dikarenakan sistem pada tubuh juga menurun seiring dengan pertambahan usia seperti sistem sensorik sistem sensorik yang berperan sebagai sistem penglihatan dan pendengaran, perubahan pada mata akan menimbulkan gangguan pendengaran dan pada telinga akan menimbulkan gangguan pendengaran, Sistem saraf pusat penyakit pada susunan saraf pusat, seperti stroke dan parkinson, sering diderita oleh lanjut usia dan menyebabkan gangguan fungsi sistem sehingga tidak baik terhadap sensorik, Kognitif dimensia diasosiasikan dengan risiko jatuh pada lansia, Muskuloskeletal Ffaktor ini sangat berperan terhadap kejadian jatuh pada lansia.

Gangguan muskuloskeletal menyebabkan gangguan gaya berjalan dan ini berhubungan dengan proses menua yang fisiologis, misalnya kekakuan jaringan penghubung, berkurangnya massa otot, perlambatan konduksi saraf dan lapang pandang dapat menyebabkan penurunan kualitas sendi.

2. Intervensi yang dilakukan dalam penanganan pasien dengan risiko jatuh ada beberapa diantaranya yaitu pencegahan jatuh dengan memodifikasi lingkungan rumah klien misalnya menambah pencahayaan di dalam rumah, memakai alat bantu jalan bila perlu pada lansia dan mengepel atau mengeringkan lantai yang basah yang dapat mengakibatkan risiko jatuh pada lansia, serta menambahkan intervensi yaitu latihan jalan tandem dengan menempelkan garis lurus pada area yang datar dan menganjurkan lansia berjalan di atasnya hal ini dilakukan untuk mengetes tingkat keseimbangan lansia
3. Implementasi dan evaluasi yang dilakukan pada kasus ini yaitu melakukan intervensi edukasi pencegahan jatuh serta mengajarkan klien untuk melakukan latihan jalan tandem untuk melatih kekuatan otot dan untuk meminimalisir risiko jatuh pada lansia dimana lansia dan keluarga lebih mengerti dan mendapatkan lebih informasi tentang pencegahan jatuh dan latihan jalan tandem dimana intervensi ini dapat dilakukan sehari-hari oleh lansia.

B. Saran

Saran untuk asuhan keperawatan pada lansia dan keluarga selanjutnya yaitu agar lansia dan keluarga untuk selalu menjaga kesehatan dan mengontrol kesehatan di fasilitas kesehatan agar lebih mengetahui status kesehatan dan untuk layanan kesehatan agar lebih memfasilitasi lansia seperti lebih banyak mengadakan posyandu lansia lagi dimana hal tersebut dapat menjadi wadah bagi lansia untuk melihat status kesehatan dan untuk fasilitas kesehatan untuk dapat mengadakan senam untuk lansia dimana dapat melatih tubuh lansia agar lebih sehat dan bugas serta dapat menguatkan otot-otot sendi lansia dimana ini sejalan dengan kasus di atas dengan melakukan senam dan berlatih risiko jatuh pada lansia dapat diminimalisir dan untuk perkembangan teori pada keperawatan gerontik untuk bisa diperbanyak lagi dalam hal teori pada buku dan artikel terupdate agar lansia dan keluarga juga dapat lebih mengetahui tren perawatan gerontik yang terbaru, dan untuk keluarga lansia untuk lebih banyak mencari informasi tentang lansia agar keluarga juga dapat mengetahui lebih banyak informasi mengenai lansia.

DAFTAR PUSTAKA

- Appley, G.A & Solomon, Louis. 2013. Ortopedi dan Fraktur Sistem Apley. Jakarta: Widya Medika, Hal 238 – 284.
- Center for Disease Control and Prevention (CDC): Osteoarthritis. <http://www.cdc.gov/arthritis/basics/osteoarthritis.html>. (diakses pada tanggal 1 November 2014)
- Depkes, R.I. 2012. Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir. <http://www.gizikia.depkes.go.id/artikel/upaya-percepatan-penurunan-angka-kematian-ibu-dan-bayi-baru-lahir-di-indonesia/>. Diakses tanggal 7 Oktober 2014
- Depkes RI, 2005; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2005 Tentang Kesehatan; Jakarta; Hal 1. Fisioterapi Indonesia; Jakarta; Hal.5.
- Iswan, R., & Oktaviana, S. (2012). Pengetahuan Dan Sikap Keluarga Tentang Pencegahan Kejadian Jatuh Pada Lansia Di Kelurahan Pahlawan Binjai . 51 56.
- Kane RL, Ouslander JG, Abrass IB, Resnick B. 2008. Essentials of clinical geriatrics. 6th ed. New York, NY: McGraw-Hill.
- Källstrand-, J. (2016). History of falling and visual ability among independently living elderly in Sweden. *Clinical Ophthalmology*, 10, 1265–1273.
- Kamel, M.H., Abdul majeed & Ismail, S. E. (2013). Risk Factors Of Falls Among Elderly Living in Urban Suez-Egypt. *The Pan African Medical Journal*, . di akses 22 Maret 2016.
- Maryam, Siti dkk. (2010). *Asuhan Keperawatan Pada Lansia*. Jakarta : Trans Info Medika
- Maryam, Siti. 2008. “Menengenal Usia Lanjut dan Perawatannya”. Jakarta: Salemba Medika
- Martono H. Pranarka K. (2011). *Buku Ajar Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut)*. Ed-4. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Miller, K. 2009, *Organizational Communication: Approaches and*
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books
- Nugroho. (2012). *Keperawatan gerontik & geriatrik*, edisi 3. Jakarta : EGC
- Nugroho. 2006 *Komunikasi dalam keperawatan gerontik*. Jakarta. EGC

- Renaud, J., & Bédard, E. (2013). Depression in the elderly with visual impairment and its association with quality of life. *Clinical Interventions in Aging*, 8, 931–943. <https://doi.org/10.2147/CIA.S27717>
- Stanley M, Patricia GB. 2006 . Buku Ajar Keperawatan Gerontik . Jakarta : EGC
- Rosdahl, Caroline Bunker & Mary T. Kowalski. (2012). Buku Keperawatan Dasar; alih bahasa Setiawan dan Anastasia Onny.-Ed.10-. Jakarta: EGC
- Sitepu, B.P., 2014. Pengembangan Sumber Belajar. Jakarta : Rajawali Press
- Septiningsih, D. S., & Naimah, T. (2012). Kesepian pada lanjut usia: Studi tentang bentuk, faktor pencetus dan strategi koping. *Jurnal Psikologi* , 6-7.
- Stanley M, Patricia GB. 2006 . Buku Ajar Keperawatan Gerontik . Jakarta : EGC
- Utami ER. Antibiotika, Resistensi, Dan Rasionalitas Terapi. 2017;1(4):191.
- World Health Organization (WHO). 2007. Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases: a comprehensive approach
- WHO. World Health Statistic Report 2015. Geneva: World Health Organization; 2015.




RIWAYAT HIDUP



NUR FITRIANI, Lahir di Kota Makassar pada tanggal 23 September 1997. Anak Kedua dari dua bersaudara pasangan Alm. Imran Ibrahim dan Sitti Maryam saat ini peneliti bertempat tinggal di Jl. Baji Pamai 5 No.18A Makassar. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Cendrawasih pada tahun 2009. Pada tahun selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah menengah pertama (SMP) negeri 27 Makassar dan tamat pada tahun 2012, pada tahun 2012 peneliti melanjutkan pendidikan menengah kejuruan di Sekolah menengah kejuruan (SMK) Kesehatan Plus Prima Mandiri Sejahtera Makassar dan tamat pada tahun 2015 dan kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada Program Studi Keperawatan kemudian Peneliti menyelesaikan kuliah strata 1 (S1) pada tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan Profesi Ners di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) dan dinyatakan lulus dalam ujian munaqayah pada 16 Juli 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R