

**INTERVENSI *TEPID WATER SPONGE* PADA ANAK YANG
MENGALAMI DHF DENGAN MASALAH HIPERTERMI
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Ners Jurusan Ilmu Keperawatan Pada
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RESKI MATTE, S. Kep

NIM: 70900119028

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reski Matte, S. Kep
NIM : 70900119028
Tempat/Tgl, Lahir : Bulueng, 16 April 1996
Jurusan : Profesi Ners
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Romangpolong, Pondok Al-Hafid
Judul : Intervensi *Tepid Water Sponge* Pada Anak Yang Mengalami DHF Dengan Masalah Hipertermi Di RSUD Labuang Baji Makassar

Dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tugas akhir ini benar adalah hasil karya tulis ilmiah penyusunan sendiri. Jika di kemudian hari tugas akhir ini adalah duplikat, plagiat, tiruan dari hasil kerja orang lain, maka karya tulis dan gelar yang diperoleh tidak sah/batal dimata hukum.

Makassar, 13 Juli 2021

Penyusun



RESKI MATTE, S. Kep
NIM:70900119028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Nama: Reski Matte S.Kep NIM: 70900119028, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Intervensi *Tepid Water Sponge* Pada Anak Yang Mengalami DHF Dengan Masalah Hipertermi Di RSUD Labuang Baji Makassar”, memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 13 Juli 2021

Menyetujui,



Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes
Pembimbing I







Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes
Pembimbing II

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS


Tugas Akhir Ners yang berjudul "Intervensi Edukasi *Brisk Walking Exercise* Pada Keluarga terhadap Perubahan Tekanan Darah dengan Masalah Hipertensi" yang disusun oleh Muhammad Awaluddin, S.Kep., NIM : 70900119027, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 16 Juli 2021 M, bertepatan dengan 6 Dzul Hijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan)

Gowa, 16 Juli 2021 M
6 Dzul Hijjah 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M. Kes	()
Sekretaris	: Dr. Patima, S. Kep., Ns., M. Kep	()
Munaqisy I	: Eka Harrayani, S. Kep. Ns., M. Kep	()
Munaqisy II	: Dr. Muhaemin, S. Ag., M. Th., I. M. Ed	()
Pembimbing I	: Ani Auli Ilmi, S. Kep., Ns., M. Kep., Sp. Kep. Kom	()
Pembimbing II	: Rasdiyana, S. Kep., Ns., M. Kep., Sp. Kep. Kom	()

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M. Kes
NIP: 198007012006042002



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt., atas rahmat dan hidayah-Nya yang masih tercurah kepada penulis, sehingga Tugas Akhir yang berjudul “Intervensi *Tepid Water Sponge* Pada Anak Yang Mengalami DHF Dengan Masalah Hipertermi Di RSUD Labuang Baji Makassar” dapat terselesaikan, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang sampai sekarang ini.

1. Dalam penyusunan tugas akhir ners ini, penyusun telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua ku yang tercinta, terkasih, tersayang serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai cita Ayahanda **Matte** & Ibunda **Saribulan** atas kasih sayang, bimbingan, dukungan, motivasi serta doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini. Untuk segenap keluarga besar khususnya saudara kandung **Kasmawati** dan **Aldy Syahputra** yang telah memberikan kasih sayang, arahan, serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi. Kepada istri saya **Lastri Ani Wahyuni** yang selalu menyempatkan waktu dan siap membantu penulis dalam keadaan apapun untuk proses penyelesaian tugas akhir ners, sehingga semangat penulis tak pernah surut.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Arbianingsi, S.Kep, Ns, M.Kes** selaku Pembimbing I dan ibu **Huriati, S.Kep, Ns, M.Kes** selaku Pembimbing II yang dengan sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun tugas akhir. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tak lupa pula saya sampaikan kepada Ibu **Dr. Nur Hidayah. S.Kep.,Ns., M.Kes** selaku Penguji I dan Bapak **Dr. Aisyah Arsyad. S.**


Ag. M.A selaku Penguji II yang telah memberi masukan berupa saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

2. Rektor UIN Alauddin Makassar **Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D** beserta seluruh jajarannya.
3. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar **Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes** para wakil dekan, dan seluruh staf akademik yang memberikan bantuan kepada penyusun selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ketua Prodi Profesi Ners Ibu **Dr. Patimah. S.Kep.,Ns., M. Kes** dan Ibu **Hj Sisnawati, S.Kep.,Ns., M.Kep Sp. Kep.J** sebagai Sekretaris Prodi Profesi Ners
5. Profesi Ners serta dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Profesi Ners yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Profesi Ners Angkatan XVI atas kebersamaannya bergandengan tangan saling merangkul satu sama lain, baik suka maupun duka dalam proses menggapai cita.
7. Penulis mengharap tugas ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktis kesehatan. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Gowa, 14 Juli 2021



Reski Matte, S.Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	iv
Daftar Isi	viii
Halaman Abstrak (Indonesia)	ix
Halaman Abstrak (Inggris)	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.....	5
D. Manfaat	6
BAB II TINJAUAN TEORI	7
A. Konsep Teori.....	7
B. Konsep Keperawatan	13
C. <i>Evidence Based Nursing</i> (EBN)	31
BAB III LAPORAN KASUS	34
A. Pengkajian	34
B. Analisa Data	56
C. Diagnosa Keperawatan	58
D. Intervensi Keperawatan.....	59
E. Implementasi Keperawatan	64
F. Evaluasi	77
BAB IV PEMBAHASAN	90
A. Analisis Kasus	90
B. Analisis Intervensi	92
C. Alternatif Pemecahan Masalah	83
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	96
B. Saran- saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
Lampiran 1 : Daftar Riwayat.....	99
Lampiran 2 : Jurnal Rujukan Utama.....	100
Lampiran 3 : Patway Hidup.....	101

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Identitas Saudarah Kandung	46
Tabel 3.2 Riwayat Imunisasi	47
Tabel 3.3 Pola Perubahan Nutrisi Tiap Tahap Usia Nutrisi Saat Ini	49
Tabel 3.4 Nutrisi	50
Tabel 3.5 Cairan	51
Tabel 3.6 Eliminasi	52
Tabel 3.7 Istirahat Tidur	52
Tabel 3.8 Olahraga	52
Tabel 3.9 Personal Hyigine	52
Tabel 3.10 Aktivitas	53
Tabel 3.11 Rekreasi	53
Tabel 3.12 Laboratorium	58
Tabel 3.13 Data Fokus	63
Tabel 3.14 Analisa Data	63
Tabel 3.15 Diagnosa Keperawatan.....	66
Tabel 3.16 Rencana Tindakan Keperawatan	67
Tabel 3.17 Implementasi Keperawatan.....	70
Tabel 3.18 Evaluasi Keperawatan	80

ABSTRAK

Nama : Reski Matte S.Kep

NIM : 70900119028

Judul : Intervensi *Tepid Water Sponge* Pada Anak Yang Mengalami DHF Dengan Masalah Hipertermi Di RSUD Labuang Baji Makassar

Latar Belakang: Menurut World Health Organization, (2015) memperkirakan bahwa 2,5 milyar atau 40% populasi didunia berisiko terhadap penyakit *Dengue Hemorrhagic Fever terutama* yang tinggal di daerah perkotaan di negara tropis dan subtropis. Saat ini juga diperkirakan ada 390 juta infeksi *dengue* yang terjadi diseluruh dunia setiap tahun. *Dengue Hemorrhagic Fever* adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti* yang ditandai berupa demam tinggi yang tiba-tiba kurang lebih dua sampai tujuh hari. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan dalam menurunkan demam dan mengurangi peningkatan suhu tubuh secara mendadak adalah mealakukan kompres hangat dengan metode *tepid water sponge* **Tujuan:** Penulisan adalah melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami *dengue hemorrhagic fever* dengan masalah hipertermi di ruang Baji Minasa dengan menggunakan terapi tepid water sponge **Metode:** Yang digunakan adalah study kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan pendokumentasian. Pelaksanaan *tepid water sponge* dilakukan selama pasien mengalami hipertermi dan dihentikan ketika suhu tubuh menurun. **Hasil:** Analisis data menunjukkan beberapa diagnosis yaitu hipertermi, Nyeri akut, Resiko deficit nutrisi dan Resiko perdarahan. Pemberian terapi *tepid water sponge* adalah salah satu intervensi yang bisa digunakan dalam menurunkan suhu tubuh. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil evaluasi kasus yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa penerapan terapi *tepid water sponge* yang dilakukan selama klien mengalami hipertermi efektif dilakukan dalam menurunkan suhu tubuh pasien

Kata Kunci : *Dengue Hemorrhagic Fever*, Hipertermi, *Tepid Water Sponge*

ABSTRACT

Name : Reski Matte S.Kep

ID Number : 70900119028

Title : *Intervention of Tepid Water Sponge in Children with DHF with Hyperthermia Problems At the Labuang Baji Makassar*

Background: According to the World Health Organization, (2015) estimates that 2.5 billion or 40% of the world's population is at risk of Dengue Hemorrhagic Fever, especially those living in urban areas in tropical and subtropical countries. It is also currently estimated that there are 390 million dengue infections that occur worldwide each year. Dengue Hemorrhagic Fever is a disease transmitted by the *Aedes Aegypti* mosquito which is characterized by a sudden high fever of approximately two to seven days. One of the interventions that can be done to reduce fever and reduce the sudden increase in body temperature is to apply warm compresses with the tepid water sponge method. **Purpose:** The writing is to carry out nursing care for patients who have dengue hemorrhagic fever with hyperthermia problems in the Baji Minasa room by using tepid therapy. water sponge **Method:** The method used is a case study with data collection techniques through interviews, observation, physical examination and documentation. The implementation of the tepid water sponge was carried out while the patient was hyperthermic and stopped when the body temperature decreased. **Results:** Data analysis showed several diagnoses, namely hyperthermia, acute pain, risk of nutritional deficit and risk of bleeding. The provision of tepid water sponge therapy is one of the interventions that can be used to reduce body temperature. **Conclusion:** Based on the results of the case evaluation, it was concluded that the application of tepid water sponge therapy carried out while the client was experiencing hyperthermia was effective in reducing the patient's body temperature.

Keywords: *Dengue Hemorrhagic Fever, Hypertermi, Tepid Water Sponge*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengue Haemorrhagic Fever merupakan penyakit yang disebabkan karena infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti*. Penyakit ini dapat menyerang semua orang dan dapat mengakibatkan kematian, terutama pada anak serta menimbulkan wabah. Jika nyamuk *Aedes Aegypti* menggigit orang dengan demam berdarah maka virus *dengue* masuk kedalam tubuh nyamuk bersama darah yang dihisapnya. Di dalam tubuh nyamuk virus berkembang biak ke seluruh tubuh nyamuk dan sebagian besar berada di kelenjar liur. Selanjutnya waktu nyamuk menggigit orang lain, air liur bersama virus dengue dilepaskan terlebih dahulu agar darah yang akan dihisap membeku dan pada saat inilah virus dengue ditularkan ke orang lain (Soegijanto, 2013).

Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. DBD pertama kali diketahui pada tahun 1950an namun, pada tahun 1975 hingga sekarang merupakan penyebab kematian utama pada anak-anak di negara-negara Asia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa 2,5 milyar atau 40% populasi di dunia berisiko terhadap penyakit DBD terutama yang tinggal di daerah perkotaan di negara tropis dan subtropis. Saat ini juga diperkirakan ada 390 juta infeksi *dengue* yang terjadi diseluruh dunia setiap tahun (WHO, 2015).

Di Indonesia sendiri, demam berdarah dengue pertama kali ditemukan di Surabaya dan Jakarta tahun 1968, dimana sebanyak 58 orang terinfeksi dan 24 orang diantaranya meninggal dunia, dengan angka kematian mencapai 41.3%. Berdasarkan data profil kesehatan Indonesia pada tahun 2017 terdapat 68.407 kasus kesakitan demam berdarah dengan jumlah kematian sebanyak 493 orang, sedangkan jumlah kasus tahun 2016 terdapat 204.171 kasus kesakitan dengan jumlah kematian sebanyak 1.598 orang. Angka kesakitan atau *Incedence Rate* DBD tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu 78,85 per 100.000 penduduk menjadi 26,10 per 100.000 penduduk (Kemenkes, 2017).

Sedangkan di tingkat Provinsi di Indonesia dengan IR (Incidence Rate) tinggi adalah Sulawesi Selatan (62,57%), Kalimantan Barat (52,61%), dan Bali (49,93%). Provinsi Jawa Timur berada di urutan no-6 dengan IR (Incidence Rate) (43,14%). Tercatat pada tahun 2017 sebanyak 7.854 kasus dengan jumlah pasien meninggal 105 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 9.087 kasus dengan korban 93 orang (Kemenkes, 2018).

Fenomena yang penulis temukan ketika praktik klinik bulan april 2021 di RSUD Labuang baji Makassar, Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan saat dinas di RSUD Labuang baji Makassar dari 17 bed yang tersedia ada 10 klien dan 2 diantaranya adalah pasien dengan *dengue hemorrhagic fever* salah satunya pasien anak usia 13 tahun dengan diagnosa medis DHF. Saat dilakukan pengkajian didapatkan bahwa An.Z demam naik turun selama 4 hari dengan hasil pemeriksaan di dapatkan suhu tubuh 38,9 °C, nyeri kepala, mual muntah sebanyak 1 kali,

tampak bintik – bintik pada kedua tangannya tambahkan di do data focus aske hasil pemeriksaan penunjang didapatkan hasil trombosit $91 \cdot 10^3/uL$. Sehingga di diagnosa DHF oleh dokter dan harus dirawat di rumah sakit.

Masalah utama yang sering dialami oleh penderita *dengue haemorrhagic fever* (DHF) yaitu hipertermia. Hipertermia itu sendiri merupakan peningkatan suhu tubuh yang berhubungan dengan ketidak mampuan tubuh untuk menghilangkan panas ataupun produksi panas. Hipertermi terjadi karena adanya ketidak mampuan mekanisme kehilangan panas untuk mengimbangi produksi panas yang berlebihan sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh (Kahinedan, 2017). Akibat dari suhu tubuh yang mengalami kenaikan dapat mengakibatkan gangguan metabolisme otak, keseimbangan sel otak menjadi terganggu, Gangguan keseimbangan sel otak bisa mengakibatkan otak menjadi kaku sehingga mengakibatkan kejang demam (Primisasiki, 2013).

Tindakan keperawatan yang dapat dilakukan untuk menangani hal diatas dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan dimana didalamnya terdapat rangkaian tindakan berdasarkan *Evident Based Nursing* yang telah terbukti mampu menangani masalah pasien yakni melalui tindakan observasi, mandiri, edukasi maupun kolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya (Perry 2012).

Tindakan mandiri merupakan rangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh perawat dalam rangka mengatasi masalah pasien dan berdasarkan aspek legal etis mendapatkan perlindungan berdasarkan perundang – undangan.Salah satu

tindakan mandiri dalam menurunkan suhu tubuh secara nonfarmakologis dapat dilakukan dengan cara *tepid water sponge*. Dimana *tepid water sponge* merupakan suatu kompres sponging dengan air hangat. Penggunaan kompres air hangat ini diterapkan di lipatan ketiak dan lipatan selangkangan (*inguinal*) selama 10-15 menit akan membantu menurunkan panas dengan cara panas keluar lewat pori-pori kulit melalui proses penguapan, dimana penanganan dengan metode ini bisa disatukan dengan pemberian obat penurun panas untuk menurunkan pusat pengatur suhu di susunan saraf otak bagian hypothalamus, kemudian dilanjutkan dengan tepid sponge ini. (Hidayati. 2014)

Dalam penelitian (Risfaldi, 2020) efektivitas pemberian kompres *tepid water sponge* dan pemberian kompres bawang merah terhadap penurunan suhu tubuh anak dengan demam mengatakan bahwa terdapat perbedaan penurunan suhu tubuh menggunakan terapi *tepid water sponge* dengan terapi bawang merah, dimana tingkat penurunan suhu pada *tepid water sponge* lebih efektif dibandingkan dengan terapi bawang merah.

Menurut (Putri, 2020) pemberian *tepid water sponge* lebih efektif dalam menurunkan suhu tubuh anak dengan demam dibandingkan dengan kompres air hangat. Hal ini disebabkan adanya seka pada teknik tersebut akan mempercepat vasodilatasi pembuluh darah kapiler di sekujur tubuh sehingga evaporasi panas dari kulit ke lingkungan sekitar akan lebih cepat dibandingkan hasil yang diberikan oleh kompres air hangat yang hanya mengandalkan reaksi dari stimulasi hipotalamus.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan Intervensi *Tepid Water Sponge* Pada Pasien *Dengue Hemorrhagic Fever* (DHF) Dengan Masalah Hipertermi di Ruang Baji Minasa RSUD Labuang Baji Makassar

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka rumusan masalah pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah Bagaimana Pelaksanaan intervensi *tepid water sponge* pada asuhan keperawatan pasien dengue hemorrhagic fever (DHF) dengan masalah hipertermi ?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pemberian intervensi *tepid water sponge* dalam asuhan keperawatan pada klien yang mengalami *dengue hemorrhagic fever* (DHF dengan masalah hipertermi di Ruangan Baji Minasa RSUD Labung Baji Makassar Pada Tahun 2021

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk Mengetahui gambaran hasil pengkajian pada pasien dengan *dengue hemorrhagic fever* (DHF)
- b) Untuk Mengetahui diagnosa keperawatan pada pasien dengan *dengue hemorrhagic fever* (DHF)
- c) Untuk Mengetahui intervensi keperawatan pada pasien dengan *dengue hemorrhagic fever* (DHF)

- d) Untuk mengetahui implementasi keperawatan pada pasien dengan *dengue hemorrhagic fever* (DHF)
- e) Untuk mengetahui evaluasi tindakan keperawatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana keperawatan pada pasien *dengue hemorrhagic fever* (DHF)
- f) Untuk Menganalisis intervensi tepid water sponge pada pasien *dengue hemorrhagic fever* (DHF) dengan masalah hipertermi
- g) Untuk mengetahui gambaran implementasi terhadap penurunan suhu tubuh pada pasien *dengue hemorrhagic fever* (DHF) dengan masalah hipertermi

D. Manfaat

1. Manfaat teoritis

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan praktik asuhan keperawatan pada pasien *dengue hemorrhagic fever* (DHF) Di Ruang Baji Minasa RSUD Labuang Baji Makassar

2. Manfaat aplikatif

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat digunakan pada intervensi masalah hipertermi pada pasien dengan *dengue hemorrhagic fever* (DHF)

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Definisi

Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) atau lebih dikenal dengan Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang sangat menular dengan vektor nyamuk *Aedes aegypti*. (Ranjit, 2011)

Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) adalah penyakit demam akut yang dapat menyebabkan kematian dan disebabkan oleh empat serotipe virus dari *Falvivirus*, virus RNA dari keluarga *Falvivirusidae*. (Soedarto, 2012).

Dari beberapa definisi yang tertera di atas tentang *dengue haemorrhagic fever* (DHF) dapat disimpulkan bahwa penyakit tersebut berasal dari nyamuk *aedes aegypti* yang menggigit manusia serta menyebabkan demam tinggi dan jika penanganannya tidak tepat dapat mengakibatkan kematian.

Demam berdarah dengue diklasifikasi berdasar beratnya penyakit menjadi 4 derajat, dimana derajat III dan IV dikelompokkan pada dengue shock syndrome (DSS). Adanya trombositopeni dan hemokonsentrasi membedakan DBD derajat I dan II dari demam dengue. (Soedarto, 2012)

- a. Derajat I: Demam dengan gejala tidak jelas; manifestasi perdarahan hanya dalam bentuk tourniquet positif dan atau mudah memar.
- b. Derajat II: Manifestasi derajat I ditambah perdarahan spontan, biasanya berupa perdarahan kulit atau perdarahan pada jaringan lainnya.
- c. Derajat III: Kegagalan sirkulasi berupa nadi tekanan sempit dan lemah, atau hipotensi, dengan gejala kulit dingin dan lembab dan penderita gelisah.
- d. Derajat IV: Terjadi gejala awal syok berupa tekanan darah rendah dan nadi tidak dapat diukur.

2. Etiologi

Menurut Soedarto (2012), demam *haemorrhagic fever* (DHF) disebabkan oleh :

a. Virus Dengue.

Virus *dengue* yang menjadi penyebab penyakit ini termasuk ke dalam Arbovirus (Arthropodborn virus) group B, tetapi dari empat tipe yaitu virus dengue tipe 1,2,3 dan 4 keempat tipe virus dengue tersebut terdapat di Indonesia dan dapat dibedakan satu dari yg lainnya secara serologis virus dengue yang termasuk dalam genus flavivirus ini berdiameter 40 nanometer dapat berkembang biak dengan baik pada berbagai macam kultur jaringan baik yang berasal dari sel-sel mamalia misalnya sel BHK (Baby Hamster Kidney) maupun sel – sel *Arthropoda* misalnya sel *Aedes Albopictus*.

b. Vektor.

Virus *dengue* serotipe 1, 2, 3, dan 4 yang ditularkan melalui vektor yaitu nyamuk *aedes aegypti*, nyamuk *aedes albopictus*, *aedes polynesiensis* dan beberapa spesies lain merupakan vektor yang kurang berperan. Infeksi dengan salah satu serotipe akan menimbulkan antibodi seumur hidup terhadap serotipe bersangkutan tetapi tidak ada perlindungan terhadap serotipe jenis yang lainnya.

3. Patofisiologi

Virus *dengue* yang pertama kali masuk kedalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk *aedes* beredar dalam aliran darah dan menginfeksi, sehingga mengaktifasi system komplemen, yang berakibat dilepasnya anafilatoksin C3a dan C5a yang kemudian merangsang PGE hipotalamus dan menimbulkan hipertermi. Hipertermi yang terjadi menyebabkan peningkatan reabsorpsi Na⁺ dan H₂O membuat permeabilitas membrane meningkat sehingga timbulnya agregasi trombosit yang melepas ADP akan mengalami metamorphosis. Trombosit yang mengalami kerusakan metamorphosis akan dimusnahkan oleh system retikuloendotelial dengan akibat trombositopenia

hebat dan perdarahan yang berlanjut terjadinya perfusi jaringan tidak efektif, hipoksia jaringan, asidosis metabolik hingga syok hipovolemik. (Nurarif, 2015)

Renjatan hipovolemik dan hipotensi menimbulkan kebocoran plasma yang berakibat terjadinya kekurangan volume cairan di jaringan, selain itu kebocoran plasma yang terjadi di ektravaskuler seperti pada paru-paru dapat menyebabkan efusi pleura kemudian terjadi ketidakefektifan pola nafas, jika mengenai organ hepar akan terjadi hepatomegali kemudian intra abdomen akan mengalami penekanan yang berakibat timbulnya nyeri,kebocoran plasma yang terjadi pada abdomen maka akan menyebabkan asites, mual muntah sehingga menimbulkan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. (Nurarif, 2015).

4. Manifestasi Klinis

Menurut Susilaningrum (2013) manifestasi klinis dari DHF adalah :

a. Demam.

Demam tinggi sampai 40 oC dan mendadak, Demam terjadi secara mendadak berlangsung selama 2 – 7 hari kemudian turun menuju suhu normal atau lebih rendah. Bersamaan dengan berlangsung demam, gejala – gejala klinik yang tidak spesifik misalnya anoreksia. Nyeri punggung , nyeri tulang dan persediaan, nyeri kepala dan rasa lemah dapat menyetainya.

b. Perdarahan

Uji tourniquet positif h. Perdarahan, petekia, epistaksis, perdarahan massif. Perdarahan biasanya terjadi pada hari ke 2 dan 3 dari demam dan umumnya terjadi pada kulit dan dapat berupa uji torniquet yang positif mudah terjadi perdarahan pada tempat fungsi vena, petekia (bintik-bintik merah akibat perdarahan intradermak / submukosa) purpura (perdarahan di kulit), epistaksis (mimisan), perdarahan gusi, . Perdarahan ringan hingga sedang dapat terlihat pada saluran cerna bagian atas hingga menyebabkan

haematemesis, dan melena (tinja berwarna hitam karena adanya perdarahan. Perdarahan gastrointestinal biasanya di dahului dengan nyeri perut yang hebat.

- c. Anoreksia
- d. Mual muntah
- e. Nyeri perut kanan atas atau seluruh bagian perut
- f. Nyeri kepala
- g. Nyeri otot dan sendi
- h. Trombositopenia ($< 100.000/ \text{mm}^3$)
- i. Hepatomegali.

Pada permulaan dari demam biasanya hati sudah teraba, meskipun pada anak yang kurang gizi hati juga sudah terabah. Bila terjadi peningkatan dari hepatomegali dan hati teraba kenyal harus di perhatikan kemungkinan akan terjadi renjatan pada penderita.

- j. Renjatan (Syok).

Permulaan syok biasanya terjadi pada hari ke 3 sejak sakitnya penderita, dimulai dengan tanda – tanda kegagalan sirkulasi yaitu kulit lembab, dingin pada ujung hidung, jari tangan, jari kaki serta sianosis disekitar mulut. Bila syok terjadi pada masa demam maka biasanya menunjukkan prognosis yang buruk.

5. Pemeriksaan Penunjang

Menurut Desmawati (2013) pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien Demam Berdarah Dengue yaitu pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi (foto rontgen thoraks), berikut pemeriksaannya :

- a. Pemeriksaan Laboratorium

- 1) Leukopeni: sering disertai limfopeni, terjadi dekat sebelum fasedemam berakhir.

- 2) Limfositosis: dengan limfosit atipik, terjadi sebelum terjadinya syok. Sel darah putih, neutrofil, trombosit: menurun.
 - 3) Hematokrit: meningkat lebih dari 20% merupakan tanda adanya hemokonsentrasi dan awal terjadinya syok. Angka hematokrit harus dipantau setidaknya 24 jam sekali untuk mengenal secara dini demam berdarah dengue. Pada demam berdarah dengue yang berat, atau pada dengue shock syndrome hematokrit diperiksa setiap 3-4 jam.
 - 4) Trombositopeni: terjadi pada lebih dari 50% penderita demam *dengue*. Trombosit yang kurang dari 100.000/ μ l selalu dijumpai pada demam berdarah dengue atau dengue shock syndrome yang terjadi sebelum defervescence dan pada saat terjadi syok. Trombosit sebaiknya diperiksa setidaknya setiap 24 jam untuk mengenal secara dini demam berdarah *dengue*.
- b. Pemeriksaan radiologis.
- Efusi pleura tampak di paru sebelah kanan, efusi pleura akan lebih luas pada DHF yang lebih berat. Pada penderita yang mengalami syok berat, efusi pleura dapat terlihat bilateral.
- c. Pemeriksaan *Rumple leed test (tourniquet test)*
- Salah satu cara yang paling mudah dan cepat untuk menentukan apakah terkena demam berdarah atau tidak. *Rumple leed test* adalah pemeriksaan bidang hematologi dengan menggunakan pembendungan pada bagian lengan atas selama 5 menit untuk diuji diagnostic kerapuhan vascular dan fungsi trombosit.
- d. Pemeriksaan lain
- Dapat digunakan untuk mengetahui adanya virus dengue yaitu antibodi imunoglobulin M (IgM) dan M *antibodi capture enzymelinked immunoserbent assay (MAC ELISA)* dengan nilai normalnya yaitu negatif.

6. Penatalaksanaan

Prinsip pengobatan pada penyakit DBD yaitu simptomatis dan suportif. Penanganan pertama pada penyakit ini di antaranya memenuhi kebutuhan cairan, yaitu dengan memberikan cairan oral 1-2 liter untuk mengatasi dehidrasi dan rasa haus akibat demam tinggi. Selain air putih pasien dapat diberikan teh manis, susu, sirup, jus buah dan oralit. Pasien yang mengalami demam tinggi dapat diberikan antipiretik golongan asetaminofen (paracetamol). Pasien tidak boleh diberikan antipiretik dari golongan salisilat karena dapat menimbulkan perdarahan yang semakin parah. Demam tinggi pada anak dapat mengakibatkan kejang. Untuk mengatasi kejang dapat diberikan antikonvulsi misalnya diazepam, stesolid, fenobarbital, dan obat antikonvulsi lainnya. (Marni, 2016)

Adapun penatalaksanaan medis maupun keperawatan pada DHF sesuai derajat yang telah ditentukan, berikut penatalaksanaannya :

a. Derajat I dan II

- 1) Obat oral
- 2) Infus cairan Ringer Laktat dengan dosis 50,1/kgBB/hari disertai minum air putih.

b. Derajat III

- 1) Berikan infus Ringer Laktat 20ml/kgBB/jam, apabila menunjukkan perbaikan (tensi terukur >80 mmHg dan nadi teraba dengan frekuensi <120 x/menit dan akral hangat lanjutkan dengan ringet laktat 10ml/kgBB/jam, jika nadi dan tensi stabil lanjutkan infus tersebut dengan jumlah cairan dihitung berdasarkan kebutuhan cairan dalam kurun waktu 24jam dikurangi cairan yang sudah masuk dibagi dengan sisa waktu (24 jam dikurangi sisa waktu yang dipakai untuk mengatasi renjatan)
- 2) Apabila satu jam setelah pemakaian cairan RL 20ml/kgBB/jam keadaan tensi masih terukur <80 mmHg dan nadi cepat lemah, akral dingin maka

penderita tersebut memperoleh plasma ekspander sebanyak 10ml/kgBB/jam dan dapat diulang maksimal 30ml/kgBB dalam kurun waktu 24 jam. Jika keadaan umum membaik dilanjutkan dengan cairan RL sebanyak kebutuhan cairan selama 24 jam dikurangi cairan yang sudah masuk dibagi sisa waktu setelah mengatasi renjatan.

c. Derajat IV

1) Cairan

- a) Infus NaCl 0,9% / Dextrose 5% atau Ringer Laktat.
- b) Plasma expender, apabila shock sulit diatasi
- c) Pemberian cairan ini dipertahankan minimal 12-24 jam maksima 148 jam setelah shock teratasi.
- d) Perlu observasi ketat akan kemungkinan oedema paru dan gagaljantung, serta terjadinya shock ulang.

2) Transfusi darah segar pada penderita dengan perdarahan masif.

3) Obat

- a) Antibiotika : diberikan pada penderita shock membangkang dan atau gejala sepsis.
- b) Kortikosteroid : pemberiannya contro versial hati-hati pada penderita dengan gastritis.
- c) Heparin : diberiakn pada penderita dengan DIC dosis 100mg/kg BB setiap 6 jam i.v. (Desmawati, 2013)

B. KONSEP KEPERAWATAN

1. Pengkajian Keperawatan

a. Identitas

DBD dapat mengenai pada semua umur yang tinggal di daerah tropis.

b. Keadaan Umum

c. Terjadinya peningkatan suhu tubuh/demam dan disertai ruam macula popular.

d. Riwayat Penyakit Sekarang

e. Umumnya klien dengan DHF datang ke Rumah Sakit dengan keluhan demam akut 2 – 7 hari, nyeri otot dan pegal pada seluruh badan, malaise, mual, muntah, sakit kepala, sakit pada saat menelan, lemah, nyeri ulu hati, pendarahan spontan.

f. Riwayat Penyakit Dahulu

g. Diantara penyakit yang pernah diderita yang dahulu dengan penyakit DHF yang dialami sekarang, tetapi kalau dahulu pernah menderita DHF penyakit itu berulang.

h. Riwayat Penyakit keluarga

i. Riwayat adanya penyakit DHF didalam keluarga yang lain, yang tinggal didalam satu rumah / beda rumah dengan jarak yang berdekatan sangat menentukan karena ditularkan melalui gigitan nyamuk.

j. Riwayat Penyakit Lingkungan

k. DHF ditularkan oleh 2 nyamuk yaitu: *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*, hidup dan berkembang biak didalam rumah yaitu pada tempat penampungan air bersih seperti kaleng bekas, bak mandi yang jarang dibersihkan.

l. Pemeriksaan Fisik

1) Sistem pernafasan

Tidak ada gangguan dalam pernafasan.

2) Sistem persyarafan

Gangguan dalam sistem persyarafan adalah terdapat respon nyeri.

3) Sistem kardiovaskuler

Terjadi pendarahan dan kegagalan sirkulasi.

4) Sistem pencernaan

Terjadi anoreksia, mual dan muntah.

5) Sistem otot dan integumen

Ditemukan petechie, pegal-pegal pada seluruh tubuh.

6) Sistem eliminasi

Terjadi gangguan pada sistem eliminasi alvi yaitu terjadi konstipasi.

2. Diagnosa Keperawatan (PPNI, 2017)

Diagnosa 1 : Hipertermi

a. Definisi

Suhu tubuh meningkat diatas rentang normal tubuh.

b. Penyebab

- 1) Dehidrasi
- 2) Terpapar lingkungan panas
- 3) Proses penyakit (mis. Infeksi, kanker)
- 4) Ketidaksesuaian pakaian dengan suhu lingkungan
- 5) Peningkatan laju metabolisme
- 6) Respon trauma
- 7) Aktivitas berlebihan
- 8) Penggunaan inkubator

c. Gejala dan tanda mayor

Objektif

- 1) suhu tubuh diatas nilai normal

d. Gejala dan tanda minor

Objektif

- 1) kulit merah
- 2) Kejang
- 3) Takikardi

- 4) Takipnea
- 5) Kulit terasa hangat
- e. Kondisi klinis terkait
 - 1) Proses infeksi
 - 2) Hipertiroid
 - 3) Stroke
 - 4) Dehidrasi
 - 5) Trauma
 - 6) Prematuritas

Diagnosa 2 : Nyeri Akut

- a. Definisi : pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan.
- b. Penyebab :
 - 1) Agen pencedera fisiologis (mis.inflamasi, iskemis,neoplasma).
 - 2) Agen pencedera kimiawi (mis.terbakar,bahan kimia iritan).
 - 3) Agen pencedera fisik (mis.abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan).
- c. Gejala dan Tanda Mayor
 - 1) Subjektif
 - Mengeluh nyeri
 - 2) Objektif
 - a) Tampak meringis
 - b) Bersikap protektif
 - c) Gelisah
 - d) Frekuensi nadi meningkat
 - e) Sulit tidur
- d. Kondisi Klinis Terkait
 - 1) Kondisi pembedahan

- 2) Cedera traumatis
- 3) Infeksi
- 4) Sindrom koroner akut
- 5) Glaukoma

Diagnosa 3 : Pola nafas tidak efektif

a. Definisi

Inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat.

b. Penyebab

- 1) Depresi pusat pernapasan
- 2) Hambatan upaya napas (mis. nyeri saat bernapas, kelemahan otot pernafasan)
- 3) Deformitas dinding dada
- 4) Deformitas tulang dada
- 5) Gangguan neuromuscular
- 6) Gangguan neurologis (mis. elektroensefalogram positif, cedera kepala, gangguan kejang)
- 7) Imatunitas neurologis
- 8) Penurunan energi
- 9) Obesitas
- 10) Posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru
- 11) Sindrom hipoventilasi
- 12) Kerusakan inervasi diafragma
- 13) Cedera pada medulla spinalis
- 14) Efek agen farmakologis
- 15) Kecemasan

c. Tanda dan gejala mayor

Subjektif : Dispnea

Objektif :

- Penggunaan otot bantu pernafasan
- Fase ekspirasi memanjang

- Pola napas abnormal (mis. takipnea, bradipnea, hiperventilasi)

d. Kondisi klinis terkait

- 1) Depresi sistem saraf pusat
- 2) Cedera kepala
- 3) Trauma thoraks
- 4) *Gullian barre syndrome*
- 5) *Multiple sclerosis*
- 6) *Myasthenia gravis*
- 7) Stroke
- 8) Kuadriplegia
- 9) Intoksikasi alcohol

Diagnosa 4 : Risiko perdarahan

a. Definisi

Beresiko mengalami kehilangan darah baik internal (terjadi didalam tubuh) maupun eksternal (terjadi hingga keluar tubuh).

b. Faktor risiko

- 1) Aneurisma
- 2) Gangguan gastrointestinal (mis. Ulkus lambung, polip, varises)
- 3) Gangguan fungsi hati
- 4) Komplikasi kehamilan (mis. Ketuban pecah sebelum waktunya, plasenta previa/abrupsi, kehamilan kembar)
- 5) Komplikasi pasca partum (mis. Atoni uterus, retensi plasenta)
- 6) Gangguan koagulasi (mis. Trombositopenia)
- 7) Gangguan farmakologis
- 8) Tindakan pembedahan
- 9) Trauma
- 10) Kurang terpapar informasi
- 11) Proses keganasan

c. Kondisi klinis terkait

Prinsip pengobatan pada penyakit DBD yaitu simptomatis dan suportif. Penanganan pertama pada penyakit ini di antaranya memenuhi kebutuhan cairan, yaitu dengan memberikan cairan oral 1-2 liter untuk mengatasi dehidrasi dan rasa haus akibat demam tinggi. Selain air putih pasien dapat diberikan teh manis, susu, sirup, jus buah dan oralit. Pasien yang mengalami demam tinggi dapat diberikan antipiretik golongan asetaminofen (paracetamol). Pasien tidak boleh diberikan antipiretik dari golongan salisilat karena dapat menimbulkan perdarahan yang semakin parah. Demam tinggi pada anak dapat mengakibatkan kejang. Untuk mengatasi kejang dapat diberikan antikonvulsi misalnya diazepam, stesolid, fenobarbital, dan obat antikonvulsi lainnya. (Marni, 2016)

Adapun penatalaksanaan medis maupun keperawatan pada DHF sesuaiderajat yang telah ditentukan, berikut penatalaksanaannya :

a. Derajat I dan II

- 1) Obat oral
- 2) Infus cairan Ringer Laktat dengan dosis 50,1/kgBB/hari disertaiminum air putih.

b. Derajat III

- 1) Berikan infus Ringer Laktat 20ml/kg BB/jam, apabila menunjukkan perbaikan (tensi terukur $>80\text{mmHg}$ dan nadi teraba dengan frekuensi $<120\text{x/menit}$ dan akral hangat lanjutkan dengan ringet laktat 10ml/kg BB/jam, jika nadi dan tensi stabil lanjutkan infus tersebut dengan jumlah cairan dihitung berdasarkan kebutuhan cairan dalam kurun waktu 24jam dikurangi cairan yang sudah masuk dibagi dengansisa waktu (24 jam dikurangi sisa waktu yang dipakai untuk mengatasi renjatan)
- 2) Apabila satu jam setelah pemakaian cairan RL 20ml/kg BB/jam keadaan tensi masih terukur $<80\text{mmHg}$ dan nadi cepat lemah, akral dingin maka penderita tersebut memperoleh plasma ekspander sebanyak 10ml/kgBB/jam dan dapat diulang maksimal 30ml/kg BB dalam kurun waktu 24 jam. Jika keadaan umum membaik dilanjutkan dengan cairan RL sebanyak

kebutuhan cairan selama 24 jam dikurangi cairan yang sudah masuk dibagi sisa waktu setelah mengatasi renjatan.

c. Derajat IV

1) Cairan

- a) Infus NaCl 0,9% / Dextrose 5% atau Ringer Laktat.
- b) Plasma expender, apabila shock sulit diatasi
- c) Pemberian cairan ini dipertahankan minimal 12-24 jam maksimal 48 jam setelah shock teratasi.
- d) Perlu observasi ketat akan kemungkinan oedema paru dan gagal jantung, serta terjadinya shock ulang.

2) Transfusi darah segar pada penderita dengan perdarahan masif.

3) Obat

- a) Antibiotika : diberikan pada penderita shock membangkang dan atau gejala sepsis.
- b) Kortikosteroid : pemberiannya controversial hati-hati pada penderita dengan gastritis.
- c) Heparin : diberiakan pada penderita dengan DIC dosis 100mg/kg BB setiap 6 jam i.v. (Desmawati, 2013)

Diagnosa 5 : Defisit nutrisi

a. Definisi: Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme

b. Penyebab

- 1) Ketidakmampuan menelan makanan
- 2) Ketidakmampuan mencerna makanan
- 3) Ketidakmampuan mengabsorbsi nutrient

c. Gejala dan tanda mayor

- 1) Subjektif: tidak tersedia
- 2) Objektif:
 - a) Berat badan menurun minimal 10% dibawah rentang ideal

- d. Gejala dan tanda minor
 - 1) Subjektif
 - a) Cepat kenyang sebelum makan
 - b) Kram/nyeri abdomen
 - c) Nafsu makan menurun
 - 2) Objektif:
 - a) Otot pengunyah lemah
 - b) Otot menelan lemah
 - c) Serum albumin menurun

- e. Kondisi klinis terkait
 - 1) Stroke
 - 2) Kerusakan neuromuscular
 - 3) Penyakit kronis

Diagnosa 6 : Intoleransi Aktivitas

- a. Definisi
 - Ketidakcukupan energy untuk melakukan aktivitas sehari-hari
- b. Penyebab
 - 1) Ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhan oksigen
 - 2) Tirah baring
 - 3) Kelemahan
 - 4) Imobilitas
 - 5) Gaya hidup monoton
- c. Gejala dan tanda mayor
 - Subyektif : Mengeluh Lelah
 - Objektif : Frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat.
- d. Gejala dan tanda minor
 - Subyektif :
 - 1. Dispnea saat/setelah aktivitas
 - 2. Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas

3. Merasa lemah

Objektif :

1. Tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat
2. Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat/setelah aktiivitas
3. Gambaran EKG menunjukkan iskemia
4. Sianosis

e. Kondisi klinis terkait

- 1) Anemia
- 2) Penyakit jantung koroner
- 3) Gagal jantung kongestif
- 4) Penyakit katup jantung
- 5) Aritmia
- 6) Penyakit paru obstruktif kronis
- 7) Gangguan metabolic
- 8) Gangguan musculoskeletal

3. Intervensi Keperawatan(PPNI, 2018)

Diagnosa 1 : Hipertermi

Luaran Keperawatan : Termogulasi

a. Tujuan dan kriteria hasil

Hipertermi yang dirasakan klien menurun dengan kriteria hasil:

- 1) Mengigil menurun
- 2) Kejang menurun
- 3) Suhu tubuh membaik
- 4) Suhu kulit membaik

b. Intervensi keperawatan dan rasional :

Manajemen Hipertermi

Observasi

- 1) Identifikasi penyebab hipertermi (mis. Dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator)

- 2) Monitor suhu tubuh
- 3) Monitor haluaran urine
- 4) Monitor kadar elektrolit
- 5) Monitor komplikasi akibat hipertermi

Terapeutik

- 1) Sediakan lingkungan yang dingin
- 2) Longgarkan atau lepaskan pakaian
- 3) Basahi dan kipasi permukaan tubuh
- 4) Berikan cairan oral
- 5) Ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis (keringat berlebih)
- 6) Melakukan pendinginan eksternal (mis. Selimut hipotermia atau kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, aksila)
- 7) Hindari pemberian antipiretik atau aspirin
- 8) Berikan oksigen, *jika perlu*

Edukasi

- 1) Anjurkan tirah baring

Kolaborasi

- 1) Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, *jika perlu*

Diagnosa 2 : Nyeri Akut

Luaran Utama : Tingkat Nyeri

a. Tujuan dan kriteria hasil

Nyeri yang dirasakan klien menurun dengan kriteria hasil:

- 1) Keluhan nyeri menurun
- 2) Meringis dapat menurun
- 3) Frekuensi nadi membaik
- 4) Tekanan darah membaik

b. Intervensi keperawatan dan rasional

Manajemen nyeri

Observasi

- 1) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri

Rasional : Mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri dari pasien

- 2) Identifikasi skala nyeri

Rasional : Mengetahui tingkat nyeri yang dirasakan pasien

- 3) Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri

Rasional : Mengetahui hal-hal yang dapat memperberat ataupun memperingan nyeri yang dirasakan pasien

- 4) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup

Rasional : Mengetahui seberapa besar rasa nyeri mempengaruhi kualitas hidup pasien

Terapeutik

- 1) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam)

Rasional : Mengurangi tingkat nyeri pasien/ mengalihkan pasien dari rasa nyerinya

- 2) Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri

Rasional : mengurangi resiko factor yang dapat memperberat nyeri/menimbulkan nyeri

- 3) Fasilitasi istirahat dan tidur

Rasional : mengalihkan dan memenuhi kebutuhan istirahat pasien

Edukasi

- 1) Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri

Rasional : Memberikan informasi terkait nyeri yang dirasakan pasien

- 2) Jelaskan strategi mengatasi nyeri

Rasional : Membantu pasien mengatasi saat rasa nyeri muncul

- 3) Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri

Rasional : Pasien dapat mengetahui sendiri karakteristik, penyebab, lokasi saat nyeri muncul

- 4) Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri

Rasional : Memudahkan pasien untuk mengontrol nyeri dengan cara sederhana tanpa menggunakan obat-obatan

Kolaborasi

- 1) Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu

Rasional : Mengurangi/ menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien, pemberian analgetik sesuai kebutuhan pasien

Diagnosa 3 : Pola Napas Tidak Efektif

Luaran Utama : Pola Napas

a. Tujuan dan Kriteria hasil (outcomes criteria):

Inspirasi dan/atau ekspirasi yang memberikan ventilasi adekuat, dengan kriteria hasil:

- 1) Meningkatnya ventilasi semenit, kapasitas vital, diameter thoraks anterior-posterior, tekanan ekspirasi, tekanan inspirasi
- 2) Menurunnya tanda dan gejala dispnea, penggunaan otot bantu napas, pemanjangan fase ekspirasi, ortopnea, pernapasan pursed-tip, pernapasan cuping hidung
- 3) Membaiknya frekuensi napas, kedalaman napas, ekskursi dada

b. Intervensi keperawatan dan rasional:

Manajemen jalan napas

Observasi

- 1) Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)

Rasional: Mengetahuipola napas pasien (frekuensi, kedalaman, usaha napas)

- 2) Monitor bunyi napas tambahan (mis. *gurgling*, mengi, *wheezing*, ronkhi kering)

Rasional: Mengetahui adanya bunyi napas tambahan masih ada atau tidak

3) Monitor sputum (jumlah, warna, aroma)

Rasional: Mengetahui karakteristik sputum pasien dan bahan evaluasi

Terapeutik

1) Pertahankan kepatenan jalan napas dengan *head-tilt* dan *chin-lift* (*jaw-thrust* jika curiga trauma servikal)

Rasional: Mempertahankan terbukanya jalan napas pasien

2) Posisikan semi-fowler atau fowler

Rasional: Mempertahankan kenyamanan, meningkatkan ekspansi paru, dan memaksimalkan oksigenasi pasien

3) Berikan minum hangat

Rasional: Membantu memobilisasi dan mengeluarkan secret

4) Lakukan fisioterapi dada, jika perlu

Rasional: Meningkatkan drainase dan memudahkan eliminasi secret yang susah dikeluarkan secara mandiri

5) Lakukan pengisapan lender kurang dari 15 detik

Rasional: Untuk menghindari hipoksemi dan tidak terjadi cedera pada jalan napas (nasopharing, oropharing, dan orotracheal) dan mempertahankan kepatenan jalan napas

6) Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal

Rasional: Untuk menghindari hipoksemia yang diakibatkan tindakan suction

7) Keluarkan sumbatan benda padat dengan forsep McGill

Rasional: Mempertahankan kepatenan jalan napas dan mencegah terjadinya infeksi

8) Berikan Oksigen, jika perlu

Rasional: Meningkatkan pengiriman oksigen ke paru untuk kebutuhan sirkulasi

9) Edukasi

10) Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, jika tidak kontraindikasi

Rasional: Agar keseimbangan cairan pasien tetap terjaga sehingga oksigenasi juga membaik

11) Ajarkan teknik batuk efektif

Rasional: Agar pasien bisa mengeluarkan secret secara maksimal tanpa menggunakan tenaga lebih/menguras tenaga

Kolaborasi

1) Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran atau mukolitik, *jika perlu*

Rasional: Memberikan support bantuan pernapasan tambahan dan memudahkan pengenceran serta pembuangan secret

Diagnosa 4: Risiko Perdarahan

Luaran Utama : Pencegahan Perdarahan

a. Tujuan dan Kriteria Hasil

- 1) Kelembapan membrane mukosa meningkat
- 2) Kelembapan kulit meningkat
- 3) Hemoptosis menurun
- 4) Perdarahan pasca operasi menurun
- 5) Hemoglobin membaik
- 6) Hematocrit membaik
- 7) TD, Nadi, dan Suhu membaik

b. Intervensi keperawatan

Observasi

- 1) Monitor tanda dan gejala perdarahan
- 2) Monitor hematocrit/hemoglobin sebelum dan setelah kehilangan darah
- 3) Monitor tanda-tanda vital ortostatik
- 4) Monitor koagulasi

Terapeutik

- 1) Pertahankan bedrest selama perdarahan
- 2) Batasi tindakan invasive, *jika perlu*
- 3) Gunakan kasur decubitus

- 4) Hindari pengukuran suhu rektal

Edukasi

- 1) Jelaskan tanda dan gejala perdarahan
- 2) Anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi
- 3) Anjurkan menghindari aspirin atau antikoagulan
- 4) Anjurkan meningkatkan asupan makanan dan vitamin K

Kolaborasi

1. Kolaborasi pemberian obat pengontrol darah, *jika perlu*
2. Kolaborasi pemberian produk darah, *jika perlu*

Diagnosa 5 : Defisit Nutrisi

Luaran Keperawatan

a. Tujuan dan kriteria hasil

Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam status nutrisi membaik dengan kriteria hasil:

- 1) Porsi makanan yang dihabiskan
- 2) Nafsu makan membaik

b. Intervensi keperawatan

Manajemen Nutrisi :

Observasi :

- 1) Identifikasi status nutrisi

R: Pengkajian penting dilakukan untuk mengetahui status nutrisi pasien sehingga dapat menentukan intervensi yang diberikan.

- 2) Identifikasi makanan yang disukai

R: membantu pasien untuk memenuhi asupan nutrisi

- 3) Monitor asupan makanan

R: untuk mengetahui jumlah yang masuk dan jumlah yang keluar.

Terapeutik

- 1) Lakukan oral *hygine* sebelum makan

R: Mulut yang bersih dapat meningkatkan nafsu makan

Edukasi

- 1) Anjurkan posisi duduk

R: Posisi duduk memberikan pasien perasaan nyaman saat makan.

Kolaborasi

- 1) Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan (mis. Pereda nyeri, antimetic).

R: Antiemetik dapat digunakan sebagai terapi farmakologis dalam manajemen mual dengan menghambat sekres asam lambung

- 2) Kolaborasi ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrient yang dibutuhkan.

R: membantu pasien untuk memenuhi jumlah nutrisi dalam tubuh

Diagnosa 6: Intoleransi Aktivitas

Luaran Utama : Manajemen Energi

a. Tujuan dan Kriteria Hasil

Respon fisiologis terhadap aktifitas yang membutuhkan tenaga dapat meningkat dengan kriteria hasil

- 1) Kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari meningkat
- 2) Kekuatan tubuh bagian atas meningkat
- 3) Kekuatan tubuh bagian bawah meningkat
- 4) Keluhan lelah menurun

b. Intervensi keperawatan

Observasi

- 1) Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan

Rasional :mengidentifikasi pencetus terjadinya kelelahan dan rencanatindakan berikutnya yang dapat dilakukan

- 2) Monitor kelelahan fisik dan emosional

Rasional :untuk mengetahui koping klien

- 3) Monitor pola dan jam tidur

Rasional : menghindari kelelahan akibat kurang istirahat

4) Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas

Rasional :mengetahui kemampuan dan batasan pasien terkait aktivitas yang akan dilakukan

Terapeutik

1) Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis. Cahaya, suara, kunjungan).

Rasional : memberikan rasa aman dan nyaman kepada klien

2) Lakukan latihan rentang gerak pasif/aktif (ROM)

Rasional : membantu meningkatkan rentang gerak klien dalam beraktivitas

3) Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan

Rasional : memberikan rasa nyaman pada klien

4) Fasilitasi duduk disisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan.

Rasional :mengurangi resiko jatuh/sakit pada klien

Edukasi

1) Anjurkan tirah baring

Rasional: Istirahat yang lebih dan mengurangi aktivitas dapat memulihkan energi kembali

2) Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap

Rasional : melatih kekuatan otot dan pergerakan pasien agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi

3) Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang

Rasional : untuk mengidentifikasi rencana tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh perawat

4) Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan

Rasional :memiliki kemampuan mengatasi masalah (*coping skill*) bermanfaat untuk mencegah komplikasi kesehatan yang mungkin nanti akan timbul.

Kolaborasi

1) Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan

Rasional: Pemberian gizi yang cukup dapat meningkatkan energi klien

3. Implementasi

Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan (Gordon, 1994, dalam Potter & Perry, 2011).

Komponen tahap implementasi :

- a. Tindakan keperawatan mandiri.
- b. Tindakan Keperawatan edukatif.
- c. Tindakan keperawatan kolaboratif.
- d. Dokumentasi tindakan keperawatan dan respon klien terhadap asuhan keperawatan.

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan, membandingkan hasil tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menilai efektivitas proses keperawatan mulai dari tahap pengkajian, perencanaan dan pelaksanaan. Evaluasi disusun menggunakan SOAP dimana (Ridha & Hilda, 2019) :

S : Ungkapan perasaan atau keluhan yang dikeluhkan secara subjektif oleh keluarga setelah diberikan implementasi keperawatan.

O : Keadaan objektif yang dapat diidentifikasi oleh perawat menggunakan pengamatan yang objektif.

A : Analisis perawat setelah mengetahui respon subjektif dan objektif.

P : Perencanaan selanjutnya setelah perawat melakukan analisis.

Ada tiga alternative dalam menafsirkan hasil evaluasi yaitu :

a. Masalah teratasi

Masalah teratasi apabila pasien menunjukkan perubahan tingkah laku dan perkembangan kesehatan sesuai dengan kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

b. Masalah sebagian teratasi

Masalah sebagian teratasi apabila pasien menunjukkan perubahan dan perkembangan kesehatan hanya sebagian dari kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

c. Masalah belum teratasi

Masalah belum teratasi, jika pasien sama sekali tidak menunjukkan perubahan perilaku dan perkembangan kesehatan atau bahkan timbul masalah yang baru



C. Evidence Based Nursing Practice (EBNP) Prosedur *Tepid Water Sponge*

1. Pengertian

Terapi *tepid water sponge* adalah suatu tindakan dimana dilakukan penyekatan keseluruhan tubuh dengan menggunakan air hangat dengan suhu 32 °C sampai 37 °C yang bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh yang diatas normal yaitu 37,5 °C (Widyawati & Cahyanti, 2010).

2. Tujuan

Menurut (Widyawati & Cahyanti, 2010) terapi *tepid water sponge* memiliki tujuan sebagai berikut :

- a) Memberikan pelepasan panas tubuh melalui cara evaporasi konveksi
- b) Memberi efek vasodilatasi pada pembuluh darah
- c) Memberi rasa nyaman pada anak

3. Indikasi

Menurut (Widyawati & Cahyanti, 2010) anak yang diberi terapi *tepid water sponge* adalah anak yang mengalami peningkatan suhu tubuh diatas normal yaitu lebih dari 37,5 °C

4. Kontraindikasi

Kontraindikasi pada terapi *tepid water sponge* (Widyawati & Cahyanti, 2010) adalah :

- a) Tidak ada luka pada daerah pemberian terapi *tepid water sponge*
- b) Tidak diberikan pada neonatus

5. Prosedur pemberian dan rasionalisasi

Cara pemberian *tepid water sponge*:

- a. persiapkan bahan *tepid water sponge*:

- 1) waskom berisi air hangat
- 2) handuk/botol atau spons
- 3) termometer/ pengukur suhu
- 4) jam tangan

b. Fase Orientasi

- 1) Memberi salam/menyapa pasien
- 2) Memperkenalkan diri
- 3) Menjelaskan tujuan tindakan
- 4) Menjelaskan langkah prosedur
- 5) Menanyakan kesiapan pasien

c. Fase Kerja

- 1) Sebelum melakukan tindakan tawarkan pasien untuk buang air kecil
- 2) Mengukur dan mencatat suhu tubuh pasien, jenis dan waktu pemberian tepid water sponge
- 3) Pasang sampiran
- 4) Alaskan pasien dengan perlak
- 5) Buka pakian pasien dan tutupi dengan handuk mantel
- 6) Basahi washlap dengan air hangat dan di letakkan pada dahi, aksila dan kedua pangkal paha, lap ekstremitas selama 5 menit untuk punggung dan bikong 10-15 menit, lakukan lap tubuh selama 20 menit

- 7) Setelah 20 menit dilakukan tindakan ukur suhu tubuh kembali, jika masih diatas 38°C lanjutkan sesuai point 6
- 8) Suhu air dipertahankan 35°C (hangat-hangat kuku)
- 9) Catat suhu tubuh sesudah dilakukan tindakan jika suhu tubuh mendekati 37,5 °C hentikan tindakan
- 10) Selimuti pasien dan keringkan selanjutnya pakaikan pasien baju tipis dan dapat menyerap keringat

- 11) Rapikan alat dan pasien

d. Fase Terminasi

- 1) Melakukan evaluasi tindakan
- 2) Berpamitan dengan pasien
- 3) Mencuci tangan



6. Evaluasi

a. Respon

Respon verbal : Orang tua klien mengatakan suhu tubuh anaknya menurun

Respon non verbal : Klien tidak gelisah, tidak rewel, ekspresi wajah segar dan suhu tubuh dalam batas normal

b. Berikan reinforcement positif

c. Lakkan kontrak untuk kegiatan selanjutnya

d. Mengakhiri kegiatan dengan baik

BAB III
LAPORAN KASUS

A. Identitas Klien

1. Nama>Nama panggilan :An. Z
2. Tempat tanggal lahir/usia : 10-01-2008/ 13 tahun
3. Jeniskelamin : Laki-laki
4. A g a m a : Islam
5. Pendidikan : SMP
6. Alamat : Jl. Andi Tonro II No. 8
7. Tanggalmasuk : 13-04-2021
8. Tanggalpengkajian : 13-04-2021
9. Diagnosamedik : *Dengue Haemorrhagic Fever* (DHF)
10. Rencana terapi : PCT 1 gr/drips, Ranitidine 1 amp/IV,
Asering 500 ml/IV

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah

- a. Nama : Tn.R
- b. Usia : 44 tahun
- c. Pendidikan : SMK
- d. Pekerjaan : Wiraswasta
- e. Agama : Islam
- f. Alamat : Limbung

2. Ibu

- a. Nama : Ny.K
- b. Usia : 42 tahun
- c. Pendidikan : S1
- d. Pekerjaan : PNS
- e. Agama : Islam

f. Alamat : Limbung

C. Identitas Saudara Kandung

No.	NAMA	USIA	HUBUNGAN	STATUS KESEHATAN
1	A	11	Saudara Kandung	Sehat
2	A	9	Saudara Kandung	Sehat
3	A	4	Saudara Kandung	Sehat

II. Keluhan Utama/Alasan Masuk Rumah Sakit

Demam selama 4 hari di sertai mual muntah 1 kali


A. Riwayat Kesehatan Sekarang : Orang tua klien mengatakan anaknya demam disertai mual muntah

B. Riwayat Kesehatan Lalu

1. Penyakit yang pernah dialami : Demam, Batuk, Diare
2. Kecelakaan yang dialami : Tidak pernah kecelakaan
3. Pernah alergi : Tidak ada alergi
4. Komsumsi obat-obatan bebas: Tidak ada
5. Perkembangan anak dibanding saudara-saudaranya: Sama dengan saudara-saudaranya

C. Riwayat Kesehatan Keluarga

1. Penyakit - penyakit anggota keluarga : Nenek klien memiliki riwayat penyakit Diabetes Melitus
2. Genogram



G I : Orang tua klien mengatakan nenek dari ibu klien berusia 63 tahun, sedangkan kakek dari ibu klien telah meninggal dunia, serta kakek dan nenek pasien dari ayah juga telah meninggal dunia

G II : Ayah pasien berusia 44 tahun dan merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. dan ibu pasien berusia 42 tahun dan merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara

G III : Pasien berusia 13 tahun dan merupakan anak pertama dari 4 bersaudara.

IV. Riwayat Imunisasi

No	Jenis Imunisasi	Usia Pemberian	Reaksi Setelah Pemberian
1	BCG	1 Bulan	Tidak ada Keluhan
2	DPT (I, II, III)	2,3,4 Bulan	Tidak ada Keluhan

3	Polio (I,II,III,IV)	1,2,3,4 Bulan	Tidak ada Keluhan
4	Campak	11 Bulan	Tidak ada Keluhan
5	Hepatitis	0 Bulan	Tidak ada Keluhan

V. Riwayat Tumbuh Kembang

A. Pertumbuhan fisik

1. Berat Badan : 45 Kg
2. Tinggi Badan : 141 cm
3. IMT : 22,6 kg/m² Normal : (18,5-25,1) kg/m²
4. Waktu Tumbuh Gigi : 9 bulan
5. Tanggal Gigi : -

B. Perkembangan tiap tahap

Usia anak saat

1. Gigi keluar : 9 bulan
2. Tersenyum : 1 bulan
3. Miring : 3 bulan
4. Tengkurap : 4 bulan
5. Duduk : 7 bulan
6. Merangkak : 8 bulan
7. Berdiri : 9 bulan
8. Berjalan : 11 bulan
9. Berbicara 2 suku kata : 9 bulan
10. Masuk SD : 6 tahun
11. Sekarang kelas : 1 SMP

VI. Riwayat Nutrisi

A. Pemberian ASI

1. Pertama kali disusui : Asi

2. Cara pemberian: Setiap kali menangis

3. Lama pemberian: 1 tahun

B. Pemberian susu formula

1. Alasan pemberian : Setelah usia 1 tahun asi sedikit keluar

2. Jumlah pemberian :4 x 200 cc

3. Cara pemberian: Oral

C. Pola perubahan nutrisi tiap tahap usia sampai nutrisi saat ini

Usia	Jenis Nutrisi	Lama Pemberian
0 bulan - 12 bulan	ASI	6 Bulan
12 bulan	Susu Formula	2 tahun
8 bulan	Bubur susu	2 bulan
10 bulan	Tim saring	2 bulan
12 bulan	Buah	6 bulan
18 bulan	Makanan padat dan lauknya	Sampai saat ini

VII. Riwayat Psikososial

1. Apakah anak dan orang tua tinggal di: Rumah sendiri

2. Lingkungan berada di: Setengah kota

3. Apakah rumah: Dekat dengan sekolah: Dekat, Memiliki ruang bermain:
Ada, Memiliki kamar tidur sendiri: Ya

4. Apakah ada tangga yang bisa membahayakan anak: Tidak ada

5. Hubungan antar anggota keluarga : Harmonis

6. Pengasuh anak: Orang tua

VIII. Riwayat Spritual

A. Support sistem dalam keluarga: Klien selalu dibimbing oleh keluarga

B. Kegiatan keagamaan: Orang tua klien mengatakan rajin beribadah

IX. Reaksi Hospitalisasi

A. Pengalaman keluarga tentang sakit dan rawat inap

1. Mengapa ibu membawa anaknya ke rumah sakit : Ibu klien mengatakan anaknya demam selama 4 hari disertai mual muntah
2. Apakah dokter menceritakan tentang kondisi anak: Ya
3. Bagaimana perasaan orang tua saat ini: Khawatir
4. Apakah orang tua akan selalu berkunjung: Ya
5. Siapa yang akan tinggal dengan anak: Ibu

B. Pemahaman anak tentang sakit dan rawat inap

1. Mengapa keluarga/orang tua membawa kamu ke RS?
Klien mengatakan karna demam dan mual muntah
2. Menurutmu apa penyebab kamu sakit
Klien mengatakan karena gigitan nyamuk
3. Apakah dokter menceritakan keadaanmu :
Klien mengatakan dokter menceritakan keadaanya kepada ibu dan klien
4. Bagaimana rasanya dirawat di RS: Bosan

X. Aktivitas Sehari-Hari

A. Nutrisi

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
1. Selera makan	Baik	Menurun
2. Menu makan	Sayur, daging dan ikan	Bubur
3. Frekuensi makan	3 kali dalam sehari	2 kali dalam sehari
4. Makanan pantangan	Tidak ada	Tidak ada
5. Pembatasan pola makan	Tidak ada	Tidak ada
6. Cara makan	Mandiri	Di bantu keluarga
7. Ritual sebelum makan	Tidak ada	Tidak ada

B. Cairan

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
1. Jenis minuman 2. Frekuensi minum 3. Kebutuhan cairan 4. Cara pemenuhan	Air putih, Jus, 4-6 kali perhari Terpenuhi Mandiri	Air putih 3-4 kali perhari Terapi cairan Terapi cairan

C. Eliminasi (BAB/BAK)

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
BAB (Buang Air Besar): 1.Tempat pembuangan 2.Frekuensi(waktu) 3.Konsistensi 4. Kesulitan 5.Obatpelancar	Toilet 2 x/hari Padat Tidak ada Tidak ada	Toilet 1 x/hari Padat Tidak ada Tidak ada
BAK(Buang Air Kecil): 1.Tempat pembuangan 2.Frekwensi 3.WarnadanBau 4.Volume 5. Kesulitan	Toilet 3 x/hari Bening - Tidak ada	Toilet 3 x/hari Bening - Tidak ada

D. Istirahat Tidur

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
1. Jam tidur a.Siang b.Malam 2.Pola tidur 3.Kebiasaan sebelum tidur 4.Kesulitan tidur	14.00 22.28 Teratur Menonton Tidak ada	12.00 21.46 Tidak teratur Menonton Tidak ada

E. Olahraga

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
1.Program olahraga	Bola	Tidak ada
2.Jenis dan frekuensi	1 x/hari	Tidak ada
3.Kondisi setelah olahraga	Berkeringat	Tidak ada

F. Personal Hygiene

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
1. Mandi		
a. Alat mandi	Gayung, sabun mandi	Di bersihkan dengan tissue basah
b. Frekuensi	3 x/hari	
2.Cuci rambut		
a.Frekuensi	1 x/hari	Belum pernah cuci rambut
b.Cara	Mandiri	
3.Gunting kuku		
a.Frekuensi	1x/setiap kuku panjang	Belum pernah gunting kuku
b.Cara	Mandiri	
4.Gosok gigi		
a.Frekuensi	2x/hari	Belum pernah gosok gigi
b.Cara	Mandiri	

G. Aktifitas /Mobilitas Fisik

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
1.Kegiatan sehari-hari	Bermain dan belajar	Berbaring
2.Pengaturan jadwal harian	Belajar dan sholat 5 waktu	Jadwal minum obat
3.Penggunaan alat bantu aktivitas	Tidak ada	Dibantu keluarga
4. Kesulitan pergerakan tubuh	Tidak ada	Klien tampak lemah

H. Rekreasi

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
1. Perasaan saat sekolah	Senang	Sedih
2. Waktu luang	Bermain	Tidak ada
3. Perasaan setelah rekreasi	Senang	Tidak ada
4. Waktu senggang keluarga	Berlibur	Tidak ada
5. Kegiatan hari libur	Berkunjung ke keluarga	Tidak ada

XI. Pemeriksaan Fisik

A. Keadaan umum klien : Klien demam, mual dan muntah 1 kali, tampak lemah dan teraba hangat, wajah tampak memerah

B. Tanda-tanda vital

1. Suhu : 38.9 °C (Normal : 36.1 – 37.7 °C)
2. Nadi : 84x/menit (Normal : 85 x/menit)
3. Respirasi : 20 x/menit (Normal : 16 - 20 x/menit)
4. Tekanan darah : 100/70 mmHg (Normal : 118/60 mmHg)

C. Antropometri

1. Tinggi Badan : 141 Cm
2. Berat Badan : 44 Kg
3. IMT : 22,6 kg/m² Normal : (18,5-25,1) kg/m²
4. Lingkar lengan atas : 20 Cm
5. Lingkar kepala : 45 Cm
6. Lingkar dada : 73 Cm
7. Lingkarperut : 75 Cm

7.Skinfold : -

D. Sistem Pernapasan

1. Hidung : Bersih, Simetris, Tidak nyeri tekan, Tidak ada polip, Tidak ada gangguan penciuman, Pernapasan cuping hidung:Tidak ada, Secret:Tidak ada

2. Leher : Tidak ada nyeri tekan ;

Pembesaran Kelenjar : Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid ;

Tumor: Tidak ada

3. Dada :

a. Bentuk dada normal: Normal chest

b. Perbandingan ukuran AP dengan transversal :Normal

c. Gerakan dada : Pergerakan dada simetris kanan dan kiri, Tidak terdapat retraksi otot bantu pernapasan

d. Suara napas: Tidak ada suara tambahan (Lup Dup)

4. Apakah ada clubbing finger : Tidak ada

E. Sistem Cardio Vaskuler

1. Conjunctiva: Pucat Bibir: Kering, Artericarotis: Lemah Tekanan venajugularis: Lemah

2. Ukuran jantung :Normal

3. Suara jantung: Vesikuler

S1 :Tunggal

S2 :Tunggal

Bising aorta: Tidak ada

Murmur: Tidak ada

Gallop: Tidak ada

4. *Capillary Refilling Time* :< 2 detik

F. Sistem Pencernaan

1. Sklera: Ikterus, Bibir: Kering
2. Mulut: Bersih
Stomatitis : Tidak ada
Palatoskizis: Tidak ada
Jumlah gigi: Lengkap
Kemampuan menelan :Baik
3. Gaster: Tidak ada keluhan
4. Abdomen: Tidak ada nyeri tekan, Tidak terdapat asites
5. Anus: Normal, Tidak ada hemoroid

G. Sistem Indra

1. Mata: Normal, Kelopak mata : Normal, Tidak ada nyeri tekan, Bulu mata: Ada, Alis: Simetris kiri kanan, Visus: Normal, Lapang pandang: Normal
2. Hidung:Penciuman:Baik, Nyeri dihidung: Tidak ada nyeri, Trauma: Tidak ada, Mimisan: Tidak pernah, Sekret yang menghalangi penciuman:Tidak ada
3. Telinga:Keadaan daun telinga: Simetris kiri dan kanan, tidak da benjolan, tidak ada nyeri tekan, Kanal auditoris: Bersih, Serumen: Tidak ada, Fungsi pendengaran: Normal

H. Sistem Saraf

1. Fungsi Cerebral
 - a. Status mental: Oreintasi: Baik, Daya ingat: Baik Perhatian dan perhitungan: Baik, Bahasa: Baik
 - b. Kesadaran :Eyes: 4, Motorik: 6, Verbal: 5, dengan GCS:15
 - c. Bicara: Ekspresif
2. Fungsi Cranial
 - a. N.I : Anak mampu membedakan berbagai macam bau
 - b. N.II : Visus: Baik, Lapang pandang: Baik

- c. N.III, N.IV, N.VI : Gerakan bola mata: Normal, Pupil: Isokor
- d. N.V : Sensorik: Normal, Motorik: Normal
- e. N.VII : Sensorik: Normal, Otonom:Normal, Motorik: Normal
- f. N.VIII : Pendengaran: Normal, Keseimbangan: Seimbang kiri dan kanan
- g. N.IX : Anak mampu membedakan rasa asin/manis/pahit: Ya
- h. N.X : Gerakan uvula: Normal, Rangsang muntah/menelan: Ada
- i. N.XI : Sternocleidomastoideus: Normal, Trapezius: Normal
- j. N.XII : Gerakan lidah : Normal

3. Fungsi Motorik : Massa otot: Baik, Tonus otot: Menurun

$$\begin{array}{r|l} \text{Kekuatan otot} & 4 & | & 4 \\ \hline & 4 & | & 4 \end{array}$$

- 4. Fungsi Sensorik : Suhu: 37.9, Nyeri: Tidak ada, Getaran: Normal
- 5. Fungsi Cerebellum : : Koordinasi: Baik, Keseimbangan: Baik
- 6. Refleks: Bisep: Normal, Trisep: Normal, Patella: Normal, Babinski: Refleks babinski ada
- 7. Iritasi meningen : Kaku kuduk: Normal Lasequesign: Normal, Brudzinkii/II: Normal

I. Sistem Musculoskeletal

- 1. Kepala: Bentuk kepala : Normal, Lingkar Kepala: 45cm
- 2. Vertebrae: Normal, Gerakan: Normal, ROM: Normal, Fungsi gerak: Baik
- 3. Pelvis: Gaya jalan: Lemah. Gerakan: Lemah, ROM: Normal, Trendelenberg test: - Ortolani/Barlow: Tidak ada
- 4. Lutut: Normal, Tidak ada benjolan, Tidak ada nyeri tekan, Gerakan: Normal
- 5. Kaki: Normal, Tidak ada edema, Tidak ada nyeri tekan, Tidak ada benjolan, Gerakan: Lemah, Kemampuan jalan: Lemah

6. Tangan :Normal, Sama panjang kiri kanan tidak ada kelainan Gerakan:
Lemah, ROM: Normal
- J. Sistem Integument
1. Rambut:Warna: Hitam, Kurang bersih, Mudah dicabut:Tidak
 2. Kulit:Warna: Putih, Temperatur: 38.9°C, Teraba : Hangat, Kelembaban:
Lembab, Tahilalat: Tidak ada, Ruam:Tidak ada, Teksture:Kasar
 3. Kuku:Warna: Putih, Permukaan kuku: Halus, Bentuk Kuku: Normal;
Mudah patah: Tidak, Kebersihan: Kotor
- K. Sistem Endokrin
1. Kelenjar thyroid: Normal
 2. Keadaan kandung kemih : Normal
 3. Ekskresi urine berlebihan: Tidak ada
 4. Suhu tubuh yang tidak seimbang:Ya, Keringat berlebihan:Tidak
 5. Riwayat bekas air seni di kelilingi semut: Tidak ada.
- L. Sistem Perkemihan
1. Oedema palpebra: Tidak ada, Moon face: Tidak ada, Oedema anasarka:
Tidak ada
 2. Keadaan kandung kemih : Normal
 3. Nocturia: Tidak ada, Dysuria: Tidak ada, Kencing batu: Tidak ada
- M. Sistem Reproduksi
1. Wanita
 - a. Payudara : Putting :- Aerola mammae: -
 - b. Labia mayora & minora:- Secret: - Bau: -
 2. Laki-laki
 - a. Keadaan glanspenis: Normal, Uretra: Normal, Kebersihan: Bersih
 - b. Testis sudah turun: Ya
- N. Sistem Imun

1. Alergi: Tidak ada

2. Penyakit yang berhubungan dengan perubahan cuaca: Flu dan batuk

XII. Pemeriksaan Tingkat Perkembangan

A. 6 Tahun Ke Atas

Perkembangan kognitif : Operasional formal

Perkembangan Psikoseksual : Masa genital

Perkembangan Psikososial : Identitas Vs kebingungan identitas

XIII. Tes Diagnostik

A. Laboratorium

Tanggal 13/04/2021 Jam : 08.58.08

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
WBC	2.40	4.0-10.0	10 ³ /uL
RBC	5.57	3.50-5.50	10 ³ /uL
HGB	13.7	11.0-17.9	g/dL
HCT	41.0	40-50	%
MCV	73.6	80.0-96.0	fL
MCH	24.6	23.2-38.7	Pg
MCHC	33.4	32-37	g/dL
RDW SD	33.3	37.0-54.0	fL
RDW CV	12.4	10.0-18.0	%
PLT	91	150-400	10 ³ /uL
MPV	10.4	6.5-11.0	fL
PDW	12.7	10.0-18.0	fL
PCT	0.09	0.15-0.50	%
P LCR	28.3	13.0-43.0	%
NEUT	0.85	1.50-700	10 ³ /uL

LYMPH	1.23	1.00-3.70	10 ³ /uL
MONO	0.24	0.00-0.70	10 ³ /uL
EO	0.06	0.00-0.40	10 ³ /uL
BASO	0.02	0.00-0.10	10 ³ /uL
IG	0.03	0.00-7.00	10 ³ /uL
RET	0.26	0.00-99.99	%
IRF	4.6	0.0-100.0	%
LFR	95.1	0.0-100.0	%
MFR	4.9	0.0-100.0	%
HFR	0.0	0.0-100.0	%
RET-He	27.2	0.00-99.9	Pg
PF	6.1	0.00-99.9	%

Tanggal 13/04/2021

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
WBC	2.56	4.0-10.0	10 ³ /uL
LYM	0.84	0.6-3.5	10 ³ /U1
MON	0.47	0.1-0.9	10 ³ /uL
GRA	1.25	1.3-6.7	10 ³ /uL
*LYM	32.7	20.0-40.0	%
*MON	18.2	2.0-8.0	%
*GRA	49.1	50.0-70.0	%
RCB	5.65	3.50-5.50	10 ³ /uL
HGB	13.5	11.0-11.9	g/dL
HTC	40.5	40.0-50.0	%
MCV	71.7	80.0-96.0	fL
MCH	23.9	23.2-38.7	pg
MCHC	33.3	32-37	g/dL

RDW SD	36.9	37.0-54.0	fL
RDW CV	12.8	10.0-18.0	%
PLT	107	150-400	10 ³ /uL
PCT	0.101	0.15-0.50	%
MPV	9.5	6.5-11.0	fL
PDW	16.6	10.0-18.0	fL
P-LCR	24.4	13.0-43.0	%

Tanggal 14/04/2021

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
WBC	3.05	4.0-10.0	10 ³ /uL
LYM	1.92	0.6-3.5	10 ³ /UI
MON	0.39	0.1-0.9	10 ³ /uL
GRA	0.74	1.3-6.7	10 ³ /uL
*LYM	63.0	20.0-40.0	%
*MON	12.9	2.0-8.0	%
*GRA	24.1	50.0-70.0	%
RCB	5.89	3.50-5.50	10 ³ /uL
HGB	14.1	11.0-11.9	g/dL
HTC	42.0	40.0-50.0	%
MCV	71.4	80.0-96.0	fL
MCH	23.9	23.2-38.7	pg
MCHC	33.5	32-37	g/dL
RDW SD	37.5	37.0-54.0	fL
RDW CV	13.0	10.0-18.0	%
PLT	89	150-400	10 ³ /uL
PCT	0.092	0.15-0.50	%
MPV	10.3	6.5-11.0	fL

PDW	17.2	10.0-18.0	fL
P-LCR	31.7	13.0-43.0	%

Tanggal 15/04/2021

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
WBC	4.17	4.0-10.0	10 ³ /uL
LYM	2.46	0.6-3.5	10 ³ /U1
MON	052	0.1-0.9	10 ³ /uL
GRA	1.19	1.3-6.7	10 ³ /uL
*LYM	58.9	20.0-40.0	%
*MON	12.4	2.0-8.0	%
*GRA	28.7	50.0-70.0	%
RCB	5.25	3.50-5.50	10 ³ /uL
HGB	12.5	11.0-11.9	g/dL
HTC	37.6	40.0-50.0	%
MCV	71.6	80.0-96.0	fL
MCH	23.9	23.2-38.7	pg
MCHC	33.3	32-37	g/dL
RDW SD	37.0	37.0-54.0	fL
RDW CV	12.8	10.0-18.0	%
PLT	204	150-400	10 ³ /uL
PCT	0.182	0.15-0.50	%
MPV	8.9	6.5-11.0	fL
PDW	16.8	10.0-18.0	fL
P-LCR	21.8	13.0-43.0	%

Jenis pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
Kimia Darah			
Kreatinin	0.70	L : 0.7-1.1 P 0.6-0.9	mg/dl
Glukosa dalam darah	91	< 200	mg/dl

- A. Foto Rotgen
- B. CT Scan
- C. MRI/US/EEG
- D. Dan lain-lain

XIV. Terapi Saat Ini (Ditulis dengan rinci)

Nama Obat	Dosis	Rute
Ranitidine injeksi	20 mg/ 12 jam	Intravena
Paracetamol infuse	450 mg/8 jam	Intravena
IVFD Ringer Laktat	20 tts/menit	Intra vena

DATA FOKUS

DATA SUNJEKTIF	DATA OBJEKTIF
<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua klien mengatakan anaknya demam sejak 4 hari yang lalu 2. Klien mengatakan suhu tubuhnya tinggi 3. Klien mengatakan suhu tubuh anaknya naik turun 4. Klien mengatakan mual dan muntah 1 kali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien terabah hangat 2. Wajah tampak memerah 3. Klien sesekali meringis 4. Tampak makanan tidak dihabiskan 5. Tampak klien tidak nafsu makan 6. Klien tampak lemah 7. Tampak bintik-bintik pada kedua tangan dan kaki klien 8. TB : 141 Cm

5. Klien mengatakan nafsu makanya menurun	BB : 45 Kg 9. TTV TD : 100/70 mmHg N : 84 x/menit S : 38.9 °C P : 20 x/menit 10. Pemeriksaan Penunjang Leukosit : 2.40 Eritrosit : 5.56 Hematokrit : 41.0 Monosit :18,2 PLT : 91
---	---

ANALISA DATA

NO	SIGN/SIMPION/DATA	ETIOLOGI/PENYEBAB	MASALAH KEPERAWATAN
1.	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua klien mengatakan anaknya demam sejak 4 hari yang lalu 2. Klien mengatakan suhu tubuhnya tinggi 3. Klien mengatakan suhu tubuh anaknya naik turun <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak lemah 2. Klien terabah hangat 3. Wajah tampak memerah 4. TTV <p>TD : 100/70 mmHg N : 84 kali/m S : 38.9 °C P : 20 kali/m</p> <p>4. Pemeriksaan penunjang PLT : 91</p>	<p style="text-align: center;">Arbovirus (mll nyamuk aedes aegypty)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Beredar mll aliran darah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Infeksi virus dengue (viremia)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Proses inflamasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Akti vasi interleukin 1 di hipotalamus</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pengeluaran prostaglandin</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Peningkatan kerja thermostat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Peningkatan suhu tubuh</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Hipertermia</p>	<p>Hipertermi</p>
2.	<p><i>Faktor Resiko :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gangguan koagulasi (mis. trombositopenia) - Efek agen farmakologis <p><i>Kondisi Klinis Terkait :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Trombositopenia 	<p style="text-align: center;">Arbovirus (mll nyamuk aedes aegypty)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Beredar mll aliran darah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Infeksi virus dengue (viremia)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pengaktifan kompleks imun antibodi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Trombosit menurun</p>	<p>Resiko Perdarahan</p>

		<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Trombosit dihancurkan oleh RES</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Trombositopenia</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Kapiler pecah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Petekie pada kulit</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Resiko Perdarahan</p>	
3.	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien mengatakan kurang nafsu makan Klien mengatakan klien mual muntah 1x <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien tampak lemah Terpasang Infus Asering 500 ml 20 tpm TB : 141 cm BB : 45 kg IMT : $22,6 \text{ kg/m}^2$ Normal : $(18,5-25,1) \text{ kg/m}^2$ TD : 100/70 mmHg N : 84 x/menit S : 38.9 °C P : 20 x/menit PLT : 91 	<p style="text-align: center;">Arbovirus (mll nyamuk aedes aegypty)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Beredar mll aliran darah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Infeksi virus dengue (viremia)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Proses Inflamasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pelepasan mediator-mediator kimia</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Histamin mensekresi asam lambung</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Peningkatan asam lambung</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">MK : Anoreksia, mual, muntah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Risiko Defisit Nutrisi</p>	Risiko Defisit Nutrisi

DIAGNOSA KEPERAWATAN

NO	DIAGNOSA KEPERAWATAN
1	Hipertensi
2	Resiko Perdarahan
3	Resiko Defisit Nutrisi



RENCANA TINDAKAN KEPERAWATAN

NAMA KLIEN : An. Z
 UMUR KLIEN : 13 tahun

NO. RM : 324744
 DX. MEDIK : DHF

NO DX	DIAGNOSA KEPERAWATAN	LUARAN KEPERAWATAN	INTERVENSI	RASIONAL
1	Hipertermia	Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 x 24 hipertermia pasien menurun dengan kriteria hasil : - Suhu tubuh dalam batas normal - Kulit merah menurun - Suhu kulit membaik	Manajemen Hipertermia Observasi a. Monitor suhu b. Monitor suhu tubuh anak tiap 2 jam, <i>jika perlu</i> c. Monitor haluaran urine Terapeutik a. (*)Kompres dengan metode tepid water spongr (EBNP) b. Longgarkan atau lepaskan pakaian Edukasi a. Anjurkan tirah baring Kolaborasi a. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, <i>jika perlu</i>	Manajemen Hipertermia Observasi a. Untuk mengetahui suhu tubuh pasien b. Mengetahui rentan waktu suhu tubuh pasien c. Mengetahui pengeluaran urin pasien Terapeutik a. Menurunkan suhu tubuh b. Memberikan rasa nyaman Edukasi a. Mengurangi aktivitas berlebihan Kolaborasi a. Mengganti cairan yang hilang
2	Resiko Perdarahan	Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 x 24 jam tidak ada tanda-tanda	Pencegahan Perdarahan Observasi 1. Monitor tanda dan gejala perdarahan	Pencegahan Perdarahan Observasi 1. Untuk mengetahui tanda dan

		<p>resiko perdarahan dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hemaglobin membaik 2. Hematokrit membaik 3. Tekanan darah membaik 	<p>2. Monitor tanda-tanda vital ortostatik</p> <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hindari tindakan invasif, jika perlu <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tanda dan gejala perdarahan 2. Anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi 	<p>gejala perdarahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengetahui tanda-tanda vital ortostatik <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi resiko perdarahan <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengetahuan tentang tanda dan gejala perdarahan 2. Memenuhi kebutuhan asupan cairan untuk menghindari konstipasi
3	Resiko Defisit Nutrisi	<p>Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam status nutrisi membaik dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Porsi makanan dihabiskan 	<p>Manajemen Nutrisi</p> <p><i>Observasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi status nutrisi. 2. Identifikasi makanan yang disukai 3. Monitor asupan makanan. 	<p>Manajemen Nutrisi</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian penting dilakukan untuk mengetahui status nutrisi pasien sehingga dapat menentukan intervensi yang

		<p>2. Nafsu makan membaik</p>	<p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan oral <i>hygnel</i> sebelum makan <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan posisi duduk. 2. Anjurkan makan sedikit tapi sering <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrient yang dibutuhkan. 	<p>diberikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membantu pasien untuk memenuhi asupan nutrisi 3. untuk mengetahui jumlah yang masuk dan jumlah yang keluar <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mulut yang bersih dapat meningkatkan nafsu makan <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi duduk memberikan pasien perasaan nyaman saat makan <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu pasien untuk memenuhi jumlah nutrisi dalam tubuh
--	--	-------------------------------	---	---

IMPLEMENTASI KEPERAWATAN

NAMA KLIEN : An. Z
UMUR KLIEN : 13 tahun

NO. RM : 324744
DX. MEDIK : DHF

NO DX	HARI/TGL/JAM	IMPLEMENTASI	NAMA JELAS
01.	Selasa, 13 April 2021	Manajemen Hipetermi <i>Observasi :</i> 14.30 1. Identifikasi penyebab hipertemi (mis.dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator). Hasil : Terpapar lingkungan panas. 14.35 2. Monitor suhu tubuh. Hasil : 38,9°C <i>Terapeutik :</i> 14.45 1. Kompres dengan tepid water sponge Hasil : Klien mengatakan merasa nyaman setelah diberikan terapi tepid 14.50 sponge 2. Longgarkan atau lepaskan pakaian. 14.52 Hasil : Klien mengenakan pakaian longgar. 3. Basahi dan kipasi permukaan tubuh. 14.55 Hasil : Menyalakan Ac dalam ruangan pasien.	Reski Matte

		<p>4. Berikan cairan oral.</p> <p>Hasil : Klien menghabiskan $\frac{1}{3}$ dari 1500 ml yang di sediakan dengan cairan infuse yang masuk 500 ml/8 jam</p> <p><i>Edukasi :</i></p> <p>1. Anjuran tirah baring.</p> <p>Hasil: Klien tampak berbaring</p> <p><i>Kolaborasi :</i></p> <p>1. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu.</p> <p>Hasil : Asering 500 ml 20 tpm/8 jam + Paracetamol infuse 450 mg/8 jam</p>	
02	Selasa, 13 April 2021	<p>Pencegahan Perdarahan</p> <p><i>Observasi</i></p> <p>15.10 1. Monitor tanda dan gejala perdarahan</p> <p>Hasil : Tampak bintik-bintik pada kedua tangan dan kaki pasien</p> <p>15.15 2. Monitor tanda-tanda vital ortostatik</p> <p>Hasil : TD : 100/70 mmHg N : 84 x/menit</p> <p>15.16 S : 38.9 °C P : 20 x/menit</p> <p><i>Terapeutik</i></p> <p>1. Hindari tindakan invasif, jika perlu</p>	Reski Matte

	15.18	<p>Hasil : Tidak ada tindakan invasif</p> <p><i>Edukasi</i></p> <p>1. Jelaskan tanda dan gejala perdarahan</p> <p>Hasil : Klien mengerti tanda dan gejala perdarahan</p>	
	15.25	<p>2. Anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi</p> <p>Hasil : Klien minum sedikit tapi sering</p>	
03	Selasa, 13 April 2021	<p>Manajemen Nutrisi</p> <p><i>Observasi :</i></p> <p>15.35 1. Identifikasi status nutrisi.</p> <p>Hasil : Klien mengatakan kurang nafsu makan</p> <p>15.37 IMT : $22,6 \text{ kg/m}^2$ Normal : $(18,5-25,1) \text{ kg/m}^2$</p> <p>2. Identifikasi makanan yang disukai</p> <p>Hasil : klien mengatakan suka memakan bakso namun setelah sakit klien kurang nafsu makan</p> <p>15.40 3. Monitor asupan makanan.</p> <p>Hasil : Klien makan 3x sehari namun dalam 1 porsi hanya menghabiskan $\frac{1}{4}$ dari porsi yang disediakan</p> <p>15.45 <i>Terapeutik</i></p> <p>1. Lakukan oral <i>hygnet</i> sebelum makan</p>	Reski Matte

	15.50	Hasil : klien menyikat gigi sebelum makan <i>Edukasi</i>	
	16.00	1. Anjurkan posisi duduk. Hasil : klien duduk ketika ingin makan 2. Anjurkan makan sedikit tapi sering Hasil : Klien makan sedikit tapi sering <i>Kolaborasi</i> 1. Kolaborasi ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrient yang dibutuhkan. Hasil : klien disediakan nasi box oleh instalazi gizi RS	
01	Rabu, 14 April 2021	Manajemen Hipetermi <i>Observasi :</i> 14.05 1. Identifikasi penyebab hipertemi (mis.dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator). Hasil : Terpapar lingkungan panas. 14.10 2. Monitor suhu tubuh. Hasil : 38,2°C <i>Terapeutik :</i> 14.15 1. Kompres dengan tepid water sponge	Reski Matte

	14.20	<p>Hasil : Klien mengatakan merasa suhu tubuhnya menurun setelah diberikan terapi tepid water sponge</p>	
		2. Sediakan lingkungan yang dingin.	
	14.23	<p>Hasil : Menyediakan lingkungan yang dingin.</p>	
		3. Longgarkan atau lepaskan pakaian.	
		Hasil : Klien mengenakan pakaian longgar.	
	14.27	4. Basahi dan kipasi permukaan tubuh.	
		Hasil : Menyalakan Ac dalam ruangan pasien.	
		5. Berikan cairan oral.	
		Hasil : Ibu klien mengatakan anaknya hanya minum 2 gelas kecil hari ini dengan terpasang cairan asering 500 ml 20 tpm.	
	14.32	<p><i>Edukasi :</i></p>	
		1. Anjuran tirah baring.	
		Hasil: Klien tampak berbaring	
	14.37	<p><i>Kolaborasi :</i></p>	
		1. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu.	
		Hasil : Asering 500 ml 20 tpm.	
		+ Paracetamol infuse 450 mg/8 jam	

02	Rabu, 14 April 2021	<p>Pencegahan Perdarahan</p> <p><i>Observasi</i></p> <p>14.43 1. Monitor tanda dan gejala perdarahan Hasil : Tampak bintik-bintik pada kedua tangan dan kaki pasien</p> <p>14.48 2. Monitor tanda-tanda vital ortostatik Hasil : TD : 100/60 mmHg N : 84 x/menit S : 38,2 °C P : 20 x/menit</p> <p>14.54 <i>Terapeutik</i> 1. Hindari tindakan invasif, jika perlu Hasil : Tidak ada tindakan invasif</p> <p>15.05 <i>Edukasi</i> 1. Anjurkan untuk mengkonsumsi jus jambu biji merah Hasil : Ibu klien mengatakan anaknya sudah mengkonsumsi 1 botol jus jambu biji merah</p> <p>15.10 2. Anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi Hasil : Klien minum sedikit tapi sering</p>	Reski Matte
----	---------------------	--	--------------------

03	Rabu, 14 April 2021	<p>Manajemen Nutrisi</p> <p><i>Observasi :</i></p> <p>15.15 1. Identifikasi status nutrisi. Hasil : klien mengatakan nafsu makannya sudah membaik</p> <p>15.20 2. Identifikasi makanan yang disukai Hasil : klien mengatakan tidak ada makanan khusus yang disukai selama di rawat di RS</p> <p>15.25 3. Monitor asupan makanan. Hasil : Klien makan 3x sehari dan sudah menghabiskan porsi makanannya</p> <p>15.30 <i>Terapeutik</i></p> <p>1. Lakukan oral <i>hygnet</i> sebelum makan Hasil : klien menyikat gigi sebelum makan</p> <p>15.35 <i>Edukasi</i></p> <p>1. Anjurkan posisi duduk. Hasil : klien duduk ketika ingin makan</p> <p>2. Anjurkan makan sedikit tapi sering Hasil : Klien makan sedikit tapi sering</p>	Reski Matte
----	---------------------	--	--------------------

	15.40	<p><i>Kolaborasi</i></p> <p>1. Kolaborasi ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrient yang dibutuhkan.</p> <p>Hasil : klien disediakan nasi box oleh instalasi gizi rumah sakit</p>	
01	<p>Kamis, 15 April 2021</p> <p>19. 45</p> <p>19. 50</p> <p>19. 55</p> <p>19. 60</p> <p>20. 05</p> <p>20.10</p>	<p>Manajemen Hipertermi</p> <p><i>Observasi :</i></p> <p>1. Identifikasi penyebab hipertemi (mis.dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator).</p> <p>Hasil : Terpapar lingkungan panas.</p> <p>2. Monitor suhu tubuh.</p> <p>Hasil : 37.4°C</p> <p><i>Terapeutik :</i></p> <p>1. Kompres dengan tepid water sponge</p> <p>Hasil : Klien mengatakan merasa suhu tubuhnya menurun dan merasa nyaman setelah diberikan terapi tepid water sponge</p> <p>2. Sediakan lingkungan yang dingin.</p> <p>Hasil : Menyediakan lingkungan yang dingin.</p> <p>3. Longgarkan atau lepaskan pakaian.</p> <p>Hasil : Klien mengenakan pakaian longgar.</p>	Reski Matte

	<p>20.15</p> <p>20.20</p>	<p>4. Basahi dan kipasi permukaan tubuh. Hasil : Menyalakan Ac dalam ruangan pasien.</p> <p>5. Berikan cairan oral. Hasil :Klien dianjurkan perbanyak minum air putih.</p> <p><i>Edukasi :</i></p> <p>1. Anjuran tirah baring. Hasil: Klien tampak berbaring</p> <p><i>Kolaborasi :</i></p> <p>1. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu. Hasil : Asering 500 ml 20 tpm.</p>	
02	<p>Kamis, 15 April 2021</p> <p>20.24</p> <p>20.28</p> <p>20.34</p>	<p>Pencegahan Perdarahan <i>Observasi</i></p> <p>1. Monitor tanda dan gejala perdarahan Hasil : Tampak bintik-bintik pada kedua tangan dan kaki pasien</p> <p>2. Monitor tanda-tanda vital ortostatik Hasil : TD : 100/80 mmHg N : 80 x/menit S : 37.4 °C</p>	Reski Matte

		<p>P : 20 x/menit</p> <p>20.39 <i>Terapeutik</i></p> <p>1. Hindari tindakan invasif, jika perlu Hasil : Tidak ada tindakan invasif</p> <p>20.46 <i>Edukasi</i></p> <p>1. Anjurkan untuk mengkonsumsi jus jambu biji Hasil : Ibu klien mengatakan anaknya sudah mengkonsumsi jus jambu biji merah</p> <p>20.53 2. Anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi Hasil : Klien minum sedikit tapi sering</p> <p>20.59</p>	
03	Kamis 15 April 2021	<p>Manajemen Nutrisi</p> <p><i>Observasi :</i></p> <p>21.05 1. Identifikasi status nutrisi. Hasil : klien mengatakan nafsu makannya membaik</p> <p>21.10 2. Identifikasi makanan yang disukai Hasil : klien mengatakan tidak ada makanan khusus yang disukai selama di rawat di RS</p> <p>3. Monitor asupan makanan.</p>	Reski Matte

		<p>Hasil : Klien makan 3x sehari dan sudah menghabiskan porsi makanannya</p>	
	21.15	<p><i>Terapeutik</i></p> <p>1. Lakukan oral <i>hygnet</i> sebelum makan</p> <p>Hasil : klien menyikat gigi sebelum makan</p>	
	21.20	<p><i>Edukasi</i></p> <p>1. Anjurkan posisi duduk.</p> <p>Hasil : klien duduk ketika ingin makan</p> <p>2. Anjurkan makan sedikit tapi sering</p>	
	21.38	<p>Hasil : Klien makan sedikit tapi sering</p>	
	21.43	<p><i>Kolaborasi</i></p> <p>1. Kolaborasi ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrient yang dibutuhkan.</p> <p>Hasil : klien disediakan nasi box oleh instalasi gizi rumah sakit</p>	

EVALUASI KEPERAWATAN

NAMA KLIEN : An. Z
 UMUR KLIEN : 13 tahun

NO. RM : 324744
 DX. MEDIK : DHF

NO. DX	HARI/TGL/JAM	EVALUASI (SOAP)	NAMA JELAS
01	Selasa, 13 April 2021 18.15 WITA	S : Klien mengatakan masih merasa panas O : Klien tampak gelisah TTV : TD : 100/80 N : 89 x/i P : 20 x/i S : 38,6°C A : Hipertermi belum teratasi P : Lanjutkan intervensi Manajemen Hipertermi <i>Observasi :</i> 1. Identifikasi penyebab hipertemi (mis.dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator). 2. Monitor suhu tubuh. <i>Terapeutik :</i> 1. Kompres dengan metode tepid water sponge 2. Sediakan lingkungan yang dingin. 3. Longgarkan atau lepaskan pakaian.	Reski Matte

		<p>4. Basahi dan kipasi permukaan tubuh.</p> <p>5. Berikan cairan oral.</p> <p>6. Lakukan pendinginan eksternal (mis. Selimut hipotermia atau kompres pada dahi, leher, dada, abdomen, aksila).</p> <p><i>Edukasi :</i></p> <p>1. Anjuran tirah baring.</p> <p><i>Kolaborasi :</i></p> <p>1. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu.</p>	
02	Selasa, 14 April 2021 18.40 WITA	<p>S : Orang tua klien mengatakan terdapat bintik-bintik pada kedua tangan anaknya</p> <p>O : Klien tampak gelisah TTV : TD : 100/80 N : 89 x/i P : 20 x/i S : 38,6 °C</p> <p>A : Resiko perdarahan belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <p>Pencegahan Perdarahan</p> <p><i>Observasi</i></p> <p>1. Monitor tanda dan gejala perdarahan</p> <p>2. Monitor tanda-tanda vital ortostatik</p> <p><i>Terapeutik</i></p>	Reski Matte

		<p>1. Hindari tindakan invasif, jika perlu</p> <p><i>Edukasi</i></p> <p>1. Jelaskan tanda dan gejala perdarahan</p> <p>Anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi</p>	
03	Selasa, 13 April 2021 18.58 WITA	<p>S : Klien mengatakan masih kurang nafsu makan</p> <p>O : Klien tampak lemah porsi makan tidak di habiskan</p> <p>A : Risiko Defisit nutrisi belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <p>Manajemen Nutrisi</p> <p><i>Observasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi status nutrisi. 2. Identifikasi makanan yang disukai 3. Monitor asupan makanan. <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan oral <i>hygnet</i> sebelum makan <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan posisi duduk. 2. Anjurkan makan sedikit tapi sering <p><i>Kolaborasi</i></p>	Reski Matte

		1. Kolaborasi ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrient yang dibutuhkan.	
01	Rabu, 14 April 2021 16.00 WITA	<p>S : Klien mengatakan masih merasa demam</p> <p>O : Klien tampak gelisah</p> <p>TTV : TD : 110/80 N : 93 x/i P : 20 x/i S : 37,8 °C</p> <p>A : Hipertermi belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <p>Manajemen Hipertermi</p> <p><i>Observasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi penyebab hipertemi (mis.dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator). 2. Monitor suhu tubuh. <p><i>Terapeutik :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompres dengan metode tepid water sponge 2. Sediakan lingkungan yang dingin. 3. Longgarkan atau lepaskan pakaian. 4. Basahi dan kipasi permukaan tubuh. 5. Berikan cairan oral. 	Reski Matte

		<p>6. Lakukan pendinginan eksternal (mis. Selimut hipotermia atau kompres pada dahi, leher, dada, abdomen, aksila).</p> <p><i>Edukasi :</i></p> <p>2. Anjuran tirah baring.</p> <p><i>Kolaborasi :</i></p> <p>Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu</p>	
02	Rabu, 15 April 2021 16.15 WITA	<p>S : Orang tua klien mengatakan bintik-bintik pada kedua tangan anaknya mulai berkurang</p> <p>O : Klien tampak tenang</p> <p>TTV : TD : 110/80 N : 93 x/i P : 20 x/i S : 37,8 °C</p> <p>A : Resiko perdarahan mulai teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <p>Pencegahan Perdarahan</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor tanda dan gejala perdarahan 2. Monitor tanda-tanda vital ortostatik <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hindari tindakan invasif, jika perlu 	Reski Matte

		<p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan mengkonsumsi jus jambu biji merah 2. Anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi 	
03	Rabu, 14 April 2021 16.25 WITA	<p>S : Klien mengatakan nafsu makannya meningkat</p> <p>O : Klien tampak menghabiskan porsi makannya</p> <p>A : Risiko Defisit nutrisi mulai teratasi</p> <p>P : Pertahankan intervensi</p> <p>Manajemen Nutrisi</p> <p><i>Observasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi status nutrisi. 2. Identifikasi makanan yang disukai 3. Monitor asupan makanan. <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan oral <i>hygnet</i> sebelum makan <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan posisi duduk. <p><i>Kolaborasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien 	Reski Matte

01	Kamis,15 April 2021 22.00 WITA	<p>S : Klien mengatakan sudah tidak merasa demam</p> <p>O : Klien tampak membaik</p> <p>TTV: TD : 100/70 mmhg N : 90 x/i</p> <p>P : 21 x/i S : 36,5°C</p> <p>A : Hipertermi teratasi</p> <p>P : Pertahankan intervensi</p> <p>Manajemen Hipertermi</p> <p><i>Observasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi penyebab hipertemi (mis.dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator). 2. Monitor suhu tubuh. <p><i>Terapeutik :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompres dengan metode tepid water sponge 2. Sediakan lingkungan yang dingin. 3. Berikan cairan oral. <p><i>Edukasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjuran tirah baring. <p><i>Kolaborasi :</i></p> <p>Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu.</p>	Reski Matte
----	-----------------------------------	--	--------------------

02	Kamis,15 April 2021 22.12 WITA	<p>S : Orang tua klien mengatakan sudah tidak terdapat bintik-bintik pada kedua tangan anaknya</p> <p>O : Klien tampak tenang TTV: TD : 100/70 mmhg N : 90 x/i P : 21 x/i S : 36,5°C</p> <p>A : Resiko perdarahan teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <p>Pencegahan Perdarahan</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor tanda dan gejala perdarahan 2. Monitor tanda-tanda vital ortostatik <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hindari tindakan invasif, jika perlu <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tanda dan gejala perdarahan Anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi 	Reski Matte
03	Kamis,15 April 2021 22.21 WITA	<p>S : Klien mengatakan nafsu makannya meningkat</p> <p>O : Klien tampak menghabiskan porsi makannya</p> <p>A : Risiko Defisit nutrisi teratasi</p>	Reski Matte

	<p>P : Pertahankan intervensi</p> <p>Manajemen Nutrisi</p> <p><i>Observasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Identifikasi status nutrisi.2. Identifikasi makanan yang disukai3. Monitor asupan makanan. <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Lakukan oral <i>hygnel</i> sebelum makan <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Anjurkan posisi duduk. <p><i>Kolaborasi</i></p> <p>Kolaborasi ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrient yang dibutuhkan.</p>	
--	--	--

HASIL INTERVENSI DAN EVALUASI TERAPI TEPID WAER SPONGE

NO	Hari/Tanggal	Sebelum Terapi Tepid Water Sponge	Setelah Terapi Tepid Water Sponge	Nilai Selisi Pre – Post Terapi Tepid Water Sponge
1	Selasa 13 April 2021	38.9 °C	38.6 °C	0,3°C
2	Rabu 14 April 2021	38.2 °C	37.8 °C	0,4°C
3	Kamis 15 April 2021	37.4 °C	36.5 °C	0,9°C



BAB IV PEMBAHASAN

A. ANALISIS KASUS

Setelah dilakukan implementasi dan evaluasi keperawatan didapatkan hasil dari implementasi hari pertama dimana sebelum diberikan terapi *tepid water sponge* dilakukan pengukuran suhu dengan hasil 38,9°C sedangkan setelah dilakukan evaluasi dan dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan hasil 38,6 °C. Hari kedua dilakukan pengukuran suhu tubuh sebelum diberikan terapi *tepid water sponge* dengan hasil 38,2°C setelah dilakukan pemberian terapi *tepid water sponge* kemudian di evaluasi pengukuran suhu tubuh dengan hasil 37,8 °C dan hari ke tiga sebelum pemberian terapi *tepid water sponge* terlebih dahulu dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan hasil 37,4°C dan setelah dilakukan terapi *tepid water sponge* didapatkan hasil 36,5°C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi *tepid water sponge* efektif dalam menurunkan suhu tubuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi *tepid water sponge* efektif dalam menurunkan suhu tubuh. Hal ini di karenakan *tepid water sponge* dapat mempercepat vasodilatasi pembuluh darah feriver diseluruh tubuh sehingga pengeluaran panas dari tubuh melalui kulit lebih cepat, selain itu terapi *tepid water sponge* lebih cepat memberikan rangsangan atau sinyal ke hipotalamus melalui sumsum tulang belakang. (Potter, 2012).

Faktor lain yang memungkinkan seseorang mengalami penyakit *dengue hemorrhagic fever* adalah faktor lingkungan. Sejalan dengan hasil studi yang dilakukan (Embong, 2019) mengatakan bahwa kondisi lingkungan yang sangat mempengaruhi terhadap kejadian penyakit DBD tentunya berkaitan dengan keberadaan jentik nyamuk *Aedes* sp yang berasal dari jentik *Aedes Aegypty* dan *Aedes abopictus* sebagai vector yang berada dilingkungan. .

Kondisi ini telah disampaikan dalam Al-Qur'an :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

“Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah swt memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)” (QS: Asy-shura:30)

Keluhan utama yang di sampaikan oleh pasien adalah demam, demam atau hipertermia merupakan suatu keadaan suhu tubuh diatas normal sebagai akibat peningkatan pusat pengatur suhu di hipotalamus (Wardiyah et al, 2016). Sedangkan menurut (Sodikin, 2012) hipertermi adalah peningkatan suhu tubuh diatas rentang normal yang tidak teratur disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan pembatasan panas.

Diagnosis keperawatan utama pada kasus ini adalah hipertermia. Masalah ini didapatkan pada saat selesai dilakukan pengkajian pada pasien saat di rawat di ruang baji minasa dengan data orang tua klien mengatakan anaknya demam tinggi sejak 4 hari yang lalu, klien mengatakan suhu tubuhnya tinggi, suhu tubuhnya mengalami kenaikan dan penurunan, klien terabach hangat, saat dilakukan pengukuran suhu tubuh didapatkan nilai 38,9°C. Hal ini sejalan dengan (Mumpuni, 2016). mengatakan penyakit *dengue hemorrhagic fever* bisa mengalami hipertermi yang diakibatkan oleh virus *dengue* yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamukdari *genud Aedes*. Masuknya virus *dengue* ke dalam tubuh akan mengakibatkan terjadinya aktivasi kompleks. Akibat aktivtasi kompleks, maka di lepakan anafilaktosit C3a dan C5a yang berdaya membebaskan histamine sebagai mediator kuat dalam peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah dan berperan dalam terjadinya renjatan (Sulsilaningrum, 2013).

B. Analisis Intervensi

Tindakan keperawatan utama yang diberikan pada diagnosis hipertermi adalah dengan pemberian terapi *tepid water sponge*. Sejalan

dengan (Putri, 2019) dari dengan hasil penelitiannya mengatakan terapi *tepid water sponge* lebih efektif dalam menurunkan suhu tubuh anak dengan demam dibandingkan dengan kompres air hangat. Hal ini disebabkan adanya seka tubuh pada teknik tersebut akan mempercepat vasodilatasi pembuluh darah perifer disekujur tubh sehingga evaporasi panas dari kulit ke lingkungan sekitar akan lebih cepat dibandingkan dengan hasil yang diberikan oleh kompres air hangat yang hanya mengandalkan reaksi dari stimulasi hipotalamu.

Intervensi terapi *tepid water sponge* ini tidak berjalan sendiri, kolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya juga dilakukan seperti pemberian obat untuk mengatasi hipertermi yang dialami pasien.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadits :

“Janganlah engkau mencela demam. Karena demam itu dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan manusia sebagaimana dalam kiir (alat pandai besi) dapat menghilangkan karat besi.” (HR. Muslim)

C. Alternatif Pemecahan Masalah (memberikan alternatif selain intervensi utama berbasis EBN)

Tindakan utama yang diberikan pada diagnosis hipertermia berbasis EBN adalah *tepid water sponge*. Sejalan dengan penelitian (Suntari, ddk.,, 2019) mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara terapi *tepid water sponge* dengan terapi kompres hangat dengan hasil terapi *tepid water sponge* memberikan penurunan suhu tubuh sebesar 0,993°C sedangkan kompres hangat hanya memberikan penurunan sebesar 0,5°C sehingga *tepid water sponge* efektif untuk menurunkan suhu tubuh dibandingkan dengan kompres hangat. Menurut dari hasil penelitian (Fatihrizky, 2020) mengatakan terapi pemberian *tepid water sponge* lebih efektif dibandingkan dengan terapi kompres bawang merah dengan hasil pemberian *tepid water sponge* didapatkan nilai selisi 0,8250 °C dibandingkan dengan terapi bawang merah hanya 0, 7750°C.

Satu hal yang dapat memotivasi kita untuk terus berusaha mencari kesembuhan dari sebuah penyakit adalah adanya jaminan dari Allah *Ta'ala*

bahwa setiap penyakit yang menimpa hambanya pasti ada obatnya.

Rasulullah Saw bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Terjemahnya:

“ *Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut* ” (H.R. Bukhari)

Hadits ini menunjukkan bahwa seluruh jenis penyakit, memiliki obat yang dapat digunakan untuk mencegah, menyembuhkan, ataupun untuk meringankan penyakit tersebut. Hadits ini juga mengandung dorongan untuk mempelajari pengobatan penyakit-penyakit badan sebagaimana kita mempelajari obat untuk penyakit-penyakit hati. Karena Allah *Ta'ala* telah menjelaskan kepada kita bahwa seluruh jenis penyakit memiliki obat, sehingga kita hendaknya berusaha mempelajari dan kemudian mempraktikkannya.

Setelah dilakukan implementasi dan evaluasi keperawatan didapatkan hasil dari implementasi hari pertama dimana sebelum diberikan terapi *tepid water sponge* dilakukan pengukuran suhu dengan hasil 38,9°C sedangkan setelah dilakukan evaluasi dan dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan hasil 38,6 °C. Hari kedua dilakukan pengukuran suhu tubuh sebelum diberikan terapi *tepid water sponge* dengan hasil 38,2°C setelah dilakukan pemberian terapi *tepid water sponge* kemudian di evaluasi pengukuran suhu tubuh dengan hasil 37,8 °C dan hari ke tiga sebelum pemberian terapi *tepid water sponge* terlebih dahulu dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan hasil 37,4°C dan setelah dilakukan terapi *tepid water sponge* didapatkan hasil 36,5°C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi *tepid water sponge* efektif dalam menurunkan suhu tubuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi *tepid water sponge* efektif dalam menurunkan suhu tubuh. Hal ini di karenakan *tepid water sponge* dapat mempercepat vasodilatasi pembuluh darah feriver diseluruh tubuh sehingga pengeluaran panas dari tubuh melalui kulit lebih cepat, selain itu terapi *tepid*

water sponge lebih cepat memberikan rangsangan atau sinyal ke hipotalamus melalui sumsum tulang belakang. (Potter, 2012). Intervensi pemberian terapi *tepid water sponge* dapat dilakukan oleh keluarga dalam menurunkan suhu tubuh anak dan dapat dilakukan dirumah dalam hal penanganan pertama hipertermi di rumah dengan memperhatikan kontraindikasi dari pemberian terapi *tepid water sponge* tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemberian *terapi tepid water sponge* pada pasien *dengue hemorrhagic fever* dengan masalah hipertermi maka masalah-masalah yang ada pada pasien teratasi seperti :

1. Hipertermi yang dilakukan pemberian terapi *terapi tepid water sponge* dan melonggarkan pakaian, maka masalah teratasi dengan suhu tubuh sebelum diberikan terapi *tepid water sponge* 38,9 °C menurun menjadi 36,5 °C dalam kurung waktu 3 x 24 jam pemberian. maka dapat disimpulkan tindakan implementasi yang dilakukan berhasil memperbaiki keadaan klien dan mengatasi masalah yang pada klien

B. Saran

1. Bagi Profesi Keperawatan karya akhir ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi non farmakologi
2. Bagi Pelayanan Rumah Sakit karya akhir ini menjadi masukan bagi bidang keperawatan dan para perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien epidural hematoma post op dengan masalah hipertermi dan melihat keefektifan pemberian kompres hangat dalam mengatasi hipertermi atau peningkatan suhu tubuh
3. Bagi Institusi Pendidikan Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien

dengue hemorrhagic fever (DHF). Perlu dilakukannya penelitian yang lebih lanjut dengan kasus yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Desmawati. (2013). *Sistem Hematologi dan Imonologi*. Edited bu D. Juliastuti. Jakarta : Penerbit In Media.
- Embong, N. B & Sudarmaja, I. M. (2019). *Pengaruh Suhu Terhadap Angka Penetasan Telur Aedes Aegypti*. E-Jurnal Med 5, 1-8.
- Hidayati, (2014). *Perbandingan Efektivitas Pemberisn Komprs Hangan dan Tepid Water Sponge Terhadap Penurunn Suhu Tubuh Anak Yang Mengalami Demam di Ruang Alamanda RSUD dr. H. Abdul Moelel*.
- Kahinedan, V.a, & Gobel, I. (2017). *Studi Penatalaksanaan Tindakan Keperawatan Pada Pasien Hipertermi di Ruang Rawat Inap Blud RSD Liun Kendange Tahuna*. 7 (Juli), 64-68.
- Kemenkes RI.(2017). *Profil Kesehatan Indonesia 2016*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia 2016*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Marni. (2016). *Asuhan Keperawatan Anak Pada Penyakit Tropis*. Semarang : Erlangga.
- Nurarif .A.H & Kusuma.H (2015). *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diaognosa Medis & NANDA NIC-NOC*. Jogjakarta : Media Action
- Ngastiyah. (2014). *Perawatan Anak Sakit Edisi 2*. Jakarta: EGC
- Primisasiki, R.J. (2013). *Mengenal Penyakit – Penyakit Balita Dan Anak*. Klaten : Sunda Kelapa Pustaka.
- Perry, A. G. & Potter, P. A. (2012). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses dan Praktik Edisi 2*. Jakarta : EGC.
- Poter, Patricia, A., & Perry,. A. G. (2012). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan*. 4th end.Jakatra : ECG.
- Putri, Hediya, Riska. Dkk. (2020) *Differences in the Effectuviness of Warn Compresses with Water Tepid Sponge in Reducing Fever In Children A Study Using a Quasi-Experimental Approach*
- Ranjit S & Kisson N. (2011). *Dengue Hemorrhagic Fever and Syock Syndromes* *Pediatric Care Med*. 12(1):90-100.

- Ridha & Hilda. (2019). *Pengaruh Pelaksanaan SOP Perawat terhadap Tingkat Kecemasan Pasien*. 3(23), 84-96.
- Soegijanto. S. (2013). *Demam Berdarah Dengue :Tinjauan Dan Temuan Baru Di Era 2003*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Soedarto. (2012). *Demam Berdarah Dengue Dengue Hemorrhagic Fever*. Jakarta : Sungeng Seto.
- Suntari, Yuniarti, Dkk. (2019). *Pengaturan Suhu Tubuh Dengan Metode Tepid Water Sponge Dan Kompres Hangat Pada Balita Demam*.
- Sodikin. (2012). *Prinsip Perawatan Demam Pada Anak*. Jakarta : ECG
- Rifaldi, Ibnu, Dkk. (2020). *Efektivitas Pemberian Kompres Tepid Water Sponge dan Pemberian Kompres Bawang Merah Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Anak Demam di Banjarmasin, Kalimantan Selatan*.
- Sulsilaningrum, R. (2013). *Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak*. Jakarta : Salemba Medika.
- PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Indikator Diagnostik, Edisi 1*. Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Tindakan Keperawatan, Edisi 1*. Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI. (2018). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Kriteria Hasil Keperawatan, Edisi 1*. Jakarta: DPP PPNI.
- World Health Organization (WHO). 2015. *Penyakit Demam Berdarah Dengue dan Demam Berdarah Dengue*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Wardiyah , A., Setiawati & Romayati, U. (2016). *Perbandingan Efektivitas Pemberian Kompres Hangat Dan Tepid Water Sponge Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Anak Yang Mengalami Demam Di Ruang Alamanda RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2015*, Holistik Jurnal Kesehatan. 10 (1) : 36-44.

L

A

M


P

I

R

A

N



1. Jurnal Rujukan

Jurnal Kesehatan
Volume 10, Nomor 1, April 2019
ISSN 2086-7751 (Print), ISSN 2548-5695 (Online)
<http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK>

Pengaturan Suhu Tubuh dengan Metode *Tepid Water Sponge* dan Kompres Hangat pada Balita Demam

NLP Yunianti Suntari C¹, Putu Susy Natha Astini², Ni Made Desi Sugiani³

^{1,2,3}Jurusan Keperawatan, Politeknik Kesehatan Denpasar, Indonesia
Email: yuni.suntari@yahoo.com

Abstract: Control The Body Temperature with Tepid Water Sponge and Warm Compress Method for Children Under Five Years having a Fever. Fever is a condition of an increase in body temperature. High fever can cause many complications. The purpose of this research was to know the difference of effectiveness of tepid water sponge and warm compress method to control the body in children under five years having a fever. This research was used quasi-experimental design and non-equivalent control group design. The number of samples in each group was 30 people selected by consecutive sampling technique. The result of the average temperature drop in the tepid water sponge group was 0,993°C, while the average temperature drop in the warm compress group was 0,54°C. The result of this research was used paired-samples t-test and independent-samples t-test and obtained p-value=0,0001 (p<0,05). There was a difference of effectiveness of tepid water sponge and warm compress method to control the body temperature in children under five years with fever at Puskesmas Abiansemal I and Puskesmas Mengwi I Year 2018.

Keywords: Compress, Fever, Tepid water sponge

Abstrak: Pengaturan Suhu Tubuh dengan Metode Tepid Water Sponge dan Kompres Hangat pada Balita Demam. Demam merupakan kondisi terjadinya kenaikan suhu tubuh. Demam tinggi dapat menimbulkan banyak komplikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan efektivitas metode *tepid water sponge* dan kompres hangat terhadap pengaturan suhu tubuh pada anak usia balita dengan demam. Jenis penelitian ini menggunakan *quasi experimental design* dengan rancangan *Non-equivalent Control Group Design*. Jumlah sampel pada masing-masing kelompok yaitu 30 orang yang dipilih dengan teknik *Consecutive Sampling*. Hasil analisis rata-rata penurunan suhu pada kelompok *tepid water sponge* yaitu 0,993°C, sedangkan pada kelompok kompres hangat yaitu 0,54°C. Hasil penelitian diuji dengan *paired-samples t-test* dan *independent-samples t-test* didapatkan hasil p=0,0001 (p<0,05). Ada perbedaan efektivitas metode *tepid water sponge* dan kompres hangat terhadap pengaturan suhu tubuh pada anak usia balita dengan demam.

Kata kunci: Kompres, Demam, Tepid water sponge


PENDAHULUAN

Demam merupakan kondisi terjadinya kenaikan suhu tubuh hingga >37,5°C. Ikatan Dokter Anak Indonesia menetapkan suhu tubuh normal untuk anak berkisar antara 36,5°C sampai 37,5°C (Setiawati, 2009). Pada demam tinggi dapat terjadi alkalosis respiratorik, asidosis metabolik, kerusakan hati, kelainan EKG, dan berkurangnya aliran darah otak. Dampak lain yang dapat ditimbulkan jika demam tidak ditangani maka akan dapat menyebabkan kerusakan otak, hiperpireksia yang akan menyebabkan syok, epilepsi, retardasi mental atau ketidakmampuan belajar (Ganong, 2002).

Di Bali, penyakit yang didahului dengan demam yang sering terjadi yaitu demam berdarah

dengue, ISPA, penyakit paru, demam *typhoid*, dan *paratyphoid*. Penyakit tersebut merupakan bagian dari pola sepuluh besar penyakit pada pasien di Puskesmas dan RSUD Bali (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2016). Pada tahun 2015 kasus demam berdarah dengue berjumlah 10.704 kasus, meningkat pada tahun 2016 berjumlah 21.668 kasus, dan mengalami penurunan pada tahun 2017 berjumlah 3.986 kasus (Dinas Kesehatan Provinsi Bali). Badung merupakan kabupaten di Bali dengan jumlah kasus demam tertinggi ketiga pada tahun 2017. Kasus demam di Puskesmas Abiansemal I Badung tahun 2017 sebanyak 861 kasus, sedangkan di Puskesmas Mengwi I Gianyar tahun 2017 sebanyak 955 kasus.

2. Penyimpangan KDM



3. Riwayat Hidup



Reski Matte, lahir di Bulueng pada tanggal 16 April 1996. Penulis merupakan anak ke dua yang dilahirkan dari pasangan Bapak **Matte** dan Ibu **Saribulan**.

Penulis yang akrabnya di panggil **Egi** ini mengawali pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2002 di SDN 65 Pattiro dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Boro pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Kesehatan Primanegara Jeneponto pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Setelah itu di tahun yang sama penulis memasuki bangku kuliah di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, tepatnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Ilmu Keperawatan dan lulus dengan gelar S.Kep kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang profesi di Perguruan Tinggi yang sama. Syukur Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT, perjuangan keras dan disertai iringan doa dari kedua orang tua, keluarga serta rekan-rekan yang dapat membantu penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun skripsi yang berjudul “Intervensi *tepid water sponge* pada anak yang mengalami DHF dengan masalah Hipertermi ”.

Penulis tidak begitu banyak aktif di organisasi, pada masa MTs penulis hanya bergabung di organisasi Pramuka. Selanjutnya pada masa SMA penulis bergabung di organisasi Pramuka. Saat di perguruan tinggi penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kemudian bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan UIN Alauddin Makassar sebagai anggota Divisi Bakat dan Minat periode 2015-2016, kemudian setelah itu menjabat sebagai anggota Divisi Bakat dan Minat HMJ Keperawatan periode 2016-2017.