

**IMPLEMENTASI HEAD UP 30⁰ PADA AN R DENGAN
DIAGNOSIS TRAUMA BRAIN INJURY DENGAN MASALAH
KEPERAWATAN PENURUNAN KAPASITAS ADAPTIF
INTRACRANIAL DI RUANGAN INTENSIF CARE UNIT (ICU)
RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners


Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan Pada Fakultas
Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Aalauddin Makassar

Oleh :

RESKY AULIYAH INSANI B, S.Kep
NIM : 70900120010

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2020/2021**

**IMPLEMENTASI POSISI HEAD UP 30⁰ PADA AN R DENGAN
DIAGNOSIS TRAUMA BRAIN INJURY DENGAN MASALAH
KEPERAWATAN PENURUNAN KAPASITAS ADAPTIF
INTRACRANIAL DI RUANGAN INTENSIF CARE UNIT (ICU)
RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Oleh :

RESKY AULIYAH INSANI B, S.Kep
NIM : 70900120010

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2020/2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resky Auliyah Insani B, S. Kep

NIM : 70900120010

Tempat/Tgl, Lahir : Ujung Pandang, 04 Agustus 1998

Jurusan : Profesi Ners

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Mannuruki 2

Judul : Implementasi posisi *head up* 30° pada An R dengan diagnosis trauma *brain injury* dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intracranial di ruangan Intensif Care Unit (ICU) RSUD Labuang Baji

Dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tugas akhir ini benar adalah hasil karya tulis ilmiah penyusunan sendiri. Jika di kemudian hari tugas akhir ini adalah duplikat, plagiat, tiruan dari hasil kerja orang lain, maka karya tulis dan gelar yang diperoleh tidak sah/batal dimata hukum.

Makassar, 15 Julil 2021

Penyusun

RESKY AULIYAH INSANI B

NIM:70900120010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Nama: Resky Auliyah Insani B NIM: 70900120010, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Implementasi posisi *head up* 30° pada An R dengan diagnosis trauma *brain injury* dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intracranial di ruangan Intesif Care Unit (ICU) RSUD Labuang Baji”, memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 15 Juli 2021



Ilhamsyah, S.Kep.,Ns.,M.Kep

Pembimbing I



Andi Budiyanto, S.Kep.,Ns.,M.Kep

Pembimbing II

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas akhir Ners yang berjudul "Implementasi *Head Up 30°* Pada An R Dengan Diagnosis *Trauma Brain Injury* Dengan Masalah Keperawatan Penurunan Kapasitas Adaptif *Intracranial* Di Ruang *Intensif Care Unit (ICU)* RSUD Labuang Baji Makassar" yang disusun oleh, **Resky Auliyah Insani B, S.Kep NIM : 70900120010**, Mahasiswa Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis dan tanggal 15 juli 2021 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam Program Studi Profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 15 Juli 2021 M
5 Zulhijah 1442 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes (.....)

Sekretaris : Dr. Patimah, S.Kep., Ns., M.Kep (.....)

Munaqisy I : Nurul Khusnul Khotimah, S.Kep., Ns., M.Kep (.....)

Munaqisy II : Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I (.....)

Pembimbing I : Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kep (.....)

Pembimbing II: Andi Budianto, S.Kep., Ns., M.Kep (.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP:198007012006042002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt. atas berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan judul “Implementasi Posisi *Head Up 30⁰* Pada An R dengan Diagnosis Trauma *Brain Injury* dengan Masalah Keperawatan Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial di Ruang Intensif Care Unit (ICU) RSUD Labuang Baji Makassar” dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang sampai sekarang ini.

Tujuan penyusunan KTI ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program Profesi *Ners* pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2020/2021.

Dengan terselesaikannya penulisan KTI ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan KTI ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta, terkasih, tersayang, serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai cita. Ayahanda tercinta Bakri dan Ibunda tercinta Samsinah atas kasih sayang, do'a dan dukungan semangat serta moril dan materinya, sehingga penulis dapat berada ditahap ini, meraih gelar *ners*. Untuk segenap keluarga besar khususnya saudara kandung

Riska, Dony dan Dadang yang telah memberikan kasih sayang dan memberikan dukungan dalam menghadapi tantangan selama menyelesaikan studi.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
3. Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku ketua prodi profesi *ners* dan Hj Sysnawati., S.Kep.,Ns.,M.Kep, Sp.Kep.J selaku sekretaris prodi profesi *ners* beserta dosen-dosen pengajar yang tidak bosan-bosannya memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Prodi Profesi *Ners* yang telah membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan skripsi.
4. Ilhamsyah., S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Pembimbing I dan Andi Budiyanto, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku pembimbing II,yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

5. Nurul Khusnul Khotimah, S.Kep., Ns., M.Kep selaku Penguji I dan Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag selaku Penguji II yang sabar dan ihlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang berkualitas
6. Kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Profesi *Ners* Angkatan XVII yang telah menemani dari awal perkuliahan sampai sekarang.
7. Kepada teman-teman Bergerak, Supiani Yamlean, Sinarwati, Rina Nur Insani, Nurhudaya Fauziah, Putri Yuniar, Megawati Yunus dan Dinasari yang telah menemani, menyemangati dan membantu penulis selama perkuliahan sampai sekarang

Disamping itu, penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon do'a semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian di masyarakat nantiya.

Samata, 15 Juli 2021

Penulis,

Resky Auliyah Insani B

NIM: 70900120010

ABSTRACT

Nama : Resky Auliyah Insani B

NIM : 70900120010

Judul : Implementasi posisi *head up* 30° pada An R dengan diagnosis trauma *brain injury* dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intracranial di ruangan Intesif Care Unit (ICU) RSUD Labuang Baji

Latar Belakang: Cedera kepala merupakan suatu gangguan traumatik dari fungsi otak yang disertai atau tanpa disertai perdarahan interstisial dalam substansi otak tanpa diikuti terputusnya kontinuitas otak. Pada tahun 2014 di Amerika Serikat cedera kepala yang diakibatkan oleh kejadian jatuh yang tidak disengaja memiliki prevalensi tertinggi yaitu 52,3%, sedangkan cedera kepala yang diakibatkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor memiliki prevalensi 20,4% dari total keseluruhan pasien rawat inap dengan diagnosa cedera kepala. Menurut Riskesdas 2018, prevalensi kejadian cedera kepala di Indonesia berada pada angka 11,9%. Kejadian cedera kepala yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan 15 %, Berdasarkan hasil observasi pada saat praktek di Rumah sakit Labuang Baji terdapat 10 bed, dari 10 bed terdapat 6 bed yang terisi pasien. Dari enam pasien tersebut 3 diantaranya menderita trauma brain injury atau cedera kepala dari ringan hingga berat. **Tujuan:** untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada klien yang mengalami trauma brain injury dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intracranial di ruang Intensive care unit (ICU) RSUD Labuang Baji Makassar. **Metode:** penelitian ini merupakan studi kasus yaitu implementasi posisi *head up* 30° pada An R dengan diagnosis trauma *brain injury* dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intracranial di ruangan Intesif Care Unit (ICU) RSUD Labuang Baji. **Hasil:** Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada An R yaitu implementasi pemberian posisi *head up* 30° terhadap An R dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intracranial dengan hasil akhir GCS pasien meningkat yaitu GCS 15 E4M6V5 dengan kesadaran pasien composmentis, pasien sudah tidak gelisah serta pasien sudah tidak mengeluarkan darah dari mulut. **Kesimpulan:** posisi *head up* 30° memiliki pengaruh untuk menurunkan tekanan intra kranial pada pasien trauma brain injury

Keyword: Head Up 30° dan Trauma Brain Injury

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat	5
BAB II TINJAUAN TEORI.....	6
A. Konsep Teori.....	6
1. Definisi.....	6
2. Klasifikasi	6
3. Etiologi.....	9
4. Manifestasi Klinis	9
5. Patofisiologi	10
6. Pemeriksaan Penunjang.....	13
7. Prognosis.....	14
8. Komplikasi	16
B. Konsep Keperawatan.....	16
1. Pengkajian.....	16
2. Diagnosis Keperawatan	20
3. Intervensi keperawatan.....	29
C. Teori Keperawatan (Self Care).....	33
D. Evidence Based Nursing	37
BAB III LAPORAN KASUS.....	40

Pengkajian.....	40
Diagnosis Keperawatan.....	49
Intervensi Keperawatan.....	50
Implementasi Keperawatan.....	53
Evaluasi Keperawatan.....	59
BAB IV PEMBAHASAN.....	64
A. Analisa Kasus.....	64
B. Analisis intrvensi.....	69
C. Alternatif Pemecahan Masalah (memberikan selain intervensi utama berbasis EBN) .	72
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cedera kepala adalah suatu gangguan traumatik dari fungsi otak yang bisa saja tidak terjadi perdarahan ataupun terjadi perdarahan interstiil dalam substansi otak tanpa diikuti terputusnya kontinuitas otak (Muttaqin, 2008). Menurut (Haryono & Utami, 2019) luka kepala yakni sebutan yang banyak digunakan beberapa luka yang terjadi pada kulit kepala, tengkorak, otak, serta jaringan di bawahnya dan pembuluh darah di kepala.

Pemicu dari luka kepala yakni terdapatnya luka pada kepala, luka yang bisa menimbulkan luka kepala diantaranya peristiwa jatuh yang tidak disengaja, musibah bermotor, benturan barang tajam serta tumpul, dan benturan pada kepala (Mannurung, 2018). Pada tahun 2014 di Amerika Serikat cedera kepala yang diakibatkan oleh kejadian jatuh yang tidak disengaja memiliki prevalensi tertinggi yaitu 52,3%, sedangkan cedera kepala yang diakibatkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor memiliki prevalensi 20,4% dari total keseluruhan pasien rawat inap dengan diagnosa cedera kepala (Peterson et al., 2019).

Berdasarkan GCS (*Glasgow Coma Scale*) cedera kepala dapat dibagi menjadi 3, ialah luka kepala ringan dengan GCS 13- 15, luka kepala lagi dengan GCS 9- 12, serta luka kepala berat dengan GCS kurang atau sama dengan 8. Menurut Surveillance Report of Traumatic Brain Injury tahun 2014,

di Amerika Serikat sebanyak 2, 87 juta penderita luka kepala. Antara lain kurang lebih 2, 53 juta orang tiba ke Instalasi Gawat Darurat yang didalamnya lebih dari 812. 000 penderita ialah anak- anak. Ada sebanyak 288. 000 penderita luka kepala yang hadapi rawat inap serta kurang lebih 23. 000 antara lain ialah anak- anak. Penderita luka kepala yang wafat dunia ada kurang lebih 56. 800 orang yang 2. 529 didalamnya ialah anak- anak(Peterson et al., 2019).

Menurut (RISKESDAS, 2018) , prevalensi kejadian cedera kepala di Indonesia yaitu sekitar 11,9%. Kejadian cedera kepala yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan 15 %, dimana provinsi dengan cedera kepala tertinggi yaitu provinsi Gorontalo dengan prevalensi 17,9%. Berdasarkan tempat terjadinya cedera kepala terjadi di jalan raya sebanyak 31,4 %.

Berdasarkan hasil observasi pada saat praktek di Rumah sakit Labuang Baji terdapat 10 bed, dari 10 bed terdapat 6 bed yang terisi pasien. Dari enam pasien tersebut 3 diantaranya menderita trauma brain injury atau cedera kepala dari ringan hingga berat.

Penanganan pada pasien cedera kepala yaitu dengan dilakukannya pemeriksaan umum untuk mendeteksi berbagai macam cedera atau gangguan-gangguan di bagian tubuh lainnya, pemeriksaan neurologis mencakup respon mata, motorik, verbal, pemeriksaan pupil, reflek okulosefalik, dan okuloves tubuler, penanganan cedera-cedera dibagian tubuh lainnya, pemberian terapi pengobatan seperti anti edema serebri, anti kejang, serta natrium bikarbonat,

dan dilakukannya tindakan pemeriksaan diagnostik seperti scan tomografi computer, angiografi serebral, dan lainnya (Nurarif & Kusuma, 2013)

Masalah keperawatan yang muncul pada pasien dengan cedera kepala antara lain penurunan kapasitas adaptif intrakranial, bersihan jalan napas tidak efektif, dan nyeri akut. Menurut (SDKI, 2017) penurunan kapasitas adaptif intrakranial adalah gangguan mekanisme dinamika intrakranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial.

Upaya atau intervensi yang dapat dilakukan berdasarkan standar intervensi keperawatan indonesia adalah manajemen peningkatan tekanan intrakranial, observasi: identifikasi penyebab TIK, monitor tanda dan gejala peningkatan TIK, Terapeutik: Berikan posisi semi fowler(head up 30°), minimalkan stimulus dengan sediakan area yang tenang, Kolaborasi: kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan.

Penerapan intervensi pemberian posisi head up 30° adalah posisi buat menaikkan kepala dari tempat tidur dengan sudut 30° tetapi posisi badan tetap sejajar dengan kaki. Posisi Head up 30° bermanfaat untuk menurunkan tekanan intracranial pada pasien dengan cedera kepala. Jika terjadi peningkatan tekanan intracranial bisa terjadi herniasi yaitu kondisi ketika jaringan otak dan cairan otak bergeser dari posisi normalnya jadi penting dilakukan head up 30° (Imtihanah, 2017). Sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Pertami et al., 2017) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dari posisi head up 30⁰ terhadap perubahan tekanan intracranial, terutama pada tingkat kesadaran dan tekanan arteri rata-rata pasien dengan cedera kepala.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan implementasi posisi head up 30⁰ pada pasien trauma brain injury dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intracranial di Ruang Intensif Care Unit (ICU) RSUD Labuang Baji Makassar

B. Rumusan Maslah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penullisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah bagaimana pelaksanaan implementasi posisi *head up* 30⁰ pada pasien trauma brain injury dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intracranial.

C. Tujuan

1. Tujuan umum

Diketuinya gambaran asuhan keperawatan pada klien yang mengalami trauma brain injury dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intracranial di ruang Intensive care unit (ICU) RSUD Labuang Baji Makassar.

2. Tujuan khusus

a. Diketuinya hasil pengkajian pada pasien dengan trauma brain injury

- b. Diketuainya diagnosis keperawatan pada pasien dengan trauma brain injury
- c. Diketuainya intervensi keperawatan pada pasien dengan trauma brain injury
- d. Diketuainya implementasi keperawatan pada pasien dengan trauma brain injury
- e. Diketuainya evaluasi keperawatan pada pasien dengan trauma brain injury
- f. Untuk menganalisis intervensi posisi head up 30⁰ pada pasien trauma brain injury dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intracranial.

D. Manfaat

1. Manfaat teoritis

Tugas akhir profesi ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajarann dalam melakukan implementasi asuhan keperawatan pada pasien trauma brain injury

2. Manfaat aplikatif

Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan pada intervensi masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranal serta bersihan jalan napas tidak efektif dengan trauma brain injury.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Definisi

Istilah cedera otak traumatik (COT) dalam beberapa literatur sering digunakan secara sinonim dengan cedera kepala (*head injury*). Cedera otak traumatik (*Traumatic Brain Injury/TBI*) adalah suatu kondisi akut pada otak, bersifat non-degeneratif, dan non-kongenital, yang terjadi karena adanya kekuatan mekanik eksternal yang mengenai kepala, yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif, fisik, dan psikososial yang bersifat sementara maupun permanen, dan berkaitan dengan timbulnya penurunan ataupun perubahan kesadaran (Dawodu, 2015)

Cedera kepala atau *trauma brain injury* ialah permasalahan dalam kesehatan yang banyak terjadi di dunia dan terbanyak diantara akibat utama kematian pada seluruh usia. Cedera kepala mengakibatkan luka pada bagian kepala, robekan pada meninges, rusaknya jaringan yang ada di otak serta dapat menyebabkan terganggunya fungsi syaraf. (Taufiq et al., 2019)

2. Klasifikasi

- a. Klasifikasi Derajat Keparahan TBI berdasarkan *Glasgow Coma Scale* (GCS) Berdasarkan tingkat keparahannya dapat dibagi menjadi :

- 1) Ringan dengan GCS 13-15, durasi amnesia pasca trauma <24 jam;
- 2) Sedang dengan GCS 9-12, durasi amnesia pasca trauma 1- 6 hari; dan
- 3) Berat dengan GCS 3-8, durasi amnesia pasca trauma 7 hari atau lebih (Young dan Mcnaught, 2011)

b. Berdasarkan patologi

Cedera otak primer biasanya menyebabkan perubahan struktural seperti hematoma epidural, hematoma subdural, perdarahan subaraknoid, perdarahan intraventrikuler atau kontusio serebri. Cedera sekunder merupakan akibat mekanik tambahan atau kelainan metabolik yang dipicu cedera primer. Cedera sekunder dapat terjadi berupa kelainan klinis seperti perdarahan, iskemia, edema, peningkatan tekanan intra kranial, vasosepasmе, infeksi, epilepsi dan hidrocefalus, sedang secara sistemis berupa hipoksia, hiperkapnea, hiperglikemia, hipotensi, hipokapnea berat, febris, anemia dan hiponatremia. Penatalaksanaan utama pada TBI adalah pencegahan cedera sekunder dan pemeliharaan fungsi neurologis dari cedera primer. Cedera sekunder dapat terjadi dalam beberapa menit, jam atau hari dari cedera primer dan berkembang sebagai kerusakan jaringan saraf. Penyebab tersering cedera sekunder adalah hipoksia dan iskemia (Sudadi, 2017)

Tipe - tipe *Traumatic Brain Injury*

- 1) *Concussion* yaitu cedera minor terhadap otak, penurunan kesadaran dengan durasi yang sangat singkat pasca trauma kepala.
- 2) Fraktur *depressed* tulang kepala terjadi ketika bagian tulang kepala yang patah atau retak menekan ke dalam jaringan otak.
- 3) Fraktur *penetrating* tulang kepala terjadi apabila terdapat benda yang menembus tulang kepala (contoh: peluru) menyebabkan cedera lokal dan terpisah pada jaringan otak.
- 4) *Contusion*, memar pada otak akibat fraktur tulang kepala. Kontusio dapat berupa regio jaringan otak yang mengalami pembengkakan dan bercampur darah yang berasal dari pembuluh darah yang rusak. Hal ini juga dapat disebabkan oleh guncangan pada otak ke depan dan belakang (*contrecoup injury*) yang sering terjadi saat kecelakaan lalu lintas.
- 5) *Diffuse axonal injury* atau *shearing* melibatkan kerusakan pada sel saraf dan hilangnya hubungan antar neuron. Sehingga mampu menyebabkan kerusakan seluruh komunikasi antar neuron di otak.
- 6) *Hematoma*, kerusakan pembuluh darah pada kepala. Tipe - tipe hematoma yaitu (1) *Epidural hematoma* (EDH), perdarahan di antara tulang kepala dan dura; (2) *Subduralhematoma* (SDH),

perdarahan di antara dura dan membran araknoid; dan (3) *Intracerebral hematoma* (ICH), perdarahan di dalam otak (Beeker dkk., 2002).

3. Etiologi

- a. Kecelakaan lalu lintas
- b. Jatuh dari ketinggian
- c. Tindak kekerasan atau penganiayaan
- d. Luka tembak
- e. Kecelakaan saat olahraga
- f. Cedera kerja
- g. Dijatuhi benda
- h. Trauma lahir (Rini et al., 2019).

4. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis cedera kepala yaitu: (Rini et al., 2019)

- a. Tingkat kesadaran berubah
- b. Bingun
- c. Ketidaknormalan pupil (ukuran berubah, bentuk, respons terhadap cahaya)
- d. Gangguan atau hilangnya refleks *gag*
- e. Tidak ada refleks kornea
- f. Defisit neurologis tiba-tiba
- g. Tanda-tanda vital berubah

- h. Gangguan penglihatan dan pendengaran
- i. Disfungsi sensoris
- j. Sakit kepala
- k. Vertigo
- l. Kaku
- m. Gangguan pergerakan
- n. Kejang

5. Patofisiologi

Trauma otak bisa diklasifikasikan sebagai cedera primer dan sekunder. Cedera otak primer merupakan akibat langsung benturan pada kepala yang menyebabkan kerusakan anatomis maupun fisiologis. Cedera otak sekunder merupakan akibat dari hipotensi, hipoksia, asidosis, edema, atau faktor lanjut lain yang menyebabkan kerusakan jaringan otak. Radikal bebas juga berperan sebagai penyebab sekunder kerusakan otak pada saat iskemia (Sudadi, 2017)

Sistem saraf dapat berfungsi dengan baik jika bergantung pada oksigen, glukosa serta substansi lain. Bila suplai oksigen mengalami gangguan dapat mengakibatkan kesadaran menurun, serta sel-sel yang ada di otak akan mati dalam kurun waktu 3 sampai 4 menit. Menurunnya suplai oksigen mengakibatkan otak melakukan metabolisme secara anerob agar mendapat energy. Sisa metabolisme anerob berupa asam laktat mengakibatkan fungsi otak terganggu.

Sisa metabolisme anaerob berupa asam laktat dapat mengakibatkan gangguan fungsi otak. Selain itu pula, penumpukan CO₂ dapat mengakibatkan fungsi otak terganggu.

Pada cedera kepala, trauma dapat mengenai bagian dari struktur anatomi kepala:

- a. Skalp : Pada scalp kulit kepala bisa robek, perdarahan pada subkutan, hematoma subgalea.
- b. Skull : cedera pada tulang tengkorak menggambarkan seberapa besar trauma pada kepala hingga mengakibatkan skull patah. Apabila skull patah maka berisiko mengalami perdarahan intracranial. Fraktur yang bisa terjadi berupa: fraktur linear, fraktur depressed, fraktur terbuka (risiko tinggi infeksi), fraktur comminuted, fraktur basal.
- c. Otak : Pada otak bisa terjadi kontusio serebri, pembengkakan serebri, epidural hemoragik (EDH), subdural hemoragik (SDH), subarachnoid hemoragik (SAH), intracerebral hemoragik (ICH) sesuai dengan klasifikasi cedera otak. Jika terjadi benturan keras bisa terjadi perdarahan dan menambah volume intracranial, sehingga edema akan menyebabkan meningkatnya tekanan intracranial. Ketika terjadi peningkatan TIK maka otak akan bergerak ke bawah. Meningkatnya TIK ini dapat mengakibatkan tingkat kesadaran menurun (Rini et al., 2019).

1) Cedera Otak Traumatik Primer

Kerusakan jaringan setelah trauma kepala bisa terjadi karena mekanisme cedera primer dan ditambah dengan mekanisme cedera sekunder. Cedera primer mengacu pada kerusakan fisik jaringan yang terjadi saat adanya trauma/rudapakasadi kepala. Energi kinetik oleh mekanisme trauma menyebabkan robekan dan pergeseran pada jaringan otak. Cedera primer yang terjadi berupa: robekan/rusaknya neuron, astrosit, dan oligodendrosit, menyebabkan kematian/nekrotik langsung. Sel nekrotik tersebut melepaskan substansi intraseluler (misalnya, asam amino yang bersifat eksitasi dan protein *heat-shock*) yang menginduksi timbulnya cedera sekunder. Cedera primer juga menyebabkan pecahnya pembuluh darah, menyebabkan ekstrasvasasi darah dan hilangnya fungsi dari pembuluh darah yang menyebabkan iskemia jaringan. Produk kerusakan jaringan yang keluar dari dinding pembuluh darah tersebut bersifat toksik pada sistem saraf pusat dan juga menginduksi cedera sekunder pada otak (van Baalen, 2008; Kurland, 2011).

2) Cedera otak traumatik sekunder

Cedera saraf pusat khususnya otak, diawali dengan gangguan (*insult*) primer, yang disebut cedera primer. Apabila cedera primer terjadi selanjutnya akan terjadi cedera sekunder di otak, dimana

cedera sekunder ialah perubahan beban metabolic baru pada jaringan yang telah terjadi cedera. Adapun dampak dari cedera otak sekunder diantaranya gangguan fisiologis, seperti iskemia, reperfusi serta kekurangan oksigen pada otak. Trauma otak sekunder dapat dicegah dengan terapi. Adapun jenis trauma otak sekunder ini dibagi menjadi dua yaitu bersifat intracranial ataupun sistemik. Adapun cedera yang bersifat intracranial yaitu meningkatnya TIK, herniasi, vasospasme serta kejang/epilepsy. Sedangkan cedera yang bersifat sistemik yaitu hipotensi, asidosis, hipoksemia, anemia, serta koagulopati. (Gorr, 2011)

Angka kematian cedera otak traumatik yang terjadi pada 2 jam pertama sesudah trauma dilaporkan mencapai 50% pada COT berat. Terdapat data yang juga memperlihatkan kerusakan saraf tidak terjadi pada trauma primer, akan tetapi terjadi dalam waktu sekian menit, jam serta hari. Hal tersebut menggambarkan bahwasanya penyebab inilah yang mengakibatkan meningkatnya angka mortalitas serta kecacatan. (Gorr, 2011)

6. Pemeriksaan Penunjang

- a. X-ray : menskrining apakah struktur tulang berubah (fraktur), struktur garis tengah bergeser (sebab adanya pendarahan serta edema) terdapat fragmen tulang.

- b. CT Scan (dengan /tanpa kontraks) : mendeteksi apakah ada hemoragik, memastikan ukuran ventrikuler, adanya jaringan otak yang bergeser.
- c. MRI : Sama fungsinya seperti CT Scan
- d. Angiografi serebral : menggambarkan sirkulasi serebral apakah ada kelainan, menunjukkan bergesernya jaringan otak akibat pembengkakan, pendarahan, cedera
- e. EEG : menunjukkan adanya perkembangan gelombang patologis
- f. Positron Emission Tomography (PET) : menggambarkan adanya aktivitas metabolisme yang berubah
- g. GDA (gas darah arteri) : untuk mengidentifikasi apakah ventilasi serta oksigenasi bermasalah sehingga menyebabkan TIK meningkat
- h. Fungsi lumbal: mengidentifikasi pada subarachnoid mengalami perdarahan atau tidak
- i. Kimia darah/ eletrolit darah : mengidentifikasi ketidak seimbangan yang berfungsi pada meningkatnya TIK
- j. Pemeriksaan toksikologi : mengidentifikasi obat-obatan yang mungkin mengakibatkan menurunnya kesadaran (Rini et al., 2019)

7. Prognosis

Faktor yang menentukan prognosis adalah usia, mekanisme cedera, skor GCS pediatrik pasca resusitasi, reaktivitas pupil, tekanan darah, tekanan intrakranial pasca resusitasi, durasi gangguan kesadaran, gangguan keseimbangan tubuh dan ukuran dan macam lesi intrakranial(Erny et al.,

2019). Untuk tindakan bedah pada kasus trauma brain injury adalah decompressive craniectomy (DC) dan cranioplasty

Tujuan primer terapi adalah untuk mempertahankan aliran darah serebri yang adekuat (diestimasi dari CPP = MAP-TIK, MAP = $\frac{1}{3}$ tekanan sistolik + $\frac{2}{3}$ tekanan diastolik) (Castillo dkk., 2008).

Decompressive craniectomy dilakukan agar tekanan intranial bisa normal kembali setelah mengalami trauma brain injury ataupun perdarahan pada otak. Decompressive craniectomy sangat bermanfaat pada pasien yang mengalami perdarahan di otak akan tetapi belum terdapat standar *guidelines* untuk melakukan decompressive craniectomy. Akan tetapi bisa dilakukan *hing craniotomie*. *Hing craniotomie* dilakukan dimana flap tulang di gantung di kranium, yang penting adalah ukuran tulang yang dihilangkan. Kontroversi lainnya adalah tentang perlu dibuka atau tidaknya duramater (Guresis dkk., 2011).

Decompressive craniectomy sangat penting pada pasien dengan kondisi tekanan intracranial yang meningkat serta bergesernya garis tengah pada pasien trauma brain injury. Decompressive craniectomy merupakan tindakan pertama dari dua langkah prosedur lainnya. Pada pasien yang tertolong defek tulangnya akan diperbaiki dengan tulang original atau implant prostetik. Decompressive craniectomy sangat berisiko tidak hanya di operasi awal akan tetapi juga pada operasi *Cranioplasty* yang kedua. Adapun risiko *cranioplasty* diantaranya trauma pada kortek, infeksi, CSF

Fistula, Epidural hematoma atau Subdural hematoma, dan Intra serebral hematoma. Keadaan tersebut bisa terjadi karena kesulitan pada saat diseksi jaringan lunak untuk mengekspos dan preparasi defek kranialnya. Dan signifikan berat pada pasien dengan fibrosis atau perlekatan antara permukaan otak dengan galea aponeuritika dan otot temporalis (Oladunjuve dkk., 2013).

8. Komplikasi

Komplikasi utama dari trauma kepala adalah

- a. peningkatan tekanan intra kranial (TIK)
- b. perdarahan dan kejang
- c. Pasien dengan fraktur tulang tengkorak, khususnya pada dasar tulang tengkorak berisiko terhadap bocornya cairan serebrospinal (CSS) dari hidung atau telinga
- d. Bocornya CSS memberi kemungkinan terjadinya meningitis.

B. Konsep Keperawatan

1. Pengkajian

a. Pengkajian Primer

1) Airway

Terdapat sumbatan/obstruksi jalan napas karena terdapat penumpukan sekret sebab reflek batuk lemah. Bila terdapat sumbatan maka lakukan :

- a) Chin lift/ jaw thrust

- b) Suction / hisap
- c) Guedel airway
- d) Intubasi trakhea dengan leher ditahan (imobilisasi) pada posisi netral.

2) Breathing

Kelemahan menelan/ batuk/ melindungi jalan napas, timbulnya pernapasan yang sulit dan/ atau tak teratur, suara nafas terdengar ronchi /aspirasi, wheezing, sonor, stidor/ ngorok, ekspansi dinding dada.

3) Circulation

Tekanan darah dapat normal atau meningkat, hipotensi terjadi pada tahap lanjut, takikardi, bunyi jantung normal pada tahap dini, disritmia, kulit dan membran mukosa pucat, dingin, dan sianosis pada tahap lanjut.

4) Disability

Menilai kesadaran dengan cepat, apakah sadar, hanya respon terhadap nyeri atau sama sekali tidak sadar. Tidak dianjurkan mengukur GCS. Adapun cara yang cukup jelas dan cepat adalah

A: Awake

V (Verbal) : Respon bicara

P (Pain) : Respon nyeri

U (Unresponsive) : Tidak ada respon

5) Eksposure

Inspeksi dan palpasi seluruh tubuh pasien untuk mengetahui apakah terdapat cedera

b. Pengkajian sekunder

1) Identitas klien : nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal masuk rumha sakit dan askes.

2) Keluhan utama : nyeri pada kepala dan menurunnya kesadaran

3) Riwayat penyakit sekarang : demam, anoreksi dan malaise, peningkatan TIK serta gejala nerologik fokal.

4) Riwayat penyakit dahulu : ditanyanyak apakah pasien pernah mengalami infeksi telinga (otitis media, mastoiditis) atau infeksi paru paru (bronkiektaksis, abses paru, empiema), jantung (endokarditis), organ pelvis, gigi dan kulit).

5) Aktivitas / istirahat

Gejala : malaise

Tanda : Ataksia, sulit jalan , lumpuh , gerakan involunter.

6) Sirkulasi

Gejala : apakah ada riwayat kardiopatologi, seperti endokarditis

Tanda : Tekanan darah mengalami peningkatan, nadi mengalami penurunan hal tersebut terjadi karena meningkatnya tekanan intracranial

7) Eliminasi

Tanda : biasanya pasien mengalami sulit berkemih ataupun mengalami retensi

8) Nutrisi

Gejala : kehilangan nafsu makan, disfagia (pada periode akut)

Tanda : anoreksia, muntah, turgor kulit jelek, membran mukosa kering.

9) Hygiene

Gejala : -

Tanda : ketergantungan terhadap semua kebutuhan, perawatan diri (pada periode akut).

10) Neurosensori

Gejala : sakit kepala, parestesia, timbul kejang, gangguan penglihatan.

Tanda : penurunan status mental dan kesadaran. Kehilangan memori, sulit dalam keputusan, afasia, mata pupil unisokor (peningkatan TIK), nistagmus, kejang umum lokal.

11) Nyeri / kenyamanan

Gejala : sakit kepala mungkin akan diperburuk oleh ketegangan, leher punggung kaku.

Tanda : tampak terus terjaga, menangis / mengeluh.

12) Pernapasan

Gejala : dipsnea ataupun takipnea

Tanda : meningkatnya pola napas pada tahap awal, serta menurunnya kesadaran (letargi sampai koma) dan gelisah

13) Keamanan

Gejala : adanya riwayat ISPA / infeksi lain meliputi : mastoiditis, telinga tengah, sinus abses gigi, infeksi pelvis, abdomen atau kulit, fungsi lumbal, pembedahan, fraktur pada tengkorak / cedera kepala

2. Diagnosis Keperawatan

a. Penurunan kapasitas adaptif intracranial (Persatuan Perawat Nasional Indonesia (SDKI), 2017)

1) Defenisi

Gangguan mekanisme dinamis intracranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intracranial

2) Penyebab

- a) Lesi menempati ruang (mis. Space-occupying lesion- akibat tumor, abses)
- b) Mobilitas terganggu
- c) Edema serebral (mis. Akibat cedera kepala)
- d) Meningkatnya tekanan pada vena (mis. Akibat thrombosis sinus vena serebral, gagal jantung)

e) Sumbatan pada aliran CSS (mis. Hidrosefalus)

f) Hipertensi intracranial idiopatik

3) Gejala dan tanda mayor

Subjektif

a) Nyeri pada kepala

Objektif

a) Tekanan darah serta nada mengalami peningkatan

b) Bradikardia

c) Pola nafas tidak teratur

d) Penurunan kesadaran

e) Melambatnya respon pupil atau tidak sama

f) Refleks neurologis mengalami gangguan

4) Gejala dan tanda minor

Subjektif

a) Tidak tersedia

Objektif

a) Gelisah

b) Agitasi

c) Muntah (tanpa disertai mual)

d) Nampak lemah atau lesu

e) Fungsi kognitif terganggu

- f) Tekanan intracranial (TIK) ≥ 20 mmHg
- g) Papilledema
- h) Postur deserebrasi (ektensi)

5) Kondisi klinis terkait Cedera kepala

- a) Iskemik serebral
- b) Tumor serebral
- c) Hidrosefalus
- d) Hematoma kranial
- e) Pembentukan arteriovenous
- f) Edema vasogenik atau sistotoksik serebral
- g) Hyperemia
- h) Obstruksi aliran vena

b. Resiko perfusi serebral tidak efektif

1) Defenisi

Beresiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak

2) Faktor resiko

- a) Masa protombin dan/atau masa tromboplastin parsial tidak normal
- b) Kinerja ventrikel kiri menurun
- c) Aterosklerosis aorta

- d) Diseksi arteri
- e) Fibrilasi atrium
- f) Tumor otak
- g) Stenosis karotis
- h) Miksoma atrium
- i) Aneurisma serebri
- j) Koagulopati (mis. Anemia sel sabit)
- k) Dilatasi kardiomiopati
- l) Koagulasi intravaskuler diseminata
- m) Embolisme
- n) Cedera kepala
- o) Hiperkolesteronemia
- p) Hipertensi
- q) Endocarditis infeksi
- r) Neuplasma otak
- s) Infark miokard akut
- t) Penyalahgunaan zat

3) Kondisi klinis terkait

- a) Stroke
- b) Trauma kepala
- c) Aterosklerotik aortic

- d) Infarkmiokard akut
 - e) Diseksi arteri
 - f) Hipertensi
 - g) Neoplasma otak
 - h) Sindrom sick sinus
 - i) Infeksi otak (mis. Meningitis)
- c. Gangguan mobilitas fisik
- 1) Defenisi
Terbatasnya gerak fisik pada ekstremitas atas maupun bawah secara mandiri
 - 2) Penyebab
 - a) Rusaknya struktur pada tulang
 - b) Metabolisme berubah
 - c) Ketidak bugaran fisik
 - d) Kendali otot menurun
 - e) Massa otot menurun
 - f) Kekuatan otot menurun
 - g) Lambat dalam berkembang
 - h) Kekuatan sendi menurun
 - i) Kontraktur
 - j) Gizi kurang

- k) Musculoskeletal terganggu
 - l) Neuromuskeletal terganggu
 - m) IMT diatas persentil ke-75 sesuai umur
 - n) Efek agen farmakologis
 - o) Diprogramkan pembatasan gerak
 - p) Nyeri
 - q) Deficit informasi mengenai aktivitas fisik
 - r) Cemas
 - s) Gangguan kognitif
 - t) Malas bergerak
 - u) Gangguan sensoripersepsi
- 3) Gejala dan tanda mayor
- Subjektif
- a) Mengeluh ekstremitas sulit digerakkan
- Objektif
- a) Kekuatan otot turun
 - b) Menurunnya Rentang gerak (ROM)
- 4) Gejala dan tanda minor
- Subjektif
- a) Sakit saat bergerak

- b) Malas melakukan gerak
- c) Cemas jika akan bergerak

Objektif

- a) Kekakuan sendi
 - b) Gerakan tidak terkoordinasi
 - c) Terbatasnya pergerakan
 - d) Lemahnya fisik
- 5) Kondisi klinis terkait
- a) Stroke
 - b) Cedera medulla spinalis
 - c) Trauma
 - d) Fraktur
 - e) Osteoarthritis
 - f) Osteomalasia
 - g) Keganasan
- d. Bersihan jalan nafas tidak efektif
- 1) Defenisi
Tidak mampu untuk membersihkan benda asing seperti secret pada jalan napas atau terjadi sumbatan agar jalan nafas bisa paten
 - 2) Penyebab

Fisiologis

- a) Spasme jalan nafas
- b) Hipersekresi jalan nafas
- c) Disfungsi neuromuskuler
- d) Benda asing pada jalan nafas
- e) Terdapat jalan nafas buatan
- f) Sekresi yang tertahan
- g) Hiperplasia dinding jalan napas
- h) Proses infeksi
- i) Respon alergi
- j) Efek agen farmakologis (mis. anastesi)

Situasional

- a) Merokok aktif
 - b) Merokok pasif
 - c) Terpajan polutan
- 3) Gejala dan tanda mayor

Subjektif

(tidak tersedia)

Objektif

- a) Batuk tidak efektif
- b) Tidak bisa batuk

- c) Sputum banyak
- d) Mengi, wheezing dan/atau ronkhi kering
- e) Mekonium dijalan napas (pada neonatus)

4) Gejala dan tanda minor

Subjektif

- a) Dispnea
- b) Sulit berbicara
- c) Ortopnea

Objektif

- a) Gelisah
- b) Sianosis
- c) Menurunnya bunyi napas
- d) Berubahnya frekuensi napas
- e) Berubahnya pola napas

3. Intervensi keperawatan

No	Diagnosis keperawatan	Luaran Keperawatan	Intervensi
1.	Penurunan kapasitas adaptif intracranial	<p>Setelah dilakukan intervensi selama Jam maka kapasitas adaptif intracranial meningkat dengan kriteria hasil :</p> <p>a. Tingkat kesadaran : 1(menurun) 2(cukup menurun) 3(sedang)4(cukup meningkat) 5(meningkat)</p> <p>b. Reaksi pupil : 1(menurun) 2(cukup menurun) 3(sedang)4(cukup meningkat) 5(meningkat)</p> <p>c. Tekanan darah sistolik : 1(memburuk) 2(cukup memburuk) 3(sedang) 4(cukup membaik) 5(membaik)</p> <p>d. Pola nafas : 1(memburuk) 2(cukup memburuk) 3(sedang) 4(cukup membaik) 5(membaik)(Persatuan Perawat Nasional Indonesia (SLKI), 2019)</p>	<p>Manajemen peningkatan tekanan intracranial</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Kaji penyebab peningkatan TIK (mis. lesi, gangguan metabolisme, edema serebral) Pantau tanda/gejala peningkatan TIK (mis. Ktekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar. bradikardia, pola napas Ireguler, kesadaran menurun) Pantau MAP (Mean Arterial Pressure) Pantau CVP (Central Venous Pressure), jika diperlukan Pantau PAWP, jika diperlukan Pantau PAP, jika diperlukan Pantau ICP (Intra Cranial Pressure), jika diperlukan Pantau CPP (Cerebral Perfusion Pressure) Pantau gelombang ICP Pantau status pemapasan Pantau intake dan ouput calran Pantau cairan serebro-spinalis (mis. warna, konsistensi) <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Meminimalkan stimulus dengan disediakannya lingkungan yang tenang Memeberikan posisi semi Fowler Manuver Valsava dihindari Mencegah terjadinya kejang Menghindari menggunakan PEEP Menghindari memberikan cairan intravena hipotonik Mengatur ventilator supaya PACO2 bisa optimal Mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkolaborasi pemberlan sedasi dan anti konvulsan, jika diperlukan Berkolaborasi pemberian diuretik osmosis, jika

			diperlukan c. Berkolaborasi pemberian pelunak tinja, jika diperlukan (SIKI, 2018)
2.	Risiko perfusi serebral tidak efektif	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama... maka perfusi serebral meningkat dengan kriteria hasil : a. Tingkat kesadaran meningkat b. Tekanan intracranial menurun c. Sakit kepala menurun d. Gelisah menurun	Pemantauan tanda vital Observasi a. Monitor tekanan darah b. Monitor nadi (frekuensi, kekuatan, irama) c. Monitor permapasan (frekuensi, kedalaman) d. Monitor suhu tubuh e. Monitor oksimetri nadi f. Monitor tekanan nadi (selisih TDS dan TDD) g. Identifikasi penyebab perubahan tanda vital Terapeutik a. Mengatur jarak pemantauan sesuai kondisi pasien b. Mendokumentasikan hasil pemantauan Edukasi a. Menjelaskan tujuan serta prosedur pemantauan b. Memberi tahu hasil pemantauan, jika diperlukan
3.	Risiko perfusi serebral tidak efektif	Setelah dilakukan intervensi selama Jam maka perfusi serebral meningkat dengan kriteria hasil : a. Tingkat kesadaran meningkat b. Tekanan intra kranial menurun c. Sakit kepala menurun d. Gelisah menurun e. Kecemasan menurun f. Agitasi menurun g. Kesadaran meningkat	Manajemen peningkatan tekanan intracranial Observasi a. Kaji penyebab peningkatan TIK (mis. lesi, gangguan metabolisme, edema serebral) b. Pantau tanda/gejala peningkatan TIK (mis. Ktekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar. bradikardia, pola napas Ireguler, kesadaran menurun) c. Pantau MAP (Mean Arterial Pressure) d. Pantau CVP (Central Venous Pressure), jika diperlukan e. Pantau PAWP, jika diperlukan f. Pantau PAP, jika diperlukan g. Pantau ICP (Intra Cranial Pressure), jika diperlukan h. Pantau CPP (Cerebral Perfusion Pressure) i. Pantau gelombang ICP j. Pantau status pemapasan k. Pantau intake dan output calran

			<p>l. Pantau cairan serebro-spinalis (mis. warna, konsistensi)</p> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Meminimalkan stimulus dengan disediakan lingkungan yang tenang Memberikan posisi semi Fowler Manuver Valsava dihindari Mencegah terjadinya kejang Menghindari menggunakan PEEP Menghindari memberikan cairan intravena hipotonik Mengatur ventilator supaya PACO₂ bisa optimal Mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkolaborasi pemberlan sedasi dan anti konvulsan, jika diperlukan Berkolaborasi pemberian diuretik osmosis, jika diperlukan Berkolaborasi pemberian pelunak tinja, jika diperlukan (SIKI, 2018)
4.	Gangguan mobilitas fisik	<p>Setelah dilakukan intervensi selama Jam maka Mobilitas fisik membaik dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pergerakan ekstremitas : 1 (menurun) 2 (cukup menurun) 3 (sedang) 4 (cukup meningkat) 5 (meningkat) Kekuatan otot : : 1 (menurun) 2 (cukup menurun) 3 (sedang) 4 (cukup meningkat) 5 (meningkat) Rentang gerak (ROM) : : 1 (menurun) 2 (cukup menurun) 3 (sedang) 4 (cukup meningkat) 5 (meningkat) (SLKI, 2019) 	<p>Dukungan Mobilisasi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Kaji apakah ada nyeri atau keluhan fisik lainnya Kaji toleransi fisik melakukan pergerakan Pantau frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum melakukan mobilisasi Pantau kondisi umum selama mobilisasi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis pagar tempat tidur) Memfasilitasi melakukan pergerakan, jika diperlukan Melibatkan keluarga untuk membantu pasien untuk meningkatkan pergerakan <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> menjelaskan tujuan serta prosedur mobilisasi menganjurkan melakukan mobilisasi dini Mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan

			(mis duduk ditempat tidur, duduk disisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi) (SIKI, 2018)
4.	Bersihan jalan napas tidak efektif	<p>Setelah dilakukan intervensi selama Jam maka bersihan jalan nafas membaik dengan kriteria hasil :</p> <p>a. Batuk efektif : 1(menurun) 2 (cukup memburuk) 3(sedang) 4(cukup membaik 5(meningkat)</p> <p>b. Produksi sputum : 1(meningkat) 2 (cukup memburuk) 3 (sedang) 4 (cukup membaik) 5 (menurun)</p> <p>c. Pola nafas : 1(memburuk) 2(cukup memburuk) 3 (sedang) 4 (cukup membaik 5(membaik)</p>	<p>Manajemen jalan nafas</p> <p>Observasi</p> <p>a. Kaji pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)</p> <p>b. Kaji bunyi napas tambahan (mis. gurgling, mengi, wheezing, ronkhi kering)</p> <p>c. Kaji sputum (jumlah, wama, aroma)</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Mempertahankan kapatenan jalan napas dengan head-tilt dan chin-Hit (jaw-thrust jika curiga trauma servikal)</p> <p>b. Memposisikan seml-Fowler atau Fowier</p> <p>c. Memberikan minum hangat</p> <p>d. Melakukan fisioterapi dada, jika diperlukan</p> <p>e. Melakukan suction kurang dari 15 detik</p> <p>f. Melakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal</p> <p>g. Mengeluarkan sumbatan benda padat dengan forsep McGill</p> <p>h. Beri oksigen, jika diperlukan</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Menganjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, jika tidak ada kontraindikasi</p> <p>b. Mengajarkan teknik batuk efektif</p> <p>Kolaborasi</p> <p>a. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika dipertukan.</p>

C. Teori Keperawatan (Self Care)

Pada hakikatnya seluruh manusia memiliki kebutuhan akan perawatan diri dan memiliki hak untuk melakukan perawatan diri secara mandiri, kecuali jika orang tersebut tidak mampu. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan agar mempertahankan kehidupan, kesehatan serta kesejahteraan individu baik keadaan sehat ataupun sakit yang dilakukan oleh orang itu sendiri disebut *self care* (Dhorothea Orem, 2001)

Terdapat 3 teori yang saling berkesinambungan dengan teori defisit perawatan diri (*Deficit Self Care*) Orem yaitu :

1. Teori perawatan diri (*self care theory*) : memperlihatkan dan mendefinisikan tujuan serta cara seseorang merawat diri
2. Teori defisit perawatan diri (*deficit self care theory*) : memperlihatkan serta mendefinisikan seseorang yang butuh bantuan dalam merawat diri, seperti tenaga keperawatan.
3. Teori sistem keperawatan (*nursing system theory*) : memperlihatkan serta mendefinisikan hubungan interpersonal yang harus dikerjakan serta dipertahankan seorang perawat agar dapat melakukan sesuatu secara produktif.

Berikut penjelasan ketiga teori keperawatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori perawatan diri (*self care theory*) berdasarkan Orem terdiri dari :

- a. Tindakan yang diprakarsai oleh seseorang dan diadakan berdasarkan kepentingan untuk mempertahankan gidup, fungsi tubuh yang sehat, perkembangan dan kesejahteraan disebut perawatan diri
- b. Kemampuan yang rumit dari seseorang ataupun orang dewasa agar mengetahui serta memenuhi kebutuhannya yang diberikan untuk melakukan fungsi dan perkembangan tubuh disebut agen perawatan diri (*self care agency*). Tingkat perkembangan usia, pengalaman hidup, orientasi sosial kultural tentang kesehatan dan sumber-sumber lain yang ada pada individu tersebut mempengaruhi *Self Care Agency*
- c. Tindakan perawatan diri secara total yang dikerjakan dalam kurun waktu yang ditentukan agar terpenuhinya semua kebutuhan perawatan diri orang tersebut melalui trik-trik tertentu antara lain mengatur nilai-nilai terkait pemenuhan udara yang adekuat, cairan maupun pemenuhan aktivitas yang dikerjakan agar terpenuhinya kebutuhan tersebut (upaya promodi, pencegahan, pemeliharaan dan penyediaan kebutuhan) disebut kebutuhan perawatan diri terapeutik (*therapeutic self care demands*)

Model Orem's menyebutkan ada beberapa kebutuhan *self care* atau yang disebut sebagai *self care requisite*, yaitu

- a. Kebutuhan perawatan diri universal (*Universal self care requisite*)

Hal yang umum bagi seluruh manusia meliputi pemenuhan kebutuhan yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan udara, menurut Orem pemenuhan kebutuhan udara yaitu bernapas tanpa alat bantu napas seperti oksigen
- 2) Pemenuhan kebutuhan air atau minum tanpa gangguan, menurut Orem kebutuhan air yaitu sekitar 6-8 gelas air/hari.
- 3) Pemenuhan kebutuhan makanan tanpa gangguan, seperti mampu mengambil makanan atau peralatan makan secara mandiri
- 4) Pemenuhan kebutuhan eliminasi dan kebersihan tubuh atau bagian bagian tubuh. Menyediakan perawatan terkait dengan proses eliminasi, seperti seseorang mampu dalam melakukan eliminasi secara mandiri seperti BAK serta BAB. Serta mampu melakukan kebersihan diri secara mandiri.
- 5) Pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat. Agar kebutuhan aktivitas dapat terpenuhi dianjurkan untuk berolahraga serta pola tidur dijaga serta mampu mengidentifikasi gejala yang dapat mengganggu intensitas tidur.
- 6) Pemenuhan kebutuhan menyendiri dan interaksi sosial. Bersosialisasi bersama teman sebaya, saudara dan dapat beradaptasi dengan lingkungan.
- 7) Pemenuhan pencegahan dari bahaya pada kehidupan manusia. Bahaya yang dimaksud menurut Orem yaitu mengidentifikasi jenis bahaya yang dapat membahayakan diri sendiri, mampu mengambil tindakan untuk mencegah bahaya dan melindungi diri sendiri dari situasi yang berbahaya.

- 8) Peningkatan perkembangan dalam kelompok sosial sesuai dengan potensi, keterbatasan dan keinginan manusia pada umumnya. Hal-hal tersebut dapat berpengaruh terhadap tubuh agar fungsi serta struktur tubuh manusia dapat bertahan agar dapat bertumbuh dan berkembang
- b. Kebutuhan Perkembangan Perawatan Diri (*Development self care requisite*).
Perubahan kondisi tubuh serta status social dapat mempengaruhi proses perkembangan pada setiap orang. Tahap perkembangan pada manusia yaitu :
- 1) Menyediakan hal hal tertentu yang memudahkan proses perkembangan. Memfasilitasi seseorang untuk berkembang contohnya yaitu bersekolah.
 - 2) Terlibatnya individu untuk mengembangkan diri. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung perkembangan
 - 3) Pencegahan terhadap gangguan yang mengancam. Menurut Orem terdapat beberapa hal yang dapat mengganggu kebutuhan perkembangan perawatan diri pada anak antara lain:
 - a) Pendidikan anak usia sekolah masih kurang
 - b) Terdapat permasalahan pada adaptasi sosial
 - c) Gagalnya seseorang agar sehat
 - d) Kehilangan orang-orang tercinta contohnya orang tua, saudara serta teman.
 - e) Lingkungan yang baru atau lingkungan yang asing
 - f) Terjadi kecacatan

c. Kebutuhan Perawatan Diri Pada Kondisi Adanya Penyimpangan Kesehatan (*Health Deviation Self Care Requisite*).

Kebutuhan tersebut terkait dengan penyimpangan dalam aspek struktur dan fungsi manusia. Individu yang sakit, terluka mengalami kondisi patologis tertentu, kecacatan atau individu atau individu tidak mampu menjalani pengobatan tetap membutuhkan perawatan diri. Adapun kebutuhan perawatan diri pada kondisi tersebut yaitu :

- 1) Mencari bantuan kesehatan
- 2) Individu sadar terhadap resiko adanya masalah akibat dari pengobatan yang dijalani
- 3) Melakukan diagnostik, terapi, dan rehabilitatif, memahami efek buruk dari perawatan.
- 4) Terdapat modifikasi gambaran atau konsep diri.
- 5) Menyesuaikan gaya hidup yang dapat mendukung perubahan status kesehatan.

D. Evidence Based Nursing

1. Head Up 30⁰

Posisi *head up* 30⁰ ialah cara memposisikan kepala orang lebih tinggi sekitar tiga puluh derajat dari tempat tidur dengan posisi tubuh sejajar dan kaki lurus atau tidak menekuk (Adithya Nugroho, 2018). Posisi Head up 30⁰ memiliki manfaat agar tekanan intracranial menurun pada pasien

trauma kepala.(Pertami dkk,2017). Posisi *head up* 30⁰ dilakukan pada pasien cedera kepala karena posisi ini akan memudahkan drainase aliran darah balik dari intracranial sehingga dapat menurunkan tekanan intracranial. Tekanan intracranial akan menurun secara signifikan dari posisi *head up* 0⁰-35⁰ tetapi pada posisi 40⁰ katas, TIK akan naik lagi Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertami dkk 2017 dengan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dari posisi *head up* 30⁰ terhadap perubahan tekanan intracranial, terutama pada tingkat kesadaran dan tekanan arteri rata-rata pasien dengan cedera kepala. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Ginting dkk 2020 dengan hasil penelitian terdapat pengaruh pemberian oksigen dan elevasi kepala 30⁰ terhadap tingkat kesadaran pada pasien cedera kepala sedang.

2. Tujuan

Posisi *head up* tiga puluh derajat memiliki tujuan agar tekanan intracranial menurun pada seseorang yang menderita trauma kepala, selain itu, posisi *head up* 30⁰ memiliki manfaat agar oksigen ke otak meningkat. (Adithya Nugroho, 2018)

Posisi *Head up* 30⁰ bertujuan untuk mengamankan pasien dalam pemenuhan oksigenasi untuk menghindari hipoksia pada pasien, dan tekanan intracranial dapat stabil dalam kisaran norma. Selain itu posisi ini lebih efektif untuk menjaga tingkat kesadaran karena mempengaruhi

posisi anatomi tubuh manusia yang kemudian mempengaruhi hemodinamik pasien. Posisi *head up* 30⁰ juga efektif untuk homeostasis otak dan mencegah kerusakan otaksekunder dengan stabilitas fungsi pernapasan untuk mempertahankan perfusi serebral yang memadai. (Pertami dkk,2017)

3. Indikasi

- a. Pasien yang mengalami cedera kepala
- b. Pasien yang mengalami peningkatan tekanan intracranial
- c. Pasien yang mengalami sesak napas

4. Kontraindikasi

- a. Pasien yang mengalami fraktur servikal

5. Prosedur pemberian

Standar operasional prosedur pemberian posisi *head up* 30⁰ yaitu :

- a. Pasien dibaringkan dalam keadaan terlentang.
- b. Mengatur ketinggian tempat tidur dan memposisikan kepala pasien lebih tinggi sekitar 30⁰ dan badan tetap lurus.
- c. Posisi kaki lurus dan tidak menekuk

Hal yang perlu diperhatikan untuk posisi *head up* 30⁰ ialah fleksi, ekstensi dan rotasi kepala akan meningkat tekanan perfusi selebral yang akan mempengaruhi peningkatan tekanan intrakarnial (Dimitros dan Alred, 2002).

BAB III

LAPORAN KASUS

Pengkajian

A. Identitas Klien

Nama Inisial Klien : An R
Umur : 16 Tahun
Alamat : Antang
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Tanggal Masuk RS : 12 April 2021
No. Rekam Medik : 391886
Diagnosis Medis : Trauma Brain Injury

B. Pengkajian Umum

Keluhan utama klien masuk : Kesadaran menurun GCS 13 E3M6V4 serta pasien nampak gelisah

Riwayat penyakit sekarang : Keluarga pasien mengatakan pasien mengalami kecelakaan semalam dan kepalanya terbentur. Pasien mengalami kesadaran menurun serta muntah. Pasien masuk di IGD pada jam 14.00 dengan keadaan penurunan kesadaran serta darah yang keluar dari mulut. Di IGD dilakukan suction setiap 10 menit sekali. Kemudian pasien dipindahkan ke ICU pada jam 15.30

Riwayat penyakit dahulu : Pasien tidak pernah dirawat di Rumah Sakit sebelumnya

Riwayat sosial : Pasien tidak merokok dan tidak mengkonsumsi analgetik

Riwayat penyakit keluarga : Keluarga pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit menular ataupun penyakit kronis seperti DM, hipertensi dan lain lain

C. Pemeriksaan fisik khusus (Pengkajian Primer)

a. Airway

Bebas : Tidak Bebas

Sumbatan : Terdapat sumbatan darah

Kejang : Pasien tidak mengalami kejang

b. Breathing

Spontan : Tidak spontan

Takipnea : Iya

Wheezing : Tidak

Apnea : Tidak

Dipsnea : Iya

SPO2 : 98%

c. Circulation

Nadi : Teraba 50x/menit

Kulit : Turgor kulit elastis

Perdarahan : Iya

CRT : < 2 detik

d. Disability

GCS : E3M6V4

Kesadaran : Somnolen

Pupil : Tidak bisa dikaji karena terdapat edema pada bagian kelopak mata

Refleks cahaya : Tidak bisa dikaji

Motorik :

Kekuatan otot : $\frac{5}{4} \mid \frac{5}{4}$

D. Pemeriksaan fisik umum (kepala dan leher) (Pengkajian sekunder)

a. Bagian kepala atas

Hematom / post trauma : ada pada kelopak mata. Berwarna kebiruan

Tipe Rambut : Lurus

Distribusi rambut : Merata

Warna rambut : Hitam

Alopesia : Tidak ada

b. Mata

Sklera ikterik : Tidak dapat dikaji

Konjungtiva : Tidak dapat dikaji karena kelopak mata pasien bengkak sehingga matanya tidak bisa terbuka. Bengkak berwarna kebiruan.

c. Telinga

Serumen : Tidak ada

Terpasang alat bantu dengar : Tidak

d. Malar / pipi

Acne : Tidak ada

e. Hidung

Napas cuping hidung : Tidak ada

Pilek : Tidak

Terpasang alat bantu napas : Iya terpasang oksigen 10 Liter NRM

f. Bibir dan mulut

Sianosis : Tidak

Sariawan : Tidak

Gigi palsu : Tidak

Mukosa bibir : Kering

Gangguan gigi dan gusi : Gigi pasien patah akibat kecelakaan yang dialami

g. Leher

Pembesaran kelenjar tiroid : Tidak ada

Limfonodi : Tidak
 Nadi karotis : Teraba

E. Pemeriksaan fisik umum (thoraks)

a. Pre kardium

a) Inspeksi

Ictus cordis terlihat di intracosta 4-5 : Tidak terlihat

Luka parut : Tidak ada

b) Palpasi

Ictus cordis teraba di intracosta 4-5 : Teraba

c) Perkusi

Redup : Ya

d) Auskultasi

Bunyi S1 dan S2 : Lup Dup

b. Pulmunal

a) Inspeksi

Retraksi : Tidak ada

Simetris kanan dan kiri : Iya

Ekspansi dada kanan dan kiri sama : iya

b) Palpasi

Krepitasi : tidak

c) Perkusi

Sonor : iya

d) Auskultasi

Wheezing : Tidak

Ronkhi : Tidak

Vesikuler : Iya

F. Pemeriksaan fisik umum (abdomen)

a. Inspeksi

Datar/cembung : Iya

Bekas operasi : Tidak ada

b. Auskultasi

Peristaltic : 8 x/menit

c. Palpasi

Massa : Tidak ada

Turgor kulit : Elastis

Nyeri tekan dilapang abdomen : Tidak

G. Pemeriksaan umum (ekstremitas)

a. Superior

Edema : Tidak

Infus : Terpasang di tangan sinistra

KN3B 24 x tetes/menit dan tidak terdapat nyeri pada area tusukan

Nadi radialis : 50x/menit

Kekuatan otot : Lemah
 CRT < 3 detik : iya
 Refleks fisiologis bisep/trisep : tidak dikaji
 Deformitas : Tidak ada
 Fraktur : Tidak

b. Inferior

Edema : Tidak
 Akral : hangat
 Kekuatan otot : baik
 Refleks patella : Tidak bisa dikaji
 Refleks patologis : Tidak dikaji

H. Pengkajian nutrisi

Antropometri

Berat badan : 55 Kg
 Tinggi badan : 160 Cm
 IMT : 21

I. Tanda tanda vital

Tekanan darah : 110/70 mmHg
 Nadi : 50 x/menit
 Pernapasan : 30x/ menit
 Suhu : 36°C

J. Pemeriksaan Diagnostik

a. Pemeriksaan Lab

Natrium (Na) : 136

Kalium (K) : 4.1

Clorida (Cl) : 111

Glukosa darah sewaktu : 124

b. Hasil pemeriksaan CT SCAN

a. Lesi hiperdens perdarahan subaracnoid volume 9.25 ml

b. Thorax dalam hasil normal

K. Terapi

KAEN3B 1500 cc/24 jam

Ceftriaxone 1 gr / 12 jam

Manitol 100 cc/ 8 jam

Omeprazole 40 mg/24 jam

Neurobion 1 amp/24 jam

Ocxtofen 1 amp/8jam

Asam tranexamat 500 / 8 jam

Paracetamol 1 gr / 8 jam

Analisa Data

No	Data	Etiologi	Masalah
1.	Ds : a. Keluarga pasien mengatakan pasien mengalami kecelakaan lalu lintas semalam b. Keluarga pasien mengatakan kepala pasien terbentur Do: a. Bradikardi, Nadi : 50 x/menit b. Tingkat Kesadaran menurun GCS 13, E3M6V4 c. Pasien nampak muntah	Pembentukan cairan berlebihan oleh pleksus koroideus ↓ Obstruksi aliran keluar pada salah satu ventrikel atau lebih ↓ Mengganggu aliran serebrospinal ↓ Peningkatan jumlah cairan serebrospinal ↓ Peningkatan tekanan intrakranial	Penurunan kapasitas adaptif intracranial
2.	Ds : Do: a. Pasien nampak sesak b. Pasien mengeluarkan darah dari mulut c. Frekuensi napas 30 x/menit d. SPO2 98 %	Etiologi cedera kepala (kecelakaan) ↓ Trauma kepala ↓ Peningkatan TIK ↓ Jaringan otak rusak ↓ Edema serebral ↓ Penurunan kesadaran ↓ Perdarahan massif region occipitalis ↓ Obstruksi jalan napas ↓ Bersihan jalan napas tidak efektif	Bersihan jalan napas tidak efektif
3.	Factor risiko a. Cedera kepala	Kecelakaan lalu lintas ↓ Terjadi benturan pada kepala ↓ Perdarahan epidural ↓ Gangguan sirkulasi ke jaringan otak	Risiko perfusi serebral tidak efektif

		↓ Risiko perfusi serebral tidak efektif	
4.	Faktor risiko a. Penurunan tingkat kesadaran GCS 13 E3M6V4 b. Gangguan penglihatan karena terjadi hematoma pada kelopak mata sehingga mata tidak bisa terbuka	Penurunan kesadaran	Risiko jatuh

Diagnosis Keperawatan

1. Penurunan kapasitas adaptif intracranial berhubungan dengan edema serebral ditandai dengan sakit kepala, tingkat kesadaran menurun, gelisah, muntah
2. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan benda asing dalam jalan napas ditandai dengan frekuensi napas berubah
3. Risiko perfusi serebral tidak efektif dibuktikan dengan cedera kepala
4. Risiko jatuh dibuktikan dengan penurunn tingkat kesadaran

Intervensi Keperawatan

No.	Diagnosis Keperawatan	Luaran Keperawatan	Rencanakan Tindakan Keperawatam	Rasional
1.	Penurunan kapasitas adaptif intracranial berhubungan dengan edema serebral ditandai dengan sakit kepala, tingkat kesadaran menurun, gelisah, muntah	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam maka kapasitas adaptif intracranial meningkat dengan kriteria hasil : a. Tingkat kesadaran meningkat b. Muntah menurun c. Bradikardi membaik	Manajemen peningkatan tekanan intracranial Observasi a. Kaji penyebab peningkatan TIK b. Pantau tanda dan gejala peningkatan TIK Terapeutik a. Memberikan posisi semi fowler b. Meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang nyaman Kolaborasi a. Kolaborasi pemberian sedasi dan anti konvulsan	- Untuk mengetahui penyebab peningkatan TIK - Untuk mengetahui tanda gejala peningkatan TIK - Memberikan posisi nyaman dan meminimalkan TIK - Agar pasien lebih nyaman - Menurunkan TIK
2.	Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan benda asing dalam jalan napas ditandai dengan frekuensi napas berubah	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam maka bersihan jalan napas membaik dengan kriteria hasil : a. Pola napas membaik	Manajemen Jalan napas Observasi a. Kaji pola napas b. Kaji bunyi napas Terapeutik a. Berikan posisi semi fowler b. Lakukan suction kurang dari 15 detik c. Beri oksigen, jika diperlukan	- Untuk mengetahui pola napas pasien - Untuk mengetahui apakah terdapat bunyi napas tambahan seperti gurgling - Membantu pasien agar tidak sesak - Membantu oksigenasi pasien - Membantu pasien

			Kolaborasi a. Kolaborasi pemberian bronkodilator jika diperlukan	meredakan gejala seperti sesak napas
3.	Risiko perfusi serebral tidak efektif dibuktikan dengan cedera kepala	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam maka perfusi serebral meningkat dengan kriteria hasil : a. Tingkat kesadaran meningkat b. Gelisah menurun c. Kesadaran membaik	Pemantauan Tanda tanda Vital Observasi a. Kaji tekanan darah b. Kaji nadi c. Kaji pernapasan d. Kaji suhu tubuh Terapeutik a. Mengatur jarak pemantauan sesuai kondisi pasien Edukasi a. Beri tahu hasil pemantauan, jika diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui TD dalam batas normal karena peningkatan TD merupakan salah satu tanda peningkatan TIK - Untuk mengetahui apakah nadi dalam batas normal karena jika terjadi bradikardi merupakan tanda terjadi peningkatan TIK - Untuk mengetahui pola napas pasien - Untuk mengetahui suhu tubuh pasien - Untuk memantau ttv pasien sesuai kondisi - Agar keluarga mengetahui hasil pemantauan
4.	Risiko jatuh dibuktikan dengan penurunan tingkat kesadaran	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam maka Tingkat jatuh menurun dengan kriteria hasil : a. Jatuh dari tempat tidur	Pencegaha Jatuh Observasi a. Identifikasi faktor risiko jatuh	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui faktor risiko jatuh pasien

		menurun	Terapeutik a. Pastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci b. Pasang handrail tempat tidur	- Meminimalkan risiko jatuh - Mencegah pasien terjatuh
--	--	---------	--	---

Implementasi Keperawatan

No.	Diagnosis Keperawatan	Hari Tgl/Jam	Implementasi	Nama jelas
1.	Penurunan kapasitas adaptif intracranial	Senin 12/4/2021 16.00	Manajemen peningkatan Tekanan Intrakranial Observasi <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi penyebab peningkatan TIK Hasil : Terdapat perdarahan diotak sebanyak 9,25 ml b. Monitor tanda/gejala peningkatan TIK Hasil : Bradikardi dan muntah Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> a. Berikan posisi semi fowler Hasil : diberikan head up 30⁰ b. Minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang kurang tenang Hasil : diberikan stimulus dan lingkungan yang nyaman c. Kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan Hasil : diberikan mannitol 100 cc/ 8 jam 	Resky Auliyah
2.	Bersihkan jalan napas tidak efektif	Senin 12/4/2021 15.30	Manajemen jalan napas Observasi <ul style="list-style-type: none"> a. Monitor pola napas Hasil : Pasien nampak sesak frekuensi napas 30 x/i b. Monitor bunyi napas Hasil : tidak ada suara bunyi napas tambahan Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> a. Posisikan semi fowler Hasil : diberikan posisi semi fowler b. Lakukan pengisapan lender kurang dari 15 detik Hasil : dilakukan suction 	Resky Auliyah

			c. Berikan O2 Hasil : terpasang NRM 10 Liter	
3.	Risiko perfusi serebral tidak efektif	Senin 12/4/2021 15.40	<p>Pemantauan tanda vital</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Monitor tekanan darah Hasil : 115/75 mmHg b. Monitor nadi Hasil : 55x/menit c. Monitor pernapasan Hasil : 28x/menit d. Monitor suhu tubuh Hasil : 36°C <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien Hasil : pemantauan dilakukan satu jam sekali <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu Hasil : diinformasikan pada keluarga mengenai hasil pemantauan 	Resky auliyah
4.	Risiko jatuh	Senin 12/4/2021 15.35	<p>Pencegaha Jatuh</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi faktor risiko jatuh Hasil : penurunan tingkat kesadaran GCS 13 <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci Hasil : roda tempat tidur selalu terkunci c. Pasang handrail tempat tidur Hasil : dipasang kedua handrail tempat tidur 	Resky auliyah
5	Penurunan kapasitas adaptif intracranial	Selasa 13/4/2021 14. 30	<p>Manajemen peningkatan Tekanan Intrakranial</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Identifikasi penyebab peningkatan TIK Hasil : Terdapat perdarahan diotak sebanyak 9,25 	Resky Auliyah

			<p>ml</p> <p>d. Monitor tanda/gejala peningkatan TIK Hasil : Bradikardi</p> <p>Terapeutik</p> <p>d. Berikan posisi semi fowler Hasil : diberikan head up 30⁰</p> <p>e. Minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang kurang tenang Hasil : diberikan stimulus dan lingkungan yang nyaman</p> <p>f. Kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan Hasil : diberikan mannitol 100 cc/ 8 jam</p>	
6	Bersihan jalan napas tidak efektif	Selasa 13/4/2021 16.00	<p>Manajamen jalan napas</p> <p>Observasi</p> <p>c. Monitor pola napas Hasil : Pasien nampak sesak frekuensi napas 30 x/i</p> <p>d. Monitor bunyi napas Hasil : tidak ada suara bunyi napas tambahan</p> <p>Terapeutik</p> <p>d. Posisikan semi fowler Hasil : diberikan posisi head up 30⁰</p> <p>e. Berikan O2 Hasil : terpasang NRM 10 Liter</p>	Resky Auliyah
7.	Risiko perfusi serebral tidak efektif	Selasa 13/4/2021 19.00	<p>Pemantauan tanda vital</p> <p>Observasi</p> <p>a. Monitor tekanan darah Hasil : 120/70 mmHg</p> <p>b. Monitor nadi Hasil : 60x/menit</p> <p>c. Monitor pernapasan Hasil : 26x/menit</p> <p>d. Monitor suhu tubuh Hasil : 36,5°C</p> <p>Terapeutik</p>	Resky auliyah

			<ul style="list-style-type: none"> b. Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien Hasil : pemantauan dilakukan satu jam sekali <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu Hasil : diinformasikan pada keluarga mengenai hasil pemantauan 	
8.	Risiko jatuh	Selasa 13/4/2021 17.00	<p>Pencegaha Jatuh</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi faktor risiko jatuh Hasil : penurunan tingkat kesadaran GCS 13 <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci Hasil : roda tempat tidur selalu terkunci b. Pasang handrail tempat tidur Hasil : dipasag kedua handrail tempat tidur 	Resky auliyah
9	Penurunan kapasitas adaptif intracranial	Rabu 14/4/2021 08.00	<p>Manajemen peningkatan Tekanan Intrakranial</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Identifikasi penyebab peningkatan TIK Hasil : Terdapat perdarahan diotak sebanyak 9,25 ml f. Monitor tanda/gejala peningkatan TIK Hasil : Bradikardi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Berikan posisi semi fowler Hasil : diberikan head up 30⁰ h. Minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang kurang tenang Hasil : diberikan stimulus dan lingkungan yang nyaman i. Kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan Hasil : diberikan mannitol 100 cc/ 8 jam 	Resky Auliyah

10.	Bersihkan jalan napas tidak efektif	Rabu 14/4/2021 10.00	Manajamen jalan napas Observasi <ul style="list-style-type: none"> e. Monitor pola napas Hasil : Pasien nampak sesak frekuensi napas 30 x/i f. Monitor bunyi napas Hasil : tidak ada suara bunyi napas tambahan Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> f. Posisikan semi fowler Hasil : diberikan posisi head up 30^o g. Berikan O2 Hasil : terpasang NRM 10 Liter 	Resky Auliyah
11	Risiko perfusi serebral tidak efektif	Rabu 14/4/2021 13.00	Pemantauan tanda vital Observasi <ul style="list-style-type: none"> a. Monitor tekanan darah Hasil : 110/80 mmHg b. Monitor nadi Hasil : 70x/menit c. Monitor pernapasan Hasil : 24x/menit d. Monitor suhu tubuh Hasil : 36,6°C Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> a. Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien Hasil : pemantauan dilakukan satu jam sekali Edukasi <ul style="list-style-type: none"> a. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu Hasil : diinformasikan pada keluarga mengenai hasil pemnataan 	Resky auliyah
12	Risiko jatuh	Rabu 14/4/2021 12.00	Pencegaha Jatuh Observasi <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi faktor risiko jatuh Hasil : penurunan tingkat kesadaran GCS 13 Terapeutik	Resky auliyah

			<p>a. Pastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci Hasil : roda tempat tidur selalu terkunci</p> <p>b. Pasang handrail tempat tidur Hasil : dipasag kedua handrail tempat tidur</p>	
--	--	--	---	--

Evaluasi Keperawatan

No.	Diagnosis Keperawatan	Hari, Tgl/jam	Evaluasi (SOAP)	Nama Jelas
1.	Penurunan kapasitas adaptif intracranial	Senin 12/04/2021 16.20	<p>S : -</p> <p>O : pasien nampak gelisah, GCS 13 E3M6V4, kesadaran somnolen</p> <p>A : Penurunan kapasitas tekanan intracranial belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi penyebab peningkatan TIK Monitor tanda gejala peningkatan TIK Berikan posisi semi fowler Minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan tenang Kolaborasi pemberian sedasi 	Resky Auliyah
2.	Bersihan Jalan Napas tidak efektif	Senin 12/04/2021 15.45	<p>S : -</p> <p>O : Pasien nampak masih sesak, pasien masih nampak mengeluarkan darah dari mulut</p> <p>A : Bersihan jalan napas belum teratasi</p> <p>P : pertahankan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitor pola napas Monitor bunyi napas Posisikan semi fowler Berikan oksigen, jika perlu 	Resky Auliyah
3.	Risiko perfusi serebral tidak efektif	Senin 12/04/2021 17.00	<p>S : -</p> <p>O : GCS 13, pasien masih nampak gelisah</p> <p>A : perfusi serebral belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan Intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitor tekanan darah Monitor nadi Monitor pernapasan Monitor suhu tubuh Atur interval pemantauan sesuai 	Resky Auliyah

			<p>kondisi pasien</p> <p>f. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu</p>	
4.	Risiko jatuh	Senin 12/4/2021 20.00	<p>S: -</p> <p>O : pasien masih nampak gelisah, GCS 13 E3M6V4</p> <p>A: Risiko jatuh belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi faktor risiko jatuh Pastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci Pasang handrail tempat tidur 	Resky Auliyah
5.	Penurunan kapasitas adaptif intracranial	Selasa 13/04/2021 14.40	<p>S : -</p> <p>O : GCS 13 E3M6V4, Pasien masih mengalami penurunan kesadaran</p> <p>A : Penurunan kapasitas tekanan intranial belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi penyebab peningkatan TIK Monitor tanda gejala peningkatan TIK Berikan posisi semi fowler Minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan tenang Kolaborasi pemberian sedasi 	Resky Auliyah
6.	Bersihan jalan napas tidak efektif	Selasa 13/04/2021 16.10	<p>S : -</p> <p>O : Pasien nampak masih sesak, pasien sudah nampak tidak mengeluarkan darah dari mulut</p> <p>A : Bersihan jalan napas belum teratasi</p> <p>P : pertahankan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitor pola napas Monitor bunyi napas 	Resky Auliyah

			c. Posisikan semi fowler	
7.	Risiko perfusi serebral tidak efektif	Selasa 12/04/2021 15.00	S : - O : GCS 13, pasien masih nampak gelisah A : perfusi serebral belum teratasi P : Lanjutkan Intervensi a. Monitor tekanan darah b. Monitor nadi c. Monitor pernapasan d. Monitor suhu tubuh e. Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien f. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu	Resky Auliyah
8.	Risiko jatuh	Selasa 13/4/2021 20.00	S : - O : pasien masih nampak gelisah, GCS 13 E3M6V4 A: Risiko jatuh belum teratasi P: Lanjutkan intervensi a. Identifikasi faktor risiko jatuh b. Pastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci c. Pasang handrail tempat tidur	Resky Auliyah
9.	Penurunan kapasitas adaptif intracranial	Rabu 14/04/2021 08.15	S : - O : GCS 15 E4M6V5, kesadaran composmentis A : Penurunan kapasitas tekanan intranial teratasi P :Pertahankan intervensi a. Identifikasi penyebab peningkatan TIK b. Monitor tanda gejala peningkatan TIK	Resky Auliyah

			<ul style="list-style-type: none"> c. Berikan posisi semi fowler d. Minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan tenang e. Kolaborasi pemberian sedasi 	
10.	Bersihan jalan napas tidak efektif	Rabu 14/04/2021 10.15	<p>S : -</p> <p>O : Pasien sudah tidak sesak, pasien sudah nampak tidak mengeluarkan darah dari mulut, pasien sudah tidak menggunakan oksigen.</p> <p>A : Bersihan jalan napas teratasi</p> <p>P : pertahankan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Monitor pola napas b. Monitor bunyi napas c. Posisikan semi fowler 	Resky Auliyah
11.	Risiko perfusi serebral tidak efektif	Rabu 14/04/2021 13.10	<p>S : -</p> <p>O : GCS 15, pasien sudah nampak tidak gelisah</p> <p>A : perfusi serebral teratasi</p> <p>P : pertahankan Intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Monitor tekanan darah b. Monitor nadi c. Monitor pernapasan d. Monitor suhu tubuh e. Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien f. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 	Resky Auliyah
12.	Risiko jatuh	Rabu 14/4/2021 13.30	<p>S : -</p> <p>O : pasien sudah tidak gelisah, GCS 15 E4M6V5</p> <p>A: Risiko jatuh teratasi</p> <p>P: Pertahankan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi faktor risiko jatuh b. Pastikan roda tempat tidur selalu 	Resky Auliyah

			dalam kondisi terkunci c. Pasang handrail tempat tidur	
--	--	--	---	--



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisa Kasus

Pada kasus laporan akhir ners ini diagnosis pada pasien yang saya angkat yaitu Trauma *Brain Injur*. Cedera otak traumatik (*Traumatic Brain Injury/TBI*) adalah suatu kondisi akut pada otak, bersifat non-degeneratif, dan non-kongenital, yang terjadi akibat kekuatan mekanik eksternal yang mengenai kepala, yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif, fisik, dan psikososial yang bersifat sementara maupun permanen, dan berkaitan dengan timbulnya penurunan ataupun perubahan kesadaran (Dawodu,2015). Penyebab dari trauma brain injury adalah kecelakaan lalu lintas,jatuh dari ketinggian, tindak kekerasan atau penganiayaan, luka tembak, cedera saat olahraga, kecelakaan saat kerja, kejatuhan benda, trauma lahir (Rini et al., 2019). Sedangkan klasifikasi dari TBI itu sendiri berdasarkan GCS menurut Young dan Mcnaught 2011 yaitu Ringan dengan GCS 13-15.

Pada kasus yang saya angkat terdapat beberapa yang memiliki kesenjangan antara teori dan kasus yaitu pasien tersebut mengalami trauma brain injury yang disebabkan oleh faktor kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan kepalanya terbentur, mengalami penurunan kesadaran, serta pasien nampak gelisah. Akibat trauma yang dialami pasien menyebabkan peningkatan tekanan intra kranial sehingga

dilakukan pemeriksaan CT-Scan kepala yang menemukan hasil adanya lesi hiperdens perdarahan subarachnois volume 9,25 ml. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama Sandhy (2020) yang mengatakan bahwa penderita cidera kepala dengan GCS 13-15 memiliki hasil CT-Scan abnormal, kelainan yang didapat yaitu fraktur kranial, subdural hematoma, EDH, SAH, edem serebri dan ICH.

Berdasarkan yang dialami pasien diatas, didala Islam terdapat juga ayat yang menyinggung mengenai musibah yang menimpah manusia yaitu pada QS al-Bāqārah (2): 155-156

وَلَنبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Terjemahnya:

(Dan sungguh Kami akan memberimu cobaan berupa sedikit ketakutan) terhadap musuh, (kelaparan) paceklik, (kekurangan harta) disebabkan datangnya malapetaka, (dan jiwa) disebabkan pembunuhan, kematian dan penyakit, (serta buah-buahan) karena bahaya kekeringan, artinya Kami akan menguji kamu, apakah kamu bersabar atau tidak. (Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar) bahwa mereka akan menerima ganjaran kesabaran itu berupa surga.

(Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah) bencana atau malapetaka (mereka mengucapkan, 'Innaa lillaahi') artinya sesungguhnya kita ini milik Allah; maksudnya menjadi milik dan hamba-Nya yang dapat diperlakukan-Nya sekehendak-Nya, ('wa innaa ilaihi raaji`un') artinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kita akan kembali, yakni ke akhirat, di sana kita akan diberi-Nya balasan. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa yang istirja`/mengucapkan 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`un' ketika mendapat musibah, maka ia diberi pahala oleh Allah dan diiringi-Nya dengan kebaikan." Juga diberitakan bahwa pada suatu ketika lampu Nabi saw. padam, maka beliau

pun mengucapkan istirja`, lalu kata Aisyah, "Bukankah ini hanya sebuah lampu!" Jawabnya, "Setiap yang mengecewakan (hati) orang mukmin itu berarti musibah." Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya.

Menurut Syaikh Abdur Rahman al-Sa'di dalam tafsirnya menyatakan, "Allah swt memberitahukan, bahwa dia pasti akan menguji para hamba-Nya dengan bencana-bencana. Agar menjadi jelas siapa (diantara) hamba itu yang sejati dan pendusta, yang sabar dan berkeluh kesah. Ini adalah ketetapan Allah atas hamba-Nya. Seandainya kebahagiaan selalu menyertai kaum mukmin, tidak ada bencana yang menimpa mereka, niscaya terjadi percampuran, tidak ada pemisah dengan orang-orang tidak baik. Kejadian ini merupakan kerusakan tersendiri. Sifat hikmah Allah menggariskan adanya pemisah antara orang-orang baik dengan orang yang jelek.

Adapun ayat lain yang membahas tentang musibah yaitu QS At-Taubah (9):50

إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ

Terjemahnya:

(Jika kamu mendapat sesuatu kebaikan) seperti mendapat kemenangan dan ganimah (mereka merasa tidak senang karenanya dan jika kamu ditimpa oleh suatu bencana) yaitu keadaan yang kritis (mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah memikirkan urusan kami) secara matang sewaktu kami tidak ikut berangkat (sebelumnya.") sebelum terjadinya bencana ini (kemudian mereka berpaling dengan rasa gembira) atas musibah yang telah menimpamu. (Al-Qur'an, 2019)

Dalam buku Quraish Shihab, Al-Biqā'i berpendapat bahwa ayat ini merupakan penjelasan mengapa neraka jahannam telah meliputi mereka. Apapun hubungan yang dipilih, yang jelas adalah hati kecil mereka tidak senang apabila Rasul

menang dalam peperangan bahkan jika sesuatu kebaikan yang didapatkan oleh nabi maka kaum musyrik tidak senang. Dan kaum muslim mereka yakin bahwa siapapun tidak mampu mendatangkan manfaat atau menampik kemudharatan selain Allah swt.

Adapun ayat lain yang membahas tentang musibah yaitu QS Asy-Syura (42):30

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Terjemahnya:

(Dan apa saja yang telah menimpa kalian) khithab ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin (berupa musibah) berupa malapetaka dan kesengsaraan (maka adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri) artinya, sebab dosa-dosa yang telah kalian lakukan sendiri. Diungkapkan bahwa dosa-dosa tersebut dikerjakan oleh tangan mereka, hal ini mengingatkan, bahwa kebanyakan pekerjaan manusia itu dilakukan oleh tangan (dan Allah memaafkan sebagian besar) dari dosa-dosa tersebut, karena itu Dia tidak membalasnya. Dia Maha Mulia dari menduakalikan pembalasan-Nya di akhirat. Adapun mengenai musibah yang menimpa kepada orang-orang yang tidak berdosa di dunia, dimaksudkan untuk mengangkat derajatnya di akhirat kelak.

Al-Maraghi menafsirkan bahwa musibah-musibah di dunia yang menimpa manusia tidak lain sebagai hukuman atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan.

Namun Allah memaafkan manusia atas kejahatan yang telah dilakukan dengan tidak menghukum atas semua kejahatan tersebut. Allah menjadikan dosa sebagai sebab-sebab yang menghasilkan akibat. (Shihab, 2007)

Menurut Rini et all 2019 manifestasi klinis pasien yang mengalami cedera kepala yaitu perubahan tingkat kesadaran, bingung, nyeri kepala, gangguan penglihatan, abnormalitas pupil, reflex kornea tidak ada, perubahan tanda tanda vital, disfungsi sensoris, vertigo, kekakuan, gangguan pergerakan serta kejang.

Dari manifestasi klinis diatas, pada kasus yang saya dapatkan memiliki perbedaan yaitu pada pasien saya nyeri kepala tidak bisa dikaji karena pasien mengalami penurunan kesadaran sehingga jika dikaji mengenai nyeri yang dirasakan pasien hanya meracau. Selain nyeri, abnormalitas pupil serta reflex kornea pun tidak bisa dikaji karena pasien mengalami hematoma pada kelopak mata sehingga mata pasien tidak bisa dibuka yang menyebabkan penulis tidak bisa mengkaji pupil serta reflex kornea pasien.

Keluhan utama klien yang didapatkan dari hasil pengkajian adalah penurunan kesadaran dengan nilai GCS 13, E : membuka mata karena dipanggil (3), M : mematuhi perintah (6), V : bingung dan disorientasi tempat (4). Pasien diklasifikasikan secara klinis sesuai dengan tingkat kesadaran. Kondisi klinis dan tingkat kesadaran setelah cedera kepala dinilai menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS), merupakan skala universal untuk mengelompokkan cedera kepala dan faktor patologis yang menyebabkan penurunan kesadaran

Menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia 2016 terdapat beberapa diagnosis yang mungkin muncul pada kasus trauma *brain injury* yaitu penurunan kapasitas adaptif intracranial, risiko perfusi serebral tidak efektif, gangguan mobilitas fisik, dan bersihan jalan napas tidak efektif. Akan tetapi pada kasus memiliki perbedaan dimana pada kasus yang saya dapatkan diagnosis gangguan mobilitas fisik tidak ditegakkan karena pasien mampu menggerakkan kedua ekstremitasnya.

Diagnosis keperawatan utama pada kasus diatas adalah penurunan kapasitas adaptif intracranial. Masalah ini didapatkan pada saat selesai pengkajian pada pasien saat dirawat di Ruang ICU dengan data terdapat perdarahan di otak sebanyak 9,25 ml, bradikardi, tingkat kesadaran menurun, serta muntah. Hal ini sejalan dengan Libeskind 2018 yang menuliskan bahwa perdarahan terjadi akibat proses trauma yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah otak.

Pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani penyakit seperti kasus diatas yaitu teori *self care*. Pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan untuk melakukan perawatan diri dan memiliki hak untuk melakukan perawatan diri secara mandiri, kecuali jika orang tersebut tidak mampu. *Self care* menurut Dhorothea Orem, (2001) adalah kegiatan memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan individu baik dalam keadaan sehat maupun sakit yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Sesuai dengan teori orem, kondisi pasien pada kasus diatas berada pada kebutuhan kompensatori dimana pasien berada dalam ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri, sehingga perawat dan pasien memiliki peran yang sama dalam melakukan self care (Chloranyta, 2020)

B. Analisis intrvensi

Analisis intervensi penurunan kapasitas adaptif intracranial pada pasien trauma brain injury berdasarkan (SIKI, 2018) adalah manajemen peningkatan tekanan intracranial, terdapat beberapa intervensi yang bisa dilakukan akan tetapi tidak

bisa dilakukan semua oleh penulis karena disesuaikan dengan kondisi pasien serta terdapat beberapa keterbatasan dari penulis. Adapun intervensi yang dilakukan pada pasien adalah Observasi: identifikasi penyebab peningkatan TIK, monitor tanda dan gejala peningkatan TIK. Terapeutik: berikan posisi semi fowler, minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. Kolaborasi: kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan. Tindakan utama yang diberikan pada diagnosis penurunan kapasitas adaptif intracranial adalah head up 30⁰ (posisi semi fowler). Penerapan intervensi pemberian posisi head up 30⁰ merupakan cara memposisikan kepala seseorang lebih tinggi sekitar tiga puluh derajat dari tempat tidur dengan posisi tubuh sejajar dan kaki lurus atau tidak menekuk. Posisi Head up 30⁰ mempunyai manfaat untuk menurunkan tekanan intracranial pada pasien dengan cedera kepala.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertami dkk 2017 dengan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dari posisi head up 30⁰ terhadap perubahan tekanan intracranial, terutama pada tingkat kesadaran dan tekanan arteri rata-rata pasien dengan cedera kepala. Posisi *head up* 30⁰ dilakukan pada pasien cedera kepala karena posisi ini akan memudahkan drainase aliran darah balik dari intracranial sehingga dapat menurunkan tekanan intracranial. Tekanan intracranial akan menurun secara signifikan dari posisi head up 0⁰-35⁰ tetapi pada posisi 40⁰ katas, TIK akan naik lagi (Pertami dkk, 2017). Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh (Ginting, 2020) dengan hasil penelitian terdapat

pengaruh pemberian oksigen dan elevasi kepala 30⁰ terhadap tingkat kesadaran pada pasien cedera kepala sedang.

Hasil dari intervensi yang dilakukan yaitu pemberian posisi *head up* 30⁰ terhadap An R dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intracranial dengan hasil akhir GCS pasien meningkat yaitu GCS 15 E4M6V5 dengan kesadaran pasien composmentis, pasien sudah tidak gelisah serta pasien sudah tidak mengeluarkan darah dari mulut

Adapun ayat yang membahas tentang proses penyembuhan yaitu QS Al-Isrā (17):82

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya:

(Dan Kami turunkan dari) huruf min di sini menunjukkan makna bayan atau penjelasan (Alquran suatu yang menjadi penawar) dari kesesatan (dan rahmat bagi orang-orang yang beriman) kepadanya (dan Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim) yakni orang-orang yang kafir (selain kerugian) dikarenakan kekafiran mereka

Dalam tafsir al-Azhar bahwa di dalam Al-Quran ada obat-obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Banyak penyakit yang bisa disembuhkan oleh Al-Quran. Dan memang banyak penyakit yang menyerang jiwa manusia, dapat disembuhkan oleh ayat-ayat Al-Quran.

Adapun ayat tentang proses penyembuhan lainnya yaitu terdapat pada QS Asy-Syu'ara (26):80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya :

"Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku" (Doa Nabi Ibrahim).

كَمَا سَيِّئَاتِهِ بِهِ اللَّهُ حَطَّ إِلَّا سِوَاهُ فَمَا مَرَضٍ مِنْ أَدَى يُصِيبُهُ مُسْلِمٍ مِنْ مَا
وَرَقَهَا الشَّجَرَةُ تَحُطُّ

Terjemahnya :


“Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan mengururkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang mengururkan daun-daunnya”. (HR. Bukhari)

C. Alternatif Pemecahan Masalah (memberikan selain intervensi utama berbasis EBN)

Beberapa intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk kasus yang sama yaitu terapi murrotal dan guide imagery. Terapi murrotal yang diperdengarkan secara teratur dan tidak memiliki perubahan irama yang mendadak meningkatkan relaksasi hingga 65 %. Pemberian terapi murrotal akan mengaktifkan sel-sel tubuh dengan mengubah getaran suara menjadi gelombang yang ditangkap oleh tubuh, menurunkan rangsangan nyeri sehingga otak mengeluarkan opiod natural endogen. Opiod ini bersifat permanen untuk memblokade nociceptor nyeri. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma dkk, 2019) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh terapi murrotal terhadap skala nyeri kepala pada klien cedera kepala.

Guide imagery adalah penggunaan imajinasi dengan sengaja untuk memperoleh relaksasi atau menjauhkan dari sensasi yang tidak diinginkan.

Relaksasi dengan tehnik guide imagery akan membuat tubuh lebih rileks dan nyaman. Dengan melakukan nafas dalam secara perlahan tubuh akan menjadi rileks. Perasaan rileks akan diteruskan ke hipotalamus untuk menghasilkan corticotropin releasing factor (CRF). Selanjutnya CRF merangsang kelenjar pituitary yang menghasilkan endorphen yang mempengaruhi suasana hati menjadi rileks. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pusparini, 2017) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh guide imagery terhadap nyeri kepala pasien cedera kepala ringan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemberian posisi *head up* 30⁰ pada pasien trauma *brain injury* dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intracranial hasilnya yaitu masalah teratasi dengan GCS terakhir 15 E4M6V5. Dan pada masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif juga teratasi dengan intervensi yang diberikan yaitu posisi *head up* 30⁰ serta pemberian oksigen 10 liter NRM.

B. Saran

1. Bagi profesi Keperawatan tugas akhir ini bisa dijadikan bahan referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi non farmakologi
2. Bagi pelayanan Rumah Sakit karya akhir ini menjadi masukan bagi bidang keperawatan dan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien trauma *brain injury* dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intracranial
3. Bagi institusi pendidikan karya ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dalam pemberian asuhan keperawatan khususnya pada kasus trauma *brain injury*

DAFTAR PUSTAKA

- Adithya Nugroho, B. & M. (2018). *Pemenuhan Oksigenasi Otak Melalui Posisi Elevasi Kepala Pada Pasien Stroke Hemoragik By Beni.*
- Al-Qur'an, K. (2019). *Kementerian Agama Republik Indonesia.*
- Chloranyta, S. (2020). Analisis Penerapan Teori Self Care Dorothea Orem Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik.*
- Dawodu, S. . (2015). *Definition and Pathophysiology, Overview, Epidenilogy, Primary Injury.*
- dhorothea orem. (2001). *Nursing concept of praktise.* The C.V Morby Company.
- Erny, Prasetyo, O., & Prasetyo, D. (2019). *Trauma Kepala pada Anak : Klasifikasi Hingga Pemantauan Jangka Panjang.* 2071(September), 42–58.
- Ginting, L. R. B. (2020). Pengaruh Pemberian Oksigen dan Elevasi Kepala 30 Derajat Terhadap Tingkat Kesadaran Pada Pasien Cedera Kepala Sedang. *Jurnal Keperawatan Dan Fisioterapi (JKF).*
- Gorr, W. L. & K. K. S. (2011). *GIS TUTORIAL.*
- Haryono, R., & Utami, M. P. S. (2019). *Keperawatan Medikal Bedah 2.* Pustaka Baru Press.
- Imtihanah, A. (2017). Pengelolaan Peningkatan Tekanan Intrakranial. *Jurnal Ilmiah Kedokteran.*
- Kusuma dkk. (2019). Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Skala Nyeri Kepala Pada Klien Cedera Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dan RSUD Banyumas. *Jurnal Riset Kesehatan Nasional.*
- Mannurung, N. (2018). *Keperawatan Medikal Bedah Konsep, Mind Mapping dan NANDA NIC NOC.* TIM.
- Nurarif & Kusuma. (2013). *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis & NANDA NIC-NOC.*
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia.* Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia.* Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2019). *Standar Luaran*

Keperawatan Indonesia. Dewan Pengurus Pusat PPNI.

Pertami, S. B., Sulastyawati, & Anami, P. (2017). Effect Of 30° Head-Up Position On Intracranial Pressure Change In Patients With Head Injury In Surgical Ward Of General Hospital Of Dr. R. Soedarsono Pasuruan. *Public Health of Indonesia*, 3(3), 89–95. <https://doi.org/ISSN: 2477-1570>

PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. dewan pengurus pusat persatuan perawat nasional Indonesia.

Pusparini, Y. (2017). pengaruh Guide Imagery Terhadap Nyeri Kepala Pasien CKR (Cedera Kepala Ringan). *Jurnal Kesehatan Masada*.

Rini, I. S., Suharsono, T., Ulya, I., Suryanto, Kartikawati, D., & Fathoni, M. (2019). *Buku Ajar Keperawatan pertolongan pertama gawat darurat*. UB Pres.

RISKESDAS. (2018). *Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar*.

Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol IV*. Lentera Hati.

Sudadi. (2017). *Brain Protection Pada Traumatik Brain Injury*. 5(November), 59–65.

Taufiq, S. M. ., Saragih, S. G. ., & Natalia, D. (2019). *Hubungan antara Pediatric Trauma Score dan Mortalitas pada Pasien Cedera Kepala*. 5, 882–891.

L

A

M


P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

REVISI DRAFT KTI RESKY AULIYAH INSANI B FIX

ORIGINALITY REPORT

22% SIMILARITY INDEX	22% INTERNET SOURCES	1% PUBLICATIONS	8% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.poltekkes-denpasar.ac.id Internet Source	6%
2	www.scribd.com Internet Source	3%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
5	sinta.unud.ac.id Internet Source	2%
6	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet Source	1%
7	pt.scribd.com Internet Source	1%
8	ejr.stikesmuhkudus.ac.id Internet Source	1%
9	mmusthofa124.wordpress.com Internet Source	1%

10	repository.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
12	siakad.akperkesdam2sriwijaya.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography Off

M A K A S S A R



Daftar Riwayat Hidup

Resky Auliyah Insani B, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 04 Agustus 1998. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan bapak **Bakri** dan Ibu **Samsinah**. Penulis atau yang lebih akrab dipanggil Kiki ini mulai mengikuti pendidikan Sekolah Dasar di SDN No 1 Centre Pattallassang pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Takalar pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Takalar pada tahun 2013 dan selesai di tahun 2016. Setelah itu di tahun yang sama penulis mendaftar diri Ke Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur UM-PTKIN dan diterima di Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan jurusan Keperawatan dan berhasil lulus S1 Keperawatan di kampus tersebut pada tahun 2020. Kemudian pada tahun yang sama penulis kembali mendaftar di kampus tersebut dalam prodi Profesi Ners dan diterima. Syukur alhamdulillah penulis masih di berikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melewati perjuangan keras serta doa dari ibu bapak dan keluarga serta teman-teman yang membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Implementasi posisi *head up 30°* pada An R dengan diagnosis trauma *brain injury* dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intracranial di ruangan Intesif Care Unit (ICU) RSUD Labuang Baji”.

EFFECT OF 30° HEAD-UP POSITION ON INTRACRANIAL PRESSURE CHANGE IN PATIENTS WITH HEAD INJURY IN SURGICAL WARD OF GENERAL HOSPITAL OF Dr. R. SOEDARSONO PASURUAN

Sumirah Budi Pertami*, Sulastyawati, Puthut Anami

Department of Nursing, Polytechnic of Health of Malang, Ministry of Health Republic of Indonesia

Accepted: 5 September 2017

***Correspondence:**

Sumirah Budi Pertami

Department of Nursing, Polytechnic of Health of Malang

Ministry of Health Republic of Indonesia

Jln. A.Yani No 1 lawang Malang E-

mail: sumirahbudip@yahoo.com

Copyright: © the author(s), YCAB publisher and Public Health of Indonesia. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ABSTRACT

Background: Head-injured patients have traditionally been maintained in the head-up position to ameliorate the effects of increased intracranial pressure (ICP). However, it has been reported that the 15 degrees head-up position may improve cerebral perfusion pressure (CPP) and outcome. We sought to determine the impact of 30 and 15 degrees on intracranial pressure change.

Methods: This was a quasi-experimental study with posttest only control time series time design. There were 30 head-injured patients was selected using consecutive sampling, with 15 assigned in the treatment (30° head-up position) and control group (15° head-up position). Intracranial pressure variable was identified using the level of consciousness and mean arterial pressure parameters. Wilcoxon signed rank test was used for data analysis

Results: Findings showed p-value 0.010 (<0.05) on awareness level and p-value 0.031 (<0.05) on mean arterial pressure, which indicated that there was a statistically significant effect of the 30° head-up position on level of awareness and mean arterial pressure.

Conclusion: There was a significant effect of the 30° head-up position on intracranial pressure changes, particularly in the level of awareness and mean arterial pressure in patients with head injury. It is recommended that for health workers to provide knowledge regarding this intervention to prevent increased intracranial pressure.

BACKGROUND

Head injuries include injuries by objects/ bone fragments that penetrate brain tissue, and the effect of strength or energy being passed on to the brain or the effects of acceleration and deceleration on the brain.¹

According to literature, head injuries can cause serious problems such as increased intra-cranial pressure, crisis hypertension, bleeding, seizures and death. Increased intracranial pressure can lead to ischemia or

infarction of brain tissue and brain death so that immediate precautions are required.²

Traffic accidents are the most common cause of head injuries and are a public health problem worldwide, especially in developing countries.³ This situation generally occurs in motor drivers without wearing helmet or wearing helmets carelessly, and do not meet the standards.³ Brain injury trauma is a significant global public health concern and is predicted to be the leading cause of death and disability by 2020.⁴

Every year, in the United States, it is about 30 million emergency injuries become hospital cases and cause death. Of those, 16% are head injuries as a primary and secondary diagnosis. In 2010, approximately 2.5 million people were hospitalized with a diagnosis of head injury in the United States.⁵ In Asia, a high percentage of incidence of head injury is caused by fall (77%) and other injuries (57%).⁴

In Indonesia, the incidence of head injury each year is estimated to reach 500,000 cases, with 10% of them died before arriving at the hospital. Of all cases, 80% were classified as mild head injury, 10% as moderate head injury, and 10% as severe head.⁶ According to medical record data of general hospital of dr. R. Soedarsono Pasuruan during the preliminary study, there were 115 cases of head injury on July - September 2016, with 94 patients categorized as mild head injury, 8 moderate head injury and 13 serious head injury patients.

Non-pharmacologic strategies performed for the management of head injury are the setting up of the 15-30° head-up position to improve venous return and reduce intracranial pressure. In patients with hypovolemic, there may be a suspicion of a drastic decrease in blood pressure and decreased cerebral perfusion.⁷ In management to optimize the value of

intra-cranial pressure, blood pressure is required to maintain the value of cerebral perfusion pressure within the normal range. In patients with severe head injury, hypotension may increase death. While in patients with head injury, hypertension also occurs that can cause death. The 30° head-up position is suggested according to previous studies, which can decrease ICT and increase the pressure of cerebral perfusion compared to the supine position.⁸ A 30° head-up position is performed in patients with head injury because this position will facilitate drainage of reverse blood flow from intracranial so as to reduce intracranial pressure.² In addition, from the Mahfoud study,⁹ it was found that intracranial pressure in ICT values decreased significantly in the 0°-60° position range, minimum intracranial arterial pressure was found in patients with a 30° head-up position. Horizontal position will increase CPP and head-up position >40° will decrease brain perfusion.⁸ Bahrudin and Sunardi¹⁰ also stated that ICT will decrease significantly from 0°- 35° head-up position, but in 40° position and upwards, ICT will rise again.

Therefore, this study aimed to analyze the effect of the 30° head-up position on changes in intracranial pressure in patients with head injury. The study was conducted by observing the level of awareness and Mean Arterial Pressure (MAP) to identify changes in intracranial pressure.

METHODS

Design

This was a quasi-experimental study with posttest only control time series time design.

Research subjects

The target population in this study was all patients with head injury in the surgical

ward of the general hospital of Dr. R. Soedarsono Pasuruan. There were 30 head-injured patients was selected using consecutive sampling, with 15 assigned in the treatment and control group.

Intervention

The researcher performed a 30° head-up position to the treatment group and the 15° head-up position to the control group to obtain relevant data in accordance with the research objectives. The treatment of this position arrangement was performed when the patient was treated in the surgical ward. The treatment was given for 2 hours on the first day and then the level of awareness and Mean Arterial Pressure was measured (posttest 1). After than, the treatment was continued for 2 hours and then the level of awareness and Mean Arterial Pressure was measured again (posttest 2).

Instrument

Level of awareness and mean arterial pressure were measured in this study. Level of awareness was measured using GCS instruments (Glasgow Coma Scale) to describe intracranial pressure. GCS 9 -12 refers to moderate intracranial pressure increase, and GCS 13-15 refers to 13-15. While Mean Arterial Pressure or average of arterial pressure was calculated by measuring blood pressure then counting systole multiply diastole and divided by three. Measurement of Mean Arterial Pressure to explain the intracranial

pressure in this study was categorized into 3 classes: High if MAP >100 mmHg, normal if MAP in the range 70 - 100 mmHg, and low if MAP <70 mmHg.

Research Ethics

Ethical approval was obtained from the Health Research Ethics Commission at Poltekkes Kemenkes Malang. Study permission was obtained from the General Hospital of Dr. R. Soedarsono Pasuruan to carry out research by disseminating the intent and purpose of research. The researcher explained the objectives and procedures of the study, and asked for the patient's willingness to be the respondent in the study and signed the informed consent.

Data analysis

Wilcoxon signed rank test was used for data analysis because the result of normality test using Shapiro Wilk showed <0.05, which indicated that the data were not in normal distribution.

RESULTS

Characteristics of respondents

Table 1 shows that 33.3% of patients with head injury aged 15-25 years, 30% of them aged 26-35%, and the rest aged 36-65 years. The majority of respondents were male (60%), having head injury caused by motor vehicle accidents (73.3%), and 83.3% of them had mild head injury.

Table 1. Distribution of respondents based on age, gender, cause of head injury, head injury classification

Characteristics	n	%
Age		
15 – 25	10	33.3%
26 – 35	9	30%
36 – 45	2	6.67%
46 – 55	5	16.67%
56 – 65	4	13.33%
Gender		
Male	18	60%
Female	12	40%

Cause of head injury		
Motor vehicle accidents	22	73.3%
Work-related accidents	2	6.7%
Falls	4	13%
Blunt trauma	2	6.7%
Classification		
Mild head injury	25	83.3%
Moderate head injury	5	16.67%

Table 2. Average level of awareness and mean arterial pressure

Variables	n	Mean	SD
Level of Awareness			
<i>30° Head-up position</i>			
Posttest 1	15	13.67	1.44
Posttest 2	15	14.87	0.32
<i>15° Head-up position</i>			
Posttest 1	15	14.40	0.91
Posttest 2	15	14.60	0.91
Mean Arterial Pressure (MAP)			
<i>30° Head-up position</i>			
Posttest 1	15	80.42	18.5
Posttest 2	15	93.76	5.57
<i>15° Head-up position</i>			
Posttest 1	15	85.01	15.3
Posttest 2	15	81.05	15.4

The result of the awareness level on the 30° head-up position in 15 respondents in posttest

1 showed that 26.67% of respondents had awareness level 9-12 and 73.33% of them had awareness level 13-15. In posttest 2, it was 100% of respondents had awareness level ranged 13-15. Table 2 shows that the mean level of awareness in posttest 1 was 13.67 and in posttest 2 was 14.87. While the level of

awareness on the 15° head-up position, the mean of awareness level in posttest 1 was

14.40 and in posttest 2 was 14.60. For the mean arterial pressure, in the 30° head-up position, MAP in the posttest 1 was 80.42 and posttest 2 was 93.76. While in the 15° head-up position, MAP in the posttest 1 was 85.01 and posttest 2 was 81.05.

Table 3. Effect of the 30° head-up position on intracranial pressure changes using Wilcoxon signed rank test

Level of Awareness	P-value
<i>30° Head-up position</i>	
Posttest 1	0.010*
Posttest 2	
<i>15° Head-up position</i>	
Posttest 1	0.083
Posttest 2	
Mean Arterial Pressure (MAP)	
<i>30° Head-up position</i>	
Posttest 1	0.031*
Posttest 2	
<i>15° Head-up position</i>	
Posttest 1	0.035*
Posttest 2	

Wilcoxon signed rank test as shown in the Table 3 showed p-value 0.010 (<0.05), which indicated that there was a statistically significant effect of the 30° head-up position on level of awareness compared to the 15° head-up position. However, there were statistically significant effects of both 30° and 15° head-up position on mean arterial pressure with p-value 0.031 and 0.035 (<0.05).

DISCUSSION

This study aimed to analyze the effect of the 30° head-up position on changes in intracranial pressure in patients with head injury. Intracranial pressure was described in terms of awareness level and mean arterial pressure. Findings of this study revealed that there was a statistically significant effect of the 30° head-up position on level of awareness. This is in line with previous study found that 93.3% of patients post-op trepanation had compos mentis awareness after given 30° head-up position in 30 minutes.

The 30° head-up position aims to secure the patient in the fulfillment of oxygenation in order to avoid hypoxia in the patient, and intracranial pressure may be stable within the normal range.¹¹ In addition, this position is more effective to maintain the level of consciousness because it affects the anatomical position of the human body which then affects the patient's hemodynamics. The 30° head-up position is also effective for brain homeostasis and prevent secondary brain damage by respiratory function stability to maintain adequate cerebral perfusion.¹²

Findings of this study also revealed that there was statistically significant effect of both 30° and 15° head-up position on mean arterial pressure. This is consistent with previous study indicated that head-up position in the range 15-30° could decrease cerebral perfusion pressure and stabilize mean arterial pressure.⁸ The Mean Arterial

Pressure (MAP) variable was measured in this study because of the particularity of the clinical symptoms in head injury namely decreased level of consciousness and change in blood pressure. Besides, MAP is used in the formula: *Cerebral Perfusion Pressure = Mean Arterial Pressure - Intracranial Pressure*.¹⁰ Cerebral Perfusion Pressure is the pressure of brain perfusion, which is related to the intracranial pressure.

On the other hand, Olviani⁸ states that Mean Arterial Pressure should be maintained above 60 mmHg to ensure perfusion to the brain, coronary artery and kidney during head-up position. In addition, an increase in blood pressure or enlarged pulse pressure (the difference between systolic and diastolic blood pressure) or changes in vital signs is a clinical symptom of increased intracranial pressure.¹² Changes in systole and diastole will also affect the value of mean arterial pressure in patients with head injury.

Positioning is one of the familiar forms of nursing intervention in the application of patient care. The 30° head-up position is part of progressive mobilization of level I in head-injured patients who can be non-pharmacological techniques to maintain intracranial pressure stability. The 30° head-up position can launch venous drainage from the head and stable condition; and prevent neck flexion, head rotation, cough and sneeze.

However, the effect of the 30° head-up position on intracranial pressure is influenced by many factors include drug factors, history of hypertension and other nonpharmacological techniques. Drug factors are excluded in this study due to the researchers limitations in controlling the half-life of the drug, and the other confounding factors such as prior history of disease were also excluded because in

the study there were no respondents with prior history of hypertension.

At the time of the study, some patients were not able to tilt to one side of the body so that this limitation affected the progressive mobilization of level I for head injury patients. In addition, in this study, the researcher also had a limitation in managing pharmacological treatment that might impact on intracranial pressure, such as sedation with morphine IV, tracheal intubation, mechanical hyper-ventilation ($\text{PaCO}_2 < 30$ mmHg), hyperosmotic drugs (mannitol 0.25-0.5 g / kg), diuretics (furosemide 5-20 mg), paralysis (pancuronium 1-4 mg) and LCS drainage.⁷ However, this study provides the insight of knowledge regarding the effect of the 30° head-up position on intracranial pressure change.

CONCLUSION

It can be concluded that there was a significant effect of the 30° head-up position on intracranial pressure changes, particularly in the level of awareness and mean arterial pressure in patients with head injury. It is recommended that for health workers to provide knowledge regarding this intervention to prevent increased intracranial pressure. Further study is needed to examine the 30° head-up position on intracranial pressure, including pulse rates, breathing, pain level, vomiting and pupillary response.

REFERENCES

1. Grace PA, Borley NR. At a glance ilmu bedah. *Edisi ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2006.
2. Japardi I. Pemeriksaan dan Sisi Praktis Merawat Pasien Cedera Kepala. *Jurnal Keperawatan Indonesia*. 2003;7(1):32-35.
3. Riyadina W, Subik IP. Profil keparahan cedera pada korban kecelakaan sepeda motor di Instalasi Gawat Darurat RSUP Fatmawati. *Universa Medicina*. 2016;26(2):64-72.
4. Puvanachandra P, Hyder AA. The burden of traumatic brain injury in Asia: a call for research. *Pak J Neurol Sci*. 2009;4(1):27-32.
5. Frieden TR, Houry D, Baldwin G. Report to Congress on Traumatic Brain Injury in the United States: Epidemiology and Rehabilitation: National Center for Injury Prevention and Control; Division of Unintentional Injury Prevention. Atlanta, GA. ; 2015.
6. Clarinta U, Iyos RN. Cedera Kepala Berat dengan Perdarahan Subaraknoid. *Journal Medula Unila*. 2016;4(4):188-193.
7. Dunn LT. Raised intracranial pressure. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*. 2002;73(suppl 1):i23-i27.
8. Olviani Y. PENGARUH PELAKSANAAN MOBILISASI PROGRESIF LEVEL I TERHADAP NILAI MONITORING HEMODINAMIK NON INVASIF PADA PASIEN CEREBRAL INJURY DI RUANG ICU RSUD ULIN BANJARMASIN TAHUN 2015. *Caring*. 2015;2(1):37-48.
9. Mahfoud F, Beck J, Raabe A. Intracranial pressure pulse amplitude during changes in head elevation: a new parameter for determining optimum cerebral perfusion pressure? *Acta neurochirurgica*. 2010;152(3):443-450.
10. Bahrudin M. Posisi Kepala Dalam Stabilisasi Tekanan Intrakranial. 2016.

11. Khandelwal N, Khorsand S, Mitchell SH, Joffe AM. Head- elevated patient positioning decreases complications of emergent tracheal intubation in the ward and intensive care unit. *Anesthesia & Analgesia*. 2016;122(4):1101-1107.
12. Batticaca FB. Asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem persarafan. *Jakarta: Salemba Medika*. 2008.

Cite this article as: Pertamina SB, Sulastyawati, Anami P. Effect of 30° Head-Up Position on Intracranial Pressure Change in Patients with Head Injury in Surgical Ward of General Hospital of Dr. R. Soedarsono Pasuruan. *Public Health of Indonesia* 2017;3(3):89-95

