

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA *CRONIC KIDNEY DISEASE (CKD)* DENGAN
GANGGUAN POLA ELIMINASI URIN INTERVENSI *BLADDER TRAINING*
(*DELAY URINATION*) DI RUANG MAMMINASA BAJI RSUD LABUANG BAJI
MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Oleh :

SUDARMI S. Kep
NIM: 70900119043

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA *CRONIC KIDNEY DISEASE (CKD)*
DENGAN GANGGUAN POLA ELIMINASI URIN
INTERVENSI *BLADDER TRAINING (DELAY URINATION)*
DI RUANG MAMMINASA BAJI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat memperoleh
Gelas Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:
SUDARMI

NIM: 70900119043

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS ANGKATAN XVI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudarmi
NIM : 70900119043
Tempat/Tgl. Lahir : Bakunge, 22 September 1996
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Profesi Ners
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumahan Romang Polong Indah
Judul : Asuhan Keperawatan Pada *Cronic Kidney Disease (Ckd)*
Dengan Gangguan Pola Eliminasi Urin Intervensi *Bladder*
Training (Delay Urination) Di Ruang Mamminasa Baji Rsud
Labuang Baji Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini adalah benal karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 16 Juli 2021

Penyusun, Sudarmi

.....
NIM: 70900119043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Andryana Agrevita, S.Kep NIM: 70900120004, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Asuhan keperawatan pada pasien preeklampsia post operasi *sectio caesarea* dengan gangguan pemenuhan rasa nyaman (nyeri) di RSUD Labuang Baji Makassar”, memandang bahwa Tugas Akhir Ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 14 Juli 2021



Dr. Risnah, S.Kep.,Ns.,M.Kes

Pembimbing I



Eva Yustilawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep

Pembimbing II

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Cronic Kidney Disease (CKD)* dengan Gangguan Pola Eliminasi Urin Intervensi *Bladder Training (Delay Urination)* di RSUD Labuang Baji Makassar" yang disusun oleh Sudarmi, S.Kep NIM : 70900119043, Mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan di pertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari kamis dan tanggal 16 juli 2021 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan.

Makassar, 16 Juli 2021
06 Dzulhijjah 1442 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Maria Ulfah Azhar, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muhaemin, S.Ag., M.Th.I.,M.Ed	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Risnah, SKM.,S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Eva Yustilawati, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP.198007012006042002

KATA PENGANTAR

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah kita diberikan nikmat kesehatan hingga sampai sekarang ini. Dan tak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw serta para sahabat-sahabat-Nya, pengikut-pegikutnya hingga akhir zaman yang telah mengajarkan iman dan islam kepada kita, sehingga kita dapat menikmati indahnya keimanan dan Islam.

Dengan penuh rasa syukur Penulis ucapkan karena dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah Akhir dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada *Cronic Kidney Disease (Ckd)* Dengan Gangguan Pola Eliminasi Urin Intervensi *Bladder Training (Delay Urination)* Di Ruang Mamminasa Baji Rsud Labuang Baji Makassar”. mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akhir ini banyak menerima suport moril, saran-saran dan arahan dari berbagai pihak. Penulis mempersembahkan terima kasih setinggi-tingginya untuk kedua orang tua wali Syamsuddin dan Sarmadia yang tak henti-hentinya memberi support moril maupun materil, doa-doa yang selalu ditasbihkan dan usaha-usaha yang tak lelah dilakukan untuk mengantarkan penulis menyelesaikan amanah akademik sebagai Perawat Profesional.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhanis M.A, Ph.D selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaludiin, Sp.A.,M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta pada wakilt dekan dan staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
3. Ibu Dr. Patima, S.Kep, Ns, M.Kep selaku ketua Program Studi Profesi Ners dan Dr. Hasnah, S.Kep. Ns, M.Kep selaku sekretaris Program Profesi Nesr, beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan.
4. Kepada Dr. Risnah, S.KM.,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku pembimbing I dalam proses penyelesaian yang telah sedia membimbing dan mengawal di awal penulisan karya ilmiah, yang telah sabar, ikhlas meluangkan waktu di tengah rutinitasnya utnuk berdiskusi dan memberi arahan kepada dan motivasi bagi penulis.

5. Kepada Ns Eva Yustilawati, S.Kep.,M.Kep selaku pembimbing ke II dalam proses penyelesaian yang telah sedia membimbing dan mengawal di awal penulisan karya ilmiah.
6. Kepada Ns Marua Ulfah Azhar, S.Kep.,M.Kep selaku Penguji I dan Bapak Dr. Muhaemin, S.Ag., M. Th.I.,M,Ed selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dan kesediaan waktu membimbing sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang terbaik yang diharapkan dapat bermanfaat bagi orang lain.
7. Kepada para perawat di RSUD Labuang Baji Kota Makassar yang telah kebersamai dan membimbing proses praktik pendidikan profesi
8. Kepada teman-teman seperjuangan, Ners Angkatan XVI UINAM yang telah sedia menerima penulis sebagai kawan mulai dari pembelajaran online hingga praktif offline. semoga ukhuwah yang terjalin tetap dieratkan walau di kemudian hari telah disibukkan dengan urusan masing-masing.

Di samping itu, penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah baik lisan maupun tindakan saat menempuh pendidikan di Kampus Tercinta, Kampus Peradaban UIN Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa menyempurnakan karya tulis ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan karya ilmiah selanjutnya. Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Sekian dan terima kasih

Makassar, 16 Juli 2021

Sudarmi

EVIDENCE BASED NURSING BLADDER TRAINING (DELAY URINATION) PADA PASIEN GANGGUAN ELIMINASI URINE DENGAN DIAGNOSIS MEDIS CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR

¹Risnah, ²Eva Yustilawati, ³Sudarmi*

*Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar
E-mail: Sudarmiuda09@gmail.com

ABSTRAK

Bladder Training adalah salah satu penerapan *Evidence Based Nursing* (EBN) untuk mengurangi gangguan eliminasi urin pada pasien *Chronic Kidney Disease* (CKD) yang terpasang keteter urin. *Bladder training* adalah latihan kandung kemih yang bertujuan untuk mengembangkan tonus otot dan otot spingter kandung kemih agar bertujuan maksimal. Tujuan dari EBN ini adalah mengedintifikasi efektifitas *Bladder Training (delay urination)* terhadap penurunan gangguan eliminasi urin pada pasien *Chronic Kidney Disease* (CKD). Hasil penerapan EBN ini didapatkan bahwa pada saat pemberian *bladder training* di hari pertama pasien belum merasakan sensasi ingin buang air kecil dan pada saat pemberian *bladder training* hari ke dua klien sudah merasakan sensasi ingin buang air kecil. *Bladder Training (delay urination)* dapat direkomendasikan sebagai terapi non farmakologi untuk mengurangi gangguan eliminasi urin, bersifat mudah dilakukan, aman dan secara teknis praktis untuk mengurangi gangguan eliminasi pada pasien *Chronic Kidney Disease* (CKD).

Kata Kunci : Bladder Training (delay urination), gangguan eliminasi urin, Chronic Kidney Disease (CKD)

ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Umum dan Khusus	4
D. Manfaat Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS	6
A. Konsep Teori CKD	
1. Definisi.....	6
2. Klasifikasi	6
3. Etiologi.....	7
4. Patofisiologi	8
5. Manifestasi Klinis	9
6. Pemeriksaan Penunjang	10
B. Konsep Teori Eliminasi	6
1. Definisi Kebutuhan Dasar Eliminasi	34
2. Fisiologi Dalam Eliminasi	34
3. Sistem Tubuh yang Berperan Dalam Eliminasi.....	35
4. Faktor-faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pola Eliminasi	38

5. Perubahan Pola Eliminasi Urin.....	40
6. Masalah Yang Dapat Terjadi Pada Pola Eliminasi	41
C. Konsep keperawatan	18
A. Pengkajian.....	18
B. Diagnosis Keperawatan	22
C. Intervensi Keperawatan	29
D. Pendekatan Teori Keperawatan Yang Digunakan	37
E. Evidence Based Nursing	38
BAB III LAPORAN KASUS	43
1. Pengkajian.....	43
2. Diagnosis Keperawatan	64
3. Intervensi Keperawatan	66
4. Implementasi.....	70
5. Evaluasi Keperawatan.....	
BAB IV PEMBAHASAN	80
A. Analisa Kasus.....	80
B. Analisa Intervensi	82
C. Alternatif penyelesaian Masalah.....	82
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit *Chronic Kidney Disease* merupakan masalah kesehatan masyarakat diseluruh Dunia. Penelitian *The Global Burden of Disease*, memperkerikan setiap tahun 5-10 juta orang meninggal karena penyakit *Chronic Kidney Disease* (WHO, 2018).

Jumlah penderita gagal ginjal kronis di Indonesia pada tahun 2013 tercatat 2,0% dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 3,8%. Provinsi di Indonesia dengan prevelensi gagal ginjal kronik tertinggi adalah Kalimantan Utara dengan persentasi 6,4% dan prevelensi gagal ginjal kronik terendah adalah Sulawesi Barat dengan persentasi 1,8%. Sementara itu prevelensi gagal ginjal kronik di Sulawesi Selatan mencapai 3,5% (Risksedas, 2018).

Prevalensi penyakit gagal ginjal kronik berdasarkan umur yaitu umur 65-74 tahun mencapai 8,23%, sementara umur 15-24 tahun mencapai 1,33%. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dengan persentasi 4,17% dan perempuan sebanyak 3,52% (Risksedas, 2018).

Beberapa dari penyebab gagal ginjal kronik berbeda-beda termasuk *plelonefritis*. *Plelonefritis* adalah proses infeksi dan peradangan yang biasanya mulai di renal pelvis, saluran ginjal yang menghubungkan ke saluran kencing (ureter) dan parenchyma ginjal atau jaringan ginjal. Infeksi bisa diakibatkan dari banyak jenis bakteri, terutama dari basilus kolon. Yang aslinya dari kontaminasi fecal saluran kencing. Ketika bakteri menyerang jaringan ginjal, kerusakan progresif dipicu sehingga mengakibatkan hilangnya fungsi ginjal. Lokasi yang paling umum diserang

adalah medula ginjal, bagian yang bertanggung jawab memekatkan urine. Jadi, pasien dengan kondisi ini telah mengalami penurunan kemampuan memekatkan urine.

Dampak gangguan eliminasi urin pada pasien gagal ginjal kronik yaitu perubahan eliminasi BAK, peningkatan tekanan darah, mual, yang ditandai dengan adanya edema maupun penurunan volume urin output dan pruritus yang ditandai dengan kulit tampak kering dan bersisik. Dampak lain gangguan eliminasi urin yaitu gangguan keseimbangan cairan elektrolit yang ditandai dengan menurunnya kadar klirens kreatinin dan meningkatnya kadar kreatinin serum dikarenakan ginjal tidak sanggup lagi mempertahankan homeostatis tubuh sehingga dapat terjadi penurunan kesadaran pada pasien dan berujung kematian (Tarwoto & Wartolah, 2015).

Berdasarkan observasi penulis selama 4 hari di Ruang Mamminasa Baji RSUD Labuang Baji Makassar didapatkan data penderita dengan gangguan eliminasi urin hanya terdapat satu orang dengan terpasang keteter urin. Berdasarkan hasil wawancara pemberian intervensi *Bladder Training* merupakan intervensi yang sering dilakukan oleh perawat di ruang mamminasa baji untuk mengembalikan pola normal eliminasi pasien dengan gangguan eliminasi urin. *Bladder training* merupakan latihan yang dilakukan pada kandung kemih dengan melakukan pengontrolan dalam pengeluaran urin (Nurlianty, 2019).

Bladder training adalah latihan kandung kemih yang bertujuan untuk mengembangkan tonus otot dan otot spingter kandung kemih agar bertujuan maksimal. *Bladder training* biasanya digunakan untuk stress inkontinensia, desakan inkontinensia atau kombinasi keduanya atau yang disebut inkontinensia campuran. Pelatihan kandung kemih yang mengharuskan klien menunda berkemih, melawan atau menghambat sensasi urgensi dan berkemih sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan bukan sesuai dengan desakan untuk berkemih. Tujuan bladder training

adalah untuk memperpanjang interval antara urinasi klien, menstabilkan kandung kemih dan menghilangkan urgensi (Shabrini, 2015).

Metode bladder training diantaranya adalah *delay urination* dan *scheduled urination*. *Delay urination* adalah latihan menahan/menunda untuk berkemih. Pada pasien yang masih terpasang kateter, *delay urination* dilakukan dengan mengklem atau mengikat aliran urine ke urine bag. Tindakan ini memungkinkan kandung kemih terisi urine dan otot detrusor berkontraksi sedangkan pelepasan klem memungkinkan kandung kemih untuk mengosongkan isinya. Latihan ini dilakukan 6-7 kali per hari sampai pasien dapat menunda untuk berkemih (Nurhasanah & Hamzah, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk memberikan Asuhan Keperawatan Pada *Choric Kidney Disease (CKD)* Dengan Gangguan Pola Eliminasi Urin Intervensi *Bladder Training (Delay Urination)* Di Ruang Mamminasa Baji Rsud Labuang Baji Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka rumusan masalah pada karya tulis ilmiah yaitu “Asuhan Keperawatan Pada *Choric Kidney Disease (CKD)* Dengan Gangguan Pola Eliminasi Urin Intervensi *Bladder Training (Delay Urination)* Di Ruang Mamminasa Baji Rsud Labuang Baji Makassar.”

C. Tujuan Umum dan Khusus

1. Tujuan Umum

Mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan memberikan Asuhan Keperawatan Pada *Choric Kidney Disease (CKB)* Dengan Gangguan Pola Eliminasi Urin Intervensi *Bladder Training (Delay Urination)* Di Ruang Mamminasa Baji Rsud Labuang Baji Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Melaksanakan Pengkajian yang Kooperhensif Pada “Tn.R” Dengan Gangguan Eliminasi Urin Dengan Diagnosa Medis *Chronic Kidney Disease (CKD)* Di RSUD Labuang Baji Makssar
- b. Menegakkan Diagnosis Keperawatan pada “Tn.R” Dengan Gangguan Eliminasi Urin Dengan Diagnosa Medis *Chronic Kidney Disease (CKD)* Di RSUD Labuang Baji Makssar
- c. Membuat Rencana Keperawatan Pada “Tn.R” Dengan Gangguan Eliminasi Urin Dengan Diagnosa Medis *Chronic Kidney Disease (CKD)* Di RSUD Labuang Baji Makssar
- d. Membuat Implementasi Keperawatan Pada “Tn.R” Dengan Gangguan Eliminasi Urin Dengan Diagnosa Medis *Chronic Kidney Disease (CKD)* Di RSUD Labuang Baji Makssar
- e. Melakukan Evaluasi Keperawatan Pada “Tn.R” Dengan Gangguan Eliminasi Urin Dengan Diagnosa Medis *Chronic Kidney Disease (CKD)* Di RSUD Labuang Baji Makssar

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil karya tulis ilmiah ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam memberikan dan menyusun penatalaksanaan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan eliminasi urin agar bisa melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif dalam aspek bio, psiko, sosial, dan spiritual.

2. Manfaat Aplikatif

Diharapkan hasil karya tulis ilmiah ini dapat menjadi referensi dalam melakukan intervensi *Bladder Training* pada pasien dengan gangguan eliminasi urine.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Chronic Kidney Disiase (CKD)

1. Definisi

Chronic Kidney Disease (CKD) adalah penyakit penurunan fungsi ginjal yang progresif dan tidak dapat lagi pulih atau kembali sembuh secara total seperti sediakala (irreversible) dengan laju filtrasi glomerulus (LFG) < 60 mL/menit dalam waktu 3 bulan atau lebih, sehingga tubuh gagal mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan elektrolit, yang menyebabkan uremia (Fitrianasari, et al, 2017).

CKD merupakan penyakit sistemik dan merupakan jalur akhir yang umum dari berbagai penyakit traktus urinarius dan ginjal (Suharyanto, Madjid, 2012 Ditulis dalam jurnal Rustandi, 2018). Pasien CKD yang mengalami gagal ginjal kronik akan menjalani hemodialisa jangka panjang, hemodialisa (HD) adalah suatu prosedur dimana darah dikeluarkan dari tubuh penderita dan beredar dalam sebuah mesin di luar tubuh yang disebut dialiser. Frekuensi tindakan HD bervariasi tergantung banyaknya fungsi ginjal yang tersisa, rata-rata penderita menjalani tiga kali dalam seminggu, sedangkan lama pelaksanaan hemodialisa paling sedikit tiga sampai empat jam tiap sekali tindakan terapi (Brunner, Suddath, 2002 Ditulis dalam jurnal Rustandi, 2018).

2. Klasifikasi

Klasifikasi gagal ginjal kronis berdasarkan derajat (stage) LFG (Laju Filtration Glomerulus) dimana nilai normalnya adalah $125 \text{ ml/min/1,73m}^2$ dengan rumus kockrof – gault sebagai berikut (Sudoyo 2010).

$$\text{LFG (ml/mnt/1,73 m}^2\text{)} = \frac{(140 - \text{umur}) \times \text{berat badan}}{72 \times \text{kreatinin plasma (mg/dl)}}$$

72 x kreatinin plasma (mg/dl).

Derajat 1 Kerusakan ginjal dengan LFG normal atau $\uparrow \geq 90$

Derajat 2 Kerusakan ginjal dengan LFG \uparrow atau ringan 60-89

Derajat 3 Kerusakan ginjal dengan LFG \uparrow atau sedang 30-59

Derajat 4 Kerusakan ginjal dengan LFG \uparrow atau berat 15-29

Derajat 5 Gagal ginjal < 15 atau dialysis

Sumber : setiati, 2015 Buku Ajar Ilmu penyakit Dalam edisi 6. Jakarta : FKUI

3. Etiologo

Penyebab penyakit tertinggi terjadinya CKD yaitu hipertensi dimana hipertensi merupakan faktor inisiasi dan dapat memperburuk kerusakan ginjal karena menyebabkan rusaknya massa nefron sehingga nefron yang masih normal akan mengalami hipertrofi untuk melakukan kompensasi terhadap rusaknya massa nefron dan penurunan fungsi ginjal sedangkan penyebab lain terjadinya CKD adalah diabetes melitus (Arianti, 2020)

CKD juga bisa terjadi karena berbagai kondisi klinis seperti penyakit komplikasi yang bisa menyebabkan penurunan fungsi pada ginjal Menurut Robinson (2013) dalam Arianti (2020). Penyebab CKD, yaitu:

- a) Penyakit glomerular kronis (glomerulonephritis)
- b) Infeksi kronis (pyelonephritis kronis, tuberculosis)
- c) Kelainan vaskuler (renal nephrosclerosis)
- d) Obstruksi saluran kemih (nephrolithiasis)
- e) Penyakit kolagen (Systemic Lupus Erythematosus)
- f) Obat-obatan nefrotoksik (aminoglikosida)

4. Patofisiologi

Penyakit hipertensi pada dasarnya adalah penyakit yang dapat merusak pembuluh darah, jika pembuluh darahnya ada pada ginjal, maka tentu saja ginjalnya mengalami kerusakan. Seseorang yang tidak mempunyai gangguan ginjal, tetapi memiliki penyakit hipertensi dan tidak diobati akan menyebabkan komplikasi pada kerusakan ginjal, dan kerusakan ginjal yang terjadi akan memperparah hipertensi tersebut. Kejadian ini menyebabkan tingkat terapi hemodialisis menjadi tinggi dan angka kematian akibat penyakit ini juga cukup tinggi. Hipertensi menyebabkan rangsangan barotrauma pada kapiler glomerulus dan meningkatkan tekanan kapiler glomerulus tersebut, yang lama kelamaan akan menyebabkan glomerulosclerosis (Akmarawita, 2016).

Glomerulosclerosis dapat merangsang terjadinya hipoksia kronis yang menyebabkan kerusakan ginjal. Hipoksia yang terjadi menyebabkan meningkatnya kebutuhan metabolisme oksigen pada tempat tersebut, yang menyebabkan keluarnya substansi vasoaktif (endotelin, angiotensin dan norepinephrine) pada sel endotelial pembuluh darah lokal tersebut yang menyebabkan meningkatnya vasokonstriksi. Aktivasi RAS (Renin Angiotensin Sistem) disamping menyebabkan vasokonstriksi, juga menyebabkan terjadinya stres oksidatif yang meningkatkan kebutuhan oksigen dan memperberat terjadinya hipoksia. Stres oksidatif juga menyebabkan penurunan efisiensi transport natrium dan kerusakan pada DNA, lipid & protein, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya tubulointerstitial fibrosis yang memperparah terjadinya kerusakan ginjal (Akmarawita, 2016).

5. Manifestasi Klinis

Setiap sistem tubuh pada Chronic Kidney Disease (CKD) dipengaruhi oleh kondisi uremia, maka klien akan menunjukkan sejumlah tanda dan gejala. Menurut Smeltzer dan Bare (2014) Keparahan tanda dan gejala bergantung pada bagian dan tingkat kerusakan ginjal, usia klien dan kondisi yang mendasari. Tanda dan gejala klien gagal ginjal kronis adalah sebagai berikut.

a. Manifestasi kardiovaskuler

Mencakup hipertensi (akibat retensi cairan dan natrium dari aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron), pitting edema (kaki, tangan, sakrum), pembesaran vena leher.

b. Manifestasi dermatologi

Warna kulit abu-abu mengkilat, kulit kering, bersisik, pruritus, ekimosis, kuku tipis dan rapuh, rambut tipis dan kasar.

c. Manifestasi Pulmoner

Krekels, sputum kental dan liat, napas dangkal, pernapasan Kussmaul.

d. Manifestasi Gastrointestinal

Napas berbau amonia, ulserasi dan pendarahan pada mulut, anoreksia, mual, muntah, konstipasi dan diare, pendarahan saluran gastrointestinal

e. Manifestasi Neurologi.

Kelemahan dan keletihan, konfusi, disorientasi, kejang, kelemahan tungkai, panas pada telapak kaki, perubahan perilaku.

f. Manifestasi Muskuloskeletal

Kram otot, kekuatan otot hilang, fraktur tulang, foot drop.


g. Manifestasi Reproduksi

Amenore dan atrofi testikuler.

6. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada klien dengan Chronic Kidney Disease (CKD) menurut trucker, 2008; sudoyo, 2015.

- 1) Urinalisasi : PH asam, SDP, SDM, berat jenis urin (24 jam) : volume normal, volume kosong atau rendah, proteiurea, penurunan klirens kreatinin kurang dari 10 ml permenit menunjukkan kerusakan ginjal yang berat.
- 2) Hitungan darah lengkap : penurunan hematokrit / HB , trombosit, leukosit, peningkatan SDP.
- 3) Pemeriksaan urin : Warna PH, kekeruhan, glukosa, protein, sedimen, SDM, keton, SDP, CCT.
- 4) Kimia darah : kadar BUN, kreatinin, kalium, kalsium, fosfor, natrium, klorida abnormal.
- 5) Uji pencitraan : IVP, ultrasonografi ginjal, pemindaian ginjal, CT scan.
- 6) EKG : distritmia /aritmia



- 7) Poto polos abdomen, bias tampak batu radio opak
- 8) Pielografi intra vena jarang dikerjakan, karena kontras tidak dapat melewati filter glomerulus, disamping keawatiran terjadinya pengaruh toksik oleh kontras terhadap ginjal yang sudah mengalami kerusakan.
- 9) Piolografi antegrad atau retrograt sesuai dengan indikasi.

10) Pemeriksaan lab CCT (Clirens Creatinin Test) untuk mengetahui laju filtrasi glomerulus. Untuk menilai GFR (Glomelular Filtration Rate) / CCT (Clearance Creatinin Test) dapat digunakan dengan rumus: $CCT (ml/ menit) = (140 - umur) \times berat\ badan\ (kg) \times 72 \times creatini\ serum^*$ wanita hasil tersebut dikalikan dengan 0,85.

B. Konsep Keperawatan

1. Pengkajian

Pengkajian adalah tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan pasien menurut (Setiadi, 2012). Pengkajian adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya (Manurung, 2011). Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien, agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah-masalah, kebutuhan kesehatan dan keperawatan pasien, baik fisik, mental, sosial dan lingkungan menurut (Dermawan, 2012).

a. Demografi

Klien CKD kebanyakan berusia diantara 30 tahun, namun ada juga yang mengalami CKD dibawah umur tersebut yang diakibatkan oleh berbagai hal seperti proses pengobatan, penggunaan obat-obatan dan sebagainya. CKD dapat terjadi pada siapapun, pekerjaan dan lingkungan juga mempunyai peranan penting sebagai pemicu kejadian CKD. Karena kebiasaan kerja dengan duduk / berdiri yang terlalu lama dan lingkungan yang tidak menyediakan cukup air minum / mengandung banyak senyawa/ zat logam dan pola makan yang tidak sehat.

b. Riwayat Penyakit

Riwayat Penyakit yang diderita klien sebelum CKD seperti DM, glomerulo nefritis, hipertensi, rematik, hiperparatiroidisme, obstruksi saluran kemih, dan traktus urinarius bagian bawah juga dapat memicu kemungkinan terjadinya CKD.

c. Pengkajian Biologis-Psikologis-Sosial

1) Aktivitas Istirahat

Gejala : kelelahan ekstrem kelemahan dan malaise, gangguan tidur (insomnia/ gelisah atau somnolen).

Tanda : kelemahan otot, kehilangan tonus, penurunan rentang gerak

2) Sirkulasi

Gejala : Riwayat hipertensi lama atau berat, palpitasi : nyeri dada (angina)

Tanda : Hipertensi : nadi kuat, edema jaringan umum dan pitting pada kaki, telapak tangan, nadi lemah dan halus, hipotensi ortostatik menunjukkan hipovolemia yang jarang terjadi pada penyakit tahap akhir, friction rub pericardial (respon terhadap akumulasi rasa) pucat, kulit coklat kehijauan, kuning, kecenderungan pendarahan.

3) Integritas Ego

Gejala : Faktor stres, contoh finansial, hubungan, dan sebagainya. Peran tak berdaya, tak ada harapan, tak ada kekuatan

Tanda : Menolak, ansietas, takut, marah, mudah terangsang, perubahankepribadian.

4) Eliminasi

Gejala : Peningkatan berat badan cepat (edem), penurunan berat badan (malnutrisi). Anoreksia, Malnutrisi, kembung, diare, konstipasi.

Tanda : Perubahan warna urin, contoh kuning pekat, merah, coklat, berwarna. Oliguria, dapat menjadi anuria.

5) Makan/Cairan

Gejala : Peningkatan berat badan cepat (edem), penurunan berat badan (malnutrisi). Anoreksia, nyeri ulu hati, mual / muntah, rasa metalik tidak sedap pada mulut (pernafasan amonia), penggunaan diuretik.

Tanda : Distensi abdomen / asietas, pembesaran hati (tahap akhir). Perubahan turgor kulit. Edem (umum, tergantung). Ulserasi gusi, pendarahan gusi / lidah. Penurunan otot, penurunan lemak subkutan, tampak tak bertenaga.

6) Neorosensasi

Gejala : Sakit kepala, penglihatan kabur, kram otot / kejang : sindrom Kaki, gelisah, kebas terasa terbakar pada telapak kaki. Kebas kesemutan dan kelemahan, khususnya ekstremitas bawah (neuropati perifer).

Tanda : Gangguan sistem mental, contoh penurunan lapang perhatian, ketidakmampuan berkonsentrasi, kehilangan memori, kacau, penurunan tingkat kesadaran, koma. Kejang, fasikulasi otot, aktifitas kejang, Rambut tipis, kuku rapuh dan tips.

7) Nyeri/Kenyamanan

Gejala : Nyeri panggul, sakit kepala, kram otot / nyeri kaki. Memburuk pada malam hari.

Tanda : perilaku berhati-hati dan gelisah.

8) Pernapasan

Gejala : nafas pendek : dipsnea, nokturnal parosimal, batuk dengan / tanpa sputum kental atau banyak.

Tanda : takiepna, dispnea, peningkatan frekuensi / kedalaman (Pernafasan kusmaul). Batuk produktif dengan sputum merah muda encer (edema paru).

9) Keamanan

Gejala : Kulit gatal ada / berulamngnya infeksi

Tanda : Pruritus Demam (sepsis, dehidrasi ; normotemia dapat secara actual terjadi peningkatan pada klien yang mengalami suhu tubuh lebih rendah dari pada normal (efek CKD / depresi respon imun) Ptekie, araequimosis pada kulit Fraktur tulang ; defosit fosfat, kalsium, (klasifikasi metastatik) pada kulit, jaringan lunak sendi, keterbatasan gerak sendi.

10) Seksualitas

Gejala : penurunan libido ; amenorea ; infertilitas.

11) Interaksi Sosial

Gejala : Kesulitan menentukan kondisi, contoh tak mampu bekerja, mempertahankan fungsi peran biasanya dalam keluarga.

d. Pemeriksaan Fisik

1) Penampilan/keadaan umum

Lemah, aktifitas dibantu, terjadi penurunan sensifitas nyeri. Kesadaran klien dari compos mentis sampai coma.

2) Tanda-tanda vital

Tekanan darah naik, respirasi riet naik, dan terjadi dispnea, nadi meningkat dan reguler.

3) Antropometri.

Penurunan berat badan selama 6 bulan terakhir karena kekurangan nutrisi, atau terjadi peningkatan berat badan karena kelebihan cairan.

4) Kepala

Rambut kotor, mata kuning / kotor, telinga kotor dan terdapat kotoran telinga, hidung kotor dan terdapat kotoran hidung, mulut bau ureum, bibir kering dan pecah-pecah, mukosa mulut pucat dan lidah kotor.

5) Leher dan tenggorok.

Peningkatan kelenjar tiroid, terdapat pembesaran tiroid pada leher.

6) Dada

Dispnea sampai pada edema pulmonal, dada berdebar-debar. Terdapat otot bantu napas, pergerakan dada tidak simetris, terdengar suara tambahan pada paru (rongkhi basah), terdapat pembesaran jantung, terdapat suara tambahan pada jantung.

7) Abdomen

Terjadi peningkatan nyeri, penurunan pristaltik, turgor jelek, perut buncit.

8) Genital.

Kelemahan dalam libido, genetalia kotor, ejakulasi dini, impotensi, terdapat ulkus.

9) Ekstremitas

Kelemahan fisik, aktifitas klien dibantu, terjadi edema, pengeroposan tulang, dan Capillary Refill lebih dari 1 detik.

10) Kulit.

Turgor jelek, terjadi edema, kulit jadi hitam, kulit bersisik dan mengkilat / uremia, dan terjadi perikarditis.

2. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan merupakan penilaian klinis terhadap pengalaman atau respon individu, keluarga, atau komunitas pada masalah kesehatan, pada resiko

masalah kesehatan atau pada proses kehidupan. Diagnosis keperawatan merupakan bagian vital dalam menentukan asuhan keperawatan yang sesuai untuk membantu klien mencapai kesehatan yang optimal.

Adapun diagnosa keperawatan yang muncul adalah : (SDKI,2017)

1) Hipervolemi

Definisi:

Peningkatan volume cairan intravascular, intertisial dan atau intraseluler

Batasan karakteristik

Penyebab:

Gangguan mekanisme regulasi

Kelebihan asupan cairan

Kelebihan asupan natrium

Gangguan aliran balik vena

Efek agen farmakologis (mis. Kortikosteroid, chlorpropamide, tolbutamide, vincristine, tryptilinescarbamaeapine)

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

- Ortopnea
- Dispnea
- Paroxymal nocturnal dyspnea (PND)

Objektif

- Edema anasarka dan atau edema perifer
- Berat badan meningkat dalam waktu yang singkat
- Jugular venous Pressure (JVP) dan atau Central Venous Pressure (CVP) meningkat

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

Tidak tersedia

Objektif

- Distensi Vena jugular
- Terdengar suara napas tambahan
- Hepatomegali
- Kadar Hb dan Ht turun
- Oliguria
- Intake lebih banyak dari output (balans cairan positif)
- Kongesti paru

2) Gangguan pertukaran gas

Definisi

Kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan/atau eliminasi karbondioksida pada membrane alveolus-kapiler.

Penyebab

- Ketidakseimbangan ventilasi-perfusi
- Perubahan membrane alveolus-kapiler

Gejala dan tanda mayor

Subjektif :

- Dispnea

Objektif

- PCO₂ meningkat/menurun
- PO₂ menurun
- Takikardia
- pH arteri meningkat/menurun

- Bunyi napas tambahan

Gejala dan tanda minor

- Subjektif
- Pusing
- Penglihatan kabur
- Objektif
- Sianosis
- Diaforesis
- Gelisah
- Napas cuping hidung
- Pola napas abnormal (cepat/lambat, regular/ireguler, dalam/dangkal)
- Kesadaran menurun

3) Intoleransi aktivitas

Definisi

Ketidackukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Penyebab

- Ketidakseimbangan antara suplai dan keutuhan energi
- Tirah baring
- Kelemahan
- Imobilitas
- Gaya hidup monoton

Gejala dan tanda mayor

Subjektif :

- Menegluh lelah

Objektif

- Frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat

Gejala dan tanda minor

Subjektif

- Dispnea saat/setelah aktivitas
- Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas
- Merasa lemah

Objektif

- Tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat
- Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat/setelah aktivitas
- Gambaran EKG menunjukkan iskemia
- Sianosis

4) Penurunan curah jantung

Defenisi

Ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh

Penyebab

- Perubahan irama jantung
- Perubahan frekuensi jantung
- Perubahan Kontraktilitas
- Perubahan preload
- Perubahan afterload

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

- Perubahan irama jantung
- Palpitasi

- Perubahan preload
- Lelah
- Perubahan afterload
- Dispnea
- Perubahan kontraktilitas
- Paroxymal Noctual Dispnea (PND)
- Ortopnea
- Batuk

Objektif

- Perubahan irama jantung
- Bradikardia/Takikardia
- Gambaran EKG aritmia atau gangguan konduksi
- Perubahan preload
- Edema
- Distensi vena jugularis
- Central Venous Pressure (CVP) meningkat/menurun
- Hepatomegali
- Perubahan afterload
- Tekanan darah meningkat/menurun
- Nadi perifer teraba lemah
- Capillary Refill Time >3 detik
- Oliguria
- Warna kulit pucat dan/atau sianosis
- Perubahan kontraktilitas
- Terdengar suara jantung S3 dan/atau S4

- Ejection fraction (EF) menurun

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

- Perubahan irama jantung
- Perubahan preload
- Perubahan afterload
- Perubahan kontraktilitas
- Cemas
- Gelisah

Objektif

- Perubahan irama jantung
- Murmur jantung
- Berat badan bertambah
- Pulmonary Artery Wedge Pressure (PAWP) menurun
- Perubahan preload
- Pulmonary Vascular Resistance (PVR) meningkat/menurun
- Systemic Vascular Resistance (SVR) meningkat/menurun
- Perubahan afterload
- Cardiac Index (CI) menurun
- Left Ventricular Stroke Work Index (LVSWI) menurun
- Stroke Volume Index (SVI) menurun
- Perubahan kontraktilitas

5) Gangguan Eliminasi Urin

Defisi

Disfungsi Eliminasi urin

Penyebab

- Penurunan kapasitas kandung kemih
- Iritasi kandung kemih
- Penurunan kemampuan menyadari tanda-tanda gangguan kandung kemih
- Efek tindakan medis dan diagnosis (mis. operasi ginjal, operasi saluran kemih, anastesi, dan obat-obatan)
- Kelemahan otot pelvis
- Ketidak mampuan mengakses toilet (mis. imobilisasi)
- Hambatan lingkungan
- Ketidak mampuan mengkomunikasikan kebutuhan eliminasi
- *Outlet* kandung kemih tidak lengkap (mis. anomali saluran kemih kongenital)
- Imaturitas (pada anak usia <3 tahun)

Gejala Tanda Mayor

Subjektif

- Desakan berkemih (Urgensi)
- Urin menetes (*dribbling*)
- Sering buang air kecil
- Nokturia
- Mengompol
- *Enuresia*

Objektif

- Distensi kandung kemih

- Berkemih tidak tuntas (*hesitancy*)
- Volume residu urin meningkat

3. Intervensi Keperawatan

a. Hipervolemia

Luaran utama : Keseimbangan cairan

1) Tujuan dan Kriteria hasil (outcomes criteria):

Ekuilibrum antara volume cairan di ruang intraseluler dan ekstraseluler tubuh meningkat dibuktikan dengan kriteria hasil:

- Asupan cairan, keluaran urin, kelembaban membrane mukosa, asupan makanan meningkat
- Edema, dehidrasi, asites, konfusi menurun
- Tekanan darah, denyut nadi radial, tekanan arteri rata-rata, membrane mukosa, mata cekung, turgor kulit, berat badan membaik

2) Intervensi keperawatan dan rasional:

Manajemen Hipervolemia

Observasi

- Periksa tanda dan gejala hipervolemia (mis. Ortopnea, dispnea, edema, JVP/CVP meningkat, reflex hepatojugular positif, suara napas tambahan.

Rasional: Mengetahui adanya tanda dan gejala hipervolemia pada pasien

- Identifikasi penyebab hipervolemia

Rasional: Mengetahui penyebab hipervolemia pada pasien

- Monitor status hemodinamik (mis. frekuensi jantung, tekanan darah, MAP, CVP, PAP, PCWP, CO,CI), jika tersedia

Rasional: Mengetahui status hemodinamik pada pasien

- Monitor input dan output cairan (mis. jumlah dan karakteristik)

Rasional: Mengetahui keseimbangan cairan pasien

- Monitor tanda hemokonsentrasi (mis. kadar natrium, BUN, hematokrit, berat jenis unri)

Rasional: Mengetahui adanya tanda hemokonsentrasi pada pasien

- Monitor tanda peningkatan onkotik plasma (mis. kadar protein dan albumin meningkat)

Rasional: Mengetahui tanda peningkatan onkotik plasma pada pasien

- Monitor kecepatan infus secara ketat

Rasional: Memastikan cairan IV yang masuk sesuai kebutuhan pasien

- Monitor efek samping diuretic

Rasional: Mengetahui adanya efek samping diuretic pada pasien

Terapeutik

- Timbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama

Rasional: Mengetahui adanya penambahan atau pengurangan berat badan pasien

- Batasi asupan cairan dan garam

Rasional: Mengurangi asupan cairan dan garam agar keseimbangan cairan kembali normal

- Tinggikan kepala tempat tidur 30-40⁰

Rasional: Mempertahankan kenyamanan, meningkatkan ekspansi paru, dan memaksimalkan oksigenasi pasien

Edukasi

- Anjurkan melapor jika haluran urin <0,5 mL/kg/jam dalam 6 jam

Rasional: Agar haluaran urin pasien tetap terpantau sehingga perfusi renal,

kecukupan penggantian cairan dan kebutuhan serta status cairan pasien dapat segera ditangani jika terjadi ketidakseimbangan

- Anjurkan melapor jika BB bertambah >1 kg dalam sehari

Rasional: Agar BB pasien tetap terpantau sehingga, kecukupan penggantian cairan dan kebutuhan serta status cairan pasien dapat segera ditangani jika terjadi ketidakseimbangan

- Ajarkan cara mengukur dan mencatat asupan dan haluaran cairan

Rasional: Agar pasien dapat mengetahui cara mengukur dan mencatat asupan dan haluaran cairannya secara mandiri

- Ajarkan cara membatasi cairan

Rasional: Agar pasien dapat mengontrol intake dan output cairan secara mandiri

Kolaborasi

- Kolaborasi pemberian diuretic

Rasional: Membantu mengeluarkan kelebihan garam dan air dalam tubuh melalui urin

- Kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat diuretic

Rasional: Mengembalikan konsentrasi kalium dalam tubuh

- Kolaborasi pemberian *Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT)*, jika perlu

Rasional: Mengatur keseimbangan cairan pasien dan membantu kerja ginjal

b. Gangguan Pertukaran Gas

Luaran Utama : Pertukaran Gas

1) Tujuan dan Kriteria hasil (outcomes criteria):

Oksigenasi dan/atau eliminasi karbondioksida pada membrane alveolus-

kapiler dalam batas normal dibuktikan dengan kriteria hasil:

- Meningkatnya tingkat kesadaran
- Menurunnya gejala dispneu, bunyi napas tambahan, pusing, penglihatan kabur, diaphoresis, gelisah, dan napas cuping hidung
- Membaiknya PCO₂, PO₂, Takikardi, pH arteri, Sianosis, pola napas, dan warna kulit

2) Intervensi keperawatan dan rasional:

Pemantauan respirasi

Observasi

- Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas

Rasional: Mengetahui frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas pasien

- Monitor pola napas (seperti bradipneu, takipneu, hiperventilasi, kussmaul, cheyne-stokes, biot, ataksik)

Rasional: Mengetahui pola napas pasien (seperti bradipneu, takipneu, hiperventilasi, *kussmaul*, *cheyne-stokes*, biot, ataksik)

- Monitor kemampuan batuk efektif

Rasional: Mengetahui kemampuan batuk efektif pasien

- Monitor adanya produksi sputum

Rasional: Mengetahui adanya produksi sputum pada jalan napas pasien

- Monitor adanya sumbatan jalan napas

Rasional: Mengetahui adanya sumbatan jalan napas pada system pernapasan pasien

- Palpasi kesimetrisan ekspansi paru

Rasional: Mengetahui kesimetrisan ekspansi paru pasien

- Auskultasi bunyi napas

Rasional: Mengetahui kesimetrisan ekspansi paru pasien

- Monitor saturasi oksigen

Rasional: Mengetahui adanya perubahan saturasi oksigen pasien

- Monitor nilai AGD

Rasional: Mengetahui adanya perubahan nilai AGD pada pasien

- Monitor hasil x-ray toraks

Rasional: Mengetahui adanya perubahan dan atau kelainan pada hasil x-ray toraks pasien

Terapeutik

- Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien

Rasional: Mengetahui perkembangan kondisi pasien

- Dokumentasikan hasil pemantauan

Rasional: Mengetahui fokus keperawatan dan mengevaluasi hasil keperawatan serta sebagai tanggung gugat perawat

Edukasi

- Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan

Rasional: Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan diberikan

- Informasikan hasil pemantauan, jika perlu

Rasional: Meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga mengenai kondisi terkait masalah kesehatannya.

c. Intoleransi Aktivitas

Luaran Utama : Manajemen Energi

1) Tujuan dan Kriteria Hasil

Respon fisiologis terhadap aktifitas yang membutuhkan tenaga dapat meningkat dengan kriteria hasil

- Kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari meningkat
- Kekuatan tubuh bagian atas meningkat
- Kekuatan tubuh bagian bawah meningkat
- Keluhan lelah menurun

2) Intervensi keperawatan

Observasi

- Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan
Rasional :mengidentifikasi pencetus terjadinya kelelahan dan rencana tindakan berikutnya yang dapat dilakukan
- Monitor kelelahan fisik dan emosional
Rasional :untuk mengetahui koping klien
- Monitor pola dan jam tidur
Rasional : menghindari kelelahan akibat kurang istirahat
- Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas
Rasional :mengetahui kemampuan dan batasan pasien terkait aktivitas yang akan dilakukan

Terapeutik

- Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis. Cahaya,suara,kunjungan).
Rasional : memberikan rasa aman dan nyaman kepada klien

- Lakukan latihan rentang gerak pasif/aktif (ROM)

Rasional : membantu meningkatkan rentang gerak klien dalam beraktivitas

- Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan

Rasional : memberikan rasa nyaman pada klien

- Fasilitasi duduk disisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan.

Rasional : mengurangi resiko jatuh/sakit pada klien

Edukasi

- Anjurkan tirah baring

Rasional :Istirahat yang lebih dan mengurangi aktivitas dapat memulihkan energi kembali

- Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap

Rasional :melatih kekuatan otot dan pergerakan pasien agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi

- Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang

Rasional : untuk mengidentifikasi rencana tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh perawat

- Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan

Rasional :memiliki kemampuan mengatasi masalah (*coping skill*) bermanfaat untuk mencegah komplikasi kesehatan yang mungkin nanti akan timbul.

Kolaborasi

Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan

Rasional: Pemberian gizi yang cukup dapat meningkatkan energi klien

d. Penurunan Curah Jantung

Luaran Utama : Curah Jantung

1) Tujuan dan Kriteria hasil (outcomes criteria):

Keadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh meningkat dibuktikan dengan kriteria hasil:

- Kekuatan nadi perifer, Ejection Fraction (EF) meningkat
- Palpitasi, Bradikardia, Takikardia, Gambaran EKG aritmia, Lelah, Edema, Distensi Vena Jugularis, Dispnea, Oliguria, Pucat/sianosis, *Paroxymal Noctural Dispnea* (PND), Ortopnea, Batuk, Suara jantung S3, Suara Jantung S4 menurun
- Tekanan darah membaik

2) Intervensi keperawatan dan rasional:

Observasi

- Identifikasi tanda/gejala primer penurunan curah jantung (meliputi dispnea, kelelahan, edema, ortopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, peningkatan CVP)

Rasional: Mengetahui tanda/gejala primer penurunan curah jantung pada pasien

- Identifikasi tanda/gejala sekunder penurunan curah jantung (meliputi peningkatan berat badan, hepatomegaly, distensi vena jugularis, palpitasi,

ronkhi basah, oliguria, batuk, ulit pucat)

Rasional: Mengetahui tanda/gejala sekunder penurunan curah jantung pada pasien

- Monitor tekanan darah (termasuk tekanan darah ortostatik, *jika perlu*)

Rasional: Mengetahui tekanan darah pasien

- Monitor intake dan output cairan

Rasional: Mengetahui keseimbangan cairan pasien

- Monitor berat badan setiap hari pada waktu yang sama

Rasional: Mengetahui berat badan setiap hari pada waktu yang sama pada pasien

- Monitor saturasi oksigen

Rasional: Mengetahui saturasi oksigen pada pasien

- Monitor keluhan nyeri dada (mis., intensitas, lokasi, radiasi, durasi, presivitasi yang mengurangi nyeri)

Rasional: Mengetahui keluhan nyeri dada pada pasien

- Monitor EKG 12 sadapan

Rasional: Mengetahui EKG 12 sadapan pada pasien

- Monitor aritmia (kelainan irama dan frekuensi)

Rasional: Mengetahui adanya kelainan irama dan frekuensi jantung pada pasien

- Monitor nilai laboratorium jantung (mis. elektrolit, enzim jantung, BNP, NTpro-BNP)

Rasional: Mengetahui nilai laboratorium jantung pada pasien

- Monitor fungsi alat pacu jantung

Rasional: Mengetahui alat pacu jantung berfungsi dengan baik

- Periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah aktivitas
Rasional: Mengetahui tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah aktivitas
- Frekuensi tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum pemberian obat (mis. beta blocker, ACE inhibitor, calcium channel blocker, digoksin)
- Rasional: Mengetahui Frekuensi tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum pemberian obat

Terapeutik

- Posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman
Rasional: Mempertahankan kenyamanan, meningkatkan ekspansi paru, dan memaksimalkan oksigenasi pasien
- Berikan diet jantung yang sesuai (mis. batasi asupan kafein, natrium, kolesterol, dan makanan tinggi lemak)
Rasional: Pemberian asupan makanan yang tidak memacu kerja jantung lebih keras
- Berikan stocking elastis atau pneumatic intermitten, *sesuai indikasi*
Rasional: Mengurangi risiko tromboemboli
- Fasilitasi pasien dan keluarga untuk modifikasi gaya hidup sehat
Rasional: Agar pasien dan keluarga bisa menjalankan gaya hidup sehat
- Berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stress, *jika perlu*
Rasional: Agar pasien merasa lebih rileks
- Berikan dukungan emosional dan spiritual
Rasional: Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien
- Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen >94%

Rasional: Memenuhi suplay oksigen pasien

Edukasi

- Anjurkan beraktivitas fisik secara toleransi

Rasional: Melatih pasien beraktivitas sesuai toleransi

- Anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap

Rasional: Melatih pasien beraktivitas secara bertahap

- Anjurkan berhenti merokok

Rasional: Melatih pasien untuk gaya hidup sehat

- Ajarkan pasien dan keluarga mengukur berat badan harian

Rasional: Agar pasien dan keluarga dapat mengukur berat badan harian secara mandiri

- Ajarkan pasien dan keluarga mengukur intake dan output cairan harian

Rasional: Agar pasien dan keluarga dapat mengukur intake dan output cairan secara mandiri

Kolaborasi

- Kolaborasi pemberian antiaritmia, *jika perlu*

Rasional: Pemberian antiaritmia sesuai kebutuhan pasien

- Rujuk ke program rehabilitasi jantung

Rasional: Agar pasien mendapatkan perawatan jantung yang lebih komprehensif

e. Gangguan Eliminasi Urin

1) Luaran Utama : Eliminasi Urin

Pengosongan Kandung kemih yang lengkap membaik dengan kriteria hasil :

- sensasi berkemih meningkat
- desakan berkemih menurun

- distensi kandung kemih

2) Intervensi Keperawatan

Observasi

- Identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin

Rasional : Untuk mengetahui masalah yang terjadi pada pasien

- Monitor eliminasi urin (*mis. Frekuensi, konsistensi, aroma, volume, dan warna*)

Rasional : mengetahui karakteristik dari urin

Terapeutik

- Catat waktu-waktu dan haluaran berkemih

Rasional : Mengetahui jadwal waktu berkemih pasien

Edukasi

- Ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih

Rasional : Memberikan informasi kepada klien terkait masalah yang dialami klien

- Ajarkan minum yang cukup, *jika tidak ada kontraindikasi*

Rasional : Agar kebutuhan cairan klien terpenuhi

B. Konsep Kebutuhan Dasar Eliminasi

1. Definisi Kebutuhan Dasar Eliminasi

Menurut kamus besar Indonesia, eliminasi adalah pengeluaran, penghilangan, penyingkiran, penyisihan.

Dalam bidang kesehatan, eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa urine ataupun bowel (feses). Eliminasi pada manusia digolongkan menjadi 2 macam, yaitu :

1. Defekasi

Buang air besar atau defekasi adalah suatu tindakan atau proses makhluk hidup untuk membuang kotoran atau tinja yang padat atau setengah padat yang berasal dari sistem pencernaan.

2. Miksi

Miksi adalah proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih terisi. Miksi ini sering disebut buang air kecil (Rohayati Eti, 2019).

2. Fisiologi Dalam Eliminasi

1. Fisiologi Defikasi

Rektum biasanya kosong sampai menjelang defikasi. Seorang yang mempunyai kebiasaan teratur akan merasa kebutuhan membuang air besar kira-kira pada waktu yang sama setiap hari. Hal ini disebabkan oleh refleks gastrokolika yang biasanya bekerja sesudah makan pagi. Setelah makan ini mencapai lambung dan setelah pencernaan dimulai maka peristaltik di dalam usus terangsang, merambat ke kolon, dan sisa makanan dari hari kemarin, yang waktu malam mencapai sekum mulai bergerak. Isi kolon pelvis masuk kedalam rektum, serentak peristaltik keras terjadi di dalam kolon dan terjadi perasaan di daerah perineum. Tekanan intra abdominal bertambah dengan penutupan glottis

dan kontraksi diafragma dan otot abdominal, sfinker anus mengendor dan kerjanya berakhir (Rohayati Eti, 2019).

2. Fisiologis Miksi

Sistem tubuh yang berperan dalam terjadinya proses eliminasi urin adalah ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Proses ini terjadi dari dua langkah utama yaitu : kandung kemih secara progresif terisi sampai tegangan di dindingnya meningkat di atas nilai ambang, yang kemudian mencetuskan langkah kedua yaitu reflex saraf yang disebut refleks miksi (refleks berkemih) yang berusaha mengosongkan kandung kemih atau jika ini gagal, setidaknya menimbulkan kesadaran akan keinginan untuk berkemih (Rohayati Eti, 2019).

3. Sistem Tubuh yang Berperan dalam Eliminasi Urin

1. Ginjal

Ginjal adalah sepasang organ retroperineal yang integral dengan homeostasis tubuh dalam mempertahankan keseimbangan, termasuk keseimbangan fisika dan kimia. Ginjal menyekresi hormone dan enzim yang membantu pengaturan produksi eritrosit, tekanan darah, serta metabolisme kalsium dan fosfor. Ginjal membuang sisa metabolisme dan menyesuaikan ekskresi air dan pelarut. Ginjal mengatur volume cairan tubuh, asiditas dan elektrolit, sehingga mempertahankan komposisi cairan yang normal (Prabowo, 2014).

Ginjal menyaring zat sisa metabolisme yang terkumpul dalam darah. Darah mencapai ginjal melalui arteri renalis yang merupakan cabang aorta abdominalis. Sekitar 20 % sampai 25 % curah jantung bersirkulasi setiap hari

melalui ginjal. Setiap ginjal berisi 1 juta nefron. Nefron yang merupakan unit fungsional ginjal, membentuk urin (Potter & Perry, 2010).

Nefron merupakan unit fungsional ginjal, di mana pada masing-masing ginjal terdiri atas 1-4 juta nefron. Nefron terdiri atas komponen vascular dan tubular. Komponen vascular atau pembuluh darah kapiler di antaranya adalah arteriola aferen, glomerulus, arteriola eferen, dan kapiler pertubular. Sedangkan komponen tubular merupakan penampung hasil filtrasi dari glomerulus, terdiri atas kapsula Bowman, tubulus kontortus prosikmal, ansa Henle, tubulus kontortus distal, sert tubulus dan duktus pengumpul. Salah satu komponen penting nefron adalah glomerulus yang merupakan cabang dari arteriola aferen dan membentuk anyaman-anyaman kapiler. Di dalam glomerulus inilah terjadi proses filtrasi (Tarwoto & Wartonah, 2015).

Ginjal terdiri atas tiga area, yaitu: korteks, medulla, dan pelvis.

a. Korteks

Korteks merupakan bagian paling luar ginjal, terletak di bawah kapsula fibrosa sampai dengan lapisan medulla, tersusun atas nefron-nefron yang jumlahnya lebih dari 1 juta. Semua glomerulus berada di korteks dan 90 % aliran darah menuju pada korteks.

b. Medulla

Medulla terdiri atas saluran – saluran atau duktus pengumpul yang disebut piramida ginjal yang tersusun antara 8-18 buah.

c. Pelvis

Pelvis merupakan area yang terdiri atas kaliks minor yang kemudian bergabung menjadi kaliks mayor. Empat sampai lima kali kaliks minor bergabung menjadi kaliks mayor dan dua sampai tiga kaliks mayor

bergabung menjadi pelvis ginjal yang berhubungan dengan ureter bagian proksimal (Tarwoto & Wartonah, 2015).

2. Ureter

Ureter merupakan saluran yang berbentuk tabung dari ginjal ke kandung kemih, panjangnya 25-30 cm dengan diameter 6 mm, berjalan mulai dari pelvis renal setinggi lumbal ke-2. Posisi ureter miring dan menyempit di tiga titik, yaitu: di titik asal ureter pada pelvis ginjal, titik saat melewati pinggir pelvis, dan titik pertemuan dengan kandung kemih. Posisi miring dan adanya penyempitan ini dapat mencegah terjadinya refluks aliran urin. Ada tiga lapisan jaringan pada ureter, yaitu: pada bagian dalam adalah epitel mukosa, bagian tengah lapisan otot polos, dan bagian luar lapisan fibrosa. Ureter berperan aktif dalam transpor urin. Urin mengalir dari pelvis ginjal melalui ureter dengan gerakan peristaltiknya. Adanya ketegangan pada ureter menstimulasi terjadinya kontraksi di mana urin akan masuk ke kandung kemih. Rangsangan saraf simpatis dan parasimpatis juga mengontrol kontraksi ureter mengalirkan urin (Tarwoto & Wartonah, 2015).

3. Kandung Kemih

Kandung kemih merupakan sebuah kantong yang terdiri atas otot halus yang berfungsi sebagai penampung air seni (urin). Dalam kandung kemih, terdapat lapisan jaringan otot yang memanjang ditengah dan melingkar disebut sebagai detrusor dan berfungsi untuk mengeluarkan urin. Pada dasar kandung kemih, terdapat lapisan tengah jaringan otot yang berbentuk lingkaran bagian dalam atau disebut sebagai otot lingkaran yang berfungsi menjaga saluran antara kandung kemih dan uretra, sehingga uretra dapat menyalurkan urin dari kandung kemih keluar tubuh (Alimul Hidayat, 2008).

Penyaluran rangsangan ke kandung kemih dan rangsangan motoris ke otot lingkar bagian dalam diatur oleh sistem simpatis. Akibat dari rangsangan ini, otot lingkar menjadi kendur dan terjadi kontraksi sphincter bagian dalam sehingga urin tetap tinggal dalam kandung kemih. Sistem parasimpatis menyalurkan rangsangan motoris kandung kemih dan rangsangan penghalang ke bagian dalam otot lingkar. Rangsangan ini dapat menyebabkan terjadinya kontraksi otot detrusor dan kendurnya sphincter (Alimul Hidayat, 2008).

d. Uretra

Urin mengalir dari kandung kemih melalui uretra dan keluar dari tubuh melalui meatus uretra. Normalnya, aliran turbulen urin melalui uretra akan membersihkannya dari bakteri. Membran mukosa melapisi uretra, dan kelenjar uretra menyekresikan mukus ke dalam saluran uretra. Uretra dikelilingi oleh lapisan otot polos yang tebal. Selain itu, uretra turun melalui lapisan otot-otot lurik yang disebut otot panggul. Jika otot ini berkontraksi, aliran urin melalui uretra dapat dicegah (Potter & Perry, 2010).

Pada wanita panjangnya sekitar 4 cm, lokasinya antara klitoris dengan liang vagina. Panjang uretra laki-laki sekitar 20 cm, terbagi atas 3 bagian: prostatik uretra yang panjangnya sekitar 3 cm, terletak di bawah leher kandung kemih sampai kelenjar prostat, bagian kedua adalah membranasea uretra yang panjangnya 1-2 cm yang di sekitarnya terdapat sfingter uretra eksterna, dan pada bagian akhir adalah kavernus atau penile uretra yang panjangnya sekitar 15 cm memanjang dari penis sampai orifisium uretra (Tarwoto & Wartona, 2015).

4. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pola Eliminasi

1. Usia

Usia atau tingkat perkembangan klien akan mempengaruhi kontrol atas pola berkemih dan defekasi. Bayi pada awalnya tidak memiliki pola eliminasi. Kontrol atas kandung kemih dan buang air besar dapat dimulai sejak usia 18 bulan tetapi biasanya tidak dikuasai sampai usia 4 tahun. Kontrol eliminasi pada malam hari biasanya lebih lama untuk dicapai, dan anak laki-laki biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembangkan kontrol atas eliminasi daripada anak perempuan. Kontrol eliminasi umumnya konstan sepanjang tahun-tahun dewasa, dengan pengecualian tahap-tahap penyakit dan kehamilan, ketika kehilangan kontrol, urgensi, dan retensi sementara dapat terjadi. Dengan meningkatnya usia, hilangnya tonus otot dan karenanya kontrol kandung kemih dapat berpengaruh pada pola eliminasi.

2. Pola Diet

Asupan cairan dan serat yang adekuat adalah faktor penting bagi kesehatan saluran kemih dan defekasi klien. Asupan cairan yang tidak adekuat merupakan penyebab utama konstipasi, seperti konsumsi makanan yang menyebabkan sembelit seperti produk susu tertentu. Diare dan perut kembung (pelepasan gas dari rektum) adalah akibat langsung dari makanan yang dicerna, dan klien perlu dididik tentang makanan dan cairan yang mempromosikan eliminasi yang sehat dan makanan mana yang dapat menghambatnya.

3. Latihan/aktivitas

Latihan/aktivitas dapat meningkatkan tonus otot, yang mengarah ke kontrol kandung kemih dan sfingter yang lebih baik. Peristalsis juga dibantu oleh aktivitas, sehingga dapat membantu pola eliminasi yang sehat.

4. Pengobatan

Obat-obatan dapat berdampak pada kesehatan dan pola eliminasi klien dan harus dinilai selama wawancara riwayat kesehatan. Klien dengan penyakit jantung, biasanya diresepkan obat diuretik, yang meningkatkan produksi urin. Antidepresan dan antihipertensi dapat menyebabkan retensi urin. Beberapa obat yang tanpa ada resep (OTC), terutama antihistamin, juga dapat menyebabkan retensi urin. Obat-obatan OTC lainnya dirancang secara khusus untuk meningkatkan eliminasi usus atau untuk melunakkan feses; perawat perlu menanyakan tentang semua obat yang diminum untuk memberikan perawatan yang tepat bagi klien yang mengalami perubahan dalam pola eliminasi (Rohayati Eti, 2019).

5. Perubahan Pola Eliminasi Urin

Menurut Alimul, Hidayat (2008) perubahan pola eliminasi terdiri atas :

1. Frekuensi

Frekuensi merupakan banyaknya jumlah berkemih dalam sehari. Peningkatan frekuensi berkemih dikarenakan meningkatnya jumlah cairan yang masuk. Frekuensi yang tinggi tanpa suatu tekanan asupan cairan dapat disebabkan oleh sistitis. Frekuensi tinggi dapat ditemukan juga pada keadaan stress atau hamil.

2. Urgensi

Urgensi adalah perasaan seseorang yang takut mengalami inkontinensia jika tidak berkemih. Pada umumnya, anak kecil memiliki kemampuan yang buruk dalam mengontrol sphincter eksternal. Biasanya, perasaan segera ingin berkemih terjadi pada anak karena kurangnya kemampuan pengontrolan pada sphincter.

3. Disuria

Disuria adalah rasa sakit dan kesulitan dalam berkemih. Hal ini sering ditemukan pada penyakit infeksi saluran kemih, trauma, dan striktura uretra.

4. Poliuria

Poliuria merupakan produksi urin abnormal dalam jumlah besar oleh ginjal, tanpa adanya peningkatan asupan cairan. Biasanya, hal ini dapat ditemukan pada penyakit diabetes mellitus dan penyakit gagal ginjal kronis.

6. Masalah-Masalah Yang Dapat Terjadi Pada Pola Eliminasi

1. Eliminasi Urine

Inkontinensia urin dan retensi urin adalah penyebab paling umum dari perubahan pola eliminasi urin. Inkontinensia urin adalah hilangnya kemampuan untuk mengontrol pengeluaran urin yang dapat berdampak pada masalah sosial atau higienis. Retensi urin adalah ketidakmampuan untuk sepenuhnya mengeluarkan urin dari kandung kemih selama berkemih. Ada dua jenis utama inkontinensia urin, akut dan kronis. Selain itu, inkontinensia urin kronis dapat dibagi lagi menjadi beberapa tipe berbeda. Karena masing-masing memiliki etiologi dan manajemen sendiri.

2. Eliminasi Bowel

Banyak penyakit dan kondisi yang mempengaruhi fungsi usus. Meskipun banyak perubahan dalam pola eliminasi usus dapat diamati, dan terdapat tiga yang menyebabkan perubahan umum: Konstipasi, diare, dan inkontinensia tinja.

a. Konstipasi

Faktor diet dapat berkontribusi terhadap konstipasi. Dehidrasi menyebabkan pengeringan tinja ketika tubuh meningkatkan reabsorpsi air dan natrium dari usus. Makanan massal yang tidak memadai juga

menyebabkan dehidrasi tinja. Penyakit divertikular, masalah umum pada manula, juga mengurangi transit kolon, yang selanjutnya meningkatkan risiko sembelit.

b. Diare

Diare adalah bentuk feses yang cair karena peningkatan frekuensi dan konsistensinya, dan dapat menyebabkan perubahan kebiasaan buang air besar seseorang. Penyebab utama diare termasuk agen infeksi, gangguan malabsorpsi, penyakit radang usus, sindrom usus pendek, efek samping obat, dan penyalahgunaan pencahar atau enema.

c. Infoninensia fekal

Mekanisme utama yang mempengaruhi orang dewasa terhadap inkontinensia fekal adalah disfungsi sfingter anal, gangguan pengiriman tinja ke rektum, gangguan penyimpanan rektum, dan cacat anatomi. Gangguan volume tinja dan konsistensi biasanya tidak cukup untuk menghasilkan inkontinensia fekal pada individu yang normal.

Al-Qur'an diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw kurang lebih abad ke-6 masehi, yang secara gambang banyak sekali tertulis tentang makanan dan kesehatan. Tetapi orang mulai berbicara masalah gizi dan kesehatan itu di awal abad 19, ditambah diakuinya ilmu gizi dalam salah satu cabang ilmu kesehatan pada tahun 1926 ketika May Swartz Rise dikukuhkan sebagai profesor ilmu gizi pertama di Universitas Columbia, New York Amerika Serikat. Dalam literatur keagamaan, bahkan dalam hadist-hadist Nabi, ditemukan sekian banyak perintah untuk menjaga makanan dan kesehatan dari mulai perintah menutup hidangan, mencuci tangan sebelum makan, larangan bernafas sambil minum, tidak kencing atau

buang air di tempat yang tidak mengalir atau di bawah pohon, adalah contoh-contoh praktis dari sekian banyak tuntunan Islam dalam konteks menjaga kesehatan (Elkarimah Mia, 2016).

Dari salah satu alasan inilah Islam sering disebut sebagai agama yang sangat proporsional. Islam datang sebagai agama untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi secara menyeluruh. Tidak terbatas jalur hubungan antara hamba dengan Tuhannya (horisontal) saja, tetapi Islam juga mengatur hubungan secara vertikal. Hubungan horisontal dan vertikal tersebut terikat oleh dua sumber utama; al-Qur'an dan Sunnah (Elkarimah Mia, 2016).

Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Setidaknya tiga dari yang disebut di atas berkaitan dengan kesehatan, yaitu jiwa, akal dan keturunan.. Tidak heran jika ditemukan bahwa Islam sangat kaya dengan tuntutan kesehatan, baik kesehatan jasmani dan rohani (Elkarimah Mia, 2016).

Dalam bahasa Arab kata sehat diungkapkan dengan kata ash-shihhah atau yang seakar dengannya yaitu keadaan baik, bebas dari penyakit dan kekurangan serta dalam keadaan normal.

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash dia berkata bahwa Rasulullah saw. telah bertanya (kepadaku, "Benarkah kamu selalu berpuasa di siang hari dan selalu berjaga di malam hari?" Aku pun menjawab, "Ya (benar), ya, Rasulullah." Rasulullah saw. pun lalu bersabda, "Jangan kau lakukan semua itu. Berpuasalah dan berbukalah, berjagalah dan tidurlah! Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu, matamu mempunyai hak atas dirimu, dan isterimu pun mempunyai hak atas dirimu." (Hadis Riwayat al-Bukhari dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash).

Rasulullah sering menggunakan kata ini dalam sabdanya:

نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْقَرَاءُ

“Banyak manusia merugi karena dua nikmat; kesehatan dan waktu luang”
(HR. al-Bukhari dari Ibnu Abbas).

Kesehatan tidak akan terealisasi tanpa adanya kebersihan, atau yang diistilahkan dengan taharah. Dari sini terlihat bahwa hubungan kebersihan dengan kesehatan tidaklah bersifat parsial, tetapi bersifat fungsional dan saling melengkapi. Antara keduanya ada hubungan kausalitas. Sehat bisa dikatakan jika diri, tempat dan lingkungan kita bersih, dengan kebersihan yang kita tunjukkan itu secara langsung kita tunjukkan bahwa kita sehat. Kebersihan atau taharah adalah bagian dari proses pembersihan diri dan satu-satunya jalan utama (syarat) agar seseorang bisa melaksanakan ibadah yang diterima Allah. Dengan melaksanakan taharah yang benar sesuai prinsip-prinsip yang diajarkan dalam sumber Islam, maka ia akan menjadi faktor kunci dalam mendapatkan kekhusukan shalat dan ibadah lainnya. Di sinilah pentingnya taharah untuk diperhatikan oleh setiap pribadi muslim.

Alasan mengapa kesehatan menjadi hal yang sangat penting diperhatikan adalah karena kalau orang sehat berarti ia kuat. Lemah dan kuatnya seseorang dalam melakukan suatu ibadah tergantung pada kesehatannya. Orang yang memiliki kesehatan yang baik akan memiliki kekuatan yang lebih dari orang yang sakit. Sedangkan orang kuat itu lebih disukai di sisi Allah daripada orang yang lemah, sebagaimana sabda Rasulullah:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

“Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi Allah daripada mukmin yang lemah” (HR. Muslim).

Dan tidak kalah pentingnya lagi, Islam menempatkan persoalan kebersihan sebagai bagian dari Islam dan fitrah manusia. Dengan kata lain, salah satu kecenderungan manusia adalah cinta kepada kebersihan (Elkarimah Mia,2016).





UNIVERSITAS ALAUDDIN
ALAUDDIN
M A K A S S A R

A. Pendekatan Teori Keperawatan Yang Digunakan

Dalam kasus CKD kemungkinan masalah yang muncul akan timbul sesuai dengan perjalanan penyakit seperti hipervolemi, gangguan pertukaran gas, intoleransi aktifitas, penurunan curah jantung, dan gangguan eliminasi. Salah satu masalah tersebut adalah pola eliminasi yang dimana pola eliminasi ini masuk menjadi salah satu hal pion ke tiga dalam konsep Virginia Henderson yaitu mengeluarkan buangan tubuh.

Virginia Henderson memandang pasien sebagai individu yang membutuhkan bantuan dalam mencapai kebebasan dan keutuhan pikiran dan tubuh. Dia menegaskan bahwa praktik yang dilakukan oleh perawat independen dari praktik dokter. Dia juga mengenalkan pemikirannya tentang peran perawat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor Karyanya berdasarkan karya (1) Thorndike, seorang psikolog Amerika, (2) pengalamannya di Henry House Visiting Nurse Agency, (3) pengalamannya di keperawatan rehabilitasi, dan (4) konsep Orlando tentang tindakan keperawatan yang terencana (Risna & Irwan, 2021).

Henderson menegaskan pentingnya seni dalam keperawatan dan mengenalkan 14 kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar asuhan keperawatan. Di dalam Bukunya yang berjudul *The Nature of Nursing: A Definition and Its Implications for Practice, Research, and Education*, Henderson (1966) memperkenalkan 14 kebutuhan dasar manusia yang merupakan dasar dalam pemberian asuhan keperawatan :

1. Bernapas normal.
2. Mengonsumsi makanan dan minuman yang cukup.
3. Mengeluarkan buangan tubuh.
4. Menggerakkan dan mempertahankan postur tubuh

5. Tidur dan beristirahat.
6. Memilih pakaian yang tepat; memilih antara memakai atau melepas pakaian.
7. Mempertahankan suhu tubuh pada batas normal dengan cara menyesuaikan pakaian dan modifikasi lingkungan.
8. Mempertahankan kebersihan tubuh, berhias dengan pantas, dan melindungi kulit.
9. Mencegah aktivitas yang dapat membahayakan orang lain dan lingkungan
10. Mampu mengkomunikasikan dan mengungkapkan perasaan, kebutuhan, kekhawatiran, dan pendapat kepada orang lain
11. Beribadah sesuai keyakinan dirinya.
12. Bekerja sehingga merasa berprestasi.
13. Ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan rekreasi.
14. Belajar, menemukan, atau memuaskan rasa ingin tahu yang mendukung pengembangan diri dan kesehatan yang normal, serta menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia (Risna & Irwan, 2021).

Keempat belas kebutuhan dasar manusia tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu komponen kebutuhan biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual kebutuhan dasar poin 1-9 termasuk komponen kebutuhan biologis, poin 10 dan 14 termasuk komponen kebutuhan psikologis, poin 11 termasuk kebutuhan spiritual, dan komponen 12 dan 13 termasuk komponen kebutuhan sosiologis. Selain itu, Henderson juga menyatakan bahwa pikiran dan tubuh manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain (inseparable). Sama halnya dengan klien dan keluarga, mereka merupakan satu kesatuan (Risna & Irwan, 2021).

Menurut Henderson, kebutuhan dasar manusia terdiri atas 14 komponen yang merupakan komponen penanganan perawatan dan Henderson memandang manusia

sebagai individu yang butuh bantuan untuk memperoleh kesehatan, kebebasan, kematian yang damai dan meraih kemandirian.

Perawat memiliki fungsi unik dalam membantu individu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Sebagai anggota dari tim kesehatan, perawat memiliki fungsi independen di dalam penanganan perawatan berdasarkan pada 14 kebutuhan manusia. Perawat harus memiliki pengetahuan biologis maupun sosial, untuk menjalankan fungsinya (Risna & Irwan, 2021).

B. Evidence Based Nursing

Dampak gangguan eliminasi urin pada pasien gagal ginjal kronik yaitu perubahan eliminasi BAK, peningkatan tekanan darah, mual, yang ditandai dengan adanya edema maupun penurunan volume urin output dan pruritus yang ditandai dengan kulit tampak kering dan bersisik. Dampak lain gangguan eliminasi urin yaitu gangguan keseimbangan cairan elektrolit yang ditandai dengan menurunnya kadar klirens kreatinin dan meningkatnya kadar kreatinin serum dikarenakan ginjal tidak sanggup lagi mempertahankan homeostatis tubuh sehingga dapat terjadi penurunan kesadaran pada pasien dan berujung kematian (Tarwoto & Wartonah, 2015).

Sejalan dengan penelitian Pamungkas Reza, M (2013) Salah satu cara non farmakologis untuk menangani inkontinensia urin adalah dengan latihan kandung kemih (*Bladder Training*). *Bladder training* adalah latihan kandung kemih yang bertujuan untuk mengembangkan tonus otot dan spingter kandung kemih agar berfungsi optimal, terdapat 3 macam metode *bladder training*, yaitu *kegel exercise*, *delay urination*, dan *scheduled bathroom trips*. *Kegel exercise* adalah latihan pengencangan atau penguatan otototot dasar panggul, *delay urination* adalah menunda berkemih sedangkan *scheduled bathroom trips* yaitu menjadwalkan berkemih.

Metode *bladder training* diantaranya adalah *delay urination* dan *scheduled urination*. *Delay urination* adalah latihan menahan/menunda untuk berkemih. Pada pasien yang masih terpasang kateter, *delay urination* dilakukan dengan mengklem atau mengikat aliran urine ke urine bag. Tindakan ini memungkinkan kandung kemih terisi urine dan otot detrusor berkontraksi sedangkan pelepasan klem memungkinkan kandung kemih untuk mengosongkan isinya. Latihan ini dilakukan 6-7 kali per hari sampai pasien dapat menunda untuk berkemih. Sedangkan *scheduled urination* adalah pembiasaan berkemih sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh perawat 6-7 kali perhari, jadwal tersebut harus diikuti dengan ketat oleh pasien, sehingga pasien berhasil belajar kembali mengenal dan mengadakan respon yang sesuai terhadap keinginan untuk berkemih (Nurhasanah & Hamzah, 2017, dalam Fajar Dwi).

Latihan kandung kemih/ *bladder training* mempunyai pengaruh antara lain memperpanjang waktu untuk mengeluarkan urine, meningkatkan jumlah urine yang ditahan oleh kandung kemih, meningkatkan kontrol pada dorongan/ rangsangan berkemih menurut jadwal dan mengurangi/ menghilangkan inkontinensia urine (Fajar Dwi, et.al 2020).

Hasil penelitian Fajar Dwi (2020) setelah dilakukan latihan *delay urination* menunjukkan hasil hampir sebagian pasien sudah mengalami perbaikan dengan tidak lagi mengalami inkontinensia urine, sedangkan pada pasien yang dilakukan latihan *scheduled urination* diketahui setengah dari jumlah pasien sudah mengalami perbaikan dan tidak lagi mengalami inkontinensia urine. Selain itu *bladder training* juga dapat memperpanjang waktu untuk mengeluarkan urine, meningkatkan jumlah urine yang ditahan oleh kandung kemih, meningkatkan

kontrol pada dorongan/ rangsangan berkemih menurut jadwal dan mengurangi/ menghilangkan inkontinensia urine.

1. Tujuan

Tujuan umum :

Secara umum bladder training bertujuan untuk mengembalikan pola normal berkemih dengan menghambat atau menstimulasi pengeluaran air kemih.

Tujuan khusus :

- a. Mengembangkan tonus otot kandung kemih sehingga dapat mencegah inkontensia
- b. Mencegah proses terjadinya batu urin
- c. Melatih kandung kemih untuk mengeluarkan urin

3. Indikasi Bladder training

Bladder Training dilakukan pada pasien dengan inkontinensia urin, atau pada pasien yang akan melepas keteter, pasien yang terpasang keteter cukup lama, pasien post operasi (Endah, 2015). Kriteria Bladder Training dapat dilakukan Bladder Training apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, terpasang keteter minimal 7-12 hari, pasien komunikatif, dilakukan ketika akan dilepas (aff keteter) tidak mengalami infeksi saluran (Endah, 2015).

4. Kontraindikasi bladder training

Kontraindikasi infeksi kandung kemih yang paling sering disebabkan oleh menyebarnya infeksi dari ureter, gangguan atau kelainan pada uretra (Endah, 2015).

5. Prosedur pemberian

a. Persiapan alat

- 1) Arteri klem

- 2) Sarung tangan
- 3) Bengkok
- 4) Air minum dalam gelas (200-250 cc)
- 5) Jam tangan/jam dinding

b. Prosedur kerja

1) Tahap pra interaksi

- Cek program terapi
- Perawat cuci tangan
- Siapkan alat-alat

2) Tahap orientasi

- Berikan salam terapeutik, panggil pasien dengan namanya
- Jelaskan tujuan, prosedur kerja dan lamanya tindakan pada pasien dan atau keluarga
- Berikan kesempatan pasien bertanya sebelum kegiatan dilakukan
- Jaga privacy pasien dengan menutup tirai dan pintu kamar pasien
- Atur posisi pasien yang aman

3) Tahap kerja

- Perawat cuci tangan
- Dekatkan peralatan kesisi tempat tidur pasien
- Kenakan sarung tangan steril
- Ukur volume urin pada kantung urin dan kosongkan kantung urin
- Klem atau ikat selang kateter sesuai program (selama 1-2 jam) yang memungkinkan kandung kemih terisi urin dan otot destrusor berkontraksi, supaya meningkatkan volume urin residural
- Anjurkan pasien untuk minum sesuai program (200 – 250 cc)

- Tanyakan pada pasien apakah teras ingin berkemih (setelah 1 jam)
- Buka klem atau ikatan, biarkan urin mengalir keluar
- Ulangi lagi seperti langkah nomer 8 selama 4 kali (4 siklus)
- Ukur volume dan perhatikan warna dan bau urin
- Bereskan dan rapikan semua peralatan
- Lepaskan sarung tangan
- Perawat cuci tangan

4) Tahap terminasi

- Tanyakan respon pasien
- Jelaskan rencana tindak lanjut
- Salam terapeutik disampaikan kepada pasien
- Dokumentasikan : volume urin, warna, bau urin, serta respon pasien

(Harmilah dkk, 2017).



BAB III
LAPORAN KASUS

1. PENGKAJIAN

A. IDENTITAS

1) REKAMAN ASUHAN KEPERAWATAN

Nama : Tn. R
Umur : 21 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Suku : Makassar
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum menikah
Alamat : Jl. Al-Ikhlas
Sumber Informasi : Pasien & keluarga

2) PENGKAJIAN AWAL

Ruang rawat : Maminasa Baji
No. RM : 390757
Tgl/Jam masuk : 28-02-2021
Tgl/Jam pengmabilan data : 02-03-2021
Diagnosa masuk : CKD (*Chronic Kidney Disease*)
Cara masuk : Berjalan
Kiriman dari poliklinik : Tidak
Pindahan dari : Rujukan dari RS Masita

B. RIWAYAT KESEHATAN

Keluhan utama : Sulit BAK
Keluhan saat ini : Klien mengatakan tidak bisa buang air kecil
Riwayat masuk RS : Klien mengatakan demam selama tiga hari dan tidak bisa BAK sejak jatuh dari tangga
Pernah mendapat pengobatan sebelumnya : Ya, klien pernah mendapat pengobatan sebelumnya
BB sebelum sakit : 56 kg
BB saat sakit : 56 kg

Riwayat oprasi : Tidak terdapat riwayat oprasi
Kiriman dari poliklinik : Tidak
Pindahan dari : Rujukan dari RS Masita

C. KEADAAN UMUM

Kesadaran : Compos mentis, nilai GCS 15 dengan E4,
M6, V5
Pasien mengerti tentang : Ya, pasien paham tentang penyakitnya
penyakitnya

D. KEBUTUHAN DASAR

Suhu : 36,5°C
Skala nyeri : Tidak ada nyeri
Gambaran nyeri : Tidak ada nyeri
Lokasi nyeri : Tidak ada nyeri
Frekuensi : Tidak ada nyeri
Durasi : Tidak ada nyeri
Respon emosional : Klien mengatakan tidak ada nyeri pada
daerah abdomen
Penyempitan fokus : Klien tidak mengalami penyempitan fokus
Cara mengatasi nyeri : Tidak ada nyeri
Masalah keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

1. NUTRISI

TB : 162 cm
Kebiasaan makan : 1-2 kali sehari dan kadang porsi tidak di
habiskan
Keluhan saat ini : Keluarga klien mengatakan nafsu makan
klien menurun
Pembesaran tiroid : Tidak ada pembesaran tiroid
Hernia/massa : Tidak ada massa
Helitosis : Tidak ada
Gigi & gusi : Gigi tampak kuning
Penampilan lidah : Kotor

Bibir : Kering

Terpasang infus dimulai : 28 Februari 2021
sejak tanggal

Jenis cairan yang dipasang : Ringer laktat (RL)

Porsi makanan yang di : Sesuai anjuran makan 1 porsi setiap makan
habiskan dan yang di habiskan hanya ½ dari porsi
yang di sediakan

Makanan yang di sukai : Pasien tidak memilih jenis makanan yang
di sediakan

Diet : Tidak ada diet

Masalah keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

2. KEBERSIHAN PERORANGAN

Kebiasaan mandi : keluarga klien mengatakan klien hanya di
lap basah 1 kali sejak masuk rumah sakit
pada tgl 28-2-2021

Kebiasaan gosok gigi : rutin 1 kali sehari

Cuci rambut : keluarga klien mengatakan cuci rambut 1
kali sejak masuk rumah sakit

Kebersihan badan : badan tampak kurang bersih

Keadaan rambut : rambut tampak berminyak

Keadaan kulit kepala : terdapat ketombe, dipalpasi tidak terdapat
massa/edema pada kulit kepala

Keadaan kuku : panjang dan kotor

Keadaan vulva/pariensial : klien mengatakan sering membersihkan
daerah parinealnya

Keluhan saat ini : Klien merasa lemas

Integritas kulit : kering bersisik

Luka bakar : tidak ada luka bakar hanya goresan-goresan
kecil pada bagian lengan atas pasca jatuh
dari tangga dengan ketinggian 1,5 meter dan
terdapat memar pada punggung kanan
setinggi scapula dan paha kanan

Masalah keperawatan : Defisit Perawatan Diri

3. CAIRAN

Kebiasaan minum	:	Dalam sehari pasien dapat menghabiskan 1,5 liter air minum
Turgor kulit	:	Lembab
Punggung kuku	:	Baik
Mata cekung	:	Tidak nampak
Konjungtiva	:	Tidak anemis
Sklera	:	Ada darah pada sclera kiri pasien
Edema	:	Tidak terdapat edema
Distensi vena jugularis	:	Tidak adanya distensi vena jugularis
Asites	:	Tidak ada asites
Spider neavi	:	Tidak ada
Minum perNGT	:	Tidak ada
Terpasang dekompresi (NGT) di mulai tgl	:	Tidak diberikan
Terpasang infus	:	Terpasang infus dengan jenis cairan Ringer Laktat
Masalah keperawatan	:	Tidak ada masalah keperawatan

4. AKTIVITAS & ISTIRAHAT

Aktivitas waktu luang	:	Nonton TV dan main hp
Aktivitas/hobby	:	main futsal
Kesulitan bergerak	:	pasien dapat bergerak dengan baik tapi ketika ingin berpindah tempat pasien beberapa kali di bantu oleh keluarga
Kekuatan otot	:	skor 5 (mampu melakukan gerakan mengangkat ekstremitas dengan normal)
Tonus otot	:	tidak terdapat tonus otot
Postur	:	tidak ada kelainan
Tremor	:	tidak ada
Rentang gerak	:	pasien dapat menggerakkan anggota tubuh ekstremitas atas dan bawah seperti tangan, kaki, pergelangan tangan, pergelangan kaki

dengan baik

Keluhan saat ini : Klien merasa lemas

Penggunaan alat bantu : tidak menggunakan alat bantu

Pelaksanaan aktivitas : pasien dapat mandiri dan beberapa kali di bantu oleh keluarga

Jenis aktivitas yang perlu dibantu : Mandi & berjalan

Masalah keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

5. ELIMINASI

Kebiasaan BAB : Keluarga klien mengatakan klien BAB 2 kali sejak masuk rumah sakit

Kebiasaan BAK : Klien terpasang selang keteter, jumlah urin pada kantong urin 100cc pada jam 14:55, 400cc pada jam 20:14.

Warna urine : kuning keruh

Menggunakan laxan : belum pernah

Menggunakan diuretik : tidak pernah

Keluhan BAK saat ini : Klien mengatakn sulit untuk BAK dan pasien terpasang kateter

Peristaltik usus : 18 x/i

Abdomen : tidak ada nyeri tekan saat di palpasi

Massa : tidak ada massa

Terpasang kateter urin : terpasang keteter

Penggunaan alkohol : tidak ada

Frekuensi BAB : 2 kali sejak masuk rumah sakit

Warna : kuning

Bentuk/tekstur : Encer

Masalah keperawatan : Gangguan Eliminasi Urin

6. OKSIGENASI

Nadi : 76 x/i

TD : 110/60 mmHg

Bunyi nafas : Normal, vasikuler

Kedalaman : konstan
Respirasi : 20 x/i
Fremitus : Normal
Sputum : tidak ada sputum
Masalah keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

7. TIDUR& ISTIRAHAT

Kebiasaan tidur sebelum sakit : Klien jarang tidur di siang hari
Kebiasaan tidur saat sakit : Klien tidur di siang dan malam hari
Lama tidur : 6-8 jam perhari
Kualitas tidur : Klien tidur dengan nyenyak
Masalah keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

8. PENCEGAHAN TERHADAP BAHAYA

Refleksi : Terdapat gerakan refleksi
Penglihatan : Normal, tidak menggunakan alat bantu penglihatan
Pendengaran : Pendengaran baik, tidak menggunakan alat bantu pendengaran
Penciuman : Penciuman baik, klien dapat membedakan bau
Perabaan : Perabaan baik, klien dapat merasakan sentuhan

Masalah keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

9. NEUROSENSORIK

Rasa ingin pingsan : klien tidak merasa ingin pingsan
Stroke (gejala sisa) : Klien tidak memiliki riwayat stroke
Status mental : Status mental klien baik
Orientasi tempat : Klien dapat mengenal tempat
Kesadaran : Composmentis, GCS: 15
Memori : Klien dapat mengingat dengan baik kejadian dimasa lalu

Kaca mata	:	Klien tidak memiliki riwayat penggunaan kacamata
Alat bantu dengar	:	Klien tidak menggunakan alat bantu dengar
Facial droop	:	Tidak nampak facial droop
Genggaman tangan ka/ki	:	Tangan kanan dan kiri dapat menggenggam dengan baik
Postur	:	baik, tidak ada masalah
Chaddock	:	normal
Masalah keperawatan	:	Tidak ada masalah keperawatan

10. KEAMANAN

Alergi/sensitivitas	:	Klien mengatakan alergi udang
Perubahan sistem imun sebelumnya	:	Klien tidak mengalami penurunan imun sebelumnya
Riwayat penyakit hubungan seksual	:	Tidak ada riwayat penyakit seksual
Perilaku resiko tinggi	:	Tidak ada
Transpuse darah/jumlah	:	Tidak ada riwayat tranpusi darah
Riwayat kecelakaan	:	Jatuh dari tangga dengan ketinggian 1,5 m
Peristaltik usus	:	18 x/i
Abdomen	:	tidak ada nyeri tekan saat di palpasi
Massa	:	tidak ada massa
Terpasang kateter urin	:	terpasang keteter urin
Penggunaan alkohol	:	klien tidak meminum alkohol
Frekuensi BAB	:	2 kali sejak masuk rumah sakit
Warna	:	kuning
Bentuk/tekstur	:	Encer
Masalah keperawatan	:	Tidak ada masalah keperawatan

11. SEKSUALITAS

Aktif melakukan hubungan seksual	:	Tidak aktif
Penggunaan Kondom	:	Klien mengatakan tidak pernah

menggunakan

Masalah- masalah/kesulitan seksual : Tidak ada riwayat penyakit seksual

Perubahan terakhir dalam frekuensi/minat : tidak ada

Pria

Rabes penis : tidak dikaji

Gangguan prostat : Klien mengatakan tidak memiliki riwayat gangguan prostat

Sirkum sisi : Klien mengatakan melakukan sirkum waktu SD

Melakukan pemeriksaan sendiri : Ya, klien melakukan pemeriksaan sendiri

Masalah Keperawatan : **Tidak ada masalah keperawatan**

12. KESEIMBANGAN & PENINGKATAN HUBUNGAN RESIKO SERTA INTERAKSI SOSIAL

Lama kawin : Klien mengatakan belum menikah

Masalah kesehatan/stress : Klien mengatakan tidak stress

Cara mengatsi stres : Tidak ada

Orang pendukung lain : Orang tua dan keluarga

Peran dalam struk keluarga : Anak pertama dari tiga bersaudara

Masalah yang berhubungan dengan penyakit : Tidak ada

Psikologis : Klien tampak tenang

Keputus asaan : Klien mengatakan tidak merasa putus asa

Ketidak berdayaan : Klien mengatakan tidak ada masalah

Perubahan bicara : Tidak ada perubahan bicara

Komunikasi verbal/nonverbal dengan keluarga/ orang terdekat : Klien berkomunikasi dengan keluarganya dengan baik


- Spiritual : Klien jarang menunaikan sholat 5 waktu
- Kegiatan keagamaan : Shalat jumat berjamaah
- Gaya hidup : Klien mengatakan merokok
- Perubahan terakhir : Klien mengatakan tidak merokok semenjam di rawat di RS
- Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan**

13. PENYULUHAN DAN PEMBELAJARAN

- Bahasa dominan : Indonesia
- Informasi yang telah diberikan : Pengaturan jam besuk, hak dan kewajiban klien, petugas yang merawat



14. DATA GENOGRAM



Keterangan :

□ : Laki-laki

X : Meninggal

○ : Perempuan

| : Garis keturunan

↗ : Pasien

--- : Garis serumah

G1 : ke dua orang tua dari ibu pasien telah meninggal dan orang tua dari ayah pasien masih hidup tapi umurnya tidak diketahui dan memiliki riwayat penyakit hipertensi

G2 : Ibu pasien merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, ayah pasien merupakan anak ke 3 dari 6 bersaudara, dan ayah klien memiliki riwayat hipertensi

G3 : Pasien anak pertama dari 3 bersaudara, dan saudara klien tidak memiliki penyakit yang sama dengan klien

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tanggal : 01 Mei 2021

Ruangan : Maminasa Baji

Nama : Tn.R

No. RM : 390757

Jenis pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
Darah Rutin			
WBC	16.5	4.0-10.0	10 ² 3/uL
LYM	1.8	0.6-3.5	10 ⁴ 3/uL
MON	1.3	0.1-0.9	10 ⁴ 3/uL
GRA	13.4	1.3-6.7	10 ⁴ 3/uL
LYM	11.2	20.0-40.0	%
MON	7.9	2.0-8.0	%
GRA	80.9	2.0-6.0	%
RBC	4.08	50-70	10 ⁴ 6/uL
HGB	12.5	3.50-5.50	g/dL
HCT	33.0	11.0-17.9	%
MCV	80.9	40-50	n
MCH	30.6	8.00-0-96	pg
MCHC	37.9	23.2-36.7	g/dl
RDW-SD	30.5	32-37	n
RDW-CV	13.4	10.0-18.0	%
PLT	70	150-400	10 ⁴ 3/uL
PCT	0.07	0.15-0.50	%
MPV	10.5	6.5-11.0	n
PDW	14.6	10.0-18.0	n
P-LCR	32.7	13.0-43.0	%

Obat Yang Diresepkan

Nama Obat	Dosis	Waktu	Rute
Furosemide		Per Hari	inj
Ringing Laktat	18 Tetes	Per Hari	IV

KLASIFIKASI DATA

Data Subjektif	Data Objektif
1. Klien mengatakan susah buang air kecil	1. Terpasang selang keteter keteter Jumlah urin pada kantong urin 100cc pada jam 14:55, 400cc pada jam 20.14.
2. Klien mengatakn sulit untuk BAK dan pasien terpasang kateter	2. Warna urine : kuning keruh
3. klien mengatakan demam selama tiga hari dan tidak bisa BAK sejak jatuh dari tangga	3. TTV TD : 110/60 mmHg N : 76x/i S : 36,5°C P : 20x/i
4. keluarga klien mengatakan klien hanya di lap basah 1 kali sejak masuk rumah sakit pada tgl 28-2-2021	4. BB sebelum sakit 56 kg
5. keluarga klien mengatakan cuci rambut 1 kali sejak masuk rumah sakit	5. Badan tampak kurang bersih
6. Kebiasaan makan klien 1-2 kali sehari dan kadang porsi tidak di habiskan.	6. Rambut tampak berminyak
7. Keluarga klien mengatakan nafsu makan klien menurun.	7. Terdapat ketombe pada kulit kepala
8. Porsi makan yang dihabiskan klien sesuai anjuran makan 1 porsi setiap makan dan yang dihabiskan hanya ½ dari porsi yang disediakan.	8. Kuku panjang dan kotor
9. Pasien dapat bergerak dengan baik tapi ketika ingin berpindah tempat pasien beberapa kali di bantu oleh keluarga	9. Gigi tampak kuning
10. Klien merasa lemas	10. Penampilan lidah kotor
11. Klien dapat bergerak dengan baik tapi ketika ingin berpindah tempat pasien di bantu oleh keluarga.	11. Integritas Kulit kering bersisik
	12. Bibir kering
	13. Paristaltik usus 18 x/i
	14. kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan E4, M6, V5

12. Jenis aktifitas yang perlu dibantu mandi dan berjalan	
13. Riwayat cedera kecelakaan klien mengatakan Jatuh dari tangga dengan ketinggian 1,5 cm.	
14. Tidak ada luka bakar hanya goresan-goresan kecil pada bagian lengan atas pasca jatuh dari tangga dengan ketinggian 1,5 meter dan terdapat memar pada punggung kanan setinggi scapula dan paha kanan	

KATEGORISASI DATA

KATEGORISASI DAN SUB KATEGORI		DATA SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF
FISIOLOGI	RESPIRASI	<i>Data Objektif</i> P : 20 x/i Bunyi napas normal, vasikuler Tidak ada sputum
	SIRKULASI	<i>Data Objektif</i> TD : 112/60 mmHg N : 76 x/i S: 36,5 °C
	NUTRISI DAN CAIRAN	<i>Data Subjektif</i> 1. Kebiasaan makan klien 1-2 kali sehari dan kadang porsi tidak dihabiskan. 2. Keluarga klien


		<p>mengatakan nafsu makan klien menurun.</p> <p>3. Porsi makan yang dihabiskan klien sesuai anjuran makan 1 porsi setiap makan dan yang dihabiskan hanya ½ dari porsi yang disediakan.</p>
	<p>ELIMINASI</p>	<p><i>Data Subjektif</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga klien mengatakan klien BAB 2 kali sejak masuk rumah sakit 2. Klien mengatakan susah buang air kecil 3. klien mengatakan demam selama tiga hari dan tidak bisa BAK sejak jatuh dari tangga <p><i>Data Objektif</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warna urine : kuning keruh 2. Klien terpasang selang keteter, Jumlah urin pada kantong urin 100cc pada jam 14:55, 400cc pada jam

		20:14.
	AKTIVITAS DAN ISTIRAHAT	<p><i>Data Subjektif</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan bergerak :Klien dapat bergerak dengan baik tapi ketika ingin berpindah tempat pasien di bantu oleh keluarga. 2. Rentang gerak: pasien dapat menggerakkan anggota tubuh ekstremitas atas dan bawah seperti tangan, kaki, pergelangan tangan, pergelangan kaki dengan baik. 3. Klien merasa lemas 4. Jenis aktifitas yang perlu dibantu mandi dan berjalan <p><i>Data Objektif</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat tonus otot
	NEUROSENSORI	<p><i>Data Subjektif</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tidak merasa ingin pingsan 2. Klien dapat

		<p>mengingat dengan baik kejadian di masa lalu</p> <p>3. Klien tidak memiliki riwayat stroke</p> <p>4. Klien tidak memiliki riwayat penggunaan kacamata</p> <p><i>Data Objektif</i></p> <p>5. Klien tidak menggunakan alat bantu dengar</p> <p>6. Tangan kanan dan kiri klien dapat memegang dengan baik</p>
	REPRODUKSI DAN SEKSUALITAS	
PSIKOLOGIS	NYERI DAN KENYAMANAN	
	INTEGRITAS EGO	<p><i>Data Subjektif</i></p> <p>Klien nampak tidak meringis pada saat palpasi abdomen</p>
	PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN	
PERILAKU	KEBERSIHAN DIRI	<p><i>Data Subjektif</i></p> <p>1. Keluarga klien mengatakan klien</p>


		<p>hanya di lab basah 1 kali sejak masuk rumah sakit pada tgl 28-2-2021.</p> <p>2. Keluarga klien mengatakan cuci rambut 1 kali sejak masuk rumah sakit.</p> <p>3. Keadaan pariental : pasien sering membersihkan daerah parientalnya</p> <p><i>Data Objektif</i></p> <p>1. badan tampak kurang bersih,</p> <p>2. rambut tampak berminyak dan terdapat ketombe</p> <p>3. Gigi tampak kuning</p> <p>4. Penampilan lidah kotor</p> <p>5. Bibir kering</p> <p>6. kuku klien tampak panjang dan kotor</p> <p>7. Integritas kulit kering bersisik.</p>
	<p>PENYULUHAN DAN PEMBELAJARAN</p>	<p><i>Data Subjektif</i></p> <p>1. Bahasa yang dihunakan Bahasa Indonesia</p>

		<p>2. Informasi yang diberikan pengaturan jam besuk, hak dan kewajiban klien, petugas yang merawat</p>
RELASIONAL	INTERAKSI SOSIAL	<p><i>Data Subjektif</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang pendukung : orang tua dan keluarga 2. Peran dalam struk keluarga : anak pertama dari tiga bersaudara, pasien tampak tenang, tidak ada keputusasaan. komunikasi lancar klien berkomunikasi dengan baik dengan keluarganya.
LINGKUNGAN	KEAMANAN DAN PROTEKSI	<p><i>Data Subjektif</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien alergi udang 2. Riwayat cedera kecelakaan : Klien mengatakan atuh dari tangga dengan ketinggian 1,5 cm 3. Masalah punggung : terdapat memar

		<p>pada punggung kanan setinggi scapula.</p> <p><i>Data Objektif</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. ROM : pasien dapat menggerakkan lengan dan kaki dengan baik.2. tidak ada luka bakar hanya goresan-goresan kecil pada bagian lengan atas pasca jatuh dari tangga dengan ketinggian 1,5 meter dan terdapat memar pada punggung kanan setinggi scapula dan paha kanan
--	--	---

ANALISA DATA

No	Data	Etiologi	Masalah Keperawatan
1.	<p>Data Subjektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klien mengatakan susah buang air kecil b. Klien mengatakan sulit untuk BAK dan pasien terpasang kateter c. klien mengatakan demam selama tiga hari dan tidak bisa BAK sejak jatuh dari tangga d. keluarga klien mengatakan klien hanya di lap basah 1 kali sejak masuk rumah sakit pada tgl 28-2-2021 <p>Data Objektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terpasang selang keteter keteter b. Jumlah urin pada kantong urin 100cc pada jam 14:55, 400cc pada jam 20.14. c. Warna urine : kuning keruh 	<p>Makanan+minuman+obat-obatan (nefrontoksik)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mengandung kalsium dan fosfat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kalsium dan fosfat meningkat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Disekresi diginjal</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kristalisasi (pengendapan)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Batu ginjal</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Obstruksi traktus urinarius</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Urin yang akan disekresi terhambat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Fungsi ginjal terhambat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Fungsi ginjal menurun</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Gangguan Eliminasi Urin</p>	<p style="text-align: center;">Gangguan Eliminasi Urin</p>

	<p>d. TTV</p> <p>TD : 110/60 mmHg</p> <p>N : 76x/i</p> <p>S : 36,5°C</p> <p>P : 20x/i</p>		
<p>2.</p>	<p>Data Subjektif :</p> <p>a. Keluarga klien mengatakan klien hanya di lap basah 1 kali sejak masuk rumah sakit pada tgl 28-2-2021</p> <p>b. Keluarga klien mengatakan cuci rambut 1 kali sejak masuk rumah sakit</p> <p>c. Klien merasa lemas</p> <p>Data Objektif :</p> <p>a. Badan tampak kurang bersih</p> <p>b. Rambut tampak berminyak</p> <p>c. Terdapat ketombe pada kulit kepala</p> <p>d. Kuku panjang dan kotor</p> <p>e. Gigi tampak kuning</p> <p>f. Penampilan lidah kotor</p> <p>g. Integritas Kulit</p>	 <pre> graph TD A[Fungsi ginjal menurun] --> B[Produksi eritropuitin menurun] B --> C[Rangsangan pembentukan sel darah merah pada tulang menurun] C --> D[HB menurun] D --> E[Suplai oksigen menurun] E --> F[Metabolisme tubuh menurun] F --> G[Kelemahan] G --> H[Defisit Perawatan Diri] </pre>	<p>Defisit Perawatan Diri</p>

	kering bersisik	
	h. Bibir kering	

DIAGNOSIS KEPERAWATAN

1.	<p>Gangguan Eliminasi Urin berhubungan dengan penurunan fungsi ginjal dibuktikan dengan</p> <p>Data Subjektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Klien mengatakan susah buang air kecil b. Klien mengatakan sulit untuk BAK dan pasien terpasang kateter c. klien mengatakan demam selama tiga hari dan tidak bisa BAK sejak jatuh dari tangga <p>Data Objektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terpasang selang keteter keteter b. Jumlah urin pada kantong urin 100cc pada jam 14:55, 400cc pada jam 20.14. c. Warna urine : kuning keruh d. TTV <ul style="list-style-type: none"> TD : 110/60 mmHg N : 76x/i S : 36,5°C P : 20x/i
2.	<p>Defisit Perawatan Diri berhubungan dengan kelemahan dibuktikan dengan</p> <p>Data Subjektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keluarga klien mengatakan klien hanya di lap basah 1 kali sejak masuk rumah sakit pada tgl 28-2-2021 b. Keluarga klien mengatakan cuci rambut 1 kali sejak masuk rumah sakit c. Klien merasa lemas <p>Data Objektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan tampak kurang bersih b. Rambut tampak berminyak

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">c. Terdapat ketombe pada kulit kepalad. Kuku panjang dan kotore. Gigi tampak kuningf. Penampilan lidah kotorg. Integritas Kulit kering bersisikh. Bibir kering |
|---|



INTERVENSI KEPERAWATAN

Nama Pasien : Tn. R
Umur : 21 Tahun

No. RM : 390757
Diagnosa Medis : CKD

No	Diagnosis Keperawatan	Luaran Keperawatan	Intervensi Keperawatan	Rasional
1	<p>Gangguan Eliminasi Urin berhubungan dengan penurunan fungsi ginjal ditandai dengan</p> <p>Data Subjektif :</p> <p>a. Klien mengatakan susah buang air kecil</p> <p>b. Klien mengatakan sulit untuk BAK dan pasien terpasang kateter</p> <p>c. klien mengatakan demam selama tiga hari dan tidak bisa BAK sejak jatuh dari tangga</p>	<p>Setelah dilakukan asuhan keperawatan 2 x 24 jam maka diharapkan pengosongan kandung kemih yang lengkap dapat membaik dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensasi berkemih meningkat (5) 2. Desakan berkemih menurun (5) 3. Distensi kandung kemih menurun (5) 	<p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin - Monitor eliminasi urin (<i>mis. Frekuensi, konsistensi, aroma, volume, dan warna</i>) <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Catat waktu-waktu dan haluaran berkemih <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih - Ajarkan minum yang cukup, <i>jika</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui masalah yang terjadi pada pasien - Mengetahui karakteristik dari urin - Mengetahui jadwal waktu berkemih dari pasien - Memberikan informasi kepada pasien terkait masalah yang dialami pasien - Agar kebutuhan cairan

<p>d. keluarga klien mengatakan klien hanya di lap basah 1 kali sejak masuk rumah sakit pada tgl 28-2-2021</p> <p>Data Objektif :</p> <p>a. Terpasang selang keteter keteter</p> <p>b. Jumlah urin pada kantong urin 100cc pada jam 14:55, 400cc pada jam 20.14.</p> <p>c. Warna urine : kuning keruh</p> <p>d. TTV TD : 110/60 mmHg N : 76x/i S : 36,5°C P : 20x/i</p>		<p><i>tidak ada kontraindikasi</i></p>	<p>pasien terpenuhi</p>
---	---	--	-------------------------

2.	<p>Defisit Perawatan Diri berhubungan dengan kelemahan ditandai dengan</p> <p>Data Subjektif :</p> <p>a. Keluarga klien mengatakan klien hanya di lap basah 1 kali sejak masuk rumah sakit pada tgl 28-2-2021</p> <p>b. Keluarga klien mengatakan cuci rambut 1 kali sejak masuk rumah sakit</p> <p>c. Klien merasa lemas</p> <p>Data Objektif :</p> <p>a. Badan tampak kurang bersih</p> <p>b. Rambut tampak berminyak</p>	<p>Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 x 24 jam maka diharapkan kemampuan melakukan aktivitas perawatan diri meningkat dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minat melakukan perawatan diri meningkat (5) 2. Mempertahankan kebersihan diri meningkat (5) 	<p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia - Monitor tingkat kemandirian <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sediakan lingkungan terapeutik (<i>mis. Suasana hangat, rileks, privasi</i>) - Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan 	<ul style="list-style-type: none"> - untuk mengetahui kebiasaan perawatan diri pasien - Untuk melihat kemampuan yang dapat dilakukan klien secara mandiri - Memberikan rasa nyaman kepada klien - Untuk memudahkan klien melakukan perawatan diri - Agar klien tetap terjaga kebersihannya selama dirawat
----	---	---	---	--

<p>c. Terdapat ketombe pada kulit kepala</p> <p>d. Kuku panjang dan kotor</p> <p>e. Gigi tampak kuning</p> <p>f. Penampilan lidah kotor</p> <p>g. Integritas Kulit kering bersisik</p> <p>h. Bibir kering</p>			
---	--	--	--

IMPLEMENTASI KEPERAWATAN

Nama Pasien : Tn. R

No. RM : 390757

Umur : 21 Tahun

Diagnosa Medis : CKD

No	Diagnosis Keperawatan	Hari/Tanggal/Jam	Implementasi	Evaluasi
1.	<p>Gangguan Eliminasi Urin berhubungan dengan penurunan fungsi ginjal ditandai dengan Data Subjektif :</p> <p>a. Klien mengatakan susah buang air kecil</p> <p>b. Klien mengatakan sulit untuk BAK dan pasien terpasang</p>	<p>Rabu, 03 Maret 2021</p> <p>14:50 WITA</p> <p>14:53 WITA</p> <p>14:55 WITA 20:14 WITA</p> <p>15:00 WITA</p>	<p>Menejemen Eliminasi Urine</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin <p>Hasil : Klien mengatakan susah buang air kecil, terpasang selang keteter pada klien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitoring eliminasi urin <p>Hasil : Warna urine : kuning keruh</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Catat waktu-waktu dan haluaran berkemih <p>Hasil : volume kantong keteter</p> <p>Jam 14:55 (100cc)</p> <p>Jam 20:14 (400 cc)</p> <p>Pemberian tindakan keperawatan bladder Training pada klien</p> <p>Hasil : perawat mengikat selang keteter klien</p>	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> - klien mengatakan belum merasakan sensasi ingin berkemih. - Dilakukan tindakan bladder training kembali <p>O : Nampak terpasang Kateter</p> <p>Warna urine : kuning keruh</p> <p>Jumlah urin (150 cc)</p> <p>A : Gangguan Eliminasi Urin belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin - Memonitoring eliminasi urin

<p>kateter</p> <p>c. klien mengatakan demam selama tiga hari dan tidak bisa BAK sejak jatuh dari tangga</p> <p>d. keluarga klien mengatakan klien hanya di lap basah 1 kali sejak masuk rumah sakit pada tgl 28-2-2021</p> <p>Data Objektif :</p> <p>a. Terpasang selang keteter keteter</p> <p>b. Jumlah urin</p>		<p>15:04 WITA</p> <p>15: 06 WITA</p>	<p>selama 2 jam</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih <p>Hasil : pasien dan keluarga pasien diberikan penjelasan gejala infeksi saluran kemih.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajarkan minum yang cukup, <i>jika tidak ada kontraindikasi</i> <p>Hasil : Pasien dan keluarga pasien dianjurkan minum yang cukup yaitu 2 liter per hari atau 8 gelas per hari</p>	<p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Catat waktu-waktu dan haluaran berkemih <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih - Mengajarkan minum yang cukup, <i>jika tidak ada kontraindikasi.</i>
--	--	---	---	--

	<p>pada kantong urin 100cc pada jam 14:55, 400cc pada jam 20.14.</p> <p>c. Warna urine : kuning keruh</p> <p>d. TTV TD : 110/60 mmHg N : 76x/i S : 36,5°C P : 20x/i</p>			
2.	<p>Defisit Perawatan Diri berhubungan dengan kelemahan ditandai dengan Data Subjektif :</p> <p>a. Keluarga klien mengatakan klien hanya di lap basah 1 kali</p>	<p>Rabu, 03 Maret 2021</p> <p>17:15 WITA</p> <p>17:16 WITA</p>	<p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia <p>Hasil : Klien mengatakan hanya 1 kali melakukan perawatan diri selama di RS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitoring tingkat kemandirian <p>Hasil : Klien mampu makan, dan bangun dengan mandiri</p>	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> - klien belum melakukan perawatan rambut dan kuku <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan tampak sudah bersih - Rambut tampak berminyak - Terdapat ketombe pada kulit kepala - Kuku panjang dan kotor <p>A : Defisit perawatan diri belum</p>

<p>sejak masuk rumah sakit pada tgl 28-2-2021</p> <p>b. Keluarga klien mengatakan cuci rambut 1 kali sejak masuk rumah sakit</p> <p>c. Klien merasa lemas</p> <p>Data Objektif :</p> <p>a. Badan tampak kurang bersih</p> <p>b. Rambut tampak berminyak</p> <p>c. Terdapat ketombe pada kulit kepala</p> <p>d. Kuku panjang</p>	<p>17:18 WITA</p> <p>17:19 WITA</p> <p>17:24 WITA</p>	<p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan lingkungan terapeutik (<i>mis. Suasana hangat, rileks, privasi</i>) <p>Hasil : Klien merasa nyaman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri <p>Hasil : Klien dibantu persiapan perawatan diri</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan <p>Hasil : Klien dan keluarga klien mengatakan mengerti dengan penjelasan yang diberikan.</p>	<p>teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia - Memonitoring tingkat kemandirian <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan lingkungan terapeutik (<i>mis. Suasana hangat, rileks, privasi</i>) - Memfasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan.
---	---	--	---

	<p>dan kotor</p> <p>e. Gigi tampak kuning</p> <p>f. Penampilan lidah kotor</p> <p>g. Integritas Kulit kering bersisik</p> <p>h. Bibir kering</p>			
--	--	--	--	--




EVALUASI KEPERAWATAN

No	No Diagnosa	Hari/Tgl/Jam	Evaluasi (SOAP)	Nama Jelas
1.	<p>Gangguan Eliminasi Urin berhubungan dengan penurunan fungsi ginjal ditandai dengan</p> <p>Data Subjektif :</p> <p>a. Klien mengatakan susah buang air kecil</p> <p>b. Klien mengatakn sulit untuk BAK dan pasien terpasang kateter</p> <p>c. klien mengatakan demam selama tiga hari dan tidak bisa BAK sejak jatuh dari tangga</p> <p>d. keluarga klien mengatakan klien hanya di lap basah 1 kali sejak masuk rumah sakit pada tgl 28-2-2021</p> <p>Data Objektif :</p> <p>a. Terpasang selang keteter keteter</p>	<p>Rabu, 03 Maret 2021</p> <p>15:10 WITA</p> <p>17:00 WITA</p> <p>19:00 WITA</p>	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> - klien mengatakan belum merasakan sensasi ingin berkemih. - Dilakukan tindakan bladder training kembali <p>O : Nampak terpasang Kateter</p> <p>Warna urine : kuning keruh</p> <p>Jumlah urin (150 cc)</p> <p>A : Gangguan Eliminasi Urin belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin - Memonitoring eliminasi urin <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Catat waktu-waktu dan haluaran berkemih <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajarkanjarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih 	Sudarmi

	<p>b. Jumlah urin pada kantong urin 100cc pada jam 14:55, 400cc pada jam 20.14.</p> <p>c. Warna urine : kuning keruh</p> <p>d. TTV</p> <p>TD : 110/60 mmHg</p> <p>N : 76x/i</p> <p>S : 36,5°C</p> <p>P : 20x/i</p>		<p>- Mengajarkan minum yang cukup, <i>jika tidak ada kontraindikasi.</i></p>	
2.	<p>Defisit Perawatan Diri berhubungan dengan kelemahan ditandai dengan</p> <p>Data Subjektif :</p> <p>a. Keluarga klien mengatakan klien hanya di lap basah 1 kali sejak masuk rumah sakit pada tgl 28-2-2021</p> <p>b. Keluarga klien mengatakan cuci rambut 1 kali sejak masuk rumah sakit</p>	<p>Rabu, 03 Maret 2021</p> <p>17:30</p>	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> - klien belum melakukan perawatan rambut dan kuku <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan tampak sudah bersih - Rambut tampak berminyak - Terdapat ketombe pada kulit kepala - Kuku panjang dan kotor <p>A : Defisit perawatan diri belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <p>Observasi</p>	

<p>c. Klien merasa lemas</p> <p>Data Objektif :</p> <p>a. Badan tampak kurang bersih</p> <p>b. Rambut tampak berminyak</p> <p>c. Terdapat ketombe pada kulit kepala</p> <p>d. Kuku panjang dan kotor</p> <p>e. Gigi tampak kuning</p> <p>f. Penampilan lidah kotor</p> <p>g. Integritas Kulit kering bersisik</p> <p>h. Bibir kering</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia - Memonitoring tingkat kemandirian <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan lingkungan terapeutik (<i>mis. Suasana hangat, rileks, privasi</i>) - Memfasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan. 	
--	--	---	--



IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEPERAWATAN

Nama Pasien : Tn. R
Umur : 21 Tahun

No. RM : 390757
Diagnosa Medis : CKD

No	Diagnosis Keperawatan	Hari/Tanggal/Jam	Implementasi	Evaluasi
1.	<p>Gangguan Eliminasi Urin berhubungan dengan penurunan fungsi ginjal ditandai dengan</p> <p>Data Subjektif :</p> <p>a. Klien mengatakan susah buang air kecil</p> <p>b. Klien mengatakn sulit untuk BAK dan pasien terpasang kateter</p> <p>c. klien mengatakan demam selama tiga hari dan tidak bisa BAK sejak jatuh dari tangga</p> <p>d. keluarga klien mengatakan klien hanya di lap basah 1 kali sejak masuk rumah sakit pada tgl 28-2-2021</p>	<p>Kamis , 04 Maret 2021</p> <p>14:15 WITA</p> <p>14:16 WITA</p> <p>14:15 WITA 18:02 WITA</p> <p>14.20 WITA</p> <p>14:23 WITA</p>	<p>Menejemen Eliminasi Urine</p> <p>Observasi</p> <p>- Mengidentifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin</p> <p>Hasil : klien mengatakan belum merasakan sensasi ingin berkemih</p> <p>- Memonitoring eliminasi urin</p> <p>Hasil : Warna urine : kuning cerah</p> <p>Terapeutik</p> <p>- Catat waktu-waktu dan haluaran berkemih</p> <p>Hasil : volume kantong keteter</p> <p>Jam 14:15 (100cc)</p> <p>Jam 18:02 (400cc)</p> <p>Pemberian tindakan keperawatan bladder Training pada klien</p> <p>Hasil : perawat mengikat selang keteter klien selama 2 jam</p>	<p>S :</p> <p>- klien mengatakan sudah merasakan adanya sensasi berkemih pada jam 20:25 WITA</p> <p>O : klien sudah BAK sebanyak 5 kali selama keteter dilepas</p> <p>A : Gangguan eliminasi urin teratasi</p> <p>P : pertahankan intervensi</p> <p>Observasi</p> <p>- Identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin</p> <p>- Monitor eliminasi urin (mis. Frekuensi,</p>

	<p>Data Objektif :</p> <p>a. Terpasang selang keteter keteter</p> <p>b. Jumlah urin pada kantong urin 100cc pada jam 14:55, 400cc pada jam 20.14.</p> <p>c. Warna urine : kuning keruh</p> <p>d. TTV</p> <p>TD : 110/60 mmHg</p> <p>N : 76x/i</p> <p>S : 36,5°C</p> <p>P : 20x/i</p>	<p>14:26 WITA</p> <p>14:28 WITA</p>	<p>Edukasi</p> <p>- Mengajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih</p> <p>Hasil : Pasien dan keluarga pasien mengerti tanda dan gejala infeksi saluran kemih.</p> <p>- Mengajarkan minum yang cukup, <i>jika tidak ada kontraindikasi</i></p> <p>Hasil : pasien dan keluarga pasien paham dengan anjuran minum yang cukup</p>	<p><i>konsistensi, aroma, volume, dan warna)</i></p> <p>Terapeutik</p> <p>- Catat waktu-waktu dan haluan berkemih</p> <p>Edukasi</p> <p>- Ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih</p> <p>- Ajarkan minum yang cukup, <i>jika tidak ada kontraindikasi</i></p>
2.	<p>Defisit Perawatan Diri berhubungan dengan kelemahan ditandai dengan</p> <p>Data Subjektif :</p> <p>a. Keluarga klien mengatakan klien hanya di lap basah 1 kali sejak masuk rumah sakit pada tgl 28-2-2021</p> <p>b. Keluarga klien mengatakan</p>	<p>Kamis, 04 Maret 2021</p> <p>14:35 WITA</p> <p>14:36 WITA</p>	<p>Dukungan Perawatan Diri</p> <p>Observasi</p> <p>- Mengidentifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia</p> <p>Hasil : klien mengatakan sudah melakukan perawatan diri lap badan</p> <p>- Memonitoring tingkat kemandirian</p> <p>Hasil : Klien mampu bangun dan makan secara mandiri</p>	<p>S :</p> <p>- klien belum melakukan perawatan rambut dan kuku</p> <p>O :</p> <p>- kuku panjang</p> <p>- Rambut tampak berminyak</p> <p>- Terdapat ketombe pada</p>

<p>cuci rambut 1 kali sejak masuk rumah sakit</p> <p>c. Klien merasa lemas</p> <p>Data Objektif :</p> <p>a. Badan tampak kurang bersih</p> <p>b. Rambut tampak berminyak</p> <p>c. Terdapat ketombe pada kulit kepala</p> <p>d. Kuku panjang dan kotor</p> <p>e. Gigi tampak kuning</p> <p>f. Penampilan lidah kotor</p> <p>g. Integritas Kulit kering bersisik</p> <p>Bibir kering</p>	<p>14:37 WITA</p> <p>14:39 WITA</p> <p>14:40 WITA</p>	<p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan lingkungan terapeutik (<i>mis. Suasana hangat, rileks, privasi</i>) <p>Hasil : klien merasa nyaman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri <p>Hasil : klien mampu melakukan perawatan diri secara mandiri</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan <p>Hasil : klien dan keluarga klien mengatakan mengerti dengan penjelasan yang diberikan.</p>	<p>kulit kepala</p> <p>A : Defisit perawatan diri belum teratasi</p> <p>P : Intervensi di hentikan, pasien pulang</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia - Memonitoring tingkat kemandirian <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan lingkungan terapeutik (<i>mis. Suasana hangat, rileks, privasi</i>) - Memfasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan
---	---	---	---


				<p>diri</p> <p>Edukasi</p> <p>- Menganjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan.</p>
--	--	--	--	---

EVALUASI KEPERAWATAN

No	No Diagnosa	Hari/Tgl/Jam	Evaluasi (SOAP)	Nama Jelas
1.	<p>Gangguan Eliminasi Urin berhubungan dengan penurunan fungsi ginjal ditandai dengan</p> <p>Data Subjektif :</p> <p>e. Klien mengatakan susah buang air kecil</p> <p>f. Klien mengatakn sulit untuk BAK dan pasien terpasang kateter</p> <p>g. klien mengatakan demam selama tiga hari dan tidak bisa BAK sejak jatuh dari tangga</p> <p>h. keluarga klien mengatakan klien hanya di lap basah 1 kali sejak masuk rumah sakit pada tgl 28-2-2021</p> <p>Data Objektif :</p> <p>e. Terpasang selang keteter keteter</p>	<p>Kamis, 04 Maret 2021</p> <p>14:30 WITA</p> <p>14:20 WITA</p> <p>16:20 WITA</p> <p>18:20 WITA</p>	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> - klien mengatakan belum merasakan sensasi ingin berkemih. - Dilakukan tindakan bladder training kembali <p>O : Nampak terpasang Kateter</p> <p>Warna urine : kuning keruh</p> <p>Jumlah urin (150 cc)</p> <p>A : Gangguan Eliminasi Urin belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin - Memonitoring eliminasi urin <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Catat waktu-waktu dan haluaran berkemih <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajarkanjarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih 	Sudarmi

	<p>f. Jumlah urin pada kantong urin 100cc pada jam 14:55, 400cc pada jam 20.14.</p> <p>g. Warna urine : kuning keruh</p> <p>h. TTV</p> <p>TD : 110/60 mmHg</p> <p>N : 76x/i</p> <p>S : 36,5°C</p> <p>P : 20x/i</p>		<p>- Mengajarkan minum yang cukup, <i>jika tidak ada kontraindikasi.</i></p>	
2.	<p>Defisit Perawatan Diri berhubungan dengan kelemahan ditandai dengan</p> <p>Data Subjektif :</p> <p>d. Keluarga klien mengatakan klien hanya di lap basah 1 kali sejak masuk rumah sakit pada tgl 28-2-2021</p> <p>e. Keluarga klien mengatakan cuci rambut 1 kali sejak masuk rumah sakit</p> <p>f. Klien merasa lemas</p>	<p>Kamis, 04 Maret 2021</p> <p>14:50 WITA</p>	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> - klien belum melakukan perawatan rambut dan kuku <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan tampak sudah bersih - Rambut tampak berminyak - Terdapat ketombe pada kulit kepala - Kuku panjang dan kotor <p>A : Defisit perawatan diri belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kebiasaan aktivitas 	

<p>Data Objektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Badan tampak kurang bersih j. Rambut tampak berminyak k. Terdapat ketombe pada kulit kepala l. Kuku panjang dan kotor m. Gigi tampak kuning n. Penampilan lidah kotor o. Integritas Kulit kering bersisik p. Bibir kering 		<p>perawatan diri sesuai usia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitoring tingkat kemandirian <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan lingkungan terapeutik (<i>mis. Suasana hangat, rileks, privasi</i>) - Memfasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan. 	
--	--	--	--





UNIVERSITAS
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisa Kasus

Klien masuk rumah sakit dengan keluhan susah buang air kecil, sebelum dibawa ke RS klien mengalami demam selama 3 hari. Keluhan susah buang air kecil pada pasien dialami sejak 3 hari sebelum dibawa ke Rumah Sakit. Klien tidak mengalami penurunan kesadaran dengan nilai GCS : 15, E4, V5, M6. Pada saat pengkajian klien tidak mengeluh nyeri di bagian abdomennya pada saat dipalpasi.

Pada kaitannya dengan praktik keperawatan, jika melihat defenisi ilmu keperawatan Henderson bahwa pemberi asuhan keperawatan langsung pada pasien merupakan tugas utama perawat. Manfaat dari asuhan keperawatan ini nampak dari kemajuan dari kondisi pasien, yang pada awalnya bergantung pada orang lain hingga akhirnya menjadi mandiri. Perawat dapat membantu pasien dalam hal ini dengan mengkaji, merencanakan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi 14 komponen penanganan perawatan dasar (Risna & Irwan, 2021).

Diagnosa utama yang diangkat pada klien adalah gangguan eliminasi urin di tandai dengan pasien mengeluh susah buang air kecil. Gangguan eliminasi urin adalah merupakan keadaan dimana seorang individu megalami atau resiko ketidak mampuan untuk berkemih (Mubarok, 2013). Gangguan eliminasi urin adalah suatu keadan dimana seorang individu mengalami gangguan dalam pola berkemih (Potter dan Perry, 2014). Volume dan kualitas urin serta kemampuan berkemih dipengaruhi banyak faktor. Beberapa kondisi bersifat akut dan reversibel (infeksi saluran kemih), sedangkan lainnya bersifat kronis dan tidak reversibel (gangguan fungsi ginjal yang progresif lambat). Faktor sosiokultural, psikologis, keseimbangan cairan, prosedur diagnostik dan operatif dapat mempengaruhi urin dan perkemihan. Gangguan

eliminasi urin banyak terdapat pada penyakit gagal jantung, gagal ginjal kronik, atau *Chronic Kidney Disease* (Vaughans, 2013).

B. Analisis Intervensi

Intervensi keperawatan yang diberikan pada diagnosis gangguan eliminasi urine yang berbasis EBN selain intervensi diatas adalah memberikan *bladder training (delay urination)*. *Bladder training* adalah latihan kandung kemih yang bertujuan untuk mengembangkan tonus otot dan otot spingter kandung kemih agar bertujuan maksimal. *Bladder training* biasanya digunakan untuk stress inkontinensia, desakan inkontinensia atau kombinasi keduanya atau yang disebut inkontinensia campuran. Pelatihan kandung kemih yang mengharuskan klien menunda berkemih, melawan atau menghambat sensasi urgensi dan berkemih sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan bukan sesuai dengan desakan untuk berkemih. Tujuan *bladder training* adalah untuk memperpanjang interval antara urinasi klien, menstabilkan kandung kemih dan menghilangkan urgensi (Fajar Dwi, 2020).

Metode *bladder training* diantaranya adalah *delay urination* dan *scheduled urination*. *Delay urination* adalah latihan menahan/menunda untuk berkemih. Pada pasien yang masih terpasang kateter, *delay urination* dilakukan dengan mengklemp atau mengikat aliran urine ke urine bag. Tindakan ini memungkinkan kandung kemih terisi urine dan otot detrusor berkontraksi sedangkan pelepasan klem memungkinkan kandung kemih untuk mengosongkan isinya. Latihan ini dilakukan 6-7 kali per hari sampai pasien dapat menunda untuk berkemih. Sedangkan *scheduled urination* adalah pembiasaan berkemih sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh perawat 6-7 kali perhari, jadwal tersebut harus diikuti dengan ketat oleh pasien, sehingga pasien berhasil belajar kembali mengenal dan mengadakan respon yang sesuai terhadap keinginan untuk berkemih (Nurhasanah dan Hamzah, 2017).

Sebelum melakukan intervensi terlebih dahulu mengobservasi keadaan klien dan keluhan-keluhan yang dapat dirasakan klien terhadap selang keteter yang terpasang pada klien, pemberian *bladder training (delay urination)* dapat dilakukan pada saat setelah mencatat haluaran urin yang terdapat pada urin bag, kemudian dilakukan pengosongan pada urin bag yang bertujuan untuk mengetahui berapa haluaran urin pada saat dilakukan *bladder training (delay urination)*. Pemberian *bladder training (delay urination)* ini tidak dapat diberikan jika ada penolakan dari klien maupun keluarga klien, untuk mengantisipasi adanya penolakan dari klien maka terlebih dahulu klien dan keluarga klien diberikan edukasi dan juga penjelasan mengenai tujuan diberikannya *bladder training (delay urination)* pada klien.

Selain pemberian *bladder training (delay urination)* tindakan farmakologi yang diberikan pada klien adalah pemberian obat furosemide yang bertujuan untuk membantu pengeluaran cairan yang ada pada tubuh klien.

Implementasi *bladder training* ini diberikan sesuai dengan standar operasional kerja yang sudah ditetapkan. Pada hari pertama implementasi *bladder training* diberikan sebanyak 3 siklus dengan waktu 2 jam setiap siklus. Pemberian pertama pada jam 15:00 di evaluasi pada jam 16:00 kemudian klem dilepaskan pada jam 17:00, pemberian kedua pada jam 18:00 di evaluasi pada jam 19:00 kemudian klem dilepaskan pada jam 20:00, dan pemberian ketiga pada jam 20:00 di evaluasi pada jam 21:00 kemudian dilepaskan pada jam 22:00. Setiap kali pemberian *bladder training (delay urination)* klien disarankan untuk minum 200 cc-250 cc yang bertujuan agar kandung kemih terisi.

Pada hari kedua pemberian implementasi *bladder training (delay urination)* diberikan sama dengan pemberian implementasi pertama, namun yang membedakan adalah jam pemberian. Pemberian *bladder training* pada hari pertama diberikn di

jam 14:20, 16:00, dan 18:20. Pada saat pemberian *bladder training (delay urination)* di hari kedua klien sudah bisa merasakan sensasi berkemih setelah 3 kali pemberian *bladder training (delay urination)*. Tindakan selanjutnya yang diberikan pada klien adalah *aff* keteter. Pada saat keteter telah dibuka klien mengatakan sudah 5 kali buang air kecil.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dwi Febrianto (2015) yaitu *Bladder Training* efektif untuk merangsang sensasi berkemih. Hal ini dikarenakan *Bladder Training* akan menstimulus kandung kemih yang menyebabkan kandung kemih dapat meningkatkan kontrol pada dorongan/rangsangan berkemih.

Sejalan dengan Purnomo (2016) mengatakan bahwa hasil penelitian secara umum di temukan bahwa intervensi *Bledder Training* terbukti secara signifikan mampu mengatasi masalah inkontinensia urine pasca kateterisasi urine, baik dengan metode *scheduled urination* maupun *delay urination* yang di lakukan setiap hari sebanyak 6-7 kali latihan dalam sehari sebelum pelepasan kateter urine. Dalam menerapkan intervensi *bladder training* terlebih dahulu pasien di berikan pemahaman mengenai inkontinensia dan metode *bladder training*, untuk meningkatkan keberhasilan pnaaganan masaalah inkontinensia urine, di butuhkan kerjasama antara perawat dan pasien pemasangan kateter menyebabkan kandung kemih tidak dapa merasakan adanya sensasi berkemih dan sfingter tidak dapat menutup dengan baik, tonus otot dan sfingter menjadi melemah kemudian menyebabkan terjadinya inkontinensia.

C. Alternatif Pemecahan Masalah

Pada perencanaan, mencakup aktivitas penyusunan rencana kebutuhan yang disesuaikan pada kebutuhan individu, termasuk rencana perbaikan apabila

didapatkan ada perubahan, serta dokumentasi bagaimana upaya perawat dalam membantu individu di saat kondisi sehat atau sakit (Risna & Irwan, 2021).

Intervensi yang diberikan pada diagnosa gangguan eliminasi urin adalah edukasi kepada pasien dan juga keluarga pasien tentang minum yang cukup sesuai dengan standar intervensi keperawatan indonesia (SIKI, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian Nurul (2015) bahwa langkah untuk menangani pasien dengan gangguan berkemih adalah dengan memberikan posisi nyaman untuk mengurangi rasa sakit, meraba perut, mengobservasi adanya distensi kandung kemih, serta mengajarkan dan mengedukasi nyeri, beri intake minum sesuai atvis yang telah ditentukan untuk mengetahui intake *output* cairan serta perubahan urine pada klien.

Hal ini sejalan juga dengan penelitian Elti (2019) bahwa asupan air dan natrium diatur untuk mempertahankan volume cairan ekstra seluler pada kadar normal. Asupan air 1-2 liter per hari biasanya dianjurkan untuk mempertahankan keseimbangan cairan. Natrium dibatasi hingga 2g per hari pada awalnya. Batasan air dan natrium yang lebih ketat dapat dibutuhkan pada saat gagal ginjal memburuk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemberian asuhan keperawatan pada “Tn. R” dengan diagnosa Cronic Kidney Disease (CKD) dapat disimpulkan yaitu :

1. Hasil pengkajian ditemukan keluhan utama adalah tidak bisa buang air kecil
2. Diagnosa keperawatan yang muncul berjumlah 2 yaitu gangguan eliminasi urine dan defisit perawatan diri.
3. Intervensi dan implementasi yang diberikan pada klien dengan Cronic Kidney Disease (CKD) yaitu manajemen eliminasi urine dan dukungan perawatan diri.
4. Proses evaluasi keperawatan pada klien dengan Cronic Kidney Disease (CKD) yaitu gangguan eliminasi urin sudah teratasi dan defisit perawatan diri belum teratasi (perawatan rambut dan kuku belum teratasi).

B. Saran

Hasil studi kasus ini dapat dijadikan acuan dalam penerapan manajemen keperawatan yang harus diimplementasikan secara komprehensif sesuai dengan disiplin ilmu keperawatan




DAFTAR PUSTAKA

- Akmarawita, Kadir. 2016. Hubungan Patofisiologi Hipertensi dan Hipertensi tebal. *Jurnal Ilmiah Kedokteran*. Vol.5, No.1
- Arianti, et all. 2020. Karakteristik Faktor Resiko Pasien Chronic Kidney Disiase (CKD) yang Menjalani Hemodialisa Di RS. X Madiun. *Biomedika* Volume 12. No.1
- Brunner & Suddarth.(2014). *Textbook of Medical-Surgical Nursing*. Edisi ke-13.America : Woltes Kluwer Health.
- DR. Risna & Irwan, M. 2021. *Filsafah Dan Teori Keperawatan Dalam Integritas Keilmuan*. Samata, Kabupaten Gowa: Alauddin University Press
- Dwi Febrianto, 2015. *Gambaran Sensasi Berkemih Pasien Post Operasional Transuretral Resection The Prostate (TURP) Yang Diberikan Tindakan Bladder Training Di RSUD Tugurejo Semarang. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidana (JIKK)*
- Fajar Dwi, et.al. 2020. *Pengaruh Bladder Training Terhadap Penurunan Inkontinensia Urine Pada Paien Post Operasi BPH*. *Jurnal of Nersing and Healt (JNH)*. Vol. 5. No. 2. Hal 100-107.
- Fatimah Mia, E, 2016. *Kajian Al-Quran dan Hadist Tentang Kesehatan Jasmani dan Ruhani*. *Tajwid*. vol. XV, No.1
- Fatimah, Endah Nur. 2015. *Strategi Pintar Menyusun SOP (Standard Oprating Procedur)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Fitrianasari, et al. 2017. Pengaruh Dukungan Keluarga terhadap Tingkat Depresi Pasien Chronic Kidney Disease. *e-Jurnal Kesehatan* Vol.5 (1)
- Harmilah dkk. 2017. *Buku Panduan Mata Ajar Medikal Bedah 1*. Yogyakarta: Poltekkes Jogja Press.
- Haryono. 2013. *Keperawatan medical bedah: system perkemihan*. Yogyakarta: Rapha Publishing
- Hidayat, A. Aziz Alimul. 2008. *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika

- Listyanti, Agita Sukma, (2013), Penderita Gagal Ginjal Makin Didominasi Kaum Muda, <http://www.tempo.co.id>, di unduh pada tanggal 12 Juli 2021.
- Mubarok, dkk, 2013. *Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta: EGC
- Nurarif & Kusuma, (2015). Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Dan NANDA NIC-NOC Jilid 2 Medaction
- Nurhasanah, T., & Hamzah, A. (2017). Bladder Training Berpengaruh Terhadap Penurunan Kejadian Inkontinensia Urine Pada Pasien Post Operasi Bph Di Ruang Rawat Inap Rsud Soreang. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan*, 5(1), 79-91.
- Nurlianty, Aspiati. 2019. *Efektifitas Bladder Training Terhadap Kemampuan Mengontrol Eliminasi Urine Pada Pasien Post Operasi Section Caesare Di RS Advent Medan. jurnal Kesehatan Surya Nusantara.*
- Nursalam. 2014, *Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Jakarta: Salemba Medika.
- Pamungkas Reza, M. dkk. *Pengaruh Latihan Kandung Kemih (Bladder Training) Terhadap Interval Berkemih Wanita Lanjut Usia (Lansia) Dengan Inkontinensia Urin*
- Pardede, J, A, et.al. 2021. *The Ability To Interac With Schizophrenic Patients Through Socialization Grup Activity Therapy. Internasional Jurnal of Health Science and Medical Research*, 1(1), 06-10 <http://ijhsmr.com/index.php/ijhsmr/article/view/6>
- Perry & Potter. 2010. *Fundamental Keperawatan, Edisi 7 Buku 3*. Singapore: Elsevier
- Perry & Potter. 2010. *Fundamental Keperawatan, Edisi 7 Buku 3*. Singapore: Elsevier
- Purnomo. (2016). *Efektivitas delay urination dengan keagle exercise terhadap respon 19 berkemih pasca kateterisasi urine di rsud ambarawa*. 1-11, di akses dari (ejournal.stikestelogorejo.ac.id) di unduh pada tanggal 12 Juli 2021.
- Riskesdas, 2018. Hasil Utama Riskesdas 2018. Kementrian Kesehatan RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Rohayati Eti. 2019. *Keperawatan Dasar 1*. Jawa Barat : LovRinz Publishing

- Rustandi, Handi, et al. 2018. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Chronic Kidney Disease Yang Menjalani Hemodialisa. *Jurnal Keperawatan Silampari* (1).2.
- Setiati, (2015). *Buku Ajar ILMU PENYAKIT DALAM JILID II*. Jakarta 47
- Shabrani, L.A, et.al. 2015. *Efektifitas Bladder Training Sejak Dini Dan Sebelum Pelepasan Keteter Urin Terhadap Terjadinya Inkontinensia Urin Pada Pasien Paska Operasi Di SMC RS Telogorejo Semarang. Urology. Jurnal Ilmu Keperawatan*, 2 (suppl3), 144-151.
- Smeltzer, S. 2014. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner dan Suddarth. Volume 2 Edisi 8*. Jakarta : EGC.
- Sudoyo. 2015. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta : Balai Penerbit FKUI.
- Syaifuddin. 2013. *Anatomi Tubuh Manusia*. Jakarta. Salemba Medika
- Tarwoto, Wartoh. 2015. *Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan Edisi 5*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Medika
- Taylor, C.R., Lilis, C., Lemone, P., Lynn, P., 2011. *Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care, 7th ed*. Wolters Kluwer, China
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. 2017. *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) Edisi 1 Cetakan 3(Revisi)* . Jakarta : Dewan Pengurus Pusat PPNI
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. 2018. *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat PPNI
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. 2019. *Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat PPNI
- Vaughans, B. W. 2013. *Keperawatan Dasar* (Th. Arie Prabawati, Penerjemah). Yogyakarta: Rapha Publishing
- World Health Organization. *World Health Statistic*. 2018. Monitoring Health For The SDGs. Sustainable Development Goals <https://www.who.int/docs/default-source/gho-documents/world-health-statistic-report/6-june-18108-worl-health-statistics-2018.pdf>



KTI SUDARMI FIX

ORIGINALITY REPORT

24% SIMILARITY INDEX	24% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	6% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	renalyulisetiawan.blogspot.com Internet Source	4%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
3	www.slideshare.net Internet Source	2%
4	repository.poltekkes-kaltim.ac.id Internet Source	2%
5	ejurnal.poltekkesjakarta3.ac.id Internet Source	2%
6	samoke2012.wordpress.com Internet Source	2%
7	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet Source	1%
8	chaerunnisatia.blogspot.com Internet Source	1%
9	zakiabakri.blogspot.com Internet Source	1%

10	es.scribd.com Internet Source	1 %
11	bidanfriskasari.wordpress.com Internet Source	1 %
12	tajdid.uinjambi.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
14	ejournal.stikestelogorejo.ac.id Internet Source	1 %
15	perpus.fikumj.ac.id Internet Source	1 %
16	vdocuments.site Internet Source	1 %
17	journal.uwks.ac.id Internet Source	1 %
18	repository.stikespantiwaluya.ac.id Internet Source	1 %
19	dwidollymp.wordpress.com Internet Source	1 %
20	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
21	repo.stikesperintis.ac.id Internet Source	1 %

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sudarmi, lahir di Soppeng pada tanggal 22 September 1996. Merupakan anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan suami istri bapak Siajeng dengan Ibu Yumming. Mulai menempuh pendidikan formal pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SD 194 Bontompare pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTs DDI Pattojo dan tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan kembali pendidikan menengah atas di MA DDI Pattojo dan lulus pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UI Alauddin Makassar pada tahun 2015 melalui jalur SNMPTN, pada tahun 2019 penulis menyelesaikan studi strata 1 (S1) Keperawatan dan tahun 2020 penulis melanjutkan studi dan terdaftar sebagai mahasiswa program Profesi Ners angkatan XVI dan selesai pada tahun 2021.