

**INTERVENSI TERAPI ZIKIR PADA PASIEN DENGAN
MASALAH HALUSINASI PENDENGARAN
: STUDI KASUS**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

TUGAS AKHIR NERS

Oleh

WA ODE YULIANTI TOGALA, S.Kep.

NIM: 70900120020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

**INTERVENSI TERAPI ZIKIR PADA PASIEN DENGAN
MASALAH HALUSINASI PENDENGARAN
: STUDI KASUS**



TUGAS AKHIR NERS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh

WA ODE YULIANTI TOGALA, S.Kep.
NIM: 70900120020

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wa Ode Yulianti Togala, S.Kep
NIM : 70900120020
Tempat/Tgl Lahir : Lindo, 31 Juli 1998
Jurusan/Prodi : Program Studi Pendidikan Ners
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Bumi Tamarunang Indah, Gowa
Judul : Intervensi Terapi Zikir Pada Pasien Dengan Masalah Halusinasi Pendengaran : Studi Kasus

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 12 Juli 2021

Penyusun


Wa Ode Yulianti Togala, S.Kep
70900120020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Wa Ode Yulianti Togala, S.Kep NIM: 70900120020, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul **“Intervensi Terapi Zikir Pada Pasien Dengan Masalah Halusinasi Pendengaran : Studi Kasus”**, memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 12 Juli 2021



Ns. Hj. Syisnawati S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.J
Pembimbing 1



Ns. Rasmawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.J
Pembimbing 2

ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS


Tugas Akhir Ners yang berjudul “Intervensi Terapi Zikir Pada Pasien Dengan Masalah Halusinasi Pendengaran: Studi Kasus” yang disusun oleh **Wa Ode Yulianti Togala, S.Kep NIM: 70900120020**, Mahasiswa Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis dan tanggal 15 Juli 2021 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam Program Studi Profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 15 Juli 2021
05 Dzulhijjah 1442 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patimah, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Ani Auli Ilmi, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.,Kep.Kom	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Hj. Sysnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J	(.....)
Pembimbing II	: Rasmawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J	(.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP.198007012006042002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah limpahan karunia, rahmat, dan ridha-Nya kita masih diizinkan untuk dapat menghela nafas sampai detik ini. Salam dan salawat tak pernah kita luput untuk selalu dikirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai manusia pilihan Allah untuk membawakan risalah-Nya dan memberikan peringatan kepada manusia melalui Al-Qur'an dan Sunah. Kita tidak lupa pula kirimkan salam dan salawat kepada keluarga dan sahabat Rasulullah dan kita selalu bermunajat kepada Allah agar kita semua sebagai umat Islam selalu diberikan hidayah, keistiqomahan di atas Al-Qur'an dan Sunah.

Alhamdulillah, dengan penuh rasa kesyukuran penulis ucapkan terimakasih, sebab dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul “Intervensi Terapi Zikir Pada Pasien Dengan Masalah Halusinasi Pendengaran : Studi Kasus”. Penulis sadar bahwa masih banyak keterbatasan penulis dari segi pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun tulisan ini. Penulis mempersembahkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT, sebab atas kekuatan yang telah diberikan-Nya, maka penulis dapat menggoreskan tinta dalam karya tulis ini. Tentunya, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, yakni Tasmin Togala dan Wa Ode Sapaeno yang selalu memberi dukungan, doa-doa yang tak pernah terhenti untuk dipanjatkan kepada Allah SWT.

Penulis tidak lupa untuk memberikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhanis, MA,Ph.D, selaku rektor UIN Alauddin Makassar, beserta seluruh jajarannya yang tercinta.
2. Ibu Dr. Dr. Syatirah Jalaludin, M.Kes., Sp., A, selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, para wakil dekan fakultas, staf akademik dan seluruh jajarannya.

3. Ibu Dr.Patimah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Ketua Prodi Profesi Ners UIN Alauddin Makassar dan jajarannya yang selalu mensupport dan *care* terhadap mahasiswanya
4. Ibunda Hj. Syisnawati S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J, selaku sekretaris Program Studi Profesi Ners UIN Alauddin Makassar dan sekaligus menjadi Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan sabar dan tulus, motivasi, arahan dan saran tak pernah luput diberikan.
5. Ibunda Rasmawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J, selaku Pembimbing II yang telah mendedikasikan waktunya dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibunda Ani Auli Ilmi, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom selaku Penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan selama berjalannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
7. Ayahanda Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag selaku Penguji II yang telah memberikan banyak masukan dan arahnya demi kebaikan penulis, agar menjadi salah satu karya yang bermanfaat bagi orang lain di kemudian hari.
8. Ibunda Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes sebagai Pembimbing Akademik selama delapan semester di S1 Keperawatan dan Ayahanda Ardian Adhiwijaya, S.Kep., Ns., M.Kep sebagai pembimbing akademik Profesi Ners penulis, yang selalu memberikan banyak dorongan dan motivasi untuk selalu berkarya serta membantu selama proses perkuliahan.
9. Seluruh tim dosen Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar, yang telah bersedia untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sabar dan tulus dalam rangka penyelesaian karya tulis ini.
10. Nenekku Wa Mori dan Saudara-saudaraku Wa Ode Emi Nur Fatmawati Togala, Wa Ode Nurni Asriah Togala, Wa Ode Siti Nurwati Togala, Wa Ode Indriani Togala, Wa Ode Erniati Togala, Wa Ode Reski Togala, Dan LM. Hidayatullah Togala, yang selalu memberikan motivasi yang tak terhingga serta telah menjadi washilah dari Allah SWT dalam membiayai selama bangku perkuliahan.

11. Ayahanda La Ode Saba dan Ibu serta Sahirin Saba yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil selama kuliah sampai sekarang.
12. Keluarga Besar PON-PES Al-Ikhlas Raha yang selalu memberikan dukungan berupa material, saran dan doa selama diperantauan.
13. Teman-teman satu angkatan di Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar Tahun 2016 (EP16LOTIS) atas kebersamaannya selama ini dalam menempuh bangku perkuliahan.
14. Seluruh pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi dan pelajaran hidup bagi penulis selama menjalani pendidikan di tanah perantauan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik hati, lisan maupun tindakan. Penulis menyadari bahwa untuk menyempurnakan karya tulis ini tidaklah mudah dikarenakan masih banyak kekurangan di dalamnya. Akhirnya, penulis berharap apa yang telah disajikan dalam karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan kesehatan. Semoga semua apa yang telah penulis usahakan diberkahi dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Terima kasih. *Jazaakumullahu khairon.*

Gowa, 12 Juli 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSARA



Wa Ode Yulianti Togala

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Tugas Akhir Ners	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tugas Akhir Ners.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	vii
Abstrak.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat Penulisan	4
BAB II TINJAUAN TEORI.....	6
A. Konsep Teori Halusinasi	6
B. Konsep Keperawatan.....	17
C. Pendekatan Teori Keperawatan Yang Digunakan.....	22
D. Evidence Based Nursing (EBN)	23
BAB III ASUHAN KEPERAWATAN	26
A. Pengkajian	26
B. Diagnosis Keperawatan	36
C. Intervensi Keperawatan	37
D. Implementasi Dan Evaluasi.....	40
BAB IV PEMBAHASAN	44
A. Analisis Kasus	44
B. Analisis Intervensi	47
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
KEPUSTAKAAN.....	54

ABSTRAK

Nama : Wa Ode Yulianti Togala
NIM : 70900120020
Judul : **Intervensi Terapi Zikir Pada Pasien Dengan Masalah Halusinasi Pendengaran: Studi Kasus**

Latar Belakang: halusinasi merupakan gejala terbanyak pada skizofrenia. Apabila tidak segera diatasi maka akan mengancam jiwa dan orang lain. Salah satu intervensi untuk mengatasi halusinasi adalah terapi zikir. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan terapi zikir pada pasien dengan masalah halusinasi pendengaran. **Metode:** penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang dilakukan pada pasien dengan masalah halusinasi pendengaran di ruangan sawit RSKD dadi Sulawesi selatan. **Hasil:** Pada hari kelima perawatan diperoleh hasil evaluasi suara-suara yang didengar oleh pasien sudah berkurang, intensitas halusinasi sudah berkurang, efek halusinasi berkurang dan perasaan sedih berkurang. Pasien mampu mengontrol halusinasinya dan pasien sudah mampu berzikir. **Kesimpulan:** intervensi terapi zikir efektif untuk mengatasi masalah halusinasi pendengaran.

Kata Kunci: S

Terapi zikir, skizofrenia, halusinasi pendengaran.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut undang – undang No. 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, menjelaskan bahwa kesehatan jiwa merupakan suatu keadaan dimana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial. Sehingga klien menyadari kemampuannya, dapat mengatasi masalahnya, bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi pada komunitasnya. Orang dengan gangguan mental merupakan orang yang mengalami gangguan pikiran, koping dan perasaan yang mempengaruhi perubahan perilaku (Ruswadi , 2021).

World Health Organization (WHO) mendiskripsikan kesehatan mental merupakan suatu keadaan sejahtera dimana seseorang memahami keadaanya sendiri, bisa mengatasi tekanan hidup secara adaptif, bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi pada komunitasnya. Menurut data WHO (2016) setiap tahunnya kasus gangguan jiwa meningkat. Terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia.

Skizofrenia merupakan salah satu gangguan jiwa. Dimana skizofrenia adalah gangguan mental kronis dan parah yang mempengaruhi 20 juta orang di seluruh dunia. Skizofrenia ditandai dengan distorsi dalam berpikir, persepsi, emosi, bahasa, rasa diri dan perilaku. Skizofrenia dapat bergejala positif dan negative. Gejala positif mengacu pada ide, persepsi, atau tindakan yang sangat dlebih-lebihkan yang menunjukkan bahwa orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Sedangkan gejala negatif mengacu pada tidak adanya atau kurangnya fungsi mental normal yang melibatkan pemikiran, perilaku, dan persepsi. Gejala-gejala tersebut merupakan ciri dari penderita skizofrenia.

Skizofrenia dapat menyebabkan delusi, perilaku yang tidak sesuai, berbicara tidak teratur, gangguan emosi dan halusinasi. Prevalensi

gangguan skizofrenia di Indonesia menurut Riskesdas (2018) sebanyak 7.0 %, prevalensi gangguan mental emosional sebanyak 9,8 % pada penduduk > 15 tahun, prevalensi rumah tangga yang memiliki anggota keluarga yang menderita skizofrenia/psikosis yaitu sebesar 7/1000 dengan cakupan pengobatan 84,9%. Angka ini hampir merata pada seluruh provinsi di Indonesia prevalensi gangguan jiwa berat (skizofrenia) di Indonesia dan di Sulawesi Selatan penderita skizofrenia sebanyak 8.8%.

Salah satu skizofrenia adalah halusinasi (mendengar suara atau melihat hal-hal yang tidak ada). Halusinasi adalah pengalaman indrawi yang terjadi tanpa adanya yang sebenarnya stimulus eksternal (Wuryaningsih, Windarwati, Dewi, Deviantony, & Hadi, 2020). Data kunjungan rawat inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta pada bulan Januari-April 2013 didapat 785 orang. Pasien dengan halusinasi menempati urutan pertama dengan angka kejadian 44% atau berjumlah 345 orang. (Sulayuningsih, 2016).

Dari hasil wawancara dengan perawat yang dilakukan oleh penulis selama seminggu praktek di RSKD Dadi Sulawesi Selatan ditemukan sekitar 200 orang yang mengalami halusinasi sedangkan di ruangan tempat penulis praktek ditemukan paling banyak yang mengalami gangguan persepsi sensori berupa halusinasi pendengaran sebanyak 20 orang. Fenomena di ruangan didapatkan bahwa isi halusinasi berupa arahan atau perintah untuk mencari sumber suara, memukul teman, menghancurkan barang-barang dalam rumah dan disuruh sholat wajib padahal bukan waktunya. Hal tersebut sudah sering terjadi pada pasien halusinasi.

Halusinasi ini memiliki tahapan-tahapan dari yang menyenangkan sampai dengan mengancam jiwa. Apabila kondisi klien dibiarkan terus menerus maka akan menjadi sangat berbahaya yang bisa mengancam jiwa orang lain dan diri sendiri. Intervensi yang umum dilakukan adalah intervensi secara generalis (menghardik, pendidikan kesehatan mengenai penggunaan obat secara teratur, bercakap-cakap dan melakukan aktivitas fisik). Intervensi lain yang bisa digunakan adalah terapi zikir. Berzikir

merupakan suatu tindakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, menghilangkan stres serta menenangkan hati klien. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar-Rad/13:28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ



Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (QS Ar-Rad : 28)

Orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dan menganggap kebenaran adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang ketika berzikir mengingat Allah dengan membaca al-Qur'an dan sebagainya, hati manjadi menjadi tenang. Hati memang tidak akan dapat tenang tanpa mengingat dan merenungkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah, dengan selalu mengharap keridaan-Nya (Shihab, 2013).

Berdasarkan masalah tersebut maka penulis menerapkan intervensi berdasarkan *Evidence Based Nursing* (EBN) yang telah diterapkan di ruangan sawit adalah intervensi terapi zikir pada pasien dengan masalah halusinasi pendengaran.

B. Rumusan Masalah

Meningkatnya prevalensi pasien yang mengalami gangguan skizofrenia khususnya halusinasi diikuti peningkatan kasus dari tahun ke tahun, menjadi perhatian penting yang membutuhkan penanganan segera dan tepat dalam rangka menurunkan angka morbiditas dan mortalitas kasus. Oleh karena itu, studi kasus mengenai intervensi terapi zikir dapat menjadi solusi berdasarkan *evidenced based nursing* bagi pasien yang mengalami halusinasi. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan pertanyaan penelitian “Bagaimanakah pengaruh intervensi terapi zikir dengan masalah halusinasi pendengaran ?”.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intervensi terapi zikir dengan masalah halusinasi pendengaran .

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya gambaran hasil pengkajian pada pasien dengan masalah halusinasi pendengaran
- b. Diketuainya diagnosis keperawatan pada pasien yang mengalami halusinasi
- c. Diketuainya gambaran setelah pemberian intervensi terapi zikir pada pasien dengan masalah halusinasi pendengaran.
- d. Diketuainya implementasi keperawatan pada pasien dengan masalah halusinasi
- e. Diketuainya evaluasi keperawatan pada pasien dengan masalah halusinasi pendengaran
- f. Diketuainya hasil analisis intervensi terapi zikir dengan masalah halusinasi pendengaran.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dalam tugas akhir ners ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya terkait intervensi terapi zikir terhadap penurunan tanda dan gejala halusinasi pada pasien halusinasi. sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya. Di samping itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai bahan referensi penunjang dan dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan pada ranah konsep dan intervensi yang bisa diberikan pada penelitian selanjutnya yang bisa diterapkan pada pasien skizofrenia yang mengalami halusinasi.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan sumber informasi bagi institusi pendidikan dan mahasiswa yang berkaitan dengan pemberian intervensi terapi zikir dengan masalah halusinasi pendengaran khususnya pada keperawatan jiwa.

2. Manfaat Aplikatif

Penelitian tugas akhir ners ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi perawat yang ada di pelayanan klinis, rumah sakit dan pelayanan masyarakat ketika akan memberikan intervensi pencegahan pada pasien halusinasi, sehingga prevalensi morbiditas dan mortalitas dapat menurun.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Teori Halusinasi

1. Definisi Halusinasi

Kata halusinasi berasal dari bahasa Latin dan berarti "mengembara secara mental". Halusinasi didefinisikan sebagai persepsi objek atau peristiwa yang tidak ada dan pengalaman sensorik yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari organ sensorik yang relevan. Halusinasi adalah persepsi sensorik (seperti gambar visual atau suara) yang terjadi tanpa adanya stimulus eksternal yang sebenarnya dan biasanya timbul dari gangguan neurologis (seperti yang terkait dengan skizofrenia, penyakit Parkinson, atau narkolepsi) atau sebagai repon terhadap obat-obatan (seperti LSD atau *phencyclidine*).

Halusinasi adalah pengalaman indrawi yang terjadi tanpa adanya yang sebenarnya stimulus eksternal. Mereka terjadi saat pasien terjaga dan pada saat dan tempat di mana tidak ada orang lain yang memiliki pengalaman validasi serupa. Halusinasi sangat nyata bagi orang yang mengalaminya. (Wuryaningsih, Windarwati, Dewi, Deviantony, & Hadi, 2020)

Halusinasi yakni berbicara tentang salah satu gejala yang sering didapatkan pada klien dengan gangguan psikologis (gangguan jiwa / skizofrenia). Halusinasi adalah gangguan pemikiran, dimana klien memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata atau tidak terjadi. Penghayatan yang dialami biasanya seperti pemikiran tanpa stimulus dari luar melalui panca indera. Stimulus tersebut dianggap sebagai sesuatu yang terjadi oleh klien. (Muhith, 2015)

Jadi halusinasi adalah adalah pengalaman sensori tanpa ada stimulus eksternal, yang hanya dirasakan oleh penderita itu sendiri dan menganggap hal tersebut nyata.

2. Dimensi Halusinasi

Problematika halusinasi didasari atas hakikat keberadaan seseorang sebagai makhluk bio – psiko – sosio – spiritual. Menurut (Muhith, 2015) halusinasi dapat dipandang dari lima dimensi, yakni :

- a. Dimensi fisik, yakni manusia dibekali system indera untuk menangkap rangsangan eksternal dari lingkungannya. Halusinasi dapat dipengaruhi beberapa masalah fisik, seperti kelelahan, penggunaan obat-obatan, demam hingga delirium, intoksikasi alcohol dan gangguan pola tidur dalam waktu yang lama
- b. Dimensi emosional, yakni kecemasan yang berlebihan didasari oleh masalah yang tidak dapat diselesaikan yang merupakan salah satu penyebab halusinasi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui isi halusinasi itu sendiri berupa permintaan yang memaksa dan sangat berbahaya, sehingga seseorang yang menderita halusinasi tidak dapat mengontrol permintaan tersebut, sehingga menyebabkan klien melakukan sesuatu yang berbahaya.
- c. Dimensi intelektual, yakni menjelaskan bahwa seseorang yang menderita halusinasi dapat mengalami penurunan fungsi ego. Pada dasarnya halusinasi adalah usaha dari sifat ego untuk melawan rangsangan yang membuat tertekan, namun dapat menimbulkan kewaspadaan yang dapat mempengaruhi seluruh pemikiran klien dan bisa mengontrol perilaku klien.
- d. Dimensi sosial, yakni seseorang yang mengalami halusinasi memperlihatkan adanya kecenderungan menyendiri, karena keasyikan dengan dunia halusinasinya, seakan-akan itu adalah tempat ternyamannya dan memenuhi kebutuhannya interaksi sosial, control diri dan harga diri yang tidak dapat terpenuhi oleh dunia nyata.

- e. Dimensi spiritual, yakni manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial sehingga interaksi dengan orang lain merupakan suatu kebutuhan dasar dan saling membutuhkan. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Hujurat/49:13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS Al-Hujurat : 13)

Dalam tafsir Al-Misbah, surat Al-Hujurat ayat 13 ini membahas tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi daripada yang lain, bukan saja antara satu bangsa, suku, atau warna kulit dan selainnya, tetapi antara jenis kelamin mereka agar saling mengenal dan saling membutuhkan serta bermanfaat untuk orang lain. Dalam ayat ini menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di sisi Allah SWT, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain. (Shihab, 2013)


Seseorang yang mengalami halusinasi lebih sering menyendiri dan tidak menyadari keberadaanya sehingga halusinasinya mengontrol orang tersebut. Ketika halusinasinya mengontrolnya, orang tersebut tidak dapat menguasai dirinya sendiri. (Muhith, 2015)

3. Jenis-jenis Halusinasi

Menurut (Yunita, Isnawati, & Addiarto, 2020) lima jenis halusinasi, yakni:

- a. Halusinasi pendengaran, dimana seseorang penderita dapat mendengar suara-suara yang tidak dapat didengar orang lain (jenis halusinasi paling umum). Suara tersebut berupa suara yang bisik maupun jelas yang didengar oleh penderita halusinasi.
 - b. Halusinasi penglihatan yaitu jenis halusinasi dimana melihat orang, warna, bentuk, atau benda yang tidak nyata (jenis halusinasi kedua yang paling umum)
 - c. Halusinasi perabaan yaitu halusinasi dimana seseorang merasakan sensasi (seperti serangga merayap di bawah kulit Anda) atau seolah-olah anda sedang disentuh padahal sebenarnya tidak.
 - d. Halusinasi penciuman dimana jenis halusinasi dimana seseorang penderita mencium sesuatu yang tidak memiliki sumber fisik (kurang umum dibandingkan halusinasi visual dan pendengaran)
 - e. Halusinasi pengecapan dimana seseorang penderita memiliki rasa di mulut yang tidak memiliki sumber (jenis halusinasi paling langka).
4. Rentang Respon Halusinasi

Halusinasi adalah salah satu kondisi dimana terjadinya respon maladaptif individu yang berada dalam rentang respon neurobiologis. Hal ini merupakan respon pemikiran paling maladaptif. apabila klien sehat maka pemikirannya akurat sehingga mampu mengidentifikasi dan dapat menginterpretasikan rangsangan - rangsangan berdasarkan informasi yang diterima/ditangkap melalui pancaindra (pendengaran, penglihatan, penghidu, pengecapan, peraban). Klien dengan masalah halusinasi biasanya mempersepsikan suatu stimulus melalui pancaindra dan menganggapnya sebagai kenyataan yang benar-benar terjadi walaupun sebenarnya stimulus tersebut tidak ada, hanya persepsi klien itu sendiri. Biasanya stimulus-stimulus halusinasi tidak langsung menguasai diri klien itu sendiri, tergantung dari respon yang menyikapi masalah tersebut. Rentang respon menurut (Muhith, 2015) dapat digambarkan seperti :



Gambar 2.1 Rentang respon halusinasi

Sumber : Muhith, 2015

5. Fase – Fase Halusinasi

Orang yang mengalami halusinasi berbeda-beda keparahan dan perilaku yang ditampilkan. Menurut (Widiyawati, 2020) ada empat fase-fase halusinasi yaitu :

a. *Comforting*

Comforting merupakan fase menyenangkan dengan karakteristik nonpsikotik dimana, pasien merasakan perasaan yang mendalam, seperti kecemasan, kesepian, rasa bersalah dan takut yang menyebabkan pasien mengalihkan pikirannya ke hal-hal yang menyenangkan untuk mengontrol perasaan kecemasan, kesepian, rasa bersalah dan takut. Pasien mengetahui pemikiran dan pengalamannya dan masih dapat dikontrol kondisinya. Ciri-cirinya yaitu:

- 1) Tersenyum atau tertawa tanpa sebab
- 2) Menggerakkan bibir tanpa bersuara
- 3) Pergerakkan mata yang cepat
- 4) Respon verbal yang lambat
- 5) Diam dan asyik sendiri

b. *Condeming*

Condeming merupakan fase yang menjijikan dengan karakteristik psikotik ringan, dimana pasien menyikapi suatu hal yang menjijikan dan menakutkan sehingga mulai lepas kendali atau kemungkinan menjauh dengan sumber yang dipersepsikan,

menarik diri dari orang lain. Tingkat kecemasannya mulai berat yang menyebabkan perasaan antipasti. Ciri-cirinya yaitu:

- 1) Peningkatan saraf otonom, seperti meningkatnya nadi
- 2) Perhatian menyempit
- 3) Keasyikan dengan dunianya dan kehilangan mengontrol halusinasinya, hingga tidak bisa membedakan antara yang nyata dan tidak
- 4) Menyalahkan orang lain
- 5) Isolasi

c. *Controlling*

Controlling merupakan fase ansietas berat dimana pengalaman sensori lebih berkuasa dengan karakteristik psikotik, dimana pasien mulai lelah dan berhenti melawan halusinasinya, menjadikan halusinasinya menjadi hal menarik dan kemungkinan jika halusinasinya berhenti akan mengalami kesepian. Ciri-cirinya :

- 1) Mengikuti perintah dari halusinasinya
- 2) Sukar berhubungan dengan orang lain
- 3) Sedikit perhatian kepada orang lain/objek lain
- 4) Adanya tanda-tanda ansietas berat seperti tremor,berkeringat dan tidak mau mengikuti arahan dari orang lain
- 5) Halusinasinya menjadi atraktif
- 6) Tidak mampu mengikuti perintah dari perawat dan orang lain.

d. *Conquering*

Conquering merupakan fase panik, pasien sudah melebur kedalam dunia halusinasinya, dengan karakteristik psikotik berat dimana pemikirannya mulai berbahaya dan jika tidak diatasi halusinasinya akan hilang beberapa jam atau hari. Ciri-cirinya :

- 1) Berperilaku yang tidak wajar
- 2) Potensi kuat *suicide* atau *homicide*
- 3) Perilaku kekerasan dan isolasi
- 4) Tidak bisa mengikuti perintah dari orang lain

5) Agitasi atau kataton

6. Manifestasi Klinik

Halusinasi dapat disertai dengan berbagai tingkat kecemasan dan tekanan. Tingkat kecemasan berhubungan dengan tingkat pengaruh halusinasi terhadap perilaku orang tersebut. Pada tingkat terendah, orang tersebut mungkin sibuk tetapi mampu mengelola pikiran dan emosi dan mampu berinteraksi dengan orang lain. Pada tingkat sedang, terjadi kecemasan yang parah dan terjadi halusinasi pengalaman terasa menjijikkan dan menakutkan. Orang tersebut mulai merasa tidak terkendali dan malu dan menarik diri dari orang lain. Pada tingkat ekstrim, orang tersebut mungkin mengalami tingkat kepanikan, merasa terancam oleh pikirannya dan terpaksa mengikuti perintah. Itu orang akan merasa sulit untuk mengikuti petunjuk atau mungkin tidak dapat memperhatikan lebih dari satu hal dalam satu waktu.

Tanda dan gejala halusinasi tergantung jenisnya. Adapun tanda-tanda halusinasi yaitu :

- a. Merasakan sensasi di tubuh (seperti perasaan merayap di kulit atau gerakan)
- b. Mendengar suara (seperti musik, langkah kaki, atau benturan pintu)
- c. Mendengar suara (dapat mencakup suara positif atau negatif, seperti suara yang memerintahkan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain)
- d. Melihat benda, makhluk, atau pola atau cahaya
- e. Mencium bau (bisa menyenangkan atau busuk dan di salah satu atau kedua lubang hidung)
- f. Mencicipi sesuatu (seringkali rasa logam, asin padahal tidak asin, pedis padahal tidak pedis dan sebagainya)

7. Etiologi Halusinasi

Menurut (Muhith, 2015) faktor-faktor yang mempengaruhi halusinasi adalah:

- a. Faktor Predisposisi

- 1) Factor genetic, hal ini merupakan penyakit keturunan dimana skizofrenia diturunkan melalui kromosom-kromosom tertentu.
 - 2) Factor perkembangan, apabila fungsi perkembangan mengalami gangguan dan hubungan interpersonal terganggu maka seseorang akan mengalami ansietas dan panic.
 - 3) Factor neurobiologi, pada pasien skizofrenia terjadi penurunan dan keabnormalan fungsi otak.
 - 4) *Study* neurotransmitter, skizofrenia menyebabkan ketidakseimbangan neurotransmitter, dopamine yang berlebihan, tidak seimbang dengan kadar serotonin.
 - 5) Factor biokimia, ketika seseorang mengalami stres yang berlebihan maka tubuh akan menghasilkan suatu zat bersifat halusinogenik neurokimia, misalnya buffofenon dan dymetytranferase (DMP).
 - 6) Psikologis, adanya penekanan pada seseorang seperti, ditekan oleh orang tuanya, stres, hubungan keluarga yang tidak harmonis, *bullying*, yang mengakibatkan gangguan orientasi realistik.
 - 7) Factor sosiokultural, adanya factor yang menyebabkan seseorang mengalami kesepian, disebabkan oleh lingkungannya.
- b. Faktor Presipitasi
- 1) Kesehatan
 - a) Kekurangan nutrisi
 - b) Gangguan pola tidur
 - c) Kelelahan
 - d) Obat-obatan
 - e) Hambatan menjangkau pelayanan kesehatan
 - 2) Lingkungan
 - a) Lingkungan yang memusuhi
 - b) Problematika rumah tangga

- c) Tertekan
- d) Sukar berhubungan dengan orang lain
- e) Menyendiri
- f) Kurangnya *support* dari keluarga dan teman

3) Sikap/perilaku

- a) Harga diri rendah
- b) Tidak percaya diri
- c) Kegagalan
- d) Perasaan memiliki kekuatan
- e) Perasaan hidupnya malang
- f) Kurangnya sosialisasi
- g) Agresif
- h) Perilaku kekerasan
- i) Ketidaksesuain antara harapan dan kenyataan

8. Pengobatan

Perawatan halusinasi akan tergantung pada jenis halusinasi, penyebab yang mendasari dan kesehatan anda secara keseluruhan. Secara umum, bagaimanapun dokter anda kemungkinan akan merekomendasikan pendekatan multidisiplin yang mencakup pengobatan, terapi dan dukungan sosial. (Ruswadi , 2021)

Obat antipsikotik sering kali efektif untuk mengobati halusinasi, baik dengan menghilangkan atau mengurangi frekuensi kejadian atau dengan efek menenangkan yang tidak terlalu menyusahkan. Nuplazid (pimavanserin) adalah obat pertama yang disetujui untuk mengobati halusinasi yang terkait dengan psikosis yang dialami dengan penyakit Parkinson. Strategi psikososial dan obat antipsikotik mungkin keduanya merupakan bagian penting dari orang tersebut rezim manajemen. Strategi psikososial termasuk pendidikan, konseling dan dukungan untuk orang dan keluarganya dapat membantu dengan pemahaman, manajemen stres dan kepatuhan pengobatan. Mengingat bahwa kepatuhan terhadap obat antipsikotik mungkin menjadi

masalah, Anda mungkin perlu memberi penjelasan pengawasan. Diskusi dengan orang tersebut tentang ketidakpatuhan dapat menimbulkan kecurigaan. Jika demikian, beri tahu dokter yang merawat, yang mungkin perlu mempertimbangkan pengobatan alternatif. (Yunita, Isnawati, & Addiarto, 2020)

9. Psikoterapi

Psikoterapi untuk halusinasi melibatkan keterlibatan pasien untuk penasaran dengan detail gejala, memberikan psiko-edukasi, mengeksplorasi alasan yang masuk akal untuk halusinasi dan menormalkan pengalaman. Strategi bantuan mandiri berikut dapat membantu pasien mengatasi halusinasi pendengaran menurut (Yunita, Isnawati, & Addiarto, 2020):

- a. Olahraga
- b. Bersenandung atau menyanyikan lagu beberapa kali (seperti "Selamat Ulang Tahun")
- c. Mengabaikan suara-suara itu
- d. Mendengarkan musik
- e. Membaca (maju dan mundur)
- f. Berbicara dengan orang lain

Stimulasi magnetik transkranial berulang (*Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation - RTM*), prosedur yang relatif non-invasif yang melibatkan penempatan perangkat magnetis kecil langsung di tengkorak, memiliki beberapa bukti awal yang mungkin dapat mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan halusinasi pendengaran pada beberapa orang dengan skizofrenia, (Wuryaningsih, Windarwati, Dewi, Deviantony, & Hadi, 2020)

Suatu aspek penting dalam membantu orang terkasih yang mengalami halusinasi adalah meyakinkan mereka bahwa pengobatan tersedia. Berikut adalah beberapa langkah praktis untuk membantu mengatasi halusinasi menurut (Wuryaningsih, Windarwati, Dewi, Deviantony, & Hadi, 2020):

a. Perhatikan Lingkungan

Lingkungan dapat memainkan peran penting dalam kesalahpahaman dan memperburuk halusinasi, misalnya, ruangan dengan penerangan yang buruk dan suasana yang bising dan kacau dapat meningkatkan kemungkinan halusinasi.

b. Tetap tenang

Meskipun bisa menakutkan dan tidak nyaman ketika orang yang dicintai mengalami halusinasi, penting untuk melakukan yang terbaik untuk merepon dengan cara yang tenang dan suportif. Misalnya, dapat mengatakan "Jangan khawatir; Aku disini."

c. Terapi distraksi

Bergantung pada tingkat keparahan halusinasi, menyentuh atau menepuk dengan lembut orang yang halusinasi dapat membantu mengurangi halusinasi. Gangguan lain yang mungkin terjadi termasuk percakapan, music atau pindah ke ruangan lain.

d. Jujur

Meskipun tidak ingin mengecewakan orang yang menderita halusinasi kita tetap harus berkata jujur dan meyakinkan mereka agar tidak khawatir dan mengatakan secara real kalau mereka hanya berhalusinasi

e. Mempertahankan rutinitas

Menjaga rutinitas sehari-hari yang normal dan dapat diandalkan dapat mengurangi kemungkinan menyimpang dari kenyataan dan mengalami halusinasi. Pertimbangkan untuk menyimpan catatan kapan halusinasi terjadi dan dalam keadaan apa.

Tujuan yang tepat dalam lingkungan komunitas atau rumah sakit saat merawat orang berhalusinasi menurut (Hidayat, 2021) meliputi:

- a. Kembangkan hubungan dengan orang tersebut berdasarkan empati dan kepercayaan.

- b. Mempromosikan pemahaman tentang fitur dan manajemen halusinasi yang sesuai.
- c. Mempromosikan strategi penanganan yang efektif untuk kecemasan, stres atau emosi lain yang mungkin bertindak sebagai pemicu halusinasi.
- d. Mempromosikan perilaku kesehatan yang positif, termasuk kepatuhan pengobatan dan gaya hidup sehat pilihan (misalnya, diet, olahraga dan/atau tidak merokok).
- e. Mempromosikan keterlibatan orang tersebut dengan jaringan sosial dan dukungannya.
- f. Memastikan kolaborasi yang efektif dengan penyedia layanan lainnya, melalui pengembangan kerja dan komunikasi yang efektif.
- g. Mendukung dan meningkatkan perawatan diri

B. Konsep Keperawatan

1. Pengkajian

Pengkajian yaitu salah satu proses sebagai tahap awal dan dasar utama dari proses keperawatan itu sendiri yang terdiri dari pengumpulan data dan perumusan kebutuhan atau masalah klien. Pengkajian keperawatan, melibatkan pengumpulan data yang sistematis dan berkesinambungan. Data yang dikumpulkan melalui data biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Pengelompokan data pengkajian kesehatan jiwa, dapat berupa faktor presipitasi, penilaian terhadap stresor. (Hidayat, 2021)

Menurut (Muhith, 2015) pengkajian pada keperawatan jiwa yaitu:

a. Identitas Klien

Meliputi nama, umur, jenis kelamin, tanggal pengkajian, tanggal dirawat, nomor rekam medis.

b. Alasan Masuk

Alasan masuk klien masuk di rumah sakit jiwa , biasanya klien sering berbicara sendiri, mendengar atau melihat sesuatu, suka berjalan tanpa tujuan, membanting peralatan dirumah, menarik diri.

c. Faktor Predisposisi

- 1) Biasanya klien mempunyai riwayat gangguan jiwa dan kurang berhasil dalam pengobatan
- 2) Pernah mengalami aniaya fisik, penolakan dan kekerasan dalam keluarga
- 3) Klien dengan gangguan orientasi bersifat herediter
- 4) Pernah mengalami trauma masa lalu yang sangat mengganggu

d. Fisik

Berupa kondisi atau keadaan fisik klien

e. Psikososial

- 1) Genogram, Pada genogram biasanya tampak ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, pola komunikasi klien terganggu maupun dengan pengambilan keputusan dan pola asuh.
- 2) Konsep diri, biasanya klien biasanya mengeluh dengan keadaan tubuhnya, ada bagian tubuh yang disukai dan tidak disukai, identifikasi diri.
- 3) Hubungan sosial, biasanya klien kurang dihargai di lingkungan dan keluarga.
- 4) Spiritual, nilai dan keyakinan biasanya klien dengan sakit jiwa dipandang tidak sesuai dengan agama dan budaya, kegiatan ibadah klien biasanya menjalankan ibadah di rumah sebelumnya, saat sakit ibadah terganggu atau sangat berlebihan.

f. Status Mental

- 1) Penampilan, Biasanya melihat penampilan klien apakah tidak rapi, tidak serasi atau cocok dan berubah dari biasanya
- 2) Pembicaraan, biasanya melihat apakah tidak terorganisir dan bentuk yang maladaptif seperti kehilangan, tidak logis, berbelit-belit

- 3) Aktifitas motorik, dinilai apakah motoriknya meningkat atau menurun, impulsif, kataton dan beberapa gerakan yang abnormal.
- 4) Alam perasaan, berupa suasana emosi yang memanjang akibat dari faktor presipitasi misalnya sedih dan putus asa disertai apatis.
- 5) Afek : afek sering tumpul, datar, tidak sesuai dan ambivalen.
- 6) Interaksi selama wawancara Selama berinteraksi dapat dideteksi sikap klien yang tampak komat-kamit, tertawa sendiri, tidak terkait dengan pembicaraan.
- 7) Persepsi, berupa halusinasi apa yang terjadi dengan klien.
- 8) Proses pikir, biasanya klien tidak mampu mengorganisir dan menyusun pembicaraan logis dan koheren, tidak berhubungan, berbelit. Ketidakmampuan klien ini sering membuat lingkungan takut dan merasa aneh terhadap klien.
- 9) Isi pikir, biasanya keyakinan klien tidak konsisten dengan tingkat intelektual dan latar belakang budaya klien.
- 10) Tingkat kesadaran, biasanya klien akan mengalami disorientasi terhadap orang, tempat dan waktu.
- 11) Memori, biasanya adanya gangguan daya ingat jangka panjang maupun jangka pendek, mudah lupa, klien kurang mampu menjalankan peraturan yang telah disepakati, tidak mudah tertarik.
- 12) Tingkat konsentrasi dan berhitung, biasanya kemampuan mengorganisir dan konsentrasi terhadap realitas eksternal, sukar menyelesaikan tugas, sukar berkonsentrasi pada kegiatan atau pekerjaan dan mudah mengalihkan perhatian, mengalami masalah dalam memberikan perhatian.
- 13) Kemampuan penilaian klien mengalami ketidakmampuan dalam mengambil keputusan, menilai, mengevaluasi diri

sendiri dan juga tidak mampu melaksanakan keputusan yang telah disepakati.

- 14) Daya tilik diri, biasanya klien mengalami ketidakmampuan dalam mengambil keputusan. Menilai dan mengevaluasi diri sendiri, penilaian terhadap lingkungan dan stimulus, membuat rencana termasuk memutuskan, melaksanakan keputusan yang telah disepakati.

g. Kebutuhan Persiapan Pulang

- 1) Makan, hal yang perlu dikaji yakni berat badan, biasanya klien sibuk dengan halusinasi dan cenderung tidak memperhatikan diri termasuk tidak peduli makanan karena tidak memiliki minat dan kepedulian.
- 2) BAB atau BAK, observasi kemampuan klien untuk BAK atau BAK serta kemampuan klien untuk membersihkan diri.
- 3) Mandi : biasanya klien mandi berulang-ulang atau tidak mandi sama sekali.
- 4) Berpakaian : biasanya tidak rapi, tidak sesuai dan tidak diganti.
- 5) Observasi tentang lama dan waktu tidur siang dan malam : biasanya istirahat klien terganggu bila halusinasinya datang.
- 6) Pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan kesehatan klien selanjutnya, peran keluarga dan sistem pendukung sangat menentukan.
- 7) Aktifitas dalam rumah klien tidak mampu melakukan aktivitas di dalam rumah seperti menyapu.

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan adalah keputusan klinis memahami seseorang, keluarga atau masyarakat sebagai akibat dari gangguan kesehatan atau proses hidup yang aktual atau potensial (Hidayat, 2021). Klien yang mengalami halusinasi mengakibatkan kehilangan kontrol dirinya sehingga dapat membahayakan dirinya, orang lain

maupun lingkungannya. Sehingga didapatkan masalah keperawatan antara lain:

- a. Gangguan persepsi sensori : halusinasi
- b. Resiko perilaku kekerasan
- c. Isolasi sosial

3. Intervensi

Klien	Keluarga
<p>SP I P</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi jenis halusinasi pasien 2. Mengidentifikasi isi halusinasi pasien 3. Mengidentifikasi waktu halusinasi pasien 4. Mengidentifikasi frekuensi halusinasi pasien 5. Mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi 6. Mengidentifikasi respon pasien terhadap halusinasi 7. Mengajarkan pasien menghardik halusinasi 8. Menganjurkan pasien memasukkan cara menghardik halusinasi dalam jadwal kegiatan harian <p>SP II P</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Memberikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur 3. Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian <p>SP III P</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain 3. Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian <p>SP IV P</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan 3. Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian 	<p>SP I K</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien 2. Menjelaskan pengertian, tanda dan gejala halusinasi dan jenis halusinasi yang dialami pasien beserta proses terjadinya 3. Menjelaskan cara-cara merawat pasien halusinasi <p>SP II K</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melatih keluarga mempraktekkan cara merawat pasien dengan halusinasi 2. Melatih keluarga melakukan cara merawat langsung kepada pasien halusinasi <p>SP III K</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu keluarga membuat jadwal aktivitas di rumah termasuk minum obat (<i>discharge planning</i>) 2. Menjelaskan <i>follow up</i> pasien setelah pulang

4. Implementasi

Implementasi merupakan salah tahap dari proses keperawatan. Tahap ini muncul, jika intervensi yang dibuat dikerjakan pada klien. Tindakan yang dilakukan pada klien akan berbeda, disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang diperlukan oleh klien. Implementasi keperawatan membutuhkan fleksibilitas dan kreativitas perawat. (Debora, 2017).

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap kelima dari proses keperawatan. Pada tahap ini perawat membandingkan hasil implementasi yang dilakukan dengan kriteria hasil yang sudah ditetapkan serta menilai apakah masalah klien sudah teratasi seluruhnya, sebagian atau belum sama sekali teratasi. Evaluasi merupakan proses yang berkelanjutan yakni suatu proses untuk mengukur dan memonitor keadaan klien untuk mengetahui (Debora, 2017):

- a. Kesesuaian tindakan keperawatan
- b. Perbaikan tindakan keperawatan
- c. Kebutuhan klien
- d. Perlunya dipindahkan pada kesehatan lain
- e. Apakah perlunya menyusun ulang prioritas diagnosis supaya kebutuhan klien bisa terpenuhi.

C. Pendekatan Teori Keperawatan Yang Digunakan

Martin Heidegger menjelaskan dalam teori eksistensi mengemukakan bahwa penyimpangan perilaku terjadi apabila individu putus hubungan dengan dirinya dan lingkungannya. Keasingan diri dan lingkungan disebabkan karena adanya hambatan dalam diri klien itu sendiri. Seseorang merasa putus asa, sedih, kesepian kurang kesadaran diri yang mencegah partisipasi dan penghargaan pada hubungan dengan orang lain. Adapun proses terapi yang digunakan dalam model eksistensi, (Ruswadi, 2021) yaitu:

1. *Rational emotive therapy*

Konfrontasi digunakan untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Klien didorong agar menerima dirinya sebagaimana adanya, bukan karena apa yang dilakukan.

2. Terapi logo

Terapi orientasi masa depan, klien mencari jati dirinya, bertujuan agar klien sadar akan tanggung jawabnya.

3. Terapi Realitas

Klien dibantu untuk menyadari dan mencapai tujuan hidupnya. Klien didasarkan terhadap alternative yang tersedia.

Keterkaitan antara teori eksistensi dengan halusinasi pendengaran yang diteliti oleh penulis ialah bahwasanya klien yang mengalami halusinasi pendengaran perlu adanya pendekatan secara teori eksistensi agar klien kembali menyadari tujuan hidupnya secara real, bertanggung jawab terhadap dirinya dan menemukan jati dirinya.

D. Evidence Based Nursing (EBN)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Emulyani & Herlambang, 2020) tentang Pengaruh Terapi Zikir Terhadap Penurunan Tanda Dan Gejala Halusinasi Pada Pasien Halusinasi, *evidence based nursing* pada klien dengan gangguan halusinasi pendengaran adalah terapi zikir.

1. Pengertian Terapi Zikir

Berzikir merupakan suatu tindakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Terapi zikir adalah serangkaian upaya yang dirancang untuk membantu atau menolong orang dengan cara mengingat Allah SWT atau menyebut nama Allah SWT. Adapun zikir yang digunakan dalam penelitian ini ialah tasbih (*subhanAllah*), tahmid (*Alhamdulillah*), tahlil (*la ilaha illah*), takbir (*Allahu akbar*) dan lafal *Laa hawla walakuata illa billahil aliyil adzim*.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari terapi zikir adalah:

- a. Dapat menghilangkan rasa resah dan gelisah,
- b. Memelihara diri dari was-was setan, ancaman manusia
- c. membentengi diri dari perbuatan maksiat dan dosa, serta dapat memberikan sinaran kepada hati
- d. Menghilangkan kekeruhan jiwa.

3. Indikasi

- a. Pasien yang mengalami halusinasi
- b. Pasien yang gangguan jiwa

- c. Pasien mengalami masalah koping
 - d. Pasien yang mengalami gangguan pola tidur
 - e. Pasien yang mengalami stres
4. Kontraindikasi
- a. Pasien Non muslim
5. Prosedur Pemberian Dan Rasionalisasi
- Prosedur kerja pemberian terapi zikir adalah sebagai berikut:
- a. Pre interaksi
 - 1) Siapkan alat-alat
 - 2) Identifikasi kontraindikasi dengan terapi yang diberikan
 - 3) Cuci tangan
 - b. Tahap orientasi
 - 1) Beri salam dan panggil klien dengan namanya
 - 2) Tanyakan perasaan klien dan kontrak
 - 3) Jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada pasien/keluarga
 - c. Tahap Kerja
 - 1) Berikan kesempatan klien/keluarga bertanya sebelum kegiatan dilakukan
 - 2) Menanyakan perasaan klien
 - 3) Jaga privasi klien. memulai kegiatan dengan cara yang baik
 - 4) Pilih zikir yang diinginkan oleh klien
 - 5) Batasi stimulasi eksternal seperti suara dan pengunjung selama mendengarkan terapi zikir berlangsung
 - 4) Pastikan volume sesuai dan tidak terlalu keras
 - 5) Hindari menghidupkan music dan meninggalkannya dalam waktu yang lama
 - d. Terminasi

- 1) Evaluasi perasaan klien setelah dilakukan terapi zikir
- 2) Evaluasi hasil kegiatan (kenyamanan pasien)
- 3) Simpulkan hasil kegiatan
- 4) Berikan umpan balik positif
- 5) Kontrak pertemuan selanjutnya
- 6) Akhiri kegiatan dengan cara yang baik
- 7) Bereskan alat-alat
- 8) Cuci tangan

e. Dokumentasi

Catat hasil kegiatan di dalam catatan keperawatan

- 1) Nama klien , Umur, Jenis Kelamin, dan lain-lain
- 2) Keluhan Utama
- 3) Tindakan yang dilakukan (terapi zikir)
- 4) Lama tindakan
- 5) Jenis terapi zikir yang diberikan
- 6) Reaksi selama, setelah terapi pemberian terapi zikir
- 7) Respon pasien
- 8) Nama perawat
- 9) Tanggal pemeriksaan

6. Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi terapi zikir adalah sebagai berikut:

- a. Terapi zikir mempengaruhi terhadap pengontrolan halusinasi pasien
- b. Pasien setelah melakukan terapi zikir mampu menguasai bahkan menghilangkan halusinasi disaat halusinasi tersebut datang. Sehingga pasien merasa tenang dan tidak merasa gelisah lagi.
- c. pasien dapat lebih mengenal cara berzikir yang baik dan bahkan pasien dapat lebih dekat dengan Allah SWT sebagai penciptanya

BAB III
ASUHAN KEPERAWATAN

Ruang Rawat : Sawit

Tanggal dirawat : 28 Januari 2021

A. PENGKAJIAN

1. Identitas Pasien

Inisial pasien : Tn. R (L)

Tanggal pengkajian : 08 Februari 2021

Umur : 37 tahun

NO. RM : 165878

Informan : pasien

2. Alasan Masuk

Pasien dibawa ke RSJ dadi oleh keluarganya karena mengamuk

3. Faktor Predisposisi

a. Pernah mengalami gangguan jiwa dimasa lalu?

Ya Tidak

b. Pengobatan sebelumnya

Berhasil Kurang berhasil Tidak berhasil

c.

	Pelaku/usia	Korban/usia	Saksi/usia
Aniaya fisik	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/>
Aniaya seksual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Penolakan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/>
Kekerasan dalam keluarga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tindakan kriminal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/>
Jelaskan			:

Pasien sudah empat kali masuk RSJ dengan keluhan yang sama yakni mendengar bisikan-bisikan dan paling lama tinggal di RSJ adalah saat ini, sebelumnya pasien hanya 1 minggu namun sekarang menjelang 20 hari belum sembuh-sembuh. Pengobatan sebelumnya berhasil dan pada saat putus obat pasien kambuh lagi. Pasien pernah mengalami aniaya fisik pada umur 33 tahun, akibat tidak mau menyingkir dari jalan raya. Pasien pernah ditolak oleh orangtua mantan pacarnya karena miskin dan pasien pernah dipenjara. Pasien juga sering bertengkar sama mantan istrinya ketika bersama.

Masalah keperawatan : risiko perilaku kekerasan

- d. Adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa

Ya Tidak

Masalah keperawatan : -

- e. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan

Pasien mengatakan bahwa pengalaman yang tidak menyenangkan adalah berzina dengan mantan pacarnya selama 3 tahun. Pasien pernah ditolak oleh orangtua pacarnya karena miskin. Pasien pernah menyewa PSK dan mengonsumsi narkoba.

Masalah keperawatan : Koping tidak efektif

4. Fisik

- a. Tanda vital :

- 1) TD : 120/80 mmHg
- 2) N : 80 X/Menit
- 3) S : 36,5 °C
- 4) P : 22 X/Menit

- b. Ukur:

- 1) TB : 168 cm
- 2) BB : 72 Kg

- c. Keluhan fisik :


Ya Tidak

Jelaskan : tidak ada

Masalah keperawatan : -

5. Psikososial

a. Genogram



Jelaskan :

Pola komunikasi : pasien mengatakan, komunikasi dengan ibu dan saudara baik dan terbuka. Hanya saja ketika pasien sakit ia jarang berkomunikasi dengan ibu dan saudara-saudaranya, karena dianggap gangguan jiwa.

Pola asuh : selama menderita gangguan jiwa pasien diasuh oleh orang tuanya

Pengambilan keputusan : pasien mengatakan yang memutuskan suatu tindakan adalah ibunya. sehingga pengambilan keputusan dilakukan oleh ibu klien.

Masalah keperawatan : -

b. Konsep diri

- 1) **gambaran diri** : pasien menyukai seluruh badannya dan menganggap dirinya ganteng apabila berjenggot
- 2) **identitas** : sebelum dirawat pasien bekerja sebagai pelaut. Pasien puas dengan pekerjaannya. Namun kecewa sama mantan istrinya

karena selalu curiga kepadanya karena uang yang dikirimkan tiap bulan berbeda-beda nominalnya.

- 3) Peran : pasien sebagai kepala rumah tangga dan bekerja sebagai kapten dalam membawa kapal batu bara miliknya
- 4) Ideal diri : pasien berharap menjadi ustadz dan ulama. Di lingkungannya dapat menerima apa yang disampaikan dan pasien berharap cepat keluar dari rumah sakit jiwa, cepat mendapat pekerjaan dan menikah.
- 5) Harga diri : dikeluarga dan lingkungannya pasien dianggap gila, pasien merasa kecewa kepada keluarganya dan menurutnya dia gila karena gila dijalan Allah SWT.

Masalah keperawatan : risiko harga diri rendah

c. Hubungan sosial

- 1) Orang berarti : Ibu dan anaknya
- 2) Peran serta dalam kegiatan kelompok/masyarakat : membantu membersihkan masjid
- 3) Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain: -

Masalah keperawatan : -

d. Spiritual

- 1) Nilai dan keyakinan : pasien menyakini dirinya gila, namun gila dijalan Allah SWT
- 2) Kegiatan ibadah : pasien selalu sholat 5 waktu dan selalu sholat sunnah

6. Status Mental

a. Penampilan

- Tidak rapih Penggunaan pakaian tidak sesuai Cara berpakaian seperti biasanya
Jelaskan : pasien tidak mengganti bajunya kerana pasien hanya

memili satu baju

Masalah keperawatan : -

b. Pembicaraan

- Cepat Keras Gagap Inkoheren

— — — —
 Apatis Lambat Membisu Tidak mampu memulai pembicaraan

Jelaskan : pasien selalu menjawab pertanyaan yang diberikan, namun dia langsung mengalihkan ke pembahasan yang lain

Masalah keperawatan :

c. Aktivitas motorik

Lesu Tegang Gelisah Agitasi
 Tik Grimasen Tremor Kompulsif

Jelaskan :-

Masalah keperawatan :-

d. Alam perasaan

Sedih Ketakutan Putus asa Khawatir Gembira berlebihan

Jelaskan : pasien terkadang merasa sedih karena rindu pada keluarganya dan pasien merasa sedih mengingat kembali perbuatannya dimasa lalu karena banyak dosa yang dilakukannya

Masalah keperawatan : harga diri rendah

e. Afek

Datar Tumpul Labil Tidak sesuai

Jelaskan : pasien terkadang menangis, kadang murung dan kadang tertawa

Masalah keperawatan : gangguan persepsi sensori

f. Interaksi selama wawancara

Bermusuhan Tidak kooperatif Masalah tersinggung

Kontak mata (-) Desensif Curiga

Jelaskan : saat wawancara pasien menjawab pertanyaan diberikan, kemudian dia mengalihkan pembicaraan dan kadang-kadang bertanya

Masalah keperawatan : gangguan persepsi sensori

g. Persepsi

- pendengaran Penglihatan Perabaan
 Pengecapan Penciuman

Jelaskan : pasien mengatakan sering mendengar bisikan-bisikan pada malam hari, bisikan-bisikan tersebut menyuruhnya untuk mencari sumber suara dan sholat. Bisikan-bisikan tersebut didengar pada saat sebelum tidur, shubuh, waktu sholat dan pada saat mengingat pengalaman yang tidak menyenangkannya (berzina dan narkoba) Paling sering mendengar di malam hari. Pasien mengatakan jika mendengar maka dia akan mencari sumber suara dan sholat apabila disuruh sholat. Apabila dia dicegah mencari sumber suara maka pasien akan marah.

Masalah keperawatan : halusinasi pendengaran dan risiko perilaku kekerasan

h. Proses pikir

- sirkumntasial Tangensial Kehilangan asosiasi
 Flight of idea *Blocking* Pengulangan pembicaraan/persevarasi

Jelaskan : -

Masalah keperawatan : -

i. Isi pikir

- obsesi Fobia Hipokondria
 Depersonalisasi Ide yang terkait Pikiran magis
Waham
 Agama Somatik kebesaran Curiga
 Nihilistik Sisip pikir Siar pikir Control pikir

Jelaskan : -

Masalah keperawatan : -

j. Tingkat kesadaran

Bingung Sedasi Stupor
Disorientasi

Waktu Tempat Orang
Jelaskan : -

Masalah keperawatan : -

k. Memori

Gangguan daya ingat jangka panjang Gangguan daya ingat jangka pendek

Gangguan daya ingat saat ini Konfabulasi

Jelaskan : -

Masalah keperawatan : -

l. Tingkat konsentrasi dan berhitung

Mudah beralih Tidak mampu konsentrasi Tidak mampu berhitung

m. Kemampuan penilaian

Gangguan berat Gangguan ringan

Jelaskan : -

Masalah keperawatan : -

n. Daya tilik diri

Mengingkari penyakit yang diderita Menyalahkan hal-hal diluar dirinya

Jelaskan : -

Masalah keperawatan : -

7. Kebutuhan Persiapan Pulang

a. Makan

Bantuan minimal Bantuan total

b. BAB/BAK

Bantuan minimal Bantuan total

Jelaskan : BAB 1 x/hari dan BAK 4-5 x/hari

Masalah keperawatan : -

c. Mandi

Bantuan minimal Bantuan total

d. Berpakaian/berhias

Bantuan minimal Bantuan total

e. Istirahat dan tidur

 Tidur siang lama: 14 : 00 – 15.35 Tidur malam lama: 20 : 00 – 04 : 50 Kegiatan sebelum tidur: pasien ngobrol sama teman-temannya

f. Penggunaan obat

 Bantuan minimal Bantuan total

g. Pemeliharaan kesehatan

Perawatan lanjutan Ya TidakPerawatan pendukung Ya Tidak

h. Kegiatan dalam rumah

Mempersiapkan makanan Ya TidakMenjaga kerapian rumah Ya TidakMencuci pakaian Ya TidakPengaturan pakaian Ya Tidak

i. Kegiatan diluar rumah

Mempersiapkan makanan Ya TidakMenjaga kerapian rumah Ya TidakMencuci pakaian Ya Tidak

Jelaskan : -

Masalah keperawatan : -

8. Mekanisme Koping

Adaptif Bicara dengan orang lain Mampu menyelesaikan masalah Teknik relaksasi**Maladaptif** Minum alcohol Reaksi lambat/berlibah Bekerja berlebihan

- Aktivitas konstruktif Menghindar
 Olahraga Meencederai diri
 Lainnya lainnya : pasien sebelum sakit pernah berzina dan mengmsumsi narkotika

Masalah keperawatan : mekanisme koping tidak efektif

9. Masalah Psikososial Dan Lingkungan

- masalah dengan dukungan kelompok, spesifik : tidak ada
 Masalah berhubungan dengan lingkungan, spesifik : tidak ada
 Masalah dengan pendidikan, spesifik : tidak ada
 Masalah dengan pekerjaan, spesifik : tidak ada
 Masalah dengan perumahan, spesifik : tidak ada
 Masalah ekonomi, spesifik : tidak ada
 Masalah dengan pelayanan kesehatan, spesifik : tidak ada
 Lainnya

Masalah keperawatan :

10. Pengetahuan Kurang Tentang

- Penyakit jiwa System pendukung
 Factor predisposisi Penyakit fisik
 Koping Obat-obatan

Lainnya

Masalah keperawatan : deficit pengetahuan

11. Diagnosis Medis

Skizofrenia

12. Aspek Medik

Nama obat :

1. Chlorpromazine (3x 1) untuk pengobatan gangguan mental yang bertujuan membantu mengembalikan keseimbangan zat alami tertentu dalam otak
2. Trihexphenidyl untuk mengatasi gejala gemetar
3. Haloperidol (1x1) diminum pada malam hari, bertujuan untuk mengatasi gejala skizofrenia

ANALISA DATA

Data	Masalah Keperawatan
DS: <ul style="list-style-type: none"> • Pasien mengatakan mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya agar mencarinya dan menyuruhnya sholat • Pasien mengatakan mendengar bisikan-bisikan pada saat shubuh, saat waktu sholat dan paling sering di malam hari sebelum tidur DO : <ul style="list-style-type: none"> • Pasien tampak sedih, murung kadang tertawa sendiri • Pasien tampak mulut komat kamit • Pasien tampak antusias menceritakan apa yang dia dengar 	halusinasi pendengaran
DS: <ul style="list-style-type: none"> • Pasien merasa dirinya tidak suci lagi karena dulu pernah berzina dan nyabu • Pasien merasa kecewa sama keluarganya karena dianggap gila • Pasien tidak pernah dijenguk DO : <ul style="list-style-type: none"> • Pasien tampak murung • Pasien sering menangis • selama praktek belum ada yang datang jenguk pasien 	Harga diri rendah
DS: <ul style="list-style-type: none"> • Pasien mengatakan dibawa oleh keluarganya karena mengamuk • Pasien pernah mengalami dipukul dan sering bertengkar sama istrinya • Pasien pernah diikat • Pasien mengatakan mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya agar mencarinya dan menyuruhnya sholat • Pasien mengatakan jika mendengar maka dia akan mencari sumber suara dan sholat apabila disuruh sholat • Apabila dia dilarang untuk mencarinya maka dia akan marah DO : <ul style="list-style-type: none"> • Tampak ada bekas ikatan ditangannya • Pasien tampak sedih, murung kadang tertawa 	Risiko perilaku kekerasan

POHON MASALAH

Risiko perilaku kekerasan

**Halusinasi**

Harga diri rendah



Koping tidak efektif

B. DIAGNOSIS KEPERAWATAN

1. Halusinasi pendengaran
2. Risiko perilaku kekerasan
3. Harga diri rendah

C. INTERVENSI KEPERAWATAN

Inisial pasien : Tn.R

Ruangan : Sawit

Umur pasien : 37 tahun

No. RM : 165878

No	Diagnosis Keperawatan	Rencana Tindakan Keperawatan		Rasional
		Kriteria evaluasi	Tindakan keperawatan	Rasional
1	Halusinasi pendengaran	Persepsi sensori membaik dengan kriteria hasil : <ul style="list-style-type: none"> • Verbalisasi mendengar bisikan menurun • Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera pendengaran menurun • Mondar-mandir menurun • Respon sesuai stimulus menurun 	1. Identifikasi jenis halusinasi pasien	Agar dapat mengetahui halusinasi pasien
			2. Identifikasi isi halusinasi pasien	Agar dapat mengetahui halusinasi pasien
			3. Identifikasi waktu halusinasi pasien	Agar dapat mengetahui waktu halusinasi pasien
			4. Identifikasi frekuensi halusinasi pasien	Agar dapat mengetahui frekuensi halusinasi pasien
			5. Identifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi	Agar dapat mengetahui situasi halusinasi pasien
			6. Identifikasi repon pasien terhadap halusinasi	
			7. Ajarkan pasien menghardik halusinasi	Agar pasien dapat mengontrol halusinasinya
			8. Anjurkan pasien memasukkan cara menghardik halusinasi dalam jadwal kegiatan harian	Agar dapat pasien dapat mengontrol halusinasinya
		Persepsi sensori membaik dengan	1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien	Agar dapat mengetahui kegiatan pasien

		kriteria hasil : <ul style="list-style-type: none"> • Verbalisasi mendengar bisikan menurun • Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera pendengaran menurun • Mondar-mandir menurun Repon sesuai stimulus menurun 	2. Berikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur	Agar pasien mengetahui pentingnya minum obat
			3. Anjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian	Agar pasien dapat mengingat jadwal minum obat
	Persepsi sensorik membaik dengan kriteria hasil : <ul style="list-style-type: none"> • Verbalisasi mendengar bisikan menurun • Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera pendengaran menurun • Mondar-mandir menurun Repon sesuai stimulus menurun 	1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien	Agar mengetahui sejauh mana kegiatan harian pasien	
		2. Latih pasien mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain	Agar pasien dapat mengontrol halusinasinya dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain	
		3. Anjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian	Agar pasien dapat menambah aktifitas sehingga dapat mengontrol halusinasinya	
		Persepsi sensorik membaik dengan kriteria hasil :	1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien	Agar mengetahui sejauh mana kegiatan harian yang telah dilakukan pasien

	<ul style="list-style-type: none"> • Verbalisasi mendengar bisikan menurun • Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera pendengaran menurun • Halusinasi pendengaran 	2. Latih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan	Agar dapat mengontrol halusinasinya
		3. Anjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian	Agar pasien mengingat cara mengontrol halusinasinya
		Teknik Menenangkan : terapi zikir Observasi: 1. Identifikasi masalah yang dialami Terapeutik : 2. Buat kontrak dengan pasien 3. Ciptakan ruangan yang tenang dan nyaman Edukasi: 4. Anjurkan berzikir	1. Untuk mengetahui masalah pasien 2. Agar intervensi berjalan dengan baik 3. Agar pasien merasan nyaman 4. Agar pasien merasa tenang dan damai

D. IMPLENTASI DAN EVALUASI

Inisial pasien : Tn.R

Ruangan : Sawit

Umur pasien : 37 tahun

No. RM : 165878

No	Diagnosis Keperawatan	Hari Tgl/Jam	Implementasi	Evaluasi
1	Gangguan persepsi sensori : Halusinasi pendengaran	Senin, 08/02/21 10: 00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina hubungan saling percaya <ol style="list-style-type: none"> a. Menyapa pasien dengan ramah b. Memperkenalkan diri dengan sopan c. Menanyakan nama pasien d. Menjelaskan tujuan pertemuan e. Jujur dan menepati janji f. Menunjukkan sifat empati dan menerima pasien apa adanya g. Memberikan pasien perhatian dan memperhatikan kebutuhan pasien h. Menanyakan keluhan pasien 	<p>S:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien mengatakan setuju ditanya-tanya oleh perawat • Pasien mengatakan mendengar bisikan-bisikan <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien tampak murung • Kadang menangis • Kadang tertawa sendiri <p>A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bina hubungan saling percaya teratasi <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi jenis halusinasi • Identifikasi waktu halusinasi • Identifikasi frekuensi halusinasi • Identifikasi respon halusinasi • terapi menghardik
		Selasa 09/02/21 10:30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi jenis halusinasi Hasil : halusinasi pendengaran 2. Mengidentifikasi waktu halusinasi Hasil : pada malam hari, shubuh, waktu sholat dan mengingat dosa-dosanya yang dilakukannya. 3. Mengidentifikasi frekuensi halusinasi Hasil ± 7 kali/ hari 	<p>S:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien mengatakan mendengar bisikan-bisikan, yang menuruhnya untuk mencarinya dan untuk sholat • Pasien sering mendengar bisikan-bisikan pada malam hari, shubuh dan waktu-waktu sholat. Serta ketika dia mengingat dosa-dosa yang dia lakukan dulu

			<p>4. Mengidentifikasi respon pasien Hasil : pasien akan mencari sumber suara apabila disuruh untuk mencarinya dan akan sholat apabila disuruh untuk sholat</p> <p>5. Mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi Hasil : halusinasi sering muncul pada malam hari, ketika sendiri dan ketika mengingat pengalaman yang tidak menyenangkan.</p> <p>6. Mengajarkan pasien mengontrol halusinasinya dengan cara menghardik Hasil : pasien menolak untuk menghardik halusinasinya, namun akan melakukannya sekali-kali.</p> <p>7. Menganjurkan pasien menambahkan terapi menghardik dalam kegiatan hariannya Hasil : terapi menghardik tidak ditambahkan kedalam daftar harian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien tidak mau menghardik karena jangan sampai dianggap gila, namun akan melakukannya jika sekali saja <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien masih tampak murung • Kadang menangis • Kadang tertawa sendiri <p>A: halusinasi pendengaran</p> <p>P: lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terapi zikir • Pendidikan kesehatan tentang minum obat secara teratur
		<p>Rabu, 10/02/2021 10:00</p>	<p>1. Mengevaluasi kegiatan harian pasien Hasil : sholat wajib, menyampu 1x/hari, makan 3x/hari, minum obat 3x/hari.</p> <p>2. Menganjurkan pasien untuk minum obat dan tidak membuangnya serta menjelaskan pentingnya minum obat Hasil : pasien mengatakan akan meminum obatnya secara teratur dan sesuai resep.</p> <p>3. Mengajarkan pasien terapi zikir Hasil: berzikir telah dilakukan pada</p>	<p>S:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien mengatakan bisikan-bisikan sudah mulai berkurang • Pasien sudah mengerti manfaat obat • Pasien merasa tenang dan adem • Pasien akan memasukkan terapi zikir dan minum obat dalam kegiatannya sehari-sehari <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien tampak mengerti pentingnya minum obat • Pasien tampak tenang • tidak murung

	<p>pasien (<i>subhanAllah, ahamdulillah, laa ilaha illah, Allahu akbar, laa hawla walaa quwwata illah billahil aliyil adzim</i>) diulang sebanyak 33 x.</p> <p>4. Menganjurkan pasien memasukkan kedalam jadwal harian Hasil : terapi zikir akan dilakukan saat selesai sholat, sedih dan ketika halusinasinya dating</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien masih menangis namun tidak sering • Pasien mampu berzikir <p>A: halusinasi pendengaran P: Lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • terapi zikir setiap malam • terapi bercakap-cakap dengan orang lain
<p>Kamis, 11/02/2021 09: 30</p>	<p>1. mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien hasil : mandi 1x/hari, makan 3x/hari, minum obat 3x/hari, berzikir 3x/hari dan menyapu 1x/hari.</p> <p>2. melatih pasien mngendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain hasil : pasien mulai aktif berbicara sama teman-temannya.</p> <p>3. menganjurkan pasien memasukkan mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain dalam kegiatan harian pasien. Hasil : Pasien akan melakukan bercerita sama temannya saat malam sebelum tidur, pada siang hari, dan saat-saat tertentu.</p>	<p>S:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien mengatakan sering berzikir dan berbincang-bincang sama temannya • Pasien mengatakan tidak membuang obatnya dan minum tepat waktu • Pasien mengatakan bahwa bisikan-bisikan sudah berkurang <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien mampu berzikir • Perasaan sedih klien tampak berkurang • Pasien tampak tenang • Pasien sudah tidak murung • Pasien tampak berbincang-bincang sama temannya <p>A: halusinasi pendengaran P: Lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terapi zikir • mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan
<p>Jum'at 12/02/2021 09:30</p>	<p>1. TAK kelompok Hasil : pasien tampak aktif dan mulai bersosialisasi sama teman-temannya</p> <p>2. Mengevaluasi kegiatan harian pasien Hasil : mandi 1 x/ hari, sholat 5 wajib</p>	<p>S:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien mengatakan sering berzikir, minum obat secara teratur, bercerita sama teman-temannya, mandi 1 kali sehari dan makan 3 kali sehari • Pasien mengatakan bisikan-bisikan sudah

		10:45	<p>dan sunah, menyampu 1 x/hari , makan 3x/ hari minum obat 3x/hari, bercakap-cakap 2 x/hari dan berzikir 4x/hari</p> <p>3. Melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan Hasil: pasien akan bercakap-cakap sama teman dan berzikir apabila halusinasinya kambuh.</p> <p>4. Menganjurkan pasien memasukan kedalam daftar harian Hasil : TAK akan dilakukan dipagi hari sekalian berolaraga.</p>	<p>tidak ada ketika berzikir dan bercakap-cakap dengan teman-temannya</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien mampu berzikir • Perasaan sedih klien tampak berkurang • Pasien tampak tenang • Pasien sudah tidak murung • Pasien tampak berbincang-bincang sama temannya • Pasien tampak mempraktekan TAK <p>A: halusinasi pendengaran</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • terapi zikir • menganjurkan pasien berteman dengan halusinasinya
--	--	-------	---	---

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Kasus

Pasien atas nama Tn. R, berusia 37 tahun, mengalami halusinasi pendengaran disebabkan oleh tekanan hidup dan pengalaman yang buruk. Berdasarkan hasil anamnesa, pasien sudah empat kali masuk rumah sakit jiwa dengan keluhan yang sama dan pengobatan sebelumnya berhasil, namun apabila putus obat maka halusinasi pendengarannya akan kambuh lagi. Orang yang mengalami gangguan jiwa, tidak boleh putus obatnya, hal ini dikarenakan obat dapat mengatasi kambuhnya halusinasi pendengaran. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, Susilo, & Putra, 2017), didapatkan hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepatuhan minum obat dan kekambuhan pada halusinasi pendengaran. Melalui upaya manajemen kepatuhan minum obat sehingga dapat menurunkan kekambuhan halusinasinya.

Pasien pernah mengalami aniaya fisik disaat berumur 33 tahun, pasien pernah ditolak oleh orangtua mantan pacarnya akibat miskin, pasien pernah bertengkar sama mantan istrinya akibat keuangan dan pasien pernah dipenjarakan. Pasien pula pernah berzina dan nyambu. Pasien masih mengingat kejadian dulu sampai saat ini. Secara teoritis, penyebab skizofrenia adalah tekanan hidup, kurangnya support keluarga dan koping yang maladaptive (Anggrain, 2018)

Saat wawancara pasien menjawab pertanyaan diberikan, kemudian dia mengalihkan pembicaraan dan kadang-kadang bertanya. Dari hasil pemeriksaan fisik diperoleh TD : 120/80 mmHg N : 80 x/Menit S : 36,5 °C P : 22 X/Menit. Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat di RS Dadi didapatkan ± 200 orang yang mengalami halusinasi dan pasien halusinasi yang dirawat di ruang sawit ± 20 orang. Penderita gangguan jiwa secara klinis akan mengalami gangguan perilaku menimbulkan berbagai gejala, salah satunya ialah gangguan perhatian/komunikasi. Dimana penderita

akan sulit memusatkan perhatiannya pada satu objek, mereka cenderung memandang berbagai arah. Begitupun pada saat komunikasi mereka cenderung mengalihkan pembicaraan dan lebih mengungkapkan sesuai apa yang dipikirkannya (Rohana, 2019).

Berdasarkan hasil anamnesa di atas menunjukkan kesesuaian dengan teori yang mengatakan bahwa halusinasi pendengaran terjadi akibat dari koping maladaptive sehingga mengakibatkan penderita mendengar suara-suara dalam dirinya yang menyuruhnya untuk melakukan sesuatu baik itu menyejukan hati maupun menyuruhnya melakukan sesuatu yang berbahaya (Yunita, Isnawati, & Addiarto, 2020). Kasus halusinasi menjadi kasus kesehatan jiwa yang paling tinggi di Indonesia, hal ini sejalan dengan penelitian (Dermawan, 2017). (Sulayuningsih, 2016) yang juga menyatakan bahwa halusinasi merupakan penyakit kesehatan jiwa di Surakarta.

Halusinasi itu sendiri disebabkan oleh Gangguan pikir/delusi, gangguan pola pikir maladaptive, tertekan, terasingkan di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak ada support sehingga penderita menarik diri dari lingkungannya karena merasa sudah tidak dihargai oleh orang lain dan sudah tidak berguna lagi, oleh karena itu klien memilih untuk menyendiri dan asyik dengan dunia khyalannya. Hal ini menyebabkan seseorang mengalami halusinasi. Padahal Allah SWT menciptakan setiap makhluknya dengan sebaik-baiknya sebagaimana dalam QS At-Tin/95: 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (QS At-Tin: 4)

Berdasarkan penafsiran Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai asbabun nuzul turunnya surah at-tin ayat 4 Allah menegaskan bahwa dia telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan psikis

terbaik. Dari segi fisik, misalnya, hanya manusia yang berdiri tegak sehingga otaknya bebas berpikir, yang berilmu, dan tangannya juga bebas bergerak untuk mengimplementasikan ilmunya itu, sehingga dapat menciptakan teknologi. Bentuk manusia yakni yang paling indah dari semua makhluk-Nya.

Dari segi psikis, hanya manusia yang memiliki pikiran dan perasaan yang sempurna. Terlebih lagi, hanya manusia yang beragama. Penegasan Allah bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan psikis terbaik yang mengandung arti bahwa fisik dan psikis manusia itu perlu dipelihara dan ditumbuhkembangkan. Fisik manusia dipelihara dan ditumbuhkembangkan dengan memberinya gizi yang cukup dan menjaga kesehatannya. psikis manusia dipelihara dan ditumbuhkembangkan dengan memberinya agama dan pendidikan yang baik. Bila fisik dan psikis manusia dipelihara dan ditumbuh kembangkan, maka manusia akan dapat memberikan kemanfaatan yang besar kepada alam ini. Sebagaimana rasullah SAW dalam berkata:

خَيْرُ لِلنَّاسِ أَنْفَعُهُمُ النَّاسِ

Artinya:

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tabrani dalam *Mu'jam al-Awsath*, Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan satu hal untuk menjadi manusia terbaik harus bermanfaat bagi manusia yang lain. Sehingga jika seseorang ingin menjadi yang terbaik maka hidupnya mesti bermanfaat bagi yang lain. Kata kuncinya pada hadis di atas adalah manfaat. Orang yang bermanfaat adalah orang yang berguna bagi orang lain.

Adapun diagnosis utama dalam penulisan ini adalah halusinasi pendengaran. Masalah ini ditemukan pada hari pertama praktek yang dibuktikan dengan buku status pasien di ruang sawit. Sedangkan halusinasi pendengaran adalah persepsi suara yang salah, yang digambarkan sebagai pengalaman kata-kata internal atau suara-suara yang tidak memiliki asal

nyata di dunia luar dan dianggap terpisah dari proses mental orang tersebut. (Hugdahl, 2017)

B. Analisis Intervensi

Tindakan keperawatan utama yang dilakukan pada diagnosis keperawatan halusinasi adalah terapi zikir. Studi yang dilakukan oleh (Emulyani & Herlambang, 2020) menyatakan bahwasanya ada pengaruh secara signifikan terhadap pemberian terapi zikir pada penurunan tanda dan gejala halusinasi. Khususnya pada STRESornya dan memberikan kenyamanan pada penderita itu sendiri. Selanjutnya terapi zikir ini sangat efektif diberikan pada pasien-pasien jiwa khususnya halusinasi pendengaran untuk mengurangi bisikan-bisikan dan mengontrol emosi klien (Hidayati, Rochmawati, & Targunawan, 2014).

Pada kasus yang ditangani oleh peneliti, dapat dianalisis bahwa terapi zikir terbukti memberikan pengaruh yang baik dan signifikan terhadap pengontrolan emosi dan mengurangi bisikan-bisikan/suara yang didengar oleh klien itu sendiri, ditandai dengan pernyataan respon verbal maupun non verbal. Dimana tanda subjektif yakni bisikan-bisikannya sudah berkurang. Sedangkan tanda objektifnya, klien mampu berzikir, klien mampu bercakap-cakap dengan orang lain, klien mampu melakukan terapi aktivitas kelompok, klien tampak tenang dan sudah tidak murung.

Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Dermawan, 2017) yang mengatakan bahwa terapi zikir dapat mengurangi bisikan-bisikan/suara yang didengar oleh penderita halusinasi pendengaran. zikir merupakan suatu tindakan mengagungkan Allah, mensucikan hati dan jiwa, mengagungkan Allah selaku hamba yang bersyukur, zikir dapat menyehatkan tubuh, dapat mengobati penyakit dengan metode ruqyah, dan mencegah manusia dari bahaya nafsu. Selain terapi zikir dapat pula dilakukan tindakan-tindakan lainnya.

Tindakan lain yang dilakukan yakni intervensi secara generalis. Pada rencana asuhan keperawatan secara generalis ada 4 strategi pelaksanaan

(SP) halusinasi, yakni teknik menghardik, pendidikan kesehatan tentang pentingnya minum obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan harian. Menurut (Livana, Rihadini, & Kandar, 2020) intervensi secara generalis dapat meningkatkan kemampuan pasien dalam mengatasi halusinasinya dan meningkatkan kemampuan coping secara adaptif pada pasien sehingga mampu untuk menurunkan frekuensi halusinasi yang ada pada diri pasien.

Strategi pelaksanaan (SP) halusinasi, yakni teknik menghardik. Teknik menghardik adalah salah satu upaya untuk mengendalikan halusinasi dengan cara menolak halusinasi yang muncul. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Anggrain, 2018) mengenai pengaruh menghardik terhadap penurunan tanda dan gejala halusinasi, didapatkan hasil bahwasanya teknik menghardik efektif terhadap penurunan tanda dan gejala halusinasi.

Strategi pelaksanaan yang kedua yakni pendidikan kesehatan tentang pentingnya minum obat. Obat pada pasien skizofrenia sangat diperlukan untuk mengatasi kekambuhan dan untuk mencegah keparahan dari skizofrenia itu sendiri, khususnya pada pasien halusinasi pendengaran. (Astuti, Susilo, & Putra, 2017). Strategi pelaksanaan yang ketiga yakni teknik bercakap-cakap. Terapi distraksi berupa teknik bercakap-cakap merupakan salah satu *peer support* pada pasien halusinasi. Strategi pelaksanaan teknik tercapak-cakap dapat mendukung stabilitas emosi pasien, karena dengan komunikasi pasien dapat berhubungan dengan orang lain sehingga memenuhi kebutuhan dasarnya dan pasien dapat mendapatkan *support* untuk menjalani pengobatan halusinasinya serta pasien tidak merasa terasingkan dari lingkungannya (Hidayati, Rochmawati, & Targunawan, 2014).

Strategi pelaksanaan yang terakhir pada pasien halusinasi yakni melakukan kegiatan harian. Dengan melakukan kegiatan harian secara terjadwal dapat mengalihkan fokus halusinasi. Sehingga pasien dihadapkan pada kehidupan realita. Dengan adanya kegiatan secara

terstruktur maka pasien sangat berpotensi sembuh secara utuh (Suhermi, 2021)


Secara teori tindakan keperawatan halusinasi didasari 4 strategi pelaksanaan (SP) yakni teknik menghardik, pendidikan kesehatan tentang pentingnya minum obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan harian. Namun pada pelaksanaan praktek yang dilakukan oleh peneliti terjadi kesenjangan dengan teori. Dimana pasien menolak untuk menghardik, karena menganggap halusinasinya baik dan nanti dianggap orang gila. Padahal secara teori teknik menghardik bertujuan untuk mengendalikan halusinasi dengan cara menolak halusinasi yang muncul. (Anggrain, 2018).

C. Alternatif Pemecahan Masalah

Beberapa intervensi yang dilakukan selain intervensi utama dan intervensi secara general yaitu penerapan aktivitas menggambar untuk mengontrol gejala halusinasi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Candra, Rikayanti, & Sudiantara, 2016) bahwa sebelum dilakukan tindakan penerapan aktivitas menggambar di rumah sakit jiwa di Bali, didapatkan jumlah halusinasi berada dalam kategori sedang (50%) tidak bisa menurunkan halusinasinya dan setelah dilakukan teknik aktivitas menggambar halusinasi skategori ringan (70% dapat mengatasi halusinasinya). Jadi teknik menggambar berpengaruh dan efektif serta dapat dijadikan sebagai intervensi mengatasi halusinasi pendengaran.

Selanjutnya adalah penerapan terapi musik. sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Succi & Apriliani, 2020) mengenai pengaruh terapi music terhadap perubahan perilaku halusinasi pendengaran. Terapi musik memiliki efek menurunkan tanda dan gejala halusinasi pendengaran, membuat pasien merasa nyaman, dapat menurunkan kecemasan, dapat menurunkan perilaku emosional dan dapat meningkatkan fungsi interpersonal. Sehingga efektif dalam menurunkan anda dan gejala halusinasi pendengaran dan dapat dijadikan sebagai intervensi pada masalah halusinasi pendengaran.

Intervensi lain yang bisa dilakukan yaitu dengan tindakan CBT (*Cognitive Behavior Theraph*). CBT merupakan suatu teknik terapi yang bertujuan untuk memodifikasi fungsi berpikir, perasaan dan bertindak dengan memberikan sugesti pada peran otak dalam menganalisa, memutuskan, bertanya, berbuat dan memutuskan kembali sehingga dengan merubah status pikiran dan perasaannya, pasien diharapkan dapat merubah tingkah lakunya dari hal tindakan maladaptif menjadi keadaptif atau dari perilaku negative ke positif. Terapi CBT ini sangat efektif menurunkan tanda dan gejala halusinasi, sesuai dengan studi yang dilakukan oleh (Wahyuni, Keliat, Yusron, & Susanti, 2011).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada pasien dengan intervensi pemberian terapi zikir dengan masalah halusinasi pendengaran, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Gambaran hasil pengkajian pada pasien halusinasi pendengaran ialah, pasien mendengar bisikan-bisikan disebabkan oleh tekanan hidup dan pengalaman yang buruk. Pasien sebelumnya sudah empat kali masuk rumah sakit jiwa dengan keluhan yang sama dan pengobatan sebelumnya berhasil, namun apabila putus obat maka halusinasi pendengarannya akan kambuh lagi.
2. Diagnosis keperawatan yang ditemukan yaitu halusinasi pendengaran, risiko perilaku kekerasan dan harga diri rendah
3. Gambaran setelah pemberian intervensi terapi zikir pada pasien yang mengalami halusinasi pendengaran yaitu terapi zikir dan teknik secara general (menghardik, pendidikan kesehatan tentang pentingnya minum obat, bercakap-cakap dan aktivitas sehari-hari) terbukti memberikan pengaruh yang baik dan signifikan terhadap pengontrolan emosi serta mengurangi bisikan-bisikan/suara yang didengar oleh pasien itu sendiri, pasien mampu berzikir, pasien mengerti pentingnya minum obat, pasien mampu bercakap-cakap dan pasien mampu melakukan kegiatan sehari-hari.
4. Implementasi pada pasien halusinasi pendengaran adalah, memberikan terapi zikir, memberikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur, mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap dan melakukan terapi aktivitas kelompok
5. Evaluasi pada pasien halusinasi pendengaran yakni teknik terapi zikir dan tindakan keperawatan secara generalis (pendidikan

kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur, mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap dan terapi aktivitas kelompok) efektif mengatasi/mengurangi bisikan-bisikan yang didengar oleh penderita.

6. Hasil analisis intervensi terapi zikir terbukti memberikan pengaruh yang baik dan signifikan terhadap pengontrolan emosi dan mengurangi bisikan-bisikan/suara yang didengar oleh klien itu sendiri, ditandai dengan respon verbal maupun non verbal pasien.

B. Saran

Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan mengenai intervensi pemberian terapi zikir dengan masalah halusinasi pendengaran terdapat beberapa saran sebagai upaya dalam mengembangkan hasil penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Penelitian dan Institusi Pendidikan

Melalui hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi peneliti di kemudian hari dapat lebih mengkaji mengenai frekuensi dan durasi yang paling tepat dalam memberikan intervensi ini. Peneliti diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai khazanah untuk memperkaya informasi dan mendukung teori dan fakta berdasarkan *evidence based practice* yang telah tertera di dalamnya.

Selain itu, hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman, serta dapat memberikan deskripsi ataupun gambaran bagi institusi pendidikan tentang efektivitas terapi zikir dengan masalah halusinasi pendengaran.

2. Bagi Pelayanan Keperawatan

Melalui hasil penelitian ini, maka diharapkan pelayanan keperawatan dapat memanfaatkan intervensi terapi zikir terhadap

penurunan tanda dan gejala halusinasi dalam mengaplikasikan asuhan keperawatan kepada pasien.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang mendapatkan masalah halusinasi baik itu diri sendiri ataupun ada keluarga maupun kerabatnya, maka diharapkan dapat segera memberikan intervensi terapi zikir agar menurunkan tanda dan gejala halusinasi dan inisiasi dini agar mengurangi keparahan halusinasi.



KEPUSTAKAAN

- Aldam, S. F., & Wardani, I. Y. (2019). Efektifitas Penerapan Standar Asuhan Keperawatan Jiwa Generalis Pada Pasien Skizofrenia Dalam Menurunkan Gejala Halusinasi. *Jurnal Keperawatan Jiwa* , 165-172.
- Astuti, A. P., Susilo, T., & Putra, S. M. (2017). Hubungan Kepatuhan Minum Obat Dengan Periode Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia: Halusinasi Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat*, 53-62.
- Anggrain, K. (2018). Pengaruh Menghardik Terhadap Penurunan Tingkat Halusinasi Dengar Pada Pasien Skizofrenia Di Rsjd Dr. Aminogondohutomo Semarang. 1-7.
- Candra, W., Rikayanti, K. N., & Sudiantara, K. (2016). Aktivitas Menggambar Dalam Mengontrol Gejala Halusinasi. *Jurnal Keperawatan*.
- Debora, O. (2017). *Proses Keperawatan Dan Pemeriksaan Fisik*. Jakarta: Salemba Medika.
- Dermawan, D. (2017). Pengaruh Terapi Psikoreligius : Dzikir Pada Pasien Halusinasi Pendengaran di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta. *Media Publikasi Penelitian*, 70-75.
- Dermawan, D. (2017). Pengaruh Terapi Psikoreligius: Dzikir Pada Pasien Halusinasi Pendengaran. *Media Publikasi Penelitian*, 70-75.
- Emulyani, & Herlambang. (2020). Pengaruh Terapi Zikir Terhadap Penurunan Tanda Dan Gejala Halusinasi Pada Pasien Halusinasi. *Jurnal Kesehatan*, 17-25.
- Hidayat, A. A. (2021). *Proses Keperawatan : Pendekatan NANDA, NIC, NOC Dan SDKI*. Surabaya: Health Books.
- Hidayati, W. C., Rochmawati, D. H., & Targunawan. (2014). Pengaruh Terapi Religius Zikir Terhadap Peningkatan Kemampuan Mengontrol Halusinasi Pendengaran Pada pasien Halusinasi Di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang. *Jurnal Ilmu Keperawatan* , 1-9.
- Hugdahl, K. (2017). *Auditory Hallucinations as Translational Psychiatry: Evidence from Magnetic Resonance Imaging. Invited Review*, 504-513.
- Kementerian Agama RI. *Mukaddimah dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Livana, Rihadini, & Kandar. (2020). Peningkatan Kemampuan Mengontrol Halusinasi Melalui Terapi Generalis Halusinasi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa*, 1-8.
- Muhith, A. (2015). *Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (Definisi Dan Indikator Diagnostik)*. Jakarta.
- RISKESDAS. (2018). *Hasil Utama RISKESDAS 2018*. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Rohana, L. (2019). Gambaran Karakteristik Klien Halusinasi Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan Tahun 2019. *Jurnal*

- Keperawatan*, 1-27.
- Ruswadi , I. (2021). *Keperawatan Jiwa : Panduan Praktis Untuk Mahasiswa*. Indramayu: Adanu Abimata.
- Shihab, Q. (2013). *Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Succi, T., & Apriliani, D. (2020). Pengaruh Terapi Musik Terhadap Perubahan Perilaku Penderita Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Skizofrenia: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 60-70.
- Suhermi. (2021). Pengaruh Terapi *Activity Daily Living* terhadap Pemulihan Pasien Halusinasi. *Jurnal Penelitian Kesehatan*, 54-57.
- Sulayuningsih, E. (2016). Pengalaman Perawat Dalam Mengimplementasikan Strategi Pelaksanaan Tindakan Keperawatan Pada Pasien Halusinasi Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. *Jurnal Keperawatan*.
- Umam, & Reliani. (2015). Pelaksanaan Teknik Mengontrol Halusinasi: Kemampuan Klien Skizofrenia Mengontrol Halusinasi. *The Sun*, 68-74.
- Wahyuni, S. E., Keliat, B. A., Yusron, & Susanti, H. (2011). Penurunan Halusinasi Pada Klien Jiwa Melalui *Cognitive Behavior Therapy*. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 185-192.
- Widiyawati, W. (2020). *Keperawatan Jiwa*. Malang: Linterasi Nusantara.
- Wuryaningsih, E. W., Windarwati, H. D., Dewi, E. I., Deviantony, F., & Hadi, E. (2020). *Keperawatan Kesehatan Jiwa I*. Jember: Universitas Jember.
- Yunita, R., Isnawati, I. A., & Addiarto, W. (2020). *Buku Ajar Psikoterapi self Help Group Pada Keluarga Pasien Skizofrenia*. Galesong: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.
- Yunita, R., Isnawati, I. A., & Addiarto, W. (2020). *Buku Ajar Psikoterapi Self Help Group Pada Keluarga Pasien Skizofrenia*. Takalar: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.

L

A

M

P

I



R

A

N

Terapi zikir Pada Pasien Dengan Masalah Halusinasi Pendengaran

ORIGINALITY REPORT

15%	15%	3%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.merdeka.com Internet Source	3%
2	repo.stikesperintis.ac.id Internet Source	2%
3	pt.scribd.com Internet Source	2%
4	www.jurnal.payungnegeri.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1%
7	www.scribd.com Internet Source	1%
8	es.scribd.com Internet Source	1%
9	lib.akpermpd.ac.id Internet Source	1%

10	restuputriandiansari.blogspot.com Internet Source	1 %
11	repository.poltekkes-denpasar.ac.id Internet Source	1 %
12	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
13	eprints.kertacendekia.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



NAMA : WA ODE YULIANTI TOGALA

Lahir di lundo, 31 Juli 1998, penulis merupakan anak ke empat dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Tasmin Togala dan Ibu Wa Ode Sapaeno. Penulis akrab di panggil **Odhe**, ini mengawali pendidikan sekolah dasar di SDN 13 Lawa, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 6 Lawa dan sekolah di MA Al-Ikhlash Labunti. Setelah itu penulis memasuki bangku kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan dan langsung melanjutkan Profesi Ners di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah, Do'a kedua orang tua, kerja keras, bantuan keluarga, dan do'a teman-teman. Penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun karya tulis (studi kasus) yang berjudul "Intervensi Terapi Zikir Pada Pasien Dengan Masalah Halusinasi Pendengaran".

Pada masa SMP penulis bergabung dalam organisasi Pramuka dan pada masa aliyah penulis bergabung dalam organisasi OSIS, Pramuka dan Pencat Silat. Selanjutnya, selama di perguruan tinggi penulis hanya memasuki organisasi, CSSMora UIN Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R