

**STUDI KASUS : IMPLEMENTASI TERAPI DZIKIR
PADA Tn. A DALAM MENGONTROL
HALUSINASI PENDENGARAN**



Tugas Akhir Ners

Oleh :

AYU RAHAYU, S.Kep
70900119045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
PROGRAM STUDI PROFESI NERS ANKATAN XVI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021

**STUDI KASUS : IMPLEMENTASI TERAPI DZIKIR
PADA Tn. DALAM MENGONTROL
HALUSINASI PENDENGARAN**



Tugas Akhir Ners

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

OLEH:

**AYU RAHAYU, S.Kep
70900119045**

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS ANGGARAN XVI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Rahayu, S.Kep
NIM : 70900119045
Tempat/ Tgl Lahir : Bima, 25 Maret 1998
Jurusan/ Prodi : Keperawatan/ Ners
Konsentrasi : Departemen Keperawatan Jiwa
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Mamoa 5A Lr. 3
Judul : Studi Kasus : Implementasi Terapi Dzikir pada Tn. A dalam Mengontrol Halusinasi Pendengaran

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A

Gowa, 13 Juli 2021

Penyusun,



Ayu Rahayu, S.Kep
NIM:70900119045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Ayu Rahayu NIM: 70900119045, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Studi Kasus : Implementasi Terapi Dzikir pada Tn. A untuk Mengontrol Halusinasi Pendengaran”, memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 13 Juli 2021



(Rasmawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J) (Hj. Syisnawati, S.Kep., Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J)

ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS


Tugas Akhir Ners yang berjudul “Studi Kasus : Implementasi Terapi Dzikir pada Tn. A dalam Mengontrol Halusinasi Pendengaran”, yang disusun oleh Ayu Rahayu, S.Kep, NIM : 70900119045 mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari bertepatan dengan, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan

Samata, November 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Andi Budiyanto, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Rasmawati., S.Kep., Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J	(.....)
Pembimbing II	: Syisnawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,


Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes
NIP: 198007012006042002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Shalawat beserta salam kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw. Tugas akhir ners yang berjudul “Studi Kasus : Terapi Dzikir pada Tn. A untuk Mengontrol Halusinasi Pendengaran” ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan di Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. dr. Syatirah, S.Ked., M.Kes., Sp.A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. Patimah, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Kepala Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ns. Rasmawati, S.Kep., M.Kep.,Sp.Kep.J dan Ns. Hj. Sysnawati, S.Kep., M.Kep.,Sp.Kep.J selaku Pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini.
4. Ns. Andi Budiyanto, S.Kep., M.Kep dan Prof. Dr. H.M. Dahlan, M.Ag selaku penguji 1 dan penguji 2
5. Seluruh Dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Orang tua tercinta Bapak Ahmad dan ibu Rukmini terimakasih do'a serta dukungan baik moril maupun materi yang telah diberikan kepada penulis dan terimakasih juga keluarga tercinta terimakasih yang tak terhingga atas doa dan dukungannya selama ini.

7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Profesi Ners angkatan XVI yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan tugas akhir Ners ini.

Penulis mengharapkan tugas ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik di waktu yang akan datang. Sebagai akhir penulis berdo'a semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahannya mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt, amin.
Wassalamu'alaikum wr.wb



Gowa, Juli 2021

Penulis

ABSTRAK

Nama : Ayu Rahayu, S.Kep
NIM : 70900119045
Judul : “Studi Kasus : Implementasi Terapi Dzikir pada Tn. A dalam Mengontrol Halusinasi Pendengaran “

Latar Belakang : Kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi sehat yang terdiri dari sehat emosional, psikologis, dan sosial yang dapat dilihat dari hubungan interpersonal yang memuaskan, perilaku yang efektif, konsep diri yang mengarah ke positif serta kestabilan emosional (Direja, 2011). Gangguan jiwa berat yang biasa terjadi yaitu masalah skizofrenia. Skizofrenia yaitu suatu gangguan psikotik yang ditandai dengan adanya pembagian antara emosi, pikiran, dan perilaku seseorang terkena penyakit tersebut. Menurut data *World Health Organization* (WHO, 2018) terdapat sekitar 450 juta orang di dunia yang terkena skizofrenia. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018 menunjukkan bahwa prevalensi skizofrenia/psikosis di Indonesia sebanyak 7% per 1000 rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1000 rumah tangga, terdapat 70 rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga (ART) dengan pengidap skizofrenia/psikosis berat. Menurut Keliat (2011) bahwa halusinasi yaitu salah satu gejala gangguan jiwa yang terjadi pada seseorang yang ditandai dengan perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu yaitu mendengarkan suara, penglihatan, pengecapan, perabaan ataupun penghidung yang sebenarnya merasakan stimulus yang tidak ada atau tidak terjadi. **Tujuan** : untuk melakukan Asuhan Keperawatan dengan memberikan terapi Dzikir pada Tn. A dengan masalah gangguan sensori persepsi : Halusinasi pendengaran. **Metode** : studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan pendokumentasian, pelaksanaan pemberian terapi dzikir untuk mengontrol halusinasi pada pasien dengan halusinasi pendengaran. **Kesimpulan** : Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa pemberian terapi dzikir dapat mengontrol halusinasi pasien dengan halusinasi pendengaran dan dapat menurunkan tanda dan gejala pasien dengan halusinasi pendengaran.

Kata Kunci : Terapi Dzikir, Halusinasi Pendengaran

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.....	6
D. Manfaat Penulisan	6
BAB II TINJAUAN TEORI.....	8
A. Konsep Halusinasi	8
B. Konsep Keperawatan	20
C. Pendekatan Teori Keperawatan	40
D. Evidence Based Nursing : Terapi Dzikir.....	41
BAB III LAPORAN KASUS	44
A. Pengkajian	44
B. Diagnosis Keperawatan.....	54
C. Intervensi	55
D. Implementasi dan Evaluasi.....	61
BAB IV PEMBAHASAN.....	67
A. Analisa Kasus	67
B. Analisa Intervensi	72
C. Alternatif Pemecahan Masalah	76
BAB V PENUTUP.....	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi sehat yang terdiri dari sehat emosional, psikologis, dan sosial yang dapat dilihat dari hubungan interpersonal yang memuaskan, perilaku yang efektif, konsep diri yang mengarah ke positif serta kestabilan emosional. Kesehatan jiwa yaitu kondisi individu yang tubuh dan berkembang serta untuk mempertahankan kesesuaian untuk mengendalikan diri agar terhindar dari stress yang serius dan berlebihan (Direja, 2011).

Gangguan jiwa berat yang biasa terjadi yaitu masalah skizofrenia. Skizofrenia yaitu suatu gangguan psikotik yang ditandai dengan adanya pembagian antara emosi, pikiran, dan perilaku seseorang terkena penyakit tersebut. Pembagian pada pasien digambarkan dengan adanya gejala yang muncul baik bersifat mendasar sampai yang memiliki sifat yang spesifik, antara lain adanya gangguan yang ditandai dengan banyak gangguan. Gejala yang mendasar antara lain adanya gangguan afektif, autisme, dan rasa ketakutan dalam dirinya.

Menurut Kaplan, et al (2010) bahwa Skizofrenia terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor biologis, genetic dan faktor psikologis. Faktor yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan jiwa antara lain faktor genetic, neuroanatomi, dan neurokimia yaitu gangguan pada struktur dan fungsi otak, serta disebabkan karena imunovirologi, psikologis dan faktor sosial (Videbeck, 2008)

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2018) terdapat sekitar 450 juta orang di dunia yang terkena skizofrenia. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018 menunjukkan bahwa prevalensi skizofrenia/psikosis di Indonesia sebanyak 7% per 1000 rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1000 rumah tangga, terdapat 70 rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga (ART) dengan pengidap skizofrenia/psikosis berat. Berdasarkan

catatan Kemenkes RI pada tahun 2019, prevalensi gangguan kejiwaan tertinggi terdapat di Provinsi Bali dan DI Yogyakarta dengan masing-masing prevalensi menunjukkan angka 11,1% dan 10,4% per 1000 rumah tangga yang memiliki ART dengan pengidap skizofrenia/psikosis. Selanjutnya diikuti oleh provinsi-provinsi lain diantaranya : Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat secara berurutan.

Adapun gejala sekundernya yaitu halusinasi dan waham (Stuart Gail W, 2013). Kasus halusinasi yang paling banyak ditemukan yaitu halusinasi pendengaran sekitar 70%, sekitar 20% penderita yang mengalami halusinasi penglihatan dan 10% kasus halusinasi penciuman, pengecapan serta perabaan. (Mamnu'ah, 2010)

Halusinasi yaitu penilaian yang salah (False perception) tanpa adanya obyek luar. Penilaian yang dihasilkan tidak seperti penilaian yang normal pada umumnya, ada objek luar yang membentuk penilaian. Halusinasi dapat dipengaruhi oleh imajinasi mental dan selanjutnya diproyeksikan keluar sehingga seakan-akan datangnya dari luar dirinya, sehingga orang yang mengalami halusinasi sangat berdampak buruk (Ibrahim, 2011).

Menurut Keliat (2011) bahwa halusinasi yaitu salah satu gejala gangguan jiwa yang terjadi pada seseorang yang ditandai dengan perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu yaitu mendengarkan suara, penglihatan, pengecapan, perabaan ataupun penghidung yang sebenarnya merasakan stimulus yang tidak ada atau tidak terjadi.

Halusinasi pendengaran yaitu individu mendengar suara-suara atau kebisingan, suara kebisingan yang kurang keras sampai kata-kata yang jelas berbicara tentang klien, dan bahkan sampai percakapan lengkap antara dua orang atau lebih dimana klien biasanya mendengarkan sesuatu yang disuruh melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya maupun orang lain disekitarnya (Muhith, 2015).

Adapun tanda dan gejala yang biasa muncul pada pasien klien dengan halusinasi sering kali menunjukkan perilaku agresif seperti marah, merasa

tertekan, tidak dapat melakukan aktivitas dasar sehari-hari, menarik diri dari lingkungan bahkan resiko terjadinya bunuh diri. Halusinasi apabila tidak dilakukan perawatan serta pengobatan akan berbahaya bagi diri sendiri mapupun orang lain serta lingkungan (Suryani, 2013).

Dampak yang terjadi akibat halusinasi yaitu individu bisa terjadi kehilangan control dirinya sehingga dapat membahayakan dirinya, orang lain dan lingkungan disekitarnya, hal ini terjadi karena individu yang mengalami halusinasi sudah mengalami kepanikan serta perilakunya dikendalikan oleh pikiran halusina tersebut. Pada saat kondisi individu mengalami halusinasi bisa melakukan bunuh diri ataupun bisa membunuh orang disekitarnya (Yosep, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat yang bekerja diruangan kenari RSKD Makassar bahwa terdapat 74 pasien gangguan jiwa yang terdiri dari masalah halusinasi, perilaku kekerasan, waham, harga diri rendah. Dari beberapa pasien yang mengalami halusinasi penulis menganalisis pasien Tn. A yang mengalami halusinasi pendengaran. Berdasarkan data pasien di ruangan Wisma Nuri RSJ Prof. H.B. Sa'anin Padang pada tahun 2020 didapatkan 10 orang (43,75%) yang mengalami halusinasi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi resiko buruk baik terhadap klien, orang sekitar dan lingkungan yaitu dengan cara memberikan terapi pada pasien yang mengalami halusinasi. Menurut *National Institute Mental Of United States* (2007) bahwa terapi yang digunakan untuk mengontrol halusinasi pada pasien skizofrenia yaitu dengan cara memberikan terapi terapi medis dan psikoterapi. Bahwa banyak pasien skizofrenia yang menggunakan agama dan atau spiritualnya sebagai alat koping. Hasil penelitian ini ditemukan berdoa, istigfar dan sholat dapat mengurangi gejala yang dialami pasien skizofrenia. Hal ini didukung oleh (Stuart, 2016) yang menyatakan spiritual koping dapat menjadi koping untuk symptom managemen pada pasien skizofrenia seperti halusinasi, hal ini sangat mampu untuk proses penyembuhan dan kekuatan bagi pasien.

Salah satu terapi yang direkomendasikan untuk mengatasi halusinsi yaitu terapi psikoreligius. Terapi ini yaitu salah satu psikoterapi yang mengkombinasikan untuk pendekatan kesehatan jiwa modern dan pendekatan pada aspek religious atau keagamaan yang memiliki tujuan untuk peningkatan mekanisme coping atau mengatasi masalah terutama halusinasi (Yosep, 2010).

Terapi religious antara lain terapi dzikir, apabila dilafalkan secara baik dan benar bisa membuat hati menjadi tenang dan rileks. Terapi dzikir juga dapat diterapkan pada pasien yang mengalami halusinasi karena jika pasien melakukan terapi dzikir dengan tekun dan memusatkan perhatiannya dengan sempurna (khusus) maka dapat memberikan dampak saat halusinasi itu muncul, pasien juga bisa menghilangkan suara-suara yang muncul apabila menyibukkan diri dengan malafazkan dzikir (Mery Fanada, 2012).

Terapi psikoreligius yaitu Dzikir secara Islami, yaitu suatu perlakuan dan pengobatan yang ditujukan kepada penyembuhan suatu penyakit mental, kepada setiap individu, dengan kekuatan batin atau ruhani, yang berupa ritual keagamaan bukan pengobatan dengan obat-obatan, dengan tujuan untuk memperkuat iman seseorang agar ia dapat mengembangkan potensi diri dan fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal, dengan cara mensosialkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ke dalam diri. Seperti melakukan shalat wajib, berdoa dan berzikir dari perbuatan tersebut dapat membuat hidup selaras, seimbang dan sesuai dengan ajaran agama (Yusuf & Fani Okviansanti, 2016)

Dzikir juga di artikan “menjaga dalam ingatan”. Jika berdzikir kepada Allah artinya menjaga ingatan agar selalu ingat kepada Alla ta’ala. Dzikir menurut syara’ adalah ingat kepada Allah dengan etika tertentu yang sudah ditentukan AlQur’an dan hadits dengan tujuan mensucikan hati dan mengagungkan Allah. Menurut Ibn Abbas ra. Dzikir adalah konsep, wadah, sarana, agar manusia tetap terbiasa dzikir (ingat) kepadaNya ketika berada diluar shalat. Tujuan dari dzikir adalah mengagungkan Allah, mensucikan hati dan jiwa, mengagungkan Allah selaku hamba yang bersyukur, dzikir dapat

menyehatkan tubuh, dapat mengobati penyakit dengan metode Ruqyah, mencegah manusia dari bahaya nafsu (Arham, 2015).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Shah et al. (2011) mengungkap bahwa “religious practices” dan kepercayaan personal merupakan prediktor dari kualitas hidup pasien skizofrenia. Penelitian ini menunjukkan bahwa selain farmakologis dan non farmakologis, tenaga kesehatan professional perlu untuk meningkatkan praktek religious dari pasien. Sehingga banyak pasien gangguan jiwa menggunakan agama sebagai alat untuk mengatasi kondisi akibat penyakit mereka. Spiritual bahkan mungkin dapat memegang peran kunci dalam pemulihan psikologis dari gangguan jiwa berat seperti skizofrenia (Sari, 2014).

Dari hasil jurnal penelitian (Deden Dermawan, 2017) tentang pengaruh terapi psikoreligius : Dzikir pada pasien halusinasi pendengaran yang dilakukan kepada 8 orang responden dirasakan oleh responden umumnya memiliki ciri-ciri yang sama, dari 8 responden tersebut 5 responden mengatakan bahwa halusinasi yang dialaminya berkurang setelah melakukan dzikir, dan 3 responden lainnya tidak mengalami perubahan. Sebuah penelitian kualitatif oleh Suryani (2013) telah mengungkap pentingnya berdzikir dan berdoa dalam mengusir halusinasi. Dalam penelitian tersebut Dzikir yang dilakukan oleh pasien bentuknya berbeda-beda. Ada yang dengan membaca subhanallah, ada yang membaca Allahu akbar, ada yang kombinasi diantaranya dengan membaca subhanallah, Allahuakbar dan astagfirullah (Suryani, 2013). Mereka melakukan dzikir sampai halusinasinya hilang, lamanya berdzikirpun bervariasi dari 15-30 menit. Hasil penelitian tersebut belum bisa digeneralisasi untuk semua pasien halusinasi karena penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif (fenomenologi). Karena itu diperlukan penelitian kuantitatif agar dapat membuktikan efektifitas dzikir dalam mengontrol halusinasi pendengaran.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan analisis terapi dzikir pada Tn. A untuk mengontrol masalah halusinasi pendengaran di Ruang Kenari RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa yang akan menjadi rumusan masalah yaitu implementasi terapi dzikir pada Tn. A untuk Mengontrol Halusinasi Pendengaran diruangan Kenari RSKD Provinsi Sulawesi Selatan

C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yaitu untuk memberikan Asuhan Keperawatan pada Tn. A dengan masalah gangguan sensori persepsi : Halusinasi pendengaran

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran pengkajian keperawatan pada Tn. A dengan masalah gangguan sensori persepsi : Halusinasi pendengaran
- b. Untuk mengetahui gambaran diagnosa keperawatan pada Tn. A dengan masalah gangguan sensori persepsi : Halusinasi pendengaran
- c. Untuk mengetahui gambaran intervensi keperawatan pada Tn. A dengan masalah gangguan sensori persepsi : Halusinasi pendengaran
- d. Untuk mengetahui gambaran implementasi keperawatan pada Tn. A dengan masalah gangguan sensori persepsi : Halusinasi pendengaran
- e. Untuk mengetahui gambaran evaluasi keperawatan pada Tn. A dengan masalah gangguan sensori persepsi : Halusinasi pendengaran
- f. Untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan dengan intervensi terapi Dzikir pada Tn. A dengan masalah gangguan sensori persepsi : Halusinasi pendengaran

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil tugas akhir ners ini dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh mahasiswa ataupun pendidikan pada bidang ilmu terutama tentang analisis asuhan keperawatan jiwa dengan masalah gangguan sensori persepsi : Halusinasi pendengaran dengan terapi dizkir untuk mengontrol halusinasi pendengaran.

2. Manfaat Aplikatif

Hasil tugas akhir ners ini dapat digunakan sebagai salah satu terapi non farmakologi pada pasien yang mengalami masalah gangguan sensori persepsi : Halusinasi pendengaran dengan memberikan terapi dzikir untuk mengontrol halusinasi pendengaran.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Medis

1. Definisi

Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan sensori persepsi yang dialami oleh pasien gangguan jiwa. Pasien merasakan sensasi berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghiduan tanpa stimulus yang nyata (Keliat & Helena, 2018)

Halusinasi merupakan gangguan persepsi dimana klien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Suatu penerapan panca indra tanpa ada rangsangan dari luar. Suatu penghayatan yang dialami suatu persepsi melalui panca indra tanpa stimulus eksteren : Persepsi palsu. Berbeda dengan ilusi dimana klien mengalami persepsi yang salah terhadap stimulus, salah persepsi pada halusinasi terjadi tanpa adanya stimulus eksternal yang terjadi. Stimulus internal dipersepsikan sebagai sesuatu yang nyata ada oleh klien (Abdul Natsir & Abdul Muhith, 2011).

2. Etiologi

Halusinasi merupakan salah satu gejala dalam menentukan diagnosis klien yang mengalami psikotik, khususnya skizofrenia. Halusinasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni (Muhith, 2015) :

a. Faktor predisposisi

1) Faktor perkembangan

Jika tugas perkembangan mengalami hambatan dan hubungan interpersonal terganggu, maka individu akan mengalami stres dan kecemasan

2) Faktor neurobiology

Ditemukan bahwa korteks prefrontal dan korteks limbik pada klien dengan skizofrenia tidak pernah berkembang penuh. Selain itu,

klien juga akan mengalami penurunan volume dan fungsi otak abnormal. Neurotransmitter juga ditemukan tidak normal khususnya dopamine, serotonin dan glutamat.

3) Studi neurotransmitter

Skizofrenia diduga juga disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan neurotransmitter serta dopamine berlebihan sehingga jumlah dopamine tidak seimbang dengan kadar serotonin.

4) Faktor sosiokultural

Seseorang yang merasa tidak diterima di lingkungan sejak bayi akan membekas di ingatannya sampai dewasa dan ia akan merasa di singkirkan, kesepian dan tidak percaya pada lingkungannya.

5) Faktor biokimia

Adanya stress yang berlebihan yang dialami oleh seseorang maka di dalam tubuhnya akan dihasilkan suatu zat yang dapat bersifat halusinogenik neurokimia sehingga menjadi ketidakseimbangan asetil kolin dan dopamine.

6) Faktor psikologis

Tipe kepribadian yang lemah tidak bertanggung jawab akan mudah terjerumus pada penyalahgunaan zat adaptif. Klien lebih memilih kesenangan sesaat dan lari dari alam nyata menuju alam nyata.

7) Faktor genetik

Telah diketahui bahwa secara genetik skizofrenia diturunkan melalui kromosom-kromosom tertentu. Namun demikian, kromosom yang keberapanya yang menjadi faktor penentu gangguan ini sampai sekarang masih dalam tahap penelitian. Anak kembar identik memiliki kemungkinan mengalami skizofrenia sebesar 50% jika salah satunya mengalami skizofrenia, sementara dizygote peluangnya sebesar 15%. Seorang anak yang salah satu orang tuanya mengalami Skizofrenia berpeluang 15% mengalami skizofrenia, sementara bila kedua orang tuanya mengalami skizofrenia maka peluangnya menjadi 35%.

8) Teori virus

Paparan virus influenza pada trimester ke-3 kehamilan dapat menjadi faktor predisposisi schizofrenia.

9) Psikologis

Beberapa kondisi psikologis yang menjadi faktor predisposisi schizofrenia antara lain anak yang di pelihara oleh ibu yang suka cemas, terlalu melindungi, dingin dan tak berperasaan, sementara ayah yang mengambil jarak dengan anaknya.

b. Faktor presipitasi

1) Dimensi fisik

Halusinasi dapat di timbulkan oleh beberapa kondisi fisik seperti kelelahan yang luar biasa, penggunaan obat-obatan, demam hingga delirium, intoksikasi alkohol dan kesulitan waktu tidur dalam waktu yang lama.

2) Dimensi emosional

Perasaan cemas yang berlebihan atas dasar problem yang tidak dapat di atasi merupakan penyebab halusinasi itu terjadi. Isi dari halusinasi dapat berupa perintah memaksa dan menakutkan. Klien tidak sanggup lagi menentang perintah tersebut sehingga dengan kondisi tersebut klien berbuat sesuatu terhadap ketakutan tersebut.

3) Dimensi intelektual

Dalam dimensi intelektual ini merangsang bahwa individu dengan halusinasi akan memperlihatkan adanya penurunan fungsi ego. Pada awalnya halusinasi merupakan usaha dari ego sendiri untuk melawan implus yang menekan, namun merupakan suatu hal yang menimbulkan kewaspadaan yang dapat mengambil seluruh perhatian klien dan tidak jarang akan mengontrol semua perilaku klien.

4) Dimensi sosial

Klien mengaggap bahwa hidup bersosialisasi di alam nyata itu sangatlah membahayakan, klien asik dengan halusinasinya. Seolah-olah dia merupakan tempat akan memenuhi kebutuhan akan interaksi sosial, kontrol diri dan harga diri yang tidak di dapatkan dalam dunia nyata. Isi halusinasi di jadikan sistem kontrol oleh individu tersebut, sehingga jika sistem halusinasi berupa ancaman, dirinya maupun orang lain. Oleh karna itu, aspek penting dalam melakukan intervensi keperawatan klien dengan mengupayakan suatu proses interaksi yang menimbulkan pengalam interpersonal yang memuaskan, serta menguasai klien tidak menyendiri sehingga klien selalu berinteraksi dengan lingkungan dan halusinasi tidak langsung.

5) Dimensi spiritual

Klien mulai dengan kemampuan hidup, rutinitas tidak bermakna, hilangnya aktifitas ibadah dan jarang berupaya secara spiritual untuk menysucikan diri. Klien sering memaki takdir tetapi lemah dalam upaya menjemput rejeki, menyalahkan lingkungan dan orang lain yang menyebabkan takdirnya memburuk.

3. Manifestasi Klinis

Adapun Tanda dan gejala pada pasien halusinasi bergantung pada jenis halusinasi yang dialaminya. Yosep (2011) mengungkapkan bahwa beberapa tanda dan gejala yang dapat dijadikan untuk menegakkan diagnosis pada pasien halusinasi yaitu :

a. Halusinasi pendengaran

Data subjektif:

- 1) Mendengar sesuatu yang menyuruh klien melakukan sesuatu yang berbahaya
- 2) Mendengar suara yang mengajak bercakap-cakap
- 3) Mendengar suara atau bunyi
- 4) Mendengar seseorang yang sudah meninggal

- 5) Mendengar suara yang mengancam diri klien atau orang lain atau yang membahayakan

Data Objektif:

- 1) Mengarahkan telinga pada sumber suara
- 2) Bicara atau tertawa sendiri
- 3) Marah-marah tanpa sebab
- 4) Menutup telinga mulut komat kamit
- 5) Ada gerakan tangan

b. Halusinasi penglihatan

Data subyektif :

- 1) Melihat orang yang sudah meninggal
- 2) Melihat makhluk tertentu
- 3) Melihat bayangan
- 4) Melihat sesuatu yang menakutkan
- 5) Melihat cahaya yang sangat terang

Data obyektif :

- 1) Tatapan mata pada tempat tertentu
- 2) Menunjuk ke arah tertentu
- 3) Ketakutan pada objek yang dilihat

c. Halusinasi penghidung

Data subyektif :

- 1) Mencium sesuatu seperti bau mayat, darah, bayi, fase, bau masakan, dan parfum yang menyengat
- 2) Klien mengatakan sering mencium bau sesuatu

Data obyektif :

- 1) Ekspresi wajah seperti sedang mencium
- 2) Adanya gerakan cuping hidung
- 3) Mengarahkan hidung pada tempat tertentu

d. Halusinasi peraba

Data subyektif :

- 1) Klien mengatakan seperti ada sesuatu di tubuhnya

- 2) Merasakan ada sesuatu di tubuhnya
- 3) Merasakan ada sesuatu di bawah kulit
- 4) Merasakan sangat panas, atau dingin
- 5) Merasakan tersengat aliran listrik

Data obyektif :

- 1) Mengusap dan menggaruk kulit
- 2) Meraba permukaan kulit
- 3) Menggerak gerakan badanya
- 4) Memegangi terus area tertentu

e. Halusinasi pengecap

Data subyektif :

- 1) Merasakan seperti sedang makan sesuatu
- 2) Merasakan ada yang dikunyah di mulutnya

Data obyektif :

- 1) Seperti mengecap sesuatu
- 2) Mulutnya seperti mengunyah
- 3) Meludah atau mutah

f. Halusinasi kinestetik

Data subyektif :

- 1) Klien mengatakan tubuh nya tidak ada fungsinya
- 2) Merasakan tidak ada denyut jantung
- 3) Perasaan tubuhnya melayang layang

Data obyektif :

- 1) Klien menatap dan melihati tubuhnya sendiri
- 2) Klien memegangi tubuhnya sendiri

4. Fase Halusinasi

Fase halusinasi dibedakan menjadi 4 fase yakni (Stuart dan Laraia dalam Muhith, 2015) :

Fase Halusinasi	Karakteristik	Perilaku Klien
FASE 1 <i>Comforting</i> ansietas sebagai	Klien mengalami perasaan seperti ansietas, kesepian, rasa bersalah dan takut mencoba	1. Tersenyum dan tertawa tidak sesuai 2. Menggerekkan bibir tanpa

halusinasi menyenangkan	untuk befokus pada pikiran menyenangkan untuk meredakan ansietas individu mengenal bahwa pikiran-pikiran dan pengalaman sensori berada dalam kondisi kesadaran jika ansietas dapat ditangani dengan nonpsikotik	suara 3. Pergerakan mata yang cepat 4. Respon verbal yang lambat jika sedang asyik 5. Diam dan asyik sendiri
FASE II <i>Complementing</i> ansietas berat halusinasi memberatkan	Pengalaman sensasi menjijikan dan menakutkan. Klien mulai lepas kendali dan mungkin mencoba untuk mengambil jarak dengan sumber yang dipersepsikan. Klien mungkin mengalami pengalaman sensori dan menarik diri dari orang lain	1. Ansietas 2. Peningkatan denyut jantung, pernafasan dan tekanan darah 3. Rentang perhatian menyempit 4. Asyik dengan pengalaman sensori 5. Kehilangan kemampuan membedakan halusinasi dan realita.
FASE III <i>Controlling</i> ansietas berat pengalaman sensori jadi berkuasa	1. Klien berhenti melakukan perlawanan terhadap halusinasi dan menyerah pada halusinasinya 2. Isi halusinasi menjadi menarik 3. Klien mengalami pengalaman kesepian jika sensori halusinasinya berhenti	1. Kemauan yang dikendalikan halusinasi akan lebih diikuti 2. Kesukaran hubungan dengan orang lain 3. Rentang perhatian hanya beberapa detik / menit adanya 4. Adanya tanda-tanda fisik ansietas berat berkeringat, tremor, tidak mampu mematuhi perintah 5. Isi halusinasi menjadi atraktif 6. Perintah halusinasi ditaati 7. Tidak mampu mengikuti perintah dari perawat, tremor dan berkeringat.
FASE IV <i>Conquering</i> Panik Umumnya menjadi melebur dalam	1. Pengalaman sensori menjadi mengancam jika klien mengikuti perintah halusinasinya 2. Halusinasi berakhir dari beberapa jam/ hari jika	1. Perilaku error akibat panik 2. Potensi kuat <i>suicide</i> / <i>homicide</i> 3. Aktifitas fisik merefleksikan isi halusinasi seperti perilaku kekerasan,

halusinasinya	tidak ada intervensi terapeutik	agitasi menarik diri atau katatonic 4. Tidak mampu merespon perintah yang kompleks 5. Tidak mampu merespon lebih dari satu orang 6. Agitasi atau kataton
---------------	---------------------------------	---

5. Rentang Respon

Halusinasi merupakan salah satu respon maladaptif individu yang berada dalam rentang respon neurobiologis. Ini merupakan respon neurobiologis yang paling maladaptif. Jika klien sehat persepsinya akurat, mampu mengidentifikasi dan menginterpretasikan stimulus berdasarkan informasi yang diterima melalui panca indera. Klien dengan halusinasi mempersepsikan suatu stimulus panca indera walaupun sebenarnya stimulus tersebut tidak ada. respon individu (yang karena suatu hal mengalami kelaian persepsi) yaitu salah mempersepsikan stimulus yang diterimanya yang disebut sebagai ilusi. Klien mengalami ilusi jika interpretasi yang dilakukan terhadap stimulus pancaindera tidak akurat sesuai dengan stimulus yang diterima (Muhith, 2015).

Berikut adalah gambaran rentang respons halusinasi (Wulandari, 2018) :



Keterangan rentang respon menurut Farida & Yudi (2010) adalah sebagai berikut :

a. Respon Adatif

Respon adaptif adalah respon yang dapat diterima oleh norma-norma sosial budaya yang berlaku. Dengan kata lain individu tersebut dalam batas normal jika menghadapi suatu masalah akan dapat memecahkan masalah tersebut. Respon adaptif antara lain sebagai berikut :

- 1) Pikiran logis yaitu ide yang berjalan secara logis dan koheren
- 2) Persepsi akurat yaitu proses diterimanya rangsangan melalui panca indera yang didahului oleh perhatian sebagai individu yang sadar tentang sesuatu yang ada di dalam maupun diluar dirinya
- 3) Emosi konsisten adalah manifestasi perasaan yang konsisten atau efek keluar disertai banyak komponen fisiologik dan biasanya berlangsung tidak lama
- 4) Perilaku sesuai yaitu perilaku individu berupa tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah masih dapat diterima oleh norma-norma sosial dan budaya umum yang berlaku
- 5) Hubungan sosial yaitu hubungan yang dinamis menyangkut antara individu dan individu, individu dan kelompok dalam bentuk kerja sama

b. Respon psikososial

- 1) Proses pikiran kadang terganggu (ilusi) yaitu interpretasi yang salah atau menyimpang tentang penyerapan (persepsi) yang sebenarnya sungguh-sungguh terjadi karena adanya rangsangan panca indera
- 2) Menarik diri yaitu percobaan untuk menghindari interaksi dengan orang lain.
- 3) Emosi berlebihan atau kurang yaitu manifestasi perasaan atau efek keluar berlebihan atau kurang
- 4) Perilaku tidak sesuai atau tidak biasa yaitu perilaku individu berupa tindakan nyata dalam menyelesaikan masalahnya tidak diterima oleh norma-norma sosial atau budaya umum yang berlaku.

c. Respon maladaptif

Respon maladaptif adalah respon individu dalam menyelesaikan masalah yang menyimpang dari norma-norma sosial budaya dan lingkungan, adapun respon maladaptif ini meliputi :

- 1) Waham adalah suatu keyakinan yang salah dipertahankan secara kuat atau terus menerus namun tidak sesuai dengan kebenaran
- 2) Halusinasi adalah hilangnya kemampuan manusia dalam membedakan rangsangan internal (pikiran) dan rangsangan eksternal (dunia luar). Klien memberi persepsi atau pendapat tentang lingkungan tanpa ada objek atau rangsangan yang nyata.
- 3) Isolasi sosial yaitu menghindari dan dihindari oleh lingkungan sosial dan berinteraksi

6. Proses Terjadinya Masalah

Halusinasi diawali dengan adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi pada diri seseorang yang mengakibatkannya merasa cemas dan mencari cara untuk mengatasi rasa cemasnya. Individu yang tidak memiliki koping yang adaptif mengatasi masalahnya dengan cara yang maladaptif seperti menarik diri dan membayangkan sesuatu yang berlawanan dari kenyataan yang dihadapi atau membayangkan sesuatu yang diharapkannya terjadi dan memenuhi kebutuhannya. Cara yang dilakukannya ini membuatnya merasa nyaman dan menurunkan rasa cemasnya. Bila tidak dilakukan intervensi kondisi ini berlanjut, klien terus menggunakan koping yang maladaptif untuk mengatasi cemasnya. Lama kelamaan rasa nyaman yang diperolehnya berubah menjadi rasa yang menakutkan karena pada perkembangan selanjutnya klien mendengar suara-suara yang mengancamnya. Sementara klien sudah tidak mampu lagi mengontrolnya. Bila tidak diintervensi, akibat dari rasa takut atau menuruti perintah suara-suara, klien dapat melakukan hal yang membahayakan dirinya, orang lain atau lingkungan disekitarnya (Videbeck, 2008).

7. Mekanisme Koping

Mekanisme koping dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, konsep diri, rasa aman nyaman, pengalaman masa lalu dan tingkat pengetahuan seseorang. Mekanisme koping didefinisikan sebagai strategi untuk memajemen tingkah laku kepada pemecahan masalah yang paling sederhana dan realistis, berfungsi untuk membebaskan diri dari masalah yang nyata maupun tidak nyata, dan koping merupakan semua usaha secara kognitif dan perilaku untuk mengatasi, mengurangi, dan tahan terhadap tuntutan-tuntutan (Muhith, 2015)

8. Penatalaksanaan

Halusinasi merupakan salah satu gejala yang paling sering terjadi pada gangguan Skizofrenia. Dimana Skizofrenia merupakan jenis psikosis, adapun tindakan penatalaksanaan dilakukan dengan berbagai terapi (Oktiviani, 2020) :

a. Farmakoterapi

Obat-obatan untuk terapi halusinasi berupa antipsikotik, haloperidol, antiansietas, antidepresan, penstabil mood, antiparkinson, serta stimulan.

b. Terapi psikososial

Karakteristik dari halusinasi adalah rusaknya kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan hubungan sesama manusia, maka intervensi utama difokuskan untuk membantu klien memasuki dan mempertahankan sosialisasi yang penuh arti dalam kemampuan klien Alternatif :

1) Terapi modalitas

Semua sumber daya di rumah sakit disarankan untuk menggunakan komunikasi yang terapeutik, termasuk semua (staf administrasi, pembantu kesehatan, mahasiswa, dan petugas instalasi)

2) Terapi kelompok

Terapi kelompok adalah psikoterapi yang dilakukan pada klien bersama-sama dengan jalan aukuasi yang diarahkan oleh seseorang yang tertatih

3) Terapi keluarga

Tujuan dari terapi keluarga :


- a) Menurunkan konflik kecemasan
- b) Meningkatkan kesadaran keluarga terhadap kebutuhan masingmasing keluarga
- c) Meningkatkan pertanyaan kritis
- d) Menggambarkan hubungan peran yang sesuai dengan tumbuh kembang. Perawat membekali keluarga dengan pendidikan tentang kondisi klien dan kepedulian pada situasi keluarga.

c. Terapi psikoreligi

Terapi psikoreligius yaitu Dzikir secara Islami, yaitu suatu perlakuan dan pengobatan yang ditujukan kepada penyembuhan suatu penyakit mental, kepada setiap individu, dengan kekuatan batin atau ruhani, yang berupa ritual keagamaan bukan pengobatan dengan obat-obatan, dengan tujuan untuk memperkuat iman seseorang agar ia dapat mengembangkan potensi diri dan fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal, dengan cara mensosialkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ke dalam diri. Seperti melakukan shalat wajib, berdoa dan berzikir dari perbuatan tersebut dapat membuat hidup selaras, seimbang dan sesuai dengan ajaran agama (Yusuf & Fani Okviansanti, 2016).

9. Pohon Masalah

Adapun pohon masalah pada halusinasi antara lain sebagai berikut :
(Yosep, 2011)



B. Konsep Keperawatan

1. Pengkajian Keperawatan

Berdasarkan Askep teoritis, diuraikan dengan beberapa langkah sebagai berikut (Keliat, 2011) :

a. Identitas Klien

Biasanya meliputi: nama klien, umur jenis kelamin, agama, alamat, tanggal masuk ke rumah sakit, nomor rekam medis, informasi keluarga yang bisa di hubungi.

b. Keluhan Utama

Biasanya yang menjadi alasan utama yang menyebabkan kambuhnya halusinasi klien, dapat dilihat dari data klien dan bisa pula diperoleh dari keluarga, antara lain : berbicara, senyum dan tertawa sendiri tanpa sebab. Mengatakan mendengar suara-suara. Kadang pasien marah-marah sendiri tanpa sebab, mengganggu lingkungan, termenung, banyak diam, kadang merasa takut dirumah, lalu pasien sering pergi keluar rumah dan keluyuran/jalan-jalan sendiri dan tidak pulang kerumah.

c. Faktor Predisposisi

1) Gangguan jiwa di masa lalu

Pasien pernah mengalami sakit jiwa masa lalu atau baru pertama kali mengalami gangguan jiwa.

2) Riwayat pengobatan sebelumnya

Biasanya pengobatan yang dilakukan tidak berhasil atau putus obat dan adaptasi dengan masyarakat kurang baik.

3) Riwayat Trauma

a) Aniaya fisik

Biasanya ada mengalami aniaya fisik baik sebagai pelaku, korban maupun saksi.

b) Aniaya seksual

Biasanya tidak ada klien mengalami aniaya seksual sebelumnya baik sebagai pelaku, korban maupun saksi.

c) Penolakan

Ada mengalami penolakan dalam lingkungan baik sebagai pelaku, korban maupun saksi

d) Tindakan kekerasan dalam keluarga

Biasanya ada atau tidak ada klien mengalami kekerasan dalam keluarga baik sebagai pelaku, korban maupun sebagai saksi.

e) Tindakan kriminal

Biasanya tidak ada klien mengalami tindakan kriminal baik sebagai pelaku, korban maupun saksi.

f) Riwayat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa

Biasanya ada keluarga yang mengalami gangguan jiwa yang sama dengan klien.

g) Riwayat pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan

Biasanya yang dialami klien pada masa lalu yang tidak menyenangkan seperti kegagalan, kehilangan, perpisahan atau kematian, dan trauma selama tumbuh kembang.

d. Fisik

- 1) Observasi tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan
- 2) Antropometri yang terdiri dari ukur tinggi badan dan berat badan
- 3) Menjelaskan keluhan fisik yang dirasakan oleh pasien

e. Psikososial

1) Genogram

Salah satu faktor penyakit jiwa diakibatkan genetik atau keturunan, dimana dapat dilihat dari tiga generasi. Genogram dibuat 3 generasi yang dapat menggambarkan hubungan Pasien dengan keluarga. Tiga generasi ini dimaksud jangkauan yang mudah diingat oleh Pasien maupun keluarga pada saat pengkajian.

2) Konsep diri

a) Citra tubuh

Persepsi pasien terhadap tubuhnya merasa ada kekurangan di bagian tubuhnya (perubahan ukuran, bentuk dan penampilan tubuh akibat penyakit) atau ada bagian tubuh yang tidak disukai.

b) Identitas diri

Berisi status pasien atau posisi pasien sebelum dirawat. Kepuasan pasien sebagai laki-laki atau perempuan. Dan kepuasan pasien terhadap status dan posisinya (sekolah, tempat kerja, dan kelompok)

c) Peran diri

Pasien menceritakan tentang peran/tugas dalam keluarga/kelompok masyarakat. Kemampuan pasien dalam melaksanakan tugas atau peran tersebut, biasanya mengalami krisis peran.

d) Ideal diri

Berisi tentang harapan pasien terhadap penyakitnya. Harapan pasien terhadap lingkungan (keluarga, sekolah, tempat kerja,

dan masyarakat). Dan harapan pasien terhadap tubuh, posisi, status, dan tugas atau peran. Biasanya gambaran diri negatif.

e) Harga diri

Hubungan Pasien dengan orang lain tidak baik, penilaian dan penghargaan terhadap diri dan kehidupannya yang selalu mengarah pada penghinaan dan penolakan. Biasanya ada perasaan malu terhadap kondisi tubuh/diri, tidak punya pekerjaan, status perkawinan, muncul perasaan tidak berguna, kecewa karena belum bisa pulang/bertemu keluarga.

3) Hubungan sosial

a) Orang terdekat atau yang berarti

Ada ungkapan terhadap orang/tempat, orang untuk bercerita, tidak mempunyai teman karena larut dalam kondisinya.

b) Peran serta dalam kelompok

Biasanya pasien baik di rumah maupun di RS pasien tidak mau/tidak mengikuti kegiatan/aktivitas bersama.

c) Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain

Pasien melaporkan kesulitan dalam memulai pembicaraan, takut dicemooh/takut tidak diterima dilingkungan karena keadaannya yang sekarang.

4) Spritual

a) Nilai dan Keyakinan

Nilai-nilai dan keyakinan terhadap agama kurang sekali, keyakinan agama pasien halusinasi juga terganggu.

b) Kegiatan Ibadah

Pasien akan mengeluh tentang masalah yang dihadapinya kepada Tuhan YME.

f. Status Mental

1) Penampilan

Pasien berpenampilan tidak rapi, seperti rambut acaka-cakan, baju kotor dan jarang diganti, penggunaan pakaian yang tidak sesuai dan cara berpakaian yang tidak seperti biasanya.

2) Pembicaraan

Ditemukan cara bicara pasien dengan halusinasi bicara dengan keras, gagap, inkoheren yaitu pembicaraan yang berpindah-pindah dari satu kalimat ke kalimat lain yang tidak ada kaitannya.

3) Aktifitas motorik

Ditemukan keadaan pasien agitasi yaitu lesu, tegang, gelisah dengan halusinasi yang didengarnya. Biasanya bibir pasien komat-kamit, tertawa sendiri, bicara sendiri, kepala mengangguk-angguk, seperti mendengar sesuatu, tiba-tiba menutup telinga, mengarahkan telinga kearah tertentu, bergerak seperti mengambil atau membuang sesuatu, tiba-tiba marah dan menyerang.

4) Alam perasaan

Pasien tanpa putus asa, gembira yang berlebihan, ketakutan dan khawatir.

5) Afek

Ditemukan afek klien datar, tidak ada perubahan roman muka pada saat ada stimulus yang menyenangkan atau menyedihkan. Efek klien bisa juga tumpul dimana klien hanya bereaksi jika ada stimulus emosi yang sangat kuat. Afek labil (emosi yang mudah) berubah juga ditemukan pada klien halusinasi pendengaran. Bisa juga ditemukan efek yang tidak sesuai atau bertentangan dengan stimulus yang ada.

6) Interaksi selama wawancara

Pada saat melakukan wawancara ditemukan kontak mata yang kurang, tidak mau menatap lawan bicara. Defensif (mempertahankan pendapat), dan tidak kooperatif.

7) Persepsi

Pada pasien yang mengalami gangguan persepsi halusinasi pendengaran sering mendengar suara gaduh, suara yang menyuruh untuk melakukan sesuatu yang berbahaya, dan suara yang dianggap nyata oleh pasien. Waktunya kadang pagi, siang, sore dan bahkan malam hari, frekuensinya biasa 3 sampai 5 kali dalam sehari bahkan tiap jam, biasanya pasien berespon dengan cara mondar mandir, kadang pasien bicara dan tertawa sendiri dan bahkan berteriak, situasinya yaitu biasanya ketika pasien termenung, sendirian atau sedang duduk.

8) Proses pikir

Pada klien halusinasi ditemukan proses pikir klien Sirkumtansial yaitu pembicaraan yang berbelit-belit tapi sampai dengan tujuan pembicaraan. Tangensial : Pembicaraan yang berbelit-belit tapi tidak sampai pada tujuan pembicaraan. Kehilangan asosiasi dimana pembicaraan tidak ada hubungannya antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dan klien tidak menyadarinya. Kadang-kadang ditemukan blocking, pembicaraan terhenti tiba-tiba tanpa gangguan eksternal kemudian dilanjutkan kembali, serta pembicaraan yang diulang berkali-kali.

9) Isi pikir

Pada pasien halusinasi ditemukan fobia yaitu ketakutan yang patologis/ tidak logis terhadap objek/ situasi tertentu. Biasanya ditemukan juga isi pikir obsesi dimana pikiran yang selalu muncul walaupun klien berusaha menghilangkannya.

10) Tingkat kesadaran

Biasanya ditemukan stupor yaitu terjadi gangguan motorik seperti kekakuan, gerakan-gerakan yang diulang, anggota tubuh dalam sikap canggung tetapi klien mengerti tentang semua hal yang terjadi dilingkungan. Orientasi terhadap waktu, tempat dan orang bisa ditemukan jelas ataupun terganggu.

11) Memori

Pasien mengalami gangguan daya ingat jangka panjang (mengingat pengalamannya dimasa lalu baik atau buruk), gangguan daya ingat jangka pendek (mengetahui bahwa dia sakit dan sekarang berada dirumah sakit), maupun gangguan daya ingat saat ini (mengulang kembali topik pembicaraan saat berinteraksi). Biasanya pembicaraan pasien tidak sesuai dengan kenyataan dengan memasukan cerita yang tidak benar untuk menutupi daya ingatnya.

12) Tingkat konsentrasi dan berhitung

Pasien mengalami gangguan konsentrasi, pasien biasanya mudah dialihkan, dan tidak mampu berhitung.

13) Kemampuan penilaian

Ditemukan gangguan kemampuan penilaian ringan dimana klien dapat mengambil keputusan sederhana dengan bantuan orang lain seperti memberikan kesempatan pada pasien untuk memilih mandi dulu sebelum makan atau makan dulu sebelum mandi. Jika diberi penjelasan, pasien dapat mengambil keputusan.

14) Daya tilik diri

Biasanya ditemukan klien mengingkari penyakit yang diderita seperti tidak menyadari penyakit (perubahan emosi dan fisik) pada dirinya dan merasa tidak perlu pertolongan. Klien juga bisa menyalahkan hal-hal di luar dirinya seperti menyalahkan orang lain/ lingkungan yang dapat menyebabkan kondisi saat ini.

g. Kebutuhan persiapan pulang

1) Makan

Pasien tidak mengalami perubahan makan, biasanya pasien tidak mampu menyiapkan dan membersihkan tempat makan.

2) BAB/BAK

Pasien dengan halusinasi tidak ada gangguan, pasien dapat BAB/BAK pada tempatnya.

3) Mandi

Pasien jarang mandi, tidak menyikat gigi, jarang mencuci rambut dan bercukur atau berhias. Badan pasien sangat bau dan kotor, dan pasien hanya melakukan kebersihan diri jika disuruh.

4) Berpakaian/berhias

Pasien jarang mengganti pakaian, dan tidak mau berdandan. Pasien tidak mampu mengenakan pakaian dengan sesuai dan pasien tidak mengenakan alas kaki

5) Istirahat dan tidur

Pasien tidak melakukan persiapan sebelum tidur, seperti: menyikat gigi, cucui kaki, berdoa. Dan sesudah tidur seperti: merapikan tempat tidur, mandi atau cuci muka dan menyikat gigi. Frekuensi tidur pasien berubah-ubah, kadang nyenyak dan kadang gaduh atau tidak tidur.

6) Penggunaan obat

Pasien mengatakan minum obat 2 kali sehari dan pasien tidak mengetahui fungsi obat dan akibat jika putus minum obat.

7) Pemeliharaan kesehatan

Pasien tidak memperhatikan kesehatannya, dan tidak peduli tentang bagaimana cara yang baik untuk merawat dirinya.

8) Aktifitas didalam rumah

Pasien mampu atau tidak merencanakan, mengolah, dan menyajikan makanan, merapikan rumah, mencuci pakaian sendiri dan mengatur biaya sehari-hari.

9) Aktivitas diluar Rumah

Pasien beraktivitas seperti biasanya diluar rumah

h. Mekanisme Koping

1) Adaptif

Biasanya ditemukan klien mampu berbicara dengan orang lain, mampu menyelesaikan masalah, teknik relaksasi, aktivitas konstruktif, klien mampu berolah raga.

2) Maladaptif

Biasanya ditemukan reaksi klien lambat/berlebuhan, klien bekerja secara berlebihan, selalu menghindar dan mencederai diri sendiri.

i. Masalah Psikososial dan Lingkungan

Pada pengkajian ditemukan riwayat klien mengalami masalah dalam berinteraksi dengan lingkungan, biasanya disebabkan oleh kurangnya dukungan dari kelompok, masalah dengan pendidikan, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan ekonomi dan masalah dengan pelayanan kesehatan.

j. Pengetahuan

Biasanya pasien halusinasi mengalami gangguan kognitif.

2. Diagnosis Keperawatan

Menurut PPNI (2017) diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang di alaminya baik yang berlangsung aktual maupun potensial, diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon individu klien, keluarga dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Adapun diagnosis keperawatan yang dapat muncul pada diagnosis utama gangguan persepsi sensori halusinasi menurut (Sutejo, 2019) antara lain sebagai berikut :

- a. Gangguan sensori persepsi : Halusinasi pendengaran
- b. Perilaku kekerasan
- c. Isolasi social : menarik diri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi atau Rencana tindakan keperawatan adalah serangkaian tindakan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan khusus. Rencana tindakan keperawatan yang digunakan di tatanan kesehatan jiwa disesuaikan dengan standar asuhan keperawatan jiwa Indonesia (Yusuf, Fitriyasari, Nihayati, 2015). Perencanaan keperawatan jiwa ada 2 yaitu : rencana tindakan keperawatan didasari tujuan yang ingin dicapai (Keliat, 2014)

No.	Diagnosa Keperawatan	Tujuan	Intervensi
1.	Gangguan sensori persepsi: halusinasi pendengaran	Setelah dilakukan 1× interaksi, pasien mampu membina hubungan saling percaya dengan perawat dengan kriteria: ekspresi wajah bersahabat, menunjukkan rasa senang, ada kontak mata, mau berjabat tangan, mau menyebutkan nama, mau duduk berdampingan dengan perawat, mau mengungkapkan perasaannya	Bina hubungan saling percaya dengan ramah baik verbal maupun non verbal <ol style="list-style-type: none"> 1. Sapa pasien dengan ramah baik verbal maupun nonverbal 2. Perkenalkan nama, nama panggilan dan tujuan perawat berkenalan 3. Tanyakan nama lengkap dan nama panggilan yang disukai pasien 4. Buat kontrak waktu yang jelas 5. Tunjukkan sikap yang jujur dan menunjukkan sikap empati serta menerima apa adanya 6. Beri perhatian kepada pasien dan perhatikan kebutuhan dasar pasien 7. Beri kesempatan pasien untuk mengungkapkan perasaannya Dengarkan ungkapan pasien dengan penuh perhatian ada ekspresi perasaan pasien
		Setelah dilakukan 2× interaksi, pasien dapat menyebutkan: isi, waktu, frekuensi, situasi dan kondisi yang menimbulkan halusinasi	SP 1 P (Pasien) <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jenis halusinasi pasien 2. Identifikasi isi halusinasi pasien 3. Identifikasi waktu halusinasi pasien 4. Identifikasi frekuensi halusinasi pasien

			<ol style="list-style-type: none"> 5. Identifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi 6. Identifikasi respons pasien terhadap halusinasi 7. Ajarkan pasien menghardik halusinasi 8. Anjurkan pasien memasukkan cara menghardik halusinasi dalam jadwal kegiatan harian
		Setelah dilakukan 2× interaksi pasien mendemonstrasikan penggunaan obat dengan benar	SP II P (Pasien) <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Berikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur 3. Anjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian
		Setelah dilakukan 2× interaksi Pasien mendapat dukungan dari keluarga dalam mengontrol halusinasinya	SP III P (Pasien) <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Latih pasien mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain 3. Anjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian
		Setelah dilakukan 2× interaksi pasien mampu menyebutkan tindakan yang biasanya dilakukan untuk mengendalikan halusinasinya	SP IV P (Pasien) <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Latih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan 3. Anjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian
2.	Isolasi Sosial	Setelah dilakukan 1× interaksi Ekspresi wajah klien bersahabat, menunjukkan rasa senang, ada kontak mata, mau berjabat tangan, mau menyebut nama, mau menjawab salam, klien mau duduk berhadapan dengan perawat, mau	<ol style="list-style-type: none"> a. Sapa Klien dengan ramah. b. Perkenalkan diri dengan sopan. c. Tanyakan nama lengkap dan nama panggilan yang disukai. d. Jelaskan tujuan pertemuan kepada klien. e. Jujur dan menepati janji. f. Tunjukkan sikap empati dan menerima klien apa adanya. g. Berikan perhatian kepada klien dan perhatikan kebutuhan dasar klien

		mengutarakan masalah yang dihadapi	
		Setelah dilakukan 2× interaksi klien dapat menyebutkan penyebab menarik diri yang berasal dari diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kaji pengetahuan klien tentang perilaku menarik diri, dan tanda-tandanya. b. Beri kesempatan klien untuk mengungkapkan perasaan penyebab menarik diri. c. Diskusikan bersama klien tentang perilaku menarik diri, dan tanda-tandanya. d. Beri pujian kepada klien tentang ungkapan perasaannya
		Setelah dilakukan 2× interaksi klien dapat menyebutkan keuntungan berhubungan dengan orang lain misalnya banyak teman, tidak sendiri, dan klien dapat melakukan diskusi. Klien dapat menyebutkan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain misalnya sendiri, tidak memiliki teman, dan sepi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kaji pengetahuan klien tentang keuntungan dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain. b. Beri kesempatan klien untuk mengungkapkan perasaan tentang keuntungan dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain. c. Diskusikan dengan klien tentang keuntungan dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain. d. Beri pujian positif tentang kemampuan klien mengungkapkan perasaannya tentang keuntungan dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain.



		Setelah dilakukan 2× interaksi, Klien dapat mendemonstrasikan berhubungan dengan orang lain (klien-perawat)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kaji kemampuan klien membina hubungan dengan orang lain. b. Ajarkan klien berkenalan c. Beri pujian positif terhadap keberhasilan yang telah dicapai d. Bantu klien untuk mengevaluasi keuntungan berhubungan dengan orang lain dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain. e. Motivasi klien untuk berhubungan dengan orang lain
		Setelah dilakukan 2× interaksi , Klien dapat mendemonstrasikan berhubungan dengan orang lain (klien perawat lain).	<ul style="list-style-type: none"> a. Beri kesempatan klien untuk berkenalan dengan seorang perawat. b. Diskusikan dengan klien tentang perasaan bila berhubungan dengan orang lain. c. Beri pujian positif atas kemampuan klien mengungkapkan perasaan tentang manfaat berhubungan dengan orang lain.
		Setelah dilakukan 2× interaksi, Klien dapat mendemonstrasikan berhubungan dengan orang lain (klien-perawat-klien lain)	<ul style="list-style-type: none"> a. Beri kesempatan klien untuk berhubungan dengan orang lain (klien-kelompok perawat/klien lain). b. Beri pujian positif atas kemampuan klien berhubungan dengan orang lain (klien-kelompok perawat/klien lain). c. Motivasi klien untuk berhubungan dengan orang lain.
		Setelah dilakukan 2× interaksi Keluarga dapat menjelaskan perasaannya, cara merawat klien menarik diri, mendemonstrasikan perawatan klien menarik diri, berpartisipasi dalam perawatan klien	<ul style="list-style-type: none"> a. Bina hubungan saling percaya dengan keluarga. b. Diskusikan dengan keluarga tentang perilaku menarik diri, penyebab menarik diri, dan cara menghadapi klien menarik diri. c. Dorong keluarga untuk memberikan dorongan kepada klien untuk berhubungan dengan orang lain. d. Anjurkan anggota keluarga secara rutin atau bergantian untuk menjenguk klien di rumah sakit, minimal 1 minggu sekali. e. Beri pujian positif atas hal yang telah dicapai keluarga.
3.	Gangguan konsep diri: HDR	Klien mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien. b. Setiap bertemu klien hindarkan dari memberi penilaian negatif. c. Utamakan memberi pujian yang realistic

		Klien memiliki daftar kemampuan/kegiatan yang dapat dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Diskusikan dengan klien kemampuan yang masih dapat digunakan selama sakit. b. Diskusikan kemampuan yang dapat dilanjutkan penggunaannya.
		Klien memiliki rencana ADL yang tersusun	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencanakan bersama klien aktivitas yang dapat dilakukan dengan menyusun ADL. b. Beri contoh kegiatan yang dapat dilakukan klien c. Tingkatkan kegiatan yang dapat dilakukan sesuai kondisi
		Klien melakukan kegiatan sesuai rencana dan kondisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Beri kesempatan kepada klien untuk mencoba kegiatan yang telah direncanakan b. Beri pujian atas keberhasilan klien
4.	Risiko perilaku kekerasan	<p>Setelah dilakukan 1× pertemuan klien menunjukkan tanda-tanda percaya kepada perawat yang ditunjukkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wajah cerah, tersenyum b. Mau berkenalan c. Ada kontak mata d. Bersedia menceritakan perasaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bina hubungan saling percaya dengan klien <ul style="list-style-type: none"> 1. Beri salam setiap kali interaksi 2. Perkenalan nama, nama panggilan perawat dan tujuan perawat berinteraksi 3. Tanyakan panggilan nama kesukaan klien 4. Tunjukkan sikap empati, jujur dan menepati janji setiap kali berinteraksi 5. Tanyak perasaan klien dan masalah yang dihadapi klien 6. Buat kontrak interaksi yang jelas 7. Dengarkan dengan penuh perhatian
		Setelah dilakukan interkasi dengan klien, klien dapat menceritakan penyebab perilaku kekerasan yang dilakukannya baik pada diri sendiri, orang lain maupun dilingkungan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Bantu klien mengungkapkan perasaan kesalnya b. Motivasi klien untuk mencerritakan penyebab rasa kesal atau jengkelnya c. Dengarkan tanpa menyela atau memberi penilai setiap ungkapan perasaan klien

		<p>Setelah dilakukan interaksi klien mampu menceritakan tanda-tanda saat terjadi perilaku kekerasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanda fisik: mata merah, tangan mengempal, ekspresi tegang dll Tanda emosional: perasaan marah, jengkel, bicara kasar. Tanda sosial: bermusuhan yang dialami saat terjadi kekerasan 	<ol style="list-style-type: none"> Bantu klien mengungkapkan tanda-tanda perilaku kekerasan yang dialaminya Motivas klien menceritakan kondisi fisik (tanda-tanda fisik) saat perilaku kekerasan terjadi Motivasi klien menceritakan kondisi hubungan dengan orang lain (tanda-tanda sosial) saat terjadi perilaku kekerasan
		<p>Setelah dilakukan interaksi, klien dapat menjelaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis- jenis ekspresi kemarahan yang selami ini telah dilakukannya Perasaan saat melakukan kekerasan Efektifitas cara yang dipakai dalam menyelesaikan masalah 	<ol style="list-style-type: none"> Diskusikan dengan klien perilaku kekerasan yang dilakukannya selama ini Motivasi klien untuk menceritakan perasaan klien setelah tindakan kekerasan tersebut terjadi Diskusikan apakah dengan tindakan kekerasan yang dilakukannya masalah yang dialami teratasi
		<p>setelah dilakuukan pertemuan klien mampu menjelaskan akibat tindakan kekerasan yang dilakukannya</p> <ol style="list-style-type: none"> Diri sendiri: luka, diajuhi teman, dll Orang lain/keluarga: luka, tersinggung, ketakutan, dll Lingkungan: barang atau benda rusak, dll 	<p>Diskusikan dnegan klien dampak negative dari cara yang dilakukan pada diri sendiri, orang lain/keluarga dan lingkungan di sekitarnya</p>

		<p>setelah dilakukan pertemuan dengan klien, klien dapat mengungkapkan cara-cara sehat untuk mengungkapkan kemarahan</p>	<p>Diskusikan dengan klien:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah klien mau mempelajari cara baru mengungkapkan marah dengan sehat 2. Jelaskan berbagai alternatif untuk mengungkapkan kemarahan selain perilaku kekerasan yang diketahui oleh klien 3. Jelaskan cara-cara sehat untuk mengungkapkan marah: <ol style="list-style-type: none"> 1. cara fisik: nafas dalam, pukul bantal atau kasur dan olahraga. 2. Verbal: mengungkapkan bahwa dirinya sedang kesal kepada orang lain 3. Sosial: latihan asertif dengan orang lain 4. Spiritual: sembahyang/doa, zikir meditasi, dll sesuai dengan keyakinan masing-masing
		<p>Setelah dilakukan interaksi dengan klien, klien mampu memperagakan cara mengontrol perilaku kekerasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. cara fisik: nafas dalam, pukul bantal atau kasur dan olahraga. b. Verbal: mengungkapkan bahwa dirinya sedang kesal kepada orang lain c. Sosial: latihan asertif dengan orang lain d. Spiritual: sembahyang/doa, zikir meditasi, dll sesuai dengan keyakinan masing-masing 	<ol style="list-style-type: none"> a. Diskusikan cara yang mungkin dipilih dan dianjurkan klien memilih cara yang mungkin untuk mengungkapkan kemarahan b. Latih klien cara yang dipilih c. Peragakan cara melaksanakan yang dipilih d. Anjurkan klien menirukan peragaan yang sudah dilakukan e. Beri penguatan pada klien, perbaiki cara yang masih belum sempurna f. Anjurkan klien menggunakan cara yang sudah dilatih
		<p>setelah dilakukan pertemuan dengan keluarga, keluarga dapat menjelaskan cara merawat klien dengan risiko perilaku kekerasan dan keluarga mampu</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Diskusikan pentingnya peran serta keluarga sebagai pendukung klien untuk mengatasi perilaku kekerasan. b. Diskusikan potensi keluarga untuk membantu klien untuk mengatasi perilaku kekerasan. c. Jelaskan pengertian, penyebab, akibat dan cara merawat klien perilaku kekerasan yang dapat dilaksanakan keluarga.

		<p>mneungkapkan rasa puas dalam merawat klien</p>	<p>d. Peragakan cara merawat klien (menangani perilaku kekerasan). e. Beri kesempatan keluarga untuk memperagakan ulang. f. Beri pujian kepada keluarga setelah memperagakan. g. Tanyakan perasaan keluarga setelah mencoba cara yang dilatihkan.</p>
		<p>Setelah dilakukan pertemuan dengan klien, klien mamou menjelaskan:</p> <p>a. Manfaat minum obat b. Bentuk dan warna obat c. Dosis obatnya d. Waktu pemberian obat e. Cara pemakaian f. Efek samping</p>	<p>a. Jelaskan manfaat minum obat secara teratur b. Jelaskan kepada klien mengenai jenis pbat, dosis, waktu pemakaian, cara pemakaian, dan efek samping yang bisa muncul c. Anjurkan klien untuk minum obat tepat waktu, melaporkan kepada perawat/dokter jika terjadi efek yang tidak biasa dan beri pujian kepada pasien terhadap kedisiplinan klien menggunakan obat</p>
5.	Defisit Perawatan Diri	<p>Setelah diberikan intervensi Klien dapat meningkatkan minat dan motivasinya untuk memperhatikan kebersihan diri dengan kriteria hasil :</p> <p>1. Klien dapat mengenal tentang pentingnya kebersihan diri 2. Klien mengetahui pentingnya kebersihan diri</p>	<p>a. Diskusikan bersama klien tentang pentingnya menjaga kebersihan diri b. Dorong klien untuk menyebutkan 3 dari 5 tanda kebersihan diri c. Dorong klien untuk menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan diri</p>
		<p>Klien melaksanakan kebersihan diri dengan bantuan perawat</p>	<p>a. Motivasi klien untuk mandi b. Anjurkan klien untuk mengganti baju setiap hari c. Kaji keinginan klien untuk memotong kuku dan merapikan rambut d. Mengadakan alat penunjang kebersiha diri: Sabun mandi, Shampo, Sikat dan pasta gigi.</p>

		Klien melakukan prosedur kebersihan diri secara mandiri setiap hari	Beri pujian jika berhasil melakukan tindakan menjaga kebersihan diri
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien melakukan prosedur kebersihan diri secara mandiri 2. Klien melakukan prosedur kebersihan diri secara mandiri setiap hari 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun ADL yang berisi waktu membersihkan diri b. Mengingatkan klien tentang waktu kebersihan diri menurut ADL c. Beri pujian jika berhasil melakukan tindakan menjaga

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi disesuaikan dengan rencana tindakan keperawatan. Pada situasi nyata sering pelaksanaan jauh berbeda dengan rencana, hal ini terjadi karena perawat belum terbiasa menggunakan rencana tertulis dalam melaksanakan tindakan keperawatan (Pardede et al, 2021). Sebelum melaksanakan tindakan keperawatan yang sudah direncanakan, perawat perlu memvalidasi dengan singkat apakah rencana tindakan masih sesuai dan dibutuhkan klien sesuai dengan kondisinya (here and now). Perawat juga menilai diri sendiri, apakah kemampuan interpersonal, intelektual, tekhnikal sesuai dengan tindakan yang akan dilaksanakan, dinilai kembali apakah aman bagi klien. Setelah semuanya tidak ada hambatan maka tindakan keperawatan boleh dilaksanakan.

5. Evaluasi Keperawatan

Menurut (Farida Kusuma, 2010) bahwa evaluasi keperawatan yaitu proses yang berkelanjutan dan dilakukan terus-menerus untuk menilai efek dari tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan evaluasi dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- a. Evaluasi proses yang dilakukan setiap selesai melaksanakan tindakan keperawatan, disebut evaluasi formatif.
- b. Evaluasi hasil dilakukan dengan cara membandingkan respons klien dengan tujuan yang telah ditentukan, disebut evaluasi sumatif.

Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan SOAP sebagai pola piker antara lain sebagai berikut :

- a. S : Respons subjektif klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan.
- b. O : Respons subjektif klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan.
- c. A : Analisis terhadap data subjektif dan objektif untuk menyimpulkan apakah masalah masih ada atau telah teratasi atau muncul masalah baru.

- d. P : Perencanaan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis respons klien.

Rencana tindak lanjut dapat berupa hal-hal sebagai berikut :

- 1) Rencana teruskan jika masalah tidak berubah
- 2) Rencana dimodifikasi jika masalah tetap ada dan semua rencana tindakan sudah dilakukan, tetapi hasil belum memuaskan.
- 3) Rencana dan diagnosis keperawatan dibatalkan jika ditemukan masalah baru dan bertolak belakang dengan masalah yang ada.

C. Pendekatan Teori Keperawatan

Pada analisis kasus ini menggunakan teori dari Hidegard E. Peplau dengan teori hubungan interpersonal (*Theory Of Interpersonal Relations*). Pada Teori ini dijelaskan bahwa kemampuan perawat untuk memahami perilaku seseorang untuk membantu mengidentifikasi keluhan-keluhan yang dirasakan dan menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang muncul dari semua hal atau kejadian yang dialami. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara perawat dengan pasien. Teori ini juga bertujuan untuk meningkatkan kondisi kejiwaan pasien agar menjadi lebih baik, menurunkan kecemasan pada pasien, memberikan asuhan keperawatan yang lebih baik dan mendorong kemandirian pasien. (Risnah & Muhammad Irwan, 2021)

Berdasarkan pemaparan pendekatan teori keperawatan yang digunakan pada analisis kasus ini yaitu sejalan dengan kasus yang didapatkan bahwa pasien mengalami gangguan kejiwaan yaitu halusinasi pendengaran, kemudian teori ini tersebut juga bisa menurunkan kecemasan yaitu pada kasus yang didapat pasien mengalami kecemasan, dan tujuan lain dari pendekatan teori tersebut yaitu mendorong klien agar mandiri, pada kasus ini diberikan intervensi yaitu cara menghardik, mengendalikan serta mengontrol halusinasinya. Intervensi yang diberikan diajarkan langsung kepada klien dan

dipraktekkan langsung intervensi yang diberikan sehingga klien bisa melakukan intervensi secara mandiri.

D. Evidence Based Nursing (Integrasi Kelimuan)

1. Definisi Terapi Dzikir

Terapi psikoreligius Dzikir menurut bahasa berasal dari kata "dzakar" yang berarti ingat. Dzikir juga di artikan "menjaga dalam ingatan". Jika berdzikir kepada Allah artinya menjaga ingatan agar selalu ingat kepada Alla ta'ala. Dzikir menurut syara' adalah ingat kepada Allah dengan etika tertentu yang sudah ditentukan Al-Qur'an dan hadits dengan tujuan mensucikan hati dan mengagungkan Allah. Menurut Ibn Abbas ra. Dzikir adalah konsep, wadah, sarana, agar manusia tetap terbiasa dzikir (ingat) kepadanya ketika berada diluar shalat (Arif Munandar, 2019)

2. Tujuan

Tujuan dari dzikir adalah mengagungkan Allah, mensucikan hati dan jiwa, mengagungkan Allah selaku hamba yang bersyukur, dzikir dapat menyehatkan tubuh, dapat mengobati penyakit dengan metode Ruqyah, mencegah manusia dari bahaya nafsu (Arham, 2015).

Menurut Anshori dzikir bermanfaat mengontrol prilaku. Pengaruh yang ditimbulkan secara konstan, akan mampu mengontrol prilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang melupakan dzikir atau lupa kepada Allah, terkadang tanpa sadar dapat berbuat maksiat, namun mana kala ingat kepada Tuhan kesadaran akan dirinya sebagai hamba Tuhan akan muncul kembali. Dzikir juga bermanfaat sebagai pembersih hati. Dzikir merupakan lawan kelalaian (nisywan), jika manusia mengingat Allah dalam keadaan apapun dan menyadari dirinya ada dihadapan dzat suci, tentu akan menahan diri dari masalah –masalah yang tidak sesuai dengan keridhaan-Nya, dan mengendalikan diri agar tidak bersikap durhaka. Semua malapetaka dan penderitaan yang timbulkan oleh

hawa nafsu dan setan, disebabkan oleh kelupaan akan Allah. Ingat Allah dapat membersihkan hati dan mensucikan jiwa

3. Indikasi

Seseorang yang berdzikir akan merasakan beberapa manfaat, selain merasakan ketenangan batin, juga terdapat manfaat-manfaat yang lain yaitu :

a. Menentramkan, membuat hati menjadi damai

Apabila manusia mengalami kesulitan, kesusahan dan kegelisahan maka berdzikirlah, insyaallah hati manusia akan menjadi lebih tenang dengan rahmatnya. Melalui dzikir, hati menjadi tenang, damai, melalui kedamaian ini maka jiwa dipenuhi oleh emosi positif seperti bahagia dan optimis.

b. Menambah keyakinan dan keberanian

Melalui dzikir jiwa bertambah yakin akan kebesaran Allah SWT. Sehingga bisa menjadikan kita berani menghadapi tantangan apapun.

c. Mendapatkan keberuntungan

Keberuntungan bisa diartikan sebagai mendapatkan kemudahan ketika kita sedang diliputi oleh masalah pelik. Ketika jiwa mulai putus asa dan lemah, Allah memberikan jalan terang kepada kita sehingga kita mampu menyelesaikan masalah dengan baik.

d. Menghilangkan rasa takut

Melalui dzikir, rasa takut yang meliputi jiwa perlahan-lahan dapat ditundukan. Hilangnya ketakutan ini membuat teguh pendirian. Keteguhan membuat pantang berputus asa sehingga tetap berusaha secara maksimal mencapai keridhoannya dalam kehidupan. Mendapatkan kenikmatan dan keselamatan lahir batin. Melalui dzikir senantiasa dilindungi Allah dari segala bencana. Keselamatan selalu menyertai, sehingga kehidupan menjadi tenang. Keselamatan merupakan rahmat yang besar dari Allah, yang akan menjamin tercapainya kehidupan yang damai dan sejahtera di dunia dan akhirat kelak.

- e. Melepaskan manusia dari kesulitan hidup

Melalui dzikir, mampu melewati ujian yang diberikan Allah dengan sabar dan tawakal. Karena dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sekuat kuatnya manusia, tetaplah ia makhluk yang lemah dan tak berdaya tanpa pertolongan dari Allah.

4. Kontraindikasi

Dzikir tidak memiliki kontraindikasi karena dengan melafazkan dzikir tidak menyebabkan adanya kerugian.

5. Prosedure Pemberian

Adapun prosedur pelaksanaan terapi dzikir menurut (Arif Munandar, 2019) antara lain sebagai berikut :

1. Klien duduk dengan nyaman, tenang dan khusyu'
2. Berpakaian bersih dan rapi
3. Posisi duduk menghadap ke arah kiblat
4. Sebelum mulai terapis meminta do'a agar diberikan kemudahan dan kelancaran
5. Mulai dzikir dengan melafazkan kalimat tahlil (*Lillahailallah*), kalimat takbir (*Allahu Akbar*) kalimat Tasbih (*Subhanallah*) dan terakhir kalimat istighfar (*Astagfirullahal'adzim*). Dilafazkan masing-masing 33kali
6. Menutup dzikir dengan ucapan hamdallah (*Alhamdulillah*)

ALA UDDIN
M A K A S S A R

BAB III**LAPORAN KASUS****I. Identitas Klien**

Insial : Tn "A"
Tanggal pengkajian : 22 Mei 2021
Umur : 35 Tahun
No.RM : 157193
Informan : Klien

II. Alasan Masuk

Keluarga membawa klien ke RSKD yang ke 5 kalinya, klien dibawa ke RSKD karena klien mendengar suara-suara yang dialaminya kurang lebih 1 bulan yang lalu, klien juga mengamuk dan memukul keluarganya, klien sering berteriak dan melempari rumah tetangganya. Klien tidak bisa tidur pada malam hari, Klien juga mengatakan keluar masuk RSKD dan melakukan pengobatan di kampungnya, klien berhenti melakukan pengobatan sehingga klien kembali mendengar suara aneh. Menurut keluarga klien awal muncul perubahan perilaku klien \pm 10 tahun yang lalu, klien merantau ke Malaysia dan mengalami penyakit malaria. Pada saat itu klien gelisah dan selalu mendengarkan suara-suara aneh, klien berteriak-teriak dan bicara sendiri. Riwayat pengobatan, klien pernah dirawat sebelumnya di RSKD, klien pernah dirawat diruangan sawit dan nyiur. Klien pertama kali dirawat pada tahun \pm 10 tahun yang lalu dengan keluhan gelisah dan suka mengamuk. Klien selalu ingin membakar Al-Qur'an dan klien mengatakan tidak suka melihat Al-Qur'an. Klien mengatakan pernah membakar Al-Qur'an karena ada suara yang klien dengar yang menyuruhnya untuk membakar Al-Qur'an. Klien pernah merusak rumah neneknya, klien juga mengatakan pernah memukul iparnya tetapi tidak sampai berdarah.

III. Faktor Predisposisi


1. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu? : Ya, klien pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu

2. Pengobatan sebelumnya? : Klien pernah mendapat pengobatan sebelumnya, klien dirawat di RSKD untuk kelima kalinya. Klien juga mengatakan sering melakukan control dikampungnya
3. Kekerasan dalam keluarga? : Ya, Klien mengatakan pernah dipukul oleh kakaknya waktu kecil karena sering nakal
4. Adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa? : Klien mengatakan memiliki saudara tiri seibu yang mengalami gangguan jiwa seperti klien.
5. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan : Klien mengatakan tidak disukai oleh temannya, klien juga mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan bahwa klien diguna-guna oleh temannya tersebut

IV. Fisik

1. Tanda Vital : TD : 110/70 mmHg
: Nadi : 80x/Menit
: Suhu : 36,5°C
: Respirasi: 20x/menit
2. Antropometri : TB: cm, BB: Kg
3. Keluhan fisik : Klien mengatakan merasakan kesemutan pada tangan

V. Psikososial
GENOGRAM



Klien anak ke 5 dari 7 bersaudara, klien tinggal bersama adiknya yang terakhir yang sudah berkeluarga. Orang tua klien meninggal sejak klien SD, sejak ibu klien meninggal klien tinggal bersama neneknya, dan sejak nenek klien meninggal klien tinggal serumah dengan saudaranya yang terakhir. Pada saat tinggal bersama nenek, klien diasuh menggunakan pola asuh permisif dimana nenek klien menyayangi klien, klien tidak terlalu dituntut banyak hal dan klien tidak pernah dimarahi oleh neneknya. Komunikasi pada keluarga klien menggunakan komunikasi interpersonal yaitu apabila ada masalah keluarga kadang klien tidak diberitahukan oleh saudaranya, saudaranya menutupi masalah ke klien dan hanya saudara yang lain yang mengetahui. Pada keluarga ini apabila ada masalah, pengambil keputusan adalah saudara klien yang pertama.

1. Konsep diri

- a. Gambaran diri : Klien mengatakan menyukai semua bagian tubuhnya, klien kadang tampak rapi kadang tidak.
- b. Identitas diri : Klien anak ke 5 dari 7 bersudara, klien tinggal bersama saudaranya yang terakhir dan posisi dirumah sebagai seorang kakak. Klien mengatakan bahwa hanya tamatan SD, klien mengatakan tidak dihargai di masyarakat karena masyarakat sekitar mengatakan bahwa klien gangguan jiwa
- c. Peran : Klien mengatakan bekerja sebagai kuli bangunan dan membantu iparnya bekerja disawah dan ladang, klien juga membantu perekonomian sudaranya yaitu dengan cara hasil kerja sebagai kuli bangunan klien memberikan kepada saudaranya.
- d. Ideal diri : Klien mengatakan ingin cepat sembuh supaya bisa membantu saudara dan iparnya bekerja disawah, klien berharap jika klien sembuh dan kembali ke rumah masyarakat sekitar tidak menganggapnya sebagai orang gila.
- e. Harga diri : Klien mengatakan selama di dirawat diruangan kenari klien belum ada keluarga ataupun saudaranya dari barru yang datang menjenguknya, klien merasa sedih karena merasa dibuang dan dilupakan. Klien merasa tidak berharga dan dibutuhkan oleh keluarganya. Selama dirawat klien memiliki banyak teman dan diruangan klien sering bercerita dengan temannya walaupun hanya sekedar sapa dan menanyakan orang mana. Klien mengatakan belum pernah mendapat pujian serta penghargaan dari orang lain dan klien merasa sedih karena tidak pernah dipuji.

Masalah : Harga Diri Rendah

Keperawatan

2. Hubungan sosial

- a. Orang yang berarti : Klien mengatakan orang yang berarti dalam hidupnya yaitu bapak dan ibu serta kakaknya yang pertama. Klien selalu diurus oleh kakaknya yang pertama jika ia sakit
- b. Peran serta dalam kegiatan kelompok/ Masyarakat : Klien mengatakan sering ikut dalam kegiatan kelompok ketika berada di RS. Sebelum dirawat di RSKD klien mengatakan sering mengikuti gotong royong di masyarakat seperti gotong royong perbaiki masjid
- c. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain : Tidak ada hambatan, klien sangat mudah berkomunikasi dengan orang disekitarnya. Komunikasi verbal klien baik yaitu klien mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan klien nyambung pada saat diajak berkomunikasi. Komunikasi non verbal klien masih kurang baik yaitu masih kurangnya kontak mata klien dengan perawat sebagai lawan bicara, ekspresi klien pada saat berkomunikasi datar

3. Spiritual

- a. Nilai & keyakinan : Klien beragama islam dan klien mengatakan meyakini bahwa hanya Allah-lah yang memberikan kita kesembuhan dan kesehatan.
- b. Kegiatan Ibadah : Klien mengatakan rajin beribadah sholat 5 waktu

VI. Status Mental

1. Penampilan : Penampilan tidak rapi, baju klien terbuka dan tidak dikancing. Klien menggunakan pakaian yang sesuai, Kulit tampak lembab, rambut klien tampak berdistribusi normal, rambut sudah beruban dan kotor, kuku klien pendek dan bersih serta aroma tubuh pada saat dikaji bau. Klien mengatakan sudah mandi tetapi belum keramas dan belum ganti baju. Klien juga mengatakan

tidak mandi jika tidak disuruh sama perawat yang bertugas

Masalah Keperawatan : Defisit Perawatan Diri

2. Pembicaraan : Klien berkomunikasi dengan kooperatif, klien kadang menjawab pertanyaan tidak nyambung
3. Aktivitas Motorik : Klien dapat berjalan tanpa hambatan, klien mengatakan melakukan aktivitasnya sendiri tanpa dibantu orang lain.
4. Alam perasaan : Klien merasa sedih karena sampai saat ini belum ada keluarga yang datang menjenguk klien, dan klien juga khawatir tidak dijemput oleh kakaknya
5. Afek : Labil, kadang klien menunjukkan ekspresi sangat bahagia, kadang sedih
6. Interaksi : Klien kooperatif saat perawat melakukan pengkajian, kontak mata (-)
7. Persepsi : Klien mengalami halusinasi pendengaran, klien mengatakan sering mendengar suara-suara aneh. Sebelum masuk RS klien mendengar suara aneh yang menyuruhnya untuk berteriak dan memukul iparnya. Klien juga mengatakan pernah melihat ular putih yang terbang. Selama di rawat di RS klien mengatakan masih sering mendengar suara tersebut baik pada saat klien duduk sendiri maupun pada saat klien mau tidur. Klien mengatakan klien biasa mendengarkan suara yang menyuruhnya untuk pergi, klien juga mendengar suara yang ajaknya berbicara. Klien mengatakan biasanya mendengara pada malam hari dengan durasi kurang lebih 3 menit. Klien merasa cemas dan merasa terganggu pada saat mendengarkan suara-suara aneh tersebut sehingga menyebabkan klien marah dan bisa melukai dirinya sendiri, orang lain serta lingkungannya.

- Masalah Keperawatan** : **Halusinasi dan Risiko Perilaku Kekerasan**
8. Proses pikir : Sirkumtansial, klien berbicara berbelit-belit tapi sampai pada tujuan pembicaraan. Klien menceritakan panjang lebar tetapi masuk pada inti hal yang dipertanyakan oleh perawat
9. Isi piker : Keyakinan klien terhadap kejadian yang terjadi pada lingkungannya dan terkait pada dirinya.
10. Tingkat kesadaran : Orientasi waktu, tempat, dan orang sekitar jelas. Klien bisa menjawab hari apa sekarang, tempatnya dimana dan klien mengenal orang-orang disekitarnya.
11. Memori : Tidak ada gangguan daya ingat, klien mengingat semua kejadian masa lampau dan kejadian sekarang
12. Tingkat konsentrasi & berhitung : Mudah beralih, klien dapat berhitung dan berkonsentrasi saat di ajak berbicara tetapi beberapa menit kemudian pembicaraan beralih klien membahas pembahasan yang lain
13. Kemampuan penilaian : Gangguan ringan, klien dapat mengambil keputusan yang sederhana
14. Daya Titik Diri : Mengingkari penyakit yang diderita

VII. Kebutuhan Persiapan

Pulang

- a. Makan : Klien dapat makan tanpa bantuan, klien mengatakan makan tiga kali sehari dengan jenis sayuran dan lauk yang bervariasi. Klien mengatakan menyukai makanan yang diberikan dan klien mengatakan tidak ada makanan pantangan
- b. BAB/BAK : Klien melakukan BAB/ BAK di WC dan dapat melakukannya dengan sendiri tanpa di bantu orang lain
- c. Mandi : Klien dapat melakukan dengan mandiri tanpa dibantu orang lain, klien mengatakan mandi 1 kali sehari

- d. Berpakain/berhias : Klien mampu menggunakan pakaian sendiri, pakaian klien tampak tidak rapi dan baju tidak dikancing. Klien mengatakan jarang mengganti pakaian
- e. Istirahat dan tidur : Klien mengatakan biasa tidur siang mulai jam 12.30 – 14.00 wita, klien mengatakan tidur malam pada pukul 21.00 dan bangun jam 5 subuh. Sebelum tidur klien tidak mencuci kaki dan berdoa dan bangun tidur klien biasa rapikan tempat tidur
- f. Penggunaan Obat : Bantuan minimal, klien mengatakan mengonsumsi obat 2x sehari yaitu pagi dan malam. Klien mengatakan tidak mengetahui fungsi obat yang dikonsumsi. Reaksi setelah minum obat klien mengatakan dirinya lebih tenang
- g. Pemeliharaan Kesehatan : Perawatan lanjutan tetap dilakukan
- h. Kegiatan di dalam rumah : Klien mampu mempersiapkan makanan, menjaga kerapian rumah
- i. Kegiatan di luar rumah : Klien dapat berkebun dan bekerja disawah

VIII. Mekanisme Koping

Adaptif : Klien mampu melakukan aktivitasnya secara mandiri

Maladaptif : Klien sering menunjukkan termenung

IX. Masalah Psikososial dan Lingkungan

Klien dapat berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan aktif mengikuti kegiatan yang berada di RS

X. Pengetahuan Kurang Tentang

Pengetahuan mengetahui tentang kondisi yang di alaminya.

ANALISA DATA

Data	Masalah
<p>Subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengatakan sebelum dirawat sering mendengar suara-suara aneh yang menyuruhnya untuk berteriak 2. Klien mengatakan sebelum dirawat mendengar suara yang menyuruhnya untuk memukul iparnya 3. Klien mengatakan selama dirawat di RSKD klien masih sering mendengar suara yang memanggilnya untuk pergi <p>Objektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak bingung 2. Klien berbicara berulang-ulang 3. Klien kadang nunduk pada saat berkomunikasi 4. Klien mudah beralih pembicaraan 	<p>Gangguan Sensori Persepsi : Halusinasi Pendengaran</p>
<p>Subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga klien mengatakan klien sering marah-marah 2. Keluarga klien mengatakan klien pernah melempar dan merusak rumah tetangganya 3. Klien mengatakan pernah merusak rumah neneknya 4. Klien mengatakan pernah memukul iparya tetapi tidak sampai berdarah <p>Objektif</p>	<p>Risiko Perilaku Kekerasan</p>

<p>Subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengatakan selama dirawat diruangan Kenari klien belum pernah dijenguk oleh keluarganya dari barru 2. Klien merasa dibuang dan dilupakan 3. Klien merasa tidak berharga dan dibutuhkan oleh keluarganya 4. Klien mengatakan belum pernah mendapat pujian 5. Klien mengatakan sedih belum pernah dipuji <p>Objektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak sedih 	<p>Harga Diri Rendah</p>
<p>Subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Klien mengatakan sudah mandi tetapi tidak mengganti baju 3. Klien mengatakan jarang mengganti baju 4. Klien mandi tidak menggosok gigi dan membersihkan rambut 5. Klien mengatakan tidak mandi apabila tidak disuruh sama perawat yang bertugas <p>Objektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pakaian klien tampak kotor dan baju tidak dikancing 3. Rambut klien tampak kotor 4. Aroma badan klien bau 	<p>Defisit Perawatan Diri</p>

XI. Aspek Medik

Diagnosa Medik : Skizofrenia

Terapi Medik : Haloperidol, Clozapin

XII. Pohon Masalah

Efek : Risiko Perilaku kekerasan

Core : Gangguan sensori persepsi : Halusinasi pendengaran

Etiologi : Isolasi Sosial → Defisit perawatan diri:
Mandi/kebersihan diri,berpakaian/berhias

DIAGNOSIS KEPERAWATAN

No	Diagnosa Keperawatan
1.	Gangguan Sensori Persepsi : Halusinasi Pendengaran
2.	Risiko Perilaku Kekerasan
3.	Harga Diri Rendah
4.	Defisit Perawatan Diri

INTERVENSI KEPERAWATAN

NAMA : Tn. A

Ruangan : Kenari

No. RM : 157193

No.	Diagnosa Keperawatan	Tujuan	Intervensi
1.	Gangguan sensori persepsi: halusinasi pendengaran	<p>Setelah dilakukan 1× interaksi, pasien mampu membina hubungan saling percaya dengan perawat dengan kriteria: ekspresi wajah bersahabat, menunjukkan rasa senang, ada kontak mata, mau berjabat tangan, mau menyebutkan nama, mau duduk berdampingan dengan perawat, mau mengungkapkan perasaannya</p>	<p>Bina hubungan saling percaya dengan ramah baik verbal maupun non verbal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sapa pasien dengan ramah baik verbal maupun nonverbal b. Perkenalkan nama, nama panggilan dan tujuan perawat berkenalan c. Tanyakan nama lengkap dan nama panggilan yang disukai pasien d. Buat kontrak waktu yang jelas e. Tunjukkan sikap yang jujur dan menunjukkan sikap empati serta menerima apa adanya f. Beri perhatian kepada pasien dan perhatikan kebutuhan dasar pasien g. Beri kesempatan pasien untuk mengungkapkan perasaannya h. Dengarkan ungkapan pasien dengan penuh perhatian ada ekspresi perasaan pasien
		<p>Setelah dilakukan 2× interaksi, pasien dapat menyebutkan: isi, waktu, frekuensi, situasi dan kondisi yang menimbulkan halusinasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jenis halusinasi pasien 2. Identifikasi isi halusinasi pasien 3. Identifikasi waktu halusinasi pasien 4. Identifikasi frekuensi halusinasi pasien 5. Identifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi 6. Identifikasi respons pasien terhadap halusinasi 7. Ajarkan pasien menghardik halusinasi 8. Anjurkan pasien memasukkan cara menghardik halusinasi dalam jadwal kegiatan harian 9. Ajarkan klien mengontrol halusinasi dengan terapi dzikir

		Setelah dilakukan 2× interaksi pasien mendemonstrasikan penggunaan obat dengan benar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Berikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur 3. Anjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian 4. Mengajarkan klien mengontrol halusinasi dengan terapi dzikir
		Setelah dilakukan 2× interaksi Pasien mendapat dukungan dari keluarga dalam mengontrol halusinasinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Latih pasien mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain 3. Anjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian 4. Ajarkan klien mengontrol halusinasi dengan terapi dzikir
		Setelah dilakukan 2× interaksi pasien mampu menyebutkan tindakan yang biasanya dilakukan untuk mengendalikan halusinasinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Latih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan 3. Anjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian 4. Ajarkan klien mengontrol halusinasi dengan terapi dzikir
2.	Gangguan konsep diri: HDR	Klien mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien. 2. Setiap bertemu klien hindarkan dari memberi penilaian negatif. 3. Utamakan memberi pujian yang realistis
		Klien memiliki daftar kemampuan/kegiatan yang dapat dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusikan dengan klien kemampuan yang masih dapat digunakan selama sakit. 2. Diskusikan kemampuan yang dapat dilanjutkan penggunaannya.
		Klien memiliki rencana ADL yang tersusun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencanakan bersama klien aktivitas yang dapat dilakukan dengan menyusun ADL. 2. Beri contoh kegiatan yang dapat dilakukan klien 3. Tingkatkan kegiatan yang dapat dilakukan sesuai kondisi

		Klien melakukan kegiatan sesuai rencana dan kondisi	<ol style="list-style-type: none"> Beri kesempatan kepada klien untuk mencoba kegiatan yang telah direncanakan Beri pujian atas keberhasilan klien
3.	Risiko perilaku kekerasan	Setelah dilakukan 1x pertemuan klien menunjukkan tanda-tanda percaya kepada perawat yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> Wajah cerah, tersenyum Mau berkenalan Ada kontak mata Bersedia menceritakan perasaan 	<p>Bina hubungan saling percaya dengan klien</p> <ol style="list-style-type: none"> Beri salam setiap kali interaksi Perkenalan nama, nama panggilan perawat dan tujuan perawat berinteraksi Tanyakan panggilan nama kesukaan klien Tunjukkan sikap empati, jujur dan menepati janji setiap kali berinteraksi Tanyak perasaan klien dan masalah yang dihadapi klien Buat kontrak interaksi yang jelas Dengarkan dengan penuh perhatian
		Setelah dilakukan interkasi dengan klien, klien dapat menceritakan penyebab perilaku kekerasan yang dilakukannya baik pada diri sendiri, orang lain maupun dilingkungan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> Bantu klien mengungkapkan perasaan kesalnya Motivasi klien untuk mencerritakan penyebab rasa kesal atau jengkelnya Dengarkan tanpa menyela atau memberi penialai setiap ungkapan perasaan klien
		Setelah dilakukan interaksi klien mampu menceritakan tanda-tanda saat terjadi perilaku kekerasan: <ol style="list-style-type: none"> Tanda fisik: mata merah, tangan mengempal, ekspresi tegang dl Tanda emosional: perasaan marah, jengkel, bicara kasar. Tanda sosial: bermusuhan yang dialami saat terjadi kekerasan 	<ol style="list-style-type: none"> Bantu klien mengungkapkan tanda-tadan perilaku kekerasan yang dialaminya Motivas klien menceritakan kondisi fisik (tanda-tanda fisik) saat perilaku kekerasan terjadi Motivasi klien menceritakan kondisi hubungan dengan orang lain (tanda-tanda sosial) saat terjadi perilaku kekerasan

		<p>Setelah dilakukan interaksi, klien dapat menjelaskan:</p> <p>d. Jenis- jenis ekspresi kemarahan yang selami ini telah dilakukannya</p> <p>e. Perasaan saat melakukan kekerasan</p> <p>f. Efektifitas cara yang dipakai dalam menyelesaikan masalah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusikan dengan klien perilaku kekerasan yang dilakukannya selama ini 2. Motivasi klien untuk menceritakan perasaan klien setelah tindakan kekerasan tersebut terjadi 3. Diskusikan apakah dengan tindakan kekerasan yang dilakukannya masalah yang dialami teratasi
		<p>setelah dilakuukan pertemuan klien mampu menjelaskan akibat tindakan kekerasan yang dilakukannya</p> <p>b. Diri sendiri: luka, diajuhi teman, dll</p> <p>c. Orang lain/keluarga: luka, tersinggung, ketakutan, dll</p> <p>d. Lingkungan: barang atau benda rusak, dll</p>	<p>Diskusikan dnegan klien dampak negative dari cara yang dilakukan pada diri sendiri, orang lain/keluarga dan lingkungan di sekitarnya</p>
		<p>setelah dilakukan pertemuan dengan klien, klien dapat mengungkapkan cara-cara sehat untuk mnegungkapkan kemarahan</p>	<p>Diskusikan dengan klien:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah klien mau mempelajari cara baru mengungkapkan marah dengan sehat 2. Jelaskan berbai alternatif untuk mengungkapkan kemaraham selain perilaku kekerasan yang diketahui oleh klien 3. Jelaskan cara-cara sehat untuk mengungkapkan marah: <ol style="list-style-type: none"> a. cara fisik: nafas dalam, pukul bantal atau kasur dan olahraga. b. Verbal: mengungkapkan bahwa dirinya sedang kesal kepada orang lain c. Sosial: latihan asertif dengan orang lain d. Spiritual: sembahyang/doa, zikir meditasi, dll sesuai dengan keyakinan masing-masing
		<p>Setelah dilakukan interaksi dengan klien, klien mampu memperagakan cara mengontrol perilaku kekerasan:</p> <p>e. cara fisik: nafas dalam, pukul bantal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusikan cara yang mungkin dipilih dan dianjurkan lien memilih cara yang mungkin untuk mengungkapkan kemarahan 2. Latih klien cara yang dipilih 3. Peragakan cara melaksanakan yang dipilih

	<p>atau kasar dan olahraga.</p> <p>f. Verbal: mengungkapkan bahwa dirinya sedang kesal kepada orang lain</p> <p>g. Sosial: latihan asertif dengan orang lain</p> <p>h. Spiritual: sembahyang/doa, zikir meditasi, dll sesuai dengan keyakinan masing-masing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Anjurkan klien menirukan peragaan yang sudah dilakukan 5. Beri penguatan pada klien, perbaiki cara yang masih belum sempurna 6. Anjurkan klien menggunakan cara yang sudah dilatih
	<p>setelah dilakukan pertemuan dengan keluarga, keluarga dapat menjelaskan cara merawat klien dengan risiko perilaku kekerasan dan keluarga mampu mengungkapkan rasa puas dalam merawat klien</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusikan pentingnya peran serta keluarga sebagai pendukung klien untuk mengatasi perilaku kekerasan. 2. Diskusikan potensi keluarga untuk membantu klien untuk mengatasi perilaku kekerasan. 3. Jelaskan pengertian, penyebab, akibat dan cara merawat klien perilaku kekerasan yang dapat dilaksanakan keluarga. 4. Peragakan cara merawat klien (menangani perilaku kekerasan). 5. Beri kesempatan keluarga untuk memperagakan ulang. 6. Beri pujian kepada keluarga setelah memperagakan. 7. Tanyakan perasaan keluarga setelah mencoba cara yang dilatihkan.
	<p>Setelah dilakukan pertemuan dengan klien, klien mampu menjelaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manfaat minum obat b. Bentuk dan warna obat c. Dosis obatnya d. Waktu pemberian obat e. Cara pemakaian f. Efek samping 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan manfaat minum obat secara teratur 2. Jelaskan kepada klien mengenai jenis obat, dosis, waktu pemakaian, cara pemakaian, dan efek samping yang bisa muncul 3. Anjurkan klien untuk minum obat tepat waktu, melaporkan kepada perawat/dokter jika terjadi efek yang tidak biasa dan beri pujian kepada pasien terhadap kedisiplinan klien menggunakan obat

4.	Defisit Perawatan Diri	Setelah diberikan intervensi Klien dapat meningkatkan minat dan motivasinya untuk memperhatikan kebersihan diri dengan kriteria hasil : 1. Klien dapat mengenal tentang pentingnya kebersihan diri 2. Klien mengetahui pentingnya kebersihan diri	1. Diskusikan bersama klien tentang pentingnya menjaga kebersihan diri 2. Dorong klien untuk menyebutkan 3 dari 5 tanda kebersihan diri 3. Dorong klien untuk menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan diri
		Klien melaksanakan kebersihan diri dengan bantuan perawat	1. Motivasi klien untuk mandi 2. Anjurkan klien untuk mengganti baju setiap hari 3. Kaji keinginan klien untuk memotong kuku dan merapikan rambut 4. Menngadakan alat penunjang kebersihan diri: Sabun mandi, Shampo, Sikat dan pasta gigi.
		Klien melakukan prosedur kebersihan diri secara mandiri setiap hari	Beri pujian jika berhasil melakukan tindakan menjaga kebersihan diri
		1. Klien melakukan prosedur kebersihan diri secara mandiri 2. Klien melakukan prosedur kebersihan diri secara mandiri setiap hari	1. Menyusun ADL yang berisi waktu membersihkan diri 2. Mengingatkan klien tentang waktu kebersihan diri menurut ADL 3. Beri pujian jika berhasil melakukan tindakan menjaga

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEPERAWATAN

NAMA : Tn. A

Ruangan : Kenari

No. RM : 157193

DIAGNOSA	Hari/Tgl/Jam	IMPLEMENTASI	EVALUASI
<p>Gangguan sensoris persepsi: Halusinasi Pendengaran</p>	<p>Rabu, 22 Mei 2021</p> <p>11.00 WITA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi jenis halusinasi pasien Hasil : Klien mengatakan sering mendengar suara-suara (Halusinasi Pendengaran) 2. Mengidentifikasi isi halusinasi pasien Hasil : Klien mengatakan klien dipanggil untuk pergi 3. Mengidentifikasi waktu halusinasi pasien Hasil : Klien mengatakan terakhir mendengar suara tadi malam dan tadi pagi 4. Mengidentifikasi frekuensi halusinasi pasien Hasil : Klien mengatakan lama mendengar 	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengatakan masih mendengarkan suara-suara - Klien mengatakan mendengar suara 2 kali sehari - Klien mengatakan mendengar suara yang meyuruhnya untuk pergi dan suara yang mengajaknya berkomunikasi <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien tampak cemas dan gelisah - Klien mampu identifikasi jenis, isi, waktu, dan frekuensi halusinasi - Klien mampu mengenal situasi penyebab halusinasi - Klien mampu mencontohkan cara menghardik yang diajarkan - Klien memasukkan cara menghardik pada jadwal kegiatan harian

		<p>suara sekitar 3-5 menit</p> <p>5. Mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi</p> <p>Hasil : Klien mengatakan sering mendengar pada saat klien menyendiri dan pada saat klien tidur</p> <p>6. Mengidentifikasi respons pasien terhadap halusinasi</p> <p>Hasil : Klien mengatakan ketika mendengar suara klien tutup telinga</p> <p>7. Mengajarkan pasien menghardik halusinasi</p> <p>Hasil : Klien diajarkan cara menghardik dan klien bisa mencontohkan apa yang telah diajarkan</p> <p>8. Mengajarkan pasien memasukkan cara menghardik halusinasi dalam jadwal kegiatan harian</p> <p>Hasil : Klien mengatakan memasukkan</p>	<p>- Klien mampu melafazkan dzikir yang diajarkan (<i>Laailahailallah, Allahu Akbar, Subhanallah dan Astagfirullah</i>)</p> <p>A : Halusinasi Pendengaran belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p>
--	--	--	--

		<p>cara menghardik pada kegiatan harian yaitu pada saat klien mendengarkan suara-suara aneh (Pagi dan malam hari)</p> <p>9. Mengajarkan klien mengontrol halusinasi dengan terapi Berdzikir</p> <p>Hasil : Klien melafazkan dzikir yang diajarkan (<i>Laailahailallah, Allahu Akbar, Subhanallah dan Astagfirullah</i>)</p>	
<p>Gangguan sensoris persepsi: Halusinasi Pendengaran</p>	<p>Kamis, 23 Mei 2021</p> <p>10.15 WITA</p>	<p>1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien</p> <p>Hasil : Klien menjelaskan kegiatan yang sudah dijadwalkan</p> <p>2. Memberikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur</p> <p>Hasil : Klien mengatakan paham terhadap penjelasan yang disampaikan, dan klien mengatakan klien mengonsumsi obat secara teratur yaitu 2x sehari pagi dan</p>	<p>S : Klien mengatakan teratur minum obat yang diberikan dan masih mendengarkan suara-suara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengatakan masih mendengarkan suara tetapi sudah berkurang yaitu sekali sehari pada malam hari - Klien konsumsi obat 2 kali sehari (Pagi dan malam) <p>O : Klien tampak masih gelisah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mampu menjelaskan jadwal hariannya - Klien paham terkait memanfaatkan obat dengan

		<p>malam</p> <p>3. Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian</p> <p>Hasil : Klien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian</p> <p>4. Mengajarkan klien mengontrol halusinasi dengan terapi dzikir</p> <p>Hasil : Klien mengikuti dzikir yang diajarkan (<i>Laailahailallah, Allahu Akbar, Subhanallah dan Astagfirullah</i>)</p>	<p>baik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mampu melafazkan dzikir (<i>Laailahailallah, Allahu Akbar, Subhanallah dan Astagfirullah</i>) <p>A : Halusinasi belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p>
<p>Gangguan sensoris persepsi: Halusinasi Pendengaran</p>	<p>Jum'at, 24 Mei 2021</p> <p>11.20 WITA</p>	<p>1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien</p> <p>Hasil : Klien menjelaskan kegiatan harian yang sudah dijadwalkan</p> <p>2. Melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain</p> <p>Hasil : Klien melakukan latihan bercakap-cakap dengan perawat agar nanti dilakukan</p>	<p>S : Klien mengatakan masih mendengarkan lagi suara-suara (Suara mengajaknya Untuk pergi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengatakan mendengar suara sekali pada malam hari <p>O : Klien tampak tenang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mampu mencontohkan cara mendelaikan halusinasi dengan bercakap-cakap - Klien mampu lafazkan (<i>Laailahailallah, Allahu Akbar, Subhanallah dan Astagfirullah</i>)

		<p>pada saat klien mendengarkan suara-suara</p> <p>3. Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian</p> <p>Hasil : Klien mengatakan jika halusinasi muncul, klien melakukan cara mengendalikan halusinasi yang diajarkan yaitu menghardik dan berdzikir</p> <p>4. Mengajarkan klien mengontrol halusinasi dengan terapi dzikir</p> <p>Hasil : Klien mengikuti dzikir yang diajarkan (<i>Laailahaillallah, Allahu Akbar, Subhanallah dan Astagfirullah</i>)</p>	<p>A : Halusinasi belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p>
<p>Gangguan sensoris persepsi: Halusinasi Pendengaran</p>	<p>Sabtu, 25 Mei 2021</p>	<p>1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien</p> <p>Hasil : Klien menceritakan jadwal hariannya</p> <p>2. Melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan</p> <p>Hasil : Klien diajak untuk terapi mewarnai dengan beberapa klien lainnya</p> <p>3. Menganjurkan pasien memasukkan dalam</p>	<p>S : Klien mengatakan selalu mencontohkan cara menghardik yang diajarkan perawat</p> <p>O : Klien tampak tenang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mampu mewarnai gambar dengan baik - Klien mampu menjelaskan makna dari warna dan gambar - Klien mampu lafaskan dzikir (<i>Laailahaillallah,</i>

		<p>jadwal kegiatan harian</p> <p>Hasil : Klien mengatakan memasukkan cara mengontrol dan mengendalikan halusinasi di jadwal harian</p> <p>4. Mengajarkan klien terapi dzikir untuk mengontrol halusinasi</p> <p>Hasil : Klien melafazkan (<i>Laailahailallah, Allahu Akbar, Subhanallah dan Astagfirullah</i>)</p>	<p><i>Allahu Akbar, Subhanallah dan Astagfirullah</i>)</p> <p>A : Halusinasi pendengaran teratasi</p> <p>P : Pertahankan Strategi pelaksanaan</p>
--	--	--	---

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Kasus

Klien Tn. A berusia 35 tahun dirawat diruangan kenari Rumah Sakit Khusus Dadi Makassar dengan diagnosa Medis Skizofrenia dengan masalah keperawatan Gangguan sensori persepsi : Halusinasi pendengaran. Klien mengatakan klien sering mendengar suara-suara aneh yang menyuruhnya untuk pergi bahkan suara itu menyuruhnya untuk memukul orang disekitar klien. Klien juga mengatakan sering bercakap-cakap dengan suara yang klien dengar, sebelum masuk Rumah Sakit klien pernah memukul iparnya dan pernah merusak rumah neneknya dan hal itu klien disuruh sama suara yang klien dengar. Keluarga klien juga sering mengamuk dan memukul keluarganya klien sering berteriak dan melempari rumah tetangganya. Di rumah sakit klien mendengar suara yang menyuruhnya untuk pergi, klien mengatakan susah tidur pada malam hari akibat mendengar suara aneh tersebut. Klien biasa mendengar suara pada malam hari dan biasa juga mendengar pada pagi hari. Klien merasa cemas dan gelisah. Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis yaitu klien tampak bingung, klien tampak cemas dan gelisah, klien tampak menunduk pada saat berkomunikasi dengan perawat, pada saat dilakukan pengkajian klien tampak bicara berulang-ulang, dan klien mudah beralih pembahasan.

Pada pengkajian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan format pengkajian keperawatan jiwa yang telah di tetapkan. Data yang dikumpulkan dengan wawancara langsung pada pasien dan perawat diruangan, dari data catatan keperawatan dan medis ditemukan kesenjangan antara data-data teoritis dengan apa yang didapat pada kasus dilapangan. Pengumpulan data yang dilakukan hanya melalui wawancara dengan pasien dan perawat diruangan, sedangkan data dari keluarga tidak didapatkan hal tersebut dikarenakan selama proses pengkajian keluarga pasien belum sempat menjenguk pasien di Rumah Sakit.

Berdasarkan data yang ditemukan pada saat pengkajian antara lain : Klien mendengar suara-suara aneh 2-3 kali sehari yang isinya berupa suara yang menyuruhnya untuk pergi, suara yang mengajaknya untuk berkomunikasi sehingga klien suka berbicara sendiri. Klien mengatakan suara tersebut muncul pada saat malam hari sebelum klien tidur dengan durasi kurang lebih 3 menit, suara juga muncul pada saat klien duduk sendiri. Klien juga biasa mendengar suara pada saat pagi hari. Pada saat dilakukan pengkajian, klien tampak bingung, kontak mata kurang dengan perawat, klien kadang menunduk, klien tampak cemas dan takut, klien juga pernah memukul iparnya karena ditegur untuk pergi-pergi. Sebelum dirawat di rumah sakit klien sering ikut kegiatan dimasyarakat, klien suka membantu gotong royong dimesjid, klien juga bekerja sebagai kuli bangunan, klien juga mengatakan sering membantu tetangganya apabila tetangga membangun rumah. Sebelum di rawat di rumah sakit juga klien jarang dirumah, lebih sering beraktivitas diluar rumah, klien juga sering ke sawah untuk membantu iparnya menanam disawah. Pada saat dirawat di rumah sakit, klien mengatakan selalu ikut kegiatan kelompok seperti senam dan klien juga juga berkumpul dengan temannya walau hanya sekedar bertanya nama dan asal darimana. Klien tampak tidak rapi, klien menggunakan pakaian yang tidak dikancing, pakaian klien tampak kotor, aroma tubuh klien bau, rambut klien tampak tidak bersih. Klien mengatakan sudah mandi tetapi tidak menggosok gigi, klien tidak membersihkan rambut, klien tidak mengganti bajunya.

Menurut data teoritis menjelaskan secara umum dari faktor predisposisi diterangkan bahwa halusinasi dapat terjadi dari berbagai faktor berupa faktor psikologis, biologis, dan faktor genetik. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis terhadap klien, klien mengatakan mempunyai saudara tiri seibu yang mengalami gangguan jiwa seperti klien, akan tetapi klien tidak mengetahui penyebab dan penyakit yang dialami saudaranya. Sedangkan dari faktor presipitasi diterangkan bahwa secara fisik Pasien dengan gangguan halusinasi timbul gangguan setelah adanya hubungan yang bermusuhan, tekanan, isolasi, perasaan tidak berguna, putus asa dan

tidak berdaya. Penilaian individu terhadap stressor dan masalah koping dapat mengindikasikan timbulnya halusinasi dimana dapat terjadi dari berbagai faktor pendukung yaitu biologis, stress lingkungan, dan sumber koping (Keliat, 2011).

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap klien, ditemukan data yang tergolong pada faktor presipitasi mendukung timbulnya gangguan sensori persepsi pada klien karena awal masuk rumah sakit klien sering mendengar suara-suara aneh yang menyuruhnya untuk pergi, klien juga mendengar suara yang mengajaknya untuk berkomunikasi, klien juga mendengar suara yang menyuruhnya untuk memukul iparnya. Sebelum masuk rumah sakit klien pernah mendengar suara yang menyuruhnya untuk merusak rumah tetangga, melempari rumah tetangga dan merusak rumah neneknya. Selain itu, klien juga mengatakan merasa direndahkan di masyarakat karena menganggap dirinya gangguan jiwa (orang gila).

Menurut Direja (2011) diagnosa keperawatan yaitu sebuah pertanyaan yang menjelaskan respon individu terhadap status kesehatan atau risiko perubahan kelompok, dimana perawat memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi secara pasti guna menjaga status kesehatan, menurun, memebatasi, dan perubahan status kesehatan klien. Adapun pohon masalah pada halusinasi dapat mengakibatkan klien mengalami kehilangan control pada dirinya, sehingga dapat membahayakan dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya. Hal ini terjadi karena apabila halusinasi sudah sampai pada fase ke empat (*Conquering*), dimana klien mengalami panik dan perilaku klien dikendalikan oleh halusinasinya.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh penulis pada klien Tn. A, penulis mengangkat diagnosa keperawatan utama yaitu gangguan sensori persepsi : Halusinasi pendengaran pada Tn. A sebagai prioritas masalah utama yang didukung oleh data subjektif antara lain klien mengatakan mendengar suara-suara aneh yang menyuruhnya untuk pergi, suara itu juga mengajak klien untuk berkomunikasi sehingga klien berbicara

sendiri, sebelum masuk rumah sakit klien juga mendengar suara yang menyuruhnya untuk memukul ibunya, suara itu juga menyuruh klien untuk melempari rumah tetangganya, klien juga mengatakan mendengar suara aneh yang menyuruhnya untuk merusak rumah neneknya, suara-suara aneh yang klien dengar menyebabkan klien cemas, gelisah dan ketakutan. Berdasarkan data tambahan tersebut penulis mengangkat diagnose tambahan yaitu risiko perilaku kekerasan. Pada saat dilakukan pengkajian, klien tampak berpakaian tidak rapi, klien menggunakan baju yang tidak dikancing, rambut klien tampak kotor, aroma tubuh klien bau dan klien mengatakan sudah mandi tetapi tidak mengganti baju, berdasarkan data hasil pengkajian ini, penulis juga dapat mengangkat diagnose tambahan lainnya yaitu defisit perawatan diri.

Keterkaitan yang terdapat pada praktek keperawatan dengan kasus yang dianalisis yaitu gangguan sensori persepsi : Halusinasi pendengaran didapatkan beberapa bagian, antara lain membina hubungan saling percaya, klien dapat mengenal halusinasinya berupa jenis, isi, waktu, frekuensi, situasi, dan respon pada saat klien mengalami halusinasi, klien dapat mengontrol halusinasi, klien dapat memanfaatkan obat dengan baik yaitu dengan mengkonsumsi obat secara rutin, dan klien mampu mengendalikan halusinasi. Dukungan keluarga dalam mengontrol halusinasi klien tidak dilibatkan pada analisis ini, karena keluarga tidak ada pada saat klien dikaji.

Pada praktek tindakan keperawatan gangguan persepsi sensori: Halusinasi pendengaran ditemukan bahwa dari kelima tindakan keperawatan hanya ada empat yang terlaksanakan dan pada tindakan keperawatan poin keempat ditambah dengan dzikir yaitu Pasien mendapat dukungan dari keluarga dalam mengontrol halusinasinya belum sempat dilakukan tindakan keperawatannya, disebabkan karena keluarga belum sempat mengunjungi pasien sehingga untuk saat ini intervensi SP keluarga belum terlaksanakan oleh perawat.

Pada tindakan keperawatan intervensi pertama yaitu pasien dapat membina hubungan saling percaya dengan menggunakan prinsip komunikasi terapeutik dengan tujuan klien dapat membina hubungan saling percaya dan

pada intervensi ini telah dilakukan tindakan keperawatan yaitu sapa pasien dengan ramah baik verbal maupun non verbal, perkenalkan nama lengkap, nama panggilan, hobbi, tanyakan perasaan pasien dan masalah yang dihadapi pasien, dengarkan dengan penuh perhatian ekspresi perasaan pasien, buat kontrak yang jelas mengenai topik, waktu pertemuan dan tempat pertemuan, beri perhatian kepada pasien dan perhatikan kebutuhan dasar pasien.

Pada intervensi kedua yaitu bantu pasien mengenal halusinasi dengan mengetahui isi, waktu terjadinya, frekuensi, situasi pencetus dengan tujuan pasien dapat mengenali halusinasi yang dialaminya. Pada intervensi kedua ini dilakukan tindakan keperawatan seperti tanyakan apakah pasien saat sedang sendirian, atau sedang tidur pernah melihat atau mendengar sesuatu, tanyakan isi halusinasi, waktu terjadinya halusinasi, frekuensi terjadinya halusinasi pagi, siang, sore, malam atau sering dan kadang-kadang. Dan diskusikan dengan pasien apa yang dirasakan jika terjadi halusinasi, diskusikan dengan pasien apa yang dilakukan untuk mengatasi perasaan tersebut serta jelaskan tentang dampak yang akan dialami jika pasien menikmati halusinasinya. Penulis juga mengajarkan cara menghardik halusinasi dnegaan cara tutup telinga dan mengatakan pergi pergi.

Pada intervensi ketiga yaitu mengidentifikasi bersama klien cara atau tindakan yang dilakukan jika terjadi halusinasi. Intervensi ini memiliki tujuan agar pasien bisa dapat mengontrol halusinasinya, tindakan keperawatan yang dilakukan seperti diskusikan cara baru untuk memutus atau mengontrol timbulnya halusinasi dengan cara menjelaskan cara menghardik halusinasi, peragakan cara mengahradik, minta pasien memperagakan ulang, pantau penerapan cara ini, beri penguatan perilaku pasien dan memasukan intervensi ini kejadwal kegiatan pasien.

Pada intervensi ke empat yaitu diskusikan dengan pasien tentang manfaat dan kerugian tidak minum obat. Dengan tujuan intervensi pasien dapat memanfaatkan obat dengan baik, tindakan keperawatan yang dilakukan yaitu jelaskan pada pasiententang nama obat, warna obat, bentuk obat, cara minum obat, waktu minum obat berapa kali sehari, kegunaan obat, dan efek

samping obat dan jelaskan akibat berhenti minum obat tanpa konsultasi dengan dokter.

Pada intervensi selanjutnya klien mengajarkan klien untuk mengendalikan halusinasinya dengan cara bercakap-cakap dengan orang sekitar. Penulis menjelaskan manfaat bercakap-cakap ketika klien mengalami halusinasi. Setiap intervensi yang diberikan oleh penulis, klien dianjurkan untuk memasukkan dalam daftar kegiatan harian sehingga klien melakukannya setiap hari.

B. Analisis Intervensi

Pengkajian keperawatan telah dilaksanakan pada tanggal 22-25 Mei 2021 di ruang Kenari Rumah Sakit Khusus Dadi Makassar. Pengkajian dilakukan dengan melakukan survey awal dan pengumpulan data melalui hasil observasi dan wawancara. Pengkajian dilakukan pada Tn. A, Pengkajian yang dilakukan yaitu mengenai data umum klien. Penulis melakukan analisis pada diagnose utama klien yaitu gangguan sensori persepsi : Halusinasi pendengaran, penulis memberikan intervensi cara menghardika apabila mendengarkan suara-suara, intervensi edukasi cara memanfaatkan obat dengan baik dan benar, selanjutnya intervensi cara mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap dan penulis memberikan intervensi tambahan yaitu memberikan terapi dzikir pada klien untuk mengontrol halusinasinya.

Dari beberapa terapi yang dapat dilakukan adalah terapi spiritual, terapi spiritual ini berupa kegiatan ritual keagamaan seperti sholat, berdo'a, memanjatkan puji-pujian kepada tuhan, ceramah keagamaan, kajian kitab suci. Terapi spiritual atau terapi religius yang antara lain dzikir, apa bila di lafalkan secara baik dan benar dapat membuat hati menjadi tenang dan rileks. Terapi dzikir juga dapat diterapkan pada pasien halusinasi, karena ketika pasien melakukan terapi dzikir dengan tekun dan memusatkan perhatian yang sempurna (khusus) dapat memberikan dampak saat halusinasi nya muncul pasien bisa menghilangkan suara-suara yang tidak nyata dan lebih dapat menyibukkan diri dengan melakukan terapi dzikir.

Berdasarkan hasil yang didapat sebelum dilakukan terapi dzikir, klien mengatakan sering mendengar suara-suara aneh yang menuruhnya untuk pergi, klien juga mendengar suara yang mengajaknya untuk berkomunikasi sehingga klien berbicara sendiri, klien tampak bingung, klien tampak gelisah, kontak mata klien kurang dan klien kadang menunduk saat diajak berkomunikasi, klien tampak cemas dan tampak takut.

Setelah dilakukan terapi dzikir hari pertama didapatkan klien mengatakan klien tidak mendengarkan suara pagi hari, klien hanya mendengarkan suara 2 kali pada malam hari. Evaluasi intervensi hari kedua, klien mengatakan setelah diberikan terapi dzikir, klien hanya sekali mendengarkan suara-suara aneh. Klien juga mengatakan apabila mendengar suara klien melakukan terapi dzikir yang diajarkan. Terapi dzikir diberikan satu kali dalam sehari yang diberikan selama 4 hari, dimana hari pada hari ketiga klien mengatakan masih mendengarkan lagi suara-suara aneh, klien juga mengatakan berdzikir pada malam hari. Klien tidak mendengarkan suara pada malam hari sehingga klien tidak gelisah dan tidur klien tidak terganggu. Setelah diberikan intervensi keperawatan psikoreligius : terapi dzikir selama 4 hari, klien mengatakan dirinya lebih tenang.

Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Madepan Mulia, 2021) bahwa hasil penelitian ini menunjukkan penurunan tanda dan gejala halusinasi pendengaran dan peningkatan kemampuan mengatasi halusinasi setelah diberikan tindakan keperawatan terapi psikoreligius: dzikir. Pemberian terapi zikir diberikan bersamaan dengan intervensi berupa SP, dimana hasil dari pemberian terapi ini menunjukkan perubahan pada pasien terkait.

Adapun penelitian yang sejalan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan (Nurdiana, 2020), Dari hasil intervensi yang dilakukan selama 4 hari didapatkan bahwa terapi Spiritual : dzikir dapat mengontrol halusinasi pendengaran pada Tn.A. Kesimpulan dari intervensi mengontrol halusinasi pendengaran dapat diidentifikasi dan dikendalikan dengan salah satunya penerapan terapi spiritual : dzikir dengan strategi pelaksanaan (Sp1-Sp 4).

Penelitian lain dilakukan oleh (Suryani P. H., 2020), Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terapi psikoreligious: dzikir dalam mengontrol halusinasi pada pasien skizofrenia (p value = 0,000), Hasil penelitian ini dapat dijadikan terapi tambahan dalam mengontrol halusinasi pada pasien dengan halusinasi pendengaran. Pada penelitian ini, peneliti melibatkan 20 orang responden sebagai sampel penelitian dengan rancangan penelitian *One Group pretest-posttest* dimana rancangan yang tidak ada kelompok pembandingan (kontrol). Analisis yang dilakukan oleh penulis juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Slamet Wiwi Jayanti, 2021) bahwa Tindakan teknik menghardik dengan zikir pada pasien halusinasi dapat membantu menurunkan tingkat halusinasi yaitu saat pretest rata-rata nilai skor 3-4, sedangkan posttest rata-rata nilai skor 0-1. Teknik kombinasi menghardik dengan zikir dilakukan selama 3 kali pertemuan dan menunjukkan hasil yang efektif sehingga dapat menurunkan tingkat halusinasi.

Dalam hal kepercayaan muslim, shalat dan dzikir adalah kewajiban untuk beribadah kepada Tuhan dan dilakukan lima kali dalam satu hari (Suryani, 2013). Mereka mempercayai bahwa Tuhan lah yang lebih berkuasa sehingga mereka meminta bantuan untuk mengurangi suara halusinasi itu dengan beribadah kepada Allah SWT. Keuntungan yang didapatkan dalam shalat yaitu dapat memberikan ketenangan hati, mengurangi kecemasan, gundah-gulana kehidupan dan kesulitan hidup (Suryani, 2013). Dzikir yaitu dengan mengingat Tuhan dengan beberapa kalimat seperti “*Laailahailallah, Allohu Akbar*”, “*Subhanalloh*” dan “*Astagfirulloh*” dilakukan setelah shalat dan dapat dilakukan kapanpun ketika membutuhkan pertolongan Allah atau ketika merasa ketakutan, ketika suara-suara tersebut muncul. Dzikir dapat digunakan untuk memberikan ketenangan karena zat endorfin keluar otomatis dalam otak, zat tersebut seperti morfin namun yang dihasilkan secara alami oleh tubuh dapat mengurangi rasa sakit dan memberikan perasaan positif (S Suryani, 2013).

Seorang muslim memang diperintahkan untuk berdzikir kepada Allah SWT pada setiap waktu dengan hati, lisan, dan anggota badannya, karena dzikir adalah obat kegersangan hati yang dapat melandasi perilaku manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ra'du / 13 : 28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Terjemah :

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab bahwa orang-orang yang selalu kembali kepada Allah SWT dan menyambut kebenaran itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang ketika berdzikir mengingat Allah dengan membaca Al-Qur'an dan sebagainya, hati mereka menjadi tenang. Hati memang tidak akan dapat tenang ketika tanpa mengingat dan merenungkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah, dengan selalu mengharapkan keridaan-Nya. Orang-orang yang beriman dan hati kita menjadi tentram disebabkan karena dzikir, sungguh hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.

Saat zikir telah menembus seluruh bagian tubuh bahkan ke setiap sel-sel dari tubuh, hal ini akan berpengaruh terhadap tubuh (fisik) dengan merasakan getaran rasa yang lemas dan menembus ke seluruh tubuh. Pada saat inilah tubuh manusia merasakan relaksasi atau pengendoran saraf sehingga ketegangan-ketegangan jiwa (stres) akibat tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani akan berkurang bahkan bisa saja hilang sama sekali. (Misbakhuddin & Siti Arofah, 2015)

Saraf yang ditembus oleh zikir adalah sistem saraf pusat karena pada penderita skizofrenia terjadinya perubahan sistem transmisi sinyal penghantar syaraf (neurotransmitter) dan reseptor di sel-sel syaraf otak (neuron), sama halnya dengan penderita halusinasi dimana klien merasakan suatu stimulus

yang sebenarnya tidak ada. Zikir juga mampu melepaskan hormon serotonin yang berfungsi untuk mengatur suasana perasaan dan mencegah depresi. Kemudian hormon endorfin yang berfungsi untuk mengurangi kecemasan dan merasa lebih baik (Misbakhuddin & Siti Arofah, 2015)

Menurut penulis, terapi zikir mempengaruhi terhadap pengontrolan halusinasi pasien. Pasien setelah melakukan terapi zikir mampu menguasai bahkan menghilangkan halusinasi disaat halusinasi tersebut datang. Sehingga pasien merasa tenang dan tidak merasa gelisah lagi.

Kelebihan dari analisis ini adalah pasien dapat lebih mengenal cara berzikir yang baik dan bahkan pasien dapat lebih dekat dengan Allah SWT sebagai penciptanya. Kekurangan pada analisis ini yaitu kurangnya waktu untuk bertemu dengan klien karena jadwal dinas yang ditetapkan pada mahasiswa yaitu mulai jam 09.00 sampai dengan jam 12.00. Pemberian terapi dzikir hanya diberikan satu kali dalam sehari karena mengingka waktu yang kurang untuk bertemu dengan klien.

C. Alternatif Pemecahan Masalah

Alternatif pemecahan masalah yang dilakukan kendala pertama yang di dapat saat memberikan terapi pada pasien yaitu awalnya pasien tidak menunjukkan ketertarikan terhadap terapi yang akan diberikan dan pasien terlihat kurang memperhatikan apa yang di sampaikan oleh penulis pemecahan masalahnya yaitu ajak pasien bercerita tentang kehidupannya dengan menanyakan apa hobinya dan apa yang ia sukai. Setelah pasien di ajak bercerita di saat itu lah penulis memberikan intervensi keperawatan dan terapi spiritual : dzikir. Pemecahan masalahnya yaitu penulis mengkaji pasien saat suasana hati pasien sedang baik dan di tempat terbuka. Adapun alternative lain untuk pemecahan masalah halusinasi pendengaran yaitu dengan mendengarkan terapi music. Terapi music ini bertujuan untuk menjadikan klien halusinasi menjadi tenang, klien berkonsentrasi sehingga kinerja perhatian dapat mengalihkan halusinasi klien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan dan analisis pengaruh terapi dzikir pada Tn. A untuk mengontrol halusinasi, maka dapat disimpulkan :

1. Pengkajian dilakukan tanggal 22 Mei 2021

Pengkajian merupakan tahap awal proses keperawatan, berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan pada Tn. A yaitu data subjektif, klien mengatakan sering mendengar suara-suara aneh yang menyuruhnya untuk pergi, klien juga mengatakan suara aneh tersebut sering mengajaknya untuk berkomunikasi. Klien sering mendengar suara-suara pada malam sebelum sebelum tidur dan pada pagi hari dengan frekuensi 2-3 kali sehari dengan durasi kurang lebih 3 menit. Adapun data objektif yang ditemukan antara lain klien kooperatif, kontak mata klien kurang, klien juga kadang menunduk dan tidak menatap lawan bicara saat diajak berkomunikasi. Klien tampak bingung, klien tampak cemas dan klien merasa takut.

2. Diagnosa keperawatan

Berdasarkan data yang didapatkan pada saat pengkajian Diagnosa utama muncul saat dilakukan pengkajian pada Tn. A yaitu gangguan persepsi sensori : Halusinasi pendengaran

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan disusun berdasarkan diagnose yang muncul dan disusun berdasarkan rencana asuhan keperawatan secara teori. Adapun rencana tindakan yang dilakukan pada Tn. A yaitu yang pertama penulis melakukan bina hubungan saling percaya antara klien dengan penulis agar klien terbuka kepada penulis, selanjutnya rencana tindakan yang dilakukan adalah mengajarkan klien SP I sampai dengan

SP IV untuk mengatasi ataupun mengontrol halusinasi pendengaran, serta penulis mengajarkan kepada klien mengenai penerapan terapi Dzikir untuk mengontrol halusinasi.

4. Implementasi

Adapun implementasi yang dilakukan sesuai dengan rencana tindakan yang telah disusun oleh penulis. Penulis melaksanakan intervensi yaitu cara mengatasi dan mengontrol halusinasi yaitu dengan mengajarkan cara menghardik halusinasi, edukasi memanfaatkan obat, latihan bercakap-cakap, dan kegiatan harian klien terjadwal dengan melakukan penerapan terapi dzikir untuk mengontrol halusinasi.

5. Evaluasi

Setelah diberikan terapi 4 hari yang dilakukan sekali dalam sehari didapatkan adanya peningkatan terhadap kemampuan klien mengontrol halusinasi pendengaran, dimana sebelum diberikan terapi dzikir klien mendengar suara-suara aneh yaitu suara yang menyuruhnya untuk pergi, suara yang mengajaknya berkomunikasi sehingga klien bicara sendiri, suara tersebut didengar 2-3 sehari dengan durasi kurang lebih 3 menit dan setelah diberikan intervensi terapi dzikir klien tidak mendengarkan suara-suara aneh tersebut. Klien selalu mencontohkan terapi dzikir yang diajarkan penulis dan memasukkan kedalam jadwal kegiatan harian. Tanda dan gejala setelah diberikan terapi dzikir yaitu klien tidak lagi mendengarkan suara-suara, klien tampak tenang, klien tidak merasa takut lagi, klien tidak gelisah dan kontak mata klien baik saat diajak berbicara.

B. Saran

1. Rumah Sakit

Rumah sakit diharapkan bisa menambah fasilitas dan senantiasa menciptakan lingkungan yang terapeutik guna mempercepat penyembuhan klien

2. Bidang keperawatan

Perawat sebagai seseorang yang memberikan asuhan keperawatan pada halusinasi, perlu melakukan pendekatan singkat namun sering dilakukan sebagai upaya untuk membina hubungan saling percaya antara perawat dengan klien. Perawat sangat diharapkan selalu memberikan semangat dan dorongan kepada klien dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya Sehingga dapat mempercepat penyembuhan klien.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Natsir, & Abdul Muhith. (2011). *Dasar-Dasar Keperawatan Jiwa Pengantar dan Teori*. Jakarta: Salemba Medika.
- Ajit N Shah, D. R., Xiantong Xin, & Li Zhang. (2011). Deletion of a subgroup of ribosome-related genes minimizes hypoxia-induced changes and confers hypoxia tolerance. *Physiol Genomics*, 43(14):855-72.
- Arham, M. U. (2015). Terapi Spiritual Melalui Dzikir Pada Santri Gangguan Jiwa Di Pp. Al-Qodir Cangkringan Yogyakarta. *FKD UIN Sunan Kalijaga*.
- Arif Munandar, K. Y. (2019). Terapi Psikoreligius Dzikir Menggunakan Jari Tangan Kanan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Vol 10 No. 1 Juli 2019*, 69-75.
- Budi Anna Keliat, A. H., & Novy Helena. (2018). *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas : CMHN (Basic Course)*. Jakarta: EGC.
- Dermawan, D. (2017). Pengaruh Terapi Psikoreligius: Dzikir Pada Pasien Halusinasi Pendengaran di RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta . *PROFESI (Profesional Islam)*, Volume 15 : No 1. 70-74.
- Direja. (2011). *Buku Asuhan Keperawatan Jiwa Edisi I*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Farida Kusuma, Y. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika.
- Farida Kusumawati, Y. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika.
- Ibrahim, A. S. (2011). *Skizofrenia Spliting Personality*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Keliat, B. A. (2011). *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas CMHN (Basic Crouse)*. Jakarta: EGC.
- Keliat, B. A. (2014). *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas : CMHN (Basic Course)*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Madepan Mulia, J. D. (2021). Penerapan Terapi Psikoreligius: Zikir Terhadap Tanda Dan Gejala Serta Kemampuan Mengatasi Halusinasi. *Madago Nursing Journal*, Vol. 2 No. 1 hal. 22-26.

- Mamnu'ah. (2010). Stres dan Strategi Koping Keluarga Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Halusinasi. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*.
- Mery Fanada, W. (2012). Perawat Dalam Penerapan Therapi Psikoreligius Untuk Menurunkan Tingkat Stress Pada Pasien Halusinasi Pendengaran Di Rawat Inap Bangaurumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang 2012. *Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan*.
- Misbakhuddin, A. D., & Siti Arofah. (2015). Zikir sebagai Terapi Penderita Skizofrenia (Living Alquran di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Eks-Psikotik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur). 1-19.
- Muhith, A. (2015). *Pendidikan Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Muhith, A. (2015). *Pendidikan Keperawatan Jiwa Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nurdiana. (2020). Penerapan Terapi Spiritual : Dzikir Pada Tn. A Terhadap Kemampuan Mengontrol Halusinasi Pendengaran Di Ruang Nuri Rsj Prof Hb Sa'anin Padang Tahun 2020. *Karya Ilmiah Akhir Ners (Kia-N) Stikes Perintis Padang*.
- Oktiviani, D. (2020). Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Tn.K dengan masalah Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran di Ruang Rokan Rumah Sakit Jiwa Tampan. *Poltekkes Kemenkes Riau*.
- Risnah, & Muhammad Irwan. (2021). *Falsafah dan Teori Keperawatan dalam Integrasi Keilmuan*. Gowa: Alauddin University Press.
- Sari, D. P. (2014). Mengembangkan Kemampuan Self Regulation : Ranah Kognitif, Motivasi Dan Metakognisi. *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol 3 No 2.
- Slamet Wiwi Jayanti, M. (2021). Pengaruh Teknik Kombinasi Menghardik Dengan Zikir Terhadap Penurunan Halusinasi. *Ners Muda*, Vol 2 No 1, April hal. 43-48.
- Stuart. (2016). *Prinsip Dan Praktek Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Singapore: Elsevier Inc.
- Stuart Gail W, S. (2013). *Buku Saku Keperawatan Jiwa (terjemah)*. Eds 3. Jakarta: EGC.
- Suryani. (2013). Pengalaman Penderita Skizofrenia tentang Proses Terjadinya Halusinasi . *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*.
- Suryani. (2013). Salat and dzikir to Dispel Voices: The Experience of Indonesia Muslim with Chronic Mental Illness. *Original Paper. MJP Online Early*.

- Suryani, P. H. (2020). Pengaruh Terapi Psikoreligious: Dzikir dalam Mengontrol Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Skizofrenia yang Muslim di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 821-826.
- Sutejo. (2019). *Keperawatan Kesehatan Jiwa : Prinsip dan Praktik Asuhan Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. 2017. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) Edisi 1 Cetakan 3(Revisi) . Jakarta : Dewan Pengurus Pusat PPNI
- Videbeck. (2008). *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: EGC.
- Wulandari, T. (2018). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Perubahan Tingkat Kemampuan Keluarga Dalam Perawatan Halusinasi Di Wilayah Kerja Puskesmas Geger Kabupaten Madiun. *Skripsi. Program Studi Keperawatan Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun*.
- Yosep, I. (2010). *Keperawatan Jiwa*. Bandung: Refia Aditama.
- Yosep, I. (2011). *Keperawatan Jiwa Edisi 4*. Jakarta: Refika Aditaman.
- Yusuf, H. M., & Fani Okviansanti. (2016). *Kebutuhan Spiritual : Konsep dan Aplikasi dalam Asuhan Keperawatan*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Yusuf, R., & Hanik Endang Nihayati. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika.



L

A

M

P

I

R



DOKUMENTASI



UJI TURNITIN

KTI AYU RAHAYU FIX

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.stikesperintis.ac.id Internet Source	6%
2	ji.unbari.ac.id Internet Source	2%
3	text-id.123dok.com Internet Source	2%
4	ktijiwa.blogspot.com Internet Source	2%
5	repository.ump.ac.id Internet Source	2%
6	repository.phb.ac.id Internet Source	1%
7	repository.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	1%
8	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
9	ojs.dinamikakesehatan.unism.ac.id Internet Source	1%

10	es.scribd.com Internet Source	1 %
11	repository.poltekkes-kaltim.ac.id Internet Source	1 %
12	doku.pub Internet Source	1 %
13	www.scribd.com Internet Source	1 %
14	www.jurnal.payungnegeri.ac.id Internet Source	1 %
15	dayatvetra.wordpress.com Internet Source	1 %
16	adoc.pub Internet Source	1 %
17	pt.scribd.com Internet Source	1 %
18	repository.stikes-bhm.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ayu Rahayu, Lahir di Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), Pada tanggal 25 Maret 1998. Merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Rukmini. Mulai menempuh pendidikan formal pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar di **SD Negeri 1 Ncera** pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan Menengah pertama di **MTs Negeri 2 Kota Bima** dan tamat pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di **MAN 2 Kota Bima** pada tahun 2012 selesai pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa **Keperawatan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar** pada tahun 2015 lulus melalui jalur SPAN-PTKIN. Pada tahun 2019 penulis menyelesaikan studi Strata 1 (S1) Keperawatan dan tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa program Profesi Ners angkatan XVI dan selesai pada Tahun 2021.

