

**PENGARUH LATIHAN *RANGE OF MOTION* (ROM) AKTIF  
DAN PASIF PADA LANSIA YANG MENGALAMI SINDROM  
*GERIATRIC IMMOBILITY* DENGAN MASALAH GANGGUAN  
MOBILITAS FISIK**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Tugas Akhir Ners**

Oleh :

YULIADI YUSUF S.KEP

NIM: 70900120017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**



**PENGARUH LATIHAN *RANGE OF MOTION* (ROM) AKTIF  
DAN PASIF PADA LANSIA YANG MENGALAMI SINDROM  
GERIATRIC *IMMOBILITY* DENGAN MASALAH GANGGUAN  
MOBILITAS FISIK**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Tugas Akhir Ners**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas  
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

YULIADI YUSUF S.KEP

NIM: 70900120017

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**



## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuliadi Yusuf, S.Kep  
NIM : 70900120017  
Tempat/Tgl. Lahir : Batudaa, 27 Juli 1998  
Jurusan/Prodi : Profesi Ners  
Konsentrasi : Keperawatan Gerontik  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Masjid Haji UGI, Kompleks Graha Aliyah Katangka  
Judul : Pengaruh Latihan Range Of Motion (Rom) Aktif Dan Pasif Pada Lansia Yang Mengalami Sindrom Geriatric Immobility Dengan Masalah Gangguan Mobilitas Fisik

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tugas akhir ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 13 Juli 2021

Penyusun

Yuliadi Yusuf, S.Kep  
NIM: 70900120017

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners saudara Yuliadi Yusuf, S.Kep NIM : 70900120017, mahasiswa program studi profesi ners jurusan keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul **“Pengaruh Latihan Range Of Motion (Rom) Aktif Dan Pasif Pada Lansia yang Mengalami Sindrom Geriatric Immobility Dengan Masalah Gangguan Mobilitas Fisik”** memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut

Gowa, 14 Juli 2021



Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kes  
Pembimbing 1



Ns Aidah Fitriani S.Kep.,M.Kep  
Pembimbing 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "Pengaruh latihan range of motion (rom) aktif dan pasif pada lansia yang mengalami sindrom geriatric immobility dengan masalah gangguan mobilitas fisik" yang disusun oleh Yuliadi Yusuf, S.Kep NIM : 70900120017, Mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan di pertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari kamis dan tanggal 15 juli 2021 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

**Makassar, 15 Juli 2021**  
**05 Dzulhijjah 1442 H**

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Ns Mutahharah S.Kep.,M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Wahyudin G, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Ns Aidah Fitriani S.Kep.,M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP. 198007012006042002

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Shalawat beserta salam kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Tugas akhir Ners yang berjudul “Pengaruh latihan *range of motion (ROM)* aktif dan pasif pada lansia yang mengalami sindrom geriatric *Immobility* dengan masalah gangguan mobilitas fisik” ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan di program studi. Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis membutuhkan kritik dan saran dari dewan penguji untuk melengkapi hal-hal yang harus dilengkapi, ataupun jika ditemukan kesalahan dalam penulisan mohon diharapkan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk menunjang kualitas dari karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar ners dir jurusan keperawatan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. dr Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Dr Patima S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Kepala Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ns. Eny Sutria S.Kep.,M.Kes dan Ns Aidah Fitriani S.Kep.,M.Kep selaku Pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini.
4. Seluruh Dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Keluarga tercinta terimakasih yang tak terhingga atas doa dan dukungannya selama ini.
6. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu dalam penyusunan proposal tugas akhir ners ini.

Penulis mengharapkan tugas ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat di



rasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Samata, 14 Juli 2021



Yuliadi Yusuf



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	10
PENDAHULUAN .....	10
A. Latar Belakang .....	10
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus .....	12
D. Manfaat .....	12
BAB II.....	14
KAJIAN TEORI.....	14
A. Konsep Teori <i>Immobility/Immobilitas</i> .....	14
B. Konsep Keperawatan .....	20
C. <i>Evidence Based Nursing (Range Of Motion/ROM)</i> .....	32
BAB III.....	40
LAPORAN KASUS.....	40
A. Pengkajian .....	40
B. Diagnosis Keperawatan.....	62
C. Intervensi Keperawatan .....	63
D. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan .....	66
E. Evaluasi .....	74
BAB IV.....	75
PEMBAHASAN.....	75
A. Analisis Kasus.....	75
B. Analisis Intervensi.....	77
C. Alternatif Pemecahan Masalah .....	80
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82

<b>B. Saran-Saran .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>
<b>A. Pathway .....</b>	<b>84</b>
<b>B. Jurnal Rujukan Utama .....</b>	<b>85</b>
<b>C. Daftar Riwayat Hidup.....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lanjut usia atau yang lebih dikenal dengan lansia merupakan suatu kelompok yang karena usianya mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan dan sosial. Perubahan ini akan memberikan pengaruh pada seluruh aspek kehidupan, termasuk kesehatannya. Oleh karena itu, kesehatan lansia perlu mendapatkan perhatian khusus dengan tetap dipelihara dan ditingkatkan agar selama mungkin dapat hidup secara produktif sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan (UU Kesehatan No. 23 tahun 1992, pasal 19 ayat 1).

Menurut World Health Organization (*WHO*) Lanjut usia (lansia) merupakan individu dengan usia 60 tahun. 1,2 Juta Populasi lansia di seluruh dunia diperkirakan akan mengalami kenaikan 2 kali lipat pada tahun 2015 dan 2050 yaitu sebesar 12% dan 22% (World Health Organization, 2018).

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) negara Indonesia saat ini telah memasuki pada periode aging population, dimana terdapat peningkatan umur tentang harapan hidup yang disertai dengan kenaikan drastis tingkat jumlah pada kelompok lansia. Di Indonesia terjadi peningkatan jumlah penduduk pada kelompok usia lanjut dari 18 juta jiwa (7,56%) pada tahun 2010, berubah menjadi 25,9 juta jiwa (9,7%) pada tahun 2019, dan dapat diperkirakan bahwa akan terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2035 menjadi 48,2 juta jiwa. (Riskesdas, 2018)

Berdasarkan survey data dari Riskesdas tahun 2018, penyakit yang sering dialami oleh lansia dalam kelompok penyakit tidak menular di Indonesia antara lain yaitu hipertensi, penyakit sendi, masalah gigi, diabetes melitus stroke, penyakit jantung, dan penyakit yang bersifat menular antara lain yaitu pneumonia, ISPA, dan diare. Khusus pada penyakit sendi paling banyak terjadi pada usia 55-64 (15,55%), pada usia 65-74 (18,63%) dan pada usia 75+ (18,95%). Di Sulawesi Selatan prevalensi penyakit sendi pada usia 55-64 (13,64%), pada usia 65-74 (17,10%) dan pada usia diatas 75 tahun (16,82%) (Riskesdas, 2018).

Seiring bertambahnya usia, lansia akan mengalami beberapa masalah yang biasa dikenal dengan 14i sindrom geriatric, Salah satu sindrom geriatric yaitu *Immobility*. *Immobility* atau yang lebih dikenal dengan imobilitas adalah

Menurut definisi oleh salah satu organisasi dunia dalam lingkup penyusun standar diagnosis yaitu *American Nursing Diagnosis Association* (NANDA) mendefinisikan gangguan mobilitas fisik atau disebut immobilisasi adalah kondisi atau keadaan dimana suatu individu memiliki ruang gerak yang terbatas atau beresiko dalam melakukan aktivitas gerak . (Kim et al, 1995).

Imobilitas atau immobilisasi yaitu suatu kondisi dimana seorang individu tidak mampu untuk melakukan pergerakan secara luas karena pada situasi yang mengganggu langkah atau pergerakan pada aktivitas, contohnya seperti pada pasien yang mengalami trauma pada tulang belakang, cedera otak skala berat disertai dengan patah tulang pada bagian ekstremitas dan sebagainya. (NANDA, 2012).

Penyakit sendi sangat berhubungan erat dengan sindrom geriatric. *Immobility* pada lansia, dapat diketahui arti dari *Immobility* / imobilitas keadaan dimana seseorang mengalami keterbatasan gerak yang disebabkan oleh kondisi atau penyakit tertentu. Berdasarkan hasil observasi langsung selama praktik di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) Gau Mabaji Gowa, jumlah klien tercatat 6 orang. Diantara 6 klien lansia, terdapat 3 lansia yang mengalami masalah *Immobility* atau gangguan mobilitas fisik.

Imobilitas pada lansia dapat dicegah sedini mungkin sebelum terjadi komplikasi dari masalah tersebut, salah satu caranya dengan cara latihan Range Of Motion (ROM), dimana intervensi ini dapat mengatasi kekakuan pada ekstremitas-ekstremitas dan dapat melancarkan sirkulasi darah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Nurfatma Sari tentang pengaruh latihan *Range of Motion* aktif terhadap peningkatan kekuatan otot ekstremitas atas bawah lansia menunjukkan adanya pengaruh atau perubahan kekuatan otot setelah diberikan intervensi (Adriani & Sari, 2019). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh *range of motion* (ROM) pasif terhadap fleksibilitas sendi pada lansia setelah diberikan

intervensi sehingga meningkatkan rentang gerak. (sahmad, Yunus, & Sarmawan, 2016)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa penting untuk menganalisis ”Pengaruh latihan *range of motion (ROM)* aktif dan pasif pada lansia yang mengalami sindrom geriatric *Immobility* dengan masalah gangguan mobilitas fisik”

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Pengaruh latihan *range of motion (ROM)* aktif dan pasif pada lansia yang mengalami sindrom geriatric *Immobility* dengan masalah gangguan mobilitas fisik ?

## **C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus**

### **Tujuan Umum**

Untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatric *Immobility*

### **Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui pengkajian keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatric *Immobility*
2. Untuk mengetahui diagnosis keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatric *Immobility*
3. Untuk mengetahui intervensi keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatric *Immobility*
4. Untuk mengetahui implementasi keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatric *Immobility*
5. Untuk mengetahui evaluasi keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatric *Immobility*
6. Untuk menganalisis intervensi latihan *range of motion (rom)* aktif dan pasif pada lansia yang mengalami sindrom geriatric *Immobility*

## **D. Manfaat**

1. Manfaat Teoritis

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan praktik



asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatric *Immobility*

## 2. Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan pada intervensi masalah gangguan mobilitas fisik terhadap lansia yang mengalami sindrom geriatric *Immobility*



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Teori *Immobility/Immobilitas*

Secara umum sindrom geriatric merupakan kumpulan ataupun gejala gejala pada kondisi kesehatan yang lazim dikeluhkan oleh kelompok lansia atau lanjut usia dan/atau keluarganya. Sindrom bukan merupakan suatu penyakit, namun dengan timbulnya kondisi tersebut dibutuhkanlah upaya dalam penanganan sedini mungkin untuk mencari terkait penyakit yang mendasari sebab munculnya sindrom tersebut.

Menurut Solomon et al. (1994) ada beberapa masalah yang sering dialami oleh lansia atau populasi geriatric seperti imobilitas atau keterbatasan gerak (*Immobility*), impaksi atau sembelit (*impaction*), ketidakseimbangan atau gangguan keseimbangan (*instability*), latrogenik atau penyakit akibat konsumsi obat (*latrogenic*), kemunduran intelektual atau perubahan intelektual (*intellectual impairment*), gangguan/sulit tidur (*insomnia*), inkontinensia atau BAK tidak terkontrol (*incontinence*), menutup diri atau tidak bersosialisasi (*isolation*), impoten atau disfungsi ereksi (*impotence*), penurunan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh (*imuno-defficiency*), mudah terinfeksi, malnutrisi kekurangan nutrisi (*inanutition*), serta gangguan panca indera yaitu penglihatan, pembauan, pendengaran dan lain-lain (Dini, 2013)

#### 1. Definisi

Imobilisasi atau Gangguan mobilitas fisik berdasarkan definisi oleh NANDA (*North American Nursing Diagnosis Association*) Merupakan kondisi individu mengalami atau berisiko terjadinya keterbatasan gerak pada fisik. (Kim et al, 1995) dalam (Nasrullah, 2021)

Immobilisasi atau Immobilitas adalah suatu kondisi dimana suatu individu tidak mampu bergerak dengan bebas karena disebabkan dengan kondisi yang kiranya bisa mengganggu pada pergerakan pada aktivitas, contohnya yaitu pada kasus pasien dengan trauma pada tulang belakang, pasien dengan cedera berat pada bagian otak disertai patah tulang pada area ekstremitas. Perubahan pada tingkat mobilitas fisik dapat

menyebabkan instruksi terhadap pembatasan gerak pada fisi dalam bentuk tirah baring atau *bedres*, pembatasan pada pergerakan fisik selama menggunakan alat bantu eksternal (contohnya traksi rangka atau gips), pembebasan gerak volunter, atau pada kehilangan fungsi sistem motorik. (Potter dan Perry, 2005) dalam (Nasrullah, 2021)

## 2. Etiologi

Faktor utama imobilisasi adalah berawal dari terdapatnya rasa sakit atau nyeri, lemah, keku pada otot, kurangnya keseimbangan, serta pada masalah yang berhubungan psikologi klien. Kondisi Osteoarthritis atau nyeri sendi menjadi salah satu faktor pencetus kekakuan terhadap lansia atau usia lanjut. Masalah fungsi kognitif berat contohnya seperti demensia serta masalah fungsi mental, seperti pada masalah depresi bisa menyebabkan imobilisasi. Ansietas keluarga secara berlebihan dapat menyebabkan kelompok usia lanjut terus menerus berbaring dibed baik di rumah sakit maupun dirumah. Beberapa faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya imobilisasi, yaitu :

- a. Gangguan muskuloskeletal :
  - 1) Osteoporosis.
  - 2) Atrofi.
  - 3) Kontraktur.
  - 4) Kekakuan sendi.
- b. Gangguan kardiovaskular :
  1. Hipotensi postural.
  2. Vasodilatasi vena.
  3. Peningkatan penggunaan valsava manuver.
- c. Gangguan sistem respirasi :
  - 1) Penurunan gerak pernafasan.
  - 2) Bertambahnya sekresi paru.
  - 3) Atelektasis.
  - 4) Pneumonia hipostatis.

## 3. Manifestasi Klinis

Perubahan-perubahan pada sistem tubuh yang disebabkan oleh immobilisasi yaitu seperti :

a. Perubahan Metabolik

Sistem hormon atau sistem endokrin, yang merupakan tempatnya hormon sekresi kelenjar diproduksi, dapat membantu untuk mempertahankan serta mengatur pada fungsi-fungsi vital contohnya seperti :

- 1) Respons tubuh terhadap stress dan cedera.
- 2) Sistem Pertumbuhan dan sistem perkembangan.
- 3) Sistem Reproduksi.
- 4) Kondisi Homeostasis ion.
- 5) Proses Metabolisme energi.

Sistem endokrin sangat berperan penting dalam mempertahankan kondisi homeostasis ion. Dimana sistem endokrin ini sangat berperan pada pengaturan lingkungan eksternal dengan cara mempertahankan keseimbangan asam basa, air, kalium dan natrium.

b. Perubahan sistem pernapasan/respirasi

Klien yang mengalami immobilisasi berisiko tinggi pada terjadinya komplikasi paru-paru. Komplikasi paru-paru yang paling umum adalah atelektasis dan pneumonia hipostatik.

c. Perubahan system kardiovaskular

Terdapat tiga perubahan utama yang bisa terjadi pada klien/klien dengan immobilisasi pada sistem kardiovaskuler, yaitu :

- 1) Hipotensi ortostatik, merupakan kondisi menurunnya tekanan darah sistole 25 mmHg dan diastole 10 mmHg saat klien bangun dari posisi berbaring atau duduk kembali ke posisi berdiri.
- 2) Peningkatan beban kerja jantung.
- 3) Pembentukan thrombus

d. Perubahan system musculoskeletal

Pengaruh imobilisasi pada sistem muskuloskeletal meliputi gangguan imobilisasi permanen. Keterbatasan mobilisasi mempengaruhi otot klien melalui kehilangan daya tahan, penurunan massa otot, atrofi, dan penurunan stabilitas.

e. Perubahan Sistem Integumen

Perubahan signifikan yang terjadi pada sistem integument yaitu menurunnya elastisitas pada kulit lansia yang disebabkan oleh proses sirkulasi darah yang terganggu karena kurangnya aktivitas gerak dan terjadinya masalah iskemia, serta jaringan yang mengalami anoksia. Jaringan yang mengalami tekanan, peredaran darah yang membelok serta terjadinya penyempitan pembuluh darah yang kuat. Kondisi ini menyebabkan respirasi sel terhambat dan menyebabkan matinya sel-sel. (Ebersole dan Hess, 1994) dalam (Nasrullah, 2021).

f. Perubahan eliminasi urine

Dalam kondisi imobilisasi, pasien bertumpu pada posisi *rekumben position*, ginjal atau ureter adalah garis datar seperti ginjal yang membentuk urin dan harus memasuki kandung kemih melawan gravitasi. Karena kontraksi peristaltik ureter yang tidak cukup kuat terhadap gaya gravitasi, panggul ginjal menjadi terisi sebelum urin memasuki ureter. Kondisi ini disebut stasis urin dan meningkatkan risiko infeksi saluran kemih dan batu ginjal.

(Perry dan Potter, 2005) dalam (Nasrullah, 2021).

#### 4. Patofisiologi

Mobilisasi atau aktivitas gerak 100% dipengaruhi oleh sistem tubuh yang disebut dengan sistem saraf atau neuromuskular, meliputi sistem saraf, kortilago, tendon, ligamen, sendi, otot dan skeletal. Otot Skeletal berperan dalam mengatur pergerakan tulang karena dengan adanya kemampuan otot dalam berkontraksi serta relaksasi yang bekerja dengan cara mengungkit. terdapat 2 tipe kontraksi otot yaitu: isometrik dan isotonik. Pada Kontraksi isometrik menyebabkan adanya peningkatan tekanan pada otot atau aktivitas otot tetapi tidak ada gerakan aktif atau

pemendekan dari otot, contohnya, dengan menganjurkan pada klien untuk melakukan latihan kuad risep. kontraksi isotonik, peningkatan pada tekanan otot sehingga menyebabkan otot memendek. Gerakan volunter merupakan gabungan dari kontraksi isotonik dan kontraksi isometrik. walaupun kontraksi isometrik tidak dapat menyebabkan otot untuk memendek, akan tetapi penggunaan energi mengalami peningkatan.

Perawat wajib mengenal atau mengetahui adanya proses peningkatan energi (peningkatan kecepatan pola pernafasan, ketidakstabilan irama jantung, tekanan darah) yang disebabkan karena latihan isometrik. kondisi ini menjadi tanda kontra indikasi terhadap klien yang sakit (infark miokard atau penyakit obstruksi paru kronik). Postur tubuh dan Gerakan Otot menggambarkan kondisi kepribadian dan keadaan suasana hati seorang individu dan tergantung dengan ukuran skeletal serta perkembangan otot skeletal. Kombinasi serta pengaturan terhadap kelompok otot tergantung dari kondisi tonus otot dan aktifitas-aktifitas dari otot yang berlawanan arah, sinergis, dan otot-oto yang melawan arah gravitasi bumi. Tonus otot yaitu suatu kondisi tegangan otot yang seimbang.

Ketegangan otot dapat dipertahankan dengan cara terdapatnya kontraksi dan relaksasi yang bergantian secara kontinue melalui aktivitas kerja otot. Tonus otot dapat mempertahankan posisi tubuh secara fungsional dan dapat mendukung arus balik aliran darah menuju jantung. Immobilisasi dapat menjadi penyebab kurangnya aktifitas dan tonus otot. Skeletal merupakan alat gerak pasif pendukung tubuh yang terdiri dari empat tipe tulang panjang, pendek, pipih, dan irreguler (tidak beraturan). Sistem skeletal sangat berfungsi dalam menggerakkan tubuh secara pasif, melindungi organ-organ vital tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan lain sebagainya, membantu dalam mengatur proses keseimbangan kalsium tulang, berperan terhadap proses pembentukan sel darah merah, Kartilago permanen tidak mengalami osifikasi kecuali pada kelompok usia lanjut dan penyakit sendi, seperti penyakit osteoarthritis (Nasrullah, 2021).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## B. Konsep Keperawatan

### 1. Pengkajian

#### a. Identitas klien

Penilaian identitas pelanggan meliputi nama, jenis kelamin, usia, status perkawinan, keyakinan agama, alamat, dan tanggal masuk RS.

#### b. Riwayat penyakit sekarang

Pengkajian riwayat klien saat ini meliputi alasan utama klien sehingga menyebabkan terjadinya keluhan atau gangguan dalam imobilitas tersebut, seperti terdapatnya rasa nyeri, keluhan pada kelemahan otot, adanya kelelahan, perubahan tingkat imobilitas, daerah terganggunya akibat imobilitas dan rentang waktu terjadinya gangguan mobilitas yang lama.

#### c. Riwayat penyakit yang pernah dialami

Pengkajian riwayat penyakit terkait dengan upaya dalam pemenuhan kebutuhan pada mobilitas, contohnya terdapatnya riwayat suatu penyakit yang berhubungan dengan sistem neurologis (kecelakaan cerebrovaskular, trauma pada kepala, peningkatan TKI atau tekanan intrakranial, miastenia gravis, guillain barre, cedera pada medula spinalis dan lain-lain), adanya riwayat penyakit pada sistem kardiovaskular (infark miokard, CHF atau disebut gagal jantung kongestif), adanya riwayat penyakit pada sistem musculoskeletal yaitu (osteoporosis, fraktur, artritis), adanya riwayat penyakit pada sistem pernafasan atau respirasi (penyakit paru obstruksi menahun atau PPOK, pneumonia dan lain-lain), adanya riwayat terkait pemakaian obat-obatan seperti sedativa, hipnotik, depresan sistem saraf pusat, laksansia, dan lain-lain.

#### d. Pemeriksaan fisik

##### 1) Sistem metabolik

Saat mengkaji pada fungsi metabolik, perawat harus menggunakan alat ukur yaitu pengukuran antropometrik untuk



mengevaluasi atau melihat aktifitas atrofi otot, menggunakan pencatatan proses asupan dan haluaran serta data penunjang seperti hasil laboratorium agar mudah dalam mengevaluasi hasil status cairan elektrolit maupun kadar serum dalam protein serta mengkaji proses penyembuhan luka

## 2) Sistem Respiratori

Pada pasien dengan aktivitas terbatas, sistem pernapasan harus dinilai setidaknya setiap 2 jam. Pengkajian sistem pernapasan meliputi: :

- a) Inspeksi : Pergerakan dinding dada selama siklus inspirasi-ekspirasi selesai. Jika klien memiliki area atelektasis, gerakan dada menjadi asimetris..
- b) Auskultasi : Seluruh area paru-paru untuk memeriksa suara pernapasan yang terganggu. Auskultasi harus fokus pada area dependen paru-paru, karena sekret paru cenderung menumpuk di daerah bawah..

## 3) Sistem Kardiovaskular

Pengkajian sistem kardiovaskular yang harus dilakukan pada klien imobilisasi, meliputi : Memantau tekanan darah Mengevaluasi nadi apeks maupun nadi perifer, Observasi tanda-tanda adanya stasis vena.

## 4) Sistem musculoskeletal

Kelainan musculoskeletal utama dapat dikaji selama pengkajian meliputi penurunan tonus otot, kehilangan massa otot, dan kontraktur

## 5) Sistem Integumen

Perawat harus terus menerus mengkaji kulit klien terhadap tanda-tanda kerusakan. Kulit harus diobservasi ketika klien bergerak, diperhatikan higienisnya, atau dipenuhi kebutuhan eliminasinya.

## 6) Sistem eliminasi

Status eliminasi klien harus dievaluasi setiap shift, dan total asupan dan haluaran dievaluasi setiap 24 jam. Perawat harus menentukan bahwa klien menerima jumlah dan jenis cairan melalui oral atau parenteral dengan benar.

### Pengkajian Kesehatan Lansia

#### 1. Refleksi ekstremitas

Refleksi	Kanan	Kiri
Biceps	+	+
Triceps	+	+
Knee	+	-
Achilles	+	+

Keterangan :

Refleksi (+) : Normal

Refleksi (-) : Menurun / meningkat

#### 2. Pengkajian INDEKS KATZ (Indeks Kemandirian Pada Aktivitas Kehidupan Sehari-hari) (Indeks kemandirian pada aktivitas kehidupan sehari-hari)

SKORE	KRITERIA
<b>A</b>	Kemandirian dalam hal makan, kontinen, berpindah, ke kamar kecil, berpakaian dan mandi.
<b>B</b>	Kemandirian dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali satu dari fungsi tersebut
<b>C</b>	Kemandirian dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali mandi dan satu fungsi tambahan.
<b>D</b>	Kemandirian dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian dan satu fungsi tambahan
<b>E</b>	Kemandirian dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil dan satu fungsi tambahan
<b>F</b>	Kemandirian dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian, berpindah dan satu fungsi tambahan
<b>G</b>	Ketergantungan pada enam fungsi tersebut
<b>Lain-lain</b>	Ketergantungan pada sedikitnya dua fungsi, tetapi, tidak dapat diklasifikasikan sebagai C, D, E atau F.

3. Pengkajian Kemampuan Intelektual Menggunakan SPMSQ (Short Portable Mental Status Questioner)

<i>Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ)</i>			
Score	No	Pertanyaan	Jawab
+	-		
	-	1 Tanggal berapa sekarang ?	
	-	2 Hari apa saat ini ? (hari, tanggal, tahun)	
+		3 Apakah nama tempat ini ?	
		4a Berapakah nomor HP/ telpon anda ?	
+		4b Dimanakah alamat anda ? (silahkan tanyakan jika klien tidak mempunyai no.telepon)	
+		5 Berapakah umur anda ?	
+		6 Kapanakah anda lahir ?	
+		7 Siapakah presiden saat ini ?	
+		8 Siapakah presiden sebelum periode ini ?	
+		9 Siapakah nama kecil orangtua ibu anda ?	
	-	<b>10 Kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap angka baru, semua secara menurun</b>	


Interpretasi :

Salah 0 - 3 : Fungsi intelektual utuh.

Salah 4 - 5 : Fungsi intelektual kerusakan ringan.

Salah 6 - 8 : Fungsi intelektual kerusakan sedang.

Salah 9 - 10 : Fungsi intelektual kerusakan berat.



4. Pengkajian Kemampuan Aspek Kognitif Menggunakan MMSE (Mini Mental Status Exam)

Aspek Kognitif	Nilai Maks	Nilai Klien	Kriteria
1. Orientasi	5	4	Menyebutkan dengan benar : Tahun : 2015 Musim : - Tanggal : 24 Hari : Sabtu Bulan : -
2. Orientasi	5	4	Dimana sekarang kita berada ? Negara : Indonesia Propinsi : Jawa timur Kabupaten / kota : Surabaya Panti : Iya Wisma : -
3. Registrasi	3	3	Sebutkan 3 nama objek (misal : Kursi, meja, kertas) kemudian ditanyakan kepada klien, menjawab : 1. Kursi (B) 2. Meja (B) 3. Kertas (B)
4. Perhatikan dan kalkulasi	5	0	Meminta klien berhitung mulai dari 100 kemudian kurang 7 sampai 5 tingkat. Jawaban : 1. 93 4. 72 2. 86 5. 65 3. 79
5. Mengingat	3	3	Minta klien untuk melaksanakanlah ketiga objek pada poin ke-2 (tiap poin nilai 1)
6. Bahasa	9	2	Menanyakan pada klien tentang benda (sambil menunjukkan benda tersebut) 1. Pintu 2. Meja
		3	Minta klien untuk mengulang kata berikut (poin 3) : (Tidak ada jika, dan, atau tetapi)
		1	Minta klien untuk mengikuti perintah berikut yang terdiri 3 langkah. Ambil kertas di tangan anda, lipat dua dan taruh di lantai, (poin 3) 1. Ambil kertas (bisa) 2. Lipat dua (bisa) 3. Taruh di lantai (bisa)
			Perhatikan pada klien untuk hal berikut : "Tutup mata anda" (bila aktifitas sesuai nilai 1 poin)
Total Nilai	30	23	

Interpretasi hasil :

24 - 30 : Tidak ada gangguan kognitif.

18 - 23 : Gangguan kognitif sedang.

0 - 17 : Gangguan kognitif berat.

skor	Uraian
<b>A. Kesedihan</b>	
3	Saya sangat pilu atau sedih / tidak bahagia dimana saya tak dapat menghadapinya.
2	Saya galau / sedih atau pilu sepanjang waktu dan saya tidak dapat keluar
1	darinya.
0	Saya merasa sedih atau pilu. Saya tidak merasa sedih atau pilu.
<b>B. Pesimisme</b>	
3	Saya rasa bahwa masa depan adalah sia-sia dan sesuatu tidak dapat membaik.
2	Saya rasa tidak mempunyai apa-apa untuk memandang ke depan.
1	Saya rasa berkecil hati mengenai masa depan.
0	Saya tidak begitu pesimis atau kecil hati tentang masa depan.
<b>C. Rasa Kegagalan</b>	
3	Saya merasa benar-benar gagal sebagai seorang orang tua (suami / istri).
2	Bila melihat kehidupan ke belakang, semua yang dapat saya lihat hanya kegagalan.
1	Saya merasa telah gagal melebihi orang tua pada umumnya.
0	Saya tidak merasa gagal
<b>D. Ketidakpuasan</b>	
3	Saya merasa tidak puas dengan segala apapun.
2	Saya merasa tidak lagi mendapatkan kepuasan dari apapun.
1	Saya merasa tidak menyukai langkah yang saya gunakan.
0	Saya merasa tidak tidak puas.
<b>E. Rasa Bersalah</b>	
3	Saya seolah-olah merasa sangat buruk atau tak berharga.
2	Saya sangat merasa bersalah.
1	Saya sangat merasa buruk / tak berharga sebagai bagian dari waktu yang
0	baik. Saya merasa tidak benar-benar bersalah.
<b>F. Tidak menyukai diri sendiri</b>	
3	Saya merasa benci diri saya sendiri.
2	Saya merasa muak dengan diri saya sendiri.
1	Saya merasa tidak suka dengan diri saya sendiri.
0	Saya merasa tidak merasa kecewa dengan diri sendiri
<b>G. Membahayakan diri sendiri</b>	
3	Saya merasa akan membunuh diri saya sendiri jika saya mempunyai kesempatan.
2	Saya merasa mempunyai rencana pasti tentang tujuan bunuh diri.
1	Saya rasa lebih baik mati.
0	Saya merasa tidak mempunyai pikiran-pikiran mengenai membahayakan diri sendiri.

#### **H. Menarik Diri dari Sosial**

- 3 Saya merasa telah kehilangan semua minat saya pada orang lain dan tidak peduli pada mereka semuanya.
- 2 Saya merasa telah kehilangan semua minat saya pada orang lain dan mempunyai sedikit perasaan pada mereka.
- 1 Saya merasa kurang berminat pada orang lain dari pada sebelumnya.
- 0 Saya merasa tidak kehilangan minat pada orang lain.

#### **I. Keragu-raguan**

- 3 Saya merasa tidak dapat membuat keputusan sama sekali.
- 2 Saya merasa mempunyai banyak kesulitan dalam membuat keputusan.
- 1 Saya merasa berusaha mengambil keputusan.
- 0 Saya merasa membuat keputusan yang baik

#### **J. Perubahan gambaran diri**

- 3 Saya rasa bahwa saya jelek atau tampak menjijikkan.
- 2 Saya rasa bahwa ada perubahan-perubahan yang permanen dalam penampilan saya dan ini membuat saya tak menarik.
- 1 Saya merasa khawatir bahwa saya tampak tua atau tak menarik.
- 0 Saya merasa tidak merasa bahwa saya tampak lebih buruk dari pada sebelumnya.

#### **K. Kesulitan Kerja**

- 3 Saya merasa tidak melakukan pekerjaan sama sekali.
- 2 Saya merasa telah mendorong diri saya sendiri dengan keras untuk melakukan sesuatu.
- 1 Saya merasa memerlukan upaya tambahan untuk mulai melakukan sesuatu.
- 0 Saya merasa dapat bekerja kira-kira sebaik sebelumnya

#### **L. Keletihan**

- 3 Saya merasa sangat lelah untuk melakukan sesuatu.
- 2 Saya rasa lelah untuk melakukan sesuatu.
- 1 Saya rasa lelah dari yang biasanya.
- 0 Saya tidak rasa lebih lelah dari biasanya.

#### **M. Anoreksia**

- 3 Saya merasa tidak lagi mempunyai nafsu makan sama sekali.
- 2 Nafsu merasa makan saya sangat memburuk sekarang.
- 1 Nafsu merasa makan saya tidak sebaik sebelumnya.
- 0 Nafsu merasa makan saya tidak buruk dari yang biasanya

#### **Penilaian**

- 0-4 Depresi/stress tidak ada atau minimal.
- 5-7 Depresi/stress ringan.
- 8-15 Depresi/stress sedang.
- 16+ Depresi/stress berat.

## 2. Diagnosis Keperawatan

### 1. Gangguan mobilitas fisik

Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri

#### • Penyebab

- Kerusakan integritas struktur tulang
- Perubahan metabolisme
- Ketidakbugaran fisik
- Penurunan kendali otot
- Penurunan massa otot
- Penurunan kekuatan otot
- Keterlambatan perkembangan
- Kekakuan sendi
- Kontraktur
- Malnutrisi
- Gangguan muskuloskeletal
- Gangguan neuromuskular
- Indeks masa tubuh diatas persentil ke-75 sesuai usia
- Efek agen farmakologis
- Program pembatasan gerak
- Nyeri
- Kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik
- Kecemasan
- Gangguan kognitif
- Keengganan melakukan pergerakan
- Gangguan sensoripersepsi

#### • Gejala dan Tanda Mayor

##### Subjektif

- Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas

##### Objektif

- Kekuatan otot menurun
- Rentang gerak (ROM) menurun

#### • Gejala dan Tanda Minor

##### Subjektif

- Nyeri saat bergerak
- Enggan melakukan pergerakan
- Merasa cemas saat bergerak

##### Objektif

- Sendi kaku
- Gerakan tidak terkoordinasi
- Gerakan terbatas
- Fisik lemah

#### • Kondisi Klinis Terkait

- Stroke
- Cedera medula spinalis
- Trauma
- Fraktur
- Osteoarthritis
- Osteomalasia
- Keganasan

2. Perfusi perifer tidak efektif

Berisiko mengalami penurunan sirkulasi darah pada level kaliper yang dapat mengganggu metabolisme tubuh

• **Faktor risiko**

- Hiperglikemia
- Gaya hidup kurang gerak
- Hipertensi
- Merokok
- Prosedur endovaskuler
- Trauma
- Kurang terpapar informasi tentang faktor pemberat (mis. merokok, gaya hidup kurang gerak, obesitas, imobilitas)

• **Kondisi Klinis Terkait**

- Arterosklerosis
- Raynaud's disease
- Trombosis arteri
- Leriche's syndrome
- Aneurisma
- Buerger's disease
- Varises
- Diabetes melitus
- Hipotensi
- Kanker

3. Risiko jatuh

Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik

• **Faktor risiko**

- Penyakit Kronis
- Efek prosedur Infasif
- Malnutrisi
- Peningkatan paparan organisme patogen lingkungan
- Ketidakadekuatan pertahanan tubuh perifer :
  - Gangguan peristaltik
  - Kerusakan integritas kulit
  - Perubahan sekresi PH
  - Penurunan kerja siliaris
  - Ketuban pecah lama
  - Ketuban pecah sebelum waktunya
  - Merokok
  - Statis cairan tubuh



- Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder
  - Penuruna Hemoglobin
  - Imunosupresi
  - Leukopenia
  - Supresi Respon Inflamasi
  - Faksinasi tidak adekuat



**f. Intervensi Keperawatan**

NO	DIAGNOSIS KEPERAWATAN	LUARAN KEPERAWATAN	INTERVENSI KEPERAWATAN	RASIONAL
1.	Gangguan mobilitas fisik b.d penurunan kekuatan otot d.d mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x 24 jam, maka diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil: a. Kekakuan sendi menurun b. Gerakan terbatas menurun c. Rentang gerak meningkat	<p><b>Dukungan mobilisasi</b></p> <p><u>Observasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaji adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya</li> <li>- Kaji toleransi fisik melakukan pergerakan</li> <li>- Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi</li> </ul> <p><u>Terapeutik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu</li> <li>- Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu</li> </ul> <p><u>Edukasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- u/ mengetahui tingkat kemampuan klien</li> <li>- u/ mengetahui batas mobilisasi klien</li> <li>- u/ memilih pergerakan yang diberikan sesuai dengan kondisi klien</li> <li>- u/ mempermudah mobilisasi klien</li> <li>- u/ memberikan mobilisasi secara bertahap</li> </ul>
2	Perfusi perifer	Setelah	<b>Pengaturan</b>	

	tidak efektif b.d penurunan aliran arteri dan atau vena d.d Warna kulit pucat	dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, maka diharapkan perfusi perifer meningkat dengan kriteria hasil: a. warna kulit menurun b. kram otot	<p><b>posisi</b></p> <p><u>Observasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor status oksigenasi sebelum dan setelah mengubah posisi</li> </ul> <p><u>Terapeutik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempatkan objek yang sering digunakan dalam jangkaun</li> <li>- Atur posisi tidur yang disukai</li> <li>- Imobilisasi dan topang bagian tubuh yang cedera dengan tepat</li> <li>- Motivasi melakukan ROM aktif atau pasif</li> <li>- Hindari posisi yang dapat meningkatkan nyeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- u/ proteksi atau memastikan status oksigen klien baik</li> <li>- u/ mempermudah klien menjangkau objek atau barangnya</li> <li>- u/ memberikan rasa nyaman</li> <li>- u/proteksi cedera bertambah parah</li> <li>- u/ meningkatkan sirkulasi perifer</li> <li>- u/proteksi ketidaknyamanan</li> </ul>
3	Risiko jatuh d.d penggunaan alat bantu jalan	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, maka diharapkan	<p><b>Pencegahan jatuh</b></p> <p><u>Observasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaji faktor risiko jatuh</li> <li>- Kaji risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- u/ mengetahui tingkat jatuh klien</li> <li>- u/ proteksi</li> </ul>

		<p>tingkat jatuh klien menurun dengan kriteria hasil:</p> <p>.1. jatuh dari bed menurun</p> <p>2. Jatuh dari</p>	<p>jatuh sekali setiap shift</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaji faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh</li> <li>- Hitung risiko jatuh menggunakan skala</li> <li>- Monitor kemampuan berpindah dari bed ke rostor</li> </ul> <p><u>Terapeutik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastikan roda rostor selalu terkunci</li> <li>-Gunakan alat bantu berjalan</li> </ul> <p><u>Edukasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjurkan memanggil perawat jika butuh bantuan</li> <li>- Anjurkan konsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh</li> </ul>	<p>klien jatuh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u/ mengetahui berpindah klien</li> <li>- u/ meningkatkan kemandirian klien proteksi kejadian jatuh</li> </ul>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### C. Evidence Based Nursing (Range Of Motion/ROM)

#### 1. Pengertian

*Range Of Motion* (ROM) adalah latihan menggerakkan bagian tubuh untuk memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi.

Latihan Range of Motion (ROM) adalah latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan mobilitas sendi secara penuh dan normal guna meningkatkan massa dan tonus otot (Potter & Perry, 2005) (Kasiati & Roslamawati, 2016)

## 2. Tujuan

ROM memiliki banyak tujuan diantaranya yaitu memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi, mengurangi rasa nyeri, mengembalikan kemampuan klien menggerakkan otot melancarkan peredaran darah.

## 3. Klasifikasi

Menurut suratun, *et al* (2006) dalam (Ananda, 2017) Menyatakan bahwa ada beberapa klasifikasi latihan ROM beserta indikasinya, yaitu :

- a. Latihan ROM pasif yaitu latihan ROM yang dilakukan klien dengan bantuan dari orang lain perawat ataupun alat bantu setiap kali melakukan gerakan.
- b. Latihan ROM aktif yaitu latihan ROM yang dilakukan mandiri oleh klien tanpa bantuan perawat pada setiap melakukan gerakan.

## 4. Indikasi

Menurut Potter & Perry (2006) indikasi ROM adalah

### a) Indikasi ROM Aktif

- 1) Pada saat klien dapat melakukan gerakan/kontraksi otot secara aktif dan menggerakkan pada ruas sendinya secara baik dengan adanya bantuan atau tidak.
- 2) Pada saat klien mengalami kelemahan otot dan tidak mampu menggerakkan pada persendian secara penuh, digunakan A-AROM (Active-Assistive ROM, adalah jenis ROM Aktif yang mana bantuan ini dapat diberikan melalui gaya dari luar apakah dengan cara manual maupun mekanik, karena otot penggerak primer membutuhkan bantuan agar dapat menyelesaikan aktivitas gerak).

- 3) ROM Aktif bisa digunakan dalam program aktivitas latihan aerobik.
  - 4) ROM Aktif dapat digunakan dalam memelihara mobilisasi ruas diatas dan dibawah pada daerah yang tidak dapat digerakkan.
- b) Indikasi ROM Pasif
- 1) Pada kondisi dimana terdapatnya inflamasi jaringan akut yang jika dilakukan pergerakan aktif dapat menghambat proses penyembuhan klien.
  - 2) Saat klien tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk bergerak secara aktif pada ruas maupun seluruh tubuh, misalnya pada keadaan koma, pada kelumpuhan ataupun bed rest total.

## 5. Kontraindikasi

Kontraindikasi dan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat latihan ROM menurut Carpenito (2009) yaitu:

- a) Latihan ROM tidak bisa diberikan jika gerakan dapat mengganggu pada proses penyembuhan terutama pasien cedera.
  - 1) Gerakan yang dapat dievaluasi dengan seksama dalam batasan gerak yang bebas dari rasa nyeri selama fase awal penyembuhan akan menunjukkan manfaat terhadap proses penyembuhan dan proses pemulihan.
  - 2) Adanya tanda-tanda mayoritas atau terdapatnya gerakan yang keliru, juga termasuk meningkatnya rasa nyeri dan radang.
- b) ROM tidak dianjurkan dilakukan jika respon klien atau kondisinya bertolak belakang dengan kesehatannya ataupun membahayakan (life threatening).
  - a) PROM dipraktekkan secara hati-hati pada bagian sendi-sendi besar, sedangkan AROM pada sendi ankle dan kaki dalam meminimalisasi venous stasis serta pembentukan trombus.
  - b) Pada kondisi setelah infark miokard, operasi arteri koronaria, dan lain-lain, ROM pada bagian ekstremitas atas masih bisa diberikan dalam pantauan yang ketat.

## **6. Prosedur pemberian dan rasionalisasi**

### **a. Persiapan Klien**

- 1) Berikan ucapan salam, perkenalkan siapa diri Anda dan kaji responden dengan cara memeriksa identitas responden secara teliti/cermat.
- 2) Jelaskan terkait prosedur tindakan atau SOP yang akan diberikan, dan berikanlah kesempatan responden untuk mengajukan pertanyaan dan jawablah semua pertanyaan responden
- 3) Aturilah posisi responden hingga ia merasakan nyaman dan aman selama memberikan tindakan.
- 4) Anjurkan klien untuk berdoa terlebih dahulu

### **b. Persiapan Alat**

- 1) Lotion/baby oil
- 2) Handscoon (jika dibutuhkan)

### **c. Tahap Kerja**

- 1) Konfirmasi ke responden bahwa tindakan akan segera dilakukan.
- 2) Lakukan Cuci tangan.
- 3) Usapkan lotion atau pelumas pada tangan.
- 4) Posisikan posisi responden dengan nyaman mungkin.

### **a. Fleksi dan ekstensi lutut dan Panggul**

- 1) Posisikan posisi satu tangan berada di bawah lutut responden dan tangan yang lain berada di bawah tepat pada mata kaki responden.
- 2) Angkat kaki klien dan bengkok kan ke arah lutut.
- 3) Gerakkan lutut klien ke atas hingga dada sejauh mungkin.
- 4) Kembalikan posisi lutut ke area bawah, tegakkan kembali lutut dan berikan posisi rendah pada kaki sampai ke area kasur.
- 5) Lakukanlah aktivitas latihan ini kurang lebih 3 kali.

### **b. Abduksi dan adduksi panggul**

- a) Posisikan 1 tangan pada bagian bawah lutut responden dan tangan yang lain berada tepat pada pergelangan kaki responden.
  - b) Luruskan kaki dibed setelah itu pindahkan posisi kaki ke area luar tepi bed.
  - c) Mobilisasi kaki ke arah sentral bed klien.
  - d) lakukan latihan ini dengan frekuensi kurang lebih sampai 3 kali.
- c. Rotasi internal dan eksternal panggul**
- a) Posisikan 1 tangan di area bawah lutut responden serta tangan yang lain di area telapak kaki responden.
  - b) Tinggikan kaki dan rotasikan kaki ke dalam dan keluar.
  - c) lakukan latihan berulang kurang lebih sampai 3 kali.
- d. Dorsofleksi pergelangan kaki**
- a) Posisikan 1 tangan di area bawah tumit responden dan tangan lainnya di area kaki responden.
  - b) Beri tekanan pada telapak kaki klien dengan cara menggunakan lengan bawah perawat.
  - c) Lakukan latihan ulang kurang lebih sampai 3 kali.
- e. Plantarfleksi pergelangan kaki**
- a) Posisikan satu tangan di area bawah tumit responden dan tangan lainnya di area punggung kaki responden.
  - b) Dorong bagian punggung kaki responden ke area bawah.
  - c) Lakukan latihan ulang dengan durasi kurang lebih sampai 3 kali
- f. Inversi dan eversi pergelangan kaki**
- a) Posisikan kedua tangan di kaki responden.
  - b) Gerakan telapak kaki ke arah dalam dan luar
  - c) Lakukanlah latihan ulang kurang lebih sampai 3 kali.
- g. Fleksi dan ekstensi jari-jari kaki**
- a) Posisikan satu tangan di pergelangan kaki responden dan tangan lainnya di jari-jari kaki responden.



- b) Tekuk jari-jari kaki ke arah bawah dan ke atas.
- c) Lakukanlah latihan ulang kurang lebih sampai 3 kali.

**h. Abduksi dan adduksi jari-jari kaki**

- a) Pegang jari-jari kaki dengan menggunakan kedua tangan.
- b) Regangkan jari-jari kaki dan kembalikan jari-jari kaki ke posisi menutup
- c) Lakukanlah latihan ulang kurang lebih sampai 3 kali.
- d. Posisikan responden ke posisi semula.
- e. Informasikan bahwa tindakan telah selesai.
- f. Bereskan alat-alat yang sudah digunakan.
- g. Lakukan pengkajian respon responden (subyektif maupun obyektif).
- h. Berikan reinforcement positif pada responden.
- i. Buat janji untuk pertemuan kedepannya/selanjutnya.
- j. Akhiri rangkaian kegiatan dengan doa dan ucapan Alhamdulillah
- k. Cuci tangan.

**7. Kriteria Evaluasi**

- a. Subjektif :
  - 1) Posisi Tubuh: Berinisiatif sendiri :
    - a) Klien mampu berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain sambil berbaring (miring kanan, miring kiri, terlentang)
    - b) Klien mampu bergerak dari depan ke belakang ataupun sebaliknya (menggeser tubuh)
    - c) Klien mampu bergerak dari posisi berbaring ke posisi duduk ataupun sebaliknya
  - 2) Penampilan Mekanika Tubuh :
    - a) Klien mampu mempertahankan kekuatan otot
    - b) Klien mampu menggunakan postur tubuh yang benar untuk berbaring
  - 3) Keseimbangan :

- a) Mempertahankan keseimbangan sementara menggeser berat badan dari satu kaki ke kaki lain
- 4) Ambulasi :
  - a) Klien mampu menopang berat badan dengan atau tanpa alat bantu

b. Objektif

- 1) Pergerakan Sendi :
  - a) Tampak rentang pergerakan sendi aktif dengan gerakan atas inisiatif sendiri
  - b) Tampak rentang pergerakan sendi pasif dengan bantuan
- 2) Reaksi sisi yang terkena dampak, klien dan keluarga mampu untuk:
  - a) Klien tampak mengubah posisi
  - b) Klien tampak menjaga dan membersihkan anggota tubuh klien (Irawati, 2019)

**8. Pengaruh ROM aktif dan Pasif Terhadap *Immobility***

Pengaruh intervensi rom aktif dan pasif terhadap *Immobility* yaitu dari artikel penelitian menjelaskan bahwa hubungan antara ROM dan *Immobility* yaitu latihan gerak dapat menyebabkan sirkulasi peredaran darah menjadi lancar, sehingga darah yang mengalir ke ekstremitas dapat membantu pergerakan aktif, otot-otot menjadi relaks, meningkatkan mobilisasi sendi dan meningkatkan masa otot (sahmad, Yunus, & Sarmawan, 2016)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusdiatin, 2019 tentang pemberian ROM aktif pada klien yang mengalami gangguan mobilitas ekstremitas bawah menunjukkan efek yang bermakna setelah diberikan intervensi tersebut, perubahan yang terjadi yaitu sudut fleksibilitas sendi lutut pada kelompok intervensi terjadi peningkatan. Walaupun kenaikannya tidak begitu besar tetapi hasil penelitian ini membuktikan bahwa intervensi

yang dilakukan memberikan hasil yang diharapkan (Rusdiatin, 2020). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh *range of motion* (ROM) pasif terhadap fleksibilitas sendi pada lansia setelah diberikan intervensi sehingga meningkatkan rentang gerak. (sahmad, Yunus, & Sarmawan, 2016) penelitian serupa terkait latihan ROM juga dilakukan oleh Andriani dan Nurfatma Sari tentang pengaruh latihan *Range of Motion* aktif terhadap peningkatan kekuatan otot ekstremitas atas bawah lansia menunjukkan adanya pengaruh atau perubahan kekuatan otot setelah diberikan intervensi (Adriani & Sari, 2019)



**BAB III**  
**LAPORAN KASUS**

**A. Pengkajian**

1. Data Demografi

Nama Lansia : Ny. P  
Umur : 80 Tahun  
Alamat : Pangkep  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jumlah Keturunan  
- Anak : 1  
- Cucu : -  
Nama Suami/Istri : Tn. Y  
Umur : Meninggal dunia  
Tanggal Pengkajian : 20 April 2021  
Tanggal Masuk Rs :

2. PENGKAJIAN

a. Fisik

*Wawancara*

- Pandangan *Lanjut Usia* tentang kesehatannya :  
Klien mengatakan ia pasrah dengan kondisi kesehatannya saat ini karena sudah tua.
- Kegiatan yang mampu dilakukan *Lanjut Usia* :  
Klien mengatakan mampu mencuci baju, mandi, makan, BAK dan BAB, memakai baju secara mandiri
- Kebiasaan *Lanjut Usia* merawat diri sendiri :  
Klien mengatakan ia merawat diri sendiri dengan mandi, ganti baju secara teratur
- Kekuatan fisik *Lanjut Usia*: otot, sendi, penglihatan dan pendengaran :

Kekuatan otot	33
	11

kekuatan sendi menurun, fungsi penglihatan menurun, fungsi pendengaran klien masih baik, terdapat kontaktur pada tangan dan kaki, ekstremitas bawah klien tampak tremor,

- ❑ Kebiasaan makan, minum, istirahat/tidur, buang air besar/kecil :  
Klien mengatakan selama bulan puasa ia makan 2 kali sehari yaitu pada saat buka puasa dan sahur, minum 1 botol sekitar 1500 cc, tidur malam 7-8 jam, BAB 2-3 x/minggu, BAK : 4-5 kali sehari.
- ❑ Kebiasaan gerak badan/olah raga/senam *Lanjut Usia* :  
Klien mengatakan sebelum pandemic sering dilakukan olahraga namun semenjak pandemic, ia hanya melakukan kegiatan didalam kamar. Perubahan-perubahan pada fungsi tubuh yang masih sangat bermakna dirasakan oleh klien :  
Klien mengatakan fungsi tubuh yang sangat dirasakan berubah yaitu penglihatan dan kekuatan otot.
- ❑ Kebiasaan *Lanjut Usia* dalam memelihara kesehatan dan kebiasaan dalam minum obat:  
Klien tidak mengonsumsi obat
- ❑ Masalah-masalah seksual yang dirasakan:  
Tidak dikaji

#### *Pemeriksaan Fisik*

- ❑ Pemeriksaan dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi untuk mengetahui perubahan sistem tubuh
  - ❑ Pendekatan yang digunakan dalam pemeriksaan fisik, yaitu:
    - Head to toe
    - Sistem tubuh
- 1) Temperatur :36, 5oC
  - 2) Tempat pengukuran :Axilla
  - 3) Pulse (denyut nadi) :
    - ⇔ Kecepatan : 64 x/ menit
    - ⇔ Irama : regular
    - ⇔ Volume : tidak dikaji

Tempat Pengukuran : di Asrama 1

3. Respirasi (Pernafasan) :
  - ⇔ Kecepatan : 16x/menit
  - ⇔ Irama : regular
  - ⇔ Bunyi : tidak ada terdengar bunyi napas tambahan
4. Tekanan Darah : 140/80 mmHg  
Posisi pengukuran : duduk (klien tidak mampu duduk dan berbaring)
5. Berat dan tinggi badan terakhir : tidak diketahui
6. Tingkat orientasi:
  - a. Waktu : klien mengatakan pagi, namun tidak mengetahui jam, tanggal, bulan dan tahun
  - b. Tempat : klien mengetahui nama tempat ia tinggal sekarang dengan baik
  - c. Orang : klien mampu mengenal petugas disekitarnya, klien terkadang berorientasi pada masalah
7. Memory (ingatan) : klien mampu mengingat dan bercerita tentang kehidupannya di masa lalu
8. Tidur
  - a. Kuantitas (Lama tidur) : 7-8 jam/hari
  - b. Kualitas : kurang nyenyak
  - c. Pola : teratur
9. Istirahat
  - a. Kwantitas (Lama tidur) : 6 Jam
  - b. Kwalitas : Baik
10. Penyesuaian psikososial : Klien mengatakan tidak pernah dikunjungi Keluarga  
Klien senang jika ada mahasiswa datang  
Klien tampak senang

*Sistem Persyarafan*

1. Kesimetrisan raut wajah : simetris
2. Tingkat kesadaran :
  - ⇔ Snile (Pikun) : ingatan klien masih baik
  - ⇔ Daya ingat : daya ingat klien masih baik
3. Mata
  - ⇔ Pergerakan : klien hanya mampu melihat satu arah yaitu ke depan dan kurang mampu menggerakkan mata ke atas, ke bawah, dan kesamping
  - ⇔ Penglihatan : klien mengalami penurunan fungsi penglihatan
  - ⇔ Penyakit penyerta : poliomyelitis
4. Pupil
  - ⇔ Kesamaan : tidak ada
5. Ketajaman penglihatan : berkurang
  - ⇔ Cek kondisi kacamata : masih kondisi baik
6. Sensori deprivation (gangguan sensorik) : tidak dikaji
7. Ketajaman pendengaran : .....
  - ⇔ Apakah menggunakan alat bantu dengar : tidak
8. Rasa sakit atau nyeri : tidak ada keluhan

#### *Sistem Kardivaskuler*

1. Sirkulasi perifer : sirkulasi perifer ke ekstremitas bawah berkurang
  - Warna : pucat
  - Kehangatan : tidak hangat, akral ekstremitas bawah terasa dingin
2. Denyut nadi apikal terdengar kuat
3. Pembengkakan vena jugularis : tidak nampak DVJ
4. Pusing : klien mengeluh sedikit pusing
5. CRT > 3 detik
6. Nyeri dada : tidak ada keluhan

7. Edema : tidak ada nampak edema

#### *Sistem Gastrointestinal*

1. Status gizi : tidak dikaji
2. Pemasukan diet : oral
3. Anoreksia : tidak ada keluhan
4. Mual : tidak ada keluhan
5. Muntah : tidak ada keluhan
6. Mengunyah dan menelan : klien hanya mampu menelan
7. Keadaan gigi : berkurang
8. Rahang : berfungsi baik
9. Rongga mulut : tidak nampak kelainan.
10. Bising usus : 6 x/ menit
11. Keadaan perut : teraba lunak
12. Konstipasi (sembelit) : tidak ada keluhan
13. Diare : tidak ada keluhan
14. Inkontinesia alvi : tidak ada keluhan

#### *Sistem Genitourinarius*

1. Warna dan bau urine : kekuningan dan bau pesing
2. Distensi kandung kemih : tidak ada
3. Inkontinensia : tidak ada
4. Frekuensi : 5-6 x/ hari
5. Tekanan/ desakan : klien mengatakan masih merasakan desakan berkemih dan masih bisa di tahan
6. Pemasukan cairan : air minum melalui oral
7. pengeluaran cairan : melalui uretra
8. Disuria : tidak ada keluhan
9. Seksualitas
  - ⇔ Minat melaksanakan hubungan seks : tidak dikaji
  - ⇔ Frekwensi : tidak dikaji



### *Sistem Kulit*

#### 1. Kulit

- ⇔ Temperatur : 36,5 oC
- ⇔ Tingkat kelembaban: kering, turgor kulit menurun
- ⇔ Keadaan luka
  - Luka terbuka/tertutup : tidak ada
- ⇔ Robekan : tidak ada
- ⇔ Turgor (kekenyalan kulit) : tidak elastis
- ⇔ Pigmen : kecoklatan

#### 2. Jaringan parut : tidak ada

#### 3. Keadaan kuku : pendek dan bersih

#### 4. Keadaan rambut : pendek, beruban dan bersih

#### 5. Gangguan-gangguan umum : tidak ada

### *Sistem Muskuloskeletal*

#### 2. Kontraktur : terdapat kontraktur pada tangan dan kaki

- ⇔ Gerakan sendi : terbatas

#### 3. Tingkat mobilisasi

- ⇔ Ambulasi (Dengan atau tanpa bantuan/ peralatan) : ambulasi klien dibantu dengan rostur, tangan dan handuk

- ⇔ Kekuatan otot : ekstremitas atas :3,3 ekstremitas bawah : 1,1

Kemampuan melangkah atau berjalan : Klien mengatakan sulit menggerakkan kakinya.. klien mengalami kelumpuhan pada ekstremitas bawah.

#### 4. Gerakan sendi : gerakan sendi terbatas dan klien mengeluh kram pada ekstremitas bawah.

Kstremitas bawah klien nampak pucat

#### 5. Paralisis : ekstremitas bawah

#### 6. Kifosis : tidak ada

#### b. Psikologis

Pengenalan masalah-masalah utama

- Sikap terhadap proses penuaan : klien menerima dan pasrah
- Perasaan dibutuhkan : perhatian
- Pandangan terhadap kehidupan : biasa saja
- Koping Stressor : berzikir, berdoa, berbincang-bincang
- Penyesuaian diri : baik
- Harapan saat ini dan yang akan datang : klien mengatakan ia berharap di beri kekuatan oleh Allah swt agar tetap kuat menghadapi kondisinya
- fungsi kognitif
  - Daya ingat : baik
  - Proses pikir: baik
  - Alam perasaan
  - Orientasi terorientasi tempat, waktu dan orang
  - Kemampuan dalam penyelesaian masalah : baik

c. Masalah emosional

Pertanyaan tahap 1

- 1) Apakah klien mengalami susah tidur : tidak
- 2) Ada masalah atau banyak pikiran : tidak
- 3) Apaka klien murung atau menangis sendiri : tidak
- 4) Apakah klien sering was was atau kuatir : tidak

Lanjutkan pertanyaan tahap 2 jika jawaban ya lebih dari 1

Pertanyaan tahap 2

- 1) Keluhan lebih dari 3 bulan atau lebih dari 1 bulan 1 kali dalam sebulan
- 2) Ada masalah atau banyak pikiran
- 3) Ada gangguan atau masalah dengan orang lain
- 4) Menggunakan obat tidur atau penenang atas anjuran dokter
- 5) Cenderung mengurung diri

Lebih dari 1 atau sama dengan 1 jawaban ya, maka masalah emosional

d. Sosial Ekonomi

- Sumber keuangan : petugas sosial
- Kesibukan dalam mengisi waktu luang : mendengarkan radio, membersihkan kamar dan mengobrol dengan tetangga kamar
- Teman tinggal : Ny. Rayain, Ny. Suyati
- Kegiatan organisasi : tidak ada
- Pandangan terhadap lingkungannya : Bagus
- Hubungan dengan orang lain di luar rumah : baik
- Yang biasa mengunjungi : petugas sosial
- Penyalurkan hobi/keinginan sesuai fasilitas yang ada :

e. Spiritual

- Agama : islam
- Kegiatan ibadah : berdzikir dan sholat
- kegiatan keagamaan : berdzikir
- Cara *Lanjut Usia* menyelesaikan masalah : meminta bantuan, pasrah dan berdoa
- Penampilan Lansia : rapid dan bersih

f. Psikososial

- Tingkat ketergantungan : ringan
- Fokus diri : kesehatan diri
- Perhatian : dari mahasiswa praktik dan pekerja sosial
- Rasa Kasih sayang : baik
- Hubungan Dengan orang lain dalam wisma : baik
- Hubungan dengan orang lain di luar wisma di dalam panti : baik
- Kebiasaan lansia berinteraksi ke wisma lainnya dalam panti : klien mengatakan jarang berinteraksi diluar wisma sebab pandemi covid 19
- Motivasi menghuni panti : tidak memiliki keluarga
- Frekuensi kunjungan keluarga : tidak ada

g. Pengkajian Lingkungan

#### Pemukiman

- Luas bangunan : 16 x 8
- Bentuk bangunan : permanen
- Jenis bangunan : Gedung
- Atap rumah : tembok
- Dinding : tembok
- Lantai : keramik/ tehel
- Kebersihan lantai : bersih
- Ventilasi : baik
- Pencahayaan : baik
- Pengaturan penataan perabot : baik
- Kelengkapan alat rumah tangga : cukup lengkap
- Sanitasi : tersedia
- Penyediaan air bersih : tersedia
- Penyediaan air minum : tersedia
- Pengelolaan jamban : tersedia
- Jenis jamban : wc duduk
- Jarak dengan sumber air : kurang lebih setengah meter
- Sarana pembuangan air limbah : tersedia
- Petugas sampah : tersedia
- Polusi udara : tidak ada
- Pengelolaan binatang pengerat : tidak ada

- Fasilitas Umum : ruang tamu, tempat menonton, masjid, ruang kerajinan, berkebun dan bermusik
- Sikap terhadap kesehatan dan pelayanan kesehatan : kooperatif
- Jaminan pemeliharaan kesehatan : tersedia.
- Sikap komunitas terhadap kelompok lansia : baik dan kooperatif

PENGAJIAN STATUS FUNGSIONAL

INDEKS KATZ	
SCORE	KRITERIA
A	Kemandirian terhadap mandi, berpakaian, ke kamar kecil, berpindah kontinen dan makan.
B	mandiri terhadap seluruh aktifitas harian, kecuali 1 dari beberapa fungsi tersebut
C	kemandirian dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali mandi dan satu fungsi tambahan
D	mandiri dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian dan satu fungsi tambahan
E	Kemandirian dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil dan satu fungsi tambahan
F	Mandiri dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian, berpindah dan satu fungsi tambahan
G	Memiliki Ketergantungan terhadap 6 fungsi

PENGAJIAN STATUS KOGNITIF DAN AFEKTIF

Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ)				
Score		No	Pertanyaan	Jawab
+	-			
	-	1	Tanggal berapa hari ini ?	Tidak tahu
	-	2	Hari apa sekarang ini ? (hari, tanggal, tahun)	Tidak tahu
+		3	Apa nama tempat ini ?	PSTW
		4a	Berapa nomor telpon anda ?	Tidak ada
+		4b	Dimana alamat anda ? (tanyakan hanya bila klien tidak mempunyai no.telepon)	Pangkep
+		5	Berapa umur anda ?	80 tahun
+		6	Kapan anda lahir ?	Lupa
+		7	Siapa presiden sekarang ?	Jokowi
+		8	Siapa presiden sebelumnya ?	Susilo Bambang Yudhoyono
+		9	Siapa nama kecil ibu anda ?	Amina
	-	10	Kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap angka baru, semua secara menurun	Tidak tahu

Penilaian : 3

- Kesalahan 0 – 2 fungsi intelektual utuh
- Kesalahan 3 – 4 fungsi intelektual ringan**
- Kesalahan 5 – 7 fungsi intelektual sedang
- Kesalahan 8 – 10 fungsi intelektual berat

SKALA DEPRESI GERIATRIC (GERIATRIC *DEPRESSION SCALE / GDS*)  
(*Short Form*)

No	Pertanyaan	Ya	Tdk
1	Apakah pada dasarnya anda puas dengan kehidupan anda ?	0	
2	Apakah anda telah banyak meninggalkan kegiatan dan minat/kesenangan anda?		0
3	Apakah anda merasa kosong dengan kehidupan yang dijalani saat ini?		0
4	sering bosankah anda ?		0
5	Apakah ada semangat anda disetiap saat ?	0	
6	Apakah merasa takutkah anda jika ada yang terjadi pada anda ?		0
7	Apakah ada perasaan bahagia disetiap waktu anda ?	0	
8	Apakah anda merasa tidak berdaya?		0
9	Apakah anda lebih suka tinggal di rumah pada malam hari, daripada pergi dan melakukan sesuatu yang baru ?	1	
10	Apakah anda memiliki banyak masalah dengan daya ingat dibandingkan kebanyakan orang		
11	Apakah anda berfikir sangat menyenangkan hidup sekarang ini?	0	
12	Apakah anda merasa Saya sangat tidak berharga/ berguna?		0
13	Apakah anda merasa penuh semangat?	0	
14	Apakah anda merasa tidak memiliki harapan?		0
15	Apakah anda berpikir keadaan orang lain lebih baik daripada anda?		
	Skor	1	0

**0 – 5 : Normal**

6 – 10 : Kemungkinan depresi

>10 : Depresi

SKALA JATUH MORSE (*MORSE FALL SCALE/MFS*)

No.	Item	Skala		Skor
1	Riwayat jatuh Apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir?	Tidak	0	25
		Ya	25	
2	Diagnosis sekunder Apakah lansia memiliki lebih dari satu penyakit?	Tidak	0	15
		Ya	15	
3	Alat bantu pergerakan <i>Bed rest/</i> dibantu perawat		0	30
	Walker/kruk/tongkat		15	
	Berpegangan pada benda sekitar (kursi, meja, lemari)		30	
4	Terapi intravena: Apakah saat ini lansia terpasang infus?	Tidak	0	0
		Ya	20	
5	Gaya berjalan/cara berpindah Normal		0	10
	Lemah		10	
	Gangguan/ tidak normal		20	
6	Status mental Lansia menyadari kondisinya		0	0
	Lansia mengalami keterbatasan daya ingat		15	
	Total nilai			

Keterangan: **Risiko tinggi**

Tingkat Risiko	Nilai MPS	Tindakan
Tidak berisiko	0 -24	Perawatan dasar
Risiko rendah	25 – 50	Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh standar
<b>Risiko tinggi</b>	<b>≥ 51</b>	<b>Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi</b>



PENGAJIAN STATUS SOSIAL

APGAR Keluarga					
No	Fungsi	Uraian	Selalu	Kadang	Hampir tidak pernah
			2	1	0
1	Adaptasi	Saya puas bahwa saya dapat kembali pada keluarga (teman-teman) saya untuk membantu pada waktu sesuatu menyusahkan saya			0
2	Hubungan	Saya puas dengan cara keluarga (teman-teman) saya membicarakan sesuatu dengan saya dan mengungkapkan masalah dengan saya			0
3	Pertumbuhan	Saya puas bahwa keluarga (teman-teman) saya menerima dan mendukung keinginan saya untuk melakukan aktifitas atau arah baru		1	
4	Afeksi	Saya puas dengan cara keluarga (teman-teman) saya mengekspresikan afek dan berespons terhadap emosi-emosi saya, seperti marah, sedih atau mencintai		1	
5	Pemecahan	Saya puas dengan cara teman-teman saya dan saya menyediakan waktu bersama-sama			0
Skor			3		

Penilaian :

**0 – 5 Fungsi sosial kurang**

6 – 10 Fungsi sosial baik

### BARTHEL INDEKS

No	Kriteria	Dengan Bantuan	Mandiri	Keterangan
1	Makan	5	<b>10</b>	Frekuensi : 3 Jumlah:5 sendok Jenis : nasi
2	Minum	5	<b>10</b>	Frekuensi : 6 Jumlah : 1 botol Jenis : air putih
3	Berpindah dari rostur ke bed dan sebaliknya	5 – 10	<b>15</b>	
4	Personal toilet (cuci muka, menyisir rambut, gosok gigi)	0	<b>5</b>	Frekuensi : 2
5	Keluar masuk toilet (membuka pakaian, menyeka tubuh, menyiram)	5	<b>10</b>	
6	Mandi	5	<b>15</b>	Frekuensi : 2
7	Jalan di permukaan datar	<b>0</b>	5	
8	Naik turun tangga	<b>5</b>	10	
9	Mengenakan pakaian	5	<b>10</b>	
10	Kontrol bowel (BAB)	5	<b>10</b>	Frekuensi :1 Konsistensi : tidak dikaji
11	Kontrol bladder (BAK)	5	<b>10</b>	Frekuensi : 4 Warna : tidak dikaji
12	Olahraga/latihan	<b>5</b>	10	Frekuensi : 1 Jenis : jalan-jalan dengan rostur
13	Rekreasi/pemanfaatan waktu luang	<b>5</b>	10	Jenis : duduk didepan asrama Frekuensi : 1 kali

Total 110

Keterangan : ketergantungan sebagian

- 130 : Mandiri
- **60-125 : Ketergantungan sebagian**
- 55 : Ketergantungan total

PENILAIAN POTENSI DEKUBITUS (Skor NORTON)

*Kondisi Fisik Umum :*

- |                 |   |
|-----------------|---|
| a) Baik         | 4 |
| b) Lumayan      | 3 |
| c) Buruk        | 2 |
| d) Sangat buruk | 1 |

*Kesadaran :*

- |                 |   |
|-----------------|---|
| a) Komposmentis | 4 |
| b) Apatis       | 3 |
| c) Sopor        | 2 |
| d) Koma         | 1 |

*Aktifitas :*

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| a) Ambulan                | 4 |
| b) Ambulan dengan bantuan | 3 |
| c) Hanya bisa duduk       | 2 |
| d) Tiduran                | 1 |

*Mobilitas*

- |                      |   |
|----------------------|---|
| a) Bergerak bebas    | 4 |
| b) Sedikit terbatas  | 3 |
| c) Sangat Terbatas   | 2 |
| d) Tak Bisa Bergerak | 1 |

*Inkontinen :*

- |                              |    |
|------------------------------|----|
| a) Tidak                     | 4  |
| b) Kadang-kadang             | 3  |
| c) Sering Inkontinesia urin  | 2  |
| d) Inkontinensia alvi & urin | 1  |
| Total :                      | 18 |

Interpretasi : kemungkinan kecil terjadi

**15-20 : Kecil sekali/ tak terjadi**


12-15 : Kemungkinan kecil terjadi

< 12 : Kemungkinan Besar terjadi

Kaji aspek kognitif dan fungsi mental dengan menggunakan MMSE (*Mini Mental Status Exam*)

- Orientasi
- Registrasi
- Perhatian
- Kalkulasi
- Mengingat kembali

No.	Aspek Kognitif	Nilai Maks	Nilai Klien	Kriteria
1	Orientasi Waktu	5	2	Menyebutkan dengan benar : (Nilai 1 untuk tiap jawaban) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahun : tidak tahu</li> <li>▪ Bulan : tidak tahu</li> <li>▪ Hari : Hari Kamis</li> <li>▪ Musim : kemarau</li> <li>▪ Tanggal : tidak tahu</li> </ul>
	Orientasi Tempat	5	5	Dimana kita sekarang berada? (Nilai 1 untuk setiap jawaban) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kota : Gowa</li> <li>▪ Propinsi/Kabupaten/Kecamatan : Gowa</li> <li>▪ Di ruangan mana : asrama</li> <li>▪ Di lantai berapa : 1</li> <li>▪ Nama wisma Balai /pstw</li> </ul>
2	Registrasi	3	3	Sebutkan nama 3 obyek/benda (oleh pemeriksa), 1 detik untuk menyebutkan masing-masing obyek. Kemudian tanyakan kepada klien ketiga obyek yang disebutkan tadi. (Nilai 1 untuk setiap jawaban) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Obyek : lampu</li> <li>▪ Obyek : kipas angin</li> <li>▪ Obyek : sapu</li> </ul>
3	Perhatian dan kalkulasi	5	0	Minta klien mengeja 5 kata dari belakang, misal "BAPAK" <ul style="list-style-type: none"> <li>• K</li> <li>• A</li> <li>• P</li> <li>• A</li> <li>• B</li> </ul> Minta klien hitung mundur dari 100 ke bawah dengan pengurangan 5. Berhenti setelah mendapat nilai 75. (Nilai 1 setiap jawaban benar)
4	Mengingat	3	3	Minta klien untuk melaksanakan ketiga obyek pada No.2 (registrasi) tadi. Bila

				<p>benar, 1 poin untuk masing-masing obyek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul>
5	Bahasa (9)	2	2	<p>Tunjukkan pada klien suatu benda dan tanyakan namanya pada klien.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (misal jam tangan) : sarung dan ember</li> <li>■ (missal pensil)</li> </ul>
	Menamai			
	Pengulangan			
	Pemahaman	1	1	<p>Minta klien untuk mengulang kata berikut : “Tak ada jika, dan, atau, tetapi.” Bila benar, nilai satu poin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pernyataan benar 2 buah : tidak ada, tetapi (contoh : tak ada, tetapi)</li> </ul>
	Membaca	3	3	<p>Minta klien untuk mengikuti perintah berikut yang terdiri dari 3 langkah : Ambil kertas di tangan anda, lipat dua, dan taruh di lantai.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ambil kertas di tangan anda</li> <li>■ Lipat dua</li> <li>■ Taruh di lantai</li> </ul>
	Menulis			
Menggambar	1	1	<p>Perintahkan pada klien untuk hal berikut (bila aktivitas sesuai perintah nilai 1 point)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ “Tutup mata Anda”</li> </ul>	
	1	0	<p>Perintahkan pada klien untuk menulis satu kalimat dan menyalin gambar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tulis satu kalimat</li> </ul>	
	1	0	<p>Perintahkan klien untuk menggambar, gambar dibawa ini :</p> 	

Intrepretasi hasil : kerusakan aspek fungsi mental sedang

- 26-30 :Aspek kognitif dan fungsi mental baik
- 21-25 :Aspek kognitif dari fungsi mental ringan
- 11-20 :Kerusakan aspek fungsi mental sedang**
- 0-10 : Terdapat kerusakan aspek fungsi mental berat



#### KLASIFIKASI DATA

DATA SUBJEKTIF	DATA OBJEKTIF
- Klien mengatakan ia	- klien mengalami kelumpuhan

<p>pasrah dengan kondisi kesehatannya saat ini karena sudah tua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan sulit menggerakkan kakinya.</li> <li>- klien mengeluh kram pada ekstremitas bawah.</li> <li>- Klien mengatakan fungsi penglihatannya menurun</li> <li>- Klien mengatakan tidak pernah dikunjungi keluarga</li> <li>- Klien senang jika ada mahasiswa datang</li> <li>- Klien merasa khawatir dengan kondisinya</li> </ul>	<p>pada ekstremitas bawah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gerakan sendi klien terbatas</li> <li>- terdapat kontraktur pada tangan dan kaki</li> <li>- Gerakan sendi : terbatas</li> <li>- Ekstremitas bawah klien nampak pucat</li> <li>- Ambulasi klien dibantu dengan rostor, tangan dan handuk</li> <li>- kekuatan otot : 3, 3, 1, 1</li> <li>- tampak sendi ekstremitas bawah kaku</li> <li>- terdapat kontraktur pada tangan dan kaki</li> <li>- akral ekstremitas bawah teraba dingin</li> <li>- turgor kulit menurun</li> <li>- CRT &gt; 3 detik</li> <li>- TD : 140/90 mmHg</li> <li>- skor skala jatuh Morse 80 (risiko tinggi)</li> <li>- bartel index : 110 (ketergantungan sebagian)</li> <li>- Klien tampak tegang</li> <li>- Ekstremitas bawah tampak tremor</li> <li>- Klien terkadang berorientasi pada masa lalu</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



### Analisis Data

NO	DATA	ETIOLOGI	MASALAH
1	<p>DS : - Klien mengatakan ia pasrah dengan kondisi kesehatannya saat ini karena sudah tua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan sulit menggerakkan kakinya.</li> <li>- Klien mengeluh sulit menggerakkan kakinya</li> </ul> <p>DO : klien mengalami kelumpuhan pada ekstremitas bawah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gerakan sendi klien terbatas</li> <li>- ambulasi klien dibantu dengan rostor, tangan dan handuk</li> <li>- tampak sendi ekstremitas bawah kaku</li> <li>- kekuatan otot : 3, 3, 1, 1</li> </ul>	<p>Virus poliomyelitis</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Menyerang system saraf pusat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>kelumpuhan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Penurunan massa, dan kendali otot</p>	Gangguan mobilitas fisik
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DS : klien mengeluh kram pada ekstremitas bawah.</li> <li>DO : - gerakan sendi klien terbatas</li> <li>- Ekstremitas bawah klien nampak pucat</li> <li>- CRT &gt; 3 detik</li> <li>- TD : 140/90 mmHg</li> <li>- terdapat kontraktur pada tangan dan kaki</li> <li>- akral ekstremitas bawah teraba dingin</li> <li>- turgor kulit menurun</li> </ul>	<p>Kelumpuhan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Imobilitas</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Aliran darah ke perifer menurun</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kram dan pucat pada ekstremitas yang lumpuh</p>	Perfusi perifer tidak efektif
3	<p>Faktor risiko : - klien mengalami kelumpuhan pada ekstremitas bawah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien mengatakan fungsi</li> </ul>	<p>Kelumpuhan, kelemahan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Imobilitas</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	Risiko jatuh

	penglihatannya menurun - Usia klien 80 tahun - skor skala jatuh Morse 80 (risiko tinggi) - kekuatan otot : 3,3,1,1	Risiko jatuh	
	<b>DS :</b> - Klien mengatakan tidak pernah dikunjungi keluarga - Klien senang jika ada mahasiswa datang - Klien merasa khawatir dengan kondisinya <b>DO :</b> - Klien tampak tegang - Ekstremitas bawah tampak tremor - Klien terkadang berorientasi pada masa lalu	Kondisi kesehatan tak kunjung baik ↓ Mempengaruhi psikologis ↓ Harapan belum terealisasi ↓ Ansietas	ansietas

## B. Diagnosis Keperawatan

1. Gangguan mobilitas fisik b.d penurunan kekuatan otot d.d mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas
2. Perfusi perifer tidak efektif b.d penurunan aliran arteri dan atau vena d.d Warna kulit pucat
3. Risiko jatuh d.d penggunaan alat bantu jalan
4. Ansietas b.d Kondisi kesehatan tak kunjung baik

### C. Intervensi Keperawatan

NO	DIAGNOSIS KEPERAWATAN	LUARAN KEPERAWATAN	INTERVENSI KEPERAWATAN	RASIONAL
1.	Gangguan mobilitas fisik b.d penurunan kekuatan otot d.d mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x 24 jam, maka diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil: a. Kekakuan sendi menurun b. Gerakan terbatas menurun c. Rentang gerak meningkat	<b>Dukungan mobilisasi</b> <u>Observasi</u> - Pantau adanya keluhan nyeri ataupun keluhan fisik yang lain - perhatikan aktivitas fisik yang masih bisa ditoleransi - pantau pola irama jantung dan tekanan darah sebelum melakukan pemindahan posisi <u>Terapeutik</u> - Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu - Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu <u>Edukasi</u> - Anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan	- u/ mengetahui tingkat kemampuan klien - u/ mengetahui batas mobilisasi klien - u/ memilih pergerakan yang diberikan sesuai dengan kondisi klien  - u/ mempermudah mobilisasi klien  - u/ memberikan mobilisasi secara bertahap
2	Perfusi perifer tidak efektif b.d penurunan aliran arteri dan atau	Setelah dilakukannya tindakan proses keperawatan selama waktu	<b>Pengaturan posisi</b> <u>Observasi</u> - Monitor status oksigenasi	- u/ proteksi atau memastikan

	vena d.d Warna kulit pucat	2x24 jam, maka diharapkan perfusi perifer meningkat dengan kriteria hasil: a. warna kulit pucat menurun b. kram otot menurun	sebelum dan setelah mengubah posisi <u>Terapeutik</u> - Tempatkan objek yang sering digunakan dalam jangkauan - Atur posisi tidur yang disukai - Imobilisasi dan topang bagian tubuh yang cedera dengan tepat - Motivasi melakukan ROM aktif atau pasif - Hindari posisi yang dapat meningkatkan nyeri	status oksigen klien baik - - u/ mempermudah klien menjangkau objek atau barangnya - u/ memberikan rasa nyaman - u/proteksi cedera bertambah parah - u/ meningkatkan sirkulasi perifer - u/proteksi ketidaknyamanan
3	Risiko jatuh d.d penggunaan alat bantu jalan	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, maka diharapkan tingkat jatuh klien menurun dengan kriteria hasil: .1. jatuh dari bed menurun 2. Jatuh dari tempat duduk	<b>Pencegahan jatuh</b> <u>Observasi</u> - Kaji faktor risiko jatuh - Kaji risiko jatuh sekali setiap shift - Kaji faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh - Hitung risiko jatuh menggunakan skala - Pantau toleransi berpindah dari bed menuju rostur <u>Terapeutik</u>	- u/ mengetahui tingkat jatuh klien - u/ proteksi klien jatuh  - u/ mengetahui berpindah klien

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastikan roda rostor selalu terkunci</li> <li>- Gunakan alat bantu berjalan</li> </ul> <p><u>Edukasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjurkan memanggil perawat jika butuh bantuan</li> <li>- Anjurkan konsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- u/ meningkatkan kemandirian klien proteksi kejadian jatuh</li> </ul>
	<p>Ansietas b.d Kondisi kesehatan tak kunjung baik</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 x24 jam diharapkan tingkat ansietas menurun</p> <p>Dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perilaku geilsah menuurun</li> <li>2. perilaku tegang menurun</li> </ol>	<p>Reduksi Ansietas</p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaji saat tingkat ansietas berubah</li> <li>- Monitor tanda-tanda ansietas</li> </ul> <p>Terapeutik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciptakan suasana teraupetik untuk menumbuhkan kepercayaan</li> <li>- Temani klien untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan</li> <li>- Dengarkan dengan penuh perhatian</li> <li>- Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk melihat perubahan ansietas</li> <li>- Agar ansietas dapat terpantau</li> <li>- Agar terjalin BHSP</li> <li>- Dengan menemani klien membuatnya tidak merasa sendiri</li> <li>- Agar klien merasa dihargai</li> <li>- Agar BHSP terjalin</li> </ul>

			Edukasi - Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan (mendengarkan music religi)	- Dengan melatih aktivitas pengalihan, klien tidak berfokus pikiran yang cemas
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------



**D. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan**

NO	DIAGNOSIS	HARI, TGL/JAM	IMPLEMENTASI	EVALUASI (SOAP)
1	1	Rabu,21/04/2021  08.00 WITA  08.00 WITA  08.30 WITA  08.40 WITA  09.40 WITA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkaji adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya Hasil : klien mengatakan pegal-pegal pada ekstremitas atas sebelah kanan</li> <li>- Mengkaji toleransi fisik melakukan pergerakan Hasil : klien hanya mampu menggerakkan ekstremitas atas</li> <li>- Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi Hasil : TD :140/80 mmHg, N : 64x/i</li> <li>- Memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu Hasil : klien mobilisasi menggunakan bantuan pegangan bed, handuk dan bantal</li> <li>- Menganjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (ROM Aktif) Hasil : klien mengerti yang diajarkan dan mempraktikkannya</li> </ul>	Rabu,21/04/2021 (12.30 WITA) S : klien mengatakan bahwa kakinya masih sulit digerakkan dan sendinya kaku serta pergerakan tangannya terbatas, O : klien nampak mengeluh sambil memijit-mijit kakinya. Sendi klien masih terbatas. Ekstremitas bawah klien nampak masih di tekuk dan miring kekuatan otot 3,3,1,1 A : gangguan mobilitas fisik belum teratasi P : lanjutkan intervensi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pantau adanya nyeri atau keluhan yang berhubungan dengan fisik.</li> <li>- Kaji aktivitas fisik yang masih bisa dilakukan</li> <li>- Pantau pola jantung dan tekanan darah sebelum melakukan mobilisasi</li> <li>- berikan aktivitas pemindahan posisi menggunakan peraga bantu</li> </ul>

2	1	<p>Kamis, 22/04/21</p> <p>08.10 WITA</p> <p>08.20 WITA</p> <p>08.35 WITA</p> <p>08.45 WITA</p>	<p>- Mengkaji adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya  Hasil : klien mengeluh lemah dan sulit bergerak</p> <p>- Mengkaji toleransi fisik melakukan pergerakan  Hasil : klien hanya mampu menggerakkan ekstremitas atas</p> <p>- Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi  Hasil : TD :140/80 mmHg, N : 64x/i</p> <p>- Memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu  Hasil : klien mobilisasi menggunakan bantuan pegangan bed, handuk dan bantal dengan mengeset</p>	<p>Kamis, 22/04/21 (12.30 WITA)</p> <p>S : klien mengatakan bahwa kakinya masih sulit digerakkan,  O : klien nampak mengeluh sambil memijit-mijit kakinya.  Ekstremitas bawah klien nampak masih di tekuk dan miring serta sulit diluruskan kekuatan otot 3,3,1,1  A : gangguan mobilitas fisik belum teratasi  P : lanjutkan intervensi</p> <p>- Kaji adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya  - Kaji toleransi fisik melakukan pergerakan  - Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi  - Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu</p>
3	1	Sabtu, 24/04/2021		Sabtu, 24/04/21 (12.30 WITA)



		<p>08.10 WITA</p> <p>08.20 WITA</p> <p>08.30 WITA</p> <p>08.40 WITA</p>	<p>- Mengkaji adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya Hasil : klien mengeluh lemah</p> <p>- Mengkaji toleransi fisik melakukan pergerakan Hasil : klien hanya mampu menggerakkan ekstremitas atas</p> <p>- Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi Hasil : TD :140/80 mmHg, N : 64x/i</p> <p>- Memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu Hasil : klien mobilisasi menggunakan bantuan rostur</p>	<p>S : klien mengatakan bahwa kakinya masih sulit digerakkan namun sudah dapat melakukan pergerakan dan kegiatan lebih baik</p> <p>O : klien nampak mengeluh sambil memijit-mijit kakinya. Ekstremitas bawah klien sudah bisa diluruskan dengan bantuan perawat</p> <p>A : gangguan mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <p>- Kaji adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya</p> <p>- Kaji toleransi fisik melakukan pergerakan</p> <p>- Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi</p> <p>- Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	2	Rabu, 21/04/2021 10.00 WITA  10.05 WITA  10.10 WITA  10.30 WITA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memonitor status oksigenasi sebelum dan setelah mengubah posisi Hasil : status oksigenasi klien baik dan tidak sesak</li> <li>- Menempatkan objek yang sering digunakan dalam jangkauan Hasil : objek yang sering digunakan diposisikan di tepi bed</li> <li>- Imobilisasi dan topang bagian tubuh yang cedera dengan tepat Hasil : bokong klien di topang menggunakan handuk dan ekstremitas bawah ditopang menggunakan bantal</li> <li>- Memotivasi melakukan ROM aktif dan pasif Hasil : klien melakukan rom aktif pada ekstremitas atas dan diberikan rom pasif pada ekstremitas bawah klien</li> </ul>	Rabu, 21/04/2021 (12.40 WITA ) S : klien mengatakan tangannya agak mudah digerakkan dari pada sebelumnya O : ekstremitas bawah klien sudah mulai meningkat pergerakannya, kekuatan otot 4,4,1,1 A : perfusi perifer tidak efektif belum teratasi P : lanjutkan intervensi <b>Pengaturan posisi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempatkan objek yang sering digunakan dalam jangkauan</li> <li>- Imobilisasi dan topang bagian tubuh yang cedera dengan tepat</li> <li>- Motivasi melakukan ROM aktif dan pasif</li> </ul>
5	2	Kamis, 22/04/2021 09.00 WITA  09.12 WITA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menempatkan objek yang sering digunakan dalam jangkauan Hasil : objek yang sering digunakan diposisikan di tepi bed</li> <li>- Imobilisasi dan topang bagian tubuh yang cedera dengan tepat</li> </ul>	Kamis, 22/04/2021 (12.40 WITA ) S : klien mengatakan kram pada ekstremitas bawah O : ekstremitas bawah klien sudah dapat di ubah posisi dan diluruskan namun masih nampak pucat

		09.30 WITA	<p>Hasil : bokong klien di topang menggunakan handuk dan ekstremitas bawah ditopang menggunakan bantal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memotivasi melakukan ROM aktif atau pasif</li> </ul> <p>Hasil : klien melakukan rom aktif pada ekstremitas atas dan diberikan rom pasif pada ekstremitas bawah klien</p>	<p>A : perfusi perifer tidak efektif belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi</p> <p><b>Pengaturan posisi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor status oksigenasi sebelum dan setelah mengubah posisi</li> <li>- Tempatkan objek yang sering digunakan dalam jangkauan</li> <li>- Imobilisasi dan topang bagian tubuh yang cedera dengan tepat</li> <li>- Motivasi melakukan ROM aktif atau pasif</li> </ul>
6	3	<p>Sabtu, 24/04/2021</p> <p>08.50 WITA</p> <p>09.00 WITA</p> <p>09.08 WITA</p> <p>09.13 WITA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkaji faktor risiko jatuh</li> </ul> <p>Hasil : klien berisiko jatuh dari bed dan rostur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghitung risiko jatuh menggunakan skala</li> </ul> <p>Hasil : skala jatuh Morse 80 (resiko tinggi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memonitor kemampuan berpindah dari bed ke rostur</li> </ul> <p>Hasil : kemampuan klien berpindah tempat lambat namun cukup mandiri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan alat bantu berjalan</li> </ul>	<p>Sabtu, 24/04/2021 (12.50 WITA )</p> <p>S : klien mengatakan mampu berpindah dari rostur dan sebaliknya sendiri.</p> <p>O : klien nampak menggunakan rostur secara mandiri.</p> <p>Perpindahan klien ke rostur berisiko jatuh.</p> <p>Klien berpindah tempat masih lemah dan butuh bantuan.</p> <p>Kekuatan otot klien 4,4,2,2</p> <p>A : risiko jatuh belum teratasi</p>

		<p>09.45 WITA</p> <p>10.02 WITA</p>	<p>Hasil : klien berjalan menggunakan bantuan rostur</p> <p>- Menganjurkan memanggil perawat jika butuh bantuan</p> <p>Hasil : klien selalu memanggil bantuan</p> <p>- Menganjurkan konsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh</p> <p>Hasil : klien mendengarkan dan mengerti</p>	<p>P : lanjutkan intervensi</p> <p><b>Pencegahan Jatuh</b></p> <p>- Kaji risiko jatuh sekali setiap shift</p> <p>- Monitor kemampuan berpindah dari bed ke rostur</p> <p>- Pastikan roda rostur selalu terkunci</p> <p>- Anjurkan memanggil perawat jika butuh bantuan</p> <p>- Anjurkan konsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh</p>
7	4	<p>Senin 26 /04/2021</p> <p>08.45 WITA</p> <p>09.04 WITA</p> <p>09.39 WITA</p>	<p>- mendengarkan dengan penuh perhatian saat klien bercerita</p> <p>Hasil : klien sangat antusias bercerita</p> <p>- melatih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan sesuai hobi (menyanyi)</p> <p>Hasil : klien bernyanyi dengan penuh emosi dan ekspresi yang dirasakan</p> <p>- melatih teknik relaksasi mendengarkan music islami</p> <p>Hasil: klien mendengarkan musik sambil menyanyikannya, klien tampak dan tertidur di</p>	<p>Senin, 26/04/2021 pukul 12.57 WITA</p> <p>S: - Klien mengatakan merasa senang dihargai</p> <p>- klien mengatakan senang melakukan hobinya (menyanyi)</p> <p>- klien merasa tenang setelah mendengarkan musik</p> <p>O: - wajah klien tampak bahagia</p> <p>- klien Nampak antusias saat menyanyi</p> <p>- klien tampak tertidur diakhir intervensi</p> <p>A: ansietas dapat dikontrol</p> <p>P : pertahankan intervensi</p>

			akhir intervensi	<ul style="list-style-type: none"><li>- latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan</li><li>- latih tehnik relaksasi mendengarkan music islami</li></ul>
--	--	--	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## **E. Evaluasi**

### **1. Evaluasi Struktur**

Selama menjalankan proses asuhan keperawatan pada Ny.P dapat dinilai secara struktur seperti dari faktor lingkungan sangat kondusif pada saat pelaksanaan proses asuhan keperawatan, dimana klien nyaman dengan lingkungan yang ditempati, didukung juga dengan fasilitas fisik yang memadai seperti rostrur sehingga dalam pemberian intervensi bisa dilakukan di luar kamar sambil klien menonton. Didukung juga dengan hubungan antara perawat dengan klien yang setiap shiftnya membantu dalam pemenuhan kebutuhan klien, sistem pendokumentasian tindakan keperawatan tertulis di buku rekam medik klien sehingga membantu perawat lainnya dalam melihat catatan perkembangan klien selama diberikan asuhan keperawatan. Apalagi didukung dengan kompetensi perawat dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan, tak lupa juga berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menunjang kesehatan klien.

### **2. Evaluasi Proses**

Selama proses asuhan keperawatan berlangsung, klien terlihat sangat kooperatif dan senang untuk diajak komunikasi atau berbincang-bincang mengenai kesehatannya, sehingga terjalinnya komunikasi terapeutik. Dengan terjalinnya komunikasi terapeutik menyebabkan adanya hubungan saling percaya antara perawat dan klien, dari situlah perawat dengan mudahnya mendapatkan keluhan ataupun data-data yang bermasalah pada klien, dari data-data yang bermasalah kemudian dianalisis dan ditegakkannya diagnosis keperawatan satu persatu berdasarkan kateori-kategori data yang di dapatkan dari hasil pengkajian.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Kasus**

Pada laporan kasus ini, penulis melakukan pengkajian di balai rehabilitasi social lanjut usia (BRSLU) dengan total jumlah lanjut usia 6 orang dengan 3 nenek dan 3 kakek. Pengkajian dilakukan pada Ny. P di asrama 1 BRSLU dengan sindrom geriatric imobilisasi. Pengkajian dilakukan pada hari senin, 20 April 2021. Sebelumnya, klien terkena penyakit poliomyelitis yang menyebabkan kedua ekstremitas bawah klien mengalami kelumpuhan. Hasil pengkajian, klien mengatakan pasrah dengan kondisinya saat ini karena sudah tua. Untuk sehari-hari, klien mengatakan mampu mencuci baju, mandi, makan, BAK dan BAB, memakai baju secara mandiri. Kekuatan fisik lansia seperti kekuatan sendi menurun, fungsi penglihatan menurun, fungsi pendengaran klien masih baik. Klien mengatakan selama bulan puasa ia makan 2 kali sehari yaitu pada saat buka puasa dan sahur, minum 1 botol sekitar 1500 cc, tidur malam 7-8 jam, BAB 2-3 x/minggu, BAK : 4-5 kali sehari.

Klien mengatakan sebelum pandemi sering dilakukan olahraga namun semenjak pandemi, ia hanya melakukan kegiatan didalam kamar. Perubahan-perubahan fungsi tubuh yang masih sangat bermakna dirasakan oleh klien. Klien mengatakan fungsi tubuh yang sangat dirasakan berubah yaitu penglihatan dan kekuatan otot. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan klien hanya mampu melihat satu arah yaitu ke depan dan kurang mampu menggerakkan mata ke atas, ke bawah, dan kesamping. tidak ada terdengar bunyi napas tambahan, sirkulasi perifer ke ekstremitas bawah berkurang, ekstremitas bawah nampak pucat tidak nampak DVJ, CRT  $>$  3 detik, klien hanya mampu menelan, bising usus : 6 x/ menit, keadaan perut teraba lunak, warna dan bau urine kekuningan dan bau pesing , distensi kandung kemih tidak ada, inkontinensia tidak ada, frekuensi berkemih 5-6 x/ hari, klien mengatakan masih merasakan desakan berkemih dan masih bisa di tahan, pemasukan cairan air minum melalui oral, pengeluaran cairan melalui uretra, keadaan kuku pendek dan bersihkan keadaan rambut pendek, beruban dan

bersih terdapat kontraktur pada tangan dan kaki, ambulasi klien dibantu dengan rostur, tangan dan handuk, Kekuatan otot ekstremitas atas :3,3 ekstremitas bawah : 0,0. Tanda-tanda vital, didapatkan Tekanan Darah : 140/90 MmHg, Nadi : 64 x/m, Pernapasan : 16 x/m, Suhu : 36,5°C. Klien mengatakan ia berharap di beri kekuatan oleh Allah swt agar tetap kuat menghadapi kondisinya. Klien mengatakan jarang berinteraksi diluar wisma sebab pandemi covid 19. Kesibukan dalam mengisi waktu luang mendengarkan radio, membersihkan kamar dan mengobrol dengan tetangga kamar.

Pengkajian index katz menunjukkan kemandirian klien dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali satu dari fungsi. pengkajian status kognitif dan afektif menunjukkan fungsi intelektual klien ringan dengan kesalahan 3 – 4. Skala jatuh morse (morse fall scale/ mfs) menunjukkan klien beresiko tinggi jatuh dengan skor 80. Skor skala depresi geriatric (geriatric depression scale / gds) yaitu 1 (normal), skor barthel index menunjukkan 110 (ketergantungan sebagian), Kaji aspek kognitif dan fungsi mental dengan menggunakan MMSE (Mini Mental Status Exam) menunjukkan kerusakan aspek fungsi mental sedang dengan skor 17.

Dari hasil pengkajian, maka penulis mengangkat masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik b.d penurunan kekuatan otot d.d mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas perfusi perifer tidak efektif b.d penurunan aliran arteri dan atau vena d.d warna kulit pucat risiko jatuh d.d penggunaan alat bantu jalan dan Ansietas b.d Kondisi kesehatan tak kunjung baik. Perubahan normal akibat penuaan ini paling jelas terlihat pada system musculoskeletal berupa penurunan otot secara keseluruhan pada usia 80 tahun mencapai 30 % sampai 50 %. Penurunan fungsi sistem musculoskeletal pada lansia dapat menyebabkan kelemahan fisik dan menurunkan aktivitas fisik dan latihan yang dapat memengaruhi aktivitas kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, gangguan mobilitas yang diakibatkan oleh perubahan patologis pada system musculoskeletal berupa penurunan kekuatan dan ketangkasan otot, kontraktur yang membatasi mobilitas sendi, kekakuan dan nyeri sendi. Untuk proteksi perubahan lebih lanjut, intervensi yang dapat diberikan latihan fisik seperti



latihan isotonik dan isometrik, latihan aerobik dan latihan range of motion (ROM) (Uda et al, 2016 dalam Adriani & Nurfatma, 2019).

## **B. Analisis Intervensi**

Penelitian Adriani & Nurfatma (2019) menunjukkan adanya pengaruh pemberian intervensi range of motion (ROM) pada klien lansia. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan otot pada lansia/responden setelah diberikannya intervensi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (sahmad dkk, 2016) menunjukkan Rata-rata rentang gerak sendi lutut, mata kaki, dan kaki pada lansia di Panti sosial tresna werda minaula kendari sebagai kelompok perlakuan meningkat. Dari hasil tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh latihan Range Of Motion (ROM) pasif terhadap peningkatan rentang gerak sendi pada lansia.

Pada penelitian serupa terkait pemberian intervensi latihan *range of motion (ROM)* pasif yang dilakukan oleh (Nanda dkk, 2021), menunjukkan hasil adanya pengaruh berupa peningkatan kekuatan otot dan rentang gerak klien pasca stroke. Pasien stroke dengan mobilitas terbatas tidak dapat melakukan beberapa atau semua latihan gerakan sendiri. Keterbatasan ini dapat didiagnosis pada klien yang memiliki keterbatasan gerak pada salah satu ekstremitas atau pada klien imobilisasi penuh. Latihan rentang gerak dapat bersifat aktif (klien menggerakkan semua sendi dengan rentang gerak tangan) dan pasif (klien tidak dapat bergerak secara mandiri dan perawat menggerakkan setiap sendi dengan rentang gerak tertentu). Melakukan terapi latihan berupa gerakan pasif sangat bermanfaat dalam menjaga sifat fisiologis otot dan sendi jaringan., (Potter & Perry 2006) dalam (Daulay, Hidayah, & Santoso, 2021)

Saat diimobilisasi, jaringan kolagen sendi bisa menjadi kaku (radang kronis). Selain itu, tulang juga mengalami demineralisasi, yang menyebabkan kalsium menumpuk di persendian, membuatnya kaku. Latihan ROM yang merupakan latihan gerakan pada persendian akan lebih menunjang fungsi persendian sebagai gerakan tubuh.

Intervensi yang dilakukan untuk mengatasi gangguan yang dialami Ny. P yaitu range your motion (ROM). ROM merupakan serangkaian latihan

gerakan yang melibatkan semua sendi dalam rentang normalnya, yang harus dilakukan secara intensif untuk mempertahankan tonus dan fungsi otot, proteksi kecacatan sendi, dan meningkatkan fungsi motorik (Hickey, 2003 dalam dalam Adriani & Nurfatma, 2019).

Jenis-jenis ROM dibagi menjadi 2 yaitu ROM aktif dan Rom Pasif. Roma aktif adalah gerakan yang dilakukan oleh seseorang (klien) dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Perawat menawarkan *directional* atau motivasi dan pasien terkemuka pada implementasi gerakan mereka sendiri terlepas dari kekuatan otot domain komunitas (klien aktif) sebesar 75%. Tujuannya adalah untuk membentuk tingkat fleksibilitas dan kekuatan otot dan senyawa melalui otot aktif. Sendi Adapun, yang diberikan oleh Roma aktif, adalah bagian dari sendi di seluruh tubuh pasien pasien di puncak pasien itu sendiri aktif. Roma pasif adalah kapasitas yang dibuat untuk pelatihan, yang muncul dari orang lain atau alat bantu mekanis. Lainnya melaksanakan persendian pasien sesuai dengan kisaran normal gerakan (pasien pasif) dari kekuatan otot 50%. Lihat latihan ROM pasif adalah pasien dengan keadaan semikologis dan tidak sadar, pasien yang memiliki dalam pembatasan mobilisasi, tidak ada atau semua latihan gerakan mungkin mandiri, pasien dengan keadaan ban awal atau pasien dengan kelumpuhan total ban melakukan awal atau pasien.

Rentang gerak pasif ini berguna untuk menjaga kelenturan otot-otot, melancarkan peredaran darah dan persendian dengan menggerakkan otot orang lain secara pasif misalnya perawat mengangkat dan menggerakkan kaki klien. Sendi yang digerakkan pada ROM pasif adalah seluruh persendian tubuh atau hanya pada ekstremitas yang terganggu dan klien tidak mampu melaksanakannya secara mandiri. (Indriani, 2019)

Pada Ny. P diberikan ROM aktif dan Rom Pasif, untuk ROM aktif dilakukan pada ekstremitas atas klien karena berdasarkan hasil penilaian kekuatan otot, ekstremitas atas dextra berada pada nilai 3 sedangkan ekstremitas atas sinistra juga berada pada nilai 3 yang berarti Otot mampu menggerakkan sendi, otot juga dapat melawan pengaruh gravitasi, tetapi tidak kuat terhadap tahanan yang diberikan oleh pemeriksa. Pada latihan rentang

gerak atas dilakukan oleh klien itu sendiri akan tetapi dalam arahan dan pengawasan perawat. Untuk ekstremitas bawah total yaitu setelah dilakukan penilaian kekuatan otot didapatkan ekstremitas bawah dextra maupun sinistra berada pada nilai 1 yang artinya kontraksi otot yang terjadi hanya berupa perubahan dari tonus otot yang dapat diketahui dengan cara palpasi dan tidak dapat menggerakkan sendi, jadi latihan ROM pasif pada Ny P dibantu secara mekanik oleh perawat pada bagian ekstremitas bawah. Hasil didapatkan setelah pemberian ROM aktif dan Pasif pada Ny. Puji yaitu dapat dilihat dari kekuatan otot, ekstremitas atas sinistra 4, ekstremitas atas dextra 4, ekstremitas bawah sinistra 2 dan ekstremitas bawah dextra 2, sehingga dapat disimpulkan adanya perubahan rentang gerak klien selama diberikan intervensi ROM dan setelah dievaluasi didapatkan data subjektif klien mengatakan merasa relaks, klien mengatakan mampu mengangkat kakinya, sedangkan data objektif menunjukkan, klien Nampak mengangkat kakinya secara mandiri, klien Nampak memfleksikan dan mengekstensi kakinya secara perlahan.

Adapun Penilaian kekuatan otot menurut (M. James dalam buku M Debora, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Derajat 0 : Paralisis total atau tidak ditemukan adanya kontraksi pada otot.
2. Derajat 1 : Kontraksi otot yang terjadi hanya berupa perubahan dari tonus otot yang dapat diketahui dengan palpasi dan tidak dapat menggerakkan sendi.
3. Derajat 2 : Otot hanya mampu menggerakkan persendian, tetapi kekuatannya tidak dapat melawan pengaruh gravitasi.
4. Derajat 3 : Otot mampu menggerakkan sendi, otot juga dapat melawan pengaruh gravitasi, tetapi tidak kuat terhadap tahanan yang diberikan oleh pemeriksa.
5. Derajat 4 : Kekuatan otot seperti pada derajat 3 disertai dengan kemampuan otot terhadap tahanan yang ringan.
6. Derajat 5 : Kekuatan otot normal. (Debora, 2017)

Pada Ny. P diberikan intervensi ROM sebanyak 3 kali dalam seminggu selama 15 menit. Setelah diberikan intervensi, keluhan klien terkait kram sendi menurun dan ekstremitas bawah klien yang sebelum diberikan intervensi hanya tertekuk dan miring, setelah diberikan intervensi, ekstremitas bawah sudah dapat diluruskan. Sehingga intervensi tersebut dianjurkan untuk terus diberikan kepada klien khususnya lanjut usia.

Rentang gerak dibagi menjadi kelas gerakan aktif dan kelas gerakan pasif. Rentang gerakan aktif adalah bahwa pasien dapat secara mandiri memindahkan saham mereka sesuai dengan rentang gerakan normal, sedangkan rentang gerak pasif adalah bahwa pasien tidak bergerak secara independen satu sama lain dan membutuhkan bantuan. Latihan ROM aktif pada orang tua dalam implementasi gerakan independen sesuai dengan kisaran gerakan normal. Indikasi ROM aktif dilakukan tiga kali selama seminggu selama 30 menit untuk meningkatkan kekuatan otot lanjut usia (Imron, et al 2015 dalam Adriani & Nurfatma, 2019).

ROM merupakan intervensi non farmakologi dan sebagai ikhtiar untuk membantu lansia proteksi dampak buruk dari imobilitas yang diharapkan memberikan efek yang positif bagi kesehatan dengan izin Allah swt seperti firman Allah dalam Qur'an surah Asy-Syu'ara :80

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AL AUDDIN  
وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Artinya: "Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku" (Doa Nabi Ibrahim). (Kementerian Agama RI, 2018)

### C. Alternatif Pemecahan Masalah

Alternative intervensi yang diberikan pada Ny P yaitu Dukungan mobilisasi dan pencegahan jatuh. Dukungan mobilisasi yaitu memfasilitasi klien untuk meningkatkan aktifitas pergerakan fisik seperti membantu memfasilitasi aktifitas mobilisasi menggunakan alat bantu, mengajarkan mobilisasi sederhana misalnya duduk di bed, duduk di sisi bed, pindah dari bed ke kursi ataupun sebaliknya. Sedangkan intervensi pencegahan jatuh yaitu mengkaji dan menurunkan resiko terjatuh akibat perubahan kondisi fisik maupun kondisi psikologis seperti mengatur posisi bed tidak tinggi atau rendah, menggunakan alat bantu berjalan seperti rosur, menganjurkan klien

untuk memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah, menganjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin dan menganjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Berkonsentrasi membantu dalam proses ketenangan untuk berpikir, jika klien tenang dalam berpikir akan berdampak ke hal-hal yang positif ketika beraktifitas. Salah satu bentuk melatih konsentrasi yaitu dengan berdzikir, selain membantu konsentrasi dzikir juga mampu menenangkan hati.

sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ra,d ayat :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya :

*(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (Kementerian Agama RI, 2018)*

Dalam ayat ini kita dianjurkan untuk berdzikir bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang yang percaya bahwa sehat sakit itu datangnya dari Allah SWT jadi sepatutnya kita selalu menyebut namanya agar hati kita menjadi lebih tenang tanpa ada rasa khawatir dengan keadaan atau kondisi apapun baik dalam keadaan apapun.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan proses asuhan keperawatan pada Ny "P", penulis merasakan sendiri pengalaman secara langsung dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, perumusan diagnosis keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan serta evaluasi keperawatan. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengkajian keperawatan dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan melakukan pemeriksaan fisik. Adapun hasilnya sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan terhadap Ny.P didapatkan bahwa Ny.P mengalami sindrom geriatric *Immobility* disebabkan kekakuan otot dan persendian terutama pada ekstremitas bawah dengan nilai otot 1/1.
2. Diagnosis keperawatan yang ditegakkan pada Ny.P dengan sindrom geriatric *Immobility* , yaitu :
  - a. Gangguan mobilitas fisik penurunan kekuatan otot d.d mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas
  - b. Perfusi perifer tidak efektif penurunan aliran arteri dan atau vena d.d warna kulit pucat
  - c. Resiko Jatuh d.d penggunaan alat bantu jalan
  - d. Ansietas b.d Kondisi kesehatan tak kunjung baik
3. Intervensi keperawatan pada Ny.P dengan sindrom geriatric *Immobility*, yaitu :
  - a. Dukungan Mobilisasi
  - b. Pengaturan Posisi
  - c. Pencegahan Jatuh
  - d. Reduksi Ansietas
4. Implementasi keperawatan pada Ny P dengan sindrom *Immobility* dilakukan 1x24 jam yang terdiri intervensi observasi, terapeutik maupun edukasi.

5. Hasil evaluasi keperawatan pada Ny P dengan sindrom geriatric *Immobility* dari 4 diagnosis, masalah ansietas teratasi, masalah gangguan mobilitas fisik sedikit teratasi, perfusi perifer tidak efektif belum teratasi dan resiko jatuh pada Ny P masih berpotensi untuk jatuh.
6. Hasil intervensi keperawatan berbasis *evidence bance* pada Ny. P yaitu ROM aktif dan Pasif dapat meningkatkan kekuatan otot klien setelah diberikan selama 1 minggu dengan frekuensi 3 kali. Sebelum diberikan intervensi angka penilaian otot menunjukkan 3,3,1,1 sedangkan setelah diberikan intervensi berada pada nilai 4,4,2,2.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi Pelayanan Kesehatan

Diharapkan bagi pelayanan kesehatan *latihan range of motion (ROM)* bisa menjadi rekomendasi intervensi dalam melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit

2. Bagi Perawat

Diharapkan *range of motion (ROM)* menjadi skil mandiri perawat yang dapat dilakukan di ruang perawatan selama menjalankan proses asuhan keperawatan

3. Bagi Klien dan Keluarga


Diharapkan setelah diajari oleh perawat terkait intervensi *range of motion (ROM)* klien dan keluarga mampu menerapkan secara mandiri terutama di rumah

4. Bagi Institusi Kesehatan

Diharapkan dapat menjadi rujukan oleh mahasiswa keperawatan dalam menambah wawasan terkait asuhan keperawatan pada lansia khususnya dalam memberikan intervensi *range of motion (ROM)*.

## LAMPIRAN

### A. Pathway





## B. Jurnal Rujukan Utama

REAL in Nursing Journal (RNJ), Vol. 2, No. 3  
Adriani & Sari, N. (2019). RNJ. 2(3) : 118-125

### Pengaruh Latihan Range of Motion (ROM) Aktif Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Ekstremitas Bawah Lansia

REAL in  
Nursing  
Journal (RNJ)

<https://ojs.fdk.ac.id/index.php/Nursing/index>

Adriani & Nurfatma Sari

#### ABSTRACT

*Musculoskeletal system disorders of weakness in the muscles of the elderly are common. Actions that can be taken to reduce complaints of the elderly are with range of motion (ROM) exercises. The purpose of this study was to determine the effect of active range of motion (ROM) exercises on increasing the strength of lower limb muscles in the elderly. Pre-experimental research design with one group pre-test and post-test. By means of purposive sampling with 6 respondents. Giving intervention as much as 6 times exercise for 3 weeks with a frequency of 2 times a day for 10 minutes with 3 repetitions of movements. Analysis was performed by paired dependent T-test samples. The results showed that the average lower limb muscle strength in the elderly before active ROM exercises were the hip region = 3.03317, the knee region = 3.44433, the ankle region = 3.24300, the toe region = 3.31950. While the average lower limb muscle strength after active ROM exercises are the hip region = 3.22117, knee region = 3.76367, ankle region = 3.51383, toe area = 3.86800, with hip value  $p = 0.028$ , knee  $p = 0.002$ , ankle  $p = 0.002$ , toe  $p = 0.000$ . Based on the results of the study it can be concluded that there is an effect of active range of motion (ROM) exercises on increasing muscle strength in the elderly. This research is expected to be a consideration for the elderly orphanages in order to make the range of motion (ROM) as an exercise program to increase muscle strength in the elderly.*

#### Keywords:

elderly, muscle strength, range of motion

#### Korespondensi:

Adriani  
[adrianisuwito@fdk.ac.id](mailto:adrianisuwito@fdk.ac.id)

Prodi Keperawatan dan  
Ners, Universitas Fort De  
Kock Bukittinggi

#### ABSTRAK

Gangguan system muskuloskeletal kelemahan pada otot-otot lansia lazim terjadi , Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi keluhan lansia adalah dengan latihan range of motion (ROM). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh latihan range of motion (ROM) aktif terhadap peningkatan kekuatan otot ekstremitas bawah pada lansia .Desain penelitian pra eksperiment dengan one group pre test dan post test. Dengan cara purposive sampling dengan 6 responden. Pemberian intervensi sebanyak 6 kali latihan selama 3 minggu dengan frekuensi 2 kali dalam sehari yaitu selama 10 menit dengan 3 kali pengulangan gerakan. Analisis dilakukan Paired sampel T-test dependent. Hasil penelitian didapatkan rata-rata kekuatan otot ekstremitas bawah pada lansia sebelum latihan ROM aktif adalah regio hip = 3,03317, regio knee =3,44433, regio ankle = 3,24300, regio toe = 3,31950. Sedangkan rata-rata kekuatan otot ekstremitas bawah setelah latihan ROM aktif adalah regio hip = 3,22117, regio knee = 3,76367, regio ankle =3,51383, regio toe = 3,86800, dengan nilai hip  $p=0,028$ , knee  $p=0,002$ , ankle  $p=0,002$ , toe  $p=0,000$ . Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat pengaruh latihan range of motion (ROM) aktif terhadap peningkatan kekuatan otot lansia. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi panti asuhan Lansia agar bisa menjadikan range of motion (ROM) sebagai program latihan untuk meningkatkan kekuatan otot pada lansia.

Kata Kunci : asupan gizi, pola asuh, stunting

## PENDAHULUAN

Lanjut usia adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Manusia secara tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi, anak-anak, dewasa dan akhirnya menjadi tua. Hal ini normal, dengan perubahan fisik dan tingkah laku yang dapat diramalkan yang terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai usia tahap perkembangan kronologis tertentu (Azizah, 2011; Sahmad et al, 2016). Menjadi tua adalah suatu proses yang tidak dapat dihindari oleh kita semua, namun tidak ada pengaruh antara penilaian ciri menjadi tua itu dengan kesehatan (Stanley & Beare, 2007, p.4). Dalam Buku Ajar Geriatri, Prof. Dr. R. Boedhi Darmojo dan Dr. H. Hadi Martono (1994) mengatakan bahwa "menua" (menjadi tua) adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/ mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas dan memperbaiki kerusakan yang diderita (Nugroho, 2008, p.11).

Menurut WHO tentang kesejahteraan lanjut usia pada pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa umur 60 tahun adalah usia permulaan tua. Menua bukanlah suatu penyakit, akan tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan yang kumulatif, merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh yang berakhir dengan kematian (Padila, 2013, p.6). Jumlah penduduk usia lanjut pada tahun 2015 adalah sebanyak 900 juta jiwa. Jumlah ini setara dengan 12% dari jumlah penduduk dunia. Sementara itu di Asia, terdapat sejumlah 508 juta penduduk berusia lanjut. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk lanjut usia di Asia menyumbang lebih dari setengah

jumlah lansia di seluruh dunia. (United Nations, 2015 : Depkes RI, 2015).

Di Indonesia batasan usia lanjut adalah 60 tahun ke atas, terdapat dalam UU No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Menurut UU tersebut diatas lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita (Padila, 2013, p.6). Jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan menjadi 11,34%. Menurut data BPS tahun 2015 presentase estimasi penduduk lansia di Indonesia sebanyak 8,5%. Provinsi dengan presentase lansia tertinggi adalah DI Yogyakarta (13,4%) dan terendah adalah Papua (2,8%). Peningkatan proporsi jumlah lansia tersebut perlu mendapatkan perhatian karena kelompok lansia merupakan kelompok beresiko tinggi yang mengalami berbagai masalah kesehatan khususnya penyakit degeneratif (Kemenkes RI, 2015).

Di Sumatera Barat, hasil sensus penduduk pada tahun 2014 jumlah penduduk lanjut usia adalah 5.131.882 jiwa, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 5.196.370 jiwa penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk per tahunnya adalah 1.26% dengan angka tertinggi di Padang yaitu 902.413 jiwa penduduk (BPS, 2015). Penurunan fungsi dan kemampuan tubuh pada lansia akan menurun begitu pula dengan kekuatan otot akan menurun seiring dengan penambahan usia. Pada seorang lanjut usia akan membawa perubahan yang menyeluruh pada fisiknya yang berkaitan dengan menurunnya kemampuan jaringan tubuh terutama pada fungsi fisiologis dalam sistem musculoskeletal dan system neurologis (Padila, 2013, p.56).

Perubahan normal akibat penuaan ini paling jelas terlihat pada sistem musculoskeletal berupa penurunan otot secara

keseluruhan pada usia 80 tahun mencapai 30% sampai 50%. Hambatan mobilitas yang diakibatkan oleh perubahan patologis pada sistem muskuloskeletal berupa penurunan kekuatan dan ketangkasan otot, kontraktur yang membatasi mobilitas sendi, kekakuan dan nyeri pada sendi (Uda et al, 2016).

Selain perubahan fisiologis, lansia juga mengalami perubahan morfologis. Dampak perubahan morfologis otot adalah penurunan kekuatan otot, penurunan fleksibilitas, dan penurunan kemampuan fungsional otot. Kekuatan otot pada lansia akan berkurang sebanyak 10- 15% tiap minggunya dan sebanyak 5,5% dapat hilang setiap hari pada kondisi istirahat dan mobilitas sepenuhnya (Stanley & Beare, 2007, p. 157). Kekuatan otot adalah tenaga kontraksi otot yang dicapai dalam sekali usaha maksimal. Usaha maksimal ini dilakukan oleh otot atau sekelompok otot untuk mengatasi suatu tahanan. Kekuatan otot secara umum adalah kekuatan sistem otot secara keseluruhan dalam mengatasi suatu tahanan (Atmojo, 2008 : Mudrikah, 2012).

Penurunan fungsi muskuloskeletal pada lansia dengan kelemahan fisik dapat menurunkan aktivitas fisik (physical activity) dan latihan (exercise), sehingga akan mempengaruhi lansia dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari (activity daily living). Untuk mencegah perubahan lebih lanjut, dapat diberikan latihan untuk mempertahankan mobilitas (Pudjiastuti & Utomo, 2003, p.10). Hal yang dapat Anda lakukan adalah mencegah atau meminimalkan dampak penurunan kekuatan otot. Intervensi yang bisa dilakukan pada orang tua adalah dengan latihan fisik. Ada beberapa latihan fisik untuk orang tua, yaitu latihan isotonik dan isometrik, latihan

aerobik, dan latihan Range of Motion (ROM) (Safa"ah et al, 2017).

Range of Motion (ROM) dapat diartikan sebagai pergerakan maksimal yang dimungkinkan pada sebuah persendian. Rentang pergerakan sendi bervariasi dari individu ke individu lain dan ditentukan oleh jenis kelamin, usia, ada atau tidaknya penyakit, dan jumlah aktivitas fisik yang normalnya dilakukan seseorang (Kozier et al, 2004). Latihan ROM adalah latihan pergerakan rentang semua sendi dalam rentang normalnya yang perlu dilakukan secara intensif untuk mempertahankan tonus dan fungsi otot, mencegah disabilitas sendi dan membantu perbaikan fungsi motorik (Hickey, 2003 : Astrid et al, 2011). Rentang gerak dibedakan menjadi dua yaitu rentang gerak pasif dan rentang gerak aktif. Rentang gerak aktif adalah klien dapat menggerakkan sendinya secara mandiri atau tanpa bantuan. Sedangkan rentang gerak pasif adalah klien tidak dapat menggerakkan sendinya secara mandiri dan perawat menggerakkan setiap sendi dengan rentang gerak atau berada diantaranya (Widuri, 2010). Latihan ROM aktif pada lansia tersebut yaitu membimbing lansia dalam melaksanakan pergerakan secara mandiri sesuai dengan rentang gerak sendi normal. Pemberian ROM aktif dilakukan selama 30 menit selama satu minggu tiga kali untuk meningkatkan kekuatan otot dan memberi kesehatan fisik pada lansia (Imron et al, 2015).

Selain latihan ROM dan kelemahan yang dialami, faktor usia mempengaruhi kenaikan kekuatan otot berhubungan dengan rehabilitasi. Proses rehabilitasi pasien adalah proses pembelajaran motorik yang merupakan sekumpulan proses yang mempengaruhi latihan motorik dalam keadaan internal dari

sistem saraf pusat. Latihan ROM dilakukan melibatkan ingatan jangka panjang dan pasien lebih mudah belajar. Usia tua diketahui memiliki kemampuan ingatan jangka panjang yang kurang dibanding usia muda, jadi usia memiliki dampak pada kemampuan pemulihan kekuatan otot (Rhestifujiyanti et al, 2015).

**METODE PENELITIAN**

Desain: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain pra experiment dengan metode one group pretest-posttest design, Sampel: Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling sebanyak 6 orang. Analisa data: Penelitian ini menggunakan uji univariat dan bivariat. Hasil uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal sehingga digunakan uji Paired t-test untuk analisa bivariat dengan batas derajat kemaknaan  $p < 0.05$ . Lansia yang mengalami gangguan fungsional otot dan sendi berjumlah 29 orang, responden yang Mengalami gangguan berjumlah 10 orang Setelah dilakukan pengecekan kartu riwayat Ada 3 orang

lansia yang menderita hipertensi sehingga jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Namun saat dilakukan penelitian terdapat 1 orang lansia tidak mampu mengikuti latihan ROM aktif. Sehingga jumlah responden dalam penelitian 6 orang. Instrument: Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Lembar SOP latihan range of motion, lembar check list latihan range of motion, lembar observasi kekuatan otot, lembar penuntun manual muscle test.

**HASIL PENELITIAN**

**Pengaruh Latihan Range of Motion (ROM) Aktif Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Ekstremitas Bawah Pada Lansia di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar Tahun 2018**

Hasil analisa data pengaruh latihan *Range Of Motion* (ROM) aktif terhadap peningkatan kekuatan otot ekstremitas bawah pada lansia di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dalam tabel 5.3 berikut ini :

**Pengaruh Latihan Range of Motion (ROM) Aktif Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Ekstremitas Bawah Pada Lansia di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar**

Regio	Intervensi	N	Mean	Standar Deviasi	Mean Difference	Standar Deviasi	P-Value
Hip	Pre Test	6	3,03317	0,085080			
	Post Test	6	3,22117	0,194376	-0,188000	0,150439	0,028
Knee	Pre Test	6	3,44433	0,245342			
	Post Test	6	3,76367	0,226246	-0,319333	0,133618	0,002
Ankle	Pre Test	6	3,24300	0,089192			
	Post Test	6	3,51383	0,176079	-0,270833	0,131038	0,004
Toe	Pre Test	6	3,31950	0,133389			
	Post Test	6	3,86800	0,124898	-0,548500	0,084998	0,000

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata kekuatan otot ekstremitas bawah pada lansia sebelum intervensi ROM adalah rata rata regio hip 3,03317 dengan standar deviasi (SD) 0,085080, sedangkan setelah intervensi ROM adalah 3,22117 dengan standar deviasi (SD) 0.194376. Rata-rata pengaruh kekuatan otot pada lansia di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar antara sebelum dan sesudah intervensi ROM adalah -0,188000 dengan standar deviasi 0,150439. Hasil uji statistik nilai P-Value adalah 0,028. Rata rata regio knee sebelum intervensi 3,44333 dengan standar deviasi (SD) 0,245342, sedangkan setelah intervensi ROM adalah 3,76367 dengan standar deviasi (SD) 0.226246. Rata-rata pengaruh kekuatan otot pada lansia di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar antara sebelum dan sesudah intervensi ROM adalah -0,319333 dengan standar deviasi 0,133618. Hasil uji statistik nilai P-Value adalah 0,002. Rata rata regio ankle sebelum intervensi 3,24300 dengan standar deviasi (SD) 0,089192, sedangkan setelah intervensi ROM adalah 3,51383 dengan standar deviasi (SD) 0,176079. Rata-rata pengaruh kekuatan otot pada lansia di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar antara sebelum dan sesudah intervensi ROM adalah - 0,270833 dengan standar deviasi 0,131038. Hasil uji statistik nilai P-Value adalah 0,004. Rata rata regio toe sebelum intervensi 3,31950 dengan standar deviasi (SD) 0,133389, sedangkan setelah intervensi ROM adalah 3,86800 dengan standar deviasi (SD) 0,124898. Rata-rata pengaruh kekuatan otot pada lansia di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar antara sebelum dan sesudah intervensi ROM adalah -0,548500 dengan standar deviasi 0,084998. Hasil uji statistik nilai P-Value adalah 0,000. Hasil uji

statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh latihan *Range Of Motion* (ROM) aktif terhadap peningkatan kekuatan otot ekstremitas bawah pada lansia di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar Tahun 2018.

#### PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh range of motion (ROM) aktif terhadap peningkatan kekuatan otot ekstremitas bawah lansia . Penelitian dilakukan sebanyak 6 kali latihan selama 3 minggu dengan frekuensi untuk 1 kali latihan adalah 2 kali dalam sehari yaitu selama 10 menit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan rata rata kekuatan otot pada lansia antara sebelum dan sesudah intervensi ROM adalah rata rata sebelum intervensi regio hip 3,03317 dengan standar deviasi (SD) 0,085080, sedangkan setelah intervensi ROM adalah 3,22117 dengan standar deviasi (SD) 0.194376. Rata-rata pengaruh kekuatan otot pada lansia di Pantijompo antara sebelum dan sesudah intervensi ROM adalah -0,188 dengan standar deviasi 0,150439. Hasil uji statistik nilai P-Value adalah 0,028. Rata rata regio knee sebelum intervensi 3,44333 dengan standar deviasi (SD) 0,245342, sedangkan setelah intervensi ROM adalah 3,76367 dengan standar deviasi (SD) 0.226246. Rata-rata pengaruh kekuatan otot pada lansia antara sebelum dan sesudah intervensi ROM adalah -0,319333 dengan standar deviasi 0,133618. Hasil uji statistik nilai P-Value adalah 0,002. Rata rata regio ankle sebelum intervensi 3,24300 dengan standar

deviasi (SD) 0,089192, sedangkan setelah intervensi ROM adalah 3,51383 dengan standar deviasi (SD) 0,176079. Rata-rata pengaruh kekuatan otot pada lansia antara sebelum dan sesudah intervensi ROM adalah -

0,270833 dengan standar deviasi 0,131038. Hasil uji statistik nilai P-Value adalah 0,004. Rata rata regio toe sebelum intervensi 3,31950 dengan standar deviasi (SD) 0,133389, sedangkan setelah intervensi ROM adalah 3,86800 dengan standar deviasi (SD)0,124898. Rata-rata pengaruh kekuatan otot pada lansia antara sebelum dan sesudah intervensi ROM adalah -0,548500 dengan standar deviasi 0,084998. Hasil uji statistik nilai P-Value adalah 0,000. Artinya kekuatan otot responden pada lansia setelah dilakukan latihan range of motion meningkat dari sebelumnya.

Secara teori, apabila otot-otot termasuk otot ekstremitas bawah tidak dilatih terutama pada klien yang mengalami gangguan fungsi motorik kasar dalam jangka waktu tertentu maka otot akan kehilangan fungsi motoriknya secara permanen. Hal ini terjadi karena otot cenderung dalam keadaan immobilisasi. Keterbatasan immobilisasi mempengaruhi otot klien melalui kehilangan daya tahan, penurunan masa otot, atrofi dan penurunan stabilitas. Pengaruh lain dari keterbatasan mobilisasi adalah gangguan metabolisme kalsium dan gangguan mobilisasi sendi. Immobilisasi dapat mempengaruhi fungsi otot dan skeletal. Akibat pemecahan protein pada otot, klien mengalami kehilangan masa tubuh yang membentuk sebagian otot (Potter & Perry, 2006).

Oleh karena itu penurunan masa otot tidak mampu mempertahankan aktifitas tanpa peningkatan kelelahan. Masa otot menurun akibat metabolisme dan otot yang tidak digunakan. Jika immobilisasi berlanjut dan otot tidak dilatih maka akan terjadi penurunan masa yang berkelanjutan (Potter & Perry, 2006). Penurunan mobilisasi dan gerakan mengakibatkan kerusakan muskuloskeletal

yang besar dengan perubahan patofisiologi utamanya adalah atrofi. Atrofi adalah suatu keadaan sebagai respons terhadap penyakit dan penurunan aktifitas sehari-hari seperti pada immobilisasi dan tirah baring (Kasper et al, 1993 dalam Potter & Perry, 2006). Penurunan stabilitas terjadi akibat kehilangan daya tahan, penurunan masa otot, atrofi dan kelainan sendi yang actual sehingga klien tidak mampu bergerak terus-menerus dan beresiko untuk jatuh.

Pada penelitian Widya Yuwetri (2016) mengenai Pengaruh Latihan ROM Aktif-asistif (Spherical Grip) Terhadap Kekuatan Otot Ekstremitas Atas Pasien Stroke Non Hemoragik di Ruang Neurologi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016 didapatkan hasil bahwa ada perbedaan rata-rata kekuatan otot sebelum dan sesudah dilakukan latihan ROM, dengan nilai  $p = 0,029$ . Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hasyim (2013) yang mengatakan bahwa latihan ROM yang dilakukan sedini mungkin dan dilakukan dengan benar dan secara terus-menerus akan memberikan dampak pada fleksibilitas sendi, kekuatan otot dan kemampuan fungsional pasien.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safa'ah (2010) dengan judul pengaruh latihan range of motion terhadap peningkatan kekuatan otot lanjut usia di UPT pelayanan sosial lanjut usia (Pasuruan) Kec. Babat Kab Lamongan didapatkan peningkatan kekuatan otot yang berarti pada lansia setelah diberikan perlakuan berupa latihan ROM. Pada kelompok eksperimen, sebagian besar (58%) responden terdapat peningkatan kekuatan otot antara pre-test dan post-test, sedangkan hampir setengahnya (26%) responden tidak terdapat penurunan

antara pre-test dan post-test atau dikatakan tetap, sebagian kecil (16%) responden terdapat penurunan antara pre-test dan post test.

#### KESIMPULAN

Penulis menganalisa penelitian di atas, bahwa Range Of Motion (ROM) jika dilakukan sedini mungkin dan dilakukan dengan benar dan secara terus-menerus akan memberikan dampak pada kekuatan otot. Latihan ROM rata-rata dapat meningkatkan kekuatan otot serta pengaruh dari kekuatan otot. Pemberian metode range of motion aktif ini bertujuan untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot serta sendi dengan cara menggunakan otot ototnya secara aktif atau mandiri sehingga menjadi lebih efektif dalam upaya meningkatkan kekuatan otot. Berdasarkan hasil analisa diatas didapatkan adanya pengaruh latihan Range Of Motion (Aktif) Aktif terhadap peningkatan kekuatan otot ekstremitas bawah pada lansia di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astrid et al. 2011. "Pengaruh Latihan Range Of Motion (ROM) Terhadap Kekuatan Otot, Luas Gerak Sendi, Dan Kemampuan Fungsional Pasien Stroke di RS Sint Carolus Jakarta". *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan*. Vol. 1, No. 4, Juni 2011 : 175-182.
- Chaidir & Zuardi. 2014. "Pengaruh Latihan Range Of Motion Pada Ekstremitas Atas Dengan Bola Karet Terhadap Kekuatan Otot Pasien Stroke Non Hemoragi Di Ruang Rawat Stroke RSSN Bukittinggi Tahun 2012". *Afiah* Vol 1 No 1 Januari 2014.
- Depkes, RI. 2015. *Demografi Populasi Penduduk Lanjut Usia di Dunia dan Indonesia*. Jakarta.
- Dewi. 2014. *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Yogyakarta : Deepublish.
- Imron et al. 2015. "Pengaruh Latihan ROM Aktif Terhadap Keaktifan Fisik Pada Lansia di Dusun Karang Templek Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember". *Jurnal Edu Health*. Vol. 5, No. 1, April 2015.
- Kozier, et al. 2004. *Fundamental of Nursing : Concepts, Process, and Practice* (7th Ed.). Jakarta : EGC.
- Kurnia. 2017. "Pengaruh Pemberian Terapi Latihan dengan Metode Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Untuk Meningkatkan Kekuatan Otot Ekstremitas Bawah Pada Pasien Stroke Non Hemoragik di RSSN Bukittinggi Tahun 2017". (skripsi). Bukittinggi : Program Studi Ilmu Keperawatan, Stikes Fort De Kock Bukittinggi.
- Lukman & Ningsih. 2011. *Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal*. Jakarta : Salemba Medika.
- Maimurahman, et al. 2012. "Keefektifan Range Of Motion (ROM) Terhadap Kekuatan Otot Ekstremitas Pada Pasien Stroke". *Jurnal Ilmu Keperawatan*.
- Mudrikah. 2012. "Pengaruh Latihan Range Of Motion Aktif Terhadap Peningkatan Rentang Gerak Sendi Dan Kekuatan Otot Kaki Pada Lanjut Usia Di Panti Werda Dharma Bakti Surakarta". *Jurnal Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Muttaqin. 2011. *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem Persarafan*. Jakarta : Salemba Medika.

- Nugroho. 2008. Keperawatan Gerontik dan Greiatrik. Edisi 2. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Olviani, et al. 2017. "Pengaruh Latihan Range Of Motion (ROM) Aktif – Asistif (Spherical Grip) Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Ekstremitas Atas Pada Pasien Stroke Di Ruang Rawat Inap Penyakit Syaraf (Seruni) RSUD Ulin Banjarmasin". *Dinamika Kesehatan* Vol 8 No 1 Juli 2017.
- Potter & Perry. 2005. Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses, dan Praktik. Edisi 4. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Pudjastuti & Utomo. 2003. Fisioterapi Pada Lansia. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Rhestifujiyanti et al. 2015. "Comparison of Muscle Strength in Stroke Patients Between The Given And Not Given Range Of Motion Exercise". *Nurse Media Journal of Nursing*. Vol. 5, No. 2, 2015.
- Safaah et al. 2017. "Effectiveness Of Isometric And Range Of Motion (ROM) Exercise Toward Elderly Muscle Strenght In Pasuruan Integrated Service Unit, Elderly Social Service In Lamongan. *Journal Biomedical Engineering*. Vol. 3, No. 1, 2017.
- Sahmad et al. 2016. "Pengaruh Pemberian Range Of Motion (ROM) Pasif Terhadap Peningkatan Fleksibilitas Sendi Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari". *Jurnal Kesehatan Manarang*. Vol. 2, No. 2, Desember 2016: 2528-5602. (21 Oktober 2017).
- Stanley & Beare. 2007. Buku Ajar Keperawatan Gerontik. Edisi 2. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sukmaningrum. 2012. "Efektivitas Range Of Motion (ROM) Aktif – Asistif : Spherical Grip Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Ekstremitas Atas Pada Pasien Stroke Di RSUD Tugurejo Semarang". *Jurnal Keperawatan* 2012.
- Tamher & Noorkasiani. 2009. Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika.
- Tseng et al. 2007. "Effect Of A Range Of Motion Exercis Programme". *Journal of Advanced Nursing* 57(2), 181-191.
- Uda et al. 2016. "Latihan Range Of Motion Berpengaruh Terhadap Mobilitas Fisik pada Lansia di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Unit Abiyoso Yogyakarta". *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*. Vol. 4, No. 3, Tahun 2016 : 169-177
- Wahyuningsih et al. "Pengaruh Range Of Motion Aktif (Clyndrical Grip) Terhadap Kekuatan Otot Ekstremitas Atas Pada Pasien Stroke Non Hemoragik". *Jurnal Ilmu Keperawatan*.
- Yuwitri. 2016. "Pengaruh Latihan ROM Aktif-Asistif (Spherical Grip) Terhadap Kekuatan Otot Ekstremitas Atas Pasien Stroke Non Hemoragik di Ruang Neurologi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016". (Skripsi) . Bukittinggi : Program Ilmu Keperawatan, Stikes Fort De Kock Bukittinggi.



### C. Daftar Riwayat Hidup



**NAMA : YULIADI YUSUF**

Lahir di Gorontalo 27 Juli 1998, penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Ardin Yusuf dan ibu Asia Dukalang. Penulis akrab dipanggil Aldi. Penulis mengawali pendidikan di taman kanak-kanak (TK) MELATI Dungaliyo pada tahun 2002 ditempuh dalam waktu 1 tahun (tidak selesai), dan melanjutkan sekolah dasar di SDN 1 Pilolalenga pada tahun 2004 dengan menempuh pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun, kemudian penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di MTs Pondok Pesantren Al-Falah Limboto Barat pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Al Falah. Kemudian mendapatkan beasiswa full dari Kementerian Agama RI Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Negeri dengan mengambil konsentrasi Ilmu Keperawatan S-1 di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016. Lalu penulis melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang profesi pada tahun 2020 di UIN Alauddin Makassar. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT, serta kedua orang tua dan keluarga yang terus mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga ke tahap profesi dan menyusun karya tulis ilmiah yang berjudul “Pengaruh latihan range of motion (rom) aktif dan pasif pada lansia yang mengalami sindrom geriatric immobility dengan masalah gangguan mobilitas fisik” semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya

## D. Hasil Uji Turnitin

KTI Yuliadi Yusuf Revisi Plagiasi

### ORIGINALITY REPORT

<b>24%</b> SIMILARITY INDEX	<b>24%</b> INTERNET SOURCES	<b>3%</b> PUBLICATIONS	<b>10%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>pt.scribd.com</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>repository.um-surabaya.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>edoc.pub</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>zdocs.tips</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>budirahayu.ip-dynamic.com:81</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>eprints.umm.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>id.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>es.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>

10	<a href="https://dspace.umkt.ac.id">dspace.umkt.ac.id</a> Internet Source	1%
11	Adriani Adriani, Nurfatma Sary. "Pengaruh Latihan Range of Motion (ROM) Aktif Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Ekstremitas Bawah Lansia", Real in Nursing Journal, 2019 Publication	1%
12	<a href="https://repository.poltekkes-tjk.ac.id">repository.poltekkes-tjk.ac.id</a> Internet Source	1%
13	Submitted to Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Student Paper	1%
14	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
15	<a href="https://mediaperawat.id">mediaperawat.id</a> Internet Source	1%
16	<a href="https://aguzhnong.blogspot.com">aguzhnong.blogspot.com</a> Internet Source	1%
17	<a href="https://repo.stikesperintis.ac.id">repo.stikesperintis.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 1%

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, & Sari, N. (2019). Pengaruh Latihan Range of Motion (ROM) Aktif Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Ekstremitas Bawah Lansia. *REAL in Nursing Journal (RNJ)*, 118-125.
- Aini, N. (2018). *Teori Model Keperawatan : Beserta Aplikasinya Dalam Keperawatan*. Malang: UMM Press.
- Ananda, I. P. (2017). *Pengaruh Range Of Motion (ROM) Terhadap Kekuatan Otot pada Lansia Bedrest di PSTW Budhi Mulia 3 Margaguna Jakarta Selatan*. Jakarta: Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2020, Desember 21). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020*. Retrieved Juli 2021, 12, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/21/0fc023221965624a644c1111/statistik-penduduk-lanjut-usia-2020.html>
- Daulay, N. M., Hidayah, A., & Santoso, H. (2021). Pengaruh Latihan Range Of Motion (ROM) Pasif Terhadap Kekuatan Otot dan Rentang Gerak Sendi Ekstremitas Pada Klien Pasca Stroke. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*, 22-26.
- Debora, O. (2017). *Proses Keperawatan dan Pemeriksaan Fisik Edisi 2*. Jakarta Selatan: Salemba Medika.
- Dini. (2013). *SINDROM GERIATRI (IMOBILITAS, INSTABILITAS, GANGGUAN INTELEKTUAL, INKONTINENSIA, INFEKSI, MALNUTRISI, GANGGUAN PENDENGARAN)*. Lampung: Repository Universitas Lampung.
- Indriani, W. (2019). *GAMBARAN UPAYA KELUARGA DALAM PEMBERIAN TERAPI ROM (RANGE OF MOTION) EXERCISE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN RENTANG GERAK PADA KLIEN STROKE*. Malang: Repositori UMM.
- Irawati, F. D. (2019). *Asuhan Keperawatan Klien Stroke Pada Ny S Dan Tn R dengan Masalah Keperawatan Hambatan Mobilitas Fisik di Ruang Melati RSUD dr Haryoto Lumajang*. Jember: Repository Univ. Jember.
- Kasiati, N., & Roslamawati, W. D. (2016). *Kebutuhan Dasar Manusia I*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Pusat: Kemenag RI.

- NANDA. (2012). *Diagnosa Keperawatan : Definisi dan Klasifikasi 2012-2014*. Jakarta: Buku Kedokteran : ECG.
- Nasrullah, D. (2021). *Buku Ajar Keperawatan Gerontik Edisi I : dengan pendekatan Asuhan Keperawatan NANDA 2015-2017*. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Riset Kesehatan Dasar. (2013, Desember 1). *Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar*. Retrieved Juli 2021, 12, from Penelitian Pengembangan Kementerian Kesehatan: [http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2013/Laporan\\_riskesdas\\_2013\\_final.pdf](http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2013/Laporan_riskesdas_2013_final.pdf)
- Riskesdas, R. (2018). *Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)*. Jakarta: Litbang Kemenkes RI.
- Rusdiatin, I. E. (2020). Efek Latihan Range of Motion(ROM) terhadap Sudut Fleksibilitas Sendi Lansia di Dusun Mojosari Desa Sitimulyo Piyungan Bantul DIY 2019. *Jurnal Kampus STIKes YPIB Majalengka*, 164-171.
- sahmad, Yunus, R., & Sarmawan, A. (2016). Pengaruh pemberian range of motion (ROM) pasif terhadap fleksibilitas sendi pada lansia di panti sosial tresna werda minaula kendari. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 89-94.
- United Nation. (2015, Februari 12). *World Population Ageing*. Retrieved Juli 2021, 7, from Unit Nation: <http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015Highlights.pdf>
- World Health Organization. (2018, Mei 22). *Ageing and health*. Retrieved Juli 2021, 12, from who international: <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/ageing-andhealth>.