

**PENETAPAN KADAR FENOLIK DAN TANIN TOTAL DAN ANALISIS
AKTIVITAS ANTIOKSIDAN PADA JAMUR MERANG (*Volvariella
volvacea* Bull.) DENGAN METODE DPPH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

KHAIRUNNISA
NIM: 70100117005

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairunnisa
NIM : 70100117005
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 16 Agustus 1999
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo, Romangpolong, Gowa
Judul : Penetapan Kadar Fenolik dan Tanin Total dan Analisis Aktivitas Antioksidan pada Jamur Merang (*Volvariella volvacea* Bull.) dengan Metode DPPH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Romangpolong, 1 Oktober 2021

Peneliti,



Khairunnisa

NIM: 70100117005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Penetapan Kadar Fenolik dan Tanin Total dan Analisis Aktivitas Antioksidan pada Jamur Merang (*Volvarella volvacea* Bull.) dengan Metode DPPH" yang disusun oleh Khairunnisa, NIM : 70100117005, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 1 Oktober 2021 yang bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1443 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Romangpolong, 1 Oktober 2021 M
24 Safar 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Sp. A., M. Kes.	
Sekretaris	: Apt. Syamsuri Syakri, S. Farm., M. Si.	
Pembimbing I	: Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M. Si.	
Pembimbing II	: Haeria, S. Si., M. Si.	
Penguji I	: Apt. Muh. Ikhlas Arsul, S. Farm., M. Si.	
Penguji II	: Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, LC., M. A.	

Diketahui oleh:

 Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. Syatirah Sp. A., M. Kes.
NIM: 701007012006042002

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penetapan Kadar Fenolik dan Tanin Total dan Analisis Aktivitas Antioksidan pada Jamur Merang (*Volvariella volvacea* Bull.) dengan Metode DPPH”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat dan salam senantiasa peneliti haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. sebagai Rahmatan Lil’alamin.

Adapun dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti menyadari bahwa ada ribuan halangan dan juga rintangan yang tak segan-segan menghampiri, namun peneliti meyakini bahwa hal itu merupakan secerca kisah yang ikut mewarnai perjalanan menempuh jembatan untuk sampai di seberang jalan yaitu menggapai tujuan dan mewujudkan harapan. Di sisi lain, skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya do’a, motivasi, dukungan dan semangat dari orang-orang baik di sekitar peneliti yang dikirimkan oleh-Nya.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang yang sangat berharga dan berjasa dalam hidup peneliti yakni sosok luar biasa kedua orang tua peneliti Bapak tercinta Hasyim, S. Pd. I. dan Ibu tersayang Anis, yang tak pernah merasa jenuh dalam mendo’akan, memotivasi dan menasehati peneliti dengan tulus. Peneliti sangat menyadari bahwa sampai detik ini tanpa adanya do’a-do’a dari beliau, peneliti tidak akan bisa berada pada tahap penyelesaian skripsi ini. Terima kasih pula peneliti ucapkan kepada saudari-saudari tersayang

Mutmainnah H. dan Najwa Aulia yang senantiasa menjadi penyemangat dan penghibur bagi peneliti. Begitu juga keluarga besar peneliti yang tak dapat disebutkan satu persatu. Teman-teman seperjuangan kuliah yang merupakan manusia-manusia kuat yang hingga kini telah membentuk ikatan kuat pula yang saling membalas kasih sepanjang proses penyelesaian studi ini dan semoga kita senantiasa diberkahi Allah SWT. dan selalu berada dalam lindungan-Nya.

Peneliti juga dengan sepenuh hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M. Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Wahyuddin, M. Hum. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag. selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, M. Kes.,Sp. A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S. Si., M. Si. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

8. Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, S. KM., MARS. Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. Bapak Apt. Andi Asrul Ismail, S. Farm., M. Sc. selaku Ketua Jurusan Farmasi dan Ibu Apt. Syamsuri Syakri, S. Farm., M. Si. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
11. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M. Si. selaku Pembimbing Pertama yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing dan mengarahkan peneliti dengan tulus dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Ibu Haeria, S. Si., M. Si. selaku Pembimbing Kedua yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya memberikan masukan dan mengoreksi peneliti dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Bapak Apt. Muh. Ikhlas Arsul, S. Farm., M. Si. selaku Penguji Kompetensi yang senantiasa memberikan kritikan dan saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi.
14. Ibu Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, LC., M. A. selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan yang baik dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
15. Ibu Apt. Nur Azizah Syahrana, S. Farm., M. Farm. selaku Pelaksana Ujian Akhir yang telah sangat berkontribusi dalam membantu terselenggaranya ujian akhir bagi peneliti.

16. Bapak dan Ibu dosen yang tulus dan ikhlas dalam membagi seluruh ilmunya, semoga Allah SWT. membalas jasa-jasa beliau. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.
17. Kepada Laboran Laboratorium Kimia Organik, Laboratorium Kimia Anorganik dan Laboratorium Kimia Instrumen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang senantiasa mengarahkan peneliti hingga dapat menyelesaikan penelitian.
18. Kepada teman-teman peneliti yang selalu memberikan *support* sehingga peneliti sampai di tahap penyelesaian skripsi.
19. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Farmasi 2017, Kovalen yang selalu menyemangati dan mendukung hingga terselesaikannya penelitian dan skripsi ini. begitu pula teman-teman yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan, dukungan, kerjasama dan do'anya.

Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya di bidang farmasi dan dengan informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT., Aamiin Allahumma Aamiin.

Romangpolong, 1 Oktober 2021

Penyusun



Khairunnisa

NIM : 70100117005

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Kajian pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Teori Umum.....	13
1. Jamur Merang (<i>Volvariella volvacea</i> Bull.).....	13
2. Radikal Bebas.....	16
3. Senyawa Fenolik Total.....	20
4. Senyawa Tanin Total.....	21
5. Antioksidan	22
6. Penetapan Kadar Fenolik dan Tanin Total dengan Reagen Folin-Ciocalteu	25
7. Pengujian Antioksidan dengan Metode DPPH	25
8. Persen Penghambatan Radikal Bebas (% Inhibisi)	27
9. Korelasi Kadar Fenolik dan Tanin Total dengan Aktivitas Antioksidan	27

10. Spektrofotometri UV-Vis.....	27
11. Metode Ekstraksi.....	29
B. Tinjauan Islam Mengenai Pemanfaatan Tumbuh-tumbuhan sebagai Obat.....	30
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Alur Penelitian.....	36
B. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Lokasi Penelitian.....	37
3. Waktu Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian.....	37
D. Instrumen Penelitian.....	37
1. Alat Penelitian.....	37
2. Bahan Penelitian.....	37
E. Populasi dan Sampel Peneliitian.....	38
1. Populasi Penelitian.....	38
2. Sampel Penelitian.....	38
F. Prosedur Kerja.....	38
1. Preparasi Sampel Jamur Merang (<i>Volvariella volvacea</i> Bull.).....	38
2. Ekstraksi Jamur Merang (<i>Volvariella volvacea</i> Bull.).....	39
3. Skrining Fitokimia.....	39
4. Penetapan Kadar Fenolik Total.....	40
5. Penetapan Kadar Tanin Total.....	41
6. Analisis Aktivitas Antioksidan.....	43
G. Analisis Data.....	44
BAB IV.....	45
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Hasil Ekstraksi.....	45
2. Hasil Skrining Fitokimia.....	45
3. Hasil Penetapan Kadar Fenolik Total.....	45

4. Hasil Penetapan Kadar Tanin Total.....	46
5. Hasil Analisis Aktivitas Antioksidan	47
B. Pembahasan.....	47
BAB V.....	54
PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	85



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Jamur Merang (<i>Volvariella volvacea</i> Bull.)	45
Tabel 2. Hasil Skrining Fitokimia Jamur Merang (<i>Volvariella volvacea</i> Bull.)...	45
Tabel 3. Hasil Pengukuran Absorbansi Standar Asam Galat.....	45
Tabel 4. Hasil Penetapan Kadar Fenolik Total Jamur Merang	46
Tabel 5. Hasil Pengukuran Absorbansi Standar Asam Tanat	46
Tabel 6. Hasil Penetapan Kadar Tanin Total Jamur Merang.....	46
Tabel 7. Hasil Perhitungan % Inhibisi Jamur Merang	47
Tabel 8. Hasil Perhitungan % Inhibisi Vitamin C.....	47
Tabel 9. Hasil Pengukuran Absorbansi Blanko DPPH	79
Tabel 10. Hasil Pengukuran Absorbansi Jamur Merang terhadap DPPH.....	79
Tabel 11. Pengukuran Absorbansi Vitamin C terhadap radikal DPPH	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jamur Merang (<i>Volvariella volvacea</i> Bull.).....	15
Gambar 2. Gugus Fenol.....	20
Gambar 3. Struktur Tanin.....	22
Gambar 4. Ilustrasi Antioksidan (A°) dalam Menarik Radikal Bebas (R°).....	23
Gambar 5. Mekanisme Aktivitas Penangkal Radikal Asam Askorbat.....	24
Gambar 6. Reaksi Senyawa Fenolik dengan Reagen Folin-Ciocalteu.....	25
Gambar 7. Reaksi DPPH dengan Senyawa Antioksidan	27
Gambar 8. Skema Kerja Spektrofotometri UV-Vis	29
Gambar 9. Kurva Standar Asam Galat.....	77
Gambar 10. Kurva Standar Asam Tanat	78
Gambar 11. Sampel Jamur Merang (<i>Volvariella volvacea</i> Bull.).....	81
Gambar 12. Ekstrak Jamur Merang (<i>Volvariella volvacea</i> Bull.).....	81
Gambar 13. Pengayakan Sebuk Simplisia dengan Ayakan Mesh 40.....	81
Gambar 14. Ekstraksi Sampel dengan Metode Maserasi	82
Gambar 15. Hasil Skrining Fitokimia	82
Gambar 16. Hasil Penetapan Kadar Fenolik Total.....	83
Gambar 17. Hasil Penetapan Kadar Tanin Total.....	83
Gambar 18. Hasil Analisis Aktivitas Antioksidan pada Ekstrak.....	83
Gambar 19. Perbandingan Vitamin C	84
Gambar 20. Proses Analisis Sampel Uji dengan Spektrofotometer UV-Vis ...	84

ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja	61
Lampiran 2. Pembuatan Larutan dan Pereaksi.....	72
Lampiran 3. Perhitungan Rendamen Ekstrak.....	76
Lampiran 4. Perhitungan Kadar Fenolik Total	77
Lampiran 5. Perhitungan Kadar Tanin Total	78
Lampiran 6. Perhitungan % Inhibisi Ekstrak	79
Lampiran 7. Perhitungan % Inhibisi Vitamin C.....	80
Lampiran 8. Gambar Penelitian	81



ABSTRAK

Nama : KHAIRUNNISA
NIM : 70100117005
Jurusan : FARMASI
Judul Skripsi : PENETAPAN KADAR FENOLIK DAN TANIN TOTAL DAN ANALISIS AKTIVITAS ANTIOKSIDAN PADA JAMUR MERANG (*Volvariella volvacea* Bull.) DENGAN METODE DPPH

Penelitian ini berjudul “Penetapan Kadar Fenolik dan Tanin Total Dan Analisis Aktivitas Antioksidan pada Jamur Merang (*Volvariella Volvacea* Bull.) dengan Metode DPPH” merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan kadar fenolik total, tanin total dan menganalisis aktivitas antioksidan berdasarkan persen penghambatannya terhadap radikal DPPH.

Untuk menetapkan kadar fenolik total dan tanin total digunakan metode spektrofotometri UV-Vis menggunakan *Folin-Ciocalteu* dengan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 765 nm dan 760 nm. Adapun untuk menganalisis aktivitas antioksidan digunakan metode peredaman DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl) kemudian dilakukan pengukuran absorbansi dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 517 nm.

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa jamur merang memiliki kadar fenolik dan tanin total berturut-turut 3,168 mg GAE/g ekstrak dan 0,20066 mg TAE/g ekstrak. Adapun aktivitas antioksidan dengan persen inhibisi terhadap DPPH dengan seri konsentrasi 10 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, dan 200 ppm berturut-turut adalah 0,79%, 7,43%, 19,99%, 23,78%, dan 35,30%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jamur merang memiliki senyawa fenolik dan tanin serta dapat berpotensi sebagai antioksidan.

Dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat menjadi informasi kepada masyarakat luas terkait khasiat jamur merang bagi kesehatan sehingga dapat menjadi salah satu pengembangan pangan fungsional yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai asupan antioksidan alami.

Kata Kunci : *Volvariella volvacea* Bull., fenolik total, tanin total, dpph, persen inhibisi

ABSTRACT

Name : KHAIRUNNISA
NIM : 70100117005
Department : PHARMACY
Title : DETERMINATION OF TOTAL PHENOLIC AND TANIN CONTENTS AND ANALYSIS OF ANTIOXIDANT ACTIVITY IN PADDY STRAW MUSHROOM (*Volvariella volvacea* Bull.) USING DPPH METHOD

This study entitled "Determining Total Phenolic and Tannin Contents and Analysis of Antioxidant Activity in Paddy Straw Mushroom (*Volvariella Volvacea* Bull.) with the DPPH Method" is a study conducted with the aim of determining total phenolic contents, total tannins contents and analyzing antioxidant activity based on the percent inhibition against free radicals DPPH.

Determine the total phenolic and total tannin contents used the spectrophotometric UV-Vis method with *Folin-Ciocalteu* was used by measuring absorbance at wavelengths of 765 nm and 760 nm. As for analyzing the antioxidant activity, DPPH (1.1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) attenuation method was used and then measured the absorbance with a spectrophotometer UV-Vis at wavelength of 517 nm.

The results of the study was found that the paddy straw mushroom had total phenolic and total tannin contents of 3.168 mg GAE/g extract and 0.20066 mg TAE/g extract. The antioxidant activity with the percentage of inhibition against DPPH with a series of concentrations of 10 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, and 200 ppm respectively were 0.79%, 7.43%, 19.99%, 23.78%, and 35.30%. So that it is stated that the paddy straw mushroom has phenolic compounds and tannin compounds and can be potential as an antioxidant.

With this research, it can be information to the wider community regarding the efficacy of paddy straw mushroom for health so that it can be the developments of functional food that can be used in daily life as a natural antioxidant intake.

Keywords : *Volvariella volvacea* Bull., total phenolic, total tannin, dpph, percent inhibition

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

WHO menyatakan bahwa hingga penghujung tahun 2014 penyakit degeneratif telah menjadi penyebab kematian hampir pada 15 juta orang di seluruh penjuru dunia dan terus meningkat hingga saat ini. Peningkatan prevalensi penderita penyakit degeneratif salah satunya menyangkut dengan perubahan pola hidup masyarakat yang tidak sehat. Penyakit degeneratif akibat kemunduran fungsi sel mengakibatkan menurunnya produksi hormon maupun enzim, sel imun, peroksida lipid, terjadinya kerusakan DNA bahkan pembuluh darah. Di antara 50 penyakit degeneratif, yang paling sering dijumpai antara lain penyakit kanker, gula darah yang tinggi, kardiovaskular, stroke, dislipidemia, jantung koroner dan lain-lain (Hamdin, 2019: 2). Di Asia Tenggara, penyakit degeneratif menduduki urutan pertama penyebab kematian. WHO telah menyatakan bahwa pada angka kematian di negara-negara Asia Tenggara di tahun 2008 mencapai 14,5 juta, dan diantaranya kurang lebih 7,9 juta disebabkan karena penyakit degeneratif. Pada tahun 2018, angka kematian akibat penyakit ini diprediksi akan meningkat sekitar 21% (Tristantini et al., 2016: 1).

Penyakit degeneratif telah mendunia dan sangat berpotensi menjadi penyebab kematian. Penyakit degeneratif adalah suatu gangguan akibat menurunnya fungsi jaringan bahkan organ yang terdapat dalam tubuh dan sering kali mengiringi proses penuaan. Meskipun penyakit ini dialami oleh mayoritas masyarakat dengan usia lansia dengan penurunan fungsi tubuh secara signifikan, namun dapat juga dialami oleh usia muda akibat menurunnya derajat kesehatan (Hamdin, 2019: 2).

Penyakit degeneratif dikaitkan dengan adanya akumulasi radikal bebas yang terdapat dalam tubuh. Nyatanya, radikal bebas dapat menimbulkan ancaman serius bagi sel, jaringan dan organ vital terutama membran lipid, asam nukleat maupun protein. Reaksi radikal bebas terhadap biomolekul dapat mengakibatkan peroksidasi lipid, hilangnya aktivitas enzim, mutasi dan karsinogenis. Kelebihan akumulasi radikal bebas menyebabkan stress oksidatif yang terlibat dalam penuaan dan sejumlah penyakit. Oleh karena itu, sejumlah penyakit degeneratif seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, dan gangguan hati sangat berkaitan dengan adanya penimbunan radikal bebas dalam tubuh (Kumar & Pandey, 2015: 438). Adapun radikal bebas di dalam tubuh yang lambat laun akan mengakibatkan kerusakan pada sel antara lain radikal turunan oksigen yang bersifat reaktif yaitu ROS (*reactive oxygen species*) dan radikal turunan nitrogen reaktif yaitu RNS (*reactive nitrogen species*) (Dhaliwal & Singh, 2015: 1).

Radikal bebas terdiri dari suatu molekul tidak stabil dan bersifat reaktif menyerang molekul-molekul alami yang terdapat dalam tubuh. Radikal bebas bersumber dari faktor endogen dan juga eksogen. Adapun sumber radikal bebas eksogen diperoleh dari asap rokok, polusi udara, air, pestisida dan herbisida, paparan sinar matahari, alkohol, logam berat, obat kemoterapi tertentu, makanan, minuman, dan radiasi sinar gamma. Namun sumber terbesar radikal bebas adalah tubuh kita. Pembentukannya terjadi terus menerus di dalam sel yang merupakan akibat dari reaksi enzimatik dan nonenzimatik (Santo & Zhu, 2016: 246-247).

Secara biologis, radikal bebas terbentuk dan menghasilkan efek buruk di dalam tubuh. Senyawa yang mampu mencegah dampak negatif dan menetralkan radikal bebas adalah antioksidan. Tidak hanya itu, perlu diterapkan gaya hidup yang sehat khususnya untuk mencegah kerusakan oksidatif akibat radikal bebas (Dhaliwal & Singh, 2015: 3).

Antioksidan ialah suatu senyawa antioksidatif yang dapat menyumbangkan elektronnya kepada molekul radikal bebas untuk mencegah adanya kerusakan sel karena molekulnya menjadi stabil (Zulaikhah, 2017: 39).

Antioksidan dapat bersumber dari tumbuhan yang memiliki senyawa bioaktif seperti fenolik atau tanin (Saefudin et al., 2013: 104). Adapun senyawa fenolik adalah senyawa yang mempunyai aktivitas antioksidan yang merupakan golongan fitokimia terbesar pada tumbuhan. Kemampuannya dalam meredam oksigen reaktif karena pada cincin aromatik terdapat gugus hidroksi yang memiliki peran sebagai donor elektron (Indra et al., 2019: 209). Begitu pula senyawa tanin yang merupakan senyawa fitokimia yang tersusun dari senyawa polifenol yang berkhasiat sebagai antioksidan dengan kemampuan mengkhelat ion besi dan memperlambat reaksi oksidasi (Fithriani et al., 2015: 104).

Senyawa metabolit sekunder seperti fenolik dan tanin dapat memberikan efek secara biologis yaitu sebagai antioksidan. Senyawa ini dapat menangkal radikal bebas. Peningkatan kadar senyawa fenolik dan tanin ini mempengaruhi aktivitas antioksidan dari suatu sampel karena semakin mudah diserap oleh tubuh. Sehingga, semakin tinggi kandungannya maka semakin tinggi aktivitas antioksidannya. Senyawa-senyawa ini dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan (Wijayanti, 2018: 7).

Organisasi Kesehatan Dunia atau dikenal dengan WHO telah mengestimasi bahwa kurang lebih 80% penduduk di seluruh dunia telah menggunakan pengobatan herbal yang bersumber dari berbagai macam tumbuhan untuk menjaga kesehatan. Hingga saat ini eksplorasi bahan alam beserta potensinya sebagai obat herbal marak dilakukan. Sudah banyak orang yang mempercayai bahwa produk alami jauh lebih baik dan aman bagi tubuh (Fithriani et al., 2015: 101).

Dalam perspektif Islam, dalil-dalil Allah SWT. telah menerangkan bahwasanya Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam dengan berbagai manfaatnya. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwasanya segala hal yang diciptakan Allah SWT. tidaklah dengan sia-sia dan hal itu merupakan tanda-tanda kebesaran-Nya, salah satunya yaitu Allah SWT. menciptakan begitu banyak tumbuhan yang baik dan juga bermanfaat misalnya jamur. Hal tersebut telah diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Setelah dikaji maka dapat dinyatakan bahwa jamur dapat digunakan sebagai pengobatan. Tanda-tanda kebesaran-Nya terlihat dari ciptaan-Nya yaitu jamur beserta kandungan dan manfaatnya bagi kesehatan, misalnya jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.). Karena pada hakikatnya, firman-firman Allah SWT. telah memberikan petunjuk bagi hamba-Nya yang tidak pernah berhenti bersyukur dan ingin mengkaji lebih dalam tentang keberadaan ciptaan Allah SWT..

Jamur merang (*volvariella volvacea* Bull.) atau jamur jerami padi berasal dari China. Pada tahun 1932-1935, di negara-negara Asia Tenggara mulai diperkenalkan jamur merang dan hingga saat ini dibudidayakan di Indonesia (Rahmawati, 2015: 17). Jamur merang adalah pangan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, jamur merang bernilai gizi yang tinggi dan berkhasiat sebagai obat-obatan sehingga memiliki nilai manfaat bagi masyarakat salah satunya sebagai antioksidan (Sinaga, 2011: 5-17).

Metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) ialah metode peredaman yang umum digunakan dalam menganalisis aktivitas antioksidan pada suatu tanaman. Aktivitas antioksidan diteliti dengan cara menghitung adanya penurunan intensitas cahaya ungu yang terjadi pada DPPH dan berbanding dengan pengurangan pada konsentrasi DPPH. Selain itu, aktivitas antioksidan dapat

dilihat dari persentase penghambatan radikal bebas (% inhibisi) (Indra et al., 2019: 210).

Berdasarkan adanya uraian tersebut, maka akan dilakukan penelitian ini untuk menetapkan kadar fenolik dan tanin total dan menganalisis aktivitas antioksidan pada jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) dengan metode DPPH. Melalui penelitian ini, diharapkan kedepannya dapat dibuktikan bahwa adanya senyawa fenolik dan tanin mempengaruhi aktivitas antioksidan dan diharapkan kedepannya dapat menjadi informasi bagi masyarakat luas terkait khasiat jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) bagi kesehatan sehingga dapat menjadi salah satu pengembangan pangan fungsional yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai asupan antioksidan alami.

B. Rumusan Masalah

1. Berapakah kadar fenolik total pada ekstrak metanol jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.)?
2. Berapakah kadar tanin total pada ekstrak metanol jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.)?
3. Apakah ekstrak metanol jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) memiliki aktivitas antioksidan?
4. Berapakah persen inhibisi ekstrak metanol jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) terhadap DPPH?
5. Bagaimana hubungan antara adanya senyawa fenolik dan tanin dengan aktivitas antioksidan ekstrak metanol jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.)?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a) Jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) dikenal juga dengan jamur jerami padi yang diperoleh dari Budidaya Jamur Merang Wbr_Westborneo di Pontianak, Kalimantan Barat. Jamur ini memiliki nutrisi yang baik, merupakan hasil akhir kerjasama antara faktor biotik (bibit jamur, gangguan hama dan lain-lain) dan abiotik (media bibit, media produksi, cuaca dan lain-lain) (Lestari, 2020: 57).
- b) Fenolik adalah senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan yang merupakan golongan fitokimia terbesar pada tumbuhan yang memiliki kemampuan dalam meredam oksigen reaktif karena pada cincin aromatik terdapat gugus hidroksi yang memiliki peran sebagai donor elektron (Indra et al., 2019: 209).
- c) Tanin adalah senyawa fitokimia yang tersusun dari senyawa polifenol yang dapat berpotensi sebagai antioksidan yang bekerja dengan mengkhelat ion besi dan memperlambat oksidasi (Fithriani et al., 2015: 104).
- d) Antioksidan adalah suatu senyawa yang berpotensi meredam efek negatif radikal bebas dengan mendonorkan satu elektronnya terhadap senyawa dengan sifat oksidan sehingga dapat dihambat aktivitasnya (Zulaikhah, 2017: 39).
- e) 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) adalah suatu senyawa radikal bebas bersifat stabil sehingga dapat cocok digunakan sebagai pereaksi pada pengujian peredaman radikal bebas atau aktivitas antioksidan (Tristantini et al., 2016: 1).
- f) Metode DPPH adalah suatu metode analisis aktivitas antioksidan pada bahan alam atau ekstrak yang terdapat pada tanaman dengan metode peredaman DPPH. Peredaman DPPH disebabkan karena adanya reaksi

molekul DPPH (difenil pikril hidrazil) dengan elektron berupa atom hidrogen dari senyawa pada sampel kemudian membentuk DPPH-H (difenil pikril hidrazin) kemudian terjadi perubahan warna DPPH dari ungu menjadi kuning (Indra et al., 2019: 210).

- g) Persen penghambatan (% Inhibisi) adalah suatu parameter yang dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi atau kekuatan dari aktivitas antioksidan dalam meredam radikal bebas (Mulyani et al., 2018: 115).

2. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi penetapan kadar fenolik dan tanin total dengan reagen *folin-ciocalteu* dan analisis aktivitas antioksidan pada jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) dengan metode DPPH.

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka menguraikan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menelusuri originalitas, kejelasan arah dan kemanfaatan dari penelitian yang dilakukan kemudian dibandingkan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian (Eguchi, 2015) dengan judul *Nutrient Composition and Functional Activity of Different Stages in the Fruiting Body Development of Philippine Paddy Straw Mushroom, Volvariella volvacea* (Bull. Fr.) Sing., menyatakan bahwa komposisi nutrisi dan bioaktivitas *V. volvacea* bervariasi dalam berbagai tahap pertumbuhan tubuh buah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *V. volvacea* mengandung senyawa bioaktif dengan beberapa aktivitas fungsional seperti antikoagulasi, antiinflamasi dan antihipertensi. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menentukan kadar fenolik dan tanin total dan

menganalisis aktivitas antioksidan pada jamur merang menggunakan metode DPPH. Penelitian pada jurnal ini mengkaji tentang komponen bioaktif dan manfaat dari sampel jamur merang bagi kesehatan sedangkan pada penelitian yang dilakukan akan menetapkan kadar fenolik dan tanin total serta menganalisis aktivitas antioksidan pada jamur merang. Penelitian yang dilakukan merujuk pada aktivitas fungsional jamur merang bagi kesehatan sehingga akan dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan kadar fenolik dan tanin total serta menganalisis aktivitas antioksidan jamur merang.

2. Berdasarkan penelitian (Dulay et al., 2016) dengan judul *Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Volvariella volvacea and Schizophyllum commune Mycelia Cultured in Indigenous Liquid Media*, menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas antioksidan dan kadar fenolik total dari jamur merang (*Volvariella volvacea*) dan *Schizophyllum commune* yang dikultur dalam media cair murni. Digunakan metode DPPH pada penelitian ini untuk menganalisis aktivitas antioksidan serta dilakukan penetapan kadar fenolik total. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kultur *V. volvacea* dan *S. commune* diperoleh aktivitas antioksidan sebesar 21,19% dan 19,45%. Total kandungan fenolik yang ditemukan adalah 23,19 mg sampel AAE/g dan 20,52 mg sampel AAE/g. Kesimpulan dari penelitian ini ialah jamur berupa pangan yang dapat dikonsumsi ini berpotensi sebagai antioksidan alami yang dipengaruhi oleh media cair. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menentukan kadar fenolik dan tanin total dan menganalisis aktivitas antioksidan pada jamur merang menggunakan metode peredaman terhadap DPPH. Adapun perbedaan penelitian pada

jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan adalah dari segi sampel. Penelitian pada jurnal ini menggunakan sampel jamur merang yang ditumbuhkan dengan media air sedangkan pada penelitian yang dilakukan menggunakan sampel jamur merang yang ditumbuhkan dengan media jerami padi. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan merujuk pada sampel jamur merang yang telah diteliti sebelumnya dengan media tumbuh yang berbeda kemudian akan ditentukan kadar fenolik dan tanin total serta aktivitas antioksidan pada sampel.

3. Berdasarkan penelitian (Wirasti, 2019) dengan judul Penetapan Kadar Fenolik Total, Flavonoid Total dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Benalu Petai (*Scurrula atropurpurea* Dans.) Beserta Penapisan Fitokimia, menyatakan bahwa kadar fenolik total yang ditentukan dengan reagen *Folin Ciocalteau* dan aktivitas antioksidan dianalisis dengan peredaman radikal DPPH. Adapun hasil penelitian ini menyatakan aktivitas antioksidan ekstrak dari daun *Scurrula atropurpurea* dinyatakan dengan nilai IC_{50} sebesar $23,48 \pm 0,04$ $\mu\text{g/ml}$. Adapun hal yang menunjang adanya aktivitas antioksidan ini adalah fenolik dan tanin total berturut-turut $198,08 \pm 1,44$ mg GAE/g ekstrak dan $148,05 \pm 4,44$ mg GAE/g ekstrak. Disimpulkan bahwa adanya kadar total fenolik maupun flavonoid mempengaruhi aktivitas antioksidan. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menentukan kadar fenolik dan tanin total dan menganalisis aktivitas antioksidan pada jamur merang menggunakan metode DPPH. Penelitian pada jurnal ini memiliki perbedaan sampel dengan penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan merujuk pada metode kerja skrining fitokimia sebagai uji pendahuluan dan penetapan kadar fenolik total pada jamur merang.

4. Berdasarkan penelitian (Malanggi et al., 2012) dengan judul Penentuan Kandungan Tanin dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Biji Buah Alpukat (*Persea americana* Mill.), menyatakan bahwa penentuan kadar total tanin menggunakan reagen *Folin* dan aktivitas antioksidan dilakukan menggunakan metode peredaman terhadap DPPH. Dari penelitian ini diperoleh bahwa kandungan total tanin biji alpukat biasa kering sebesar 117 mg/kg, biji alpukat mentega kering sebesar 112 mg/kg, biji alpukat segar sebesar 41,3335 mg/kg, dan biji alpukat mentega segar sebesar 41 mg/kg sehingga aktivitas antioksidan yang paling tinggi pada ekstrak biji alpukat biasa kering sebesar 93,045%. Disimpulkan bahwa penentuan kadar tanin total berbanding lurus dengan aktivitas antioksidan. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menentukan kadar fenolik dan tanin total dan menganalisis adanya aktivitas antioksidan pada jamur merang menggunakan metode penangkal DPPH. Adapun penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan memiliki sampel yang berbeda. Adapun penelitian yang dilakukan merujuk pada metode kerja penetapan kadar tanin total pada jamur merang.
5. Berdasarkan penelitian (Handayani et al., 2014) dengan judul Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Bunga dan Daun Patikala (*Etilingera elatior* (Jack) R.M.Sm) Menggunakan Metode DPPH, menyatakan bahwa uji aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH. Pada penelitian ini diperoleh hasil bunga patikala berpotensi sebagai antioksidan kategori lemah dengan nilai IC50 sebesar 101,84 µg/mL dan sampel daun patikala tergolong antioksidan kuat dengan nilai IC50 sebesar 30,65 µg/mL. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode penghambatan DPPH maka dapat diperoleh

aktivitas antioksidan pada sampel. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menentukan kadar fenolik dan tanin total dan menganalisis aktivitas antioksidan pada jamur merang menggunakan metode penangkal DPPH. Penelitian pada jurnal ini memiliki perbedaan sampel dengan penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan merujuk pada metode kerja analisis aktivitas antioksidan pada jamur merang.

6. Berdasarkan penelitian (Mulyani et al., 2018). dengan judul Formulasi dan Aktivitas Antioksidan Lotion Ekstrak Daun Suruhan (*Peperomia pellucida* L.), menyatakan bahwa analisis aktivitas antioksidan dengan metode peredaman terhadap radikal DPPH dengan menentukan aktivitas antioksidan berdasarkan % inhibisi. Hasil penelitian ini menunjukkan pada sampel lotion ekstrak daun suruhan yang memiliki konsentrasi sebesar 0,550 mg/ml memiliki aktivitas antioksidan dengan % inhibisi sebesar 93,29%. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menentukan kadar fenolik dan tanin total dan menganalisis aktivitas antioksidan pada jamur merang menggunakan metode penangkal DPPH. Penelitian pada jurnal ini memiliki perbedaan sampel dengan penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan merujuk pada landasan teori tentang parameter untuk menganalisis aktivitas antioksidan berdasarkan persen inhibisi terhadap radikal DPPH.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menentukan kadar fenolik total pada ekstrak metanol jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.).
2. Untuk menentukan kadar tanin total pada ekstrak metanol jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.).

3. Untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak metanol jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.).
4. Untuk mengetahui persen inhibisi ekstrak metanol jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) terhadap DPPH.
5. Untuk mengetahui hubungan antara adanya senyawa fenolik dan tanin dengan aktivitas antioksidan ekstrak metanol jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.).

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah dapat menjadi sumber informasi secara ilmiah, wawasan dan juga ilustrasi teradap peneliti dan khayalak masyarakat luas terkait khasiat jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) bagi kesehatan khususnya sebagai asupan antioksidan alami sehingga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Teori Umum*

1. **Jamur Merang (*Volvariella volvacea* Bull.)**

Jamur adalah suatu jenis organisme yang serupa dengan tumbuhan meskipun DNA jamur berkaitan dengan hewan. Organisme ini tidak dapat berfotosintesis karena tidak memiliki klorofil sehingga jamur menggunakan suatu komponen organik sebagai suatu sumber energi dan karbon. Reproduksi jamur secara aseksual dengan memproduksi spora yang dapat tumbuh menjadi benang-benang halus disebut mycelium sehingga terbentuk badan buah. Hingga saat ini, jamur digunakan sebagai obat-obatan karena kandungan nutrisinya yang diakui khususnya antioksidan (Rahmawati, 2015: 17).

Awal mula budidaya jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) ini dilakukan sejak abad ke-18 oleh penduduk China hingga akhirnya menyebar sampai ke Indonesia. Jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) ialah jenis jamur yang paling sering dibudidayakan dan digunakan dalam membuat aneka jenis bahan pangan. Dengan tekstur, rasa bahkan kandungan gizi yang membuat pangan ini semakin memasyarakat untuk dikonsumsi sehingga nilai ekonominya semakin tinggi (Ichsan et al, 2011: 171).

a. **Daerah Tumbuh**

Jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) memiliki daerah tumbuh yang relatif luas. Awalnya tumbuh dan berkembang di dataran Cina. Kemudian mulai menyebar ke pantai timur Afrika hingga ke wilayah negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, Malaysia bahkan memasuki wilayah Indonesia. Di Indonesia, jamur merang sudah banyak dibudidayakan dan memasyarakat sehingga sudah secara luas

digunakan. Jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) merupakan jenis jamur yang dapat dibudidayakan dengan media tumbuh berupa limbah pertanian atau limbah organik (Sinaga, 2011: 16).

b. Nama Daerah

Jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) atau *paddy straw mushroom* memiliki nama daerah yang beragam seperti *supa pare* di Jawa Barat, *jamur dami* di Jawa Tengah, *kulat sagu* di Maluku, *im sere* di Minahasa, *kulat jeramoe* di Aceh, dan beberapa sebutan lainnya (Achmad, 2011: 133).

c. Morfologi Fungi

Jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) mempunyai volva dengan warna coklat muda. Jenis jamur ini tergolong tidak beracun sehingga aman untuk dikonsumsi. Fase pertumbuhan dari jamur ini antara lain jamur pentul atau *pinhead*, kancing kecil atau *tiny button*, kancing atau *button*, telur atau *egg*, pemanjangan atau *elongation* dan dewasa atau *mature* (Saputra, 2014: 10).

Jamur merang pada stadium telur sudah siap untuk dipanen. Warnanya berubah menjadi coklat, putih dan hitam yang memiliki bentuk menyerupai telur. Volva atau cawan terdapat pada jamur stadium ini yang sebelumnya merupakan selaput pembungkus buah. Nantinya, selubung akan sobek dan menuju ke atas disebabkan karena tudung buah dan tangkainya berkembang semakin besar. Cawan yang telah terbuka akan menghasilkan basidia dan basidiospora yang kemudian akan membentuk hifa hingga dihasilkan kembali jamur kancing kecil dan mengalami tahap pertumbuhan menjadi stadium telur untuk siap dipanen (Saputra, 2014: 10).

d. Klasifikasi Fungi

Regnum	: Fungi
Divisio	: Basidiomycota
Kelas	: Basidiomycetes
Ordo	: Agaricales
Famili	: Pluteaceae
Genus	: Volvariella
Spesies	: <i>Volvariella volvacea</i> Bull.

(Nurhakim, 2018: 8).



Gambar 1. Jamur Merang (*Volvariella volvacea* Bull.) (Suharjo, 2007: 11).

e. Kandungan Kimia

Jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) memiliki kandungan kimia berupa lemak 2-2,6%, protein total 25,9-28,5%, dan karbohidrat 2,7-4,8% (Mindarti & Sinaga, 2010: 2). Jamur merang juga mengandung senyawa flavonoid sebagai antibiotik, senyawa polifenol sebagai antioksidan, senyawa volvatoksin dan flamutoksin (Saputra, 2014: 13).

Jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) adalah jamur dengan berbagai komponen gizi yang melimpah. Dalam 100 g jamur segar

terdapat air 93,3%, protein 1,8%, karbohidrat 2,68%, lemak 0,3%, fosfor 37 mg, kalsium 30 mg, abu 1,2%, vitamin B12 0,01 mg (riboflavin), vitamin C 1,7 mg, asam amino 37,4 mg dan niasin 1,7 mg (Suharjo, 2007: 11).

f. Manfaat bagi kehidupan sehari-hari

Secara umum, jamur memiliki khasiat bagi kesehatan yang berfungsi sebagai antikolesterol, imunostimulan, menjadi sumber vitamin, mineral dan protein yang tinggi, sebagai pelancar peredaran darah dan mengatasi gangguan pencernaan serta hati (Oktariana, 2011: 68)

Jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) adalah jenis jamur pangan (dapat dikonsumsi) dengan nutrisi di dalamnya dan berkhasiat sebagai obat. Jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) terbukti memiliki antioksidan yang bermanfaat dalam mengatasi stress oksidatif (Damayanty & Suromo, 2015: 49).

Selain karena lezat dan teksturnya baik, jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) dapat menjadi sumber enzim terutama tripsin yang mempengaruhi proses pencernaan menjadi lancar. Jamur merang mengandung vitamin B-kompleks seperti riboflavin, asam amino esensial yang lengkap sehingga dapat bermanfaat sebagai pelindung atau peningkat ketahanan tubuh. Oleh karena itu, jamur ini gemar dibudidayakan dan dikonsumsi masyarakat luas (Oktariana, 2011: 69).

2. Radikal Bebas

Radikal bebas ialah molekul yang terdiri dari elektron yang tidak berpasangan yang terdapat pada orbital terluar. Sifat radikal bebas tidak stabil dan cenderung reaktif dimana akan bereaksi dengan molekul di dalam tubuh hingga

mencapai keadaan stabil. Sifat reaktif ini akan membentuk rantai reaksi dalam tiap pembentukannya. Oleh karena itu, akan menghasilkan senyawa yang tidak normal dengan efek yang buruk yang selanjutnya akan memulai reaksi berantai lainnya sehingga dapat menyebabkan *cell damage* penting yang ada di dalam tubuh. Radikal bebas diatasi dengan melakukan peredaman menggunakan antoksidan (Tristantini et al., 2016: 2).

Sumber radikal bebas berasal dari faktor endogen dan eksogen (Zulaikhah, 2017: 41).

a. Sumber endogen

Radikal bebas diperoleh dari proses metabolisme normal yang terjadi di dalam tubuh. Reaksi metabolisme menghasilkan lebih dari 90% oksigen yang berasal dari proses oksidasi makanan sehingga diperoleh energi dalam mitokondria yang dikenal dengan rantai transpor elektron dan akan menghasilkan anion superoksida radikal bebas. Biasanya radikal bebas diproduksi oleh sel darah putih seperti neutrophil yang berfungsi sebagai pertahanan dalam menghancurkan patogen asing, reaksi oksidasi xanthine, reaksi zat besi dan logam lainnya, olahraga berlebihan, kelebihan oksigen, dan produksi energi yang membutuhkan oksigen. Namun ada beberapa oksigen yang justru membentuk radikal, peradangan, dan iskemik. Sumber endogen radikal bebas lainnya meliputi autoksidasi, oksidasi enzimatis, dan proses pernafasan (Zulaikhah, 2017: 41-42).

b. Sumber eksogen

Radikal bebas juga dapat bersumber dari pencemaran lingkungan, radiasi, asap rokok, penipisan ozon, bahan kimia, obat, racun, alkohol, mikroorganisme patologis, anestesi dan pestisida yang digunakan untuk industri (Zulaikhah, 2017: 42).

1) Obat-obatan

Tekanan oksigen yang meningkat di dalam tubuh dapat dipengaruhi oleh obat-obatan. Ketika bereaksi dengan hiperoksida, maka akan mempercepat kerusakan. Obat tersebut dapat berupa antibiotik atau golongan ion logam terikat, obat antikanker seperti antrasiklin, obat fenilbutazon, dan golongan aminosalisilat yang menonaktifkan protease dan mempercepat peroksidasi lipid (Zulaikhah, 2017: 42).

2) Radiasi

Radioterapi dapat menjadi penyebab kerusakan jaringan. Radiasi elektromagnetik seperti sinar x atau sinar gamma maupun radiasi partikel seperti elektron, neutron, proton akan menyebabkan terbentuknya radikal primer melalui transfer energi menuju komponen seluler. Jenis radikal primer ini dapat membentuk reaksi sekunder dengan oksigen (Zulaikhah, 2017: 42).

3) Asap rokok

Rokok mengandung oksidan 10^7 molekul per batang. Reaksi yang terbentuk akan menimbulkan peroksidasi asam lemak ganda yang terjadi pada membran sel dan dapat memperkuat terjadinya stress oksidatif. Molekul oksidan dalam asap tembakau dapat mengakibatkan penurunan antioksidan dalam tubuh. Merokok dapat menyebabkan rendahnya antioksidan dalam plasma dan penerobosan vitamin C hingga 30% (Zulaikhah, 2017: 42).

Radikal bebas yang terdapat dalam tubuh sebagian besar berasal dari radikal turunan oksigen yaitu ROS (*reactive oxygen species*). Adapula jenis radikal bebas yang dinamakan RNS (*reactive oxygen species*) yang berasal dari

nitrogen. Senyawa radikal bebas dapat meliputi radikal hidroksil (\cdot OH), peroksil (\cdot OOH), dan superoksida ($O_2 - \cdot$) dan senyawa non radikal meliputi oksigen singlet (1O_2), dan hidrogen peroksida (H_2O_2), radikal bebas berbahaya tetapi lebih berbahaya dengan adanya faktor lingkungan. ROS adalah suatu senyawa yang bersumber dari oksigen yang dibutuhkan oleh semua organisme yang bersifat aerobik. Manusia membutuhkan oksigen dalam menghasilkan energi ATP yang merupakan sumber energi untuk makhluk hidup dari proses oksidatif fosforilasi pada mitokondria (Zulaikhah, 2017: 43).

Reaksi dalam tubuh yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas yaitu reaksi enzimatik dan nonenzimatik. Reaksi enzimatik yang menghasilkan radikal bebas adalah reaksi rantai pernafasan, sistem sitokrom P450 dan sintesis prostaglandin. Misalnya, radikal anion superoksida dibentuk melalui berbagai sistem oksidasi seluler seperti xantin oksidase, peroksidase, NADPH oksidase dan lain-lain. Reaksi nonenzimatik yang menghasilkan radikal bebas adalah reaksi fosforilasi oksidatif dalam mitokondria. Berbagai reaksi elektromagnetik juga dapat menghasilkan radikal bebas misalnya sinar gamma yang dapat membagi air dalam tubuh untuk menghasilkan radikal hidroksil (Dhaliwal & Singh, 2015: 97).

Ketika radikal bebas diproduksi dalam jumlah berlebih maka antioksidan endogen dan eksogen tidak dapat menetralkannya. Oleh karena itu, kondisi ini akan menyebabkan stress oksidatif. Kondisi ini memiliki berbagai efek degeneratif pada membran sel, DNA, dan lain-lain. Kerusakan pada protein akibat radikal bebas dapat mempengaruhi aktivitas enzimatik. Stress oksidatif ini juga dapat menyebabkan berbagai penyakit degeneratif seperti kanker tertentu, kardiovaskular, gangguan neurodegeneratif, diabetes mellitus, penuaan,

aterosklerosis, peradangan, gangguan mata dan skomplikasi janin (Dhaliwal & Singh, 2015: 97).

3. Senyawa Fenolik Total

Senyawa fenolik (C_6H_5OH) adalah komponen yang memberikan aktivitas antioksidan yang merupakan golongan fitokimia terbesar pada tumbuhan yang memiliki kemampuan dalam meredam oksigen reaktif karena pada cincin aromatik terdapat gugus hidroksil yang memiliki peran sebagai donor elektron (Indra et al., 2019: 209).

TPC (*Total Phenolic Content*) atau kandungan fenolik total adalah kandungan total fenolik pada suatu sampel. Fenolik yang terkandung dalam tanaman bersifat redoks dan sifat-sifatnya memungkinkan adanya aktivitas antioksidan. TPC dinyatakan dalam satuan GAE/g sampel (Johari & Khong, 2019: 3).



Gambar 2. Gugus Fenol (Kusnadi, 2018: 118).

Asam galat adalah suatu senyawa turunan fenolik yang sebagian besar ditemukan dalam tanaman dan sangat aktif. Telah dibuktikan bahwa aktivitas antioksidan berhubungan dengan adanya gugus hidroksil bebas dan terkonjugasi pada senyawa fenolik seperti asam galat (Maesaroh et al., 2018: 94).

Asam galat sering digunakan sebagai larutan pembanding. Hal ini karena senyawa ini bersifat stabil, murni dan relatif murah. Asam galat akan bereaksi jika dicampur reagen *Folin-ciocalteu* dalam kondisi basa dengan penambahan natrium


karbonat. Adapun asam galat ini merupakan senyawa kompleks warna biru dengan absorbansi yang diukur dengan panjang gelombang 765 nm. Kurva baku atau pembandingan asam galat ini digunakan untuk memperoleh persamaan regresi linear sehingga kadar senyawa fenolik dapat diukur (Nofita & Nurlan, 2020: 82).

4. Senyawa Tanin Total


Senyawa tanin ($C_{76}H_{52}O_{46}$) adalah senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan, termasuk kategori tumbuhan tingkat tinggi atau rendah yang memiliki kemampuan meredam reaksi oksidatif akibat radikal bebas. Berdasarkan struktur kimianya digolongkan menjadi tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi (Soenardjo, 2017: 91).

TTC (*Total Tannin Content*) atau kandungan tanin total adalah kandungan total tanin pada suatu sampel. Tanin dapat memberikan aktivitas antioksidan. Standar yang digunakan berupa asam tanat sehingga dapat dinyatakan dalam satuan TAE/g sampel (Muthukumar et al., 2013: 142).

Asam tanat adalah suatu senyawa golongan tanin terhidrolisis turunan polifenol. Asam tanat sering digunakan sebagai senyawa pembandingan dalam menetapkan kadar tanin total pada suatu sampel. Tanin yang direaksikan dengan reagen yang membentuk warna yaitu folin-ciocalteu dan pembentuk suasana basa natrium karbonat (Pratama & Rosalina, 2019: 372).



Hydrolysable Tannins



Condensed Tannins

Gambar 3. Struktur Tanin (Ghosh, 2015: 41).


5. Antioksidan

Antioksidan ialah suatu senyawa yang dapat bersifat sebagai reduktor dengan mendonorkan elektronnya dan menginaktivasi reaksi oksidasi. Antioksidan dapat memproteksi sel dari efek buruk radikal bebas yang bekerja dengan meredam radikal bebas sehingga stress oksidatif dapat dicegah (Widyasanti et al., 2016: 2).

Klasifikasi antioksidan terdiri dari antioksidan enzimatik dan nonenzimatik. Antioksidan enzimatik disebut juga antioksidan endogen yang terdiri dari enzim superoksida dismutase (SOD), glutathione reduktase (GR), catalase (CAT), glutathione peroksidase (GPX) dan enzim-enzim yang memiliki aksi kerja melindungi jaringan atau sel dari kerusakan oksidatif karena reaksi radikal bebas seperti hidroksil, peroksida, peroksil, dan hidrogen peroksida. Sedangkan antioksidan nonenzimatik atau antioksidan eksogen ditemukan dalam sayur-sayuran maupun buah-buahan karena memiliki senyawa vitamin C, glutathione (GSH), β -karoten, isoflavon, flavonoid, katekin, antosianin, dan asam lipoat. Dengan bantuan senyawa tersebut sehingga dapat melindungi sel-sel dalam tubuh dari radikal bebas (Zulaikhah, 2017: 41).

Antioksidan memiliki dua mekanisme dalam menangkal radikal bebas. Mekanisme pertama yaitu pemutusan rantai, dimana antioksidan primer menyumbangkan elektron ke radikal bebas dan menetralkannya. Mekanisme kedua yaitu penghapusan ROS (*reactive oxygen species*) dengan memadamkan katalisator rantai. Sehingga dalam mekanisme ini, antioksidan akan menetralkan radikal bebas dan akan mengalami oksidasi (Dhaliwal & Singh, 2015: 2).

Adapun ilustrasi peredaman molekul radikal bebas oleh antioksidan terdapat pada gambar di bawah ini :




Gambar 4. Ilustrasi Antioksidan (A°) dalam Nanopartikel yang Menarik Radikal Bebas (R°) ($R:A$ merupakan senyawa netral) (Mendelson, 2013: 422).

Antioksidan memiliki manfaat bagi kesehatan dalam mencegah proses menua dan penyakit degeneratif seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, jantung, obesitas dan sebagainya. Antioksidan berpotensi meredam radikal bebas di dalam tubuh yang diperoleh dari hasil metabolisme tubuh, asap rokok, sinar matahari dan sebagainya. Antioksidan dapat diperoleh secara alami dari berbagai tanaman di Indonesia. Antioksidan juga dapat diperoleh dari obat sintetis seperti vitamin C atau asam askorbat, N-asetil sistein dan lain-lain (Werdhasari, 2014: 60).

Vitamin C ialah suatu senyawa dengan efek sebagai antioksidan alami. Adapun vitamin C dapat digunakan sebagai senyawa pembanding dalam melakukan analisis aktivitas antioksidan dikarenakan penggunaan antioksidan alami lebih bersifat aman dan tidak bersifat toksik. Jika dibandingkan dengan senyawa antioksidan yang lain, vitamin C berpotensi menjadi antioksidan yang

termasuk dalam kategori antioksidan kuat, bahkan lebih murah dan juga mudah didapat (Lung & Destiani, 2017: 54-59).

Vitamin C ialah suatu senyawa polar yang memiliki 4 gugus hidroksil yang akan bereaksi dengan suatu radikal anion hidroksil dengan cara memberikan satu elektron sehingga diperoleh senyawa semihidroaskorbat dengan sifat yang tidak reaktif. Kemudian senyawa tersebut mengalami suatu reaksi disproporsionasi dan terbentuklah dehidroaskorbat yang sifatnya tidak stabil. Secara alamiah, dehidroaskorbat akan mengalami degradasi dan terbentuk asam oskhalat dan asam treonat (Lung & Destiani, 2017: 57).



Gambar 5. Mekanisme Aktivitas Penangkal Radikal Asam Askorbat (Nimse & Pal, 2015: 27990).


Vitamin C akan bermodifikasi menjadi radikal askorbat karena telah menyalurkan elektron ke radikal lemak sehingga reaksi berantai peroksidasi lemak dapat terhenti. Radikal bebas yang bereaksi dengan vitamin C akan menghasilkan molekul askorbat dan molekul *dehydroascorbate*. *Dehydroascorbate* merupakan suatu senyawa yang tidak bersifat antioksidatif sehingga secara ilmiah akan diubah kembali menjadi askorbat melalui donor 2 elektron yang dilakukan oleh oksidoreduktase (Nimse & Pal, 2015: 27990).

6. Penetapan Kadar Fenolik dan Tanin Total dengan Reagen Folin-Ciocalteu

Folin-ciocalteu adalah reagen yang digunakan untuk menganalisis senyawa fenolik. Prinsip dari metode ini yaitu suatu senyawa warna biru yang merupakan senyawa kompleks kemudian diukur absorbansinya dengan panjang gelombang 765 nm (Noviyanty et al., 2020: 62).

Reaksi senyawa fenolik dan reagen *Folin-ciocalteu* (pH=3) hanya dapat terbentuk jika dalam suasana basa (pH=10) dengan penambahan natrium karbonat sehingga akan terjadi disosiasi pada proton yang terdapat pada senyawa fenolik sehingga terbentuk ion fenolat (Noviyanty et al., 2020: 62).

Besarnya konsentrasi senyawa fenolik menentukan banyaknya ion fenolat dalam mereduksi asam heteropoli (*fosfomolibdat-fosfotungstat*) menjadi senyawa kompleks biru *molibdenum-tungsten* sehingga dapat diukur dengan spektrofotometer UV-Vis. Sehingga warna biru pekat akan menggambarkan kadar fenolik yang tinggi (Noviyanty et al., 2020: 62).



Gambar 6. Reaksi Senyawa Fenolik dengan Reagen *Folin-Ciocalteu* (Noviyanty et al., 2020: 63).

7. Pengujian Antioksidan dengan Metode DPPH

Untuk mengetahui besarnya aktivitas suatu senyawa tumbuhan berpotensi menjadi *scavenger* (penangkap) pada radikal bebas maka perlu dilakukan


pengujian aktivitas antioksidan. Penangkal radikal bebas memiliki aksi salah satunya dengan menghambat oksidasi lipid (Egra et al., 2018: 107).

1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl (DPPH) ($C_{18}H_{12}N_5O_6$) ialah senyawa radikal bebas yang bersifat stabil sehingga sering digunakan dalam menentukan aktivitas antioksidan sebagai larutan pereaksi (Tristantini et al., 2016: 1).

Metode DPPH adalah metode yang tergolong sering digunakan terbukti efektif, efisien dan sensitif untuk menganalisis aktivitas antioksidan pada suatu bahan alam atau ekstrak tanaman dengan metode peredaman DPPH (Indra et al., 2019: 210).

Metode ini merupakan metode serapan terhadap DPPH. Keuntungan pengujian dengan metode ini dalam menganalisis aktivitas antioksidan adalah sederhana, efisien, mudah, akurat, dan menggunakan sampel yang sedikit dan waktu pengujian yang singkat serta praktis (Haeria et al., 2018: 94).

Dalam metode ini hanya digunakan senyawa DPPH sebagai pereaksi dan senyawa pembanding seperti vitamin C. Pengamatan pada metode ini ditandai dengan perubahan larutan ungu menjadi kuning. Hal ini menandakan DPPH telah mengalami reduksi oleh suatu proses donor hidrogen dari senyawa antioksidan. (Lung & Destiani, 2017: 56).



Gambar 7. Reaksi DPPH dengan Senyawa Antioksidan (Tristantini et al., 2016: 2)

Adanya peredaman warna yang mulanya berwarna ungu berubah menjadi warna kuning yang terjadi pada radikal DPPH disebabkan karena terdapat senyawa antioksidan yang mampu mendonorkan atom hidrogen terhadap radikal DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) dan terjadi proses reduksi menghasilkan molekul DPPH-H (1,1-difenil-2-pikrilhidrazin) suatu molekul yang stabil (Tristantini et al., 2016: 2).

8. Persen Penghambatan Radikal Bebas (% Inhibisi)

Persen penghambatan (% Inhibisi) adalah suatu parameter yang dapat digunakan untuk menentukan potensi senyawa antioksidan dalam meredam suatu radikal bebas (Mulyani et al., 2018: 115).

Berdasarkan % inhibisi, aktivitas antioksidan dapat dikategorikan antara lain dengan nilai persen inhibisi 50-90% memiliki aktivitas antioksidan tinggi, 20-50% memiliki aktivitiitas antioksidan sedang, dan 0% tidak memiliki aktivitas antioksidan (Mulyani et al., 2018: 115).

9. Korelasi Kadar Fenolik dan Tanin Total dengan Aktivitas Antioksidan

Senyawa fenolik alami meliputi senyawa polifenol yang terdiri dari tanin, flavonoid, glikosida dan lain-lain. Senyawa-senyawa ini merupakan komponen terbesar yang dapat berpotensi sebagai antioksidan alami yang terdapat pada tumbuhan. Apabila semakin tinggi kadar senyawa fenolik dalam suatu tumbuhan maka akan semakin kuat aktivitas antioksidannya (Dhurhania, 2018: 62).

10. Spektrofotometri UV-Vis

Spektroskopi merupakan cabang ilmu kimia yang mengkaji tentang interaksi berbagai tipe radiasi elektromagnetik dengan suatu bahan kimia.


Spektrofotometri UV-Vis terdiri dari dua gabungan sumber cahaya yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible/tampak (Nazar, 2018: 1-13).

Spektrofotometri adalah suatu metode pengukuran dengan adanya absorpsi cahaya pada suatu panjang gelombang tertentu yang melewati media larutan yang terdiri dari sampel yang kemudian akan ditentukan serapannya (Lestari, 2009: 189).

Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk analisis secara spektrofotometri dengan menganalisis suatu senyawa secara kuantitatif dan kualitatif (Suharmanto, 2013: 1).

Spektrofotometri UV-Vis ialah suatu metode instrumen yang umum diaplikasikan dalam menganalisis senyawa kimia dengan tujuan untuk mendeteksi senyawa yang berdasarkan adanya absorpsi foton pada daerah UV-Vis dengan panjang gelombang 200-700 nm (Irawan et al., 2019: 2).

Prinsip kerja dari metode spektrofotometri UV-Vis adalah suatu cahaya yang bersifat monokromatik akan melewati suatu media yaitu larutan, karenanya akan terjadi penyerapan pada sebagian cahaya, kemudian sebagian ada yang dipantulkan lalu sebagiannya lagi dipancarkan. Analisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis berlandaskan pada hukum Lambert-Beer (Fatimah, 2016: 22).



Gambar 8. Skema Kerja Spektrofotometri UV-Vis (Nazar, 2018: 13)

11. Metode Ekstraksi

Ekstraksi ialah suatu proses penyarian terhadap senyawa kimia yang dapat larut dengan bantuan pelarut yang cocok. Ekstrak ialah suatu sediaan dalam keadaan kering, kental ataupun cair yang dari suatu simplisia nabati atau hewani (Tambun et al., 2016: 54).

Jenis-jenis metode ekstraksi antara lain :

a. Maserasi

Maserasi ialah suatu metode ekstraksi yang sederhana dan seringkali digunakan. Prinsip kerjanya dengan merendam serbuk simplisia dan pelarut dalam satu wadah inert dengan kondisi tertutup rapat dan suhu ruangan.

b. *Ultrasound-Assisted Solvent Extraction*

Metode ini modifikasi dari metode maserasi dan dilakukan dengan bantuan *ultrasound*. *Ultrasound* tersebut merupakan suatu sinyal berfrekuensi tinggi yaitu 20 kHz. Serbuk simplisia dan pelarut dimasukkan dalam wadah *ultrasound* dan *ultrasonic*.

c. Perkolasi

Dalam sebuah perkolator, serbuk simplisia akan dibasahi secara perlahan. Di atas serbuk simplisia tersebut akan ditambahkan pelarut dan dibiarkan menetes.

d. Soxhlet

Di masukkan serbuk dari simplisia ke dalam sautu sarung selulosa ataupun kertas saring dalam suatu klongsong. Adapun klongsong tersebut diletakkan di atas suatu labu maupun di bawah dari kondensor. Labu diisi dengan pelarut kemudian diatur suhu dibawah dari suhu refluks.

e. Reflux dan destilasi uap

Sampel dan pelarut dimasukkan dalam suatu labu yang telah terhubung dengan kondensor. Dalam hal ini, dilakukan pemanasan pada pelarut tersebut hingga mencapai titik didih. Kemudian uap tersebut mengalami kondensasi kemudian kembali menuju labu. Destilasi uap mempunyai prinsip kerja yang sama dengan mengekstraksi minyak esensial.

(Mukhriani, 2014: 362-364).

B. Tinjauan Islam Mengenai Pemanfaatan Tumbuh-tumbuhan sebagai Obat

Sebagai seorang muslim, menjaga kesehatan merupakan salah satu kewajiban kita kepada diri sendiri. Hal ini membuktikan bahwa ajaran agama Islam juga sangat memperhatikan kesehatan jasmani manusia dan tentunya tidak luput untuk menyeimbangkan dengan kesehatan rohani. Sebab, tubuh kita memiliki hak, khususnya hak untuk mendapatkan kesehatan atau menerima pengobatan ketika sakit. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda

وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya :

“Sungguh, badanmu memiliki hak atas dirimu” (H.R. Muslim).

(In'am. A & Latipun, 2020: 44).

Sabda Rasulullah SAW. tersebut mengisyaratkan bahwa kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu hak tubuh manusia yaitu menerima pengobatan ketika dilanda sakit. Hal tersebut merupakan sesuatu yang secara alamiah dibutuhkan manusia. Dalam menjaga

kesehatan atau mengobati, manusia memiliki banyak cara yang merupakan bentuk ikhtiar. Bahkan Allah SWT. telah menyediakan obatnya. Hal ini telah dijelaskan dalam berbagai kajian hadis salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW. bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW.. bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya” (H.R. Al-Bukhari).

(Bukhari, VII, 2010: 12).

Adapun hadis tersebut telah menerangkan mengenai Allah SWT. menurunkan suatu penyakit dan menurunkan pengobatan atas penyakit tersebut. Setiap penyakit memiliki obat kecuali kematian. Allah SWT. menurunkan salah satu penyakit yaitu penyakit degeneratif. Hal ini sesuai dalam firman-Nya QS. Ar-Ruum/30: 54 yang berbunyi

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

Terjemahnya :

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa” (Kementerian Agama RI, 2014: 410).

Telah dijelaskan dalam firan Allah SWT. di atas bahwa telah diciptakan manusia melalui fase penciptaan manusia, mulai dari keadaan lemah (berasal dari air mani) yang akan menjadi segumpal darah kemudian terbentuklah segumpal daging. Setelah itu, daging tersebut membungkus tulang belulang kemudian ditiupkan ruh dan keluar dari perut ibunya dalam keadaan lemah. Lambat laun

mengalami perkembangan menjadi seorang anak belia, kemudian menjadi remaja dan menjadi kuat (dewasa) hingga akhirnya menjadi lemah kembali (beruban) atau mengalami lanjut usia. Segala yang terjadi adalah atas kehendak-Nya. Dari penjelasan tersebut, tersirat makna yang menggambarkan adanya proses degenerasi (penurunan atau kemunduran) sehingga mengalami penyakit degeneratif yaitu penyakit yang sejalan dengan penambahan usia (Ibnu Katsir, 2018: 113).

Dalam firman di atas telah diterangkan mengenai fase penciptaan manusia mulai dari keadaan lemah dan lama kelamaan menjadi kuat hingga akhirnya kembali menjadi lemah. Ketika manusia pada fase kemunduran (lansia) atau degenerasi, manusia akan mengalami penurunan fungsi organ tubuh yang disebut penyakit degeneratif seperti kanker, autoimun, penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, jantung, obesitas dan sebagainya. Meskipun dengan adanya penyakit tersebut, Allah SWT. akan selalu memberikan syafa'at bagi hamba-Nya. Salah satunya yaitu Allah SWT. telah menumbuhkan tumbuhan bagi manusia untuk dimanfaatkan sebagai pengobatan, hal ini termaktub dalam QS. Yunus/10: 24, Allah SWT. berfirman

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak” (Kementerian Agama RI, 2014: 211).

Dalam dalil ini telah dijelaskan bahwa Dia menciptakan dunia dengan kenikmatannya yang hanya sekejap. Diumpamakan seperti suatu air yang turun ke bumi dari langit yang memiliki manfaat atas kesuburan tumbuhan yang terdapat di bumi oleh karenanya dapat menjadi makanan bagi manusia dan hewan.

Menggambarkan pula tentang keelokannya yang sekejap dapat punah di muka bumi ini. Jika tiba saatnya, setelah manusia dan hewan mengambil kebaikan dan kemanfaatannya (pengobatan) maka Allah SWT. akan mematikannya (Shihab, 2002: 57).

Firman di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. menumbuhkan telah tanaman agar dapat dimanfaatkan manusia dengan sebaik-baiknya misalnya pemanfaatan tumbuhan sebagai obat. Dalam ayat lain, dijelaskan pula bahwa Allah SWT. Maha Kuasa yang nampak dari bermacam-macam tumbuhan yang diturunkan-Nya agar dapat dimanfaatkan manusia. Sebagaimana dalam QS. Thaha/20: 53, Allah SWT. berfirman

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهٖ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya :

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kementerian Agama RI, 2014: 315).

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang kuasa, pengetahuan dan penciptaan Allah SWT. yang sempurna telah memberikan suatu kenikmatan dalam kehidupan begitupula Dia telah sangat memelihara setiap hamba-Nya. Bumi dijadikan sebagai hamparan untuk manusia, membentangkan jalan-jalan yang dapat dilalui serta diturunkannya hujan di muka bumi ini hingga akhirnya tercipta sungai dan danau. Dengan turunnya air dengan perantaraan hujan maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang beragam dengan perbedaan jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya (pengobatan). Ada tumbuhan dengan warna bermacam-macam seperti hitam dan putih, dan memiliki variasi rasa seperti manis dan pahit. ada tumbuhan

tingkat tinggi yakni monokotil dan dikotil, serta ada pula tumbuhan tingkat rendah yakni lumut dan jamur (Shihab, 2002: 316).

Ayat di atas menjelaskan tentang kebesaran-Nya dengan keberagaman tumbuhan yang diciptakan oleh Allah SWT. Salah satu bukti keberagaman tumbuhan adalah dengan diciptakannya jamur yang memiliki manfaat bagi manusia. Didukung dengan adanya hadis yang juga menjelaskan kemanfaatan jamur pada zaman Rasulullah SAW.. Hadis-hadis tersebut telah membuktikan bahwa jamur (air jamur) telah dikenal di dunia herbal Islam. Telah diriwayatkan sebanyak 2 kali oleh Imam Bukhari dan 7 kali oleh Imam Muslim dan dalam kitab-kitab yang lainnya. Rasulullah SAW. bersabda

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكَمَاءُ مِنَ الْمَنَّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

Artinya :

“Dari Sa’id bin Zaid r.a., Rasulullah SAW.. bersabda: *al-kam’ah* adalah sebagian dari *al-mann*, dan airnya adalah termasuk obat untuk (menyembuhkan) mata” (H.R. Al-Bukhari).

(Bukhari, VII, 2010: 17).

Melalui hadis di atas, kita dapat memahami bahwa jamur merupakan wujud karunia-Nya yang dapat digunakan sebagai obat. Selain itu, jamur sangat kaya akan nutrisi dan khasiat bagi tubuh sehingga dapat mengatasi berbagai fenomena penyakit dalam dunia kesehatan yang disebabkan oleh kelalaian manusia dalam menjaga kesehatan. Khususnya dalam pengaturan pola konsumsi dan jenis makanan atau gizi. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 168 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Kementerian Agama RI, 2014: 25).


Allah SWT. telah menjelaskan pada ayat di atas bahwa Dia menganjurkan kita untuk mengonsumsi apa yang telah diciptakan di bumi ini dengan segala halal dan baiknya. Allah SWT. pula menegaskan kita untuk tidak mengikuti langkah syaitan yang senantiasa merayu manusia agar memakan makanan yang haram. Adapun makanan yang halal adalah suatu makanan yang tidak haram, dengan kata lain makanan yang diperbolehkan oleh agama. Kemudian dari kata baik (tayyiban) memiliki makna yang mengarah pada jenis dan pola konsumsi makanan. Tersirat makna bahwa suatu makanan yang dikonsumsi sangat mempengaruhi kesehatan baik secara jasmani maupun rohani (Shihab, 2002: 379-381).

Firman di atas menjelaskan betapa penyayang Allah SWT. kepada hamba-Nya. Dia telah menciptakan segala hal yang dibutuhkan oleh hamba-Nya. Dijelaskan bahwa Allah SWT. menganjurkan kita dalam mengonsumsi jenis makanan yang halal dan juga baik karena pada hakikatnya hal ini berpengaruh terhadap kondisi manusia dari aspek kesehatan. Jadi, melalui firman ini Allah SWT. telah memberikan tuntunan tentang makanan yang merupakan kebutuhan jasmani dan dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alur Penelitian



B. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan, melihat, membuktikan, dan meninjau dengan angka tentang suatu objek yang diteliti dengan apa adanya kemudian menarik kesimpulan berdasarkan fenomena yang terjadi pada saat penelitian (Putra, EA, 2015: 73).

Metode penelitian ini dilakukan untuk menentukan kadar fenolik dan tanin total dan menganalisis aktivitas antioksidan pada jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) dengan metode DPPH.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Organik, Laboratorium Kimia Anorganik dan Laboratorium Kimia Instrumen Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Panca Sakti Makassar.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 10-22 Juni 2021.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan secara kuantitatif berupa penetapan kadar fenolik dan tanin total dan analisis aktivitas antioksidan pada jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) dengan metode DPPH.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan alat dan bahan yang dapat menunjang antara lain.

1. Alat Penelitian

Adapun alat-alat yang digunakan antara lain batang pengaduk, *beaker glass*, *blender*, botol coklat, cawan porselin, gelas arloji, *hot plate*, kuvet, labu ukur, *micropipet*, oven, pipet skala, pipet tetes, pisau, rak tabung, sendok tanduk, *shiever shaker*, spektrofotometer UV-Vis, tabung reaksi, timbangan analitik, toples kaca, *vacum rotary evaporator*, dan *waterbath*.

2. Bahan Penelitian

Adapun bahan-bahan yang digunakan antara lain aluminium foil, aquadest (Waterone®), asam galat (Sigma®), asam klorida (Merck®), asam tanat

(Merck®), besi (III) korida (Merck®), DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) (Himedia®), *Folin-ciocalteu* (Merck®), jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.), metanol, natrium karbonat (Merck®), pereaksi dragendorf, pereaksi meyer, serbuk magnesium (Merck®), tissue, dan vitamin C (Merck®).

E. Populasi dan Sampel Peneliitian

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) segar yang diperoleh dari Budidaya Jamur Merang Wbr_Westborneo di Pontianak, Kalimantan Barat yang dikumpulkan dengan metode *nonprobability sampling*. Teknik yang dilakukan adalah *convenience sampling* yakni teknik pengambilan sampel dimana peneliti dapat langsung menentukan dan memilih sampel berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan mendapatkannya (Hasnidar, 2020: 55).

2. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan adalah tudung, bilah, spora, tangkai dan cawan dari jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) yang diperoleh dari proses pengeringan dan penghalusan sehingga sampel siap untuk diekstraksi.

F. Prosedur Kerja

1. Preparasi Sampel Jamur Merang (*Volvariella volvacea* Bull.)

Sampel jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) yang diperoleh kemudian ditimbang 4 kg kemudian disortasi basah lalu pencucian dilakukan menggunakan air mengalir hingga bersih. Setelah itu, dilakukan perajangan pada sampel kemudian dijemur pada tempat terbuka tanpa terkena sinar matahari langsung, lalu di sortasi kering. Sampel jamur diserbukkan menggunakan *blender* (Lusiana, 2015: 1066). Dilakukan pengecilan ukuran serbuk dengan mengayak

menggunakan ayakan mesh 40 (Nuraeni et al., 2019: 66). Kemudian sampel jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) siap untuk diekstraksi (Lusiana, 2015: 1066).

2. Ekstraksi Jamur Merang (*Volvariella volvacea* Bull.)

Serbuk sampel jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) ditimbang 150 gram lalu masukkan ke dalam wadah untuk maserasi. Setelah itu, dituang pelarut metanol 1.125 ml sampai serbuk terendam (Ningsih et al., 2020: 98). Selanjutnya didiamkan selama 3x24 jam hindari dari cahaya dan diaduk tiap 24 jam sekali. Dilakukan penyaringan dalam ke dalam wadah penampung. Dilakukan penyarian sebanyak 3 kali pengulangan, tiap 24 jam pelarut diganti (450 ml pelarut metanol). Dilakukan pemekatan pada cairan penyari menggunakan *rotary evaporator* ($T = 50^{\circ}\text{C}$) (Ningsih et al., 2020: 98). Kemudian dibebaskan dengan cara dipanaskan di atas penangas sehingga dihasilkan ekstrak kental jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) (Wahyudi & Octaviana, 2020: 74).

3. Skrining Fitokimia

a. Uji Alkaloid

0,5 g ekstrak dicampurkan dengan HCl 2N sebanyak 1 ml dan aquadest sebanyak 9 ml, setelah itu dipanaskan selama 2 menit, dilakukan pendinginan dan penyaringan lalu diperoleh filtrat. 2 tabung reaksi dimasukkan filtrat sebanyak 0,5 ml, setelah itu 2 tetes pereaksi Meyer dan Dragendorf ditambahkan pada masing-masing tabung reaksi. Adapun hasil positif alkaloid ditandai jika terdapat endapan atau kekeruhan warna putih (Meyer) atau merah (Dragendorf) (Wirasti, 2019: 2).

b. Uji Flavonoid

0,5 g ekstrak ditimbang dan ditambah pelarut metanol kemudian dipanaskan. Lalu ditambahkan serbuk Mg sebanyak 0,1 mg lalu ditambah

HCl pekat sebanyak 5 tetes. Hasil positif flavonoid ditandai dengan adanya warna menjadi merah, kuning atau jingga (Wirasti, 2019: 2).

c. Uji Saponin

Ekstrak sebanyak 1 g dimasukkan dalam sebuah tabung reaksi. Setelah itu, dimasukkan air panas sebanyak 10 ml dan didinginkan terlebih dahulu kemudian dilakukan pengocokan kuat-kuat (10 detik). Adapun hasil positif saponin ditunjukkan jika terdapat buih selama 10 menit (tinggi 1-10 cm) dan buih tetap ada apabila ditambahkan HCl 2N 1 tetes (Wirasti, 2019: 3).

d. Uji Fenol

Sebanyak 1 ml filtrat diteteskan dengan 2 tetes dari larutan FeCl_3 5%. Hasil positif fenol jika menunjukkan warna hijau atau warna hijau biru (Wirasti, 2019: 2).

e. Uji Tanin

1 g ekstrak dididihkan dengan aquadest kemudian didinginkan dan disaring. Ditambahkan FeCl_3 beberapa tetes pada filtrat. Reaksi positif apabila terbentuk coklat kehijauan atau biru kehitaman (Ikalinus et al., 2015: 73).

4. Penetapan Kadar Fenolik Total

a. Pembuatan dan pengukuran larutan perbandingan

Disiapkan larutan perbandingan asam galat 1000 ppm. Dilarutkan asam galat 10 mg dengan metanol hingga volume mencapai 10 ml kemudian 2,5 ml larutan dipipet kemudian diencerkan dengan metanol sampai volume 25 ml hingga menjadi konsentrasi 100 ppm. Setelah itu dipipet 1, 2, 3, 4, 5 ml dari larutan lalu ditambahkan dengan metanol sampai 10 ml dan diperoleh konsentrasi 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm

(Ahmad et al., 2015: 3). Setelah itu dari tiap konsentrasi dipipet 0,2 ml lalu ditambahkan dengan aquadest sebanyak 15,8 ml dan sebanyak 1 ml *Folin-Ciocalteu* selanjutnya dibiarkan (8 menit). Lalu ditambahkan sebanyak 3 ml Na_2CO_3 10% pada larutan lalu dibiarkan (2 jam; suhu kamar). Setelah itu, dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang maksimum 765 nm (3 replikasi) (Wirasti, 2019: 3).

b. Pengujian dan penentuan kadar fenolik total

Ditimbang 10 mg ekstrak jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) kemudian dilarutkan dengan metanol sampai 10 ml (1000 ppm) (Ahmad et al., 2015: 3). Kemudian dipipet 0,2 ml dari larutan lalu dicampurkan sebanyak 15,8 ml aquadest dan sebanyak 1 ml *Folin-Ciocalteu* selanjutnya dibiarkan (8 menit). Setelah itu, ditambahkan sebanyak 3 ml Na_2CO_3 10% lalu dibiarkan (2 jam; suhu kamar). Setelah itu, dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang maksimum 765 nm (3 replikasi). Hasil kadar fenolik total dinyatakan sebagai mg GAE/g ekstrak. Dihitung kadar fenolik total dengan rumus :

$$\text{Total Fenolik} = \frac{C \times V \times fP}{g}$$

Ket :

C = Konsentrasi fenolik (nilai x)

V = Volume ekstrak (L)

fP = Faktor pengenceran

g = Berat sampel (gram)

(Wirasti, 2019: 3).

5. Penetapan Kadar Tanin Total

a. Pembuatan dan pengukuran larutan pembanding

Disiapkan larutan pembanding asam tanat 1000 ppm dengan melarutkan asam tanat 10 mg dengan metanol sampai volume 10 ml kemudian sebanyak 2,5 ml larutan dipipet lalu diencerkan menggunakan metanol hingga 25 ml sehingga diperoleh konsentrasi 100 ppm. Kemudian dipipet 1, 2, 3, 4, 5 ml pada larutan lalu ditambahkan metanol hingga volume 10 ml dan diperoleh seri konsentrasi 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm (Ahmad et al., 2015: 3). Kemudian sebanyak 0,1 ml dipipet dari larutan ditambahkan dengan 7,5 ml aquadest dan sebanyak 0,1 ml *Folin-Ciocalteu* serta 2 ml dari Na_2CO_3 . Lalu diinkubasi (37°C ; 30 menit). Kemudian dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang maksimum 760 nm (3 replikasi) (Malangngi et al., 2012: 7).

b. Pengujian dan penentuan kadar tanin total

Ditimbang 10 mg ekstrak jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) kemudian dilarutkan dengan metanol sampai 10 ml (1000 ppm) (Ahmad et al., 2015: 3). Kemudian sebanyak 0,1 ml dipipet dan dicampurkan dengan 7,5 ml aquadest dan sebanyak 0,1 ml *Folin-Ciocalteu* serta 2 ml dari Na_2CO_3 . Lalu, diinkubasi (37°C ; 30 menit) kemudian dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang maksimum 760 nm (3 replikasi). Hasil kadar tanin total yang diperoleh dinyatakan mg TAE/g ekstrak (Malangngi et al., 2012: 7). Dihitung kadar tanin total dengan rumus :

$$\text{Total Tanin} = \frac{C \times V \times fP}{g}$$

Ket :

C = Konsentrasi tanin (nilai x)

V = Volume ekstrak (L)

fP = Faktor pengenceran

g = Berat sampel (gram)

(Ola et al., 2020: 106).

6. Analisis Aktivitas Antioksidan

a. Pembuatan dan pengukuran larutan pembanding

Disiapkan larutan pembanding dengan menimbang sebanyak 1 mg pembanding vitamin C lalu ditambahkan dengan 10 ml metanol dan dihasilkan konsentrasi suatu larutan induk 100 ppm lalu diencerkan menjadi seri konsentrasi 2, 4, 6, 8 ppm dengan metanol sampai batas tanda 10 ml. Kemudian dipipet sebanyak 0,5 ml dari tiap konsentrasi selanjutnya ditambahkan dengan 3,5 ml DPPH. Selanjutnya diinkubasi (37°C; 30 menit). Kemudian diukur serapan pada panjang gelombang maksimum 517 nm dan dilakukan 3 replikasi (Handayani et al., 2014: 89).

b. Pembuatan dan pengukuran larutan blanko

Ditimbang 5 mg DPPH lalu dilarutkan dalam 100 ml metanol (50 ppm). Kemudian dipipet 4 ml larutan DPPH dan diinkubasi (37°C; 30 menit) pada ruang yang gelap lalu diukur absorbansi reagen blanko pada panjang gelombang 517 nm dan dilakukan 3 replikasi (Handayani et al., 2014: 88-89).

c. Pengujian aktivitas antioksidan

Ditimbang 5 mg ekstrak jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) lalu dilarutkan dengan metanol dicukupkan sebanyak 10 ml (500 ppm) sambil diaduk dan dihomogenkan. Kemudian dilakukan pengenceran dengan metanol sampai 10 ml dan diperoleh konsentrasi 10, 50, 100, 150, dan 200 ppm. Diambil 0,5 ml dari tiap konsentrasi selanjutnya ditambahkan 3,5 ml DPPH. Setelah itu diinkubasi (37°C; 30 menit). Selanjutnya diukur serapan tiap konsentrasi pada panjang gelombang

maksimum 517 nm dan dilakukan 3 replikasi (Handayani et al., 2014: 89).

Dihitung persen penghambatan dengan persamaan :

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Abs. blanko} - \text{Abs. sampel}}{\text{Abs. blanko}} \times 100\%$$

(Purwati & Verryanti, 2016: 13).

G. Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian adalah data primer yang merupakan data deskriptif kuantitatif, yaitu penetapan kadar fenolik dan tanin total dan analisis aktivitas antioksidan pada jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) dengan metode DPPH. Dalam memperoleh data, teknis yang digunakan adalah analisis data secara kuantitatif sehingga dihasilkan data berupa angka-angka. Data penetapan kadar fenolik dan tanin total diperoleh melalui persamaan regresi linear yaitu $y = ax + b$ pada kurva standar. Adapun data analisis aktivitas antioksidan diperoleh dari rumus persen inhibisi terhadap DPPH.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Jamur Merang (*Volvariella volvacea* Bull.)

Jenis Ekstrak	Berat Simplisia	Berat Ekstrak	% Rendamen
Ekstrak kental	150 gram	15,843 gram	10,562 %

2. Hasil Skrining Fitokimia

Tabel 2. Hasil Skrining Fitokimia Jamur Merang (*Volvariella volvacea* Bull.)

Senyawa	Pereaksi	Hasil
Alkaloid	(+) HCl 2N (+) Mayer (+) Dragendorf	Tidak ada endapan (-)
Flavonoid	(+) Serbuk Mg (+) HCl pekat	Merah (+)
Saponin	Dikocok kuat-kuat (+) HCl 2N	Berbuih (+)
Fenol	(+) FeCl ₃ 5 %	Hijau kehitaman (+)
Tanin	(+) FeCl ₃ 5 % Pemanasan dan penyaringan	Coklat kehijauan (+)

3. Hasil Penetapan Kadar Fenolik Total

Tabel 3. Hasil Pengukuran Absorbansi Standar Asam Galat

Konsentrasi	Absorbansi			Absorbansi Rata-Rata	Persamaan Garis Linear
10 ppm	0,0387	0,0386	0,0382	0,0385	$y = 0,0007x + 0,0316$ $R^2 = 0,9954$
20 ppm	0,0448	0,0452	0,0451	0,0450	
30 ppm	0,0505	0,0504	0,0505	0,0505	
40 ppm	0,0574	0,0572	0,0571	0,0572	
50 ppm	0,0651	0,0654	0,0655	0,0653	

Tabel 4. Hasil Penetapan Kadar Fenolik Total Jamur Merang (*Volvariella volvacea* Bull.)

Berat Ekstrak	Absorbansi	Absorbansi Rata-Rata	Kadar Ekivalen	Kadar Fenolik Total
0.01 gram	0,1425	0,1425	158,428 mg/L	3,168 mg GAE/g ekstrak
	0,1426			
	0,1424			

4. Hasil Penetapan Kadar Tanin Total

Tabel 5. Hasil Pengukuran Absorbansi Standar Asam Tanat

Konsentrasi	Absorbansi			Absorbansi Rata-Rata	Persamaan Garis Linear
10 ppm	0,0682	0,0686	0,0683	0,0684	$y = 0,003x + 0,0368$ $R^2 = 0,9938$
20 ppm	0,0906	0,0911	0,0915	0,0911	
30 ppm	0,1282	0,1289	0,1290	0,1287	
40 ppm	0,1596	0,1596	0,1594	0,1595	
50 ppm	0,1830	0,1830	0,1833	0,1831	

Tabel 6. Hasil Penetapan Kadar Tanin Total Jamur Merang (*Volvariella volvacea* Bull.)

Berat Ekstrak	Absorbansi	Absorbansi Rata-Rata	Kadar Ekivalen	Kadar Tanin Total
0,01 gram	0,0968	0,0970	20,066 mg/L	0,20066 mg TAE/g ekstrak
	0,0969			
	0,0971			

5. Hasil Analisis Aktivitas Antioksidan

Tabel 7. Hasil Perhitungan % Inhibisi Jamur Merang (*Volvariella volvacea* Bull.)

Konsentrasi	% Inhibisi
10 ppm	0,79%
50 ppm	7,43%
100 ppm	19,99%
150 ppm	23,78%
200 ppm	35,30%

Tabel 8. Hasil Perhitungan % Inhibisi Vitamin C

Konsentrasi	% Inhibisi
2 ppm	34,14%
4 ppm	53,91%
6 ppm	79,33%
8 ppm	96,37%

B. Pembahasan

Antioksidan mempunyai peranan yang penting dalam menjaga serta memelihara kesehatan karena antioksidan mampu menangkal dampak negatif akibat radikal bebas begitu juga dengan spesies oksigen reaktif lainnya. Dengan adanya proses tersebut maka dapat menghambat reaksi stress oksidatif yang dapat menyebabkan penyakit degeneratif misalnya penyakit jantung, kanker, disfungsi otak, arthritis dan lain-lain (Adawiah et al., 2015: 130). Jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) mengandung senyawa antioksidan sehingga dapat bermanfaat bagi kesehatan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Asy-Syu'ara/26: 7 yang menjelaskan bahwa Allah SWT. dengan segala kekuasaan-Nya telah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat

أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Kementerian Agama RI, 2014: 367).

Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. mengajak kita agar belajar dari seluruh alam bahwa hanya Allah SWT. semata yang berhak untuk disembah. Mereka yang mempertahankan kekufuran dan kedustaan sehingga enggan percaya atas kebesaran-Nya. Jika mereka ingin merenungi adanya Kuasa-Nya di bumi ini maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Allah SWT. telah menciptakan berbagai macam tumbuhan yang baik sehingga mendatangkan manfaat membuktikan bahwa Allah SWT. merupakan dzat yang Maha Kuasa dalam menghidupkan atau membangkitkan yang telah mati (Shihab, 2012: 11).

Dengan segala kebesaran dan kekuasaan-Nya, Allah SWT. telah menumbuhkan suatu tumbuh-tumbuhan yang baik yang dapat dimanfaatkan oleh setiap makhluk-Nya. Salah satu manfaat dari tumbuhan yaitu dalam dunia kesehatan. Tumbuhan dapat digunakan sebagai pengobatan atau biasa disebut sebagai tanaman obat (herbal). Bagi hamba-Nya yang senantiasa ingin berfikir dan mengkaji adanya kekuasaan Allah SWT. tersebut, maka niscaya Allah SWT. akan memberikan petunjuk. Salah satu tanda-tanda kebesaran-Nya adalah ditumbuhkannya jamur yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia. Adapun dalam penelitian ini telah dikaji tentang manfaat jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) memiliki kandungan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan.

Dalam penelitian ini sampel jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) dipreparasi. Dilakukan sortasi basah lalu pencucian dengan air mengalir dan dilakukan perajangan. kemudian dikeringkan di tempat terbuka tanpa terkena sinar matahari secara langsung, lalu di sortasi kering. Sampel dihaluskan menjadi serbuk menggunakan *blender* dengan tujuan meningkatkan luas permukaan sampel sehingga kontak dengan cairan penyari semakin tinggi. Kemudian diayak

serbuk simplisia menggunakan ayakan mesh 40 agar ukuran partikel serbuk simplisia bersifat homogen karena hal ini dapat mempengaruhi kecepatan difusi senyawa aktif menuju pelarut.

Ekstraksi pada jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) menggunakan metode maserasi. Adapun metode maserasi adalah metode ekstraksi sederhana yang dilakukan dengan merendam suatu simplisia dalam bentuk serbuk dan pelarut dalam satu wadah inert dengan kondisi tertutup rapat dan suhu ruangan (Mukhriani, 2014: 362). Metode maserasi cocok dilakukan pada senyawa yang bersifat termolabil. Mekanisme penarikan senyawa pada metode maserasi melalui proses difusi pelarut yang masuk ke dalam dinding sel simplisia hingga akhirnya dapat menarik senyawa-senyawa pada simplisia tersebut (Kiswando, 2011: 134). Pelarut yang digunakan yaitu metanol karena metanol ialah pelarut semipolar yang dapat melarutkan senyawa yang bersifat polar ataupun nonpolar seperti fenolik, flavonoid, saponin dan lain-lain dan dapat menarik lebih banyak senyawa dari suatu tanaman (Surahmaida, 2019: 3). Pada tabel 1. menunjukkan hasil ekstraksi pada jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) dengan persen rendamen sebesar 10,562%.

Skrining fitokimia bertujuan untuk mengidentifikasi golongan senyawa pada jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) meliputi alkaloid, flavonoid, saponin, dan terutama fenolik serta tanin. Pada tabel 2. menunjukkan hasil skrining fitokimia bahwa jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) tidak mengandung alkaloid karena tidak terbentuk endapan. Kemudian sampel mengandung senyawa antara lain flavonoid ditandai dengan terjadi perubahan warna menjadi merah, saponin ditandai dengan terbentuknya buih, fenol ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi hijau kehitaman dan tanin ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi coklat kehijauan.

Penetapan kadar fenolik total pada jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) dilakukan dengan penambahan reagen *Folin-Ciocalteu* yang diukur dengan spektrofotometer UV-Vis (765 nm). Adapun reaksi yang terbentuk antara senyawa fenolik dan *Folin-Ciocalteu* disebabkan oleh gugus hidroksi yang terdapat pada suatu senyawa fenolik membentuk reaksi dengan *Folin-Ciocalteu* dalam suatu keadaan basa dengan penambahan natrium karbonat sehingga berubah menjadi suatu ion fenolat yang dapat membentuk reaksi reduksi pada asam heteropoli (*fosfomolibdat-fosfotungstat*) membentuk kompleks berwarna biru *molibdenum-tungsten* (Noviyanty et al., 2020: 62). Tabel 4. menunjukkan hasil kadar fenolik total pada jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) sebesar 3,168 mg GAE/g ekstrak artinya pada setiap gram ekstrak setara dengan 3,168 mg pembandingan asam galat. Hasil positif juga diperoleh dengan adanya perubahan warna larutan menjadi biru.

Penetapan kadar tanin total pada jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) menggunakan reagen *Folin-Ciocalteu* dengan mekanisme pembentukan warna serupa dengan penetapan kadar fenolik total yang dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis (760 nm). Tabel 6. menunjukkan hasil kadar tanin total pada jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) sebesar 0,20066 mg TAE/g ekstrak artinya pada setiap gram ekstrak setara dengan 0,20066 mg pembandingan asam tanat. Hasil positif juga diperoleh dengan adanya perubahan warna larutan menjadi biru.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kadar fenolik total yang lebih tinggi daripada kadar tanin total, maka dapat dinyatakan bahwa jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) lebih berpotensi sebagai sumber senyawa fenolik daripada senyawa tanin.

Menurut (Singh et al., 2016) senyawa fenolik dapat dibagi dalam beberapa kelompok senyawa antara lain flavonoid, asam fenolat, dan tanin jika dilihat dari jumlah gugus hidroksil yang terdapat pada struktur yang menghubungkan cincin benzen. Adapun menurut (Soenardjo, 2017) tanin merupakan senyawa polifenol yang digolongkan menjadi tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi berdasarkan struktur kimianya. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan kadar fenolik dan tanin total. Adapun penetapan kadar fenolik total untuk mengetahui kadar secara keseluruhan dari senyawa fenolik yang terdiri dari tanin serta senyawa fenolik lainnya. Sedangkan penetapan kadar tanin total untuk mengetahui kadar secara spesifik dari senyawa tanin yang merupakan turunan dari senyawa fenolik yaitu polifenol yang mencakup tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi.

Analisis aktivitas antioksidan pada jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) menggunakan metode peredaman terhadap DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) yang dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis (517 nm). Adapun metode ini bertujuan untuk menganalisis besarnya aktivitas senyawa yang terdapat pada tumbuhan berperan sebagai *scavenger* (penangkap) pada radikal bebas. Dalam metode ini digunakan DPPH sebagai senyawa radikal yang stabil. Keuntungan pengujian dengan metode DPPH dalam menganalisis aktivitas antioksidan adalah metode ini termasuk sederhana, relatif cepat, mudah, sensitif, dan sampel yang dibutuhkan sedikit. Tabel 7. menunjukkan hasil perhitungan persen inhibisi jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) terhadap DPPH pada konsentrasi 10 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm dan 200 ppm berturut-turut 0,79%, 7,43%, 19,99%, 23,78% dan 35,30%. Adanya aktivitas antioksidan juga ditunjukkan dengan adanya perubahan warna pada larutan sampel mulai dari ungu pudar hingga warna kuning dari seri konsentrasi terendah hingga tertinggi. Mekanisme peredaman dan perubahan warna ini disebabkan karena terdapat

senyawa antioksidan yang mampu menyumbangkan atom hidrogen terhadap radikal DPPH dan terjadi reduksi menghasilkan DPPH-H (1,1-difenil-2-pikrilhidrazin) suatu molekul yang stabil (Tristantini et al., 2016: 2).

Persen inhibisi jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) lebih rendah jika dibandingkan vitamin C sebagai antioksidan alami yang sangat kuat. Vitamin C merupakan senyawa pembanding dalam melakukan analisis aktivitas antioksidan dikarenakan penggunaan antioksidan alami lebih aman dan tidak bersifat toksik serta vitamin C memiliki gugus pendonor elektron (Lung & Destiani, 2017: 54-59).

Jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) memiliki kandungan yang berkhasiat sebagai antitoksik, dapat memacu kerja jantung, meningkatkan kadar darah di dalam tubuh, menurunkan tekanan darah dan mencegah adanya kanker (Asegab, 2010: 18). Jamur merang tidak hanya memiliki rasa lezat tetapi juga memiliki khasiat bagi kesehatan. Adapun jamur merang dapat berpotensi sebagai antioksidan alami karena memiliki kandungan polifenol. Senyawa antioksidan ini mampu meredam radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel di dalam tubuh (Saputra, 2014: 12-13). Senyawa fenolik atau amin aromatik yang terdapat pada jamur merang merupakan senyawa antioksidan dapat memutuskan dan memotong perbanyakkan reaksi berantai yang disebabkan oleh radikal bebas (Damayanty & Suromo, 2015: 51).

Keberadaan senyawa fenolik dan tanin menandakan adanya aktivitas antioksidan dari suatu tumbuhan. Senyawa fenolik memiliki peran yang aktif dalam memberikan efek antioksidan. Adanya potensi suatu senyawa fenolik terhadap antioksidan dikarenakan terdapat gugus hidroksil yang terdapat dalam suatu senyawa fenolik (Wirasti, 2019: 2-4). Tanin merupakan suatu senyawa metabolit sekunder dengan khasiat salah satunya berperan sebagai antioksidan

(Malangngi et al., 2012). Senyawa fenolik memiliki potensi sebagai antioksidan dengan aksi kerja memutuskan rantai reaksi antara asam lemak dan radikal bebas (Damayanty & Suromo, 2015: 51).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) memiliki senyawa fenolik dan tanin serta memiliki aktivitas antioksidan sehingga hasil penelitian telah sesuai. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa senyawa fenolik dan tanin berhubungan dengan aktivitas antioksidan.

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu instrumen spektrofotometer UV-Vis. Pada penelitian ini, ekstrak metanol jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis menggunakan panjang gelombang tertentu. Pada penetapan kadar fenolik total, absorbansi dari larutan uji dianalisis pada panjang gelombang maksimum pembanding asam galat yaitu 765 nm (Wirasti, 2019: 3). Adapun pada penetapan kadar tanin total, absorbansi dari larutan uji dianalisis pada panjang gelombang maksimum pembanding asam tanat yaitu 760 nm (Malangngi et al., 2012: 7). Adapun pada analisis aktivitas antioksidan, absorbansi dari larutan uji dianalisis pada panjang gelombang maksimum dari DPPH yaitu 517 nm (Handayani et al., 2014: 89).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Ekstrak metanol jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) memiliki kadar fenolik total sebesar 3,168 mg GAE/g ekstrak.
2. Ekstrak metanol jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) memiliki kadar tanin total sebesar 0,20066 mg TAE/g ekstrak.
3. Ekstrak metanol jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) memiliki aktivitas antioksidan.
4. Ekstrak metanol jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.) memiliki persen inhibisi terhadap DPPH pada konsentrasi 10 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, dan 200 ppm berturut-turut adalah 0,79%, 7,43%, 19,99%, 23,78%, dan 35,30%.
5. Adanya senyawa fenolik dan tanin berhubungan dengan aktivitas antioksidan ekstrak metanol jamur merang (*Volvariella volvacea* Bull.).

B. Saran

Disarankan agar lebih teliti dalam menentukan konsentrasi dan mempersiapkan larutan baku, larutan pembanding dan larutan uji.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. (2011). *Panduan Lengkap Jamur*. Penebar Swadaya.
- Adawiah, Dede Sukandar, A. M. (2015). *Aktivitas Antioksidan dan Kandungan Komponen Bioaktif Sari Buah Nannam*. Jurnal Kimia Valensi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kimia, 1(November).
- Ahmad, A. R., Afrianty, S., Ratulangi, D., Malik, A., & Sm, J. R. M. (2015). *Penetapan Kadar Fenolik dan Flavonoid Total Ekstrak Metanol Buah dan Daun Patikala (Etlingera elatior (Jack))*. 2(1).
- Al-Bukhari, Abu Abdulllah Muhammad bin Ismail, (2010). *Shahih Al-Bukhari (Jilid VII)*. Pustaka As-Sunnah Jakarta.
- Asegab, M. (2010). *Bisnis Pembibitan Jamur Tiram, Jamur Merang, dan Jamur Kuping*. Agromedia Pustaka. Jakarta.
- Damayanty, A. E., & Suromo, L. B. (2015). *Pengaruh pemberian ekstrak jamur merang (volvariella volvacea) terhadap kadar kolesterol total, enzim lplpa 2 dan mda darah*.
- Dhaliwal, J. S., & Singh, H. (2015). *Free Radicals and Antioxidants in Health and Disease*. 2(3), 97–99.
- Dhurhanian. (2018). *Uji Kandungan Fenolik Total dan Pengaruhnya terhadap Aktivitas Antioksidan dari Berbagai Bentuk Sediaan Sarang Semut (Myrmecodia pendens)*. Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia, 5(2), 62–68.
- Dulay, R. M. R., Vicente, J. J. A., Cruz, A. G. Dela, Gagarin, M., Fernando, W., Kalaw, S. P., & Reyes, R. G. (2016). *Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Volvariella volvacea and Schizophyllum commune Mycelia Cultured in Indigenous Liquid Media* <https://doi.org/10.5943/mycosphere/7/2/4>
- Eguchi, et. al. (2015). *Nutrient Composition and Functional Activity of Different Stages in the Fruiting Body Development of Philippine Paddy Straw Mushroom, Volvariella volvacea (Bull. Fr.) Sing.* AENSI Journals, Pages: 54-65. Retrieved from <http://www.aensiweb.com/AEB/>
- Egra, S., Tarakan, U. B., Kusuma, I. W., Mulawarman, U. (2018). *Kandungan Antioksidan Pada Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)*. January 2019. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d1601xx>
- Fatimah, S. (2016). *Pengaruh Konsentrasi Pelarut Untuk Menentukan Paduan U-Zr Dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri Uv-Vis*. 17, 22–33.


- Fithriani, D., Amini, S., & Melanie, S. (2015). *Uji Fitokimia, Kandungan Total Fenol dan Aktivitas Antioksidan Mikroalga Spirulina Sp., Chlorella Sp., dan Nannochloropsis Sp.*, 101–109.
- Ghosh, Debosree. (2015). *Tannins from Foods to Combat Diseases*. International Journal of Pharma Research & Review, May 2015; 4(5):40-44. Department of Physiology, Ramananda College, Bishnupur, Bankura 722122, West Bengal, India. ISSN: 2278-6074.
- Hamdin, C. D. (2019). *Gerakan Self Control Penyakit Degeneratif Di Desa Gondang*. 1(3), 267–271.
- Haeria et al., (2018). *Penentuan Kadar Flavonoid dan Kapasitas Antioksidan Ekstrak Etanol Kulit Batang Kelor (Moringa Oleifera L.) dengan Metode DPPH, CUFAC dan FRAP*. JF FIK UINAM Vol.6 No.2: UINAM. Gowa.
- Handayani, V., Ahmad, A. R., Sudir, M., Etlingera, P., & Sm, R. M. (2014). *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Bunga dan Daun Patikala (Etlingera elatior (Jack) R . M . Sm) Menggunakan Metode DPPH*. UMI. Makassar. 86–93.
- Hasnidar. (2020). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Yayasan Kita Menulis.
- Ichsan et al., (2011). *Karakteristik Pertumbuhan Dan Hasil Jamur Merang (Volvariella Volvacea L.) Pada Media Tanam Dan Konsentrasi Pupuk Biogreen Yang Berbeda*. 171–180.
- Ibnu Katsir, (2018). *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 8)*. Penerbit Insan Kamil Solo.
- Ikalinus, R., Widyastuti, S. K., Luh, N., Setiasih, E., (2015). *Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Kulit Batang Kelor (Moringa oleifera)*. Universitas Udayana. Denpasar. 4(1), 71–79.
- In'am, A & Latipun. (2020.). *New Normal, Kajian Multidisiplin*. UMM.
- Indra et al., (2019). *Fenolik Total, Kandungan Flavonoid, dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Mareme (Glochidion arborescens Blume.)*. 22, 206–212.
- Irawan et al., (2019). *Kalibrasi Spektrofotometer Sebagai Penjaminan Mutu Hasil Pengukuran Dalam Kegiatan Penelitian Dan Pengujian*. 1(2), 1–9.
- Johari, M. A., & Khong, H. Y. (2019). *Total Phenolic Content and Antioxidant and Antibacterial Activities of Pereskia bleo*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, (2014). *Al-Qur'an Terjemahan*. PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Solo.

- Kiswandono. (2011). *Krining Senyawa Kimia dan Pengaruh Metode Maserasi dan Refluks pada Biji Kelor (Moringa Oleifera, Lamk) terhadap Rendemen Ekstrak yang Dihasilkan*. Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan.
- Kumar, S., & Pandey, A. K. (2015). *Free Radicals : Health Implications and their Mitigation by Herbals*. 7(6), 438–457. <https://doi.org/10.9734/BJMMR/2015/16284>.
- Kusnadi, Joni. (2018). *Pengawet Alami untuk Makanan*. Tim UB Press. Malang-Indonesia.
- Lestari. (2020). *Isolasi, Karakterisasi, dan Produksi Inokulan Jamur Merang (Volvariella volvaceae bull. Ex. Fr) sing dari Beberapa Lokasi Budidaya di Karawang*. January 2017. <https://doi.org/10.33661/jai.v2i1.722>
- Lestari, F. (2009). *Bahaya Kimia : Sampling dan Pengukuran Kontaminasi Kimia di Udara*. EGC. Jakarta.
- Lung, S., & Destiani, D. P. (2017). *Uji Aktivitas Antioksidan Vitamin A, C, E Dengan Metode DPPH*. Farmaka Farmaka. 15, 53–62.
- Lusiana. (2015). *Potensi Antioksidasi Ekstrak Etanol Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus)*. 11(1), 1066–1069.
- Maesaroh et al., (2018). *Perbandingan Metode Uji Aktivitas Antioksidan DPPH, FRAP dan FIC Terhadap Asam Askorbat, Asam Galat dan Kuersetin*. 6(2), 93–100.
- Malangngi, L. P., Sangi, M. S., & Paendong, J. J. E. (2012). *Penentuan Kandungan Tanin dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Biji Buah Alpukat (Persea americana Mill.)*. 1(1), 5–10.
- Mendelson, Mel I. (2013). *Learning Bio-Micro-Nanotechnology*. CRC Press. Boca Raton.
- Mindarti, S., & Sinaga, A. (2010). *Budidaya Jamur Merang: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian*.
- Monica, R. & E. (2018). *Penetapan kandungan fenolik total dan uji aktivitas antioksidan fraksi air ekstrak metanol kulit batang falook (sterculia quadrifida r.br)*. March. <https://doi.org/10.36434/scientia.v8i1.119>
- Mukhriani. (2011). *Ekstraksi, pemisahan senyawa, dan identifikasi senyawa aktif*. UINAM. Makassar.
- Mulyani et al., (2018). *Formulasi dan Aktivitas Antioksidan Lotion Ekstrak Daun Suruhan (Peperomia pellucida L.)* 2(1), 111–117.

- Muthukumaran, P., Saraswathy, N., Aswitha, V., Balan, R., & Gokhul, V. B. (2013). *Assessment of total phenolic, flavonoid, tannin content and phytochemical screening of leaf and flower extracts from *Peltophorum pterocarpum* (DC.) Backer ex K. Heyne : a comparative study*. 140–143. <https://doi.org/10.5530/pj.2016.2.7>
- Nazar, M. (2018). *Spektroskopi Molekul*. Jurusan Pendidikan Kimia FKIP Unsyiah.
- Nimse, S. B., & Pal, D. (2015). *RSC Advances*. *RSC Advances*, 5(March), 27986–28006. <https://doi.org/10.1039/C4RA13315C>.
- Ningsih, A. W., Hanifa, I., & Hisbiyah, A. (2020). *Pengaruh Perbedaan Metode Ekstraksi Rimpang Kunyit (*Curcuma domestica*) Terhadap Rendemen dan Skrining Fitokimia*. 2(2), 96–104.
- Nofita, D., & Nurlan, D. S. (2020). *Perbandingan Kadar Fenolik Total Ekstrak Etanol 70 % dengan Ekstrak Air Daun Surian (*Toona sureni* Merr.)*. 12(2).
- Noviyanty, Y., Agustian, Y. (2020). *Identifikasi Dan Penetapan Kadar Senyawa Tanin Pada Ekstrak Daun Biduri (*Calotropis Gigantea*) Metode Spektrofotometri Uv-Vis*. 6(1), 57–64.
- Nuraeni et al., (2019). *Aktivitas Antioksidan dan Identifikasi Senyawa Ekstrak Jamur Lingzhi (*Ganoderma Lucidum*) dengan *Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS)**. Program Studi Kimia FMIPA Universitas Pakuan. Bogor. 19.
- Nurhakim, Y. I. (2018). *Budi Baya Jamur Merang*. BIP Gramedia.
- Oktariana et al., (2011). *Use Of Some Kind Of Waste Plant Growing Media As*. *Xiii*(1), 67–85.
- Ola, P. D., Sandri, M. I., & Ola, A. R. B. (2020). *Jurusan Kimia Fakultas Sains Dan Teknik Universitas Nusa Cendana*. 1(2), 94–107.
- Pratama, M., & Rosalina, V. S. (2019). *Analisis Kadar Tanin Total Ekstrak Etanol Bunga Cengkeh (*Syzygium aromaticum* L.) Menggunakan Metode Spektrofotometri UV-vis*. 6(2), 368–373.
- Purwati & Verryanti (2016). *Aktivitas Antioksidan Dan Evaluasi Fisik Sediaan Masker Gel Peel Off Dari Ekstrak Kulit Terung Ungu (*Solanum melongena* L.)*. 1(2), 10–21.
- Putra, EA. (2015). *Anak Berkesulitan Belajar Di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Kalumbuk Padang (Penelitian Deskriptif Kuantitatif)*. 4(September), 71–76.
- Rahmawati, S. I. (2015). *Jamur Sebagai Obat; Fungi As Medicines*. 1(1), 14–24.


- Saefudin et al., (2013). (*Antioxidan Activity on Six Species of Sterculiaceae Plants*). 31(2), 103–109.
- Santo, A., & Zhu, H. (2016). *Free Radicals: From Health to Disease*. October. <https://doi.org/10.20455/ros.2016.847>
- Saputra, W. (2014). *Budi Daya Jamur Merang*. Agromedia Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Lentera hati.
- Sinaga, M. S. (2011). *Budi Daya Jamur Merang*. Penebar Swadaya.
- Singh, J.P., Kaur, A., Singh, N., Nim, L., Shevkani, K., Kaur, H., and Arora, D.S. (2016). *In vitro antioxidant and antimicrobial properties of jambolan (Syzygium cumini) fruit polyphenols*. LWT, 65 (January): 1025-1030.
- Soenardjo, N. (2017). *Analisis Kadar Tanin Dalam Buah Mangrove Avicennia marina Dengan Perebusan Dan Lama Perendaman Air Yang Berbeda*. 20(November), 90–95.
- Suharjo, E. (2007). *Budi Daya Jamur Merang dengan Media Kardus*. PT Agromedia Jakarta.
- Suharmanto. (2013). *Adaptif Probe Serat Optik Untuk Spektrofotometer Genesys 10s Uv-Vis Generasi Kedua*. 2(1), 2–4.
- Surahmaida. (2019). *Studi Fitokimia Ekstrak Daun Kemangi dan Daun Kumis Kucing Menggunakan Pelarut Metanol*. Indonesian Chemistry And Application Journal (ICAJ) ISSN : 2549-2314; Volume : 3; Number 1, 1, 1–6.
- Tambun et al., (2016). *Pengaruh Ukuran Partikel, Waktu Dan Suhu Pada Ekstraksi Fenol Dari Lengkuas Merah*. 5(4), 53–56.
- Tristantini, D., Ismawati, A., Pradana, B. T., & Gabriel, J. (2016). *Pengujian Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH pada Daun Tanjung (Mimusops elengi L.)*. 1–7.
- Wahyudi, V. A., & Octaviana, L. (2020). *Kajian Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan Jamur Tiram Putih*. 71–87.
- Widyasanti et al., (2016). *Aktivitas Antioksidan Ekstrak Teh Putih (Camellia Sinensis) Dengan Metode Dpph (2,2 Difenil -1- Pikrilhidrazil)*. 1(1), 1–9.
- Werdhasari, A. (2014). *Peran Antioksidan Bagi Kesehatan*. Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Balitbangkes, Kemenkes RI.

- Wijayanti, E. D. (2015). *Perbandingan Kadar Fenolik Total Antara Seduhan Daun Gaharu Dan Kombucha Daun Gaharu (Aquailaria malaccensis)*. 6–11.
- Wirasti. (2019). *Penetapan Kadar Fenolik Total , Flavonoid Total , dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Benalu Petai (Scurrula atropurpurea Dans.) Beserta Penapisan Fitokimia*. 4(1), 1–5.
- Zulaikhah, S. T. (2017). *The Role of Antioxidant to Prevent Free Radicals in The Body*. 8(1), 39–45.



Lampiran 1. Skema Kerja

1. Preparasi sampel





Diserbukkan sampel menggunakan *blender* kemudian lakukan pengayakan pada mesh 40

2. Ekstraksi sampel

Serbuk simplisia sebanyak 150 gram dimasukkan dalam wadah maserasi



Direndam dengan memasukkan 1.125 ml pelarut metanol ke dalam wadah



Ditutup wadah lalu didiamkan selama 3x24 jam pada tempat yang terlindung dari cahaya kemudian dilakukan pengadukan tiap 24 jam sekali



Dilakukan penyaringan ke dalam wadah penampung, direndam kembali ampas dengan metanol (450 ml) dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali, tiap 24 jam pelarut diganti



Dipekatkan ekstrak cair menggunakan *rotary evaporator* ($T = 50^{\circ}\text{C}$) dan dibebaskan metanol dengan cara dipanaskan di atas penangas sehingga dihasilkan ekstrak kental

3. Skrining Fitokimia

a. Uji alkaloid


Disiapkan 0,5 g dari ekstrak dengan penambahan 1 ml HCl 2N serta sebanyak 9 ml aquadest

Dipanaskan selama 2 menit, kemudian dilakukan pendinginan dan penyaringan


Disiapkan 2 tabung reaksi, diisi filtrat sebanyak 0,5 ml, setelah itu tiap tabung reaksi ditambahkan dengan Meyer dan juga Dragendorf sebanyak 2 tetes

Hasil positif alkaloid jika terbentuk endapan/kekeruhan warna putih (Meyer) atau merah (Dragendorf)


b. Uji Flavonoid



c. Uji Saponin



d. Uji Fenol



Hasil positif fenol jika warna hijau atau warnahijau biru

e. Uji Tanin

Disiapkan 1 g ekstrak dalam aquadest, dididihkan lalu dilakukan pendinginan dan penyaringan

Diteteskan degan FeCl_3

Hasil positif tanin akan ditunjukkan jika terdapat coklat kehijauan atau biru kehitaman

4. Penetapan Kadar Fenolik Total

a. Pembuatan dan pengukuran larutan pembanding

Dilarutkan asam galat 10 mg dengan metanol hingga volume menjadi 10 ml (1000 ppm)

Dipipet sebanyak 2,5 ml larutan, diencerkan dengan metanol hingga 25 ml (100 ppm)

Dipipet larutan 1, 2, 3, 4, 5 ml pada larutan lalu ditambahkan metanol hingga volume 10 ml (10, 20, 30, 40, dan 50 ppm)



Dipipet larutan 0,2 ml yang ditambahkan sebanyak 15,8 ml aquadest dan 1 ml *Folin-Ciocalteu*, diamkan (8 menit)



Ditambahkan dalam larutan 3 ml Na_2CO_3 10%, diamkan (2 jam; suhu kamar)



Dilakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-Vis (765 nm) (3 replikasi)

b. Pengujian dan penentuan kadar fenolik total

Ditimbang 10 mg dari ekstrak yang dilarutkan dengan metanol 10 ml sehingga (1000 ppm)



Dipipet larutan sebanyak 0,2 ml dan ditambahkan dengan 15,8 ml aquadest dan sebanyak 1 ml *Folin-Ciocalteu*. Lalu diamkan (8 menit)



3 ml Na_2CO_3 10% ditambahkan pada larutan, didiamkan (2 jam; suhu kamar)



Dilakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-Vis (765 nm) dan dihitung kadar fenolik total (3 replikasi)

5. Penetapan Kadar Tanin Total

a. Pembuatan dan pengukuran larutan pembanding


Disiapkan larutan asam tanat 1000 ppm dengan melarutkan asam tanat 10 mg dengan metanol hingga 10 ml




2,5 ml dipipet lalu dilarutkan dengan metanol sampai 25 ml (100 ppm)



Dipipet larutan 1, 2, 3, 4, 5 ml, ditambahkan metanol hingga volume 10 ml (10, 20, 30, 40, dan 50 ppm)



b. Pengujian dan penentuan kadar tanin total



Dilakukan inkubasi (37°C; 30 menit)

Dilakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-Vis (760 nm) lalu dihitung kadar tanin total (3 replikasi)

6. Analisis Aktivitas Antioksidan

a. Pembuatan dan pengukuran larutan perbandingan


Larutan perbandingan disiapkan, sebanyak 1 mg vitamin C ditimbang lalu ditambahkan dengan 10 ml metanol

Larutan induk 100 ppm


Dilakukan pengenceran (2, 4, 6 dan 8 ppm), dipipet 0,5 ml lalu ditambahkan sebanyak 3,5 ml DPPH

Didiamkan (37°C; 30 menit) lalu dilakukan pengukuran serapan dengan spektrofotometer UV-Vis (517 nm) (3 replikasi)

c. Pembuatan dan pengukuran larutan blanko



d. Pengujian aktivitas antioksidan





Dilakukan inkubasi pada (37°C; 30 menit)



Dilakukan pengukuran menggunakan sepektrofotometer
UV-Vis (517 nm) (3 replikasi)

Lampiran 2. Pembuatan Larutan dan Pereaksi

1. Pengenceran larutan

- a. Larutan asam galat dan asam tanat 10, 20, 30, 40 dan 50 ppm (dalam 10 ml)

Larutan induk : 100 ppm

$$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$$
$$V_1 = \frac{M_2 \cdot V_2}{M_1}$$

- 1) Konsentrasi 10 ppm

$$V_1 = \frac{10 \cdot 10}{100}$$

$$V_1 = 1 \text{ ml}$$

- 2) Konsentrasi 20 ppm

$$V_1 = \frac{20 \cdot 10}{100}$$

$$V_1 = 2 \text{ ml}$$

- 3) Konsentrasi 30 ppm

$$V_1 = \frac{30 \cdot 10}{100}$$

$$V_1 = 3 \text{ ml}$$

- 4) Konsentrasi 40 ppm

$$V_1 = \frac{40 \cdot 10}{100}$$

$$V_1 = 4 \text{ ml}$$

- 5) Konsentrasi 50 ppm

$$V_1 = \frac{50 \cdot 10}{100}$$

$$V_1 = 5 \text{ ml}$$

Hasil perhitungan pada tiap konsentrasi asam galat atau asam tanat dipipet kemudian dicukupkan dengan metanol sebanyak 10 ml untuk memperoleh konsentrasi 10, 20, 30, 40 dan 50 ppm dari asam galat atau asam tanat.

- b. Larutan vitamin C 2, 4, 6 dan 8 ppm (dalam 10 ml)

Larutan induk : 100 ppm

$$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$$

$$V_1 = \frac{M_2 \cdot V_2}{M_1}$$

- 1) Konsentrasi 2 ppm

$$V_1 = \frac{2 \cdot 10}{100}$$

$$V_1 = 0,2 \text{ ml}$$

- 2) Konsentrasi 4 ppm

$$V_1 = \frac{4 \cdot 10}{100}$$

$$V_1 = 0,4 \text{ ml}$$

- 3) Konsentrasi 6 ppm

$$V_1 = \frac{6 \cdot 10}{100}$$

$$V_1 = 0,6 \text{ ml}$$

- 4) Konsentrasi 8 ppm

$$V_1 = \frac{8 \cdot 10}{100}$$

$$V_1 = 0,8 \text{ ml}$$

Hasil perhitungan pada tiap konsentrasi vitamin C dipipet lalu dicukupkan metanol sebanyak 10 ml dan diperoleh konsentrasi 2, 4, 6 dan 8 ppm vitamin C.

- c. Larutan ekstrak jamur merang 10, 50, 100, 150 dan 200 ppm (dalam 10 ml)

Larutan induk : 500 ppm

$$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$$

$$V_1 = \frac{M_2 \cdot V_2}{M_1}$$

1) Konsentrasi 10 ppm

$$V_1 = \frac{10 \cdot 10}{500}$$

$$V_1 = 0,2 \text{ ml}$$

2) Konsentrasi 50 ppm

$$V_1 = \frac{50 \cdot 10}{500}$$

$$V_1 = 1 \text{ ml}$$

3) Konsentrasi 100 ppm

$$V_1 = \frac{100 \cdot 10}{500}$$

$$V_1 = 2 \text{ ml}$$

4) Konsentrasi 150 ppm

$$V_1 = \frac{150 \cdot 10}{500}$$

$$V_1 = 3 \text{ ml}$$

5) Konsentrasi 200 ppm

$$V_1 = \frac{200 \cdot 10}{500}$$

$$V_1 = 4 \text{ ml}$$

Hasil perhitungan pada tiap konsentrasi ekstrak jamur merang dipipet kemudian dicukupkan dengan metanol sebanyak 10 ml untuk memperoleh konsentrasi 10, 50, 100, 150 dan 200 ppm ekstrak jamur merang.

2. Pembuatan Pereaksi

a. FeCl_3 5%

Ditimbang 5 g besi (III) klorida kemudian di larutkan dengan 100 ml aquadest sehingga diperoleh FeCl_3 5%.

b. HCl 2N

Tiap 1000 ml HCl pekat/murni memiliki kadar 36-37%, sehingga :

Diketahui : BJ = 1,1878

Konsentrasi = 37%

Mr HCl = 36,5 g/mol

$$\begin{aligned} \text{Normalitas (N)} &= \frac{1000 \times \text{BJ} \times \text{Konsentrasi}}{\text{Mr} \times 100} \\ &= \frac{1000 \times 1,1878 \times 37}{36,5 \times 100} = 12\text{N} \end{aligned}$$

Jadi, $N_1 \cdot V_1 = N_2 \cdot V_2$

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{V_2 \cdot N_2}{N_1} \\ &= \frac{100 \text{ ml} \cdot 2}{12} \\ &= 16,6 \text{ ml} \end{aligned}$$

HCl pekat 16,6 ml dimasukkan ke dalam labu ukur yang telah berisi 50 ml aquadest. Setelah itu, ditambahkan aquadest sampai tanda batas 100 ml secara perlahan pada dinding gelas beaker untuk mencegah terjadinya perubahan panas yang berlebihan atau letupan.

c. Na_2CO_3 10%

Ditimbang 10 g natrium karbonat kemudian di larutkan dengan 100 ml aquadest sehingga diperoleh Na_2CO_3 10%.

d. Folin-Ciocalteu 1:10

Pereaksi folin-ciocalteu dibuat dengan melarutkan 100 g sebanyak natrium tungstat dan sebanyak 25 g natrium molibdat dengan 700 ml aquadest. Dilakukan pengasaman menggunakan HCl pekat sebanyak 50 ml dan sebanyak 50 ml asam fosfat 85%. Kemudian dididihkan selama 10 jam dan didinginkan lalu ditambahkan 150 g lithium sulfat sehingga diperoleh pereaksi folin berwarna kuning terang. Pereaksi folin-ciocalteu

perbandingan 1:10 dibuat dengan cara mengambil 1 ml folin-ciocalteu kemudian dicampurkan dengan aquadest 10 ml.

e. DPPH 50 ppm (BM = 394,32 g/mol)

$$\text{Konsentrasi larutan} = \frac{\text{Bahan yang akan ditimbang (x)}}{\text{Volume larutan}}$$

$$50 \text{ ppm} = \frac{x}{100 \text{ ml}}$$

$$\frac{50 \text{ mg}}{1000 \text{ ml}} = \frac{x}{100 \text{ ml}}$$

$$50 \text{ mg} \cdot 100 = 1000 \cdot x$$

$$x = \frac{5000 \text{ mg}}{1000} = 5 \text{ mg}$$

Sehingga, Diketahui BM = 394,32 g/mol

$$n = \frac{\text{massa}}{\text{BM}} = \frac{5 \text{ mg}}{394,32} = 0,012 \text{ mmol}$$

$$M = \frac{n}{v} = \frac{0,012 \text{ mmol}}{0,1 \text{ L}} = 0,12 \text{ mM atau } 0,1 \text{ mM}$$

Ditimbang 5 mg DPPH kemudian ditambahkan 100 ml metanol kemudian dilarutkan hingga homogen.


Lampiran 3. Perhitungan Rendamen Ekstrak

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{Bobot ekstrak (gram)}}{\text{Bobot simplisia (gram)}} \times 100 \%$$

$$= \frac{15,843 \text{ gram}}{150 \text{ gram}} \times 100 \%$$

$$= 10,562\%$$

Lampiran 4. Perhitungan Kadar Fenolik Total



Gambar 9. Kurva Standar Asam Galat

Kadar Ekuivalen :

Diketahui : Abs. Ekstrak = 0.1425

$$y = 0.0007x + 0.0316$$

$$0.1425 = 0.0007x + 0.0316$$

$$x = \frac{0.1425 - 0.0316}{0.0007}$$

$$x = \frac{0.1109}{0.0007}$$

$$x = 158.428 \text{ mg/L}$$

Kadar Fenolik Total :


$$\text{Total Fenolik} = \frac{C \times V \times fP}{g}$$

$$= \frac{158.428 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 0.0002 \text{ L} \times 1}{0.01 \text{ g}}$$

$$= \frac{0.03168 \text{ mg}}{0.01 \text{ g}}$$

$$= 3,168 \text{ mg GAE/g ekstrak}$$

Lampiran 5. Perhitungan Kadar Tanin Total



Gambar 10. Kurva Standar Asam Tanat

Kadar Ekuivalen :

Diketahui : Abs. Ekstrak = 0.0970

$$y = 0.003x + 0.0368$$

$$0.0970 = 0.003x + 0.0368$$

$$x = \frac{0.0970 - 0.0368}{0.003}$$

$$x = \frac{0.0602}{0.003}$$

$$x = 20.066 \text{ mg/L}$$

Kadar Tanin Total :

$$\text{Total Tanin} = \frac{C \times V \times fP}{g}$$

$$= \frac{20.066 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 0.0001 \text{ L} \times 1}{0.01 \text{ g}}$$

$$= \frac{0.0020066 \text{ mg}}{0.01 \text{ g}}$$

$$= 0.20066 \text{ mg TAE/g ekstrak}$$

$$= 0,20066 \text{ mg TAE/g ekstrak}$$

Lampiran 6. Perhitungan % Inhibisi Ekstrak

Tabel 9. Hasil Pengukuran Absorbansi Blanko DPPH

Blanko	Absorbansi	Absorbansi Rata-Rata
DPPH	1,2470	1,2475
	1,2473	
	1,2482	

Tabel 10. Hasil Pengukuran Absorbansi Jamur Merang (*Volvariella volvacea* Bull.) terhadap DPPH

Konsentrasi	Absorbansi			Absorbansi Rata-Rata	% Inhibisi
10 ppm	1,2379	1,2371	1,2377	1,2376	0,79%
50 ppm	1,1540	1,1549	1,1553	1,1547	7,43%
100 ppm	0,9978	0,9975	0,9989	0,9981	19,99%
150 ppm	0,9409	0,9403	0,9413	0,9508	23,78%
200 ppm	0,8062	0,8065	0,8086	0,8071	35,30%

Perhitungan % inhibisi :

a. 10 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{1.2475 - 1.2376}{1.2475} \times 100\%$$

$$= 0,79\%$$

b. 50 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{1.2475 - 1.1547}{1.2475} \times 100\%$$

$$= 7,43\%$$

c. 100 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{1.2475 - 0.9981}{1.2475} \times 100\%$$

$$= 19,99\%$$

d. 150 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{1.2475 - 0.9508}{1.2475} \times 100\%$$

$$= 23,78\%$$

e. 200 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{1.2475 - 0.8071}{1.2475} \times 100\%$$

$$= 35,30\%$$

Lampiran 7. Perhitungan % Inhibisi Vitamin C

Tabel 11. Pengukuran Absorbansi Vitamin C terhadap radikal DPPH

Konsentrasi	Absorbansi			Absorbansi Rata-Rata	% Inhibisi
2 ppm	0,8214	0,8216	0,8215	0,8215	34,14%
4 ppm	0,5752	0,5748	0,5747	0,5749	53,91%
6 ppm	0,2578	0,2574	0,2581	0,2578	79,33%
8 ppm	0,0453	0,0454	0,0450	0,0452	96,37%

Perhitungan % inhibisi :

a. 2 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{1.2475 - 0.8215}{1.2475} \times 100\%$$

$$= 34,14\%$$

b. 4 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{1.2475 - 0.5749}{1.2475} \times 100\%$$

$$= 53,91\%$$

c. 6 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{1.2475 - 0.2578}{1.2475} \times 100\%$$

$$= 79,33\%$$

d. 8 ppm


$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{1.2475 - 0.0452}{1.2475} \times 100\%$$

$$= 96,37\%$$

Lampiran 8. Gambar Penelitian



Gambar 11. Sampel Jamur Merang (*Volvariella volvacea* Bull.)




Gambar 12. Ekstrak Jamur Merang (*Volvariella volvacea* Bull.)



Gambar 13. Pengayakan Sebuk Simplisia dengan Ayakan Mesh 40



Gambar 14. Ekstraksi Sampel dengan Metode Maserasi



Gambar 15. Hasil Skrining Fitokimia



Gambar 16. Hasil Penetapan Kadar Fenolik Total




Gambar 17. Hasil Penetapan Kadar Tanin Total



Gambar 18. Hasil Analisis Aktivitas Antioksidan pada Ekstrak



Gambar 19. Pembanding Vitamin C



Gambar 20. Proses Analisis Sampel Uji dengan Spektrofotometer UV-Vis

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Khairunnisa, kerab disapa Nisa lahir di Jakarta 16 Agustus 1999. Peneliti adalah anak sulung dari tiga bersaudara dari pasangan Hasyim, S.Pd. I dan Anis. Peneliti berdarah Betawi-Massenrempulu. Asal Peneliti dari Dusun Gandeng Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Peneliti memulai pendidikan di jenjang sekolah dasar tepatnya di MI JAMIATULKHAIR, Tangerang-Banten. Namun karena ayah dan ibu peneliti yang memutuskan untuk menetap di kampung halaman ayah jadi peneliti pindah sekolah di SD Negeri 122 Pangbuluran. Merupakan suatu hal yang mengasyikkan bisa berbaur dengan kenalan baru dan bahasa yang baru pula kemudian peneliti melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di MTs Negeri 1 Enrekang. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas tepatnya di MAN Enrekang. Setelah menempuh pendidikan di beberapa jenjang tersebut, dengan izin Allah SWT. maka peneliti menempuh pendidikan S1 di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, meskipun tidak sesuai harapan awal peneliti yang ingin menempuh pendidikan di Jurusan Kedokteran. Tetapi peneliti yakin bahwa takdir itu adalah yang terbaik menurut Allah SWT.. Hobi peneliti menulis dan merangkai puisi, entah sejak kapan peneliti merasa jatuh hati kepada puisi. Puisi bagi Peneliti adalah obat. Motto peneliti adalah *“The Principle has no requirements, Then stand on principle or not stand at all”*. Peneliti bercita-cita menjadi apoteker sukses dunia akhirat hingga suatu saat nanti terangkai nama Apt. Khairunnisa, S. Farm.

Peneliti ingin memberikan kado terindah kepada sosok luar biasa yaitu orang tua peneliti dengan melihat peneliti menjadi sukses kelak, begitupun orang disekitar peneliti dengan mengharapkan ridha-Nya, *Aamiin allahumma aamiin*.