

STUDI LITERATUR

AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK BIJI JINTAN HITAM (*Nigella sativa* L.) TERHADAP BEBERAPA BAKTERI PATOGEN



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

KHARISAH AFIFAH
NIM: 70100117034

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kharisah Afifah
NIM : 70100117034
Tempat/ Tgl. Lahir : Maros, 26 Agustus 1999
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata, Gowa
Judul : Studi Literatur Aktivitas Antibakteri Ekstrak
Biji Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.) terhadap
Beberapa Bakteri Patogen

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 11 November 2021

Penulis,



Kharisah Afifah

NIM: 70100117034

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Studi Literatur Aktivitas Antibakteri Ekstrak Biji Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.) terhadap Beberapa Bakteri Patogen" yang disusun oleh Kharisah Afifah, NIM: 70100117034, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munawasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 11 November 2021 M yang bertepatan dengan 6 Rabiul Akhir 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 11 November 2021
6 Rabiul Akhir 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. (.....)

Sekretaris : Apt. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc. (.....)

Pembimbing I : Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si. (.....)

Pembimbing II : Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si. (.....)

Penguji I : Apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Lomba Sultan, MA. (.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmat yang tiada hentinya dari Allah swt. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai uswatun hasanah, keluarga, para shahabat, tabi'in, tabiut tabi'in dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Skripsi dengan judul “Studi Literatur Aktivitas Antibakteri Ekstrak Biji Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.) terhadap Beberapa Bakteri Patogen” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk materi maupun moril. Untuk itulah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang senantiasa membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini terkhusus kepada orang tua saya, Ayahanda Azikin dan Ibunda Aisyah Rahman yang telah memberikan seluruh kasih dan sayang serta pengorbanan dan dukungan yang luar biasa bagi penulis. Tak lupa pula penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhanis MA., PhD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Wahyuddin, M.Hum, selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
8. Dr. H. Fais Satrianegara, SKM., Mars., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. Apt. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
11. Apt. Syamsuri Sakri, S.Farm., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
12. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku pembimbing pertama yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si., selaku pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., selaku penguji akademik yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
15. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, MA. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.

16. Bapak dan ibu dosen yang ikhlas membagi seluruh ilmunya serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
17. Kepada teman-teman angkatan 2017 (KOVALEN) yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, doa, dan kebersamaan selama ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari bentuk yang sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Demikianlah skripsi ini kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah STW. Aamiin.

Gowa, 11 November 2021

Penyusun,



Kharisah Afifah
NIM: 70100117034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan masalah..... | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| BAB II METODE | 5 |
| 2.1 Strategi Pencarian Jurnal..... | 5 |
| 2.1.1 <i>Framework</i> Penelitian..... | 5 |
| 2.1.2 Kata Kunci | 7 |
| 2.1.3 <i>Database</i> | 7 |
| 2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi..... | 7 |
| 2.3 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas..... | 8 |
| 2.3.1 Hasil Pencarian dan Seleksi Studi | 8 |
| 2.3.2 Daftar Artikel Hasil Seleksi..... | 9 |
| BAB III HASIL DAN ANALISIS | 10 |
| 3.1 Hasil | 10 |
| 3.2 Analisis | 10 |

| | |
|---|----|
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 15 |
| 4.1 Uraian Tumbuhan..... | 15 |
| 4.2 Ekstraksi..... | 20 |
| 4.3 Antibakteri..... | 22 |
| 4.4 Aktivitas Antibakteri Ekstrak Biji Jintan Hitam | 27 |
| 4.5 Tinjauan Islam..... | 49 |
| BAB V PENUTUP..... | 54 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 54 |
| 5.2 Saran..... | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |
| LAMPIRAN..... | 62 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 69 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. <i>Framework</i> Penelitian..... | 5 |
| Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi..... | 7 |
| Tabel 3. Hasil Penelusuran Literatur..... | 8 |
| Tabel 4. Daftar Artikel Hasil Seleksi..... | 9 |
| Tabel 5. Hasil Analisis Artikel..... | 10 |
| Tabel 6. Komposisi Umum dari <i>Nigella sativa seeds</i> | 18 |
| Tabel 7. Kategori Diameter Zona Hambat..... | 25 |
| Tabel 8. Bakteri Patogen yang dihambat oleh Ekstrak Biji Jintan Hitam..... | 34 |
| Tabel 9. Kekuatan Aktivitas Antibakteri Ekstrak Biji Jintan Hitam..... | 38 |
| Tabel 10. Senyawa Aktif Sebagai Antibakteri..... | 40 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Kerangka Penelitian | 6 |
| Gambar 2. <i>Nigella sativa</i> L. flower | 15 |
| Gambar 3. <i>Nigella sativa</i> L. seeds | 16 |
| Gambar 4. Struktur Kimia Bahan Aktif dari Minyak <i>Nigella sativa</i> seeds. | 19 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Hasil Pencarian <i>Database Pubmed</i> | 62 |
| Lampiran 2. Hasil Pencarian <i>Database Sciencedirect</i> | 63 |
| Lampiran 3. Hasil Pencarian <i>Database Google scholar</i> | 64 |
| Lampiran 4. Foto Jurnal | 66 |



ABSTRAK

Nama : Kharisah Afifah
Nim : 70100117034
Judul : Studi Literatur Aktivitas Antibakteri Ekstrak Biji Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.) terhadap Beberapa Bakteri Patogen

Resistensi bakteri terhadap antibiotik masih menjadi masalah global yang serius, dibutuhkan beberapa upaya untuk mengurangi masalah tersebut, salah satunya yaitu penemuan senyawa obat baru yang berasal dari bahan alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak biji jintan hitam (*Nigella sativa* L.), bakteri yang dapat dihambat dan senyawa aktif yang berperan sebagai antibakteri. Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan metode PICO, penelusuran artikel/pustaka secara *on-line* menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi dengan kata kunci “*Antibacterial activity of Nigella sativa seed*” dan “*Antimicrobial activity of Nigella sativa seed*” pada 3 *database/searchengine* yaitu *Pubmed*, *Sciencedirect*, dan *Google scholar*. Hasil analisis 5 artikel yang memenuhi kriteria inklusi menunjukkan bahwa ekstrak biji jintan hitam memiliki spektrum aktivitas luas (*broad spectrum*) dalam menghambat pertumbuhan beberapa bakteri patogen diantaranya bakteri gram positif; *Staphylococcus aureus*, *Methicillin-resistant Staphylococcus aureus* (MRSA), *Streptococcus pneumonia*, *Enterococcus faecalis* dan bakteri gram negatif; *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebseilla pneumoniae*, *Proteus mirabilis*. Kekuatan aktivitas antibakteri yang dihasilkan diantaranya sangat kuat (*very strong*) menghambat bakteri *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebseilla pneumoniae*, *Proteus mirabilis* pada konsentrasi (75µg/well), *Methicillin-resistant Staphylococcus aureus* (MRSA) pada konsentrasi (1%) dan kuat (*strong*) menghambat bakteri *Escherichia coli* (75µg/well), *Streptococcus pneumonia* (30mg/ml), dan *Enterococcus faecalis* (100µl/well). Senyawa aktif yang berperan sebagai antibakteri diantaranya adalah *Thymoquinone*, *thymol*, *p-cymene*, senyawa fenolik, dan senyawa flavonoid.

Kata kunci: antibakteri, ekstrak tumbuhan, biji jintan hitam, *habbatussauda*

ABSTRACT

Name : Kharisah Afifah
Reg.Number : 70100117034
Title : *Study Literature Antibacterial Activity of Black Cumin Seed Extract (Nigella sativa L.) Against Several Pathogenic Bacteria*

Antimicrobial resistance is still a serious global problem, several efforts are needed to reduce the problem, one of which is the discovery of new medicinal compounds derived from natural ingredients. This study aims to determine the antibacterial activity of black cumin seed extract (Nigella sativa L.), pathogenic bacteria that can inhibited and find active compounds that act as antibacterial. This study is a literature study using PICO method by searching on-line articles/journal using inclusion and exclusion criteria with the keywords “Antibacterial activity of Nigella sativa seed” and “Antimicrobial activity of Nigella sativa seed” in 3 databases/search engines among others are Pubmed, Sciencedirect, and Google Scholar. The results of 5 inclusion articles that analysis showed that black cumin seed extract had a broad spectrum activity in inhibiting several pathogenic bacteria including gram-positive bacteria; Staphylococcus aureus, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Streptococcus pneumonia, Enterococcus faecalis and gram-negative bacteria; Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebseilla pneumoniae, Proteus mirabilis. The strength of the antibacterial activity was very strong on Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebseilla pneumoniae, Proteus mirabilis at a concentration (75 µg/well), Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) bacteria at a concentration (1 %) and strong on Escherichia coli (75 µg/well), Streptococcus pneumonia (30 mg/ml), and Enterococcus faecalis (100µl/well). Active compounds that act as antibacterials include thymoquinone, thymol, p-cymene, phenolic compounds, and flavonoid compounds.

Keywords: antibacterial, plant extract, Nigella sativa seed, habbatussauda

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit infeksi masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting, khususnya di negara berkembang. Penyakit infeksi dapat disebabkan oleh mikroorganisme patogen, seperti bakteri, virus, parasit atau jamur. Infeksi adalah masuknya bakteri atau mikroorganisme patogen ke dalam tubuh yang mampu menyebabkan sakit. Menurut WHO (*World Health Organization*) (2014) setiap tahun infeksi menyebabkan kematian pada 3,5 juta orang yang sebagian besar terdiri dari anak-anak miskin dan anak-anak tertinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah (Solin et al., 2019).

Pemberian antibiotika merupakan pengobatan utama dalam penatalaksanaan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Sejak ditemukannya lebih dari 70 tahun yang lalu, antibiotik merupakan obat yang diketahui telah menyelamatkan jutaan umat di dunia. Antibiotik memiliki kontribusi yang signifikan dalam membatasi morbiditas dan mortalitas. Begitu banyak penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri seperti mikobakterium, stafilokokus, streptokokus, enterokokus dan sebagainya dapat diobati dengan menggunakan antibiotik. Tidak hanya itu, antibiotik juga digunakan untuk mencegah munculnya infeksi khususnya pada pasien paska operasi. Kemampuan antibiotik dalam mengatasi maupun mencegah penyakit infeksi menyebabkan penggunaannya mengalami peningkatan yang luar biasa. Bahkan antibiotik digunakan secara tidak tepat atau tidak rasional untuk penyakit yang tidak perlu dan terdapat kecenderungan antibiotik dibeli bebas atau tanpa resep dokter. Akibatnya telah terjadi perkembangan bakteri yang resisten terhadap antibiotik (Desrini, 2015).

Resistensi bakteri terhadap antibiotik telah menjadi masalah global yang serius. Setiap tahunnya ditemukan sekitar 440 ribu kasus baru TB-MDR (*Tuberculosis-Multi Drug Resistance*) dan menyebabkan 150 ribu kematian di seluruh dunia. Diperkirakan 25 ribu orang di Eropa meninggal akibat infeksi yang disebabkan bakteri yang multiresisten. Sekitar 2 juta orang di Amerika Serikat terinfeksi oleh bakteri yang resisten terhadap antibiotik setiap tahunnya dan paling sedikit 23.000 orang meninggal tiap tahunnya akibat infeksi tersebut (Desrini, 2015). Studi yang dilakukan oleh J.O'Neill (2014) dengan sumber data WHO (*World Health Organization*) memperkirakan resistensi antimikroba pada tahun 2050 akan terus mengalami peningkatan dan menyebabkan 10 juta jiwa meninggal tiap tahunnya (Neill, 2014).

Hasil Penelitian *Antimicrobial Resistance in Indonesia, Prevalence and Prevention* (AMRIN Study) yang merupakan penelitian kolaborasi Indonesia dan Belanda di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan RSUP Dr. Kariadi Semarang pada tahun 2001-2005 menunjukkan terdapat bakteri multi-resisten, seperti MRSA (*Methicillin Resistant Staphylococcus aureus*) dan bakteri penghasil ESBL (*Extended Spectrum Beta Lactamases*). Infeksi oleh bakteri yang resisten terhadap antibiotik akan membahayakan nyawa pasien oleh karena infeksiya menjadi sulit diobati dan berpengaruh pada biaya pelayanan kesehatan. Biaya kesehatan akan menjadi lebih tinggi oleh karena kesakitan yang lebih lama dan masa rawat di rumah sakit menjadi lebih lama (Desrini, 2015).

Resistensi bakteri terhadap antibiotik telah menjadi salah satu masalah global yang sedang dihadapi baik pada negara berkembang maupun negara maju oleh karena itu dibutuhkan beberapa tindakan untuk mengurangi masalah ini. Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah mengontrol penggunaan antibiotik, mengembangkan penelitian untuk mendalami mekanisme resistensi

secara genetik, serta menggiatkan penemuan obat baru baik sintetik maupun yang berasal dari alam (Slipranata et al., 2016).

Penemuan berbagai senyawa obat baru dari bahan alam semakin memperjelas peran penting metabolit sekunder tanaman sebagai sumber bahan baku obat. Masyarakat Indonesia sendiri sudah mengenal penggunaan obat tradisional dari pemanfaatan tumbuh-tumbuhan sejak zaman dahulu. WHO (*World Health Organization*) merekomendasi penggunaan obat tradisional dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, karena obat tradisional memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit dari pada obat modern (Bustanussalam, 2016).

Salah satu tanaman yang ditengarai memiliki aktivitas antibakteri adalah biji jintan hitam (*Nigella sativa* L.). Biji jintan hitam atau *habbatussauda* dipercaya memiliki banyak sekali khasiat dalam pengobatan. Biji jintan hitam atau yang juga dikenal dengan sebutan “*black cumin*” adalah tanaman herba tahunan yang termasuk dalam keluarga *Ranunculaceae*. Tanaman ini berasal dari daerah laut mediterania. Biji *N. sativa* dipercaya dapat menjaga kesehatan manusia dan dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit salah satunya mengobati berbagai infeksi bakteri. Secara tradisional biji ini sering digunakan oleh masyarakat khususnya di Timur Tengah dan beberapa negara Asia (Sulistiawati & Radji, 2014).

Pengobatan secara tradisional memerlukan riset ilmiah untuk dapat dipertanggung jawabkan, seperti penelitian toksikologi, farmakologi, dan identifikasi serta isolasi senyawa kimia aktif yang terdapat dalam tumbuhan (Iien et al., 2020). Berbagai penelitian farmakologis dari tanaman ini telah dilakukan untuk menguji berbagai aktivitas dari biji jintan hitam salah satunya adalah aktivitas antibakterinya. Untuk itulah peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian literatur untuk membahas mengenai aktivitas antibakteri dari biji jintan hitam dari berbagai

penelitian sebelumnya agar dapat menjadi referensi apakah biji jintan hitam dapat menjadi sumber alternatif obat baru yang efektif khususnya sebagai antibakteri melihat kasus resistensi antibakteri yang masih menjadi permasalahan global yang cukup serius.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apa sajakah bakteri patogen yang dapat dihambat pertumbuhannya dari ekstrak biji jintan hitam (*Nigella sativa* L.)?
- 1.2.2 Bagaimana kekuatan aktivitas antibakteri yang dari ekstrak biji jintan hitam (*Nigella sativa* L.)?
- 1.2.3 Apakah senyawa aktif dari ekstrak biji jintan hitam (*Nigella sativa* L.) yang berperan dalam menghambat bakteri patogen?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas antibakteri dari ekstrak biji jintan hitam (*Nigella sativa* L.), bakteri yang dapat dihambat dari ekstrak biji jintan hitam (*Nigella sativa* L.) dan senyawa aktif yang berperan sebagai antibakteri dalam ekstrak biji jintan hitam (*Nigella sativa* L.).

BAB II METODE

2.1 Strategi Pencarian Jurnal

Jenis penelitian ini digunakan penelitian deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Metode studi literatur merupakan suatu metode penelitian untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan interpretasi terhadap hasil penelitian yang sejenis untuk menjawab pertanyaan penelitian, topik tertentu atau fenomena yang sedang menjadi perhatian. Tujuan penggunaan studi kualitatif deskriptif adalah untuk mengungkapkan atau memperoleh informasi dari data penelitian secara menyeluruh, luas, dan mendalam (Siswanto, 2012).


2.1.1. Framework Penelitian

Pencarian dan analisis pustaka pada penelitian ini dilakukan berdasarkan metode PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) sebagai berikut.

Tabel 1. Framework penelitian

| P | I | C | O |
|---|---|---|---|
| Population | Intervention | Comparison | Outcome |
| Ekstrak biji jintan hitam (<i>Nigella sativa</i> L.) | Metode ekstraksi, metode pengujian, konsentrasi ekstrak yang digunakan, bakteri uji, dan kandungan senyawa ekstrak. | Kontrol positif menggunakan antibiotik sintetik dan kategori daya hambat termasuk (sangat kuat, kuat, sedang, lemah). | Bakteri patogen yang dapat dihambat, kekuatan aktivitas antibakteri yang dihasilkan, dan senyawa aktif yang memiliki aktivitas antibakteri dalam ekstrak biji jintan hitam (<i>Nigella sativa</i> L.). |

Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan berdasarkan kerangka berikut:
(Siswanto, 2012)



Gambar 1. Kerangka Penelitian

2.1.2. Kata kunci yang digunakan

Kata kunci yang digunakan pada pencarian literatur yaitu *Antibacterial activity of Nigella sativa seed* dan *Antimicrobial activity of Nigella sativa seed*.

2.1.3. Data-base yang digunakan

Database yang digunakan dalam pencarian literatur ini adalah *PubMed*, *Science direct* dan *Google Scholar*.

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Jurnal

Kriteria yang digunakan dalam pencarian dan pengumpulan jurnal/ artikel disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

| Kriteria Inklusi | Kriteria Eksklusi |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Rentang waktu publikasi minimal 10 tahun terakhir (2011-2021) 2. Berbahasa Inggris 3. Subjek penelitian yaitu ekstrak biji jintan hitam (<i>Nigella sativa</i> L.) 4. Tipe jurnal termasuk <i>original research article</i> 5. Kriteria jurnal memiliki <i>International Standard Serial Number (ISSN)/ Digital Object Identifier (DOI)</i> 6. Ketersediaan naskah full text/ open acces 7. Tema pada artikel adalah aktivitas antibakteri dari ekstrak biji jintan hitam (<i>Nigella sativa</i> L.) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode kerja (ekstraksi dan pengujian) yang disajikan tidak jelas. 2. Artikel tidak dapat memenuhi <i>Framework</i> penelitian berupa (<i>Population, Intervention, Comparison, Outcome</i>) yang diangkat. 3. Adanya duplikasi artikel pada database pencarian. |

2.3 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas

2.3.1 Hasil pencarian dan seleksi studi

Hasil penelusuran literatur disajikan pada tabel di bawah ini yang memuat database, kata kunci, dan jumlah artikel:

Tabel 3. Hasil Penelusuran Literatur

| Data-base | Kata Kunci | Jumlah artikel | | |
|--|--|----------------|---------|-------|
| | | Inklusi | Ekslusi | Akhir |
| PubMed | <i>Antibacterial activity of Nigella sativa seed</i> | 30 | 26 | 1 |
| | <i>Antimicrobial activity of Nigella sativa seed</i> | 59 | 58 | 0 |
| Science direct | <i>Antibacterial activity of Nigella sativa seed</i> | 65 | 64 | 1 |
| | <i>Antimicrobial activity of Nigella sativa seed</i> | 70 | 70 | 0 |
| Google Scholar | <i>Antibacterial activity of Nigella sativa seed</i> | 125 | 122 | 2 |
| | <i>Antimicrobial activity of Nigella sativa seed</i> | 331 | 330 | 1 |
| Total pustaka yang akan dianalisis dan dibahas | | | | 5 |

2.3.2 Daftar artikel hasil pencarian

Artikel hasil pencarian yang telah diseleksi disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Daftar Artikel Hasil Seleksi

| No | Judul | Penulis dan tahun | Nomor ISSN/ DOI | Kriteria jurnal |
|----|---|---------------------------|---|-----------------|
| 1. | <i>Antibacterial activity of Nigella sativa seed in various germination phases on clinical bacterial strains isolated from human patients</i> | (Islam et al., 2012) | ISSN 2141-7474 | Q3 |
| 2. | <i>Nigella sativa seed extract applicability in preparations against methicillinresistant Staphylococcus aureus and effects on human dermal fibroblasts viability</i> | (Gawron et al., 2019) | https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.112135 | Q2 |
| 3. | <i>Phytochemical Screening, Antibacterial Activity and Heavy Metal Analysis of Ethnomedicinal Recipes and Their Sources Used Against Infectious Diseases</i> | (Mahmood et al., 2019) | https://doi.org/10.3390/plants8110454 | Q1 |
| 4. | <i>Development of Novel Topical Cosmeceutical Formulations from Nigella sativa L. with Antimicrobial Activity against Acne-Causing Microorganisms</i> | (Nawarathne et al., 2019) | https://doi.org/10.1155/2019/5985207 | Q2 |
| 5. | <i>Chemical Composition and In vitro Antibacterial and Cytotoxic Effect of Nigella sativa L. Seed Extract</i> | (Callixte et al., 2021) | https://doi.org/10.15294/kesmas.v16i3.26799 | S2 |

BAB III

HASIL DAN ANALISIS

3.1 Hasil

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka dari 3 database *search engine* *Pubmed*, *Sciencedirect*, dan *Google scholar* diperoleh 5 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan dapat dianalisis.

3.3 Analisis

Hasil analisis artikel disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. Hasil analisis artikel

| No | Judul | Popula- tion | Intervention | Compa- rison | Outcome |
|----|--|---|---|---|---|
| 1. | <i>Antibacterial activity of Nigela sativa seed in various germination phases on clinical bacterial strains isolated from human patients</i> | Biji jintan hitam pada fase perkecambahan hari ke-3,5,7,9, dan ke-11. | <p>Metode ekstraksi: Jenis metode ekstraksi yang digunakan adalah soxhletasi, serbuk 20 gram diekstraksi dengan pelarut metanol selama 48 jam untuk mengekstrak senyawa bioaktif.</p> <p>Metode pengujian: metode pengujian yang digunakan adalah metode difusi sumur agar (<i>agar well diffusion</i>).</p> <p>Konsentrasi ekstrak: 25, 50, 75 µg/ well</p> <p>Bakteri uji: bakteri uji yang digunakan berasal dari isolat klinis manusia diantaranya <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Klebsiella pneumonia</i>, <i>Pseudomonas</i></p> | <p>Kontrol positif antibiotik -Streptomisin -ciprofloxacin -doksisisiklin -ampisilin -ofloksasin</p> <p>Kategori diameter zona hambat • <i>weak</i> ($\leq 5\text{mm}$) • <i>moderate</i> (6-10mm) • <i>strong</i> (11-20mm) • <i>very strong</i> ($\geq 21\text{ mm}$)</p> | <p>Bakteri patogen yang dihambat: <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Klebsiella pneumonia</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Proteus mirabilis</i>.</p> <p>Kekuatan daya hambat: pada konsentrasi 75 µg/ well bakteri dapat dihambat dengan kekuatan -<i>Escherichia coli</i> (strong; $\pm 13\text{mm}$) -<i>Staphylococcus aureus</i> (very strong; $\pm 34\text{mm}$) -<i>Klebsiella pneumonia</i> (very strong; $\pm 28\text{mm}$) -<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (very strong; $\pm 30\text{mm}$)</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| | | | <p><i>aeruginosa</i>, <i>Proteus mirabilis</i>.</p> <p>Kandungan senyawa: hasil uji kualitatif menunjukkan adanya sterol, alkaloid, saponin, fenol, flavonoid, terpenoid, dan glikosida jantung.</p> | | <p><i>-Proteus mirabilis</i> (very strong; ± 30mm)</p> <p>Senyawa aktif yang berperan: Senyawa yang berperan adalah senyawa metabolit sekunder yang diperoleh dari ekstrak metanol pada hari-hari perkecambahan khususnya senyawa fenolik yang terkandung dalam biji jintan hitam.</p> |
| 2. | <p><i>Nigella sativa</i> seed extract applicability in preparations against methicillin resistant <i>Staphylococcus aureus</i> and effects on human dermal fibroblasts viability</p> | <p>Biji jintan hitam (<i>Nigella sativa</i> L.)</p> | <p>Metode ekstraksi: metode ekstraksi yang digunakan adalah ekstraksi superkritis dengan CO₂ sebagai pelarut fluida superkritis</p> <p>Metode pengujian: metode pengujian menggunakan uji difusi sumur agar</p> <p>Konsentrasi ekstrak: 1% dan 10%</p> <p>Bakteri uji: <i>Staphylococcus aureus</i> resisten metisilin</p> <p>Kandungan senyawa: hasil analisis komposisi minyak esensial dan asam lemak menggunakan GC-MS menunjukkan kandungan ekstrak biji jintan hitam diantaranya thymoquinone, p-</p> | <p>Kontrol positif: chlorquinadol, amylmetacreso l dan 2,4 dichlorobenzyl alcohol</p> <p>Kategori diameter zona hambat</p> <ul style="list-style-type: none"> • weak (≤ 5mm) • moderate (6-10mm) • strong (11-20mm) • very strong (≥ 21 mm) | <p>Bakteri patogen yang dihambat: <i>Staphylococcus aureus</i> resisten metisilin</p> <p>Kekuatan daya hambat: pada konsentrasi terkecil 1% dapat menghambat <i>Staphylococcus aureus</i> resisten metisilin (very strong: 37mm)</p> <p>Senyawa aktif yang berperan: Kontribusi dominan dari aktivitas tersebut disebabkan karena adanya thymoquinone dalam minyak esensial biji jintan hitam. Potensinya mirip dengan chlorquinadol dan lebih baik dari</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| | | | cymene, tymol, , α -terpinene, isoterpinolene, p-menthadien-7-ol, longifolene. Adapun komposisi asam lemak diantaranya asam linoleat, asam oleat, asam palmitat, asam stearat. | | kombinasi amylmetacresol dan 2,4 dichlorobenzylalcohol. Selain itu p-cymene dan thymol juga memiliki aktivitas antibakteri. |
| 3. | <i>Phytochemical Screening, Antibacterial Activity and Heavy Metal Analysis of Ethnomedicinal Recipes and Their Sources Used Against Infectious Diseases</i> | Biji jintan hitam (<i>Nigella sativa</i> L.) | <p>Metode ekstraksi: maserasi dengan merendam serbuk dalam air suling.</p> <p>Metode pengujian: difusi sumur agar</p> <p>Konsentrasi ekstrak: 30 mg/ml</p> <p>Bakteri uji: <i>Streptococcus pneumonia</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Klebsiella pneumonia</i></p> <p>Kandungan senyawa: hasil skrinning fitokimia kualitatif menunjukkan ekstrak <i>N.sativa</i> mengandung alkaloid, flavonoid, dan saponin.</p> | <p>Kontrol positif antibiotik Ciprofloxacin</p> <p>Kategori diameter zona hambat</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>weak</i> (≤ 5mm) • <i>moderate</i> (6-10mm) • <i>strong</i> (11-20mm) • <i>very strong</i> (≥ 21 mm) | <p>Bakteri patogen yang dihambat: <i>Streptococcus pneumonia</i> dan <i>Klebsiella pneumonia</i></p> <p>Kekuatan daya hambat: pada konsentrasi 30 mg/ml ekstrak air dapat memberikan hambatan maksimum dengan kekuatan, -<i>Streptococcus pneumonia</i> (very strong; $\pm 20,23$mm) -<i>Klebsiella pneumonia</i> (strong; $\pm 14,30$mm)</p> <p>Senyawa aktif yang berperan: Hasil skrinning kuantitatif menunjukkan kandungan yang paling banyak dari ekstrak ini adalah flavonoid. Flavonoid hadir dalam tanaman obat dengan sifat terapeutik dan antimikroba.</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 4. | <p><i>Development of Novel Topical Cosmeceutical Formulations from Nigella sativa L. with Antimicrobial Activity against Acne-Causing Microorganisms</i></p> | <p>Biji jintan hitam (<i>Nigella sativa L.</i>)</p> | <p>Metode ekstraksi: metode ekstraksi maserasi menggunakan pelarut etil asetat selama 24 jam.</p> <p>Metode pengujian: metode difusi sumur agar</p> <p>Konsentrasi ekstrak: 20mg/ml tiap ekstrak</p> <p>Bakteri uji: <i>Staphylococcus aureus</i></p> <p>Kandungan senyawa: Skrining fitokimia ekstrak menunjukkan terdapat alkaloid, fenolik, dan flavonoid.</p> | <p>Kontrol positif antibiotik: Co-amoxiclav</p> <p>Kategori diameter zona hambat</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>weak</i> (≤ 5mm) • <i>moderate</i> (6-10mm) • <i>strong</i> (11-20mm) • <i>very strong</i> (≥ 21 mm) | <p>Bakteri patogen yang dihambat: <i>Staphylococcus aureus</i></p> <p>Kekuatan daya hambat: pada konsentrasi 20mg/ml ekstrak etil asetat memberikan daya hambat maksimum dengan kekuatan daya hambat pada <i>Staphylococcus aureus</i> (strong; 12 mm)</p> <p>Senyawa aktif yang berperan: Senyawa yang terlibat adalah metabolit sekunder yang dikandung oleh ekstrak yaitu senyawa fenolik dan flavonoid.</p> |
| 5. | <p><i>Chemical Composition and In vitro Antibacterial and Cytotoxic Effect of Nigella sativa L. Seed Extract</i></p> | <p>Biji jintan hitam (<i>Nigella sativa L.</i>)</p> | <p>Metode ekstraksi: metode ekstraksi maserasi dengan pelarut metanol 96% selama 3 hari</p> <p>Metode pengujian: Metode difusi sumur agar</p> <p>Konsentrasi ekstrak: 100 μl ekstrak</p> <p>Bakteri uji: <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Enterococcus faecalis</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i></p> <p>Kandungan senyawa: analisis kualitatif uji</p> | <p>Kontrol positif antibiotik: Gentamycin</p> <p>Kategori diameter zona hambat</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>weak</i> (≤ 5mm) • <i>moderate</i> (6-10mm) • <i>strong</i> (11-20mm) • <i>very strong</i> (≥ 21 mm) | <p>Bakteri patogen yang dihambat: <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Enterococcus faecalis</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i></p> <p>Kekuatan daya hambat: pada konsentrasi ekstrak 100 μl bakteri dapat dihambat dengan kekuatan <i>-Staphylococcus aureus</i> (strong; 16,3 mm)</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>kimia menunjukkan adanya kandungan tannin, steroid, terpenoid, saponin, alkaloid, fenol, dan flavonoid dalam ekstrak.</p> | <p>-<i>Enterococcus faecalis</i> (srong; 14,5mm) -<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (srong; 11,3mm)</p> <p>Senyawa aktif yang berperan: Senyawa metabolit sekunder flavonoid berperan dalam penghambatan bakteri uji.</p> |
|--|--|--|--|--|

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 *Uraian Tumbuhan*

Uraian tumbuhan *Nigella sativa* L. meliputi klasifikasi tumbuhan, nama daerah atau nama lain, morfologi tumbuhan dan komposisi tumbuhan.

4.1.1. *Klasifikasi tumbuhan*

Klasifikasi dari *Nigella sativa* L. yaitu: (Sultana et al., 2015)

Gambar 2. *Nigella sativa* L. flower (Sultana et al., 2015)



Regnum : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Subdivisi : Angiospermae
Kelas : Dicotyledonae
Subkelas : Dialypetalae
Ordo : Ranunculales
Famili : Ranunculaceae
Genus : *Nigella*
Spesies : *Nigella sativa* L.

Nigella sativa L. atau yang dikenal dengan nama jintan hitam adalah tanaman obat yang berasal dari daerah Asia Barat dan Mediterania yang beriklim subtropis. Di daerah beriklim tropis tanaman jintan hitam mampu tumbuh sampai dengan memproduksi biji yaitu di daerah Lembang, Jawa Barat, yang terletak pada ketinggian tempat 1.301,5 meter dpl, jenis tanah andisol, suhu dan kelembaban rata-rata 15-27°C dan 71-96% dengan curah hujan 2.616 mm/tahun. Di tempat asalnya yang beriklim subtropis, jintan hitam ditanam pada ketinggian 530-1.725 m dpl, suhu rata-rata 6,9-17,4°C, kelembaban 45,4-61,7%, curah hujan 140-462,5 mm/tahun (Suryadi, 2010).



Gambar 3. *Nigella sativa* L. seeds (Sultana et al., 2015)

4.1.2. Nama daerah atau nama lain

Nama daerah jintan hitam; *jinten ireng* (Jawa), *jintang le'leng* (Makassar), (Amir, 2016). Nama lain jintan hitam; *black seed/ black cumin* (Inggris), *siyah daneh* (Persia), *kalonji* (India), *habbat-ul-barakah* atau *habbatul-sauda* (Arab) (Suryadi, 2010).

4.1.3. *Morfologi tumbuhan*

Batang tanaman jintan hitam memiliki bentuk tegak, warna hijau, lunak, beralur, berusuk, dan berbulu kasar. Tanaman ini memiliki daun dengan bentuk lonjong panjang sekitar 1,5-2 cm, daun tunggal dengan pangkal dan ujung runcing dan berwarna hijau. Jumlah kelopak bunga umumnya lima, dengan warna putih kebiruan. Biji jintan hitam memiliki bentuk oval warna coklat kehitaman (Rahmi, 2014). Biji jintan hitam berada di dalam buah yang memiliki bentuk bulat telur atau agak bulat. Jintan hitam membentuk kapsul buah yang terdiri dari beberapa biji trigonal berwarna putih. Ketika kapsul buah matang, kapsul akan terbuka dan biji yang ada di dalamnya akan muncul keluar dan berubah menjadi hitam (Hayah, 2010).

4.1.4. *Komposisi tumbuhan*

Biji *Nigella sativa* L. mengandung berbagai komposisi antara lain air, minyak, protein (delapan dari sembilan asam amino esensial), karbohidrat, vitamin, dan mineral. Persentase bahan yang dikandungnya tentunya bervariasi tergantung letak geografis, waktu panen, dan metode budidayanya. Biji jintan hitam terdiri dari minyak lemak (stabil) dan minyak esensial (*atsiri/volatile*) yang bertanggungjawab atas banyaknya keuntungan yang dihasilkan dari biji jintan hitam (*Nigella sativa* L.). Minyak lemak mengandung sejumlah asam lemak tak jenuh (asam linoleat dan oleat) serta asam lemak jenuh dalam jumlah kecil (asam arakidonat dan asam eikosanoat). Selain profil asam lemak biji jintan hitam juga terdiri dari sejumlah besar vitamin E (tokoferol α , β , and γ), retinol (vitamin A), carotenoids (β -*carotene*), dan *thymoquinone* (Amin & Hosseinzadeh, 2016).

Bahan lain yang dikandung dari biji jintan hitam seperti berbagai mineral; potassium, fosfor, kalsium, dan zat besi dalam jumlah besar, serta zinc, magnesium, mangan, selenium, dan tembaga dalam jumlah sedikit. Biji jintan hitam juga


mengandung alkaloid seperti *nigellimine*, *nigellidine*, and *nigellicine* dalam jumlah sedikit. Selain itu jintan hitam juga diketahui mengandung sejumlah besar senyawa pitosterol seperti *β -sitosterol*, *avenasterol*, *stigmasterol*, *campesterol*, dan *lanosterol* (Amin & Hosseinzadeh, 2016). Komposisi umum dari biji jintan hitam disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. Komposisi umum dari *Nigella sativa* L. seeds (Amin & Hosseinzadeh, 2016).

| Constituents | Komposisi kimia | Persentase % (w/w) |
|---------------------------------|--|--------------------|
| Minyak lemak | Asam linoleat (Omega-6), asam oleat, asam palmitoleat, asam linolenat (Omega-3), asam miritoleat, asam dihomolionolenat, asam stearate, asam eikosadienoat, asam miristat, asam arakidik, asam behanat, sterol, tokoferol (α , β , and γ) timokuinon, retinol (vitamin A), karotenoid (β -carotene) | 22-38% |
| Minyak esensial (atsiri) | Timokuinon, p-Cymene, karvakrol, α -Pinene, β -Pinene, longifolenen, t-Anethole, timol, timohidrokuinon, ditimokuinon (nigellone) | 0,40-1,50% |
| Protein | Asam glutamat, arginine, asam aspartate, leusin, glisin, valin, lisin, treonin, fenilalanin, isoleusin, histidine, metionin | 20,8-31,2% |
| Karbohidrat | Glukosa, ramnosa, xylosa, arabinosa | 24,9-40% |
| Mineral | Kalsium, fosfor, besi, kalium, natrium, zink, magnesium, mangan, tembaga, selenium | 3,7-7% |
| Saponin | Hederagenin (melanthigenin), α -Hederin (melanthin) | 0,013% |
| Alkaloid | Nigelicine, Nigellimine, Nigellidine | 0,01% |
| Vitamin dan lainnya | Vitamin A, Thiamin, Riboflavin, Pyridoxine, Niacin, Folacin, Vitamin C | 1-4% |

Kandungan lain yang diekstrak dari minyak atsiri biji jintan hitam yang secara fungsional sangat penting karena volatilitasnya kaya akan 18.4–24% *thymoquinone* (TQ), 46% *monoterpenes* diantaranya *p-cymene*, *α -pinene*, *thymol* (THY), *dithymoquinone* (DTQ, *nigellone*), dan *thymohydroquinone* (THQ).

Diantara komponen yang diisolasi dari minyak atsiri biji jintan hitam yang paling populer yakni *thymoquinone* (TQ) karena telah terbukti sebagai bahan aktif utama dari biji jintan hitam (*Nigella sativa* L.). Struktur kimia bahan utama dari minyak biji jintan hitam diantaranya *thymoquinone*, *dithymoquinone*, *thymohydroquinone*, *p-cymene*, dan *thymol* disajikan dalam gambar di bawah.



Gambar 4. Struktur kimia bahan aktif dari minyak *N.sativa* L.seeds (Amin & Hosseinzadeh, 2016).

Konsentrasi metabolit sekunder dan komposisi dari *N.sativa* L. seeds sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal (genetik, kondisi kesehatan tanaman, umur) dan faktor eksternal (lingkungan, perawatan dengan obat). Faktor internal sangat mempengaruhi sifat dasar dan kelangsungan hidup, sedangkan faktor eksternal sangat mempengaruhi nutrisi atau suplemen yang diperoleh tanaman (Mahfur, 2018).

4.2 Ekstraksi

4.2.1. Pengertian Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses pemisahan dimana senyawa bioaktif dipisahkan dari sampel menggunakan berbagai pelarut baik dengan metode konvensional ataupun metode non-konvensional. Hal ini dilakukan untuk memperoleh senyawa bioaktif yang terdapat dalam produk tanaman (Kumar et al., 2019). Pada ekstraksi prinsip pemisahan didasarkan pada kemampuan atau daya larut analit dalam pelarut tertentu. Dengan demikian pelarut yang digunakan harus mampu menarik komponen analit dari sampel secara maksimal (Leba, 2017).

4.2.2. Jenis-Jenis Ekstraksi

Jenis-jenis metode ekstraksi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

a. Maserasi

Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Metode maserasi cocok untuk senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Mukhriani, 2014).

b. *Ultrasound-Assisted Solvent Extraction*

Ultrasound-Assisted Solvent Extraction merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan menggunakan bantuan *ultrasound* (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz). Wadah yang berisi serbuk sampel ditempatkan dalam wadah *ultrasonic* dan *ultrasound*. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel hingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi (Mukhriani, 2014). Studi menunjukkan bahwa ekstraksi dengan bantuan *ultrasound*

meningkatkan efisiensi ekstraksi dan mempersingkat waktu ekstraksi serta menurunkan volume pelarut yang dibutuhkan (Vankar & Srivastava, 2010).

c. Perkolasi

Perkolasi dan maserasi memiliki persamaan sama-sama tidak memerlukan panas dalam proses ekstraksinya. Alat utamanya adalah perkolator, yaitu sebuah bejana berbentuk silindris atau kerucut terbalik yang dilengkapi dengan lobang atau kran di bagian ujung bawahnya. Proses perkolasi sendiri dilakukan dengan melarutkan senyawa metabolit pada suatu bahan yang akan diekstrak dengan cara mengalirkan pelarut yang sesuai pada matriks bahan atau sampel yang telah dipak atau ditata pada perkolator sehingga senyawa metabolit terikat dengan pelarut dan mengalir keluar dari bejana untuk ditampung (Nugroho, 2017).

d. Soxhlet

Prinsip ekstraksi dengan metode soxhlet adalah dengan mengekstrak bahan yang sudah dihaluskan dan dibungkus pada selembur kertas saring dalam klonsong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor kemudian dimasukkan ke dalam alat soxhlet yang sebelumnya telah ditempatkan pelarut pada labu soxhlet yang berada di bagian bawah. Persis di bawah labu soxhlet tersebut ditempatkan sebuah *heating mantle* atau *hot plate* untuk memanaskan labu soxhlet (Nugroho, 2017).

e. Reflux dan Destilasi Uap

Reflux berarti pelarut yang diputar kembali atau di-*recycle* secara kontinyu melalui pengkondensasian berulang pada sebuah alat kondensor. Pada metode ini bahan yang akan diekstrak direndam pada pelarut dalam sebuah bejana/labu yang biasanya berbentuk bulat yang kemudian ditempatkan pada sebuah pemanas (dapat menggunakan *water bath*, *heating mantle*, atau *hot plate*). Bagian atas labu ada sebuah lubang yang dihubungkan dengan alat pendingin balik (kondensor). Lubang

pada bejana tersebut juga berguna untuk memasukkan dan mengeluarkan bahan, pelarut, maupun hasil ekstraknya (Nugroho, 2017).

Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor (Mukhriani, 2014).

4.3 Antibakteri

4.3.1. Pengertian Antibakteri

Antibakteri adalah zat yang menekan pertumbuhan atau bahkan membunuh bakteri. Antibakteri terbagi atas dua berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu bakteriostatika yang bersifat menghambat pertumbuhan bakteri dan bakterisida yang bersifat membunuh bakteri (Rollando, 2019).

4.3.2. Mekanisme kerja antibakteri

Potensi antimikroba dari beberapa kelas antibiotik menjalankan aksinya dengan menargetkan beberapa bagian penting dari bakteri seperti struktur atau proses metabolismenya. Target penghambatan antibiotik diuraikan di bawah ini: (Ebimieowei & Ibemologi, 2016)

a. Menghambat sintesis dinding sel mikroba

Sebagian besar sel bakteri terbungkus oleh lapisan kaku peptidoglikan atau biasa juga disebut murein yang sifatnya melindungi sel-sel dalam menghadapi tekanan osmotik yang cukup keras di lingkungan dan kondisi dimana sel berada. Untuk mempertahankan hidupnya, bakteri harus memenuhi kebutuhannya untuk mensintesis peptidoglikan; tentunya dengan bantuan aktivitas *Penicillin binding protein* (PBP). Obat-obatan seperti penisilin, karbapenem dan sefalosporin mampu memblokir ikatan silang unit peptidoglikan dengan menghambat pembentukan

ikatan peptida yang dikatalisis oleh PBP (Ebimieowi & Ibemologi, 2016). Beberapa contoh antibiotik yang mekanisme kerjanya menghambat sintesis dinding sel adalah penisilin, sefalosporin, basitrasin, vankomisin, dan sikloserin. Dinding sel terdiri dari polipeptidoglikan, bila sintesis polipeptidoglikan dihambat maka dapat menyebabkan dinding sel lisis oleh karena tekanan osmosis dalam sel yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan diluar sel (Sujati, 2016).

b. Merusak struktur dan fungsi membran sel mikroba

Golongan antibiotik yang merusak membran sel bakteri bersifat spesifik pada setiap kelompok mikroba berdasarkan perbedaan jenis lipid dalam membran selnya. Antibiotik polimiksin misalnya, menyebabkan disintegrasi membran sel bakteri dengan cara efektif mengikat bagian lipid dari lipopolisakarida dalam sel bakteri (Ebimieowi & Ibemologi, 2016).

c. Menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba

Antibiotik menghambat sintesis asam nukleat dengan memblokir replikasi atau menghentikan transkripsi. Replikasi DNA melibatkan pelepasan struktur heliks ganda, suatu proses yang difasilitasi oleh enzim helicase. Adanya mekanisme penghentian aktivitas oleh enzim-enzim tersebut pada bakteri berdampak buruk pada RNA polimerase yang pada gilirannya mencegah sintesis RNA (Ebimieowi & Ibemologi, 2016).

d. Menghambat sintesis protein sel mikroba

Makhluk hidup termasuk bakteri ditentukan oleh jumlah dan jenis protein penyusunnya yang terus diproduksi. Protein bertanggung jawab atas komposisi struktural, proses metabolisme dan fisiologis, dan respons terhadap kondisi yang merugikan, dan beberapa peran lainnya. Mengingat pentingnya protein dalam metabolisme dan proses kehidupan semua organisme hidup, apa pun yang mengganggu proses sintesisnya dalam sel bakteri pada akhirnya akan

melumpuhkan sel; menghambat pertumbuhannya atau bahkan membunuhnya sama sekali. Obat yang menghambat sintesis protein adalah salah satu kelas antibiotik yang paling luas dan dapat dibagi menjadi dua subkelas: inhibitor 50S dan inhibitor 30S (Ebimiewei & Ibemologi, 2016). Antibiotik yang menghambat pembentukan protein, atau mengakibatkan terbentuknya protein yang abnormal dan nonfungsional contohnya seperti aminoglikosida, makrolid, linkomisin, tetrasiklin, dan kloramfenikol (Sujati, 2016).

e. Menghambat metabolisme sel mikroba

Beberapa antibiotik seperti sulfonamid dan trimetoprim telah terbukti menyerupai substrat yang dibutuhkan untuk metabolisme sel bakteri. Mekanisme kerja ini menyebabkan enzim bakteri menempel pada antibiotik daripada substrat normal. Asam folat sangat penting dalam metabolisme asam nukleat (DNA, RNA) dan asam amino dari sel bakteri (Ebimiewei & Ibemologi, 2016). Mikroba membutuhkan asam folat untuk kelangsungan hidupnya. Bila sintesis asam folat dari PABA dihambat oleh antimikroba maka kelangsungan hidupnya akan terganggu. Contoh antibiotik yang menghambat metabolisme sel adalah sulfonamide, trimetoprim, asam p-aminosalisilat (Sujati, 2016).

4.3.3. *Metode pengujian antibakteri*

Aktivitas antibakteri dapat dipelajari menggunakan beberapa metode, yaitu metode dilusi dan metode difusi (Nurhayati et al., 2020).

a. Metode Difusi

Metode difusi adalah metode yang sering digunakan untuk analisis aktivitas antibakteri. Prinsip kerja metode difusi adalah terdifusinya senyawa antibakteri ke dalam media padat dimana mikroba uji telah diinokulasikan (Nurhayati et al., 2020). Pada metode ini dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

1) Metode cakram (*disc diffusion*)

Pada cara ini digunakan suatu cakram kertas saring (paper disc) yang berfungsi sebagai tempat menampung zat antimikroba. Kertas saring tersebut kemudian diletakkan pada lempeng agar yang telah diinokulasi mikroba uji, kemudian diinkubasi pada waktu tertentu dan suhu tertentu, sesuai dengan kondisi optimum dari mikroba uji. Pada umumnya, hasil yang didapat bisa diamati setelah inkubasi selama 18-24 jam dengan suhu 37°C. Hasil pengamatan yang diperoleh berupa ada atau tidaknya daerah bening yang terbentuk disekeliling kertas cakram yang menunjukkan zona hambat pada pertumbuhan bakteri (Prayoga, 2013). Menurut (LIPI, 2020) efektivitas suatu zat antibakteri bisa diklasifikasikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Kategori diameter zona hambat (LIPI, 2020)

| Diameter zona hambat | Kekuatan daya hambat |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ≤ 5 mm | Lemah (<i>weak</i>) |
| 6-10 mm | Sedang (<i>moderate</i>) |
| 11-20 mm | Kuat (<i>strong</i>) |
| ≥ 21 mm | Sangat kuat (<i>very strong</i>) |

2) Metode parit (*ditch-plate technique*)

Suatu lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji dibuat sebidang parit. Parit tersebut berisi zat antimikroba, kemudian diinkubasi pada waktu dan suhu optimum yang sesuai untuk mikroba uji. Hasil pengamatan yang akan diperoleh berupa ada tidaknya zona hambat yang akan terbentuk di sekitar parit (Prayoga, 2013).

3) Metode sumuran (*hole/cup-plate technique*)

Pada lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji dibuat suatu lubang yang selanjutnya diisi dengan zat antimikroba uji. Kemudian setiap lubang itu diisi dengan zat uji. Setelah diinkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai

dengan mikroba uji, dilakukan pengamatan dengan melihat ada atau tidaknya zona hambatan di sekeliling lubang (Prayoga, 2013).

b. Metode Dilusi

Metode dilusi dibagi menjadi 2, yaitu dilusi cair dan padat. Metode dilusi cair digunakan untuk mengukur KHM (kadar hambat minimum) sementara metode dilusi padat digunakan untuk menentukan KBM (kadar bakterisidal minimum) (Fitriana et al., 2020).

1) Dilusi cair/*broth dilution*

Metode dilusi cair merupakan salah satu metode pengujian antimikroba, prosedurnya melibatkan pengenceran dua kali lipat dari agen antimikroba (mis; 1,2,4,8,16,32 mg/ml) (Balouiri et al., 2016). Metode dilusi cair/*broth dilution test* (serial dilution) metode ini mengukur MIC (*minimum inhibitory concentration*) KHM (kadar hambat minimum) dan MBC (*minimum bactericidal concentration*). Prosedur uji ini dilakukan dengan menumbuhkan bakteri murni pada medium cair yang mengandung pengenceran bertingkat suatu agen antibiotika. Nilai KHM ditentukan berdasarkan konsentrasi terendah yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Hambatan pertumbuhan bakteri ditunjukkan dengan media nampak jernih. Penentuan nilai KHM dilakukan dengan menumbuhkan ulang bakteri yang ada di dalam tabung KHM dalam media cair yang tidak ditambahkan antibiotika dan diinkubasi pada suhu 35-37°C selama 18-24 jam. Pada media cair yang tetap terlihat jernih setelah inkubasi ditetapkan sebagai KBM. Metode ini merupakan standar baku dalam pengujian kepekaan antibiotik (Sariadji et al., 2019).

2) Dilusi padat/*Solid dilution*

Metode dilusi padat dilakukan dengan menginokulasi mikroba uji pada media agar yang mengandung agen antimikroba. Keuntungan metode dilusi ini

adalah satu konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji (Fitriana et al., 2020).

4.4 Aktivitas antibakteri ekstrak biji *Nigella sativa*

4.5.1. Bakteri patogen yang mampu dihambat

Bakteri patogen merupakan kelompok bakteri parasit yang menimbulkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan (Padoli, 2016). Bakteri patogen dapat berasal dari bakteri gram positif maupun gram negatif. Bakteri gram positif dan bakteri gram negatif memiliki ciri khasnya masing-masing. Bakteri gram positif memiliki membran plasma tunggal yang dikelilingi dinding sel berupa peptidoglikan dengan tebal (15-80 nm) sedangkan bakteri gram negatif memiliki struktur membran ganda, dinding sel mengandung peptidoglikan (10-15 nm) yang terletak diantara membran luar dan membran plasmanya (Boleng, 2015). Sifat antibiotik dapat dikatakan memiliki spektrum aktivitas yang luas (*broad spectrum*) apabila dapat menghambat bakteri gram positif dan gram negatif (Yuana Agustin, 2014).

Dari hasil analisis artikel dapat diketahui bahwa ekstrak biji jintan hitam memiliki sifat penghambatan dengan spektrum aktivitas luas (*broad spectrum*), karena dapat menghambat bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Berikut dibahas mengenai bakteri patogen yang dihambat.

1. *Staphylococcus aureus*

Bakteri *Staphylococcus aureus* merupakan kelompok bakteri gram positif dengan bentuk kokus. Bakteri ini merupakan bakteri terbanyak penyebab dari infeksi kulit sekunder (Rosalina et al., 2010). Hasil pengujian (Islam et al., 2012) yang menguji biji jintan hitam pada fase perkecambahan hari ke-0,3,5,7,9,11 didapatkan hasil ekstrak biji jintan hitam pada fase perkecambahan yang memiliki aktivitas antibakteri maksimum terhadap bakteri *S. aureus* adalah pada fase

perkecambahan hari ke-5 dimana pada konsentrasi 75µg tiap sumur menghasilkan aktivitas antibakteri dengan diameter zona hambat ±34 mm dikategorikan sangat kuat (*very strong*) berdasarkan kategori diameter zona hambat (LIPI, 2020). Selain itu penghambatannya lebih baik dari semua kontrol positif yang diujikan diantaranya streptomisin (20 mm), ciprofloxacin (16 mm), doksisisiklin(14 mm), ampisilin (18 mm), ofloksasin (24 mm). Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode soxhletasi dengan pelarut metanol. Pengujian dilakukan dengan metode sumur agar dengan konsentrasi ekstrak yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri adalah 75µg tiap sumur.

Penelitian (Nawarathne et al., 2019) ekstrak etil asetat biji jintan hitam dengan konsentrasi 20 mg/ml menunjukkan penghambatan terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* (diameter zona hambat 12 mm) dikategorikan kuat (*strong*). Namun kontrol positif co-amoxiclav masih memiliki diameter zona hambat yang lebih tinggi yakni 31 mm. Metode ekstraksi dilakukan dengan maserasi, dan metode pengujian antibakteri menggunakan metode difusi sumur agar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Callixte et al., 2021) didapatkan hasil bahwa ekstrak metanol biji jintan hitam pada konsentrasi ekstrak tiap sumur diberikan 100µl dapat menghambat strain bakteri *Staphylococcus aureus* dengan diameter zona hambat 16,3 mm termasuk kategori daya hambat kuat (*strong*). Namun penghambatannya masih belum lebih baik dari kontrol positif gentamisin dengan diameter zona hambat yaitu 25,6 mm. Metode ekstraksi digunakan dengan metode maserasi pelarut metanol dan metode pengujian yang digunakan adalah metode sumur agar.

Dari beberapa artikel penelitian yang dianalisis terkait penghambatan ekstrak biji jintan hitam terhadap bakteri *S.aureus* artikel yang menunjukkan hasil penghambatan dengan diameter paling besar terhadap bakteri *S.aureus* yaitu

penelitian (Islam et al., 2012) dimana dengan konsentrasi 75 µg/well dapat menghasilkan aktivitas antibakteri dengan diameter zona hambat ±34 mm (*very strong*) dan jika dibandingkan dengan kontrol positifnya penghambatannya lebih baik dari semua kontrol positif yang diujikan diantaranya antibiotik streptomisin, ciprofloxacin, doksisisiklin, ampicilin, ofloksasin.

2. *Pseudomonas aeruginosa*

Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* merupakan bakteri gram negatif dengan bentuk basil yang merupakan patogen yang bertanggungjawab terhadap sebagian besar penyebab infeksi pneumonia nosokomial (Warganegara, 2017). Penelitian (Islam et al., 2012) yang menguji biji jintan hitam pada fase perkecambahan hari ke-0,3,5,7,9,11 didapatkan hasil ekstrak biji jintan hitam pada fase perkecambahan yang memiliki aktivitas antibakteri tertinggi terhadap bakteri *P.aeruginosa* adalah pada fase perkecambahan hari ke-5 dimana dengan konsentrasi 75µg tiap sumur dapat menghasilkan aktivitas antibakteri dengan diameter zona hambat ±30 mm dikategorikan sebagai daya hambat sangat kuat (*very strong*) selain itu penghambatannya lebih baik dari semua kontrol positif yang diujikan diantaranya streptomisin (16 mm), sedangkan ciprofloxacin, doksisisiklin, ampicilin, dan ofloksasin menunjukkan resistensi. Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode soxhletasi dengan pelarut metanol. Pengujian dilakukan dengan metode difusi sumur agar.

Penelitian (Callixte et al., 2021) didapatkan hasil bahwa ekstrak metanol biji jintan hitam pada konsentrasi 100µl ekstrak dapat menghambat strain bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dengan diameter zona hambat 11,3 mm termasuk kategori daya hambat kuat (*strong*). Sedangkan kontrol positif gentamisin memberikan hasil penghambatan yang lebih tinggi pada *P.aeruginosa* yaitu 19 mm.

Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode maserasi dengan pelarut metanol dan metode pengujian digunakan metode sumur agar.

Dari kedua artikel penelitian yang dianalisis terkait penghambatan ekstrak biji jintan hitam terhadap bakteri *P.aeruginosa* diperoleh artikel yang menunjukkan hasil penghambatan terbesar terhadap bakteri *P.aeruginosa* yaitu penelitian (Islam et al., 2012) konsentrasi 75 μ g ekstrak dapat menghambat pertumbuhan bakteri *P.aeruginosa* dengan diameter zona hambat yang dihasilkan yaitu \pm 30 mm yang dikategorikan sebagai daya hambat sangat kuat (*very strong*) serta lebih baik dari semua kontrol positif diantaranya antibiotik streptomisin, ciprofloxacin, doksisisiklin, ampicilin, ofloksasin.

3. *Escherichia coli*

Bakteri *Escherichia coli* merupakan kelompok bakteri gram negatif berbentuk basil. Bakteri ini merupakan penyebab kedua terbanyak diare setelah rotavirus. Penelitian (Islam et al., 2012) yang menguji biji jintan hitam pada fase perkecambahan hari ke-0,3,5,7,9,11 didapatkan hasil ekstrak biji jintan hitam yang memiliki aktivitas antibakteri tertinggi terhadap bakteri *E.coli* adalah pada fase perkecambahan hari ke-5 dimana pada konsentrasi 75 μ g ekstrak tiap sumur menghasilkan aktivitas antibakteri dengan diameter zona hambat \pm 13 mm dikategorikan daya hambat kuat (*strong*) namun penghambatan ekstrak terhadap bakteri *E.coli* masih di bawah kontrol positif antibiotik streptomisin (16 mm), sedangkan ciprofloxacin, doksisisiklin, ampicilin, ofloksasin resisten terhadap bakteri. Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode soxhletasi dengan pelarut metanol. Pengujian dilakukan dengan metode difusi sumur agar.

4. *Klebsiella pneumoniae*

Bakteri *K.pneumoniae* merupakan bakteri gram negatif dengan bentuk basil/batang. Bakteri ini merupakan salah satu bakteri penyebab pneumonia komunitas

(Tarina & Kusuma, 2017). Hasil pengujian (Islam et al., 2012) yang menguji biji jintan hitam pada fase perkecambahan hari ke-0,3,5,7,9,11 didapatkan hasil ekstrak biji jintan hitam pada fase perkecambahan yang memiliki aktivitas antibakteri tertinggi terhadap bakteri *K.pneumoniae* adalah pada fase perkecambahan hari ke-5 dimana menghasilkan aktivitas antibakteri dengan diameter zona hambat ± 28 mm dikategorikan sebagai daya hambat sangat kuat (*very strong*) selain itu penghambatannya lebih baik dari semua kontrol positif yang diujikan diantaranya streptomisin (12mm), dan antibiotik ciprofloxacin, doksisisiklin, ampisilin, ofloksasin menunjukkan resistensi. Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode soxhletasi dengan pelarut metanol. Pengujian dilakukan dengan metode sumur agar dengan konsentrasi ekstrak yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri adalah 75 μ g tiap sumur.

Penelitian (Mahmood et al., 2019) menggunakan] ekstrak biji jintan hitam dengan pelarut air suling dengan metode ekstraksi maserasi, ekstrak air pada konsentrasi 30mg/ml menunjukkan aktivitas daya hambat maksimum terhadap strain *K.pneumoniae* dengan diameter zona hambat 14,30 mm dikategorikan sebagai daya hambat kuat (*strong*) sedangkan kontrol positif digunakan disk ciprofloxacin menghasilkan diameter zona hambat yang tinggi yaitu 30 mm. metode pengujian dilakukan dengan metode sumur agar.

Dari kedua artikel terkait penghambatan ekstrak biji jintan hitam terhadap strain *K.pneumoniae* diperoleh artikel yang menunjukkan hasil penghambatan terbaik yaitu pada pengujian yang dilakukan oleh (Islam et al., 2012).

5. *Proteus mirabilis*

Bakteri *P.mirabilis* merupakan bakteri gram negatif berbentuk basil. Bakteri ini merupakan salah satu bakteri yang menginfeksi saluran kemih. Bakteri ini merupakan salah satu gram negatif penyebab ISK. ISK yang disebabkan oleh

P.mirabilis bersifat persisten, sulit diterapi dan berakibat fatal (Khairani, 2019). Hasil pengujian (Islam et al., 2012) yang menguji biji jintan hitam pada fase perkecambahan hari ke-0,3,5,7,9,11 didapatkan hasil ekstrak biji jintan hitam pada fase perkecambahan yang memiliki aktivitas antibakteri tertinggi terhadap bakteri *P.mirabilis* adalah pada fase perkecambahan hari ke-5 dimana pada konsentrasi 75 µg ekstrak tiap sumur menghasilkan aktivitas antibakteri dengan diameter zona hambat ±30 mm dikategorikan sebagai daya hambat sangat kuat (*very strong*) selain itu penghambatannya lebih baik dari semua kontrol positif yang diujikan diantaranya streptomisin (18mm), dan antibiotik ciprofloxacin, doksisisiklin, ampisilin, ofloksasin menunjukkan resistensi.. Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode soxhletasi dengan pelarut metanol. Pengujian dilakukan dengan metode sumur agar dengan konsentrasi ekstrak yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri adalah 75µg tiap sumur.

6. *Methicillin-resistant Staphylococcus aureus* (MRSA)

Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) adalah bakteri *Staphylococcus aureus* yang menjadi kebal atau resisten terhadap antibiotik jenis metisilin. MRSA mengalami resistensi karena perubahan genetik yang disebabkan oleh paparan terapi antibiotik yang tidak rasional (Mahmudah et al., 2013).

Penelitian (Gawron et al., 2019) ekstrak superkritis CO₂ biji jintan hitam pada konsentrasi terkecil 1% mampu menghambat bakteri *S. aureus* yang resisten metisilin dengan diameter zona hambat yang dihasilkan yaitu 37 mm yang dikategorikan sebagai daya hambat sangat kuat (*very strong*). Potensi penghambatan terhadap MRSA (*methicillin-resistant Staphylococcus aureus*) sinergis dengan kontrol positif chlorquinaldol dan lebih baik dari kombinasi amylmetacresol dan 2,4dichlorobenzylalcohol. Penelitian (Gawron et al., 2019) menggunakan ekstrak superkritis CO₂ biji jintan hitam dengan perlakuan metode

ekstraksi fluida superkritis menggunakan pelarut CO₂ dengan metode pengujian menggunakan difusi sumur agar.

7. *Streptococcus pneumoniae*

Bakteri *S.pneumoniae* merupakan kelompok bakteri gram positif berbentuk kokus. Bakteri ini merupakan bakteri patogen penyebab *invasive Pneumococcal Disease* (IPD) seperti *pneumoniae*, *otitis media*, dan *meningitis* (Sari et al., 2020).

Penelitian (Mahmood et al., 2019) menggunakan ekstrak biji jintan hitam dengan pelarut air suling dengan metode ekstraksi maserasi, ekstrak air pada konsentrasi 30mg/ml menunjukkan aktivitas daya hambat maksimum terhadap strain *S.pneumoniae* dengan diameter zona hambat 20,23 mm (*very strong*) sedangkan kontrol positif digunakan disk ciprofloxacin dengan diameter zona hambat 33 mm. Metode ekstraksi digunakan metode maserasi dan pengujian dilakukan dengan metode difusi sumur agar.

8. *Enterococcus faecalis*

Bakteri *E. faecalis* adalah bakteri gram positif bentuk kokus, *Enterococcus* pada manusia terkait dengan penyakit mulut, seperti karies, infeksi endodontik, periodontitis, dan peri-implantitis. *E. faecalis* telah sering terlibat dalam kegagalan perawatan endodontik, karena resistensi yang tinggi terhadap obat-obatan endodontik (Syam, 2020). Penelitian (Callixte et al., 2021) didapatkan hasil bahwa ekstrak metanol biji jintan hitam dapat menghambat strain bakteri *Enterococcus faecalis* dengan konsentrasi 100µl diameter zona hambat yang dihasilkan 14,5 mm termasuk kategori daya hambat kuat (*strong*) sedangkan kontrol positif gentamisin memberikan hasil penghambatan pada *E. faecalis* dengan diameter zona hambat yaitu 20,6 mm. Metode pengujian yang digunakan adalah metode sumur agar.

Berikut tabel yang merangkum penghambatan ekstrak biji jintan hitam terhadap beberapa bakteri patogen.

Tabel 8. Bakteri patogen yang dihambat oleh ekstrak biji jintan hitam

| No | Bakteri dan gram | Konsentrasi ekstrak | Metode ekstraksi | Metode pengujian | Diameter zona hambat | Pustaka |
|----|---|---------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1. | <i>Staphylococcus aureus</i> (Gram positif) | 75µg/well | soxhletasi pelarut metanol | difusi sumur agar | ±34 mm | (Islam et al., 2012) |
| | | 20 mg/ml | maserasi pelarut etil asetat | difusi sumur agar | 12 mm | (Nawarathne et al., 2019) |
| | | 100 µl | maserasi pelarut metanol | difusi sumur agar | 16,3 mm | (Callixte et al., 2021) |
| 2. | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Gram negatif) | 75µg/well | soxhletasi pelarut metanol | difusi sumur agar | ±30 mm | (Islam et al., 2012) |
| | | 100µl | maserasi pelarut metanol | difusi sumur agar | 11,3 mm | (Callixte et al., 2021) |
| 3. | <i>Escherichia coli</i> (Gram negatif) | 75µg/well | soxhletasi pelarut metanol | difusi sumur agar | ±13 mm | (Islam et al., 2012) |
| 4. | <i>Klebseilla pneumonia</i> (Gram negatif) | 75µg/well | soxhletasi pelarut metanol | difusi sumur agar | ±28 mm | (Islam et al., 2012) |
| | | 30mg/ml | maserasi pelarut air suling | difusi sumur agar | 14,30 mm | (Mahmood et al., 2019) |
| 5. | <i>Proteus mirabilis</i> (Gram negatif) | 75µg/well | soxhletasi pelarut metanol | difusi sumur agar | ±30 mm | (Islam et al., 2012) |
| 6. | <i>Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)</i> (Gram positif) | Ekstrak 1% | ekstraksi fluida super-kritis pelarut CO ₂ | difusi sumur agar | 37 mm | (Gawron et al., 2019) |
| 7. | <i>Streptococcus pneumonia</i> (Gram positif) | 30 mg/ml | maserasi pelarut air suling | difusi sumur agar | 20,23 mm | (Mahmood et al., 2019) |
| 8. | <i>Enterococcus faecalis</i> (Gram negatif) | 100µl/well | maserasi pelarut metanol | difusi sumur agar | 14,5 mm | (Callixte et al., 2021) |

4.5.2. Pengaruh metode ekstraksi dan metode pengujian terhadap daya hambat ekstrak

1. Metode ekstraksi

Berdasarkan tabel analisis di atas dapat diamati bahwa metode ekstraksi yang digunakan dari beberapa artikel terkait aktivitas antibakteri biji jintan hitam adalah metode ekstraksi soxhletasi dan maserasi. Dapat dilihat bahwa metode ekstraksi soxhletasi menunjukkan aktivitas penghambatan yang lebih besar dibandingkan dengan metode maserasi hal ini dapat diamati dari perbedaan diameter zona hambat yang dihasilkan pada bakteri yang sama. Pada bakteri *Staphylococcus aureus* diameter zona hambat yang dihasilkan ekstrak dengan metode soxhletasi lebih besar dibanding dengan metode ekstraksi maserasi meskipun pada metode soxhletasi konsentrasi yang digunakan lebih kecil yaitu 75µg/well, sedangkan pada metode maserasi ekstrak menggunakan konsentrasi 20mg/ml tetapi diameter zona hambat yang dihasilkan lebih kecil. Begitu juga dengan penghambatan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dan bakteri *Kleibseilla pneumonia*. Hal ini menunjukkan bahwa metode ekstraksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya hambat ekstrak.

Berdasarkan penelitian (Widyaningrum, 2020) yang menguji metode ekstraksi soxhletasi dan maserasi ekstrak *Elephantopus Scaber* L. dalam penghambatan bakteri *Staphylococcus aureus* diperoleh bahwa metode ekstraksi soxhletasi menghasilkan bobot rendemen ekstrak yang lebih besar selain itu hasil pengujian aktivitas antibakteri yang dihasilkan juga lebih baik dibandingkan dengan ekstrak yang diperoleh dengan metode maserasi.

Salah satu parameter mutu ekstrak adalah rendemen ekstrak yang dihasilkan. Rendemen adalah perbandingan antara ekstrak yang diperoleh dengan simplisia awal. Rendemen menggunakan satuan persen (%), semakin tinggi nilai

rendemen yang dihasilkan menandakan nilai ekstrak yang dihasilkan semakin banyak. Metode sokhletasi dapat menghasilkan rendemen ekstrak yang paling baik karena dalam prosesnya menggunakan pemanasan, semakin tinggi suhu ekstraksi akan menyebabkan gerakan molekul semakin cepat, begitu juga dengan adanya sirkulasi (pergerakan) pelarut. Adanya faktor suhu dan sirkulasi pelarut dapat meningkatkan laju perpindahan massa senyawa dari sel tanaman, dengan demikian kontak zat terlarut (solut) dalam sampel dengan pelarut semakin sering dan diperoleh ekstrak yang lebih banyak.

Selain itu rendemen ekstrak yang dihasilkan ternyata juga berpengaruh terhadap jumlah kadar senyawa yang dikandung oleh ekstrak. Berdasarkan penelitian (Puspitasari & Proyogo, 2013) yang menguji kadar fenolik total dari kedua metode ekstraksi yaitu metode sokhletasi dan maserasi. Metode sokhletasi dengan rendemen ekstrak yang banyak menghasilkan kadar fenolik total paling besar. Dari hal ini diketahui bahwa kadar senyawa yang dihasilkan metode sokletasi lebih besar dibandingkan metode maserasi karena rendemen ekstraknya juga besar.

2. Metode pengujian

Berdasarkan analisis artikel yang diperoleh terkait aktivitas antibakteri biji jintan hitam semua artikel menggunakan metode pengujian difusi sumur agar. Metode pengujian aktivitas antibakteri yang lazim digunakan adalah metode uji menggunakan difusi cakram (*paper disc*) dan metode difusi sumuran. Metode difusi sumur agar diketahui dari beberapa penelitian lebih unggul dibanding metode cakram (*paper disc*) penelitian (Nurhayati et al., 2020) aktivitas antibakteri yang dihasilkan menggunakan metode sumuran lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas antibakteri dengan metode cakram. Hal ini karena sampel yang dimasukkan ke dalam sumuran yang telah dibuat, akan menghasilkan proses osmosis yang lebih homogen dan efisien sehingga lebih efektif dalam menghambat

pertumbuhan bakteri. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian (Prayoga, 2013) yang menyatakan bahwa dengan menggunakan metode sumuran dapat menghasilkan diameter zona hambat yang besar. Hal ini diakibatkan karena pada metode sumuran terjadi proses osmolaritas dari konsentrasi ekstrak yang lebih tinggi dari metode disk. Metode sumuran setiap lubangnya diisi dengan konsentrasi ekstrak sehingga osmolaritas terjadi lebih menyeluruh dan lebih homogen serta konsentrasi ekstrak yang dihasilkan lebih tinggi dan lebih kuat untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua artikel dalam metode pengujian aktivitas antibakteri menggunakan difusi sumur agar untuk memperoleh daya hambat ekstrak yang lebih baik.

4.5.3. Kekuatan aktivitas antibakteri

Secara umum semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin besar pula zona hambat yang terbentuk. Pertumbuhan bakteri akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi antibakteri yang ditambahkan. Salah satu parameter kekuatan antibakteri dari ekstrak adalah dengan mengamati diameter zona hambat atau zona bening yang terbentuk. Diameter zona hambat merupakan petunjuk kepekaan bakteri uji. Semakin besar zona hambat maka daya antibakteri dikatakan semakin baik (Rahman et al., 2012). Untuk melihat efektivitas antibakteri ekstrak terhadap suatu patogen tertentu dapat dilihat dari diameter zona hambat yang dibentuk dan konsentrasi yang dibutuhkan untuk menghambat patogen tersebut. Di bawah ini merangkum hasil analisis artikel terkait kekuatan aktivitas antibakteri ekstrak yang menghasilkan diameter zona hambat terbaik.

Kekuatan aktivitas antibakteri ekstrak biji jintan hitam (*Nigella sativa* L.) terhadap beberapa bakteri patogen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Kekuatan aktivitas antibakteri ekstrak biji jintan hitam

| Bakteri dan gram | Konsentrasi ekstrak | Kekuatan daya hambat | | | Keterangan | Pustaka |
|---|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| | | <i>moderate</i> (6-10 mm) | <i>strong</i> (11-20 mm) | <i>very strong</i> (≥ 21 mm) | | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> (Gram positif) | 75 μ g/ well | | | ✓ | Efektif terhadap <i>S.aureus</i> diameter zona hambat dihasilkan ± 34 mm (<i>very strong</i>) dan lebih baik dari semua kontrol positif (streptomisin, ciprofloxacin, doksisisiklin, ampisilin, ofloksasin) | (Islam et al., 2012) |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Gram negatif) | 75 μ g/ well | | | ✓ | Efektif terhadap <i>P.aeruginosa</i> diameter zona hambat dihasilkan ± 30 mm (<i>very strong</i>) dan lebih baik dari semua kontrol positif (streptomisin, ciprofloxacin, doksisisiklin, ampisilin, ofloksasin) | |
| <i>Escherichia coli</i> (Gram negatif) | 75 μ g/ well | | ✓ | | Dapat menghambat bakteri <i>E.coli</i> diameter zona hambat ± 13 mm (<i>strong</i>) lebih baik dari control positif (ciprofloxacin, doksisisiklin, ampisilin, ofloksasin) | |
| <i>Klebseilla pneumonia</i> (Gram negatif) | 75 μ g/ well | | | ✓ | Efektif menghambat <i>K.pneumoniae</i> dengan diameter zona hambat ± 28 mm (<i>very strong</i>) dan lebih baik dari semua kontrol positif (streptomisin, ciprofloxacin, doksisisiklin, ampisilin, ofloksasin). | |
| <i>Proteus mirabilis</i> | | | | ✓ | Efektif menghambat <i>P.mirabilis</i> dengan | |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|---|--|--|-------------------------|
| (Gram negatif) | 75 µg/ well | | | | diameter zona hambat ±30 mm (<i>very strong</i>) dan lebih baik dari semua kontrol positif (streptomisin, ciprofloxacin, doksisisiklin, ampisilin, ofloksasin). | |
| <i>Methicillin-resistant Staphylococcus aureus</i> (MRSA) (Gram positif) | Ekstrak 1% | | ✓ | | Efektif terhadap MRSA (<i>methicillin-resistant Staphylococcus aureus</i>) diameter zona hambat yang dihasilkan yaitu 37 mm yang dikategorikan sebagai daya hambat sangat kuat (<i>very strong</i>). Sinergis dengan kontrol positif chlorquinaldol. | (Gawron et al., 2019) |
| <i>Streptococcus pneumonia</i> (Gram positif) | 30mg/ml | | ✓ | | Efektif menghambat <i>S.pneumoniae</i> diameter zona hambat yaitu 20,23 mm (<i>strong</i>), sedangkan kontrol positif ciprofloxacin dengan diameter zona hambat 33 mm. | (Mahmood et al., 2019) |
| <i>Enterococcus faecalis</i> (Gram negatif) | 100µl/ well | | ✓ | | Dapat menghambat bakteri <i>E.faecalis</i> diameter zona hambat 14,5 mm (<i>strong</i>) sedangkan kontrol positif gentamisin menunjukkan diameter zona hambat 20,6 mm | (Callixte et al., 2021) |

Dari tabel di atas pada penelitian (Islam et al., 2012) diamati bahwa ekstrak dengan konsentrasi 75 µg/ well memberikan diameter zona hambat yang paling besar pada bakteri *Staphylococcus aureus* (±34 mm) disusul dengan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* (±30 mm), *Proteus mirabilis* (±30 mm), *Klebseilla pneumonia* (±28 mm) dikategorikan daya hambat sangat kuat, dan *Escherichia coli* (±13

mm) dikategorikan daya hambat kuat. Diameter zona hambat yang dihasilkan pada bakteri *Staphylococcus aureus* cukup besar dibanding dengan diameter zona hambat bakteri yang lain dengan konsentrasi ekstrak yang sama, jadi dapat disimpulkan bahwa ekstrak biji jintan hitam sangat efektif dalam menghambat bakteri *Staphylococcus aureus*.

Ekstrak biji jintan hitam juga dapat menghambat bakteri *Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)*, *Streptococcus pneumonia*, dan *Enterococcus faecalis*. Pada artikel (Gawron et al., 2019) dengan konsentrasi ekstrak 1% menghasilkan diameter zona hambat yang dikategorikan sangat kuat (37 mm) pada bakteri *Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)*. Adapun pada artikel (Mahmood et al., 2019) pada konsentrasi 30mg/ml memberikan zona hambat yang dikategorikan kuat pada bakteri *Streptococcus pneumonia* (20,23 mm). Pada artikel (Callixte et al., 2021) dengan konsentrasi ekstrak 100µl/well dapat menghambat bakteri *Enterococcus faecalis* dengan diameter zona hambat 14,5 mm dikategorikan daya hambat kuat.

4.5.4. Senyawa aktif sebagai antibakteri

Di bawah ini disajikan tabel yang merangkum senyawa aktif dari ekstrak biji jintan hitam yang berperan sebagai antibakteri.

Tabel 10. Senyawa aktif sebagai antibakteri

| Senyawa aktif | Ekstrak | Metode Ekstraksi | Pelarut | Pustaka |
|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Fenolik | Ekstrak biji jintan hitam | Soxhletasi | Metanol | (Islam et al., 2012) |
| | Ekstrak biji jintan hitam | Maserasi | Etil asetat | (Nawarathne et al., 2019) |
| Thymoquinone Thymol p-cymene | Ekstrak minyak atsiri biji jintan hitam | Ekstraksi fluida superkritis | CO ₂ | (Gawron et al., 2019) |
| Flavonoid | Ekstrak biji jintan hitam | Maserasi | Air suling | (Mahmood et al., 2019) |

| | | | | |
|--|---------------------------|----------|-------------|---------------------------|
| | Ekstrak biji jintan hitam | Maserasi | Etil asetat | (Nawarathne et al., 2019) |
| | Ekstrak biji jintan hitam | Maserasi | Metanol | (Callixte et al., 2021) |

1. Senyawa fenolik

Skrinning fitokimia ekstrak biji jintan hitam menunjukkan terdapat senyawa fenolik pada penelitian (Nawarathne et al., 2019) yang menunjukkan penghambatan terhadap bakteri *S.aureus*. Studi yang dilakukan oleh (Islam et al., 2012) menunjukkan bahwa ekstrak biji jintan hitam dapat menghambat semua bakteri uji diantaranya *E.coli*, *S.aureus*, *K.pneumoniae*, *P.aeruginosa*, dan *P.mirabilis*. Menurut (Islam et al., 2012) penghambatan tersebut dihasilkan oleh metabolit sekunder yang diperoleh dari ekstrak, hasil uji kualitatif pada studi ini menunjukkan bahwa ekstrak mengandung senyawa metabolit sekunder salah satunya adalah senyawa fenol.

Dari tabel 10 dapat diamati bahwa senyawa fenolik dapat diperoleh dari ekstrak metanol dan ekstrak etil asetat. Pemilihan pelarut dalam mengekstraksi kandungan metabolit suatu tanaman sangat berpengaruh terhadap jumlah ekstrak, komposisi kimia dan uji aktivitasnya. Efektivitas ekstraksi suatu senyawa oleh pelarut sangat tergantung kepada kelarutan senyawa tersebut dalam pelarut, sesuai dengan prinsip *like dissolve like* yaitu suatu senyawa akan terlarut pada pelarut dengan sifat yang sama. Penggunaan jenis pelarut dapat memberikan pengaruh terhadap senyawa yang dihasilkan (Kemit et al., 2010). Begitu juga halnya dengan senyawa fenol dalam tanaman. Senyawa fenol adalah senyawa yang banyak ditemukan pada tanaman. Umumnya komponen fenolik dapat diekstraksi dari bahan tumbuhan menggunakan pelarut polar seperti air, metanol, etanol, aseton atau pelarut semi polar seperti etil asetat. Penggunaan metanol sebagai pelarut membuat senyawa seperti fenolik dalam tanaman terekstraksi. Hal ini sejalan dengan

penelitian (Bayani, 2016) dimana ekstrak buah sentul menggunakan pelarut metanol yang diuji kandungan senyawa fenoliknya secara kualitatif menggunakan reagen millon dan reagen $FeCl_3$ keduanya menunjukkan positif adanya senyawa fenolik. Selain itu dalam penelitian (R. Putri, 2018) menguji adanya senyawa fenolik dalam ekstrak metanol meniran yang dengan ekstraksi sokhletasi hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak metanol herba meniran positif mengandung fenolik. Senyawa fenol juga diketahui terdapat pada ekstrak etil asetat biji jintan hitam, hal ini sejalan dengan penelitian (Purnama et al., 2020) dimana fraksi ekstrak etil asetat ditemukan mengandung senyawa fenolik.

Mekanisme aksi antibakteri senyawa fenolik sepenuhnya belum diketahui pasti namun senyawa ini diketahui melibatkan banyak aksi di situs tingkat seluler. Beberapa peneliti menjelaskan aktivitasnya yaitu dengan memodifikasi permeabilitas membran sel, merubah berbagai fungsi intraseluler dengan menginduksi hydrogen yang terikat dengan senyawa fenolik ke enzim atau dengan memodifikasi kekakuan dinding sel dengan menghilangkan ketahanan untuk dapat berinteraksi dengan membran sel. Sifat lipofilik yang tinggi dari senyawa fenolik dapat meningkatkan aktivitas antimikroba dengan mendorong masuk dan interaksi senyawa dengan membran sel. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan ireversibel pada membran sitoplasma, koagulasi isi sel dan bahkan dapat menyebabkan penghambatan enzim intraseluler. Sebagai contoh phenylpropanoid terikat tannin dapat menyebabkan kerusakan membran sel dan bahkan dapat menginaktivasi metabolisme dengan mengikat jalan terikat pada enzim (Bouarab-Chibane et al., 2019).

2. Thymoquinone dan thymol

Aktivitas farmakologi jinten hitam sebagian besar disumbangkan oleh thymoquinone. Thymoquinone merupakan senyawa nonpolar yang terdapat dalam

minyak atsiri jinten hitam. Thymoquinone berfungsi menginaktivasi protein pada bakteri karena zat tersebut dapat membentuk kompleks yang irreversibel dengan asam amino nukleofilik pada protein bakteri (Ayu & Pintadi, 2020).

Dari tabel 10 dapat diamati bahwa senyawa timokuinon dan timol diperoleh dari ekstrak hasil ekstraksi fluida superkritis menggunakan pelarut CO₂. Secara umum rempah-rempah dengan minyak atsiri dan herbal diekstraksi dengan berbagai metode seperti teknik destilasi atau penyulingan dan atau menggunakan pelarut organik. Namun teknik penyulingan biasanya tidak mampu merepresentasikan karakteristik minyak atsiri dari rempah yang diekstrak. Selain itu tingginya suhu penyulingan menyebabkan lebih banyak komponen yang labil terhadap pemansan mengalami kerusakan. Kerusakan komponen ini menyebabkan mutu ekstrak yang menyimpang dari karakter aslinya. Dengan ekstraksi fluida superkritis CO₂ secara umum suatu senyawa bisa berbentuk padat, gas, atau cair tergantung kondisi tekanan dan suhunya. Begitu juga dengan CO₂ dalam kondisi tertentu jika suhu dan tekanan terus dinaikkan sehingga lebih besar daripada suhu kritis (T_c) dan tekanan kritis (P_c), maka CO₂ mempunyai karakteristik unik dapat sebagai cair dan gas sekaligus. Dalam kondisi inilah CO₂ disebut dalam kondisi superkritis. Dalam kondisi superkritis ini CO₂ mempunyai sifat pelarut sebagaimana CO₂ cair, tetapi sekaligus mempunyai sifat difusivitas yang tinggi sebagaimana CO₂ gas. Dalam kondisi superkritis CO₂ bisa berperan sebagai solvent yang sangat efektif. Sebagai pelarut CO₂ mempunyai kelebihan karena sifatnya antara lain tidak mempunyai sifat racun, tidak berasa dan tidak berbau, aman untuk pangan dan tidak mudah terbakar. CO₂ juga mudah dipisahkan dan dipakai kembali (recycled). Disamping itu kondisi superkritis CO₂ bisa dicapai pada suhu rendah, hanya di atas 31,1°C sehingga meminimalkan kerusakan komponen volatile yang mungkin terjadi karena panas. Selain itu proses ekstraksi ini merupakan *single step process* dan

berlangsung cukup singkat (kurang dari 2 jam). Dengan demikian, proses ekstraksi dengan fluida CO₂ superkritis ini merupakan proses *gentle extraction* yang mampu menghasilkan ekstrak minyak atsiri dengan mutu yang tinggi (Hariyadi, 2007).

Dalam penelitian (Callixte et al., 2021) yang menunjukkan penghambatan ekstrak biji jintan hitam terhadap *S.aureus*, *E.faecalis*, dan *P.aeruginosa* menjelaskan bahwa aktivitas antimikroba ekstrak biji jintan hitam dikaitkan dengan adanya kandungan thymoquinone dan senyawa turunannya seperti timol. Dalam (Gawron et al., 2019) thymoquinone dianggap memiliki kontribusi yang besar terhadap aktivitas penghambatan terhadap bakteri MRSA (*Methicillin-resistant Staphylococcus aureus*). Potensinya melawan MSSA (*Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus*) dan MRSA (*Methicillin-resistant Staphylococcus aureus*) dianggap sinergis dengan kontrol positif dalam pengujian yaitu chlorquinaldol dan lebih baik dari kombinasi 1:2 amylmetacresol dan 2,4-dichlorobenzyl alkohol.

Penelitian (Islam et al., 2012) mengatakan bahwa aktivitas yang diberikan oleh ekstrak metanol biji jintan hitam karena adanya beberapa fitokonstituen aktif seperti timol dan timokuinon. Timol adalah alkohol fenolik yang ada dalam minyak esensial *N. sativa* yang telah dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri. Thymol adalah isomer struktural yang memiliki hidroksil fenolik pada lokasi yang berbeda pada cincin fenolik. Gugus hidroksil meningkatkan kemampuan hidrofiliknya, yang dapat membantu mereka larut dalam membran mikroba dan merusaknya. Kehadiran gugus hidroksil pada timol memainkan peran penting dalam potensinya mendepolarisasi membran sel bakteri. Kehadiran gugus hidroksil bebas membantunya masuk dalam sitoplasma membran, mengubah sifat fisika kimia membran sel dan mempengaruhi stabilitas lipid bilayer serta meningkatkan pemasukan proton pasif melintasi membran sel (Xu et al., 2008). Timol dan timokuinon hadir dalam bagian larut metanol dari minyak *N. sativa*. Dalam sebuah

studi oleh Kahsai (2002), thymoquinone hadir dalam minyak atsiri yang diperoleh dari ekstrak kasar dan menunjukkan penghambatan yang luar biasa dari pertumbuhan berbagai strain bakteri. Thymoquinone hadir dalam bagian larut metanol minyak *N. sativa* dan dengan demikian akan diekstraksi dan terdapat dalam ekstrak metanol biji jintan hitam juga.

3. *p-cymene*

Penelitian (Gawron et al., 2019) hasil analisis komposisi minyak atsiri menunjukkan ekstrak minyak atsiri biji jintan hitam mengandung salah satu konstituen aktif yang memiliki aktivitas antimikroba yaitu *p-cymene*, konstituen tersebut dianggap memiliki kontribusi juga selain thymoquinone dan thymol terhadap aktivitas penghambatan terhadap bakteri MRSA (*Methicillin-resistant Staphylococcus aureus*).

Dari tabel 10 dapat diamati bahwa senyawa *p-cymene* juga diperoleh dari ekstrak hasil ekstraksi fluida superkritis menggunakan pelarut CO₂. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ekstraksi fluida CO₂ superkritis ini merupakan proses *gentle extraction* yang mampu menghasilkan ekstrak minyak atsiri dengan mutu yang tinggi dibanding dengan metode lain seperti teknik penyulingan. Selain itu sebagai pelarut CO₂ mempunyai kelebihan karena sifatnya antara lain tidak mempunyai sifat racun, tidak berasa dan tidak berbau, aman untuk pangan dan tidak mudah terbakar. CO₂ juga mudah dipisahkan dan dipakai kembali (recycled). Disamping itu kondisi superkritis CO₂ bisa dicapai pada suhu rendah, hanya di atas 31,1°C sehingga meminimalkan kerusakan komponen volatile yang mungkin terjadi karena panas.

p-Cymene [1-methyl-4-(1-methylethyl)-benzene] adalah monoterpene yang ditemukan pada lebih dari 100 spesies tanaman yang digunakan untuk tujuan pengobatan dan makanan. *p-cymene* menunjukkan berbagai aktivitas biologis

termasuk antioksidan, anti-inflamasi, antinociceptive, ansiolitik, antikanker dan efek antimikroba. Akhir ini, *p-cymene* telah diselidiki secara luas sebagai agen antimikroba karena kebutuhan mendesak akan zat baru dengan sifat antimikroba, yang akan digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen dan karena meningkatnya kasus resistensi antimikroba. *p-cymene* adalah salah satu konstituen utama dari ekstrak dan minyak esensial yang digunakan dalam obat-obatan tradisional sebagai agen antimikroba (Marchese et al., 2017).

Mekanisme kerja *p-cymene* dalam menghambat pertumbuhan bakteri dapat dilihat pada sebuah studi yang dilakukan oleh Ultee et al. yang menyelidiki mekanisme kerja *p-cymene* dengan mengujinya pada bakteri *B.cereus*, bakteri patogen pada makanan. Studi ini menyelidiki efek dari senyawa alami pada ekspansi membran liposomal bakteri, pengaruhnya terhadap potensial membran sel, perubahan pH intraseluler, pengaruhnya pada jumlah ATP, dan efeknya terhadap pertumbuhan *B.cereus*. *p-cymene* yang ditambahkan pada liposom menyebabkan perluasan sitoplasma membran, molekul ini juga menginduksi pengurangan potensial membran sel, *p-cymene* tidak menunjukkan perannya dalam perubahan pH intraseluler dan tidak berpengaruh terhadap jumlah ATP ekstra dan intraseluler (Marchese et al., 2017).

4. Senyawa Flavonoid

Dalam studi (Callixte et al., 2021) menunjukkan penghambatan ekstrak biji jintan hitam terhadap *S.aureus*, *E.faecalis*, dan *P.aeruginosa*, senyawa metabolit sekunder yang berperan salah satunya adalah flavonoid. Berdasarkan analisis kualitatif kimia ekstrak menunjukkan adanya kandungan senyawa flavonoid. Callixte et al., 2021 menjelaskan bahwa ekstrak menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan menyebabkan kebocoran protein dan beberapa enzim dari sel (Callixte et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Mahmood et al., 2019) dimana ekstrak biji jintan hitam menunjukkan daya hambat pada *S.pneumoniae* dan *K.pneumoniae* diketahui hasil skrinning kuantitatif kandungan senyawa kimia yang paling banyak dari ekstrak adalah flavonoid dibandingkan metabolit lain yaitu alkaloid dan saponin. Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa flavonoid hadir dalam tanaman obat memiliki sifat terapeutik dan antimikroba. Skrinning fitokimia ekstrak biji jintan hitam menunjukkan terdapat senyawa flavonoid pada penelitian (Nawarathne et al., 2019) yang menunjukkan penghambatan terhadap bakteri *S.aureus*.

Tabel 10 dapat diamati bahwa senyawa flavonoid dapat diperoleh dari ekstrak biji jintan hitam menggunakan pelarut air, metanol, dan etil asetat. Umumnya flavonoid bersifat polar karena memiliki gugus hidroksi yang tidak tersubstitusi. Efektivitas ekstraksi suatu senyawa oleh pelarut sangat tergantung kepada kelarutan senyawa tersebut dalam pelarut, sesuai dengan prinsip *like dissolve like* yaitu suatu senyawa akan terlarut pada pelarut dengan sifat yang sama. Penggunaan jenis pelarut dapat memberikan pengaruh terhadap rendemen ekstrak dan senyawa yang dihasilkan (Kemit et al., 2010). Hal ini sejalan dengan penelitian (Suryani et al., 2016) yang menguji kadar rendemen ekstrak dan aktivitas antioksidan senyawa flavonoid dalam ekstrak daun matoa, diperoleh hasil bahwa pelarut metanol menghasilkan rendemen ekstrak yang paling besar disusul dengan pelarut air selain itu juga menghasilkan nilai aktivitas antioksidan dari senyawa yang tinggi. Pelarut metanol merupakan pelarut universal yang mampu mengikat semua komponen kimia yang terdapat pada tumbuhan, baik yang sifatnya non-polar, semi polar, dan polar. Metanol merupakan cairan penyari yang mudah masuk dalam sel melewati dinding sel bahan, sehingga metabolit sekunder yang terdapat dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut dan senyawa akan terekstraksi secara sempurna. Dari tabel 10 juga diketahui bahwa senyawa flavonoid juga dapat hadir

dalam ekstrak etil asetat biji jantan hitam. Hal ini sejalan dengan penelitian (W. Putri et al., 2015) yang menguji kandungan flavonoid pada kulit buah manggis menggunakan ekstrak etil asetat, hasilnya menunjukkan positif terdapat flavonoid. Hal ini terjadi karena etil asetat merupakan pelarut semi polar yang mampu menarik senyawa-senyawa dengan rentang polaritas lebar dari senyawa polar hingga non-polar. Dari tabel tersebut juga diperoleh bahwa semua senyawa flavonoid yang terdapat dalam ekstrak biji jantan hitam diperoleh dengan metode ekstraksi maserasi hal ini karena senyawa flavonoid bersifat tidak tahan panas dan mudah teroksidasi pada suhu tinggi (Setiani et al., 2017).

Mekanisme kerja flavonoid sebagai senyawa antibakteri dibagi menjadi 3 yaitu menghambat sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sel dan menghambat metabolisme energi. Dalam menghambat sintesis asam nukleat, cincin A dan B senyawa flavonoid berperan penting dalam proses interkalisasi atau ikatan hydrogen yakni dengan menumpuk basa asam nukleat sehingga menghambat pembentukan DNA dan RNA. Hasil interaksi flavonoid juga akan menyebabkan kerusakan permeabilitas dinding sel. Dalam menghambat fungsi membran sel, flavonoid akan membentuk senyawa kompleks dari protein ekstraseluler yang dapat merusak membran sel dan senyawa intraseluler akan keluar. Sedangkan dalam menghambat metabolisme energi dengan menghambat penggunaan oksigen oleh bakteri, energi dibutuhkan bakteri untuk biosintesis makromolekul, sehingga jika metabolismenya terhambat maka molekul bakteri tersebut tidak dapat berkembang menjadi molekul yang kompleks (Nomer et al., 2019) (Sapara & Waworuntu, 2016).

4.5 Tinjauan Islam tentang Penggunaan Obat dari Bahan Alam

Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama merupakan sesuatu yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Agama merupakan sumber ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang tertuang dalam ajaran agama.

Pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan ilmu pengetahuan terus dilakukan dan hasilnya selalu menunjukkan betapa menakjubkannya isi kandungan Al-Qur'an. Salah satunya yaitu penjelasan terkait khasiat tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat dalam pencegahan dan pengobatan berbagai jenis penyakit. Beberapa tumbuhan terbukti memiliki potensi yang luar biasa. Eksplorasi mendalam diperlukan untuk mengetahui khasiat-khasiat dari berbagai tumbuhan. Allah menciptakan beraneka ragam tumbuhan dari jenis bentuk dan manfaatnya yang berbeda-beda bagi manusia. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan pada ayat di bawah ini.

Di dalam firman Allah swt. dalam QS. Thaha/ 20: 53 yang berbunyi :

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۝﴾

Terjemahnya :

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu dibumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kementrian Agama, 2019).

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Allah swt. menurunkan air dari langit untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang beragam jenisnya, dengan adanya tumbuhan yang beraneka ragam jenis ini tentunya memiliki kandungan fitokimia

yang beragam pula. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan energi yang nantinya digunakan dalam berbagai proses. Zat-zat hasil fotosintesis tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Tumbuhan juga menghasilkan metabolisme sekunder yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan tersebut dari lingkungannya seperti serangan dari serangga, bakteri, jamur dan jenis pathogen lainnya. Dari tanaman yang bervariasi atau beragam jenisnya baik berbeda famili ataupun spesies akan menghasilkan metabolit sekunder yang berbeda pula. Metabolit sekunder yang berbeda dapat mempunyai manfaat yang sama atau berbeda, tergantung proses biokimiawi yang dipengaruhi. Tentunya hal ini merupakan bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang memiliki khasiat tertentu agar dapat dimanfaatkan dalam pengobatan (Shihab, 2002).

Selain itu Allah swt. berfirman dalam QS. An-Naba/78: 14-16 yang berbunyi :

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً مُّجْجًا لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۖ وَجَعَلْنَا الْفَاوَّاقَ ۝﴾

Terjemahnya :

“Dan Kami telah menurunkan dari awan air yang tercurah deras, supaya Kami mengeluarkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat” (Kementerian Agama, 2019).

Dalam ayat tersebut Allah menunjukkan kuasa-Nya di bumi serta manfaat yang dapat diperoleh manusia dari penciptaan-Nya. Dalam ayat tersebut dapat dilihat bagaimana kuasa Allah swt. menurunkan air yang hujan yang tercurah sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Air hujan dapat membantu menumbuhkan suatu tanaman, dimulai sejak benih/ biji, kemudian akan mengalami proses perkecambahan. Dari proses perkecambahan akan muncul akar tanaman

yang akhirnya akan menopang berdirinya suatu tanaman yang lengkap dengan organ tanaman lain seperti batang dan daun. Setelah dewasa tumbuhan akan mengalami perkembangbiakan baik secara vegetatif maupun generatif. Salah satunya yaitu dengan penyerbukan yang dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan angin. Setelah proses penyerbukan tanaman akan menghasilkan buah yang berbiji, biji tersebut nantinya akan menjadi benih baru. Pemanfaatan tumbuhan dalam dunia farmasi dapat diamati dari metabolit sekunder yang dikandungnya. Biosintesis metabolit sekunder pada tanaman dapat terjadi pada semua organ tumbuhan, termasuk biji (Shihab, 2002).

Beberapa pemanfaatan biji tumbuhan yang telah diteliti karena khasiat dan metabolit sekunder yang dikandungnya, diantaranya seperti biji labu kuning sebagai antelmintik karena kandungan tanninnya yang tinggi bekerja dengan menggumpalkan protein pada cacing. Biji adas yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan karena kandungan senyawa fenoliknya yang tinggi. Contoh lain yaitu biji alpukat mengandung flavonoid yang memiliki potensi sebagai antidiabetes.

Berdasarkan tafsir tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah swt. mengatur sedemikian rupa langit dan segala penciptannya untuk dapat bermanfaat bagi manusia, seperti diibaratkan bagaimana Allah swt. menurunkan hujan untuk menumbuhkan biji-bijian dan tumbuhan yang bermanfaat untuk dijadikan pangan bagi manusia.

Salah satu tanaman herba yang memiliki khasiat luar biasa dan dikatakan sebagai penyembuh berbagai penyakit adalah jintan hitam atau lebih dikenal dengan nama *habbatussauda*. Tanaman ini telah digunakan sebagai media pengobatan sejak zaman peradaban Mesir kuno. Pada masa Islam, Rasulullah Muhammad saw. memberikan rekomendasi bahwa jintan hitam adalah obat bagi

segala penyakit. Setelah 14 abad lamanya, barulah penelitian-penelitian modern menemukan dan membuktikan adanya khasiat kesembuhan dalam biji jintan hitam. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبَجَرَ فَمَرَضَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ فَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحُبِّيَّةِ السُّودَاءِ فَخَذُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطْرَاتِ زَيْتٍ فِي هَذَا الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْني أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السُّودَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنْ السَّامِ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami *Abdullah bin Abu Syaibah* telah menceritakan kepada kami *'Ubaidullah* telah menceritakan kepada kami *Isra'il* dari *Manshur* dari *Khalid bin Sa'd* dia berkata; Kami pernah bepergian yang di antaranya terdapat *Ghalib bin Abjar*, di tengah jalan ia jatuh sakit, ketika sampai di Madinah ia masih menderita sakit, lalu *Ibnu Abu 'Atiq* menjenguknya dan berkata kepada kami; Hendaknya kalian memberinya *habbatussauda'* (jintan hitam), ambillah lima atau tujuh biji, lalu tumbuklah hingga halus, setelah itu teteskanlah di hidungnya di sertai dengan tetesan minyak sebelah sini dan sebelah sini, karena sesungguhnya *Aisyah* pernah menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “*Sesungguhnya habbatussauda' ini adalah obat dari segala macam penyakit kecuali saam. Aku bertanya; Apakah saam itu? Beliau menjawab: Kematian.*” (HR. Al-Bukhari, no. 5255).

Hadis diatas merupakan hadis utama yang menjadi dasar kajian bahwasanya *habbatussauda'* merupakan obat dari berbagai penyakit. Hadis tersebut bukan bermakna hanya *habbatussauda'* yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Perlu dikemukakan bahwa hadis Nabi saw. tentang *habbatussauda'* pada dasarnya memberikan informasi dan menganjurkan bahwa *habbatussauda'* sebagai salah satu obat yang bersifat umum dan memiliki manfaat besar bagi kesehatan. Nabi

saw. memberikan informasi untuk konteks zamannya yang bersifat preventif dengan menganjurkan mengkonsumsi *habbatussauda* (Safarsyah, 2019).

Hadits di atas sangat jelas bahwa jintan hitam atau yang dikenal sebagai *habbatussauda* merupakan salah satu pengobatan yang direkomendasikan oleh Rasulullah saw. karena dapat mengobati berbagai macam penyakit. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian modern yang telah dilakukan untuk mencari dan membuktikan berbagai aktivitas dari biji jintan hitam salah satunya adalah aktivitas antibakteri.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian studi literatur yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya;

- a. Ekstrak biji jintan hitam memiliki spektrum aktivitas luas (*broad spectrum*) dalam menghambat pertumbuhan beberapa bakteri patogen diantaranya bakteri gram positif; *Staphylococcus aureus*, *Methicillin-resistant Staphylococcus aureus* (MRSA), *Streptococcus pneumonia*, *Enterococcus faecalis* dan bakteri gram negatif; *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebseilla pneumoniae*, *Proteus mirabilis*.
- b. Kekuatan aktivitas antibakteri yang dihasilkan diantaranya sangat kuat (*very strong*) menghambat bakteri *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebseilla pneumoniae*, *Proteus mirabilis* pada konsentrasi (75µg/well), *Methicillin-resistant Staphylococcus aureus* (MRSA) pada konsentrasi (1%) dan kuat (*strong*) menghambat bakteri *Escherichia coli* (75µg/well), *Streptococcus pneumonia* (30mg/ml), dan *Enterococcus faecalis* (100µl/well).
- c. Senyawa aktif yang berperan sebagai antibakteri diantaranya adalah *Thymoquinone*, *thymol*, *p-cymene*, senyawa fenolik, dan senyawa flavonoid.

5.2 Saran

Diharapkan penelitian studi literatur ini dapat menjadi dorongan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang akan mengisolasi senyawa aktif dan mengembangkan sumber alternatif obat baru yang berasal dari bahan alam yang

efektif khususnya sebagai antibakteri melihat kasus resistensi antibakteri yang masih menjadi permasalahan global yang cukup serius.



DAFTAR PUSTAKA

- Amin, B., & Hosseinzadeh, H. (2016). Black Cumin (*Nigella sativa*) and Its Active Constituent, Thymoquinone: An Overview on the Analgesic and Anti-inflammatory Effects. *Planta Med*, 8–16.
- Amir, U. F. (2016). Uji Daya Hambat Ekstrak Metanol Biji Jintan Hitam (*Nigella Sativa* L.) terhadap Bakteri (*Streptococcus mutans*). [Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/](http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/).
- Ayu, Z. P., & Pintadi, S. (2020). Daya Antibakteri Ekstrak Jintan Hitam dan Daun Sirih terhadap *Staphylococcus aureus* pada Plat Gigi Tiruan dilakukan dengan cara perendaman gigi Jintan hitam (*Nigella sativa*) digunakan oleh orang Negara Timur Tengah sebagai obat. *Insisiva Dental Journal: Majalah Kedokteran Gigi Insisiva*, 9(1), 19–25. <https://journal.umy.ac.id/index.php/di/article/view/7536>
- Balouiri, M., Sadiki, M., & Ibsouda, S. K. (2016). Methods for in vitro evaluating antimicrobial activity: A review. In *Journal of Pharmaceutical Analysis* (Vol. 6, Issue 2, pp. 71–79). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.jpha.2015.11.005>
- Bayani, F. (2016). Analisis Fenol Total dan Uji Aktivitas Antioksidan dari Ekstrak Buah Sentul (*Sandoricum koetjape* Merr.). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kimia "Hydrogen,"* 4(1), 55–69.
- Boleng, D. T. (2015). *Bakteriologi* (S. R. & R. S. (eds.); Cetakan Pe). Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Bouarab-Chibane, L., Forquet, V., Lantéri, P., Clément, Y., Léonard-Akkari, L., Oulahal, N., Degraeve, P., & Bordes, C. (2019). Antibacterial properties of polyphenols: Characterization and QSAR (Quantitative structure-activity relationship) models. *Frontiers in Microbiology*, 10(APR). <https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00829>
- Bustanussalam. (2016). Pemanfaatan Obat Tradisional (Herbal) sebagai Obat Alternatif. *BioTrends*, 7(1), 20–25.
- Callixte, C., Arwati, H., Irene, T., & Shoukat, S. (2021). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Chemical Composition and In vitro Antibacterial and Cytotoxic Effect of Nigella*. 16(3), 308–314.
- Desrini, S. (2015). Resistensi Antibiotik, Akankah Dapat Dikendalikan ? *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*, 6(4), i–iii. <https://doi.org/10.20885/jkki.vol6.iss4.art1>
- Ebimieowei, E., & Ibemologi, A. (2016). Antibiotics: Classification and mechanisms of action with emphasis on molecular perspectives. *International Journal of Applied Microbiology and Biotechnology Research*, 4(January

2016), 90–101.
<https://pdfs.semanticscholar.org/aebc/840138529c147e54552205bf26ec8aa3ca2e.pdf>

- Fitriana, Y. A. N., Fatimah, V. A. N., & Fitri, A. S. (2020). Aktivitas Anti Bakteri Daun Sirih: Uji Ekstrak KHM (Kadar Hambat Minimum) dan KBM (Kadar Bakterisidal Minimum). *Sainteks*, 16(2), 101–108.
<https://doi.org/10.30595/st.v16i2.7126>
- Gawron, G., Krzyczkowski, W., Lemke, K., Ołdak, A., Kadziński, L., & Banecki, B. (2019). Nigella sativa seed extract applicability in preparations against methicillin-resistant Staphylococcus aureus and effects on human dermal fibroblasts viability. *Journal of Ethnopharmacology*, 244(May), 1–7.
<https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.112135>
- Hariyadi, P. (2007). *Ekstraksi Rempah-Rempah dengan CO2 Superkritis* (pp. 40–42). Food Review Indonesia/Vol. II/No.9.
- Hayah, R. K. (2010). Pengaruh Pemberian Ekstrak Biji Jintan Hitam (Nigella sativa Linn.) terhadap Kadar Asam Urat Darah dan Gambaran Histologi Ginjal Mencit (Mus musculus) Hiperurisemia. *UIN Maulana Malik Ibrahim*.
- Ien, H., Zulkifli, L., & Sedijani, P. (2020). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Metanol Daun Turi (Sesbania grandiflora L.) Terhadap Pertumbuhan Klebsiella pneumonia. *Jurnal Biologi Tropis*, 20(2), 219.
<https://doi.org/10.29303/jbt.v20i2.1790>
- Islam, M. H., Ahmad, I. Z., & Salman, M. T. (2012). Antibacterial activity of Nigella sativa seed in various germination phases on clinical bacterial strains isolated from human patients. *E3 Journal of Biotechnology and Pharmaceutical Research*, January.
- Kemit, N., Widarta, I. W. R., & Nocianitri, K. A. (2010). Pengaruh Jenis Pelarut dan Waktu Maserasi terhadap Kandungan Senyawa Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Alpukat (Persea Americana Mill). *Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana*.
- Khairani, N. (2019). Identifikasi Bakteri Proteus mirabilis pada Infeksi Saluran Kemih yang Menderita Penyakit Ginjal Kronik di RSUP H. Adam Malik Medan. *Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan*, 2, 1–13.
- Kumar, A., Ahmad, F., & Zaidi, S. (2019). Importance of Bioactive Compounds Present in Plant Products and Their Extraction – A Review. *Agricultural Reviews*, 40(04). <https://doi.org/10.18805/ag.r-1926>
- Lingga, A. R., Pato, U., & Rossi, E. (2016). Uji Antibakteri Ekstrak Batang Kecombrang (Nicolaiia speciosa Horan) terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. *Universitas Riau*, 2(2).

- LIPI. (2020). LIPI: Berita Biologi Jurnal Ilmu-ilmu Hayati. *LIPI, Pusat Penelitian Biologi*, 19(2), 1–16.
- Mahfur. (2018). Profil Metabolit Sekunder Senyawa Aktif Minyak Atsiri Jinten Hitam (*Nigella sativa* L.) dari Habasyah dan India. *PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia (Pharmaceutical Journal of Indonesia)* Vol.15, 15(01), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s40278-018-51514-y>
- Mahmood, N., Nazir, R., Khan, M., Iqbal, R., Adnan, M., Ullah, M., & Yang, H. (2019). Phytochemical screening, antibacterial activity and heavy metal analysis of ethnomedicinal recipes and their sources used against infectious diseases. *Plants*, 8(11), 1–14. <https://doi.org/10.3390/plants8110454>
- Mahmudah, R., Soleha, T. U., & Ekowati, C. (2013). Identifikasi Methicillin-Resistant *Staphylococcus Aureus* (MRSA) Pada Tenaga Medis Dan Paramedis Di Ruang Intensivecare Unit (ICU) Dan Ruang Perawatan Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek. *Medical Journal of Lampung University*, 2(4), 70–78.
- Marchese, A., Arciola, C. R., Barbieri, R., Silva, A. S., Nabavi, S. F., Jorel, A., Sokeng, T., Izadi, M., Jafari, N. J., Suntar, I., Daglia, M., & Nabavi, S. M. (2017). *Update on Monoterpenes as Antimicrobial Agents: A Particular Focus on p-Cymene*. 1–15. <https://doi.org/10.3390/ma10080947>
- Mukhriani. (2014). Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar*, 7(2), 361–367. <https://doi.org/10.17969/agripet.v16i2.4142>
- Nawarathne, N. W., Wijesekera, K., Wijayarathne, W. M. D. G. B., & Napagoda, M. (2019). Development of Novel Topical Cosmeceutical Formulations from *Nigella sativa* L. with Antimicrobial Activity against Acne-Causing Microorganisms. *Scientific World Journal*, 2019. <https://doi.org/10.1155/2019/5985207>
- Neill, J. O. ' (2014). *Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations The Review on Antimicrobial Resistance Chaired. December.*
- Nomer, N. M. G. R., Duniaji, A. S., & Nocianitri, K. A. (2019). Kandungan Senyawa Flavonoid dan Antosianin Ekstrak Kayu Secang (*Caesalpinia sappan* L.) serta Aktivitas Antibakteri terhadap *Vibrio cholerae*. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Pangan (ITEPA)*, 8(2), 216. <https://doi.org/10.24843/itepa.2019.v08.i02.p12>
- Nugroho, A. (2017). Buku Ajar: Teknologi Bahan Alam. In *Lambung Mangkurat University Press* (Issue January 2017).
- Nurhayati, L. S., Yahdiyani, N., & Hidayatulloh, A. (2020). Perbandingan Pengujian Aktivitas Antibakteri Starter Yogurt Dengan Metode Difusi

- Sumuran Dan Metode Difusi Cakram. *Jurnal Teknologi Hasil Peternakan*, 1(2), 41. <https://doi.org/10.24198/jthp.v1i2.27537>
- Padoli. (2016). Mikrobiologi dan Parasitologi Keperawatan. In *Kemenkes RI*.
- Prayoga, E. (2013). Perbandingan Efek Ekstrak Daun Sirih Hijau (*Piper betle* L.) dengan Metode Difusi Disk dan Sumuran terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus*. *UIN Syarif Hidayatullah*, 34(3), 361–403.
- Purnama, I., Abidin, Z., & Maryam, S. (2020). Analisis Kadar Fenolik Fraksi Etil Asetat Daun Petai Cina (*Leucaena leucocephala*) (Lam.) de Wit) secara Spektrofotometri UV-VIS (Vol. 3, Issue 2017). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Puspitasari, A. D., & Proyogo, L. S. (2013). Perbandingan Metode Ekstraksi Maserasi dan Sokletasi terhadap Kadar Fenolik Total Ekstrak Etanol Daun Kersen (*Muntingia calabura*). *Universitas Wahid Hasyim Semarang*, 1–8.
- Putri, R. (2018). Analisis Kualitatif dan Penetapan Kadar Fenol Ekstrak Heksana, Aseton, Metanol dan Air dari Meniran (*Phyllanthus niruri* L.). *Farmasi, Universitas Andalas*.
- Putri, W., Warditiani, N., & Larasanty, L. (2015). Skrining Fitokimia Ekstrak Etil Asetat Kulit Buah Manggis (*Garcinia mangostana* L.). *Universitas Udayana*, 56–60.
- Rahman, D. T., Sutrisna, E., & Candrasari, A. (2012). Uji Efek Antibakteri Ekstrak Etil Asetat dan Kloroform Meniran (*Phyllanthus Niruri* Linn) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus Aureus* ATCC 6538 dan *Escherichia Coli* ATCC 11229 secara In Vitro. *Biomedika*, 4(2). <https://doi.org/10.23917/biomedika.v4i2.254>
- Rahmi, A. (2014). Pengaruh Pemberian Ekstrak Minyak Jintan Hitam (*Nigella sativa*) terhadap Gambaran Histopatologi Organ Testis Mencit (*Mus musculus*). *Repository Ipb*.
- Rollando. (2019). *Senyawa Antibakteri dari Fungi Endofit*. CV. Seribu Bintang, Malang, Jawa Timur.
- Rosalina, D., Martodihardjo, S., & Listiawan, M. Y. (2010). *Staphylococcus aureus* sebagai Penyebab Tersering Infeksi Sekunder pada Semua Erosi Kulit Dermatitis Vesikobulosa. *Berkala Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin*, 2(318), 102–108.
- Safarsyah, A. I. (2019). Hadis Nabi SAW Tentang Obat Dalam Tinjauan Ilmu Kedokteran Modern. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 12(2), 165–188. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i2.2079>
- Sapara, T. U., & Waworuntu, O. (2016). Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun

- Pacar Air (*Impatiens Balsamina L.*) Terhadap Pertumbuhan *Porphyromonas Gingivalis*. *Pharmakon*, 5(4), 10–17.
<https://doi.org/10.35799/pha.5.2016.13968>
- Sari, M., Latief, N., & Massi, M. N. (2020). Isolasi dan identifikasi gen pneumococcal surface adhesin A (*psaA*) sebagai faktor virulensi *Streptococcus pneumoniae*. *Bioma: Jurnal Biologi Makassar*, 5(1), 27–33.
- Sariadji, K., Sembiring, M., & Litbangkes, B. (2019). Kajian Pustaka : Uji Kepekaan Antibiotik pada *Corynebacterium diphtheriae*. *Jurnal Biotek Medisiana Indonesia*, 8, 121–133.
- Setiani, L. A., Sari, B. L., Indriani, L., & Jupersio. (2017). Penentuan Kadar Flavonoid Ekstrak Etanol 70% Kulit Bawang Merah (*Allium cepa L.*) dengan Metode Maserasi dan MAE (Microwave Assisted Extraction). *Universitas Pakuan Bogor*, 7(2), 15–22.
- Siswanto, S. (2012). Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 13(4). <https://doi.org/10.22435/bpsk.v13i4>
- Slipranata, M., Lestari, F. B., & Sandi, N. A. (2016). Potensi Ekstrak Daun Sage (*Salvia officinalis . L*) sebagai anti- *Streptococcus suis* Penyebab Zoonotik Meningitis Sage Leaves Extract Potency as anti *Streptococcus suis* which caused Zoonotic Meningitis. *Jurnal Sain Veteriner*, 34(2), 198–202.
- Solin, A. R., Hasanah, O., & Nurchayati, S. (2019). Hubungan Kejadian Penyakit Infeksi Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita 1-4 Tahun. *JOM FKp*, 6(1), 65–71. jom.unri.ac.id
- Sujati. (2016). Farmakologi. In *Woro, Sujati*.
- Sulistiawati, F., & Radji, M. (2014). Potensi Pemanfaatan *Nigella sativa L.* sebagai Imunomodulator dan Antiinflamasi. *Pharmaceutical Sciences and Research*, 1(2), 65–77. <https://doi.org/10.7454/psr.v1i2.3493>
- Sultana, S., Asif, H. M., Akhtar, N., Nazar, A., & Rehman, R. (2015). *Nigella sativa*: Monograph Sabira. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 2015*; 3(1), 1. <https://doi.org/10.4103/1658-631x.149647>
- Suryadi, R. (2010). *Perubahan Karakter Fisiologi dan Senyawa Sekunder Jintan Hitam (Nigella sativa L.) di Indonesia*. 33(65), 1–20. <https://balitro.litbang.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2013/06/Warta-Vol.-33-No-65-Tahun-2016.pdf>
- Suryani, N. C., Permana, D. G. M., & AAGN, A. J. (2016). Pengaruh Jenis Pelarut terhadap Kandungan Total Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Matoa (*Pometia pinnata*). *Universitas Udayana*, 1–10.

- Syam, A. I. I. (2020). Literature review Potensi Ekstrak Bawang Putih (*Allium sativum* L.) terhadap Bakteri *Enterococcus faecalis* dalam Saluran Akar. *Literature Review*, 19(November), 33–37.
- Tarina, N. T. I., & Kusuma, S. A. F. (2017). Deteksi Bakteri *Klebsiella pneumoniae*. *Jurnal Farmaka*, 15(2), 119–126. <http://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/13173>
- Vankar, P. S., & Srivastava, J. (2010). Ultrasound-assisted extraction in different solvents for phytochemical study of *Canna indica*. *International Journal of Food Engineering*, 6(3). <https://doi.org/10.2202/1556-3758.1599>
- Warganegara, E. (2017). Pneumonia Nosokomial: Hospital-Acquired, Ventilator-Associated, dan Health Care-Associated. *Jurnal Kedokteran Unila*, 1(3), 612–618. <http://jke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/JK/article/view/1729>
- Widyaningrum, I. (2020). *Effect of Extraction Method on Antimicrobial Activity Against Staphylococcus Aureus of Tapak Liman (Elephantopus Scaber L.) Leaves*. 3(October), 105–110.
- Wijaya, H., Novitasari, & Jubaidah, S. (2018). Perbandingan Metode Ekstraksi terhadap Rendemen Ekstrak Daun Rambai Laut (*Sonneratia caseolaris* L. Engl). *Akademi Farmasi Samarinda*, 4(1), 79–83.
- Xu, J., Zhou, F., Ji, B. P., Pei, R. S., & Xu, N. (2008). The antibacterial mechanism of carvacrol and thymol against *Escherichia coli*. *Letters in Applied Microbiology*, 47(3), 174–179. <https://doi.org/10.1111/j.1472-765X.2008.02407.x>
- Yuana Agustin, D. (2014). Gambaran Penggunaan Antibiotik dengan Resep dan Tanpa Resep Dokter Beberapa Apotek di Area Jember Kota. *Universitas Jember*, 1–64.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil pencarian database *Pubmed*

The screenshot shows a PubMed search page with the following details:

- Search term: Antibacterial activity of nigella sativa seed
- Results: 30 results
- Highlighted article: "Comparison of chemical composition and antibacterial activity of Nigella sativa seed essential oils obtained by different extraction methods." by Kokoska L. et al. (2008, PMID: 19244901).
- Filters applied: Full text, Journal Article, in the last 10 years.
- Taskbar: Shows a search bar, taskbar icons, and system tray with date 20/08/2021 and time 23:16.

Kata kunci: *Antibacterial activity of Nigella sativa seed*

The screenshot shows a PubMed search page with the following details:

- Search term: Antimicrobial activity of Nigella sativa seed
- Results: 59 results
- Highlighted articles: "Studies on the antimicrobial activity of Nigella sativa seed (black cumin)." by Hanafy MS. et al. (1991, PMID: 1795532) and "Antimicrobial activity of Nigella sativa L. seed oil against multi-drug resistant Staphylococcus aureus isolated from diabetic wounds." by Emeka LB. et al. (2015, PMID: 26639493).
- Taskbar: Shows a search bar, taskbar icons, and system tray with date 20/08/2021 and time 23:16.

Kata kunci: *Antimicrobial activity of Nigella sativa seed*

Lampiran 2. Hasil pencarian database *Sciencedirect*

WhatsApp x ScienceDirect Search Results - Ki x +

sciencedirect.com/search?articleTypes=FLA&lastSelectedFacet=accessTypes&q=Antibacteria%20activity%20of%20Nigella%20sativa%20seed&years=2020%2C20...

ScienceDirect Journals & Books karisah af

Find articles with these terms

Antibacterial activity of *Nigella sativa* seed

Advanced search

65 results

Download selected articles Export sorted by relevance | date

Refine by:

Years

- 2021 (12)
- 2020 (6)
- 2019 (4)

Show more

Article type

- Research articles (65)

Publication title

- Asian Pacific Journal of Tropical Medicine (10)
- Saudi Journal of Biological Sciences (8)

1 Response of lymphatic tissues to natural feed additives, curcumin (*Curcuma longa*) and black cumin seeds (*Nigella sativa*), in broilers against *Pasteurella multocida*
Poultry Science, 19 January 2021, ...
Muhammad Akmal Raheem, Hu Jjiangang, ... Kezong Qi
Download PDF Abstract Export

2 An investigation of physicochemical properties of *Nigella sativa* L. Seed oil from Al-Qassim by different extraction methods
Journal of King Saud University - Science, 25 September 2020, ...
Moneer Alrashidi, Darfuzi Derawi, ... Mohamad Findaus Yusoff
Download PDF Abstract Export

3 In vitro study on the activity of essential oil and methanolic extract from Algerian *Nigella sativa* L. Seeds on the growth kinetics of micro-organisms isolated from the buccal cavities of periodontal patients
Feedback

Type here to search

Kata kunci: *Antibacterial activity of Nigella sativa seed*

WhatsApp x ScienceDirect Search Results - Ki x ScienceDirect Search Results - Ki x +

sciencedirect.com/search?q=Antimicrobial%20activity%20of%20Nigella%20sativa%20seed&years=2021%2C2020%2C2019%2C2018%2C2017%2C2016%2C2015...

ScienceDirect Journals & Books karisah af

Find articles with these terms

Antimicrobial activity of *Nigella sativa* seed

Advanced search

70 results

Download selected articles Export sorted by relevance | date

Refine by:

Years

- 2021 (12)
- 2020 (10)
- 2019 (4)

Show more

Article type

- Research articles (70)

Publication title

- Saudi Journal of Biological Sciences (8)
- Asian Pacific Journal of Tropical Medicine (8)

1 Volatile compounds of black cumin (*Nigella sativa* L.) seeds cultivated in Bangladesh and India
Heliyon, 27 October 2020, ...
Yearul Kabir, Yoko Akasaka-Hashimoto, ... Michio Komai
Download PDF Abstract Export

2 Response of lymphatic tissues to natural feed additives, curcumin (*Curcuma longa*) and black cumin seeds (*Nigella sativa*), in broilers against *Pasteurella multocida*
Poultry Science, 19 January 2021, ...
Muhammad Akmal Raheem, Hu Jjiangang, ... Kezong Qi
Download PDF Abstract Export

3 In vitro study on the activity of essential oil and methanolic extract from Algerian *Nigella sativa* L. Seeds on the growth kinetics of micro-organisms isolated from the buccal cavities of periodontal patients
Feedback

Type here to search


Kata kunci: *Antimicrobial activity of Nigella sativa seed*

Lampiran 3. Hasil pencarian database *Google scholar*

The image shows a screenshot of a Google Scholar search results page. At the top, there is a search bar with the query "Antibacterial activity of Nigella sativa seed". Below the search bar, the results are displayed in a list format. The first result is a PDF titled "Antibacterial activity of Nigella sativa seed in various germination phases on clinical bacterial strains isolated from human patients" by M.H. Islam, I.Z. Ahmad, and M.T. Salman, published in E3 Journal of Biotechnology in 2013. The second result is an HTML article titled "Antibacterial activity of Thymoquinone, an active principle of Nigella sativa and its potency to prevent bacterial biofilm formation" by K. Chahleb, B. Kouidhi, H. Jrah, K. Mahdouani, et al., published in Springer in 2011. The third result is an HTML article titled "Assessment of in vitro antibacterial activity and cytotoxicity effect of Nigella sativa Oil" by AR Ugur, HT Dagi, B Ozturk, G Tekin, et al., published in ncbi.nlm.nih.gov in 2016. The fourth result is an HTML article titled "Evaluation of antibacterial activity of Nigella sativa seed extract against Porphyromonas gingivalis and Prevotella intermedia" by K. Senthilnathan, B. Ilango, T. Abirami, et al., published in Jidonline.com in 2020. The search results page also includes a sidebar with filters for "Kapan saja" (Since 2021, 2020, 2017), "Rentang khusus" (2011-2021), "Urutkan menurut" (relevansi, Urutkan menurut tanggal), "sertakan paten" (unchecked), "mencakup kutipan" (checked), and "Buat lansiran".

Kata kunci: *Antibacterial activity of Nigella sativa seed*

M A K A S S A R



Penelusuran lanjutan

Temukan artikel dengan semua kata

dengan frasa yang sebenarnya

dengan minimal satu kata

tanpa kata

di tempat kata saya muncul

di manapun dalam artikel

dalam judul artikel

Kembalikan artikel yang ditulis oleh

misalnya, "PJ Hayes" atau McCarthy

Kembalikan artikel yang dipublikasikan di

misalnya, J Biol Chem atau Alami

Kembalikan artikel tertanggal antara

2011 — 2021

misalnya, 1996

Google Cendekia "Antimicrobial activity of Nigella sativa seed"

Sekitar 331 hasil (0,06 detik)

Kapan saja Sejak 2021 Sejak 2020 Sejak 2017 Rentang khusus... 2011 — 2021 Telesuri

Urutkan menurut relevansi Urutkan menurut tanggal

sertakan paten mencakup kutipan Buat lansiran

[HTML] An active principle of *Nigella sativa* L., thymoquinone, showing significant antimicrobial activity against anaerobic bacteria [HTML] nih.gov
 MA Randhawa, AK Alenazy, MG Alrowaili... - Journal of Intercultural ... 2017 - ncbi.nlm.nih.gov
 Pharmazie, 1975 30:109-11. [PubMed] [Google Scholar] 7 Hanafy MS, Hatem ME. Studies on the antimicrobial activity of *Nigella sativa* seed (black cumini) J Ethnopharmacol. 1991;34:275-8. [PubMed] [Google Scholar] 8 Mahmoud HM...
 ☆ Dirujuk 28 kali Artikel terkait 9 versi

[PDF] Antimicrobial activity of aqueous, ethanolic, methanolic, cyclohexanic extracts and essential oil of *Nigella sativa* seeds [PDF] researchgate.net
 K Benlafia, K Karrouchi, Y Charkaoui... - Journal of chemical ... 2014 - researchgate.net
 ... Antimicrobial activities have been reported for the extracts of *N. sativa* seed in vitro [17,18]. The objective of this study is to investigate the antimicrobial activity of *Nigella sativa* seed various extracts obtained by maceration extraction and essential oil against different bacterial and ...
 ☆ Dirujuk 11 kali Artikel terkait 2 versi

[PDF] Comparative antimicrobial activity of some active constituents of *N. sativa* L. [PDF] psu.edu
 M Shohayeb, E Halawani - World Appl Sci J 2012 - Citeseer
 ... Saudi Pharm J. 5: 126-9. 21 Hanafy, MSM and ME Hatem, 1991. Studies on the antimicrobial activity of *Nigella sativa* seed (black cumini). J. Ethnopharmacol., 34: 275-278. 22. Saxena, A. and K. Vyas, 1986. Antimicrobial activity of seeds of some ethnopharmacal plants ...
 ☆ Dirujuk 24 kali Artikel terkait 3 versi

[PDF] Evaluation of antimicrobial potential of *Nigella sativa* oil in a model food matrix [PDF] farmaciajournal.com
 M Georgescu, PR Tăpăloaga, D Tăpăloaga... - ... 2018 - farmaciajournal.com
 ... Staphylococcus aureus J Ayub Med College (Abbottabad), 2008; 20: 72-74. 43. Hasan NA, Nawahwi MZ, Malek HA. Antimicrobial activity of *Nigella sativa* seed extract. Sains Malaysiana, 2013, 42(2): 143-147. 44. Hasanzadeh ...

Kata kunci: *Antimicrobial activity of Nigella sativa seed*

ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 4. Foto Jurnal

E3 Journal of Biotechnology and Pharmaceutical Research Vol. 4(1), pp. 8-13, January 2012
Available online at <http://www.e3journals.org/JBPR>
ISSN 2141-7474 © 2013 E3 Journals

Full Length Research Paper

Antibacterial activity of *Nigella sativa* seed in various germination phases on clinical bacterial strains isolated from human patients

Mohammad Hayatul Islam¹, Iffat Zareen Ahmad^{1*} and Mohammad Tariq Salman²

¹Department of Bioengineering, Integral University, Dasauli, Kursi Road, Lucknow-226026, Uttar Pradesh, India
²Department of Pharmacology, Era's Lucknow Medical College, Lucknow, Uttar Pradesh, India

Accepted 23 December, 2012

Nigella sativa is an important spice and flavoring agent which is widely used in various European and Asian cuisines. It harbors an array of medicinal properties as shown by various researches. Germination is a phenomenon during which rapid changes in metabolic activities and the interconversions of metabolites take place. The objective of present study was to evaluate the antibacterial activity of *N. sativa* seed that are on various germination phases against clinical bacterial strains isolated from pus, urine, ascitic fluid and cerebrospinal fluid of various patients. The minimum inhibitory concentration (MIC) values were determined by using a modified macro-broth dilution technique. The agar well diffusion method was used to test the antimicrobial effects of *N. sativa* extracts. Some broad spectrum antibiotics were used as positive control. The phytochemical constituents of *N. sativa* seed were also studied in germination phases. The distilled methanolic extracts of *N. sativa* showed significant antimicrobial activity against tested clinical strains of Gram-positive *Staphylococcus aureus* and Gram-negative *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa* and *Proteus mirabilis* bacteria. Results showed day-dependent and dose-dependent activity and a significant antimicrobial effect was observed as germination proceeded.

Keywords: *Nigella sativa* seed, germination phases, phytochemicals, clinical isolates, antibacterial activity.



Nigella sativa seed extract applicability in preparations against methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* and effects on human dermal fibroblasts viability

Grzegorz Gawron^a, Wojciech Krzyckowski^{fb}, Krzysztof Lemke^b, Alicja Oldak^b, Leszek Kadziński^{ca}, Bogdan Banecki^b

^aDepartment of Molecular and Cellular Biology, Biotechnology Faculty of University of Gdańsk and Medical University of Gdańsk, Abrahamia Str. 58, 80-307, Gdańsk, Poland
^bBioVico Sp. z o.o., Hutnicza Str. 15 B, 81-061, Gdynia, Poland

ARTICLE INFO

Keywords:
Nigella sativa
Thymoquinone
Methicillin resistant *Staphylococcus aureus*
Supercritical fluid extraction
Antibacterial
Cytotoxicity

ABSTRACT

Ethnopharmacological relevance: *Nigella sativa* L. seed extracts and oils have been embraced by traditional medicine of cultures inhabiting Middle East and North Africa for centuries. Among other uses, it has been applied against dermatitis and eczema often worsened by staphylococcal colonization of the skin.

Aim of the study: The study was conducted to evaluate applicability of *N. sativa* seed extract in antibacterial skin formulations by examination of its activity against methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* as well as cytotoxicity against human dermal fibroblasts.

Materials and methods: Two variants of *N. sativa* seed extract containing 9.91 and 2.10 % of thymoquinone were prepared by supercritical carbon dioxide extraction. The extracts and standards of their major volatile ingredients: thymoquinone, thymol, p-cymene alongside with the reference anti-septic: chlorhexidol and a combination of amylmetacresol with 2,4-dichlorobenzyl alcohol were subjected to evaluation of antibacterial efficacy against a collection of *Staphylococcus aureus* strains. The preparation based on Vaseline containing 1% of *N. sativa* extract was applied on Mueller-Hinton agar plates and its ability to inhibit *S. aureus* growth was examined. The MIT assay was employed to study cytotoxic effects of the thymoquinone-rich *N. sativa* seed extract against HDFa fibroblasts.

Results: *N. sativa* seed extract and thymoquinone have shown potent bacteriostatic and bactericidal effect against *Staphylococcus aureus*, including methicillin-resistant strains (MRSA) isolated in Poland. Results suggest that *N. sativa* seed extract activity against *S. aureus* should mainly be attributed to thymoquinone, which was effective in concentrations of 4–16 µg/ml. Regarding the activity against *S. aureus*, thymoquinone was more efficient than a combination of amylmetacresol with 2,4-dichlorobenzyl alcohol and comparable to chlorhexidol. The Vaseline-based preparation containing *N. sativa* extract caused growth inhibition comparable to an equally concentrated DMSO solution of the extract. The IC50 of *N. sativa* extract against HDFa fibroblast was determined at 0.2 mg/ml, which was 2-fold higher than the average MIC and MBC of the extract against *S. aureus*.

Conclusion: The observed effectiveness of *N. sativa* seed extracts against bacteria was found to be dominantly dependent on concentration of thymoquinone. Its efficiency against *S. aureus* isolates as well as results of cy-

Article

Phytochemical Screening, Antibacterial Activity and Heavy Metal Analysis of Ethnomedicinal Recipes and Their Sources Used Against Infectious Diseases

Nasir Mahmood ^{1,2}, Ruqia Nazir ³, Muslim Khan ³, Rashid Iqbal ³, Muhammad Adnan ⁴, Mohib Ullah ⁵ and Hongyi Yang ^{1,2,*}

¹ Key Laboratory of Saline-alkali Vegetation Ecology Restoration (Northeast Forestry University), Ministry of Education, Harbin 150040, China

² College of Life Sciences, Northeast Forestry University, Harbin 150040, China

³ Department of Chemistry, Kohat University of Science and Technology Kohat 26000, KPK, Pakistan

⁴ Department of Botanical and Environmental Sciences, Kohat University of Science and Technology, Kohat 26000, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

⁵ Key Laboratory of Functional Inorganic Material Chemistry, Ministry of Education (School of Chemistry and Material Science), Heilongjiang University, Harbin 150080, China

* Correspondence: 18830701@nefu.edu.cn

Received: 30 August 2019; Accepted: 24 October 2019; Published: 26 October 2019





Abstract: Plants are a rich source of secondary metabolites that have been found to have medicinal properties. The present study was conducted to evaluate the phytochemical screening, antibacterial activities and heavy metal analysis of seven medicinal plants i.e., *Nigella sativa* (seeds), *Trigonella foenum-graecum* (seeds), *Brassica campestris* (seeds), *Pistacia integerrima* (galls), *Linum usitatissimum* (seeds), *Hyssopus officinalis* (flowers), *Ephedra vulgaris* (dry branches) and its two recipes which are used by hakims (Practitioners of local herbal medicines), against different diseases particularly respiratory tract infections. The obtained results revealed that alkaloids (30%) and flavonoids (41%) were in maximum quantity in *P. integerrima* (galls) while saponins (10.9%) were in maximum quantity in Recipe 1. The antibacterial activity was determined by the agar well disc diffusion method using methanol, ethanol, chloroform and deionized water extracts. Each plant extract was tested against one Gram-positive (*Streptococcus pneumoniae*) and two Gram-negative (*Pseudomonas aeruginosa* and *Klebsiella pneumoniae*) bacteria. Maximum zones of inhibition in methanol, ethanol, chloroform and aqueous extract were seen in *T. foenum-graecum* against *S. pneumoniae* (20.06 ± 0.16 mm), *B. campestris* against *S. pneumoniae* (22.40 ± 0.24 mm), Recipe 2 against *K. pneumoniae* (20.06 ± 0.16 mm) and *N. sativa* against *S. pneumoniae* (20.23 ± 0.16 mm), respectively. The concentrations of heavy metals were determined by atomic absorption spectrophotometer and showed the existence of high concentration of Iron (Fe), Lead (Pb) and Chromium (Cr). Thus, it has been found that medicinal

Hindawi
The Scientific World Journal
Volume 2019, Article ID 5985207, 7 pages
<https://doi.org/10.1155/2019/5985207>



Research Article

Development of Novel Topical Cosmeceutical Formulations from *Nigella sativa* L. with Antimicrobial Activity against Acne-Causing Microorganisms

Nirmani Wishwakala Nawarathne,¹ Kanchana Wijesekera,¹
Weerasinghe Mudiyansele Dilip Gaya Bandara Wijayarathne ²
and Mayuri Napagoda ³

¹Department of Pharmacy, Faculty of Allied Health Sciences, University of Ruhuna, Galle 80000, Sri Lanka

²Department of Microbiology, Faculty of Medicine, University of Ruhuna, Galle 80000, Sri Lanka

³Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Ruhuna, Galle 80000, Sri Lanka

Correspondence should be addressed to Mayuri Napagoda; mayurinapagoda@yahoo.com

Received 7 May 2019; Revised 15 July 2019; Accepted 31 July 2019; Published 14 August 2019

Academic Editor: Monika Wujec

Copyright © 2019 Nirmani Wishwakala Nawarathne et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Acne vulgaris occurs due to the inflammation of sebaceous follicles in the skin. It is triggered by the activity of some bacterial species like *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, and *Staphylococcus epidermidis*. Acquisition of antibiotic resistance by these microorganisms and adverse effects associated with the current treatment regimens necessitate the introduction of novel therapeutic agents for acne vulgaris. Thus, this study was undertaken to develop novel gel formulations from seeds of *Nigella sativa* L. and to evaluate the antibacterial potential against some acne-causing bacterial species. The antibacterial activity of seed extracts was initially screened against *S. aureus* and *P. acnes* by the agar well diffusion method. Thereafter, topical gels were formulated incorporating the ethyl acetate extract of seeds of *N. sativa* at three different concentrations. These topical formulations were subjected to antimicrobial activity studies while the stability was evaluated over a period of 30 days. All three formulations were capable of inhibiting the growth of *S. aureus* and *P. acnes*, with the highest antibacterial activity in the formulation comprising 15% of the seed extract. Interestingly, the antibacterial potency of this formulation against *S. aureus* surpassed the commercial synthetic product used as the positive control. Moreover, any alteration in color, odor, homogeneity, washability, consistency, and pH was not observed while the antibacterial potency was also retained during the storage period. The present antibacterial activity in topical gel formulations developed from the ethyl acetate extract of *N. sativa* suggests their



Chemical Composition and *In vitro* Antibacterial and Cytotoxic Effect of *Nigella sativa* L. Seed Extract

Cyuzuzo Callixte¹, Heny Arwati², Tuyishimire Irene³, Shahzad Shoukat¹

¹Graduate Program in Immunology, Postgraduate School, Universitas Airlangga, Indonesia

²Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Universitas Airlangga, Indonesia.

³Department of Horticulture, College of Agriculture, Animal Science and Veterinary Medicine, University of Rwanda, Rwanda.

Article Info

Article History:

Submitted October 2020

Accepted December 2020

Published March 2021

Keywords:

antibacterial, cytotoxicity, *Nigella sativa* L, MIC, inhibition zone

DOI

<https://doi.org/10.15294/kemas.v16i3.26799>

Abstract

Nigella sativa L. is a plant with high medicinal profile in the treatment of diseases. This study aimed to assess the chemical composition and *in vitro* antibacterial and cytotoxic effect of *Nigella sativa* L. seed extract. Seeds were purchased from supermarket and blended into powder using electric blender. The powder was macerated with 96% methanol. The extracts were then qualitatively screened to test the presence of secondary metabolites and agar well diffusion method was employed to study the antibacterial activity of extracts. In this evaluation, 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay was used to examine the cytotoxic effect of extract on peripheral blood mononuclear cells (PBMCs). MTT assay was done on different extract concentrations for 3 days and the results were recorded daily. The findings revealed the presence of tannins, terpenoids, steroids, saponins, alkaloids, phenolic compounds and flavonoids. The antibacterial activity was observed with the inhibition zones ranging from 11.3 ±1.1 to 16.3 ±1.5mm while the minimum inhibitory concentration (MIC) values of extract ranged between 0.5 and 1.25 µg/mL. The black seed extracts contain bioactive substances with germicidal activity and *in vitro* administration of black seed extract up to the dose of 100 µg/mL resulted no cytotoxic effect on PBMCs.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kharisah Afifah akrab disapa Risa, dilahirkan di Maros, 26 Agustus 1999. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Azikin dan Aisyah Rahman ini menempuh pendidikan dasar di SDI Padang Lampe pada tahun 2005 dan menyelesaikan pada tahun 2011, kemudian pendidikan tingkat lanjut ditempuh di SMP Negeri 1 Pujananting pada tahun 2011 dan menyelesaikan pada tahun 2014. Pendidikan tingkat menengah (sederajat) ditempuhnya di SMA Negeri 3 Barru pada tahun 2014 dan menyelesaikannya pada tahun 2017. Pada 2017 penulis terdaftar sebagai salah satu Mahasiswi Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar melalui jalur UM-PTKIN. Itu merupakan suatu kesyukuran yang diberikan Allah swt. kepada penulis, semoga kesuksesan akan diraihinya kelak. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R