

**STUDI PUSTAKA POLA PENGGUNAAN ANTIBIOTIK INFEKSI**

**SALURAN KEMIH (ISK)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**MA'WAHDANIA MUSLIMIN**

**NIM : 70100116092**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Studi Pustaka Pola Penggunaan Antibiotik Infeksi Saluran Kemih (ISK)*” yang disusun oleh Ma'wahdania Muslimin, NIM: 70100116092, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 30 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi

Gowa, 31 Agustus 2021  
22 Muharram 1443

### DEWAN PENGUJI:

|               |  |         |
|---------------|--|---------|
| Ketua         | : Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M. Kes.                    | (.....) |
| Sekretaris    | : Apt. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M. Sc.              | (.....) |
| Munaqisy I    | : Apt. Nurshalati Tahar, S. Farm., M.Si.               | (.....) |
| Munaqisy II   | : Dr. Asriyah, M. Pd.I.                                | (.....) |
| Pembimbing I  | : Apt. Mukhriani, S.Si., M. Si.                        | (.....) |
| Pembimbing II | : Apt. Alifia Putri Febriyanti, S.Farm., M.Farm., Klin | (.....) |

Diketahui Oleh:

Dewan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP. 19600701 200604 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ma'wahdania Muslimin  
Nim : 70100116092  
Tempat, Tanggal Lahir : Sengkang, 19 Juni 1998  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Farmasi  
Alamat : Hertasning, Perum. Halmin Residence Blok C1/14  
Judul : Studi Pustaka Pola Penggunaan Antibiotik Infeksi Saluran Kemih (ISK)

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Februari 2021

Penyusun

**Ma'wahdania Muslimin**  
**70100116092**

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, luapan kasih sayang-Nya melampaui sifat penyayang-Nya itu. Hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini. Shalawat dan taslim penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menyingkap tabir kegelapan dan kejahiliyahan umat manusia menuju generasi hanifiyyah yang beradab dan berperikemanusiaan. Skripsi dengan judul **“Studi Pustaka Pola Penggunaan Antibiotik Infeksi Saluran Kemih (ISK)”**. Ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa untaian do'a, secarik nasehat dan berbagai motivasi, segudang pemikiran, serta berbagai petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya.

Terkhusus ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Ayahanda **Muslimin Ab. Tang** serta ibunda **Hj. Marhani, S.Pd.** dengan seluruh kekuatan dan do'a-do'anya yang tak pernah terhenti disetiap sujud, cinta dan sayang, serta pengorbanannya selama ini untuk penulis hingga dapat menyelesaikan program studi S1 dan kakak saya tercinta **Mustamarsyam** dan **Marviani Mulsyam, S.E.** terima kasih telah menyemangati saya sampai detik ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Hamdan Juhanis, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu didalamnya.
2. Dr. dr. Syahtira Jalaluddin, Sp. A., M.Kes selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta wakil Dekan I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dan senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasehat kepada penulis.
3. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., Apt. selaku ketua jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar dan Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt selaku sekretaris jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar atas segala fasilitas yang diberikan dan senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasehat kepada penulis.
4. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis, dan Alifia Putri Febriyanti, S. Farm., M. Farm., Klin., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
5. Dwi Wahyuni Leboe, S. Si., M. Si. Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama penulis menjalani proses perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan Farmasi hingga saat ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepada teman-teman D16OXIN yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi serta motivasi dan dukungannya.
8. Kepada Fakhrollah yang selalu menemani, mendorong, memberikan semangat kepada penulis dan membantu menyelesaikan skripsi serta memberikan motivasi dan dukungannya.
9. Sahabat sejak SMA hingga sekarang Novita Sari, Nur Fahmi Rahman, Musdalifah, kakak Firman AR yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan semangat baik secara langsung maupun lewat komunikasi.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan kemaslahatan bersama dan bernilai ibadah disisi Allah SWT.Aamiin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 19 Februari 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
Ma'wahdania Muslimin  
70100116092  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>JUDUL</b> .....   | i   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                             | ii  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....                   | iii |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                | iv  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                    | vii |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                       | ix  |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                      | x   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                   |     |
| A. Latar Belakang .....                                    | 1   |
| B. Rumusan Masalah.....                                    | 4   |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                     | 4   |
| D. Tinjauan Islam .....                                    | 4   |
| <b>BAB II METODE PENELITIAN</b>                            |     |
| A. Strategi Pencarian Literatur .....                      | 9   |
| 1. Framework yang digunakan.....                           | 9   |
| 2. Kata Kunci yang digunakan.....                          | 10  |
| 3. Sumber Data.....  | 10  |
| 4. Gambar Prisma Diagram.....                              | 11  |
| B. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Jurnal/Artikel .....      | 12  |
| C. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas.....               | 12  |
| 1. Hasil Pencarian dan Seleksi Studi.....                  | 12  |
| 2. Daftar Artikel Hasil Pencarian.....                     | 13  |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>                        |     |
| A. Hasil Penelusuran Jurnal.....                           | 17  |
| B. Analisis Jurnal.....                                    | 17  |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>                                   |     |
| A. Pembahasan Hasil Analisis Jurnal .....                  | 26  |
| B. Tabel Penggunaan Antibiotik Infeksi Saluran Kemih ..... | 35  |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                       |     |
| A. Kesimpulan .....  | 38  |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| B. Saran .....           | 38 |
| <b>KEPUSTAKAAN</b> ..... | 39 |
| <b>LAMPIRAN</b> .....    | 42 |
| <b>BIOGRAFI</b> .....    | 46 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## ABSTRAK

Nama : Ma'wahdania Muslimin

Nim : 70100116092

Judul : Studi Pustaka Pola Penggunaan Antibiotik Infeksi Saluran Kemih (ISK)

---

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi yang sering menyerang pria maupun wanita dari berbagai usia dengan berbagai tampilan klinis dan episode. ISK sering menyebabkan morbiditas dan dapat secara signifikan menjadi mortalitas. Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui pola penggunaan antibiotik infeksi saluran kemih (ISK). Metode Penelitian ini adalah Studi Literatur menggunakan PICO (*Populasi, Intervensi, Comparison, dan Outcome*) Framework dengan kata kunci Pola Penggunaan Antibiotik Infeksi Saluran Kemih (ISK) di Rumah Sakit, Antibiotik Infeksi Saluran Kemih (ISK), *Urinary Tract Infection Antibiotic, Urinary Tract Infection, The Pattern Of Antibiotic Use Of Urinary Tract Infection In Hospital*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa antibiotik yang paling sering digunakan untuk penderita infeksi saluran kemih (ISK) yaitu ciprofloxacin, levofloxacin, ceftriaxone, cefixime dan trimethoprim. Kesimpulan dari penelitian Studi Literatur ini menyatakan bahwa Antibiotik yang digunakan untuk pasien infeksi saluran kemih berbeda-beda, yang umumnya dipengaruhi oleh faktor usia. Antibiotik paling sering digunakan adalah sefalosporin generasi ketiga dan quinolon. Antibiotik yang sering digunakan dalam golongan quinolon yaitu ciprofloxacin, levofloxacin. Antibiotik yang sering digunakan dalam golongan fluoroquinolon yaitu trimethoprim. Antibiotik yang sering digunakan dalam golongan sefalosporin generasi ketiga yaitu ceftriaxone, ceftazidime, ceftibuten, cefixime, cefoperazone, cefarox dan ceftizoxim.

**Kata Kunci:** Antibiotik, Infeksi Saluran Kemih (ISK)

## ABSTRACT

Name : Ma'wahdania Muslimin

Nim : 70100116092

Title : Literature Study On The Use Of Antibiotics For Urinary Tract Infection (UTI)

---

Urinary tract infections (UTIs) are infections that often affect both men and women of various ages with varying clinical appearances and episodes. UTIs often cause morbidity and can significantly become mortality. The purpose of this study is to determine the pattern of antibiotic use of urinary tract infections (UTIs). This Research Method is a Literature Study using PICO (Population, Intervention, Comparison, and Outcome) Framework with keywords Antibiotic Use Patterns Urinary Tract Infections (UTIs) in Hospitals, Antibiotics Urinary Tract Infection Antibiotics, Urinary Tract Infection, The Pattern Of Antibiotic Use Of Urinary Tract Infection In Hospital. The results showed that the most commonly used antibiotics for people with urinary tract infections (UTIs) are ciprofloxacin, levofloxacin, ceftriaxone, cefixime and trimethoprim. The conclusion of this Literature Study study states that antibiotics used for urinary tract infection patients vary, which are generally influenced by age factors. The most commonly used antibiotics are third-generation cephalosporins and quinolon. Antibiotics that are often used in the quinolon group are ciprofloxacin, levofloxacin. Antibiotics that are often used in the fluoroquinolone group are trimpethoprim. Antibiotics often used in the third generation cephalosporin group are ceftriaxone, ceftazidime, ceftibuten, cefixime, cefoperazone, cefarox dan ceftizoxim.

**Keyword** : Antibiotic, Urinary Tract Infection (UTI)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana interaksi antara senyawa kimia atau obat yang digunakan pada sistem biologi seperti manusia dan hewan. Farmakologi juga dapat menjadi dasar pengetahuan bagi ilmu-ilmu dalam bidang farmasi. Seiring dengan perkembangan ilmu dan tuntutan zaman, ilmu farmakologi kemudian berkembang menjadi beberapa cabang diantaranya farmakokinetik, farmakodinamika, toksikologi, bioanalisis, farmakologi klinik, farmakokinetika klinik, toksikologi klinik. Peran ilmu-ilmu farmakologi terasa penting dengan seiring adanya perluasan paradigma kefarmasian *daru product oriented* menjadi *patient oriented* yang menuntut pelayanan langsung seorang apoteker kepada pasien yaitu pelayanan informasi obat, konsultasi penggunaan obat pada pasien, pemantauan terapi dirumah sakit, pemilihan obat dalam proses terapi (Prof. Agung. 2018).

Interaksi obat merupakan perubahan efek obat utama oleh pemberian obat lain sebelumnya atau secara bersamaan. Penggunaan antibiotik seringkali disertai dengan obat lain untuk mengatasi gejala lain atau komplikasi dari penyakit ini sehingga dapat menimbulkan interaksi antar obat. Selain itu, interaksi obat juga memiliki dampak yang berbeda-beda bila ditinjau dari tingkat keparahan interaksi sehingga perlu dimonitoring (Indira et, al. 2015).

Farmasis memiliki peran penting dalam mengidentifikasi serta memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat atau *Drug*

*Related Problems* (DRP) baik yang bersifat potensial maupun aktual. *Drug Related Problem* (DRP) atau masalah terkait obat adalah bagian dari asuhan kefarmasian (pharmaceutical care) yang menggambarkan suatu keadaan, dimana profesional kesehatan (apoteker) menilai adanya ketidaksesuaian pengobatan dalam mencapai terapi yang sesungguhnya (Musdalipah. 2018).

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah suatu penyakit yang dimana terbentuknya mikroorganisme dalam jumlah banyak di saluran kemih. Dalam rangka meningkatkan penggunaan obat yang rasional, farmasis memiliki peran penting terutama dalam mengidentifikasi serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat atau *Drug Related Problem* (DRP) baik yang bersifat potensial maupun aktual (Musdalipah. 2018).

ISK menempati urutan kedua setelah infeksi saluran nafas atas (ISPA) dan sebanyak 8,3 juta kasus dilaporkan per tahun. ISK dapat menyerang pasien dari segala usia mulai bayi baru lahir hingga orang tua. Di negara maju diperkirakan biaya yang harus dihabiskan untuk penanganan ISK ini berkisar antara 2-6 milyar dolar setiap tahunnya (Hermiyanty. 2016).

Infeksi saluran kemih di Indonesia dan prevalensinya tinggi. Jumlah penderita ISK di Indonesia adalah 95 kasus/ 104 penduduk pertahunnya atau sekitar 180.000 kasus baru pertahun (Depkes. 2014).

Dikatakan ISK jika terdapat kultur urin positif  $\geq 100.000$  CFU/mL. Ditemukannya positif (dipstick) leukosit esterase adalah 64 - 90%. Positif nitrit pada dipstick urin, menunjukkan konversi nitrat menjadi nitrit oleh bakteri gram negatif tertentu (tidak gram positif), sangat spesifik sekitar 50% untuk infeksi

saluran kemih. Temuan sel darah putih (leukosit) dalam urin (piuria) adalah indikator yang paling dapat diandalkan infeksi ( $> 10$  WBC / hpf pada spesimen berputar) adalah 95% sensitif tapi jauh kurang spesifik untuk ISK. Secara umum,  $> 100.000$  koloni/mL pada kultur urin dianggap diagnostik untuk ISK (M.Grabe dkk, 2015).

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah penyakit infeksi yang sering menyerang pria maupun wanita dari berbagai usia dengan berbagai tampilan klinis dan episode. ISK sering menyebabkan morbiditas dan dapat secara signifikan menjadi mortalitas. Walaupun infeksi saluran kemih itu normalnya bebas dari pertumbuhan bakteri, dan bakteri yang umumnya naik dari rektum dapat menyebabkan terjadinya ISK. Ketika virulensi meningkat atau pertahanan inang menurun, adanya inokulasi bakteri dan kolonisasi, maka infeksi pada saluran kemih dapat terjadi (Kurnia. 2015).

Penatalaksanaan pada infeksi berkaitan dengan pemberian antibiotika, penggunaan antibiotika yang rasional sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah resistensi kuman. Berkaitan dengan hal tersebut Ikatan Ahli Urologi Indonesia telah menyusun panduan yang merujuk pada EAU dan Guidline ISK IAUI 2007 (saat ini direvisi dalam Guideline ISK IAUI 2015).

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat apakah sudah tepat pola penggunaan antibiotik pada pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK), melihat bagaimana pola penggunaan antibiotik tersebut pada pasien, apakah sesuai dengan penyakitnya sehingga diberikan antibiotik tersebut.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pola penggunaan antibiotik pada penderita Infeksi Saluran Kemih (ISK)?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola penggunaan antibiotik pada pasien penderita penyakit Infeksi Saluran Kemih (ISK)

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tersebut yaitu agar kita dapat mengetahui pola penggunaan antibiotik yang digunakan pada penderita Infeksi Saluran Kemih (ISK)

## D. Tinjauan Islam

Adapun ayat yang berhubungan dengan penelitian kami yaitu ayat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 26:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوثُهُ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۗ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ مَّا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۗ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu.9) Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi, orang-orang kafir berkata, “Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?” Dengan (perumpamaan) itu banyak orang yang disesatkan-Nya.10) Dengan itu pula banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Namun, tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu, selain orang-orang fasik,11).

9) Makhluk yang kecil yang dikira lemah, seperti nyamuk, semut, lebah, laba-laba, atau lainnya, sebenarnya banyak menyimpan hikmah untuk menjadi pelajaran bagi manusia. 10) Seseorang menjadi sesat karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Swt. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mereka ingkar dan tidak mau memahami mengapa Allah Swt. menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan. Akibatnya, mereka menjadi sesat. 11) Orang fasik adalah orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik dengan ucapan maupun perbuatan (Kemenag. 2019).

Sebagian kuman yang berbahaya hanya dapat hidup dalam tubuh manusia. Untuk melangsungkan kehidupannya, kuman tersebut harus pindah dari orang yang telah terkena infeksi kepada orang sehat yang belum kebal terhadap kuman tersebut. Kuman mempunyai banyak cara atau jalan agar dapat keluar dari orang yang terkena infeksi untuk pindah dan masuk ke dalam seseorang yang sehat. Kalau kita dapat memotong atau membendung jalan ini, kita dapat mencegah penyakit menular. Kadang kita dapat mencegah kuman itu masuk maupun keluar tubuh kita. Kadang kita dapat pula mencegah kuman tersebut pindah ke orang lain. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an yang melarang untuk berlebihan termasuk dalam makanan, karena lebih berpotensi terjadinya penyakit generatif. Makan terlalu banyak tidak hanya berpengaruh buruk pada tubuh kita tapi juga berpengaruh buruk pada psikis kita.

Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu dari kebenaran dengan menyebutkan sesuatu baik sedikit maupun banyak, meskipun hanya menyebutkan perumpamaan dengan sesuatu yang sangat kecil,

seperti seekor nyamuk atau lalat dan binatang serupa lainnya. Yang Allah jadikan perumpamaan akan lemahnya semua yang disembah selain Allah. Adapun orang-orang Mukmin mereka mengetahui hikmah Allah dalam membuat perumpamaan dengan sesuatu yang kecil maupun besar makhluk-Nya, sedangkan orang-orang kafir mereka mencemooh sembari berkata: “apa maksud Allah membuat perumpamaan dengan serangga-serangga yang hina ini?” Maka Allah menjawab pengingkaran mereka, bahwa tujuannya adalah untuk menguji dan membedakan mana orang mukmin dan mana orang yang kafir, karena itu Allah memalingkan dengan perumpamaan tersebut banyak manusia dari kebenaran lantaran penghinaan mereka terhadap bentuk perumpamaan itu dan sebaliknya Allah memberikan taufik bagi orang selain mereka untuk mendapatkan tambahan keimanan dan hidayah. Dan Allah tidak menzalimi siapapun, karena Dia tidaklah memalingkan dari kebenaran kecuali orang-orang yang sudah keluar dari ketaatan kepada-Nya.

Tafsir Al-Mukhtashar menjelaskan bahwa Sesungguhnya Allah-Subhanahu wa Ta'ala- tidak malu untuk membuat perumpamaan-perumpamaan yang dikehendaki-Nya. Maka Allah membuat perumpamaan berupa nyamuk, atau sesuatu yang lebih besar atau yang lebih kecil dari itu. Sedangkan manusia terbelah menjadi dua golongan dalam menyikapinya, yaitu golongan mukmin dan golongan kafir. Orang-orang mukmin percaya dan yakin bahwa di balik perumpamaan itu pasti ada hikmah tertentu. Sedangkan orang-orang kafir justru bertanya-tanya dengan nada sinis tentang alasan Allah membuat perumpamaan berupa makhluk-makhluk yang remeh-temeh, seperti nyamuk, lalat, laba-laba dan



lain-lain. Kemudian jawaban datang dari Allah, “Sesungguhnya dalam perumpamaan-perumpamaan itu terdapat petunjuk, bimbingan dan ujian bagi manusia. Maka ada orang-orang yang disesatkan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan itu, karena mereka enggan merenungkannya. Dan golongan ini sangat banyak. Namun ada orang-orang yang Allah berikan petunjuk ke jalan yang benar, karena mereka mau mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan tersebut. Dan jumlah mereka juga sangat banyak. Allah hanya menyesatkan orang-orang yang memang layak untuk tersesat, yaitu orang-orang yang memang layak untuk tersesat, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, seperti orang-orang munafik.

Tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan nyamuk atau semacamnya baik kecil maupun besar sebagai nasihat dan pelajaran. Orang-orang mukmin mengetahui bahwa perumpamaan itu benar, tidak berubah, tidak batil dan datang dari Allah. Sedangkan orang-orang kafir, mereka mengolok-olok perumpamaan itu dan meremehkan faidahnya. Allah menghendaki perumpamaan itu untuk menyesatkan suatu kaum dan memberi hidayah bagi kaum lainnya. Akan tetapi kesesatan itu untuk orang-orang fasik, yaitu orang-orang tidak taat kepada Allah. Sesungguhnya mereka berbuat fasik, kemudian Allah menyesatkan mereka dengan kefasikan mereka sendiri. Ayat ini diturunkan sebagaimana disebutkan Ath-Thabari Ketika orang-orang kafir menghujat tentang keberadaan Al-Qur'an sebagai kalam Allah dengan berkata: “Sesungguhnya Allah malu membuat

perumpamaan dengan sesuatu yang hina seperti lalat, semut, lebah dan laba-laba dan hal itu tidak sesuai dengan ucapan orang-orang yang fasih”.



## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. *Strategi Pencarian Literatur*

##### 1. Framework (PICO)

Studi pustaka merupakan pengkajian teori dan beberapa referensi yang didapatkan dari literatur-literatur ilmiah, dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang relevan seperti buku, jurnal atau artikel ilmiah yang terkait dengan topik yang dipilih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu mengumpulkan informasi mengenai hal-hal variabel berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya (Ramanda. 2019).

Studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca untuk memperoleh atau mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya kemudian membandingkan artikel yang satu dengan artikel lainnya sehingga mendapatkan informasi yang menarik yang terdapat dalam suatu *literature review* (Triandini, Jayanatha, Indrawan, Putra dan Iswara. 2019).

Pada penelitian ini dilakukan proses pencarian artikel secara online dengan metode atau kerangka secara PICO. Semua artikel yang telah diperoleh dianalisis dan disesuaikan dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kriteria inklusi dan disaring jika tidak relevan dengan penelitian kemudian dimasukkan ke dalam tabel eksklusi (Mutiudin et al. 2019). PICO merupakan salah satu metode atau kerangka kerja yang praktis digunakan untuk mengidentifikasi sumber data yang tepat dan menganalisis data yang relevan. PICO merupakan singkatan dari

*Populasi, Intervensi, Control, dan Outcome*. PICO digunakan untuk membentuk pertanyaan dan mempermudah dalam pencarian literatur (Health Researches. 2019). Kerangka PICO yang digunakan

Population : Infeksi Saluran Kemih (ISK)

Intervensi : Metode yang digunakan *cross sectional*

Comparison : Tidak ada pembanding


Outcome : Antibiotik yang digunakan pada pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK)

## **2. Kata Kunci**

Pada Penelitian ini menggunakan artikel penelitian yang menggunakan metode eksperimental. Kata kunci yang digunakan pada proses penelusuran artikel penelitian ini adalah “Pola Penggunaan Antibiotik Infeksi Saluran Kemih (ISK) di Rumah Sakit”, “Antibiotik Infeksi Saluran Kemih (ISK)”, “*Urinary Tract Infection Antibiotics*”, “*Urinary Tract Infection*”. “*The Pattern Of Antibiotic Use Of Urinary Tract Infections In Hospital*”

## **3. Sumber Data**

Pada penelitian ini pencarian artikel penelitian dilakukan secara online dengan menggunakan database yakni Google Scholar, NCBI-PMC, dan Medline.

**Gambar 1. Prisma Diagram**

## **B. Kriteria Inklusi Dan Eksklusi**

### **1. Kriteria Inklusi**

Kriteria inklusi yang digunakan pada penelitian ini yaitu harus sesuai dan relevan dengan penelitian yang akan digunakan. Kriteria inklusi dari penelitian ini diantaranya :

- a. Artikel yang digunakan memiliki jenis studi desain eksperimental
- b. Artikel dipublikasikan dari tahun 2015-2020
- c. Bahasa yang digunakan pada artikel penelitian yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- d. Subjek yang digunakan pada artikel penelitian yaitu Antibiotik Infeksi Saluran Kemih (ISK) di Rumah Sakit
- e. Isi jurnal berkaitan dengan antibiotik infeksi saluran kemih (ISK) di Rumah Sakit

### **2. Kriteria Eksklusi**

Kriteria eksklusi yang terdapat pada penelitian ini diantaranya:

- a. Subjek yang dianalisis biaya penggunaan antibiotik Infeksi Saluran Kemih (ISK)
- b. Subjek yang digunakan ibu hamil
- c. Isi jurnal yang tidak full teks

## **C. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas**

### **1. Hasil Pencarian dan Seleksi Studi**

Berdasarkan hasil pencarian beberapa referensi berupa artikel penelitian dengan menggunakan database secara online yakni Google Scholar, Medline, dan NCBI-

PMC dengan menggunakan kata kunci yang sesuai didapatkan sebanyak 14 jurnal telah relevan untuk dianalisis dan sudah memenuhi kriteria inklusi. 279 Jurnal ditemukan sesuai kata kunci kemudian di skrining. 168 Jurnal tidak relevan (tidak menjelaskan Antibiotik Infeksi Saluran Kemih (ISK). 111 Jurnal relevan dengan masalah yang akan diteliti. 97 Jurnal dieksekusi karena tidak memenuhi kriteria inklusi. 14 Jurnal relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dari 14 jurnal ini telah menjelaskan mengenai potensi antibiotik infeksi saluran kemih di beberapa rumah sakit.

### 1. Daftar Artikel Hasil Pencarian

**Tabel 1. Daftar Artikel Hasil Pencarian**

| No. | Penulis dan Tahun  | Judul   | Kriteria artikel | Database |
|-----|--|---|------------------|----------|
| 1.  | Anne Holm, Gloria, Cordoba Dan Rune Aabenhus. 2019.                              | <i>Prescription Of Antibiotics For Urinary Tract Infection In General Practice In Denmark</i>                         | Q1               | Ncbi     |
| 2.  | Dr.J.Louis Ferdin Zeno, Dr.MK Uthaya Sankar, Dr.R.Gopal, Dr. IS.SUman Babu. 2019 | <i>Study Of Clinical Profile And Antibiotic Susceptibility Of Urinary Tract Infection In A Tertiary Care Hospital</i> | Q1               | Medline  |
| 3.  | Helena Kornfa, Katarina Hedin, Eva Melander, Dll. 2019.                          | <i>Increased Adherence To Treatmeny Guidelines In Patients With Urinary Tract</i>                                     | Q1               | Ncbi     |

|    |   |   |    |                |
|----|---|---|----|----------------|
|    |   | <i>Infection In Primary Care: A Retrospective Study</i>   |    |                |
| 4. | Jennifer Kranz, Stefanie Schmidt, Cordula Lebert, Laila Schneidewind, Guido Schmiemann, Florian Wagelenher. 2017. | <i>Uncomplicated Bacterial Community-Acquired Urinary Tract Infection In Adults</i>   | Q1 | Ncbi           |
| 5. | Dr.Somanjana Ghosh, Dr Soumyajyoti Bandyopadhyay, Dr Arita Lahiri, Dr Shouvanik Adhya, Ankur Bhattacharjee. 2017. | <i>Pattern Of Antibiotic Sensitivity In Clinically Suspected Cases Of Urinary Tract Infections: An Observation From A Tertiary Care Hospital In West Bengal</i> | Q1 | Medline        |
| 6. | Septiana Kurniasari, Fauzan Humaidi, Ida Sofiyati. 2020.  | Penggunaan Antibiotik Oleh Penderita Infeksi Saluran Kemih Di Instalasi Rawat Inap (IRNA) 2 RSUD Dr.H. Slamet Martdodirdjo Pamekasan Tahun 2018                 | S1 | Google Scholar |
| 7. | Ryan Ravi Is Syahputra, Dini Agustina, Septa Surya Wahyudi. 2018  | Pola Kepekaan Bakteri Terhadap Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih Di RSD Dr. Soebandi Jember  | S1 | Google Scholar |
| 8. | Nina Irmayanti Harahap.   | Penggunaan  | S1 | Google         |



|     |   |  |    |                |
|-----|---|--|----|----------------|
|     | 2018.   | Antibiotik Pada Penyakit Infeksi Saluran Kemih Di RSUD Datu Beru Takengon  |    | Scholar        |
| 9.  | A.Rufaidah Hashary, Marianti Manggau, Hasyim Kasim. 2018.                 | Analisis Efektifitas Dan Efek Samping Penggunaan Antibiotik Pada Infeksi Saluran Kemih Di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.         | S1 | Google Scholar |
| 10. | FF Baso, DA Perwitasari, Dan I Risdiana. 2018.                            | Efektivitas Antibiotik Golongan Sefalosporin Generasi Ke-3 Dibandingkan Fluroquinolon Terhadap Pasien Infeksi Saluran Kemih Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. | S1 | Google Scholar |
| 11. | Sintya Yustira Veranandal, Sabaniah Indjar Gamal, Jaka Fadraersadal. 2017 | Studi Pola Penggunaan Antibiotik Dan Analgesik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK) (Studi Dilaksanakan Di Instalasi Rawat Inap RSUD                        | S1 | Google Scholar |

|     |   |  |    |                |
|-----|---|--|----|----------------|
|     |   | Abdul Wahab Sjahranie  |    |                |
| 12. | Jenny Pontoon, Okpri Meila, Nurma Amalita Fariza. 2017                    | Pola Peresepan Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih Di RSPAD Gatot Soeboroto Jakarta   | S1 | Google Scholar |
| 13. | Ahmad Siddiq Muhajir, Priyo Budi Purwono, Samsriyaningsih Handayani. 2016 | Gambaran Terapi Dan Luaran Infeksi Saluran Kemih Oleh Bakteri Penghasil <i>Extended Spectrum Beta Lactamase</i> Pada Anak Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya | S1 | Google Scholar |
| 14. | Elly Puspitosari Dan Zakky Cholisoh. 2015.                                | Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih Di Instalasi Rawat Inap RSPAU Dr.S.Hadrjolukito Yogyakarta Tahun 2014                 | S1 | Google Scholar |

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Hasil Penelusuran Jurnal

Berdasarkan hasil penelusuran artikel penelitian secara online dengan menggunakan data base yakni, Google Scholar, Medline, NCBI-PMC. Kata kunci yang digunakan pada proses pencarian artikel penelitian berhubungan dengan topik yang akan dikaji atau yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu “Pola Penggunaan Antibiotik Infeksi Saluran Kemih (ISK)”, “Infeksi Saluran Kemih (ISK)”, “*Urinary Tract Infection*”, “*The Pattern Of Antibiotics Use Of Urinary Tract Infections In Hospital*”. Berdasarkan tabel hasil pencarian jurnal yang telah disusun terdapat 14 jurnal yang relevan sesuai dengan kriteria inklusi.

##### B. Analisis Jurnal

Tabel 3. Analisa PICO

| No. | Journal Biography  | Population   | Intervention                 | Comparasion | Outcome  |
|-----|--|--|------------------------------|-------------|--|
| 1.  | <i>Prescription Of Antibiotics For Urinary Tract Infection In General Practice In Denmark</i><br><br>Author:<br>Anne Holm, Dkk.<br>2019. | Menilai proporsi dan prediktor infeksi saluran kemih (ISK) sebagai penyebab pediatrik kunjungan departemen rawat jalan (ODP) dan menentukan uropatogen dengan pola kerentanan antimikroba. | Studi <i>cross sectional</i> |             | Sebanyak 863 anak mengunjungi OPD. <i>Escherichia coli</i> (34/74, 45.9%) dan <i>klebsiella spp</i> (18/74, 24.3%) adalah isolate yang paling sering. Resistensi dicatat terhadap amoksisilin (70,6%) dan kotrimoksazol (97,1%) oleh <i>Escherichia coli</i> . |
| 2.  | <i>Study Of Clinical</i>   | Profil klinis dan  | Melakukan                    |             | Dari 40 pasien yang  |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    | <p><i>Profile And Antibiotic Susceptibility Of Urinary Tract Infection In A Tertiary Care Hospital</i></p> <p>Author:<br/>Dr.M.K. Uthaya Sankar. 2019.</p>                                      | <p>mikrobiologis dari infeksi saluran kemih di antara pasien yang dirawat di sekolah tinggi dan rumah sakit medis vinayagar sri manakula.</p> | <p><i>studi cross-sectional</i> pada pasien yang didiagnosis berdasarkan ISK pada kultur urin.</p> | <p>diteliti, demam (85%) adalah gejala yang paling umum dan <i>Escherichia coli</i> (57,50%) merupakan organisme yang paling banyak diisolasi diikuti oleh <i>Klebsiella</i> (15%). Antibiotik yang paling sensitif adalah meropenem (75%) dan antibiotik yang paling resisten adalah sefazolin (87,50%).</p>   |
| 3. | <p><i>Increased Adherence To Treatment Guidelines In Patients With Urinary Tract Infection In Primary Care: A Retrospective Study</i></p> <p>Author:<br/>Helena Kornfalt Isberg, Dkk. 2019.</p> | <p>Mendeskripsikan jumlah konsultasi untuk pasien yang didiagnosis dengan infeksi saluran kemih bagian (ISK) bagian bawah.</p>                | <p>Studi deskriptif dan resep antibiotik ISK untuk tahun 2008, 2010 dan 2013.</p>                  | <p>Terdapat variasi dalam kejadian konsultasi untuk LUTI dengan peningkatan antara tahun 2008 dan 2010 dan penurunan antara 2010 dan 2013, mengakibatkan sedikit peningkatan dalam konsultasi insiden antara 2008 dan 2013. Penggunaan nitrofurantoin atau pivmecillinam yang direkomendasikan di LUTI pada wanita meningkat dari 54% di tahun 2008</p> |

|    |  |   |  |   |  |
|----|--|---|--|---|--|
|    |  |   |  |   | <p>menjadi 69% di tahun 2013. <i>Fluoroquinolones</i> atau trimethoprim diresepkan pada 24% kasus LUTI pada wanita pada 2008 dan 7% pada 2013. Resep pivmecillinam atau nitrofurantoin pada kasus LUTI pria meningkat dari 13% pada 2008 menjadi 31% pada 2013. <i>Fluoroquinolones</i> atau trimethoprim diresepkan pada 54% pria Kasus LUTI tahun 2008 dan 32% tahun 2013.</p> |
| 4. | <p><i>Uncomplicated Bacterial Community-Acquired Urinary Tract Infection In Adults</i></p> <p>Author:<br/>Jennifer Kranz, Dkk.<br/>2017.</p> | <p>Pencegahan infeksi saluran kemih (ISK) berulang.</p> | <p>Pencarian literatur yang sistematis</p> | <p>Untuk pengobatan sistitis, fosfomycin-trometamol, nitrofurantoin, nitroxolin, pivmecillinam dan trimethoprim semuanya sama-sama direkomendasikan. Fluorquinolones dan sefalosporin tidak dianjurkan. Pielonefritis tanpa komplikasi dengan perjalanan klinis</p> |  |

|    |   |  |   |  |  |
|----|---|--|---|--|--|
|    |   |  |   |  | ringan sampai sedang harus diobati dengan cefodoxime oral, ceftibuten, ciprofloxacin, atau levofloxacin.   |
| 5. | <p><i>Pattern Of Antibiotic Sensitivity In Clinically Suspected Cases Of Urinary Tract Infections: An Observation From A Tertiary Care Hospital In West Bengal.</i></p> <p>Author:<br/>Dr. Arista Lahiri.<br/>2017.</p> | <p>Pengobatan pasien yang datang dengan ISK.</p>                       | <p>Laporan sensitivitas kultur pasien yang dirawat dengan dugaan ISK, kriteria inklusi dan eksklusi terpenuhi dan hasil dianalisis sesuai standar metode statistik.</p> |  | <p>Rentang usia ditemukan 17-38 tahun.</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Enterococci</i> dan <i>Escherichia coli. proteus</i> dan <i>Candida</i> diisolasi dari sampel. Diantranya antibiotik levoflaxacin, gentamicin, dan amikasin ditemukan paling efektif sesuai sensitifitas antibiotik sementara cefixime dan cefotaxime menunjukkan perlawanan.</p> |
| 6. | <p>Penggunaan Antibiotik Oleh Penderita Infeksi Saluran Kemih Di Instalasi Rawat Inap (IRNA) 2 RSUD</p> <p>Dr.H. Slamet Martdodirdjo<br/>Pamekasan Tahun 2018</p> <p>Author:<br/>Septiana Kurniasari,</p>               | <p>Kesesuaian penggunaan antibiotik dengan formularium rumah sakit</p> | <p>Penelitian deskriptif dengan metode retrospektif. Data diambil dari rekam medik di rumah sakit</p>   |  | <p>Jenis antibiotik yang digunakan di rumah sakit adalah pengguna antibiotik tunggal ceftriaxone (10,14%), cefoperazon (1,44%), cefarox (5,79%), cefixime (2,89%), levofloxacin (1,44%), ciprofloxacin (2,89%), pengguna</p>   |

|    |   |                                      |  |  |  |
|----|---|--------------------------------------|--|--|--|
|    | Dkk. 2020.  |                                      |  |  | antibiotik kombinasi ceftriaxone dan cefixim (49,27%), ceftriaxone dan ciprofloxacin (7,24%), ceftriaxone dan levofloxacin (1,44%), cefixime dan cefoperazone (10,14%), cefixime dan cefotaxime (1,44%), cefixime dan ciprofloxacin (1,44%), cefarox dan ceftriaxone (1,44%), ceftriaxone dan cefoperazone (1,44%), cefarin dan cefarox (1,44%). |
| 7. | <p>Pola Kepekaan Bakteri Terhadap Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih Di RSD Dr. Soebandi Jember</p> <p>Author:<br/>Ravi Is Syahputra,<br/>Dkk. 2018</p> | Kepekaan bakteri terhadap pasien ISK | Deskriptif dengan mengambil data sekunder yaitu data rekam medik hasil pemeriksaan kultur urin dan uji sensitifitas antibiotik pada pasien ISK | Didapatkan 57 sampel urin yang positif mengandung bakteri dan ditemukan 18 jenis bakteri penyebab ISK yaitu 16 bakteri gram negatif dan 2 bakteri gram positif. Lima bakteri terbanyak yang ditemukan antara lain <i>Escherichia coli</i> pada 24 sampel, <i>K. ornithinolytica</i> pada 5 sampel, <i>K.pneumonia</i> pada 4 sampel, <i>B.cepacia</i> pada 4 sampel, dan <i>e.cloacae</i> pada 3 |  |

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
|    |   |   |   | <p>sampel. Hasil pola sensitivitas bakteri terhadap antibiotik berdasarkan tingkat sensitivitas tertinggi yaitu amikasin, fosfomicin, netilmicin, gentamicin, dan nitrofurantoin. Sedangkan pola resistensi bakteri terhadap antibiotik berdasarkan tingkat resistensi tertinggi yaitu cephalotin, cephazolin, ampicillin, sulphametaxazole, dan trimetropin.</p> |
| 8. | <p>Penggunaan Antibiotik Pada Penyakit Infeksi Saluran Kemih Di Rsu Datu Beru Takengon</p> <p>Author:<br/>Nina Irmayanti Harahap. 2018.</p> | <p>Penggunaan antibiotik adalah pilihan utama dalam pengobatan infeksi saluran kemih.</p> | <p>Menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penjelasan data subjektif. Mengumpulkan data, menganalisis data, mengambil kesimpulan, kemudian memecahkan masalah.</p> | <p>Pemakaian antibiotik infeksi saluran kemih yaitu cefixime 100mg sebanyak 2.891, ceftriaxone 1 gram sebanyak 2.319, ciprofloxacin 500mg sebanyak 1.232, azythromicin 250mg sebanyak 511, ciprofloxacin infuse 100ml sebanyak 425, cefotaxime 1gram sebanyak 352, amoxicillin 500mg sebanyak 128, levoflaxacine 500mg sebanyak 115, levoflaxacin</p>             |



|     |   |  |   |  |   |
|-----|---|--|---|--|---|
|     |   |  |   |  | infus 100ml<br>sebanyak 102,<br>ceftazidime 1gra,<br>sebanyak 78 dan<br>ceftizoxime<br>sebanyak 53  |
| 9.  | Analisis Efektifitas Dan Efek Samping Penggunaan Antibiotik Pada Infeksi Saluran Kemih Di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.<br><br>Author : A.Rufaidah Hashary, Dkk. 2018. | Analisis efektivitas penggunaan antibiotik, interaksi obat dengan obat lainnya dan efek samping pemberian antibiotik pada pasien ISK | Data yang diperoleh pengujian deskriptif. Penggunaan antibiotik terhadap penurunan bakteri, WBC, dan neutrofil. |  | Efek samping yang terjadi setelah pemberian antibiotik ceftriaxone yaitu mual 9%, nyeri perut 4,5%, dan pemberian antibiotik ceftrazidime mengalami diare 4,5%. Interaksi yang terjadi pada pemberian antibiotik yaitu antara ceftriaxone dan furosemid. Penggunaan ceftriaxone (sefalosporin) bersamaan dengan furosemid ( <i>diuretic</i> ) dapat meningkatkan konsentrasi plasma atau menurunkan klirens dari ceftriaxone. |
| 10. | Efektivitas Antibiotik Golongan Sefalosporin Generasi Ke-3 Dibandingkan Fluroquinolon Terhadap Pasien Infeksi Saluran   | Evaluasi efektivitas dan perbandingan antibiotik golongan sefalosporin golongan ketiga dan   | Rancangan kohort retrospektif pada pasien ISK. Kriteria inklusi diambil dari catatan rekam                      |  | Sebanyak 66 pasien. Kedua golongan antibiotik tidak menunjukkan perbedaan.  |

|     |   |  |   |  |  |
|-----|---|--|---|--|--|
|     | Kemih Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta<br><br>Author:<br>FF Baso, Dkk. 2018.   | fluoroquinolone  | medis.  |  |  |
| 11. | Studi Pola Penggunaan Antibiotik Dan Analgesic Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK) (Studi Dilaksanakan Di Instalasi Rawat Inap Rsud Abdul Wahab Sjahrani) | Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan penyakit kedua yang paling banyak dialami oleh pasien di rumah sakit.          | Penelitian dilakukan secara retrospektif dan dijabarkan secara deksriptif. Mengambil data rekam medis pasien ISK.   |  | Golongan antibiotik dan analgesik yang paling banyak digunakan adalah golongan sefalosporin 67% yaitu seftriakson 30%, dan analgesik non opioid 96% yaitu parasetamol 71%  |
| 12. | Pola Peresepan Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih Di RSPAD Gatot Soeboroto Jakarta  | Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan infeksi akibat berkembang biaknya mikroorganismen lain di dalam saluran kemih. | Desain penelitian menggunakan metode deskriptif dengan rancangan studi <i>cross sectional</i> yang bersifat retrospektif. Menggunakan rekam medik pasien. |  | Penggunaan antibiotik per resep 1,86 item, presentase penggunaan antibiotik generik 86%, presentase antibiotik yang termasuk dalam katalog 69%, antibiotik per golongan terbesar sefalosporin yaitu sefoperazon 25,49%, seftriakson 15,69% dan golongan kuinolon yaitu levoflaksasin 23,53%. |

|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
| 13. | <p>Gambaran Terapi Dan Luaran Infeksi Saluran Kemih Oleh Bakteri Penghasil <i>Extended Spectrum Beta Lactamase</i> Pada Anak Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya</p> <p>Author:<br/>Ahmad Siddiq Muhajir, Dkk. 2016.</p> | <p>Gambaran terapi serta luaran pasien infeksi ESBL.</p>               | <p>Observasional dengan studi deskriptif. Menggunakan data rekam medis.</p>  |  | <p>Pasien anak berjumlah 56, terbanyak penyebab ISK <i>Klebsiella pneumoniae</i> (60,7%). Uji sensitivitas tertinggi meropenem (90,5%). Pilihan terapi definitif meropenem 25%, status luaran membaik 78,57%.</p>  |
| 14  | <p>Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih Di Instalasi Rawat Inap RSPAU<br/>Dr.S.Hadrjolukito<br/>Yogyakarta Tahun 2014</p> <p>Author:<br/>Elly Puspitosari,Dkk. 2015.</p>              | <p>Evaluasi ketetapan penggunaan antibiotik infeksi saluran kemih.</p> | <p>Penelitian observasional (<i>non-experimentad e</i> dengan rancangan secara deskriptif. Pengambilan data dengan teknik <i>purposive sampling</i>.</p> |  | <p>Kriteria tepat indikasi 100% sebanyak 40 pasien, tepat pasien 100% sebanyak 40 pasien, tepat obat 90% sebanyak 36 pasien dan tepat dosis 17,5% sebanyak 7 pasien, penggunaan antibiotik yang rasional sebanyak 7 pasien (17,5%). Obat antibiotik yang paling banyak digunakan adalah siprofloksasin karena merupakan <i>drug of choice</i>.</p> |

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS

#### A. *Pembahasan Hasil Analisis Jurnal*

##### 1. Antibiotik

Antibiotik merupakan senyawa yang dihasilkan dari mikroba, terutama fungi yang dapat digunakan untuk membunuh atau menekan pertumbuhan bakteri. Bakteri tersusun oleh komponen paling luar yaitu dinding sel yang mengandung peptidoglikan kecuali mikoplasma. Bagian lebih dalam dari dinding sel adalah membran plasma yang terdiri dari dua lapis fosfolipida dan protein. Dinding sel maupun membrane plasma bakteri menjadi satu bagian membentuk struktur *envelope* yang “membungkus” bakteri tersebut. Bagian lebih dalam dari membrane plasma adalah sitoplasma, yang terdapat ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Dalam sitoplasma tidak dijumpai inti sel maupun mitokondria. Oleh karena itu, DNA (kromosom) terdapat dalam sitoplasma tanpa dilindungi membrane inti sel. Tanpa adanya mitokondria, proses pembentukan energi berlangsung dalam membrane plasma (Prof. Agung, 2018).

##### 2. Antibiotik Golongan Quinolon

Obat golongan ini mempunyai mekanisme aksi untuk menghambat DNA gyrase sehingga dapat menghambat terjadinya proses sintesis DNA bakteri. DNA gyrase merupakan enzim bakterial yang bertanggung jawab terhadap proses pembukaan dan supercoil DNA protein bakteri. Quinolon merupakan satu-satunya antibiotika yang menghambat replikasi DNA. Antibiotika golongan ini digunakan pada pengobatan infeksi saluran kencing. Obat golongan ini mempunyai spektrum

yang luas. Contoh obat golongan ini adalah ciprofloxacin, ofloxacin, norfloxacin, levofloxacin (Prof. Agung. 2018).

### 3. Antibiotik Golongan Sefalosporin

Sefalosporin merupakan antibiotika pilihan kedua pada beberapa infeksi. Klasifikasi obat golongan ini berdasarkan generasi, yang pada dasarnya ditentukan oleh aktivitas antimikrobiahnya.

- a. Generasi pertama adalah bersifat sensitif terhadap enzim  $\beta$ -laktamase dan berspektrum sempit. Dalam hal ini, berspektrum sempit adalah relatif, karena sebenarnya aksinya atau spektrum sefalosporin generasi pertama sama dengan penisilin dengan spektrum luas. Contoh dari generasi pertama adalah sefazolin dan sefaleksin.
- b. Generasi kedua mempunyai stabilitas yang lebih baik, dan aktivitasnya terhadap bakteri gram negatif lebih tinggi. Contoh dari generasi kedua adalah sefaklor, sefamandol dan sefoksitin.
- c. Generasi ketiga mempunyai spektrum lebih luas dan lebih resisten terhadap enzim  $\beta$ -laktamase. Contoh dari generasi ketiga adalah sefotaksim, seftasizidim, dan seftriakson. Obat generasi ini yang sebagian dari generasi kedua dapat menembus barrier darah otak dan digunakan pada pengobatan meningitis.
- d. Generasi keempat yaitu mempunyai aktivitas terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif, dan mempunyai resistensi terhadap enzim  $\beta$ -laktamase yang lebih baik. Contoh dari generasi keempat adalah sefepim dan sefpirom (Prof. Agung. 2018).

Berdasarkan jurnal *Prescription Of Antibiotics For Urinary Tract Infection In General Practice In Denmark*. Hasil penelitian bahwa sebanyak 507.532 resep diberikan kepada 267.539 pasien selama satu tahun masa studi, mewakili 2,35 DID. ISK bawah akut adalah alasan paling umum untuk resep pemberian antibiotik (89,5%) diikuti ISK berulang (8,4%). Mayoritas resep diterbitkan untuk orang berusia diatas 60 tahun (57,6%). Pivmecillinam adalah yang paling umum menulis antibiotik pada ISK akut bawah (45,8%) dan akut atas (63,3%). Trimethoprim adalah antibiotik yang paling sering diresepkan pada ISK rekuren (45,9%). Resep kuinolon meningkat dengan bertambahnya usia pasien. Hal ini tidak sesuai dengan Urological Urinary Tract Infection 2015 (Anne Holm, dkk. 2018).

Berdasarkan jurnal *Study Of Clinical Profile And Antibiotic Susceptibility Of Urinary Tract Infection In A Tertiary Care Hospital*. Data hasil penelitian kerentanan antibiotik menunjukkan bahwa 42% organisme sensitif terhadap nitrofurantoin, 55% untuk ceftriaxone, 30% untuk ceftazidime, 12,5% untuk ampicillin, 30% untuk gentamycin, 20% untuk norfloksasin, 25% untuk tobramycin, 12,5% untuk cefazolin, dan 75% untuk meropenem dimana meropenem merupakan antibiotik paling sensitif terhadap organisme yang diisolasi, meropenem juga dapat digunakan untuk menghambat spektrum beta laktamase dan tidak bisa diresepkan secara umum untuk pasien ISK (Dr. J. Louis Ferdin Zeno. 2019).

Berdasarkan jurnal *Increased Adherence To Treatment Guidelines In Patients With Urinary Tract Infection In Primary Care: A Retrospective Study*.

Hasil penelitian terdapat variasi dalam kejadian konsultasi LUTI dengan peningkatan antara tahun 2008 dan 2010 dan penurunan antara 2010 dan 2013 mengakibatkan sedikit peningkatan dalam konsultasi insiden antara 2008 dan 2013. Penggunaan nitrofurantoin atau pivmecillinam yang direkomendasikan di LUTI pada wanita meningkat dari 54% di tahun 2008 menjadi 69% di tahun 2013. Fluoroquinolon atau trimethoprim diresepkan pada 24% kasus LUTI pada wanita pada tahun 2008 dan 7% di tahun 2013. Resep pivmecillinam atau nitrofurantoin pada kasus LUTI pria meningkat dari 13% pada tahun 2008 menjadi 31% pada tahun 2013. Fluoroquinolon atau trimethoprim diresepkan pada pria 54%. Kasus LUTI di tahun 2008 dan 2013 32% (Helena Kornfa, dkk. 2019).

Berdasarkan jurnal *Uncomplicated Bacterial Community-acquired Urinary Tract Infection in Adults*. Hasil penelitian bahwa evaluasi diagnostik berorientasi gejala sangat dihargai. Untuk pengobatan sistisis, fosfomycin-trometamol, nitrofurantoin, nitroxolin, pivmecillinam dan trimethoprim semuanya sama-sama direkomendasikan. Fluoroquinolon dan sefalosporin tidak dianjurkan. Pielonefritis tanpa komplikasi dengan perjalanan klinis ringan sampai dengan harus diobati dengan cefodoxime oral, ceftibuten, ciprofloxacin, atau levofloxacin. Untuk sinitis akut dan tidak rumit dengan gejala ringan sampai sedang, pengobatan simptomatik saja dapat dipertimbangkan alih-alih antibiotik setelah mendiskusikan pilihan dengan pasien. Terutama tindakan non-antibiotik direkomendasikan untuk profilaksis terhadap rekurensi infeksi saluran kemih (Jennifer Kranz, dkk. 2017).

Berdasarkan jurnal *Pattern Of Antibiotic Sensitivity In Clinically Suspected Cases Of Urinary Tract Infections: An Observation From A Tertiary Care Hospital In West Bengal*. Data hasil penelitian bahwa Antibiotik diuji sensitivitasnya adalah levofloxacin yang paling sensitif antimikroba, diikuti oleh gentamicin dan amikacin. Telah terbukti bahwa dalam pengobatan infeksi saluran kemih sesuai dengan kepekaan terhadap antibiotik. Cefixime diidentifikasi paling sedikit antimikroba sensitif dengan resistensi tertinggi, cefotaxime juga menunjukkan derajat keberadaan yang lebih tinggi (Dr.Arista Lahiri. 2017)

Berdasarkan jurnal *Penggunaan Antibiotik Oleh Penderita Infeksi Saluran Kemih Di Instalasi Rawat Inap (IRNA) 2 RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan Tahun 2018*. Data hasil penelitian bahwa penggunaan antibiotik infeksi saluran kemih adalah ceftriaxone (10,14%), cefoperazone (1,44%), cefarox (5,79%), cefixime (2,89%), levofloxacin (1,44%), ciprofloxacin (2,98%). Penggunaan antibiotik yang dikombinasikan yaitu antibiotik ceftriaxone dan cefixime adalah golongan antibiotik betalaktam yang bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel mikroba dan aktivitasnya terhadap bakteri gram negatif lebih kuat dan lebih luas lagi yang meliputi bakteri *Pseudomonas dan Bacteroides*. Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik di RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan tahun 2018 tidak semuanya sesuai dengan formularium rumah sakit, berdasarkan standar pengobatan formularium rumah sakit dapat hasil 87,5% yang sesuai (Septiana Kurniasari. 2020).

Berdasarkan jurnal *The Sensitivity Pattern Of Bacteria Against Antibiotics In Urinary Tract Infection Patients At RSD Dr. Soebandi Jember*. Pada penelitian



tersebut menunjukkan bahwa pola kepekaan bakteri terhadap antibiotik pada pasien infeksi saluran kemih adalah antibiotik cephalotin 42%, cephazolin 40%, ampicillin 38%, sulphametoxazole 38%, trimetoprin 33%. Antibiotik tersebut merupakan antibiotik golongan sephalosporin generasi pertama yang memiliki sensitivitas yang relatif rendah pada kuman yang ditemukan, antibiotik tersebut merupakan antibiotik yang berspektrum luas dan kombinasinya yang rutin merupakan penatalaksanaan penyakit infeksi oleh para klinis (Ravi Is Syahputra. 2018)

Berdasarkan jurnal Penggunaan Antibiotik Pada Penyakit Infeksi Saluran Kemih di RSUD Datu Beru Takengon. Data hasil tentang penggunaan obat infeksi saluran kemih untuk antibiotik dari bulan maret sampai dengan bulan agustus 2018 melalui resep yang dilayani di instalasi farmasi untuk pasien rawat inap di Rumah Sakit Datu Beru Takengon persentase penggunaan antibiotik yaitu cefixime 37% dengan dosis 100 mg dikarenakan cefixime termasuk golongan sefalosporin generasi ketiga yang diberikan secara oral. Antibiotik tersebut dapat menstabilkan berbagai jenis bakteri betalaktamase dan memiliki spektrum antibakteri. Ceftriaxone 1 gram dengan rute Vial injeksi sebanyak 29%, azythromicin 250 mg dengan rute oral sebanyak 7%, ciprofloxacin 500 mg dengan rute oral sebanyak 16%, cefotaxim 1 gram dengan rute vial injeksi sebanyak 6%, ciprofloxacin infuse 100 ml dengan rute vial injeksi sebanyak 6,5%, levofloxacin 500 mg dengan rute oral sebanyak 4%, levofloxacin infuse 100 ml dengan rute vial injeksi sebanyak 4%, ceftazidim 1 gram dengan rute vial injeksi sebanyak 4%, ceftizoxime 1 gram dengan rute vial injeksi sebanyak 2%. Dari data

tabel dan grafik diatas terlihat bahwa antibiotik yang sering diberikan di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon adalah cefixime dengan persentase 35,36%. Hal ini merupakan cefixime dapat menghambat sintesis di dinding sel bakteri, dan obat tersebut bekerja untuk menghambat transpeptidasi yang merupakan langkah akhir sintesis peptidoglikan di dinding sel bakteri, cefixime juga memiliki aktivitas yaitu mampu melawan mikroorganisme gram positif seperti *Streptococcus sp*, *Streptococcus pneumoniae* dan gram negatif seperti *Escherichia coli*, *Proteus sp*, dan *Branhamella catarrhalis* (Nina Irmayanti Harahap. 2018).

Berdasarkan Jurnal Analisis Efektifitas Dan Efek Samping Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih Di Instalasi Rawat Inap RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Data yang diperoleh menggunakan uji deskriptif dengan rekam medik yang menunjukkan hasil efektif yang mengurangi infeksi pada pasien dan efek samping yang terjadi. Antibiotik yang digunakan untuk terapi pasien infeksi saluran kemih pada penelitian ini terdiri dari 7 macam antibiotik dengan 6 golongan antibiotik. Penggunaan ceftriaxone mencapai setengah dari jumlah pasien dengan presentase 50% (A. Rufaidah Hashary 2018).

Berdasarkan jurnal Efektivitas Antibiotik Golongan Sefalosporin Golongan Ketiga Dibandingkan Fluroquinolon Terhadap Pasien Infeksi Saluran Kemih Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa golongan sefalosporin golongan ketiga sebanyak (ceftriaxone) 96,6% sedangkan fluroquinolon (ciprofloxacin dan levofloxacin) 81,8% (FF Baso. 2018).

Berdasarkan jurnal Studi Pola Penggunaan Antibiotik dan Analgesik pada Pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK) (Studi dilaksanakan di Instalasi Rawat Inap

RSUD Abdul Wahab Sjahranie). Data penelitian mengenai pola penggunaan antibiotik dapat dilihat pada tabel berdasarkan data penelitian antibiotik yang paling banyak digunakan adalah golongan sefalosporin 67% dan kuinolon 16%. Pada golongan sefalosporin yang paling banyak yaitu seftriakson 30% karena seftriakson merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga yang berspektrum luas dan efek kerjanya dapat mencapai sistem saraf pusat dan golongan kuinolon paling banyak yaitu siprofloksasin 15% karena merupakan antibiotik golongan kuinolon generasi kedua yang lebih efektif pada bakteri gram negatif dibanding dengan bakteri gram positif dan antibiotik tersebut bekerja dengan cara menghambat replikasi DNA bakteri dengan menempelkan molekulnya pada DNA gyrase (topoismerase II dan topoismerase IV) (Sintya Yustira Verananda. 2017).

Berdasarkan jurnal *Antibiotic Prescribing Patterns In Patients With Urinary Tract Infection At RSPAD Gatot Soberoto Hospital Jakarta*. Hasil penelitian Antibiotik yang paling banyak digunakan pada pasien rawat inap dengan infeksi saluran kemih merupakan golongan sefalosporin generasi ketiga yaitu sefoperazon paling banyak digunakan mencapai 25,49% persepan antibiotik tinggi dikarenakan tingkat keparahan penyakit yang diderita pasien dan dokter berkeinginan pasien agar cepat sembuh dan seftriakson sebesar 15,69%, sedangkan golongan kuinolon yang paling banyak digunakan yaitu levofloksasin sebesar 23,53% diberikan karena dapat menghambat terjadinya topoismerase II dan topoismerase IV yang diperlukan bakteri untuk replikasi DNA. Hal ini sesuai dengan panduan *Guidelines on Urogical Infection* tahun 2015, dimana pemberian

antibiotik tersebut dapat menghambat pembentukan dinding sel bakteri sehingga menghambat biosintesis dinding sel bakteri (Jenny pontoon dll. 2017)

Berdasarkan jurnal *Therapy And Outcome Of Pediatric Urinary Tract Infection Caused By Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) Producing Bacteria In Soetomo Hospital Surabaya*. Data yang dihasilkan pada penelitian tersebut bahwa antibiotik yang digunakan untuk penghasil ESBL adalah meropenem sebanyak 90,5%. Hal ini sesuai dengan penelitian Pravelensi dan Pola Sensitivitas Antibiotik *Klebsiella Pneumoniae* dan *Escherichia Coli* Penghasil Extended Spectrum Beta Laktamase yaitu meropenem sebanyak 98,9% (Ahmad Siddiq, dkk. 2016)

Berdasarkan jurnal *Evaluation Of The Use Of Antibiotics In Patients Urinary Tract Infectios In The Installation Inpatient RSPAU Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta 2014*. Penggunaan Golongan Antibiotik tunggal pada pasien infeksi saluran kemih di instalasi rawat inap RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta tahun 2014. Golongan antibiotik paling banyak digunakan adalah golongan sefalosporin generasi ketiga (ceftriaxone) sebanyak 12 pasien (30%) dan golongan fluoroquinolon generasi kedua (ciprofloxacin) 32 pasien (80%) penggunaan obat sesuai dengan gejala dan indikasi pasien. Hal ini sesuai dengan acuan IDSA Guideline tahun 2011 (Elly Puspitosari, dkk. 2015).

**B. Tabel Penggunaan Antibiotik Infeksi Saluran Kemih**

| <b>Jurnal</b> | <b>Antibiotik<br/>Quinolon</b>  | <b>Antibiotik<br/>Fluoroquinolon</b>               | <b>Antibiotik<br/>Sefalosporin<br/>Generasi<br/>Pertama</b> | <b>Antibiotik<br/>Sefalosporin<br/>Generasi<br/>Kedua</b> | <b>Antibiotik<br/>Sefalosporin<br/>Generasi<br/>Ketiga</b> | <b>Antibiotik<br/>Sefalosporin<br/>Generasi<br/>Keempat</b> |
|---------------|---------------------------------|--|---|---|--|---|
| 1.            | -                               | Trimethoprim                                       | -   | -   | -  | -   |
| 2.            | Norfloxacin                     | -  | Cefazoline  | -   | Ceftriaxone,<br>ceftazidime,                               | -   |
| 3.            | -                               | Trimethoprim,<br>Pivmecillinam,<br>nitrofurantoin  | -   | -   | -  | -   |
| 4.            | Ciprofloxacin,<br>levofloxacin. | Nitrofurantoin,<br>pivmecillinam,<br>trimethoprim. | Nitroxolin  | cefodoxime  | Ceftibuten   | Fosfomycin-<br>trometamol                                   |
| 5.            | Levofloxacin                    | -  | -   | -   | Cefixime   | -   |
| 6.            | Levofloxacin<br>ciprofloxacin   | -  | -   | -   | Ceftriaxone,<br>cefoperazone<br>,cefaro,<br>cefixime,      | -   |
| 7.            | -                               | Trimethoprim                                       | Cepahlotin,<br>cephazolin,                                  | -   | -  | -   |
| 8.            | Ciprofloxacin,<br>levofloxacin, | -  | -   | -   | Cefixime,<br>ceftriaxone,                                  | -   |

|     |                                |   |           |   |   |   |
|-----|--------------------------------|---|-----------|---|---|---|
|     |                                |   |           |   | cefatoxime,<br>ceftazidime,<br>ceftizoxime. |   |
| 9.  | -                              | - | -         | - | Ceftriaxone                                 | - |
| 10. | Ciprofloxacin,<br>Levofloxacin | - | -         | - | Ceftriaxone                                 | - |
| 11. | Ciprofloxacin                  | - | -         | - | Ceftriaxone                                 | - |
| 12. | Levofloxacin,                  | - | -         | - | Ceftriaxone,<br>cefoperazone                | - |
| 13. | -                              | - | Meropenem | - | -   | - |
| 14. | Ciprofloxacin                  | - | -         | - | Ceftriaxone                                 | - |

Hasil dari berbagai jurnal diatas menyatakan bahwa antibiotik yang paling sering digunakan untuk penderita Infeksi Saluran Kemih (ISK) yaitu ciprofloxacin, levofloxacin, ceftriaxone, cefixime dan trimethoprim. Antibiotik tersebut digunakan sebagai monoterapi sesuai dengan diagnosa penyakit Infeksi Saluran Kemih (ISK).

Adapun ayat yang berhubungan dengan penelitian tersebut tentang bakteri dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 19;

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ۖ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ يُخْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۗ

*Terjemahnya:*

19. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati (kering). Seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur).

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa demikian pula masalah kehidupan dan kematian, yang masing-masing merambat pada yang lain dengan perlahan dan bertahap. Setiap detik yang melewati suatu makhluk hidup, pada saat itu merambatlah kematian kepada sisi kehidupan. Kematian memakan kehidupan, tetapi pada waktu yang sama terbentuk kehidupan baru. Saat sel-sel kehidupan mati dan musnah, maka sel-sel kehidupan baru pun tumbuh dan beraksi. Setiap ada musnah dan karena mati maka ada yang kembali dalam putaran lain menuju kepada kehidupan. Setiap ada muncul sebagai sesuatu yang hidup, ia akan kembali dalam putaran lain menuju kepada kematian (Kemenag. 2019).

Tafsir Ar-rum mengungkapkan sebagian kekuasaan Allah, yang menyeru hamba-hamba-Nya agar bertasbih dan beribadah kepada-Nya. Orang yang bertasbih kepada Allah tanpa mengetahui hak-hak, kekuasaan, dan kebesaran Allah dalam beribadah, maka tasbih dan ibadahnya itu tidak akan ada manfaatnya. Dia tidak akan menjumpai Allah dengan tasbih dan ibadah yang seperti itu, padahal yang diharapkan adalah perjumpaan yang akan melapangkan dada, membukakan hati, dan menjernihkan jiwa. Oleh karena itu, ibadah yang diperintahkan ialah ibadah yang benar-benar dapat membekas dalam jiwa manusia (Kemenag.2019).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Antibiotik yang digunakan untuk pasien infeksi saluran kemih berbeda-beda, yang umumnya dipengaruhi oleh faktor usia. Antibiotik paling sering digunakan adalah sefalosporin generasi ketiga dan quinolon dan fluoroquinolon. Antibiotik yang sering digunakan dalam golongan quinolon yaitu ciprofloxacin, levofloxacin. Antibiotik yang sering digunakan dalam golongan fluoroquinolon yaitu trimethoprim. Antibiotik yang sering digunakan dalam golongan sefalosporin generasi ketiga yaitu ceftriaxone, cefixime.

#### **B. Saran**

Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan studi PICO (*Population, Intervention, Comparison, dan Outcome*) untuk memastikan kembali Pola Penggunaan Antibiotik Infeksi Saluran Kemih (ISK).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R





## KEPUSTAKAAN

- Ahmad Siddiq, dkk. *Therapy and Outcome of Pediatric Urinary Tract Infection Caused by Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) Producing Bacteria in Soetomo Hospital Surabaya*. Sari Pediatri, Vol. 18, No. 2. 2016.
- A.Rufaidah Hashary, dkk. *Analisis Efektivitas dan Efek Samping Penggunaan Antibiotik pada Pasien Infeksi Saluran Kemih di Instalasi Rawat Inap RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar*. MFF, Vol.22, No. 2. 2018.
- Anne Holm, dkk. *Prescription of Antibiotic for Urinary Tract Infection in General Practice in Denmark*. SJPHC Vol. 37, No.1. 2019.
- Cita Indira. *Pembuatan Indikator Asam Basa Karamunting*. Jurnal Vol.XI. 2015.
- Departemen Kesehatan RI. *Farmakope Indonesia*. Dirjen POM, Jakarta. 2014.
- Dr. M.K. Uthaya Sankar. *Study of Clinical Profile and Antibiotic Susceptibility of Urinary Tract Infection in a Tertiary Care Hospital*. JMSCR Vol. 7, August 2019.
- Dr Arista Lahiri. *Pattern of Antibioti Sensitivity in Clinically Suspected Cases of Urinary Tract Infections: An Observation from a Tertiary Care Hospital in West Bengal*. JMSCR Vol. 5, August 2017.
- Eko Prabowo, dkk. *Asuhan Keperawatan Sistem Perkemihan*. Nuha Medika. Jember. 2017.
- Elly Puspitosori, Zakki Cholish. *Evaluation of the use of Antibiotics in Patients Urinary Tract Infections in the Instalation Inpatient RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta 2014*. Surokarta 2015.
- FF Baso, dkk. *Efektivitas Antibiotik Golongan Sefalosporin Generasi Ke-3 Dibandingkan Fluroquinolon Terhadap Pasien Infeksi Saluran Kemih Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta*. Media Pharmaceutica Indonesia, Vol. 2, No.1. 2018.
- Harmila. *Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Sistem Perkemihan*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta. 2020.

- Helena Kornfalt Isberg, dkk. *Increased Adherence to Treatment Guidelines in Patients With Urinary Tract Infection in Primary Care: A Retrospective Study*. Plos One, 28 March 2019.
- Hermiyanty. *Faktor Risiko Infeksi Saluran Kemih di Bagian Rawat Inap RSUD Mokopido Toli-Toli Tahun 2012*. Jurnal Kesehatan Tadulako Vol. 2, No. 2. 2016.
- Jennifer Kranz, dkk. *Uncomplicated Bacterial Community-Acquired Urinary Tract Infection in Adults*. Clinical Practice Guideline. 2017.
- Jenny Pontoan, dkk. *Antibiotic Prescribing Patterns in Patients With Urinary Tract Infections at RSPAD Gatot Soebroto Hospital Jakarta*. SCPIJ. Vol. 2, No. 1. 2017.
- Kementerian Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya*. 2019.
- Lusy Noviani. *Panduan Praktis Apoteker dalam Implementasi Program Pengendalian Resistensi Antibiotik Di Rumah Sakit*. PT ISFI Penerbitan. Jakarta. 2019.
- M. Grabe, dkk. *Guidelines On Urological Infections*. 2015.
- Musdalipah. *Identifikasi Drug Related Problem (DRP) pada Pasien Infeksi Saluran Kemih di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari*. ISSN (p) 2622-7363. Vol. 11, No. 1. 2018.
- Mutiudin, A. I., Program, D., Keperawatan, S., Bhakti, U., Tasikmalaya, K., Implant, B., Dressing, M. W. *Efektivitas Proses Penyembuhan Luka dengan Penggunaan Modern Wound Dressing pada Pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK): A Sistematis Review*. 2019.
- Nina Irmayanti Harahap. *Penggunaan Antibiotik pada Penyakit Infeksi Saluran Kemih di RSUD Datu Beru Takengon*. Jurnal Ilmiah Farmasi Imelda Vol. 2, No. 2, September 2018.
- Prof. Agung Endro Nugroho. *Farmakologi (Obat-obat Penting dalam Pembelajaran Ilmu Farmasi dan Dunia Kesehatan)*. Ed. II. Yogyakarta. 2018.
- Ramanda, B. P. *Jurnal Eduksi Jurnal Bimbingan Konseling*. Vol. 5. No. 2. 2019.

- Ryan Ravi Is Syahputra. *The Sensitivity Pattern of Bacteria Against Antibiotics in Urinary Tract Infection Patients at RSD Dr. Soebandi Jember*. JAMS, Vol. 4, No.3. 2018.
- Sintya Yustira Veranda, dkk. *Studi Pola Penggunaan Antibiotik dan Analgesik pada Pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK) (Studi Dilaksanakan di Instalasi Rawat Inap RSUD Abdul Wahab Sjahranie)*. Mulawarman Pharmaceuticals Conferences. Samarinda, 2017.
- Septiana Kurniasari, dkk. *Penggunaan Antibiotik oleh Penderita Infeksi Saluran Kemih di Instalasi Rawat Inap (IRNA) 2 RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan Tahun 2018*. JIPA, Vol. 01, No. 01. 2020.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G., & Iswara, B. *Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia*. Vol. 1. No. 2. 2019.

## LAMPIRAN GAMBAR



The screenshot shows the PubMed website interface. At the top, there is a search bar with the query 'urinary tract infection'. Below the search bar, a notification banner reads 'COVID-19 is an emerging, rapidly evolving situation.' The main content area displays search results for 'urinary tract infection', showing 121,406 items. The first two results are visible:

- Urinary Tract Infection in Children**  
Alexander K.C. Leung, Alex H.C. Wong, Amy A.M. Leung, Kam I. Hon  
Recent All Inflamm Allergy Drug Discov. 2019 May; 13(1): 2-18. Published online 2019 May.  
doi: 10.2174/1572213X13966181228154940  
PMID: 314351519  
Article Full-Text PDF-Link Cite
- Gram-Positive Uropathogens, Polymicrobial Urinary Tract Infection, and the Emerging Microbiota of the Urinary Tract**  
Kimberly A. King, Amanda L. Lewis  
Microbiol Spectr. Author manuscript available in PMC 2016 Jun 1.  
PubMed Central full text archive Microbiol Spectr. 2016 Apr; 4(2): 10.1128/microb.00192-2012.  
doi: 10.1128/microb.00192-2012  
PMID: 243499979  
Article Full-Text PDF-Link Cite

On the right side, there is a section for 'PMC images search for urinary tract infection' showing several thumbnail images of scientific papers.

The screenshot shows the Google Scholar website interface. The search bar contains the query 'antibiotik infeksi saluran kemih'. The search results are displayed in a list format:

Sekitar 4 3/8 hasil (0,93 dik)

- Rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien infeksi saluran kemih (ISK) di instalasi rawat inap RSUD Undata Palu tahun 2012** [PDF] undat.ac.id  
AW Febrianto, A Mukaddas. Natural Science: Journal. 2013. bestjournal.undat.ac.id  
ABSTRACT Urinary Tract Infection (UTI) is a bacterial infection of urinary tract that antibiotic was the first step on therapy. Antibiotic usage at hospitalized patients in developing country is 39-80%, but from all of that 20-65% antibiotic usage was considered inappropriate. It can ...  
☆ 00 Ditinjau 22 kali Artikel terkait: 3 versi 00
- Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih Pada Bangsa Penyakit Dalam Di Rsup Dr. Kariadi Semarang Tahun 2008** [PDF] undip.ac.id  
NF Wiranti. eprints.undip.ac.id  
Latar Belakang: Infeksi saluran kemih merupakan infeksi bakteri yang terjadi di saluran kemih, yang insiden dan prevalensinya di Indonesia masih cukup tinggi. Antibiotik merupakan kelompok obat yang digunakan untuk mengobati penyakit infeksi, termasuk ...  
☆ 00 Ditinjau 11 kali Artikel terkait: 2 versi 00
- Uji kepekaan bakteri yang disolasi dari urin penderita infeksi saluran kemih (isk) terhadap beberapa antibiotika pada periode Maret-Juni 2008** [PDF] ui.ac.id  
S Komala, W Ransa, L Eshary. Science and Research. 2012. paui.ac.id  
ABSTRACT Urinary tract infections (UTI) was an inflammatory response of the urethra when attacked by microorganisms. This disease can happen to people at all ages beginning with asymptomatic to moderately symptomatic infections. Thus far, antibiotic treatment was the best for curing the ...  
☆ 99 Ditinjau 15 kali Artikel terkait: 7 versi 00
- Efektifitas antibiotik golongan sefalosporin dan kuinolon terhadap infeksi saluran kemih** [PDF] umy.ac.id  
A Themo, AF Pradipto. Mulia Medika: Jurnal Kedokteran dan ... 2012. journal.umy.ac.id  
Abstrak: Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah infeksi yang dipalori untuk menyatakan adanya infeksi mikroorganisme pada saluran kemih, jika tidak terdapat disain baik, ISK dapat ...

M A K A S S A R

Problem loading page x New Tab x the pattern of antibiotic use of X +

https://search.nlm.nih.gov/ncbi/mq/cgi-bin/query-meta?query=the+pattern...

NIH National Library of Medicine Search NLM

PRODUCTS AND SERVICES - RESOURCES FOR YOU - EXPLORE NLM - GRANTS AND FUNDING -

the pattern of antibiotic use of urinary tract infection in hospital

Search help  
Search Web Archives

All Results Health Information Programs & Services Exhibits & Collections

91 results

1. **Listing of Excluded Studies - Closing the Quality Gap: A Critical Analysis of Quality Improvement Strategies (Vol. 6: ...**  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK43983>  
 ... Shoji KT, Axnick K, Rytel MW. **Infections and antibiotic use in a large municipal hospital 1970-1972: a prospective analysis of the effectiveness of a continuous surveillance program.** Health Lab ...
2. **Risk factors - Cerebral palsy in under 25s: assessment and management - NCBI Bookshelf**  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK533249>  
 ... respiratory tract or genito-urinary infection treated in hospital postnatal ... and respiratory tract infections in pregnant women and subsequent rates of cerebral ...
3. **Intrapartum antibiotics - Antibiotics for Early-Onset Neonatal Infection - NCBI Bookshelf**

6:28 AM 2/19/20

Problem loading page x New Tab x antibiotic urinary tract infection X +

https://search.nlm.nih.gov/ncbi/mq/cgi-bin/query-meta?query=antibiotic+u...

NIH National Library of Medicine Search NLM

PRODUCTS AND SERVICES - RESOURCES FOR YOU - EXPLORE NLM - GRANTS AND FUNDING -

antibiotic urinary tract infection

Search help  
Search Web Archives

All Results Health Information Programs & Services Exhibits & Collections

354 results

1. **Treatment to prevent urinary tract infection - Urinary Incontinence in Neurological Disease - NCBI Bookshelf**  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK132819>  
 ... antibiotics compared with a) no treatment b) other antibiotic reduce the risk of symptomatic urinary tract infections? View in own window Clinical Methodological Introduction Population: ...
2. **Investigations before starting antibiotics in the baby - Antibiotics for Early-Onset Neonatal Infection - NCBI Bookshelf**  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK116618>  
 ... delay and, whenever possible, before the administration of antibiotics. Urinary tract infection in children ( NICE clinical guideline 54, 2007) includes ...
3. **MedlinePlus Drug Information: Methenamine**

Catalog Records

- Optimal use of antibiotics for urinary tract infections in long-term care facilities: successful strategies prevent ... Book - 2017
- Systematic reviews on preventing catheter-associated urinary tract infection: a systematic review ... Book - 2016

More catalog records >

6:28 AM 2/19/20

Problemi loading page x New Tab x pola penggunaan antibiotik inf x +

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\_sdt=0%2C5&q=pola+pe

Google Cendekia pola penggunaan antibiotik infeksi saluran kemih di rumah sakit

Sekitar 3.850 hasil (0,06 dt)

Artikel

Kapan saja  
Sejak 2021  
Sejak 2020  
Sejak 2017  
Rentang khusus...

Urutkan menurut relevansi  
Urutkan menurut tanggal

sertakan paten  
 mencakup kutipan  
 Buat lansiran

**Identifikasi pola kepekaan dan jenis bakteri pada pasien infeksi saluran kemih di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta** [PDF] umy.ac.id  
FI Prabowo, I Habb - *Mutara Medika: Jurnal Kedokteran dan ...* 2012 - journal.umy.ac.id  
... Lango, Stanbidi, 2005, 5, Masibuan, H. Pola Kuman Pada Urin Penderita yang Menggunakan  
Karakter Uretra Di Ruang Perawatan Intensif Dan Bangsal Bebas. *Me ...* 2007, 6, Saepudin,  
Sulistiawan R.Y., Hamidah S. Perbandingan penggunaan antibiotik pada peng  
☆  Ditinjau 11 kali Artikel terkait: 3 versi

**Rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien infeksi saluran kemih (ISK) di instalasi rawat inap RSUD Undata Palu tahun 2012.** [PDF] untad.ac.id  
AW Febrianto, A Mukadizat - *Natural Science: Journal ...* 2013 - bestjournal.untad.ac.id  
... Dan persentase tersebut 20-65% penggunaannya dianggap tidak tepat ... Sikehendalo (Lestari  
dkk., 2011) Penggunaan obat yang rasional diartikan sebagai tepat diagnosis penyakit ... aamping  
(Ambarwati dkk., 2006) Berdasarkan laporan pola penyakit dari anam rekam medik ...  
☆  Ditinjau 22 kali Artikel terkait: 3 versi

**Efektifitas antibiotik golongan sefalosporin dan kuinolon terhadap infeksi saluran kemih** [PDF] umy.ac.id  
A Thiono, AE Elviana - *Mutara Medika: Jurnal Karakter dan ...* 2012 - journal.umy.ac.id  
... penelitian didapatkan bahwa pada perawatan ISK menggunakan inap antibiotik golongan  
sefalosporin 4,57 ± 2,07 hari, dan lama perawatan menggunakan antibiotik golongan kuinolon  
Pola dan Sensibilitas Kuman di Penderita ... Saebjanto, N. Penggunaan Siprofloksasin di ...  
☆  Ditinjau 10 kali Artikel terkait: 3 versi

**Evaluasi penggunaan antibiotik untuk terapi infeksi saluran kemih pada pasien sindrom nefrotik pediatri** [PDF] ugm.ac.id  
D.Wahyuni, IM Yasin - *JURNAL MANAJEMEN DAN ...* 2014 - journal.ugm.ac.id  
... terapi ISK pada pasien SNI pediatri rawat inap dilakukan dengan menggunakan standar ... Dengan  
demikian evolusi pola kuman, sensitivitas dan resistensi terhadap antibiotik selama ...  
☆  Ditinjau 1 kali Artikel terkait: 3 versi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

## BIOGRAFI



Nama lengkap penulis adalah Ma'wahdania Muslimin disapa Nia, lahir di Sengkang, 19 Juni 1998. Anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Muslimin Ab. Tang dan Hj. Marhani, S. Pd. Penulis bertempat tinggal di Hertasning, Perum. Halmin Residence, Blok C1 No. 14. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 235 Watallipue lulus pada tahun 2010, SMP Negeri 1 Sengkang lulus pada tahun 2013, SMA Negeri 3 Sengkang lulus pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016 di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selama kuliah penulis aktif di bidang Organisasi Ekstra yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R