

**UJI SITOTOKSIK EKSTRAK BATANG BAJAKAH TAMPALA  
(*SPATHOLOBUS LITTORALIS* HASSK.) DENGAN METODE BSLT  
(*BRINE SHRIMP LETHALITY TEST*)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**NUR AFIAH ALFRIANTI NUR**

**NIM : 70100117022**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Afiah Alfrianti Nur  
NIM : 70100117022  
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 22 November 1999  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Perumahan Graha Al Habsy Taeng  
Judul : Uji Sitotoksik Ekstrak Batang Bajakah Tampala  
(*Spatholobus littoralis* Hassk) dengan Metode BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Romangpolong, November 2021

Penulis,



Nur Afiah Alfrianti Nur  
NIM: 70100117022

### PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Uji Sitotoksik Ekstrak Bajakah Tampala (*Spatholobus littoralis* Hassk.) Dengan Metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT)." yang disusun oleh Nur Afiah Alfrianti Nur NIM: 70100117022, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 12 November 2021 M yang bertepatan 6 Rabiul Akhir 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 12 November 2021 M  
6 Rabiul Akhir 1443 H

#### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc	(.....)
Pembimbing I	: apt. Muhkriani, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: apt. Muh. Ikhlas Arsul, S.Farm., M.Si	(.....)
Penguji I	: apt. Alwiyah Nur Syarif, S.Farm., M.Si	(.....)
Penguji II	: Dr. Nurhidayat Muh. Said, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pelaksana	: apt. Nurul Muhlisah Maddeppungeng, S.Si., M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, Nabi sebagai rahmat bagi semesta alam.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat banyak hambatan dan rintangan. Namun atas dukungan dari berbagai pihak yang terus memberikan motivasi sehingga penelitian ini bisa terselesaikan.

Terima kasih yang sebesar besarnya kami persembahkan kepada kedua orang tua kami yang tak henti-hentinya menghaturkan doa dan memberikan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moral maupun dalam bentuk materiil, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M. Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Wahyuddin, M. Hum. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag. selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

6. Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
11. Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
12. Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., apt. selaku pembimbing pertama yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Bapak Muh. Ikhlas Arsul, S.Farm., M.Si., apt. selaku pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Ibu Alwiyah Nur Syarif, S.Farm., M.Si., apt. selaku penguji akademik yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
15. Bapak Dr. Nurhidayat Muh. Said, S.Ag., M.Ag. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.

16. Bapak Nursalam Hamzah S.Si., M.Si., apt. selaku pendamping penelitian yang telah meluangkan banyak waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam proses penelitian.
17. Bapak dan ibu dosen farmasi yang telah membantu dan membimbing selama perkuliahan.
18. Kepada staf laboratorium fitokimia fakultas farmasi, univeristas megarezky makassar yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah swt. Aamiin.

Wassalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, November 2021

Penyusun



Nur Afiah Alfrianti Nur

NIM 70100117022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRACT .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup .....	3
1. Definisi Operasional .....	3
2. Ruang Lingkup .....	3
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Uraian Sampel .....	6
1. Klasifikasi Tanaman .....	6
2. Morfologi Tanaman .....	6
3. Kandungan Kimia .....	7
4. Kegunaan Tanaman .....	8
B. Klasifikasi Hewan Uji .....	8
1. Klasifikasi .....	8
2. Morfologi .....	8
3. Lingkungan Hidup dan Perkembangan .....	10
4. Penggunaan Dalam Penelitian .....	11
C. Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) .....	12
D. Uji Sitotoksik .....	13
E. Golongan Metabolit Sekunder .....	16
1. Flavonoid .....	17
2. Alkaloid .....	18
3. Saponin .....	19
4. Fenol .....	19
F. Metode Ekstraksi .....	19
1. Cara dingin .....	20
2. Cara Panas .....	21
G. Tinjauan Islam .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
1. Lokasi Penelitian .....	27


2. Waktu Penelitian .....	27
C. Pendekatan Penelitian .....	27
D. Populasi dan Sampel .....	27
E. Alat dan Bahan .....	28
1. Alat .....	28
2. Bahan .....	28
F. Prosedur Kerja .....	28
1. Penyiapan Sampel .....	28
2. Determinasi Tumbuhan Bajakah Tampala .....	28
3. Ekstraksi .....	28
4. Skrining Fitokimia .....	29
5. Uji Sitotoksik .....	30
6. Analisis Data .....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	32
A. Hasil Penelitian .....	32
B. Pembahasan .....	33
BAB V PENUTUP .....	37
A. Kesimpulan .....	37
B. Saran .....	37
DAFTAR PUSTAKA .....	38
LAMPIRAN .....	45

**DAFTAR GAMBAR**

<i>Gambar 1.</i> Daun dan Batang Bajakah Tampala (sumber primer) .....	8
<i>Gambar 2.</i> Larva udang <i>A.salina</i> Leach .....	11
<i>Gambar 3.</i> Batang Bajakah Tampala .....	58
<i>Gambar 4.</i> Ekstrak Batang Bajakah Tampala.....	58
<i>Gambar 5.</i> Proses Penghalusan Batang Bajakah Tampala .....	59
<i>Gambar 6.</i> Proses Rotary Evaporator Ekstrak Bajakah Tampala .....	59
<i>Gambar 7.</i> Penetasan Telur Udang <i>A.salina</i> Leach .....	60
<i>Gambar 8.</i> Uji Saponin .....	61
<i>Gambar 9.</i> Uji Fenolik .....	62
<i>Gambar 10.</i> Uji Alkaloid (Meyer) .....	63
<i>Gambar 11.</i> Uji Alkaloid (Dragendorf) .....	64

**DAFTAR TABEL**


<i>Tabel 1.</i> Tingkat Toksisitas .....	14
<i>Tabel 2.</i> Hasil Persen Rendemen .....	32
<i>Tabel 3.</i> Hasil Skrining Fitokimia.....	32
<i>Tabel 4.</i> Hasil Uji BSLT Varietas Merah.....	33
<i>Tabel 5.</i> Hasil Uji BSLT Varietas Putih.....	33



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**DAFTAR LAMPIRAN**

<i>Lampiran 1. Skema Kerja</i> .....	47
<i>Lampiran 2. Hasil Determinasi Bajakah Tampala</i> .....	54
<i>Lampiran 3. Surat Selesai Penelitian</i> .....	55
<i>Lampiran 4. Perhitungan Persen Rendemen</i> .....	56
<i>Lampiran 5. Perhitungan Pembuatan Pereaksi</i> .....	56
<i>Lampiran 6. Gambar Penelitian</i> .....	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**ABSTRACT****Name : NUR AFIAH ALFRIANTI NUR****NIM : 70100117022****Depratement : FARMASI****Title : Cytotoxic Test of Bajakah Tampala Extract (*Spatholobus Littoralis* Hassk.) with BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*) methode.**

---

Bajakah tampala is an herbal medicine plant that can be used in all its parts. This plant comes from remote areas of Kalimantan Province which has not spread to other regions. Bajakah plant is one of the plants used by the people of Kalimantan as a traditional medicine to restore stamina during activities and cure various types of diseases. This study aims to determine the toxicity of the tampala bajakah stem using the BSLT (Brine Shrimp Lethality Test) method. Bajakah is extracted by maceration process using solvent gradient, namely n-hexane, ethyl acetate and 96% ethanol. Each extract was identified for its compound content and then tested for toxicity using shrimp larvae with various concentrations of 10, 50, 100, 500, and 1000 ppm. The results showed that bajakah tampala contains a class of flavonoid compounds, phenols, alkaloids and saponins. Bajakah rods did not show toxicity where none of the larvae died at all concentrations tested

**Keywords:** *Bajakah tampala, skrining, BSLT.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**ABSTRAK****Nama : NUR AFIAH ALFRIANTI NUR****NIM : 70100117022****Jurusan : FARMASI****Judul Skripsi : Uji Sitotoksik Ekstrak Bajakah Tampala (*Spatholobus littoralis* Hassk.) dengan Metode BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*).**

---

Bajakah tampala merupakan tanaman obat herbal yang dapat dimanfaatkan seluruh bagiannya. Tanaman ini berasal dari daerah terpencil di Provinsi Kalimantan yang belum menyebar ke daerah lain. Tanaman bajakah adalah salah satu tanaman yang digunakan sebagai pengobatan tradisional oleh penduduk Kalimantan untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit dan memulihkan stamina saat beraktivitas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui toksisitas batang tampala bajakah memanfaatkan metode BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*). Bajakah diekstraksi dengan proses maserasi menggunakan gradien solven (pelarut) yaitu n-heksana, etil asetat dan etanol 96%. Masing-masing ekstrak diidentifikasi kandungan senyawanya kemudian diuji toksisitasnya menggunakan larva udang dengan variasi konsentrasi 10, 50, 100, 500, dan 1000 ppm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bajakah tampala mengandung golongan senyawa flavonoid, fenol, alkaloid dan saponin. Batang bajakah tidak menunjukkan toksisitas dimana tidak ada larva yang mati pada semua konsentrasi yang diuji.

**Kata Kunci:** *Bajakah tampala, skrining, BSLT.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang***

Indonesia dikenal oleh dunia akibat kaya akan beragam tumbuhannya yang mampu berkhasiat sebagai obat atau bahan baku obat, tetapi masih banyak tanaman di Indonesia yang masih belum dikaji menurut saintifik. Tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat tradisional perlu dilakukan kajian ilmiah lebih lanjut sehingga dapat dibuktikan keabsahan khasiat dan didapatkan bukti saintifik tentang bagian aktif dari bahan nabati tersebut (Hasanah et al., 2019).

Warga di Indonesia memiliki tabiat memanfaatkan obat tradisional menjadi obat pengganti untuk menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Obat tradisional memanfaatkan bahan alam yang bersumber dari tanaman, memiliki senyawa kimia yang disebut metabolit sekunder.

Dalam rangka penelitian senyawa bioaktif baru, dilakukan pemilihan tanaman baru dengan cara pendekatan etnobotani dan kemotaksonomi. Pendekatan etnobotani didefinisikan sebagai upaya pencarian yang bersumber pada pemanfaatan bahan alam oleh suatu kaum tertentu untuk beragam tujuan, yang terpenting untuk pengobatan. Sebaliknya, pendekatan kemotaksonomi dilakukan menggunakan pencarian yang bersumber pada ikatan kekeluargaan antar tanaman dengan anggapan tumbuhan yang sekerabat mempunyai kandungan kimia yang sama atau memiliki kerangka yang sama (Desi Pertiwi, 2014).

Bajakah tampala (*Spatholobus littoralis* Hassk.) adalah salah satu keragaman hayati yang dapat dijadikan sebagai obat tradisional. Bajakah tampala termasuk tumbuhan herbal medicine yang dapat digunakan semua bagiannya. Tumbuhan ini dapat ditemui di pedalaman Provinsi Kalimantan yang belum

tersebar ke wilayah lain. Belum ada upaya pembudidayaan pada Bajakah tampala dikarenakan kurangnya pemahaman penduduk sekitar akan kegunaan tanaman ini (Saputera & Ayuhecaria, 2018).

Tumbuhan bajakah adalah satu dari banyaknya tanaman yang secara empiris digunakan oleh penduduk Kalimantan menjadi obat tradisional. Sedari dulu, warga Dayak memanfaatkan tumbuhan Bajakah sebagai obat untuk memulihkan daya tahan tubuh saat berkegiatan di hutan, juga digunakan untuk menyembuhkan beraneka macam penyakit (Fitriani et al., 2020).

Salah satu proses awal yang kerap digunakan untuk mengetahui tingkat toksisitas senyawa dan merupakan proses penyaringan untuk keaktifan antikanker (sitostatika) campuran kimia dalam ekstrak tumbuhan adalah *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT) (Meyer et al., 1982).

Pada penelitian sebelumnya yaitu pengujian aktivitas antioksidan menggunakan proses peredaman radikal bebas dan uji sitotoksik menggunakan metode (BSLT) akar bajakah, hasil yang diperoleh pada pengujian sitotoksik menunjukkan bahwa partisi etil asetat memiliki nilai  $IC_{50}$  sebesar 48,39 ppm dan pada air sebesar 354,20 ppm yang artinya mampu menyebabkan kematian 50% pada *Artemia salina* Leach. Oleh karena itu dilakukan penelitian lebih lanjut ke bagian batang tumbuhan untuk membandingkan efek toksik yang dihasilkan dari tiap bagian tumbuhan bajakah (Hasanah et al., 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pada penelitian ini akan dilakukan pengujian sitotoksik batang bajakah tampala menggunakan metode BSLT pada larva udang *Artemia salina* Leach.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Golongan senyawa apa yang terkandung dalam batang bajakah tampala varietas merah dan putih?

2. Bagaimana toksisitas bajakah tampala varietas merah dan putih?

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup**

#### **1. Definisi Operasional**

##### **a. Uji Sitotoksik**

Uji sitotoksik adalah uji secara in vitro menggunakan larva udang sebagai uji pendahuluan untuk mengetahui potensi ketoksikan bajakah tampala.

##### **b. Ekstrak**

Ekstrak adalah sediaan yang dapat berbentuk padat, cair atau kental yang dibuat dengan proses menyari tumbuhan bajakah tampala.

##### **c. Bajakah Tampala**

Bajakah tampala adalah tanaman dengan nama latin *Spatholobus littoralis* Hassk. yang berasal dari daerah Kalimantan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian.

##### **d. BSLT**

BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*) adalah uji untuk mengetahui dan melihat kekuatan toksik terhadap sel dari suatu senyawa yang didapatkan dari ekstrak tumbuhan bajakah tampala.

#### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah bagian batang dari tanaman bajakah tampala yang diuji sitotoksik menggunakan metode BSLT. Identifikasi senyawa kimia dari sampel meliputi uji golongan alkaloid, fenol, flavonoid, saponin.

### **D. Kajian Pustaka**

1. Jamiatul Hasanah, Rudi Kartika, Partomuan Simanjuntak “Uji Aktivitas Antioksidan Dengan Metode Redaman Radikal Bebas Dan Sitotoksik Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) Akar Bajakah (*Uncaria Tomentosa*)

(Willd Ex Schult). Dc)” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung, antioksidan dan aktivitas sitotoksik akar bajakan. Hasil skrining fitokimia menunjukkan akar bajakah mengandung tanin, flavonoid, alkaloid, steroid saponin, dan triterpenoid. Hasil uji aktivitas antioksidan dengan proses partisi etil asetat menghasilkan % inhibisi senilai 72,61%, untuk pelarut etanol 96% yaitu 74,40% dan pada air senilai 77,67%. Hasil uji sitotoksik menggunakan metode BSLT dengan metode partisi etil asetat yaitu 48,39 ppm, dan pada partisi air 354,20 ppm.

Pada penelitian yang dilakukan kali ini mengadopsi metode yang sama pada penelitian di atas yaitu metode BSLT dan menggunakan sampel yang sama tetapi bagian tanaman yang berbeda.

2. Wirasti “Penentuan Kadar Fenolik Total, Flavonoid Total, dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Parasit (*Scurrula atropurpurea* Dans.) dan Skrining Fitokimia” Penelitian ini dilakukan untuk melihat aktivitas antioksidan dan pengukuran nilai senyawa fenolik total, flavonoid total, etanol ekstrak daun peta parasit, dan uji skrining fitokimia. Pada uji skrining fitokimia didapatkan hasil ekstrak etanol daun petai parasit mengandung saponin, alkaloid, fenol, dan flavonoid.

Pada penelitian ini mengadopsi metode yang sama dengan penelitian diatas yaitu uji skrining fitokimia dengan 4 jenis golongan senyawa yaitu flavonoid, alkaloid, fenolat dan saponin.

3. M.Rusdi, Tahirah Hasan, Ardillah, Evianti “Perbandingan Metode Ekstraksi Kadar Flavonoid Total dan Aktivitas Antioksidan Batang *Boehmeria virgata*” Penelitian ini menggunakan 2 metode ekstraksi dan dilakukan perbandingan antar metode yaitu refluks dan maserasi terhadap kandungan etanol flavonoid dan aktivitas antioksidan batang *Boehmeria virgata*. Hasil yang diperoleh

menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan dengan metode DPPH ekstrak parang romang yang didapatkan dengan metode refluks lebih baik dibandingkan metode maserasi karena kandungan flavonoid yang didapatkan lebih banyak.

Pada penelitian yang akan dilakukan terkait dengan penelitian diatas yaitu menggunakan metode ekstraksi yang sama yaitu metode maserasi.

4. Ary Andini, Ersalina Nidianti, Endah Prayekti “Pengujian Sitotoksisitas Kitosan-Kolagen Pembalut Luka Menggunakan Metode Uji Lethality Udag Brine” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat toksisitas kolagen kitosan pada pembalut luka dengan konsentrasi K0 sebagai kontrol menggunakan kitosan murni, K1 menggunakan kolagen 25% dan kitosan 75%, K2 menggunakan kolagen 50% dan kitosan 50%, K3 menggunakan kolagen 75% dan kitosan 25% menggunakan metode BSLT dengan konsentrasi masing-masing kelompok sampel 10, 50, 100, 250, 500, 750 dan 1000 ppm. Hasil penelitian menyatakan bahwa setiap kelompok pembalut luka seperti K0, K1, K2 dan K3 memiliki nilai  $LC_{50} > 1000$  ppm yang dinyatakan tidak toksik.

Pada penelitian saat ini terkait dengan penelitian di atas, menggunakan metode BSLT dan menunjukkan hasil yang sama pada semua konsentrasi yaitu tidak beracun.

5. Wida Witriani, Endang L. Widiastuti, M Kanedi, Nuning Nurcahyani “EKSTRAK BIOASSAY *Selaginella willdenowii* DENGAN Brine SRIMP LETHALITY TEST (BSLT)” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui toksisitas ekstrak *Selaginella* dengan metode BSLT. Proses ekstraksi menggunakan metode maserasi. Analisis data menggunakan one-way variance (ANOVA) ( $\alpha=0,05$ ) dengan pengamatan sensitif waktu 12 jam dan 24 jam. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada konsentrasi 2% jam ke-12 didapatkan nilai mortalitas terendah yaitu 14,28%, konsentrasi 20% didapat nilai tertinggi sebesar

26,78%, lalu pada jam ke-24 konsentrasi 2% didapatkan nilai mortalitas terendah yaitu 8,90%, sedangkan nilai tertinggi ditunjukkan pada konsentrasi 20% sebanyak 26,78%. Ekstrak selaginella willdenowii aquadest dapat dikategorikan toksik tetapi memiliki toksisitas yang rendah.

Pada penelitian yang sedang dilakukan terkait dengan penelitian di atas yaitu menggunakan metode BSLT tetapi sampel yang berbeda.

#### ***E. Tujuan & Manfaat Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui golongan senyawa yang terkandung dalam bajakah tampala varietas merah dan putih
- b. Mengetahui toksisitas bajakah tampala varietas merah dan putih

##### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat pada penelitian ini yaitu dapat memberikan penjelasan serta wawasan kepada penulis dan masyarakat dalam penemuan senyawa dari tanaman-tanaman yang ada disekitar khususnya bajakah tampala.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Uraian Sampel

##### 1. Klasifikasi Tanaman

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Tracheophyta
Class	: Magnoliopsida
Ordo	: Fabales
Family	: Fabaceae
Genus	: <i>Spatholobus</i>
Species	: <i>Spatholobus littoralis</i> Hassk. (UNM. 2021)

##### 2. Morfologi Tanaman

Bajakah Tampala (*Spatholobus littoralis* Hassk.) merupakan tumbuhan yang hidup merambat di daerah Tropis. Tumbuhan ini berasal dari Desa Sebuku, Kalimantan Utara. Dalam bahasa Dayak, bajakah artinya akar, bukan suatu spesies tumbuhan tertentu. Tumbuhan ini memiliki bentuk lebar pada bagian pangkal daun, bentuk pangkal daun segitiga sungsang dengan ujung daun runcing, memiliki tangkai daun dengan panjang 2,4 – 6 cm. Daun berwarna hijau, bentuk daun menyirip, dengan permukaan licin dan mengkilap, jumlah daun dalam 1 tangkai ada 3 helai, memiliki bunga dengan panjang 7 – 8 mm berwarna putih, merah muda, merah atau merah tua yang tersusun dalam fasula. Batangnya berwarna coklat kehijauan, berkulit kayu dan tidak bercabang. Batang berbentuk seperti lekukan yang membedakan dari batang tumbuhan lain. Batang menghasilkan getah kental warna merah, memiliki rasa sepat dan pahit, dan

memiliki ukuran yang cukup besar (Sakultala Ninkaew and Pranom Chantaranothai, 2014).

Bajakah tergolong dalam kategori genus *Spatholobus*, adalah tanaman dari suku Phaseoleae dan menjalar di pohon kayu, ditemukan pertama kali oleh cendekiawan botani asal Jerman, Justus Karl Hasskarl pada tahun 1842. Menurut (Sakultala Ninkaew and Pranom Chantaranothai, 2014), sejumlah 29 spesies genus *Spatholobus* Hassk tersebar dan hidup di hutan tropis Indonesia (Fitriani et al., 2020).

Bajakah memiliki beberapa spesies lain diantaranya, *S. acuminatus*, *S. apoensis*, *S. hirsutus*, *S. latibractea*, *S. latistipulus*, *S. pottingeri*, dan *S. sanguineus* (Ridder-Numan, 1992).



**Gambar 1.** Daun dan Batang Bajakah Tampala (sumber primer)

### **3. Kandungan Kimia**

Hasil penelitian menyatakan bahwa tumbuhan *S. littoralis* Hassk. mengandung senyawa metabolit sekunder berupa tanin, fenol, steroid, flavonoid, saponin, dan terpenoid, tetapi tidak mengandung senyawa alkaloid (Saputera & Ayuhecarya, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Cheng et al., 2011) mengemukakan bahwa tumbuhan *Spatholobus suberectus* Dunn. yang memiliki genus sama dengan *Spatholobus littoralis* Hassk. memiliki senyawa metabolit sekunder yaitu flavon, isoflavonoid, flavonoid dan flavanol.

#### 4. Kegunaan

Tanaman Bajakah tampala dapat digunakan untuk mengobati proses penyembuhan luka, dan air rebusan dari batang dapat digunakan sebagai obat disentri (Saputera & Ayuhecarya, 2018) dan (Nur Azizah Putri Nada Hanifah, 2020).

Bajakah tampala mengandung senyawa tanin yang dapat menghambat signaling lipogenik, menekan jalur metabolisme lipid, dan mempengaruhi profil lipid. Senyawa tanin yang terkandung dapat membantu menurunkan berat badan (Novanty et al., 2021).

### B. Klasifikasi Hewan Uji

#### 1. Klasifikasi

Kingdom	: Animalia
Divisi	: Arthropoda
Subdivisi	: Crustacea
Class	: Branchiopoda
Ordo	: Anostraca
Family	: Artemiidae
Genus	: Artemia
Species	: <i>Artemia salina</i> (Dumitrascu, 2011)

#### 2. Morfologi

*Artemia salina* adalah kelompok udang dari golongan Arthropoda, keluarga Artemiidae yang memiliki usia sekitar 100 juta tahun yang dapat tumbuh

di rawa, dan kolam dengan salinitas tinggi sekitar 60-300 ppt. Memiliki tubuh yang terdiri atas tiga bagian yaitu perut, kepala dan dada. Larva udang menampilkan dimorfisme seksual, memiliki perbedaan antara jantan dan betina yang dapat diamati pada jarak maksimum sekitaran mata majemuk, lebar segmen perut ketiga, panjang perut, garis tengah mata majemuk, panjang antena pertama dan panjang total. Jantan dewasa mempunyai panjang 8-10 mm, pada betina mempunyai panjang 10-12 mm. Pada *Artemia* dewasa memiliki 3 mata dan 11 pasang kaki. *Artemia* dewasa mempunyai warna yang beragam tergantung pemusatan garam dalam air. Darah mereka mengandung pigmen hemoglobin. *Artemia* jantan memiliki 2 organ reproduksi, yang digunakan bergantian tergantung pada kondisi kehidupan. Menghasilkan telur yang mengambang diatas air dan tumbuh menjadi larva (naupli) atau tidak menguntungkan kondisi yang diubah menjadi kista dan dapat bertahan dalam periode kekeringan yang lama. *Artemia salina* memakan alga, protozoa, dan detritus dalam kondisi alami. Mode pemberian makanan yang digunakan adalah filter non-selektif aktif dengan menghilangkan partikel tersuspensi kurang dari 40-60  $\mu$ m (Dumitrascu, 2011).

Struktur tubuh larva udang pada fase nauplia masih sangat simpel, hanya terdiri dari lapisan kulit, antena, mulut, calon thoracopoda dan pencernaan (Ayu et al., 2018).



**Gambar 2.** Larva udang *A.salina* Leach  
(Dumitrascu, 2011)

### **3. Lingkungan Hidup dan Perkembangan**

Cara pembiakan *Artemia* dipengaruhi oleh lingkungan, diantaranya jenis makanan, fluktuasi dan pemusatan oksigen dalam air, dan salinitas (Dumitrascu, 2011).

Dua metode reproduksi digunakan bergantian tergantung pada kondisi kehidupan, dapat bersifat ovivipar yang artinya bila disukai dan bila tidak menguntungkan bersifat ovipar. Pembiakan ovipar, selepas kopulasi telur yang telah dibuahi kemudian tumbuh ke tahap gastrula dan dikelilingi oleh kerak coklat yang keras yang terdiri dari kitin, lipoprotein, dll. Kista yang terlahir dimasukkan ke dalam air dan harus melalui proses pengeringan. Hanya ketika dehidrasi awal ini terjadi, kista bisa mendapatkan larva bebas ketika kondisinya mendukung. Reproduksi ovovivipar, telur yang telah dibuahi berkembang ke tahap gastrula, namun bukannya terkurung, gastrula akan berubah menjadi tubuh betina, larva disebut nauplia. Telur larva yang menetas memiliki warna keputihan. Nauplia adalah larva sirip bebas. Kista dengan skala 0,2 - 0,3 mm berganti menjadi larva perenang air, dengan jangka waktu 24-36 jam nauplia akan berukuran 0,45 mm. Kista hidrasi lengkap memerlukan durasi sekitar satu jam. Tergantung pada

ketersediaan makanan, nauplia akan mencapai dewasa (maks. 12 mm) dalam waktu 3 minggu. Nauplia berubah menjadi dewasa reproduktif yang menghasilkan anak muda secara berurutan dengan cepat ketika kondisinya mendukung dan kista yang dapat bertahan dalam kondisi kering selama bertahun-tahun jika kondisi mulai menjadi kurang menguntungkan. Untuk menghasilkan nauplia sirip bebas dari kista, mereka membutuhkan air (hidrasi) dan oksigen untuk memulai dan menyelesaikan metabolisme (Dumitrascu, 2011).

*Artemia salina* Leach memiliki 3 tahapan daur hidup diantaranya kista, naupli dan dewasa. Pada tahap naupli, merupakan tahap yang digunakan untuk pengujian toksisitas menggunakan metode BSTL, pada tahap ini larva udang mempunyai kualitas sensitivitas yang sangat tinggi karena dinding sel yang masih sangat lunak. Tahap naupli merupakan langkah kedua dari mekanisme kehidupan larva udang yang hanya mempunyai satu mata (fotoreseptor). Naupli akan tumbuh dengan mengembangkan dua mata lalu berenang melewati kolom air (fototaksis) memanfaatkan antena. rahangnya digunakan untuk memfilter air dan autotorof atau sering disebut fitoplankton (Wahyu Ningdyah et al., 2015).

#### **4. Penggunaan dalam Penelitian**

*Artemia salina* leach adalah hewan coba yang biasanya digunakan menjadi organisme target untuk mendeteksi senyawa bioaktif dalam tumbuhan. Analisis hayati menggunakan hewan uji *Artemia salina* leach memiliki beberapa keunggulan dalam standarisasi dan kontrol kualitas produk tumbuhan (Arcanjo et al., 2012).

Larva udang digunakan sebagai salah satu solusi untuk menguji toksisitas ekstrak herbal dan memiliki korelasi dengan hewan model lainnya (Tekha et al., 2015).

*Artemia salina* leach yang sering juga disebut udang air asin merupakan krustasea kecil yang sering dijadikan subyek penelitian. Uji kematian udang air asin dalam pengujian dianggap sebagai salah satu cara yang paling berguna untuk pengujian awal toksisitas umum pada tumbuhan. Telah ditetapkan keamanan, kepraktisan dan ekonomis untuk menentukan bioaktivitas tumbuhan (Ferraz Filha et al., 2012).

Pusat Kanker Purdue, Universitas Purdue di Lafayette memanfaatkan hewan uji *Artemia salina* Leach untuk pencarian senyawa aktif tumbuhan baik secara umum atau tidak spesifik untuk antikanker. Ikatan relevan pada sampel yang memiliki sifat toksik pada *Artemia salina* leach ternyata memiliki aktifitas sitotoksik. Dari hal tersebut maka hewan uji *Artemia salina* leach dapat digunakan untuk uji sitotoksik (Meyer et al., 1982).

Perubahan telur larva udang *A.salina* Leach pada saat keadaan basah dan keadaan kering sebagai sampel uji yang menarik dan efektif ditinjau dengan jangka lama serta perawatan yang mudah dan tingkat sensitifitas terhadap kondisi yang cukup tinggi (Wahyu Ningdyah et al., 2015).

### ***C. Brine Shrimp Lethality Test***

Salah satu metode awal untuk mengetahui ketoksikan suatu senyawa yang terkandung pada tumbuhan adalah *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT). BSLT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari senyawa antikanker yang berasal dari tumbuhan dan telah terbukti memiliki korelasi dengan aktivitas antikanker. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak tumbuhan bersifat toksik maka dapat dikembangkan ke tahap isolasi senyawa sitotoksik tumbuhan untuk pengembangan obat alternatif antikanker. Jika hasil uji menunjukkan bahwa ekstrak tumbuhan tidak bersifat toksik maka dapat dikembangkan untuk melihat

khasiat lainnya menggunakan hewan coba yang lebih besar dari larva udang seperti, tikus, mencit seara in vivo (Meyer et al., 1982).

BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*) adalah sebuah metode yang memanfaatkan udang air asin atau yang biasa disebut *Artemia salina* Leach diusulkan sebagai bioassay sederhana untuk penelitian produk alam. Metode ini menggunakan prosedur penentuan nilai  $IC_{50}$  (*Lethal concentration*) dalam  $\mu/ml$  senyawa aktif dan ekstrak dalam media air garam atau air laut. Aktivitas berbagai senyawa aktif yang diketahui dimanifestasikan sebagai toksisitas pada udang air asin. Kelebihan metode ini adalah cepat, murah, dan sederhana sebagai alat bioassay umum (Meyer et al., 1982).

Pengujian efek toksik dari larva *Artemia salina* leach dihitung berdasarkan  $IC_{50}$  yang artinya terjadi kematian pada hewan uji setelah 6 jam pemaparan dimasukkan kedalam kategori  $IC_{50}$  akut dan pemaparan setelah 24 jam dimasukkan kedalam kategori  $IC_{50}$  kronis. Pada pengerjaan biasanya digunakan  $IC_{50}$  setelah 14 pemaparan 24 jam dimana terjadi peningkatan kelarutan ekstrak yang sukar larut membutuhkan waktu lebih lama (Anderson et al., 1991).

Hasil yang didapatkan dijumlah sebagai nilai  $IC_{50}$  ekstrak dimana jumlah dosis yaitu konsentrasi kematian larva udang 50% setelah masa inkubasi 24 jam. Senyawa dengan nilai  $IC_{50} < 1000$  /ml dapat dinyatakan sebagai senyawa aktif yang bersifat toksik dan dapat ditingkatkan sebagai agen anti kanker (Meyer et al., 1982).

Konsentrasi	Keterangan
$IC_{50} \leq 30 \mu g/ml$	Sangat toksik
$IC_{50} \leq 1000 \mu g/ml$	Toksik
$IC_{50} > 1000 \mu g/ml$	Tidak toksik

**Tabel 1.** Tingkat Toksisitas

Suatu senyawa akan dinyatakan tidak beracun bila nilai  $IC_{50}$  diatas 1000 ppm. Senyawa tersebut akan dinyatakan memiliki toksisitas rendah bila nilai  $IC_{50}$  berada pada kisaran 200 ppm – 1000 ppm. Kedua rentang konsentrasi tersebut diduga memiliki aktivitas sebagai desinfektan. Senyawa tersebut dinyatakan memiliki tingkat toksisitas sedang jika nilai  $IC_{50}$  berada pada kisaran 30 ppm - 200 ppm yang diduga memiliki aktivitas antimikroba. Senyawa tersebut dinyatakan memiliki tingkat toksisitas yang tinggi jika nilai  $IC_{50}$  di bawah 30 ppm dan diduga memiliki aktivitas antikanker (Rinaldi F et al., 2016).

#### **D. Uji Sitotoksik**

Salah satu uji awal yang dilakukan untuk memprediksi atau menentukan tingkat keamanan suatu ekstrak tumbuhan obat yang kemudian dilanjutkan ke tahap uji farmakologi adalah uji praklinis toksisitas. Pengujian toksisitas dapat dilakukan dengan metode yaitu secara *in vitro* atau *in vivo*. Metode toksisitas *in vitro* yang umum digunakan adalah metode BSLT (Mardany et al., 2018).

Senyawa sitotoksik merupakan senyawa atau zat yang bisa merusak sel normal dan sel kanker dan juga dimanfaatkan untuk menghalangi perkembangan sel tumor ganas (Purwanto et al., 2015).

Pengujian *in vitro* pada uji sitotoksik memanfaatkan kultur sel yang digunakan untuk mengetahui adanya aktivitas antineoplastik suatu senyawa. Penentuan *in vitro* ini merupakan salah satu metode untuk memperoleh obat sitotoksik. Tes ini adalah tes kuantitatif dengan menentukan kematian sel (Haryoto et al., 2013).

Metode sitotoksik digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu obat antikanker atau suatu cara standar untuk memastikan apakah suatu tanaman mengandung bahan yang berbahaya secara biologis (beracun). Sistem ini adalah tes kualitatif dengan penentuan kematian sel (Arel et al., 2018).

Indikator yang digunakan pada uji sitotoksik yaitu nilai  $IC_{50}$ . Dimana  $IC_{50}$  (Lethal Concentration) adalah nilai yang menandakan potensi toksisitas suatu senyawa terhadap sel. Nilai termasuk tolok ukur atau parameter untuk melakukan tes pengamatan kinetika sel. Potensi suatu senyawa menjadi toksik dapat ditunjukkan dengan nilai  $IC_{50}$ . Semakin tinggi nilai  $IC_{50}$ , semakin kurang toksik senyawa tersebut (Haryoto et al., 2013).

Akhir uji sitotoksik diperoleh konsentrasi maksimum yang masih memungkinkan sel untuk bertahan hidup. Bagian akhir dari uji sitotoksik pada organ target memberikan informasi langsung tentang perubahan yang terjadi pada fungsi sel tertentu (Haryoto et al., 2013).

Uji toksisitas ini menggunakan metode BSLT yang memiliki aktivitas farmakologi yang sangat luas, cepat, tidak memerlukan banyak biaya, hasil dapat dipertanggungjawabkan dan prosedurnya sederhana. Oleh karena itu, metode BSLT sering dikaitkan dengan metode skrining senyawa antikanker (Mardany et al., 2018).

Istilah sitotoksik biasa digunakan pada zat yang bersifat teratogenik, mutagenik, genotoksik, onkogenik, dan zat berbahaya lainnya (Purwanto et al., 2015).

Aktivitas sitotoksik ekstrak tumbuhan terhadap larva udang dapat ditentukan menurut analisis probit dan regresi linier  $y = a + bx$ , dimana  $y$  = nilai probit sedangkan  $x$  = konsentrasi log. Dari persamaan tersebut dapat ditentukan untuk menentukan nilai  $IC_{50}$  ekstrak dengan memasukkan nilai probit mortalitas 50% ke dalam persamaan sehingga diperoleh konsentrasi yang menyebabkan mortalitas 50% (Arel et al., 2018).

### ***E. Golongan Metabolit Sekunder***

Metabolit sekunder tergolong senyawa yang tidak esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan organisme yang dapat ditemukan dalam bentuk satuan atau berbeda antara satu spesies dengan spesies lainnya. Setiap organisme akan menghasilkan metabolit sekunder yang berbeda, bahkan biasanya satu jenis senyawa hanya terdapat pada satu spesies dalam satu kingdom. Tidak semua senyawa dapat diproduksi, hanya pada saat dibutuhkan atau pada fase tertentu. Metabolit sekunder berfungsi sebagai pertahanan diri dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, misalnya untuk mengatasi hama dan penyakit, molekul sinyal dan untuk menarik penyerbuk. Metabolit sekunder digunakan oleh organisme untuk berinteraksi dengan lingkungannya (Reo et al., 2017).

Metabolit sekunder merupakan senyawa alam yang keberadaannya tidak terlalu bermanfaat bagi tubuh tetapi dapat berperan penting dalam kelangsungan hidup suatu makhluk hidup. Sebagian besar tumbuhan penghasil metabolit sekunder menggunakan senyawa tersebut untuk pertahanan diri dan bersaing dengan makhluk hidup lain di sekitarnya (Stanton et al., 2007).

Diketahui bahwa metabolit sekunder pada tumbuhan dapat memberikan efek farmakologis yaitu antivirus, sitotoksik, dan antioksidan. Salah satu metabolit sekunder yang penting pada tumbuhan adalah flavonoid (Alfaridz & Amalia, 2018).

Metode yang umumnya diujikan untuk mengetahui ada tidaknya senyawa yang tersimpan dalam tanaman adalah skrining fitokimia. Skrining fitokimia merupakan uji pendahuluan yang digunakan untuk memperoleh gambaran kandungan senyawa yang terdapat pada tumbuhan. Hasil penapisan fitokimia akan digambarkan dengan terjadinya perubahan warna visual (Dewatisari, 2020).

Pengujian fitokimia pada tumbuhan sangat diperlukan, untuk mengamati metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman yang tidak digunakan atau dapat dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh. Tetapi memiliki efek yang berguna untuk kesehatan atau memiliki peran penting untuk pencegahan penyakit (Novitasari & Putri, 2016).

Kelebihan metode penapisan fitokimia ini adalah cepat, sederhana, efektif dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok senyawa serta dapat menentukan keberadaan senyawa aktif biologis yang terdistribusi dalam jaringan (Puspitasari et al., 2013). Berikut beberapa golongan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan, yaitu:

### **1. Flavonoid**

Golongan metabolit sekunder yang paling banyak terdapat pada tumbuhan adalah flavonoid. Flavonoid termasuk dalam keluarga polifenol yang dikelompokkan menurut struktur kimia dan biosintesisnya. Flavonoid memiliki struktur dasar yang terdiri dari dua gugus aromatik yang dihubungkan oleh perantara karbon. Flavonoid memiliki pembagian golongan berdasarkan perbandingan struktur terutama pada substitusi karbon pada gugus aromatik pusat dengan keragaman aktivitas farmakologi yang ditimbulkan (Alfaridz & Amalia, 2018).

Flavonoid memiliki peranan penting bagi tanaman yang akan memberikan warna, rasa pada biji, bunga dan buah serta aroma yang akan melindungi tanaman dari dampak lingkungan, proteksi dari paparan sinar UV dan antimikroba. (Alfaridz & Amalia, 2018).

Flavonoid merupakan metabolit sekunder yang berasal dari tumbuhan dan termasuk dalam kelompok besar polifenol. Senyawa flavonoid dapat ditemukan di semua bagian tumbuhan termasuk kulit kayu, kembang kol, daun, akar, buah, biji,

bunga, serbuk sari dan nektar. Flavonoid berfungsi sebagai penangkal radikal bebas dan dapat mencegah oksidasi lipid (Zuraida et al., 2017).

## **2. Alkaloid**

Alkaloid adalah metabolit sekunder yang dapat ditemukan pada tumbuhan, dapat ditemui pada ranting, daun, kulit kayu dan biji. Alkaloid memiliki manfaat kesehatan berupa memicu sistem saraf, analgesik, meningkatkan tekanan darah, penyakit kardiovaskular, obat penenang dan antimikroba (Aksara et al., 2013).

Secara umum senyawa alkaloid bersumber dari tumbuhan terutama spesies angiospermae yang dimana lebih dari 20% spesies angiosperma mengandung alkaloid. Alkaloid dapat ditemui dalam jumlah kecil dan senyawa kompleks harus dipisahkan dari jaringan tanaman. Alkaloid berfungsi sebagai toksin yang akan melindunginya dari hama, senyawa penyimpan yang dapat mensuplai nitrogen. Faktor pengatur pertumbuhan dan elemen lainnya (Ningrum et al., 2017).

## **3. Saponin**

Saponin merupakan senyawa yang aktif terdapat pada permukaan dan menghasilkan buih bila dikocok dalam air. Saponin adalah bentuk glikosida dari saponin sehingga bersifat polar. Terbentuknya buih yang dilakukan pada uji saponin menandakan adanya kandungan glikosida yang mempunyai kemampuan membentuk sebuah buih yang terkandung didalam air yang akan dihidrolisis menjadi glukosa atau senyawa lainnya. Senyawa saponin secara umum akan tertarik oleh pelarut semi polar (Astarina, N. W. G., Astuti, K. W., Warditiani, 2012).

## **4. Fenol**

Fenol merupakan metabolit non esensial yang diproduksi oleh tanaman sebagai respons terhadap kondisi lingkungan sekitar. Senyawa fenol berfungsi sebagai proteksi terhadap sinar UV-B dan kematian sel serta melindungi DNA

dari beberapa kerusakan. Serta memiliki fungsi sebagai agen pencegahan terhadap beberapa gangguan penyakit seperti kanker, penumpukan kolesterol pada dinding arteri, diabetes melitus dan Gangguan fungsi otak. Pada umumnya setiap tumbuhan mengandung satu atau lebih metabolit sekunder golongan flavonoid (Hanin & Pratiwi, 2017).

#### **F. Metode Ekstraksi**

Ekstraksi adalah proses pemisahan zat aktif dari senyawa padat atau cair dengan menggunakan pelarut tertentu. Prinsip proses ekstraksi adalah pelarut dipindahkan melalui bulk ke permukaan, kemudian pelarut menembus ke dalamnya atau disebut proses difusi massa pelarut pada permukaan padatan inert ke dalam pori padatan. Selanjutnya zat terlarut (solute) yang ada dalam padatan larut ke dalam pelarut karena adanya perbedaan konsentrasi. Kemudian campuran zat terlarut dalam pelarut berdifusi keluar dari permukaan padatan inert. Selanjutnya zat terlarut (solute) keluar dari pori-pori padatan dan bercampur dengan pelarut yang berada di luar padatan (Prayudo et al., 2018).

Tujuan dari ekstraksi ini adalah untuk menarik serta memisahkan senyawa murni pada suatu tumbuhan yang memiliki kelarutan berbeda sesuai dengan komponen pelarut pada bahan alam dari yang di miliki oleh hewan, tumbuhan atau biota laut dengan menggunakan pelarut berbahan organik (Departemen Kesehatan RI, 2000).

Metode yang diterapkan untuk penelitian obat tradisional adalah metode ekstraksi. Pemilihan metode yang digunakan berdasarkan sifat bahan dan senyawa yang terkandung didalamnya. Target tindakan perlu dilakukan sebelum memilih metode. Beberapa tindakan tersebut antara lain:

1. Senyawa yang merupakan bioaktif yang tidak diketahui sumbernya.
2. Senyawa yang diketahui bersumber pada suatu organisme tertentu.

3. Sekelompok senyawa di dalam suatu organisme yang memiliki hubungan secara struktural.

(Mukhriani, 2014).

Adapun metode ekstraksi yang dapat di gunakan dengan pelarut dengan suhu dingin atau panas, yaitu:

### **1. Metode Suhu Dingin**

#### **a. Proses Maserasi**

Maserasi merupakan suatu proses ekstraksi simplisia dengan menggunakan beberapa pelarut melalui pengocokan atau pengadukan berulang-ulang pada suhu kamar (Departemen Kesehatan RI, 2000). Namun metode ekstraksi menggunakan suhu kamar ini terdapat suatu kelemahan yaitu proses ekstraksinya yang kurang sempurna sehingga mengakibatkan hasil dari senyawa proses pelarutannya kurang sempurna. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan suhu tertentu untuk menentukan penilaian suhu yang optimal selama proses ekstraksi. Ekstraksi dengan menggunakan metode ini memiliki kelebihan yaitu menjamin zat aktif yang akan diekstraksi tidak akan mengalami kerusakan (Chairunnisa et al., 2019).

#### **b. Proses Perkolasi**

Perkolasi merupakan suatu proses ekstraksi yang setiap pengujiannya menggunakan pelarutan terbaru untuk menghasilkan ekstrak yang sempurna, umumnya dilakukan pada suhu kamar (Departemen Kesehatan RI, 2000).

Metode perkolasi ini merupakan jenis ekstraksi suhu dingin yang menggunakan suatu alat khusus yang disebut perkolator. Kelebihan dari proses perkolasi adalah mampu mengekstrak ekstrak yang lebih sempurna dibandingkan dengan proses maserasi tetapi memiliki kekurangan yaitu membutuhkan bahan

pelarut yang cukup banyak dan membutuhkan waktu yang lebih lama (Verawati et al., 2017).

Perkolasi merupakan sebuah proses ekstraksi dimana pelarut akan dialirkan melalui suatu kolom perkolator dan diisi dengan beberapa bahan serbuk atau sampel, kemudian ekstraknya akan dikeluarkan secara perlahan melalui saluran keran. Parameter penghentian penambahan bahan pelarut apabila perkolat tidak lagi mengandung komponen yang akan diekstraksi. Caranya adalah dengan mengambil bahan tersebut kemudian dibasahi dengan jenis pelarut yang cocok dan masukkan ke dalam sebuah wadah perkolator. Diberi saringan berpori di bagian bawah wadah untuk menampung bedak. Pelarut cair akan dialirkan dari atas menuju ke bawah melalui suatu serbuk. Pelarut akan melarutkan sebuah zat aktif dalam sel yang dilaluinya sehingga jenuh (Atun, 2014).

## **2. Metode Suhu Panas**

### **a. Refluks**

Refluks merupakan salah satu metode ekstraksi menggunakan pelarut pada suhu dan titik didih yang telah ditentukan. Durasi waktu yang telah ditetapkan serta menggunakan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan karena adanya proses pendinginan balik. Proses pada residu biasanya dilakukan 3-5 kali pada residu pertama, sehingga dapat dianggap sebagai proses ekstraksi yang lengkap (Departemen Kesehatan RI, 2000).

### **b. Soxhlet**

Soxhlet merupakan proses ekstraksi menggunakan prinsip pemanasan serta penggunaan pelarut yang lebih efisien karena terdapat proses perputaran pelarut yang setiap saat membasahi sampel. Senyawa yang tidak terpengaruh oleh panas sangat cocok menggunakan metode soxhlet (Hasrianti et al., 2016).

Metode ini menggunakan alat khusus serta menggunakan pelarut yang selalu baru dikarenakan terjadi proses ekstraksi terus menerus dan pelarut yang digunakan relatif konsisten karena terjadi proses back cooling (Departemen Kesehatan RI, 2000).

Soxhlet adalah salah satu metode ekstraksi panas yang tidak cocok untuk sampel tanaman yang mengandung campuran termolabil dan memerlukan alat khusus yaitu soxhlet (Verawati et al., 2017).

#### **c. Digesti**

Digesti adalah proses maserasi kinetik (pengadukan terus menerus) dengan suhu lebih tinggi dari suhu kamar, umumnya dikerjakan pada suhu 40°C – 50°C (Departemen Kesehatan RI, 2000).

#### **d. Infus**

Infus merupakan metode ekstraksi menggunakan air sebagai pelarut dengan suhu waterbath (bejana infus direndam dalam waterbath mendidih, suhu terukur 90° C) selama 15-20 menit. (Hasrianti et al., 2016).

Infus adalah metode ekstraksi menggunakan air sebagai pelarut. Selama proses infudasi, suhu pelarut air harus berada dititik 90°C dalam waktu 15 menit. Perbandingan ukuran antara sampel dan pelarut adalah 1:10 yang dimana jika berat sampel 100 gram, maka berat volume pelarut adalah 1000 ml. Prosesnya adalah panaskan sampel tersebut dalam wadah panci dengan air seperlunya dengan waktu 15 menit hingga suhu berada dititik 90°C sambil diaduk. Saring selagi panas menggunakan kain flanel, lalu tambahkan air secukupnya melalui ampas untuk mendapatkan volume yang diinginkan. Jika bahannya memiliki minyak esensial, disaring setelah didinginkan (Atun, 2014).

#### e. Dekok

Dekok adalah ekstraksi yang memanfaatkan pelarut air pada temperatur 90°C dalam kurung waktu 30 menit (Hasrianti et al., 2016).

Proses ekstraksi dekoksi hampir mirip dengan ekstraksi infus, yang membedakan adalah waktu infus lebih panjang ( $\geq 30$  menit) dan temperatur pelarut yang sama dengan titik didih air. Caranya ambil sampel dan tambahkan air menggunakan perbandingan 1:10, lalu panaskan dalam wadah panci stainless steel atau panci enamel dengan waktu 30 menit. Aduk sesekali. Dilakukan penyaringan dalam keadaan panas menggunakan kain flanel, kemudian dicukupkan dengan air panas melalui ampas untuk mendapatkan volume yang diinginkan (Atun, 2014).

#### G. Tinjauan Islam Mengenai Penelitian Tanaman Obat

Tumbuhan yang memiliki khasiat obat merupakan suatu kelebihan di sisi Allah SWT, karena tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan khasiatnya oleh manusia. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. As-Syu'ara (26) ayat 7:

اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahannya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik”. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015).

Makna ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt mengajak umatnya untuk belajar dari alam semesta agar mereka mengetahui bahwa hanya Allah swt yang berhak disembah. Dan apakah mereka orang-orang musyrik itu tidak memperhatikan apa yang mereka lihat di hamparan bumi, betapa kita menanam berbagai macam pasangan tumbuhan yang baik yang membawa banyak manfaat bagi manusia. Allah swt menciptakan berbagai macam tumbuhan yang baik yang membawa manfaat dan membuktikan kekuasaan-Nya dalam menghidupkan dan menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati, membuktikan adanya Sang Pencipta Yang Maha Esa (Shihab, 2012).

Dalam ayat lain disebutkan juga bahwa Allah berfirman dalam QS. Al-Luqman (31) ayat 10-11, yang berbunyi:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10) هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (11)

Terjemahannya :

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (diper permukaan) bumi supaya bumi tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang, dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik (10). Inilah Ciptaan Allah, Maka perhatikanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembah-sembahan(mu) selain Allah. Sebenarnya orang-oran zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata (11) (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2015).

Ayat ini menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta dengan segala isinya, berupa planet-planet yang tak terhitung banyaknya. Dalam ayat ini dikatakan "tanpa tiang seperti yang kamu lihat". Dipahami bahwa langit memiliki pilar, yaitu kekuatan yang menopangnya dan berfungsi sebagai pilar, agar planet-planet tidak berantakan. Hanya mereka yang berilmu yang dapat melihat tiang-tiang kokoh itu dengan ilmu batinnya. Dia membiakkan segala jenis binatang melata, kecerdasan, mamalia, bertelur dan lain-lain dan kami turunkan air hujan dari langit dimana hujan itu berasal dari awan yang Dia arahkan ke suatu tempat tertentu yang akan membasahi permukaan bumi. Dengan air hujan tumbuhlah segala jenis tanaman, dengan warna yang indah dan banyak manfaat (Shihab, 2002).

Kata Karim digunakan untuk segala sesuatu yang baik menurut objeknya. Rizq yang karim itu halal, bermanfaat dan berlimpah. Berbagai pasangan tanaman yang indah adalah sesuatu yang tumbuh subur dan dapat menghasilkan apa yang diharapkan dari penanamannya (Shihab, 2002).

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nahl (6) ayat 10 berbunyi :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَلَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

Terjemahannya:

“Dia-lah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan yang pada (tempat tumbuhnya) kamu mengembalakan ternakmu (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2015).

Ayat ini menjelaskan bahwa ini adalah rincian dari Keesaan Allah SWT. Ayat ini juga menjelaskan tentang tumbuhan yang merupakan sumber kebutuhan dan sumber makanan bagi manusia dan hewan (Shihab, 2002).

Ayat di atas mengingatkan manusia untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT dan memanfaatkan nikmat-Nya dengan sebaik-baiknya, karena Dialah Yang Maha Kuasa yang telah mentaati dari langit, yaitu awan air hujan yang digunakan untuk menyuburkan tanaman tempat tumbuhnya. , lalu mengembalakan ternak agar bisa berkembang biak. digunakan yang menghasilkan susu segar, daging, dan bulu untuk Anda, sebagian digunakan sebagai minuman segar (Shihab, 2002).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratorium dengan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menentukan golongan senyawa kimia yang ada dalam sampel sedangkan untuk analisis kuantitatif dimana toksisitas sampel diukur.

#### **B. Lokasi Penelitian dan Waktu**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Fitokimia Jurusan Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Megarezky.

##### **2. Waktu**

Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Maret – Juli 2021

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini meliputi 3 tahap pengerjaan, yaitu tahap ekstraksi, tahap penyaringan fitokimia, dan uji sitotoksik. Tahap ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut n-heksana, etil asetat dan etanol. Tahap penapisan fitokimia dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa alkaloid, fenol, flavonoid, dan saponin. Metode uji sitotoksik menggunakan metode BSLT.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini menggunakan tanaman Bajakah tampala (*Spatholobus littoralis* Hassk.) yang berasal dari daerah Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sampel yang digunakan adalah batang tampala bajakah.

## **E. Alat dan Bahan**

### **1. Alat**

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas, alat refluks, alat rotavapor, timbangan analitik, tabung reaksi, rak tabung, wadah kultur larva, dan vial.

### **2. Bahan**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tampala batang bajakah, n-Heksana, etil asetat, etanol 96%, air laut, air suling, asam klorida (Merck), asam sulfat pekat (Merck), besi (III) klorida (Merck), dimetil sulfoksida (Merck), larva udang (*Artemia salina* Leach), magnesium (Merck), methanol (Merck), reagen Dragendorf, reagen Meyer.

## **F. Prosuder Kerja**

### **1. Penyiapan Sampel**

#### **a. Pengambilan Sampel**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tampala Bajakah yang berasal dari daerah Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

#### **b. Pengolahan Sampel**

Sampel yang telah diambil, disortir basah kemudian dicuci dengan air bersih, kemudian dicacah dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dan diserbukkan hingga menjadi simplisia terakhir yang disimpan pada suhu kamar.

### **2. Determinasi Tumbuhan**

Determinasi sampel dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar.

### **3. Ekstraksi**

Batang bajakah diekstraksi dengan metode maserasi dan masing-masing menggunakan pelarut n-heksana, etil asetat dan etanol. Sampel tampala bajakah

ditimbang lalu dihaluskan menggunakan grinder (blender) kemudian dimasukkan ke dalam wadah maserasi dan dibasahi sedikit dengan pelarut n-heksana, kemudian ditambahkan hingga 2 liter. Dimaserasi selama 3 x 24 jam dengan suhu ruang yang terlindung dari cahaya, sesekali diaduk lalu disaring. Setelah itu dilakukan 2 kali remaserasi pada residu. Ekstrak cair yang diperoleh, lalu diuapkan menggunakan alat rotary evaporator, dan didapatkan ekstrak batang tampala bajakah. Lakukan prosedur yang sama pada pelarut etil asetat dan etanol 95%. (Rusdi et al., 2018).

#### **4. Skrining Fitokimia (Wirasti, 2019)**

Skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder yang terkandung dalam bajakah tampala (*Spatholobus littoralis* Hassk.)

##### **a. Uji alkaloid**

Ditimbang ekstrak sebanyak 0,5 gram lalu ditambahkan 1 ml HCL 2N dan aquadest 9ml, kemudian dipanaskan di atas penangas air selama kurang lebih 2 menit lalu dinginkan dan disaring. Diambil dua tabung reaksi, kemudian ditambahkan 0,5 ml filtrat lalu ditambahkan 2 tetes pereaksi Meyer dan Dragendorf pada masing-masing tabung reaksi. Hasil positif menunjukkan adanya endapan atau kekeruhan.

##### **b. Uji Flavonoid**

Timbang ekstrak sebanyak 0,5 gram kemudian tambahkan metanol dan panaskan di atas water bath, tambahkan 0,1 mg magnesium lalu tambahkan HCL pekat 5 tetes. Hasil positif menunjukkan terbentuknya warna merah, kuning atau jingga.

##### **c. Uji Saponin**

Ditimbang ekstrak sebanyak 1 gram dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 mL, lalu tambahkan air panas sebanyak 10 ml dan dinginkan, dikocok

kuat selama 10 detik. Busa padat terbentuk tidak kurang dari 10 menit dengan tinggi 1-10 cm dan tidak hilang bila ditambahkan HCL 2N.

#### **d. Uji Fenol**

Diekstraksi sampel menggunakan etanol 96% sebanyak 20 ml. Masukkan 1 ml filtrat ke dalam tabung reaksi dan tambahkan larutan FeCl<sub>3</sub> 5% sebanyak 2 tetes. Hasil positif menandakan terbentuknya warna biru kehijauan atau hijau.

### **5. Uji Sitotoksik (Desi Pertiwi, 2014)**

#### **a. Proses Penetasan Telur Udang *Artemia salina* Leach**

Pengembang biakan larva udang dilakukan dalam wadah kaca atau aquarium yang terbagi menjadi 2 bagian, satu terdiri dari bagian yang gelap dan satu bagian yang terang. Pembuatan sekat diberikan lubang-lubang dengan diameter +/- 2 mm. Masukkan beberapa air laut ke dalam sebuah wadah, kemudian diangin-anginkan menggunakan alat aerator. Sejumlah telur larva udang dimasukkan ke dalam wadah satu ruangan lalu menutup wadah. Sisi lainnya dibiarkan terbuka dan diberi pencahayaan lampu agar menarik larva udang melepaskan telur yang telah menetas melewati lubang sekat. Akan terjadi Penetasan telur 18 hingga 24 jam kemudian menjadi larva. Larva yang berusia 48 jam siap untuk digunakan pada uji toksisitas.

#### **b. Proses Pembuatan Larutan Sampel dan Kontrol**

Proses pembuatan larutan induk dengan cara melarutkan 100 mg sampel di tambahkan 10 ml pelarut (n-Hexan, etil asetat dan etanol) dan menambahkan air laut (kadar garam hingga 2 ml). Konsentrasi larutan induk = 100 g/ml. Sampel yang akan lakukan pengujian disiapkan pada konsentrasi 10, 50, 100, 500 dan 1000 ppm. Sedangkan blanko tanpa larutan uji, dibuat 10 l DMSO dan kemudian ditambahkan 10 ml air laut.

### c. Uji Toksisitas Metode BSLT

Sebanyak 10 larva udang dalam 100 L air laut dimasukkan ke dalam sebuah vial uji, lalu ditambahkan beberapa konsentrasi larutan sampel. Untuk setiap konsentrasi dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan. Sebagai suatu kontrol ditambahkan 100 µl larutan blanko kemudian dimasukkan 10 ml air laut. Dilakukannya pengamatan setelah 24 jam dengan melakukan perhitungan jumlah larva udang yang masih hidup dan mati, kemudian dihitung angka mortalitasnya.

Adapun angka mortalitas larva dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Angka kejadian mortalitas larva} = \frac{\text{akumulasi larva mati}}{\text{akumulasi larva mati} + \text{akumulasi larva hidup}} \times 100\%$$

Suatu fraksi dikatakan akan aktif bila mempunyai besaran nilai  $IC_{50} \leq 1000$  µg/ml. Sedangkan untuk senyawa murni dikatakan aktif bila mempunyai besaran nilai  $IC_{50} \leq 200$  µg/ml.

### d. Teknik Analisis Data

Data yang akan diperoleh berupa sebuah data mortalitas *Artemia* dianalisis menggunakan one way variance (ANOVA) dengan  $\alpha = 5\%$ , bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan diantar kelompok perlakuan. (Witriani et al., 2014).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Determinasi

Penetapan tanaman Bajakah tampala dilakukan di Laboratorium Biologi FMIPA UNM. Hasil penentuan tanaman dapat dilihat pada Lampiran 2.

##### 2. Rendemen Ekstrak

Tabel 2. Hasil Persen Rendemen

Jenis Ekstrak	Varietas	Jenis Pelarut	Berat simplisia	Berat Ekstrak	% Rendamen
Ekstrak Kental	Merah	n-Heksana	500 g	5,5334 g	1,1 %
		Etil Asetat	500 g	2.4008 g	0,48 %
		Etanol 96%	500 g	6,5778 g	1,31 %
	Putih	n-Heksana	850 g	1,8498 g	0,21 %
		Etil Asetat	850 g	4,698 g	0,95 %
		Etanol 96%	850 g	11.2801 g	1,32 %

##### 3. Skrining Fitokimia

Tabel 3. Hasil Skrining Fitokimia

Sampel		Alkaloid	Flavonoid	Saponin	Fenol
Merah	n-Hexan	+	+	-	+
	Ethyl asetat	+	+	+	+
	Etanol 96%	+	+	+	+
Putih	n-Hexan	+	+	-	+
	Ethyl asetat	+	+	-	+
	Etanol 96%	+	+	+	+

Ket : (+) = Menunjukkan adanya senyawa

(-) = Menunjukkan tidak mengandung senyawa

#### 4. Uji Sitotoksik BSLT

**Tabel 4.** Hasil Uji BSLT Varietas Merah

Sampel		Konsentrasi ( $\mu\text{g/ml}$ )						Total Kematian	Rerata Kematian	% Kematian
		0	10	50	100	500	1000			
Var. Merah	n-Hexan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ethyl Asetat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Etanol 96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabel 5.** Hasil Uji BSLT Varietas Putih

Sampel		Konsentrasi ( $\mu\text{g/ml}$ )						Total Kematian	Rerata Kematian	% Kematian
		0	10	50	100	500	1000			
Var. Putih	n-Hexan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ethyl Asetat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Etanol 96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### B. Pembahasan

Penggunaan sampel dalam penelitian ini adalah batang tampala bajakah (*Spatholobus littoralis* Hassk). Tanaman ini tersebar luas di pulau Kalimantan. Sampel yang di pergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Desa Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Penetapan tanaman Bajakah tampala dilakukan di Laboratorium Biologi FMIPA UNM Makassar dengan sebuah tujuan untuk memastikan suatu kebenaran sampel yang digunakan agar diperoleh hasil pengujian yang baik dan spesifik (hasil penetapan dapat dilihat pada lampiran 2) .

Sampel yang akan digunakan diekstraksi dengan metode maserasi. Metode ini menggunakan alat yang sederhana, mudah, murah, dan tidak melalui suatu proses pemanasan yang dapat merusak susunan senyawa kimia di dalamnya. Prinsip dari metode maserasi adalah *like dissolve like*, artinya proses pelarut polar akan melarutkan sebuah senyawa polar yang terkandung dalam simplisia (Dewatisari, 2020). Proses ekstraksi menggunakan gradien pelarut yaitu n-

heksana, etil asetat dan etanol 96%. Sampel akan direndam selama 3x24 jam dimana setiap 1x24 jam cairan filter akan diganti dengan pelarut baru sehingga ekstraksi senyawa lebih optimal. Perlakuan yang sama dilakukan pada pelarut etil asetat dan etanol 96%.

Rendemen ekstrak merupakan rasio berat akhir ekstrak dengan berat awal ekstrak dalam persen (Sani et al., 2014). Nilai suatu rendemen yang kadarnya tinggi menunjukkan banyaknya suatu komponen bioaktif yang terkandung di dalamnya (Dewatisari et al., 2018). Rendemen ekstrak batang tampala bajakah varietas merah dengan pelarut n-Hexan, etil asetat, dan etanol secara berturut-turut adalah 1,1%, 0,48% dan 1,31%. Sedangkan rendemen ekstrak bajakah tampala varietas putih dengan pelarut n-Hexan, etil asetat dan etanol secara berturut-turut menunjukkan angka 0,21%, 0,93% dan 1,32%.

Penilaian fitokimia akan dilakukan secara kualitatif berdasarkan sifat kelarutan senyawanya. Skrining fitokimia merupakan tahap awal untuk menentukan jenis golongan metabolit sekunder yang terkandung dalam sampel. Hasil penapisan fitokimia pada golongan senyawa yang terkandung dalam sampel akan digambarkan dengan perubahan warna visual (Dewatisari, 2020). Pada penelitian ini diidentifikasi empat jenis senyawa fitokimia yang terdiri dari uji alkaloid, flavonoid, fenol, dan saponin (Tabel 2).

Batang varietas merah dan putih mengandung beberapa senyawa flavonoid, alkaloid, fenol, dan saponin. Hasil uji positif untuk flavonoid ditunjukkan dengan perubahan warna merah, kuning atau jingga. Hasil positif untuk alkaloid ditunjukkan dengan adanya endapan atau kekeruhan. Hasil uji positif fenol ditunjukkan dengan terbentuknya berupa perubahan warna hijau atau biru kehijauan. Hasil uji positif saponin ditunjukkan dengan terbentuknya sebuah buih setinggi 1 hingga 10 cm dan tidak akan hilang dalam kurun waktu < 10

menit. (Wirasti, 2019). Hasil penapisan pada varietas merah dengan pelarut n-Hexan negatif, serta varietas putih dengan pelarut n-Hexan dan etil asetat negatif, artinya tidak mengandung senyawa saponin.

Kematian larva udang *A.salina* Leach dapat terjadi karena kandungan dari metabolit sekunder yang memiliki sifat toksik pada suatu ekstrak yang dapat menghambat proses daya makan larva. Senyawa ini bekerja menjadi suatu racun perut atau *stomach piosining*. Jika senyawa tersebut masuk ke dalam bagian tubuh larva udang, maka secara langsung sistem pencernaan larva akan terganggu. Racun yang terdapat pada lambung akan menyerang organ inti dalam pencernaan serangga, yaitu ventrikulus. Ketika senyawa ini masuk melalui mulut larva dan tertelan, pencernaannya seketika akan terganggu. Senyawa tersebut dapat menghambat proses reseptor rasa di daerah mulut larva. Hal ini dapat menyebabkan larva gagal dalam mendapatkan stimulus suatu rasa sehingga tidak mampu mengenali rasa makanan sehingga larva akan mati kelaparan. Senyawa flavonoid berperan dalam penghambatan saluran pencernaan larva udang dan sebagai racun. Senyawa saponin bekerja dengan cara menekan aktivitas enzim pencernaan dan proses penyerapan makanan pada larva udang (Idris, 2019)

Uji toksisitas yang dilakukan dengan menggunakan metode berupa BSLT (Brine Shrimp Lethality Test) yang merupakan suatu uji pendahuluan untuk mendeteksi adanya senyawa dari tampala bajakah yang memiliki sifat toksik terhadap larva *A.salina* Leach. Metode BSLT merupakan suatu metode yang murah, cepat, akurat serta sederhana sebagai alat bioassay umum. Suatu ekstrak dapat menunjukkan efek toksik dalam BSLT jika ekstrak tersebut dapat menyebabkan sejumlah kematian 50% pada hewan uji dengan nilai  $IC_{50} < 1000$  ppm (Meyer et al., 1982). Nilai  $IC_{50}$  dapat ditentukan dengan menggunakan kurva persentase larva yang mati terhadap konsentrasi ekstrak. Hasil yang ditunjukkan

pada Tabel 3. menunjukkan bajakah tampala varietas merah putih dengan pelarutan-Hexan, etil asetat dan etanol dengan persen mortalitas 0 artinya tidak beracun.

Penelitian ini mengingatkan kita betapa besar kekuasaan Allah swt dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an banyak yang menyebutkan bahwa tumbuhan memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai obat bagi manusia. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 11 yang berbunyi:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat (kebesaran Allah swt) bagi kaum yang berpikir” (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2015).

Dari ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa Dia telah menciptakan tumbuhan yang terdiri dari berbagai macam bentuk, sifat khusus, rasa, bau dan warna. Tumbuhan ini dapat memberikan manfaat bagi hewan dan manusia. Allah SWT menciptakan sesuatu hal yang tidak dilakukan dengan sia-sia, akan tetapi memiliki kegunaan dan manfaat tersendiri (Rossidy, 2012).

Abu Na'im dan Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله، فإنكم لن تقدروا قدره (الحديث

Artinya :

“Renungkanlah ciptaan Allah, jangan renungkan Dzat-Nya, karena sesungguhnya kamu tak akan mampu mengukur kekuasaan-Nya”

Hadis diatas menjelaskan bahwa Tafakkur pada awalnya adalah merupakan perenungan atas segala ciptaan Allah, baik yang buruk maupun yang bagus. Kenapa Allah menciptakan jenis makhluk yang jika diamati secara sekilas seperti tidak ada manfaatnya? Kenapa Allah menciptakan keburukan dan kebagusan? Kenapa Allah menciptakan kejahatan dan kebaikan? Sesungguhnya, saat Allah menciptakan keburukan dan kejahatan – Allah ingin menampakkan

sifat “jalal”Nya, dan ketika Allah menciptakan kebagusan dan kebaikan – Allah ingin menampakkan sifat “jamal”Nya.

Maka hendaknya kita manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna, yang memiliki akal pikiran. Sehingga kita di harapkan dapat membedakan tentang kebaikan dan keburukan yang ada di muka bumi ini, dan dapat mempelajari semua tentang ciptaanNya. Bahwasanya segala sesuatu yang di ciptakan oleh Allah SWT tidak ada yang sia-sia.

dengan predikat taqwim ( sebaik-baiknya ciptaan) yang ada pada manusia di bandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Menggunakan akal pikiran yang telah di berikan , dapat memanfaatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ( hewan, tumbuhan dan zat lainnya ) untuk di pergunakan dengan semestinya agar dapat memberi manfaat yang baik dalam kehidupan. Sehingga dapat melestarikan alam semesta ini dan memperbaiki hidup untuk setiap makhluk ciptaannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tiap ekstrak batang bajakah tampala varietas merah dan putih mengandung golongan senyawa yaitu alkaloid, fenol, flavonoid. Ekstrak etyhl asetat dan etanol bajakah tampala varietas merah dan ekstrak etanol bajakah tampala putih mengandung saponin.
2. Ekstrak batang bajakah tampala varietas merah dan putih tidak bersifat toksik.

#### ***B. Saran***

Determinasi tumbuhan sebaiknya dilakukan di Laboratorium Herbarium LIPI untuk menentukan varietas spesies bajakah. Ekstraksi bajakah dilakukan dengan metode refluks untuk memaksimalkan hasil ekstraksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aksara, R., Musa, W. J. A., & Alio, L. (2013). Identifikasi Senyawa Alkaloid Dari Ekstrak Metanol Kulit Batang Mangga ( *Mangifera indica* L ). *Jurnal Entropi*, 8(1), 514–519.
- Alfaridz, F., & Amalia, R. (2018). Klasifikasi dan Aktivitas Farmakologi dari Senyawa Aktif Flavonoid. *Farmaka*, 16(3), 1–9.
- Anderson, J. E., Goetz, C. M., McLaughlin, J. L., & Suffness, M. (1991). A blind comparison of simple bench-top bioassays and human tumour cell cytotoxicities as antitumor prescreens. *Phytochemical Analysis*, 2(3), 107–111. <https://doi.org/10.1002/pca.2800020303>
- Arcanjo, D., Albuquerque, A., Melo-Neto, B., Santana, L., Medeiros, M., & Citó, A. (2012). Bioactivity evaluation against *Artemia salina* Leach of medicinal plants used in Brazilian Northeastern folk medicine. *Brazilian Journal of Biology*, 72(3), 505–509. <https://doi.org/10.1590/s1519-69842012000300013>
- Arel, A., Wardi, E. S., & Oktaviani, Y. (2018). Profil Metabolit Sekunder Ekstrak Daun Berenuk (*Crescentia Cujete* L.) Dan Uji Sitotoksik Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test. *Jurnal Katalisator*, 3(2), 82. <https://doi.org/10.22216/jk.v3i2.3165>
- Astarina, N. W. G., Astuti, K. W., Warditiani, N. K. (2012). Skrining Fitokimia Ekstrak Metanol Rimpang Bangle ( *Jurnal Farmasi Udayana*, 344(4), 1–7.
- Atun, S. (2014). Metode Isolasi dan Identifikasi Struktural Senyawa Organik Bahan Alam. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 8(2), 53–61. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v8i2.132>

- Ayu, P., Surbakti, A., Queljoe, E. De, & Boddhi, W. (2018). Skrining Fitokimia Dan Uji Toksisitas Ekstrak Etanol Daun Binahong (*Andredera Cordifolia* (Ten.) Steenis) Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (Bslt). *Pharmakon*, 7(3), 22–31. <https://doi.org/10.35799/pha.7.2018.20112>
- Chairunnisa, S., Wartini, N. M., & Suhendra, L. (2019). Pengaruh Suhu dan Waktu Maserasi terhadap Karakteristik Ekstrak Daun Bidara (*Ziziphus mauritiana* L.) sebagai Sumber Saponin. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 7(4), 551. <https://doi.org/10.24843/jrma.2019.v07.i04.p07>
- Cheng, X. L., Wan, J. Y., Li, P., & Qi, L. W. (2011). Ultrasonic/microwave assisted extraction and diagnostic ion filtering strategy by liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry for rapid characterization of flavonoids in *Spatholobus suberectus*. *Journal of Chromatography A*, 1218(34), 5774–5786. <https://doi.org/10.1016/j.chroma.2011.06.091>
- Departemen Kesehatan RI. (2000). Parameter Standar Umum Ekstrak Tanaman Obat. In *Departemen Kesehatan RI. Hal* (Vol. 1, pp. 10–11).
- Desi Pertiwi, dan. (2014). Uji Toksisitas Ekstrak Etanol Sarang Semut Lokal Aceh (*Mymercodia* Sp.) Dengan Metode Bslt Terhadap Larva Udang *Artemia salina* Leach Toxicity Test of Ethanol Extract Ant Plant Local Aceh (*Mymercodia* sp) Method of BSLT Larvae Shrimp *Artemia salina* Leach. *Jurnal Medika Veterinaria*, 8(1).
- Dewatisari, W. F. (2020). Perbandingan Pelarut Kloroform dan Etanol terhadap Rendemen Ekstrak Daun Lidah Mertua (*Sansevieria trifasciata* Prain.) Menggunakan Metode Maserasi. *Journal.Uin-Alauddin*, September, 127–

132.

Dewatisari, W. F., Rumiyan, L., & Rakhmawati, I. (2018). Rendemen dan Skrining Fitokimia pada Ekstrak Daun Sansevieria sp . Rendemen and Phytochemical Screening using Leaf extract of Sansevieria Sp . *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 17 (3)(January), 197–202.  
<http://www.jurnal.polinela.ac.id/JPPT>

Dumitrascu, M. (2011). Artemia salina. *Balneo Research Journal*, 2(4), 119–122.  
<https://doi.org/10.12680/balneo.2011.1022>

Ferraz Filha, Z. S., Lombardi, J. A., Guzzo, L. S., & Saúde-Guimarães, D. A. (2012). Brine shrimp (Artemia salina Leach) bioassay of extracts from Lychnophoriopsis candelabrum and different Lychnophora species. *Revista Brasileira de Plantas Mediciniais*, 14(2), 358–361.  
<https://doi.org/10.1590/S1516-05722012000200016>

Fitriani, Sampepna, E., & Saputra, S. H. (2020). Karakteristik Tanaman Akar Bajakah ( Spatholobus Littoralis Hassk) Dari Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Characterizing Bajakah Root Plants (Spatholobus Littoralis Hassk) From Loa Kulu Kutai Kartanegara Regency. *14(2)*, 365–376.

Hanin, N. N. F., & Pratiwi, R. (2017). Kandungan Fenolik, Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Paku Laut (Acrostichum aureum L.) Fertil dan Steril di Kawasan Mangrove Kulon Progo, Yogyakarta. *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology*, 2(2), 51.  
<https://doi.org/10.22146/jtbb.29819>

Haryoto, Muhtadi, Indrayudha, P., Azizah, T., Suhendi, A., & Haryoto, Muhtadi,

- Peni Indrayudha, Tanti Azizah, A. S. (2013). Aktivitas Sitotoksik Ekstrak Etanol Tumbuhan Sala (*Cynometra ramiflora* Linn) Terhadap Sel HeLa, T47D dan WiDR. *Jurnal Penelitian Saintek*, 18(Aktivitas Sitotoksik Ekstrak Etanol Tumbuhan Sala Aktivitas Sitotoksik Ekstrak Etanol Tumbuhan Sala (*Cynometra ramiflora* Linn) TERHADAP SEL HeLa, T47D dan WiDR), 21–28.
- Hasanah, J., Kartika, R., & Simanjuntak, P. (2019). Uji Aktivitas Antioksidan Dengan Metode Peredaman Radikal Bebas Dan Sitotoksik Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test ( Bslt ) Akar Bajakah ( *Uncaria tomentosa* ( Willd ex Schult ). DC ).
- Hasrianti, Nururrahmah, & Nurasia. (2016). Pemanfaatan Ekstrak Bawang Merah dan Asam Asetat Sebagai Pengawet Alami Bakso. *Dinamika*, 07(1), 9–30.
- Idris, M. (2019). Uji Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Daun Salam ( *Syzygium Polyanthum* ( Wight ) Walp .) Dengan Metode Bslt ( Brine Shrimp Lethality Test ) Acute Toxicity Test Of Ethanol Extract Of Salam Leaf ( *Syzygium Polyanthum* ( Wight ) Walp .) With Bslt Method ( Brine. *Jurnal Medical Sains*, 4(1), 35–42.
- Mardany, M. P., Chrystomo, L. Y., & Karim, A. K. (2018). Skrining Fitokimia dan Uji Aktivitas Sitotoksik dari Tumbuhan Sarang Semut (*Myrmecodia beccarii* Hook.f.) Asal Kabupaten Merauke. *Jurnal Biologi Papua*, 8(1), 13–22. <https://doi.org/10.31957/jbp.41>
- Meyer, B. N., Ferrigni, N. R., Putnam, J. E., Jacobsen, L. B., Nichols, D. E., & McLaughlin, J. L. (1982). Brine shrimp: A convenient general bioassay for active plant constituents. *Planta Medica*, 45(1), 31–34.

<https://doi.org/10.1055/s-2007-971236>

Mukhriani. (2014). ekstraksi, pemisahan senyawa dan identifikasi senyawa aktif. *Jurnal Kesehatan*, VII, 361. <https://doi.org/10.17969/agripet.v16i2.4142>

Ningrum, R., Purwanti, E., & Sukarsono, S. (2017). Alkaloid Compound Identification of *Rhodomyrtus tomentosa* Stem as Biology Instructional Material for Senior High School X Grade. *Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia*, 2(3), 231. <https://doi.org/10.22219/jpbi.v2i3.3863>

Novanty, V., Pangkahila, W., & Dewi, N. N. A. (2021). Administration of ethanol extract of Bajakah tampala (*Spatholobus littoralis* Hassk) stem decreased reactive oxygen species, visceral fat and body weight of obese rats. *Neurologico Spinale Medico Chirurgico*, 4(1), 32–36. <https://doi.org/10.36444/nsmc.v4i1.150>

Novitasari, A. E., & Putri, D. Z. (2016). Isolasi dan Identifikasi Saponin pada Ekstrak Daun Mahkota Dewa dengan Ekstraksi Maserasi. *Jurnal Sains*, 6(12), 10–14. <http://journal.unigres.ac.id/index.php/Sains/issue/view/88>

Nur Azizah Putri Nada Hanifah. (2020). Aktivitas Antioksidan Metode Klt Dan Skrining Fitokimia Fraksi N-Heksana Batang Bajakah Tampala (*Spatholobus Littoralis* Hassk.) Asal Kalimantan Tengah. 1–70.

Prayudo, A. N., Novian, O., Setyadi, ., & Antaresti, . (2018). Koefisien transfer massa kurkumin dari temulawak. *Widya Teknik*, 14(1), 26–31. <https://doi.org/10.33508/WT.V14I1.1739>

Purwanto, N., Rismawati, E., & Sadiyah, esti R. (2015). Uji Sitotoksik ekstrak biji salak (*Salacca zalacca* (Gaert) Voss dengan menggunakan metode Brine

- Shrimp lethality test (Bslt). *Prosiding Penelitian SPeSIA Unisiba Prodi Farmasi FMIPA*, 616–622.
- Puspitasari, L., Swastini, D. a., & Arisanti, C. I. . (2013). Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol 95% Kulit Buah Manggis (*Garcinia mangostana* L .). *Garuda Portal*, 961, 5.
- Reo, A. R., Berhimpon, S., & Montolalu, R. (2017). Metabolit Sekunder Gorgonia (*Paramuricea clavata*). *Jurnal Ilmiah Platax*, 5(1), 42–48.
- Ridder-Numan, J. (1992). *Spatholobus* (Leguminosae-Papilionoideae): a new species and some taxonomic notes. *Blumea - Biodiversity, Evolution and Biogeography of Plants*, 37(1), 63–71.
- Rinaldi F, F., Ibrahim, A., Fadraersada, J., & Rijai, L. (2016). Identifikasi Metabolit Sekunder Dan Pengujian Toksisitas Ekstrak Metanol Kulit Kayu Laban (*Vitex Pinnata* L.) Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (Bslt). 20–21. <https://doi.org/10.25026/mpc.v4i1.172>
- Rusdi, M., Hasan, T., Ardillah, A., & Evianti, E. (2018). Perbandingan Metode Ekstraksi terhadap Kadar Flavonoid Total dan Aktivitas Antioksidan Batang *Boehmeria virgata*. *Ad-Dawaa' Journal of Pharmaceutical Sciences*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.24252/djps.v1i1.6426>
- Sakuntala Ninkaew and Pranom Chantaranothai. (2014). The Genus *Spatholobus* Hassk . ( Leguminosae-Papilionoideae ) in Thailand *Spatholobus* Hassk . is a genus of woody climbers of the tribe Phaseoleae tropical and subtropical Asia . This genus description and key to the species of the provided herein along wi. *Tropical Natural History*, 14(October), 87–99.

- Sani, R. N., Nisa, F. C., Andriani, R. D., & Maligan, J. M. (2014). Analisis Rendemen Dan Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Mikroalga Laut Tetraselmis Chuii Yield Analysis And Phytochemical Screening Ethanol Extract Of Marine Microalgae Tetraselmis Chuii. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 2(2), 121–126.
- Saputera, M. M. A., & Ayuhecacia, N. (2018). Uji Efektivitas Ekstrak Etanolik Batang Bajakah (*Spatholobus littoralis* Hassk.) Terhadap Waktu Penyembuhan Luka. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Shihab, M. (2002). Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10. Lentera Hati.
- Stanton, W. J., Etzel, M. J., & Walker, B. J. (2007). Kandungan Metabolit Sekunder dan Efek Penurunan Glukosa Darah Ekstrak Biji Rambutan (*Nephellium lappaceum* L) Pada Mencit (*Mus musculus*). 634.
- Tekha, K., -, E., & Kartika, R. (2015). Uji Toksisitas Ekstrak Kelopak Jantung Pisang Kepok (*Musa Paradisiaca* Linn.) Dengan Metode BSLT (Brine Shrimp Lethality Test). *Jurnal Kimia Mulawarman*, 13(1), 19–22.
- Verawati, V., Nofiandi, D., & Petmawati, P. (2017). Pengaruh Metode Ekstraksi Terhadap Kadar Fenolat Total Dan Aktivitas Antioksidan Daun Salam (*Syzygium polyanthum* (Wight) Walp.). *Jurnal Katalisator*, 2(2), 53. <https://doi.org/10.22216/jk.v2i2.1744>
- Wahyu Ningdyah, A., Hairil Alimuddin, A., & Jayuska, A. (2015). Uji Toksisitas Dengan Metode Bslt (Brine Shrimp Lethality Test) Terhadap Hasil

Fraksinasi Ekstrak Kulit Buah Tampoi (*Baccaurea macrocarpa*). 4(1), 75–83.


Wirasti. (2019). Penetapan Kadar Fenolik Total, Flavonoid Total, dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Benalu Petai (*Scurrula atropurpurea* Dans.) Beserta Penapisan Fitokimia. *Journal of Pharmaceutical and Medicinal Sciences*, 4(1), 1–5.

Witriani, Widiastuti, W., Kanedi, E. L., Nurcahyani, M., & Nuning. (2014). Bioassay Ekstrak Selaginella Willdenowii Dengan Brine Shrimp Lethality Test (Bslt). *Jurnal Ilmiah*, 2(1), 46–49.  
<https://doi.org/10.4324/9781315853178>


Zuraida, Z., Sulistiyani, S., Sajuthi, D., & Suparto, I. H. (2017). Fenol, Flavonoid, Dan Aktivitas Antioksidan Pada Ekstrak Kulit Batang Pulaui (*Alstonia scholaris* R.Br). *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 35(3), 211–219.  
<https://doi.org/10.20886/jphh.2017.35.3.211-219>

*Lampiran 1. Skema Kerja*

**1. Preparasi sampel**



## 2. Pembuatan ekstrak



### 3. Skrining Fitokimia

#### a. Uji Alkaloid

Disiapkan ekstrak sebanyak 0,5 g ditambah dengan 1 ml 2N HCl dan 9 ml aquadest



Dipanaskan di atas penangas air selama 2 menit, didinginkan kemudian disaring dan diperoleh filtratnya



Disiapkan dua tabung reaksi, kemudian masing-masing ditambahkan 0,5 ml filtrat, setelah itu ditambahkan 2 tetes pereaksi Meyer dan Dragendorf pada masing-masing tabung reaksi.



Hasil positif untuk alkaloid ditunjukkan jika terdapat endapan atau kekeruhan putih (Meyer) atau merah (Dragendorf).

**b. Uji Flavonoid**

Disiapkan ekstrak sebanyak 0,5 g ditambah metanol dan dipanaskan di atas penangas air



Ditambahkan 0,1 gram serbuk magnesium dan 2 ml asam klorida pekat. Ditambahkan 0,1 mg serbuk Mg kemudian ditambahkan 5 tetes



Hasil positif untuk flavonoid ditunjukkan dengan adanya warna merah, kuning atau jingga

**c. Uji Saponin**


Ekstrak yang sudah jadi sebanyak 1 g dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, masukkan 10 ml air panas dan dinginkan lalu kocok kuat-kuat selama 10 detik





Hasil positif untuk saponin ditunjukkan jika banyak busa selama tidak kurang dari 10 menit dengan tinggi 1-10 cm dan busa tidak hilang jika ditambahkan 1 tetes HCl 2N

#### 4. Uji Sitotoksik

##### a. Penetasan Telur Udang *Artemia salina* Leach



**b. Pembuatan Larutan Sampel dan Kontrol****c. Uji Sitotoksik Metode BSLT**

Sebagai kontrol ditambahkan 100  $\mu$ l larutan blanko kemudian ditambahkan air laut sebanyak 10 ml



Pengamatan dilakukan setelah 24 jam dengan menghitung jumlah larva udang yang hidup dan mati, kemudian dihitung mortalitasnya



Tingkat kematian larva dihitung dengan rumus

#### d. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh berupa data mortalitas Artemia dianalisis menggunakan one way variance (ANOVA) dengan  $\alpha = 5\%$ , untuk mengetahui ada perbedaan yang signifikan antar kelompok perlakuan.

## Lampiran 2. Hasil Determinasi Bajakah Tampala



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
LABORATORIUM BIOLOGI

Alamat : Kampus Parangtambung Jl. Dg. Tata Raya  
Tlp. (0411) 840610 Fax. (0411) 841504 Makassar 90224  
Laman : <http://bio.fkipa.unm.ac.id>

12 Maret 2021

No : 03/UN36.1.4/LAB.BIO/SKAP/2021  
Lamp :-  
Hal : Hasil Identifikasi Tanaman

Kepada Yth.  
Nurfajri Syamsi (70100117010)  
Nur Afah Alfianti Nur (70100117022)  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dengan Hormat,

Bersama ini, kami sampaikan hasil identifikasi Tanaman Kayu Bajakah (*Spatholobus littoralis* Hassk.) yang saudara kirirkan. Identifikasi dilakukan oleh staf peneliti laboratorium Botani Jurusan Biologi FMIPA UNM dengan hasil sebagai berikut:

Kingdom : Plantae  
Divisi : Magnoliophyta  
Kelas : Magnoliopsida  
Ordo : Fabales  
Famili : Fabaceae  
Genus : *Spatholobus*  
Species : *Spatholobus littoralis* Hassk.

Kunci determinasi : 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9a – 41b – 42b – 43b – 54a – 55b – 57b – 58b –  
Fam. Fabaceae – *Spatholobus*

Sumber pustaka :


1. <https://www.gbif.org/species/2977057>
2. <http://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:519160-1>
3. <https://eol.jrnl.org/species/346195#classification>
4. <http://worldfloweronline.org/taxon/wfo-0000207208>
5. <https://eol.jrnl.org/species/346195#overview>
6. Steenis, Van C.G.G.J. 2013. Flora. PT. Balai Pustaka, Jakarta

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Laboratorium Biologi  
FMIPA UNM  
  
Dr. A. Mu'nisa, S.Si., M.Si.  
NIP. 197205261998022001

M A K A S S A R

**Lampiran 3. Surat Selesai Penelitian**

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>FAKULTAS FARMASI</b> <b>PROGRAM STUDI S-1 FARMASI</b>	Kode/No : UNIMERZ.11.32.1/FM
	Jl. Antang Raya No. 43 Telp. (0411) 492401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:ftersi@universitasmegarezky.ac.id">ftersi@universitasmegarezky.ac.id</a>	Tanggal : 15 April 2019
		Revisi : 00
	Halaman : 1 dari	

Nomor : 02.48201.091056/XI/2021  
 Lampiran :  
 Perihal : **Surat Pengantar Selesai Penelitian**

Kepada YTH.  
**KETUA JURUSAN FARMASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
 Di  
 Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mahasiswa Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar Pada Program Studi S1 Farmasi Universitas Mega Rezky Makassar. Bahwa Telah Menyelesaikan Penelitian, Atas :

Nama : Nur Afia Alfrianti Nur  
 Judul Penelitian : Uji sitotoksik ekstrak Bajakah Tampala (*Spatholobus littoralis Hassk*) dengan metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT)  
 Tempat Penelitian : Laboratorium Farmakognosi Fitokimia  
 Waktu Penelitian : Maret - Juli 2021

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih

*Wallahul Muwafiq ilaa Aqwamih Tharieq*

*Wassalamu Alaikum Wr.*

Makassar, 8 November 2021  
 Ketua Program Studi S1 Farmasi  
  
 Apt. Ahmad Irsyad Aliah., M.Si.  
 NIDN: 09270997 01

Tembusan Kepada Yth :  
 1. Yang Bersangkutan  
 2. Arsip

M A K A S S A R

#### Lampiran 4. Perhitungan Persen Rendemen

##### Perhitungan Rendemen Ekstrak

% Rendemen ekstrak batang bajaka tampala (*Spatholobus littoralis* Hassk)

$$\text{Rendemen} = \frac{\text{bobot ekstrak (gram)}}{\text{bobot simplisia (gram)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Merah n-Hexan} &= \frac{5,5334}{500} \times 100\% \\ &= 1,1\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Merah ethyl asetat} &= \frac{2,4008}{500} \times 100\% \\ &= 0,48\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Merah etanol} &= \frac{6,5778}{500} \times 100\% \\ &= 1,31\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Putih n-Hexan} &= \frac{1,849}{850} \times 100\% \\ &= 0,21\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Putih ethyl asetat} &= \frac{4,698}{850} \times 100\% \\ &= 0,93\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Putih etanol} &= \frac{11,280}{850} \times 100\% \\ &= 1,32\% \end{aligned}$$

#### Lampiran 5. Perhitungan Pembuatan Pereaksi

1. FeCl<sub>3</sub> 5%

Ditimbang 5 g besi (III) klorida kemudian di larutkan dengan 100 ml aquadest sehingga diperoleh FeCl<sub>3</sub> 5%.

2. HCL 2N

Tiap 1000 ml HCl pekat/murni memiliki kadar 36-37%, sehingga :

Diketahui : BJ = 1,1878

Konsentrasi = 37%

Mr HCl = 36,5 g/mol

$$\text{Normalitas (N)} = \frac{1000 \times \text{bj} \times \text{konsentrasi}}{\text{Mr} \times 100}$$
$$\frac{1000 \times 1,1878 \times 37}{36,5 \times 100} = 12 \text{ N}$$

$$\text{Jadi, } N_1 \cdot V_1 = N_2 \cdot V_2$$

$$V_1 = \frac{V_2 \cdot N_2}{N_1}$$
$$= \frac{100 \text{ ml} \cdot 2N}{12 N}$$
$$= 16,6 \text{ ml}$$

Diambil HCl pekat 16,6 ml kemudian dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml yang berisi 50 ml aquadest. Setelah itu, ditambahkan aquadest sampai tanda batas 100 ml secara perlahan melalui dinding labu untuk menghindari perubahan panas yang berlebih/uap.

*Lampiran 6. Gambar Penelitian*



*Gambar 3. Batang Bajakah Tampala*



*Gambar 4. Ekstrak Batang Bajakah Tampala*




**Gambar 5.** Proses Penghalusan Batang Bajakah Tampala




**Gambar 6.** Proses Rotary Evaporator Ekstrak Bajakah Tampala




*Gambar 7.* Penetasan Telur Udang *A.salina* Leach




**Gambar 8. Uji Saponin**



*Gambar 9. Uji Fenolik*



*Gambar 10. Uji Alkaloid (Meyer)*



*Gambar 11. Uji Alkaloid (Dragendorff)*

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nur Afiah Alfrianti Nur, akrab disapa Piah atau Iyya'. Lahir disebuah kota yang terdapat di Sulawesi Selatan, Makassar 22 November 1999. Dia adalah anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Nur Amin dan Nur Yanti. Penulis berasal dari suku makassar. Dia berasal dari salah satu desa yang terletak di kabupaten gowa lebih tepatnya desa taeng kecamatan pallangga. Disaat usianya 5 tahun, penulis memulai Pendidikan dijenjang sekolah dasar tepatnya di SDI Bontoala I. Setelah lulus dari jenjang sekolah dasar, penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Sungguminasa. Hal ini merupakan kali pertama merasakan sekolah yang berada jauh dari jangkauan rumah dan merupakan hal baru yang didapatkan baik itu dari lingkungan dan segi transportasi. Setelah itu, penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di SMK Farmasi Syekh Yusuf Al Makassar Gowa. Setelah menyelesaikan pendidikan dibangku SMK, alhamdulillah atas izin Allah SWT, penulis sedang menempuh Pendidikan di salah satu Universitas Islam yang berada di Kota Makassar, yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. **Motto Penulis adalah “Berjuanglah seakan-akan nyawamu sedang dipertaruhkan.”. Harapan penulis untuk kedepannya, semoga bisa menggapai mimpi-mimpi yang diharapkan dan bisa lebih beerguna bagi banyak orang.**