

**STUDI LITERATUR AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN
BINAHONG (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi

Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RASIH AYU PRATIWI

NIM: 70100114056

**JURUSAN FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
SAMATA-GOWA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rasih Ayu Pratiwi
NIM : 70100114056
Tempat tanggal lahir : makassar, 3 juni 1996
Jurusan : Farmasi
Alamat : Perumahan Bumi Pallangga Mas 2
Judul : Studi Literatur Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Binahong

Menyatakan bahwa studi literatur yang kami buat ini benar adalah karya tulis kami. Jika kemudian hari terdapat bukti kopian, tiruan, dan duplikasi dari skripsi orang lain maka studi literatur ini tidak sah dan melanggar hukum.

Gowa, Juli 2021

Penyusun

Rasih Ayu Pratiwi

70100114056

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berupa Studi Literatur yang berjudul “Studi Literatur Aktivitas Antibakteri Daun Binahong (*Anredera cordifolia (Ten). Steenis*)” yang disusun oleh Rasih Ayu Pratiwi, NIM: 70100114056, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada , dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, Juli 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Dr. Syatirah Jalaluddin, M.kes., Sp.a. (.....)

Sekretaris : Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si (.....)

Pembimbing 1 : Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si (.....)

Pembimbing 2 : Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si (.....)

Penguji 1 : Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si (.....)

Penguji 2 : Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc. M. HI (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. Dr. Syatirah Jalaluddin, M. Kes., Sp.A

NIP : 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Baik Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **STUDI LITERATUR AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN BINAHONG (*Anredera cordifolia (Ten.) Steenis*)** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabiullah Muhammad saw, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Rajamang dan ibunda Yesih Wiyarsih yang telah merawat hingga membesarkan penulis dan tak henti-hentinya memberi doa dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materi, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan untuk saudaraku tercinta, serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas doa, kasih sayang dan bimbingan kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Mereka adalah semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag, selaku Wakil Rektor I (Bid. Akademik Pengembangan Lembaga) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Wahyuddin, M.Hum, selaku Wakil Rektor II (Bid. Adm. Umum dan Perencanaan) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, selaku Wakil Rektor III (Bid. Kemahasiswaan) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag selaku Wakil Rektor IV (Bid. Kerjasama dan Pengembangan) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany., S.Si., M.Si., Apt, selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
8. Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS, selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfu, M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

10. Apt. Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si, Apt selaku Sekretaris jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
12. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
13. Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si selaku pembimbing ke II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
14. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc. M. HI selaku penguji Kompetensi Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
16. Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmu dan motivasi, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah SWT, serta staff jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
17. Kepada seluruh laboran Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
18. Kepada teman-teman Angkatan penulis Farmasi 2014 Galenica yang selalu memberi dukungan, cinta dan motivasi kepada penulis.
19. Terkhusus untuk sahabat-sahabat penulis di Girl Squad. Terima kasih karena selalu mendukung, memotivasi, mengajari, dan menasehati penulis.

20. Kepada musisi, aktor, pelakon, penggiat literasi dan orang-orang bertalenta yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu, terima kasih telah menjadi inspirasi dan motivasi penulis untuk bersyukur dan menikmati hidup dengan *love myself*
21. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang Farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Gowa, Juli 2021

Penulis

Rasih Ayu Pratiwi
NIM: 70100114056

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
BAB II.....	4
2.1 Strategi Pencarian Literatur	4
2.1.1 Frame work yang digunakan.....	4
2.1.2 Kata kunci yang digunakan.....	5
2.1.3 Data base atau search engine yang digunakan	5
2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Jurnal/Artikel.....	5
2.2.1 Kriteria inklusi.....	5
2.2.2 Kriteria eksklusi	6
2.3 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas	6
2.3.1 Hasil pencarian dan seleksi studi	6
2.3.2 Daftar artikel hasil pencarian	7
BAB III.....	11
3.1 Hasil.....	11
3.2 Analisis Data	12
BAB IV	27

4.1. Tanaman binahong	27
4. 2. Kandungan senyawa binahong	29
4. 3 Ekstraksi	33
4. 4 Pembahasan artikel.....	36
4. 5 Antibakteri	44
4.6 Tinjauan Keislaman Tentang Keanekaragaman Tumbuhan.....	55
BAB V.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. PICO	4
Tabel 2. Hasil pencarian dan seleksi studi	6
Tabel 3. Artikel Hasil Pencarian.....	7
Tabel 4. Analisis Data	12
Tabel 5. Kandungan senyawa	32
Tabel 6. Bakteri yang dapat dihambat oleh tanaman binahong	51
Tabel 7. Kategori daya hambat.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Artikel yang dianalisis	70
--	-----------

ABSTRAK

Nama : Rasih Ayu Pratiwi

NIM : 70100114056

**Judul : STUDI LITERATUR AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN
BINAHONG (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis)**

Antibakteri merupakan zat yang dapat menghambat atau membunuh bakteri dengan penyebab infeksi. Salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai antibakteri yaitu daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya aktivitas antibakteri daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis), jenis bakteri yang dapat dihambat oleh ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) dan kandungan senyawa ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) yang berpotensi sebagai antibakteri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi literatur dan dianalisis berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) memiliki aktivitas antibakteri. Jenis bakteri yang dapat dihambat oleh ekstrak daun binahong adalah *eschericia coli*, *propionibacterium acne*, *pseudomonas aeruginosa*, *salmonella thypi*, *shigella flexneri*, *staphylococcus aureus*, *streptococcus mutans*, *streptococcus penumoniae*, *streptococcus pyogenes*, *vibrio harveyi*. Serta memiliki kandungan senyawa flavonoid, tanin, saponin, fenol, dan steroid yang berfungsi sebagai antibakteri.

Kata Kunci: Ekstrak daun binahong, *binahong extract*, aktivitas antibakteri ekstrak daun binahong

ABSTRACT

Name : Rasih Ayu Pratiwi

NIM : 70100114056

**Title : STUDY LITERATURE OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY
BINAHONG LEAF EXTRACT (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis)**

*Antibacterial is a substance that can inhibit or kill bacteria that cause infection. One of the plants that has antibacterial properties is binahong leaf (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis). This study aims to determine the antibacterial activity of binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis), a type of bacteria that can be inhibited by binahong extract (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) and the content of binahong leaf extract (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) which has the potential as an antibacterial. The method used in this research is literature study and analyzed based on inclusion and exclusion criteria. The result of this research is that the leaf extract of binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) has potential as an antibacterial. The types of bacteria that can be inhibited by binahong leaf extract are *eschericia coli*, *propionibacterium acne*, *pseudomonas aeruginosa*, *salmonella thypi*, *shigella flexneri*, *staphylococcus aureus*, *streptococcus mutans*, *streptococcus pneumoniae*, *streptococcus pyogenes*, *vibrio harveyi*. It also contains flavonoid, tannins, saponins, phenols, and steroids that function as antibacterials.*

Keyword : *binahong extract, antibacterial activity of binahong leaf*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati, termasuk tanaman obat yang telah digunakan selama berabad-abad untuk pencegahan penyakit, pengobatan dan pemeliharaan kesehatan. Dewasa ini, penggunaan obat dalam pengobatan tradisional banyak diterapkan oleh masyarakat. Hal ini karena efek samping obat tradisional yang relatif rendah dan harga yang terjangkau oleh masyarakat luas (Sulistiyarsi, 2018).

Obat tradisional yang digunakan sebagai obat di Indonesia masih terbatas. Obat tradisional Indonesia merupakan bahan penelitian dan pengembangan yang ekstensif sehingga obat-obatan yang berbahan dasar bahan alam Indonesia lebih banyak dimanfaatkan manfaatnya dan diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, minat dan kemampuan dalam berbagai bidang. Ini adalah warisan budaya yang diperlukan (BPOM, 2005).

Binahong tumbuh secara alami di daerah kering Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, dan Argentina selatan. Pada tahun 1800-an, tanaman ini diperkenalkan ke Amerika Serikat dan Inggris Raya oleh para imigran Portugis. Di Indonesia, binahong banyak ditemukan di berbagai tempat dan dipercaya mampu menyembuhkan banyak penyakit. Daun binahong mengandung antioksidan tingkat tinggi, asam askorbat, fenol

dan protein. Karena kandungan senyawa tersebut, daun binahong dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit (astrid savitri, 2016).

Tumbuhan Binahong dapat membantu proses penyembuhan penyakit degeneratif seperti kerusakan ginjal, diabetes, jantung bengkak, stroke, wasir, dan asam urat. Tanaman binahong juga dapat digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Tanaman binahong mengandung fenol, flavonoid, saponin, triterpenoid, steroid, alkaloid dan antioksidan (Ani Sulistyarsih, 2018).

Agen antibakteri adalah zat yang dapat mengendalikan atau membunuh bakteri penyebab infeksi. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau mikroorganisme patogen yang menyebabkan bakteri masuk dan berkembang biak didalam jaringan tubuh (Niswa paju, 2013).

Daun binahong mengandung banyak senyawa dengan efek antibakteri: flavonoid, tanin, saponin, fenol, steroid/triterpenoid. Fenolik dan flavonoid aktif secara biologis dan ditemukan dalam metabolit sekunder tanaman, termasuk 8.000 senyawa. Senyawa ini dapat berperan langsung sebagai antibiotik dengan mekanisme kerja menghancurkan dinding sel bakteri (ani sulistyarsih, 2018).

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Apakah ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) memiliki aktivitas antibakteri berdasarkan studi literatur?

- 1.2.2. Apa sajakah bakteri yang dapat dihambat oleh ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) berdasarkan studi literatur?
- 1.2.3. Apa kandungan dari ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) berdasarkan studi literatur
- 1.3.2. Mengetahui jenis bakteri yang dapat dihambat oleh ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) berdasarkan studi literatur
- 1.3.3. Mengetahui kandungan senyawa ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) yang berpotensi sebagai antibakteri

BAB II

METODE KERJA

2.1 Strategi Pencarian Literatur

Pencarian literatur (*literature searching*) adalah pencarian mendalam untuk informasi publik tentang suatu topik. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan berbagai mesin pencari yang tersedia di perpustakaan. Penelitian bibliografi bertujuan untuk memperoleh publikasi ilmiah sebanyak-banyaknya tentang suatu pokok bahasan tertentu. Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan sebuah proyek penelitian (Dr. Putu Gede Surada, 2016).

2.1.1 Frame work yang digunakan

Metode yang digunakan adalah PICO

P (*Population*) : masalah dan populasi yang spesifik dalam jurnal tersebut

I (*Intervention*) : intervensi atau perlakuan yang dilakukan pada populasi

C (*Comparison*) : perbandingan intervensi yang sudah/ pernah dilakukan pada populasi

O (*Outcome*) : hasil yang didapatkan dari penelitian

Tabel 1. PICO

P (<i>Population</i>)	I (<i>Intervention</i>)	C (<i>Comparison</i>)	O (<i>Outcome</i>)
Ekstrak daun binahong (<i>Anredera</i>)	Konsentrasi ekstrak, jenis	Oksitetrasiklin, tetrasiklin, iodip, kotrimoksazol, klindamisin,	Kandungan daun binahong dan aktivitas antibakteri daun

<i>cordifolia (Ten.) Steenis)</i>	bakteri, dan metode pengujian	klorhexidin, dan kloramfenikol	binahong (<i>Anredera cordifolia (Ten.) Steenis)</i>
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---

2.1.2 Kata kunci yang digunakan

Kata kunci yang digunakan dalam hal ini adalah ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia (Ten.) Steenis*), *binahong extract*, aktivitas antibakteri ekstrak daun binahong

2.1.3 Data base atau search engine yang digunakan

Adapun database yang digunakan ialah Google Scholar, pubmed, dan *National Center for Biotechnology Information (NCBI)*

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Jurnal/Artikel

2.2.1 Kriteria inklusi

Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Artikel yang berkaitan dengan aktivitas antibakteri daun binahong (*Anredera cordifolia (Ten.) Steenis*)
- b. Pustaka primer mengandung bahasan dari kata kunci yang dicari. Pustaka primer dari tahun 2010 sampai 2020
- c. Artikel yang merupakan jurnal eksperimental
- d. Artikel berbahasa indonesia dan inggris
- e. Artikel yang dapat diakses secara utuh (full)
- f. Artikel yang duplikat hanya dipilih salah satu

g. Artikel internasional dan nasional

2.2.2 Kriteria eksklusi

Kriteria eksklusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Artikel yang tidak sesuai dengan topik penelitian
- b. Tahun terbitan Artikel tidak termasuk 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 - 2020
- c. Artikel yang merupakan jurnal review
- d. Artikel dengan metode penelitian tidak jelas

2.3 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas

2.3.1 Hasil pencarian dan seleksi studi

Tabel 2. Hasil pencarian dan seleksi studi

Data base	Kata kunci	Jumlah artikel		
		Inklusi	Eksklusi	Akhir
Pubmed	<i>anredera cordifolia extract</i>	7	7	0
	<i>Antibacterial activity of anredera cordifolia</i>	2	2	0
NCBI	<i>anredera cordifolia extract</i>	50	50	0
	<i>Antibacterial activity of anredera cordifolia</i>	25	23	2
Google scholar	Ekstrak binahong	7	7	0
	<i>Binahong extract</i>	7	7	0
	Aktivitas antibakteri ekstrak binahong	30	15	15
	<i>Antibacterial activity of anredera cordifolia extract</i>	19	19	0
Total pustaka yang dianalisis dan dibahas				17

2.3.2 Daftar artikel hasil pencarian

Tabel 3. Artikel Hasil Pencarian

No	Penulis	Tahun	Judul artikel	Kriteria jurnal
1.	I gede oka darsana, dkk	2012	Potensi daun binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis) dalam menghambat pertumbuhan bakteri <i>Escherichia coli</i> secara in vitro	S4
2.	Lilies kusuma wardhani dan nanik sulistyani	2012	Uji aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat daun binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis) terhadap <i>Shigella flexneri</i> beserta profil kromatografi lapis tipis	S2
3.	Anis ainurrochmah, dkk	2013	Efektivitas ekstrak daun binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis) terhadap penghambatan pertumbuhan bakteri <i>shigella flexneri</i> dengan metode sumuran	S4
4.	Sutrisno E, dkk	2014	Kajian aktivitas penyembuhan luka dan antibakteri binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis), pegagan (<i>Centella</i>	S5

			<i>asiatica (L.) Urban</i>) serta kombinasinya terhadap bakteri <i>staphylococcus aureus</i> dan <i>pseudomonas aeruginosa</i> dari pasien luka kaki diabetes	
5.	Dewi peti virgianti dan diar maulani purwanti	2015	Daya hambat ekstrak etanol daun binahong (<i>Anredera cordifolia (Ten.) Steenis</i>) terhadap pertumbuhan bakteri <i>Streptococcus pyogenes</i> secara in vitro	S4
6.	Beta kurniawan dan wayan ferly aryana	2015	Binahong (<i>Anredera cordifolia (Ten.) Steenis</i>) as inhibitor <i>eschericia coli</i> growth	S3
7.	Ratih dewi dwiyanti, dkk	2015	Efektivitas air rebusan daun binahong (<i>Anredera cordifolia (Ten.) Steenis</i>) terhadap pertumbuhan <i>salmonella thypi</i>	S2
8.	Gde raka angga kartika, dkk	2016	Potensi ekstrak daun binahong (<i>Anredera cordifolia (Ten.) Steenis</i>) sebagai penghambat bakteri <i>vibrio herveyi</i>	S3
9.	Vivivan wijaya, dkk	2017	<i>The efficaci of an infusion of binahong leaves (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) againts wild strain black pigmented bacteria</i>	Q3
10.	Fadel abima, dkk	2017	Uji efektivitas antibakteri ekstrak daun binahong (<i>Anredera cordifolia</i>	S2

			(<i>Ten.</i>) <i>Steenis</i>) terhadap isolat bakteri <i>Eschericia coli</i> jajanan cilok secara in vitro dengan metode difusi	
11.	Pratiwi trisunuwati dan endang setyowati	2017	Potensi perasan daun binahong (<i>Anredera cordifolia (Ten.) Steenis</i>) sebagai antibakterial pada kultur media bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>esherichia coli</i> penyebab mastitis klinis sapi perah	S2
12.	Hasri, dkk	2017	Analisis fenolik dan daya hambat daun binahong (<i>Anredera cordifolia (Ten.) Steenis</i>) terhadap bakteri <i>eschericia coli</i> dan <i>staphylococcus aureus</i>	S1
13.	Ani Sulistyarsi dan Nanda Wahyu Pribadi	2018	Uji aktivitas antibakteri ekstrak daun binahong (<i>Anredera cordifolia (Ten.) Steenis</i>) terhadap pertumbuhan bakteri <i>staphylococcus aureus</i> dan <i>pseudomonas aeruginosa</i>	S2
14.	Indarto, dkk	2019	Aktivitas antibakteri ekstrak daun binahong terhadap <i>Propionibacterium acne</i>	S3
15.	Isnaeni usman, dkk	2019	Aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak daun kemangi dan daun binahong	S3

			terhadap <i>stertococcus mutans</i>	
16.	I Putu Gede A. P. H, dkk	2020	Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% daun binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis) terhadap bakteri <i>staphylococcus aureus</i>	S3
17.	Nuke Annisa Nasution, dkk	2020	<i>Antibacterial activity of leaf extracts of (Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis) ans <i>Muntingia calabura L. Against Streptococcus pneumoniae</i>	S2

BAB III

HASIL DAN ANALISIS

3.1 Hasil

Pada penelitian terkait aktivitas antibakteri daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis), telah banyak dilakukan penelitian berbasis eksperimen. Terkait pengkajian mengenai aktivitas antibakteri daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) dilakukan penelusuran sumber data menggunakan kata kunci dari penelitian ini, didapatkan 128 artikel. Namun setelah diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi serta tujuan studi literatur ini didapatkan sebanyak 17 artikel dari berbagai situs database, yaitu Google Scholar, pubmed, dan *National Center for Biotechnology Information* (NCBI)

3.2 Analisis Data

Tabel 4. Analisis Data

No	Judul, penulis, dan tahun	Populasi	Intervensi			comparison	Hasil	Mekanisme antibakteri ekstrak binahong
			Konsentrasi ekstrak	Jenis bakteri	Metode pengujian			
1	Uji aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat daun binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis) terhadap <i>Shigella flexneri</i> beserta profil kromatografi lapis tipis (Lilies kusumawardhani dan nanik sulistyani, 2012)	Ekstrak daun binahong	8,5%, 8%, 7,5% , 7%, 6,5%, 6%, 5,5%, dan 5%	<i>Shigella flexneri</i>	Daun binahong diekstraksi menggunakan metode maserasi, dengan pelarut etil asetat. Uji antibakteri menggunakan metode dilusi cair untuk menentukan kadar bunuh minimum (KBM), selanjutnya dilakukan uji	Menggunakan kontrol media, kontrol pelarut, kontrol ekstrak, kontrol obat, kontrol <i>suspending agent</i> , kontrol suspensi bakteri	Hasil dari skrining fitokimia diketahui bahwa daun binahong mengandung senyawa polifenol dan saponin, hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat daun binahong memiliki aktivitas antibakteri terhadap <i>Shigella flexneri</i> . Kadar bunuh minimum ekstrak etil asetat daun binahong terhadap bakteri	-

					kromatografi lapis tipis		<i>Shigella flexneri</i> yaitu 8% b/v.	
2	Potensi daun binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis) dalam menghambat pertumbuhan bakteri <i>Escherichia coli</i> secara in vitro (Igede oka darsana, dkk. 2012)	Daun binahong	0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%	<i>Escherichia coli</i>	Dibuat perasan daun binahong menggunakan pelarut aquades. Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode uji difusi. Data yang diperoleh kemudian diuji dengan analisis deskriptif, analisis ragam selanjutnya uji duncan	Oksitetrasiklin 30 µg	Dari hasil penelitian diketahui bahwa daun binahong memiliki potensi sebagai antibakteri terhadap bakteri <i>Escherichia coli</i> . Hasil pengujian daya hambat didapatkan konsentrasi yang efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri <i>e.coli</i> yaitu pada konsentrasi 100%. Kandungan daun binahong yaitu saponin, flavonoid, alkaloid, dan terpenoid	√
3	Efektivitas ekstrak daun binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.)	Ekstrak daun binahong	40%, 60%, 80%, dan 100%	<i>Shigella flexneri</i>	Pembuatan ekstrak menggunakan metode maserasi,	Aquadest steril	Dari hasil penelitian diketahui bahwa ekstrak daun binahong dapat menghambat	√

	<p><i>Steenis</i>) terhadap penghambatan pertumbuhan bakteri <i>shigella flexneri</i> dengan metode sumuran (Anis ainurrochmah, dkk. 2013)</p>				<p>dengan pelarut etanol 96%. Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi. Data yang diperoleh diuji menggunakan uji normalitas dan dianalisis menggunakan analisis varian 1 arah. Untuk mengetahui perbedaan dari setiap konsentrasi dengan lebih jelas dilakukan uji duncan</p>		<p>pertumbuhan bakteri <i>shigella flexneri</i>, dengan hasil skrining menunjukkan daun binahong mengandung senyawa polifenol dan saponin. Konsentrasi optimal ekstrak daun binahong yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri <i>shigella flexneri</i> strain BW 1201 yaitu pada konsentrasi 100%. Hasil uji normalitas menunjukkan tingkat signifikansi $p > \alpha$, dengan $(p) = 0,760 ; 0,997$ dan $\alpha = 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan data berdistribusi normal. Hasil uji</p>	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

							<p>analisis varian 1 arah $p(0,000) < \alpha(0,05)$ yang berarti terdapat perbedaan aktivitas antibakteri dari setiap konsentrasi. Hasil uji duncan menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi maka semakin besar diameter zona hambat yang terbentuk.</p>	
4	<p>Kajian aktivitas penyembuhan luka dan antibakteri binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis), pegagan (<i>Centella asiatica</i> (L.) Urban) serta kombinasinya terhadap bakteri</p>	<p>Daun binahong</p>	<p>100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm</p>	<p><i>staphylococcus aureus</i> dan <i>pseudomonas aeruginosa</i></p>	<p>Daun binahong diekstraksi secara maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96%. Uji aktivitas bakteri dilakukan dengan menentukan konsentrasi hambat minimum</p>	<p>Tetrasiklin 10 ppm, 20 ppm, dan 30 ppm</p>	<p>Dari hasil penelitian diketahui bahwa daun binahong mengandung senyawa flavonoid, saponin, tanin, fenol, dan steroid. Ekstrak daun binahong mempunyai aktivitas sebagai bakterisid dan bakteriostatik</p>	-

	<i>staphylococcus aureus</i> dan <i>pseudomonas aeruginosa</i> dari pasien luka kaki diabetes (Sutrisno E, dkk. 2014)				(KHM) dan kadar bunuh minimum (KBM)		terhadap bakteri uji. Pada bakteri <i>staphylococcus aureus</i> konsentrasi optimal yang bersifat bakteriostatik yaitu pada konsentrasi 400ppm, yang bersifat bakterisid yaitu pada konsentrasi 1000ppm. Pada bakteri <i>pseudomonas aeruginosa</i> konsentrasi optimal yang bersifat bakteriostatik yaitu pada konsentrasi 1000ppm dan yang bersifat bakterisid yaitu pada konsentrasi 5000ppm	
5	Daya hambat ekstrak etanol daun binahong (<i>Androdera</i>	Ekstrak daun	10%, 20%, 30%, 40%,	<i>streptococcus pyogenes</i>	Proses ekstraksi menggunakan metode maserasi,	NaCl fisiologis sebagai	Dari hasil penelitian diketahui bahwa ekstrak etanol daun	√

	<i>cordifolia</i> (Tan.) (Steenis) terhadap pertumbuhan bakteri <i>streptococcus pyogenes</i> secara in vitro (Dewi peti virgianti dan dia maulani purwanti. 2015)	binahong	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, dan 100%		dengan pelarut etanol 70%. Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode kirby-bauer	kontrol negatif	binahong dapat menghambat pertumbuhan bakteri <i>streptococcus pyogenes</i> . Berdasarkan hasil uji skrining diketahui binahong mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan saponin. Hasil uji daya hambat dari tiap konsentrasi didapatkan pada konsentrasi 100% merupakan konsentrasi optimal	
6	Binahong (<i>Androdera cordifolia</i> (Tan.) (Steenis) as inhibitor <i>eschericia coli</i> growth (Beta kurniawan dan	Daun binahong	50 ppm, 100 ppm, 500 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm	<i>Eschericia coli</i>	Daun binahong diekstraksi dengan maserasi menggunakan pelarut n-heksan. Uji aktivitas antibakteri menggunakan uji difusi	Kertas cakram yang telah direndam dengan NaCl dengan fisiologi 0,9%	Daun binahong dapat menghambat bakteri <i>eschericia coli</i> , karena mengandung senyawa Flavonoid, minyak atsiri, saponin, terpenoid, dan alkaloid Hasil penelitian	√

	wayan ferly aryana. 2015)						menunjukkan diameter daya hambat yang terbentuk pada konsentrasi 2000ppm merupakan konsentrasi yang optimal	
7	Efektivitas air rebusan daun binahong (<i>Androdera cordifolia</i> (Tan.) (Steenis)) terhadap pertumbuhan <i>salmonella thypi</i> (Ratih dewi dwiyanti, dkk. 2015)	Air rebusan daun binahong	20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%	<i>salmonella thypi</i>	Dibuat air rebusan daun binahong, menggunakan aquades. Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode uji difusi	Kloramfenikol	Air rebusan daun binahong dapat menghambat pertumbuhan bakteri <i>salmonella thypi</i> . Daun binahong mempunyai kandungan flavonoid, saponin, alkaloid, minyak atsiri, tanin. Hasil optimal didapatkan pada konsentrasi 100%	√
8	Potensi ekstrak daun binahong (<i>Androdera cordifolia</i> (Tan.) (Steenis))	Ekstrak daun binahong	3%, 5%, 7%, 9%, 11%,	<i>Vibrio herveyi</i>	Ekstraksi daun binahong menggunakan metode maserasi,	kontrol media+bakteri uji	Dari hasil penelitian ekstrak daun binahong dapat menghambat pertumbuhan	√

	sebagai penghambat bakteri <i>vibrio herveyi</i> (Gde raka angga kartika, dkk. 2016)		dan 13%		dengan pelarut aquades. Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode MIC (<i>Minimum Inhibitory Concentration</i>) dan MBC (<i>Minimum Bactericidal Concentration</i>). Analisis data menggunakan analisis varian (ANOVA)		bakteri <i>vibrio herveyi</i> . Hasil uji MIC diperoleh pada konsentrasi 3% dimana hasil biakan tabung reaksi mulai tampak jernih. Hasil uji MBC menunjukkan bahwa ekstrak daun binahong mampu menghambat pertumbuhan bakteri uji. Konsentrasi terbaik didapatkan pada konsentrasi 13%. Daun binahong mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan saponin.	
9	<i>The efficacy of an infusion of binahong leaves (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) against wild strain</i>	Infus daun binahong	50%, 65%, 80%, 95%, dan 100%	Bakteri berpigmen hitam	Dibuat infus binahong menggunakan pelarut aquadest. Uji aktivitas antibakteri menggunakan	klorhexidin	Infus daun binahong memiliki efek antibakteri terhadap bakteri berpigmen. Dari hasil penelitian diketahui hasil MIC	-

	<i>black pigmented bacteria</i> (Vivian wijaya, dkk. 2017)				metode MIC (<i>Minimum Inhibitory Concentration</i>) dan MBC (<i>Minimum Bactericidal Concentration</i>).		>65% dan MBC 80% dengan zona hambat sebesar >50%. Daun binahong mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, dan tanin	
10	Uji efektivitas antibakteri ekstrak daun binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis) terhadap isolat bakteri <i>Eschericia coli</i> jajan cilok secara in vitro dengan metode difusi (Fabel abima, dkk. 2017)	Ekstrak daun binahong	25%, 50%, dan 75%	<i>Eschericia coli</i>	Ekstraksi daun binahong menggunakan metode maserasi dengan pelarut aquades. Menggunakan metode pengujian difusi agar (<i>Kirby-Bauer</i>). Kemudian dilakukan uji <i>kruskal-wallis</i> . Selanjutnya dilakukan analisis <i>Post hoc</i>	kloramfenikol	Ekstrak daun binahong memiliki efek antibakteri terhadap bakteri <i>e.coli</i> . mengandung senyawa alkaloid, saponin, tanin, fenolik, flavonoid, dan steroid. Ekstrak daun binahong konsentrasi 75% adalah konsentrasi yang paling efektif sebagai antibakteri	-
11	Potensi perasan daun binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.)	Perasan daun binahong	60%, 80%, dan 100%	<i>Staphylococcus aureus</i> dan	Daun binahong dihaluskan dengan cara ditumbuk,	Iodip	Dari hasil penelitian diketahui bahwa perasan daun binahong	-

	<p><i>Steenis</i>) sebagai antibakterial pada kultur media bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>esherichia coli</i> penyebab mastitis klinis sapi perah (Pratiwi trisunuwati dan endang setyowati. 2017)</p>			<p><i>esherichia coli</i></p>	<p>selanjutnya diperas hingga menghasilkan perasan dengan konsentrasi 100%. Dilakukan uji daya hambat dengan konsentrasi 60%, 80%, dan 100% menggunakan media NA. Kemudian data dianalisis dengan metode anova</p>		<p>dapat dimanfaatkan sebagai alternatif antibakteri herbal pada kasus mastitis yang disebabkan oleh bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>esherichia coli</i>. Dari hasil uji daya hambat terhadap bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>esherichia coli</i> didapatkan konsentrasi optimal yaitu pada konsentrasi 100% dan memiliki daya hambat dengan kategori kuat (>6mm). Daun binahong mengandung senyawa flavono id, alkaloid, terpenoid, dan saponin</p>	
--	---	--	--	-------------------------------	--	--	---	--

12	<p>Analisis fenolik dan daya hambat daun binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis) terhadap bakteri <i>eschericia coli</i> dan <i>staphylococcus aureus</i> (Hasri, dkk. 2017)</p>	Daun binahong	7%, 7,5%, 8%, 8,5%, dan 9%	<i>eschericia coli</i> dan <i>staphylococcus aureus</i>	<p>Proses ekstraksi menggunakan metode maserasi, dengan pelarut etanol dan etil asetat. Dilakukan uji golongan, selanjutnya dilakukan analisis kadar fenolik. Pengujian aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi agar</p>	Media NA + etanol dan media Na + etil asetat	<p>Dari hasil penelitian diketahui bahwa daun binahong dapat menghambat bakteri <i>eschericia coli</i> dan <i>staphylococcus aureus</i>, mengandung senyawa Alkaloid, steroid, flavonoid, dan fenol. Hasil analisis kadar fenolik pada ekstrak etanol yaitu 28,43 mg GAE/g ekstrak. Pada ekstrak etil asetat 26,47 mg GAE/g ekstrak. Konsentrasi hambat minimum ekstrak etil asetat sebesar 7,5%. Konsentrasi hambat minimum ekstrak etanol sebesar 8%.</p>	-
----	---	---------------	----------------------------	---	--	--	---	---

13	Uji aktivitas antibakteri ekstrak daun binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis) terhadap pertumbuhan bakteri <i>staphylococcus aureus</i> dan <i>pseudomonas aeruginosa</i> (analisistyarsi dan nanda wahyu pribadi. 2018)	Ekstrak daun binahong	25%, 30%, 35%, 40%, 45%, dan 50%	<i>staphylococcus aureus</i> dan <i>pseudomonas aeruginosa</i>	Daun binahong diekstraksi dengan metode maserasi, dengan pelarut etanol 70%. Dilakukan uji konsentrasi daya hambat minimum (KHM) dan konsentrasi bunuh minimum (KBM) dengan melakukan penanaman bakteri pada media NA (<i>Nutrient Agar</i>) dan NB (<i>Nutrient broht</i>).	Menggunakan kontrol media dan kontrol bakteri	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun binahong memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan bakteri <i>staphylococcus aureus</i> dan <i>pseudomonas aeruginosa</i> , mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Pemberian ekstrak daun binahong dalam menurunkan jumlah koloni bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> adalah sebesar 80,5%. Sedangkan jumlah koloni bakteric <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	√
----	---	-----------------------	----------------------------------	--	--	---	---	---

							adalah sebesar 61,6%.	
14	Aktivitas antibakteri ekstrak daun binahong terhadap <i>propionibacterium acne</i> (indarto, dkk. 2019)	Ekstrak daun binahong	20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%	<i>propionibacterium acne</i>	Pembuatan ekstrak dengan metode maserasi dengan pelarut metanol dan etil asetat (1:1). Uji daya hambat antibakteri menggunakan medium NA. Dianalisis menggunakan ANOVA (<i>Analysis of Variance</i>).	klindamisin	Dari hasil penelitian diketahui bahwa ekstrak daun binahong dapat menghambat pertumbuhan bakteri <i>propionibacterium acne</i> , mengandung tanin, flavonoid, saponin, dan fenol. Konsentrasi optimal dalam menghambat bakteri <i>propionibacterium acne</i> yaitu pada konsentrasi 100%. Hasil analisis data menunjukkan perbedaan yang mencolok	√
15	Aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak daun kemangi dan	Ekstrak daun binahong	7%, 9%, dan 11%	<i>stertococcus mutans</i>	Proses ekstraksi dengan metode ekstraksi dengan pelarut etanol 70%, kemudian	Tetrasiklin	Dari hasil penelitian diketahui bahwa ekstrak daun binahong dapat menghambat	-

	daun binahong terhadap <i>stertococcus mutans</i> (isnaeni usman, dkk. 2019)				dilakukan skrining fitokimia. Pengujian aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi agar		pertumbuhan bakteri <i>stertococcus mutans</i> , mengandung senyawa alkaloid dan fenolik. Ekstrak etanol daun binahong memiliki aktivitas antibakteri dengan konsentrasi optimal pada konsentrasi 11%	
16	Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% daun binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis) terhadap bakteri <i>staphylococcus aureus</i> (I putugede A. P. H,dkk. 2020)	Ekstrak etanol daun binahong	4 gram ekstrak dilarutkan dalam 5 ml etanol. Dibuat 4 replikasi	<i>staphylococcus aureus</i>	Pembuatan ekstrak menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 70%. Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi agar dengan mengukur diameter zona hambat yang terbentuk	Kloramfenikol	Ekstrak etanol 70% daun binahong memiliki aktivitas antibakteri yang kuat terhadap bakteri <i>staphylococcus aureus</i> , mengandung senyawa fenol, flavonoid,alkaloid, dan saponin. Diameter zona hambat yang terbentuk sebesar $12,97 \pm 0,54$ mm	√

17	<i>Antibacterial activity of leaf extracts of (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) ans Muntingia calabura L. Against Streptococcus pneumoniae</i> (Nuke Annisa Nasution, dkk. 2020)	Ekstrak daun binahong	25%, 50%, 75%, dan 100%	<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619 dan <i>Streptococcus Pneumoniae</i> PU 067	Proses ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Pengujian efektivitas antibakteri menggunakan konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100%	Kloramfenikol 30 µg	Ekstrak daun binahong dapat menghambat pertumbuhan bakteri <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619 dan <i>Streptococcus Pneumoniae</i> PU 067, mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin. Hasil dari pengujian efektivitas antibakteri terhadap bakteri <i>S. Pneumoniae</i> ATCC 49619 didapatkan konsentrasi yang efektif pada konsentrasi 75%. Terhadap bakteri <i>S. Pneumoniae</i> PU 067 yaitu pada konsentrasi 100%	-
----	---	-----------------------	-------------------------	---	---	---------------------	--	---

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. *Tanaman binahong*

Binahong berasal dari kawasan kering Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brazil, dan Argentina selatan. Pada tahun 1800-an tanaman ini diperkenalkan oleh imigran Portugal hingga ke Amerika dan Inggris. Di Indonesia binahong banyak ditemukan di berbagai tempat dan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Daun binahong mengandung anti oksidan, asam askorbat, fenol, dan protein yang tinggi. Kandungan senyawa-senyawa inilah yang membuat daun binahong mampu menyembuhkan berbagai penyakit (astrid savitri, 2016).

Klasifikasi tanaman binahong (*Anredera cordifolia*(Ten.) Steenis) (Anwar dan tri, 2016)

Kingdom : Plantae
Sub kingdom : Trachcobionta
Superdivisio : Spermatophyta
Divisio : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Subkelas : Hamamelidae
Ordo : Caryophyllales
Familia : Basellaceae

Genus : *Anredera*

Spesies : *Anredera cordifolia* (Tenore.) Steenis.

Tanaman binahong tumbuh menjalar pada tanaman lain dan panjangnya bisa melebihi 5 m, serta berumur panjang. Batangnya lunak dan saling membelit, membentuk silindris, permukaan halus dan berwarna kemerahan (suparjo dkk, 2016).

Daunnya tunggal dan berwarna hijau, bertangkai pendek dan tersusun berselang seling. Daun berbentuk hati yang memiliki panjang 5-10 cm dan 3-7 cm. Helai daunnya tipis lemas dengan pangkal yang berlekuk, ujungnya runcing, permukaan licin dan bertepi rata. Bunga binahong bertangkai panjang yang muncul pada ketiak daun, bunga majemuk berbentuk tandan dengan jumlah 5 helai dan tidak berlekatan. Sedangkan mahkota bunga berwarna krem keputih-putihan dengan panjang helai mahkota 0,5-1 cm. Akar tanaman binahong berdaging lunak dan berbentuk rimpang. Tanaman binahong dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Banyak ditanam di dalam pot sebagai tanaman hias dan tanaman obat (suparjo dkk, 2016).

Pada penelitian sri murni astuti 2013 yang berjudul skrining fitokimia dan uji aktifitas antibiotika ekstrak etanol daun, batang, bunga, dan umbi tanaman binahong diketahui bahwa daun binahong mengandung senyawa kimia flavonoid, fenol, saponin, terpenoid, steroid, dan alkaloid.

Tanaman binahong mengandung senyawa fitokimia seperti saponin, fenol dan flavonoid yang bekerja sebagai antibiotik. Pada tanaman binahong kandungan metabolit sekunder yang tinggi adalah total saponin, total fenol, dan total flavonoid.

Kandungan senyawa ini mempunyai aktifitas sebagai antioksidan dan antimikroba/antibiotik, sehingga binahong sangat baik digunakan sebagai bahan baku untuk obat tradisional. Steroid dari saponin dapat digunakan sebagai preparat hormon seksual, kortikosteroid, dan derivat dari steroid. Saponin pada akar tanaman dapat digunakan sebagai obat generik yang dapat mengobati penyakit diabetes. Fenol termasuk flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan dan dapat menghambat mikroba atau sebagai antibiotik (sri murni astuti, 2013).

4. 2. Kandungan senyawa binahong

Flavonoid merupakan metabolit sekunder polifenol, banyak ditemukan pada tanaman dan makanan, dan memiliki banyak efek bioaktif seperti antivirus, antiinflamasi, antidiabetes, anti tumor, anti penuaan, antioksidan, antibakteri, dll. Flavonoid ditemukan di semua ekstrak tumbuhan. Flavonoid merupakan kelompok senyawa yang banyak ditemukan di alam. Flavonoid ditemukan pada tanaman yang membantu menghasilkan pigmen kuning, merah, oranye, biru, dan ungu pada buah-buahan, bunga, dan daun. Flavonoid termasuk dalam family polifenol yang larut dalam air. Mekanisme kerja senyawa flavonoid dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara merusak membran sel bakteri dan membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan larut yang menyebabkan kematian dan pelepasan senyawa intraseluler. Sitoplasma semua sel hidup dikelilingi oleh membran sitoplasma yang secara selektif bertindak sebagai penghalang permeabel, melakukan fungsi transpor aktif dan dengan demikian mengontrol komposisi internal sel. Ketika integrasi

fungsional membran sel terganggu, makromolekul dan ion meninggalkan sel, rusak atau mati (Simanjuntak *et.al*, 2020; Anggita *et.al*, 2015).

Flavonoid termasuk pigmen kuning alami hingga tidak berwarna yang larut dalam air dan tahan panas. Menurut Retnowati *et al* (2011) flavonoid biasanya disintesis oleh tanaman sebagai responnya terhadap infeksi mikroba. Mekanisme aksi antibakteri terdiri dari pembentukan kompleks dengan protein ekstraseluler dan melarutkannya pada tingkat dinding mikroba. Kemungkinan lain adalah bahwa flavonoid berperan langsung dalam mengganggu fungsi sel mikroba dan menghambat siklus sel mikroba.

Alkaloid adalah sekelompok senyawa organik yang ditemukan terutama di alam. Hampir semua alkaloid berasal dari tumbuhan dan tersebar luas pada tumbuhan tingkat tinggi. Kebanyakan alkaloid ditemukan pada tumbuhan dikotil, tetapi tumbuhan monokotil dan pterofita mengandung sejumlah kecil sulcaroid. Alkaloid adalah senyawa basa yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen dan biasanya bersifat siklik. Alkaloid mengandung atom karbon, hidrogen dan nitrogen, seringkali oksigen. Senyawa alkaloid banyak terdapat pada akar, biji, tumbuhan dan daun hewan dan tumbuhan. Alkaloid merupakan hasil metabolisme tumbuhan dan digunakan sebagai cadangan untuk sintesis protein. Kegunaan alkaloid pada tanaman, perangsang dan pengatur hormon terhadap serangan hama. Alkaloid memiliki efek fisiologis. Alkaloid merupakan kelompok terbesar zat tumbuhan sekunder dengan aktivitas antibakteri. Alkaloid mengganggu komponen struktural peptidoglikan dalam sel bakteri,

menyebabkan pembentukan dinding sel yang tidak lengkap dan kematian sel (Anggita *et.al*; 2015).

Saponin adalah glikosida yang larut dalam air dan etanol, tetapi tidak larut dalam eter. Karena saponin berperan sebagai agen antibakteri dan menyebabkan penyakit bakteri, maka mekanisme saponin yang termasuk dalam golongan antibakteri adalah dengan mencegah permeabilitas membran sel bakteri sehingga menyebabkan kerusakan pada membran sel dan komponen penting lainnya, seperti protein, asam nukleat, dan nukleotida (Darsana, 2012).

Mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri adalah tanin dapat menginduksi lisis dinding sel bakteri dan pelepasan AKP (Alkaline Phosphate) peningkatan konsentrasi saponin membuat protein larut dan menyebabkan intraseluler berdifusi melalui membran luar yang menyebabkan dinding sel dan sitoplasma keluar dari sel sehingga terjadi kematian sel (Simanjuntak *et.al*; 2020).

Terpenoid tanaman umumnya digunakan sebagai senyawa aromatik yang menyebabkan bau kayu putih, aroma kayu manis, cengkeh, dan jahe, serta memberi warna kuning pada bunga. Terpenoid tanaman memiliki keunggulan penting dalam pengobatan tradisional. Antibakteri, antijamur dan masalah kesehatan lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa terpenoid dapat menghambat pertumbuhan sengan mengganggu dinding sel dan/atau pembentukan membran. Membran atau dinding sel tidak terbentuk atau tidak terbentuk sempurna (Darsana, 2012).

Mekanisme terpenoid sebagai agen antibakteri adalah reaksi dengan porin (protein transmembran). ini membentuk ikatan makromolekul yang kuat pada membran luar dinding sel bakteri, yang menyebabkan penghancuran porin. Kerusakan porin adalah invasi senyawa mengurangi permeabilitas dinding sel dan defisiensi nutrisi, menghambat pertumbuhan bakteri atau kematian (Simanjuntak *et.al*; 2020).

Tabel 5. Kandungan senyawa

No	Nama Peneliti	Kandungan senyawa			
		Flavonoid	Alkaloid	Saponin	Terpenoid
1.	I gede oka darsana, dkk. 2012	√	√	√	√
2.	Lilies kusuma wardhani dan nanik sulistyani. 2012			√	
3.	Anis ainurrochmah, dkk. 2013			√	
4.	Sutrisno, dkk. 2014	√		√	√
5.	Dewi peti virgianti dan dia maulani purwanti. 2015	√		√	
6.	Beta kurniawan dan wayan ferly aryana. 2015	√	√	√	√
7.	Ratih dewi dwiyanti, dkk. 2015	√	√	√	
8.	Gde raka angga kartika, dkk. 2016	√	√	√	√
9.	Vivian wijaya, dkk. 2017	√	√		
10.	Fadel abima, dkk. 2017	√	√	√	
11.	Pratiwi trisunuwati dan endang setyowati. 2017	√	√	√	√
12.	Hasri, dkk. 2017	√	√		

13.	Ani sulistyarsi dan nanda wahyu pribadi. 2018	√	√		
14.	Indarto, dkk. 2019	√		√	
15.	Isnaeni usman, dkk. 2019		√		
16.	I putu gede a.p.h, dkk. 2020	√	√	√	
17.	Nuke annisa nasution, dkk. 2020	√	√	√	

4.3 Ekstraksi

Ekstraksi adalah teknik pemisahan kimia untuk memisahkan atau memperoleh kembali satu atau lebih komponen suatu senyawa (analit) dari suatu sampel dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai. Ekstraksi bertujuan untuk menarik komponen kimia yang ada dalam komponen alami (Leba. 2017).

Prinsip ekstraksi adalah pelarut masuk ke dalam sel, melarutkan senyawa aktif yang ada dalam sel sampel dan menyebabkan perbedaan konsentrasi senyawa terlarut di dalam dan di luar sel. Pelarut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi. Pelarut diklasifikasikan menjadi tiga jenis, polar (seperti asam asetat dan etanol), semi polar (seperti aseton dan DMSO) dan non polar (seperti heksana dan toluene), Tergantung pada sifat polaritasnya. Disisi lain pelarut diklasifikasikan menjadi lima kategori berdasarkan fungsinya: true solvent, diluent, latent, paint remover dan media reaksi (Nasyanka, dkk. 2020).

Kategori metode ekstraksi sangat beragam, salah satunya dapat dibagi menjadi metode ekstraksi berdasarkan suhu, antara lain sebagai berikut:

a. Cara dingin

1. Maserasi

Maserasi adalah salah satu jenis ekstraksi padat cair yang paling sederhana. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara merendam sampel pada suhu kamar menggunakan pelarut yang sesuai sehingga dapat melarutkan analit dalam sampel. Sampel direndam selama 3-5 hari sambil di aduk sesekali untuk mempercepat proses pelarutan analit. Ekstraksi dilakukan berulang kali sehingga analit terekstraksi secara sempurna. Indikasi bahwa semua analit telah terekstraksi secara sempurna adalah pelarut yang digunakan sudah tidak berwarna (Leba. 2017).

2. Perkolasi

Perkolasi adalah jenis ekstraksi yang dilakukan dengan cara mengalirkan pelarut secara perlahan pada sampel dalam suatu percolator. Pada ekstraksi jenis ini, pelarut ditambahkan secara terus-menerus, sehingga proses ekstraksi selalu dilakukan dengan pelarut yang baru. Pola penambahan pelarut yang dilakukan adalah menggunakan pola penetesan pelarut dari bejana terpisah disesuaikan dengan jumlah pelarut yang keluar atau dilakukan dengan penambahan pelarut dalam jumlah besar secara berkala (Leba. 2017).

b. Cara panas

1. Refluks

Ekstraksi refluks adalah metode yang umum digunakan untuk mendapatkan senyawa pada tanaman dengan penguapan suhu tinggi (Vifta, 2017). Mekanisme ekstraksi refluks adalah pelarut yang digunakan menguap pada suhu yang digunakan, tetapi karena didinginkan dalam kondensor, pelarut dalam bentuk uap mengembun di

kondensor dan kembali ke kondensor bejana reaksi. Selama reaksi, pelarut tetap ada (Utami, dkk. 2020).

2. Sokletasi

Sokletasi merupakan salah satu jenis ekstraksi yang menggunakan alat soklet. Pada ekstraksi ini pelarut dan sampel ditempatkan secara terpisah. Prinsipnya adalah ekstraksi dilakukan secara terus menerus menggunakan pelarut yang relatif sedikit. Bila ekstraksi telah selesai maka pelarut dapat diuapkan sehingga akan diperoleh ekstrak. Biasanya pelarut yang digunakan adalah pelarut-pelarut yang mudah menguap atau mempunyai titik didih yang rendah (Leba. 2017).

3. Digesti

Digesti adalah metode ekstraksi pengadukan terus menerus pada suhu diatas suhu kamar, yaitu 40-50°C (Hasrianti, dkk. 2016).

4. Infus

Infus adalah metode ekstraksi menggunakan pelarut air selama 15 menit pada suhu penangas air (merendam wadah infus dalam panci berisi air mendidih dan mengukur suhu pada 90°C) (Hasrianti, dkk. 2016).

5. Dekok

Dekok berupa ekstraksi air pada suhu 90°C selama 30 menit (Hasrianti, dkk. 2016).

4. 4 Pembahasan artikel

Penelitian yang dilakukan Usman, Isnaeni *et al.* 2019 dalam media farmasi yang bertujuan untuk mengetahui senyawa yang terdapat pada ekstrak daun binahong dan aktivitas antibakteri terhadap bakteri *streptococcus mutans* dengan variasi konsentrasi 7%, 9%, dan 11%. Setelah dilakukan skrining fitokimia ekstrak daun binahong mengandung senyawa alkaloid dan fenolik dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti, Ratih D *et al.* 2015 dalam medical laboratory technology journal yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas air rebusan daun binahong terhadap pertumbuhan bakteri *salmonella typhi* dengan menggunakan metode difusi (sumuran) dan 5 perlakuan konsentrasi yaitu 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Hasil penelitian yang didapatkan diketahui bahwa air rebusan daun binahong dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 100%, tetapi zona hambat yang terbentuk masih dalam kategori resisten. Hal yang dapat mempengaruhi hasil antara lain keadaan lingkungan saat proses pengolahan sampel seperti panas, sinar matahari, dan oksigen sehingga dapat mengurai zat aktif sehingga kadarnya dapat berkurang. Kemudian suhu tinggi dan lamanya perebusan dapat merusak dan menguapkan zat aktif yang terlarut dalam air.

Penelitian yang dilakukan oleh Ainurrochmah, Anis *et al.* 2013 yang bertujuan untuk mengetahui konsentrasi optimal yang dapat menghambat bakteri *shigella flexneri* dengan menggunakan ekstrak daun binahong. Konsentrasi yang digunakan 40%, 60%,

80%, dan 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi optimal yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri yaitu konsentrasi 100% dengan rata-rata diameter zona hambat sebesar 27,2 mm.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika, Gde R A *et al.* 2016 dalam *Journal of Marine and Aquatic Sciences* yang bertujuan untuk mengetahui potensi ekstrak daun binahong sebagai penghambat bakteri *Vibrio harveyi*. Konsentrasi yang digunakan adalah 3%, 5%, 7%, 9%, 11%, dan 13%. Hasil uji *Minimum Inhibitory Concentration* (MIC) diperoleh pada konsentrasi 3% yang ditunjukkan dengan hasil biakan pada tabung reaksi tampak jernih. Hasil uji *Minimum Bactericidal Concentration* (MBC) menunjukkan bahwa ekstrak daun binahong dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Vibrio harveyi*. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa daun binahong memiliki potensi sebagai penghambat bakteri *Vibrio harveyi* dengan konsentrasi terbaik yaitu 13% dengan diameter rata-rata sebesar 10,3 mm.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasri *et al.* 2017 yang bertujuan menganalisis kandungan fenolik dan mengetahui daya hambat ekstrak daun binahong terhadap bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. Daun binahong diekstraksi menggunakan pelarut etanol dan etil asetat yang selanjutnya dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis sehingga didapatkan hasil kadar fenolik pada ekstrak etanol sebesar 28,43 mg GAE/g dan ekstrak etil asetat sebesar 26,47 mg GAE/g. Pengujian aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi agar dengan konsentrasi 7%; 7,5%; 8%; 8,5%; dan 9%. Berdasarkan hasil pengujian dimana konsentrasi hambat minimum

(KHM) ekstrak etil asetat terhadap bakteri *e.coli* diperoleh pada konsentrasi 7,5% sedangkan pada ekstrak etanol diperoleh pada konsentrasi 8,5%. KHM ekstrak etanol terhadap bakteri *s.aureus* diperoleh pada konsentrasi 8% sedangkan ekstrak etil asetat diperoleh pada konsentrasi 9,5%.

Penelitian yang dilakukan oleh Darsana, I Gede O *et al.* 2012 dalam jurnal indonesia medicus veterinus yang bertujuan untuk mengetahui potensi daun binahong dalam menghambat pertumbuhan bakteri *E.coli* secara *in vitro*. Dilakukan dengan cara mengukur diameter daya hambat yang terbentuk menggunakan konsentrasi 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%, kemudian diuji dengan analisis deskriptif, analisis ragam, dan uji duncan. Selanjutnya pengolahan data menggunakan program SPSS. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perasan daun binahong dapat menghambat bakteri *E.coli* dengan rata-rata diameter terbesar terjadi pada konsentrasi 100% sebesar 12.325 mm. Hasil uji analisis ragam dinyatakan bahwa perasan daun binahong memberikan pengaruh yang sangat nyata dengan hasil signifikan 0,00 ($P < 0,01$). Dari hasil SPSS menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi perasan daun binahong maka semakin tinggi pula diameter daya hambat yang terbentuk terhadap pertumbuhan bakteri *E.coli*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution, Nuke A *et al.* 2020 yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri daun binahong terhadap bakteri *streptococcus pneumonia ATTC 49619* dan isolat klinis *streptococcus pneumoniae PU 067* menggunakan metode difusi dengan konsentrasi ekstrak 25%, 50%, 75%, dan 100%.

Hasil yang didapatkan diameter zona hambat yang paling efektif terhadap bakteri *streptococcus pneumonia ATTC 49619* yaitu pada konsentrasi 75% (14,0 mm) dan pada bakteri *streptococcus pneumoniae PU 067* yaitu pada konsentrasi 100% (14,0 mm).

Penelitian yang dilakukan oleh Indarto *et al.* 2019 yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak daun binahong terhadap bakteri *propionibacterium acnes*. Konsentrasi yang digunakan 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% dengan kontrol positif menggunakan klindamisin dan kontrol negatif menggunakan aquades, pengamatan dilakukan setiap 24 jam selama 2 hari, kemudian analisis data menggunakan ANOVA. Hasil yang didapatkan diketahui bahwa ekstrak daun binahong dapat menghambat bakteri *propionibacterium acnes* yang ditunjukkan dengan adanya zona hambat yang terbentuk dan konsentrasi yang paling efektif yaitu pada konsentrasi 100% sebesar 9,00 mm pada waktu 24 jam, pada waktu 48 jam konsentrasi yang paling efektif yaitu konsentrasi 100% sebesar 11,20 mm. Hasil analisis data menggunakan ANOVA pada tiap konsentrasi menunjukkan perbedaan yang mencolok. Dari hasil yang didapatkan diketahui bahwa uji efektifitas ekstrak daun binahong dipengaruhi oleh waktu, semakin lama waktunya maka zona hambat yang terbentuk semakin besar dan semakin tinggi konsentrasi maka semakin besar pula zona hambat yang terbentuk.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyarsi, Ani & Pribadi, Nanda W. 2018 yang bertujuan untuk mengetahui aktifitas antibakteri dari ekstrak daun binahong terhadap

pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*. Konsentrasi ekstrak yang digunakan yaitu 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, dan 50% kemudian data dianalisis menggunakan uji oneway ANOVA. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka jumlah koloni bakteri akan semakin rendah. Penambahan ekstrak daun binahong dalam menurunkan jumlah koloni bakteri *Staphylococcus aureus* sebesar 80,5% sedangkan pada bakteri *Pseudomonas aeruginosa* sebesar 61,6%.

Penelitian yang dilakukan oleh Trisunuwati, Pratiwi & Setyowati, Endang. 2017 yang bertujuan untuk mengetahui antibakteri daun binahong terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Eschericia coli* penyebab mastitis klinis penyebab mastitis sapi perah dengan uji daya hambat dan dianalisis menggunakan ANOVA yang dilanjutkan dengan MDRS. Pada uji daya hambat konsentrasi paling efektif dalam menghambat bakteri *Staphylococcus aureus* yaitu pada konsentrasi 100% sebesar 9,72 mm dan pada bakteri *Eschericia coli* yaitu pada konsentrasi 100% sebesar 9,15 mm. Diameter zona hambat pada setiap perlakuan memiliki perbedaan yang sangat nyata ($p,0,01$) terhadap pertumbuhan bakteri. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi yang digunakan maka semakin besar pula zona hambat yang terbentuk dan perasan daun binahong dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri *Staphylococcus aureus* dan *Eschericia coli* pada kasus mastitis sapi perah.

Penelitian yang dilakukan oleh Virgianti, Dewi P & Dian M P. 2015 yang bertujuan untuk mengetahui daya hambat ekstrak etanol daun binahong terhadap

pertumbuhan bakteri *streptococcus pyogenes* menggunakan metode kirby-bauer dengan konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, dan 100% dan diamati 24 jam selama 2 hari. Konsentrasi paling efektif ditunjukkan pada konsentrasi 100% dengan hasil rata-rata zona hambat sebesar 15,15 mm sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi maka semakin besar pula zona hambat yang terbentuk.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani, Lilies S & Nanik sulistyani. 2012 yang bertujuan untuk mengetahui kandungan kimia yang terdapat dalam ekstrak etil asetat daun binahong dan aktivitas antibakterinya serta kadar bunuh minimum (KBM) terhadap bakteri *shigella flexneri*. Konsentrasi ekstrak yang digunakan yaitu 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, 7%, 7,5%, 8%, dan 8,5%.^{b/v}. Hasil skrining fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat daun binahong mengandung polifenol dan saponin. Pada uji KBM konsentrasi 8%^{b/v} dapat membunuh koloni bakteri.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, vivivan *et al.* 2017 yang bertujuan untuk mengetahui efek antibakteri dari infus daun binahong terhadap bakteri berpigmen hitam secara *in vitro* serta kadar hambat minimum (KHM) dan kadar bunuh minimum (KBM). Konsentrasi ekstrak yang digunakan 50%, 65%, 80%, 95%, dan 100% , kontrol positif yang digunakan klorhexidin 0,2 dan kontrol negatif yaitu aquades. Hasil yang didapatkan pada uji KHM yaitu lebih dari 65% dan KBM pada konsentrasi 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan maka semakin besar pula zona hambat yang terbentuk.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, Beta & Wayan Ferly A. 2015 yang bertujuan untuk mengetahui daya hambat daun binahong terhadap pertumbuhan bakteri *E.coli* dengan metode uji difusi dan konsentrasi yang digunakan 50 ppm, 100 ppm, 500 ppm, 1000 ppm, dan 2000 ppm. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa diameter hambat terbesar yaitu pada konsentrasi 2000 ppm sebesar 9 mm. Kandungan daun binahong yang berperan sebagai antibakteri yaitu flavonoid, minyak atsiri, saponin, terpenoid, dan alkaloid dengan mekanisme kerja merusak permeabilitas dinding sel bakteri

Penelitian yang dilakukan oleh Ita, Iputugap *et al.* 2020 yang bertujuan untuk mengetahui aktifitas antibakteri ekstrak etanol daun binahong terhadap bakteri *staphylococcus aureus* dengan menggunakan metode difusi cakram dan dilakukan replikasi sebanyak 4 kali. Hasil rata-rata diameter zona hambat yang terbentuk yaitu sebesar 12,97 mm, berdasarkan kriteria kekuatan aktifitas antibakteri daun binahong memiliki aktifitas antibakteri yang kuat

Penelitian yang dilakukan oleh Abima, Fadel *et al.* 2017 yang bertujuan untuk mengetahui aktifitas antibakteri ekstrak daun binahong terhadap bakteri *E.coli* secara *in vitro* dengan menggunakan metode difusi agar selanjutnya diuji menggunakan uji *kruskal-wallis*, kemudian dianalisis dengan analisis *post hoc*. Konsentrasi ekstrak yang digunakan yaitu 25%, 50%, dan 75%. Hasil yang didapatkan rata-rata zona hambat yang terbentuk pada konsentrasi 25% yaitu sebesar 11,86 mm, pada konsentrasi 50% yaitu 13,75 mm, pada konsentrasi 75% yaitu 15,41. Hasil uji *kruskal-wallis*

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas ekstrak daun binahong terhadap bakteri ($p < 0,05$). Hasil analisis *post hoc* menunjukkan perbedaan yang bermakna dari setiap konsentrasi dengan nilai signifikansi $p < 0,001$.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno E. 2014 yang bertujuan untuk mengetahui aktifitas antibakteri daun binahong terhadap bakteri *staphylococcus aureus* dan *pseudomonas aeruginosa* pada pasien luka kaki diabetes dengan menentukan konsentrasi hambat minimum (KHM) dan konsentrasi bunuh minimum (KBM) dan dilakukan skrining fitokimia. Dari hasil skrining fitokimia didapatkan bahwa daun binahong mengandung flavonoid, saponin, tanin, fenol, dan steroid. Konsentrasi ekstrak yang digunakan terhadap bakteri *staphylococcus aureus* yaitu 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm dan didapatkan hasil konsentrasi yang paling efektif yaitu 1000 ppm dengan diameter daya hambat sebesar 12,42 mm. Konsentrasi yang digunakan terhadap bakteri *pseudomonas aeruginosa* yaitu 500 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, 3000 ppm, 4000 ppm, dan 5000 ppm dan didapatkan hasil konsentrasi yang paling efektif yaitu pada konsentrasi 5000 ppm sebesar 11,45 mm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daun binahong memiliki aktifitas sebagai bakteristatik dan bakterisid terhadap bakteri *staphylococcus aureus* dan *pseudomonas aeruginosa* pada pasien luka kaki diabetes.

Berdasarkan literatur diatas daun binahong mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, saponin, dan terpenoid yang tidak hanya berfungsi sebagai antibakteri tetapi dapat juga berfungsi sebagai anti inflamasi, antivirus, kardioprotektif, anti diabetes,

anti kanker, dan antioksidan. Pada beberapa jurnal yang telah dibahas ekstrak daun binahong memiliki daya hambat yang termasuk dalam kategori kuat menurut Pan, 2009 dengan nilai diameter daya hambat >6 mm.

4.5 Antibakteri

Bakteri adalah mikroorganisme prokariotik yang dapat memberikan efek positif bagi kesehatan sebagai flora normal, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif dengan menyebabkan penyakit atau bersifat patogen (Kumar dan Chordia, 2017). Pengendalian dan pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dapat dilakukan melalui pengobatan. Sebagian besar obat yang digunakan untuk mengendalikan/membunuh patogen yang menginfeksi manusia adalah antibiotik sintetik, yang beresiko menyebabkan resistensi obat, menyebabkan kegagalan pengobatan dan infeksi jangka panjang pada pasien (Utami, 2011). Ketika mempertimbangkan risiko resistensi antibiotik sintesis terhadap patogen, kita perlu mencari solusi untuk menemukan alternatif yang aman, terjangkau, mudah ditemukan dan lebih baik, seperti obat baru untuk menggantikan antibiotik sintesis. Senyawa antibakteri tersebut dapat diperoleh dari mikroorganisme, tumbuhan dan hewan. Karena Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati, maka peluang untuk mendapatkan bahan antibakteri alami di Indonesia sangat besar (Setiawan et al., 2014).

Agen antibakteri adalah senyawa yang digunakan untuk mengendalikan bakteri. antibiotik biasanya terdapat di dalam tubuh sebagai metabolit sekunder.

Mekanisme senyawa antibakteri biasanya dicapai dengan merusak dinding sel, mengubah permeabilitas membran, mengganggu sintesis protein, dan menghambat kerja enzim (pelczar dan chan, 2008). Senyawa yang terlibat dalam kerusakan dinding sel antara lain fenol, flavonoid, dan alkaloid. Fitokimia tersebut berpotensi sebagai antibakteri alami terhadap patogen seperti *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*.

Zat antibakteri adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan bahkan membunuh bakteri dengan cara menghalangi metabolisme mikroorganisme yang berbahaya bagi manusia. Obat yang digunakan untuk membunuh patogen manusia harus memiliki toksisitas selektif. Berdasarkan sifat toksisitas selektif, agen antibakteri dapat dibagi menjadi dua kategori: bakterisida dan bakteriostatik. Fungisida membunuh bakteri, tetapi agen bakteriostatik dapat menekan pertumbuhan bakteri, tetapi tidak membunuh bakteri (Ganiswarna, 1995). Kadar minimal yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau membunuh disebut sebagai kadar hambat minimum (KHM) dan kadar bunuh minimum (KBM). Antimikroba tertentu aktivitasnya dapat meningkat dari bakteriostatik menjadi bakterisid bila kadar antimikrobanya ditingkatkan melebihi KHM (Ganiswarna, 1995). Mekanisme kerja dari senyawa antibakteri yaitu menghambat sintesis dinding sel bakteri, menghambat keutuhan permeabilitas dinding sel bakteri, menghambat kerja enzim dan menghambat sintesis asam nukleat dan protein (Dwidjoseputro, 1980). Resistensi sel mikroba ialah suatu sifat tidak terganggunya sel mikroba oleh antimikroba (Setiabudy dan Gan,

1995). Resistensi mikroba terhadap obat terjadi akibat perubahan genetik dan dilanjutkan serangkaian proses seleksi oleh antimikroba. Faktor yang mempengaruhi sifat resistensi mikroba terhadap antimikroba terdapat pada unsur yang bersifat genetik seperti DNA, plasmid dan kromosom (Jawetz, 2001). Resistensi alami tanaman terhadap mikroorganisme telah menyebabkan pengembangan berbagai macam senyawa yang berasal dari tanaman dengan sifat antibakteri dan antijamur (Griffin, 1981).

Daun binahong sebagai antibakteri dapat menghambat bakteri *escherichia coli*, *propionibacterium acne*, *pseudomonas aeruginosa*, *salmonella thypi*, *shigella flexneri*, *staphylococcus aureus*, *streptococcus mutans*, *streptococcus penumoniae*, *streptococcus pyogenes*, *vibrio harveyi*.

Bakteri *Escherichia coli* biasanya terdapat pada saluran cerna bagian bawah dan dapat berubah menjadi patogen pertumbuhan bakteri dalam tubuh yang melebihi batas normal, akibat fluktuasi makanan dan perubahan lingkungan dari panas ke dingin (hujan) atau sebaliknya. Efek yang muncul pada pasien adalah penurunan berat badan dan kondisi fisik, pertumbuhan yang lambat, yang dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. *Escherichia coli* dapat menyebar melalui debu yang terkontaminasi atau melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan feses (Darsana, 2012).

Escherichia coli merupakan bakteri batang gram-negatif berbentuk batang, tidak membentuk spora, motil berbentuk flagel peritrik, berdiameter $\pm 1,1 - 1,5 \mu\text{m}$ x $0,2 - 0,6 \mu\text{m}$. *E. coli* dapat bertahan hidup di lingkungan sederhana yang

menghasilkan gas dan asam dari glukosa dan memfermentasi laktosa. Pergerakan bakteri ini motil, tidak motil, dan peritrikus, ada yang bersifat aerobik dan anaerobik fakultatif (Elfidasari dkk. 2011).

Propionibacterium acnes adalah bakteri gram-positif dengan bentuk dan panjang sel punca bervariasi dari 1-1,5 μm , nonmotil, tidak membentuk spora dan dapat tumbuh di udara dan memerlukan oksigen mulai dari aerob atau anaerob fakultatif sampai ke anaerob. Bakteri ini dapat memfermentasi glukosa untuk menghasilkan asam propionat dan asetat dalam jumlah yang banyak (Narulita, 2017).

Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* memiliki ciri-ciri sebagai berikut, gram negatif, berbentuk batang (rods) atau kokus (coccus), aerob obligat, motil mempunyai flagel polar. Bakteri ini, oksidase positif, katalase positif, nonfermenter dan tumbuh dengan baik pada suhu 4°C atau dibawah 43°C. *Pseudomonas* ditemukan pada tanah, tanaman dan air (yoyon dan farid, 2015).

Bakteri *Salmonella typhi* adalah berbentuk batang, tidak berspora, ukuran 103,5 μm x 0,5-0,8 μm , besarnya koloni rata-rata 2-4 mm, memiliki flagela peritrikh. Bakteri ini memfermentasikan glukosa dan manosa tanpa membentuk gas tetapi tidak memfermentasikan laktosa dan sukrosa (Jawetz et al., 2006). *Salmonellatyphi* yang diisolasi pada media SSA (salmonella dan shigella agar) ketika suhu 37°C menunjukkan penampakan cembung, transparan dan memiliki bercak hitam dibagian pusat (Nugraha,2012). Bakteri *Salmonellatyphi* akan mati pada suhu 60°C selama 15 – 20 menit melalui pasteurisasi, pendidihan dan khlorinasi (lestari dan hendrayana, 2017).

Shigella sp merupakan bakteri berbentuk batang dengan pengecatan gram bersifat gram negatif, dapat tumbuh baik pada suasana aerob dan fakultatif anaerob, tidak dapat bergerak, kuman ini patogen pada pencernaan. Termasuk dalam (famili) enterobacteriacee genus *Shigella*. *Shigella sp* dibagi menjadi 4 spesies yaitu: *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*, *shigella boydii*, dan *shigella sonnei*. *Shigella sp* merupakan kuman kecil berbentuk batang dengan pengecatan gram bersifat negatif ramping dengan ukuran $0,5 - 0,7 \mu\text{m} \times 2 - 3 \mu\text{m}$, tidak mempunyai flagel sehingga tidak dapat bergerak dan tidak berspora. Pada suhu 37°C dapat tumbuh dengan cepat pada media Mac Conkey, SSA, EMBA, dan Endo. Tampak koloni kecil dan transparan tidak dapat meragikan laktosa kecuali pada *Shigella sonnei* bersifat laktosa fermenter lambat (Karsinah, 2011).

Shigella flexneri merupakan bakteri gram negatif, *nonmotile*, dan berbentuk batang. *Shigella flexneri* dapat menyebabkan shigellosis (disentri basiler) dengan cara menginvasi epitel usus besar. Bakteri *Shigella flexneri* mampu menyerang dan memecah sel-sel epitel serta makrofag dan sel dendritik kemudian masuk ke sitosol. Bakteri ini umumnya ditemukan dalam air yang tercemar oleh kotoran manusia kemudian ditransmisikan ke dalam air atau makanan yang terkontaminasi dan melalui kontak antar manusia. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Shigella sp* dapat disembuhkan dengan menggunakan antibiotik, tetapi menggunakan antibiotik yang berlebihan menyebabkan bakteri menjadi resisten (Anis ainurrochmah dkk, 2013).

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram-positif yang berdiameter $0,5-1,5 \mu$, tidak membentuk spora dan tidak bergerak. Pada media biakan, bakteri ini

berbentuk bulat yang terlihat tunggal, berkelompok atau bankan dapat tersusun seperti rantai . Beberapa strain dari bakteri ini memiliki kapsul (Jawetz, 2013). *Staphylococcus aureus* merupakan salah satu bakteri penyebab infeksi tersering di dunia. Tingkat keparahan infeksi pun bervariasi, mulai dari infeksi minor di kulit (furunkulosis dan impetigo), infeksi traktus urinarius, infeksi trakrus respiratorius, sampai infeksi pada mata dan Central Nervous System (CNS) (DeLeo et al , 2010). Menurut Kusuma (2010), *Escherichia coli* merupakan bakteri yang bersifat patogen pada manusia ini menyebabkan gangguan pencernaan pada manusia serta mengganggu sistem kerja dari organ lambung. Bakteri ini juga sebagai penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas diseluruh dunia.

Streptococcus mutans merupakan bakteri anaerob fakultatif gram-positif berbentuk bulat yang khas membentuk pasangan atau rantai selama masa pertumbuhannya. Bakteri ini anggota flora normal yang paling banyak ditemukan napas atas dan penting untuk menjaga kesehatan membrane mukosa. Streptococcus mutans biasanya ditemukan pada rongga mulut manusia, dan memegang peranan terhadap terjadinya kerusakan gigi. Kerusakan gigi dapat berpengaruh pada kesehatan secara keseluruhan individu Streptococcus mutans merupakan bakteri kokus tunggal berbentuk bulat atau bulat telur dan tersusun dalam rantai. Rantai – rantai Streptococcus mutans tampak sebagai diplokokkus dan bentuknya kadang – kadang menyerupai batang (Nuzulia P, 2017).

Streptococcus pneumoniae adalah Gram positif, berbentuk bulat telur atau seperti bola, penghuni normal dari saluran pernapasan bagian atas manusia dan dapat menyebabkan pneumonia, sinusitis, otitis, bronkhitis, bakteremia, meningitis, dan proses infeksi lainnya. Serangan *Pneumonia pneumococcus* biasanya mendadak demam, menggigil, dan nyeri pleura yang nyata. Pada awal penyakit, ketika demam tinggi, terdapat bakteremia dalam 10-20% kasus. *Pneumonia* yang disertai bakteremia selalu menyebabkan angka kematian yang paling tinggi. Penggunaan terapi antimikroba, penyakit dapat sembuh secara bertahap, bila diberikan dari awal, maka konsolidasi dapat dihalangi (Jawetz dkk., 2013).

Streptococcus pyogenes adalah bakteri Gram-positif, bersifat anaerobfakultatif, katalase-negatif, tidak motile, dan tidak memiliki spora. *Streptococcus pyogenes* berbentuk kokus, berdiameter 0.6-1.0 μm , dan tersusun berpasangan atau berderet seperti rantai dengan panjang yang bervariasi. Metabolisme dari *Streptococcus pyogenes* bersifat fermentatif dan membutuhkan media yang mengandung banyak darah untuk pertumbuhannya. *Streptococcus pyogenes* tumbuh baik pada pH 7.4-7.6 dan suhu optimum 37 $^{\circ}\text{C}$ (Mudatsir, 2010). Bakteri ini memiliki kapsul yang mengandung asam hialuronat dan tergolong β -haemolytic karena dapat melisis eritrosit secara sempurna (Patterson, 2018).

Bakteri *V. harveyi* adalah bakteri gram negatif berbentuk batang dengan ukuran (1,0-1,6 x 0,5-0,7 μm), fermentatif dan memiliki flagel lateral pada salah satu ujung polarnya (Ramesh et al., 2014). Bakteri ini mempunyai ciri-ciri koloni berwarna putih

sampai hijau pada media Thiosulphate Citrate Bile Salt (TCBS), dengan diameter 15-17 mm dan pada pusat koloni berwarna hijau tua. Karakteristik lain bakteri *V. harveyi* adalah bersifat patogen oportunistik, yaitu organisme yang dalam keadaan normal ada di lingkungan pemeliharaan yang berkembang menjadi patogen apabila kondisi lingkungan dan inangnya memburuk (Widanarni et al., 2012).

Tabel 6. Bakteri yang dapat dihambat oleh tanaman binahong

No.	Nama peneliti	Jenis bakteri
1.	I gede oka darsana, dkk. 2012	<i>Eschericia coli</i>
2.	Lilies kusuma wardhani dan nanik sulistyani. 2012	<i>Shigella flexneri</i>
3.	Anis ainurrochmah, dkk. 2013	<i>Shigella flexneri</i>
4.	Sutrisno, dkk. 2014	<i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>pseudomonas aeruginosa</i>
5.	Dewi peti virgianti dan dia maulani purwanti. 2015	<i>Streptococcus pyogeneses</i>
6.	Beta kurniawan dan wayan ferly aaryana. 2015	<i>Eschericia coli</i>
7.	Ratih dewi dwiyanti, dkk. 2015	<i>Salmonella thypi</i>
8.	Gde raka angga kartika, dkk. 2016	<i>Vibrio herveyi</i>
9.	Vivian wijaya, dkk. 2017	Bakteri berpigmen hitam
10.	Fadel abima, dkk. 2017	<i>Eschericia coli</i>
11.	Pratiwi trisunuwati dan endang setyowati. 2017	<i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>eschericia coli</i>

12.	Hasri, dkk. 2017	<i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>eschericia coli</i>
13.	Ani sulistyarsi dan nanda wahyu pribadi. 2018	<i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>pseudomonas aeruginosa</i>
14.	Indarto, dkk. 2019	<i>Propionibacterium acne</i>
15.	Isnaeni usman, dkk. 2019	<i>Streptococcus mutans</i>
16.	I putu gede a.p.h, dkk. 2020	<i>Staphylococcus aureus</i>
17.	Nuke annisa nasution, dkk. 2020	<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619 dan <i>Streptococcus Pneumoniae</i> PU 067

Aktivitas daya hambat antibakteri dinyatakan berdasarkan zona bening yang dihasilkan disekitar kertas cakram. Aktivitas zona hambat antimikroba dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu :

Diameter	Kekuatan daya hambat
≤ 5 mm	Lemah
6-10 mm	Sedang
11-20 mm	Kuat
≥ 21 mm	Sangat kuat

Tabel 7. Kategori daya hambat

No.	Nama peneliti	Jenis bakteri	Konsentrasi yang mampu menghambat bakteri	kekuatan daya hambat
1.	I gede oka darsana, dkk. 2012	<i>Eschericia coli</i>	25%	Sedang (7,2 mm)

2.	Lilies kusuma wardhani dan nanik sulistyani. 2012	<i>Shigella flexneri</i>	8%	Sedang (7,4 mm)
3.	Anis ainurrochmah, dkk. 2013	<i>Shigella flexneri</i>	40%	Kuat (18,5 mm)
4.	Sutrisno, dkk. 2014	<i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Staphylococcus aureus</i> konsentrasi 200 ppm <i>pseudomonas aeruginosa</i> konsentrasi 1000 ppm	Sedang (<i>Staphylococcus aureus</i> 8,26 mm) (<i>pseudomonas aeruginosa</i> 7,37 mm)
5.	Dewi peti virgianti dan dia maulani purwanti. 2015	<i>Streptococcus pyogeneses</i>	10%	Sedang (8,25 mm)
6.	Beta kurniawan dan wayan ferly aryana. 2015	<i>Eschericia coli</i>	100 ppm	Sedang (7 mm)
7.	Ratih dewi dwiyanti, dkk. 2015	<i>Salmonella thypi</i>	100%	Kuat (11 mm)
8.	Gde raka angga kartika, dkk. 2016	<i>Vibrio herveyi</i>	3%	Sedang (7,20 mm)
9.	Vivian wijaya, dkk. 2017	Bakteri berpigmen hitam	50%	Lemah (0,42 mm)
10.	Fadel abima, dkk. 2017	<i>Eschericia coli</i>	25%	Kuat (11,86 mm)

11.	Pratiwi trisunuwati dan endang setyowati. 2017	<i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>eschericia coli</i>	<i>Staphylococcus aureus</i> pada konsentrasi 60% <i>eschericia coli</i> pada konsentrasi 60%	Lemah (<i>Staphylococcus aureus</i> 3,67 mm) (<i>eschericia coli</i> 3,55 mm)
12.	Hasri, dkk. 2017	<i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>eschericia coli</i>	<i>Staphylococcus aureus</i> konsentrasi 7,5% <i>eschericia coli</i> konsentrasi 8%	Sedang (<i>Staphylococcus aureus</i> 7,74 mm) (<i>eschericia coli</i> 9,35 mm)
13.	Ani sulistyarsi dan nanda wahyu pribadi. 2018	<i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Staphylococcus aureus</i> konsentrasi 25% <i>pseudomonas aeruginosa</i> konsentrasi 25%	Lemah (<i>Staphylococcus aureus</i> 4,47 mm) (<i>pseudomonas aeruginosa</i> 4,09 mm)
14.	Indarto, dkk. 2019	<i>Propionibacterium acne</i>	20%	Lemah (2,31 mm)
15.	Isnaeni usman, dkk. 2019	<i>Streptococcus mutans</i>	7%	Sedang (7,7 mm)
16.	I putu gede a.p.h, dkk. 2020	<i>Staphylococcus aureus</i>	4 gr ekstrak dalam 5 ml etanol	Kuat (12,97 mm)
17.	Nuke annisa nasution, dkk. 2020	<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619 dan <i>Streptococcus</i>	<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619 konsentrasi 25%	Sedang (<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619 10,9 mm)

		<i>Pneumoniae</i> PU 067	<i>Streptococcus Pneumoniae</i> PU 067 konsentrasi 25%	(<i>Streptococcus Pneumoniae</i> PU 067 8 mm)
--	--	-----------------------------	---	---

4.6 Tinjauan Keislaman Tentang Keanekaragaman Tumbuhan

Allah SWT telah menciptakan berbagai macam makhluk termasuk tumbuhan yang ada disekeliling manusia. Tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki manfaat yang sangat besar sekali. Hal ini telah terangkum dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw.

Dalam firman Allah SWT QS. Ta-Ha ayat 53 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ۝٥٣

Terjemahnya:

“yang telah menjadikanmu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu dibumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam”

Pada redaksi ayat-ayat di atas terdapat kata *Kami* yang konteks uraiannya tidak mungkin diucapkan kecuali oleh Allah SWT. Ayat-ayat di atas menyatakan: *Dia*, yakni Allah, *Yang telah menjadikan bagi kamu*, wahai Fir'aun dan seluruh manusia, sebagian

besar *bumi sebagai hamparan* dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi *dan Dia, yakni Tuhan itu juga, Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantara hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya* (Shihab Vol.7: 604-605).

Thabáthabá'I menghubungkan ayat ini dengan akhir ayat yang lalu, yang menegaskan bahwa, "Allah SWT. Memberikan kepada setiap sesuatu bentuk kejadiannya", kemudian memberinya petunjuk serta mengaitkannya pula dengan jawaban Nabi Músá as. Tentang keluasan ilmu Allah. Ulama itu menulis bahwa Allah swt. Menempatkan manusia di bumi dengan menghamparkannya agar mereka dapat menikmati hidup dan berbekal guna kehidupan akhiratnya, serupa dengan bayi yang ditempatkan dalam buaian dan dididik guna meraih kehidupan yang lebih mulia dan tinggi. Allah menjadikan manusia di bumi ini agar ia menyadari bahwa ada jarak antara ia dan tujuan hidupnya. Ada jalan yang harus ditempuhnya guna mencapai tujuan hidup itu, yakni pendekatan diri kepada Allah dan upaya masuk ke hadirat-Nya, sebagaimana halnya ia menempuh jalan-jalan di permukaan bumi ini untuk mencapai arah yang ditujunya. Allah menurunkan air dari bumi ini untuk mencapai arah yang ditujunya. Allah menurunkan air dari langit berupa hujan dan juga mata-mata air dan sungai-sungai serta lautan, lalu ditumbuhkan dari air itu aneka macam dan jenis tumbuhan lalu Allah swt. Memberi hidayah kepada manusia untuk memakannya dan itu semua

merupakan ayat-ayat, yakni, tanda-tanda tentang hidayah dan *rubúbiyyahl* Ketuhanan dan Pemeliharaan Allah swt. Hal-hal tersebut harus dicamkan oleh kaum yang berakal. Dengan demikian-tulis Thabáthabá'i lebih jauh-firman-Nya: *Dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan* adalah isyarat bahwa keberadaan manusia di pentas bumi dalam rangka kehidupannya adalah bagian dari hidayah Allah; firman-Nya: *Menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan* adalah isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh manusia di bumi guna meraih tujuannya juga adalah bagian dari hidayah-Nya. Selanjutnya, firman-Nya bahwa: *Dia menurunkan dari langit air, maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam* juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah kepada langit guna menurunkan hujan, dan hidayah buat hujan agar turun tercurah dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang. Dengan lebih kurang pandangan Thabáthabá'I (Shihab Vol.7: 606).

Redaksi firman-Nya (أَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى) *akhrajná bihi azwájan min nabátin syattá / maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam* beralih menjadi persona pertama (*Kami*) sedang sebelumnya adalah persona ketiga (*Dia*) dalam firman-Nya: الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا *alladzí ja'ala lakum al-ard mahdan/Dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan*. Pengalihan bentuk redaksi tersebut bertujuan mengisyaratkan bahwa penumbuhan

aneka tumbuhan dengan bermacam-macam jenis bentuk dan rasanya itu merupakan hal-hal yang sungguh menakjubkan lagi membuktikan betapa agung Penciptanya. Pengalihan redaksi itu juga bertujuan mengundang perhatian pendengar dan mitra bicara agar mengarahkan pandangan dan pikirannya kepada hal-hal yang disebut itu. Gaya bahasa semacam ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan dalam konteks uraian yang sama. Bacalah misalnya QS. Al-An'am [6]: 99, Fathir [35]: 27, Naml [27]: 60 dan lain-lain.

Kata (أَزْوَاجًا) *azwāj* yang menguraikan aneka tumbuhan dapat dipahami dalam arti *jenis-jenis tumbuhan*, katakanlah seperti tumbuhan berkeping dua (dikotil) semacam kacang-kacangan, atau tumbuhan berkeping satu (monokotil) seperti pisang, nanas, palem dan lain-lain.

Dalam Al-qur'an surah Asy-Syu'ara' (26) ayat 7 yang berbunyi:


 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik” (Q.S. 26:7) (Kemenag RI. 2020).

Ayat diatas dapat diasumsikan bahwa Allah SWT mengingatkan kepada manusia bahwa banyak tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan yang dapat bermanfaat bagi makhluk hidup, tinggal kita sebagai manusia mengolah tumbuh-

tumbuhan itu dengan baik, baik daun, akar, batang dan bagian tumbuhan lainnya karena tak satupun yang Allah SWT ciptakan itu dengan sia-sia (tidak ada manfaat).

Dalam dunia kesehatan apabila suatu menyerang, manusia disarankan untuk mencari pengobatan, bisa menggunakan obat tradisional atau obat sintetik karena berobat adalah salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesembuhan (masood, 2009).

Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Bukhari nomor 5246:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ
 بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al mutsanna telah menceritakan kepada kami abu ahmad az zubairi telah menceritakan kepada kami umar bin sa'id bin abu husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'atha' bin abu rabah dari abu hurairah radhiallahu'anhu dari nabi SAW beliau bersabda "Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula (H.R Bukhari nomor 5246).

Hadist diatas menjelaskan mengenai setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah, dengan-Nya pasti diturunkan pula penawarnya. Jadi, segala penyakit yang diberikan oleh Allah pastilah ada obatnya dan atas izin Allah diberikan kesembuhan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1. Daun binahong memiliki aktivitas antibakteri berdasarkan studi literatur

5.1.2. Bakteri yang dapat dihambat oleh ekstrak daun binahong berdasarkan studi literatur adalah *eschericia coli*, *propionibacterium acne*, *pseudumonas aeruginosa*, *salmonella thypi*, *shigella flexneri*, *staphylococcus aureus*, *streptococcus mutans*, *streptococcus penumoniae*, *streptococcus pyogenes*, *vibrio harveyi*

5.1.3. Daun binahong mengandung senyawa kimia flavonoid, fenol, saponin, terpenoid, steroid, dan alkaloid yang berfungsi sebagai antibakteri berdasarkan studi literatur

5.2 Saran

Diharapkan adanya penelitian lanjutan secara eksperimental untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak daun binahong

DAFTAR PUSTAKA

- Abima, fadel *et al.* 2017. *Uji efektivitas antibakteri ekstrak daun binahong (anredera cordifolia (Ten) steenis) terhadap isolat bakteri escherichia coli jajanan cilok secara invitro dengan metode difusi.* Jurnal Profesi Medika : Jurnal Kedokteran dan Kesehatan. Vol 11. ISSN: 0216-3438
- Ainurrochmah, Anis *et al.* 2013. *Efektivitas ekstrak daun binahong (Andredera cordifolia (Ten) Steenis) terhadap penghambatan pertumbuhan bakteri shigella flexneri dengan metode sumuran.* Jurnal LenteraBio. Vol 2. ISSN: 2252-3979
- Astuti, sri. 2013. *Skrining fitokimia dan uji aktifitas antibiotika ekstrak etanol daun, batang, bunga, dan umbi tanaman binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis).* Journal of Chemical Information and Modeling. Vol 53. ISSN: 1098-6596
- BPOM. 2005. *Peraturan badan pengawas obat dan makanan.* Jakarta. BPOM RI vol 6
- Darsana, I Gede O *et al.* 2012. *Potensi daun binahong (anredera cordifolia (Ten) steenis) dalam menghambat pertumbuhan bakteri eschericia coli secara invitro.* Inodesia medicus veterinus. Vol 1. ISSN: 2477-6637
- Dwiyanti, Ratih D *et al.* 2015. *Efektivitas air rebusan daun binahong (anredera cordifolia) terhadap pertumbuhan salmonella typhi.* Medical Laboratory Technology Journal. Vol 1. ISSN: 0022-2607
- Hasri *et al.* 2017. *Analisis fenolik dan daya hambat daun binahong (anredera cordifolia (ten.) steenis) terhadap bakteri eschericia coli dan staphylococcus aureus.* Indonesian Chemistry and Application Journal. Vol 1. ISSN: 2549-2314
- Hita, I Putu G A P *et al.* 2020. *Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% daun binahong (anredera cordifolia (ten.) Steenis) terhadap bakteri staphylococcus aureus.* Jurnal farmasi dan kesehatan. Vol 9. ISSN: 2354-8487
- Indarto *et al.* 2019. *Aktivitas antibakteri ekstrak daun binahong terhadap propionibacterium acne.* Biosfer jurnal tadrhis biologi. Vol 10. ISSN: 2086-5945

- Kartika, Gde R A *et al.* 2016. *Potensi ekstrak daun binahong (Anredera cordifolia (Ten) steenis) sebagai penghambat bakteri vibrio herveyi.* Journal of Marine and Aquatic Sciences. Vol 2. ISSN: 2302-8114
- Kementrian agama republik indonesia. 2007. *Al-Qur'an dan terjemahannya.* CV dipenogoro
- Kurniawan, beta & Wayan Ferly A. 2015. *Binahong (Anredera cordifolia(Ten) steenis) as inhibitor eschericia coli growth.* Journal majority. Vol 4
- Masood, ehsan. 2009. *Ilmuwan-ilmuwan muslim pelopor hebat dibidang sains modern.* Jakarta. Gramedia pustaka utama
- Nasution, Nuke A *et al.* 2020. *Antibacterial Activity of Leaf Extracts of Anredera cordifolia (Ten.) Steenis and Muntingia calabura L. Against Streptococcus pneumoniae.* Current Biochemistry. Vol 7. ISSN: 2355-7877
- Paju, Niswa *et al.* 2013. *Uji aktivitas salep ekstrak daun binahong (anredera cordifolia (Ten) steenis) pada kelinci (oryctolagus cuniculus) yang terinfeksi bakteri staphylococcus aureus.* Jurnal ilmiah farmasi-UNSRAT. Vol 2. ISSN: 2302-2493
- Savitri, astrid. 2016. *Tanaman ajaib! Basmi penyakit dengan TOGA (tanaman obat keluarga).* Jakarta. Ibit publisher
- Shihab, Quraish. 2002. *TafsirAl-Misbah Volume 7 Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al-Qur'an.* Jakarta: Lentera Hati
- Sulistiyarsi, Ani & Pribadi, Nanda W. 2018. *Uji aktivitas antibakteri ekstrak daun binahong (Anredera cordifolia (ten.) Steenis) terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa.* Journal of Pharmaceutical Science and Medical Research. Vol 1. ISSN: 2614-4840
- Surada, Dr Putu G. 2016. *Buku panduan clinical skill – panduan pencarian literatur medis.* Udayana
- Surbakti, Putri A A *et al.* 2018. *Skrining fitokimia dan uji toksisitas ekstrak etanol daun binahong (Andredera cordifolia (Ten.) Steenis) dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT).* Jurnal Ilmiah Farmasi. Vol 7. ISSN: 2302-2493
- Sutrisno, E *et al.* 2014. *Kajian aktivitas penyembuhan luka dan antibakteri binahong (Anredera cordifolia (ten.) Steenis), pegagan (centella asiatica (L) urban) serta kombinasinya terhadap bakteri staphylococcus aureus dan pseudomonas*

aeruginosa dari pasien luka kaki diabetes. *Bionatura-Jurnal Ilmu-ilmu Hayati dan Fisik*. Vol 16. ISSN: 1411-0903

Trisunuwati, Pratiwi & Setyowati, Endang. 2017. *Potensi perasan daun binahong (Anredera cordifolia (Ten) steenis) sebagai antibakterial pada kultur media bakteri Staphylococcus aureus dan Eschericia coli penyebab mastitis klinis sapi perah*. *Jurnal ilmu-ilmu peternakan*. ISSN: 0852-3681

Usman, Isnaeni *et al.* 2019. *Aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak daun kemangi dan daun binahong terhadap streptococcus mutans*. *Media farmasi*. Vol XV. ISSN: 0216-2083

Virgianti, Dewi P & Dian M P. 2015. *Daya hambat ekstrak etanol daun binahong (anredera cordifolia (Ten) steenis) terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes secara in vitro*. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan dan Farmasi*. Vol 13. ISSN: 1979-004X

Wardhani, Lilies S & Nanik sulistyani. 2012. *Uji aktivitas antibaktri ekstrak etil asetat daun inahong (Anredera cordifolia (Ten) steenis) terhadap shigella flexneri beserta profil kromatografi lapis tipis*. Vol 2. ISSN: 09760083

Wijaya, vivivan *et al.* 2017. *The efficacy of an infusion of binahong leaves (Anredera cordifolia(Ten) steenis) against wild strain black pigmented bacteria*. *International Journal of Applied Pharmaceutics*. Vol 9. ISSN: 09757058

Lampiran

Lampiran 1. Artikel yang dianalisis

Journal of Pharmaceutical Science and Medical Research
ISSN 2614-4840 (print) 2614-6118 (online)
Vol. 1 No. 1 Tahun 2018

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN BINAHONG
(*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) TERHADAP PERTUMBUHAN
BAKTERI *Staphylococcus aureus* DAN *Pseudomonas aeruginosa***

**TEST OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF LEAF EXTRACT BINAHONG
(*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) ON GROWTH OF BACTERIA *Staphylococcus
aureus* AND *Pseudomonas aeruginosa***

Ani Sulistyarsi¹, Nanda Wahyu Pribadi²

¹ Program Studi Farmasi FIKS, Universitas PGRI Madiun, Indonesia

² Program studi Pendidikan Biologi FKIP, Universitas PGRI Madiun, Indonesia

anisulistyarsi@unipma.ac.id

Abstrak

Tumbuhan obat telah digunakan sejak dahulu secara turun temurun untuk mencegah, menyembuhkan serta memelihara kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) terhadap pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap 7 perlakuan, 3 kali ulangan. Ekstrak binahong dengan uji maserasi menggunakan etil asetat. Konsentrasi ekstrak binahong menggunakan kontrol (0%), 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50% untuk bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*. Data dianalisis dengan uji oneway ANOVA, korelasi dan regresi linear. Hasil penelitian KHM ekstrak binahong terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* pada konsentrasi 25%, pada bakteri *Pseudomonas aeruginosa*: konsentrasi 50%. Pada uji KBM ekstrak binahong terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dengan konsentrasi 50%, pada bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dengan konsentrasi 100%. Hasil uji oneway ANOVA: ada perbedaan yang bermakna antar perlakuan. Nilai sig (0,000) < p (0,05). Semakin tinggi konsentrasi ekstrak binahong, semakin mampu menghambat dan membunuh bakteri *Staphylococcus aureus* (r = -0,805), *Pseudomonas aureginosa* (r = -0,616). Hasil uji fitokimia ditemukan senyawa polifenol, alkaloid dan flavanoid.

Kata kunci: Binahong; *Staphylococcus aureus*; *Pseudomonas aeruginosa*

UJI EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN BINAHONG (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) TERHADAP ISOLAT BAKTERI *Escherichia coli* JAJANAN CILOK SECARA IN VITRO DENGAN METODE DIFUSI

Fadel Abima¹, Meiskha Bahar², Aulia Chairani³

¹Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta
Email : delabima27@gmail.com

²Departemen Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran UPN "Veteran" Jakarta
Email : meiskha27@gmail.com

³Departemen Farmakologi, Fakultas Kedokteran UPN "Veteran" Jakarta

ABSTRAK

Diare masih menjadi masalah besar bagi kesehatan dunia terutama pada negara berkembang. Makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh mikroorganisme menjadi faktor resiko penyebab diare, termasuk bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*). Salah satu upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis). Penelitian ini menggunakan metode eksperimental murni. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah ekstrak daun binahong dengan konsentrasi 25%, 50%, dan 75% dengan metode pengujian difusi agar (*Kirby-Bauer*) menggunakan media *Mueller Hinton Agar* (MHA) dua lapis (*base layer* dan *seed layer*) untuk mengukur zona hambat di sekitar plat silinder. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 24 isolat *E. coli*. Jumlah ulangan tiap kelompok perlakuan dihitung menggunakan rumus Federer. Hasil penelitian diuji dengan uji *Kruskal-Wallis* dan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas ekstrak daun binahong terhadap isolat bakteri *E. coli* ($p < 0,05$) serta pada analisis *post hoc* menggunakan uji *Mann-Whitney* menunjukkan perbedaan yang bermakna antara setiap konsentrasi, yaitu 25%, 50%, dan 75%. ($p < 0,001$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna pada ekstrak daun binahong setiap konsentrasi.

LenteraBio
Journal of Health Science

ISSN: 2252-3979

<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/lenterabio>

Efektivitas Ekstrak Daun Binahong (*Anredera cordifolia*) terhadap Penghambatan Pertumbuhan Bakteri *Shigella flexneri* dengan Metode Sumuran

The Effectivity of Binahong (*Anredera cordifolia*) Leaves Extracts for Growth Inhibition of *Shigella flexneri* by Agar Well Difussion Method

Anis Ainurrochmah, Evie Ratnasari, Lisa Lisdiana
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Shigella flexneri merupakan salah satu bakteri penyebab disentri. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Shigella* sp. dapat disembuhkan dengan menggunakan antibiotik, tetapi penggunaan antibiotik yang berlebihan menyebabkan bakteri menjadi resisten. Salah satu alternatif pengganti antibiotik adalah dengan memanfaatkan senyawa metabolit sekunder daun binahong (*Anredera Cordifolia*). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan pertumbuhan bakteri *Shigella flexneri* strain BW 1201 dan konsentrasi yang paling optimal dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Shigella flexneri* strain BW 1201 dengan menggunakan ekstrak daun binahong. Pembuatan ekstrak daun binahong dilakukan dengan metode maserasi, yaitu dengan menggunakan pelarut etanol 96%. Filtrat yang diperoleh kemudian diuapkan menggunakan rotary vacuum evaporator untuk memperoleh ekstrak kental. Konsentrasi ekstrak daun binahong yang diujikan adalah 0% (kontrol negatif/ akuades), 40%, 60%, 80% dan 100% dengan 4 pengulangan. Data yang diperoleh berupa ukuran diameter zona hambat (mm) yang terbentuk pada media kultur *S. flexneri* strain BW 1201. Data dianalisis dengan menggunakan Analisis Varian Satu Arah dan dilanjutkan dengan uji Duncan untuk mengetahui perbedaan pada setiap konsentrasi dengan lebih jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun binahong dapat menghambat pertumbuhan bakteri *S. flexneri* strain BW 1201. Perlakuan dengan konsentrasi 100% dapat menghambat pertumbuhan bakteri *S. flexneri* strain BW 1201 paling optimal dengan rata-rata diameter zona hambat sebesar 27,2 mm.

Kata kunci: *Shigella flexneri*; ekstrak daun binahong; hambatan pertumbuhan bakteri; metode sumuran

Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan 27 (1): 18 - 27
ISSN : 0852-3681
E-ISSN : 2443-0765
©Fakultas Peternakan UB, <http://jiiip.ub.ac.id/>

Potensi perasan Daun Binahong (*Anredera cordifolia*) sebagai antibakterial pada kultur media bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* penyebab mastitis klinis penyebab mastitis Sapi Perah

Pratiwi Trisunuwati dan Endang Setyowati
Dosen Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya

Correspondence author : pratiwi_trisunuwati@yahoo.com

ABSTRACT: This research was conducted to determine the ability of binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) leaf juice as alternative herbal antibacterial against teat dipping mastitis of livestock. Pure isolate of *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli* taken from sub clinical mastitis of dairy cow were used in this experiment. The experiment was examined with four different treatments and five replication 60% (P₁), 80% (P₂), and 100% (P₃) of binahong leaf juice concentration's as treatment and iodips 10% (P₀) as placebo. Based on statistical method, the result prove that binahong's leaf juice had potentially reduced against growth of bacteria as play of inhibition's zone on NA media culture. Mostly 100% (P₃) of binahong leaf juice concentrations was the best treatment that gave inhibition zone in *Staphylococcus aureus* (9.72 ± 4.36 mm) and *Escherichia coli* (9.15 ± 4.57 mm). This could be concluded that binahong's leaf juice had an ability avoid growth of mastitis bacteria and it can be potentially used as herbal antibacterial in teat dipping to against mastitis.

Keywords: Binahong leaf juice, herbal antibacterial, inhibition zone

KAJIAN AKTIVITAS PENYEMBUHAN LUKA DAN ANTIBAKTERI BINAHONG (*Anredera cordifolia* (Ten.) STEENIS, PEGAGAN (*Centella asiatica* (L.) Urban) SERTA KOMBINASINYA TERHADAP BAKTERI *Staphylococcus aureus* DAN *Pseudomonas aeruginosa* DARI PASIEN LUKA KAKI DIABETESSutrisno, E.,¹ Adnyana, I.K.,¹ Sukandar, E.Y.,¹ Fidrianny, I.¹ dan Lestari, T.²¹Sekolah Farmasi, Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesa No. 10 Bandung.²Sekolah Tinggi Farmasi Bandung, Jl. Soekarno Hatta No. 754, Bandung.

E-mail: me@entrissutrisno.com

ABSTRAK

Telah dilakukan uji aktivitas antibakteri ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis, pegagan (*Centella asiatica* (L.) Urban) serta kombinasinya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ekstrak binahong, ekstrak pegagan, serta ekstrak kombinasinya pada masing-masing konsentrasi mempunyai aktivitas sebagai bakteristatik terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan bakterisidal terhadap *Pseudomonas aeruginosa*.

Kata kunci: Binahong, pegagan, Antibakteri, *S. aureus*, *P. aeruginosa*

yaitu, hilangnya sebagian atau bahkan seluruh fungsi jaringan dan organ yang mengalami luka, perdarahan, gangguan hematologi, timbulnya beberapa respon saraf simpatis, serta kemungkinan terjadinya kontaminasi lebih kronis yang dapat mengakibatkan kematian dari beberapa sel-sel penting (Lans *et al.*, 2007). Pada kasus luka kaki diabetes, bakteri yang sering dijumpai adalah bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*. (Ying *et al.*, 2012).

Untuk menunjang pemanfaatan secara maksimum terutama dalam hal penggunaan di masyarakat, data pendukung riset baik preklinis maupun klinis sangat dibutuhkan. (Departemen Kesehatan RI, Direktorat

Wayan FA, Betta K I Binahong (*Cassia Alata* L) For Inhibiting The Growth Of Bacteria *Escherichia Coli***[ARTIKEL REVIEW]****BINAHONG (*Cassia Alata* L) AS INHIBITOR OF *ESCHERICHIA COLI* GROWTH****Betta Kurniawan, Wayan Ferly Aryana**


Faculty of Medicine, Lampung University

Abstract

Escherichia coli normally located in the lower part of gastrointestinal tract and can become pathogen if the number and growth of bacteria in human beyond normal limits, it can be happen because sudden dietary change and also environmental changes from rain to heat and in reverse. Increasing number of *E. Coli* can cause many gastrointestinal disease such as diarrhea, and can cause complication like shock and death. One of plants that are empirically used as an anti-bacterial drug is binahong (*Cassia Alata* L) which have ingredient like flavanoid, clove oil, saponin, terpenoids and alkaloid as anti-bacterial. Mechanism of action of substances to inhibit of bacteri is causing damage to the permeability of bacterial cell wall.

Keywords : Antibacterial, Binahong (*Cassia Alata* L), *Escherichia coli*

Media Farmasi p.issn 0216-2083 e.issn 2622-0962 Vol. XV No. 2, Oktober 2019,



**AKTIVITAS ANTIBAKTERI KOMBINASI EKSTRAK DAUN KEMANGI DAN DAUN
BINAHONG TERHADAP *Streptococcus mutans***

Antibacterial Activity Of Extracts Of Basil Leaves And Binahong Leaves On Streptococcus mutans

Isnaeni Usman*, Jane Stefany Rambung, Ermi Reski Hijriah AR, Ismail

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar

*Email: isnaeni.usman19@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.32382/mf.v15i2.1058>

ABSTRACT

Dental caries and bad breath are oral health problems that are quite prevalent in teenagers and young children. These conditions are caused by *Streptococcus mutans* bacteria, which are normal flora found in the oral cavity. However, in large numbers, these bacteria have the potential to trigger the formation of dental plaque. The purpose of this study is to compare the antibacterial activity of the extract of the basil and Binahong leaves and their combination against the bacterium *Streptococcus mutans*. The extract of the basil and Binahong leaves were made by the maceration method using 70% ethanol, followed by phytochemical screening and determination of antibacterial activity. The results of phytochemical screening show that basil leaf extract contains alkaloid and flavonoid, while binahong has alkaloid and phenolic compounds. The test on the antibacterial activity of a single extract using the diffusion method shows that a concentration of 7% per extract is the most optimal and inhibit *Streptococcus mutans*. Therefore, the antibacterial activity of the extract of binahong to basil leaves was tested in a ratio of 50 to 50, 70 to 30, and 30 to 70. The most optimal concentration was 70:30.

Keywords: Mouthwash, Basil Leaves, Binahong Leaves, *Streptococcus mutans*

MEDFARM: Jurnal Farmasi dan Kesehatan
Vol. 9, No.2, Desember 2020, hal 49-54

e-ISSN 2715-9957
p- ISSN 2354-8487

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL 70% DAUN
BINAHONG (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) TERHADAP
BAKTERI *Staphylococcus aureus***

**I Putu Gede Adi Purwa Hita¹, Putu Eka Arimbawa², Dhianciantyan windyaca
BP³**

^{1,2,3}Universitas Bali Internasional, Jl. Seroja Denpasar - Bali 80114

e-mail: ¹⁾adipurwah.1@gmail.com

²⁾eka_apoteker@yahoo.co.id

³⁾windyacabraturputri@iikmpbali.ac.id

ABSTRAK

Pengobatan jerawat dewasa ini didominasi oleh kosmetika khususnya kosmetika sintetis memiliki efek samping yang tinggi, sehingga memerlukan alternatif yaitu pengobatan obat herbal yang memiliki efek samping lebih sedikit dari obat sintetis. Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) merupakan salah satu tanaman obat herbal khas Indonesia yang secara empiris digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol 70% daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*. Pembuatan ekstrak dilakukan dengan metode maserasi menggunakan etanol 70% dan uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi cakram yang diukur diameter zona hambatnya. Sebanyak 84,04 gram ekstrak kental daun binahong yang memiliki warna hijau kehitaman, bau khas, dan rasa pahit didapatkan melalui proses ekstraksi. Diameter zona hambat ekstrak yang dihasilkan sebesar $12,97 \pm 0,54$ mm, kontrol positif (kloramfenikol) $30,18 \pm 0,08$ mm, dan kontrol negatif tidak memberikan zona hambat. Ekstrak etanol 70% daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) memiliki aktivitas antibakteri yang kuat terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*.

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETIL
ASETAT DAUN BINAHONG (*Anredera scandens* (L.)
Moq.) TERHADAP *Shigella flexneri* BESERTA PROFIL
KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS**

**ANTIBACTERIAL ACTIVITY TEST OF ETHYL
ACETATE EXTRACT OF BINAHONG LEAF (*Anredera
scandens* (L.) Moq.) AGAINST *Shigella flexneri* WITH
THE PROFILE OF THIN LAYER
CHROMATOGRAPHY**

Lilies Kusuma Wardhani, Nanik Sulistyani
Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Abstrak

Antibakteri adalah senyawa yang dapat digunakan untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Secara tradisional tanaman Binahong (*Anredera scandens* (L.) Moq.) dikenal oleh masyarakat untuk mengobati berbagai macam penyakit, di antaranya adalah penyakit infeksi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat daun Binahong dan Kadar Bunuh Minimum (KBM) terhadap *Shigella flexneri*, serta untuk mengetahui kandungan kimia yang terdapat dalam ekstrak etil asetat daun Binahong (*Anredera scandens*(L.) Moq.). Serbuk daun Binahong diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etil asetat. Uji antibakteri dilakukan dengan metode dilusi cair dengan berbagai konsentrasi ekstrak (8,5%, 8%, 7,5%, 7%, 6,5%, 6%, 5,5%, dan 5% ^{b/v}) untuk menentukan KBM. Uji kromatografi lapis tipis dilakukan untuk mengetahui golongan senyawa yang terdapat dalam ekstrak etil asetat daun Binahong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KBM ekstrak etil asetat daun Binahong terhadap *Shigella flexneri* adalah 8 % ^{b/v}. Hasil uji skrining fitokimia dengan uji tabung dan kromatografi lapis tipis menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat daun Binahong mengandung polifenol, dan saponin.

Kunci : Ekstrak etil asetat daun Binahong (*Anredera scandens*(L.) Moq.).

Indonesia Medicus Veterinus 2012 1(3) : 337 – 351
ISSN : 2301-7848

**Potensi Daun Binahong (*Anredera Cordifolia (Tenore) Steenis*)
dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri *Escherichia Coli*
secara *In Vitro***

I GEDE OKA DARSANA,
I NENGAH KERTA BESUNG, HAPSARI MAHATMI

Laboratorium Kesmavet,
Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana.
Jl.P.B.Sudirman Denpasar Bali tlp. 0361-223791,
E-mail : peanutdog_bali@yahoo.com

ABSTRACT

This study examined the response of *Escherichia coli* codes ATCC (American Type Culture Collection) 25922 obtained from the Laboratorium Daerah of binahong juice leaf with determination test the ability of the inhibition of growth of *Escherichia coli* by standard Kirby-Bauer disc using five treatments namely binahong juice leaf (0 %, 25%, 50%, 75% and 100%) and negative controls physiological NaCl 0.9% and a positive control with oxytetracycline with repetition as much as four times. Reaction of *Escherichia coli* growth inhibition by leaf juice and antibiotics binahong shown by the formation of a subsequent inhibition area was measured as the diameter of the circle of the inhibition. Data were obtained, will be tested with Variety Analysis (Test F), followed by Duncan's test of data processing can then proceed to determine the regression analysis. And all the data processed using SPSS.

The results of this study indicate that the juice of binahong leaf (*Anredera cordifolia (Tenore) steenis*) at a concentration of 0% indicates the average resistivity of (0.000 mm); concentration of 25% (7.225 mm); concentration of 50% (8.325 mm) concentration of 75% (10.125 mm) and concentration 100% (12.325 mm). In addition, binahong leaf juice could inhibit the growth of *Escherichia coli* ATCC 25922, and binahong juice leaf statistically significant ($P < 0.01$) against the bacteria *Escherichia coli* and there were highly significant differences ($P < 0.01$) at each concentration diameter. As well, the increased concentration of binahong leaf juice (*Anredera cordifolia (Tenore) steenis*) increased the inhibition on the growth of *Escherichia coli* in vitro.

Key words : binahong leaf (*Anredera cordifolia (Tenore) steenis*), *Escherichia coli*, ATCC (American Type Culture Collection) 25922 .

THE EFFICACY OF AN INFUSION OF BINAHONG LEAVES (*ANREDERA CORDIFOLIA* (TEN.) STEENIS) AGAINST WILD STRAIN BLACK-PIGMENTED BACTERIA

VIVIAN WIJAYA, ELIZABETH SHINTA MAHARANI, HARUN ASYIQ GUNAWAN, RIA PUSPITAWATI*

Department of Oral Biology, Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. Email: rpuspitawati2013@gmail.com

Received: 16 September 2017, Revised and Accepted: 3 October 2017

ABSTRACT

Objective: Black-pigmented bacteria represent one of the most prominent causes of chronic periodontitis. The objective of this study is to investigate the *in vitro* antibacterial effect of an infusion of binahong leaves (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) against black-pigmented bacteria.

Methods: The black-pigmented bacteria were isolated from the periodontal pocket of a patient with chronic periodontitis. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) were determined by means of a dilution test using 10^7 cfu/ml of bacteria cultured on Brucella broth containing blood and kanamycin, which was exposed to a 20%, 30%, 40%, 50%, 65%, 80%, and 95% infusion of binahong leaves and then incubated for 24, 48, and 72 h. In the blank disc diffusion test, a 50%, 65%, 80%, 95%, and 100% infusion was dripped onto a paper disc placed at the center of a Brucella agar bacterial culture and then incubated for 24 h.

Results: The MIC and MBC of the binahong leaf infusion were >65% and 80%, respectively, while the antibacterial activity was not correlated with the duration of the exposure to the infusion. The diffusion test showed that an increased concentration of the infusion resulted in an increased diameter of the inhibition zone that ranged from 0.42 mm (50% infusion) to 1.42 mm (100% infusion).

Conclusion: Binahong leaves infusion has potential efficacy against black-pigmented bacteria.

Keywords: Binahong leaves infusion, Black-pigmented bacteria, Chronic periodontitis.

© 2017 The Authors. Published by Inovare Academic Sciences Pvt Ltd. This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) DOI: <http://dx.doi.org/10.22159/ijap.2017.v9i2.08>

INTRODUCTION

The loss of dental attachment and alveolar bone destruction that occur in cases of periodontitis is caused by the inflammation response of the host tissues against the toxin produced by bacteria [1]. Based on their degree of virulence, the periodontopathogens can be classified into six groups. Indeed, from the most to the least virulent, the periodontopathogenic bacteria groups are red complex, orange complex, yellow complex, green complex, blue complex, and purple complex. The red and orange complex bacteria have a strong relationship with the clinical parameters commonly used as a reference in the diagnosis of periodontitis. The red complex bacteria group consists of *Treponema denticola*, *Porphyromonas gingivalis*, and *Bacteroides forsythus*, while the orange complex bacteria group includes *Prevotella intermedia*, *Prevotella nigrescens*, and some others species [2].

The bacteria most commonly found in cases of chronic periodontitis are *P. gingivalis* (red complex) and *P. intermedia* (orange complex) [3]. These two bacteria together comprise a class of periodontopathogens known as black-pigmented bacteria. These bacteria are referred to as black-pigmented bacteria because both groups produce melanin and appear as black-pigmented colonies [4].

Indonesia is a country rich in various plants, and hence, the government had instituted a policy of developing the potentiation of herbal medicine derived from traditional medicinal herbs [5]. Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) has long been widely used by the Indonesian population as a traditional medicine. Phytochemical filtration has shown that the active ingredients of binahong are phenol, flavonoids, terpenoids, and steroids.

The highest phenol content in binahong is found (from the highest to the lowest) in the flower, leaves, and root of the plant. Binahong leaves also contain alkaloids and saponins. Binahong leaves represent the easiest part of the plant to harvest in large quantities, and the flavonoid content is

high [6]. The flavonoids and saponins found in plants are famous for their antibacterial effect due to their capability for degrading the permeability of the bacterial cell wall [7,8]. A previous study reported that an extract of binahong leaves had an antibacterial effect against *Staphylococcus aureus*, showing a minimum inhibitory concentration (MIC) and a minimum bactericidal concentration (MBC) of 25% and 50%, respectively [9].

Another study reported both the MIC and MBC of an infusion of binahong leaves against *Streptococcus mutans* to be 50% [10]. *S. aureus* and *S. mutans* are Gram-positive bacteria, while the black-pigmented bacteria are Gram-negative microorganisms, which are more resistant than the Gram-positive class [11].

Chlorhexidine is the most common antibacterial agent used in the treatment of periodontitis. It has been proven to be clinically effective in overcoming many cases of chronic periodontitis [12]. However, the availability of this agent as well as other synthetic antibacterial agents in various isolated and remote regions of Indonesia remains limited.

The simplest way of making use of herbal plants is the creation of an infusion. The infusion technique requires a lower temperature than the boiling and steaming involved in processing herbal medicines, which means it does not lead to any damage to the plant's active components. Further, the technique does not require any sophisticated tools or techniques, meaning that it can be practised by the wider community [12,13].

This study aimed to investigate the antibacterial effect of an infusion of binahong leaves against black-pigmented bacteria.

METHODS

Handling of the wild strain black-pigmented bacteria sample

The sample of black-pigmented bacteria used in this study was isolated from a chronic periodontitis patient before the delivery of any treatment.

DAYA HAMBAT EKSTRAK ETANOL DAUN BINAHONG (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI *Streptococcus pyogenes* SECARA *IN VITRO*

Dewi Peti Virgianti dan Diar Maulani Purwati
STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya

ABSTRAK

Daun binahong *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis merupakan salah satu tanaman obat yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Kandungan kimia pada daun binahong dapat berfungsi sebagai antibakteri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui daya hambat ekstrak etanol daun binahong terhadap pertumbuhan bakteri *Streptococcus pyogenes*.

Penelitian dilakukan secara eksperimen menggunakan ekstrak etanol daun binahong dengan konsentrasi pengenceran 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, dan 100% yang diujikan terhadap bakteri *Streptococcus pyogenes* dengan kepadatan 0,5 mcFarland, menggunakan metode Kirby-Bauer.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pada semua konsentrasi ekstrak daun binahong dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang ditunjukkan dengan terbentuknya zona jernih. Diameter zona hambat terbesar ditunjukkan pada konsentrasi 100% yaitu sebesar 15,15 mm.

Berdasarkan hasil penelitian uji *in-vitro* daya hambat ekstrak daun binahong *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis terhadap pertumbuhan bakteri *Streptococcus pyogenes* pada media Muller-Hinton, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekstrak daun binahong dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Streptococcus pyogenes*.

Kata kunci : *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis, *Streptococcus pyogenes*, antibakteri.



AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN BINAHONG TERHADAP *PROPIONIBACTERIUM ACNES*

Indarto^{1*}, Windy Narulita², Bambang Sri Anggoro³, Aulia Novitasari⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
*Email : indarto@radenintan.ac.id

Received: Mey 11th, 2019. Accepted: June 29th, 2019. Published: June 30th, 2019

Abstract

The purpose of this study was to determine whether binahong leaf extract can inhibit the growth of *Propionibacterium acnes* bacteria. This study was a laboratory experimental study using a completely randomized design (CRD) with five treatments. The treatment was repeated 3 times with various concentrations of 20%, 40%, 60%, 80%, and 100%, clindamycin as a comparison and aquadest as a control. The binahong leaf extract was obtained from maceration of binahong leaves with methanol and partitioned using ethyl acetate, then tested the antibacterial activity against *Propionibacterium acnes* bacteria. The parameters observed were the diameter of the zone inhibiting the growth of *Propionibacterium acnes* bacteria. Data analysis using Analysis of Variance (ANOVA). The result is known that binahong leaf extract has the ability to inhibit the growth of *Propionibacterium acnes* bacteria seen by the presence of inhibitory zones formed. The most effective concentration to inhibit the growth of *Propionibacterium acnes* bacteria is at a concentration of 100% at 9.00 mm in 24 hours and 11.20 mm in 48 hours.

Keywords: Binahong (*Anredera cordifolia*); antibacterial; *Propionibacterium acnes*; *acne*

Potensi Ekstrak Daun Binahong (*Anredera cordifolia*) Sebagai Penghambat Bakteri *Vibrio harveyi*

Gde Raka Angga Kartika ^{a*}, Sri Andayani ^b, Soelistyowati ^b

^a Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran, Bali 80361, Indonesia

^b Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Brunei Darussalam, Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 65113, Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +62-991-931-223
Alamat e-mail: raka.angga@umad.ac.id

Diterima (received) 10 Mei 2016; disetujui (accepted) 27 Juni 2016; tersedia secara online (available online) 2 Agustus 2016

Abstract

Binahong (*Anredera cordifolia*) is a plant that can treat various kinds of diseases, because this plant has a high antioxidant content and as an antibacterial and antiviral. Vibriosis disease caused by the bacterium *Vibrio harveyi* is a serious problem in marine and brackish culture, this disease can cause death for shrimp and fish that farmed in marine or brackish. This study aims to determine the potential of using leaf extract Binahong with different concentrations as *Vibrio harveyi* inhibiting bacterial growth in vitro. The method used is to test the Minimum inhibitory concentration (MIC) to determine minimum levels inhibit the growth of *Vibrio harveyi* and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) using paper disc. The results showed the use of leaf extract Binahong (*Anredera cordifolia*) with different concentrations significant effect on the growth of *Vibrio harveyi* in vitro. Binahong leaf extract (*Anredera cordifolia*) with a concentration of 3%, 5%, 7%, 9%, 11% and 13% is only bacteriostatic which inhibits the growth of bacteria *Vibrio harveyi* with the best concentration obtained is equal to 13%.

Keywords: Binahong leaves; *Vibrio harveyi*; inhibition

Abstrak

Binahong merupakan salah satu tanaman yang dapat mengobati berbagai jenis penyakit. Hal ini dikarenakan tanaman ini memiliki kandungan antioksidan tinggi dan sebagai antibakteri dan antivirus. Penyakit Vibriosis yang disebabkan oleh bakteri *Vibrio harveyi* merupakan salah satu masalah serius pada budidaya laut dan payau yang dapat mengakibatkan kematian pada ikan dan udang yang dibudidayakan baik di air laut maupun payau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penggunaan ekstrak daun Binahong (*Anredera cordifolia*) dengan konsentrasi yang berbeda sebagai penghambat pertumbuhan bakteri *Vibrio harveyi* secara *in-vitro*. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan uji Minimum Inhibitory concentration (MIC) untuk mengetahui kadar minimal menghambat pertumbuhan *Vibrio harveyi* dan Minimum Bactericidal Concentration (MBC) dengan menggunakan kertas cakram. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan ekstrak daun Binahong (*Anredera cordifolia*) dengan konsentrasi yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan bakteri *Vibrio harveyi* secara *in vitro*. Ekstrak daun Binahong (*Anredera cordifolia*) dengan konsentrasi 3%, 5%, 7%, 9%, 11% dan 13% hanya bersifat bakteriostatik yaitu menghambat pertumbuhan bakteri *Vibrio harveyi* dengan konsentrasi terbaik yang didapatkan yaitu sebesar 13%.

Kata Kunci: daun Binahong; *Vibrio harveyi*; daya hambat

1. Pendahuluan

Penyakit dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan suatu fungsi atau struktur dari alat tubuh atau sebagian alat tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung (Kordi, 2004). Menurut Handayani dan Samsundari (2005), penyakit yang menyerang tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses hubungan antara tiga faktor, yaitu kondisi lingkungan (kondisi dalam air), kondisi inang, dan adanya jasad patogen (jasad penyakit).

Penurunan kualitas perairan pada lokasi budidaya dapat menyebabkan terjadinya serangan penyakit. Salah satu penyakit pada ikan atau udang yang sering

menyerang lokasi budidaya adalah penyakit Vibriosis. Vibriosis terjadi secara berkala di dunia dan dapat menyebabkan kematian massal pada beberapa spesies ikan (Austin and Austin, 1993). Salah satu penyebab serangan penyakit Vibriosis adalah bakteri bercahaya (*luminescent bacteria*) yaitu bakteri *Vibrio harveyi* (Kraxberger-Beatty *et al.*, 1990). Strains *Vibrio* adalah bakteri dominan di air laut dan umumnya menginfeksi udang budidaya maupun udang liar (Hervio - Heath *et al.*, 2002). Bakteri ini penyebab penyakit pada udang yang mampu menyerang bagian-bagian tubuh udang baik di luar maupun di dalam tubuh.

Dalam menanggulangi penyakit ini pengelola panti benih pada umumnya menggunakan antibiotik untuk



Medical Laboratory Technology Journal

1 (1), 2015, 1-6

Available online at : <http://ejurnal-analiskesehatan.web.id>

EFEKTIVITAS AIR REBUSAN DAUN BINAHONG (*Anredera cordifolia*) TERHADAP PERTUMBUHAN *Salmonella typhi*

Ratih Dewi Dwiyanti, Nurlailah, Indah Kurnia Widiningsih

Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
 Jl Mistar Cokrokusumo 4a Banjarbaru
 e-mail: Ratihdewi262@yahoo.co.id

Abstract: Typhus is one of acute febrile illness caused by the bacterium *Salmonella typhi*. Treatment of typhoid fever usually use antibiotics, the use of antibiotics can cause side effects. People today are using treatment with natural ingredients, one of which is Binahong (*Anredera cordifolia*) compounds containing alkaloids, polyphenols, flavonoids, saponin, and anthraquinone is efficacious as an antibacterial. This study aims to determine the effectiveness of the water decoction of leaves Binahong against *Salmonella typhi* growth in vitro. This type of research is true experiment with posttest study design Only Control Group Design and methods used are diffusion (wells) with 5 treatment. The concentration of the cooking water leaves the digunakan Binahong is 20%, 40%, 60%, 80% and 100%. The result showed inhibition zone water decoction of the leaves Binahong against *Salmonella typhi* at a concentration of 20%, 40%, 60%, 80% is 0 mm, whereas at 100% concentration obtained inhibition zone of 11 mm. It is concluded that the water decoction of the leaves Binahong at a concentration of 100% has the ability to inhibit the growth of *Salmonella typhi*, but these results have not been effective because it is still in the category of resistance. It is suggested for further research to increase the concentration of water decoction of the leaves binahong or use alcohol extract of leaves binahong to inhibit the growth of *Salmonella typhi*.

Keywords: Water decoction of leaves Binahong, *Salmonella typhi*, antibacterial.

INDONESIAN CHEMISTRY AND APPLICATION JOURNAL | 2017
 (ICAJ) ISSN : 2549-2314;
 Volume : 1; Number 1

ANALISIS FENOLIK DAN DAYA HAMBAT DAUN BINAHONG (*Anredera cordifolia* (ten.) Steenis) TERHADAP BAKTERI *Eschericia coli* DAN *Staphylococcus aureus*

Hasri¹, Muhammad Anwar¹, Marwah Karim²

²Jurusan Kimia Universitas Negeri Makassar, Jl. Dg Tata Raya. No. 76

Email : marwahkarim88@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan fenolik dan mengetahui daya hambat ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) terhadap bakteri *Eschericia coli* dan *Staphylococcus aureus*. Ekstraksi daun binahong menggunakan pelarut etanol, dan etil asetat. Ekstrak yang diperoleh dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui kandungan fenolik dan daya hambatnya. Diperoleh kadar fenolik ekstrak etanol sebesar 28,43 mg GAE/g ekstrak, ekstrak etil asetat sebesar 26,47 mg GAE/g ekstrak. Konsentrasi hambat minimum (KHM) ekstrak etanol dan etil asetat terhadap *E. coli* masing-masing sebesar 8,5%, dan 7,5%. Konsentrasi hambat minimum (KHM) ekstrak etanol dan etil asetat terhadap *S. aureus* masing-masing sebesar 8%, dan 9,5%.

Kata kunci : Daun Binahong, Fenolik, Anti Bakteri, *E. coli*, dan *S. aureus*.

Curr. Biochem. 7(1): 1-9



CURRENT BIOCHEMISTRY
ISSN: 2355-7877
e-ISSN: 2355-7931

Journal homepage: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/cbj>
Journal E-mail: current.biochemistry@gmail.com

CB Current
Biochemistry

Antibacterial Activity of Leaf Extracts of *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis and *Muntingia calabura* L. Against *Streptococcus pneumoniae*

Nuke Annisa Nasution¹, I Made Artika^{1*}, Dodi Safari²

¹Department of Biochemistry, IPB University, Bogor, 16680, Indonesia

²Eijkman Institute for Molecular Biology, Jalan Diponegoro 69, Jakarta, 10430

Received: 26 December 2019 ; Accepted: 20 January 2020

Corresponding author : I Made Artika, Department of Biochemistry, IPB University
e-mail: imart@ipb.ac.id

ABSTRACT

Antibacterial resistance in *Streptococcus pneumoniae* has been increasing and is one of ongoing global concern. The need to find new antibacterial agents against *Streptococcus pneumoniae* is of paramount importance. Medicinal plants are prospective sources of antibacterial agents. The aims of the present study were to determine the activity of leaf extract of *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis and *Muntingia calabura* L. against *Streptococcus pneumoniae*. Leaves of *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis were extracted using 96% ethanol, while the leaves of *Muntingia calabura* L. were extracted using 100% methanol. The leaf extracts of the two plants obtained were bioassayed for antibacterial activity against *Streptococcus pneumoniae* ATCC 49619 and a clinical isolate *Streptococcus pneumoniae* PU 067. Results showed that leaf extracts of both *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis and *Muntingia calabura* L. have antibacterial activity in vitro against *Streptococcus pneumoniae* ATCC 49619 at crude extract concentrations of 25%, 50%, 75% and 100% (w/v). Both plants extracts showed strongest activity against *S. pneumoniae* ATCC 49619 at extract concentration of 75%. In addition, the extracts of both plants have inhibitory activity against growth of the clinical isolate *Streptococcus pneumoniae* PU 067. Both plant extracts showed strongest activity against *S. pneumoniae* PU 067 at extract concentration of 100%. Therefore, leaf extracts of *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis and *Muntingia calabura* L. can potentially be used as a source of antibacterial agent for *Streptococcus pneumoniae*.

Keywords: Antibacterial agent, *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis, *Muntingia calabura* L., *Streptococcus pneumoniae*.

RIWAYAT HIDUP



Rasih ayu pratiwi, lahir di makassar pada tanggal 03 Juni 1996. Putri pertama dari dua bersaudara, anak dari bapak Rajamang dan ibu Yesih wiyarsih. Penulis memulai pendidikan formalnya di TK aisyah bustanul atfal Balikpapan Selatan pada tahun 2000-2002, kemudian melanjutkan sekolah di SDN 010 Balikpapan Selatan pada tahun 2002 hingga 2008. selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 14 Balikpapan Selatan dan lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan di SMKS Harapan Bhakti Balikpapan dan lulus pada tahun 2014. Ditahun yang sama penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswi di jurusan farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Semasa menjalani kuliah, penulis aktif didunia organisasi Himpunan Jurusan Farmasi. Penulis juga sempat mengabdikan diri sebagai asisten dosen pada beberapa praktikum di jurusan Farmasi.