

**STUDI LITERATUR TANAMAN YANG MEMILIKI AKTIVITAS
SEBAGAI IMUNOSTIMULAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

NURHIKMAH

70100117056

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawa ini

Nama : Nurhikmah
Nim : 70100117056
Tempat tanggal lahir : Gowa, 11 Oktober 1999
Jurusan : Farmasi
Alamat : Desa Sicini, Kecamatan Parigi
Judul : Studi Literatur Tanaman Yang Memiliki
Aktivitas Sebagai Imunostimulan

Menyatakan bahwa studi literatur yang kami buat ini benar adalah karya tulis kami. Jika kemudian hari terdapat bukti kopian, tiruan dan duplikasi dari skripsi orang lain maka studi literatur ini tidak sah dan melanggar hukum.

Gowa, 30 Agustus 2021

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM MASEJAH
ALAUDDIN
NURHIKMAH
70100117056
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berupa Studi Literatur yang berjudul "Studi Literatur Tanaman Yang Memiliki Aktivitas Sebagai Imunostimulan" yang disusun oleh Nurhikmah, Nim : 70100117056, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 30 Agustus 2021 M yang bertepatan dengan 22 Muharram 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 30 Agustus 2021 M
21 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A.	(.....)
Sekretaris	: Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si	(.....)
Pembimbing 1	: Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing 2	: Apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si	(.....)
Penguji 1	: Apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M. Farm	(.....)
Penguji 2	: Dr. St. Nasriah, M.Sos.I	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah swt karena berkat rahmat dan hidayahnya kami bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Studi literatur tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan”.

Tak lupa pula kami hantarkan salam dan shalawat atas junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan maupun rintangan yang penulis hadapi tetapi hambatan yang kami hadapi kami bisa lalui dengan adanya pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan kami serta kedua orang tua saya yaitu Bapak Latif dan Ibu jumalia terima kasih atas segala doa, bantuan, dukungan, semangat yang tiada henti – hentinya yang diberikan kepada kami sehingga kami mampu berada dititik ini dan menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar serjana Farmasi (S1) di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penyusun skripsi ini banyak pihak yang membantu kami dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Dr. H. M Fais Satrianegara, S.KM, MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Apt. Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
12. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si. selaku Pembimbing I yang selalu membimbing kami dan mengarahkan kami serta meluangkan waktunya demi terselesainya skripsi penulis.
13. Apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si. selaku Pembimbing II kami yang selalu mengarahkan dan membimbing kami demi terselesainya skripsi ini
14. Apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M. Farm. Selaku Penguji Kompetensi yang telah memberi saran maupun masukan demi kesempurnaan skripsi ini.

15. Dr. St. Nasriah, M.Sos.I. selaku Penguji Agama yang telah memberikan saran maupun kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
16. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen farmasi dan Staf jurusan farmasi, atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada kami selama ini.
17. Kepada teman seperjuang kami yaitu Farmasi Angkatan 2017 (Kovalen) yang selalu menyemangati kami, mensupport kami serta mendukung kami sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
18. Kepada seluruh kerabat yang senantiasa mendoakan kami, mendukung kami dan mensupport kami, saya ucapkan terima kasih banyak karena dengan adanya kalian skripsi ini bisa terselesaikan.

Kami sebagai penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Namun penulis berharap dengan adanya skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti – peneliti selanjutnya.

Gowa, 30 Agustus 2021

Penulis

Nurhikmah

NIM : 70100117056

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	3
1.3 Tujuan	3
BAB II METODE	5
2.1 Strategi pencarian literatur	5
2.1.1 Fremwork	5
2.1.2 Kata kunci	7
2.1.3 Database atau search engine.....	7
2.2 Kriteria inklusi dan eksklusi dalam seleksi studi	7
2.3 Seleksi studi dan penilaian kualitas.....	8
2.3.1 Kata kunci kunci yang digunakan	8
2.3.2 Daftar artikel hasil pencarian	9
BAB III HASIL DAN ANALISIS	12
3.1 Hasil	12

3.2 Analisis.....	12
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
4.1 Imunostimulan.....	29
4.2 Macam – Macam Sistem Imun	30
4.2 Tanaman Yang Memiliki Aktivitas Sebagai Imunostimulan.....	32
4.3 Metode Ekstraksi Tanaman Yang Memiliki Aktivitas Imunostimulan	42
4.4 Metode Pengujian Tanaman Yang Memiliki Aktivitas Imunostimulan ...	45
4.5 Tinjauan Islam Tentang Tanaman Yang Memiliki Akvitas sebagai Imunostimulan.....	42
BAB V PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	61
RIWAYAT HIDUP.....	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Fremwork penelitian	5
Tabel 2. Kriteria inklusi dan eksklusi	7
Tabel 3. Daftar artikel hasil seleksi.....	9
Tabel 4. Hasil dan analisis artikel	10
Tabel 5. Tanaman yang memiliki aktivitas imunostimulan	39
Tabel 6. Metode ekstraksi tanaman yang memiliki aktivitas imunostimulan.....	43
Tabel 7. Metode pengujian tanaman yang memiliki aktivitas imunostimula	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka penelitian.....6



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema kerja seleksi studi artikel.....	61
Lampiran 2. Situs pencarian pustaka.....	62
Lampiran 3. Screenshot jurnal	68
Lampiran 4. Gambar tanaman.....	74



ABSTRAK

Nama : Nurhikmah
Nim : 70100117056
Judul skripsi : Studi Literatur Tanaman Yang Memiliki Aktivitas Sebagai Imunostimulan

Imunostimulan mampu meningkatkan kerja sistem kekebalan tubuh baik yang spesifik maupun yang non spesifik. Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui tanaman apa saja yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan, bagian tanaman, jenis metode ekstraksi, jenis metode pengujian dan kandungan tanaman dengan menggunakan metode PICO melalui kriteria inklusi dan eksklusi. Kata kunci yang digunakan yaitu tanaman imunostimulan, *immunostimulant plant herbal*, *standardization immunostimulant plant isolates* dan *standardization immunostimulant plant extract* dengan data base yang digunakan yaitu PubMed, ScienceDirect dan Google scholar. Dari hasil analisis jurnal terdapat 12 tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan yaitu umbi bawang putih (*Allium sativum*), buah rasberi (*Rubus fruticosus*), brotowali (*Tinospora crispa*), akar panax ginseng (*Panax qunquefolius*), daun mangga (*Mangifera indica*), rimpang kunyit (*Curcuma domestica rhizome*), daun benalu (*Loranthus micranthus Lin*), daun mimba (*Azadirachta indica*), biji jintam hitam (*Carum copticum*), bunga kasumba turate (*Carthamus tictorius L*), bunga *Gentiana olivieri griseb* dan daun flamboyan (*Delonix regia*). Metode ekstraksi yang digunakan yaitu metode maserasi, refluks dan sohxlet. Dan untuk pengujian tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan dilakukan dengan uji hipersensitivitas tipe lambat, uji titer antibodi dan uji bersihan karbon. Dan kandungan senyawa yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan yaitu lektin, polisakarida, monosakarida, lipopolisakarida, flavonoid, triterpenoid, minyak atsiri, curcumin, alkaloid dan tanin.

Kata kunci: *Imunostimulan, Isolat tanaman, ekstrak tanaman*

ABSTRACT

Nama : Nurhikmah
Nim : 70100117056
Judul skripsi : Study Of Literature Plants That Have Activity As Immunostimulants

Immunostimulants are able to increase the work of the immune system, both specific and non-specific. This literature study aims to find out which plants have immunostimulant activity, plant parts, types of extraction methods, types of testing methods and plant content using the PICO method through inclusion and exclusion criteria. The keywords used are immunostimulant plants, herbal immunostimulant plants, standardization immunostimulant plant isolates and standardization immunostimulant plant extracts with the data bases used are PubMed, ScienceDirect and Google scholar. From the results of the journal analysis, there are 12 plants that have activity as immunostimulants, namely garlic bulbs (*Allium sativum*), raspberries (*Rubus fruticosus*), brotowali (*Tinospora crispa*), roots of panax ginseng (*Panax qunquefolius*), mango leaves (*Mangifera indica*), rhizomes turmeric (*Curcuma domestica rhizome*), parasite leaf (*Loranthus micranthus Lin*), neem leaf (*Azadirachta indica*), black cumin seed (*Carum copticum*), kasumba turate flower (*Carthamus tictorius L*), *Gentiana olivieri griseb* and flamboyant leaf (*Delonix regia*). The extraction methods used are maceration, reflux and Soxhlet methods. And for testing plants that have activity as immunostimulants, it is carried out with delayed type hypersensitivity test, antibody titer test and carbon clearance test. And the content of compounds that have activity as immunostimulants are lectins, polysaccharides, monosaccharides, lipopolysaccharides, flavonoids, triterpenoids, essential oils, curcumin, alkaloids and tannins.

Keywords: *Immunostimulan, plant Isolates, plant extracts*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang memiliki keanekaragaman obat tradisional yang dibuat dari bahan-bahan alami termasuk tanaman. Tidak kurang dari 30.000 spesies tumbuhan ada di hutan tropis Indonesia. Dari jumlah tersebut sekitar 7000 spesies yang diketahui memiliki khasiat obat namun semuanya dimanfaatkan secara optimal sebagai obat herbal atau dapat juga dijadikan sebagai tanaman obat oleh masyarakat banyak (Jumiarni & Komalasari, 2017).

Tanaman dan obat tradisional sejak zaman dahulu mempunyai peranan penting dalam menjaga kesehatan tubuh, mempertahankan stamina dan mengobati segala penyakit. Oleh karena itu tanaman dan obat tradisional telah berakar kuat dan menyebar dalam kehidupan sebagian masyarakat hingga saat ini (Parawansah et al., 2020).

Tanaman sering digunakan sebagai bahan baku yang biasa digunakan dalam obat tradisional dan jamu, yang apabila dikonsumsi dapat meningkatkan kekebalan tubuh (*immune system*) karena tanaman ini mempunyai sifat spesifik sebagai tanaman obat yang bersifat pencegahan (*preventif*) dan promotif melalui kandungan metabolik sekunder contohnya seperti pada jahe dan pada temulawak yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh (Pertiwi et al., 2020).

Setiap hari tubuh kita selalu menghadapi berbagai ancaman yang datang dari luar yang berupaya masuk ke dalam tubuh manusia dengan berbagai macam cara. Terdapat jutaan mikroorganisme, virus, bakteri dan patogen lainnya yang bisa masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara seperti melalui sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan juga bisa melalui permukaan kulit. Walaupun

besarnya ancaman yang membahayakan tubuh kita, Maha besar Allah yang telah mempersiapkan dan memberikan sebuah sistem di dalam tubuh manusia yang dapat menangkal masuknya serangan tersebut melalui sistem pertahanan tubuh atau disebut sistem imun tubuh (Aripin, 2019).

Sistem imun merupakan sistem pertahanan tubuh terhadap berbagai patogen seperti virus, bakteri, parasit, jamur serta sel-sel tumor. Sistem imun dapat mengenali dan membunuh patogen melalui mekanisme sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Meskipun demikian, patogen dan sel tumor juga memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan terhadap sistem imun sehingga dibutuhkan suatu substansi dari luar untuk membantu meningkatkan kinerja dan mencegah dampak patologis dari sistem imun (Nafis et al., 2020).

Imunostimulan adalah stimulasi sel – sel sistem kekebalan tubuh yang menginduksi reaksi spesifik antigen atau menghasilkan limfosit spesifik. Dimana imunostimulan juga mampu meningkatkan kerja komponen sistem kekebalan tubuh baik yang spesifik maupun non spesifik (sistem imun bawaan) (Skerfving S, Bergdahl I., 2015).

Bahan aktif dalam tanaman yang diduga dapat memodulasi sistem imun adalah polisakarida, flavonoid, fenolik, polifenol, alkaloid, kuinon, terpenoid, lektin, dan polipeptida (Nafis et al., 2020).

Meskipun tanaman telah digunakan sebagai imunostimulan selama ribuan tahun, aktivitas imunostimulasi telah dipelajari paling banyak pada tikus, ayam, dan manusia. Dalam budidaya tanaman juga digunakan sebagai kemoterapi dan adiktif pakan yang memiliki khasiat untuk meningkatkan kemampuan pertumbuhan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kemampuan antimikroba, merangsang nafsu makan, menjaga kesehatan tubuh dan karakteristik anti stres. Beberapa tumbuhan mengandung senyawa fenolik, polifenol, alkaloid, kuinon,

terpenoid, lektin, dan polipeptida yang banyak di antaranya merupakan alternatif efektif untuk antibiotik, bahan kimia, vaksin, dan senyawa sintetis lainnya. Dan bagian tanaman yang dapat digunakan yaitu bagian daun, akar, batang, bunga, kulit batang, rimpang biji dan bagian lainnya (Van Hai, 2015).

Beberapa tanaman dengan potensi imunomodulator telah direkomendasikan oleh beberapa peneliti. Tanaman tersebut berasal dari spesies *Viscum album*, *Panax ginseng* dan *Tinospora cordifolia*, tanaman tersebut telah terbukti telah mengubah fungsi kekebalan. Penggunaan tumbuhan dengan efek imunostimulan pada pasien dilaporkan memberikan toksisitas dan efek samping yang lebih sedikit. Peneliti di seluruh dunia berfokus untuk menjelajah tumbuhan obat dan bahan turunan tumbuhan yang dapat mengubah respons imun tertentu. Dengan demikian, zat alami tersebut bisa menggantikan kemoterapi konvensional untuk modulasi respon imun, terutama yang terganggu respon imunnya (Kumolosasi et al., 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan studi literatur yaitu untuk mengetahui tanaman apa saja yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan dan kandungan tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan.

1.1 Rumusan Masalah

1.2.1 Tanaman apa saja yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan?

1.2.1 Apa saja bagian tanaman, jenis metode ekstraksi, metode pengujian dan kandungan tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan?

1.2 Tujuan

1.3.1 Untuk mengetahui tanaman apa saja yang memiliki aktivitas imunostimulan

1.3.2 Untuk mengetahui bagian tanaman, jenis metode ekstraksi, metode pengujian dan kandungan tanaman yang memiliki aktivitas imunostimulan



BAB II

METODE

2.1 Strategi Pencarian Literatur

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Metode studi literatur merupakan rangkaian penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan, penapisan, pembacaan, ekstraksi dan analisis data pustaka serta kajian antar kepustakaan yang diolah dalam proses penelitian (Eriksen & Frandsen, 2018).


2.1.1 Framework

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode PICO (*Population, Interventions, Comparison* dan *Outcome*).

Tabel 1. Framework penelitian

P	I	C	O
<i>Population</i>	<i>Intervention</i>	<i>Comparison</i>	<i>Outcome</i>
Tanaman yang memiliki aktivitas imunostimulan	Bagian tanaman, metode ekstraksi metode pengujian dan kandungan tanaman	Pembanding kontrol dalam setiap penelitian	Aktivitas imunostimulan dari tanaman

Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan berdasarkan kerangka berikut:



Gambar 1. Kerangka penelitian

2.1.2 Kata Kunci

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur yaitu *Immunostimulant herbal plants*, *Standardization immunostimulant plant isolates* dan *Standardization immunostimulant plant extract* dan tanaman imunostimulan

2.1.3 Database atau search engine

Data base atau search engine yang digunakan dalam penelusuran pustaka yaitu *PubMed* (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>) dan *science direct* (<https://www.sciencedirect.com/>) dan google scholar.

2.2 Kriteria Inklusi dan eksklusi dalam seleksi studi

Kriteria yang digunakan dalam pencarian dan pengumpulan artikel disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi	Kriteria eksklusi
1. Rentang waktu publikasi jurnal maksimal 10 tahun terakhir (2011-2021)	1. Isi dari jurnal tidak membahas tentang tanaman yang memiliki aktivitas imunostimulan
2. Berbahasa inggis dan berbahasa indonesia	2. Metode penelitian tidak jelas
3. Subjek penelitian yaitu tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan	
4. Tipe jurnal termasuk <i>original research article</i> atau <i>review artikel</i>	
5. Kriteria jurnal memiliki <i>International Standard Serrial Number (ISSN)/ DOI</i>	
6. Ketersediaan naskah <i>full text</i>	

7. Jurnal nasional dan internasional	
8. Jurnal duplikasi (dipilih salah satu)	

2.3 Seleksi studi dan penilaian kualitas

2.3.1 Kata kunci yang digunakan

Hasil penelusuran literatur disajikan pada tabel dibawah ini:

Data base	Kata kunci	Jumlah artikel		
		Inklusi	Eksklusi	Akhir
PudMed	Tanaman imunostimulan	2	2	0
	<i>Immunostimulant herbal plants</i>	115	113	2
	<i>Standart immunostimulant plant isolates</i>	20	18	2
	<i>Standardization immunostimulant plant extract</i>	41	40	2
Science direct	Tanaman imunostimulan	0	0	0
	<i>Immunostimulant herbal plants</i>	136	134	2
	<i>Standardization immunostimulant plant isolates</i>	45	44	1
	<i>Standardization immunostimulant plant extract</i>	153	152	1
Google scholar	Tanaman imunostimulan	11	10	1
	<i>Immunostimulant herbal plants</i>	20	20	0
	<i>Standart immunostimulant plant isolates</i>	1	1	0
	<i>Standardization immunostimulant plant extract</i>	1	1	0
Jurnal yang sama				3
Total pustaka yang dianalis dan dibahas				11

2.3.2 Daftar Hasil Pencarian Artikel

Artikel hasil pencarian yang telah diseleksi dibawah ini yang memuat judul, penulis, tahun, nomor DOI/ISSN dan kriteria jurnal:

Tabel 3. Daftar Artikel Hasil Seleksi

No	Judul	Penulis dan Tahun	ISSN/DOI	Kriteria jurnal
1	Immunomodulatory activity of a lupane triterpenoid ester isolated from the eastern Nigeria mistletoe, <i>Loranthus Micranthus</i> (Linn)	Ogechukwu et al., 2011	10.1016/S19957645(11)60137-5.	Q3
2	Stimulation of IFN- γ production by <i>Garlic</i> lectin mouse spleen cells: involvement of IL-12 via activation of P 38 MAPk and erk in macrophages	Dong et al., 2011	10.1016/j.phymed.2010.06.008.	Q1
3	Isolation and characterization of glucosamine from <i>azadirachta indica</i> leaves: An evaluation of immunostimulant activity in mice	Kumar et al., 2012	10.1016/S22211691(12)60453-5	Q2
4	Phytochemical chromatographic and spectroscopil investigation of	Taylor et al., n.d.2015	ISSN 1744-5116	Q1

	carum coptikum seeds and their potential as immunomodulatory agent			
5	Immunostimulatory effects of the standardized extract of <i>Tinospora crispa</i> on innate immune responses in Wistar Kyoto rat	(Ahmad et al., 2015)	https://doi.org/10.2147/DDDT.S85405	Q1
6	Raspberry pulp polysaccharides inhibit tumor growth via immunopotention and enhance ducetaxel chemotheray againt malignant melanoma in vivo	Yang et al., 2015	10.1039/c5fo00389j	Q1
7	Isolation purification characterization and immunostimulatory activity of polysaccharides derived from Amerika ginseng	Yu et al., 2017	http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.	Q1
8	Immunostimulant activity of standardised extract of mangifera indica leaf and curcuma domestica rhizome in mice	Kumolosasi et al., 2018	10.4314/tjpr.v17i1.12	Q3

9	Structural elucidation and immune-enhancing activity of an arabinogalactan from flowers of <i>Carthamus tinctorius</i> L	Yao et al., 2018	https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.08.098	Q1
10	Immunomodulatory activity of butanol fraction of <i>Gentiana olivieri</i> Griseb. on Balb/C mice	Singh et al., 2012	10.1016/S2221-1691(12)60071-9.	Q2
11	Potensi ekstrak daun flambayon (<i>Delonix regia</i>) terhadap peningkatan aktivitas dan kapasitas makrofag	Rosnizar et al., 2017	ISSN: 2597-6753	S1

BAB III
HASIL DAN ANALISIS

3.1 Hasil

Hasil penelusuran jurnal dengan kriteria inklusi yang diterapkan dari data base PubMed dan Science Direct diperoleh sebanyak 545 artikel, dieksklusi sebanyak 532 jurnal dan tersisa 11 artikel. Jumlah keseluruhan artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis adalah sebanyak 11 artikel.

3.1 Analisis

Hasil analisis artikel disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil analisis Artikel

No	Judul Penulis dan tahun	<i>Population</i>	<i>Intervention</i>	<i>Comparison</i>	<i>Outcome</i>
1.	Immunomodulatory activity of a lupane triterpenoid ester isolated from the eastern Nigeria mistletoe, <i>Loranthus micranthus</i> (Linn) (Ogechukwu et al., 2011)	<i>Loranthus micranthus</i> (Lin)	Bagian tanaman: Daun Metode ekstraksi: Daun benalu (<i>Loranthus micranthus</i> Lin) dibersihkan dan dikeringkan kemudian diahancurkan untuk menghasilkan serbuk. Serbuk daun ditimbang sebanyak 200 g dan diekstraksi dengan metanol sebanyak	Kontrol yang digunakan kontrol negatif yaitu suspensi Sheep red blood cell (SRBC) 0,1 ml	Hasil ester triterpenoid menghasilkan beberapa peningkatan splenosit pada dosis 5 g/ml menyebabkan penghambatan ekspresi reseptor interleukin 8 (IL-8) maka dapat disimpulkan bahwa tanaman benalu (<i>Loranthus micranthus</i> Lin) memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Dimana triterpenoid memiliki kemampuan

			<p>500 ml menggunakan ekstraktor soxhlet. Kemudian pelarut dihilangkan dalam vakum menggunakan evaporator lalu ekstrak disimpan dalam botol yang bersih dan disimpan dalam lemari es sampai ingin digunakan</p> <p>Metode pengujian: Menggunakan uji titer antibodi</p> <p>Kandungan tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan: Triterpenoid</p>		<p>sebagai imunostimulan pada splenosit dan reseptor interleukin 8 (IL-8)</p>
2.	Stimulation of IFN- γ production by garlic	Bawang putih	<p>Bagian tanaman: Umbi bawang putih</p>	Kontrol yang digunakan yaitu sikloheksimida 0,14 g/ml	<p>lektin bawang putih menginduksi interleukin 12 (IL-12) melalui</p>

	<p>lectin mouse spleen cells: involvement of IL-12 via activation of P 38 MAPk and erk in macrophages</p> <p>(Dong et al., 2011)</p>		<p>Metode ekstraksi: Umbi bawang putih sebanyak 200 g dicampur dengan air suling sebanyak 200 ml lalu dihomogenkan selama 2 menit pada suhu kamar, lalu dipanaskan selama 30 menit pada suhu 80°C lalu disaring menggunakan kertas saring.</p> <p>Metode pengujian: Menggunakan uji titer antibodi</p> <p>Kandungan senyawa tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan: lektin</p>		<p>aktivitas P 38 MHPK dan ERK di makrofag tikus dan menstimulasi IFN produksi melalui peningkatan IFN-MRNA dalam sel limpa hasil menunjukkan bahwa produksi IFN diinduksi lektin mempromosikan pembentukan sel T tipe th 1 dan meningkatkan sistem kekebalan untuk melindungi terhadap infeksi virus</p>
--	--	--	--	--	---

3.	<p>Isolation and characterization of glucosamine from azadirachta indica leaves: An evaluation of immunostimulant activity in mice</p> <p>(Kumar et al., 2012)</p>	Azadirachta Indica	<p>Bagian tumbuhan: Daun</p> <p>Metode ekstraksi: daun daun mimba (<i>Azadirachta Indica</i>) dibersihkan dan dikeringkan kemudian daun yang kering di potong-potong kecil dan dibuat menjadi serbuk kasar dan melewati saringan mesh 10. Kemudian daun direndam sebanyak 660 g dalam 3 liter pelarut dengan polaritas berbeda (heksan, kloroform, metanol dan air) dengan ekstraksi dingin dalam labu alas bulat. Gujangan dilakukan dengan</p>	Kontrol yang digunakan yaitu AILG (glukosamin) melalui injeksi intraperitoneal	<p>Daun mimba (<i>Azadirachta indica</i>) ditemukan sebagai komponen aktif yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan pada tikus albino. Pemberian dosis 266, 400 dan 800 g/kg menyebabkan AILG meningkat secara signifikan dan kadar serum interleukin 2 (IL-2) pada tikus. Maka dapat disimpulkan bahwa glukosamin yang diisolasi dari daun mimba (<i>Azadirachta indica</i>) memiliki aktivitas imunostimulan pada tikus.</p>
----	--	--------------------	--	--	---

			<p>selang waktu 45 menit. Setelah 72 jam ekstraksi di saring dan dipekatkan menggunakan rotary evapokator dan disimpan pada suhu kamar.</p> <p>Metode pengujian: Menggunakan uji hipersensitivitas tipe lambat.</p> <p>Kandungan senyawa tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan: polisakarida</p>		
4	Phytochemical chromatographic and spectroscopic investigation of carum coptikum seeds and	Jintan	<p>Bagian tanaman: Biji jintan</p> <p>Metode ekstraksi: Biji jintan (<i>Carum coptikum</i>) diambil sebanyak</p>	Kontrol yang digunakan yaitu suspensi gumakasia 3% dan kontrol positif levamisol 2,5 mg/kg	Aktivitas imunomodulator dari ekstrak kasar fraksi dan minyak yang diisolasi dari biji jintan hitam (<i>Carum coptikum</i>) dievaluasi dengan Glc dan

	<p>their potential as immunomodulatory agent</p> <p>(Taylor et al., n.d. 2015)</p>		<p>400 g kemudian diekstraksi menggunakan etanol 95% v/v lalu diuapkan dibawa vakum menggunakan putaran dasar IKA-RV10 evaporator dan setelah itu ekstrak dikeringkan dalam desikator dibawa tekanan untuk pengeringan total.</p> <p>Metode pengujian: Menggunakan uji hipersensitivitas tipe lambat.</p> <p>Kandungan senyawa tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan: minyak atsiri</p>	<p>HPLC. Ekstrak alkohol biji jintan (<i>Carum coptikum</i>) dari senyawa yang diisolasi pada dosis 500, 150 dan 50 mg/g menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam titer hemaglutinasi (HA), respon delayed tipe hipersensitivity (DTH) dan fogositosis. Maka dapat disimpulkan bahwa biji jintan hitam (<i>Carum coptikum</i>) memiliki aktivitas sebagai imunostimulan.</p>
--	--	--	---	---

5.	<p>Immunostimulatory effect of the standardized extract of <i>tinospora crispa</i> on innate immune responses in wistar kyoto rats</p> <p>(Ahmad et al., 2015)</p>	Brotowali	<p>Bagian tanaman: seluruh bagian tanaman brotowali</p> <p>Metode ekstraksi: Semua bagian tanaman brotowali dimaserasi dengan menggunakan alkohol 80% pada suhu kamar selama 72 jam. Kemudian disaring lalu filtratnya dikumpulkan, kelebihan pelarut diuapkan pada tekanan tereduksi menggunakan rotary evaporator pada suhu 55°C dan 66°C.</p> <p>Metode pengujian: Menggunakan uji titer antibodi.</p>	Kontrol yang digunakan yaitu concanavalin A 5µg/ml	<p>Pada sampel brotowali dosis yang berpengaruh yaitu pada dosis 400 mg/kg dimana dapat meningkatkan respon imun yang diperantarai oleh sel Th 1 (TNF-α –IL-2 dan IFN-γ) dan Th 2 (IL-4) dan menunjukkan bahwa ekstrak brotowali meningkat secara signifikan dalam serum tikus yang diobati dengan dosis yang berbeda. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa brotowali memiliki aktivitas sebagai imunostimulan dan memiliki potensi terapeutik untuk pencegahan penyakit imun. Kandungan senyawa yang memiliki aktivitas</p>
----	--	-----------	--	--	--

			<p>Kandungan senyawa tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan: lipopolisakarida</p>		<p>sebagai imunostimulan adalah lipopolisakarida</p>
6.	<p>Raspberry pulp polysaccharides inhibit tumor growth via immunopotention and enhance docetaxel chemotherapy against melanoma in vivo</p> <p>(Yang et al., 2015)</p>	Rasberi	<p>Bagian tanaman: Buah rasberi</p> <p>Metode ekstraksi: Serbuk buah rasberi diekstraksi dua kali dengan petroleum eter pada suhu kamar selama 24 jam. Kemudian diekstraksi dengan etanol 80% pada suhu 60°C selama 2 jam. Ekstraksi polisakarida dilakukan melalui USG pada suhu 60°C selama 2 jam. Filtrat kemudian digabungkan dan</p>	<p>Kontrol yang digunakan yaitu obat docetaxel</p>	<p>Mekanisme yang mendasari aktivitas anti-tumor telah diselidiki hasilnya dan menunjukkan bahwa Rasbery tidak menunjukkan efek sitotoksik langsung pada se HT-29, MGC-803, Bel-7402 dan B16F10, ini menunjukkan penghambatan pertumbuhan tergantung dosis dan dosis yang mengalami penghambatan yaitu 400 mg/kg dan dapat berpotensi sebagai agen imunopotensi dimana efek imunopotensi yang terjadi yaitu peningkatan sistem</p>

			<p>dipekatkan dalam vakum menggunakan flash evapokator pada suhu 60°C.</p> <p>Metode pengujian: Menggunakan uji hipersensitivitas tipe lambat.</p> <p>Kandungan senyawa tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan: polisakarida</p>		kekebalan pada tikus pembawa tumor. Maka dapat disimpulkan bahwa rasberi memiliki efek imunostimulan.
7.	<p>Isolation purification characterization and immunostimulatory activity of polysaccharides derived from amerika ginseng</p> <p>(Yu et al., 2017)</p>	Ginseng	<p>Bagian tanaman: Akar</p> <p>Metode ekstraksi: Akar panas ginseng diekstraksi menggunakan etil alkohol 95% pada suhu 90°C selama 4 jam dibawa refluks untuk</p>	Pembanding kontrol yang digunakan yaitu polisakrida mentah	Efek imunostimulan dari ekstrak akar ginseng pada limfa proliferasi, limfosit, fugositosis makrofag dan produksi oksida nitrat diselidiki secara invitro menunjukkan bahwa stimulasi sebagai SPS-3>, SPS-1> CPS (polisakarida mentah) >

			<p>menghilangkan kotoran yang larut dalam alkohol dan residu diekstraksi selama 3 kali dengan menggunakan air suling dengan perbandingan 25:1 (b/b) selama 3 jam. Setelah disentrifugasi lalu dipekatkan dalam putaran evaporator dibawa tekanan tereduksi lalu ditambahkan etanol sebanyak 4 kali kedalam konsentrat untuk mengendapkan polisakarida pada suhu 4°C lalu endapan tersebut dikumpulkan dan dicuci dengan menggunakan etanol absolut,</p>	<p>WPS-1>, WPS-2>, SPS-2. Dari hasil menunjukkan bahwa fraksi SPS-3 memiliki aktivitas sebagai imunostimulan yang lebih kuat dan mungkin dieksplorasi sebagai agen imunopotensi potensial untuk digunakan dalam makanan fungsional maupun obat.</p>
--	--	--	---	---

			<p>aseton dan ester. Kemudian disimpan dalam desikator pada suhu kamar selama digunakan nanti.</p> <p>Metode pengujian: Menggunakan uji bersihan karbon.</p> <p>Kandungan senyawa tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan: Monosakarida</p>		
8.	Immunostimulant activity of standardized extract of mangifera indica leaf and curcuma domestica rhizome in mice	Daun mangga dan rimpang kunyit	<p>Bagian tanaman: Daun mangga dan rimpang temulawak.</p> <p>Metode ekstraksi: Daun mangga dan rimpang kunyit dibersihkan dan</p>	kontrol yang digunakan yaitu suspensi Sheep red blood cells (SRBC)	Dalam penelitian Daun mangga dosis yang digunakan yaitu 160 mg/kg dan pada rimpang kunyit dosis yang digunakan yaitu 200 mg/kg dan memiliki menunjukkan aktivitas yang bertindak sebagai

	(Kumolosi et al., 2018)		<p>dikeringkan kemudian diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi dengan pelarut metanol 95% selama 3 kali. Kemudian ekstrak disaring dengan kertas whatman no 1 kemudian pelarut diuapkan menggunakan ratovapor dan disimpan pada suhu kamar.</p> <p>Metode pengujian: Menggukan a uji hipersensitivitas tipe lambat.</p> <p>Kandungan senyawa tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan: Daun</p>	<p>imunostimulan yang ampuh meningkatkan sistem imun bawaan dan adaptif. Penemuan juga mengungkapkan bahwa rimpang kunyit memiliki aktivitas imunostimulan yang lebih kuat dari daun mangga.</p>
--	-------------------------	--	--	--

			mangga mengandung flavanoid sedangkan rimpang kunyit mengandung senyawa kurkumin		
9.	Structural elucidation and immune-enhancing activity of a arabinogalactan from flowers of <i>Carthamus tictorius L</i> (Yao et al., 2018)	Kasumba turate	Bagian tanaman: Bunga Metode ekstraksi: Bunga kasumba turate (<i>Carthamus tictorius L</i>) dibersihkan dikeringkan kemudian dihancurkan menjadi serbuk kasar . serbuk kasar ditimbang sebanyak 1,5 kg lalu direndam dengan menggunakan alkohol 95% dilakukan 2 kali dalam 3 hari. Kemudian residu diekstraksi dengan air mendidih selama 3	kontrol yang digunakan yaitu concavalin A dan polymixn B	Tanaman kasumba turate (<i>Carthamus tictorius L</i>) memiliki aktivitas biologis yang menunjukkan bahwa polisakarida dari tanaman kasumba turate (<i>Carthamus tictorius L</i>) memiliki aktivitas sebagai peningkat kekebalan dengan berbagai cara dan melalui aktivitas persinyalan nuclear factor – kappa beta (NF-KB) dan meningkatkan ekspresi tumor necrosis factor-alfa interleukin – interleukin beta dan inducible nitric oxide synthase (TNF- α IL-1 β)

			<p>jam (3 kali) lalu dipekatkan dan dideproteksi dengan perlakuan asam trikloroasetat 15% setelah netralisasi dan sentrifugasi kemudian dipekatkan dan diendapkan dengan alkohol 95% untuk mendapatkan polisakarida</p> <p>Metode pengujian: Menggunakan uji titer antibodi</p> <p>Kandungan senyawa tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan: Polisakarida</p>		<p>dan iNOS) dalam limfosit dan makrofag.</p>
--	--	--	--	--	---

10	<p>Immunomodulatory activity of butanol fraction of <i>Gentiana olivieri griseb</i> on balb/C mice</p> <p>(Singh et al., 2012)</p>	Bunga	<p>Bagian tanaman: Bunga</p> <p>Metode ekstraksi: Bagian bunga sebanyak 1 kg dimaserasi menggunakan etanol 80% selama 70 jam kemudian pelarut disaring dan dikeringkan lalu diekstraksi kembali sebanyak 3 kali. Kemudian pelarut diuapkan pada rotovapor dan diliofilisasi untuk mendapatkan rendemen 37 gram dari ekstrak etanol bunga <i>Gentiana olivieri griseb</i> lalu diolah dengan butanol untuk mendapatka</p>	Kontrol yang digunakan yaitu siklofosfamid 250 mg/kg	<p>Ekstrak etanol dan fraksi butanol bunga <i>Gentiana olivieri griseb</i> dengan dosis 50, 100 dan 200 mg. Pada dosis 200 mg signifikan meningkatkan antibodi humoral sekunder dibandingkan dengan kontrol. Hasil penelitian menyatakan bahwa tanaman bunga <i>Gentiana olivieri griseb</i> memiliki efek imunostimulan pada tikus dengan bertindak melalui sel dan imunitas humoral dalam model eksperimental imunitas pada tikus</p>
----	--	-------	--	--	---

			<p>n fraksi butanol.</p> <p>Metode pengujian: Menggunakan uji titer antibodi.</p> <p>Kandungan senyawa tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan yaitu: Polisakarida</p>		
11.	<p>Potensi ekstrak daun flamboyan (<i>Delonix regia</i>) terhadap peningkatan aktivitas dan kapasitas makrofag</p> <p>(Rosnizar et al., 2017)</p>	Daun flamboyan	<p>Bagian tanaman: Daun</p> <p>Metode ekstraksi: Pertama tama daun flamboya dibersihkan kemudian dikeringkan dan dihaluskan sampai menjadi serbuk kasar. Serbuk kasar daun flamboyan sebanyak 500 gram dimaserasi menggunakan metanol</p>	<p>Kontrol yang digunakan yaitu kontrol positif Stimuno dosis 455 mg/kg bb</p>	<p>Pada ekstrak daun flamboyan ada beberapa dosis yang digunakan yaitu 250, 500 dan 750 mg/kg bb. Pada dosis 750 mg/kg bb mampu meningkatkan aktivitas dan kapasitas fagositosis oleh makrofag pada peritoneum mencit. Maka dapat disimpulkan bahwa daun flamboyan memiliki aktivitas sebagai imunostimulan</p>

			<p>dan direndam selama 3 hari. Setelah itu filtrat dan pelarut dipisahkan lalu diuapkan menggunakan rotary evaporator sampai diperoleh ekstrak.</p> <p>Metode pengujian: Menggunakan uji bersihan karbon.</p> <p>Kandungan senyawa yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan yaitu: Flavanoid</p>	
--	--	--	---	--

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Imunostimulan

Sistem kekebalan tubuh memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesehatan manusia. Sistem kekebalan yang tidak berfungsi dengan baik menyebabkan berbagai penyakit seperti radang sendi, kolitis ulserativa, asma, alergi, kanker dan penyakit menular. Penyakit seperti itu, yang disebabkan oleh modulasi sistem imun. Zat yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dikenal sebagai imunomodulator. Imunomodulator dapat dibagi menjadi dua yaitu imunostimulan (meningkatkan fungsi sistem imun) dan immunosupresi (menekan respon imun) (Kumolosasi et al., 2018).

Sistem imun merupakan sistem pertahanan tubuh terhadap berbagai patogen seperti virus, bakteri, parasit, jamur serta sel-sel tumor. Sistem imun dapat mengenali dan membunuh patogen melalui mekanisme sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif (Nafis et al., 2020).

Imunostimulan adalah stimulasi sel – sel sistem kekebalan tubuh yang yang menginduksi reaksi spesifik antigen atau menghasilkan limfosit spesifik. Dimana imunostimulan juga mampu meningkatkan kerja komponen sistem kekebalan tubuh baik yang spesifik maupun non spesifik (sistem imun bawaan) (Skerfving S, Bergdahl I., 2015).

Pada manusia terdapat sistem imun dengan kemampuan yaitu dapat membedakan antara zat asing atau lebih dikenal dengan antigen dan zat yang berasal dari tubuh sendiri. Namun pada beberapa kondisi, sistem imun tidak mampu untuk membedakan antara zat asing yang berasal dari luar tubuh dengan zat yang berasal dari tubuh itu sendiri sehingga sel-sel pada sistem imun mulai membentuk zat anti terhadap jaringan tubuhnya yaitu autoantibodi. Respon imun

Pada tubuh merupakan suatu respon dari semua komponen sistem imun yang secara bersamaan terkoordinasi dalam melakukan eliminasi zat asing atau yang masuk ke dalam tubuh. Pada proses ini diawali dengan tahap adanya pengenalan molekul zat asing oleh komponen sistem imun yang melalui reseptor yang menstimulasi sistem saraf pada otak dengan tujuan membangkitkan serta melakukan reaksi yang tepat untuk mengeliminasi zat asing tersebut (Antasari, 2017).

4.2 Macam-macam sistem imun

Sistem imunitas tubuh terbagi menjadi 2 yaitu sistem imunitas non-spesifik dan sistem imunitas spesifik.

1. Sistem imun non-spesifik

Sistem imun non-spesifik atau disebut imunitas bawaan (*innate immunity*) merupakan suatu respon imun terhadap paparan zat asing (antigen) yang terjadi walaupun sebelumnya pada tubuh belum pernah terpapar zat tersebut. Zat asing yang masuk ke dalam tubuh akan dihancurkan dengan adanya sistem imun nonspesifik melalui proses fagositosis sehingga dalam hal ini neutrofil, makrofag dan monosit memiliki peran yang sangat penting. Pada proses fagositosis sel- sel fagositosis berada dalam jarak yang dekat dengan partikel zat asing seperti bakteri atau bisa dikatakan zat asing tersebut harus melekat ke permukaan fagosit sehingga untuk dapat mencapai sasaran fagosit harus bergerak. Dilepasnya mediator atau zat tertentu dari sel makrofag, neutrofil atau komplemen yang sudah berada dilokasi sehingga dapat terjadi fagositosis (menelan patogen) (Ida et al., 2017).

Sistem imun non-spesifik (sistem imun bawaan) adalah garis pertahanan pertama terhadap agen infeksi dan sebagian besar patogen potensial. Individu yang sehat dilindungi mikroorganisme yang berpotensi berbahaya dilingkungan

oleh sejumlah mekanis efektif yang ada sejak lahir, yang tidak tergantung pada paparan sebelumnya terhadap mikroorganisme tertentu. Mekanisme pertahanan sistem imunitas bawaan menunjukkan spesififikasi yang luas dalam arti bahwa mereka efektif melawan berbagai agen yang berpotensi menular (Stewart, 2012).

Adapun jalur pensiyalan aktif pada sistem imun nonspesifik diantaranya:

- a. Jalur sinyal STING yaitu jalur pensiyalan yang menginduksi produksi interferon tipe 1 saat sensor DNA sitosol mendeteksi infeksi oleh patogen intraseluler seperti bakteri, virus dan parasit intraseluler.
- b. Jalur sinyal Toll Like reseptor (TRL) yaitu jalur yang berfungsi mengaktifkan respon sel kekebalan ketika TLR permukaan sel mendeteksi pola molekuler terkait patogen yang berbeda.
- c. Jalur sinyal aktivasi inflamasi Caspase-1 yang dimediasi oleh inflamasi ketika reseptor pengenalan pola sitosol pada inflammasom mendeteksi sinyal bahaya dari mikroba dan sinyal gangguan seluler yang diturunkan dari inang (Ida et al., 2017).

2. Sistem imun spesifik (*adaptive immunity*)

Respon imun adaptif berfungsi untuk menghancurkan patogen yang menyerang dan bergantung pada kapasitas sel imun untuk membedakan antara sel tubuh sendiri dan penyerang yang tidak diinginkan. Sistem imun spesifik merupakan sistem pertahanan tubuh yang diperankan oleh sel limfosit dengan atau tanpa bantuan sel makrofag dan komplemen ataupun komponen sistem imun yang lain. Sistem imun spesifik ini hanya ditujukan kepada antigen khusus yaitu antigen yang merupakan pasangannya (ligannya). Respon imun spesifik akan mudah mengenali kembali antigen atau benda asing yang sama dan menyerang tubuh. Pada sistem imun spesifik dibentuk suatu antibodi dan limfosit efektor spesifik terhadap benda asing atau antigen yang telah merangsangnya sehingga

terjadilah eliminasi antigen. Adapun sel-sel yang berperan penting dalam hal ini yaitu sel yang mempresentasikan antigen APC (antigen presenting cell atau makrofag) sel limfosit B dan sel limfosit T (Ida et al., 2017).

Sistem imun spesifik (sistem imun adaptif) adalah salah satu elemen yang paling kuat dari sistem kekebalan karena memiliki reseptor kekebalan yang paling tepat untuk menargetkan patogen yang menginfeksi (Smith, 2014).

Imunitas yang didapat menghasilkan respon spesifik terhadap setiap agen infeksi dan mekanisme efektor yang dihasilkan biasanya membasmi penyebabnya. Sistem imun adaptif dapat mencegah penyakit dikemudian hari (Stewart, 2012). Sistem imunitas spesifik dapat diperoleh dengan dua cara yaitu disebabkan oleh infeksi klinis yang nyata atau infeksi klinis yang tidak terlihat dan imunisasi buatan yang disengaja (Stewart, 2012).

4.3 Jenis tanaman yang memiliki aktivitas imunostimulan

Dari hasil analisis jurnal yang diperoleh ada beberapa jenis tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan. Dimana jenis tanaman tersebut yaitu bawang putih (*Allium sativum*) (Dong et al., 2011), buah rasberi (*Rubus fruticosus*), brotowali (*Tinospora crispa*) (Ahmad et al., 2015), amerika ginseng (*Panax quinquefolius*) (Yu et al., 2017), daun mangga (*Mangifera indica*) (Kumolosasi et al., 2018), rimpang kunyit (*Curcuma domestica rhizome*) (Kumolosasi et al., 2018), benalu (*Loranthus micranthus Lin*) (Ogechukwu et al., 2011), daun mimba (*Azadirachta indica*) (Kumar et al., 2012), biji jintan hitam (*Carum copticum*) (Taylor et al., n.d. 2015), kasumba turate (*Carthamus tictorius L*) (Yao et al., 2018), bunga *Gentiana olivieri griseb* (Singh et al., 2012) dan daun flamboyan (*Delonix regia*) (Rosnizar et al., 2017).

1. Benalu (*Loranthus micranthus* Lin)

Benalu (*Loranthus micranthus* Lin) dikenal dapat menyembuhkan berbagai penyakit terutama diabetes, tekanan darah tinggi dan kondisi yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Rebusan atau ekstrak alkohol dari benalu (*Loranthus micranthus* Lin) memiliki klaim folklorik beragam seperti aktivitas untuk pengobatan epilepsi penyakit kardiovaskular, sindrom monopause, rematik dan kondisi yang memodulasi sistem kekebalan tubuh, hal ini sama-sama digunakan secara lokal sebagai agen antimikroba. Triterpenoid menghasilkan peningkatan spenosit dan menghambat ekspresi reseptor interleukin 8 (IL-8) (Ogechukwu et al., 2011). Kandungan senyawa benalu (*Loranthus micranthus* Lin) yaitu karbohidrat, alkaloid, glikosida, saponin, tanin, flavonoid, steroid, resin, terpenoid, protein dan tri terpenoid (Ogechukwu et al., 2011).

2. Bawang putih (*Allium sativum*)

Bawang putih (*Allium sativum*) adalah tanaman yang biasa digunakan sebagai makanan populer, dan dianggap sebagai ramuan medis di berbagai budaya yang berbeda di dunia. Banyak studi epidemiologi telah melaporkan bahwa bawang putih makanan memiliki efek sebagai antikanker dan mencegah perkembangan tumor. Baru-baru ini, beberapa penelitian mengenai efek lektin pada produksi sitokin telah dilakukan karena sitokin jaringan diterima secara luas untuk memainkan peran penting dalam sistem kekebalan. Misalnya, aglutinin bibit gandum dapat menginduksi sekresi sitokin seperti interleukin 12 (IL-12), tumor faktor nekrosis (TNF), dan interferon (IFN-) pada makrofag peritoneum murine. Di antara sitokin, interleukin 12 (IL-12) adalah sitokin pleiotropik yang diproduksi terutama oleh makrofag dan sel dendritik setelah stimulasi oleh antigen mikroba, dan memiliki peran penting dalam perkembangan respon imun T helper tipe 1 (Th1). Interleukin 12 (IL-12) meningkatkan respons inflamasi dan aktivitas

anti-tumor dan menginduksi ekspresi IFN, yang juga membantu perkembangan Th1 melalui mekanisme yang konsisten dengan peningkatan kemampuan sel T naif untuk merespon interleukin 12 (IL-12) (Dong et al., 2011).

3. Daun mimba (*Azadirachta indica*)

Daun mimba (*Azadirachta indica*) merupakan family dari Meliaceae, tanaman ini dibudidayakan di India. bagian dari pohon *Azadirachta indica* biasa digunakan dalam pengobatan tradisional India untuk obat rumah tangga melawan berbagai penyakit manusia. Pada tahun 1992, Akademi Nasional AS Science menerbitkan sebuah laporan berjudul, “Neem: Sebuah pohon untuk memecahkan masalah global”. Penggunaan neem pertama yang tercatat dikaitkan dengan budaya Harrappa India Timur kuno yang menambahkan tanaman ke lusinan alat bantu kesehatan dan kecantikan 4500 tahun yang lalu. Daun mimba (*Azadirachta indica*) terkenal di India dan negara tetangga selama lebih dari 2000 tahun sebagai salah satu dari tanaman obat yang paling serbaguna. Di pedesaan India, orang-orang umumnya menggunakan air rebusan daun mimba untuk pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit. Pada penelitian ekstrak daun mimba mampu meningkatkan secara signifikan kadar serum interleukin 2 (IL-2) (Kumar et al., 2012).

Ada banyak fitokonstituen yang diisolasi dari daun mimba (*Azadirachta indica*) seperti isoprenoid yang termasuk terpenoid yang mengandung limonoid, azadirone dan turunannya, C-Secomeliacins seperti azadirachtin, nonisoprenoid, asam amino, polisakarida, polifenol (flavonoid). Penggunaan obat tradisional dari daun mimba (*Azadirachta indica*) dilaporkan memiliki manfaat dalam kesehatan umum dan perawatan kulit. Bagian dari daun mimba (*Azadirachta indica*) (daun, kulit kayu, buah, bunga, minyak, dan permen karet) memiliki aktivitas seperti efek antimikroba, efek kardioprotektif, tindakan hepatoprotektif, efek neuroprotektif,

racun ular fosfolipaseInhibitor A2, antivirus in vitro, insektisida, acaricidal, aktivitas antibovine herpesvirus tipe1 (BOHV-1), aktivitas antimutagenik dan aktivitas antibakteri (Kumar et al., 2012).

4. Biji jintan (*Carum copticum*)

Biji jintan (*Carum copticum*) biasa disebut gulma bishop dibudidayakan secara luas untuk digunakan sebagai bumbu dan obat-obatan. Tanaman ini berasal dari india, iran dan mesir. Biji dari jintan (*Carum copticum*) ini mengandung protein, lemak mineral, serat karbohi drat, kalsium, fosfor, besi karoten, terpen, timin dan minyak atsiri. Biji jintan hitam memiliki aktivitas farmakologis seperti antiasthamik atau bronkodilator, antihipertensi, antispasmodickhepatoprotektif, antibakteri, antihistamin, analgesik, antijamur, dan peningkat sistem kekebalan tubuh (imunostimulan). Biji jintan (*Carum copticum*) mengandung mineral, serat, kalsium, karoten, protein, lemak dan minyak atsiri yang kaya akan teroen, thymine, cymine dan steroptin dan mampu meningkatkan respon imun humoral, dan fagositosis (Taylor et al., n.d. 2015)

5. Brotowali (*Tinospora crispa*)

Brotowali (*Tinospora crispa*) termasuk dalam family *Menispermaceae*. Spesies ini banyak digunakan diindonesia, Malaysia dan Thailand sebagai obat untuk pengobatan demam, gangguan saluran kemih, rematik dan penyakit kuning. Tanaman ini juga telah digunakan dalam pengobatan tradisional cina untuk mengobati gangguan terkait ulkus tropis, kudis, patah tulang, septicemia dan memar. *Tinospora crispa* juga telah ditemukan memiliki aktivitas antiparasit, antiaterosklerosis, antiperglikemik, antioksidan, antibakteri, kardiovaskular dan sebagai imonomodulator. Ekstrak brotowali pada konsentrasi sitokin TH-1 dan TH-2 (IL-4) secara signifikan meningkat dalam serum tikus (Ahmad et al., 2015).

6. Buah Raspberry (*Rubus fruticosus*)

Raspberry (*Rubus fruticosus*) adalah salah satu buah paling populer di dunia. Raspberry dikonsumsi sebagai buah segar atau diolah menjadi selai, jus dan dapat dijadikan sebagai obat. Buah raspberry telah terbukti menghasilkan manfaat pada penyakit kardiovaskular, obesitas, kanker, penyakit degeneratif dan peningkatan sistem imun. Efek ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya sejumlah besar zat bioaktif dari buah raspberry ini termasuk flavonoid, tanin, asam fenolik, stibenoid, polisakarida, vitamin dan mineral (Yang et al., 2015).

7. Ginseng (*Panax quinquefolius L*)

Ginseng amerika (*Panax quinquefolius L*) anggota genus *panax* dari keluarga *Araliaceae* berasal dari Quebec, Kanada, dan Wisconsin Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an berhasil diperkenalkan di Cina dan sekarang tumbuh secara luas di banyak daerah seperti provinsi Liaoning, provinsi Heilongjiang dan pegunungan Heilongjiang di provinsi Jilin. Ginseng merupakan obat Tiongkok kuno terkenal dan merupakan salah satu penambah energi yang paling populer saat ini. Studi telah menunjukkan bahwa ginseng memiliki efek positif pada sistem kardiovaskular, sistem kekebalan dan endokrin karena berbagai aktivitas biologis dan efek farmakologis yang unik karena ginseng mengandung senyawa bioaktif seperti ginsenosides dan polisakarida. Ekstrak akar ginseng mampu meningkatkan limfa proliferasi limfosit, fagositosis, makrofag, dan produksi nitrogen monosakarida (Yu et al., 2017).

8. Daun mangga (*Mangifera indica L*)

Daun mangga (*Mangifera indica L*) merupakan family dari *Anacardiaceae* yang secara tradisional digunakan di Kuba untuk anti-inflamasi, sifat analgesik, antioksidan dan imunomodulator (Rivera et al., 2011). Daun mangga (*Mangifera indica*) bertindak sebagai agen imunostimulan kuat dengan meningkatkan respon

imun bawaan dan adaptif dari sistem kekebalan dengan meningkatkan respons imun yang diperantarai sel dan humoral. Ekstrak daun mangga mengandung beberapa senyawa seperti saponin, steroid, tanin dan flavonoid. Ekstrak daun mangga mampu meningkatkan jumlah total WBC (white blood cell) dan limfosit dalam darah dan meningkatkan indeks limfanya (Kumolosasi et al., 2018).

9. Rimpang kunyit (*Curcuma domestica*)

Kunyit merupakan tanaman tahunan herba berbonggol dengan bunga kuning dan daun lebar, yang merupakan anggota famili jahe dan tumbuh di iklim tropis. kunyit telah banyak digunakan untuk pengobatan-pengobatan berbagai penyakit selama 2500 tahun di Asia dan sebagian besar Negara lainnya. Kunyit juga memiliki banyak manfaat untuk pencegahan dan pengobatan penyakit dan pengobatan obat tradisional Tiongkok. Kunyit juga memiliki aktivitas sebagai antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, antiangiogenik, antimitagenik, dan sifat agregasi antiplatelet. Dinyatakan bahwa rimpang kunyit mengandung kurkumin yang memiliki efek sebagai perlindungan dan pencegahan terhadap berbagai penyakit seperti kanker, autoimun, neurologis, metabolik, paru-paru, hati, dan penyakit kardiovaskular (CVDs) (Kocaadam & Şanlıer, 2017). Temuan juga mengungkapkan bahwa rimpang kunyit (*Curcuma domestica*) memiliki aktivitas imunostimulan yang lebih kuat dari pada daun *Mangifera indica*. Peningkatan jumlah sel darah putih karena aktivitas stimulasi kekebalan kurkumin (Kumolosasi et al., 2018)

10. Kasumba turate (*Carthamus tinctorius L*)

Kasumba turate (*Carthamus tinctorius L.*) dibudidayakan di banyak negara. Telah banyak digunakan sebagai pengobatan di Cina untuk mengobati penyakit jantung koroner, penyakit ginekologi dan penyakit lain dengan gangguan sirkulasi darah (Zhang et al., 2017). Safflower telah banyak digunakan sebagai

obat yang meningkatkan sirkulasi darah untuk mengobati trauma dan penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular selama lebih dari 2000 tahun (Song et al., 2013)

Kasumba turate (*Carthamus tinctorius L*) umumnya dikenal safflower yang merupakan family dari *Asteraceae* ini telah banyak digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok untuk mengobati serebrovaskular, penyakit kardiovaskular dan penyakit wanita. Tahun terakhir kasumba turate (*Carthamus tinctorius L*) dilaporkan memiliki aktivitas farmakologi yang beragam seperti antimikroba, antikoagulan, anti osteoporosis, antioksidan, anti kecemasan, anti depresi dan aktivitas sebagai imunostimulan. Kandungan senyawa dari kasumba turate (*Carthamus tinctorius L*) terdiri dari flavonoid, alkaloid, asam organik, poliasetilan, dan polisakarida. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa polisakarida safflower menghambat proliferasi dan metastasis payudara MCF-7 sel kanker dan menginduksi apoptosis sel NSCL C dengan menghambat jalur Akt. Dan juga mengaktifkan faktor transkripsi NF-B melalui reseptor seperti produksi sitokin yang diinduksi oleh makrofag (Yao et al., 2018).

11. Bunga *Gentiana olivieri griseb*

Tanaman *Gentiana olivieri griseb* digunakan untuk pengobatan berbagai gangguan. Tanaman ini banyak digunakan di Anatolia timur dan tenggara sebagai tonik pahit dan untuk mengurangi gangguan mental di wilayah Turki. Ramuan bunga ini bisa digunakan sebagai obat untuk menurunkan tekanan darah pada penderita diabetes, sebagai antipiretik, antimikroba, anti-inflamasi dan memiliki aktivitas sebagai imunomodulator. Tanaman ini juga mengandung alkaloid, asam triterpenoid, lemak, glikosida secoiridoid pahit, flavonoid (iso-orientin dan turunannya) dan xanthone. Ekstrak bunga gentiana mampu meningkatkan antibodi humoral sekunder pada tikus (Singh et al., 2012).

12. Daun flamboyant (*Delonix regia*)

Tanaman flamboyant (*Delonix regia*) merupakan tanaman yang mudah tumbuh dengan adanya sinar matahari tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Tanaman flamboyant juga memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh. Tanaman flamboyant juga mengandung senyawa metabolit sekunder seperti tanin, alkaloid, flavonoid dan terpenoid dan daun flamboyant juga memiliki aktivitas sebagai imunostimulan. Dimana daun flamboyant mampu meningkatkan aktivitas dan kapasitas fagositosis oleh makrofag pada peritoneum mencit (Rosnizar et al., 2017).

Tabel 5. Tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan

Tanaman	Bagian tanaman	Senyawa imunostimulan	Mekanisme	Penulis
Kasumba turate (<i>Carthamus tictorius L</i>)	Bunga	Polisakarida	Melalui aktivitas persinyalan NF-KB dan meningkatkan ekspresi TNF – α IL – 1β dan INOS dalam limfosit dan makrofag	(Yao et al., 2018)
Brotowali (<i>Tinospora crispa</i>)	Seluruh bagian tanaman	Lipopolisakarida	Pada konsentrasi sitokin TH1 (TNF – α , IL – 2 dan IFN) dan TH2 (IL-4) secara signifikan meningkat dalam serum tikus	(Ahmad et al., 2015)
Raspberry (<i>Rubus fruticosus</i>)	Buah	Polisakarida	Meningkatkan konsentrasi serum TNF-IFN- γ dan interleukin 2 (IL-2)	(Yang et al., 2015)

Daun mangga (<i>Mangifera indica</i>)	Daun	Flavonoid	Meningkatkan jumlah total WBC dan limfosit dalam darah dan meningkatkan indeks limfanya.	(Kumolosasi et al., 2018)
Rimpang kunyit (<i>Curcuma domestica rhizome</i>)	Rimpang	Curcumin	Peningkatan jumlah sel darah putih karena aktivitas stimulasi kekebalan kurkumin	(Kumolosasi et al., 2018)
Benalu (<i>Loranthus micranthus</i>)	Daun	Triterpenoid	Triterpenoid menghasilkan peningkatan spenosit dan menghambat ekspresi reseptor IL-8	(Ogechukwu et al., 2011)
Daun mimba (<i>Azadirachta indica</i>)	Daun	Polisakarida	Meningkatkan secara signifikan kadar serum interleukin (IL-2) pada tikus.	(Kumar et al., 2012)
Jintan (<i>Carum copticum</i>)	Biji	Minyak atsiri	Meningkatkan respon imun humoral, hipersensitivitas tipe lambat dan	(Taylor et al., n.d.2015)

			fagositosis	
Bawang putih (<i>Allium sativum</i>)	Umbi	Lektin	Lektin bawang putih menginduksi IL-12 melalui aktivitas P 38 MHPK dan ERK di makrofag tikus dan menstimulasi IFN produksi melalui peningkatan IFN-MRNA dalam sel limfa.	(Dong et al., 2011)
Ginseng (<i>Panax qunquefolius L</i>)	Akar	Monosakarida	Meningkatkan limfa proliferasi limfosit fagositosis, makrofag, dan produksi nitrogen monosakarida	(Yu et al., 2017)
Bunga <i>Gentiana olivieri griseb</i>	Bunga	Polisakarida	Meningkatkan antibodi humoral sekunder pada tikus	(Singh et al., 2012)
Daun flambayon (<i>Delonix regia</i>)	Daun	Flavonoid	Meningkatkan aktivitas dan kapasitas fagositosis oleh makrofag pada peritoneum mencit	(Rosnizar et al., 2017)

4.4 Metode ekstraksi tanaman yang memiliki aktivitas imunostimulan

Tahap awal sebelum melakukan ekstraksi yaitu persiapan sampel tanaman seperti daun, kulit kayu, akar, buah dan bunga dapat diekstraksi dari bahan tanaman segar atau kering. Pra-persiapan bahan tanaman lainnya seperti penggilingan dan pengeringan juga mempengaruhi ekstrak akhir. Tanaman terlebih dahulu dilakukan pra-ekstraksi dan prosedur ekstraksi yang merupakan langkah penting dalam pengolahan konstituen bioaktif dari bahan tanaman. Metode ekstraksi yang biasa digunakan seperti metode maserasi dan ekstraksi Soxhlet biasanya digunakan di tempat penelitian kecil atau di tingkat *Small Manufacturing Enterprise* (SME) (Nn, 2015).

Ekstraksi adalah proses pemisahan bagian tanaman yang berkhasiat obat dengan menggunakan pelarut tertentu. Tujuan dilakukan ekstraksi untuk mendapatkan senyawa kimia yang terdapat dari tanaman atau simplisia (Nn, 2015).

Untuk mengekstrak senyawa fenolik yang berbeda dari tanaman dengan tingkat akurasi yang tinggi, berbagai pelarut dengan polaritas yang berbeda harus digunakan. Selain itu para ilmuwan telah menemukan bahwa pelarut yang sangat polar seperti metanol (Altemimi et al., 2017).

Dari hasil analisis jurnal ada beberapa metode ekstraksi tanaman yang memiliki efek sebagai imunostimulan yang digunakan seperti metode maserasi, metode refluks dan metode soxhlet.

1. Metode maserasi

Maserasi merupakan proses perendaman simplisia dengan pelarut yang sesuai untuk menarik senyawa aktif dari tanaman (Nn, 2015) . Metode ini nyaman dan sangat cocok untuk bahan tanaman termolabil. Dan metode ini juga merupakan metode yang paling sering digunakan dalam penelitian. Adapun yang

tanaman yang diekstraksi menggunakan metode ini yaitu bawang putih (*Allium sativum*) (Dong et al., 2011), brotowali (*Tinospora crispa*) (Ahmad et al., 2015), daun mangga (*Mangifera indica*) (Kumolosasi et al., 2018), rimpang kunyit (*Curcuma domestica rhizome*) (Kumolosasi et al., 2018), raspberry (*Rubus fruticosus*) (Yang et al., 2015), bunga *Gentian olivieri griseb* (Singh et al., 2012), daun mimba (*Azadirachta indica*) (Kumar et al., 2012), jintan (*Carum Copticum*) (Taylor et al., n.d.), daun flamboyan (*Delonix regia*) (Rosnizar et al., 2017) dan kasumba turate (*Carthamus tictorius*) (Yao et al., 2018).

2. Metode refluks

Metode refluks merupakan metode ekstraksi yang dilakukan dengan menggunakan pemanasan. Adapun tanaman yang diekstraksi dengan metode ini yaitu akar ginseng (*Panax quinqueofolius*) (Yu et al., 2017).

3. Metode soxhlet

Ekstraksi soxhlet dikenal juga sebagai metode ekstraksi yang tahan dengan pemanasan. Keuntungan dari metode ini sejumlah besar tanaman dapat diekstraksi dengan jumlah pelarut yang lebih sedikit, tidak diperlukan penyaringan dan jumlah panas yang tinggi dapat diterapkan (Poojar et al., 2017). Adapun tanaman yang diekstrak menggunakan metode ini yaitu benalu (*Loranthus micrantus*) (Ogechukwu et al., 2011).

Tabel 6. Metode ekstraksi tanaman yang memiliki aktivitas imunostimulan

Tanaman	Bagian tanaman	Metode ekstraksi			Pelarut	Penulis
		Maserasi	Refluks	Soxhlet		
Bawang putih (<i>Allium sativum</i>)	Umbi	√			Air suling	(Dong et al., 2011)

Brotowali (<i>Tinospora crispa</i>)	seluruh bagian tanaman	√			Etanol 95%	(Ahmad et al., 2015)
Raspberry	Buah	√			Etanol 80% petroleum eter	(Yang et al., 2015)
Daun mangga (<i>Mangifera indica</i>)	Daun	√			Metanol 99,5 %	(Kumolosasi et al., 2018)
Rimpang kunyit (<i>Curcuma domestica</i>)	Rimpang	√			Metanol 99,5%	(Kumol osasi et al., 2018)
Jintan (<i>Carum Copticum</i>)	Biji	√			Etanol 95%	(Taylor et al., n.d. 2015)
Amerika ginseng	Akar		√		Etanol 95%	(Yu et al., 2017)
Pohon benalu (<i>Loranthus micrantus</i>)	Daun			√	Metanol 98%	(Ogechukwu et al., 2011)
Daun mimba (<i>Azadirachta indica</i>)	Daun	√			Heksan, kloroform, metanol, air suling	(Kumar et al., 2012)
Kasumbaturate (<i>Carthamus tictorius L</i>)	Bunga	√			Alkohol 95%	(Yao et al., 2018)

Bunga <i>Gentiana olivieri griseb</i>	Bunga	√			Etanol 80%	(Singh et al., 2012)
Daun flamboyan (<i>Delonix regia</i>)	Daun	√			Ekstrak methano 1	(Rosniza r et al., 2017)

4.5 Metode pengujian tanaman yang memiliki aktivitas imunostimulan

Dari jurnal yang telah dianalisis ada beberapa metode pengujian yang digunakan dalam penelitian tersebut dan ada juga beberapa jurnal yang menggunakan metode yang sama dalam pengujian tanaman. Metode yang digunakan yaitu metode uji respon hipersensitivitas tipe lambat, uji bersihan karbon dan uji titer antibodi.

1. Uji respon hipersensitivitas lambat

Pengujian hipersensitivitas tipe lambat merupakan pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi imunitas seluler dalam klinis dan menghasilkan respon imunitas adaptif (respon imun spesifik) yang ditandai dengan adanya aktivitas Th1, aktivitas makrofag yang ditandai dengan adanya edema pada kaki hewan (Houston, 2015).

Pada uji hipersensitivitas tipe lambat ada beberapa tanaman yang diuji dengan menggunakan metode ini yaitu daun mangga (*Mangifera indica*) (Kumolosasi et al., 2018), rimpang kunyit (*Curcuma domestica*) (Kumolosasi et al., 2018), bawang putih (*Allium sativum*) (Dong et al., 2011), biji jintan (*Carum copticum*) (Taylor et al., n.d.2015), rasberi (*Rubus fruticosus*) (Yang et al., 2015) dan daun mimba (*Azadiracta indica*) (Kumar et al., 2012).

Pada sampel daun mangga (*Mangifera indica*) dan rimpang kunyit (*Curcuma domestica*) pengujian dilakukan pada tikus dengan cara tikus di imunisasi selama 14 hari dengan menginduksikan 0,3 ml suspensi SRCB 2% secara subkutan dan didaerah sub plantar kaki belakang bagian kanan. Ketebalan kaki tikus di ukur pada menit ke 30, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam dan 24 jam. Respon uji hipersensitivitas lambat dilihat dari peningkatan rata-rata ketebalan kaki tikus atau terjadi edema pada tikus (Kumolosasi et al., 2018).

Pada sampel bawang putih (*Allium sativum*) dimana perlakuan awal yang dilakukan yaitu makrofag dengan U0126 (10 M) atau SB 203580 (10) selama 1 jam diikuti dengan pemberian lektin bawang putih (1,0 mg/ml) selama 3 dan 6 jam. Setelah pemberian IL-2 dalam supernatan diukur dan dibandingkan dengan kontrol dan bawang putih. Dan secara signifikan bawang putih menghambat produksi IL-2 (Dong et al., 2011).

Pada sampel biji jintan (*Carum copticum*) pengujian dilakukan dengan cara menginduksikan SRCB pada kaki tikus yang dilakukan selama 24 hari dan pada hari ke 22 kaki tikus mengalami pembengkakan. Peningkatan ketebalan kaki pada tikus dianggap sebagai reaksi uji hipersensitivitas tipe lambat (Taylor et al., 2015).

Pada sampel rasberri pengujian dilakukan dengan menggunakan uji hipersensitivitas tipe lambat ditandai dimana terjadinya peningkatan konsentrasi serum TNF – IFN – γ dan interleukin 2 (IL-2) pada hewan coba (Yang et al., 2015).

Pada sampel daun mimba (*Azadiracta indica*) pengujian menggunakan uji hipersensitivitas tipe lambat, dimana hewan coba yang ingin diujikan yaitu menggunakan mencit dengan pemberian AILG dengan dosis yang berbeda.

Setelah pemberian AILG menunjukkan perubahan yang signifikan pada kadar interleukin 2 (IL-2) pada mencit (Kumar et al., 2012).

2. Uji titer antibodi

Uji titer antibodi merupakan pengujian yang digunakan untuk uji efek imunostimulan. Pada uji ini melibatkan respon imun spesifik baik yang seluler maupun yang humoral. Meningkatnya nilai titer antibodi terjadi karena adanya aktivitas sel Th yang menstimulasi sel B dan meningkatnya sel B akan terjadi pembentukan antibodi.

Pada uji titer antibodi ada beberapa tanaman yang diuji menggunakan pengujian ini yaitu brotowali (*Tinospora crispa*) (Ahmad et al., 2015), benalu (*Loranthus micranthus*) (Ogechukwu et al., 2011) dan bunga *Gentiana olivieri griseb* (Singh et al., 2012).

Pada pengujian sampel bunga *Gentiana olivieri griseb* dimana mencit dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 hewan. Mencit kelompok 1 menggunakan kontrol dan yang digunakan serum albumin 0,3 ml selama 7 hari. Mencit pada kelompok ke 2 diberi SCBR pada hari ke 0. Tikus kelompok ke 3 dan 4 diberi siklofosamid dan ekstrak etanol 80% dan fraksi butanl bunga *Gentiana olivieri griseb* dengan dosis 50, 100 dan 200 mg/kg bb selama 7 hari. Mencit kelompok 9 dan 10 diberi levamisol 2,5 mg/kg dan siklofosamid 250 mg/kg, masing-masing pada hari ke 0. Hewan dimunisasi dengan menyuntikkan 200 μ l 5×10^9 SCBR/ml secara intraperitoneal pada hari ke 0. sampel darah blood dikumpulkan dalam tabung microliter dari masing-masing hewan dari semua kelompok dengan menyuntikkan vena retroorbital pada hari ke 8. Sampel darah disentrifugasi dan serumnya dipisahkan. Kemudian dilakukan uji titer antibodi dan menunjukkan adanya peningkatan anti bodi humoral sekunder (Singh et al., 2012).

Pengujian pada sampel brotowali (*Tinospora crispa*) dimana hewan coba yang digunakan yaitu tikus. Dimana darah tikus disentrifugasi selama 10 menit dan serum dipisahkan. Kadar serum interleukin 12 (IL-2), interleukin 4 (IL-4), interleukin (IL-12), IFN- γ dan TNF- α ditentukan secara kualitatif menggunakan kit immunoassay tikus procatalpex-5 piley berbasis manik-manik magnetik. Pengujian dilakukan sesuai instruksi pabrik. Manik-manik magnetic berlapis antibody ditangkap dengan menambahkan 50 μ l manik-manik kedalam masing-masing pelat. Sebanyak 25 μ l sampel serum dicampur dengan manik-manik berlapis antibodi. Kemudian 25 μ l assay nuffer ditambahkan kedalam masing-masing sumur dan dinkubasi selama 2 jam pada magnetik shaker dengan kecepatan 500 rpm. Setelah itu dicuci dengan buffer pencuci, setelah dicuci 25 μ l antibodi dideteksi dan dicampurkan kembali dan sampel diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar setelah itu pembacaan data dibaca pada instrument luminex (Ahmad et al., 2015).

Pengujian pada sampel kasumba turate (*Carthamus tictorius*) di uji menggunakan tikus dengan splenosit tersuspensi yang ditumpahkan kedalam dengan konsentrasi yang berbeda. Lalu diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37°C. kultur supernatant dikumpulkan dan konsentrasi TNf- α diukur. Setelah diukur menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ekspresi TNF- α IL-I β dan INOS dalam limfosit dan makrofag (Yao et al., 2018).

3. Uji bersihan karbon

Uji bersihan karbon merupakan pengujian standar dalam partikel asing yang terdapat dalam darah yang dapat terjadi pada proses fagositosis terhadap benda asing yang terdapat dalam darah.

Pada pengujian bersihan karbon ada beberapa tanaman yang uji menggunakan pengujian ini yaitu panax ginseng (*Panax quinquefolius*) dan daun

flambayon (*Delonix regia*). Pengujian ini dilakukan pada makrofag mencit menggunakan larutan D-Hank kemudian disentrifugasi dan setelah disentrifugasi sel-sel disuspensikan kembali kedalam media lengkap RPMI 1640. Sel-sel ditempatkan dipiring kultur yang rata dan dikubasi pada suhu 37°C selama 4 jam. Media dihilangkan dalam sel-sel yang tidak patuh dicuci lalu makrofag berlapis tunggal dikumpulkan . dan dievaluasi fagositosis oleh makrofag. (Yu et al., 2017).

Tabel 7. Metode pengujian tanaman yang memiliki aktivitas imunostimulan

Tanaman	Bagian Tanaman	Jenis Ekstrak	Metode pengujian ekstrak			Penulis
			Uji tipe lambat	Uji titer antibody	Uji bersihan karbon	
Bawang putih (<i>Allium sativum</i>)	Umbi	Ekstrak air suling	√			(Dong et al., 2011)
Brotowali (<i>Tinospora crispa</i>)	Seluruh bagian tanaman	Ekstrak etanol 80%		√		(Ahmad et al., 2015)
Raspberry (<i>Rubus fruticosus</i>)	Buah	Ekstrak etanol 80%	√			(Yang et al., 2015)
Daun mangga (<i>Mangifera indica</i>)	Daun	Ekstrak metanol	√			(Kumolosasi et al., 2018)
Rimpang kunyit (<i>Curcuma domestica</i>)	Rimpang	Ekstrak metanol	√			(Kumolosasi et al., 2018)

<i>rhizome)</i>						
Jintan (<i>Carum copticum</i>)	Biji	Ekstrak etanol 95%	√			(Taylor et al., n.d.2015)
Ginseng (<i>Panax qunquefoli us</i>)	Akar	Ekstrak etil- alkohol			√	(Yu et al., 2017)
Pohon Benalu (<i>Loranthu s micranthu s</i>)	Daun	Ekstrak metanol 98%		√		(Ogechu kwu et al., 2011)
Daun mimba (<i>Azadirac hta indica</i>)	Daun	Ekstrak metanol	√			(Kumar et al., 2012)
Kasumba turate (<i>Cartham us tictorius L</i>)	Bunga	Ekstrak alkohol 95%		√		(Yao et al., 2018)
Bunga <i>Gentiana olivire griseb</i>	Bunga	Ekstrak etanol 80%		√		(Singh et al., 2012)
Daun flamboyan (<i>Delonix regia</i>)	Daun	Ekstrak metanol			√	(Rosniza r et al., 2017)

4.6 Tinjauan Islami tentang tanaman yang memiliki aktivitas imunostimulan

Manusia dan tumbuh-tumbuhan sangatlah erat kaitannya dalam kehidupan. Banyak sekali manfaat yang didapat oleh manusia dari tumbuh-tumbuhan tetapi masih banyak pula tumbuh-tumbuhan yang ada disekitar kita yang belum diketahui manfaatnya. Keberadaan tumbuh-tumbuhan merupakan berkah dan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada seluruh makhluknya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Abasa/ 80: 27-32 yang berbunyi:

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠)
وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٢)

Terjemahnya:

“Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur dan sayuran, dan zaitun dan pohon kurma, dan kebun-kebun (yang) rindang, dan buah-buahan serta rerempukan. Untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan” (Kementrian Agama. 2015).

Dalam Q.S ‘Abasa/ 80: 27-32 menjelaskan bahwa tumbuhan yang ada dibumi itu sangat penting dan bermanfaat bagi manusia. Dimulai dari biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan serta rumput yang bisa dijadikan sebagai tanaman obat dan bahan makanan bagi manusia dan ternak. Setiap unsur tanaman memiliki khasiat unit bagi tubuh manusia yang bisa diteliti dalam kehidupan kita dan banyak hal dari unsur-unsur ini yang dapat dipelajari untuk mencerahkan dan memberikan pandangan mendalam akan keajaiban yang terkandung dalam unsur tersebut.

Dan terdapat pula pada Q.S Lukman/ 31: 10

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan darinya macam tumbuh-tumbuhan yang baik” (Kementrian Agama, 2015).

Pada tafsir Al – misbah dijelaskan bahwa Allah menurunkan hujan yang berasal dari langit, kemudian Allah tumbuhkan berbagai macam – macam tumbuh-tumbuhan yang baik yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat atau obat tradisional (Shihab. 2002).

Ayat diatas dijelaskan pada tafsir Al – misba menyatakan bahwa kami tumbuhkan biji – bijian dibumi, yang sebagian bisa digunakan sebagai obat atau makanan baik buah anggur, buah zaitun maupun kurma yang berkualitas baik dan kebun – kebun yang lebat serta buah – buahan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai tanaman obat atau makanan (Shihab. 2002).

Surah Al Lukman di atas menjelaskan bahwa atas kekuasaanNya lah sehingga diciptakan berbagai kemudahan bagi umat manusia di muka bumi. Ditumbuhkanlah berbagai macam tanaman agar manusia dapat berfikir dan menjadikan tanaman tersebut tidak hanya sebagai sumber makanan tetapi juga dapat dijadikan sebagai tanaman obat atau obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan adanya kemampuan dan ilmu yang dimiliki.

Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat tradisional telah lama ada sejak zaman dahulu. Sebelum adanya obat medis tumbuhan telah menjadi alternatif pengobatan masyarakat yang digunakan sebagai tanaman obat dan ini telah terbukti karena adanya banyak khasiat yang dimiliki tanaman sehingga tidak diragukan lagi baik dari batang, daun, akar, rimpang, kulit batang serta bunganya semua memiliki khasiat tersendiri dalam menyembuhkan penyakit ringan maupun berat.

Sesuai yang terdapat pada Q.S Asy – Syu'ara/ 26: 7 yang berbunyi:

وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, beberapa banyak kami tambahkan di bumi itu berbagai macam (tumbuhan-tumbuhan) yang baik?”(Kementrian Agama. 2015).

Ayat diatas dijelaskan pada tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa Allah SWT telah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat yang dapat dijadikan sebagai tanaman obat atau obat tradisional bagi manusia (Shihab. 2002).

Dan ayat pun diatas juga menjelaskan bahwa banyak sekali tanaman yang diciptakan oleh Allah SWT yang dapat dijadikan sebagai makanan maupun obat yang dapat digunakan oleh masyarakat banyak, sehingga dalam penggunaan tanaman sebagai obat dapat meminimalisir efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan obat yang diresepkan oleh dokter, sehingga tanaman yang ada di muka bumi ini perlu di jaga, dilestarikan dan dibudidayakan oleh masyarakat banyak supaya nantinya dapat digunakan sebagai pengobatan dan dapat juga sebagai obat tradisional.

Nabi Muhammad SAW bersabda:


حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ
قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

“Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata telah menceritakan kepadaku 'Atha`bin Abu Rabah dari Abu

Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR. Al- Bukhari).

Berdasarkan hadis diatas ditegaskan bahwa setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT masing-masing memiliki penawar atau obatnya. Jadi kita sebagai manusia harus lebih memperhatikan dan membudidayakan yang ada disekelilingi baik tumbuhan – tumbuhan maupun yang lainnya yang dapat dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan segala penyakit.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelusuran jurnal terdapat 11 jurnal yang didalamnya terdapat tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan.

1. Tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan yaitu daun benalu (*Loranthus micranthus Lin*), umbi bawang putih (*Allium sativum*), daun mimba (*Azadirachta indica*), biji jintan hitam (*Carum copticum*), brotowali (*Tinospora crispa*), buah rasberi (*Rubus fruticosus*), akar ginseng (*Panax qunquefolius L*), daun mangga (*Mangifera indica*), rimpang kunyit (*Curcuma domestica rhizome*), kasumba turate (*Carthamus tinctorius L*), bunga *Gentiana olivieri griseb* dan daun flamboyan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa banyak tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat dan makanan.
2. Dari hasil analisis terdapat beberapa metode ekstraksi yang digunakan diantaranya yaitu metode maserasi, metode refluks dan metode soxhlat dan metode yang paling sering digunakan adalah metode maserasi.
3. Pada pengujian ekstrak tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan terdapat pula beberapa metode pengujian yang digunakan yaitu uji hipersensitivitas tipe lambat, uji bersihan karbon dan uji titer antibodi.
4. Kandungan senyawa tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan diantaranya yaitu lektin, polisakarida, lipopolisakarida, flavanoid, minyak atsiri, monosakarida, triterpenoid, tanin, alkaloid dan curcumin.

5.2 Saran

Diharapkan nantinya ada yang melakukan penelitian ini secara eksperimental supaya dapat mengetahui aktivitas dari tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, W., Jantan, I., Kumolosasi, E., & Bukhari, S. N. A. (2015). Immunostimulatory effects of the standardized extract of *Tinospora crispa* on innate immune responses in Wistar Kyoto rats. *Drug Design, Development and Therapy*, 9, 2961–2973. <https://doi.org/10.2147/DDDT.S85405>
- Altemimi, A., Lakhssassi, N., Baharlouei, A., Watson, D. G., & Lightfoot, D. A. (2017). Phytochemicals: Extraction, isolation, and identification of bioactive compounds from plant extracts. *Plants*, 6(4). <https://doi.org/10.3390/plants6040042>
- Al-Bukhari, Al-Imam al-Hafids Abi Bdillah Ibn Ismail. 2003. *Shahihul al-Bukhari*, Dar Ibn Hazm, Beirut-Libonan.
- Antasari, A. L. (2017). *Imunologi Dasar*. Budi Utama.
- Aripin, I. (2019). Pendidikan nilai pada materi konsep sistem imun. *Jurnal Bio Educatio*, 4(1), 01–11. <https://www.jurnal.unma.ac.id/index.php/BE/article/viewFile/1297/1207>
- Dong, Q., Sugiura, T., Toyohira, Y., Yoshida, Y., Yanagihara, N., & Karasaki, Y. (2011). Stimulation of IFN- γ production by garlic lectin in mouse spleen cells: Involvement of IL-12 via activation of p38 MAPK and ERK in macrophages. *Phytomedicine*, 18(4), 309–316. <https://doi.org/10.1016/j.phymed.2010.06.008>
- Eriksen, M. B., & Frandsen, T. F. (2018). The impact of PICO as a search strategy tool on literature search quality: A systematic review. *Journal of the Medical Library Association*, 106(4), 420–431. <https://jmla.pitt.edu/ojs/jmla/article/view/345/726>
- Houston, S. (2015). *NIH Public Access*. 32(27), 3341–3344. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2014.04.049>. Delayed-Type
- Ida, D., Kade, B., Si, M. (2017). *Diklat Imunologi Dasar Sistem Imun*. Fakultas Kedokteran . 1-36.
- Jumiarni, W. O., & Komalasari, O. (2017). Eksplorasi Jenis Dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat Pada Masyarakat Suku Muna Di Permukiman Kota Wuna. *Traditional Medicine Journal*, 22(1), 45–56.
- Kedokteran, J., Nafis, I., Lestari, I. C., & Artikel, H. (2020). Potensi Herbal Sebagai Immunomodulator the Potential of Herbs As Immunomodulators. *Jurnal Kedokteran Ibnu Nafis*, 9(2), 33–44. <https://ojsfkuisu.com/index.php/ibnunafis/article/view/85>
- Kementrian Agama RI. 2015. *Al-qur'an dan terjemahnya*. Bandung: CV Darus Sunnah.

- Kocaadam, B., & Şanlıer, N. (2017). Curcumin, an active component of turmeric (*Curcuma longa*), and its effects on health. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 57(13), 2889–2895. <https://doi.org/10.1080/10408398.2015.1077195>
- Kumar, V. S., Navaratnam, V., Rajasekaran, A., & Nair, N. (2012). Isolation and characterization of glucosamine from *Azadirachta indica* leaves: An evaluation of immunostimulant activity in mice. *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine*, 2(3), S1561–S1567. [https://doi.org/10.1016/S2221-1691\(12\)60453-](https://doi.org/10.1016/S2221-1691(12)60453-)
- Kumolosasi, E., Ibrahim, S. N. A., Shukri, S. M. A., & Ahmad, W. (2018). Immunostimulant activity of standardised extracts of mangifera indica leaf and curcuma domestica rhizome in mice. *Tropical Journal of Pharmaceutical Research*, 17(1), 77–84. <https://doi.org/10.4314/tjpr.v17i1.12>
- Nn, A. (2015). A Review on the Extraction Methods Use in Medicinal Plants, Principle, Strength and Limitation. *Medicinal & Aromatic Plants*, 04(03), 3–8. <https://doi.org/10.4172/2167-0412.1000196> Ogec
- Ogechukwu, O. E., Ogoamaka, O. P., Sylvester, N. C., Kawamura, A., & Proksch, P. (2011). Immunomodulatory activity of a lupane triterpenoid ester isolated from the eastern Nigeria mistletoe, *Loranthus micranthus* (Linn.). *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 4(7), 514–522. [https://doi.org/10.1016/S1995-7645\(11\)60137-5](https://doi.org/10.1016/S1995-7645(11)60137-5)
- Parawansah, P., Ezzo, A., & Saida, S. (2020). Sosialisasi Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh Ditengah Pandemi di Kota Kendari. *Journal of Community Engagement in ...*, 3(2), 2018–2021. <https://jceh.org/index.php/JCEH/article/view/90>
- Pertiwi, R., Notriawan, D., & Wibowo, R. H. (2020). Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Meningkatkan Imunitas Tubuh sebagai Pencegahan COVID-19. *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 18(2), 110–118. <https://doi.org/10.33369/dr.v18i2.12665>
- Poojar, B., Ommurugan, B., Adiga, S., Thomas, H., Sori, R. K., Poojar, B., Hodlur, N., Tilak, A., Korde, R., Gandigawad, P., In, M., Sleep, R., Albino, D., Rats, W., Article, O., Schedule, P., Injury, C. C., Sori, R. K., Poojar, B., ... Gandigawad, P. (2017). Methodology Used in the Study. *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*, 7(10), 1–5. <https://doi.org/10.4103/jpbs.JPBS>
- Rivera, D. G., Hernández, I., Merino, N., Luque, Y., Álvarez, A., Martín, Y., Amador, A., Nuevas, L., & Delgado, R. (2011). *Mangifera indica* L. extract (Vimang) and mangiferin reduce the airway inflammation and Th2 cytokines


- in murine model of allergic asthma. *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 63(10), 1336–1345. <https://doi.org/10.1111/j.2042-7158.2011.01328.x>
- Rosnizar, R., Maulida, S., Eriani, K., & Suwarno. (2017). Potensi ekstrak daun flamboyan [*Delonix regia* (Boj . Ex Hook .) Raf .] terhadap peningkatan aktivitas dan kapasitas makrofag. *Bioleuser*, 1(3), 104–115.
- Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al-misba: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Singh, S., Yadav, C. P. S., & Noolvi, M. N. (2012). Immunomodulatory activity of butanol fraction of *Gentiana olivieri* Griseb. on Balb/C mice. *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine*, 2(6), 433–437. [https://doi.org/10.1016/S2221-1691\(12\)60071-9](https://doi.org/10.1016/S2221-1691(12)60071-9)
- Smith, G. P. (2014). Chapter 1. Introduction to the Immune Response. *The Variation and Adaptive Expression of Antibodies*, July, 1–11. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674365148.intro>
- Stewart, J. (2012). Innate and acquired immunity. *Medical Microbiology: Eighteenth Edition*, 109–135. <https://doi.org/10.1016/B978-0-7020-4089-4.00024-X>
- Skerfving S, Bergdahl I. 2015. Handbook on The Toxicology of Metals. 4th ed. London: Elsevier.
- Song, L., Wang, Q., Chai, Z., Zhang, C., Wang, J., Ma, J., Guo, J., Yu, J., Xiao, B., Han, G., Huang, J., & Ma, C. (2020). Anhydrosafflor Yellow B alleviates brain injury of acute permanent cerebral ischemia in rats by anti-inflammatory mechanism. *All Life*, 13(1), 201–212. <https://doi.org/10.1080/26895293.2020.1750492>
- Taylor, P., Sonar, P. K., Singh, R., Saraf, S. K., Sonar, P. K., Singh, R., & Saraf, S. K. (n.d.). *Phytochemical , chromatographic and spectroscopic investigation of Carum copticum seeds and their potential as immunomodulatory agents* *Phytochemical , chromatographic and spectroscopic investigation of Carum copticum seeds and their potential as immunomod.* July 2015. <https://doi.org/10.3109/13880209.2015.1050116>
- Van Hai, N. (2015). The use of medicinal plants as immunostimulants in aquaculture: A review. *Aquaculture*, 446, 88–96. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2015.03.014>
- Yang, Y., Xu, H., & Suo, Y. (2015). *Function growth via immunopotential and enhance docetaxel chemotherapy against malignant melanoma in vivo.* <https://doi.org/10.1039/c5fo00389j>

- Yao, Y., Yao, J., Du, Z., Wang, P., & Ding, K. (2018). Highlight SC. *Carbohydrate Polymers*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.08.098>
- Yu, X. H., Liu, Y., Wu, X. L., Liu, L. Z., Fu, W., & Song, D. D. (2017). Isolation, purification, characterization and immunostimulatory activity of polysaccharides derived from American ginseng. *Carbohydrate Polymers*, 156, 9–18. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2016.08.092>
- Zhang, Y., Song, L., Pan, R., Gao, J., Zang, B., & Jin, M. (2017). *Hydroxysafflor Yellow A Alleviates Lipopolysaccharide-Induced Acute Respiratory Distress Syndrome in Mice*. 40(2), 135–144.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema kerja seleksi studi artikel



Lampiran 2. Situs pencarian pustaka

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov

tanaman imunostimulan

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Save Email Send to Sorted by: Best match Display options

MY NCBI FILTERS 2 results

RESULTS BY YEAR

2014 2021

TEXT AVAILABILITY

Abstract

Free full text

Filters applied: Free full text, in the last 10 years. Clear all

The following term was not found in PubMed: imunostimulan

Diversity of global rice markets and the science required for consumer-targeted rice breeding.

1

Cite Calingacion M, Laborte A, Nelson A, Resurreccion A, Concepcion JC, Daygon VD, Mumm R, Reinke R, Dipti S, Bassinello PZ, Manful J, Sophany S, Lara KC, Bao J, Xie L, Loaiza K, El-hissewy A, Gayin J, Sharma N, Rajeswari S, Manonmani S, Rani NS, Kota S, Indrasari SD, Habibi F, Hosseini M, Tavasoli F, Suzuki K, Umemoto T, Bualaphanh C, Lee HH, Hung YP, Ramli A, Aung PP, Ahmad R, Wattoo JI, Bandonill E, Romero M, Brites CM, Hafeel R, Lur HS, Cheaupun K, Jongdee S, Blanco P, Bryant R, Thi Lang N, Hall RD, Fitzgerald M.

Share

PLoS One. 2014 Jan 14;9(1):e85106. doi: 10.1371/journal.pone.0085106. eCollection 2014.

Kata kunci: *Tanaman imunostimulan*

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov

immunostimulant herbal plant

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Save Email Send to Sorted by: Best match Display options

MY NCBI FILTERS 115 results

RESULTS BY YEAR

2011 2021

TEXT AVAILABILITY

Abstract

Free full text

Filters applied: Free full text, in the last 10 years. Clear all

Herbal immune-boosters: Substantial warriors of pandemic Covid-19 battle.

1

Cite Khanna K, Kohli SK, Kaur R, Bhardwaj A, Bhardwaj V, Ohri P, Sharma A, Ahmad A, Bhardwaj R, Ahmad P. Phytomedicine. 2021 May;85:153361. doi: 10.1016/j.phymed.2020.153361. Epub 2020 Oct 3. PMID: 33485605 Free PMC article. Review.

Share However, here, we have formulated the novel concept hitherto, ancient means of traditional medicines or **herbal plants** to beat this pandemic...

Preventative effect of an herbal preparation (HemoHIM) on development of airway inflammation in mice via modulation of Th1/2 cells differentiation.

2

Cite Kim JJ, Cho HW, Park HR, Jung U, Jo SK, Yee ST. PLoS One. 2013 Jul 28;8(7):e68552. doi: 10.1371/journal.pone.0068552. Print 2013.

Kata kunci: *Immunostimulant herbal plant*

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov

Standart immunostimulant plant isolates

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Save Email Send to Sorted by: Best match Display options

MY NCBI FILTERS 20 results

RESULTS BY YEAR

Filters applied: Free full text, in the last 10 years. Clear all

Showing results for *standart immunostimulant plant isolates*
Your search for *Standart immunostimulant plant isolates* retrieved no results

1 **Metabolic engineering of Escherichia coli to produce a monophosphoryl lipid A adjuvant.**

Cite Ji Y, An J, Hwang D, Ha DH, Lim SM, Lee C, Zhao J, Song HK, Yang EG, Zhou P, Chung HS. Metab Eng. 2020 Jan;57:193-202. doi: 10.1016/j.ymben.2019.11.009. Epub 2019 Nov 28. PMID: 31786244 **Free PMC article.**

Share

In fact, MPLA generation involves expensive and laborious procedures based on synthetic routes or chemical transformation of precursors **isolated** from Gram-negative bacteria. Here, we report the engineering of an Escherichia coli strain for in situ production and accumulati ...

TEXT AVAILABILITY

Abstract

Free full text

Kata kunci: *Standart immunostimulant plant isolates*

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov

Standardization immunostimulant plant extract

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Save Email Send to Sorted by: Best match Display options

MY NCBI FILTERS 41 results

RESULTS BY YEAR

Filters applied: Free full text, in the last 10 years. Clear all

1 **A comprehensive evidence-based review on the role of topicals and dressings in the management of skin scarring.**

Cite Sidgwick GP, McGeorge D, Bayat A. Arch Dermatol Res. 2015 Aug;307(6):461-77. doi: 10.1007/s00403-015-1572-0. Epub 2015 Jun 5. PMID: 26044054 **Free PMC article.** Review.

Share

Topical treatments identified include imiquimod, mitomycin C and **plant extracts** such as onion **extract**, green tea, Aloe vera, vitamin E and D, applied to healing wounds, mature scar tissue or fibrotic scars following revision surgery, or in combination with ot ...

2 **Review on Sustained Relief of Osteoarthritis Symptoms with a Proprietary **Extract** from Pine Bark, Pycnogenol.**


TEXT AVAILABILITY

Abstract

Free full text

Full text

Kata kunci: *Standardization immunostimulant plant extract*



ScienceDirect Journals & Books [Register](#) [Sign in](#)


Find articles with these terms

[Q](#)

[Advanced search](#)

No results found.
Please check for typos, or use fewer terms or fields.

Kata kunci: *Tanaman imunostimulan*



ScienceDirect Journals & Books [Register](#)

Find articles with these terms

[Q](#)

Year: 2011-2021 [X](#)

[Advanced search](#)

136 results sorted by relevance | date

Refine by:

Years

- 2021 (6)
- 2020 (27)
- 2019 (24)
- 2018 (16)
- 2017 (14)
- 2016 (12)
- 2015 (12)
- 2014 (8)
- 2013 (7)
- 2012 (6)
- 2011 (4)

Custom range

Show less [^](#)

Article type [@](#)

- Research articles (136)

Research article
A novel *herbal immunostimulant* for rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) against *Yersinia ruckeri*
Fish & Shellfish Immunology, 28 December 2020, ...
Ertugrul Terzi, Bunyamin Kucukkosker, ... Sukru Senol Parug

Research article
Protection of *Penaeus monodon* against white spot syndrome virus by inactivated vaccine with *herbal immunostimulants*
Fish & Shellfish Immunology, June 2012, ...
Aiyakani Yogeeswaran, Subramanian Velmurugan, ... Thavasimuthu Citarasu

Want a richer search experience?
Sign in for article previews, additional search fields & filters, and multiple article download & export options.
[Sign in >](#)

Research article
***Plant polysaccharides* used as *immunostimulants* enhance innate immune response and disease resistance against *Aeromonas hydrophila* infection in fish**
Fish & Shellfish Immunology, December 2016, ...
Erlong Wang, Xia Chen, ... Xiandao Wei

Kata kunci: *Immunostimulant herbal plant*

ScienceDirect Journals & Books [Register](#)

Find articles with these terms

Standardization immunostimulant plant isolates

Year: 2011-2021 X

Advanced search

45 results sorted by relevance | date

Refine by:

Years

2021 (6)

2020 (5)

2019 (2)

2018 (3)

2017 (5)

2016 (7)

2015 (3)

2014 (7)

2013 (3)

2012 (1)

2011 (3)

Custom range

Show less ^

Article type [🔗](#)

Research article

β -1,3-Glucan from *Euglena gracilis* as an immunostimulant mediates the antiparasitic effect against *Mesanoophrys* sp. on hemocytes in marine swimming crab (*Portunus trituberculatus*)

Fish & Shellfish Immunology, 10 April 2021, ...

Summia Perveen, Lujia Yang, ... Fei Yin

Research article

Raw starch microparticles have immunostimulant activity in mice vaccinated with BCG and challenged with *Mycobacterium tuberculosis*

Vaccine, 14 August 2017, ...

Silvia Moreno-Mendieta, Jorge Barrios-Payán, ... Romina Rodríguez-Sanoja

Want a richer search experience?

Sign in for article previews, additional search fields & filters, and multiple article download & export options.

[Sign in >](#)

Research article

In vivo and in vitro antimicrobial activity of phytol, a diterpene molecule, isolated and characterized from *Adhatoda vasica* Nees. (Acanthaceae), to control severe bacterial disease of ornamental fish, *Carassius auratus*, caused by *Bacillus licheniformis* PKBMS16

Microbial Pathogenesis, 15 January 2020, ...

Feedback

Kata kunci: *Standarization immunostimulan plant isolates*

ScienceDirect Journals & Books [Register](#)

Find articles with these terms

Standardization immunostimulant plant extract

Year: 2011-2021 X

Advanced search

153 results sorted by relevance | date

Refine by:

Years

2021 (20)

2020 (22)

2019 (15)

2018 (11)

2017 (18)

2016 (16)

2015 (9)

2014 (13)

2013 (9)

2012 (7)

2011 (13)

Custom range

Show less ^

Article type [🔗](#)

Review articles (77)

Research article [Open access](#)

Design and characterization of propolis extract loaded self-nano emulsifying drug delivery system as immunostimulant

Saudi Pharmaceutical Journal, 1 May 2021, ...

Annisia Fitri, Suoi Hanifah, ... Yandi Syukri

[Download PDF](#)

Research article

β -1,3-Glucan from *Euglena gracilis* as an immunostimulant mediates the antiparasitic effect against *Mesanoophrys* sp. on hemocytes in marine swimming crab (*Portunus trituberculatus*)

Fish & Shellfish Immunology, 10 April 2021, ...

Summia Perveen, Lujia Yang, ... Fei Yin

Want a richer search experience?

Sign in for article previews, additional search fields & filters, and multiple article download & export options.

[Sign in >](#)

Research article

Pectin of cacao pod husk, an efficient immunostimulant for white shrimp, *Litopenaeus vannamei*

Fish & Shellfish Immunology, 24 October 2020, ...

Chia-Ling Lee, Chin-Chyuan Chang, ... Winton Cheng

Feedback

Kata kunci: *Standardization immunostimulant plant extract*

google Scholar

Articles 11 results (0.03 sec) My profile

Articles added in the last year, sorted by date Abstracts Everything

Tip: Search for English results only. You can specify your search language in Scholar Settings.

Peningkatan Pengetahuan Terhadap Pemanfaatan Obat Tradisional Untuk Menjaga Daya Tahan Tubuh Di Masa Pandemi Covid-19 [PDF] unipasby.ac.id
 DP Sari, AW Mukti - SNHRP, 2021 - snhrp.unipasby.ac.id
 53 days ago - ... Indonesia kaya akan sumber daya alamnya dan pengobatan tradisional menggunakan bahan ala mini sudah menjadi kebiasaan turun temurun. Pemerintah Indonesia telah menyarankan penggunaan beberapa **tanaman** obat sebagai agen **imunostimulan** ...
 ☆ 99 Cited by 1

KOMBINASI SIRIH DAN KIPAHIT SEBAGAI IMUNOSTIMULAN TERHADAP PENYAKIT Streptococcus PADA IKAN NILA (Oreochromis niloticus) [PDF] kkp.go.id
 N Nafiqoh, S Andriyanto, H Novita... - Jurnal Riset ..., 2021 - ejournal-baltibang.kkp.go.id
 62 days ago - ... Peningkatan sistem imun dari ikan yang dibudidayakan merupakan cara yang efektif untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satu fungsi **tanaman** obat adalah sebagai **imunostimulan**, di mana sistem imun akan meningkat terutama saat mengalami wabah penyakit ...
 ☆ 99

Efek Imunomodulator Ekstrak N-Heksana Temu Mangga (Curcuma mangga Val.) Terhadap Aktivitas Fagositosis dan Titer Antibodi Mencit Jantan
 MS Sinaga - 2020 - repositori.usu.ac.id
 195 days ago - ... Latar Belakang: Temu Mangga (Curcuma mangga Val.) merupakan **tanaman** dari famili Zingiberaceae, yang mengandung berbagai zat seperti flavonoid, steroid/triterpenoid yang dapat berfungsi sebagai **imunostimulan**. Tujuan ...
 ☆ 99

Kata kunci: *Tanaman imunostimulan*

Google Scholar

Articles About 20 results (0.03 sec) My profile

Articles added in the last year, sorted by date Abstracts Everything

Nyctanthes arbor-tristis: A traditional herbal plant with miraculous potential in medicine [PDF] researchgate.net
 H Rawat, Y Verma, NS Ayesha, N Negi, HC Pant... - researchgate.net
 25 days ago - ... actions such as anti-arthritis, antispasmodic, antibacterial, anti-inflammatory, **immunostimulant**, antidiabetic, hepatoprotective ... It is an **herbal** remedy for treating sciatica, malaria, enlargement of spleen ... **Immuno-stimulant** activity: Aqueous leaf extract of NAT has been found ...
 ☆ 99

Poguntano Herba Extract Immunostimulant Activities (Picriafel-terraeLour). in Immunosuppression Rats Infected by Staphylococcus aureus Against Total Leukocytes ... [PDF] usu.ac.id
 A Ningtias - Indonesian Journal of Pharmaceutical and Clinical ..., 2021 - talenta.usu.ac.id
 30 days ago - ... **immunostimulants**, immunosuppressants, Staphylococcus aureus ... Based on the description above, this study aims to determine the effect of **immunostimulant** activity of poguntano ... increase total leukocytes, an increase in the number of leukocytes is due to the **herbal** ...
 ☆ 99

Evaluation of Acute, Subacute and LD 50 values of Methanolic extract of Sphaeranthus indicus leaves in Albino mice [HTML] rjptonline.org
 GP Choudhary, AP Jain - Research Journal of Pharmacy and ..., 2021 - rjptonline.org
 33 days ago - ... increase in lymphocyte count was noted in both sexes supported **immunostimulant** activity ... Along these lines, poisonous quality investigations of **herbal** product don't typically get as ... Although numerous pharmacological studies have been carried out with this **herb**, there ...
 ☆ 99 All 2 versions

Kata kunci: *Immunostimulan plant herbal*

Google Scholar Standardization immunostimulant plant isolates

Articles 1 result (0.03 sec) [My profile](#)

Any time
 Since 2021
 Since 2020
 Since 2017
 Custom range...

Sort by relevance
 Sort by date

include patents
 include citations

Create alert

Articles added in the last year, sorted by date [Abstracts](#) [Everything](#)

Immunomodulatory effects of 7-hydroxy frullanolide, a plant-based sesquiterpene lactone, in inhibiting immune cell responses and roles of disease and vaccination ...
 S Pathak - 2021 - etd.iisc.ac.in
 132 days ago - ... that are used either to suppress (immunosuppressants) or enhance (immunostimulants) immune responses ... Sesquiterpene lactones are a major class of plant-based immunomodulators that are ... using the autodock modelling simulation software and standardized ...

☆ [🔗](#) [🔗](#)

Kata kunci: *Standardization immunostimulant plant isolates*

Google Scholar Standardization immunostimulant plant extract

Articles 1 result (0.05 sec) [My profile](#)

Any time
 Since 2021
 Since 2020
 Since 2017
 Custom range...

Sort by relevance
 Sort by date

include patents
 include citations

Create alert

Articles added in the last year, sorted by date [Abstracts](#) [Everything](#)

[PDF] Tropical Journal of Natural Product Research [\[PDF\] cu.edu.eg](#)
 A Ramadan, G Kamel, AA Shokry, RA El-Shiekh - 2020 - scholar.cu.edu.eg
 220 days ago - ... to determine anti-ageing and immunomodulatory effect of apricot seed standardized extract and its ... Standardization of the extract Instrumentation HPLC analysis of the samples and standard was ... extract in cosmetic skin creams as anti-wrinkle and immunostimulant component ...

☆ [🔗](#) [🔗](#) Related articles All 2 versions [🔗](#)

Kata kunci: *Standardization immunostimulant plant extract*

Lampiran 3: Screenshot jurnal

Tropical Journal of Pharmaceutical Research January 2018; 17 (1): 77-84
ISSN: 1596-5996 (print); 1596-9827 (electronic)
© Pharmacotherapy Group, Faculty of Pharmacy, University of Benin, Benin City, 300001 Nigeria.

Available online at <http://www.tjpr.org>
<http://dx.doi.org/10.4314/tjpr.v17i1.12>

Original Research Article

Immunostimulant activity of standardised extracts of *Mangifera indica* leaf and *Curcuma domestica* rhizome in mice

Endang Kumolosasi*, Siti Nur Aisyah Ibrahim, Siti Munirah Ahmad Shukri, Waqas Ahmad
Drug and Herbal Research Center, Faculty of Pharmacy, Universiti Kebangsaan Malaysia, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300, Kuala Lumpur, Malaysia

*For correspondence: **Email:** e_kumolosasi@yahoo.co.id, e_kumolosasi@ukm.edu.my; **Tel:** +60-392898054

Sent for review: 9 June 2017 Revised accepted: 16 October 2017

Abstract

Purpose: To investigate the immunomodulating activity of *Mangifera indica* (MI) and *Curcuma domestica* (CD) extracts in mice.

Methods: Mice were randomly divided into 4 groups, namely, vehicle, untreated, MI and CD groups (n = 6). They were treated with MI (160 mg/kg) or CD (200 mg/kg) extracts, and vehicle for control group, for 14 days and sacrificed on day 15. In innate immunity test, the mice were challenged with sheep red blood cells (SRBCs) antigen on day 8, while in adaptive immunity test, mice were immunized and challenged on days 7 and 14, respectively, with SRBC. White blood cells count (WBC), spleen index (SI), and haemagglutination (HA) titer, and delayed type hypersensitivity (DTH) responses were determined.

Drug Design, Development and Therapy

Dovepress

open access to scientific and medical research

Open Access Full Text Article

ORIGINAL RESEARCH

Immunostimulatory effects of the standardized extract of *Tinospora crispa* on innate immune responses in Wistar Kyoto rats

This article was published in the following Dove Press journal:
Drug Design, Development and Therapy

10 June 2015

Number of times this article has been viewed

Waqas Ahmad
Ibrahim Jantan
Endang Kumolosasi
Syed Nasir Abbas Bukhari

Drug and Herbal Research Centre,
Faculty of Pharmacy, Universiti
Kebangsaan Malaysia, Jalan Raja Muda
Abdul Aziz, Kuala Lumpur, Malaysia

Abstract: *Tinospora crispa* (TC) has been used in folkloric medicine for the treatment of various diseases and has been reported for several pharmacological activities. However, the effects of TC extract on the immune system are largely unknown. Therefore, the present study was aimed to investigate the immunomodulatory effects of a standardized 80% ethanol extract of the stem of TC on innate immune responses. Male Wistar Kyoto rats were treated daily at 100 mg/kg, 200 mg/kg, and 400 mg/kg doses of the extract for 21 days by oral gavage. The immunomodulatory potential of TC was evaluated by determining its effect on chemotaxis and phagocytic activity of neutrophils isolated from the blood of rats. To further elucidate the mechanism of action, its effects on the proliferation of T- and B-lymphocytes and T-lymphocytes subsets (CD4+ and CD8+) and on the secretion of Th1 and Th2 cytokines were also monitored. The main components of the extracts, syringin and magnoflorin, were identified and quantitatively analyzed in the extracts by using a validated reversed-phase high-performance liquid chromatography method. It was observed that the chemotactic activity of neutrophils obtained



Contents lists available at ScienceDirect

Phytomedicine

journal homepage: www.elsevier.de/phymed



Stimulation of IFN- γ production by garlic lectin in mouse spleen cells: Involvement of IL-12 via activation of p38 MAPK and ERK in macrophages

Qing Dong^a, Tsutomu Sugiura^b, Yumiko Toyohira^c, Yasuhiro Yoshida^b,
Nobuyuki Yanagihara^{c,*}, Yuji Karasaki^a

^a Department of Human Information and Life Sciences, School of Health Sciences, University of Occupational and Environmental Health, Yahatanishi-ku, Kitakyushu 807-8555, Japan

^b Department of Immunology and Parasitology, University of Occupational and Environmental Health, School of Medicine, Yahatanishi-ku, Kitakyushu 807-8555, Japan

^c Department of Pharmacology, University of Occupational and Environmental Health, School of Medicine, 1-1, Iseigaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu 807-8555, Japan

ARTICLE INFO

Keywords:

ABSTRACT

Several lectins, present in beans and edible plant products, have immuno-potentiating and anti-tumor



Carbohydrate Polymers

journal homepage: www.elsevier.com/locate/carbpol



Isolation, purification, characterization and immunostimulatory activity of polysaccharides derived from American ginseng

Xiao-Hong Yu, Ying Liu^{*}, Xian-Ling Wu, Li-Zhai Liu, Wei Fu, Dan-Dan Song

College of Food Engineering, Harbin University of Commerce, Harbin, 150076, China



ARTICLE INFO

Article history:

Received 22 June 2016

Received in revised form 25 August 2016

Accepted 26 August 2016

Available online 28 August 2016

Keywords:

American ginseng

Polysaccharide

ABSTRACT

In this study, crude American ginseng polysaccharide (AGPS) was extracted with hot water and preliminarily purified by using resin S-8 and Polyamide columns. Then, it was further purified and separated by DEAE-Sephrose CL-6B and Sepharose CL-6B chromatography, respectively. Five main fractions were obtained, named WPS-1, WPS-2, SPS-1, SPS-2 and SPS-3. Their homogeneities and structural characteristics were elucidated based on UV-vis spectroscopy, High Performance Gel Filtration Chromatography (HPGFC), Gas Chromatography (GC), Scanning Electron Microscopy (SEM), Infrared Spectrum (IR), and NMR Spectroscopy methods. Furthermore, the immunostimulatory effects of these fractions upon splenic lymphocyte proliferation, macrophage phagocytosis and nitric oxide (NO) production, were investigated



Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine

journal homepage: www.elsevier.com/locate/apjtb



Document heading

doi:

©2012 by the Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. All rights reserved.

Isolation and characterization of glucosamine from *Azadirachta indica* leaves: An evaluation of immunostimulant activity in mice

Venugopalan Santhosh Kumar^{1*}, Visweswaran Navaratnam^{1,3}, Aiyalu Rajasekaran², Narenk Nair¹,
Dorai Soundaraj Priya Matharasi⁴, Srinivasan Narasimhan⁴, Subramaniam Ramachandran²

¹Centre for Drug Research, Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia

²KMCH College of Pharmacy, Coimbatore 641048, Tamilnadu, India

³Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi), 1 Place St Gervais, CH-1201 Geneva, Switzerland

⁴Asthagiri Herbal Research Foundation, Perungudi, Chennai, India

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received 17 August 2012

Received in revised form 8 September 2012

Accepted 13 November 2012

Objective: To evaluate the potential immunostimulant activity of glucosamine from *Azadirachta indica* leaves in mice. **Methods:** The hexane, chloroform, methanol and aqueous extracts of *Azadirachta indica* leaves were prepared and its immunostimulant activity was studied.



Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Asian Pacific Journal of Tropical Medicine

journal homepage: www.elsevier.com/locate/apjtm



Document heading

doi:

Immunomodulatory activity of a lupane triterpenoid ester isolated from the eastern Nigeria mistletoe, *Loranthus micranthus* (Linn)

Omeje Edwin Ogechukwu^{1*}, Osadebe Patience Ogoamaka¹, Nworu Chukwuemeka Sylvester²,
Akira Kawamura³, Peter Proksch⁴

¹Department of Pharmaceutical and Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Nigeria, 410001, Nsukka, Nigeria

²Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Nigeria, 410001, Nsukka, Nigeria

³Department of Chemistry, Hunter College of CUNY, The City University of New York, U.S.A

⁴Department of Pharmaceutical Biology, Heinrich-Hein University, Düsseldorf, Germany

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received 21 February 2011

Received in revised form 11 April 2011

Objective: To provide further evidence for the ethnomedicinal use of the Eastern Nigeria mistletoe, *Loranthus micranthus* (*L. micranthus*), as an immunostimulant. **Methods:** Solvent fractions from the crude extract of the mistletoe plant was obtained and compared by the



Document heading

Immunomodulatory activity of butanol fraction of *Gentiana olivieri* Griseb. on Balb/C mice

Satnam Singh¹, Yadav CPS², Malleshappa N Noolvi^{1*}

¹Department of Pharmaceutical Sciences, ASBASJSM College of Pharmacy, Bela (Ropar)-140111, Punjab, India

²MJRP College of Health Care and Allied Sciences Mahatma Jyoti Rao Phoolke University, Jaipur, Rajasthan, India

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received 25 September 2011

Received in revised form 5 November 2011

Accepted 2 December 2011

Available online 28 June 2012

Objective: To explore the immunomodulatory properties of 80% ethanol extract and butanol fraction of *Gentiana olivieri* (*G. olivieri*) Griseb on Balb/C mice. **Methods:** The study was performed with basic models of immunomodulation such as the humoral antibody response (hemagglutination antibody titres), cell mediated immune response (delayed type hypersensitivity and *in vivo* carbon clearance or phagocytosis). Ethanol (80%) extract of flowering aerial parts of *G. olivieri* and its butanol fraction were administered p.o. (orally) to the mice. Levamisole, 2.5 mg/kg was used as standard drug. **Results:** There was a potentiation of immune response to sheep red blood

**Pharmaceutical
Biology**

<http://informahealthcare.com/phb>
ISSN 1388-0209 print/ISSN 1744-5116 online
Editor-in-Chief: John M. Pezzuto
Pharm Biol, Early Online: 1-9
© 2015 Informa Healthcare USA, Inc. DOI: 10.3109/13880209.2015.1050116

**informa
healthcare**

ORIGINAL ARTICLE

Phytochemical, chromatographic and spectroscopic investigation of *Carum copticum* seeds and their potential as immunomodulatory agents

Pankaj K. Sonar¹, Ranjit Singh², and Shailendra K. Saraf³

¹Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Babu Banarasi Das Northern India Institute of Technology, Lucknow, Uttar Pradesh, India, ²Government College of Pharmacy, Rohru, Dist. Shimla, Himachal Pradesh, India, and ³Faculty of Pharmacy, Babu Banarasi Das Northern India Institute of Technology, Lucknow, Uttar Pradesh, India

Abstract

Context: *Carum copticum* seeds have been prescribed in the traditional system of medicine for the treatment of immune disorders, such as asthma and rheumatism.

Objective: The objective of this study was to determine immunomodulatory effects of the alcoholic extract and isolated compounds in Swiss albino mice.

Materials and methods: Seeds of *C. copticum* were extracted with 95% v/v alcohol. The immunomodulatory activity of the crude extract was evaluated at the doses of 100, 300, and 500 mg/kg body weight of mice, administered in mice once daily (orally) for 25 days. Volatile oil of *C. copticum* was isolated by steam distillation and was characterized by GLC and HPLC. Bioassay-guided fractionation and isolation were carried out and the isolated compounds were characterized and subjected to immunomodulatory activity studies.

Results: The *n*-hexane fraction yielded *p*-cymene, carvacrol, and α -pinene. The LD₅₀ value of the crude extract was found to be 4500 mg/kg and the values reported for *p*-cymene, carvacrol, and

Keywords

DTH-response, HA-titer, immunomodulation, phagocytosis, thymol, WBC

History

Received 20 January 2015

Accepted 7 May 2015

Published online 1 June 2015



Cite this: DOI: 10.1039/c5fo00389j

Raspberry pulp polysaccharides inhibit tumor growth *via* immunopotential and enhance docetaxel chemotherapy against malignant melanoma *in vivo*

Yong-Jing Yang,^{a,b} Han-Mei Xu^c and You-Rui Suo^{*a,d}

It has been reported previously that the systemic efficacy of chemotherapeutic agents is substantially restricted for some cancer types, including malignant melanoma. Therefore, the development of more effective treatment modalities remains a critical, albeit elusive, goal in anticancer therapy. The study presented here evaluates the antitumor activity of raspberry pulp polysaccharides (RPPs) against malignant melanoma using a murine tumor-bearing model. Furthermore, the underlying mechanism of this anti-tumor activity has also been investigated. The results show that while RPP exhibits no direct cytotoxic effect on HT-29, MGC-803, HeLa, Bel-7402, L02 and B16F10 cells *in vitro*, it does demonstrate a dose-dependent growth inhibition of melanoma *in vivo* with an inhibition ratio of 59.95% at a dose of 400 mg kg⁻¹. Besides this, the body weight and spleen index in tumor-bearing mice have also been improved in RPP-treated groups. RPP is also found to induce splenocyte proliferation and is able to upregulate the activity of immune-related enzymes, including acid phosphatase (ACP), alkaline phosphatase (AKP), lactate dehydrogenase (LDH) and superoxide dismutase (SOD) in the spleen of tumor-bearing mice. The levels of tumor necrosis factor α (TNF- α), interferon γ (IFN- γ) and interleukin 2 (IL-2) in the serum of tumor-bearing mice show to be effectively increased upon RPP treatment. Histopathological analyses show that RPP induces tumor tissue necrosis by increasing inflammatory cell infiltration and causes no lesions to

July 2015. Downloaded by Nanjing Technological University on 20/08/2015 19:25:26.

Accepted Manuscript

Title: Structural elucidation and immune-enhancing activity of an arabinogalactan from flowers of *Carthamus tinctorius* L

Authors: Yanli Yao, Jian Yao, Zhenyun Du, Peipei Wang, Kan Ding



PII: S0144-8617(18)31007-5
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.08.098>
Reference: CARP 13995

To appear in:

Received date: 25-4-2018
Revised date: 31-7-2018
Accepted date: 24-8-2018

Please cite this article as: Yao Y, Yao J, Du Z, Wang P, Ding K, Structural elucidation and



BIOEUSER, 1(3):104-115
Desember 2017
ISSN: 2597-6753

Potensi ekstrak daun flamboyan [*Delonix regia* (Boj. Ex Hook.) Raf.] terhadap peningkatan aktivitas dan kapasitas makrofag

*The potential of flamboyan leaf extract [*Delonix regia* (Boj. Ex Hook.) Raf.] against the increasing activity and capacity of macrofag*

Rosnizar Rosnizar^{*1}, Siti Maulida¹, Kartini Eriani¹, Suwarno¹

^{*}Jurusan Biologi FMIPA Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Indonesia, Email: rosnizarjamil@gmail.com

Abstract: Activity and capacity of macrophage were the important factor to increase the immune system. Some of compound from plant such as Flamboyant leaves [*Delonix regia* (Boj. ex Hook.) Raf.] contain flavonoids compounds that have been reported could increase the total of leukocyte and relative weight of mice spleens. This study was carried out to determine the potential effect of *D. regia* leaves as immunostimulant for mice (*Mus musculus*). This study used *Staphylococcus aureus* as an infection agent. This study used a complete randomized design with control (aquadest) (P₀), positive control (Stimuno) (P₁).



Lampiran 4: Gambar tanaman

Gambar	Nama tanaman
	Bawang putih
	Benalu
	Brotowali
	Biji jintan

 A photograph of several ginseng roots with their characteristic fibrous root systems, resting on a light-colored wooden surface.	<p>Ginseng</p>
 A photograph showing a small glass jar and a metal bowl filled with bright red, thread-like saffron threads (Kasumba turate) on a patterned fabric background.	<p>Kasumba turate</p>
 A photograph of several green, serrated leaves (Daun mimba) and a few cinnamon sticks (Daun mace) lying on a white background.	<p>Daun mimba</p>
 A photograph of a branch with several large, green, ovate leaves (Daun manga) on a white background.	<p>Daun manga</p>

 A photograph of a field of blue gentian flowers (Gentiana olivieri) with green foliage in the background.	<p>Bunga gentian olivieri</p>
 A photograph of the green, feathery leaves of a flamboyant tree (Delonix regia) with some yellow seed pods visible.	<p>Daun flamboyant</p>
 A close-up photograph of several ripe, red raspberries on a stem with green leaves.	<p>Buah rasberi</p>
 A photograph showing several pieces of fresh turmeric rhizomes and a small wooden bowl filled with bright yellow turmeric powder.	<p>Rimpang kunyit</p>

RIWAYAT HIDUP



Merupakan seorang anak yang bernama Nurhikmah yang sering disapa Hikmah dia lahir pada tanggal 11 Oktober di Gowa. Merupakan buah hati dari pasangan bapak Latif dan Ibu Jumalia. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara.

Dia memulai jenjang pendidikan di TK pusat padu harapan pada usia 5 tahun dan lanjut di SD Inpres Sicini Kec. Parigi, Kab Gowa. Saat menduduki kelas 5 SD, ia telah mulai memasuki Organisasi pramuka. Pada tahun 2011, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Parigi. Dan pada 2014 memasuki jenjang pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Parigi yang sekarang dikenal dengan SMA Negeri 12 Gowa. Dan pada tahun 2017 penulis mulai memasuki perguruan tinggi di salah satu Universitas Negeri yang ada di Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengambil jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan.

Prinsip hidup yang penulis pegang jangan takut gagal karena kegagalan adalah awal dari keberhasilan dan teruslah berproses karena setiap proses tidak akan pernah mengkhianati hasil.

