

**PENETAPAN KADAR TANIN EKSTRAK ETANOL DAUN
KETEPENG CINA (*Cassia alata L.*) MENGGUNAKAN
METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS DAN
LOWENTHAL-PROCTER**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SRI ULFASARI
NIM: 70100117048

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Ulfasari
NIM : 70100117048
Tempat/Tgl. Lahir : Bantaeng/16 April 1999
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jln. Mustafa Daeng Bunga Paccinongan.
Judul : Penetapan Kadar Tanin ekstrak Etanol Daun Ketepeng Cina (*Cassia alata* L.) Menggunakan Metode Spektrofotometri UV-VIS dan Lowenthal-procter.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Oktober 2021



Sri Ulfasari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "Penetapan Kadar Tanin Ekstrak Etanol Daun Ketepeng Cina (*Cassia alata* L.) Menggunakan Metode Spektrofotometri UV-VIS dan Lowenthal-Procter" yang disusun oleh Sri Ulfasari, NIM: 70100117040, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Manaqiyah* yang diselenggarakan pada hari *Jum'at*, 12 November 2021 M yang bertepatan dengan 7 Rabiul Akhir 1443 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 12 November 2021 M
7 Rabiul akhir 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatrah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Apt. Mukhriani, S.Si, M. Si	(.....)
Pembimbing II	: Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M. Si	(.....)
Penguji I	: Dr. Nurhidayah Muh. Said, S.Ag., MAg	(.....)
Penguji II	: Haeris, S. Si., M. Si.	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatrah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 300604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya. Syukur penulis panjatkan kepada Allah swt.. Sang Maha Pemilik segala yang ada. Yang membolak-balikkan hati, Dia yang menduduki singgasana tertinggi, sehingga atas pertolongan-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Maha Besar Allah, yang mengutus sang penjelas antara yang makhruf dan munkar. Sang pembawa risalah, penerus, dan penyempurna ajaran Nabi-nabi terdahulu. Shalawat semoga selalu tercurah kepada beliau, Nabi Muhammad saw.

Skripsi dengan judul “Petetapan Kadar Tanin Ekstrak Etanol Daun Ketepeng Cina (*Cassia alata* L.) Dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis dan Lowenthal-Procter” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat lika liku yang harus dihadapi. Namun karena adanya dukungan, nasehat, dan semangat yang tak henti dari berbagai pihak sehingga penelitian ini terselesaikan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis sadar mendapat banyak partisipasi, kontribusi, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus sebagai ungkapan kebahagiaan:

1. Prof. Hamdan Juhannis MA.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.

2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr.Hj.Gemy Nastity Handayani., S.Si., M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
4. Dr.H.M. Fais Satrianegar,S,KM.,MARS. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.
7. Apt. Syamsuri syakri, S.Farm., M.Si. selaku sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
8. Apt. Mukhriani, S. Si, M. Si. Selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan nasehat serta motivasi yang sangat luar biasa. Terimah kasih atas segala waktu yang diluangkan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa kepada penulis.
10. Dr. Nurhidayat Muh. Said, S. Ag., M. Ag. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan bantuan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini serta meluangkan banyak waktu dan bimbingan kepada penulis.
11. Haeria, S.Si., M.Si., Selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan arahan, nasehat dan meluangkan waktunya untuk penulis. Terimah kasih atas segala doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis

12. Apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M. Farm selaku pelaksana kegiatan ujian akhir yang telah banyak meluangkan waktu, usaha, dan kerja kerasnya dalam membantu terselenggaranya ujian akhir bagi peneliti.
13. Bapak Ibu Dosen yang ikhlas dalam membagi seluruh ilmunya, semoga jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt.. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
14. Kepada seluruh Laboran, Laboratorium Kimia dan Laboratorium Instrumen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pancasakti Makassar, yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
15. Kepada kedua orang tua, Rahma (Ibu) dan Suardi (Bapak) penghargaan setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan. Yang telah membesarkan dan menyekolahkan anaknya sampai keperguruan tinggi, yang selalu memberikan motivasi, semangat, kasih sayang dan nasehat untuk tetap sabar.
16. Kepada Gustiawan dan Gustiranda selaku kakak saya serta Asyifatul khasanah selaku adik saya dan seluruh keluarga yang tak pernah berhenti berdo'a, memberikan semangat, motivasi, nasehat dan bantuan kepada penulis
17. Kepada Nurzakiyah, Rakhmi Khasanah, Kharisah Afifa, Munawwara dan Yustika Annisa Hamzah, selaku teman, sahabat dan saudara saya diperantauan yang selalu kebersamai baik suka maupun duka, saling menguatkan satu sama lain saling membantu dan memberikan motivasi serta semangatnya kepada penulis

18. Kepada teman-teman kovalen 2017, Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan memberikan support selalu hingga bisa pada tahap menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dan kepada teman-teman yang lain yang tidak sempat saya sebut satu per satu terima kasih atas bantuan, kerjasama, dan do'anya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan namun besar harapan untuk bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah swt..

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, 19 September 2021
Penyusun,



Sri Ulfasari
Nim:70100117048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIError! Bookmark not defined.	
PENGESAHAN SKRIPSIError! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Daun Ketepeng cina (<i>Cassia alata</i> L.)	10
B. Tanin.....	12
C. Metode Folin-ciocalteu.....	15
D. Spektrofotometri UV-VIS	17
E. Lowenthal-procter	19
F. Metode Ekstraksi	20
G. Tinjauan Islam	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29

C. Instrumen Penelitian	29
E. Prosedur Kerja	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian.....	35
B. Penetapan Kadar Tannin Menggunakan Spektrofotometri UV-VIS	35
C. Hasil Penetapan Kadar Tannin Menggunakan Metode Lowenthal- Procter	40
BAB V PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN.....	47
RIWAYAT HIDUP	67

DAFTAR TABEL

Table 1. Uji kualitatif tannin.....	34
Table 2. Hasil kadar tanin dengan metode Spektofotometri UV-VIS.....	34
Table 3. Hasil pembakuan laturan dengan Asam Oksalat.....	38
Table 4. hasil titrasi sampel.....	38
Table 5. hasil titasi blanko.....	39
Table 6. Hasil perhitungan kadar tannin.....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Daun ketepeng cina.....	10
Gambar 2. Jenis-jenis tannin.....	14
Gambar 3. Reaksi folin ciocalteu dengan fenol.....	16
Gambar 4. Skema kerja Spektrofotometri UV-VIS.....	17
Gambar 5. Reaksi senyawa tanin dengan FeCl_3	36
Gambar 6. Reaksi senyawa tanin dengan gelatin.....	36
Gambar 7. Reaksi senyawa fenol dengan folin ciocalteu.....	38
Gambar 8. Kurva baku asam tanat.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema kerja.....	47
Lampiran 2. Pembuatan Larutan.....	54
Lampiran 3. Pengukuran standar dan kurva kalibrasi.....	56
Lampiran 4. Perhitungan kadar total tannin dengan metode spektrofotometri UV-VIS.....	57
Lampiran 5. Perhitungan kadar total tannin dengan metode Lowenthal-procter....	59
Lampiran 6. Gambar preparasi sampel.....	61
Lampiran 7. Gambar Uji kualitatif tannin.....	62
Lampiran 8. Penetapan kadar tannin dengan spektrofotometri uv-vis.....	63
Lampiran 9. Penetapan kadar tannin dengan Lowenthal procter.....	64



ABSTRAK

Nama : SRI ULFASARI
Nim : 70100117048
Jurusan : Farmasi
Judul skripsi : Penetapan Kadar Tanin ekstrak Etanol Daun Ketepeng Cina (*Cassia alata* L.) Menggunakan Metode Spektrofotometri UV-VIS dan Lowenthal-procter.

Ketepeng cina (*Cassia alata* L.) merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat tradisional dimana berfungsi mengobati panu, kadas, kurap, cacangan, sembelit, dan sariawan. ketepeng cina mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, antrakuinon, saponin dan tanin. Tanin diketahui merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang mempunyai beberapa khasiat yaitu sebagai astringen, anti diare, anti bakteri dan antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar tannin yang terdapat dalam ekstrak etanol daun ketepeng cina. Preparasi sampel daun ketepng cina dilakukan dengan teknik ekstraksi maserasi dengan pelarut etanol 70%. Analisis kadar tanin ditentukan dengan metode Spektrofotometri UV-VIS dan Lowenthal-procter. Hasil analisis menunjukkan kadar tanin pada daun ketepng cina dengan metode spektrofotometri UV-VIS sebesar 1,075 % ekstrak, dan pada metode Lowenthal-procter sebesar 7,12636 %.

Kata kunci: Daun Ketepeng Cina, Tannin, Spektrofotometri UV-VIS, Lowental-Procter



ABSTRACT

Nama : SRI ULFASARI
Nim : 70100117048
Jurusan : Farmasi
Judul skripsi : Determination of Tannin Content of Ethanol Extract of Ketepeng Cina Leaves (*Cassia alata* L.) Using UV-VIS and Lowenthal-procter Spectrophotometric Methods.

Chinese ketepeng (*Cassia alata* L.) is a traditional medicine plant that can be used to cure tinea versicolor, ringworm, intestinal worms, constipation, and canker sores. Flavonoid chemicals, alkaloids, anthraquinones, saponins, and tannins are all found in Chinese ketepeng. Tannins are recognized to be active components of secondary metabolites with astringent, anti-diarrhea, anti-bacterial, and antioxidant effects. The goal of this study is to find out how much tannin is in the ethanol extract of Chinese Ketepeng leaves. The maceration extraction procedure was used to prepare the Chinese ketepng leaf samples, utilizing 70% ethanol as the solvent. UV-VIS spectrophotometry and Lowenthal-procter techniques were used to determine tannin content. The tannin concentration of the Chinese ketepng leaf was 1,075 % extract using the UV-VIS spectrophotometric method, and 7,12636 % using the Lowenthal-Procter method, according to the findings.

Keywords: Ketepeng Cina Leaves, Tannins, UV-VIS Spectrophotometry, Lowental-Procter

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai gudangnya tumbuhan obat. Penelitian tentang khasiat tumbuhan obat Indonesia sudah banyak dilakukan, diantaranya berbagai jenis tumbuh-tumbuhan liar, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman pangan, rempah-rempah (Pratama et al., 2019).

Banyak jenis tanaman yang dapat tumbuh di Indonesia yang sebagian besar dapat digunakan sebagai sumber bahan obat alam dan telah banyak digunakan oleh masyarakat secara turun temurun untuk keperluan pengobatan guna mengatasi masalah kesehatan. Obat tradisional tersebut perlu diteliti dan dikembangkan sehingga dapat bermanfaat secara optimal untuk peningkatan kesehatan masyarakat (Mihra et al., 2018)

Ketepeng cina (*Casia alata* L.) merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat tradisional dimana berfungsi mengobati panu, kadas, kurap, cacangan, sembelit, dan sariawan. (Mahmudah et al., 2018)

Ketepeng cina (*Cassia alata* L.) atau lebih dikenal dengan nama gelinggang memiliki rasa pedas dan bersifat hangat. Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam tanaman ini diantaranya tannin, rein aloe-emodina, rein aloe-emodinadiantron, asam krisofanat, alkaloida, saponoin, flavonoida, dan glkosida antrakinin. Pada umumnya, efek farmakologis yang dimiliki oleh ketepeng cina (*Cassia alata* L.) diantaranya sebagai pencahar, obat cacing, penghilang gatal-gatal, dan obat kelainan kulit yang disebabkan oleh parasit kulit. (Mahmudah et al., 2018)

Pada penelitian Asmah, (2020). Mengemukakan bahwa Berdasarkan analisa kandungan senyawa metabolit sekunder ekstrak daun ketepeng Cina (C.

alata L.) menunjukkan bahwa pada daun kering menunjukkan adanya senyawa alkaloid, fenol dan tannin. Sedangkan pada daun segar diperoleh adanya senyawa alkaloid, steroid, terpenoid, saponin, flavonoid, fenol dan dan tannin. Senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam daun ketepeng cina adalah senyawa polar, yang disebabkan oleh pelarut yang digunakan adalah polar.

Pada penelitian Octarya dan Saputra (2015). Juga mengemukakan bahwa pada Skrining fitokimia serbuk simplisia menunjukkan bahwa serbuk daun ketepeng cina mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, antrakuinon, saponin dan tanin. Ekstraksi serbuk daun ketepeng cina dilakukan dengan metode refluks menggunakan pelarut etanol 70%, n-heksana dan aquades.

Tanin diketahui merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang mempunyai beberapa khasiat yaitu sebagai astringen, anti diare, anti bakteri dan antioksidan. Tanin merupakan komponen zat organik yang sangat kompleks, terdiri dari senyawa fenolik yang sukar dipisahkan dan sukar mengkristal, mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut (Pratama et al., 2019)

Tanin memiliki beberapa khasiat diantaranya menghentikan pendarahan dan mengobati luka bakar, menghentikan internal healing berjalan dan tanin mampu membuat lapisan pelindung luka dan ginjal. Tanin digunakan sejak lama sebagai pengobatan cepat diare, disentri, perdarahan, dan mereduksi ukuran tumor. Berbagai virus in aktif dengan paparan tannin (Pratama et al., 2019).

Tanin dapat digunakan sebagai antibakteri karena mempunyai gugus fenol, sehingga tanin mempunyai sifat-sifat seperti alkohol yaitu bersifat antiseptik yang dapat digunakan sebagai komponen antimikroba. (Mihra et al., 2018).

Pada penelitian Yakubu, et. al. (2010) telah melakukan skrining fitokimia bahwa ekstrak ketepeng cina (*Cassia alata* L.) positif mengandung saponin

(1.22%), flavonoid (1.06%), glikosida jantung (0.20%), kardenolid dan dienolides (0.18%), fenolik (0.44%) dan alkaloid (0.52%).

Pada penelitian Rahmawati, dkk (2015) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Kadar flavonoid dari fraksi etil asetat daun ketepeng cina (*Cassia alata* L. adalah sebesar 2,665 mgRE/g dan kadar fenoliknya sebesar 3,729 mgGAE/g.

Penetapan kadar tannin pada daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.) belum dilakukan maka dari itu perlu dilakukan analisis penetapan kadar tannin pada sampel tersebut.

Kandungan senyawa metabolit sekunder dalam suatu tanaman dapat diketahui dengan suatu metode pendekatan yang dapat memberikan informasi adanya senyawa metabolit sekunder, dalam hal ini adalah tanin. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode fitokimia. Selain itu untuk mengetahui jumlah kadar tanin tertinggi pada tumbuhan ketepeng cina yaitu dengan menggunakan metode Lowenthal-Procter. Prinsip metode Lowenthal-Procter yaitu berdasarkan jumlah gugus fenol pada senyawa tanin. Titrasi dengan larutan kalium permanganat, gugus fenol pada tanin akan teroksidasi. Jumlah gugus fenol berbanding lurus dengan jumlah kalium permanganat yang diperlukan untuk titrasi. Tanin termasuk golongan senyawa yang memiliki gugus fenol, sehingga 4 jumlah gugus fenol ini diasumsikan mewakili jumlah tanin secara keseluruhan (Sudarmadji, 1997 dalam Ummah, 2010).

Dalam perspektif Islam, segala hal yang diciptakan oleh Allah swt. tidaklah dengan sia-sia yang merupakan tanda-tanda kebesaran-Nya, tanpa terkecuali tumbuh-tumbuhan yang baik dan bermanfaat sehingga dapat digunakan sebagai pengobatan untuk berbagai penyakit. Salah satu hal yang menjadi tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya adalah Allah swt. menciptakan tumbuhan

ketepeng cina dengan kandungan dan manfaatnya bagi kesehatan. Al-Qur'an telah memberikan petunjuk bagi manusia yang senantiasa bersyukur dan ingin mengkaji lebih dalam tentang adanya ciptaan Allah swt..

Sebagaimana dalam firman-Nya QS al-Syu'ara'/26: 7 yang menjelaskan tentang Allah swt.. dengan segala kekuasaan-Nya telah menciptakan berbagai macam tumbuhan yang bermanfaat.

أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَىٰ آلِٰرَٰضِ كَمْ ۖ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya :

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (Kementerian Agama RI, 2014).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. mengajak kita untuk belajar dari seluruh alam bahwa hanya Allah swt. semata yang berhak untuk disembah. Bagi mereka yang mempertahankan kekufuran dan kedustaan dan jika mereka ingin merenungi adanya tanda-tanda kebesaran Allah swt. di bumi ini maka niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Allah swt. menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan baik sehingga mendatangkan manfaat (Shihab, 2002).

Pada QS al-Syu'arā'/26: 7 di atas menurut tafsir Al-Qurthubi ada tiga macam kata yang ditekankan yaitu kata *يَرَوْا* yang artinya memperhatikan, *زَوْجٍ* yang artinya tumbuh-tumbuhan dan *كَرِيمٍ* yang artinya baik dan mulia. Dalam ayat tersebut kita sebagai manusia diperintahkan untuk memperhatikan tumbuh-tumbuhan yang baik dan mulia yang telah Allah tumbuhkan di bumi ini. Tumbuh-tumbuhan yang baik dapat diartikan sebagai tumbuhan yang memiliki berbagai manfaat didalamnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai penetapan kadar tanin total dari ekstrak etanol daun

gelinggang (*Cassia alata* L.) dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-VIS dan lowental-procter.

B. Rumusan Masalah

1. Berapakah kadar tannin pada ekstrak etanol daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.) dengan metode spektrofotometri UV-VIS dan Lowenthal procter?
2. Berapakah perbandingan hasil kadar tannin ekstrak etanol daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.) dengan metode spektrofotometri UV-VIS dan dengan metode Lowenthal procter?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a) Ketepeng cina Casia alata L. merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat tradisional dimana berfungsi mengobati panu, kadas, kurap, cacingan, sembelit, dan sariawan. (Mahmudah et al., 2018)
- b) Ekstraksi adalah proses penarikan suatu kandungan kimia yang dapat larut sehingga dapat terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan bantuan suatu pelarut yang tepat (Tambun, dkk, 2016).
- c) Ekstrak adalah suatu sediaan dalam keadaan kering, kental ataupun cair yang dihasilkan dengan menyari suatu simplisia nabati atau hewani menggunakan metode yang sesuai (Tambun, dkk, 2016).
- d) Tanin adalah senyawa fitokimia yang tersusun dari senyawa polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan karena memiliki kemampuan mengkhelat ion besi dan memperlambat oksidasi (Fithriani, dkk, 2015).
- e) Spektrofotometer UV-Vis adalah salah satu metode instrumen yang paling sering diaplikasikan dalam analisis kimia yang bertujuan untuk mendeteksi

senyawa (padat atau cair) yang berdasarkan pada absorbansi foton (Irawan, 2019).

- f) Prinsip metode Lowenthal-Procter yaitu berdasarkan jumlah gugus fenol pada senyawa tanin. Titrasi dengan larutan kalium permanganat, gugus fenol pada tanin akan teroksidasi. Jumlah gugus fenol berbanding lurus dengan jumlah kalium permanganat yang diperlukan untuk titrasi.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis kuantitatif penetapan kadar tanin ekstrak etanol daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.) menggunakan metode spektrofotometri uv-vis dan Lowenthal-procter.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian ini, di bandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Didapatkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian (Mawaddah, dkk, 2020) dengan judul Skrining fitokimia, uji toksisitas dan uji peredaman radikal DPPH ekstrak daun gelinggang (*Cassia alata* L.), menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder dengan menggunakan uji fitokimia dari ekstrak daun gelinggang (*Cassia alata* L.). Hasil penelitian ini menunjukkan ekstrak daun gelinggang atau ketepeng cina mengandung alkaloid, triterpenoid, steroid, dan kuinon.
2. Berdasarkan penelitian (Asmah et al., 2020) dengan judul analisis kandungan senyawa metabolit sekunder ekstrak daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.) dari Bireum Bayeun, Aceh Timur, menyatakan bahwa

tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder pada daun segar dan daun kering Ketepeng Cina (*C. alata* L.) yang diambil dari kecamatan Birem Bayeun kabupaten Aceh Timur. Pada daun segar menunjukkan adanya alkaloid, steroid, terpenoid, saponin, flavonoid, fenol dan dan tanin. Sedangkan pada daun kering menunjukkan adanya alkaloid, fenol dan tanin.

3. Berdasarkan penelitian Rahmawati, dkk (2015) dengan judul analisis kadar flavonoid dan fenolik total fraksi etil asetat daun ketepeng cina (*senna alata* (L.) Roxb) dengan metode spektrofotometri uv-visible, menyatakan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis flavonoid dan kandungan fenolik fraksi etil asetat daun ketepeng cina. Cina Daun ketepeng diekstraksi menggunakan etanol 96%, kemudian dipartisi menggunakan metode partisi cair-cair dari etil asetat untuk mendapatkan fraksi etil asetat. Kadar flavonoid dan fenolik ditentukan menggunakan spektrofotometri UV-VIS pada 415 panjang gelombang nm untuk flavonoid dan 730 nm untuk fenolik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Kadar flavonoid dari fraksi etil asetat daun ketepeng cina (*Cassia alata* L. adalah sebesar 2,665 mgRE/g dan kadar fenoliknya sebesar 3,729 mgGAE/g.
4. Berdasarkan penelitian (Arif, 2015) dengan judul kajian metode pengeringan dan metode analisis daun belimbing wuluh (*averrhoa bilimbi* L.) terhadap kadar tannin, menyatakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode pengeringan dan metode analisis terhadap kadar tanin daun belimbing wuluh. Perbedaan metode pengeringan dilakukan dengan cara diangin-anginkan dan dikeringkan dalam oven pada suhu 40°C yang dibandingkan dengan

daun segar. Metode analisis yang digunakan adalah metode titrimetri lowenthal-procter dan metode spektrofotometri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan cara pengeringan dan metode analisis yang berbeda mempengaruhi kadar tanin. Kadar tanin terbaik hasil metode analisis titrimetri diperoleh 15,52 % dengan menggunakan daun segar dan metode analisis spektrofotometri diperoleh kadar tanin terbaik 12,20 % dengan menggunakan daun yang dikeringkan pada suhu 40°C.

5. Berdasarkan penelitian (Mukhriani, dkk, 2014) dengan judul Penetapan Kadar tannin total ekstrak biji jintan hitam (*Nigella sativa*) secara spektrofotometri UV-Vis. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan level dari total ekstrak tanin biji jintan hitam (*Nigella sativa*). Metode yang digunakan bertingkat maserasi menggunakan n-heksana dan etanol 70%. Ekstrak diidentifikasi menggunakan FeCl_3 reagent dan larutan gelatin menunjukkan hasil positif mengandung tanin pada ekstrak etanol 70% Ekstrak positif yang mengandung tanin diencerkan, ditambahkan pereaksi Folin Deanis dan dijenuhkan natrium karbonat, kemudian dibaca pada panjang gelombang 740 nm. Reaksi pembentuk adalah oksidasi reduksi dimana tanin sebagai reduktor dan Folin Denis sebagai oksidan. Hasil oksidasi akan membentuk warna biru yang terbaca pada panjang gelombang maksimal. Berdasarkan regresi $y =$ Untuk koefisien determinasi $0,004 x + 0,097$ dan $0,996$ diperoleh rata-rata tannin Kadar ekstrak etanol biji jintan hitam (*Nigella sativa*) adalah 4, 13%.


E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menentukan kadar tannin pada ekstrak etanol daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.) dengan metode spektrofotometri UV-VIS dan Lowenthal procter

2. Untuk menentukan perbandingan hasil kadar tannin total ekstrak etanol daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.) dengan metode spektrofotometri UV-VIS dan dengan metode Lowenthal procter

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi secara ilmiah, wawasan serta gambaran kepada penulis dan masyarakat luas tentang penemuan adanya kadar tanin total pada daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.)



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Daun Ketepeng cina (Cassia alata L.)*

1. Klasifikasi



gambar 1. daun ketepeng cina

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Ordo : Fabales

Famili : Leguminosae

Genus : Cassia

Spesies : *Cassia alata* L.

(Hujjatusnaini, Noor. 2000: 4)

Tumbuhan ketepeng di Indonesia memiliki berbagai macam nama daerah, seperti daun kupang (Melayu), daun kurap, ura'kap (Sumatera), gelenggang (Tapanuli), ki manila, ketepeng gede, katepeng (Sunda), ketepeng cina, ketepeng badak (Jawa Tengah), tabakum (Tidore), dan kupang-kupang (Ternate). Nama asing tumbuhan ketepeng adalah seven golden candlestick (Inggris), chum-het-thet (Thailand), dan dui ye dou (Cina).

2. Morfologi daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.)

Daun ketepeng cina berbentuk jorong sampai bulat telur sungsang, merupakan daun majemuk menyirip genap yang berpasang-pasangan sebanyak 5 – 12 baris, mempunyai anak daun yang kaku dengan panjang 5 – 15 cm, lebar 2,5 – 9 cm, ujung daunnya tumpul dengan pangkal daun runcing serta tepi daun rata. Pertulangan daunnya menyirip dengan tangkai anak daun yang pendek dengan panjang \pm 2 cm dan berwarna hijau. (Sesa et al., 2014)

Ketepeng cina (*Cassia alata* L.) merupakan jenis perdu yang besar dan banyak tumbuh secara liar di tempat-tempat yang lembab, disebabkan karena kandungan mineral yang sesuai untuk pertumbuhannya. Akibat yang ditimbulkan dari mudahnya pertumbuhan ketepeng cina, menyebabkan tumbuhan ini hidup secara liar, sebab ketepeng cina dapat tumbuh tanpa pembudidayaan serta sangat jarang dimanfaatkan oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman tentang khasiat dari ketepeng cina. Secara empiris, daun ketepeng cina bermanfaat sebagai obat cacung, sariawan, sembelit, panu, kurap, kudis dan gatal-gatal. (Rara Warih Gayatri, 2017)

3. Kandungan fitokimia daun ketepeng cina

Senyawa organik pada tumbuhan dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer merupakan senyawa utama yang diperlukan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan meliputi karbohidrat, lemak dan protein. Metabolit sekunder yang dihasilkan tumbuhan merupakan bagian dari sistem pertahanan diri. Senyawa tersebut berperan sebagai pelindung dari serangan infeksi mikroba patogen dan mencegah pemakanan oleh herbivora.

Ketepeng cina (*Cassia alata* L.) atau lebih dikenal dengan nama gelinggang memiliki rasa pedas dan bersifat hangat. Beberapa bahan kimia yang

terkandung dalam tanaman ini diantaranya tannin, rein aloe-emodina, rein aloe-emodinadiantron, asam krisofanat, alkaloida, saponoin, flavonoida, dan glikosida antrakinon. (Mahmudah et al., 2018)

4. Manfaat daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.)

Selama ini ketepeng cina banyak dimanfaatkan secara tradisional, antara lain adalah sebagai antiparasit, laksana, kurap, kudis, panu, eksem, malaria, sembelit, radang kulit bertukak, sifilis, herpes, influenza dan bronchitis. Ketepeng cina dilaporkan memiliki potensi untuk merangsang respon imun. Masyarakat menggunakan daun ketepeng cina secara tradisional dengan cara digosokkan pada kulit yang sakit atau ditumbuk sampai lumat lalu ditempelkan pada kulit yang sakit. (Sesa et al., 2014)

Secara etnobotani, tumbuhan *C. alata* memiliki khasiat obat untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh jamur khususnya *Candida albicans*. Penyakit yang disebabkan oleh *C. albicans* disebut dengan candidiasis. Candidiasis merupakan penyakit infeksi pada kulit, mulut, kerongkongan, saluran pencernaan, vagina dan sistem pembuluh darah manusia. Salah satu cara menanganinya adalah dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan jamur yang menyebabkan penyakit ini. (Bahi et al., 2014)


B. Tanin

Tanin merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman dan disintesis oleh tanaman (Jayanegara dan Sofyan, 2008). Tanin merupakan senyawa yang mempunyai berat molekul 500-3000 dan mengandung sejumlah besar gugus hidroksi fenolik yang memungkinkan membentuk ikatan silang yang efektif dengan protein dan molekul-molekul lain seperti polisakarida, asam amino, asam lemak dan asam nukleat. (Hidayah, 2016)

Tanin merupakan senyawa fenol yang memiliki berat molekul besar yang terdiri dari gugus hidroksi dan beberapa gugus yang bersangkutan seperti karboksil untuk membentuk kompleks kuat yang efektif dengan protein dan beberapa makromolekul. Fungsi Tanin pada tanaman salah satunya untuk melindungi tanaman tersebut dari gangguan hewan lain. Tanin disebut juga zat antinutrisi. Tanin terdiri dari dua jenis yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Kedua jenis tanin ini terdapat dalam tumbuhan, tetapi yang paling dominan terdapat dalam tanaman adalah tanin terkondensasi. (Kamilah Hayati et al., 2010)

Tanin menyebabkan beberapa tumbuhan dan buah-buahan memiliki rasa sepat dan asa pahit dalam suatu jenis buah-buahan yang pahit disebabkan oleh tannin. Secara kimia, terdapat dua jenis utama tanin yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Tanin terkondensasi terjadi karena reaksi polimerisasi (kondensasi) antar flavonoid, sedangkan tanin terhidrolisis terbentuk dari reaksi esterifikasi asam fenolat dan gula (glukosa). Tanin mudah teroksidasi, maka bergantung pada banyaknya zat itu terkena air panas atau udara, dengan mudah ia dapat berubah menjadi asam tanat. Asam tanat sebagai salah satu contoh tanin terhidrolisis. Asam tanat merupakan polimer asam galat dan glukosa. Asam tanat berupa serbuk amorf, berkilau, berwarna kuning putih sampai cokelat terang dan berbau khas. Asam tanat berkhasiat untuk mengobati diare. Selain itu, asam tanat berfungsi membekukan protein. Zat yang mengandung asam tanat memiliki efek negatif terhadap mukosa lambung, yaitu selaput lendir yang melapisi lambung sehingga menyebabkan orang tersebut menderita berbagai masalah dengan lambung. asam tanat juga memiliki efek anti bakteri, antienzimatik, antioksidan dan antimutagen. (Kamilah Hayati et al., 2010)

Tanin dibagi menjadi dua kelompok yaitu tanin yang mudah terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin yang mudah terhidrolisis merupakan polimer gallic dan ellagic acid yang berikatan ester dengan sebuah molekul gula, sedangkan tanin terkondensasi merupakan polimer senyawa flavonoid dengan ikatan karbon-karbon berupa catechin dan gallo catechin. Tanin terhidrolisis selama ini telah diketahui mempunyai berbagai manfaat dalam bidang farmasi. Salah satu jenis tanin terhidrolisis yang cukup bermanfaat adalah asam tanat. (Hidayah, 2016)



Gambar 5. Jenis-jenis tanin

Tanin terhidrolisis mengandung ikatan ester atau glukosida dan mudah terurai oleh asam, sedangkan tanin terkondensasi mengandung inti benzena. Tanin yang berasal dari hijauan (leguminosa) umumnya membentuk tanin terkondensasi dan mempunyai ikatan kompleks dengan protein yang lebih kuat dibandingkan dengan tanin terhidrolisis (Fahey & Berger, 1988). Tanin dapat berinteraksi dengan protein dan ada tiga bentuk ikatan yaitu: (1) ikatan hidrogen, (2) ikatan ion, (3) ikatan kovalen. Tanin terhidrolisis dan terkondensasi berikatan dengan protein dengan membentuk ikatan hidrogen antara kelompok fenol dari tannin dan kelompok karboksil (aromatik dan alifatik) dari protein. Ikatan kuat antara tanin dan protein akan berpengaruh terhadap pencernaan protein (Hidayah, 2016)

Tanin diketahui merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang mempunyai beberapa khasiat yaitu sebagai astringen, anti diare, anti bakteri dan

antioksidan. Tanin merupakan komponen zat organik yang sangat kompleks, terdiri dari senyawa fenolik yang sukar dipisahkan dan sukar mengkristal, mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut. (Pratama et al., 2019)

Tanin memiliki beberapa khasiat diantaranya menghentikan pendarahan dan mengobati luka bakar, menghentikan internal healing berjalan dan tanin mampu membuat lapisan pelindung luka dan ginjal. Tanin digunakan sejak lama sebagai pengobatan cepat diare, disentri, perdarahan, dan mereduksi ukuran tumor. Berbagai virus in aktif dengan paparan tannin. (Pratama et al., 2019)

Senyawa-senyawa tanin ditemukan pada banyak jenis tumbuhan; berbagai senyawa ini berperan penting untuk melindungi tumbuhan dari pemangsa oleh herbivora dan hama, serta dalam pengaturan pertumbuhan. Tanin yang terkandung dalam buah muda menimbulkan rasa kelat (sepat), perubahan-perubahan yang terjadi pada senyawa tanin bersama berjalannya waktu berperan penting dalam proses pemasakan buah.

Kandungan tanin dari bahan organik (serasah, ranting dan kayu) yang terlarut dalam air hujan (bersama aneka substansi humus), menjadikan air yang tergenang di rawa-rawa dan rawa gambut berwarna coklat kehitaman seperti air teh, yang dikenal sebagai air hitam (*black water*). Kandungan tanin pula yang membuat air semacam ini berasa kesat dan agak pahit.

C. Metode Folin-ciocalteu


Uji Penentuan senyawa kandungan total tannin dapat dilakukan dengan metode Folin-Ciocalteu. Prinsip metode ini adalah oksidasi gugus fenolik hidroksil. Pereaksi ini mengoksidasi fenolat (garam alkali), mereduksi asam heteropoli menjadi suatu kompleks molibdenum-tungsten (Mo-W) (Khadijah et al: 2017).

Metode Folin-Ciocalteu didasarkan pada reduksi asam fosfotungstat dalam arutan alkali menjadi fosfotungstat biru. Absorbansi yang terbentuk akibat fosfotungstat biru sebanding dengan jumlah senyawa fenolik yang terdapat dalam sampel, sehingga dapat diketahui seberapa besar kandungan senyawa dengan gugus fenol dalam suatu sampel tanaman yang dinyatakan dalam ekivalen asam galat (Cindric et al: 2011)

Pereaksi Folin-Ciocalteu merupakan larutan kompleks ion polimerik yang dibentuk dari asam fosfo molibdat dan asam heteropoli fosfotungstat. Pereaksi ini terbuat dari air, natrium tungstat ,natrium molibdat, asam fosfat, asam klorida, litium sulfat, dan bromin (Folin et al., 1944).

Deteksi kuantitatif senyawa fenol salah satunya dapat dilakukan dengan metode Folin-Ciocalteu. Metode ini merupakan metode kolorimetri karena reduksi dari campuran fosfotungstat dan fosfomolibdat oleh gugus hidroksi akan menghasilkan warna biru yang intensitasnya dapat dihitung menggunakan spektrofotometer. Pereaksi Folin-Ciocalteu dapat mengoksidasi fenolat (garam alkali) yang terbentuk pada suasana basa sehingga mereduksi asam heteropoli menjadi suatu kompleks molibdenum-tungsten berwarna biru dengan struktur yang belum diketahui dan dapat dideteksi dengan spektrofotometer. Warna biru yang terbentuk akan semakin pekat setara dengan konsentrasi ion fenolat yang terbentuk (Singleton & Rossi, 1965; Vermesis & Nicholson, 2006).

Reaksi senyawa fenol dengan reagen folin ciocalteu : Spektrofotometri UV-Vis



Gambar 6. Reaksi folin ciocalteu dengan fenol

D. Spektrofotometri UV-VIS

Spektroskopi adalah suatu cabang ilmu kimia yang mengkaji tentang interaksi berbagai tipe radiasi elektromagnetik dengan suatu bahan kimia. Spektrofotometri UV-Vis menggunakan dua gabungan sumber cahaya berbeda yaitu sumber cahaya UV dan visible (Nazar, 2018)


Spektrofotometri adalah suatu metode pengukuran berdasarkan adanya absorpsi cahaya pada suatu Panjang gelombang tertentu melalui larutan yang mengandung kontaminan yang kemudian akan ditentukan konsentrasinya (Lestari, 2010)

Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk analisis secara spektrofotometri dengan menganalisis suatu senyawa secara kuantitatif dan kualitatif (Suharmanto, 2013).

Spektrofotometri UV-Vis adalah salah satu metode instrumen yang paling sering diaplikasikan dalam analisis kimia yang bertujuan untuk mendeteksi senyawa (padat atau cair) yang berdasarkan pada absorbansi foton pada daerah UV-Vis dengan panjang gelombang 200-700 nm (Irawan, 2019).

Prinsip kerja spektrofotometri UV-Vis adalah suatu cahaya monokromatik melalui suatu media yaitu larutan, maka terjadi penyerapan pada Sebagian cahaya

tersebut, sebagian dipantulkan dan sebagiannya lagi dipancarkan. Pengukuran spektrofotometri UV-Vis berdasarkan pada hukum Lambert-Beer (Yanlinastuti, 2016:).



Gambar 7. Skema kerja Spektrofotometri UV-VIS

Spektrofotometer UV-VIS adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet (200-350nm) dan sinar tampak (350-800nm) oleh suatu senyawa. Serapan cahaya UV atau VIS (cahaya tampak) mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi elektron-elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksitasi berenergi lebih rendah.

1. Bagian-bagian Spektrofotometer

a. Sumber cahaya

Spektrofotometri Sinar Tampak (UV-Vis) adalah pengukuran energi cahaya oleh suatu sistem kimia pada panjang gelombang tertentu (Day, 2002). Sinar ultraviolet (UV) mempunyai panjang gelombang antara 200-400 nm, dan sinar tampak (visible) mempunyai panjang gelombang 400-750 nm. Pengukuran spektrofotometri menggunakan alat spektrofotometer yang melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometer UV-Vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibandingkan kualitatif. Spektrum UV-Vis sangat berguna untuk pengukuran secara kuantitatif. Konsentrasi dari analit di dalam larutan bisa ditentukan dengan mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan hukum Lambert-Beer (Rohman, 2007).

b. Monokromator

Monokromator adalah alat yang berfungsi untuk menguraikan cahaya polikromatis menjadi beberapa komponen panjang gelombang tertentu (monokromatis) yang berbeda (terdispersi).

c. Detektor

Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang. Detektor akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang selanjutnya akan ditampilkan oleh penampil data dalam bentuk jarum atau angka digital. Mengukur trasmittansi larutan sampel, dimungkinkan untuk menentukan konsentrasinya dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Spektrofotometer akan mengukur intensitas cahaya melewati sampel, dan membandingkan ke intensitas cahaya sebelum melewati sampel. Rasio disebut transmittansi dan biasanya digunakan dalam presentase.

d. Mikroprosesor

Mikroprosesor dan output software dari kalibrator dapat disimpan dan konsentrasi sampel yang tidak diketahui secara otomatis dapat dihitung (KEMENKES,2010).

e. Piranti pembaca

Fungsinya adalah membaca sinyal listrik dari detector dimana data digambarkan dalam bentuk yang bisa diinterpretasikan atau disajikan pada display yang dapat dibaca oleh pemeriksa (KEMENKES,2010).

E. Lowenthal-procter

Lowenthal-procter atau yang disebut juga dengan titrasi permanganometri adalah titrasi yang didasarkan pada reaksi redoks. Metode ini didasari oksidasi fenolat oleh larutan kalium permanganate dengan adanya indigokarmin sebagai

indikator redoks untuk menunjukkan indikator titrasi (Zhou dan Regenstein, 2004).

Metode titrasi Permanganometri yang merupakan pengukuran volume suatu larutan yang diketahui konsentrasinya dengan pasti, yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan salah satu volume tepat zat yang akan ditentukan. Larutan yang kadarnya diketahui dengan pasti dinamakan larutan baku atau larutan standar (DepKes RI, 1989). Titrasi permanganometri berdasarkan proses oksidasi-reduksi atau redoks. Pada penelitian ini digunakan sebagai standar zat pengoksidasi adalah KMnO_4 karena termasuk oksidator kuat, umum digunakan, mudah diperoleh, dan tidak mahal. Dan sebagai larutan baku primer adalah asam oksalat. Pada penetapan kadar tanin, setelah ekstrak sampel disari dengan air, kemudian dipipet volume tertentu ditambahkan asam indigo sulfonat sebagai indikator, kemudian dititrasi dengan kalium permanganat yang telah dibakukan dengan asam oksalat. Titik akhir titrasi pada penetaan kadar tannin ditunjukkan dari warna biru menjadi berwarna kuning emas (Ryanata. 2015).

F. Metode Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses penarikan suatu kandungan kimia yang dapat larut sehingga dapat terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan bantuan suatu pelarut yang tepat. Ekstrak adalah suatu sediaan dalam keadaan kering, kental ataupun cair yang dihasilkan dengan menyari suatu simplisia nabati atau hewani menggunakan metode yang sesuai (Tambun, dkk, 2016).

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya matahari langsung (Direktorat jendral POM, 1979).

Zat aktif yang umumnya terdapat dalam tanaman maupun hewan lebih mudah larut dalam pelarut organik. Proses terdeteksinya zat aktif dalam tanaman

adalah pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan pelarut organik diluar sel. Maka larutan terpekat akan berdifusi ke luar sel, dan proses ini berlangsung terus sampai terjadi keseimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam sel dan di luar sel (Gennaro, A.R 1990).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak, diantaranya :

1. Faktor biologi yang mempengaruhi mutu ekstrak meliputi beberapa hal yaitu:
 - a. Identitas jenis (spesies): jenis tumbuhan dari sudut keragaman hayati dapat dikonfirmasi sampai informasi genetik sebagai factor internal untuk validasi jenis (spesies).
 - b. Lokasi tumbuhan asal: lokasi berarti faktor eksternal yaitu lingkungan (tanah dan atmosfer) dimana tumbuhan berinteraksi berupa energi (cuaca, temperatur, cahaya) dan materi (air, senyawa organik dan anorganik).
 - c. Periode pemanenan hasil tumbuhan
 - d. Penyimpanan bahan tumbuhan
 - e. Umur tumbuhan dan bagian yang digunakan (Ditjen POM, 2000).
3. Faktor kimia yang mempengaruhi mutu ekstrak meliputi beberapa hal yaitu:
 - a. Faktor internal meliputi jenis senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif, komposisi kualitatif senyawa aktif dan kadar total rata-rata senyawa aktif.
 - b. Faktor eksternal meliputi metode ekstraksi perbandingan ukuran alat ekstraksi, ukuran kekerasan dan kekeringan bahan, pelarut yang digunakan, kandungan logam berat, kandungan pestisida (Ditjen POM, 2000).

Menurut Rusdi (1988), ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut-pelarut organik dengan kepolaran yang semakin meningkat secara berurutan. Pelarut yang digunakan pada saat ekstraksi harus memenuhi syarat tertentu yaitu tidak toksik, tidak meninggalkan residu, harganya murah, tidak korosif, aman, dan tidak mudah meledak.

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik (optimal) untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau yang aktif, dengan demikian senyawa tersebut dapat dipisahkan dari bahan dan dari senyawa kandungan lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar senyawa kandungan yang diinginkan dalam hal ekstrak total, maka cairan pelarut dipilih yang melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang terkandung. (Depkes RI, 1996: 82-84).

Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. Cairan penyari yang baik harus memenuhi kriteria berikut ini (Dirjen POM. 1986):

- a. Murah dan mudah diperoleh
- b. Stabil secara fisika dan kimia
- c. Bereaksi netral
- d. Tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar
- e. Selektif yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki
- f. Tidak mempengaruhi zat berkhasiat
- g. Diperbolehkan oleh peraturan. Etanol merupakan penyari yang bersifat universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar maupun senyawa nonpolar.

Etanol adalah senyawa yang mudah menguap, jernih (tidak berwarna), berbau khas, dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah. Etanol mudah menguap baik pada suhu rendah maupun pada suhu mendidih (78°C), mudah terbakar, serta larut dalam air, dan semua pelarut organik. Bobot jenis etanol tidak lebih dari

0,7964. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif dibandingkan air. Selain itu, kapang dan mikroba sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas. Etanol juga memiliki beberapa keuntungan lain yaitu tidak beracun, netral, absorpsi baik, dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan, dapat memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut, dan tidak memerlukan panas yang tinggi untuk pemekatan (Depkes RI, 1989).

Etanol umumnya digunakan sebagai cairan pengekstraksi dan biasanya dicampur dengan pelarut lain terutama campuran etanol dan air. Etanol yang paling baik untuk menghasilkan senyawa aktif yang optimal adalah etanol (Voight R, 1995).

Penggunaan etanol sebagai cairan pengekstraksi biasanya dicampur dengan pelarut lain, terutama campuran etanol dan air. Etanol yang paling baik untuk menghasilkan senyawa aktif yang optimal adalah etanol 70% (Voight, 1995).

Jenis-jenis ekstraksi yang biasa digunakan antara lain :

a. Maserasi

Maserasi merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana dan seringkali digunakan. Metode ini dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dan pelarut dalam satu wadah inert dengan kondisi tertutup rapat dan suhu ruangan.

b. *Ultrasound-Assisted Solvent Extraction*

Metode ini merupakan metode maserasi yang telah dimodifikasi dengan adanya bantuan *ultrasound*. *Ultrasound* tersebut merupakan sinyal dengan frekuensi yang tinggi yaitu 20 kHz. Metode ini, serbuk simplisia dan pelarut dimasukkan dalam wadah *ultrasound* dan *ultrasonic*.

c. Perkolasi

Dengan metode ini, serbuk simplisia akan dibasahi secara perlahan di dalam sebuah perkolator. Pelarut akan ditambahkan di atas serbuk dan dibiarkan menetes ke bawah.

d. Soxhlet

Pada metode ini, serbuk dimasukkan dalam sarung selulosa atau kertas saring di dalam klongsong yang diletakkan di atas labu serta di bawah kondensor. Pelarut dimasukkan dalam labu kemudian suhu diatur dibawah suhu reflux.

e. Reflux dan destilasi uap

Ekstraksi menggunakan metode reflux, sampel dan pelarut dimasukkan ke dalam labu yang terhubung dengan kondensor. Dalam hal ini, pelarut dipanaskan sampai mencapai titik didih. Kemudian uap akan terkondensasi dan akan kembali ke dalam labu. Destilasi uap memiliki prinsip yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial.(Mukhriani, 2014).

G. Tinjauan Islam

Sebagai seorang muslim, menjaga kesehatan merupakan salah satu kewajiban kita kepada diri sendiri. Hal ini membuktikan bahwa agama Islam memberikan perhatian terhadap kesehatan jasmani manusia dan tentunya tidak luput untuk menyeimbangkan dengan kesehatan rohani. Sebab, tubuh kita memiliki hak khususnya hak untuk mendapatkan kesehatan atau menerima pengobatan ketika sakit. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّومِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَتَّى نَأْتِيَ أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رَسُولًا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ، قَالَ: فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّ تَشَاءُوا، أَنْ تَدْخُلُوا، وَإِنْ تَشَاءُوا، أَنْ تَقْعُدُوا هَا هُنَا، قَالَ فَعُلْنَا: لَا، بَلْ نَقْعُدُ هَا هُنَا، فَحَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ، قَالَ: فَإِذَا دُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا أُرْسِلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: «أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ

الدَّهْرَ وَتَفَرُّهُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟» فَقُلْتُ: بَلَى، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْحَيْرَ، قَالَ: «فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ «فَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرِزْوَرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» قَالَ: «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ»

Artinya:

Dan Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Ar Rumi telah menceritakan kepada kami An Nadlr bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar Telah menceritakan kepada kami Yahya ia berkata, saya berangkat bersama Abdullah bin Yazid hingga kami menemui Abu Salamah, lalu kami mengutus seseorang kepadanya. kemudian ia pun keluar menemui kami, dan tepat dekat pintu rumahnya ternyata ada Masjid, maka kami pun menunggu di masjid itu hingga keluar menemui kami. Lalu ia berkata, "Jika kalian mau, masuklah, namun bila kalian memilih duduk (di situ), maka duduklah." Kami menjawab, "Kami duduk di sini saja. Ceritakanlah hadits kepada kami!" Ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Amru bin Ash radiallahu 'anhuma, ia berkata; Saya biasa melakukan puasa Ad Dahr (sepanjang masa) dan membaca (mengkhataamkan) Al Qur'an setiap malam sekali. Mungkin telah disampaikan berita kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai diriku atau mungkin juga beliau yang mengutus seseorang kepadaku. Lalu aku mendatangi beliau, maka beliau pun bertanya kepadaku: "Benarkah berita bahwa kamu berpuasa sepanjang masa dan membaca (mengkhataamkan) Al Qur'an sekali setiap malam?" saya menjawab, "Benar wahai Nabiyullah, namun tidaklah saya menginginkan dari perbuatan itu kecuali kebaikan." Beliau bersabda: "Sungguh, bagimu cukup berpuasa tiga hari dalam setiap bulannya." Saya berkata, "Wahai Nabiyullah, sungguh saya masih kuat lebih dari itu." beliau bersabda: "Sesungguhnya isteri juga mempunyai hak atasmu, tamumu punya hak atasmu dan jasadmu juga punya hak atasmu. Karena itu, lakukanlah puasa Dawud Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam, sebab ia adalah hamba yang paling banyak beribadah." Saya bertanya, "Wahai Nabiyullah, bagaimanakah puasa Dawud itu?" beliau menjawab: "Nabi Dawud berpuasa sehari dan berbuka sehari." Kemudian beliau bersabda: "Bacalah (khatamkanlah) Al Qur'an sekali dalam setiap bulannya." Saya berkata, "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya saya masih kuat kurang dari itu." beliau bersabda: "Kalau begitu, pada setiap dua puluh hari sekali." Saya berkata, "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya saya masih kuat kurang dari itu." beliau bersabda: "Kalau begitu, setiap sepuluh hari sekali." Saya berkata, "Wahai Nabiyullah, sungguh, saya masih kuat kurang dari itu." beliau bersabda: "Kalau begitu, bacalah (khatamkanlah) Al Qur'an setiap tujuh hari sekali, janganlah kamu menambahnya lagi, sebab, isterimu juga punya hak atasmu, dan jasadmu juga punya hak atasmu." Abdullah berkata; Aku telah berlebih-lebihan, hingga aku pun diberatkan sendiri. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku: "Sesungguhnya kamu tidak tahu, apakah umurmu masih panjang." Abdullah berkata; "Maka aku pun lebih memilih dan melakukan apa yang disabdakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam padaku. setelah lanjut usia, aku pun berangan-angann, sekiranya dahulu aku menerima rukhshah (keringanan) Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah

menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah telah menceritakan kepada kami Husain Al Mu'allim dari Yahya bin Abu Katsir dengan isnad ini, dan ia menambahkan setelah ungkapan; "Tiga hari dalam setiap bulannya, karena setiap kebaikan maka ganjarannya untukmu akan menjadi sepuluh kali lipat, maka itulah puasa Ad Dahr (sepanjang masa)." Dan di dalam hadits diungkapkan; Saya berkata, "Bagaimana puasa Nabiullah Dawud?" beliau menjawab: "Yaitu setengah masa." Dan ia tidak menyebutkan sesuatu pun terkait dengan bacaan Al Qur'an. Dan ia juga tidak menyebutkan; "Sesungguhnya tamumu juga punya hak atasmu." Namun ia menyebutkan; "Sesungguhnya anakmu juga punya hak atasmu." (HR. Muslim).

Tentang tawazun (keseimbangan), Nabi saw. Pernah menasehati Abdullah bin Amr, tatkala mengetahui sahabatnya itu terus-menerus melakukan ibadah puasa serta shalat malam dan membaca Al-Qur'an, hanya saja ia melalaikan hak dirinya, hak istri dan anaknya serta hak-hak orang yang ingin mengunjunginya. Oleh karena itu Rasulullah saw. Memerintahkan kepada Abdullah bin Amr, agar ia mengambil jalan tengah dalam masalah ini. Beliau bersabda "...Rasulullah saw. bertanya kepadaku: "Wahai Abdullah bin Amr, telah sampai berita kepadaku bahwa kamu berpuasa sepanjang hari dan shalat sepanjang malam. Janganlah kamu lakukan, sebab jasadmu mempunyai hak atas dirimu, kedua matamu mempunyai hak atas dirimu, dan istrimu juga mempunyai hak atas dirimu. Oleh karena itu, hendaknya kamu puasa dan juga berbuka. Berpuasa tiga hari pada tiap bulannya, sebab itulah sebenarnya puasa sepanjang masa. "saya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya sesungguhnya saya kuasa melakukannya. "Beliau bersabda: "Kalau begitu, berpuasalah sebagaimana puasa Dawud 'Alaihis salam, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari." Dikemudian hari Abdullah bin Amr pun berkata, "Duhai..., sekiranya aku mengambil rukhsah (keringanan) itu" (Muslim, no. 1973).

Dalam hadist tersebut Rasulullah saw. Menjelaskan bahwa harus ada tawazun (keseimbangan) pada diri sendiri baik dalam bentuk ibadah maupun kegiatan sehari-hari. Sungguh badan kita mempunyai hak atas diri kita, apabila kita lapar maka jasad kita berhak untuk mendapatkan makanan, apabila kita Lelah

maka jasad kita memiliki hak untuk beristirahat, dan apabila kita sakit maka jasad kita memiliki hak untuk diobati.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (H.R. Al-Bukhari).

Dalam tersebut dijelaskan bahwa ketika seseorang sakit yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut hanyalah Allah swt.. Kita sebagai manusia hanya bisa memohon dan berusaha dalam menyembuhkan penyakit tersebut. Salah satu upaya penyembuhan yang dapat dilakukan adalah mengomsumsi tumbuhan obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut.

Dalam QS Yunus/10: 24, Allah swt. berfirman


إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ۗ

Terjemahnya :

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. (Kementerian Agama RI, 2014).

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan dunia dengan segala kefanannya dari segi keindahan dan keelokannya. Diumpamakan seperti air yang turun ke bumi dari langit yang memiliki manfaat atas kesuburan tumbuhan yang ada di bumi sehingga dapat menjadi makanan bagi manusia dan hewan. Keelokannya pula menjadi hiasan di muka bumi, namun semua hal itu mengandung kefanan. Jika tiba saatnya, setelah manusia dan hewan mengambil

kebaikan dan kemanfaatannya maka Allah swt. akan mematikannya. ayat ini disertai segala hukum dan bukti-bukti bagi orang-orang yang berakal dan berfikir. Dijelaskan bahwa tanda-tanda kebesaran-Nya telah diperlihatkan dan bagi mereka dengan ilmu pengetahuannya dan senantiasa ingin memperhatikannya maka petunjuk bagi mereka dari Allah swt. (Shihab, 2002).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen laboratorium berdasarkan pada model penelitian *true experimental* untuk penetapan kadar tanin ekstrak etanol daun ketepeng cina (*cassia alata l.*) menggunakan metode spektrofotometri uv-vis dan Lowenthal procter.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Instrumen Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Universitas Pancasakti.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai bulan Juni - Juli 2021.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif berupa penetapan kadar tanin ekstrak etanol daun ketepeng cina (*cassia alata l.*) menggunakan metode spektrofotometri uv-vis dan Lowenthal procter.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa alat dan bahan yang dapat menunjang antara lain.

1. Alat Penelitian

Batang pengaduk, beaker glass, blender, botol semprot, cawan porselin, erlenmeyer, gelas ukur, kuvet, lemari pendingin, micropipet, neraca analitik, oven, penangas air, pipet tetes, rak tabung, Spektrofotometer UV-Vis, tabung reaksi, vacuum rotary evaporator, vortex mixer, wadah maserasi, dan waterbath.

2. Bahan Penelitian

Aquadest, aquadest water one, etanol 70%, FeCl₃, gelatin, H₂SO₄, indigokarmin, kaolin, KMnO₄, kertas saring, NaCl 2% Na₂CO₃, Na₂C₂O₄, sampel daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.), dan tissue.

D. Sampel

Sampel yang digunakan adalah daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.) yang diambil dari kelurahan romang polong, Gowa. Sampel telah dikeringkan dan diserbukkan sehingga sampel siap untuk diekstraksi.

E. Prosedur Kerja

1. Preparasi sampel

Sampel daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.) yang diperoleh ditimbang kemudian dilakukan sortasi basah lalu pencucian dilakukan dengan air mengalir hingga bersih. Setelah itu, dilakukan perajangan pada sampel kemudian dilakukan pengeringan dengan cara dijemur dibawah sinar matahari, lalu di sortasi kering. Sampel diserbukkan menggunakan blender selanjutnya dilakukan pengayakan, akhirnya sampel daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.) siap untuk diekstraksi.

2. Ekstraksi daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.)

Sampel daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.) yang telah diserbukkan ditimbang sebanyak 300 gram lalu dimasukkan ke dalam wadah maserasi. Setelah itu, dituang cairan penyari etanol hingga serbuk simplisia terendam. Selanjutnya ditutup dan dibiarkan selama 1x24 jam terlindung dari cahaya sambil diaduk tiap 8 jam sekali. kemudian disaring ke dalam wadah penampung. Dilakukan penyarian sebanyak 3 kali pengulangan. Hasil dari penyarian yang diperoleh dipisahkan menggunakan evaporator dan dibebaskan dengan cara dipanaskan di atas penangas sehingga dihasilkan ekstrak kental daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.)

3. Uji kualitatif tannin

Sebanyak 2 gram ekstrak etanol daun ketepeng cina dilarutkan aquades panas kemudian didinginkan. Setelah itu ditambahkan 1 ml NaCl 2% dan disaring. Filtrat dibagi 2 bagian A dan B. Filtrat A ditambahkan 3 tetes pereaksi FeCl₃ 5%. Positif tanin apabila terbentuk warna hitam kebiruan. Filtrat B diambahkan gelatin. Terbentuknya endapan putih menunjukkan adanya tanin.

4. Penetapan Kadar Tanin metode Titrimetri Lowenthal – Procter

a. Pembakuan Larutan Baku Primer Asam Oksalat

Ditimbang dalam botol timbang asam oksalat 2H₂O sebanyak ± 0,63 gram, dilarutkan dengan aqua demineralisata secukupnya. Dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, lalu ditambah aquadest sampai batas tanda pada labu ukur. Dihitung N asam oksalat.

b. Pembakuan Larutan KMnO₄ dengan Asam Oksalat 0,1N

Dipipet 10 ml larutan asam oksalat 2H₂O 0,1N. Lalu dimasukkan ke dalam erlenmeyer 100 ml, ditambah 10 ml larutan H₂SO₄ 4N, dipanaskan sampai suhu 70°C, kemudian dititrasi dengan KMnO₄ 0,1N. Titrasi dihentikan apabila sudah terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi berwarna merah muda (sudah mencapai TAT).

$$N \text{ KMnO}_4 = \frac{W \text{ (mg) / BM} \times 2 \times \text{FP}}{V \text{ KMnO}_4}$$

(Mihra et, al. 2018: 180)

c. Penetapan Kadar Tanin dengan KMnO₄

Sebanyak 0,2 gram serbuk daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.) dimasukkan ke dalam beaker glass. Lalu ditambahkan 5 ml aquadest, dipanaskan di atas waterbath sampai mendidih selama 30 menit sambil diaduk. Didiamkan beberapa menit, diendapkan, lalu dituang melalui kertas saring ke dalam labu ukur

25 ml dan didapat filtrat. Ampasnya disari kembali dengan aquadest mendidih dan dimasukkan ke dalam labu ukur yang sama. Penyarian dilakukan beberapa kali hingga residu tidak menunjukkan perubahan warna menjadi berwarna biru hitam apabila direaksikan dengan FeCl_3 .

Larutan didinginkan dan ditambah aquadest sampai 25 ml secara kuantitatif ke dalam labu ukur. Lalu dipipet 2,5 ml, dipindahkan ke dalam erlenmeyer 100 ml, ditambah 75 ml aquadest dan 2,5 ml indikator asam indigo karmin. Selanjutnya, dititrasi dengan KMnO_4 hingga terjadi perubahan warna dari biru tua menjadi berwarna kuning keemasan. Dicatat volume KMnO_4 yang digunakan.

d. Pengukuran titrasi blanko

Sebanyak 75 ml aquadest dimasukkan ke dalam erlenmeyer 100 ml, ditambahkan 2,5 ml indikator Indigokarmin, kemudian diambil sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan dititrasi dengan KMnO_4 hingga terjadi perubahan warna larutan dari biru tua hingga menjadi berwarna kuning keemasan. Dicatat volume KMnO_4 yang digunakan. Dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Setelah dilakukan titrasi sampel dan blanko, kemudian dihitung kadar tanin menggunakan rumus:

$$\% \text{ kadar tanin} = \frac{(V-V_0) \times N \text{ KMnO}_4 \times 0,00416 \times \text{FP}}{\text{berat sampel (g)}} \times 100\%$$

(Maulida et, al. 2020: 88)

5. Penetapan Kadar Tanin dengan metode spektrofotometri UV-VIS

a. Pembuatan Larutan Standar Asam tanat 1000 ppm

0,1 gram asam tanat dilarutkan dalam 100 ml aquades. Larutan standar ini harus selalu dibuat baru tiap kali akan melakukan pengujian (Cunnif, 1996). Dibuat seri pengenceran 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm. Diambil masing-masing 1 ml dari seri pengenceran dan dimasukkan ke dalam

wadah labu tentukur 10 ml yang berisi 7,5 ml aquadestilata. Ke dalam labu tersebut ditambahkan 0,5 ml pereaksi folin denis, didiamkan 3 menit dan ditambahkan 1 ml larutan Na_2CO_3 jenuh, diinkubasi selama 15 menit. Kemudian serapannya dibaca pada panjang gelombang 740 nm.

b. Penetapan panjang gelombang

Serapan maksimum Diambil salah satu konsentrasi larutan baku, diukur serapannya pada rentang panjang gelombang 400-800 nm. Panjang gelombang yang menunjukkan nilai serapan tertinggi merupakan panjang gelombang maksimum.

c. Pembuatan Kurva Baku

Kurva baku dibuat dengan menghubungkan konsentrasi larutan standar dengan hasil serapannya yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 740 nm.

d. Penetapan Kadar Tanin

Sebanyak 0,5 gram maserat ditimbang dan dilarutkan dengan aquabidestilata sampai 10 ml. Jika belum larut sempurna bisa dibantu dengan alat yang berfungsi untuk menghomogenkan larutan. Dipipet 1 ml sampel dengan seksama, dimasukkan ke dalam wadah berukuran 10 ml yang telah berisi 7,5 ml aquabidestilat. Ditambahkan 0,5 ml pereaksi folin ciocalteu, didiamkan selama 3 menit, ditambankan 1,0 ml larutan Na_2CO_3 jenuh. Diinkubasi selama 15 menit, kemudian dibaca serapannya pada panjang gelombang maksimum. Dihitung dengan menggunakan kurva baku yang didapat sehingga diketahui konsentrasi dari sampel.


$$\text{Total Tanin} = \frac{C \times V}{g}$$

Ket :

C = Konsentrasi fenolik (nilai x)

V = Volume ekstrak yang digunakan (ml)

g = Berat sampel yang digunakan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstraksi Serbuk Daun Ketepeng Cina (*Cassia alata* L.)

Hasil ekstraksi daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.) dengan cara maserasi selama 3 hari dan diaduk selama 8 jam sekali. Penimbangan serbuk 300 gram didapatkan hasil ekstrak 10 gram, dan Adapun persen rendamen yang didapat yaitu 3,4%.

2. Penentuan Adanya Tanin Secara Kualitatif

Hasil penetapan kualitatif adanya tanin dilakukan pada ekstrak daun ketepeng cina dengan menggunakan pereaksi FeCl_3 , gelatin 1%, dan NaCl 2%. berdasarkan data percobaan yang dilakukan menunjukkan bahwa ekstrak daun ketepeng cina positif mengandung tanin. Data hasil pengamatan dapat dilihat pada table

Table 7. Uji kualitatif tanin

Pereaksi	Hasil	Tannin
FeCl_3	Biru kehitaman	+
Larutan garam gelatin	Adanya endapan	+

B. Penetapan Kadar Tannin Menggunakan Spektrofotometri UV-VIS

Table 8. Hasil kadar tanin dengan metode Spektrofotometri UV-VIS

Berat bahan (g)	Absorbansi	Absorbansi rata-rata	Kadar tannin total
1 g	0,7881	0,7886	85,61
	0,7886		
	0,7892		

Telah dilakukan penelitian dari ekstrak etanol daun ketepng cina (*Cassia alata* L.) Tanin merupakan komponen zat organik yang sangat kompleks, terdiri dari senyawa fenolik yang sukar dipisahkan dan sukar mengkristal, mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut. Sifat tanin sebagai astringen dapat dimanfaatkan sebagai antidiare, menghentikan pendarahan, dan mencegah peradangan terutama pada mukosa mulut, serta digunakan sebagai antidotum pada keracunan logam berat dan alkaloid. Tanin dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan tanin dan mengetahui kadar senyawa tanin yang terkandung didalam ekstrak etanol daun ketepeng cina dengan menggunakan dua metode yaitu metode Spektrofotometri UV-VIS dan Lowenthal-procter, serta perbedaan hasil dari kedua metode tersebut.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.) yang diperoleh dari Kelurahan Romang Polong, Somba Opu, Gowa. Selanjutnya dilakukan pengeringan pada sampel di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Daun yang telah kering kemudian dibuat serbuk untuk memperluas permukaan, sehingga pada saat ekstraksi, kontak antara pelarut dengan sampel lebih efektif dan senyawa dapat terekstrak dengan optimal. Pengeringan dilakukan agar reaksi enzimatik tidak berjalan dan mencegah pertumbuhan mikroba pada simplisia. Setelah didapatkan serbuk simplisia daun anggur, selanjutnya dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi.

Proses maserasi mengakibatkan cairan penyari menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif sehingga zat aktif akan larut ke dalam cairan penyari karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel (Adawiyah, R., 2017). Selain itu, maserasi juga merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana dan sering kali

digunakan. Etanol digunakan sebagai cairan penyari karena mempunyai tingkat ekstraksi yang tinggi, murah dan mudah didapatkan, relatif tidak toksik jika dibandingkan dengan methanol dan aseton dan aman untuk ekstrak yang akan dijadikan obat (Hakim, 2020). Sampel dimaserasi dengan menggunakan pelarut etanol 70% dimana etanol 70% bersifat semipolar sehingga dapat menarik komponen yang bersifat polar dan nonpolar.

Proses maserasi dilakukan dengan perendaman sampel menggunakan pelarut etanol 70% dalam wadah dengan kondisi tertutup rapat dan di biarkan selama 3×24 jam, dan diaduk tiap 8 jam. Kemudian sampel di saring dan dilakukan pemekatan menggunakan evaporator.


Filtrat yang didapatkan kemudian dipekatkan dengan cara pemanasan untuk menghilangkan pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi, dari hasil maserasi simplisia daun ketepeng cina sebanyak 300 gram dengan pelarut etanol 70% sebanyak 2 liter, didapatkan ekstrak sebanyak 10 gram dengan hasil randemen ekstrak sebesar 3,4%.

Ekstrak yang dihasilkan digunakan untuk uji kualitatif tanin dengan melakukan skrining fitokimia menggunakan metode tabung dan hasil menunjukkan bahwa daun ketepeng cina positif mengandung tanin. Skrining fitokimia digunakan untuk mendeteksi kandungan senyawa metabolit sekunder suatu tanaman berdasarkan golongannya sebagai informasi awal dalam mengetahui golongan senyawa kimia yang memiliki aktivitas biologis dari suatu tanaman.

Identifikasi senyawa tanin dilakukan dengan dua cara, yang pertama direaksikan dengan FeCl_3 1%, perubahan warna larutan dikarenakan adanya reaksi reduksi, tanin merupakan golongan senyawa polifenol yang mampu mereduksi besi (III) menjadi besi (II), dengan adanya gugus fenol dari senyawa

Sebelum dilakukan analisis kuantitatif terlebih dahulu dilakukan pembuatan kurva baku. Pembuatan kurva baku bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi larutan asam tanat dengan nilai nilai absorbansi sehingga konsentrasi sampel daun ketepeng cina dapat diketahui. Larutan standar 1000 ppm dibuat seri konsentrasi 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm dan dibuat regresi linier seperti pada gambar. Persamaan kurva baku yang diperoleh dari konsentrasi asam tanat yaitu $y = 0,0024x + 0,5013$ dengan nilai $r^2 = 0,9929$ digunakan untuk menetapkan kadar tanin daun ketepeng cina (*Cassia alata* L.).

Pada uji kuantitatif dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 190 nm-380 nm (pada daerah ultraviolet) atau panjang gelombang 380 nm-780 nm (pada daerah cahaya tampak). Untuk menentukan kadar tanin diukur dengan menggunakan kurva standar tanin. Standar tanin yang digunakan yaitu asam tanat. Pemilihan asam tanat dikarenakan asam tanat merupakan golongan tanin terhidrolisis sehingga dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran kadar tanin total (Supriyanto, R 2011). Tanin yang dibaca pada spektrofotometri UV- Vis harus direaksikan dengan reagen pembentuk warna yaitu folin denis dan natrium karbonat. Pembentukan warnanya berdasarkan reaksi reduksi oksidasi, dimana tanin sebagai reduktor. Folin denis sebagai oksidator, tanin yang teroksidasi akan mengubah fosmolibdat dalam folin denis menjadi fosmolibdenim yang berwarna biru yang dapat menyerap sinar pada daerah panjang gelombang ultraviolet visibel (Andriyani D dkk, 2010). Na_2CO_3 bertujuan untuk membuat suasana basa agar terjadi reaksi reduksi folin denis oleh gugus hidroksil dari polifenol di dalam sampel dan akan membentuk kompleks molybdenum-tungsten berwarna biru. Reaksi antara senyawa tanin dan folin ciocalteu dapat di lihat pada gambar 7.



Gambar 7. Reaksi senyawa fenol dengan folin ciocalteu

Sampel di timbang sebanyak 3 kali dengan berat masing-masing 0,5 gram. Kemudian diukur dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis untuk mengetahui absorban dari sampel. Untuk mendapatkan absorban sampel sesungguhnya dilakukan dengan cara mengurangi nilai absorban sampel dengan nilai absorban kontrol ekstrak. Setelah di dapatkan absorban sampel sesungguhnya kemudian dihitung nilai kandungan tanin total masing-masing dari hasil replikasi sampel. Rata-rata kandungan tanin total nilai ekstrak dari sampel ketepeng cina (*Cassia alata* L.) didapatkan dengan menjumlahkan keseluruhan nilai kandungan tanin total kemudian dibagi 3. Hasil yang didapatkan yaitu setiap gram ekstrak mengandung tanin sebesar 1,075% ekstrak yang setara dengan asam tanat.

C. Hasil Penetapan Kadar Tannin Menggunakan Metode Lowenthal-Procter

1. Pembakuan larutan KMnO_4 dengan As. Oksalat 0,1 N

Table 9. Hasil pembakuan larutan dengan Asam Oksalat

Titration	Larutan $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$	Larutan H_2SO_4	Larutan KMnO_4	Normalitas KMnO_4
1	10 ml	10 ml	28,5 ml	0,03509 N
2	10 ml	10 ml	29,3 ml	0,03413 N
3	10 ml	10 ml	27,5 ml	0,03637 N
Normalitas rata-rata: 0,03520 N				

2. Hasil volume titrasi sampel dengan KMnO_4

Table 10. hasil titrasi sampel

Titration	Larutan Sampel + Indikator	Larutan KMnO_4
1	10 ml	10,8 ml
2	10 ml	11,2 ml
3	10 ml	10,1 ml

3. Hasil volume titrasi blanko

Table 11. hasil titasi blanko

Titration	Larutan Sampel + Indikator	Larutan KMnO_4
1	10 ml	1,0 ml
2	10 ml	0,9 ml
3	10 ml	1,1 ml

4. Hasil perhitungan % Tanin

Table 12. Hasil perhitungan kadar tanin


Titration	Kadar tannin
1	7,24839 %
2	7,54125 %
3	6,58944 %
Kadar tannin rata-rata adalah 7,12636 %	

Setelah serangkaian uji kualitatif dilakukan, didapatkan hasil bahwa sampel ekstrak etanol daun ketepeng cina positif mengandung senyawa tanin, maka penelitian ini dapat dilanjutkan ketahap uji kuantitatif dengan melakukan penetapan kadar senyawa tanin pada sampel. Uji kuantitatif ini menggunakan metode titrimetri dengan titrasi permanganometri. Metode ini digunakan karena

termasuk metode yang sering digunakan untuk menetapkan kadar senyawa tanin pada suatu tanaman dan merupakan metode yang sederhana, mudah dikerjakan, murah serta memiliki tingkat ketelitian yang tinggi (Amelia, 2015). Metode ini melibatkan reaksi reduksi oksidasi, digunakan larutan KMnO_4 sebagai larutan standar karena termasuk oksidator kuat, umum digunakan, mudah diperoleh dan harganya tidak mahal. Prinsip dari metode ini yaitu mengukur volume KMnO_4 yang diperlukan dalam proses titrasi sampel sampai terjadi perubahan warna kuning keemasan pada larutan. Larutan KMnO_4 yang akan digunakan sebagai titran pada titrasi sampel harus dibakukan

Terlebih dahulu sebelum digunakan, karena larutan KMnO_4 merupakan larutan baku sekunder yang harus dibakukan dengan larutan primer, pada penelitian ini digunakan asam oksalat. Pada proses pembakuan ini dilakukan penambahan H_2SO_4 pada larutan asam oksalat sebagai titrat yang dimasukkan kedalam erlenmeyer untuk menciptakan suasana asam. Campuran larutan kemudian dipanaskan hingga suhu 70°C lalu dititrasi dengan KMnO_4 . Fungsi dipanaskan untuk mempercepat proses titrasi karena reaksi ini akan berjalan lambat jika titrasi dilakukan pada suhu $<60^\circ\text{C}$. Titrasi dilakukan terjadinya titik akhir titrasi (TAT) yang ditandai dengan adanya perubahan warna dari bening menjadi merah muda (Amelia, 2015). Volume titran yang digunakan pada proses pembakuan ini yaitu 28,5 ml, 29,3 ml, 27,5 ml, sehingga didapatkan hasil normalitas rata-rata yaitu 0,03520 N

Reaksi kimia antara asam oksalat, asam sulfat dan kalium permanganat:



Proses selanjutnya dilakukan penetapan kadar tanin ekstrak etanol daun ketepeng cina menggunakan larutan titran KMnO_4 yang telah dibakukan. Pada penetapan kadar ini digunakan indikator Indigokarmin yang berfungsi untuk

membantu mendeteksi terjadinya titik akhir titrasi dengan perubahan warna dari biru tua menjadi kuning emas. KMnO_4 berperan sebagai oksidator yang akan mengoksidasi fenolat dalam sampel, untuk 1 ml KMnO_4 0,1N akan mengoksidasi tanin sebanyak 0,00146 gram. Didapatkan hasil volume titrasi sampel yaitu 10,8 ml, 11,2 ml, dan 10,1 ml. Dilakukan juga titrasi blanko yang bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak KMnO_4 0,04N bereaksi dengan indigokarmin, volume titrasi blanko dijadikan faktor pengurangan pada volume titrasi sampel (Mihra, 2018). Dari hasil titrasi blanko didapatkan hasil volume titrasi yaitu 1,0 ml, 0,9 ml, dan 1,1 ml. Setelah semua proses penetapan kadar dilakukan, maka dari data yang ada dapat dilakukan perhitungan % kadar tanin yaitu didapatkan hasil sebesar 7,24839%, 7,54125%, 6,58944%, dengan % kadar rata-rata adalah 7,12636%.

Alasan penggunaan dua metode yaitu agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan untuk menetapkan standar baku tannin dari sampel daun ketepeng cina sehingga bisa dijadikan referensi.

Dari hasil yang didapatkan dari dua metode didapatkan hasil dari spektrofotometri UV-VIS dalam 0,5 gram adalah 1,075%, sedangkan hasil yang didapat pada metode Lowenthal-procter dalam 2 gram sampel adalah 7,12636%. Dari kedua metode yang dilakukan menghasilkan jumlah kadar tanin yang berbeda, karna tingkat akurasi dari setiap metode berbeda. Tingkat akurasi dari metode spektrofotometri UV-VIS lebih tinggi dibanding dengan metode Lowenthal-procter. Selain itu, kemurnian pelarut dan cara pengerjaan dari kedua metode bisa mempengaruhi hasil dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kadar tannin dari sampel ekstrak etanol daun Ketepeng cina (*Cassia alata* L.) yang diperoleh dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-VIS adalah 1,075%, sedangkan pada metode Lowenthal-procter adalah 7,12636 %
2. Perbandingan hasil kadar tanin ekstrak etanol daun Ketepeng cina (*Cassia alata* L.) pada metode spektrofotometri UV-Vis dengan berat ekstrak 0,5 gram diperoleh kadar tanin 1,075% sedangkan pada metode Lowenthal-procter dengan berat ekstrak 2 gram diperoleh kadar tanin 7,12636%.

B. Saran

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini sampai tahap isolasi karena berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari senyawa tannin sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dipergunakan secara luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Asmah, N., Halimatussakdiah, H., & Amna, U. *Analisa Kandungan Senyawa Metabolit Sekunder Ekstrak Daun Ketepeng Cina (Cassia alata L.) dari Bireum Bayeun, Aceh Timur*. QUIMICA: Jurnal Kimia Sains Dan Terapan, 2(2), 7–10. 2020 <https://doi.org/10.33059/jq.v2i2.2646>
- Bahi, M., Mutia, R., & Lukitaningsih, E. *Bioassay on n -Hexane Extract of Leaves Cassia alata against Candida albicans*. 14(1), 5–10. 2014
- Departemen Kesehatan RI. *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2010.
- Ditjen POM. *Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1979.
- Dirjen POM. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat: Cetakan pertama*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2000.
- Ditjen POM. *Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995.
- Dirjen POM. *Sediaan Galenik*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1986.
- Folin, Octo. Ciocalteu. Vintila. . *On Tyrosine and Tryptophane Determinations in Proteins*, *Jour.Bio.Chem.* 1944
- Gennaro, A.R. *Remington and Practice of Pharmacy*. Philadelphia: Philadelphia college Pharmacy and Sience, 1990.
- Hidayah, N. *Pemanfaatan Senyawa Metabolit Sekunder Tanaman (Tanin dan Saponin) dalam Mengurangi Emisi Metan Ternak Ruminansia*. Jurnal Sain Peternakan Indonesia, 11(2), (2016) <https://doi.org/10.31186/jspi.id.11.2.89-98>
- Hujjatusnaini, Noor. *Pengaruh Ekstrak Daun Ketepeng Cina (Cassia Alata L.) Terhadap Pertumbuhan Trychophyta sp*. Palangkaraya: UNPAR2000
- Irawan, Anom. *Kalibrasi Spektrofotometer sebagai Penjaminan Mutu Hasil Pengukuran dalam Kegiatan Penelitian dan Pengujian*. Indonesian Journal of Laboratory. 2019.
- Kamilah Hayati, E., Fasyah, A., & Sa'adah, L. *Fraksinasi Dan Identifikasi Senyawa Tanin Pada Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.)*. Jurnal Kimia, 4(2), 78–82. 2010
- Lestari. *Bahaya Kimia: Sampling dan Pengukuran Kontaminan Kimia di Udara*. Buku Kedokteran EGC. Jakarta.
- Mahmudah, R., Abdullah, N., Pratiwi, A., & Asrhah, M. *Uji Efektifitas Ekstrak Etanol Pada Daun Ketepeng Cina (Cassia alata L .) Terhadap Mikroba Penyebab Sariawan (Stomatitis Aftosa)*. 4(1). 2018
- Mihra, M., Jura, M. R., & Ningsih, P. *Analisis Kadar Tanin dalam Ekstrak Daun Mimba (Azadirachta indica a. Juss) dengan Pelarut Air dan Etanol*. Jurnal Akademika Kimia, 7(4), 179. 2018. <https://doi.org/10.22487/j24775185.2018.v7.i4.11941>

- Mukhriani, dkk. *Penetapan Kadar Tanin Total Ekstrak Biji Jintan Hitam (Nigella sativa) Secara Spektrofotometri Uv-Vis.* farmasi. UIN Alauddin Makassar. 2014
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2. 813
- Pratama, M., Razak, R., & Rosalina, V. S. *Analisis Kadar Tanin Total Ekstrak Etanol Bunga Cengkeh (Syzygium Aromaticum L.) Menggunakan Metode Spektrofotometri Uv-Vis.* Jurnal Fitofarmaka Indonesia, 6(2). 2019. <https://doi.org/10.33096/jffi.v6i2.510>
- Rahmati, R. A., & Lestari, T. *Penetapan Kadar Total Flavonoid Ekstrak Etanol Dan Fraksi Daun Saliara (Lantana Camara L .) Dengan Metode Spektrofotometri.* Departemen Farmakognosi Prodi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. 2018
- Rara Warih Gayatri. *Pemanfaatan Tumbuhan Ketepeng Cina (Cassia alata L .) Sebagai Obat Sariawan dan Bau Mulut.* 5(April). 2017
- Rohman. *Analisis Spektrofotometri.* Universitas Indonesia, Jakarta. 2007
- Ryanata, Ebry. *Penentuan Jenis Tanin Dan Penetapan Kadar Tanin Dari Kulit Buah Pisang Masak (Musa Paradisiaca L.) Secara Spektrofotometri Dan Permanganometri.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.1. 2015.
- Septiani, S., Dewi, E. N., & Wijayanti, I. *Aktivitas Antibakteri Ekstrak Lamun (Cymodocea Rotundata) Terhadap Bakteri Staphylococcus Aureus Dan Escherichia Coli (Antibacterial Activities Of Seagrass Extracts (Cymodocea Rotundata) Against Staphylococcus Aureus And Escherichia Coli).* SAINTEK PERIKANAN : Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology, 13(1). 2017. <https://doi.org/10.14710/ijfst.13.1.1-6>
- Sesa, O. E., Sulastry, T., & Muharram. *Isolasi Dan Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Ekstrak Metanol Daun Ketepeng Cina (Cassia alata Linn).* Jurnal Chemica 15(1). 2014.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an).* lentera hati. 2002.
- Sudarmadji, S. *Prosedur Analisa Untuk Bahan Makanan dan Pertanian.* Liberty. Yogyakarta. 1997
- Ummah, M. K. *Ekstraksi dan pengujian aktivitas antibakteri senyawa tanin pada daun belimbing wuluh (Avverhoa bilimbi L.).* Skripsi Sarjana Fakultas Sains dan Teknologi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2010.
- Voight, R. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi.* Yogyakarta: UGM Press, 1995
- Zona Octarya, Robi Saputra. *Pengaruh jenis pelarut terhadap jumlah ekstrak dan daya antifungi daun ketepeng cina (Cassia Alata L) terhadap Jamur Trychophyton Sp.* Jurnal Photon. 5(2). 2015


LAMPIRAN


Lampiran 1. Skema kerja

1. Preparasi sampel




2. Ekstraksi daun ketepeng cina






3. Uji kualitatif tannin





4. Petetapan kadar tannin metode Lowenthal-procter


a. Pembakuan larutan baku primer asam oksalat



b. Pembakuan Larutan KMnO₄ dengan Asam Oksalat 0,1N





c. Penetapan kadar tannin dengan KMnO_4 




5. Penetapan Kadar Tanin dengan metode spektrofotometri UV-VIS

a. Pembuatan larutan standar asam tanat 1000 ppm







b. Penetapan panjang gelombang



c. Pembuatan kurva baku



d. Petetapan kadar tannin



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAKASSAR

Lampiran 2. Pembuatan Larutan

a. Pembuatan larutan induk

Pembuatan larutan standar sam tanat dilakukan dengan cara melarutkan Sebanyak 10 mg asam tanat ditimbang kemudian dilarutkan dengan aquadest dalam gelas kimia. Selanjutnya dimasukkan dalam labu ukur 10 mL dan ditambah aquadest sampai tanda batas. Larutan tersebut dijadikan sebagai larutan induk 1000 ppm, dari larutan tersebut dibuat larutan standar

Pembuatan larutan standar 20 ppm

$$M1 \times V1 = M2 \times V2$$

$$1000 \times V1 = 50 \text{ ml} \times 20 \text{ ppm}$$

$$V1 = \frac{50 \text{ ml} \times 20 \text{ ppm}}{1000 \text{ ppm}}$$

$$V1 = 1 \text{ ml}$$

Larutan standar 1000 ppm diambil 1 ml dan diencerkan kedalam labu takar 50 ml sampai tanda batas.

Untuk konsentrasi 20, 40, 60, 80 dan 100 ppm dibuat dengan rumus perhitungan yang sama, V2 diubah sesuai dengan konsentrasi yang akan dibuat.

b. Pembuatan reagen folin ciocalteu

Sodium tungstate diambil sebanyak 5 gram dan dicampurkan dengan asam fosfomolibdat sebanyak 1 gram. dilarutkan dengan menggunakan aquadest dalam gelas kimia. Setelah larut sempurna dimasukkan kedalam labu ukur 50 mL selanjutnya ditambahkan asam fosfat 2,5 mL dan ditambahkan quadest sampai tanda batas.

c. Pembuatan larutan natrium karbonat

Pembuatan larutan Na_2CO_3 jenuh dilakukan dengan cara menimbang sebanyak 7,5 gram Na_2CO_3 kemudian dilarutkan dengan aquadest dalam gelas

kimia dan dipanaskan pada suhu 60°C. Setelah larut sempurna dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL

d. Pembuatan Pereaksi FeCl₃ 1%

FeCl₃ 1% dibuat dengan melarutkan 1 gram FeCl₃ dengan air suling hingga volume 100 ml.

e. Pembuatan larutan asam oksalat

Sebanyak 0,63 gram Asam Oksalat dilarutkan dengan aquadest secukupnya dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, lalu ditambah aquadest sampai batas tanda pada labu ukur, kemudian dihitung normalitas asam oksalat menggunakan rumus: (Mihra et, al. 2018: 180)

$$V \times N = \frac{\text{gram}}{\text{BE}}$$

$$0,1 \times N = \frac{0,63}{63} = 0,1$$

F. Pembuatan larutan KMnO₄ 0,1N

Sebanyak 0,32 gram KMnO₄ dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, ditambahkan 100 ml aquadest dan dididihkan selama 15 menit, lalu disimpan selama satu malam, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam labu ukur. (Mihra et, al. 2018: 180)

$$V \times N = \frac{\text{gram}}{\text{BE}}$$

$$0,1 \times N = \frac{0,32}{31,6}$$

$$N = 0,1$$

f. Pembuatan larutan indikator indigokarmin


Sebanyak 0,6 gram Indigokarmin dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml, dilarutkan dengan 50 ml aquadest dan dipanaskan lalu didinginkan dan ditambahkan aquadest hingga 100 ml, kemudian disaring

Lampiran 3. Pengukuran standar dan kurva kalibrasi

Table 13. Pengukuran absorbansi larutan standar dan kurva kalibrasi asam tanat

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
20	0,5538
40	0,5902
60	0,6438
80	0,7025
100	0,7384

Konsentrasi	20	40	60	80	100
Absorbansi	0,5534	0,5904	0,6435	0,7027	0,7385
	0,5543	0,5900	0,6436	0,7024	0,7386
	0,5537	0,5904	0,6443	0,7024	0,7381
Rata-rata	0,5538	0,5902	0,6438	0,7025	0,7384



Gambar 8. Kurva baku asam tanat

Lampiran 4. Perhitungan kadar total tannin dengan metode spektrofotometri**UV-VIS**

Kadar ekivalen tannin:

$$y = 0,0024x + 0,5013$$

a. Replikasi 1

$$y = 0,0024x + 0,5013$$

$$0,7881 = 0,0024x + 0,5013$$

$$0,0024x = 0,7881 + 0,5013$$

$$x = \frac{1,2894}{0,0024}$$

$$x = 537,25 \text{ mg/L}$$

b. Replikasi 2

$$y = 0,0024x + 0,5013$$

$$0,7886 = 0,0024x + 0,5013$$

$$0,0024x = 0,7886 + 0,5013$$

$$x = \frac{1,2899}{0,0024}$$

$$x = 537,458 \text{ mg/L}$$

c. Replikasi 3

$$y = 0,0024x + 0,5013$$

$$0,7892 = 0,0024x + 0,5013$$

$$0,0024x = 0,7892 + 0,5013$$

$$x = \frac{1,2905}{0,0024}$$

$$x = 537,708 \text{ mg/L}$$

Kadar tannin total

$$\text{Total tannin} = \frac{\text{volume} \times \text{konsentrasi (x)}}{\text{bobot ekstrak}}$$

1. Replikasi 1

$$\begin{aligned} \text{Total tannin} &= \frac{\text{volume} \times \text{konsentrasi (x)}}{\text{bobot ekstrak}} \\ &= \frac{0,01 \text{ L} \times 537,25}{0,5 \text{ gr}} \\ &= 10,745 \text{ mgTAE/g} \end{aligned}$$

2. Replikasi 2

$$\begin{aligned} \text{Total tannin} &= \frac{\text{volume} \times \text{konsentrasi (x)}}{\text{bobot ekstrak}} \\ &= \frac{0,01 \text{ L} \times 537,458}{0,5 \text{ gr}} \\ &= 10,749 \text{ mgTAE/g} \end{aligned}$$

3. Replikasi 3

$$\begin{aligned} \text{Total tannin} &= \frac{\text{volume} \times \text{konsentrasi (x)}}{\text{bobot ekstrak}} \\ &= \frac{0,01 \text{ L} \times 537,708}{0,5 \text{ gr}} \\ &= 10,754 \text{ mgTAE/g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi total kadar tannin rata-rata adalah:} &= \frac{10,745 + 10,749 + 10,754}{3} \\ &= 10,749 \text{ mgTAE/g ekstrak} \\ &= 1,075\% \end{aligned}$$

Lampiran 5. Perhitungan kadar total tannin dengan metode Lowenthal-procter

Pembakuan normalitas KMnO_4

$$N \text{ KMnO}_4 = \frac{W \text{ (mg)}/\text{BM} \times 2 \times \text{FP}}{V \text{ KMnO}_4}$$

1. Titrasi 1

$$\begin{aligned} N \text{ KMnO}_4 &= \frac{W \text{ (mg)}/\text{BM} \times 2 \times \text{FP}}{V \text{ KMnO}_4} \\ &= \frac{0,63/126 \times 2 \times 100}{28,5} \\ &= 0,03509 \text{ N} \end{aligned}$$

2. Titrasi 2

$$\begin{aligned} N \text{ KMnO}_4 &= \frac{W \text{ (mg)}/\text{BM} \times 2 \times \text{FP}}{V \text{ KMnO}_4} \\ &= \frac{0,63/126 \times 2 \times 100}{29,3} \\ &= 0,03413 \text{ N} \end{aligned}$$

3. Titrasi 3

$$\begin{aligned} N \text{ KMnO}_4 &= \frac{W \text{ (mg)}/\text{BM} \times 2 \times \text{FP}}{V \text{ KMnO}_4} \\ &= \frac{0,63/126 \times 2 \times 100}{27,5} \\ &= 0,03637 \text{ N} \end{aligned}$$

Jadi rata-rata pembakuan normalitas KMnO_4 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{0,03509+0,03413+0,03637}{3} \\ &= 0,03520 \text{ N} \end{aligned}$$

Kadar tannin total

$$\% \text{ kadar tannin} = \frac{(V-V_0) \times N \text{ KMnO}_4 \times 0,00416 \times \text{FP}}{\text{berat sampel (g)}} \times 100\%$$

1. Titrasi 1

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar tannin} &= \frac{(V-V_0) \times N \text{ KMnO}_4 \times 0,00416 \times \text{FP}}{\text{berat sampel (g)}} \times 100\% \\ &= \frac{(10,8-1,0) \times 0,03520 \times 0,00416 \times 10}{0,2} \times 100\% \\ &= 7,24839 \% \end{aligned}$$

2. Titrasi 1

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar tannin} &= \frac{(V-V_0) \times N \text{ KMnO}_4 \times 0,00416 \times \text{FP}}{\text{berat sampel (g)}} \times 100\% \\ &= \frac{(11,2-0,9) \times 0,03520 \times 0,00416 \times 10}{0,2} \times 100\% \\ &= 7,54125 \% \end{aligned}$$

3. Titrasi 1

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar tannin} &= \frac{(V-V_0) \times N \text{ KMnO}_4 \times 0,00416 \times \text{FP}}{\text{berat sampel (g)}} \times 100\% \\ &= \frac{(10,1-1,1) \times 0,03520 \times 0,00416 \times 10}{0,2} \times 100\% \\ &= 6,58944 \% \end{aligned}$$

Jadi kadar total kadar tannin rata-rata adalah :

$$\begin{aligned} &= \frac{7,24839 + 7,54125 + 6,58944}{3} \\ &= 7,12636 \% \end{aligned}$$

Lampiran 6. Gambar preparasi sampel

(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

Keterangan:

A: pengeringan sampel

B: perendaman sampel dengan etanol

C: pemekatan dengan evaporator

D: pengkentalan ekstrak

E: ditimbang berat ekstrak

Lampiran 7. Gambar Uji kualitatif tannin



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

Keterangan:

A: penimbangan bahan

B: pemanasan sampel

C: sampel disaring sebelum diuji

D: uji kualitatif tannin dengan FeCl_3

E: uji kualitatif tannin dengan gelatin 1%

Lampiran 8. Penetapan kadar tannin dengan spektrofotometri uv-vis

(a)



(b)



(c)



(d)

Keterangan:

A: penimbangan bahan

B: pembuatan konsentrasi asam tanat

C: seri pengenceran asam tanat

D: Pembacaan absorbansi

Lampiran 9. Penetapan kadar tannin dengan Lowenthal procter



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

Keterangan:

A: penimbangan sampel

B: penimbangan KMnO_4

C: penimbangan sam oksalat

D: pemanasan KMnO_4

E: penyaringan KMnO_4

F: KMnO_4



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

Keterangan:

A: titrasi 1

B: titrasi 2

C: titrasi 3

D: hasil titrasi 1

E: hasil titrasi 2

F: hasil titrasi 3



(a)



(b)



(c)



(d)

Keterangan:

A: titrasi sampel

B: hasil titrasi 1

C: hasil tirasi 2

D: hasil titrasi 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR



RIWAYAT HIDUP

Nama saya Sri Ulfasari sering disapa ulfa atau uppa. Saya lahir di Bantaeng, 16 April 1999 dari pasangan Suardi dan Rahma. Saya berasal dari Bantaeng. Saya anak ke-3 dari 4 bersaudara. Saya pernah sekolah di TK Perwanida II Bateballa, dan setelah lulus saya melanjutkan sekolah di SDN 42 Bateballa. Setelah lulus SD, saya melanjutkan pendidikan di MTs Ma'arif Lasepang. Setelah lulus dari MTs saya melanjutkan pendidikan saya di MA Ma'arif Lasepang. Setelah lulus dari Madrasah, saya melanjutkan pendidikan tingkat tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Jurusan Farmasi pada tahun 2017.

Hobi saya yaitu membaca, dan nonton. Motto hidup saya yaitu “Sabar Dan Ikhlas”. Alasan saya memilih farmasi yaitu karna saya ingin menjadi tenaga Kesehatan yang bisa berguna bagi banyak orang.