

**ANALISIS DRUG RELATED PROBLEMS (DRPs) PENGGUNAAN
ANTIDEPRESAN**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

ANAS FATURRAHMAN PUTRA

70100117033

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Faturrahman Putra
Nim : 70100117033
Temat/tgl lahir : Rahampu'u 7 maret 2000
Jurusan/prodi : Farmasi
Fakultas / Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN Adipatih Residence
Judul : Analisis *Drug Related Problems* (DRPs) dari Penggunaan antidepresan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 16 November 2021

Penyusun



ANAS FATURRAHMAN PUTRA
NIM. 70100117033

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “*analisis Drug Related Problems (DRPs) dari penggunaan antidepresan*” yang disusun oleh **Anas Faturrahman Putra**, NIM. **70100117033**, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam dalam Ujian Siding Skripsi yang diselenggarakan pada hari kamis, 11 November 2021 M yang bertepatan dengan 5 Rabiul Akhir 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 11 November 2021 M
5 Rabiul Akhir 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah , Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Apt. Nurul M. Maddepungeng, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Apt. Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc.	(.....)
Pembimbing II	: Apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc.	(.....)
Penguji I	: Apt. Surya Nings , S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Prof. Siti Aisyah Kara, M.A., PhD	(.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi dan syukur kepada Allah swt. Atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai syarat meraih Gelar Sarjana farmasi. Sholawat dan salam juga tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw, keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya.

Skripsi dengan judul “analisis drug related problmes (DRPs) dari penggunaan antidepresan” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami beberapa kendala. Namun, atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu serta memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kami penulis ucapkan kepada orang tua tercinta bapak Moh. Yunus dan ibu Hasnawiyah yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, serta dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada keluarga besar tercinta atas segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
2. Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani., S.Si., M.Si., Apt. selaku wakil dekan I, bapak Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS. Selaku wakil dekan II, dan bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku wakil dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
3. Bapak Apt. Asrul Ismail, S. Farm, M.Sc. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
4. Bapak Apt. Asrul Ismail, S. Farm, M.Sc. selaku pembimbing I dan ibu Apt. Munifah Wahyuddin, S. Farm, M.Sc selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt membalas bantuan bapak dan Ibu dengan pahala bahkan hal yang lebih baik di dunia dan akhirat kelak.
5. Ibu Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si. selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan saran dan kritiknya demi perbaikan dan kelengkapan skripsi ini, serta Ibu Prof. Siti Aisyah Kara, M.A., PhD. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan pengarahan sekaligus bimbingan terhadap kelengkapan dan perbaikan khususnya tinjauan islam dalam skripsi ini.

6. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf jurusan farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh Pendidikan farmasi hingga saat ini.
7. Kakak di Apotik Karuna Medika dan kakak di Apotek Fitrah yang telah memberikan ilmu, waktu dan pengalamannya serta memfasilitasi saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Saudara seperjuangan KOBOYS yang telah menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara(i)ku seperjuangan Farmasi Angkatan 2017 (KOVALEN) yang telah saling memberikan dukungan dan semangat, menemani dalam suka dan duka sejak awal menginjakan kaki di dunia kampus hingga saat ini tetap kompak dan sukses selalu.
10. Kakak-kakak Alumni dan adik-adik Farmasi UIN Alauddin Makassar yang telah berbagi cerita, motivasi, dan inspirasi selama di kampus peradaban.
11. Organisasi HMJ Farmasi dan Komunitas Belajar Avicanna Zone, yang telah mengajarkan pengembangan soft skill yang sangat bermanfaat dalam menempuh Pendidikan hingga saat ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini kedepannya.

Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah disisi Allah swt dan bermanfaat bagi semua pihak serta menjadi amal jariyah, aamiin.


Gowa, 16 November 2021

Penyusun



Anas Faturrahman Putra

NIM. 70100117033



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan ruang lingkup Penelitian.....	4
1. Definisi operasional.....	4
2. Ruang lingkup penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	7
A. Gangguan Jiwa.....	7
1. Pengertian gangguan jiwa.....	7
2. Penyebab gangguan jiwa.....	8
B. Depresi.....	11
1. Antidepresan klasik (trisiklik dan tetrasiklik).....	23
2. Antidepresan generasi ke-2.....	26
3. Antidepresan MAO.....	29

C. Teori Drug Related Problems (DRPs).....	32
D. Tinjauan keislaman	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel	42
D. Variabel Penelitian.....	43
1. Variabel bebas (variable Independen).....	43
2. Variable Terikat (Variabel Dependent).....	43
E. Instrumen Penelitian.....	43
F. Tahap Penelitian.....	43
1. Tahap awal	44
2. Tahap pelaksanaan	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Karakteristik pasien	46
2. Pola penggunaan obat.....	47
3. Analisis Drug Related Problems (DRPs)	49
B. Pembahasan.....	52
1. Karakteristik pasien depresi	52
2. Pola penggunaan obat antidepresan	53
3. Drug Related Problems (DRPs) pasien depresi.....	55
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
KEPUSTAKAAN	59
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi dasar DRPs oleh PCNE	34
Tabel 2. Klasifikasi domain problem.....	35
Tabel 3. Deskripsi bagian Problems	35
Tabel 4. Klasifikasi domain causes.....	35
Tabel 5. Klasifikasi planned intervention	37
Tabel 6. Klasifikasi intervention acceptance	37
Tabel 7. Status Drug Related Problems	38
Tabel 8 Karakteristik Pasien	46
Tabel 9. Penggunaan obat antidepresan dan obat lainnya.....	47
Tabel 10 Data Evaluasi DRPs.....	50
Tabel 11 Hasil Analisis Hubungan Antara Jenis Kelamin dan DRPs.....	51
Tabel 12 Hasil Analisis Hubungan Antara Usia dan DRPs.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Meneliti.....	61
Lampiran 2. Kode Etik Penelitian.....	62
Lampiran 3. Surat Keterangan Hasil Penelitian.....	64
Lampiran 4. Data Karakteristik Pasien	66
Lampiran 5. Interaksi DRPs Pasien Depresi.....	67
Lampiran 6. Karakteristik Pengobatan.....	68
Lampiran 7 Hubungan Jenis Kelamin dengan DRPs.....	72
Lampiran 8 Hubungan Usia dengan DRPs	73



ABSTRAK

Nama : Anas Faturrahman Putra
NIM : 570100117033
Judul penelitian : Analisis *Drug Related Problem* (DRPs) dari Penggunaan Antidepresan

Depresi adalah gangguan emosial atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan perasaan bersedih yang berkepanjangan, hilangnya harapan, merasa selalu salah dan tidak berarti yang mengakibatkan akitivitas yang sedang dijalani akan terganggu sehingga akan mempengaruhi pola hidup seseorang. *Drug Related Problems* (DRPs) adalah permasalahan yang terjadi berkaitan dengan suatu pengobatan yang terkait dalam terapi obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya DRPs pada pasien depresi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif observasional, yaitu pengambilan data yang dilakukan secara prospektif di apotek karuna medika dan apotek fitrah. Rekam medik pasien dianalisa untuk mengidentifikasi adanya DRPs dan penyebab DRPs dapat dilihat dari penggolongan *pharmaceutical care network Europe foundation* versi 8.01. Sampel pada penelitian ini berjumlah 40 pasien dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita depresi lebih banyak diderita oleh perempuan yaitu 65% (n=26) dan laki-laki 35% (n=14) dan paling banyak diderita oleh pasien pada kelompok usia 45-54 tahun yaitu 35% (n=14) dan pasien pada kelompok usia 35-44 tahun yaitu 32,5% (n=13). Adapun DRPs yang ditemukan yaitu DRPs pada domain C3.1 dimana terjadi dosis subterapeutik. Jumlah pasien yang mendapatkan dosis subterapeutik yaitu 20% (n=8) pasien.

Kata kunci : Depresi, Antidepresan, DRPs, PCNE

ABSTRACT

Name : Anas Faturrahman Putra
NIM : 70100117033
Judul penelitian : Analysis of Drug related problems (DRPs) of use
antidepressant

Depression is an emotional disorder or bad mood characterized by prolonged feelings of sadness, loss of hope, feeling always wrong and meaningless which results in the activities being undertaken will be disrupted so that it will affect a person's lifestyle. Drug Related Problems (DRPs) are problems that occur related to a treatment related to drug therapy. This study aims to see whether DRPs occur in depressed patients. The research method used is descriptive observational, namely the data collection is carried out prospectively at the Karuna Medika pharmacy and the fitrah pharmacy. Patient medical records are analyzed to identify the presence of DRPs and the causes of DRPs can be seen from the pharmaceutical care network classification Europe foundation version 8.01. the sample in this study amounted to 40 patients with the results of the study showing that women with depression suffered more, namely 65% (n = 26) and men 35% (n = 14) and most suffered by patients in the 45-54 age group. years was 35% (n=14) and patients in the 35-44 year age group were 32.5% (n=13). The DRPs found were DRPs in domain C3.1 where subtherapeutic doses occurred. The number of patients receiving subtherapeutic doses was 20% (n=8) patients.

Keywords : Depression, Antidepressants, DRPs, PCNE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu yang diakibatkan dalam realistik kehidupan manusia masa kini adalah munculnya berbagai gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, serta mengalami gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan yang diwujudkan dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang signifikan, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi manusia sebagai manusia. Saat ini, perkiraan jumlah penderita gangguan jiwa di dunia sekitar 450 juta orang, termasuk skizofrenia (WHO, 2017). Secara global kontributor penyebab kematian salah satunya yaitu gangguan jiwa dengan persentase 14,4 %. Kondisi tersebut tidak berbeda dengan kondisi di Asia tenggara dengan persentase penyebab kematian oleh gangguan jiwa yaitu 13,5%. Beberapa jenis gangguan jiwa yang diprediksi akan dialami oleh penduduk di Indonesia antara lain depresi, kecemasan, skizofrenia, bipolar, gangguan perilaku, autisme, gangguan perilaku makan, disabilitas intelektual (Kemenkes RI, 2019)

Salah satu jenis gangguan jiwa yaitu depresi. Selama tiga dekade depresi selalu menduduki urutan pertama kontributor terbesar beban penyakit penyebab kematian untuk jenis penyakit gangguan jiwa (Kemenkes RI, 2019). Depresi adalah jenis gangguan jiwa dimana seorang yang mengalami depresi biasanya merendahkan diri, sedih, marah, atau tidak berharga. Menurut (Kemenkes RI, 2016) terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi dan data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun keatas mencapai sekitar 6,1% dari jumlah penduduk Indonesia. Tanda

seorang menjadi depresi yaitu perasaan sedih, menderita, hilangnya rasa ketertarikan pada hidup, seperti terhadap interaksi sosial dan pekerjaan, rasa bersalah (Nuryati, 2018).

Depresi merupakan keadaan *sad mood* yang berkepanjangan dimana hal tersebut mengakibatkan menurunnya ketertarikan seseorang terhadap kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, mengalami penurunan berat badan, mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan sering mempunyai pikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri, dari hal tersebut perlu adanya pemantauan ataupun terapi secara psikologis maupun pengobatan secara kimia atau farmaka. Terapi secara psikologis biasanya dengan dibawa rutin ke psikiater agar depresi yang dialaminya tidak menjadi depresi yang berat. Sedangkan untuk pengobatan secara kimia atau farmaka biasanya menggunakan obat antidepresan, namun tidak semua pasien merespon hanya dengan pemberian antidepresan saja perlu adanya penambahan obat golongan antipsikotropika untuk meningkatkan respon atau efek dari obat golongan antiepresan (ikawati dan anurogo, 2018)

Ketepatan pemberian dosis juga perlu diperhatikan, karena apabila pemberian dosis berlebih ataupun kurang hal tersebut bisa menjadi salah satu yang mengindikasikan bahwa terapi pengobatan yang diberikan kepada pasien tidak rasional dan bisajadi tidak terjadi hasil terapi yang diinginkan atau terjadi kegagalan terapi. Apabila tidak sesuai dengan dosis terapi bisa menyebabkan resiko kekambuhan 45% hingga 70% dibandingkan dengan menjalani terapi yang sesuai dilihat dari jenis depresi yang dialami (Depkes RI, 2007). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Alves et al., 2014) mengenai *Drug Related Problems* dan intervensi apoteker dalam pasien rawat jalan dengan gangguan depresi ditemukan bahwa

masalah terkait obat (DRPs) paling banyak ditemukan yaitu sebanyak 38% dan jumlah tersebut lebih banyak dari pada presentase ketidak patuhan minum obat pasien depresi dengan presentase 24%.

Masalah terkait obat (*Drug Related Problem's*) adalah peristiwa yang melibatkan terapi obat yang benar-benar atau berpotensi mengganggu hasil kesehatan yang diinginkan. DRP lazim dan menyebabkan morbiditas dan mortalitas pasien yang cukup besar, serta peningkatan biaya perawatan kesehatan. Antidepresan juga merupakan obat dengan penjualan terbanyak ketiga secara global. Dalam banyak kasus obat antidepresan digunakan bersamaan dengan obat lain, sehingga mengekspos pasien pada potensi bahaya karena reaksi obat yang merugikan. Pasien dengan gangguan depresi sangat rentan terhadap interaksi obat baik karena usia lanjut, polifarmasi, dan metabolisme obat (Nagappa et al., 2015).

Kaitannya dengan hal tersebut di atas tentu penggunaan obat yang tepat baik itu tepat obat, tepat indikasi dan tepat dosis sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya masalah terkait obat dan juga dapat meminimalisir biaya yang harus dibayar oleh pasien. Karenanya apoteker sangat dibutuhkan agar dapat mengidentifikasi DRPs dan mencari terapi yang sebanding dan meyakinkan dokter mengenai preferensi idenya sehingga dapat meningkatkan perawatan pasien dan penggunaan obat yang aman

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang Analisis Drug Related Problems (DRPs) dari penggunaan antidepresan di apotek karuna medika dan apotek fitrah.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah apakah terdapat *Drug Related Problem* (DRPs) dari penggunaan antidepresan di apotek karuna medika dan apotek fitrah ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi operasional

- a. *Drug related Problem* (DRPs) adalah suatu kejadian atau keadaan yang melibatkan terapi obat yang sebenarnya atau berpotensi mengganggu hasil terapi yang di inginkan (Pharmaceutical Care Network Europe Foundation, 2017)
- b. Antidepresan merupakan senyawa yang dapat menimbulkan efek antidepresan, banyak digunakan untuk pengobatan pasien yang mengalami depresi karena berbagai alasan.

2. Ruang lingkup penelitian

Disiplin ilmu yang terkait dengan penelitian ini adalah Analisis Drug Related Problems (DRPs) dari penggunaan antidepresan di apotek karuna medika dan apotek fitrah.

D. Kajian Pustaka

1. (Septyarini et al., 2020) *Evaluasi Ketepatan Dosis Obat Pasien Depresi Rawat Jalan di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan*. Penelitian ini berkaitan dengan ketepatan penggunaan dosis obat pasien depresi di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa obat golongan antidepresan yang paling banyak digunakan yaitu fluoxetine obat golongan antipsikotropika yang paling banyak digunakan yaitu resperidon dan obat golongan psikotropika yang digunakan yaitu hexymer dan masih terdapat

pemberian dosis obat pada penderita gangguan depresi tidak tepat dosis. Dan pasien depresi paling banyak dialami oleh ibu rumah tangga.

2. (Palupi et al., 2017) *Evaluasi Terapi Antidepresan Pada Pasien dengan Gejala Depresi di RSJD Amino Gondohutomo Semarang*. Penelitian ini berkaitan dengan evaluasi terapi antidepresan pada pasien gejala depresi di RSJD Amino Gondohutomo Semarang dan mengaitkan antara jenis antidepresan yang digunakan dan lama rawat inap dengan hasil menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kelompok antidepresan dan lama rawat inap
3. (Ningtyas et al., 2016) *Farmakoterapi Depresi dan Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Efikasi Antidepresan*. Penelitian ini berkaitan dengan hubungan jenis kelamin terhadap penggunaan antidepresan dengan hasil penelitian yaitu terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap efikasi antidepresan.
4. (Oktaverinda, 2016) *Analisis Drug Related Problems (DRPs) Pada Pasien Depresi "Lansia" yang menjalani Rawat Inap di rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur*. Penelitian ini berkaitan dengan masalah terkait obat terhadap pasien lansia dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaktepatan dosis yang digunakan, pemilihan obat yang menimbulkan interaksi, dan tingkat kegagalan menerima obat yang sangat rendah.
5. (Nagappa et al., 2015) *Assesment of Drug-Related Problems in Depressive Patiens*. Penelitian ini berkaitan dengan penilaian masalah terkait obta pada pasien depresi dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa usia, jenis kelamin, polifarmasi adalah factor resiko untuk mengmebangkanterjadinya DRPs.

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui *Drug Related Problem (DRPs)* dari penggunaan antidepresan di Apotek karuna medika dan Apotek fitrah

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan dan sebagai sumber informasi dan pedoman bagi apotek Karuna medika dan apotek fitrah dalam penggunaan antidepresan, sehingga efek terapi dari antidepresan dapat menjadi optimal dan juga diharapkan dengan penelitian ini dapat mendukung pelayanan asuhan kefarmasian.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Gangguan Jiwa*

1. Pengertian gangguan jiwa

Gangguan jiwa merupakan kondisi dimana individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kondisi disekitarnya. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan suatu masalah menyebabkan lebih banyak stres yang membuat kesehatan mental individu lebih rentan dan akhirnya dinyatakan sebagai gangguan kesehatan mental (Putri, dkk: 2015).

Gangguan jiwa adalah sindrom dari pola perilaku seseorang yang biasanya dikaitkan dengan gejala kesusahan atau gangguan pada satu atau lebih fungsi penting manusia, yaitu psikologis, perilaku, fungsi biologis, dan gangguan tersebut tidak hanya terletak di dalam tubuh manusia. hubungan antara manusia tetapi juga dengan masyarakat. Gangguan jiwa adalah gambaran sindrom dengan berbagai penyebab. Banyak yang tidak diketahui dengan pasti dan perjalanan penyakit tidak selalu kronis. Secara umum ditandai dengan penyimpangan mendasar, karakteristik pemikiran dan persepsi, dan adanya afek abnormal atau tumpul (Yusuf, et al., 2015)

Gangguan kesehatan jiwa terdapat hal-hal yang dapat berdampak pada stres yang berlebihan. Kehidupan yang semakin modern membawa berbagai macam tuntutan yang harus dipenuhi. Bukan hanya karena wajib atau penting, namun keinginan untuk diakui oleh masyarakat membuat individu merasa terdorong untuk mengikuti tren yang sedang berlangsung tanpa menyadari kapasitasnya (Putri, dkk: 2015).

2. Penyebab gangguan jiwa

Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh banyak hal, yang akan diterangkan berikut ini (Nuryati, 2018):

a. Peristiwa yang sangat menekan.

Orang yang hidup pasti mengalami berbagai macam pengalaman dan peristiwa, beberapa di antaranya dapat membuat orang sangat khawatir dan tertekan. Hampir setiap orang akan belajar bagaimana menghadapi pengalaman-pengalaman itu dan melanjutkan hidup. Pada beberapa orang, terkadang, peristiwa tersebut dapat menyebabkan gangguan jiwa. Berbagai peristiwa kehidupan yang dapat menyebabkan stres berat antara lain pengangguran, kematian orang yang dicintai, masalah ekonomi seperti terlilit hutang, kesepian, konflik rumah tangga, kekerasan, trauma, dan lain-lain.

b. Latar belakang keluarga yang sulit.

Orang-orang yang memiliki masa kanak-kanak yang tidak bahagia, karena pelecehan atau pengabaian, secara emosional lebih rentan untuk mengembangkan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan sebagai orang dewasa.

c. Penyakit otak (retardasi mental)

Demensia dan gangguan emosi dapat disebabkan oleh infeksi otak, AIDS, cedera kepala, epilepsi, dan stroke. Tidak ada patologi otak yang telah diidentifikasi dalam banyak kasus gangguan mental. Meskipun ada bukti yang menunjukkan bahwa banyak gangguan mental disertai dengan perubahan kimia otak seperti neurotransmitter.

d. Hereditas atau genetik.

Ini merupakan faktor penting dalam gangguan mental yang parah. Namun jika salah satu orang tua memiliki gangguan jiwa, maka risiko anaknya mengalami gangguan jiwa sangat kecil. Hal ini dikarenakan gangguan jiwa ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti penyakit fisik seperti diabetes atau penyakit jantung.

e. Gangguan medis atau penyakit fisik.

Penyakit seperti gagal ginjal, penyakit hati, terkadang dapat menyebabkan gangguan mental. Ada beberapa jenis obat untuk penyakit fisik yang dapat menyebabkan depresi. Gejala gangguan jiwa yang menonjol adalah unsur psikisnya, tetapi yang sakit dan menderita tetap sebagai manusia seutuhnya (Yusuf, et al., 2015)

f. Faktor somatik (somatogenik),

Faktor somatik disebabkan oleh gangguan struktur neuron, fisiologi saraf, dan reaksi kimia pada saraf, termasuk tingkat maturitas, perkembangan organik, serta faktor prenatal dan perinatal.

g. Faktor psikologik (psikogenik),

Faktor psikologis berkaitan dengan interaksi ibu dan anak, peran ayah, persaingan antar saudara kandung, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, tuntutan masyarakat. Selain itu, faktor kecerdasan, tingkat perkembangan emosi, konsep diri, dan pola adaptasi juga akan mempengaruhi kemampuan menghadapi masalah. Jika situasi ini tidak baik, dapat menyebabkan kecemasan berlebihan, depresi, rasa malu, dan rasa bersalah.

h. Faktor sosial budaya,

Faktor sosial budaya yang meliputi faktor stabilitas keluarga, pola asuh, tingkat ekonomi, perumahan, dan masalah kelompok minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas kesehatan dan kesejahteraan yang tidak memadai, serta pengaruh ras dan agama.

Gangguan kesehatan jiwa adalah kondisi individu yang memiliki gejala gangguan jiwa. Ada berbagai macam unsur penyebab gangguan kesehatan jiwa pada seseorang, gangguan kesehatan jiwa ini dibagi menjadi tiga kategori penyebab, yaitu: (Putri et al., 2015) faktor somatogenik, psikogenik, dan sosiogenik. Faktor somatogenik terdiri dari neuroanatomi, neurofisiologi, neurokimia, tingkat kematangan dan perkembangan organik, serta faktor pra dan perinatal. Faktor psikogenik meliputi interaksi ibu-anak yang tidak normal seperti kurangnya kepercayaan, peran ayah, persaingan saudara kandung, kecerdasan, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permainan dan masyarakat, kehilangan yang menyebabkan kecemasan, depresi, rasa malu atau bersalah, pola adaptasi dan pertahanan. sebagai reaksi terhadap bahaya, dan tingkat perkembangan emosional. Faktor sosiogenik yang didalamnya terdapat stabilitas keluarga, pola asuh, keluarga dengan ekspresi emosi tinggi atau rendah, pendapatan atau tingkat ekonomi, tempat tinggal, masalah kelompok minoritas yang berprasangka buruk, kesehatan yang tidak memadai, fasilitas pendidikan dan kesejahteraan, pengaruh ras dan agama, dan nilai. yang berfungsi sebagai pedoman. Dari ketiga faktor tersebut diketahui bahwa penyebab gangguan jiwa atau gangguan jiwa tidak bisa hanya disebabkan oleh satu faktor saja, karena fitrah manusia itu utuh dimana sistem dalam diri manusia merupakan satu kesatuan, oleh karena itu sangat mungkin penyebab terjadinya gangguan jiwa.

gangguan merupakan kombinasi dari tiga kategori dengan satu kategori sebagai penyebab utama. Karena itu, penilaian terhadap pasien harus dilakukan secara detail dan menyeluruh. Dan juga penyebab gangguan jiwa umumnya dikategorikan ke dalam aspek fisik atau biologis seperti misalnya keturunan, obesitas yang cenderung psikosis, manik depresi dan bisa juga skizofrenia, temperamen karena orang yang terlalu sensitif, penyakit, dan cedera tubuh. Santrock juga menjelaskan bahwa gangguan jiwa juga dapat disebabkan oleh faktor psikologis dimana seseorang dengan pengalaman frustrasi, kegagalan dan kesuksesan akan mewarnai perilaku, kebiasaan, dan karakternya di masa depan. Pernyataan bahwa kehidupan manusia dapat dibagi menjadi 7 periode dan dalam keadaan tertentu dapat mendukung terjadinya gangguan jiwa (Putri et al., 2015)

B. *Depresi*

Depresi adalah gangguan emosi atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kekecewaan, harapan, perasaan bersalah dan tidak berarti. Sehingga semua proses mental (berpikir, merasa dan berperilaku) dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan interpersonal (Dirgayunita, 2016).

Gangguan depresi dapat terjadi pada semua usia, dengan riwayat keluarga gangguan depresi, biasanya dimulai antara usia 15 dan 30 tahun. Usia paling awal dikatakan 5-6 tahun sampai 50 tahun dengan usia rata-rata 30 tahun. Gangguan depresi mayor rata-rata dimulai pada usia 40 tahun (20-50 tahun). Epidemiologi ini tidak tergantung pada ras dan tidak memiliki korelasi dengan sosial ekonomi. Wanita juga bisa mengalami depresi pascapersalinan. Beberapa orang mengalami gangguan depresi musiman, di negara barat biasanya pada musim dingin. Ada gangguan depresi

yang merupakan bagian dari gangguan bipolar (dua kutub: satu kutub adalah gangguan depresi, kutub lainnya adalah mania). Gangguan depresi mayor adalah gangguan dengan prevalensi seumur hidup sekitar 15%, pada wanita mungkin sampai 25%. Wanita dua kali lebih mungkin mengalami gangguan depresi daripada pria. Alasan dalam penelitian di negara-negara barat dikatakan karena masalah hormonal, dampak persalinan, stres dan pola perilaku yang dipelajari. Gangguan depresi sangat umum, setiap tahun lebih dari 17 juta orang Amerika mengalaminya. Banyak orang mengalami gangguan depresi terkait penggunaan narkoba dan alkohol karena narkoba terdiri dari bahan kimia yang mempengaruhi fungsi otak, penggunaan narkoba yang terus menerus akan membuat ketidakseimbangan bahan kimia otak, sehingga mengganggu proses berpikir, perasaan dan perilaku (Depkes RI, 2007).

Sejak Perang Dunia II, kejadian depresi telah meningkat terus dalam populasi yang diteliti. Penyelidikan baru-baru ini menyimpulkan bahwa kejadian tahunan gangguan mood sekitar 10% pada populasi orang dewasa, dan 1 dari 15 orang dewasa (6,7%) akan mengalami gangguan mood. menderita episode depresi berat selama 12 bulan periode. Berbagai penelitian dari Eropa dan Amerika Serikat telah memperkirakan prevalensi seumur hidup menjadi 5% sampai 12% pada pria dan 9% hingga 26% pada wanita. Meskipun insiden depresi sangat mirip di berbagai ras dan kelompok etnis, penyakit mungkin sedikit lebih umum di sosial ekonomi yang lebih rendah. Onset depresi paling sering terjadi pada akhir 20-an, tetapi ada rentang yang luas, dan episode pertama mungkin sebenarnya hadir pada usia berapa pun. Salah satu kesalahpahaman yang berlaku adalah bahwa depresi lebih sering terjadi pada individu lanjut usia. Epidemiologis bukti menunjukkan bahwa kejadiannya sedikit lebih rendah pada anak laki-laki yang lebih tua daripada populasi umum, tetapi sub tipe

tertentu mungkin menjadi lebih umum (misalnya, melankolis, depresi dengan psikotik), dan depresi onset baru yang awalnya muncul selama tahun geriatri dapat membawa prognosis yang lebih buruk. Faktor genetik tampaknya memainkan peran utama dalam penyebab depresi. Keturunan dari individu yang depresi adalah 2,7 kali lebih mungkin mengalami depresi jika salah satu orang tua menderita, dan 3 kali lebih mungkin jika kedua orang tua menderita depresi. Tingkat kesesuaian untuk kembar monozigot (identik) berkisar dari 54% hingga 65%, sedangkan tingkat yang sesuai di dizigotik (persaudaraan) kembar berkisar dari 14% hingga 24%. Faktor genetik juga dapat menjadi predisposisi individu untuk timbulnya depresi lebih awal (lebih muda dari 30 tahun). Ada bukti yang jelas bahwa depresi mungkin terjadi sebagai akibat dari peristiwa stres (yaitu, faktor lingkungan) dalam hidup seseorang. Faktor-faktor ini termasuk masa kanak-kanak yang sulit, pelecehan fisik atau verbal, harga diri yang rendah, kematian orang yang dicintai satu, kehilangan pekerjaan, dan akhir dari hubungan yang serius. Akut episode depresi sering dikaitkan dengan kombinasi faktor lingkungan dan genetik. Misalnya, individu yang membawa kecenderungan genetik untuk gangguan mood dapat mengalami pengalaman traumatis yang pada akhirnya memicu manifestasi dari simptomatologi depresi. Depresi juga dapat terjadi secara spontan di antara orang-orang yang tampaknya tidak memiliki genetik yang jelas atau kecenderungan lingkungan (Alldredge *et al.*, 2013).

Penyebab gangguan jiwa selalu dipertimbangkan dari sisi organobiologis, sosiokultural dan psikoedukasi. Dari sisi biologis dikatakan terjadi gangguan pada neurotransmitter norepinefrin, serotonin dan dopamin. Ketidakseimbangan kimiawi otak, yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan komunikasi antar serabut saraf, membuat tubuh menerima komunikasi yang salah dalam pikiran, perasaan, dan

perilaku. Oleh karena itu, dalam terapi farmakologi, terapi yang dilakukan adalah meningkatkan kerja neurotransmitter norepinefrin, serotonin dan dopamin (Depkes RI, 2007)

Patofisiologi depresi dalam (Alldredge *et al.*, 2013) beberapa teori modern membahas asal-usul depresi telah berkembang selama tiga dekade terakhir, dengan fokus pada sistem neurotransmitter, termasuk norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Sebagai obat antidepresan yang unik dikembangkan dan pemahaman kita tentang mekanisme tindakan farmakologis meningkat, teori depresi meyakinkan lainnya pasti akan berkembang. Di masa lalu, hipotesis monoamina mengusulkan bahwa penurunan konsentrasi sinaptik norepinefrin atau serotonin menyebabkan depresi. Teori penipisan norepinefrin awalnya didasarkan pada pengamatan bahwa reserpin, yang menghabiskan simpanan katekolamin di sistem saraf pusat (SSP), mampu menyebabkan depresi. Teori ini berkembang menjadi hipotesis permisif, yang menekankan peran yang lebih besar untuk serotonin dalam mempromosikan atau "mengizinkan" penurunan fungsi norepinefrin. Secara khusus, hipotesis ini menunjukkan bahwa konsentrasi rendah serotonin atau norepinefrin di sistem saraf pusat memicu gejala depresi, sedangkan tingkat rendah serotonin dan peningkatan aktivitas norepinefrin mengakibatkan dalam gejala manik. Antidepresan dipercaya dapat meredakan depresi dengan menghambat reuptake norepinefrin atau serotonin dari sinaps ke dalam neuron, dan secara efektif meningkatkan konsentrasi neurotransmitter di sinaptik. Meskipun teori-teori ini pada awalnya membantu dalam meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana antidepresan bekerja, ada beberapa alasan untuk mencurigai bahwa mekanisme dan sistem lain terlibat. Pertama, antidepresan mampu memblokir pengambilan kembali neurotransmitter

segera setelah administrasi, namun beberapa minggu berlalu sebelum terapi efeknya jelas yaitu, onset tertunda. Kedua, sinaptik konsentrasi amina biogenik tidak selalu menurun pada individu yang depresi dan sebenarnya bisa lebih tinggi dari itu terlihat pada kontrol normal. Terakhir, antidepresan dalam pengembangan dapat bekerja melalui mekanisme yang tidak melibatkan peningkatan relatif dalam konsentrasi neurotransmitter sinaptik. Mekanisme seperti itu termasuk blokade substansi P, dan antagonisme faktor pelepas kortikotropin atau reseptor kortikosteroid. Hipotesis disregulasi telah berkembang baru-baru ini dan menunjukkan bahwa depresi, serta gangguan kejiwaan lainnya, adalah akibat dari sistem neurotransmiter yang tidak teratur. Regulasi dis seperti itu dapat mencakup gangguan dalam regulasi atau mekanisme homeostatis, keluaran basal neurotransmiter yang tidak menentu, gangguan pada periodisitas normal (sirkadian ritme), respons yang kurang selektif terhadap rangsangan lingkungan, gangguan sistem yang mengakibatkan pengembalian tertunda ke baseline, dan pemulihan regulasi yang efisien melalui penggunaan agen farmakologis. Depresi telah dikaitkan dengan perubahan densitas reseptor prasinaps dan pascasinaps (atau kepekaan) yang telah digambarkan sebagai downregulated atau desensitized. Perubahan termasuk penurunan alfa-adrenergik pascasinaps sensitivitas reseptor, bersama dengan perubahan sensitivitas reseptor alfa-adrenergik, dopaminergik (D2) dan serotonin sub tipe (5-HT1A dan 5HT2A). Misalnya, serotonin selektif reuptake inhibitor (SSRI) dapat meningkatkan efisiensi neurotransmisi serotonergik secara akut (melalui reuptake blokade), tetapi efek terapeutiknya terkait sementara dengan peningkatan pelepasan serotonin melalui downregulasi autoreseptor pra sinaptik (5-HT1A). Saat ini, penekanan terus ditempatkan pada serotonin, atau epinefrin, dan neurotransmiter dopamin, dan

tambahan perhatian juga diberikan pada efek diferensial mereka pada gejala depresi tertentu. Misalnya, nafsu makan, tidur, libido, fungsi motorik, kecemasan, dan agresi semuanya tampak kuat dipengaruhi oleh transmisi serotonin. Bukti penelitian untuk pengaruh serotonergik telah menunjukkan bahwa konsentrasi metabolit primer serotonin (asam 5-hidroksiindoleasetat [5-HIAA]) menurun dalam cairan serebrospinal pasien depresi. Konsentrasi 5-HIAA yang rendah juga ditemukan pada cairan serebrospinal pasien yang mencoba bunuh diri dan mungkin memiliki peran dalam memicu aktivitas kekerasan lainnya. Penurunan diet l-tryptophan, prekursor serotonin, telah menyebabkan kekambuhan pada pasien depresi yang sebelumnya responsif terhadap SSRI, dan gejala seperti iritabilitas dan gangguan tidur atau nafsu makan tampaknya kembali secara istimewa. Defisiensi norepinefrin (dan dopamin) sampai batas tertentu diyakini memediasi gejala depresi seperti anhedonia, penurunan energi, gangguan memori, dan disfungsi eksekutif.³⁰ Pemberian -metil para tirosin (yang menghambat sintesis norepinefrin) memiliki mengakibatkan kembalinya gejala depresi ini di antara pasien yang sebelumnya berhasil diobati dengan noradrenergik antidepressan. Peran dopamin dalam memediasi konstelasi gejala ini telah tersirat melalui postmortem studi, hasil neuroimaging, dan efektivitas agonis dopamin murni yang ditunjukkan (misalnya, amantadine, pramipexole) dalam menghilangkan depresi. Pada akhirnya, masih diyakini bahwa sirkuit umum dipengaruhi oleh berbagai neurotransmitter ini, mengakibatkan manifestasi klinis depresi.

Depresi ditunjukkan dengan tanda-tanda berikut ini.

- 1) Fisik: merasa lelah dan tidak bertenaga, sakit dan nyeri di seluruh tubuh yang tidak jelas sebabnya.

2) Perasaan: perasaan sedih dan menderita; hilangnya rasa ketertarikan pada hidup, seperti terhadap interaksi sosial dan pekerjaan; rasa bersalah.

3) Pikiran: tidak punya harapan akan masa depan, sulit konsentrasi dan mengambil keputusan; merasa diri tidak sebaik orang lain (tidak percaya diri), merasa bahwa mungkin lebih baik jika ia tidak hidup, sehingga muncul keinginan dan rencana untuk bunuh diri (Nuryati and kresnowati, 2018).

Sedangkan menurut (Dirgayunita, 2016) Gejala umum dan tanda-tanda depresi termasuk gejala fisik seperti pola tidur yang terganggu, tingkat aktivitas yang menurun, seperti kehilangan minat, kesenangan dalam hobi atau aktivitas yang sebelumnya dinikmati, kesulitan makan atau makan berlebihan (dapat menjadi kurus atau kelebihan berat badan. Gejala penyakit fisik yang dialaminya). sakit kepala, masalah pencernaan, sakit perut dan nyeri kronis, kelemahan, kelelahan, lesu, dan sulit berkonsentrasi. , merasa terbebani dan tidak berdaya, resah dan mudah tersinggung, berpikir ingin mati atau bunuh diri, sensitif, dan kehilangan kepercayaan diri. Gejala sosial berupa penurunan aktivitas dan minat sehari-hari (menarik diri, menyendiri, malas), tidak ada motivasi untuk melakukan apa saja, kehilangan keinginan untuk hidup dan ide bunuh diri.

Gejala gangguan depresi bervariasi dari orang ke orang, tergantung pada tingkat keparahan gejalanya. Gangguan depresi mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku seseorang serta kesehatan fisiknya. Gangguan depresi tidak memiliki gejala fisik yang sama dan pasti pada satu orang dan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Keluhan yang sering muncul adalah nyeri, nyeri pada sebagian atau seluruh tubuh, keluhan pada sistem pencernaan. Sebagian besar gejalanya adalah karena mereka mengalami stres, kekhawatiran, dan kecemasan yang hebat terkait

dengan gangguan depresi mereka. Gejala dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang berkaitan dengan perubahan dalam berpikir, perasaan dan perilaku. Perubahan cara berpikir yang mengganggu konsentrasi dan pengambilan keputusan membuat seseorang sulit mempertahankan ingatan jangka pendek, dan sepertinya sering lupa. Pikiran negatif sering menyerang pikiran mereka. Mereka menjadi pesimis, memiliki harga diri yang rendah, merasa sangat bersalah, dan kritis terhadap diri sendiri. Beberapa orang merusak diri sendiri sampai bunuh diri atau membunuh orang lain. Perubahan perasaan yaitu perasaan sedih, tertekan, tanpa sebab yang jelas. Beberapa orang merasa mereka tidak bisa lagi menikmati apa yang dulu mereka nikmati, dan tidak bisa merasakan kesenangan apa pun. Motivasi menurun dan menjadi acuh tak acuh terhadap apapun. Merasa seperti berada di titik terendah, merasa lelah sepanjang waktu bahkan tanpa bekerja. Perasaan mudah tersinggung, mudah tersinggung. Dalam keadaan ekstrim yang ditandai dengan perasaan tidak berdaya dan putus asa. Perubahan perilaku ini merupakan cerminan dari emosi negatif. Mereka menjadi apatis, sulit bergaul atau bertemu orang, sehingga menarik diri dari pergaulan. Nafsu makan berubah drastis, makan lebih banyak atau kesulitan membangkitkan keinginan untuk makan. Sering juga sering menangis berlebihan tanpa alasan yang jelas. Sering mengeluh tentang segala hal, marah dan mengamuk. Minat berhubungan seks seringkali berkurang hingga hilang, tidak lagi mengurus diri sendiri, termasuk mengurus hal-hal pokok seperti mandi, meninggalkan tanggung jawab dan kewajiban baik pekerjaan maupun pribadi. Beberapa orang tidak bisa tidur, beberapa tidur sepanjang waktu. Perubahan kesehatan fisik akibat emosi negatif seseorang merasa dirinya tidak sehat secara fisik selama mengalami gangguan depresi. Kelelahan kronis menyebabkan dia lebih suka berada di tempat tidur tanpa melakukan apa-apa,

mungkin banyak tidur atau tidak bisa tidur. Mereka berbaring terjaga atau gelisah bangun di tengah malam dan menatap langit-langit. Keluhan nyeri di banyak bagian tubuh merupakan tanda khas dari gangguan depresi. Gelisah dan tidak bisa diam, mondar-mandir sering menyertai. Gejalanya berlangsung sangat lama, mulai dari beberapa minggu hingga beberapa tahun, sehingga perasaan, pikiran, dan perilaku berjalan dengan cara yang sama sepanjang waktu setiap hari. Jika gejala tersebut dirasakan, dilihat dan diamati, maka sudah saatnya untuk membawanya berobat, karena gangguan depresi bisa diobati. Gangguan ini tidak hanya berdampak pada orang yang mengalaminya tetapi juga berdampak pada anggota keluarga dan lingkungan. Karena gangguan depresi, seseorang kehilangan minat, termasuk minat dalam perawatan diri untuk aktivitas pekerjaan. Dengan demikian akan menimbulkan kerugian ekonomi di tempat kerja karena seseorang tidak bisa lagi bekerja, sedangkan keluarga yang harus mengurusnya juga kehilangan waktu dan tenaga, serta mengganggu aktivitas sehari-hari (Depkes RI, 2007).

Gangguan depresi terbagi menjadi dua (Dirgayunita, 2016), yaitu:

1. Major Depressive Disorder (MDD) ditandai dengan keadaan emosional kesedihan dan hilangnya kemampuan untuk menikmati aktivitas biasa, disertai dengan setidaknya 4 (empat) gejala berikut :
 - a. Tidur terlalu banyak (10 jam atau lebih) atau terlalu sedikit (sulit tidur, sering terbangun)
 - b. Kekakuan motorik
 - c. Kehilangan nafsu makan dan penurunan berat badan secara drastis atau sebaliknya makan berlebihan sehingga berat badan meningkat drastis.
 - d. Kehilangan energi, lemah, tidak termotivasi, tidak tertarik melakukan apapun

- e. Merasa tidak berharga
- f. Kesulitan berkonsentrasi, berpikir dan membuat keputusan
- g. Pikiran tentang kematian atau bunuh diri yang berulang-ulang Gejala ini muncul hampir sepanjang hari, setiap hari, selama minimal 2 (dua) minggu dan bukan karena kehilangan yang wajar, misalnya karena suami/istri meninggal. MDD sering disebut oleh masyarakat umum dengan istilah depresi.

Gangguan depresi mayor ditandai dengan satu atau lebih episode depresi mayor, seperti yang didefinisikan oleh Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Periode 2 minggu yang sama dan menyebabkan penderitaan atau gangguan yang signifikan seperti suasana hati atau kehilangan minat atau kesenangan, suasana hati yang mudah tersinggung, perasaan tertekan, tidak adanya minat pada suatu kegiatan, penurunan atau penambahan berat badan, insomnia atau hipersomnia, agitasi psikomotor atau penghambatan, berkurangnya konsentrasi atau keragu-raguan, pikiran berulang tentang kematian, dan pikiran untuk bunuh diri. Diagnosis memerlukan tinjauan pengobatan, pemeriksaan fisik, status mental pemeriksaan, hitung darah lengkap dengan diferensial, tes fungsi tiroid, dan penentuan elektrolit. Banyak penyakit kronis (misalnya, stroke, penyakit Parkinson, cedera otak traumatis, hipotiroidisme) dan penyalahgunaan zat dan gangguan ketergantungan berhubungan dengan depresi. Obat-obatan yang berhubungan dengan depresi termasuk banyak antihipertensi, kontrasepsi oral, isotretinoin, interferon- β 1 dan banyak lagi (Dipiro *et al.*, 2020).

Untuk menegakkan diagnosis gangguan depresif berat, gejala harus ada setidaknya selama 2 minggu dan tidak boleh dipicu atau dipengaruhi oleh penyakit

medis atau pengobatan (menurut kriteria DSM-IV-TR). Individu harus memiliki setidaknya lima gejala, salah satunya adalah suasana hati yang tertekan ATAU anhedonia (berkurangnya minat atau kesenangan dalam aktivitas). Tujuh lainnya gejalanya adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan nafsu makan
- b. Perubahan dalam tidur
- c. Energi rendah
- d. Konsentrasi yang buruk (atau kesulitan membuat keputusan)
- e. Perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang tidak pantas
- f. Agitasi atau keterbelakangan psikomotor
- g. Pikiran bunuh diri yang berulang

Kriteria diagnostik juga menetapkan bahwa gangguan *mood* harus menyebabkan penderitaan yang nyata atau mengakibatkan gejala klinis gangguan yang signifikan dari fungsi sosial atau pekerjaan. Meskipun energi rendah dan perubahan tidur atau nafsu makan adalah hadir pada sebagian besar pasien depresi, presentasi klinis dari depresi bisa sangat bervariasi. Banyak pasien akan dengan mudah mengungkapkan kesedihan atau keputusasaan yang mendalam, tetapi orang lain dapat memproyeksikan penampilan yang lebih cemas atau mudah tersinggung. Agitasi psikomotor mungkin terlihat, menampilkan meremas-remas tangan, meringis, mondar-mandir, atau mengutuk. Sebaliknya, keterbelakangan psikomotor dapat jelas, dengan bicara atau pemikiran yang melambat, suara monoton yang lembut, atau ekspresi wajah minimal. Meskipun kriteria untuk mendeteksi depresi berat identik pada populasi lanjut usia seperti pada populasi umum, penyajiannya mungkin sedikit berbeda daripada pada individu yang lebih muda. Pasien lanjut usia

mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk mengakui kesedihan atau melankolis dan memilih untuk diam sebagai gantinya pada keluhan somatik seperti sakit kepala, insomnia, nyeri sendi, pusing, atau sembelit. Akibatnya, dokter disarankan untuk mempertimbangkan kemungkinan depresi setiap kali seseorang hadir dengan gejala penyakit fisik kronis yang tidak jelas dan tidak jelas etiologinya (Alldredge *et al.*, 2013).

2. Dysthymic Disorder (Gangguan Distimik / Dysthymia) Adalah gangguan depresi kronis. Individu yang didiagnosis dengan kondisi distimik mengalami depresi lebih dari separuh waktu selama minimal 2 (dua) tahun. Jadi, dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, separuh dari waktu tersebut individu tersebut mengalami kondisi depresif, mengalami paling sedikit 2 (dua) gejala berikut ini :
 - a. Kehilangan nafsu makan atau sebaliknya
 - b. Tidur terlalu banyak/terlalu sedikit
 - c. Merasa tidak berharga
 - d. Kesulitan berkonsentrasi dan membuat keputusan
 - e. Mersa kehilangan harapan Gejala tidak terlihat lebih dari 2 (dua) bulan. Tidak ada episode MDD selama 2 tahun pertama gejala. Gejala yang dialami lebih ringan dibandingkan MDD namun dengan waktu yang lebih lama.

Penatalaksanaan penderita depresi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu farmakologis dan nonfarmakologis. Non farmakologi berupa Psikoterapi, yaitu terapi yang digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi keluhan dan mencegah terulangnya gangguan psikologis atau pola perilaku maladaptif. Terapi dilakukan dengan menjalin hubungan profesional antara terapis dan pasien. Psikoterapi bagi penderita gangguan depresi dapat diberikan secara individu, kelompok, atau

berpasangan sesuai dengan gangguan psikologis yang mendasarinya. Psikoterapi dilakukan dengan memberikan kehangatan, empati, pengertian dan optimisme. Dalam pengambilan keputusan untuk melakukan psikoterapi sangat dipengaruhi oleh penilaian dokter atau penderita. Terapi farmakologi adalah dengan meminum obat antidepresan (Depkes RI, 2007)

Penggolongan obat antidepresan (Depkes RI, 2007)

1. Antidepresan klasik (trisiklik dan tetrasiklik)

- a. Mekanisme kerja yaitu Obat-obat ini menghambat resorpsi dari serotonin dan noradrenalin dari sela sinaps di ujung-ujung saraf
- b. Efek samping
 - 1) Efek jantung ; dapat menimbulkan gangguan penerusan impuls jantung dengan perubahan ECG, pada overdosis dapat terjadi aritmia berbahaya.
 - 2) Efek anti kolinergik ; akibat blokade reseptor muskarin dengan menimbulkan antara lain mulut kering, obstipasi, retensi urin, tachycardia, serta gangguan potensi dan akomodasi, keringat berlebihan.
 - 3) Sedasi
 - 4) Hipotensi ortostatik dan pusing serta mudah jatuh merupakan akibat efek antinoradrenalin, hal ini sering terjadi pada penderita lansia, mengakibatkan gangguan fungsi seksual.
 - 5) Efek antiserotonin, akibat blokade reseptor 5HT postsinaptik dengan bertambahnya nafsu makan dan berat badan.
 - 6) Kelainan darah, seperti agranulocytose dan leucopenia, gangguan kulit
 - 7) Gejala penarikan pada penghentian terapi dengan mendadak dapat timbul antara lain gangguan lambung-usus, agitasi, sukar tidur, serta nyeri kepala dan otot.

c. Obat yang termasuk antidepresan klasik

1) Imipramin

Dosis lazim : 25-50 mg 3x sehari bila perlu dinaikkan sampai maksimum 250-300 mg sehari.

Kontra Indikasi : Infark miokard akut

Interaksi Obat : anti hipertensi, obat simpatomimetik, alkohol, obat penekan SSP Perhatian : kombinasi dengan MAO, gangguan kardiovaskular, hipotensi, gangguan untuk mengemudi, ibu hamil dan menyusui.

2) Klomipramin

Dosis biasa : 10 mg dapat ditingkatkan hingga dosis maksimum 250 mg setiap hari.

Kontraindikasi : Infark miokard, pemberian MAO bersamaan, gagal jantung, kerusakan hati berat, glaukoma sudut sempit.

Interaksi Obat : dapat menurunkan efek antihipertensi dari penghambat neuroadrenergik, dapat meningkatkan efek kardiovaskular noradrenalin atau adrenalin, meningkatkan aktivitas obat depresan SSP, alkohol.

Perhatian : terapi bersama dengan preparat tiroid, konstipasi kronik, kombinasi dengan beberapa obat antihipertensi, simpatomimetik, penekan SSP, anti kolinergik, penghambat reseptor serotonin selektif, antikoagulan, simetidin. Monitoring hitung darah dan fungsi hati, gangguan untuk mengemudi.

3) Amitriptilin

Dosis biasa : 25 mg dapat ditingkatkan secara bertahap hingga dosis maksimum 150-300 mg setiap hari.

Kontra Indikasi : koma, diskrasia darah, gangguan depresi sumsum tulang, kerusakan hati, penggunaan bersamaan dengan MAO.

Interaksi Obat : dengan guanethidine menghilangkan efek antihipertensi, dengan depresan SSP seperti alkohol, barbiturat, hipnotik atau analgesik opiat mempotensiasi efek gangguan depresi SSP termasuk depresi pernapasan, dengan reserpin menghilangkan efek antihipertensi.

Perhatian : gangguan kardiovaskular, kanker payudara, penurunan fungsi ginjal, glaukoma, kecenderungan bunuh diri, kehamilan, laktasi, epilepsi

4) Lithium karbonat

Dosis lazim : 400-1200 mg dosis tunggal pada pagi hari atau sebelum tidur malam. Kontra Indikasi : kehamilan, laktasi, gagal ginjal, hati dan jantung.

Interaksi Obat : diuretik, steroid, psikotropik, AINS, diazepam, metildopa, tetrasiklin, fenitoin, carbamazepin, indometasin.

Perhatian : Monitor asupan diet dan cairan, penyakit infeksi, demam, influenza, gastroenteritis

2. Antidepresan generasi ke-2

a. Mekanisme kerja

SSRI (Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors): Obat ini menghambat resorpsi serotonin. NaSA (Noradrenalin dan Serotonin Antidepresan): Obat ini tidak selektif, menghambat pengambilan kembali serotonin dan noradrenalin. Ada beberapa indikasi bahwa obat ini lebih efektif daripada SSRI.

b. Efek samping

- 1) Efek seretogenik; Ini termasuk mual, muntah, malaise umum, sakit kepala, gangguan tidur dan saraf, agitasi atau kegelisahan sementara, disfungsi seksual dengan ejakulasi tertunda dan orgasme.
- 2) Sindrom serotonin; Ini termasuk kegelisahan, demam dan kedinginan, kejang dan kekakuan parah, tremor, diare, dan gangguan koordinasi. Sebagian besar terjadi dengan penggunaan kombinasi obat generasi ke-2 dengan obat klasik, MAO, lithium atau triptofan, biasanya dalam beberapa jam hingga 2-3 minggu. Gejala-gejala ini dilawan dengan antagonis serotonin (methysergide, propranolol).
- 3) Efek antikolinergik, antiadrenergik, dan jantung sangat sedikit atau tidak ada sama sekali.

c. Obat yang termasuk antidepresan generasi ke-2

1) Fluoxetin

Dosis lazim : 20 mg sehari pada pagi hari, maksimum 80 mg/hari dalam dosis tunggal atau terbagi.

Kontra Indikasi : hipersensitif terhadap fluoxetin, gagal ginjal yang berat, penggunaan bersama MAO.

Interaksi Obat : MAO, Lithium, obat yang merangsang aktivitas SSP, anti depresan, triptofan, karbamazepin, obat yang terkait dengan protein plasma.

Perhatian : penderita epilepsi yang terkontrol, penderita kerusakan hati dan ginjal, gagal jantung, jangan mengemudi / menjalankan mesin.

2) Sertralin

Dosis biasa : 50 mg/hari bila perlu ditingkatkan menjadi maksimal 200 mg/hari.

Kontraindikasi : Hipersensitif terhadap sertraline.

Interaksi Obat : MAO, Alkohol, Lithium, Obat seretogenik.

Perhatian : pada gangguan hati, terapi kejang listrik, kehamilan, menyusui, penurunan kemampuan mengemudi dan mengoperasikan mesin.

3) Citalopram

Dosis biasa: 20 mg/hari, maksimum 60 mg/hari.

Kontraindikasi: hipersensitivitas terhadap obat ini.

Interaksi Obat: MAO, sumatripan, simetidin.

Perhatian: kehamilan, menyusui, gangguan manik, kecenderungan bunuh diri.

4) Fluvoxamine

Dosis biasa : 50 mg bisa diberikan 1x/hari sebaiknya malam hari, dosis maksimal 300 mg.

Interaksi Obat: warfarin, fenitoin, teofilin, propranolol, litium.

Perhatian : Tidak untuk digunakan dalam waktu 2 minggu setelah penghentian terapi MAO, insufisiensi hati, tidak dianjurkan untuk anak-anak dan epilepsi, kehamilan dan menyusui.

5) Mianserin

Dosis biasa: 30-40 mg pada malam hari, dosis maksimum 90 mg/hari

Kontra Indikasi : mania, gangguan fungsi hati.

Interaksi Obat: mempotensiasi aksi depresan SSP, tidak boleh diberikan dengan atau dalam waktu 2 minggu setelah penghentian terapi.

Perhatian: dapat mengganggu psikomotor pada hari pertama terapi, diabetes, hati, ginjal, insufisiensi jantung

6) Mirtazapin

Dosis biasa : 15-45 mg/hari menjelang tidur.

Kontraindikasi : Hipersensitif terhadap mitrazapine.

Interaksi Obat : dapat meningkatkan SSP mengurangi aksi alkohol, meningkatkan efek sedatif dari benzodiazepin, MAO.

Perhatian : pada epilepsi sindrom otak organik, hati, ginjal, jantung, tekanan darah rendah, orang dengan skizofrenia atau gangguan psikotik lainnya, penghentian terapi secara tiba-tiba, lanjut usia, hamil, menyusui, gangguan kemampuan mengemudi atau mengoperasikan mesin.

7) Venlafaxine

Dosis biasa : 75 mg/hari bila perlu dapat ditingkatkan menjadi 150-250 mg sekali/hari.

Kontraindikasi: penggunaan bersama MAO, kehamilan dan menyusui, anak <18 tahun.

Interaksi Obat: MAO, obat pengaktif SSP lainnya.

Perhatian: riwayat kejang dan penyalahgunaan obat, gangguan ginjal atau sirosis hati, penyakit jantung tidak stabil, monitor tekanan darah jika pasien mengonsumsi dosis harian > 200 mg

3. Antidepresan MAO

a. Farmakologi

Monoamine oksidase merupakan sistem enzim kompleks yang tersebar luas di dalam tubuh, berperan dalam penguraian amina biogenik, seperti norepinefrin, epinefrin, dopamin, serotonin. MAOI menghambat sistem enzim ini, sehingga menyebabkan peningkatan konsentrasi amina endogen. Semua MAOI nonselektif yang digunakan sebagai antidepresan adalah inhibitor ireversibel, sehingga diperlukan waktu hingga 2 minggu untuk memulihkan metabolisme amina normal setelah penghentian obat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terapi MAOI kronis menyebabkan penurunan jumlah reseptor adrenergik dan serotoninergik.

b. Farmakokinetik

Penyerapan/distribusi – Informasi tentang farmakokinetik MAOI terbatas. MAOI tampaknya diserap dengan baik setelah pemberian oral. Tingkat puncak tranlycypromine dan phenelzine mencapai tingkat puncak masing-masing dalam 2 dan 3 jam. Namun, penghambatan MAO maksimal terjadi dalam 5 sampai 10 hari. Metabolisme/ekskresi – metabolisme MAOI dari kelompok hidrazin (fenelzin, isokarboksazid) diperkirakan

menghasilkan metabolit aktif. Inaktivasi terjadi terutama melalui asetilasi. Efek klinis phenelzine dapat berlanjut hingga 2 minggu setelah penghentian terapi. Setelah penghentian tranylcipromine, aktivitas MAO kembali dalam 3 sampai 5 hari (mungkin sampai 10 hari). Phenelzine dan isocarboxazide diekskresikan dalam urin sebagian besar dalam bentuk metabolitnya. Populasi khusus – “asetilator lambat”: Asetilasi lambat dari hidrazin MAOI dapat meningkatkan efek setelah dosis standar.

c. Indikasi

Depresi, secara umum, MAOI diindikasikan pada pasien dengan depresi atipikal (eksogen) dan pada beberapa pasien yang tidak menanggapi terapi antidepresan lainnya. MAOI jarang digunakan sebagai obat pilihan.

d. Kontraindikasi

Hipersensitivitas terhadap senyawa ini, pheochromocytoma, gagal jantung kongestif, riwayat penyakit hati atau fungsi hati abnormal, gangguan ginjal berat, gangguan serebrovaskular, penyakit kardiovaskular, hipertensi, riwayat sakit kepala, pemberian bersama dengan MAOI lain, senyawa terkait dibenzazepine termasuk antidepresan trisiklik, carbamazepine, dan cyclobenzaprine, bupropion, SRRI, simpatomimetik, meperidin, dekstrometorfan, senyawa anestesi, depresan SSP, antihipertensi, kafein, keju atau makanan lain yang tinggi tiramin.

e. Peringatan

Memburuknya gejala klinis dan risiko bunuh diri: Pasien dengan gangguan depresi mayor, baik dewasa maupun anak-anak, dapat mengalami perburukan depresi dan/atau munculnya ide atau perilaku bunuh diri, atau

perubahan perilaku yang tidak biasa, yang tidak terkait dengan penggunaan antidepresan. , dan risiko ini dapat bertahan sampai terjadi pengurangan jumlah obat yang signifikan. Ada kekhawatiran bahwa antidepresan mungkin memainkan peran dalam mendorong memburuknya depresi dan munculnya bunuh diri pada pasien tertentu. Antidepresan meningkatkan risiko pemikiran dan perilaku bunuh diri (suicidality) dalam studi jangka pendek pada anak-anak dan orang dewasa dengan gangguan depresi mayor dan gangguan kejiwaan lainnya.

Menurut (Depkes RI, 2007) dampak gangguan depresi bukan hanya mengimbas orang yang mengalaminya tetapi juga membuat dampak pada anggota keluarga dan lingkungan. Karena gangguan depresif, seseorang menjadi kehilangan minat, termasuk minat pada pemeliharaan diri sampai aktivitas pekerjaan. Dengan demikian akan membuat kerugian ekonomi di tempat kerja karena seseorang tak lagi dapat bekerja, sementara itu keluarga yang perlu merawatnya juga kehilangan waktu dan tenaga, serta terganggu aktivitas kesehariannya. Gangguan depresif yang serius akan merusak hubungan antar orang termasuk dalam keluarga. Dampaknya adalah : Mengganggu kehidupan sosial ekonomi, meningkatkan angka ketidakhadiran di sekolah dan tempat kerja sehingga produktivitas menurun. Menurut penelitian *National Institute of Mental Health* (NIMH), di Amerika kehilangan 44 juta dollar setahun karena gangguan depresif. Selain itu gangguan depresif juga mengganggu kehidupan berkeluarga serta dapat menimbulkan gangguan emosional yang hebat sehingga dapat mengancam keselamatan diri, orang lain, dan lingkungannya. Gangguan depresif merupakan kondisi psikologik yang berasal dari gangguan otak,

mengubah cara pikir dan perasaan, mengubah perilaku sosial, mengganggu rasa sehat pada fisik seseorang, seperti letih tanpa bekerja apapun atau hanya sedikit beraktivitas, malas bekerja ketika mengalami masalah serius, kehilangan minat apapun yang mendalam dan berlangsung lama, bermanifestasi sebagai gangguan fisik yang diwujudkan dalam bentuk kunjungan ke dokter yang selalu berganti-ganti (shopping doctor) Banyak penderita gangguan depresif tidak mendapatkan pengobatan tepat karena gejalanya tak dikenali sebagai gangguan depresif dan lebih banyak dianggap sebagai gangguan fisik sehingga diobati tanpa mempedulikan apa yang mendasarinya, penderita yang mengalami gangguan depresif karena hanya dianggap orang malas, lemah, dan manja sehingga tidak dibawa ke pelayanan kesehatan, adanya stigma dimasyarakat bahwa gangguan depresif adalah gangguan jiwa, penderita yang mengalami gangguan depresif tidak berdaya untuk mencapai layanan kesehatan dengan diagnosis tepat, hampir 80% yang diobati menunjukkan perbaikan suasana hati dan penyesuaian diri dengan situasi kehidupan.

C. Teori *Drug Related Problems* (DRPs)

Farmasi klinik adalah suatu keahlian profesional di bidang kesehatan yang bertanggung jawab atas keamanan, rasionalitas, dan penggunaan terapi obat oleh pasien melalui penerapan pengetahuan dan fungsi khusus. Sehingga farmasi klinik merupakan suatu disiplin ilmu tentang kesehatan dimana apoteker bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan tidak hanya memberikan pelayanan klinis kepada pasien tetapi juga bertujuan untuk mengoptimalkan terapi obat dan meningkatkan kesehatan serta pencegahan penyakit. (Rikomah, 2018).

Drug Related Problems (DRPs) atau dikenal dengan obat-obatan terkait masalah adalah peristiwa atau keadaan yang terkait dengan terapi obat yang berpotensi atau sebenarnya mempengaruhi hasil klinis pasien, di mana DRPs sebenarnya adalah masalah yang telah terjadi pada pasien dan apoteker harus berusaha mengatasinya. , sedangkan DRPs potensial adalah masalah yang mungkin terjadi dan risiko yang dapat berkembang pada pasien jika apoteker tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya. (Andayani *at al.*, 2020).

Untuk mengatasi masalah DRPs, klasifikasi DRPs telah dilakukan untuk digunakan dalam penelitian tentang sifat, prevalensi, dan kejadian DRPs dan juga sebagai indikator proses dalam penelitian eksperimental hasil pengobatan farmasi. Hal ini juga dimaksudkan untuk membantu para profesional perawatan kesehatan sehingga mereka dapat mendokumentasikan informasi DRPs dalam proses perawatan kefarmasian. Klasifikasi DRPs didasarkan pada apa yang terjadi di lapangan, tetapi berbeda dari sistem sebelumnya karena memisahkan masalah dari penyebabnya. (PCNE, 2017).

Definisi resmi PCNE-DRP berikut yang menjadi dasar klasifikasi DRPs adalah bahwa DRPs adalah peristiwa atau keadaan yang melibatkan terapi obat yang sebenarnya atau berpotensi mengganggu hasil terapi yang diinginkan. Adapun klasifikasi dasar, sekarang ada tiga domain utama untuk masalah, 8 domain utama untuk penyebab dan 5 domain utama untuk intervensi. (PCNE, 2017).

Tabel 1. Klasifikasi dasar DRPs oleh PCNE

	<i>Code</i>	Primary Domain
	<i>C8.01</i>	
<i>Problems</i> (Termasuk Potensial)	P1	Efektifitas Pengobatan
	P2	Keamanan Pengobatan
	P3	Lain-lain
<i>Causes</i> (Termasuk kemungkinan penyebab untuk <i>Problems</i> Potensial)	C1	Pemilihan Obat
	C2	Bentuk Sediaan
	C3	Pemilihan Dosis
	C4	Durasi Pengobatan
	C5	Dispensing
	C6	Proses Penggunaan Obat
	C7	Terkait dengan Pasien
	C8	Lain-lain
<i>Planned Intervention</i>	I0	Tidak ada intervensi
	I1	Pada tingkat peresepan
	I2	Pada tingkat pasien
	I3	Pada tingkat obat
	I4	Lain-lain
<i>Intervention acceptance</i>	A1	Intervensi diterima
	A2	Intervensi tidak diterima
	A3	Lainnya
<i>Status of DRPs</i>	O0	Status Masalah tidak diketahui
	O1	Masalah Terselesaikan
	O2	Masalah Sebagian Terselesaikan
	O3	Masalah Tidak Terselesaikan

Tabel 2. Klasifikasi domain problem

Domain Utama	Code V8.01	Problem
1. Efektifitas Pengobatan	P1.1	Tidak ada efek dari pengobatan / pengobatan gagal
	P1.2	Efek dari pengobatan tidak efektif
	P1.3	Indikasi yang tidak terobati
2. Keamanan Pengobatan	P2.1	Efek samping obat
3. Lainnya	P3.1	Masalah dengan efektivitas biaya pengobatan
	P3.2	Terapi pengobatan yang tidak dibutuhkan
	P3.3	Masalah tidak jelas, diperlukan klarifikasi lebih lanjut

Umumnya, masalah didefinisikan sebagai ‘peristiwa atau keadaan yang tidak diharapkan atau tidak terduga’ ada 3 domain utama dibagian masalah atau *problems*. Deskripsi berikut dapat membantu menemukan domain masalah yang tepat (PCNE, 2017).

Tabel 3. Deskripsi bagian *Problems*

Efek klinis dari perawatan tidak seperti yang diharapkan atau tidak ada pengobatan	Lihat P1
Pasien menderita efek samping pada dosis normal atau dari reaksi toksik	Lihat P2
Sepertinya tidak ada yang salah dalam perawatan, tetapi ada masalah lain.	Lihat P3

Tabel 4. Klasifikasi domain *causes*

Domain Utama	Code C8.01	Penyebab
1. Pemilihan Obat	C1.1	Ketidaksesuaian obat terhadap <i>guideline</i> atau formularium
	C1.2	Ketidaksesuaian obat (dengan <i>guideline</i> tetapi sebaliknya mengalami kontraindikasi)
	C1.3	Tidak ada indikasi untuk obat
	C1.4	Ketidaksesuaian kombinasi dari obat atau obat dengan pengobatan herbal
	C1.5	Ketidaksesuaian duplikasi dari kelompok terapi atau bahan aktif
	C1.6	Tidak ada pengobatan meskipun

		terdapat indikasi
	C1.7	Terlalu banyak obat yang diresepkan untuk indikasi
2. Bentuk Sediaan	C2.1	Ketidaksesuaian bentuk sediaan dengan pasien
3. Pemilihan Dosis	C3.1	Dosis terlalu rendah
	C3.2	Dosis terlalu tinggi
	C3.3	Regimen dosis tidak cukup banyak
	C3.4	Regimen dosis terlalu tinggi
	C3.5	Kesalahan waktu pemberian dosis, tidak jelas, atau terlupakan
4. Durasi Pengobatan	C4.1	Durasi pengobatan terlalu pendek
	C4.2	Durasi pengobatan terlalu panjang
5. Dispensing	C5.1	Pereseapan obat tidak tersedia
	C5.2	Informasi yang diperlukan tidak tersedia
	C5.3	Obat salah, kekuatan atau dosis yang disarankan (OTC)
	C5.4	Obat salah, dan kekuatan obat ditiadakan
6. Proses Penggunaan Obat	C6.1	Tidak tepat waktu pemberian obat dan / atau interval dosis
	C6.2	Obat kurang terawat
	C6.3	Pemberian obat berlebihan
	C6.4	Obat tidak diberikan samasekali
	C6.5	Pemberian obat yang salah
7. Hubungan dengan Pasien	C7.1	Pasien menggunakan / mengambil lebih sedikit obat daripada yang ditentukan atau tidak mengonsumsi obat sama sekali
	C7.2	Pasien menggunakan / mengambil lebih banyak obat daripada yang ditentukan
	C7.3	Penyalahgunaan obat pasien (penggunaan berlebihan yang tidak diatur)
	C7.4	Pasien menggunakan obat yang tidak perlu
	C7.5	Pasien mengambil makanan yang berinteraksi
	C7.6	Pasien menyimpan obat yang tidak tepat
	C7.7	Interval waktu atau interval yang tidak tepat
	C7.8	Pasien mengelola / menggunakan obat dengan cara yang salah
	C7.9	Pasien tidak dapat menggunakan obat / bentuk sesuai petunjuk
8. Lainnya	C8.1	Tidak ada atau pemantauan hasil yang tidak sesuai
	C8.2	Penyebab lainnya, yang lebih spesifik

Tabel 5. Klasifikasi *planned intervention*

Primary domain	Code V8.01	Intervensi
Tidak ada intervensi	I0.1	Tidak ada intervensi
1. Pada tingkat persepan	I1.1	Pembuat resep Hanya menginformasikan
	I1.2	Pembuat resep meminta informasi
	I1.3	Intervensi diusulkan kepada prescriber
	I1.4	Intervensi didiskusikan dengan prescriber
2. Pada tingkat pasien	I2.1	Konseling obat pasien
	I2.2	Hanya Informasi tertulis yang disediakan
	I2.3	Pasien dirujuk ke pembuat resep
	I2.4	Disampaikan kepada anggota keluarga atau pengasuh
3. pada tingkat obat	I3.1	Obat diganti menjadi
	I3.2	Dosis diganti menjadi ...
	I3.3	Formulasi diubah menjadi ...
	I3.4	Instruksi penggunaan diubah menjadi ...
	I3.5	Obat berhenti ...
	I3.6	Obat baru dimulai
4. Intervensi atau aktivitas lainnya	I4.1	Intervensi lain
	I4.2	Efek samping dilaporkan kepada pihak berwenang

Tabel 6. Klasifikasi *intervention acceptance*

Domain utama	Code V8.01	Penerapan
1. Intervensi diterima	A1.1	Intervensi diterima dan diterapkan sepenuhnya
	A1.2	Intervensi diterima, separuhnya diterapkan
	A1.3	Intervensi diterima tapi tidak diterapkan
	A1.4	Intervensi diterima, penerapan tidak diketahui
2. Intervensi tidak diterima	A2.1	Intervensi tidak diterima, tidak layak
	A2.2	Intervensi tidak diterima, tidak disetujui
	A2.3	Intervensi tidak diterima, alasan lainnya
	A2.4	Intervensi tidak diterima, alasan tidak diketahui
3. lainnya	A3.1	Intervensi diajukan, penerimaan tidak diketahui
	A3.2	Intervensi tidak diajukan

Tabel 7. Status *Drug Related Problems*

Domain utama	Code V8.01	Hasil intervensi
0. Tidak diketahui	O0.1	Status permasalahan tidak diketahui
1. terselesaikan	O1.1	<i>Problems</i> seluruhnya terselesaikan
2. separuhnya terselesaikan	O2.1	<i>Problems</i> sebagian terselesaikan
3. tidak terselesaikan	O3.1	Masalah tidak terpecahkan, kurangnya kerjasama pasien
	O3.2	Masalah tidak terpecahkan, kurangnya kerjasama prescriber
	O3.3	Masalah tidak terpecahkan, intervensi tidak efektif
	O3.4	Tidak perlu atau tidak ada kemungkinan untuk memecahkan masalah

D. Tinjauan keislaman

Depresi adalah gangguan mood yang ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan yang dapat mengganggu kondisi fisik dan kehidupan sosial (K. F. Putri & Tobing, 2020). Berdasarkan hal tersebut, depresi merupakan kondisi manusia yang selalu bersikap lemah dan pasrah meskipun Allah swt telah melarang seseorang untuk lemah dan sedih.

Hal tersebut telah dijelaskan dalam firmanNya QS Ali ‘Imran/3: 139

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”

Dalam tafsir Al-mishbah dijelaskan bahwa (jangan lemah), hadapi musuhmu dan musuh Allah swt, kuatkan badanmu (dan jangan) juga (kamu bersedih) karena apa yang kamu alami dalam perang Uhud, atau acara serupa lainnya, tetapi perkuat mentalitas Anda. Mengapa kamu lemah atau sedih, (padahal kamu adalah orang yang paling tinggi) derajatnya di sisi Allah di dunia ini dan di akhirat, di dunia ini karena

kamu mendapat surga. Mengapa kamu bersedih sementara orang-orang yang termasuk di antara kamu pergi ke surga dan yang terluka menerima pengampunan ilahi, ini (jika kamu orang beriman) yaitu, jika iman benar-benar kokoh di hatimu.

Selain menyuruh umat manusia untuk tidak depresi, Allah SWT telah memerintahkan umat manusia untuk mengikuti petunjuk-Nya agar terhindar dari depresi, seperti dalam firman-Nya QS. ayat Al 'Baqarah/2: 38

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya :

Kami berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga! Lalu, jika benar-benar datang petunjuk-Ku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjuk-Ku tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati."

Dalam tafsir Al-mishbah dijelaskan bahwa (nanti bila datang kepadamu wahai Adam dan istrimu serta anak cucumu) petunjuk yang datang dari-Ku, yaitu melalui penyampaian para nabi, baik wahyu kitab suci dan petunjuk dan atau teladan para nabi, atau hasil penalaran yang lurus, maka ikutilah petunjuk-Ku. Janganlah kamu mengikuti petunjuk-petunjuk yang bertentangan dengannya, karena (barang siapa mengikuti petunjuk-Ku maka tidak ada ketakutan yang akan menguasainya, dan tidak pula mereka bersedih hati). Ketakutan adalah kegelisahan tentang sesuatu yang negatif di masa depan, dan kesedihan adalah kecemasan tentang sesuatu yang negatif yang telah terjadi. Ya, mereka mungkin takut dari waktu ke waktu, tetapi ketakutan itu tidak mengalahkan kemampuan mereka untuk bertahan, juga tidak meliputi seluruh tubuh dan jiwa mereka. Begitu juga dengan kesedihan sebagai manusia pasti tidak luput dari kesedihan, tapi itu tidak akan berlanjut.

Selain dengan mengikuti petunjuknya , kita juga diberitahukan untuk selalu mengingat Allah s.w.t sebagaimana dalam Al-Quran surah Ar ‘Rad/13: 28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya :

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram”

Dalam tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram setelah sebelumnya bimbang dan ragu. Ketentraman itu yang bersemi di dada mereka disebabkan karena dzikrullah, yakni mengingat allah atau karena ayat-ayat allah yang sangat memesona kandungan dan artinya. Sungguh camkanlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal shaleh seperti yang keadaannyaitu yang tidak akan meminta bukti-bukti tambahan dan bagi mereka itulah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan bagi mereka juga tempat kembali yang baik, yaitu surga.

Adapun untuk manusia yang telah berada dalam situasi depresi yaitu mengalami tekanan baik itu tekanan dalam pekerjaan , konflik dengan orang lain dan masalah lainnya yang mengganggu pikiran Rasulullah saw telah menyampaikan kepada umatnya untuk selalu membaca doa berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَتِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

Artinya :

“ Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa susah dan duka, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat lemah dan malas, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan kikir, serta aku berlindung kepada-Mu dari utang yang tak terbayar dan dari belunggu orang lain“ (HR Abu Daud 4/353)



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental, menggunakan desain analisis deskriptif dan dilakukan secara retrospektif dengan data rekam medis pasien dengan teknik pengambilan sampel yaitu *simple random sampling*, dimana seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel dan dianalisis untuk *Drug Related Problems (DRP)*.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Apotek Karuna Medika dan Apotek fitrah pada bulan Mei - Juli 2021.

C. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai semua unsur atau unsur yang menjadi objek penelitian. Populasi adalah himpunan semua hal yang ingin diketahui (Masturoh & Anggita T, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita depresi. Menurut (Masturoh & Anggita T, 2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat-sifat yang dimiliki oleh populasi yang benar-benar dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Sampling adalah bagian dari proses pengambilan sampel dari populasi agar dapat mewakili populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* yaitu *simple random sampling*, adalah semua subjek atau rekam medik yang memenuhi kriteria inklusi dalam penelitian.

1. Kriteria inklusi
 - a. Pasien yang menggunakan obat antidepresan
 - b. Pasien yang menggunakan obat antidepresan dan kombinasikan dengan antipsikotik dan tercatat di rekam medik
2. Kriteria Eksklusi
 - a. Pasien yang memiliki rekam medik tidak lengkap

D. Variabel Penelitian

Variable penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Variabel bebas (variable *Independen*)

Variabel *independen* adalah variable yang mempengaruhi atau menyebabkan timbulnya variable *dependent* (*terikat*) (Sugiyono, 2009). Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah *Drug Related Problem*

2. Variable Terikat (Variabel *Dependent*)

Variable *Dependent* adalah variable yang yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variable *independen* (bebas). Variabel *dependent* (*terikat*) dalam penelitian ini adalah penggolongan karakteristik pasien depresi (Usia, jenis kelamin) dan profil penggunaan obat antidepresan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah rekam medik pasien depresi di apotek karuna medika dan apotek fitrah.

F. Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap :

1. Tahap awal

Pada tahap ini peneliti mengambil data responden dimulai dengan mengunjungi apotek dengan menyerahkan surat izin, kemudian peneliti menanyakan data pasien gangguan jiwa. Setelah data terpenuhi, peneliti kemudian membuat kontrak waktu dengan staf apotek untuk melakukan penelitian, yang sebelumnya peneliti telah menjelaskan kepada staf apotek alur penelitian dan instrumen yang akan digunakan.

2. Tahap pelaksanaan

Pada penelitian ini dilakukan penelusuran terhadap data pasien pengguna obat antidepresan di apotek Karuna Medika dan apotek fitrah. Proses seleksi didasarkan pada pasien yang masuk kriteria inklusi dan mencatat data rekam medis di ruang administrasi berupa identitas pasien (nama, jenis kelamin, usia) mendiagnosis penyakit, riwayat penyakit, dan data penggunaan obat.

Implementasi data rekam medis dan pola terapi pengobatan antidepresan dilanjutkan dengan transkripsi data yang dikumpulkan dalam logbook dan komputer. Pemrosesan data dilakukan dalam tahapan berikut:

a. *Editing*

Hal ini dilakukan dengan cara meneliti data mentah, tetapi terlebih dahulu memeriksa kebenaran data yang diperoleh dan membuang data yang tidak memenuhi kriteria penelitian.

b. *Coding*

Dengan pengkodean untuk memudahkan peneliti memasukkan data yang diperoleh dari laboratorium dan rekam medis.

c. *Entry data*

Setelah coding, data dimasukkan ke dalam program Microsoft Excel dalam bentuk tabel.

d. *Cleaning Data*

Dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dimasukkan ke dalam sistem komputer untuk menghindari ketidaklengkapan atau kesalahan data.

3. Tahap analisis data

Analisis data dilakukan berdasarkan data yang didapat dari rekam medik pasien depresi. Data mengenai pola penggunaan obat antidepresan terkait dengan jenis kelamin, usia, pola penggunaan obat serta analisis *Drug Related Problem* (DRPs) di sajikan dalam bentuk tabel dan deskriptif.

Analisis data yang dilakukan dengan *microsoft excel 2019* dan program SPSS (*Statistic Packages for Social Sciences*) versi 26 dan akan di analisis secara bivariat dengan analisis uji *chi-square* untuk mengetahui hubungan antara dua variabel.

Adapun pengolahan data dengan analisis bivariat adalah karakteristik pasien berupa jenis kelamin dan usia terhadap *Drug Related Problem* (DRPs)

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Rekam Medik Kesehatan di apotek karuna medika dan apotek fitrah. Data Pasien depresi yang memenuhi kriteria inklusi penelitian dari sampel didapat yaitu 40 pasien

1. Karakteristik pasien

Tabel 8 Karakteristik Pasien

No	Karakteristik pasien				
1	Jenis kelamin	Laki-laki		Perempuan	
		35%		65%	
2	Usia	25-34 tahun	35-44 tahun	45-54 tahun	55-64 tahun
		17,50%	32,50%	35%	15%

Analisis karakteristik dasar pasien untuk jenis kelamin dilakukan untuk mengetahui presentasi angka kejadian pasien depresi pada laki-laki dan perempuan, dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pasien untuk klasifikasi pasien depresi berdasarkan dari jenis kelamin yang paling banyak terjadi yaitu pada perempuan dengan presentase 65% (n=26) pasien dan presentase penderita depresi pada laki-laki sebanyak 35% (n=14) pasien.

Karakteristik pasien berdasarkan usia , dapat dilihat bahwa untuk penderita pasien depresi yang paling banyak yaitu kelompok usia 45-54 tahun yaitu 35% (n=14) pasien. Kemudian kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 32.5% (n=13) pasien. Untuk kelompok usia 25-34 tahun sebanyak 17.5% (n=7) pasien dan pada kelompok usia 55-64 tahun sebanyak 15% (n=6) pasien.

2. Pola penggunaan obat

Penggunaan obat antidepresan yang digunakan di apotek karuna medika dan apotek fitrah yaitu penggunaan obat antidepresan tunggal dan penggunaan obat lainnya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Penggunaan obat antidepresan dan obat lainnya

No	Golongan	Nama obat	Jumlah pasien $\sum n = 40$	Presentase
1	SSRI (<i>Selective serotonin Reuptake inhibitor</i>)	Fluoxetine	23	57,5%
		Sertraline	5	12,5%
		Escitalopram	3	7,5%
2	TCA (<i>Tricylic Antidepresan</i>)	Amitriptyline	2	5%
3	<i>Tetracylic Antidepresan</i>	Mirtazapine	7	17,5%
Penggunaan obat lainnya				
No	Golongan	Nama obat	Frekuensi	Presentase
1	Benzodiazepine	Clobazam	22	55%
		Diazepam	2	5%
		Lorazepam	19	47,5%
		Alprazolam	17	42,5%
		Clonazepam	4	10%
		Zolpidem tartrate	3	7,5%
2	Antipsikotik	Estazolam	1	2,5%
		Olanzapine	5	12,5%
		Aripiprazole	6	15%
		Quetiapine	10	25%
		Clozapine	3	7,5%
		Haloperidol	24	60%
3	Antihipertensi	Sulpiride	6	15%
		Propranolol	9	22,5%
4	Obat maag	Flunarizine	1	2,5%
		Lansoprazole	11	27,5%
		Ranitidine	3	7,5%
		Sukralfat	5	12,5%
		Strocain	1	2,5%
		Nevradin	1	2,5%
		Neurodex	1	2,5%
		Benovit c	1	2,5%
Becom Z	1	2,5%		
5	Suplemen	Coxavit	1	2,5%
		Proimbost	1	2,5%

		Mecola	1	2,5%
		Zink plus	3	7,5%
		Folac	1	2,5%
		Astatin	2	5%
6	Obat asam urat	Allopurinol	1	2,5%
7	Obat kolestrol	Simvastatin	1	2,5%
8	Obat lainnya	Arkine	27	67,5%
		Kaditic	3	7,5%
		Xiety	4	10%
		Eperisone hcl	1	2,5%

Berdasarkan data pada tabel 9, dapat dilihat bahwa pasien yang mendapat terapi obat antidepresan dengan golongan SSRI (*Selective Serotonin Reuptake Inhibitor*) terdapat tiga jenis obat yang digunakan yaitu obat fluoxetine sebanyak 23 pasien (57,5%), kemudian sertraline 5 pasien (12,5%), dan obat escitalopram dengan jumlah pasien 3 orang (7,5%).

Kemudian, untuk antidepresan golongan *tricyclic antidepresan* jenis obat yang digunakan yaitu amitriptyline dengan jumlah pasien 2 orang persentasenya 5%. Selanjutnya untuk golongan *tetracyclic antidepresan* jenis obat yang digunakan yaitu mirtazapine sebanyak 7 pasien (17,5%).

Pada tabel 9, untuk penggunaan obat lainnya Obat antipsikotik yang paling banyak digunakan adalah haloperidol dengan jumlah pasien sebanyak 24 orang (60%). Adapun antipsikotik lain, untuk quetiapine sebanyak 10 orang (25%), aripiprazole dan sulpiride 6 orang (15%), olanzepine 5 orang (12,5%) dan clozapine 3 orang (7,5%).

Selain antipsikotik, pasien juga menggunakan obat golongan benzodiazepine dengan obat yang paling banyak digunakan yaitu clobazam 22 pasien (55%), lorazepam 19 pasien (47,5%) dan alprazolam 17 pasien (42,5%). Golongan benzodiazepine adalah obat yang paling sering diresepkan untuk menghilangkan

gejala kesemasan dengan cepat, dimana semua golongan benzodiazepine merupakan ansiolitik yang sama efektifnya, dan pertimbangan sifat farmakokinetik dan situasi klinis pasien akan membantu dalam pemilihan obat yang paling sesuai (Dipiro *et al.*, 2020).

Obat lainnya dengan penggunaan paling banyak yaitu arkine 27 pasien (67,5%). Arkine mengandung zat aktif trihexyphenidyl HCL yang bekerja dengan cara mengurangi efek kolinergik sentral akibat dari kekurangan dopamine (BNF, 2020). Penggunaan arkine pada pasien bertujuan untuk mengurangi efek samping ekstrapiramidal akibat dari penggunaan antipsikotik (Nugroho, 2012). Selain itu obat yang digunakan pasien berupa vitamin dan suplemen untuk meringankan gejala dan sebagai antioksidan serta adanya terapi obat di beberapa pasien seperti alopurinol untuk mengatasi asam urat dan simvastatin untuk terapi kolestrol pada pasien.

3. Analisis Drug Related Problems (DRPs)

Pada analisa *Drug Related Problems* (DRPs) yang dilakukan berdasarkan berdasarkan *Pharmaceutical Care Network Europe* (PCNE) V8.01 kejadian *Drug Related Problems* dari penggunaan obat antidepresan pada pasien depresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah DRPs yang ditemukan adalah 8 pasien, yaitu ditemukan dosis yang subterapeutik dengan 20% (n=8) pasien yaitu pada domain C3.1.

Tabel 10 Data Evaluasi DRPs

No	Nama	C1.1	C1.2	C1.3	C1.4	C1.5	C1.6	C1.7	C2.1	C3.1	C3.2	C3.3	C3.4	C3.5
1	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	W	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
24	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
26	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
27	Aa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Bb	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
29	Cc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dd	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
31	Ee	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
32	Ff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Gg	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
34	Hh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Ii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Ll	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
39	Mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Nn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ket : Terjadi DRPs (+), tidak terjadi DRPs (-)

1. C1.1 : obat tidak sesuai dengan pedoman dan formula
2. C1.2 : obat sesuai dengan pedoman tapi di kontraindikasikan
3. C1.3 : tidak ada indikasi obat
4. C1.4 : kombinasi yang tidak sesuai antar obat
5. C1.5 : penggandaan zat aktif obat yang tidak tepat
6. C1.6 : tidak ada pengobatan obat meskipun ada indikasi
7. C1.7 : terlalu banyak obat yang diresepkan untuk indikasi
8. C2.1 : bentuk obat yang tidak sesuai (untuk pasien)
9. C3.1 : dosis obat terlalu rendah
10. C3.2 : dosis obat terlalu tinggi
11. C3.3 : regemin dosis tidak cukup sering
12. C3.4 : regimen dosis terlalu sering
13. C3.5 : intruksi pengaturan dosis salah, tidak jelas, atau tidak ada

4. Hasil Analisis Bivariat

a. Analisis Hubungan Antara Jenis kelamin dan DRPs

Berdasarkan analisis data jenis kelamin pasien dengan DRPs menggunakan uji analisis korelasi rank pearson dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 11 Hasil Analisis Hubungan Antara Jenis Kelamin dan DRPs

→ Correlations

[DataSet1] D:\Farmasi\SKRIPSI\syarat hasil\data analisis

		Jenis Kelamin	Kejadian DRPs
Jenis Kelamin	Pearson Correlation	1	.157
	Sig. (2-tailed)		.333
	N	40	40
Kejadian DRPs	Pearson Correlation	.157	1
	Sig. (2-tailed)	.333	
	N	40	40

Dari tabel 11 dapat dilihat bahwa pengaruh jenis kelamin terhadap DRPs dengan menggunakan metode uji analisis korelasi perason didapatkan hasil untuk signifikansi hubungan yaitu $0,333 < \text{lebih kecil dari } 0,05$ maka artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel jenis kelamin dan kejadian DRP. Sehingga, jika melihat tingkat kekuatan (keeratan) hubungan hanya diperoleh angka 0,157 yang berada pada *range* 0,00 – 0,20 yang artinya tingkat korelasinya berada dalam kategori tidak ada korelasi

b. Analisis Hubungan antara Usia dan DRPs

Berdasarkan analisis antara kelompok usia dengan DRPs menggunakan uji pearson dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12 Hasil Analisis Hubungan Antara Usia dan DRPs

→ **Correlations**

		Kelompok Usia	Kejadian DRPs
Kelompok Usia	Pearson Correlation	1	.119
	Sig. (2-tailed)		.466
	N	40	40
Kejadian DRPs	Pearson Correlation	.119	1
	Sig. (2-tailed)	.466	
	N	40	40

Dari tabel 12 dapat dilihat bahwa pengaruh usia terhadap DRPs dengan menggunakan metode uji analisis korelasi pearson didapatkan hasil untuk signifikansi hubungan yaitu $0,466 < \text{lebih kecil dari } 0,05$ maka artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel usia dan kejadian DRP. Sehingga, jika melihat tingkat kekuatan (keeratan) hubungan hanya diperoleh angka $0,119$ yang berada pada *range* $0,00 - 0,20$ yang artinya tingkat korelasinya berada dalam kategori tidak ada korelasi

B. Pembahasan

1. Karakteristik pasien depresi

Sampel yang didapatkan pada evaluasi DRPs dari penggunaan antidepresan di apotek karuna medika dan apotek fitrah yang memenuhi kriteria inklusi adalah 40 pasien.

Distribusi pasien depresi tersebut berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah terbanyak pada perempuan yaitu 65% ($n=26$) pasien. Kemudian laki-laki sebanyak 35% ($n=14$) pasien. Hal tersebut sesuai dengan (Depkes RI, 2007) perempuan mempunyai kecenderungan mengalami gangguan depresif daripada laki-laki

dikarenakan masalah hormonal, dampak melahirkan, stressor dan pola perilaku yang dipelajari.

Distribusi pasien depresi jika berdasarkan usia yang paling banyak ialah pada usia 45-54 tahun yaitu 35% (n=14) pasien. Kemudian kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 32,5% (n=13) pasien. Untuk kelompok usia 25-34 tahun sebanyak 17,5% (n=7) pasien. Dan pada kelompok usia 55-64 tahun sebanyak 15% (n=6) pasien. Hal tersebut selaras dengan (Kemenkes RI, 2019) melalui hasil riset kesehatan dasar bahwa gangguan depresi dapat dialami oleh semua kelompok usia dan gangguan tersebut sudah mulai terjadi sejak rentang usia remaja 15-24 tahun, dengan prevalensi 6,2% dan prevensi semakin meningkat seiring seiring dengan meningkatnya usia dan yang tertinggi pada usia 75+ tahun (8,9%), 65-74 tahun (8%) dan usia 55-64 tahun dengan prevensi 6,5%.

2. Pola penggunaan obat antidepresan

Penggunaan obat antidepresan yang digunakan di apotek karuna medika dan apotek fitrah yang dengan menggunakan obat antidepresan tunggal dengan tiga golongan obat yaitu *Selective Serotonin Reuptake Inhibitor* (SSRI), *Tricyclic Antidepresan* (TCA), dan *Tetracyclic antidepresan*. Adapun SSRI yang digunakan yaitu tiga jenis obat yaitu fluoxetine, sertraline, dan escitalopram. Adapun TCA dengan obat amitriptyline dan *Tetracyclic Antidepresan* dengan obat mirtazapine. Adapun golongan obat yang paling banyak digunakan yaitu SSRI dengan fluoxetine sebanyak 23 pasien (57,5%), kemudian sertraline 5 pasien (12,5%), dan obat escitalopram dngan jumlah pasien 3 orang (7,5%). Obat golongan SSRI merupakan golongan obat yang secara kimiawi beragam dengan efek primer menghambat pengangkut serotonin (serotonin transporter) (Katzung et al., 2013). Umumnya SSRI

dipilih sebagai antidepresan lini pertama karena keamanan relatif dalam overdosis dan juga lebih toleran dibandingkan generasi sebelumnya (Dipiro et al., 2017)

Kemudian untuk antidepresan golongan *tricyclic antidepresan* jenis obat yang digunakan yaitu amitriptyline dengan jumlah pasien 2 orang (5%) dan untuk golongan *tetracyclic antidepresan* jenis obat yang digunakan yaitu mirtazapine sebanyak 7 pasien (17,5%). Antidepresan lain telah dipelajari dalam uji coba terkontrol dengan mirtazapine di anggap sebagai agen lini kedua dalam pengobatan antidepresan dan juga penggunaan TCA amitriptyline dan imipramine juga dianggap sebagai agen line kedua terapi depresi (Dipiro et al., 2020). Pada pasien dengan keluhan insomnia untuk menghindari perburukan gejala mirtazapine dan amitriptyline menjadi pilihan karena efek samping dari kedua obat tersebut tidak menimbulkan terjadinya insomnia (Alldredge *et al.*, 2013)

Selain obat antidepresan pasien juga menggunakan obat-obat lainnya dalam proses pengobatannya. Obat antipsikotik yang paling banyak digunakan adalah haloperidol dengan jumlah pasien sebanyak 24 orang (60%). Adapun antipsikotik lain, untuk quetiapine sebanyak 10 orang (25%), aripiprazole dan sulpiride 6 orang (15%), olanzepine 5 orang (12,5%) dan clozapine 3 orang (7,5%). Pada gangguan depresi dengan gejala psikotik (Alldredge *et al.*, 2013) kombinasi antara antipsikotik dan antidepresan telah terbukti lebih unggul daripada salah satu komponen saja dalam depresi psikotik.

Selain antipsikotik, pada pasien penderita depresi juga diberikan pengobatan untuk meredakan kecemasan yang dialaminya. Penggunaan obat anticemas yang digunakan yaitu golongan benzodiazepine dengan obat yang paling banyak digunakan yaitu clobazam 22 pasien (55%), lorazepam 19 pasien (47,5%) dan

alprazolam 17 pasien (42,5%). Golongan benzodiazepine adalah obat yang paling sering diresepkan untuk menghilangkan gejala kesemasan dengan cepat, dimana semua golongan benzodiazepine merupakan ansiolitik yang sama efektifnya, dan pertimbangan sifat farmakokinetik dan situasi klinis pasien akan membantu dalam pemilihan obat yang paling sesuai (Dipiro *et al.*, 2020).

Obat lainnya dengan penggunaan paling banyak yaitu arkiner 27 pasien (67,5%). Arkiner mengandung zat aktif trihexyphenidyl HCL yang bekerja dengan cara mengurangi efek kolinergik sentral akibat dari kekurangan dopamine (BNF, 2020). Penggunaan arkiner pada pasien bertujuan untuk mengurangi efek samping ekstrapiramidal akibat dari penggunaan antipsikotik (Nugroho, 2012). Selain itu obat yang digunakan pasien berupa vitamin dan suplemen untuk meringankan gejala dan sebagai antioksidan serta adanya terapi obat di beberapa pasien seperti alopurinol untuk mengatasi asam urat dan simvastatin untuk terapi kolestrol pada pasien.

3. *Drug Related Problems* (DRPs) pasien depresi

Drug related Problem (DRPs) dilakukan menggunakan instrumen *Pharmaceutical Care Network Europe* (PCNE) V8.01 dan ditemukan pada pasien depresi yaitu adanya dosis yang subterapeutik. DRPs yang telah teridentifikasi tentu akan memberikan beberapa dampak bagi pasien. Pada kejadian dosis subterapeutik, untuk kebanyakan obat tidak mungkin dosis subterapeutik menimbulkan efek toksik tetapi dosis yang terlalu rendah akan memberikan akibat tidak tercapainya konsentrasi minimum obat di dalam serum darah untuk menimbulkan sebuah efek terapi yang diinginkan dari obat tersebut. Pada pasien dengan depresi yang diteliti terdapat DRPs pada domain C3.1 yaitu dosis subterapeutik. Sebanyak 8 pasien yang menggunakan obat antidepresan dengan dosis subterapeutik dimana dosis terpaetik

itu adalah dosis mirtazapine 5 mg sekali sehari serta dua kali sehari dan dosis sertraline 5 mg sekali sehari. Berdasarkan (BNF, 2021) dosis yang digunakan untuk mirtazapine yaitu 15-30 mg sehari untuk waktu 2-4 minggu yang diminum sebelum tidur dan kemudian disesuaikan dengan respon pasien hingga 45 mg sekali sehari. Adapun untuk sertraline berdasarkan (BNF, 2021) dosis yang digunakan yaitu 25-50 mg sehari sekali dengan maksimum dosis per hari 200 mg. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktaverinda, 2016) yang melakukan analisis DRPs pada pasien depresi dengan hasil yang menunjukkan bahwa pasien depresi yang teridentifikasi mengalami DRPs salah satunya terkait dengan dosis subterapeutik dengan presentasi (17,24%) dan juga penelitian yang dilakukan oleh (Septyarini et al., 2020) dengan mengevaluasi ketepatan dosis obat pasien depresi rawat jalan mendapatkan hasil bahwa masih terdapat pemberian dosis obat pada penderita gangguan depresi tidak tepat dosis sehingga perlu adanya pemantaun lebih teliti dalam pemberian dosis obat pada pasien penderita gangguan depresi.

Pada penelitian ini peneliti hanya mengamati beberapa kategori DRP saja, meliputi dosis subterapeutik, overdosis, dan interaksi obat antidepresan. Sedangkan kategori DRP yang lain tidak dapat diamati karena adanya keterbatasan dalam penelitian, yaitu penelitian hanya dilakukan dalam metode retrospektif yang mengakibatkan tidak dapat mengamati pasien secara langsung karena hanya mengamati pencacatan medis saja. Kemudian untuk indikasi yang tidak diterapi dan penggunaan obat tanpa indikasi juga tidak dapat diamati jika hanya rekam medik, melainkan perlu adanya observasi langsung kepada pasien.

Drug Related Problem (DRPs) dari penelitian yang telah dilakukan menggambarkan bahwa masih terdapat ketidaktepatan dosis yang digunakan yaitu pada dosis subterapeutik.

4. Analisis Bivariat

Penelitian dengan jenis analisis bivariat dilakukan untuk melihat hasil analisa data *non-parametric test* salah satunya dengan menggunakan uji analisis korelasi rank spearman untuk melihat signifikansi hubungan apakah nilai signifikansi hubungan $> 0,05$ atau nilai signifikansi $< 0,05$. Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antar dua variabel (jenis kelamin dan usia) terhadap DRPs. Jika nilai signifikansi hubungan $< 0,05$ maka uji dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu, uji ini juga melihat tingkat kekuatan hubungan jika nilainya 0,00-0,20 maka tidak ada korelasi, jika nilainya 0,21-0,40 korelasi lemah, jika nilai 0,41-0,60 korelasi sedang, jika nilai 0,61-0,80 korelasi kuat, dan jika nilainya 1 maka korelasi sempurna.

Dari semua hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap DRPs dengan menggunakan uji analisis korelasi rank spearman secara keseluruhan didapatkan bahwa nilai signifikansi hubungan $> 0,05$ dan nilai tingkat kekuatan hubungan berada pada nilai 0,00-0,20 yang berarti tidak ada korelasi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan dan juga memiliki tingkat korelasi yang sangat lemah antara variabel bebas (usia dan jenis kelamin) terhadap variabel terikat (DRPs).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di apotek karuna medika dan apotek fitrah berdasarkan dari data rekam medik pasien dapat disimpulkan bahwa karakteristik pasien berdasarkan jenis kelamin yang terbanyak adalah perempuan 26 pasien (65%) dan laki – laki 14 pasien (35%). Karakteristik berdasarkan usia yang paling banyak yaitu pada kelompok usia 45—54 tahun yaitu 14 pasien (35%) dan kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 13 pasien (32,5%). Adapun untuk kejadian DRPs yang ditemukan pada pasien depresi yaitu pada DRPs kategori C3.1 (dosis subterapeutik) yaitu sebanyak 8 pasien (20%)

B. Saran

1. Sebaiknya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pemberian regimen dosis secara sistematis dan dilaksanakan secara teratur untuk mengatasi DRPs yang terjadi.
2. Sebaiknya dilakukan pendataan data rekam medik yang lebih jelas utamanya pada kartu control yang dapat menimbulkan kekeliruan membaca data rekam medik pasien
3. Sebaiknya dilakukan penelitian dengan topik yang sama namun bersifat prospektif
4. Sebaiknya kolaborasi antar tenaga kesehatan perlu ditingkatkan demi tercapainya kualitas pelayanan kefarmasian dan pengobatan yang lebih baik sehingga didapatkan terapi yang tepat, efektif, dan aman.

KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan terjemahnya.

Ah yusuf, Rizky fitrysari PK, H. endang nihayati. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Salemba Medika.

Allredge, B. K. et al., (2013). *Koda-kimble & Young's Applied Therapeutics The Clinical Use of Drugs*. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Alves, L., Marques, M., Fernandes Galduróz, J. C., Fernandes, M. R., Beijo, L. A., & Noto, A. R. (2014). *Drug-Related Problems, Drug-Related Negative Clinical outcomes and Pharmacist Interventions in Outpatients with Depressive disorder*. *J. Sci. Res. Phar. Journal of Scientific Research in Pharmacy*, 2014(31), 26–30. www.jsrponline.com

Andayani, Tri murti., Rahmawati, fita., Rokhman., Sampurno., Mayasari, gita., Nurcahya., Arini, yovita dwi., Arfania, maya., Afriani, debi., Octasari, paulina maya., Dwiningrum, Arissa., Irnayati., & Intiyani, rafila. (2020). *Drug Related Problems-identifikasi faktor resiko dan pencegahannya*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press

BNF. (2021). *British National Formulary 79th edition*. London. BMJ Group and Pharmaceutical Press

Depkes RI. (2007). *Pharmaceutical Care Untuk Penderita Gangguan Depresif*. In *Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan*.

Dipiro, Joseph T., Dipiro, Cecily V., Wells, Barbara G., Schwinghammer, Terry L. (2017). *Pharmacotherapy Handbook 10th edition*. USA. McGraw-Hill Education.

Dipiro, Joseph T., Yee, Gary C., Posey, Michael L., Haines, Stuart T., Nolin, Thomas D., & Ellingrod. (2020). *Pharmacotherapy : A Pathophysiologic Approach*. USA. McGraw Hill

Dirgayunita, A. (2016). *Depresi: Ciri, Penyebab dan Penangannya*. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.33367/psi.v1i1.235>

Ikawati, Z. dan Anurogo, D. (2018). *Tata Laksana Terapi Penyakit Sistem Syaraf usat*. Yogyakarta: Bursa Ilmu

Kemenkes RI. (2019). *Situasi Kesehatan Jiwa DI Indonesia*. In *InfoDATIN* (p. 12).

Kemenkes RI (2016). *Peran Keluarga Dukung Kesehatan Jiwa Masyarakat*. Kemenkes

Masturoh, I., & Anggita T, N. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (ke 1). pusat pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

Nagappa, A., Verupaksha, D., Balkrishnan, R., Bhandary, P., Lalwani, T., & Mateti,

- U. (2015). *Assessment of drug-related problems in depressive patients. Perspectives in Clinical Research*, 6(1), 58. <https://doi.org/10.4103/2229-3485.148820>
- Ningtyas, R. A., Puspitasari, M. I., & Sinuraya, K. A. (2016). *Review Artikel : Farmakoterapi Depresi Dan Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Efikasi Antidepresan. Farmaka*, 16(2), 186–201. <http://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/17530/pdf>
- Nugroho, Agung Endro. (2012). *Farmakologi: Obat-Obat Penting dalam Pembelajaran Ilmu Farmasi dan Dunia Kesehatan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Nuryati, S. Far., MPH, and dr Lily Kresnowati, M. S. (2018). *Klasifikasi dan Kodefikasi Penyakit dan Masalah terkait III Anatomi, Fisiologi, Patologi, Terminologi Medis dan Tindakan pada Sistem Panca Indra, Syaraf, dan Mental (Bangun Asmo Darmanto (ed.); cetakan pe)*. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Oktaverinda, D. (2016). *Analisis Drug Related Problem (DRPs) Pada Pasien Depresi "Lansia" yang Menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 5(1), 1–17.
- Palupi, P. D., Novembrina, M., Semarang, A. G., & Java, C. (2011). *Gejala Depresi Di Rsjd Amino Gondohutomo Semarang (Evaluation of Antidepressan Therapy in Patients With Depression Symptoms in Rsjd Amino Gondohutomo Semarang). 12(2)*.
- Pharmaceutical Care Network Europe Foundation. (2017). *Classification for Drug related problems V 8.01. PCNE Classification*, 1–10. https://www.pcne.org/upload/files/215_PCNE_classification_V8-01.pdf
- Putri, A. W., Wibhawa, B., & Gutama, A. S. (2015). *Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, Dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental). Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 252–258. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13535>
- Putri, K. F., & Tobing, D. L. (2020). *Tingkat Resiliensi dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja. Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 10(01), 1–6. <https://doi.org/10.33221/jiiki.v10i01.392>
- Rikomah, Setya Enti. (2018). *Farmasi Klinik*. Yogyakarta. Deepublish.
- Septyarini, D., Muthoharoh, A., Permadi, Y. W., & Ningrum, W. A. (2020). *Evaluasi ketepatan dosis obat pasien depresi rawat jalan di rsud kraton kabupaten pekalongan. Health Sciences and Pharmacy Journal*, 35, 1–10.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta. Lentera Hati.
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- World Health Organization (2017). *Mental disorders fact sheets*. World Health Organization. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/> -

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Meneliti.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar Telepon (01411) 868720 Faksimil (0411) 864923
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa Telepon 1500363 (0411) 841879 Faksimil (0411) 8221400
Email: fak@uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-2017 / Un.06/FKIK/PP.00.9/06/ 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Gowa, 3 Juni 2021

Kepada Yth :
Apoteker Penanggung jawab Apotik Fitrah
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Anas Faturahman Putra
N I M : 70100117033
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Farmasi
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN. Adipatih Residence

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Perbandingan Efektivitas Konseling Farmasi Secara Daring dan Luring Terhadap Kepatuhan Minum Obat Pasien Depresi di Apotik Karuna Medika dan Apotik Fitrah".

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Apt. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc
2. Apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Si

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Apotik Fitrah, waktu penelitian ± 1 bulan (Juni-Juli 2021)

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,


Byatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa

Lampiran 2. Kode Etik Penelitian

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

No.A.049/KEPK/FKIK/VI/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : anas faturrahman putra
 Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin makassar
 Name of the Institution

Dengan judul:
 Title

"Perbandingan Efektivitas Konseling Farmasi Secara Daring Dan Luring Terhadap Kepatuhan Minum Obat Pasien Depresi Di Apotik Karuna Medika Dan Apotik Fitrah"

"Comparison of the effectiveness of online pharmacy counseling and offline pharmacy counseling on adherence to taking medication for depression patients at Karuna Medika and Fitrah pharmacies"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfilment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022.

This declaration of ethics applies during the period June 02, 2021 until June 02, 2022.

02 June 2021
 Ketua and Chairperson,

 Dr. H. Syatirah Sp.A., M.Kes



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

No : A.065/KEPK/FKIK/VIII/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : Annas Faturrahman
 Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Name of the Institution

Dengan judul:
 Title

"Analisis Drug related Problem (DRPs) dari penggunaan antidepresan pada pasien depresi di apotek karuna medika dan apotek fitrah"

"Analysis of drug related problem (DRPs) of use antidepressant in depressed patients at karuna medika pharmacy and fitrah pharmacy"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022

This declaration of ethics applies during the period August 18, 2021 until August 18, 2022

August 18, 2021

Professor and Chairperson,

DR=Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 3. Surat Keterangan Hasil Penelitian.

 **APOTEK KARUNA MEDIKA**
Jl. Poros pallangga No.12,Bontoala, Kec. Palangga, Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan


SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Nomor B-2017/ Un.06/FKIK/PP.00.9/06/2021, perihal permohonan izin penelitian. Maka apoteker penanggung jawab Apotek dengan ini menerangkan nama dibawah ini:

Nama : Anas Faturrahman Putra
Nim : 70100117033
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Benar telah melakukan penelitian di Apotek Karuna Medika guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Drug Related Problem (DRPs) penggunaan Antidepresan Pada Pasien Depresi**".

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, juli 2021
Apoteker penanggung jawab

Apt. Fanny Fadillah Alfarid, S. Farm



Apotek Fitrah

(CV FITRAH)

Jl. Mangrove No. 25 Makassar Tlp / Fax : 0411-836637
Email : apotekfitrah@351@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Nomor B-2017/Un.06/FKIK/PP.00.9/06/2021, perihal permohonan izin penelitian. Maka Apoteker Penanggungjawab Apotek dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anas faturrahman putra

Nim : 70100117033

Jurusan : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan ilmu kesehatan

BENAR telah melakukan penelitian di Apotek Fitrah guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Drug Related Problem (DRPs) Penggunaan Antidepresan Pada Pasien Depresi**".

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Juli 2021

Apoteker Penanggungjawab

apt. Ilham Aridani, S.Farm

Lampiran 4. Data Karakteristik Pasien

No	Nama	Usia	Jenis kelamin
1	A	38 tahun	P
2	B	34 tahun	L
3	C	34 tahun	P
4	D	30 tahun	P
5	E	52 tahun	P
6	F	52 tahun	P
7	G	41 tahun	L
8	H	44 tahun	P
9	I	30 tahun	P
10	J	41 tahun	L
11	K	41 tahun	P
12	L	27 tahun	P
13	M	27 tahun	P
14	N	58 tahun	L
15	O	47 tahun	P
16	P	62 tahun	P
17	Q	50 tahun	P
18	R	57 tahun	P
19	S	48 tahun	P
20	T	51 tahun	L
21	U	58 tahun	P
22	V	62 tahun	P
23	W	41 tahun	L
24	X	40 tahun	P
25	Y	45 tahun	P
26	Z	42 tahun	L
27	Aa	57 tahun	P
28	Bb	46 tahun	P
29	Cc	45 tahun	L
30	Dd	39 tahun	L
31	Ee	47 tahun	P
32	Ff	42 tahun	L
33	Gg	40 tahun	P
34	Hh	35 tahun	L
35	Ii	42 tahun	P
36	Jj	46 tahun	P
37	Kk	53 tahun	P
38	Ll	27 tahun	L
39	Mm	50 tahun	L
40	Nn	47 tahun	L

Lampiran 5. Interaksi DRPs Pasien Depresi

No	Nama	C1.1	C1.2	C1.3	C1.4	C1.5	C1.6	C1.7	C2.1	C3.1	C3.2	C3.3	C3.4	C3.5
1	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	W	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
24	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
26	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
27	Aa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Bb	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
29	Cc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dd	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
31	Ee	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
33	Gg	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
34	Hh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Ii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Jj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Ll	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
39	Mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Nn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ket :

- C1.1 : obat tidak sesuai dengan pedoman dan formula
 C1.2 : obat sesuai dengan pedoman tapi di kontraindikasikan
 C1.3 : tidak ada indikasi obat
 C1.4 : kombinasi yang tidak sesuai antar obat
 C1.5 : penggandaan zat aktif obat yang tidak tepat
 C1.6 : tidak ada pengobatan obat meskipun ada indikasi
 C1.7 : terlalu banyak obat yang diresepkan untuk indikasi
 C2.1 : bentuk obat yang tidak sesuai (untuk pasien)
 C3.1 : dosis obat terlalu rendah
 C3.2 : dosis obat terlalu tinggi
 C3.3 : regimen dosis tidak cukup sering
 C3.4 : regimen dosis terlalu sering
 C3.5 : intruksi pengaturan dosis salah, tidak jelas, atau tidak ada.
 + : terdapat kejadian DRPs
 - : tidak terdapat kejadian DRPs

Lampiran 6. Karakteristik Pengobatan

No	Nama	Golongan obat	Frekuensi penggunaan	dosis
1	A	R/Nopress (fluoxetine,SSRI) R/Proclozam (benzo isi clobazam) Haloperidol Arkine R/Valdimex	½ biji sehari sekali 2x1	20 mg 3 mg 0,25 mg 0,25 mg 0,5 mg
2	B	R/Nopress (fluoxetine,SSRI) R/Clofritis Hlp Arkine R/ dobrizole R/caditic	1 kali pagi hari 2x1 1 kali setelah makan 2x1	20 mg 5 mg 0,25 mg 0,25 mg 20 mg 50 mg
3	C	R/nopress (fluoxetine, ssri) R/proclozam Xiety Hlp Arkine R/dobrizole	1 x 1 2x1 2x1	20 mg 5 mg 2,5 mg 0,25 mg 0,25 mg 20 mg
4	D	R/ nopress (fluoxetine,SSRI) R/clofritis Hlp Arkine R/dobrizole	1 kali pagi hari 2x1 1 kali sebelum makan	20 mg 5 mg 0,25 mg 0,5 mg 20 mg
5	E	R/foranci R/clofritis Hlp Arkine R/strokain R/puricemia	1x1 2x1	20 mg 5 mg 0,25 mg 0,25 mg 300 mg
6	F	R/nopress R/clofritis Hlp Arkine R/dobrizole R/titan	1x1 2x1 2x1 2x1	20 mg 5 mg 0,5 mg 0,5 mg
7	G	R/Amytriptylin Clofritis Hlp Arkine R/Dobrizole	2x1 1x1	12,5 mg 5 mg 0,25 mg 0,25 mg
8	H	R/simvastatin R/nopres R/clofritis Hlp Arkine	1x1 1x1 1x1	20 mg 20 mg 2,5 mg 0,25 mg 0,25 mg
	I	R/nopress R/clofritis Hlp Arkine R/dobrizole	1x1 2x1 1x1	20 mg 5 mg 0,25 mg 0,25 mg 0,5 mg
10	J	R/ trombopob salep R/caditic R/eperisone R/amt Merlopam Hlp Arkine	2x1 2x1 1 kali malam hari	6,25 mg 1 mg 0,25 mg 0,25 mg
11	K	R/foransi R/clofritis	1 kali pagi hari 2x1	20 mg 10 mg

		Hlp Arkine R/musifat R/titan	2x1	0,25 mg 0,25 mg
12	L	R/Nopress R/proklozam Alprazolam Xiety Hlp Arkine R/braxidin R/musifat	1x1 2x1 2x1	20 mg 2 mg 0,25 mg 2,5 mg 0,25 mg 0,25 mg
13	M	R/nopres R/clofritis Hlp Arkine R/musifat	1x1 2x1	20 mg 10 mg 0,25 mg 0,25 mg
14	N	R/nopress R/merlopam Hlp Arkine R/nefradin R/dobrizole	1 kali 1 pagi hari 2x1 1x1 1x1	20 mg 0,5 mg 0,5 mg 0,5 mg
15	O	R/ nopress R/clofritis Hlp Arkine R/dobrizole R/titan	1x1 2x1 1x1	20 mg 2,5 mg 0,25 mg 0,25 mg 20 mg
16	P	R/ nopress R/merlopam Hlp Arkine R/neurodex	½ tablet sehari sekali 2x1 2x1	20 mg 2,5 mg 0,25 mg 0,25 mg
17	Q	R/nopres R/clofritis Hlp Arkine R/musifat R/proimboost	1x1 2x1	20 mg 5 mg 0,25 mg 0,25 mg
18	R	R/nopress R/merlopam Hlp Arkine	1x1 pagi 2x1	20 mg 0,5 mg 0,25 mg 0,25 mg
19	S	R/nopress R/clofritis Hlp Arkine R/lansoprazole Kaditic	1x1 2x1	20 mg 5 mg 0,25 mg 0,25 mg
20	T	R/nopress R/clofritis Hlp Arkine	1x1 2x1	20 mg 5 mg 0,25 mg 0,25 mg
21	U	R/Nopress R/proclozam Hlp Arkine R/dohixat	1x1 2x1	20 mg 5 mg 0,25 mg 0,25 mg

		R/dobrizole		
22	V	R/nopres R/hlp Merlopam Arkine R/mucifat	1x1 2x1	20 mg 0,25 mg 0,5 mg 0,25 mg
23	W	R/foransi R/ proclozam Hlp Arkine	1x1 2x1	10 mg 2,5 mg 0,25 mg 0,25 mg
24	X	R/nopress R/proclozam Hlp Arkine Xiety R/merlopam R/dobrizole R/benovit c	1x1 2x1 ½ biji sekali sehari malam 1x1	20 mg 2 mg 0,25 mg 0,25 mg 2,5 mg 0,5 mg
25	Y	R1 Mirzap Farmdral aa 5 mg Merlopam Sopvell aa ¼ mg Frixitas 1/8 mg	2x1	5 mg 5 mg 0,5 mg 0,5 mg 0,125 mg
26	Z	R1 a. Nudeep (SSRI) b. Clofritis c. Merlopam d. Folac R2 a. Mecola (terapi penunjang pada penderit dm)	2x1 1x1	5 mg 5 mg 0,25 mg 100 mg
27	Aa	R/ Arkine 2 mg Mirzap 10 mg Quetvell 30 mg Farmadral 5 mg Lozap 2,5 mg Riclon ½ mg	2x1 malam hari	2 mg 10 mg 30 mg 5 mg 2,5 mg 0,5 mg
28	Bb	R1 a. Mirzap b. Quetvell c. Dogmatil d. Merlopam e. Friksitas f. Zypras R2 Astatin 1 x pagi hari antioksidan kuat	1x1 malam hari 1x1 pagi hari	5 mg 12,5 mg 10 mg 0,5 mg 0,25 mg 0,25 mg
29	Cc	R1 Dogmatil Mirzap Quetvell	2x1	12,5 mg 12,5 mg 12,5 mg

		Lozap Farmadral Merlopam Alganax Xanax Diazepam Sopvel		7,5 mg 2,5 mg 0,25 mg 0,5 mg 0,25 mg 1 mg 0,25 mg
30	Dd	R1 Mirzap Quetvell Dogmatil Merlopam Friksitas Alganax	2x1	5 mg 5 mg 5 mg 0,5 mg 0,25 mg 0,25 mg
31	Ee	R1 Atarax Mirzap Farmadral Quetvell Dogma Merlopam Xiety Zypros	1x1	0,25 mg 5 mg 2,5 mg 10 mg 10 mg 0,25 mg 0,25 mg 0,25 mg
32	Ff	R1 Fredep Farmadral Quetvell aa Merlopam Clorilex R2 Fredep Farmadral Quetvell Merlopam Friksitas Lozap	1x1	5 mg 5 mg 5 mg 1 mg 5 mg 5 mg 5 mg 0,25 mg 0,25 mg 1,5 mg
33	Gg	R1 Nudeep Dogma Avran Farmadral Quetvell Zolmia Friksitas Unalium 10 mg prn Ativan	2x1	20 mg 10 mg 0,5 mg 5 mg 5 mg 0,5 mg 0,5 mg 10 mg prn 1 mg
34	Hh	R1 Elxion Farmadral Zipren Riclon Merlopam Zypras	1x1 malam hari	5 mg 5 mg 1 mg 0,25 mg 0,25 mg 0,25 mg

		R2 Clofritis	Jika perlu	10 mg pm
35	II	R/ kalxetin quetvell farmadral dogmatil merlopam frixitas	2x1	10 mg 10 mg 5 mg 10 mg 1 mg 0,5 mg
36	Jj	R/ Elxion Farmadral Zypren Hexymer merlopam atatax aa Sopvell Zink plus	1x1	5 mg 5 mg 1 mg 1,5 mg 0,5 mg 0,5 mg 0,5 mg 1/3 mg
37	Kk	R/ Depram Farmadral Avran Riclona Alganax Zink plus R/ Coxavit pagi hari	1x1 malam hari 1x1 pagi hari	5 mg 5 mg 1,5 mg 0,5 mg 0,5 mg 0,5 mg
38	Ll	R/ Fridep Avran Arkine Zolmia Frixitas Zypras	1x1	5 mg 1,5 mg 2 mg 0,5 mg 0,25 mg 0,25 mg
39	Mm	R/ Nudep Dogmatil Riklona Zypras Opizolam	2x1	5 mg 10 mg 0,25 mg 0,25 mg
40	Nn	R/ mirzap Quetvell Clofritis Renaquil Frixitas Opizolam Esilgan	2x1	10 mg 10 mg 5 mg 0,25 mg 0,25 mg 0,25 mg 1 mg

Lampiran 7 Hubungan Jenis Kelamin dengan DRPs

IBM SPSS Statistics Data Editor

Visible: 2 of 2 Variables

	JK	DRPs	VSF															
1	2.00	2.00																
2	1.00	2.00																
3	2.00	2.00																
4	2.00	2.00																
5	2.00	2.00																
6	2.00	2.00																
7	1.00	2.00																
8	2.00	2.00																
9	2.00	2.00																
10	1.00	2.00																
11	2.00	2.00																
12	2.00	2.00																
13	2.00	2.00																
14	1.00	2.00																
15	2.00	2.00																
16	2.00	2.00																
17	2.00	2.00																
18	2.00	2.00																
19	2.00	2.00																
20	1.00	2.00																
21	2.00	2.00																
22	2.00	2.00																
23	1.00	1.00																
24	2.00	2.00																
25	2.00	1.00																
26	1.00	1.00																
27	2.00	2.00																
28	2.00	1.00																
29	1.00	2.00																

IBM SPSS Statistics Processor is ready | Unicode ON

IBM SPSS Statistics Viewer

```

GET
FILE='D:\Farmasi\SKRIPSI\syarat hasil\data analisis jk dan drps.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
CORRELATIONS
/VARIABLES=JK DRPs
/PRINT=TWO TAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
  
```

Correlations

[DataSet1] D:\Farmasi\SKRIPSI\syarat hasil\data analisis jk dan drps.sav

		Jenis Kelamin	Kejadian DRPs
Jenis Kelamin	Pearson Correlation	1	.157
	Sig. (2-tailed)		.333
	N	40	40
Kejadian DRPs	Pearson Correlation	.157	1
	Sig. (2-tailed)	.333	
	N	40	40

IBM SPSS Statistics Processor is ready | Unicode ON

Lampiran 8 Hubungan Usia dengan DRPs

IBM SPSS Statistics Data Editor

Visible: 2 of 2 Variables

	Usia	DRPs
1	2.00	2.00
2	1.00	2.00
3	1.00	2.00
4	1.00	2.00
5	3.00	2.00
6	3.00	2.00
7	2.00	2.00
8	2.00	2.00
9	1.00	2.00
10	2.00	2.00
11	2.00	2.00
12	1.00	2.00
13	1.00	2.00
14	4.00	2.00
15	3.00	2.00
16	4.00	2.00
17	3.00	2.00
18	4.00	2.00
19	3.00	2.00
20	3.00	2.00
21	4.00	2.00
22	4.00	2.00
23	2.00	1.00
24	2.00	2.00
25	3.00	1.00
26	2.00	1.00
27	4.00	2.00
28	3.00	1.00
29	3.00	2.00

IBM SPSS Statistics Processor is ready | Unicode ON

IBM SPSS Statistics Viewer

```

GET
  FILE='D:\Farmasi\SKRIPSI\syarat hasil\data analisis kelompok usia.sav'.
  DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
CORRELATIONS
  /VARIABLES=Usia DRPs
  /PRINT=TWOCELL NOSIG
  /MISSING=FAIRWISE.
  
```

Correlations

[DataSet1] D:\Farmasi\SKRIPSI\syarat hasil\data analisis kelompok usia.sav

		Kelompok Usia	Kejadian DRPs
Kelompok Usia	Pearson Correlation	1	.119
	Sig. (2-tailed)		.466
	N	40	40
Kejadian DRPs	Pearson Correlation	.119	1
	Sig. (2-tailed)	.466	
	N	40	40

IBM SPSS Statistics Processor is ready | Unicode ON

RIWAYAT HIDUP



Anas Faturrahman Putra akrab dipanggil anas merupakan anak pertama dari pasangan Mohamad Yunus dan Hasnawiyah. Lahir di Sulawesi tenggara Kabupaten Bombana tepatnya di Kelurahan Rahampu'u pada tanggal 07 maret 2000. Memulai Pendidikan di SD Negeri Rahampuu. Kemudian melanjutkan pendidikannya di MTs Negeri Kabaena dan kemudian pindah ke Sulawesi Selatan dan melanjutkan SM di SMA Negeri Khusus Jenepono. Setelah lulus SMA ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi. Dan berharap dapat membanggakan kedua orang tuanya.

“sedikit lebih beda lebih baik dari sedikit lebih baik”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR