

**FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS KRIM ANTIOKSIDAN EKSTRAK
ETANOL DAUN BINAHONG (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) DENGAN
METODE DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil*)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RESKYATRI FARADISA FARUKI

NIM: 70100114072

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

SAMATA-GOWA

2021

**FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS KRIM ANTIOKSIDAN EKSTRAK
ETANOL DAUN BINAHONG (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) DENGAN
METODE DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RESKYATRI FARADISA FARUKI

NIM: 70100114072

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

SAMATA-GOWA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RESKYATRI FARADISA FARUKI
NIM : 70100114072
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 13 Mei 1996
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Veteran Utara Jl. Bambapuang No.41B
Judul : Formulasi Dan Uji Aktivitas Krim Antioksidan Ekstrak
Etanol Daun Binahong (*Anredera Cordifolia* (Ten.)
Steenis) dengan Metode DPPH (*1,1-diphenyl-2-
picrylhydrazil*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 27 Januari 2021

Penulis,

RESKYATRI FARADISA FARUKI
NIM: 70100114072

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Formulasi dan Uji Aktivitas Krim Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) dengan Metode DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil*)” yang disusun oleh Reskyatri Faradisa Faruki, NIM: 70100114072, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 M yang bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 27 Januari 2021 M
14 Jumadil Akhir 1442 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M. Kes., Sp.A. (.....)

Sekretaris : Apt. Asrul Ismail, S.Farm.,M.Sc. (.....)

Pembimbing I : Apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si. (.....)

Pembimbing II : Apt. Nurshalati Tahar, S.Farm.,M.Si. (.....)

Penguji I : Dwi Wahyuni Leboe, S.Si.,M.Si. (.....)

Penguji II : Dr. Dudung Abdullah, M.Ag (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M. Kes., Sp. A
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula salam serta shalawat penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. yang menjadi panutan ummat Islam karena telah membawa banyak perubahan dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi yang berjudul “Formulasi Dan Uji Aktivitas Krim Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Binahong (*Anredera Cordifolia* (Ten.) Steenis) dengan Metode DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil*)” ini merupakan salah satu persyaratan yang harus penulis penuhi untuk mendapatkan gelar sarjana Farmasi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentunya tak luput dari dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan permohonan maaf dan banyak terima kasih kepada Ibunda tersayang St. Asiah yang telah banyak berperan dan berkorban dalam kehidupan penulis dan tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk segala kebaikan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Serta untuk kakak saya Muh. Risfan Fajar Sadik dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi

dan selalu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua senantiasa mendapat perlindungan dan keberkahan dari Allah swt.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA, Ph, D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Wahyuddin, M.Hum. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M. Kes., Sp. A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Apt. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si.,M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

8. Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. Apt. Asrul Ismail, S.Farm.,M.Sc., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
11. Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm.,M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
12. Apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Apt. Nurshalati Tahar, S.Farm.,M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Dwi Wahyuni Leboe, S.Si.,M.Si., selaku penguji kompetensi yang telah mengoreksi dan memberikan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Dr. Dudung Abdullah, M.Ag., selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi ini.

16. Bapak/Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini
17. Kepada seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan IlmuKesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.

Banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah *SWT*. Amin Ya Rabbal Alamin.

Samata-Gowa, 27 Januari 2021

Penyusun

Reskyatri Faradisa Faruki

NIM : 70100114072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	3
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK.....	15
ABSTRACT.....	16
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Uraian Tanaman Daun Binahong (Zaujin Karim).....	8
B. Radikal Bebas.....	10
C. Antioksidan.....	13
D. Uraian DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)	19
E. Sediaan Krim.....	20

F. Komposisi sediaan krim	22
G. Ekstraksi	24
H. Spektrofotometri UV-Vis	28
I. Kulit.....	32
J. Tinjauan Islam Mengenai Riset Dan Pengobatan	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Instrumen Penelitian.....	43
E. Prosedur pengolahan dan analisis data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian.....	49
B. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN.....	58
KEPUSTAKAAN	59
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja.....	63
2. Perhitungan	68
3. Gambar Penelitian.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rancangan Formula Sediaan Krim Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis)	44
2. Berat Ekstrak Etanol Daun Binahong	49
3. Hasil Perhitungan % Peredaman DPPH	49
4. Hasil Pengamatan Organoleptis	50
5. Hasil Pengukuran pH	50
6. Hasil Pengukuran Daya Sebar	51
7. Hasil Pengamatan Homogenitas	51
8. Hasil Pengukuran Daya Lekat.	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tumbuhan Binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis)	8
2. Struktur Kulit.....	33
3. Pengambilan dan Pengumpulan Sampel	70
4. Penimbangan Sampel	70
5. Proses Pengeringan (Pembuatan Simplisia)	70
6. Penimbangan Simplisia	70
7. Proses Pemisahan Pelarut dan Sampel	70
8. Proses Penguapan Filtrat Etanol dengan <i>Rotary Evaporator</i>	70
9. Pemekatan Ekstrak Di Atas Penangas Air	71
10. Penimbangan Bahan.....	71
11. Penimbangan Ekstrak	71
12. Pencampuran Bahan (Pembuatan Krim)	71
13. Sediaan Krim Formula I.....	71
14. Sediaan Krim Formula II.....	72
15. Sediaan Krim Formula III	72
16. Sediaan Krim Formula IV	72
17. Sediaan Krim Formula V	72
18. Pembuatan Larutan DPPH.....	72
19. Pengukuran Absorbansi.....	72
20. Pengukuran Absorbansi % Peredaman.....	73

21. Pengujian Daya Sebar	73
22. Pengamatan Organoleptik	73
23. Pengujian Daya Lekat	73
24. Pengukuran pH.....	73
25. Pengujian Homogenitas.....	73



ABSTRAK

Nama : RESKYATRI FARADISA FARUKI

Nim : 70100114072

**Judul : FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS KRIM ANTIOKSIDAN
EKSTRAK ETANOL DAUN BINAHONG (*Anredera cordifolia*
(Ten.) Steenis) DENGAN METODE DPPH (*1,1-diphenyl-2-
picrilhydrazil*)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk kosmetik dari bahan alam dengan menggunakan ekstrak etanol Daun Binahong dan mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak etanol Daun Binahong dalam sediaan krim dengan metode DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrilhydrazil*). Ekstraksi Daun Binahong dengan metode maserasi menggunakan etanol. Formulasi sediaan krim antioksidan dibuat dengan beberapa variasi konsentrasi FI (0,02 g), FII (0,04 g), FIII (0,06 g), FIV sebagai kontrol negatif dan FV sebagai kontrol positif. Kemudian di uji aktivitas antioksidannya terhadap larutan DPPH dan dihitung rata-rata % peredaman FI 18,49%, FII 63,61%, FIII -8,68%, FIV -36,94% dan FV 61,87%. Dari semua formulasi yang memiliki aktivitas antioksidan yang paling efektif adalah FII dengan konsentrasi ekstrak 0,04 g.

Selanjutnya dilakukan evaluasi sediaan krim yaitu pengujian organoleptik, pengujian pH, daya sebar, homogenitas dan daya lekat. Pada pengujian organoleptik dan homogenitas semua formulasi memiliki hasil yang baik. Pada pengujian daya sebar semua sediaan krim tidak memenuhi syarat. Pada pengujian pH sediaan hanya FII, FIII dan FV yang memiliki pH sesuai dengan fisiologis kulit. Pada pengujian daya lekat semua sediaan krim memenuhi syarat.

Kata kunci: Daun Binahong, Krim Antioksidan, DPPH

ABSTRACT

Name : RESKYATRI FARADISA FARUKI

Nim : 70100114072

**Title of script : FORMULATION AND TEST OF ANTIOXIDANT
ACTIVITY CREAM ETHANOL EXTRACT OF
BINAHONG LEAVES (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis)
USING DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrihydrazil*) METHOD**

This research aimed to develop cosmetics from natural ingredients using ethanol extracts of Binahong leaves, and to determine the antioxidant activity of ethanol extracts of Binahong leaves in cream formulations using the DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrihydrazil*) method. Binahong leaves immersion method is extracted with ethanol. An antioxidant cream formulation was prepared, in which the concentration of FI (0,02 g), FII (0,04 g), FIII (0,06 g), FIV as a negative control and FV as a positive control had several change. The antioxidant activity was then tested against the DPPH solution, and the averages percentage reduction rate of FI 18,49%, FII 63,61%, FIII -8,68%, FIV -36,94% and FV 61,87% was calculated. Among all the formulas with the most effective antioxidant activity, the extract concentration of FII is 0,04 g.

Next, the cream formulation is evaluated, namely sensory test, pH test, dispersibility, homogeneity and adhesion. The sensory and homogeneity test of all formulations have achieved good results. When testing the spreadability of all cream formulations that do not meet the requirements. When testing the pH of the formulation, only FII, FIII and FV have a pH according to skin physiology. In the adhesion test, all cream preparations passed.

Keywords: Binahong Leave, Antioxidant Cream, DPPH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matahari memancarkan sinar yang mengandung radiasi ultra violet (UV) yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan secara langsung oleh manusia. Pada dasarnya, sinar ultra violet yang berasal dari matahari bermanfaat bagi manusia, salah satunya adalah untuk pembentukan Vitamin D. Vitamin D memiliki peran dalam metabolisme pembentukan tulang dan juga dalam pertahanan sistem imun tubuh. Selain itu, radiasi sinar UV dalam waktu yang cukup dan rutin seringkali digunakan untuk terapi beberapa penyakit, beberapa diantaranya yaitu tuberculosis, psoriasis dan vitiligo (Pratiwi dan Patihul. 2017).

Paparan sinar matahari yang terkena langsung pada kulit akan mengakibatkan sinar UV dapat berpenetrasi ke dalam kulit, berinteraksi dan memberikan energinya sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan biologi. Kulit yang terus menerus mendapat paparan sinar UV secara berulang dapat mengakibatkan kolagen pada kulit mengalami degradasi dan mengubah jaringan konektif kulit. Kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari yaitu kulit terbakar, penggelapan kulit, keriput (penuaan dini), hingga kanker kulit (Mappamasing, dkk. 2015).

Paparan sinar ultraviolet dari matahari secara berulang akan mengakibatkan perubahan struktur dan komposisi kulit dan stress oksidatif pada kulit. Efek yang ditimbulkan dapat berupa perubahan-perubahan akut seperti eritema, pigmentasi dan fotosensitivitas, maupun efek jangka panjang berupa penuaan dini dan kanker kulit. Sinar UV merupakan sinar matahari yang memiliki

komponen kecil dari spektrum elektromagnetik dan memiliki rentang radiasi yang sempit, yaitu pada panjang gelombang 200-400 nm. Spektrum sinar UV dibagi menjadi 3, yaitu UV C (200-290 nm) dapat menyebabkan kanker, UV B (290-320 nm) juga dapat menyebabkan kanker dan dapat menimbulkan efek terbakar pada kulit dan UV A (320-400 nm) dapat masuk ke lapisan kulit paling dalam dan memberikan efek terbakar pada kulit namun lebih lemah dibandingkan efek UV B (Putri, dkk. 2019).

Spesies oksigen reaktif (ROS) pada kulit yang terbentuk akibat paparan sinar matahari mengakibatkan kerusakan pada asam nukleat, lipid serta protein, termasuk kolagen kulit sehingga terbentuk kerutan. Sistem antioksidan kulit terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok enzim (misalnya katalase dan peroksidase) dan kelompok antioksidan bobot molekul rendah. Antioksidan ini bekerja sebagai proteksi utama terhadap ROS sehingga dapat mencegah kerusakan kulit akibat radikal bebas (Mappamasing, dkk. 2015).

Radikal bebas merupakan suatu senyawa atau molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Akibatnya, elektron yang tidak memiliki pasangan menjadi sangat reaktif untuk mencari pasangan dengan cara menyerang dan mengikat elektron yang berada di sekitarnya sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit (Lung dan Dika. 2017).

Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat, mencegah dan menetralkan kerusakan oksidatif yang diakibatkan oleh radikal bebas. Antioksidan dapat berupa molekul yang kompleks seperti superoksida dismutase, katalase dan peroksiredoksin, maupun berupa senyawa sederhana yaitu

glutation, vitamin (vitamin A, C, E dan β -karoten) dan senyawa lain (seperti flavonoid, albumin, bilirubin, seruplasmin dan lain-lain). Disamping antioksidan yang enzimatis ada juga yang non-enzimatis yang dapat berupa senyawa nutrisi maupun non-nutrisi. Antioksidan non-enzimatis dapat ditemukan dalam sayuran maupun buah-buahan, biji-bijian, serta kacang-kacangan. Senyawa kimia yang tergolong dalam kelompok antioksidan dan dapat ditemui pada tanaman antara lain berasal dari golongan polifenol, bioflavonoid, asam askorbat, vitamin E, betakaroten, katekin dan lain sebagainya (Sulastri, dkk. 2015).

Flavonoid adalah metabolit sekunder dari polifenol, ditemukan secara luas pada tanaman serta makanan dan memiliki berbagai efek bioaktif termasuk antivirus, anti-inflamasi, anti-diabetic, anti kanker, anti-penuaan, antioksidan dan lain-lain. Senyawa flavonoid adalah senyawa polifenol. Flavonoid terdapat pada semua tumbuhan hijau sehingga dapat ditemukan pada setiap ekstrak tumbuhan. Flavonoid adalah kelas senyawa yang banyak disajikan secara luas di alam. Flavonoid ditemukan pada tanaman yang berkontribusi memproduksi pigmen berwarna kuning, merah, oranye, biru dan warna ungu dari buah, bunga dan daun. Flavonoid termasuk dalam family polifenol yang larut dalam air (Arifin dan Sanusi. 2018).

Pada penelitian Anwar dan Sri. 2016 “Manfaat Daun Binahong (*Anredera cordifolia*) sebagai *Acne Vulgaris*” mengatakan bahwa hasil uji fitokimia menunjukkan ekstrak daun binahong terdapat senyawa polifenol, alkaloid dan flavonoid. Flavonoid mempunyai sifat anti-inflamasi, anti-hepatotoksik, anti-tumor, anti-mikrobia dan anti-virus. Namun, kebanyakan flavonoid berperan

sebagai antioksidan. Ekstrak etanol daun Binahong memiliki kapasitas antioksidan total sebesar 4,25 mmol/100g (segar) dan 3,68 mmol/100g (kering).

Di dunia industri kosmetik saat ini sedang gencar untuk mengembangkan produk-produk yang berorientasi pada penggunaan bahan alam karena banyaknya respon positif dari kalangan masyarakat. Sediaan bahan alam dianggap jauh lebih aman untuk digunakan dan memiliki dampak negatif lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan bahan kimia. Didukung oleh kekayaan alam Indonesia, industri kosmetik dapat memanfaatkan beragam tumbuh-tumbuhan sebagai bahan aktif sediaan kosmetik (Pratiwi dan Husni. 2017).

Penggunaan daun Binahong sebagai pelindung kulit masih jarang digunakan di kalangan masyarakat, sehingga peneliti perlu melakukan pengembangan menjadi suatu bentuk sediaan topikal. Sediaan kosmetik yang beredar umumnya berupa krim. Krim banyak disenangi oleh masyarakat karena sifatnya yang mudah dioleskan, tidak lengket, kemampuan penyebarannya yang baik pada kulit, memberikan efek dingin karena lambatnya penguapan air pada kulit, mudah dicuci dengan air, pelepasan obat yang baik, serta tidak terjadi penyumbatan di kulit (Mailana, dkk. 2016).

Sedangkan dalam Al-qur'an surah Asy-Syu'arā (26) ayat 7 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik” (Q.S. 26:7) (Kemenag RI. 2012).

Ayat diatas dapat diasumsikan bahwa Allah SWT mengingatkan kepada manusia bahwa banyak tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan yang dapat bermanfaat bagi makhluk hidup, tinggal kita sebagai manusia meneliti dan mengolah tumbuh-tumbuhan itu dengan baik, baik daun, akar, batang dan bagian tumbuhan lainnya karena tak satupun yang Allah SWT ciptakan itu dengan sia-sia (tidak ada manfaat).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak etanol daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis.) stabil dalam bentuk sediaan krim?
2. Berapakah konsentrasi ekstrak etanol daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis.) yang lebih stabil dalam bentuk sediaan krim?
3. Berapakah konsentrasi ekstrak etanol daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) dalam sediaan krim yang memiliki aktivitas antioksidan yang paling efektif?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup

1. Definisi Operasional

Terdapat berbagai macam istilah pada judul skripsi ini, diantaranya :

- a. Antioksidan adalah suatu senyawa yang dapat mencegah terjadinya proses oksidasi yang akan menunda atau mencegah terjadinya kerusakan akibat oksidasi.
- b. Radikal bebas merupakan sebuah atom yang sangat aktif karena kehilangan pasangan elektronnya.

- c. Metode DPPH (2,2-difenil-1-picrylhydrazyl) merupakan metode menggunakan pereaksi DPPH yang merupakan senyawa radikal bebas yang stabil. Metode DPPH cepat dan mudah digunakan untuk menentukan aktivitas peredaman radikal bebas dari suatu ekstrak.
- d. Krim merupakan sediaan semi padat yang dapat berupa emulsi yang mengandung air tidak kurang dari 60% dan digunakan untuk pemakaian luar.
- e. Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dari serapan cahaya pada panjang gelombang tertentu.
- f. Daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis.) merupakan tanaman yang dikenal di Makassar khususnya dengan nama Binahong dan di daerah Jawa dikenal sebagai Gendola. Binahong merupakan salah satu tanaman obat yang mempunyai banyak khasiat dalam penyembuhan berbagai macam penyakit.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah bidang Fitokimia dan Teknologi Sediaan Farmasi. Rentang waktu yang digunakan sekitar 3 bulan.

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian Anwar dan Sri. 2016 “Manfaat Daun Binahong (*Anredera cordifolia*) sebagai *Acne Vulgaris*” mengatakan bahwa hasil uji fitokimia menunjukkan ekstrak daun binahong terdapat senyawa polifenol, alkaloid dan flavonoid. Flavonoid mempunyai sifat anti-inflamasi, anti-hepatotoksik, anti-tumor, anti-mikrobia dan anti-virus. Namun, kebanyakan flavonoid berperan

sebagai antioksidan. . Ekstrak etanol daun Binahong memiliki kapasitas antioksidan total sebesar 4,25 mmol/100g (segar) dan 3,68 mmol/100g (kering).

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui kestabilan ekstrak etanol daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) dalam bentuk sediaan krim.
- b. Untuk mengetahui pada konsentrasi berapa sediaan krim ekstrak etanol daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) lebih stabil.
- c. Untuk mengetahui pada konsentrasi berapa sediaan krim ekstrak etanol daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) yang memiliki aktivitas antioksidan paling efektif.

2. Manfaat penelitian

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan data ilmiah mengenai stabilitas ekstrak etanol daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis.) pada sediaan krim
- b. Dapat mengetahui konsentrasi dari ekstrak etanol daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis.) yang lebih stabil pada sediaan krim.
- c. Dapat mengetahui konsentrasi dari sediaan krim antioksidan ekstrak etanol daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) yang memiliki aktivitas antioksidan paling efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman Daun Binahong (*Zaujin Karim*)



Gambar.1 Tumbuhan binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis)

1. Klasifikasi Tanaman

Kingdom	: Plantae
Sub kingdom	: Tracheobionta
Superdivisio	: Spermatophyta
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Subkelas	: Hamamelidae
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Basellaceae
Genus	: <i>Anredera</i>
Spesies	: <i>Anredera cordifolia</i> (Tenore.) Steenis.

(Anwar dan Tri. 2016).

2. Nama Daerah

Salah satu tanaman tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat yaitu daun Binahong mempunyai nama latin *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis. Daun Binahong juga mempunyai nama dari berbagai daerah seperti Makassar: Binahong; Jawa: Gendola; Minangkabau: Lembayung; Bali: Gendola; Sunda:

Gandola; Sulawesi Utara: Tatabuwe; Gorontalo: Poiloo. Selain itu, Binahong juga memiliki nama di berbagai negara. Di negara Cina Binahong dikenal dengan nama *teng san chi*, sedangkan di Inggris nama umum dari Binahong yaitu *heartleaf madeiravine* atau *madeira vine*. Binahong merupakan tumbuhan yang diduga berasal dari Australia, Afrika Selatan, Hawaii, New Zealand dan Pulau Pasifik lainnya. Tumbuhan ini mudah tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi (Surbakti, dkk. 2018).

3. Morfologi Tanaman

Tanaman binahong berasal dari negeri Cina. Tumbuh menjalar pada tanaman lain dan panjangnya bisa melebihi 5 m, serta berumur panjang. Batangnya lunak dan saling membelit, berbentuk silindris, permukaan halus dan berwarna kemerahan (Suparjo, dkk. 2016).

Daunnya tunggal dan berwarna hijau, bertangkai pendek dan tersusun berselang-seling. Daun berbentuk hati yang memiliki panjang sekitar 5-10 cm dan 3-7 cm. helaian daunnya tipis lemas dengan pangkal yang berlekuk, ujung runcing, permukaan licin dan bertepi rata (Suparjo, dkk. 2016).

Bunga Binahong bertangkai panjang yang muncul pada ketiak daun, bunga majemuk berbentuk tandan dengan jumlah 5 helai dan tidak berlekatan. Sedangkan mahkota bunga berwarna krem keputih-putihan dengan panjang helai mahkota 0,5-1 cm (Suparjo, dkk. 2016).

Akar tanaman Binahong berdaging lunak dan berbentuk rimpang. Tanaman Binahong dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi.

Banyak ditanam di dalam pot sebagai tanaman hias dan tanaman obat (Suparjo, dkk. 2016).

B. Radikal Bebas

Radikal bebas merupakan atom atau molekul dengan satu atau lebih elektron yang tidak saling berpasangan, bersifat tidak stabil dan sangat reaktif menarik molekul lain untuk mencapai stabilitas (Arnanda dan Rina. 2019).

Radikal bebas bisa didapatkan dari dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal radikal bebas didapatkan dari dalam tubuh kita sendiri yang merupakan sisa proses metabolisme (proses pembakaran), protein, karbohidrat dan lemak yang kita konsumsi. Sedangkan untuk faktor eksternal didapatkan dari asap rokok, hasil penyinaran ultra violet, zat-zat pemicu radikal dalam makanan dan polutan lainnya (Fakriah, dkk. 2019).

Radikal bebas yang berperan dalam proses biologis sebagian besar berasal dari proses biologis alami yang melibatkan prooksidasi ROS dan *reactive nitrogen species* (RNS). Proses terbentuknya radikal bebas dimulai dengan molekul yang tidak memiliki pasangan elektron dan mencoba mengambil elektron lain yang berada disekitarnya. Proses ini merupakan proses oksidasi yang kemudian akan membentuk sebuah molekul radikal bebas yang baru. Proses ini jika berlangsung terus-menerus dapat membentuk sebuah rantai reaksi yang akan menghancurkan ribuan molekul lain. Radikal bebas dapat terbentuk dari hasil metabolisme ataupun yang memang dengan sengaja dibentuk untuk menetralkan virus dan bakteri pada sistem imunitas tubuh. Radikal bebas dibentuk oleh banyak

mekanisme terutama oleh mekanisme oksidasi glukosa (Berawi dan Theodora. 2017).

Glukosa akan dioksidasi melalui reaksi yang melibatkan logam menjadi anion enediol, kemudian diubah menjadi ketoaldehid dan O_2^- . O_2^- mengalami dismutase menjadi H_2O_2 yang tidak dapat didegradasi oleh katalase atau glutathione peroksida sehingga menghasilkan $OH\bullet$ yang sangat reaktif. Anion superoksida dapat bereaksi dengan NO membentuk molekul reaktif peroxynitrite ($ONOO^-$). Produksi ROS dan/atau RNS yang berlebihan dapat mengakibatkan stress oksidatif. *Reactive oxygen species* dalam tubuh mempunyai berbagai macam bentuk yaitu superoksida anion (O_2^-), radikal hidroksil (HO), lipid (R), dan peroksida lainnya seperti ROO dan XO (Berawi dan Theodora. 2017).

Radikal bebas yang mengambil elektron dari tubuh manusia dapat menyebabkan perubahan struktur DNA (*Deoxy Nucleic Acid*) sehingga muncullah sel-sel mutan. Kerusakan sel yang diakibatkan serangan radikal bebas antara lain (Fakriah, dkk. 2019) :

1. Kerusakan struktur DNA (*Deoxy Nucleic Acid*) pada inti sel. Senyawa radikal bebas merupakan salah satu penyebab kerusakan DNA diantara penyebab lainnya seperti radiasi dan zat kimia karsinogen. Akibatnya pembelahan sel menjadi terganggu. Terjadi perubahan abnormal yang mengenai gen tertentu dalam tubuh yang dapat menyebabkan penyakit kanker.
2. Kerusakan membrane sel. Membran sel memiliki komponen penting seperti asam lemak tak jenuh ganda yang sangat rentan terhadap serangan

radikal bebas. Akibatnya, struktur dan fungsi dari membran sel akan berubah dan yang lebih bahayanya lagi dapat mematikan sel-sel pada jaringan tubuh. Misalnya kerusakan sel organ tubuh.

3. Kerusakan protein. Terjadinya kerusakan akibat serangan radikal bebas ini termasuk oksidasi protein yang menyebabkan kerusakan jaringan tempat protein itu berada. Contohnya: kerusakan protein pada lensa mata yang mengakibatkan katarak.
4. Kerusakan lipid peroksida. Ini terjadi bila asam lemak tak jenuh terserang radikal bebas, sehingga reaksi antara zat gizi dalam tubuh menghasilkan peroksida yang menyebabkan kerusakan sel sehingga dianggap salah satu penyebab terjadinya berbagai penyakit degeneratif (kemerosotan fungsi tubuh).
5. Dapat menimbulkan Autoimun. Dalam keadaan normal, antibodi hanya terbentuk bila ada antigen yang masuk dalam tubuh. Autoimun adalah terbentuknya antibody terhadap suatu sel tubuh biasa dan hal ini dapat merusak jaringan tubuh.
6. Proses penuaan. Paparan radikal bebas bagi tubuh manusia bersifat akumulatif yang akan muncul sebagai penyakit apabila sistem imunitas tubuh tidak lagi dapat mentoleransi keberadaan senyawa radikal bebas. Hal ini dipengaruhi oleh keseimbangan kerja radikal bebas yang berada dalam tubuh ataupun yang masuk ke dalam tubuh melalui lingkungan dengan kadar antioksidan dalam tubuh. Bila kadar radikal bebas melampaui batas kemampuan tubuh untuk mengelolanya maka akan timbul kondisi stress

oksidatif. Stress oksidatif inilah yang menjadi penyebab utama penyakit stroke, jantung, tekanan darah tinggi, kanker dan lainnya.

Untuk mencegah terjadinya akumulasi dari radikal bebas yang dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti diatas dan mempercepat proses penuaan dini, diperlukan senyawa antioksidan untuk menetralkan, menurunkan dan menghambat pembentukan radikal bebas baru di dalam tubuh dengan cara menjadi pendonor elektron untuk radikal bebas sehingga elektron dari radikal bebas menjadi berpasangan, stabil dan menghentikan kerusakan dalam tubuh (Arnanda dan Rina. 2019).

C. Antioksidan

Antioksidan memiliki peranan yang sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia karena berfungsi menghambat dan menetralkan terjadinya reaksi oksidasi yang melibatkan radikal bebas sehingga mampu mencegah terjadinya berbagai macam penyakit degenerative seperti kardiovaskuler, karsinogenesis dan penyakit lainnya. Senyawa antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralkan radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein dan lemak. Netralisir ini dilakukan dengan cara menyumbangkan satu elektronnya sehingga dapat menjadi senyawa yang lebih stabil atau terjadi reaksi terminasi dan reaksi-reaksi radikal berakhir atau stress oksidatif tidak terjadi pada sel (Parwata. 2016).

Antioksidan secara alami bisa didapatkan dari makanan. Akan tetapi banyak yang tidak mengetahui bahwa makanan tersebut sebenarnya mengandung antioksidan sehingga ada yang membeli suplemen antioksidan yang harganya

cukup mahal. Beberapa contoh makanan sumber antioksidan antara lain vitamin A : wortel, brokoli, sayur hijau, bayam, labu, hati, kentang, telur, aprikot, mangga, susu dan ikan. Vitamin C : Lada (merica), cabe, peterseli, jambu biji, kiwi, brokoli, taoge, kesemek, pepaya, stroberi, jeruk, lemon, bunga kol, bawang putih, anggur, raspberri, jeruk, kepruk, bayam, tomat dan nanas. Vitamin E : asparagus, alpukat, buah zaitun, bayam, kacang kacangan, biji bijian, minyak sayur, sereal. Beta karoten, lutein, likopen, wortel, labu, sayur sayuran hijau, buah buah berwarna merah, tomat, rumput laut. Polipenol: buah berri, teh, anggur, minyak zaitun, kopi, cokelat, buah kenari, kacang, kulit buah, buah delima dan minuman anggur (Sayuti. 2015).

Pada penelitian kali ini digunakan pembanding vitamin C karena vitamin C memiliki nilai IC_{50} yang relatif kecil yaitu $14,79 \mu\text{g/mL}$ (nilai IC_{50} kurang dari 50). Vitamin C merupakan senyawa yang lebih polar dan memiliki empat gugus hidroksil (Lung. 2017: 57).

1. Jenis antioksidan

Dalam melawan bahaya radikal bebas baik radikal bebas eksogen ataupun endogen, tubuh manusia telah mempersiapkan penangkal berupa sistem antioksidan. Antioksidan terdiri dari 3 jenis, sebagai berikut: (Rata. 2016: 46-47).

a. Antioksidan primer

Antioksidan primer ini berfungsi mencegah pembentukan radikal bebas. Yang termasuk antioksidan primer, misalnya transferin, feritin dan albumin.

b. Antioksidan sekunder

Antioksidan ini berfungsi menangkap radikal bebas. Fungsi lain dari antioksidan sekunder adalah menghentikan pembentukan radikal bebas. Yang termasuk dalam antioksidan sekunder, misalnya *glutathion peroxidase* (GPx), *superoxide dismutase* (SOD), vitamin C, vitamin E dan karoten.

c. Antioksidan tersier

Antioksidan tersier ini berfungsi memperbaiki jaringan tubuh yang rusak oleh radikal bebas.

Berdasarkan sumbernya antioksidan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu (Perwata. 2016):

- a. Antioksidan yang sudah diproduksi di dalam tubuh manusia yang dikenal dengan antioksidan endogen atau enzim antioksidan (enzim Superoksida Dismutase (SOD)), Glutathion (GPx) dan katalase (CAT).
- b. Antioksidan sintesis yang banyak digunakan pada berbagai produk farmasi adalah Butil Hidroksil Anisol (BHA), Butil Hidroksil Toluen (BHT), propil galat dan Tert-Butil Hidroksi Quinon (TBHQ).
- c. Antioksidan alami yang dapat diperoleh dari bagian tanaman seperti kayu, kulit kayu, akar, daun, buah, bunga, biji dan serbuk sari seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E dan senyawa fenolik (flavonoid).

Studi epidemiologi menunjukkan bahwa adanya peningkatan konsumsi antioksidan alami yang terdapat dalam buah, sayur, bunga dan bagian-bagian lain dari tanaman dapat mencegah terjadinya stress oksidatif (Parwata. 2016).

2. Metode penentuan aktivitas antioksidan

Beragam metode pengukuran telah dikembangkan untuk mengukur aktivitas antioksidan, tetapi tidak ada yang benar-benar ideal. Metode pengukuran aktivitas antioksidan akan mendeteksi karakteristik yang berbeda dari antioksidan dalam sampel, hal ini menjelaskan mengapa metode pengukuran aktivitas antioksidan yang berbeda akan mengacu pada pengamatan mekanisme kerja antioksidan yang berbeda pula (Maryam, dkk. 2015). Metode-metode yang telah dikembangkan untuk penentuan kandungan antioksidan dalam sampel antara lain adalah DPPH, ABTS, CUPRAC, ORAC, dan FRAP (Yefrida, dkk. 2015).

a. Metode DPPH

Pengujian aktivitas antioksidan dapat dilakukan secara *in vitro* dengan metode DPPH. DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil*) merupakan senyawa radikal bebas yang stabil dan berwarna ungu kehitaman. DPPH digunakan untuk mengetahui aktivitas antioksidan melalui kemampuannya dalam menangkap radikal bebas. Aktivitas antioksidan diukur berdasarkan transfer elektron yang dilakukan oleh antioksidan (Wulansari, Anisa Nur. 2018).

Semula DPPH yang berwarna ungu pekat memberikan serapan, namun setelah mengalami reduksi maka DPPH akan berubah warna yang akan berangsur-angsur memudar menjadi warna kuning dan nilai serapannya akan sebanding dengan jumlah elektron yang diterima (Wulansari, Anisa Nur. 2018).

Metode DPPH memiliki keunggulan yaitu metode analisisnya yang bersifat sederhana, cepat, mudah dan sensitive terhadap sampel dengan konsentrasi yang kecil namun pengujian menggunakan DPPH terbatas karena hanya dapat

dilarutkan dalam pelarut organik sehingga agak sulit untuk menganalisis senyawa yang bersifat hidrofilik (Wulansari, Anisa Nur. 2018).

b. Metode ABTS

Pengujian antioksidan juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode ABTS (2,2-Azinobis 3-ethyl benzothiazoline 6-sulfonic acid) yang merupakan senyawa radikal yang mengandung atom nitrogen. Prinsip pengujiannya adalah penyetabilan radikal bebas melalui donor proton. Pengukuran aktivitas antioksidan dilakukan berdasarkan penghilangan warna ABTS yang semula berwarna biru hijau akan berubah menjadi tidak berwarna apabila tereduksi oleh radikal bebas. Intensitas warna yang terbentuk kemudian diukur menggunakan spektrofotometri visible pada panjang gelombang 734. Hasil yang di dapat dibandingkan dengan larutan standar Trolox yang merupakan antioksidan analog tokoferol (Wulansari, Anisa Nur. 2018).

Metode ABTS memiliki keunggulan yaitu memberikan absorbansi spesifik pada panjang gelombang visible dan waktu reaksi yang leboh cepat. Selain itu, ABTS dapat dilarutkan dalam pelarut organik maupun air sehingga bisa mendeteksi senyawa yang bersifat lipofilik maupun hidrofilik. Namun, pengujian menggunakan ABTS tidak menggambarkan sistem pertahanan tubuh terhadap radikal bebas, sehingga ABTS hanya dapat dijadikan sebagai metode pembanding karena tidak mewakili sistem biologis tubuh (Wulansari, Anisa Nur. 2018).

c. Metode FRAP

Metode FRAP adalah salah satu metode yang digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan. Metode ini dapat menentukan kadar antioksidan total dari

suatu bahan berdasarkan kemampuan senyawa antioksidan untuk mereduksi ion Fe^{3+} menjadi Fe^{2+} sehingga kekuatan antioksidan suatu senyawa dianalogikan dengan kemampuan mereduksi dari senyawa tersebut (Maryam, dkk. 2015).

Prinsip dari uji FRAP adalah reaksi transfer electron dari antioksidan ke senyawa Fe^{3+} - TPTZ. Senyawa Fe^{3+} - TPTZ sendiri mewakili senyawa oksidator yang mungkin terdapat dalam tubuh dan dapat merusak sel-sel. Kelebihan metode FRAP ini yaitu metodenya murah, reagensinya mudah disiapkan, cukup sederhana dan cepat (Maryam, dkk. 2015).

d. Metode ORAC

Metode ORAC menggunakan senyawa radikal peroksil yang dihasilkan melalui larutan cair dari 2,2-azobis-2-metil-propanimidamida. Antioksidan akan bereaksi dengan radikal peroksil dan menghambat degradasi pendaran zat warna. Kelebihan metode pengujian ORAC adalah kemampuannya dalam menguji antioksidan hipofilik dan lipofilik sehingga akan menghasilkan pengukuran lebih baik terhadap total aktivitas antioksidan. Kelemahan dari metode ini adalah membutuhkan peralatan yang mahal dan hanya sensitive terhadap penghambatan radikal peroksil (Kurniasih, dkk. 2015).

e. Metode CUPRAC

Metode CUPRAC juga merupakan salah satu pengujian antioksidan untuk melihat daya antioksidan dari senyawa-senyawa polifenol dan vitamin E yang dikenal mudah untuk dilakukan dan berbiaya rendah. Metode ini menggunakan reagen *copper(II)-neocuproine* (Cu(II)-Nc). Metode ini dapat juga digunakan

untuk mengetahui kapasitas antioksidan senyawa-senyawa fenolik (Nugraha, dkk. 2017).

Antioksidan standar atau ekstrak dicampur dengan CuSO_4 dan neocuproine. Setelah 30 menit, absorbansi diukur pada 450nm. Dalam pengujian, Cu (II) direduksi menjadi Cu (I) melalui aksi antioksidan penyumbang elektron. Hasilnya dinyatakan dalam miligram Trolox per liter ekstrak.

D. Uraian DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl*)

Metode DPPH merupakan salah satu pengujian untuk menentukan aktivitas antioksidan dalam sampel dengan melihat kemampuannya dalam menangkal radikal bebas DPPH. Metode DPPH dipilih karena pengujiannya sederhana, mudah, cepat, peka dan hanya memerlukan sedikit sampel. Kemampuan penangkapan radikal berhubungan dengan kemampuan komponen senyawa dalam menyumbangkan elektron atau hidrogen. Setiap molekul yang dapat menyumbangkan elektron atau hidrogen akan bereaksi dan akan memudarkan DPPH (Kurniasih, dkk. 2015).

Metode DPPH merupakan metode pengujian dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Penggunaan metode spektroskopi ini sudah divalidasi dengan pengukuran beberapa antiradikal bebas yang umum seperti tokoferol, vitamin C, pinocembrin, dan skualen yang memberikan hasil yang signifikan dengan uji antiradikal bebas yang lain. Keaktifan dari golongan senyawa-senyawa yang berfungsi sebagai antiradikal bebas ditentukan oleh gugus fungsi $-\text{OH}$ (hidroksil) bebas dan ikatan rangkap karbon-karbon seperti flavon, skualen, tokoferol, β -karoten, vitamin C dan lain-lain (Parwata. 2016).

DPPH merupakan radikal bebas yang stabil dan tidak membentuk dimer akibat delokalisasi dari elektron bebas pada seluruh molekul. Delokalisasi elektron bebas ini juga mengakibatkan terbentuknya warna ungu pada larutan DPPH, sehingga bisa diukur absorbansinya pada panjang gelombang (λ) sekitar 517 nm. Ketika larutan DPPH dicampur dengan senyawa yang dapat mendonorkan atom hidrogen, maka warna ungu dari larutan akan hilang seiring dengan tereduksinya DPPH (Parwata. 2016).

E. Sediaan Krim

Bentuk sediaan setengah padat (semi solid) secara umum dideskripsikan sebagai bentuk sediaan obat yang tak termasuk dalam sediaan cair dan sediaan padat. Sediaan semi padat umumnya mengandung minyak/lemak dan air dengan penggunaan terbesar sebagai obat luar/lokal. Sediaan semi solid biasanya dikemas dalam wadah seperti pot salep atau tube dan terkadang dimasukkan dalam botol pendek dengan mulut botol cukup lebar (Lazuardi. 2020).

Menurut pembagian bentuknya, sediaan semi padat dibagi menjadi beberapa tipe, antara lain salep, krim, gel (jelly) dan pasta. Contoh sediaan semi padat yaitu balsam, salep mata, krim wajah, gel rambut dan pasta gigi (Sarasmita. 2020).

Sediaan topikal dengan bentuk krim lebih disukai karena banyak keuntungannya, diantaranya yaitu sederhana dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan, mudah dicuci, bentuknya menarik serta menimbulkan rasa nyaman bagi pengguna. Krim merupakan salah satu sediaan emulsi setengah padat dengan kandungan air tidak kurang dari 60% serta dimaksudkan untuk pemakaian luar.

Syarat-syarat dasar krim yang baik dan ideal adalah stabil, lunak dan homogen, mudah digunakan, cocok dengan zat aktif, bahan obat dapat terbagi halus dan terdistribusi merata dalam dasar krim (Amaliah dan Rimadani. 2017).

Tipe krim ada 2, yaitu:

1. Tipe M/A atau O/W

Vanishing cream adalah kosmetika yang digunakan untuk maksud membersihkan, melembabkan dan sebagai alas bedak. Krim m/a (*vanishing cream*) yang digunakan melalui kulit akan hilang tanpa bekas. Pembuatan krim m/a sering menggunakan zat pengemulsi campuran dari surfaktan (jenis lemak yang ampifil) yang umumnya merupakan rantai panjang alkohol walaupun untuk beberapa sediaan kosmetik pemakaian asam lemak lebih populer. Contoh: *vanishing cream* sebagai pelembab (*moisturizing*) meninggalkan lapisan berminyak/film pada kulit (Elmitra. 2017).

2. Tipe A/M atau W/O

Krim berminyak mengandung zat pengemulsi A/M yang spesifik seperti *adepts lanae*, wool alkohol atau ester asam lemak dengan atau garam dari asam lemak dengan logam bervalensi 2, misal Ca. Krim A/M dan M/A membutuhkan emulgator yang berbeda-beda. Jika emulgator tidak tepat, dapat terjadi pembalikan fasa. Contoh *cold cream*. *Cold cream* adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk maksud memberikan rasa dingin dan nyaman pada kulit, sebagai krim pembersih berwarna putih dan bebas butiran. *Cold cream* mengandung mineral oil yang cukup besar (Elmitra. 2017).

F. Komposisi sediaan krim

Bahan-bahan penyusun krim umumnya yaitu, zat aktif atau bahan yang dapat memberikan khasiat, fase minyak yang berupa bahan obat yang larut dalam minyak dan bersifat asam, fase air yang berupa bahan obat yang larut dalam air dan bersifat basa, dan bahan pengemulsi yang digunakan dalam sediaan krim disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang akan dibuat/dikehendaki. Sebagai bahan pengemulsi dapat digunakan emulgide, lemak bulu domba, setaseum, setil alkohol, stearyl alkohol, trietanolamin stearate, polisorbat dan PEG (Elmitra. 2017).

Bahan-bahan tambahan dalam sediaan krim yaitu, zat untuk memperbaiki konsistensi sediaan krim, zat pengawet untuk meningkatkan stabilitas sediaan dengan mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme, pelembab/humektan dimaksudkan untuk meningkatkan hidrasi kulit, antioksidan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketengikan akibat oksidasi oleh cahaya pada minyak tidak jenuh yang sifatnya autooksidasi, dan peningkat penetrasi dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah zat yang terpenetrasi agar dapat digunakan untuk tujuan pengobatan sistemik lewat dermal (kulit) (Elmitra. 2017).

Adapun bahan yang digunakan oleh peneliti dalam formulasi yaitu:

1. Zat aktif

Zat aktif yang digunakan oleh peneliti yaitu ekstrak etanol dari daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis). Hasil uji skrining fitokimia ekstrak etanol daun Binahong ditemukan senyawa polifenol, flavonoid, saponin, alkaloid dan monopolisakarida termasuk D-Galaktose, D-glukosa dan lain-lain (Anwar dan

Tri. 2016). Kandungan kimia flavonoid dan lain-lain yang terdapat dalam daun Binahong membuatnya dapat bersifat sebagai anti-bakteri, anti-inflamasi, anti virus, kardioprotektif, anti-diabetes, anti kanker, anti penuaan dini dan antioksidan (Arifin dan Sanusi. 2018).

2. Asam stearat dan TEA

Asam stearat dan TEA umum digunakan pada formulasi sediaan farmasi seperti formulasi kosmetik. Pada formulasi kosmetik, asam stearat dan TEA biasa digunakan sebagai bahan pengemulsi. Asam stearat biasa digunakan dalam range 1-20% dan merupakan bahan untuk fase minyak sedangkan TEA digunakan dalam range 0,1-0,5% dan merupakan bahan pada fase air (Elmitra. 2017).

3. Setil alkohol

Setil alkohol secara luas digunakan dalam formulasi kosmetik sebagai bahan pengemulsi dan emolien karena dapat memperbaiki tekstur sediaan. Range yang biasa digunakan sebagai bahan emolien adalah 2-5%. Setil alkohol merupakan bahan untuk fase minyak (Elmitra 2017).

4. Gliserin

Gliserin sering digunakan pada berbagai formulasi sediaan farmasi umumnya formulasi kosmetik. Gliserin biasa digunakan sebagai bahan humektan dengan range $\leq 30\%$. Pelembab atau humektan ditambahkan dalam sediaan topikal dimaksudkan untuk meningkatkan hidrasi kulit. Hidrasi pada kulit menyebabkan jaringan menjadi lunak, mengembang dan tidak berkeriput sehingga penetrasi zat akan lebih efektif. Gliserin merupakan bahan untuk fase air (Elmitra. 2017).

5. Span 80 dan Tween 80

Span 80 dan Tween 80 merupakan emulgator non ionik, bersifat tidak toksik, tidak iritatif, memiliki potensi rendah menyebabkan hipersensitivitas dan stabil terhadap asam lemah dan basa lemah. Span dapat digunakan sendiri sebagai emulgator dan dapat juga dikombinasikan dengan Tween, begitupun sebaliknya. Untuk rangenya masing jika digunakan untuk dosis tunggal yaitu 1-15% sedangkan untuk kombinasi 1-10%. Span merupakan bahan untuk fase minyak dan Tween bahan untuk fase air (Elmitra. 2017).

6. Metil Paraben dan Propil Paraben

Metil dan Propil Paraben merupakan pengawet yang umum digunakan dalam formulasi sediaan farmasi. Pengawet yang dimaksud adalah zat yang ditambahkan dan dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas sediaan dengan mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme, karena pada sediaan krim mengandung fase air dan lemak maka pada sediaan ini mudah ditumbuhi bakteri dan jamur. Oleh karena itu, perlu penambahan zat yang dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Range yang biasa digunakan untuk kombinasi propil dan metil paraben adalah 0,02%-0,18%. Propil paraben merupakan fase minyak dan metil paraben merupakan fase air (Elmitra. 2017).

G. Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan cair, kental atau kering yang merupakan hasil proses ekstraksi atau penyarian suatu matriks atau simplisia menurut cara yang sesuai. Beberapa jenis ekstrak yang umumnya diketahui antara lain (Nasyanka, dkk. 2020) :

1. Ekstrak cair : Ekstrak yang diperoleh dari ekstraksi yang masih mengandung sebagian besar cairan penyari
2. Ekstrak kental : Ekstrak yang diperoleh apabila sebagian besar cairan penyari sudah diuapkan
3. Ekstrak kering : Ekstrak yang diperoleh jika sudah tidak mengandung pelarut/ cairan penyari
4. Tingtur (*Tinctura*) : Sediaan cair yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi suatu simplisia dengan pelarut yang tertera pada masing-masing monografi

Ekstraksi merupakan salah satu teknik pemisahan kimia untuk memisahkan atau menarik satu atau lebih komponen senyawa-senyawa (analit) dari suatu sampel dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai. Ekstraksi bertujuan untuk menarik komponen kimia yang ada dalam bahan alam (Leba, 2017).

Prinsip ekstraksi adalah pelarut akan masuk ke dalam sel dan melarutkan senyawa aktif yang ada dalam sel sampel, sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara senyawa terlarut di dalam dan di luar sel. Pelarut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi. Berdasarkan sifat kepolarannya, pelarut digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu polar (seperti asam asetat dan etanol), semi polar (seperti aseton dan DMSO) dan non polar (seperti heksana dan toluene). Sedangkan, berdasarkan fungsinya, pelarut digolongkan menjadi 5 macam yaitu, true solvent, diluent, latent, paint remover dan media reaksi (Nasyanka, dkk. 2020).

Pembagian metode ekstraksi cukup beragam, salah satunya metode ekstraksi berdasarkan suhu dapat dibedakan menjadi, sebagai berikut:

a. Cara dingin

1. Maserasi

Maserasi merupakan salah satu jenis ekstraksi padat cair yang paling sederhana. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara merendam sampel pada suhu kamar menggunakan pelarut yang sesuai sehingga dapat melarutkan analit dalam sampel. Sampel biasanya direndam selama 3-5 hari sambil di aduk sesekali untuk mempercepat proses pelarutan analit. Ekstraksi dilakukan berulang kali sehingga analit terekstraksi secara sempurna. Indikasi bahwa semua analit telah terekstraksi secara sempurna adalah pelarut yang digunakan sudah tidak berwarna (Leba. 2017).

Kelebihan ekstraksi ini adalah alat dan cara yang digunakan sangat sederhana, dapat digunakan untuk analit baik yang tahan terhadap pemanasan maupun yang tidak tahan terhadap pemanasan. Kelemahannya adalah menggunakan banyak pelarut (Leba. 2017).

2. Perkolasi

Perkolasi merupakan salah satu jenis ekstraksi yang dilakukan dengan jalan mengalirkan pelarut secara perlahan pada sampel dalam suatu percolator. Pada ekstraksi jenis ini, pelarut ditambahkan secara terus-menerus, sehingga proses ekstraksi selalu dilakukan dengan pelarut yang baru. Pola penambahan pelarut yang dilakukan adalah menggunakan pola penetesan pelarut dari bejana

terpisah disesuaikan dengan jumlah pelarut yang keluar atau dilakukan dengan penambahan pelarut dalam jumlah besar secara berkala (Leba. 2017).

b. Cara panas

1. Refluks

Metode ekstraksi refluks merupakan suatu metode yang sering digunakan untuk mendapatkan suatu senyawa pada tumbuhan dengan penguapan suhu tinggi (Vifta, 2017). Mekanisme kerja dari ekstraksi refluks yaitu pelarut yang digunakan akan menguap pada suhu yang digunakan, tetapi akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung (Utami, dkk. 2020).

2. Sokletasi

Sokletasi merupakan salah satu jenis ekstraksi yang menggunakan alat soklet. Pada ekstraksi ini pelarut dan sampel ditempatkan secara terpisah. Prinsipnya adalah ekstraksi dilakukan secara terus menerus menggunakan pelarut yang relatif sedikit. Bila ekstraksi telah selesai maka pelarut dapat diuapkan sehingga akan diperoleh ekstrak. Biasanya pelarut yang digunakan adalah pelarut-pelarut yang mudah menguap atau mempunyai titik didih yang rendah (Leba. 2017).

Sokletasi dilakukan dengan cara pemanasan pelarut. Uap pelarut yang dihasilkan mengalami pendinginan dalam kondensor dan secara kontinyu akan membasahi sampel dan secara teratur pelarut tersebut dimasukkan kembali ke dalam labu dengan membawa analit. Proses ini berlangsung kontinyu. Pelarut

yang digunakan dapat diuapkan kembali dan dipisahkan dari analit. Sokletasi dapat dihentikan dengan cara menghentikan pemanasan (Leba. 2017).

3. Digesti

Digesti adalah maserasi dengan pengadukan kontinyu pada temperature yang lebih tinggi dari temperatur kamar yaitu pada suhu 40-50°C (Hasrianti, dkk. 2016).

4. Infus

Infus adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperature penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 90°C) selama 15 menit (Hasrianti, dkk. 2016).

5. Dekok

Dekok adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur 90°C selama 30 menit (Hasrianti, dkk. 2016).

H. Spektrofotometri UV-Vis

Spektrofotometer adalah sebuah instrument penting dalam analisis kimia. Instrumen ini digunakan untuk menguji sampel tertentu yang berorientasi pada pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu, instrument ini penting digunakan pada sektor pendidikan, penelitian maupun industri. Pada sektor pendidikan, alat ini sebagai media pendidikan untuk meningkatkan pemahaman siswa pada pengenalan alat dan praktikum. Pada sektor penelitian berperan dalam menguji analisis senyawa secara kuantitatif dan kualitatif pada sampel. Pada sektor industry alat ini berperan untuk menentukan kadar bahan yang digunakan

pada industri pewarna makanan dan analisis kadar senyawa pada limbah yang dihasilkan (Yohan, dkk. 2018).

Spektrofotometri merupakan salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmittan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Spektrofotometer merupakan gabungan dari alat optik dan elektronika serta sifat-sifat kimia fisiknya. Dimana detector dapat mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan secara tidak langsung cahaya yang di absorpsi. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa atau warna yang terbentuk (Sembiring, dkk. 2019).

Spektrofotometer UV-Vis merupakan gabungan antara prinsip spektrofotometri UV dan Visible. Alat ini menggunakan dua buah sumber cahaya yang berbeda, yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya Visible. Larutan yang dianalisis diukur serapan sinar ultra violet atau sinar tampaknya. Konsentrasi larutan yang dianalisis akan sebanding dengan jumlah sinar yang diserap oleh zat yang terdapat dalam larutan tersebut (Sembiring, dkk. 2019).

Spektrofotometri UV-Vis mengacu pada hukum Lambert-Beer. Apabila cahaya monokromatik melalui suatu media (larutan), maka sebagian cahaya tersebut akan diserap, sebagian dipantulkan dan sebagian lagi akan dipancarkan. Sinar dari sumber cahaya akan dibagi menjadi dua berkas oleh cermin yang berputar pada bagian dalam spektrofotometer. Berkas pertama akan melewati

kuvet berisi blanko, sementara berkas kedua akan melewati kuvet berisi sampel. Blanko dan sampel akan diperiksa secara bersamaan. Blanko berguna untuk menstabilkan absorpsi akibat perubahan voltase dari sumber cahaya (Sembiring, dkk. 2019).

Adapun komponen-komponen spektrofotometer UV-Vis antara lain:

1. Sumber cahaya

Sumber cahaya pada spektrofotometer harus memiliki pancaran radiasi yang stabil dan intensitasnya tinggi. Sumber cahaya pada spektrofotometer UV-Vis ada dua macam (Sembiring, dkk. 2019) :

a. *Lampu Tungsten (Wolfram)*

Lampu ini digunakan untuk mengukur sampel pada daerah tampak. Bentuk lampu ini mirip dengan bola lampu pijar biasa. Memiliki panjang gelombang antara 350-2200 nm. Spektrum radiasinya berupa garis lengkung. Umumnya memiliki waktu 1000 jam pemakaian.

b. *Lampu Deuterium*

Lampu ini dipakai pada panjang gelombang 190-380 nm. Spektrum energi radiasinya lurus dan digunakan untuk mengukur sampel yang terletak pada daerah UV. Memiliki waktu 500 jam pemakaian

2. Monokromator

Monokromator adalah alat yang akan memecah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal (monokromatis) dengan komponen panjang gelombang tertentu. Bagian-bagian monokromator, yaitu (Sembiring, dkk. 2019) :

a. *Prisma*

Prisma akan mendeskripsikan radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis.

b. *Grating (kisi difraksi)*

Kisi difraksi memberi keuntungan lebih bagi proses spektroskopi. Dispersi sinar akan disebarkan merata, dengan pendispersi yang sama, hasil disperse akan lebih baik. Selain itu, kisi difraksi dapat digunakan dalam seluruh jangkauan spektrum

c. *Celah optis*

Celah ini digunakan untuk mengarahkan sinar monokromatis yang diharapkan dari sumber radiasi. Apabila celah berada pada posisi yang tepat, maka radiasi akan dirotasikan melalui prisma, sehingga diperoleh panjang gelombang yang diharapkan.

d. *Filter*

Filter berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya diteruskan merupakan cahaya berwarna yang sesuai dengan panjang gelombang yang dipilih.

3. *Kompartemen sampel*

Kompartemen ini digunakan sebagai tempat diletakkannya kuvet. Kuvet merupakan wadah yang digunakan untuk menaruh sampel yang akan dianalisis. Pada spektrofotometer double beam, terdapat dua tempat kuvet. Satu kuvet digunakan sebagai tempat menaruh sampel, sementara kuvet lain digunakan untuk menaruh blanko. Sementara pada spektrofotometer single beam hanya terdapat

satu kuvet. Terdapat berbagai jenis dan bentuk kuvet pada spektrofotometer. Umumnya pada pengukuran di daerah UV, digunakan kuvet yang terbuat dari bahan kuarsa atau plexiglass. Kuvet kaca tidak dapat mengabsorpsi sinar UV, sehingga tidak digunakan pada saat pengukuran di daerah UV. Oleh karena itu, bahan kuvet dipilih berdasarkan panjang gelombang yang digunakan, bertujuan untuk dapat melewati daerah panjang gelombang yang digunakan (Sembiring, dkk. 2019).

4. Detektor


Detektor berfungsi untuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Ada dua macam detektor yang biasa digunakan, yaitu phototube dengan jangkauan panjang gelombang (λ) 150-1000 nm dan photomultiplier dengan jangkauan panjang gelombang (λ) 150-1000 nm. Adapun syarat-syarat sebuah detektor, yaitu memiliki kepekaan yang tinggi, perbandingan isyarat atau signal dengan bising tinggi, respon konstan pada berbagai panjang gelombang, waktu respon an signal minimum tanpa radiasi dan signal listrik yang dihasilkan harus sebanding dengan tenaga radiasi (Suarsa. 2015).

I. Kulit

Kulit merupakan organ tubuh terluas, berat total berkisar 2,7-3,6 kg dan menerima sepertiga dari volume darah tubuh, ketebalan kulit bervariasi antara 0,5-6,0 mm, terdiri dari sel-sel dan matriks ekstraselular. Kulit manusia mempunyai banyak fungsi yang penting terutama sebagai pertahanan garis depan, melindungi tubuh dari berbagai elemen yang berasal dari lingkungan luar tubuh. Kulit juga

dapat menjadi faktor penting dalam kesehatan mental dan kondisi social manusia (Sayogo, dkk. 2017).

Struktur kulit terdiri dari 3 lapisan, epidermis merupakan lapisan terluar kulit dan tipis, dermis merupakan lapisan tebal dan terletak di dalam, lapisan di bawah dermis terdapat jaringan lemak subkutan (hipodermis). Jaringan hipodermis merupakan jaringan ikat longgar yang melekat di bawah dermis (Sayogo, dkk. 2017).



Gambar 2. Struktur kulit (Sayogo, dkk. 2017)

1. Epidermis

Fungsi epidermis sebagai pertahanan tubuh terluar terhadap lingkungan luar tubuh. Suasana asam pada kulit melindungi kulit dari mikroorganisme. Lapisan keratin yang keras melindungi tubuh dari invasi mikroorganisme dan infeksi juga menjaga kelembaban. Sel Langerhans membentuk reseptor pengenalan baik terhadap mikroorganisme, virus bahkan senyawa asing yang selanjutnya mengaktifkan sistem imunitas. Kemampuan tubuh mempertahankan kadar air penting untuk menjaga kesehatan kulit. Jumlah dan distribusi pigmen melanin yang memberikan keragaman warna pada kulit manusia. Vitamin D

disintesis di epidermis dengan bantuan sinar ultraviolet, sintesis ini dilakukan oleh keratinosit yang terletak pada *stratum basale* dan *stratum spinosum* dari epidermis (Sayogo, dkk. 2017).

2. Dermis

Dermis merupakan “rumah” dari komponen tambahan epidermis. Di dermis terdapat sel-sel imun yang berfungsi melawan infeksi yang masuk ke dalam kulit. Dermis menyediakan suplai darah, nutrisi dan oksigen pada dirinya sendiri dan juga epidermis. Dermis juga mempunyai fungsi pengaturan suhu kulit melalui pembuluh darah superfisial dan reseptor saraf berfungsi untuk sensasi rasa raba (Sayogo, dkk. 2017).

3. Hipodermis

Jaringan hipodermis atau subkutan merupakan lapisan yang terdiri dari lemak dan jaringan ikat yang kaya akan pembuluh darah dan saraf. Lapisan ini penting dalam pengaturan suhu kulit dan tubuh (Sayogo, dkk. 2017).

J. Tinjauan Islam Mengenai Riset Dan Pengobatan

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki fungsi sehingga dihamparkan di bumi. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia memanfaatkan keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan. Untuk mengetahui fungsi dari keanekaragaman tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan disiplin ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Syu'arā/26: 7-8:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik? (7)”. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman (8)” (Kemenag RI. 2012).

Kaum musyrikin enggan percaya, bahkan memperolok-olokkan, ayat-ayat Allah, sebagaimana diuraikan ayat-ayat yang lalu. Mereka enggan percaya karena bersikap keras kepala. Di sini keadaan mereka dipertanyakan, yakni adakah mereka akan terus mempertahankan kekufuran mereka padahal telah sekian banyak bukti dipaparkan dan terhampar? Apakah mereka enggan memerhatikan gugusan bintang di langit *dan apakah mereka tidak melihat ke bumi*, yakni mengarahkan pandangan sepanjang, seluas dan seantero bumi, *berapa banyak Kami telah tumbuhkan di sana dari setiap pasang tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya yang kesemuanya tumbuh subur lagi bermanfaat? Sesungguhnya pada yang demikian itu hebatnya benar-benar terdapat suatu ayat*, yakni tanda yang membuktikan adanya Pencipta Yang Maha Esa serta membuktikan pula kuasa-Nya menghidupkan dan membangkitkan siapa yang telah mati. Sayang, mereka enggan memerhatikan sehingga mereka tidak menemukan tanda itu *dan tidaklah kebanyakan mereka akan termasuk orang-orang mukmin. Dan*, yakni padahal, *sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dia-lah Yang Mahaperkasa Yang tidak terkalahkan kehendak-Nya, bahkan dapat memaksakannya, lagi Maha*

Penyayang sehingga menghadirkan bukti itu dan melimpahkan aneka rahmat-Nya.

Kata (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ) *ilá/ke* pada firman-Nya di awal ayat ini: *awalam yará ilá al-ard/apakah mereka tidak melihat ke bumi* merupakan kata yang mengandung makna *batas akhir*. Ia berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir. Dengan demikian, ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya (Shihab Vo. 9: 187-188).

Kata (زَوْجٍ) *zauj* berarti *pasangan*. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan karena tumbuhan muncul di celah-celah tanah yang terhampar di bumi. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga menyatu dalam diri pasangannya dan dalam penyerbukannya ia membutuhkan pejantan dari bunga lain dan ada juga yang hanya memiliki salah satunya saja sehingga membutuhkan pasangannya. Yang jelas, setiap tumbuhan memiliki pasangannya dan itu dapat terlihat kapan saja bagi siapa yang ingin menggunakan matanya. Karena itu, ayat di atas memulai dengan pertanyaan *apakah mereka tidak melihat*, pertanyaan yang mengandung unsur keheranan terhadap mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang sangat jelas itu, juga memberitahukan manusia untuk menjadikan penelitian atau riset terhadap tumbuhan.

Salah satu lagi ayat yang menjelaskan mengenai kekuasaan Allah swt dalam menciptakan segala sesuatunya ialah QS. Tāhā/20 : 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
أَنْزُوجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kemenag RI. 2012).

Pada redaksi ayat-ayat di atas terdapat kata *Kami* yang konteks uraiannya tidak mungkin diucapkan kecuali oleh Allah SWT. Ayat-ayat di atas menyatakan: *Dia*, yakni Allah, *Yang telah menjadikan bagi kamu*, wahai Fir’aun dan seluruh manusia, sebagian besar *bumi sebagai hamparan* dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi *dan Dia*, yakni Tuhan itu juga, *Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air*, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, *maka Kami tumbuhkan dengannya*, yakni dengan perantaraan hujan itu, *berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam* jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya (Shihab Vol.7: 604-605).

Thabáthabá’I menghubungkan ayat ini dengan akhir ayat yang lalu, yang menegaskan bahwa, “Allah SWT. memberikan kepada setiap sesuatu bentuk kejadiannya”, kemudian memberinya petunjuk serta mengaitkannya pula dengan jawaban Nabi Músá as. tentang keluasan ilmu Allah. Ulama itu menulis bahwa Allah swt. menempatkan manusia di bumi dengan menghamparkannya agar

mereka dapat menikmati hidup dan berbekal guna kehidupan akhiratnya, serupa dengan bayi yang ditempatkan dalam buaian dan dididik guna meraih kehidupan yang lebih mulia dan tinggi. Allah menjadikan manusia di bumi ini agar ia menyadari bahwa ada jarak antara ia dan tujuan hidupnya. Ada jalan yang harus ditempuhnya guna mencapai tujuan hidup itu, yakni pendekatan diri kepada Allah dan upaya masuk ke hadirat-Nya, sebagaimana halnya ia menempuh jalan-jalan di permukaan bumi ini untuk mencapai arah yang ditujunya. Allah menurunkan air dari bumi ini untuk mencapai arah yang ditujunya. Allah menurunkan air dari langit berupa hujan dan juga mata-mata air dan sungai-sungai serta lautan, lalu ditumbuhkan dari air itu aneka macam dan jenis tumbuhan lalu Allah swt. memberi hidayah kepada manusia untuk memakannya dan itu semua merupakan ayat-ayat, yakni, tanda-tanda tentang hidayah dan *rubúbiyyahl* Ketuhanan dan Pemeliharaan Allah swt. Hal-hal tersebut harus dicamkan oleh kaum yang berakal. Dengan demikian-tulis Thabáthabá'i lebih jauh-firman-Nya: *Dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan* adalah isyarat bahwa keberadaan manusia di pentas bumi dalam rangka kehidupannya adalah bagian dari hidayah Allah; firman-Nya: *Menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan* adalah isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh manusia di bumi guna meraih tujuannya juga adalah bagian dari hidayah-Nya. Selanjutnya, firman-Nya bahwa: *Dia menurunkan dari langit air, maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam* juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia

memberi hidayah kepada langit guna menurunkan hujan, dan hidayah buat hujan agar turun tercurah dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang. Dengan lebih kurang pandangan Thabáthabá'I (Shihab Vol.7: 606)

Redaksi firman-Nya (أَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ) *akhrajná bihi azwájan min nabátin syattá* / maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam beralih menjadi persona pertama (*Kami*) sedang sebelumnya adalah persona ketiga (*Dia*) dalam firman-Nya: الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا *alladzi ja'ala lakum al-ard mahdan*/Dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan. Pengalihan bentuk redaksi tersebut bertujuan mengisyaratkan bahwa penumbuhan aneka tumbuhan dengan bermacam-macam jenis bentuk dan rasanya itu merupakan hal-hal yang sungguh menakjubkan lagi membuktikan betapa agung Penciptanya. Pengalihan redaksi itu juga bertujuan mengundang perhatian pendengar dan mitra bicara agar mengarahkan pandangan dan pikirannya kepada hal-hal yang disebut itu. Gaya bahasa semacam ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan dalam konteks uraian yang sama. Bacalah misalnya QS. Al-An'ám [6]: 99, Fátírh [35]: 27, Naml [27]: 60 dan lain-lain.

Kata (أَزْوَاجًا) *azwáj* yang menguraikan aneka tumbuhan dapat dipahami dalam arti *jenis-jenis tumbuhan*, katakanlah seperti tumbuhan berkeping dua (dikotil) semacam kacang-kacangan, atau tumbuhan berkeping satu (monokotil) seperti pisang, nanas, palem dan lain-lain. Dalam hal ini salah satunya yang dimaksud adalah daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis.) yang berkhasiat sebagai antioksidan dalam sediaan krim.

Adapun juga menurut peneliti maksud dari QS. Asy-Syu'arā ayat 7 di atas pada kata “memperhatikan” adalah sama artinya dengan “meneliti” artinya banyak manusia yang tidak memanfaatkan tumbuh-tumbuhan untuk diteliti dan dicari manfaatnya atau kegunaannya. Pada QS. Tāhā ayat 53 pada terjemahan “Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” maksudnya Allah SWT telah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan namun banyak manusia yang tidak memanfaatkannya dengan baik, sementara itu, jika manusia dapat memanfaatkannya dengan baik maka perbuatannya itu dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala.

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh H.R Bukhari Nomor 5246:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula (H.R. Bukhari Nomor 5246).

Hadits di atas menjelaskan mengenai setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah, dengan-Nya pasti diturunkan pula penawarnya. Jadi, segala penyakit yang diberikan oleh Allah pastilah ada obatnya, salah satu obat yang ditemukan adalah daun Binahong dan atas izin Allah akan diberikan kesembuhan.

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh H.R. Thabrani:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan”

Allah Ta'ala menyukai keindahan dari makhluk-makhluk-Nya dalam segala bentuk. Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang memakai baju yang indah, memakai sepatu yang indah dan bersih. Allah menyukai keindahan dalam segala hal. Berpenampilan indah yang dicintai oleh Allah adalah yang sesuai dengan syariat, bukan penampilan yang dianggap indah dan bertentangan dengan syariat.

Dalam hal ini, salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat adalah daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) yang berkhasiat sebagai antioksidan yang diformulasikan dalam bentuk sediaan krim. Antioksidan dapat dimanfaatkan dalam berbagai jenis penyakit dan untuk krim antioksidan biasanya digunakan untuk mencegah kerutan pada wajah sebagai bagian dari menjaga kecantikan diri karena Allah itu indah dan menyukai keindahan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi eksperimental kuantitatif

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan dalam laboratorium Fitokimia Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk melaksanakan proses pengolahan sampel daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) sampai didapatkan ekstrak etanol dari tanaman daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) dan laboratorium Farmasetika Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk melakukan formulasi sediaan krim antioksidan

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode eksperimental. Metode eksperimental merupakan metode penelitian yang ingin mengetahui hubungan sebab-akibat antara suatu variabel dengan variabel lainnya.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Tanaman Binahong (*Anredera cordifolio* (Ten.) Steenis) yang diambil dari Jl. Romang polong dekat pemukiman warga.

2. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel dari bahan alam yaitu daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis.).

D. Instrumen Penelitian

1. Alat yang digunakan

Alat-alat gelas, cawan porselin, rotavapor, seperangkat alat maserasi, spektrofotometer UV-Vis, timbangan analitik dan wadah krim.

2. Bahan yang digunakan

Air suling, aluminium foil, Asam stearat, DPPH, ekstrak etanol daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis), etanol 70%, gliserin, metil paraben, Oleum rosae, propil paraben, span 80, setil alkohol, trietanolamin, tween 80, vitamin C.

E. Prosedur pengolahan dan analisis data

1. Pengambilan sampel

Sampel daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) diambil dari daerah Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pukul 09.00 WITA. Daun yang digunakan adalah seluruh daun yang tidak rusak, tidak berjamur dan tidak berwarna kuning atau terlalu tua.

2. Pengolahan sampel

Sampel yang telah diambil dan masih dalam kondisi segar kemudian disortasi basah untuk memisahkan sampel dari kotoran-kotoran, kerikil, rumput-rumputan, tanah, bagian tanaman yang rusak dan bagian tanaman lainnya. Setelah disortasi sampel dicuci dengan air sampai bersih. Setelah itu sampel dirajang

Oleum rosae	q.s	q.s	q.s	q.s	q.s	Pengaroma
Aquadest ad	100	100	100	100	100	Pelarut

5. Pembuatan sediaan krim

Fase minyak dibuat dengan cara meleburkan asam stearat, setil alkohol, span 80 dan propil paraben secara berturut-turut dalam cawan porselen di atas penangas air hingga suhu 70°C sambil diaduk hingga homogen.

Fase air dibuat dengan cara memanaskan air hingga 70°C, ditambahkan metil paraben sambil diaduk hingga melarut sempurna. Setelah itu ditambahkan gliserin, tween 80 dan trietanolamin, kemudian diaduk hingga homogen. Selanjutnya, fase minyak dituang ke dalam fase air dalam mortir panas, digerus sampai suhu 25°C dan terbentuk massa krim. Tambahkan ekstrak daun binahong dalam krim dan teteskan oleum rosae, digerus sampai homogen, lalu masukkan krim ke dalam pot plastik.

6. Pembuatan larutan baku DPPH

Sebanyak 10 mg serbuk DPPH dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dilarutkan dengan etanol p.a sebagai larutan stock. Dibuat 5 variasi konsentrasi ppm. Untuk konsentrasi 5 ppm, larutan DPPH dipipet sebanyak 0,5 ml dimasukkan dalam labu ukur 10 ml lalu dicukupkan dengan etanol p.a. Hal yang sama dilakukan untuk masing-masing konsentrasi 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm dan 25 ppm. Kemudian diamati absorbansinya pada spektrofotometer.

7. Penentuan panjang gelombang maksimum DPPH

Sebanyak 10 mg DPPH ditimbang dan dilarutkan dengan etanol p.a dicukupkan hingga 100 ml. Kemudian diambil 3,5 ml larutan DPPH dan masukkan ke dalam labu ukur 10 ml dan dicukupkan dengan etanol p.a. lalu

diamkan selama 30 menit. Amati absorbansinya pada panjang gelombang 200-800 nm. Panjang gelombang yang memiliki nilai absorbansi paling besar ditetapkan sebagai panjang gelombang maksimum DPPH.

8. Pembuatan larutan uji aktivitas antioksidan

Larutan uji sediaan krim ditimbang sebanyak 2,5 gram dimasukkan ke dalam lumpang, tambahkan 5 ml etanol p.a lalu di sentrifugasi selama 10 menit, hasil sentrifugasi di saring dengan kertas saring hingga jernih. Hasil saringan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, tambahkan 2 ml larutan DPPH dan dicukupkan hingga 10 ml dengan etanol p.a, selanjutnya diinkubasi selama 30 menit. Dimasukkan ke dalam kuvet dan diukur absorbansinya menggunakan UV-Vis dengan panjang gelombang 328 nm. Dihitung % peredamannya menggunakan rumus:

% Peredaman Radikal DPPH

$$= \frac{\text{Absorbansi DPPH} - \text{Absorbansi Sampel}}{\text{Absorbansi DPPH}} \times 100\%$$

9. Uji sifat fisik sediaan krim

a. Evaluasi organoleptik

Evaluasi organoleptis meliputi pengamatan secara visual perubahan-perubahan bentuk, bau dan warna pada sediaan krim pada suhu kamar (25°C). Jika tidak mengalami perubahan bentuk, bau dan warna pada sediaan krim maka sediaan memenuhi syarat.

b. Evaluasi homogenitas

Krim diambil dari masing-masing formula secukupnya dan dioleskan pada plat kaca, diraba dan saat digosokkan massa krim harus menunjukkan susunan homogen yaitu tidak terasa adanya bahan padat pada kaca. Sediaan krim yang baik adalah yang semua bahannya tercampur dengan baik dan tidak terdapat partikel-partikel kasar.

c. Pengukuran pH

Pengukuran pH sediaan krim dilakukan menggunakan indikator universal, indikator universal dicelupkan ke dalam sediaan krim. Setelah tercelup dengan sempurna, amati perubahan warna pada indikator universal tersebut dan sesuaikan dengan spektrum warna pada alat. Nilai pH suatu sediaan topikal yang baik berkisar antara 4,5-6,5 yang sesuai dengan pH fisiologis kulit.

d. Uji daya sebar

Sebanyak 0,53 gram krim diletakkan di tengah kaca bulat, diatas krim diletakkan kaca bulat lain dan dibiarkan selama 1 menit lalu diukur diameter krim yang menyebar. Beban seberat 150 gram diletakkan di atas kaca bulat dan didiamkan selama 1 menit lalu diukur lagi diameter krim yang menyebar dari berbagai sisi. Daya sebar yang baik untuk sediaan topikal yaitu berkisar 5-7 cm.


e. Uji daya lekat

Krim diambil sebanyak 0,21 gram kemudian dioleskan pada sebuah plat kaca. Kedua plat ditempelkan sampai plat menyatu dan ditekan dengan beban seberat 1 kg selama 5 menit, setelah itu beban diambil. Waktu sampai kedua plat saling lepas dicatat, kemudian dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali untuk

masing-masing formula. Semakin lama suatu sediaan menempel pada kulit maka absorpsinya pada kulit akan semakin baik. Persyaratan daya lekat yang baik untuk sediaan topikal adalah lebih dari 4 detik.

f. Uji stabilitas sifat fisik sediaan krim

Uji stabilitas sifat fisik sediaan krim dilakukan dengan mengamati perubahan sifat fisik krim yang meliputi organoleptik (bentuk, warna dan bau), homogenitas, pH, daya sebar dan daya lekat selama penyimpanan 28 hari. Pengamatan uji stabilitas dilakukan setiap hari pada minggu pertama, selanjutnya pada hari ke 14, 21 dan 28 selama penyimpanan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil ekstrak etanol dari daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis)

Tabel 2. Berat ekstrak etanol daun Binahong

Sampel	Metode ekstraksi	Berat sampel (gram)	Berat ekstrak (gram)	Rendamen ekstrak (%)
Daun Binahong	Maserasi	500 gram	14,451 gram	28,9

2. Hasil Pengukuran Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 96% Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) dengan Metode DPPH

Tabel 3. Hasil perhitungan % Peredaman DPPH

Formula Krim	Konsentrasi (gram)	Absorbansi (Replikasi)			Absorbansi DPPH	% Peredaman
		1	2	3		
I	0,2	0,589	0,680	0,656	0,787	18,46%
II	0,4	0,310	0,250	0,299	0,787	63,61%
III	0,6	0,875	0,836	0,855	0,787	-8,68%
IV	-	1,060	1,029	1,136	0,787	-36,64%
V	0,05	0,312	0,277	0,311	0,787	61,87%

3. Hasil Evaluasi Sediaan Krim Antioksidan Ekstrak Etanol 96% Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) selama 4 minggu

Tabel 4. Hasil Pengamatan Organoleptis Krim Antioksidan Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis)

Penyimpanan	Bentuk / Tekstur	Warna	Bau
Formulasi I			
Minggu-1	Lembut dan tidak lengket	Putih kekuningan	Khas
Minggu-2	Lembut dan tidak lengket	Putih kekuningan	Khas
Minggu-3	Lembut dan tidak lengket	Putih kekuningan	Khas
Minggu-4	Lembut dan tidak lengket	Putih kekuningan	Khas
Formulasi 2			
Minggu-1	Lembut dan tidak lengket	Putih kekuningan	Khas
Minggu-2	Lembut dan tidak lengket	Putih kekuningan	Khas
Minggu-3	Lembut dan tidak lengket	Putih kekuningan	Khas
Minggu-4	Lembut dan tidak lengket	Putih kekuningan	Khas
Formulasi 3			
Minggu-1	Lembut dan tidak lengket	Kuning kecoklatan	Khas
Minggu-2	Lembut dan tidak lengket	Kuning kecoklatan	Khas
Minggu-3	Lembut dan tidak lengket	Kuning kecoklatan	Khas
Minggu-4	Lembut dan tidak lengket	Kuning kecoklatan	Khas
Formulasi 4			
Minggu-1	Lembut dan tidak lengket	Putih bersih	Khas
Minggu-2	Lembut dan tidak lengket	Putih bersih	Khas
Minggu-3	Lembut dan tidak lengket	Putih bersih	Khas
Minggu-4	Lembut dan tidak lengket	Putih bersih	Khas
Formulasi 5			
Minggu-1	Lembut dan tidak lengket	Putih	Khas
Minggu-2	Lembut dan tidak lengket	Putih	Khas
Minggu-3	Lembut dan tidak lengket	Putih	Khas
Minggu-4	Lembut dan tidak lengket	Putih	Khas

Tabel 5. Hasil Pengukuran pH Krim Antioksidan Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis).

Formulasi	Penyimpanan			
	Minggu-1	Minggu-2	Minggu-3	Minggu-4
F I	6,6	6,5	6,5	6,5
F II	6,3	6,2	6,5	6,6
F III	6,0	6,1	6,2	6,2
F IV	6,6	6,6	6,7	6,5
F V	4,7	5,2	4,9	4,8

Tabel 6. Hasil Pengukuran Daya Sebar Krim Antioksidan Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis).

Formulasi	Penyimpanan			
	Minggu-1	Minggu-2	Minggu-3	Minggu-4
F I	4 cm	4 cm	4,5 cm	4,5 cm
F II	4 cm	4,1 cm	4,2 cm	4,5 cm
F III	4,3 cm	4,3 cm	4,6 cm	4,6 cm
F IV	4,1 cm	4,1 cm	4,2 cm	4,9 cm
F V	4 cm	4 cm	3,5 cm	4,9 cm

Tabel 7. Hasil Pengamatan Homogenitas Krim Antioksidan Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis).

Formulasi	Penyimpanan			
	Minggu-1	Minggu-2	Minggu-3	Minggu-4
F I	Homogen	Homogen	Homogen	Homogen
F II	Homogen	Homogen	Homogen	Homogen
F III	Homogen	Homogen	Homogen	Homogen
F IV	Homogen	Homogen	Homogen	Homogen
F V	Homogen	Homogen	Homogen	Homogen

Tabel 8. Hasil Pengukuran Daya Lekat Krim Antioksidan Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis).

Formulasi	Penyimpanan			
	Minggu-1	Minggu-2	Minggu-3	Minggu-4
F I	> 5 detik	> 5 detik	> 5 detik	> 5 detik
F II	> 5 detik	> 5 detik	> 5 detik	> 5 detik
F III	> 5 detik	> 5 detik	> 5 detik	> 5 detik
F IV	> 5 detik	> 5 detik	> 5 detik	> 5 detik
F V	> 5 detik	> 5 detik	> 5 detik	> 5 detik

B. Pembahasan

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki fungsi sehingga dihamparkan dibumi. Salah satunya adalah keanekaragaman tumbuhan yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan. Seperti halnya daun Binahong pada dalam jurnal “Manfaat Daun Binahong (*Anredera cordifolia*) sebagai *Acne Vulgaris*” pada penelitian Anwar dan Sri tahun 2016 mengatakan bahwa hasil uji fitokimia menunjukkan ekstrak daun binahong terdapat senyawa polifenol, alkaloid dan flavonoid. Flavonoid mempunyai sifat anti-inflamasi, anti-

hepatotoksik, anti-tumor, anti-mikrobia dan anti-virus. Namun, kebanyakan flavonoid berperan sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Ekstrak etanol daun Binahong memiliki kapasitas antioksidan total sebesar 4,25 mmol/100g (segar) dan 3,68 mmol/100g (kering). Untuk membuktikannya maka dilakukan penelitian dengan memformulasikan ekstrak etanol Daun Binahong dalam bentuk sediaan krim antioksidan.

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi. Maserasi dipilih karena metode ini mudah dilakukan dengan peralatan yang sederhana dan tidak melibatkan panas sehingga dapat menghindari kerusakan senyawa yang tidak tahan panas (Mailana, dkk. 2016). Pelarut yang digunakan yaitu etanol 70% selama 3x24 jam dengan berat simplisia 500 gram. Hasil maserasi kemudian disaring dan dipisahkan. Proses ini diulang sebanyak dua kali. Hasil maserasi kemudian diuapkan dengan menggunakan *rotary evaporator* dan dipekatkan diatas penangas air dengan suhu 40°-50°C sampai diperoleh ekstrak kental.

Hasil rendamen ekstrak etanolik yang didapat dari daun Binahong diperoleh sebanyak 28,9%. Berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia (2017) hasil rendamen ekstrak daun Binahong tidak kurang dari 11,9%. Perbedaan %rendamen didapatkan karena adanya perbandingan antara jumlah pelarut dan sampel yang digunakan. Ekstrak etanol daun Binahong berwarna coklat kehitaman dan tidak berbau.

Ekstrak etanol daun Binahong mengandung flavonoid yang diketahui memiliki kapasitas sebagai antioksidan (Anwar dan Tri. 2016). Antioksidan

umumnya berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Berdasarkan fungsinya ekstrak ini diformulasikan sebagai sediaan topikal yaitu sediaan krim. Sediaan yang banyak beredar umumnya berupa krim merupakan sistem emulsi sediaan semi padat dengan penampilan tidak jernih, berbeda dengan salep yang tembus cahaya (Lachman. 2012) Krim banyak dipilih karena pengaplikasiannya yang mudah untuk dioleskan, tidak lengket, kemampuan penyebaran yang baik, memberikan efek dingin dan mudah dicuci dengan air. Formula krim dibuat menjadi 3 variasi konsentrasi yaitu 0,2 gram, 0,4 gram, dan 0,6 gram. Adapun formula krim yang dibuat tanpa menggunakan ekstrak sebagai kontrol negatif dan menggunakan vitamin C dengan konsentrasi 0,05% sebagai kontrol positif. Formulasi krim terbagi menjadi dua fase yaitu, fase minyak dan fase air. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam fase minyak yaitu asam stearat, setil alkohol, span 80 dan propil paraben. Sedangkan untuk fase air yaitu, metil paraben, gliserin, tween 80 dan trietanolamin

Konsentrasi bahan-bahan untuk fase minyak dan fase air adalah sama untuk masing-masing formula yaitu Asam Stearat 12 g, Tween 80 5,11 g, Span 80 0,25 g, Setil Alkohol 4 g, Gliserin 18,74 g, trietanolamin 0,09 g, Metil Paraben 0,20 g, Propil Paraben 0,02 g, dan pengaroma Oleum rosae secukupnya. Fase minyak dibuat dengan cara meleburkan asam stearat, setil alkohol, span 80 dan propil paraben dalam cawan porselin di atas penangas air hingga suhu 70°C sambil diaduk hingga homogeny. Fase air dibuat dengan cara memanaskan air sebanyak 25ml hingga suhu 70°C, tambahkan metil paraben sambil diaduk hingga melarut dengan sempurna. Jika metil paraben telah larut sempurna tambahkan

gliserin, tween 80 dan TEA, kemudian diaduk lagi hingga homogen. Sambil menyiapkan bahan-bahan, siapkan juga lumpang dan alu yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Setelah semuanya siap, fase air dituang ke dalam lumpang panas selanjutnya fase minyak dituang ke dalam fase air, digerus terus hingga terbentuk massa krim. Setelah massa krim terbentuk tambahkan ekstrak daun Binahong dan teteskan oleum rosae secukupnya, gerus lagi hingga homogen, lalu masukkan ke dalam wadah pot plastik.

Selanjutnya dilakukan pengujian antioksidan dengan metode DPPH. Metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) dipilih karena merupakan metode yang sederhana, murah, cepat dan cukup peka sehingga tidak memerlukan banyak sampel. Pembuatan larutan DPPH untuk penentuan panjang gelombang dilakukan dengan cara timbang DPPH sebanyak 10mg dilarutkan dengan etanol p.a dicukupkan sampai 100ml, kemudian dipipet sebanyak 3,5 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml dan dicukupkan dengan etanol p.a lalu homogenkan. Diamkan selama 30 menit lalu ukur pada panjang gelombang 200-800 nm. Panjang gelombang maksimum DPPH yang didapat yaitu 328 nm. Untuk pembuatan larutan uji sediaan krim, sebanyak 2,5 gram krim ditambahkan 5ml etanol p.a lalu disentrifugasi selama 10 menit kemudian saring hasil sentrifugasi menggunakan kertas saring hingga jernih. Masukkan hasil saringan ke dalam labu ukur 10 ml, tambahkan larutan DPPH sebanyak 2ml lalu cukupkan hingga 10ml dengan etanol p.a, diinkubasi selama 30 menit, lalu ukur panjang absorbansinya pada panjang gelombang 328 nm, dilakukan replikasi sebanyak tiga kali replikasi pada masing-masing formula. Formula I sebanyak tiga kali replikasi berturut-turut

absorbansinya 0,589, 0,680, 0,656. Formula II sebanyak tiga kali replikasi berturut-turut absorbansinya 0,310, 0,250, 0,299. Formula III sebanyak tiga kali replikasi berturut-turut absorbansinya 0,875, 0,836, 0,855. Formula IV sebanyak tiga kali replikasi berturut-turut absorbansinya 1,060, 1,029, 1,136. Formula V sebanyak tiga kali replikasi berturut-turut absorbansinya 0,312, 0,277, 0,311. Setelah mendapatkan nilai absorbansinya, dihitung nilai % peredaman dari masing-masing formula. Formula I memiliki nilai rata-rata % peredaman 18,49%. Formula II memiliki nilai rata-rata % peredaman 63,61%. Formula III memiliki nilai rata-rata % peredaman -8,68%. Formula IV sebagai kontrol negatif memiliki nilai rata-rata % peredaman -36,64%. Formula V sebagai kontrol positif memiliki nilai rata-rata % peredaman 61,87%. Berdasarkan hasil pengujian aktivitas krim antioksidan terhadap DPPH untuk masing-masing formula, yang paling efektif sebagai krim antioksidan dari ekstrak daun Binahong adalah F III yang mengandung ekstrak sebanyak 0,04 gram dengan % peredaman sebesar 63,61%, hal ini dibuktikan dengan adanya F V yang menggunakan bahan aktif vitamin C sebagai kontrol positif memiliki % peredaman yaitu 61,87%.

Untuk evaluasi sediaan krim dilakukan selama 4 minggu. Pengujiannya meliputi organoleptis, uji pH, daya sebar, homogenitas dan daya lekat. Hasil pengamatan organoleptis selama 4 minggu untuk F I, F II, F III, F IV, F V memiliki karakteristik yang hampir sama yaitu memiliki bau khas dan bertekstur lembut dan tidak lengket, dari segi warna F I berwarna putih kekuningan, F II putih kekuningan, F III kuning kecoklatan, F IV putih bersih, dan F V berwarna putih. Kelima formula tidak mengalami perubahan warna, bau, dan tekstur di

setiap minggunya, hal ini membuktikan kestabilan formula krim daun Binahong dalam pengamatan organoleptis.

Pengamatan homogenitas bertujuan untuk mengetahui tercampurnya bahan-bahan sediaan krim, baik itu zat aktif, fase minyak dan fase airnya. Hasil pengamatan homogenitas pada FI, FII, FIII, FIV dan FV selama 4 minggu yaitu homogen. Hal ini membuktikan bahwa bahan-bahan yang terdapat dalam sediaan krim tercampur dengan baik karena tidak terdapat partikel-partikel kasar.

Pengujian daya sebar dilakukan untuk mengetahui luas penyebaran krim saat di aplikasikan ke kulit. Persyaratan daya sebar yang baik untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5-7 cm (Genatrika, dkk. 2016). Hasil pengukuran daya sebar FI selama 4 minggu berturut-turut 4 cm, 4 cm, 4,5 cm dan 4,5 cm.. Untuk FII hasilnya 4 cm, 4,1 cm, 4,1 cm, 4,2 cm dan 4,5 cm. Untuk FIII hasilnya yaitu 4,3 cm, 4,3 cm, 4,6 cm dan 4,6 cm. Untuk FIV hasilnya yaitu 4,1 cm, 4,1 cm, 4,2 cm dan 4,9 cm. Untuk FV hasilnya yaitu 4 cm, 4 cm, 4,5 cm dan 4,9 cm. Berdasarkan hasil pengujian daya sebar pada sediaan krim dapat disimpulkan bahwa semua sediaan krim tidak memenuhi syarat. Daya sebar dari semua formula krim tersebut kurang dari standar daya sebar sediaan topikal yang baik.

Pengukuran pH dilakukan bertujuan untuk mengetahui sifat asam dan basa suatu sediaan krim sehingga aman untuk digunakan dan tidak mengiritasi kulit. Oleh karena itu, nilai pH sebaiknya berkisar antara 4,5-6,5 sesuai dengan pH fisiologis kulit (Lathifah dan Iswari. 2013). Pada FI dilakukan pengukuran pH selama 4 minggu berturut-turut dengan hasil 6,6; 6,5; 6,5; 6,5. Pada FII dilakukan pengukuran pH selama 4 minggu berturut-turut dengan hasil 6,3; 6,2; 6,5; 6,5.

Pada FIII dilakukan pengukuran pH selama 4 minggu berturut-turut dengan hasil 6,0; 6,1; 6,2; 6,2. Pada FIV dilakukan pengukuran pH selama 4 minggu berturut-turut dengan hasil 6,6; 6,6; 6,7; 6,5. Pada FV dilakukan pengukuran pH selama 4 minggu berturut-turut dengan hasil 4,7; 5,2; 4,9; 4,8. Dari hasil pengukuran pH, FII dan FIII merupakan formula yang paling baik karena memiliki nilai pH yang tidak melebihi pH fisiologis kulit. Untuk FV sebagai kontrol positif juga memiliki nilai pH yang baik karena tidak melebihi nilai pH fisiologis kulit, hanya saja nilai pH pada FV lebih bersifat asam karena zat aktif vitamin C yang dikandungnya.

Pengujian daya lekat pada suatu sediaan bertujuan untuk mengetahui kemampuan suatu sediaan untuk dapat menempel pada kulit. Semakin lama suatu sediaan menempel pada kulit maka absorpsinya pada kulit akan semakin baik. Persyaratan daya lekat yang baik untuk sediaan topikal adalah lebih dari 4 detik (Wibowo, dkk. 2017). Hasil pengukuran daya lekat untuk FI, FII, FIII, FIV, dan FV mulai dari minggu-1 sampai minggu-4 yaitu semuanya lebih dari detik. Berdasarkan hasil pengujian daya lekat pada masing-masing formula dapat disimpulkan bahwa setiap formula memiliki daya lekat yang baik karena memiliki waktu lekat yang lebih dari 5 detik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Formula sediaan krim ekstrak etanol daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) yang lebih stabil dalam bentuk sediaan krim adalah FII.
2. Evaluasi sediaan krim ekstrak etanol daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) pada pengujian organoleptik semua formulasi memiliki hasil yang baik, begitu pula pada pengujian homogenitas semua formula memiliki hasil yang baik. Pada pengujian daya sebar semua sediaan krim tidak memenuhi syarat. Pada pengujian pH sediaan, FII, FIII dan FV yang memiliki nilai sesuai dengan pH fisiologis kulit. Pada pengujian daya lekat semua sediaan krim memenuhi persyaratan.
3. Sediaan krim ekstrak etanol daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) yang memiliki aktivitas antioksidan yang paling efektif adalah FII yang mengandung ekstrak sebesar 0,4 gram dengan % peredaman sebesar 63,61%.

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan beberapa bentuk sediaan topikal yang lainnya dan beberapa metode pengujian aktivitas antioksidan yang lain agar diperoleh hasil yang lebih spesifik.

KEPUSTAKAAN

- Amaliah, A, D dan Rimadani Pratiwi. "Review Artikel: Studi Formulasi dan Evaluasi Fisik Sediaan Krim Antiskabies dari Minyak Mimba (*Azadirachta Indica* A.Juss)." *Farmaka Suplemen Volume 15 Nomor 2*. Jatinangor: Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. 2017.
- Anwar, T, M dan Tri Umiana Soleha. "Manfaat Daun Binahong (*Anredera cordifolia*) sebagai Terapi *Acne Vulgaris*." *Majority Volume 5 Nomor 5*. Lampung: Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 2016.
- Arifin, B dan Sanusi Ibrahim. "Struktur, Bioaktivitas dan Antioksidan Flavonoid." *Jurnal Zarah Volume 6 Nomor 1*. Padang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 2018.
- Arnanda, Q, P dan Rina Fajri Nuwarda. "Review Article: Penggunaan Radiofarmaka Teknesium-99M dari Senyawa Glutation dan Senyawa Flavonoid Sebagai Deteksi Dini Radikal Bebas Pemicu Kanker." *Farmaka Volume 17 Nomor 2*. Jatinangor: Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. 2019.
- Berawi, K, N dan Theodora Agverianti. "Efek Aktivitas Fisik Pada Proses Radikal Bebas sebagai Faktor Risiko Aterosklerosis." *Majority Volume 6 Nomor 2*. Lampung: Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 2017.
- Elmitra. *Dasar-Dasar Farmasetika dan Sediaan Semi Solid*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2017.
- Erlidawati, dkk. *Potensi Antioksidan Sebagai Antidiabetes*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. 2018.
- Fakriah, dkk. "Sosialisasi Bahaya Radikal Bebas dan Fungsi Antioksidan Alami Bagi Kesehatan." *Jurnal Vokasi Volume 3 Nomor 1*. Lhokseumawe: Politeknik Negeri Lhokseumawe. 2019.
- Hasrianti, dkk. "Pemanfaatan Ekstrak Bawang Merah dan Asam Asetat sebagai Pengawet Alami Bakso." *Jurnal Dinamika Volume 07 Nomor 1*. Palopo: Fakultas Sains Universitas Cokroaminoto Palopo. 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Qur'an. 2012.
- Kurniasih, N, dkk. "Potensi Daun Sirsak (*Annona muricata* Linn), Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) dan Daun Benalu Mangga (*Dendrophthoe pentandra*) sebagai Antioksidan Pencegah Kanker." *Jurnal*

Volume IX Nomor 1. Bandung: UIN Sunan Gunung Jati dan Politeknik Kesehatan Bandung. 2015.

Lazuardi, M. *Bagian Khusus Ilmu Farmasi Veteriner Edisi 1*. Surabaya: Airlangga University Press. 2020.

Leba, M,A,U. *Ekstraksi dan Real Kromatografi*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2017.

Lung, J, K, S dan Dika P, D. "Review Artikel: Uji Aktivitas Antioksidan Vitamin A, C, E dengan Metode DPPH." *Farmaka: Suplemen Volume 15 Nomor 1*. Padjadjaran: 2017.

Mailana, D, dkk. "Formulasi Sediaan Krim Antioksidan Ekstrak Etanolik Daun Alpukat (*Persea americana* Mill)." *Acta Pharmaciae Indonesia*. Purwokerto: Jurusan Farmasi Universitas Jenderal Sudirman. 2016.

Mappamasing, F, dkk. "Formulasi Karakterisasi dan Uji Penetrasi *In Vitro* Resveratol Solid Lipid Nanopartikel dalam Krim Topikal." *Jurnal Ilmi Kefarmasian Indonesia Volume 13 Nomor 2*. Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. 2015.

Maryam, St, dkk. "Pengukuran Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam.) Menggunakan Metode FRAP (*Ferric Reducing Antioxidant Power*)." *Jurnal Fitofarmaka Indonesia Volume 2 Nomor 2*. Makassar: Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia. 2015.

Nasyanka, A, L, dkk. *Pengantar Fitokimia*. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media. 2020.

Nugraha, A, T, dkk. "Profil Senyawa dan Aktivitas Antioksidan Daun Yakon (*Smallanthus sonchifolius*) dengan Metode DPPH dan CUPRAC." *Jurnal Ilmiah Farmasi Volume 13 Nomor 1*. Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia. 2017.

Parwata, I, M, O, A. *Bahan Ajar: Antioksidan*. Bali: Universitas Udayana. 2016.

Pratiwi, S dan Patihul Husni. "Artikel Tinjauan: Potensi Penggunaan Fitokonstituensi Tanaman Indonesia Sebagai Bahan Aktif Tabir Surya." *Farmaka: Volume 15 Nomor 4*. Jatinangor: Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. 2017.

Putri, Y, D, dkk. "Formulasi dan Evaluasi Losion Tabir Surya Ekstrak Daun Stevia (*Stevia rebaudiana* Bertoni M)." *Jurnal Sains Farmasi & Klinis Volume 6 Nomor 1*. Bandung: Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. 2019.

- Sarasmita, M, A. *Buku Panduan Edukasi Obat Oleh Apoteker Seri: Edukasi Untuk Anak "Mengenal Profesi Apoteker dan Obat."* Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.
- Sayogo, W, dkk. "Potensi +Dalethyne Terhadap Epitelisasi Luka Pada Kulit Tikus yang Diinfeksi Bakteri MRSA." *Jurnal Biosains Pascasarjana Volume 19*. Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga. 2017.
- Sayuti, K dan Rina Yenrina. *Antioksidan Alami dan Sintetik*. Padang: Andalas University Press. 2015.
- Sembiring, T, dkk. *Alat Penguji Material*. Guepedia. 2019.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 7 Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 9 Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Suarsa, I, W. *Spektroskopi*. Bali: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. 2015.
- Sulastri, E, dkk. "Formulasi Mikroemulsi Ekstrak Bawang Hutan dan Uji Aktivitas Antioksidan." *Jurnal Pharmascience Volume 2 Nomor 2*. Farmasi FMIPA Universitas Tadulako. 2015.
- Suparjo, dkk. "Pengaruh Auksin dan Sitokinin Terhadap Perbanyakan Mikro Tanaman Binahong (*Anredera cordifolia* (Tenore) Steenis)." *Jurnal Bioteknologi dan Biosains Indonesia Volume 3 Nomor 2*. Tangerang Selatan: Balai Bioteknologi, BPPT, Kawasan PUSPIPTEK. 2016.
- Surbakti, P, A, A, dkk. "Skrining Fitokimia dan Uji Toksisitas Ekstrak Etanol Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) dengan Metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT)." *Pharmacon: Jurnal Ilmiah Farmasi Volume 7 Nomor 3*. Manado: FMIPA UNSRAT. 2018.
- Utami, N, F, dkk. "Pengaruh Berbagai Metode Ekstraksi Pada Penentuan Kadar Flavonoid Ekstrak Etanol Daun Iler (*Plectranthus scutellarioides*)." *Fitofarmaka Jurnal Ilmiah Farmasi Volume 10 Nomor 1*. Bogor: FMIPA Universitas Pakuan. 2020.
- Vifta, R, L, dkk. "Perbandingan Total Rendamen dan Skrining Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Sirih Hijau (*Piper betle* L.) Secara Mikrodilusi." *Journal of Science and Applicative Technology Volume 1 Nomor 2*. Ungaran Barat: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo. 2017.

Wulansari, Anisa Nur. "Alternatif Cantigi Ungu (*Vaccinium varingiaefolium*) sebagai Antioksidan Alami: Review." *Jurnal Farmaka Suplemen Volume 16 Nomor 2*. Jatinangor: Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. 2018.


Yefrida, dkk. "Validasi Metode FRAP Modifikasi Pada Penentuan Kandungan Antioksidan Total Dalam Sampel Mangga dan Rambutan." *J. Ris. Kim Volume 8 Nomor 2*. FMIPA Universitas Andalas. 2015.


Yohan, dkk. "Pembuatan Spektrofotometer Edukasi Untuk Analisis Senyawa Pewarna Makanan." *Chimica et Natura Acta Volume 6 Nomor 3*. Tangerang Selatan, Banten: Fakultas Teknik Universitas Pamulang. 2018.




Lampiran 1. Skema Kerja


A. Skema Proses Penelitian




B. Skema Ekstraksi Sampel Daun Binahong

C. Skema Pembuatan Sediaan Krim



D. Skema Evaluasi Sediaan

E. Skema Pengujian Aktivitas Antioksidan

Lampiran 2. Perhitungan

A. Perhitungan Penyiapan DPPH

$$\text{mM} = \frac{\text{mg}}{\text{Mr}} \times \frac{1000}{\text{Vol}}$$

$$0,252 \text{ mM} = \frac{\text{mg}}{394,32} \times \frac{1000}{100}$$

$$\text{mg} = \frac{0,252 \times 394,32}{10}$$

$$\text{mg} = 10 \text{ mg}$$

B. Perhitungan % Peredaman Krim Ekstrak Etanol Daun Binahong

$$\% \text{ Peredaman} = \frac{\text{Absorbansi DPPH} - \text{Absorbansi Sampel}}{\text{Absorbansi DPPH}} \times 100\%$$

Formula I

$$\text{FIa} = \frac{0,787 - 0,589}{0,787} \times 100\% = 25,15\%$$

$$\text{FIb} = \frac{0,787 - 0,680}{0,787} \times 100\% = 13,59\%$$

$$\text{FIc} = \frac{0,787 - 0,656}{0,787} \times 100\% = 16,64\%$$

$$\text{Rata-rata} = 18,46\%$$

Formula II

$$\text{FIIa} = \frac{0,787 - 0,310}{0,787} \times 100\% = 60,61\%$$

$$\text{FIIb} = \frac{0,787 - 0,250}{0,787} \times 100\% = 68,23\%$$

$$\text{FIIc} = \frac{0,787 - 0,299}{0,787} \times 100\% = 62,01\%$$

$$\text{Rata-rata} = 63,61\%$$

Formula III

$$\text{FIIIa} = \frac{0,787-0,875}{0,787} \times 100\% = -11,18\%$$

$$\text{FIIIb} = \frac{0,787-0,836}{0,787} \times 100\% = -6,22\%$$

$$\text{FIIIc} = \frac{0,787-0,855}{0,787} \times 100\% = -8,64\%$$

$$\text{Rata-rata} = -8,68\%$$

Formula IV

$$\text{FIVa} = \frac{0,787-1,060}{0,787} \times 100\% = -34,68\%$$

$$\text{FIVb} = \frac{0,787-1,029}{0,787} \times 100\% = -30,74\%$$

$$\text{FIVc} = \frac{0,787-1,136}{0,787} \times 100\% = -44,34\%$$

$$\text{Rata-rata} = -36,64\%$$

Formula V

$$\text{FVa} = \frac{0,787-0,312}{0,787} \times 100\% = 60,35\%$$

$$\text{FVb} = \frac{0,787-0,277}{0,787} \times 100\% = 64,80\%$$

$$\text{FVc} = \frac{0,787-0,311}{0,787} \times 100\% = 60,48\%$$

$$\text{Rata-rata} = 61,87\%$$

Lampiran 3. Gambar Penelitian

A. *Penyiapan Sampel*



Gambar 3. Pengambilan dan pengumpulan sampel



Gambar 4. Penimbangan sampel



Gambar 5. Proses pengeringan



Gambar 6. Proses penimbangan simplisia

B. *Proses Pembuatan Ekstrak*



Gambar 7. Proses pemisahan pelarut dan sampel



Gambar 8. Proses penguapan filtrat etanol dengan *rotary evaporator*



Gambar 9. Pemekatan ekstrak di atas penangas air

C. Proses Pembuatan Krim




Gambar 10. Penimbangan bahan krim



Gambar 11. Penimbangan ekstrak



Gambar 12. Pencampuran bahan (pembuatan krim)




Gambar 13. Sediaan krim formula I



Gambar 14. Sediaan krim formula II



Gambar 15. Sediaan krim formula III



Gambar 16. Sediaan krim formula IV



Gambar 17. Sediaan krim formula V


D. Proses Pengujian Antioksidan



Gambar 18. Pembuatan larutan DPPH



Gambar 19. Pengukuran absorbansi



Gambar 20. Pengukuran absorbansi % peredaman

E. *Evaluasi Sediaan Krim*



Gambar 21. Pengujian daya sebar




Gambar 22. Pengamatan organoleptik



Gambar 23. Pengujian daya lekat



Gambar 24. Pengukuran pH



Gambar 25. Pengujian homogenitas

RIWAYAT HIDUP



Saya Reskyatri Faradisa Faruki, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 13 Mei 1996, anak terakhir dari 3 bersaudara dari pasangan (Alm) Halipuddin Tanda dan St. Asiah. Sering kali akrab dipanggil kiki/kikoy.

Penulis memulai pendidikan di tingkat TK di TK Aisiyah, selanjutnya masuk SD di SDN MARICAYA selama 6 tahun belajar di SD, melanjutkan pendidikan SMP di SMPN 24 Makassar di Jl. Baji Gau, setelah itu pindah ke Polewali dan melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Polewali dan tepat tahun 2014,, alhamdulillah penulis akhirnya diterima di UIN salah satu perguruan tinggi negeri Islam di Makassar terlebih lagi penulis lulus di salah satu jurusan favorit disana yaitu Farmasi. Hari demi hari, bulan demi bulan hingga tahun demi tahun telah penulis lalui di UIN sebagai mahasiswa Farmasi, banyak suka duka yang selama ini penulis lalui, sampai akhirnya penulis hanya berharap bahwa kelak akan lulus dan mendapatkan gelar sarjana.