

STUDI LITERATUR
TINJAUAN MOLEKULER AKTIVITAS TANAMAN KAYU TAMMATE
(*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) SEBAGAI ANTIKANKER



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

SUCI NURZAKINAH

70100117026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Nurzakinah
NIM : 70100117026
Tempat/Tgl. Lahir : Palopo, 20 April 1999
Jurusan : Farmasi
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Judul : Studi Literatur Tinjauan Molekuler Aktivitas Tanaman
Kayu Tammate (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.)
Sebagai Antikanker

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 20 Agustus 2021

Penyusun,



SUCI NURZAKINAH
70100117026


PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “**Studi Literatur Tinjauan Molekuler Aktivitas Tanaman Kayu Tammate (*Lannea Coromandelica* (Houtt.) Merr.) Sebagai Antikanker**” yang disusun oleh **Suci Nurzakinah, NIM. 70100117026**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 20 Agustus 2021 M** yang bertepatan dengan **11 Muharram 1443 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 20 Agustus 2021 M
11 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Nurshalati Tahar, S.Farm, M.Si.	(.....)
Penguji I	: apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin.	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. Lomba Sultan., MA.	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar, 


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Studi Lliteratur Tinjauan Molekuler Aktivitas Tanaman Kayu Tammate (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) Sebagai Antikanker” disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Farmasi di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian penelitian dan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan. Namun, atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yaitu bapak Amiruddin Puroso dan Ibu Nurlaely., yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada keluarga besar tercinta atas segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. Apt. Hj. Gemy Natity Handayany, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. apt. Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
12. apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
13. apt. Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
14. apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin., selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

15. Prof. DR. Lomba Sultan MA, selaku Penguji Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
16. apt. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si selaku Dosen Pendamping yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya penelitian ini.
17. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi, atas ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.
18. Kovalen Farmasi 2017 yang selalu menyemangati dan mendoakan

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Gowa, 20 Agustus 2021

Penulis



Suci Nurzakinah

NIM. 70100117042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA).....	x
ABSTRACT (ENGLISH)	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II METODE	7
2.1 Strategi Pencarian Literatur.....	7
2.1.1 Kata Kunci Yang Digunakan Dan Database	8
2.1.2 <i>Data Base Atau Search Engine</i> Yang Digunakan	8
2.2 Kriteria Inklusi Dan Eksklusi Jurnal/Artikel.....	8
2.3 Seleksi Studi Dan Penilaian Kualitas	9
2.3.1 Hasil Pencarian Dan Seleksi Studi	9
2.3.2 Daftar Artikel Hasil Pencarian	10
BAB III HASIL DAN ANALISIS	12
BAB IV PEMBAHASAN.....	25
BAB V PENUTUP.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kriteria inklusi dan eksklusi dalam seleksi studi	8
Tabel 2. Hasil penelusuran literatur	9
Tabel 3. Hasil seleksi pustaka	10
Tabel 4 .Artikel hasil penelitian	12
Tabel 5. Hasil review artikel tentang aktivitas antikanker	13



DAFTAR GAMBAR


Halaman

Gambar 1. Skema kerja penelitian.....	7
Gambar 2. Tanaman kayu tammate (<i>Lannea Coromandelica</i>)	41
Gambar 3. Skema rincian senyawa bioaktif	43
Gambar 4. Model hipotetik regulasi kematian sel pada	45
Gambar 5. Representasi skema dari kejadian apoptosis.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Tanaman kayu tammate.....	61
Lampiran 2. Hasil penelusuran jurnal google scholar.....	62
Lampiran 3. Hasil penelusuran jurnal science direct	63
Lampiran 4. Hasil penelusuran jurnal pubmed	64
Lampiran 5. Jurnal.....	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Suci Nurzakinah
Nim : 70100117026
Judul Skripsi : Studi literatur tinjauan molekuler aktivitas tanaman kayu tammate (*lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) sebagai antikanker

Kayu tammate (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.) adalah tumbuhan dari keluarga Anacardiaceae, yang merupakan salah satu tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia khususnya di Sulawesi. Kayu tammate memiliki kandungan senyawa polifenol, fenolik, tannin, flavonoid yang berfungsi sebagai antikanker. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme kerja kandungan kayu tammate (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) sebagai antikanker secara molekuler. Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Metode studi literatur merupakan rangkaian penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan, pembacaan, dan pencatatan bahan yang dibutuhkan untuk selanjutnya diolah dalam proses penelitian. Dalam penelusuran dan analisis literatur menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi dengan kata kunci *Lannea coromandelica* MAPK (*raf/mek/erk*), *Lannea coromandelica phosphatidylinositol-3 kinase (PI3K/AKT)*, *Lannea coromandelica Wnt/b-catenin* dan *lannea coromandelica apoptosis couple membrane receptor* dan search engine google scholar, pubmed dan science direct. Berdasarkan dari hasil penelusuran literatur diperoleh sebanyak 65 artikel dan dieksklusi sebanyak 54 artikel. Hasil penelitian ini yaitu diperoleh gambaran bahwa mekanisme kerja tanaman kayu tammate (*lannea coromandelica*) sebagai antikanker secara molekuler bekerja pada jalur signalling pathway MAPK (*raf/mek/erk*) dan jalur induksi *apoptosis couple membrane receptor* yang merujuk pada 11 artikel yang telah memenuhi kriteria inklusi.

Kata kunci : *Lannea coromandelica*, anticancer, signalling pathway

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Suci Nurzakinah
NIM : 70100117026
Research Title : Study of molecular literature on the activity of kayu tammate (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) as anticancer

Kayu tammate (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.) is a plant from the Anacardiaceae family, which is one of the most widely grown plants in Indonesia, especially in Sulawesi. Kayu tammate contains polyphenolic compounds, phenolics, tannins, flavonoids that function as anticancer. This study aims to describe the mechanism of action of tammate wood (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) as an anticancer molecularly. The research method is descriptive qualitative through literature study. The literature study method is a series of research using techniques of collecting, reading, and recording materials needed to be further processed in the research process. In the literature search and analysis using inclusion and exclusion criteria with keywords *Lannea coromandelica* MAPK (*raf/mek/erk*), *Lannea coromandelica* phosphatidylinositol-3 kinase (*PI3K/AKT*), *Lannea coromandelica* Wnt/b-catenin and *Lannea coromandelica* apoptosis couple membrane receptor and search engines google scholar, pubmed and scince direct. Based on the results of the literature search, 65 articles were obtained and 54 articles were excluded. The results of this study showed that the mechanism of action of the kayu tammate (*Lannea coromandelica*) as an anticancer molecularly works on the MAPK signaling pathway (*raf/mek/erk*) and the couple membrane receptor apoptosis induction pathway, which refers to 11 articles that have met the inclusion criteria.

Keywords: *Lannea coromandelica*, anticancer, signaling pathway

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kanker adalah sekelompok besar penyakit yang dapat dimulai di hampir semua organ atau jaringan tubuh ketika sel-sel abnormal tumbuh tak terkendali, melampaui batas biasanya untuk menyerang bagian-bagian yang bersebelahan tubuh dan/atau menyebar ke organ lain. Proses terakhir disebut metastasis dan merupakan proses utama penyebab kematian akibat kanker. Neoplasma dan tumor ganas adalah nama umum lainnya untuk kanker. Kanker adalah penyebab utama kedua kematian secara global setelah penyakit jantung, terhitung sekitar 9,6 juta kematian, atau satu dari enam kematian, pada tahun 2018. Kanker paru-paru, prostat, kolorektal, lambung, dan hati adalah jenis kanker yang paling umum pada pria, sedangkan kanker payudara, kolorektal, paru-paru, serviks, dan tiroid adalah yang paling umum di antara wanita (Siegel et al., 2018).

Berdasarkan data World Health Organization kanker adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia, terhitung hampir 10 juta kematian pada tahun 2020. Yang paling umum pada tahun 2020 (dalam hal kasus baru kanker) adalah: payudara (2,26 juta kasus); paru-paru (2,21 juta kasus); usus besar dan rektum (1,93 juta kasus); prostat (1,41 juta kasus); kulit (non-melanoma) (1,20 juta kasus); dan perut (1,09 juta kasus). Penyebab paling umum kematian akibat kanker pada tahun 2020 adalah: paru-paru (1,80 juta kematian); usus besar dan rektum (935.000 kematian); hati (830 000 kematian); perut (769.000 kematian); dan payudara (685.000 kematian) (World Health Organization, 2020).

Kejadian kanker yang akan membludak di masa depan pun diprediksi oleh sebab adopsi gaya hidup yang diketahui meningkatkan risiko kanker, seperti

merokok, pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik dan sebagainya (Siegel et al., 2018).

Penyakit kanker di Indonesia berada di urutan ke 8 di Asia Tenggara, sedangkan di Asia urutan ke 23. Angka kejadian kanker tertinggi di Indonesia untuk laki-laki adalah kanker paru yaitu sebesar 19,4% penduduk dengan rata-rata kematian 10,9% penduduk, yang di ikuti dengan kanker hati sebesar 12,4% penduduk dengan rata-rata kematian 7,6% penduduk. Sedangkan pada perempuan angka kejadian tertinggi adalah kanker payudara yaitu sebesar 42,1% penduduk dengan rata-rata kematian 17% penduduk yang di ikuti kanker leher Rahim sebesar 23,4% penduduk dengan rata-rata kematian 13,9% penduduk (Kementrian Kesehatan RI, 2019).

Prevalensi penyakit kanker di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dari 1,4% penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79% penduduk pada tahun 2018. Prevalensi kanker tertinggi terletak di provinsi DI Yogyakarta 4,86%, diikuti Sumatera Barat 2,47% penduduk dan Gorontalo 2,44% penduduk (Kementrian Kesehatan RI, 2019).

Indonesia adalah negara yang kaya akan jenis tumbuhan yang merupakan sumber daya hayati dan juga gudang senyawa kimia baik berupa senyawa metabolit primer maupun senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavanoid, steroid, terpenoid, dan fenilpropanoid dan sebagainya. Senyawa-senyawa ini merupakan senyawa kimia yang umumnya mempunyai kemampuan bioaktivitas dan sebagai pelindung tumbuhan dari gangguan hama penyakit dan dari lingkungannya (Paramudita et al., 2017).

Ada banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai obat-obatan yang dikenal dengan obat tradisional sehingga penelitian tentang penggunaan tumbuh-tumbuhan berkhasiat dan mengetahui senyawa kimia yang berfungsi

sebagai obat sangat diperlukan. Salah satu tumbuhan yang sudah lama digunakan masyarakat sebagai ramuan obat tradisional untuk penyembuhan adalah tumbuhan kayu tammate (*Lannea coromandelica* (Houtt) Merr). Tumbuhan ini mudah ditemukan di Sulawesi Selatan, tumbuhan ini merupakan tumbuhan liar yang biasa digunakan sebagai tanaman pagar. Kayu tammate (*Lannea coromandelica* (Houtt) Merr). merupakan tumbuhan yang termasuk dalam genus *Lannea* dari famili Anacardiaceae (Paramudita et al., 2017).

Tanaman obat merupakan sumber daya biologi (*bioresource*) yang utama dalam pengembangan obat herbal, nutraceutical, obat baru, dan starting materials untuk obat semi sintesis atau modern. Pengembangan obat yang berasal dari produk alam telah terbukti berhasil di masa lalu dan teknologi baru telah dikembangkan untuk memperoleh senyawa-senyawa turunan dari berbagai jenis tanaman (Azzahrah et al., 2019).

Kayu tammate (*Lannea cormendalica* (Houtt.) Merr.) adalah tumbuhan dari keluarga Anacardiaceae, yang merupakan salah satu tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia khususnya di Sulawesi. Masyarakat Makassar mengenal tanaman ini dengan nama kayu tammate dan di daerah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan disebut Kayu Jawa. Tanaman ini sering digunakan masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengobati berbagai jenis penyakit, misalnya untuk pengobatan luka bakar, dan penyakit lainnya. Berdasarkan penelitian (Indrayangingsih et al., 2015) Kulit batang *Lannea* digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan muntah darah dan perawatan pasca melahirkan. Penggunaan lain tanaman Kayu Jawa adalah sebagai analgesik, anti ulkus, dan aphrodisiac, getahnya sebagai penyembuhan luka, daunnya mengobati pembengkakan akibat keseleo, dan kortex kayu jawa sebagai antiinflamasi, antimitosis dan antioksidan (Ismail et al., 2016).

Tanaman kayu tammate (*Lannea coromandelica*) merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang masih sering digunakan masyarakat karena memiliki berbagai khasiat antara lain digunakan untuk mengobati luka dalam maupun luar seperti diare, mual dan muntah (Rahayu et al., 2006). Berdasarkan skrining fitokimia (Manik et al., 2013) kulit batang tanaman kayu tammate (*Lannea coromandelica*) dilaporkan mengandung senyawa golongan karbohidrat, steroid, alkaloid, terpenoid, saponin, tannin, dan flavonoid (Yumita et al., 2019).

Berdasarkan penelitian (Haruna et al., 2018) dengan Judul Penelitian Efek Ekstrak Metanol dan Partisi dari Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* Houtt. Merr.) terhadap Pertumbuhan Sel HeLa dan MCF-7 adalah menentukan efek ekstrak metanol dan partisi kulit batang kayu jawa dalam menghambat pertumbuhan sel kanker HeLa dan sel kanker MCF-7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak metanol, partisi tidak larut heksan dan partisi larut heksan dapat menghambat pertumbuhan sel kanker Hela dengan nilai indeks selektivitas, berturut-turut, 2,04; 1,85 dan 4,19. Sedangkan untuk sel MCF-7, indeks selektivitas, berturut-turut, 1,91; 1,44 dan 2,13. Partisi larut heksan dapat memiliki potensi sebagai antikanker dengan selektivitas yang baik (Haruna et al., 2018).

Pada penelitian (Prawirodihardjo, 2014) dengan Judul Uji Aktivitas Antioksidan dan Uji Toksisitas Ekstrak Etanol 70% dan Ekstrak Air Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*). Hasil uji aktivitas antioksidan yang dilakukan menunjukkan nilai AAI (*Antioxidant activity index*) ekstrak etanol 70%, ekstrak air, dan vitamin C berturut-turut 5,5679 (sangat kuat); 0,0667 (lemah); dan 9,6254 (sangat kuat). Pengujian toksisitas juga dilakukan terhadap ekstrak etanol 70% dan ekstrak air menggunakan metode BSLT (*Brine shrimp lethality test*). Hasil uji toksisitas yang dihitung menggunakan metode probit menunjukkan

ekstrak air tidak memiliki aktivitas toksik dengan nilai LC_{50} 3.171 ppm, sedangkan ekstrak etanol 70% menunjukkan aktivitas toksik dengan nilai LC_{50} 23,774 ppm. Berdasarkan penelitian ini, ekstrak etanol 70% kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) diduga memiliki potensi antikanker (Prawirodihardjo, 2014).

Kemoterapi adalah langkah pengobatan yang efektif untuk melawan kanker. Obat sitotoksik pada terapi kemoterapi menyebabkan kematian sel kanker (Dan Granders Group, 2015). Namun dalam pengaplikasiannya menuai banyak efek samping dan resistensi antikanker itu sendiri. Terapi antikanker ditujukan untuk membunuh sel kanker tanpa merusak sel inangnya. Hal ini menjadi sulit karena sel kanker juga merupakan sel manusia juga. Di lain pihak, folikel rambut, epitelium saluran pencernaan dan sumsum tulang juga mengalami pembelahan secara terus menerus. Oleh karena itu, penggunaan terapi antikanker akan menyebabkan efek samping pada sel-sel tersebut (Nugroho, 2014). Terapi kemoterapi dapat menginduksi terjadinya myelosupresi, neutropenia, anemia dan trombositopenia (Tia, Lui, Chua, & Strebel, 2015). Timbulnya efek samping oleh pengobatan kemoterapi disebabkan oleh selektifitas yang rendah dari agen kemoterapi tersebut (Haruna et al., 2018).

Kemoterapi sitotoksik selalu menjadi andalan terhadap pengobatan kanker (Kumler, Stenvang, Moreira, Brunner, & Nielsen, 2015). Namun, oleh beberapa agen kemoterapi dapat menyebabkan resisten (Luca, et al., 2015). Kemoterapi antrasiklin sering digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit berbahaya. Tetapi dalam pengaplikasiannya menemui beberapa keterbatasan oleh perkembangan efek samping yang serius, terutama kardiotoxicitas dan menjadi tidak efektif oleh adanya resistensi multi obat (Haruna et al., 2018).

Salah satu jenis tumbuhan yang digunakan secara empiris oleh sebagian masyarakat yang berpotensi sebagai antikanker adalah kayu tammate (*Lannea*

coromandelica (Houtt.) Merr). Tanaman ini mengandung sejumlah senyawa kimia dengan aktivitas farmakologi yang bervariasi dan dapat berperan sebagai antikanker. (Haruna et al., 2018).

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui lebih lanjut studi literatur tentang mekanisme kerja kandungan didalam kayu tammate (*Lannea coromendelica* (Houtt.) Merr.) sebagai antikanker secara molekuler.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah mekanisme kerja kandungan kayu tammate (*Lannea coromendelica* (Houtt.) Merr.) sebagai antikanker secara molekuler?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan mekanisme kerja kandungan kayu tammate (*Lannea coromendelica* (Houtt.) Merr.) sebagai antikanker secara molekuler

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat atau industri tentang kandungan kayu tammate (*Lannea coromendelica* (Houtt.) Merr.) sebagai antikanker

1.4.2 Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan menjadi referensi tentang kandungan kayu tammate (*Lannea coromendelica* (Houtt.) Merr.) sebagai antikanker

BAB II


METODE

2.1 *Strategi Pencarian Literatur*

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Metode studi literatur merupakan rangkaian penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan, pembacaan, dan pencatatan bahan yang dibutuhkan untuk selanjutnya diolah dalam proses penelitian.

2.1.1 Kerangka kerja yang digunakan

Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan berdasarkan kerangka berikut:



Gambar 1. Skema kerja Penelitian

2.1.2 Kata Kunci

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur yaitu *Lannea coromandelica* MAPK (RAF/MEK/ERK), *Lannea coromandelica* phosphatidylinositol-3 kinase (PI3K/AKT), *Lannea coromandelica* Wnt/b-catenin, *Lannea coromandelica* apoptosis and coupled membrane receptor signalling.

2.1.3 Database atau search engine

Database atau search yang digunakan dalam penelusuran pustaka yaitu Google Scholar, PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>), dan Science direct (<https://www.sciencedirect.com/>).

2.2 Kriteria inklusi dan eksklusi dalam seleksi studi

Kriteria yang digunakan dalam pencarian dan pengumpulan artikel disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rentang waktu publikasi jurnal maksimal 10 tahun terakhir (2011-2021) 2. Subjek penelitian yaitu <i>Lannea coromandelica</i> 3. Tipe jurnal termasuk <i>original research article</i> 4. Kriteria jurnal memiliki <i>International Standard Serial Number</i> (ISSN) atau <i>Digital Object Identifier</i> (DOI) 5. Membahas salah satu atau beberapa mekanisme kerja kayu tammate (<i>Lannea coromandelica</i>) pada jalur MAPK (RAF/MEK/ERK), phosphatidylinositol-3 kinase (PI3K/AKT), Wnt/b-catenin, apoptosis and coupled membrane receptor signalling 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal atau artikel tersebut dalam bentuk <i>review</i> 2. Ketersediaan naskah tidak <i>full text</i>

2.3 Seleksi studi dan penilaian kualitas

2.3.1 Kata kunci yang digunakan

Hasil penelusuran literatur disajikan pada tabel dibawah ini

Search engine	Kata kunci	Jumlah Artikel		
		Hasil Pencarian Artikel	Eksklusi	Inklusi (Hasil Akhir)
Google scholar	<i>Lannea coromandelica</i> MAPK (RAF/MEK/ERK)	20	13	7
	<i>Lannea coromandelica</i> phosphatidylinositol-3 kinase (PI3K/AKT)	5	5	0
	<i>Lannea coromandelica</i> Wnt/b-catenin	0	0	0
	<i>Lannea coromandelica</i> apoptosis and coupled membrane receptor signaling	20	20	0
Pubmed	<i>Lannea coromandelica</i> (MAPK) RAF/MEK/ERK	8	8	0
	<i>Lannea coromandelica</i> phosphatidylinositol-3 kinase (PI3K/AKT)	0	0	0
	<i>Lannea coromandelica</i> Wnt/b-catenin	0	0	0
	<i>Lannea coromandelica</i> apoptosis and coupled membrane receptor signaling	1	0	1
Science direct	<i>Lannea coromandelica</i> (MAPK) RAF/MEK/ERK	2	2	0
	<i>Lannea coromandelica</i> phosphatidylinositol-3 kinase (PI3K/AKT)	1	1	0
	<i>Lannea coromandelica</i> Wnt/b-catenin	0	0	0
	<i>Lannea coromandelica</i> apoptosis and coupled membrane receptor signaling	9	6	3
Total pustaka yang akan dianalisis dan dibahas				11

Tabel 2. Hasil penelusuran literatur

2.3.2 Daftar Artikel Hasil Pencarian

Tabel 3. Artikel Hasil Penelitian

No	Judul	Penulis dan Tahun	ISSN/DOI	Kriteria Jurnal
1	<i>Induction of apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells by extracts of Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. and Diospyros castanea (Craib) Fletcher</i>	(Weerapreeyakul et al., 2016)	10.1186/s13020-016-0091-z	Q1
2	<i>Gc-MS Analysis, Antibacterial And Anticancer Activities Of Bark Extract Of Lannea Coromandelica (Houtt.) Merr</i>	(C. Sivaraj 1, B. Pavithra 2, 2018)	10.13040/IJPSR.0975-8232.9(7).3047-51	Q3
3	<i>Phytochemical Screening, Antimicrobial Activity, Antioxidant Capacity And In Vivo Anticancer Activity Of Lannea Coromandelica Bark Extracts</i>	(Hossain et al., 2018)	10.9790/3008-1303021925	Q2
4	<i>Cytotoxic activity screening of Bangladeshi medicinal plant extracts</i>	(Akter et al., 2014)	10.1007/s11418-013-0789-5	Q2
5	<i>Comparative effect of lannea coromandelica (Houtt.) merr. leaves and stem barks on acetic acid induced pain model in mice and chromogenic reagents: Exploring the analgesic potential and phytochemical groups</i>	(Rahman et al., 2016)	18278620.2016/233	Q4
6	<i>Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Induces Heme Oxygenase 1 (HO-1) Expression and Reduces Oxidative Stress via the p38/c-Jun N-Terminal Kinase–Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2 (p38/JNK–NRF2)-Mediated Antioxidant Pathway</i>	(M. B. Alam et al., 2017)	10.3390/ijms18020266	Q1

7	<i>Hepatoprotective and antioxidant activity of Lannea coromandelica Linn. on thioacetamide induced hepatotoxicity in rats</i>	(Rao et al., 2014)	2300-967	Q2
8	<i>Antioxidant and Analgesic Activities of Lannea coromandelica Linn. Bark Extract</i>	(B. Alam et al., 2012)	10.3923/ijp.2012.224.233	Q3
9	<i>Phytochemical profile and medicinal potentials of lannea coromandelica stem</i>	(Jacques Britto & Durairaj, 2020)	10.26452/ijrps.v1i13.2490	Q4
10	<i>Appraisal of Total Phenol, Flavonoid Contents, and Antioxidant Potential of Folkloric Lannea coromandelica Using In Vitro and In Vivo Assays</i>	(Kumar & Jain, 2015)	10.1155/2015/203679	Q2
11	<i>Fortified Antioxidative Potential by Chrysoeriol through the Regulation of the Nrf2/MAPK-mediated HO-1 Signaling Pathway in RAW 264.7 Cells</i>	(Park, 2018)	10.5352/JLS.2018.28.1.43	Q3

BAB III

HASIL DAN ANALISIS

3.1 Hasil

3.1.1 Profil aktivitas antikanker tanaman kayu tammate (*Lannea coromandelic*)

Hasil pencarian pada search engine google scholar, pubmed dan science direct dengan rentang waktu selama 10 tahun terakhir menggunakan 4 kata kunci menghasilkan 11 artikel hasil penelitian yang dapat dianalisis sebagaimana disajikan dalam tabel berikut

Tabel 4. Hasil seleksi pustaka

No	<i>database</i>	jumlah
1	<i>google scholar</i>	8
2	<i>pubmed</i>	1
3	<i>science direct</i>	2
Total artikel yang dianalisis		11

Kanker ditandai dengan pembelahan sel yang tidak terkendali dan pertumbuhan sel yang tidak normal, yang sebagian besar disebabkan oleh berbagai mutasi gen. Ada upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan pengobatan kanker yang efektif karena resistensi terhadap obat antikanker saat ini telah meningkat. Produk alami merupakan sumber yang menjanjikan dalam pencarian pengobatan antikanker karena memiliki struktur kimia yang unik dan kombinasi senyawa yang mungkin efektif melawan kanker dengan profil toksisitas minimal atau sedikit efek samping dibandingkan dengan terapi antikanker standar. Penelitian ekstensif pada produ alami telah menunjukkan bahwa senyawa alami bioaktif menargetkan berbagai proses seluler dan jalur yang terlibat dalam perkembangan kanker (Ong et al., 2020)

Tabel 5. Hasil Review Artikel tentang Aktivitas Antikanker Kayu tammate (*Lannea coromandelica*)

No	Ekstraksi/ metode	Kandungan Senyawa Aktif	Jenis Kanker	In vivo/In vitro	Sel Model	Mekanisme Kerja	Hasil	Referensi
1.	Ekstrak kulit batang <i>Lannea coromandelica</i> etanol-air 50%.	Asam heksadekanoat dan asam oktadekanoat	Kanker Hati	In vitro	HepG2	menginduksi apoptosis pada sel HepG2 induksi apoptosis secara signifikan menghambat proliferasi sel, dengan apoptosis terinduksi dan G0 / G1	Memiliki sitoksisitas sedang <0,001 g/ml dan selektivitas yang rendah < 3, aktivitas antikanker ini bekerja pada jalur MAPK (RAF/MEK/ERK)	(Weerapreeyakul et al., 2016)
2.	Ekstraksi maserasi kulit kayu <i>Lannea coromandelica</i> 10 g dengan pelarut metanol 100 ml selama 72 jam	Senyawa piperazin, 1-(2 adamantyl)- 4-benzoyl (1- (2- Adamantyl)-4-benzoylpiperazine)	Kanker Payudara	In vitro	MCF7	induksi apoptosis dengan penghentian siklus sel pada fase subG1	Memiliki sitoksisitas 23,83 g/ml aktivitas antikanker ini bekerja pada jalur MAPK (RAF/MEK/ERK)	(C. Sivaraj 1, B. Pavithra 2, 2018)

3.	Ekstraksi kulit kayu batang <i>Lannea coromandelica</i> 30 g dengan menggunakan Heksana soxhlet, Petroleum benzene soxhlet, Metanol soxhlet, dan Kloroform soxhlet	7a-acetoxy-6hydroxyroyleanone	Kanker Esofagus	In vivo	EAC (<i>Ehrlich Ascites Carcimoma</i>)	induksi apoptosis pada gen BCl-2	Memiliki nilai sitoksisitas <0,01. Aktivitas antikanker ini bekerja melalui jalur intrinsik pada apoptosis couple membrane reseptor	(Hossain et al., 2018)
4.	Eksraksi kulit batang <i>lannea coromandelica</i> dengan metanol selama 24 jam kemudian disaring dan pelarutnya diuapkan (rotary evaporator),	Flavan-3-ol	Kanker lambung	In vitro	AGS (kanker lambung)	Menahan perkembangan siklus sel pada fase S	Memiliki sitotoksik tinggi aktivitas melawan sel kanker lambung (AGS) untuk <i>L. coromandeli ca</i> ekstrak kulit	(Akter et al., 2014)

							kayu nilai IC50 0,090 dan daun nilai 0,67 mg/mL, aktifitas ini bekerja melalui jalur MAPK (RAF/MEK/ERK)	
5.	800 g kulit kayu batang <i>lannea coromandelica</i> direndam dalam 99,8% etanol. diulang tiga kali.	Kuersetin	Kanker Payudara	In vivo	MCF7	menginduksi kerusakan DNA, dan menginduksi sitotoksik esitas dengan mengaktifkan jalur intrinsik apoptosis	Pada kulit kayu dan daun memiliki nilai sitotoksik 0,09 (kulit kayu) dan 0,67 (daun) dengan selektivitas yang tinggi yaitu 1,0 mg/ml. aktifitas antikanker ini bekerja	(Rahman et al., 2016)

							melalui jalur MAPK (RAF/MEK/ERK)	
6.	Kulit batang kayu <i>lannea coromandelica</i> (100 g) diekstraksi dengan metanol menggunakan metode refluks selama 3 jam (tiga kali)	Asam galat, (-)-epigallocatechin-3-gallate, catechin, asam klorogenat, dan asam caffeic dalam LCBE	Kanker Payudara	In vitro	RAW 264,7	meningkatkan regulasi faktor nuklir 2 terkait faktor 2 (NRF2) yang dimediasi jalur di RAW 264,7 sel melalui fosforilasi p38 kinase dan c-Jun N-terminal kinase (JNK)	LCBE ditemukan untuk memerangi oksidatif stres dengan meningkatkan ekspresi, baik pada tingkat transkripsi dan translasi, dari primer enzim antioksidan serta enzim detoksifikasi fase II, terutama heme oksigenase 1, melalui peningkatan regulasi	(M. B. Alam et al., 2017)

						<p>faktor nuklir 2 terkait faktor 2 (NRF2) jalur yang dimediasi di RAW 264,7 sel melalui fosforilasi p38 kinase dan c-Jun N-terminal kinase (JNK). LCBE menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat dan mengurangi produksi ROS seluler. Aktivitas ini bekerja pada jalur MAPK (RAF/MEK/</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

7.	250 g kulit batang kayu <i>lannea coromandelica</i> diekstraksi dengan air, etanol 70% dan dengan campuran pelarut berair dan etanol dengan perbandingan yang sama dengan metode maserasi.	Flavan-3-ol	Kanker Hati	In vivo	HepG2	Menghambat pertumbuhan tumor	ERK) Memiliki nilai IC50 (83,28 ± 2,12) g/mL, untuk aktivitas penangkal radikal DPPH. Hasil menyimpulkan bahwa ekstrak etanol dan kombinasi air dan ekstrak kulit kayu alkohol <i>Lannea coromandelica</i> menunjukkan potensi hepatoprotektif dan antioksidan aktivitas karena	(Rao et al., 2014)
----	--	-------------	-------------	---------	-------	------------------------------	--	--------------------

							adanya kelompok fenolik, terpenoid dan alkaloid. Aktifitas ini bekerja melalui jalur MAPK (RAF/MEK/ERK)	
8	1 kg kulit batang <i>lannea coromandelica</i> direfluks dengan methanol selama tiga jam. Filtrat total dipekatkan sampai kering, dalam vakum pada 40°C untuk membuat ekstrak MeOH (390 g).	Kuersetin (3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone)	Kanker Payudara	In vitro dan in vivo	MCF-7	Kuersetin dari golongan flavonoid menghambat sel proliferasi dan pembentukan ROS pada kanker payudara dan Kuersetin menghambat pelepasan P-glikoprotein di Garis sel MCF-7	Persentase penghambatan generasi ROS oleh ekstrak juga tergantung konsentrasi dengan nilai IC ₅₀ 13,7240,48 ug mL, sedangkan nilai IC standar trolox ditemukan menjadi 8,66	(B. Alam et al., 2012)

							+ 0,11 ug/mL. aktifitas ini bekerja pada jalur MAPK (RAF/MEK/ERK)	
9	Kulit batang <i>Lannea Coromandelica</i> Di ekstraksi menggunakan etanol	Asam galat	Kanker Payudara	In vitro	MCF7	menginduksi apoptosis pada sel BC reseptor-positif hormon (MCF-7) dengan mengaktifkan serangkaian caspase seperti caspase 3/7 dan caspase 9 dan menghambat sintase asam lemak yang diekspresikan secara berlebihan	Kandungan tanin dalam penelitian ini ditemukan menjadi lebih tinggi 237,5 g/mg (23,7%) dinyatakan dalam kesetaraan asam tannic. Aktifitas ini bekerja melalui jalur ekstrinsik apoptosis couple membrane reseptor	(Jacques Britto & Durairaj, 2020)

						dalam sel BC		
10	Daun kering <i>Lannea coromandelica</i> (8 g) L. coromandelica diekstraksi dengan metanol 80% oleh Buchi Ekstraktor Kecepatan (tekanan 100 bar, suhu 100°C, waktu pemanasan 5 menit, waktu tahan 3 menit, jumlah siklus 5, dan waktu siklus berakhir 5 menit), dan ekstraksi diulang tiga kali.	Asam galat	Kanker serviks	In vitro	Sel Hela	penurunan viabilitas sel melalui penutupan penurunan jalur kelangsungan hidup kanker termasuk kaskade pensinyalan NF-K β melalui penurunan regulasi komponen p65	semua fraksi pelarut memiliki aktivitas antikanker in vitro terhadap garis sel kanker Hela yang bekerja melalui jalur ekstrinsik apoptosis couple membrane reseptor	(Kumar & Jain, 2015)
11	Ekstrak kulit batang kayu <i>lannea</i>	Kuersetin Chrysoeriol	Kanker payudara	In vitro	RAW 264.7 cells (sel makrofag)	menginduksi ekspresi HO-1 melalui	mekanisme kerja modulasi	(Park, 2018)

	<p><i>coromandelica</i> dengan metanol refluks</p>				<p>upregulasi Nrf2-jalur yang dimediasi melalui fosforilasi p38 dan JNK SB202190</p>	<p>kaskade kinase intraseluler terlibat dalam regulasi ekspresi HO- 1. Quercetin adalah penginduksi gen HO-1 yang efektif melalui aktivasi ERK. Selain itu, ekstrak kulit kayu dari <i>Lannea coromandeli ca</i> menginduksi ekspresi HO- 1 melalui upregulasi Nrf2- jalur yang dimediasi melalui</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>fosforilasi p38 dan JNK SB202190. penambahan masing-masing inhibitor selektif secara signifikan menghapus protein HO-1-1 ekspresi yang diinduksi oleh chrysoeriol. Hasil ini menunjukkan bahwa ekspresi HO-1 yang diinduksi chrysoeriol diatur oleh Molekul pensinyalan ERK, JNK,</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>dan p38 dalam sel RAW 264,7. Aktifitas ini bekerja melalui jalur MAPK (RAF/MEK/ERK)</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Teoritis *Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.)

4.1.1 Klasifikasi

Regnum : Plantae
Phylum : Magnoliophyta
Class : Spermatophyta
Subclass : Rosids
Order : Sapindales
Family : Anacardiaceae
Genus : *Lannea*
Species : *Lannea coromandelica* Houtt.Merr.

(Archive, 2021)

4.1.2 Morfologi

Tanaman kayu tammate merupakan tanaman habitus, biasanya tinggi pohonnya mencapai 6-8 meter, berakar tunggang, batang bercabang. Daun majemuk gasal (ganjil), bentuk anak daun bulat memanjang, ada bekas ibu tangkai daun pada cabang/ ranting, pertulangan daun menyirip. Berwarna hijau pucat. Di lingkungan yang lebih lembab pohon ini tumbuh lebih besar hingga menjadi 20 meter. Di Sri Lanka *Lannea coromandelica* sering tumbuh di singkapan batu atau inselbergs (Asia et al., 2020)

4.1.3 Kandungan

Kandungan senyawa yang terdapat di dalam tanaman kayu tammate (*Lannea coromandelica*) yaitu tannin, saponin, flavonoid, alkaloid, quinon, glikosida, terpenoid, fenol, komarin, steroid, plobatanins, antarquinon, glikosida jantung dan lain sebagainya (Jacques Britto & Durairaj, 2020)

4.1.4 Nama Daerah Asal Tanaman

Tanaman *lannea coromandelica* ini memiliki beragam nama daerah yakni dalam bahasa Jawa dinamakan kayu jaran, dalam bahasa Makassar dinamakan tammate, dan dalam bahasa Bugisnya dinamakan aju jawa (Archive, 2021)

Tanaman obat berfungsi sebagai hadiah alam kepada manusia untuk membantu mereka mengejar kesehatan yang lebih baik. Tumbuhan dan senyawa bioaktifnya berada di praktek pengobatan sejak zaman kuno. Beberapa tanaman obat spesies dan fitokimia mereka menghambat perkembangan dan perkembangan kanker. Berdasarkan penelitian bahwa tanaman tersebut terdiri dari sekitar 250.000 spesies tanaman dan hanya sekitar 10% telah dipelajari untuk pengobatan treatment penyakit yang berbeda. Fitokimia dan analog turunannya hadir di berbagai bagian tanaman, misalnya, bunga, bunga stigma, pericarp, kecambah, buah-buahan, biji, akar, rimpang, batang, daun, embrio, kulit kayu dan melakukan beberapa farmakologis fungsi. Beberapa produk tanaman seperti alkaloid, flavonoid, lignan, saponin, terpena, taxanes, vitamin, mineral, glikosida, gom, minyak, biomolekul, dan bahan primer lainnya metabolit sekunder memainkan peran penting dalam menghambat protein pengaktif sel kanker, enzim, dan pensinyalan jalur [Cdc2, CDK2 dan CDK4 kinase, topoisomerase enzim, siklooksigenase dan COX-2 (Siklooksigenase), Bcl-2, sitokin, PI3K, Akt, MAPK/ERK, MMP, TNK, mekanistik target rapamycin (mTOR) atau dengan mengaktifkan mekanisme perbaikan DNA (p21, p27, p51, p53 gen dan produk proteinnya), protein Bax, Bid, Bak, merangsang pembentukan enzim pelindung (Caspase-3, 7, 8, 9, 10, 12), menginduksi aksi antioksidan (enzim antioksidan misalnya GSH, GST dan GPxn), sehingga menunjukkan efek antikanker yang

kuat dalam hal kemanjurannya pada protein yang disebutkan di atas, enzim dan jalur. (Iqbal et al., 2017)

4.2 Pembahasan Hasil

Pada penelitian ini dibahas aktivitas antikanker yang ditemukan pada tanaman kayu tammate (*Lannea coromandelica*) dengan ekstrak kulit batang kayu tammate dan ekstrak daun tanaman kayu tammate (*Lannea coromandelica*) (Weerapreeyakul et al., 2016) (C. Sivaraj 1, B. Pavithra 2, 2018) (Hossain et al., 2018) (Akter et al., 2014) (Rahman et al., 2016) (M. B. Alam et al., 2017) (Rao et al., 2014) (B. Alam et al., 2012) (Jacques Britto & Durairaj, 2020) (Kumar & Jain, 2015) (Park, 2018).

Pada penelitian ini menggunakan ekstrak dengan pelarut etanol-air, metanol, kloroform dan etanol (Weerapreeyakul et al., 2016) (Rao et al., 2014), ekstrak dengan menggunakan pelarut metanol (C. Sivaraj 1, B. Pavithra 2, 2018) (Akter et al., 2014) (M. B. Alam et al., 2017) (B. Alam et al., 2012) (Kumar & Jain, 2015) (Park, 2018), (Hossain et al., 2018), (Rahman et al., 2016) (Jacques Britto & Durairaj, 2020).

Pada penelitian ini didapatkan nilai aktivitas sitotoksik IC_{50} pada ekstrak tanaman kulit batang kayu tammate (*Lannea coromandelica*) <0,001 g/ml, 23,83 g/ml, 0,27 g/ml, 92,92 g/ml, $(83,28 \pm 2,12)$ g/mL, <0,05-0,001, (Weerapreeyakul et al., 2016), (C. Sivaraj 1, B. Pavithra 2, 2018), (Akter et al., 2014), (Rahman et al., 2016), (Rao et al., 2014), (B. Alam et al., 2012), dan pada daun tanaman kayu tammate (*Lannea coromandelica*) di dapatkan nilai sitotoksik 1,61 g/ml 95,14 g/ml (Akter et al., 2014) (Rahman et al., 2016).

Pada jurnal *Induction of apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells by extracts of Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr. and *Diospyros castanea* (Craib) Fletcher diketahui kandungan senyawa aktif yang bersifat sebagai

antikanker dan model sel/ jenis kanker yang didapatkan pada tanaman kayu tammate (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) yaitu Asam heksadekanoat dan asam oktadekanoat yang berfungsi sebagai antikanker pada jenis kanker hati (HepG2) (Weerapreeyakul et al., 2016).

Asam heksadekanoat dan asam oktadesenoat diidentifikasi sebagai senyawa utama dalam minyak mentah *Lannea Coromandelica* (kulit batang) ekstrak dalam penelitian ini. Struktur control (pada resolusi dari 2,5 Å) dan studi kinetika telah menunjukkan bahwa asam heksadekanoat dapat bertindak sebagai senyawa anti-inflamasi dengan menghambat fosfolipase A2 secara kompetitif. Asam lemak ini berkontribusi sebagai potensi sel anti hepatoma dalam ramuan hidroetanol 50% ekstrak. Asam heksadekanoat dan asam 9,12-oktadekadienoat (Z, Z) adalah asam lemak yang biasa ditemukan dalam ekstraksi cairan super kritis CO₂ yang memediasi apoptosis pada manusia hepatoma sel SMMC-7721, melibatkan jalur pensinyalan mitokondria yang dimediasi spesies oksigen reaktif reactive. Campuran ekstrak asam oktadekanoat terutama terdiri dari asam oleat dan control dari Euphorbia kansui menghasilkan pengurangan yang bergantung pada konsentrasi dalam jumlah sel lambung manusia (SGC-7901), HCC (BEL 7402), dan leukemia (HL-60) dan secara signifikan menghambat proliferasi sel, dengan apoptosis terinduksi dan G₀ / G₁ penghentian siklus sel fase Asam oktadekanoat tidak hanya menyebabkan apoptosis / nekrosis sel tetapi juga berfungsi dan kerusakan control pada control sel tumor dan ultrastruktur sel. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil yaitu aktivitas antikanker ini bekerja pada jalur MAPK (RAF/MEK/ERK) (Weerapreeyakul et al., 2016).

Pada jurnal *Gc-Ms Analysis, Antibacterial And Anticancer Activities Of Bark Extract Of Lannea Coromandelica* (Houtt.) Merr terdapat kandungan senyawa aktif piperazin, 1-(2 adamantyl)- 4-benzoyl (1- (2-Adamantyl)-4-

benzoylpiperazine) yang berfungsi sebagai antikanker pada kanker payudara (MCF7) (C. Sivaraj 1, B. Pavithra 2, 2018) Dilakukan Analisis GC-MS untuk ekstrak metanol *Lannea coromandelica* dan senyawa terelusi ditunjukkan Senyawa piperazin, 1-(2 adamantyl)-4-benzoil (1-(2-Adamantyl)-4-benzoylpiperazine) dielusi oleh GC-MS yang menjadi salah satu alasan untuk sifat antikanker ekstrak. Pada MCF7 maksimum kematian sel adalah $74,20 \pm 0,71\%$ pada 100 g/mL konsentrasi ekstrak kulit kayu *Lannea coromandelica* dan IC50 adalah konsentrasi 23,82 $\mu\text{g/mL}$. Didapatkan pula kandungan senyawa fenolik, terpenoid dan alkaloid dengan jenis kanker dan model sel yang sama yaitu kanker hati (HepG2) (Rao et al., 2014), Senyawa piperazin, 1-(2 adamantyl)-4-benzoyl (1-(2-Adamantyl)-4-benzoylpiperazine) dengan jenis kanker payudara (MCF7) Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil yaitu aktivitas antikanker ini bekerja pada jalur MAPK (RAF/MEK/ERK) (C. Sivaraj 1, B. Pavithra 2, 2018).

Pada jurnal *Phytochemical Screening, Antimicrobial Activity, Antioxidant Capacity And In Vivo Anticancer Activity Of Lannea Coromandelica Bark Extracts* (Hossain et al., 2018) terdapat senyawa aktif ekstrak kloroform yaitu 7-acetoxy-6-hydroxyleanone yang berfungsi sebagai antikanker pada kanker esofagus dengan model sel EAC (*Ehrlich Ascites Carcinoma*) (Hossain et al., 2018). Mekanisme kerja Hasil real time PCR menunjukkan bahwa ekspresi mRNA dari anti-apoptosis Bcl-2 gen diregulasi sebagai efek kloroform pecahan Konsentrasi yang lebih tinggi menciptakan tingkat ekspresi mRNA yang lebih tinggi. Sebaliknya, gen pro-apoptosis Bax tidak terpengaruh oleh pengobatan. Sejalan dengan hasil kami, sebuah studi oleh (Burmistrova et al., 2013) melaporkan bahwa peningkatan ekspresi protein mitokondria pelindung Bcl-2 dan Bcl-xl dalam garis sel tumor manusia tidak mencegah sitotoksitas yang disebabkan oleh abietane. Senyawa paling prinsip dalam Fraksi kloroform adalah

7a-acetoxy-6ahydroxyroyleanone berdasarkan ukuran puncak dalam kromatogram. The abietane diterpene 7a-acetoxy-6a-hydroxyroyleanone telah sebelumnya diisolasi dari *P. grandidentatus* Gurke dan dilaporkan memiliki anti-proliferatif yang kuat aktivitas melawan berbagai lini sel kanker manusia termasuk MCF-7, NCI-H460, SF-268, TK-10, dan UACC-62 (Burmistrova et al., 2013; Marques et al., 2002). Dengan mengetahui senyawa bioaktif dari fraksi yang bertanggung jawab untuk apoptosis menginduksi aktivitas, dapat memberikan informasi dasar sebelum untuk pengembangan tanaman herbal ini sebagai kandidat potensial untuk terapi kanker (Ozaslan et al., 2011). Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil yaitu aktivitas antikanker ini bekerja pada jalur *apoptosis couple membrane receptor* (Hossain et al., 2018).

Pada *Jurnal Cytotoxic activity screening of Bangladeshi medicinal plant extracts* (Akter et al., 2014) di dapatkan kandungan senyawa aktif flavan-3-ol sebagai antikanker lambung dengan mekanisme kerja menahan perkembangan siklus sel pada fase S yang memiliki sitotoksik tinggi aktivitas melawan sel kanker lambung (AGS) untuk *Lannea coromandelica* ekstrak kulit kayu nilai IC₅₀ 0,090 dan daun nilai 0,67 mg/mL. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil yaitu aktivitas antikanker ini bekerja pada jalur MAPK (RAF/MEK/ERK) (Akter et al., 2014).

Pada jurnal *Comparative effect of lannea coromandelica* (Houtt.) merr. *leaves and stem barks on acetic acid induced pain model in mice and chromogenic reagents: Exploring the analgesic potential and phytochemical groups* (Rahman et al., 2016) didapatkan kandungan senyawa aktif kuersetin dari golongan flavonoid sebagai antikanker payudara (MCF7) secara in vivo dengan mekanisme kerja menginduksi apoptosis pada sel kanker dengan relatif rendah toksisitas pada sel normal ditemukan lebih efisien untuk anti-kanker payudara

aktivitas sel kanker. Oleh karena itu, kekuatan antikanker dapat terkait dengan quercetin dalam ekstrak tersebut, yang quercetin dapat menginduksi sitotoksitas pada sel kanker garis melalui berbagai rute tindakan. Quercetin bisa menginduksi kerusakan DNA, yang perlu diperbaiki sebelum pembelahan sel terjadi, dan menginduksi sitotoksik esitas dengan mengaktifkan jalur intrinsik apoptosis. Ini mengkonfirmasi bahwa flavonoid dapat bertanggung jawab untuk aktivitas antikanker. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil yaitu aktivitas antikanker ini bekerja pada jalur intrinsik *apoptosis couple membrane receptor* (Rahman et al., 2016).

Pada Jurnal *Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr. *Induces Heme Oxygenase 1 (HO-1) Expression and Reduces Oxidative Stress via the p38/c-Jun N-Terminal Kinase–Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2 (p38/JNK–NRF2)-Mediated Antioxidant Pathway* (M. B. Alam et al., 2017) didapatkan kandungan senyawa aktif asam galat dari golongan polifenol (fenol dan flavanoid) sebagai antikanker payudara secara in vitro pada RAW 264,7 dengan mekanisme kerja Ekstrak menunjukkan kapasitas yang sangat kuat untuk mengais banyak radikal bebas melalui transfer atom hidrogen dan/atau donasi elektron dan juga spesies oksigen reaktif seluler yang dipadamkan (ROS) generasi tanpa menunjukkan toksisitas apapun. LCBE ditemukan untuk memerangi oksidatif stres dengan meningkatkan ekspresi, baik pada tingkat transkripsi dan translasi, dari primer enzim antioksidan serta enzim detoksifikasi fase II, terutama heme oksigenase 1, melalui peningkatan regulasi faktor nuklir 2 terkait faktor 2 (NRF2) yang dimediasi jalur di RAW 264,7 sel melalui fosforilasi p38 kinase dan c-Jun N-terminal kinase (JNK). LCBE menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat dan mengurangi produksi ROS seluler. Berdasarkan penelitian ini didapatkan

hasil yaitu aktivitas antikanker ini bekerja pada jalur MAPK (RAF/MEK/ERK) (M. B. Alam et al., 2017).

Pada Jurnal *Hepatoprotective and antioxidant activity of Lannea coromandelica Linn. on thioacetamide induced hepatotoxicity in rats* (Rao et al., 2014) didapatkan kandungan senyawa aktif flavan-3-ol dari golongan fenolik, terpenoid dan alkaloid sebagai antikanker hati (HepG2) secara in vivo dengan mekanisme kerja menghambat pertumbuhan tumor berdasarkan hasil penelitian memiliki nilai IC50 ($83,28 \pm 2,12$) g/mL, untuk aktivitas penangkal radikal DPPH. Hasil menyimpulkan bahwa ekstrak etanol dan kombinasi air dan ekstrak kulit kayu alkohol *Lannea coromandelica* menunjukkan potensi hepatoprotektif dan antioksidan. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil yaitu aktivitas antikanker ini bekerja pada jalur MAPK (RAF/MEK/ERK) (Rao et al., 2014)

Pada Jurnal *Antioxidant and Analgesic Activities of Lannea coromandelica Linn. Bark Extract* (B. Alam et al., 2012) di dapatkan kandungan senyawa aktif kuersetin dari golongan flavonoid sebagai antikanker hati (HepG2) secara in vivo dengan mekanisme kerja kuersetin menghambat sel proliferasi dan menginduksi apoptosis pada beberapa jenis kanker sel MCF-7. Kuersetin dari golongan flavonoid menunjukkan antioksidan penting aktivitas, tidak hanya dengan menghambat pembentukan ROS, tetapi juga dengan mempengaruhi aktivitas berbagai macam enzim detoksifikasi, seperti: sebagai siklooksigenase, lipoksigenase dan oksida nitrat yang dapat diinduksi sintase. Kuersetin menghambat pelepasan P-glikoprotein di Garis sel MCF-7 dan untuk meningkatkan aktivitas antikanker in vitro dari adriamycin dalam garis sel kanker payudara. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil yaitu aktivitas antikanker ini bekerja pada jalur MAPK (RAF/MEK/ERK) (B. Alam et al., 2012).

Pada Jurnal *Phytochemical profile and medicinal potentials of lannea coromandelica stem* (Jacques Britto & Durairaj, 2020) didapatkan kandungan senyawa aktif asam galat dari golongan tanin sebagai antikanker payudara (MCF7) Tanin telah digambarkan sebagai agen antikanker di semua molekul subtype, ditemukan menginduksi apoptosis pada sel BC reseptor-positif hormon (MCF-7) terutama dengan mengaktifkan serangkaian caspase seperti caspase 3/7 dan caspase 9 dan menghambat sintase asam lemak yang diekspresikan secara berlebihan dalam sel BC. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil yaitu aktivitas antikanker ini bekerja pada jalur *apoptosis couple membrane receptor* (Jacques Britto & Durairaj, 2020).

Pada Jurnal *Appraisal of Total Phenol, Flavonoid Contents, and Antioxidant Potential of Folkloric Lannea coromandelica Using In Vitro and In Vivo Assays* (Kumar & Jain, 2015) didapatkan kandungan senyawa aktif asam galat dari golongan fenolik sebagai antikanker secara in vitro dengan mekanisme kerja peningkatan apoptosis melalui downregulasi E2F1 dan upregulasi protein Bax. Senyawa fenolik yang ada dalam SF daun LC dapat juga menyebabkan penurunan viabilitas sel melalui penutupan penurunan jalur kelangsungan hidup kanker termasuk kaskade pensinyalan NF- κ B melalui penurunan regulasi komponen p65. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil yaitu aktivitas antikanker ini bekerja pada jalur *apoptosis couple membrane receptor* (Kumar & Jain, 2015).

Pada Jurnal *Fortified Antioxidative Potential by Chrysoeriol through the Regulation of the Nrf2/MAPK-mediated HO-1 Signaling Pathway in RAW 264.7 Cells* (Park, 2018) didapatkan kandungan senyawa aktif Chrysoeriol dan kuersetin sebagai antikanker payudara pada sel RAW 264.7 secara in vitro dengan mekanisme kerja modulasi kaskade kinase intraseluler terlibat dalam regulasi

ekspresi HO-1. Quercetin adalah penginduksi gen HO-1 yang efektif melalui aktivasi ERK tetapi tidak JNK dan p38 dalam makrofag. Selain itu, ekstrak kulit kayu dari *Lannea coromandelica* menginduksi ekspresi HO-1 melalui upregulasi Nrf2- jalur yang dimediasi melalui fosforilasi p38 dan JNK SB202190. penambahan masing-masing inhibitor selektif secara signifikan menghapus protein HO-1-1 ekspresi yang diinduksi oleh chrysoeriol. Hasil ini menunjukkan bahwa ekspresi HO-1 yang diinduksi chrysoeriol diatur oleh Molekul pensinyalan ERK, JNK, dan p38 dalam sel RAW 264,7. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil yaitu aktivitas antikanker ini bekerja pada jalur MAPK (RAF/MEK/ERK) (Park, 2018)

Pada penelitian ini didapatkan persamaan dan perbedaan jurnal diatas yaitu berdasarkan mekanisme kerjanya pada *jurnal Induction of apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells by extracts of Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr. and *Diospyros castanea (Craib) Fletcher* (Weerapreeyakul et al., 2016) *Gc- Ms Analysis, Antibacterial And Anticancer Activities Of Bark Extract Of Lannea Coromandelica* (Houtt.) Merr (C. Sivaraj 1, B. Pavithra 2, 2018) *Cytotoxic activity screening of Bangladeshi medicinal plant extracts* (Akter et al., 2014) *Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr. *Induces Heme Oxygenase 1 (HO-1) Expression and Reduces Oxidative Stress via the p38/c-Jun N-Terminal Kinase– Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2 (p38/JNK–NRF2)-Mediated Antioxidant Pathway* (M. B. Alam et al., 2017) *Hepatoprotective and antioxidant activity of Lannea coromandelica Linn. on thioacetamide induced hepatotoxicity in rats* (Rao et al., 2014) *Antioxidant and Analgesic Activities of Lannea coromandelica Linn. Bark Extract* (B. Alam et al., 2012) *Fortified Antioxidative Potential by Chrysoeriol through the Regulation of the Nrf2/MAPK-mediated HO-1 Signaling Pathway in RAW 264.7 Cells* (Park, 2018) bekerja pada jalur

MAPK (RAF/MEK/ERK). Sedangkan pada jurnal *Phytochemical Screening, Antimicrobial Activity, Antioxidant Capacity And In Vivo Anticancer Activity Of Lannea Coromandelica Bark Extracts* (Hossain et al., 2018) *Comparative effect of lannea coromandelica (Houtt.) merr. leaves and stem barks on acetic acid induced pain model in mice and chromogenic reagents: Exploring the analgesic potential and phytochemical groups* (Rahman et al., 2016) *Phytochemical profile and medicinal potentials of lannea coromandelica stem* (Jacques Britto & Durairaj, 2020) *Appraisal of Total Phenol, Flavonoid Contents, and Antioxidant Potential of Folkloric Lannea coromandelica Using In Vitro and In Vivo Assays* (Kumar & Jain, 2015) bekerja pada jalur *apoptosis couple membrane receptor*

4.3 Mekanisme kerja antikanker pada tanaman kayu tammate (*Lannea coromandelica*)

Mekanisme kerja kandungan senyawa aktif antikanker pada tanaman kayu tammate (*lannea coromandelica*). Pada penelitian ini yang dibahas adalah induksi apoptosis secara signifikan menghambat proliferasi sel, dengan apoptosis terinduksi dan G0 / G1 (Weerapreeyakul et al., 2016), induksi apoptosis dengan penghentian siklus sel pada fase subG1 (C. Sivaraj 1, B. Pavithra 2, 2018), induksi apoptosis pada gen BCl-2 (Hossain et al., 2018), Menahan perkembangan siklus sel pada fase S (Akter et al., 2014), Menahan perkembangan siklus sel pada fase G0/G1 (Rahman et al., 2016), peningkatan regulasi faktor nuklir 2 terkait faktor 2 (NRF2) yang dimediasi jalur di RAW 264,7 sel melalui fosforilasi p38 kinase dan c-Jun N-terminal kinase (JNK) (M. B. Alam et al., 2017), Menghambat pertumbuhan tumor (Rao et al., 2014), kuersetin dari golongan flavonoid menghambat sel proliferasi dan pembentukan ROS pada kanker payudara dan Kuersetin menghambat pelepasan P-glikoprotein di Garis sel MCF-7 (B. Alam et al., 2012), menginduksi apoptosis pada sel BC reseptor-positif hormon (MCF-7)

dengan mengaktifkan serangkaian caspase seperti caspase 3/7 dan caspase 9 dan menghambat sintase asam lemak yang diekspresikan secara berlebihan dalam sel BC (Jacques Britto & Durairaj, 2020), penurunan viabilitas sel melalui penutupan penurunan jalur kelangsungan hidup kanker termasuk kaskade pensinyalan NF- κ B melalui penurunan regulasi komponen p65 (Kumar & Jain, 2015), menginduksi ekspresi HO-1 melalui upregulasi Nrf2-jalur yang dimediasi melalui fosforilasi p38 dan JNK SB202190 (Park, 2018).




4.4 Tinjauan Teori Terapi Kanker Menggunakan Fitokimia

Potensi tanaman obat sebagai agen terapeutik tergantung pada kualitas dan kuantitas fitokimia aktif dalam mereka, yang bervariasi dengan garis lintang, garis bujur, ketinggian, usia, iklim dan musim dari spesies ke spesies. Fungsi farmakologis dan tingkat mereka bervariasi dengan bagian tanaman. Lekula fitomo bioaktif ini juga dapat digunakan dalam terapi antikanker tetapi masih menuntut penelitian lebih lanjut. Pemurnian cules fitomole aktif mungkin melibatkan berbagai strategi seperti kombinatorial kimia, uji isolasi, dan fraksinasi yang dipandu bioassay. Fraksinasi terpandu bioassay dengan berbagai teknik analisis dapat digunakan untuk memisahkan berbagai senyawa bioaktif dari campuran senyawa. Prosesnya dimulai dari alam uji ekstrak (dari bahan tanaman kering/basah) dengan aktivitas biologis yang dikonfirmasi. Kemudian, matriks yang sesuai digunakan untuk fraksinasi ekstrak aktif, diuji bioaktivitasnya dan berbagai macamnya teknik analisis seperti TLC, HPLC, FTIR, Mass spektroskopi dan NMR dll harus digunakan untuk pemisahan separation pecahan aktif. Untuk naiknya urutan polaritas, pelarut yang berbeda harus menggunakan. Superdex, Sephadex, Silica atau matriks lain yang sesuai dapat digunakan untuk fraksinasi. Ada begitu banyak zat pewarna digunakan untuk mendeteksi senyawa alami dalam tanaman obat misalnya Asam vanilisulfat (Iqbal et al., 2017)

Prosedur ini bisa berubah namun kemurnian, kualitas dan kuantitas senyawa bioaktif harus setinggi mungkin dan ini dapat dicapai dengan menggunakan kualitas tinggi pelarut, matriks dan penanganan hati-hati. Setelah pemurnian fitomolekul ini, mereka harus diperiksa untuk efek antikanker in-vitro atau in-vivo. Jika sifat anti kanker yang lebih baik dicapai oleh molekul maka aspek lainnya seperti farmakokinetik, farmakodinamik, imunogenisitas, nasib

metabolik, keamanan hayati dan efek samping, interaksi obat, dosis konsentrasi dll harus diteliti untuk merancang obat masa depan (Iqbal et al., 2017).



Gambar 2 Skema rinci sintesis senyawa bioaktif, optimasi, karakterisasi, pengujian, dan aplikasi potensial sebagai kanker agen terapeutik (Sumber : Iqbal et al., 2017)


4.5 Mekanisme Induksi Apoptosis Oleh Metabolit *lannea coromandelica* pada Sel Kanker

Apoptosis atau sel terprogram kematian memainkan peran penting dalam banyak proses dan terlibat dalam berbagai penyakit. Itu istilah ini berasal dari kata Yunani, yang berarti a tanaman menumpahkan daun 1, 2. Apoptosis, sumur penghancuran seluler yang diarahkan oleh gen yang dikoreografikan, memainkan peran penting dalam berbagai biologi peristiwa, termasuk morfogenesis, homeostatis, pemeliharaan berbagai jaringan dan penghapusan sel-sel berbahaya

sementara apoptosis yang tidak teratur memiliki telah terlibat dalam berbagai penyakit seperti kanker, autoimun sistemik dan organ spesifik penyakit dan gangguan neurodegeneratif Apoptosis terjadi: (1) selama perkembangan dan penuaan (2) penghapusan berlebihan dari berpotensi sel berbahaya (3) sel tumor (4) terinfeksi virus sel. Apoptosis juga terjadi sebagai mekanisme pertahanan seperti dalam reaksi imun atau ketika sel-sel rusak oleh penyakit atau agen berbahaya.

4.5.1 Proses Apoptosis:

Proses apoptosis terdiri dari tiga langkah. Dalam langkah pertama, sinyal intraseluler dan ekstraseluler mengaktifkan jalur spesifik yang akan menentukan apakah sel harus hidup atau mati. Tumornya gen supresor p53 terlibat dalam pemeriksaan yang memutuskan apakah sel berkembang di dalam sel siklus atau mati dengan apoptosis sebagai respons terhadap kerusakan asam deoksiribonukleat (DNA). Interaksi ligan Fas atau faktor nekrosis tumor (TNF) dengan reseptor membran mereka meningkatkan intraseluler tingkat ceramide. Faktor pertumbuhan atau interaksi dengan matriks ekstraseluler meningkatkan kalsium intraseluler dan mengaktifkan protein kinase C (PKC). Itu langkah kedua melibatkan dua pos pemeriksaan yang bisa mengatur jalur kematian sel akhir. Satu pos pemeriksaan dikendalikan oleh protein dari Bcl-2 keluarga. Ekspresi Bcl-2 dapat ditingkatkan dengan interaksi dengan protein virus atau ditiru oleh LMP-1 dari virus Epstein-Barr. Yang lain pos pemeriksaan dapat ditentukan oleh sistein protease terkait dengan interleukin-1 β (IL-1-) converting enzyme (ICE) yang dihambat oleh Protein CrmA dari virus cacar sapi. Kematian sel jalur kemudian mencapai titik tidak bisa kembali, dan apoptosis dikaitkan dengan DNA internukleosomal fragmentasi, proteolisis beberapa nuklir dan protein sitosol, dan karakteristik morfologis perubahan



Gambar 3. model hipotetik regulasi kematian sel pada apoptosis (Sumber : Iqbal et al., 2017).

4.5.2 Morfologi apoptosis:

Mikroskop cahaya dan elektron telah mengidentifikasi berbagai perubahan morfologi yang terjadi selama apoptosis. Selama proses awal apoptosis, penyusutan sel dan piknosis terlihat dengan mikroskop cahaya. Pada penyusutan sel, ukuran sel lebih kecil, sitoplasma padat dan organel lebih rapat. Pyknosis adalah hasil dari kondensasi kromatin dan ini adalah fitur yang paling khas dari apoptosis.

Pemeriksaan histologis apoptosis dengan pewarnaan hematoxylin dan eosin, menunjukkan yang melibatkan sel tunggal atau kelompok kecil sel. Sel apoptosis muncul sebagai massa bulat atau oval dengan sitoplasma eosinofilik gelap dan fragmen kromatin inti ungu padat. Mikroskop elektron dapat lebih menentukan perubahan sub-seluler. Terjadi blebbing membran plasma yang luas diikuti oleh karyorrhexis dan pemisahan fragmen sel menjadi badan apoptosis selama proses yang disebut “budding”. Badan apoptosis terdiri dari sitoplasma dengan organel padat dengan atau tanpa fragmen nuklir. Integritas organel masih

dipertahankan dan semua ini tertutup dalam membran plasma yang utuh. Badan-badan ini kemudian difagositosis oleh makrofag, sel parenkim, atau sel neoplastik dan didegradasi di dalam fagolisosom. Makrofag yang menelan dan mencerna sel-sel apoptosis disebut “makrofag tingibile body (potongan-potongan nukleus dari sel-sel apoptosis)” dan sering ditemukan di dalam pusat germinal reaktif folikel limfoid atau kadang-kadang di dalam korteks timus.

4.5.3 Karakterisasi apoptosis:

Apoptosis dicirikan oleh fenomenologi spesifik; Pertama, Kondensasi inti sel dan degradasi DNA nuklir melalui pembelahan endonuklear DNA kromosom, yang pecah pertama menjadi besar (50~300 kb) dan kemudian menjadi fragmen yang sangat kecil. Kedua, Dalam kasus apoptosis, kematian sel adalah bunuh diri karena sel menjalankan program internal kematiannya termasuk aktivasi protease endogen, enzim pendegradasi protein.


4.5.4 Mekanisme apoptosis:

Ada dua jalur berbeda yang dapat memulai kaskade kaspase, menghasilkan apoptosis: jalur intrinsik (atau mitokondria) dan jalur ekstrinsik (atau reseptor kematian). Ada jalur tambahan yang melibatkan sitotoksitas dan perforin yang dimediasi sel-T. pembunuhan sel yang bergantung pada granzim. Jalur perforin/granzim dapat menginduksi apoptosis baik melalui granzim B atau granzim A. Jalur ekstrinsik, intrinsik, dan granzim B bertemu di terminal yang sama, atau jalur eksekusi. Jalur ini diprakarsai oleh pembelahan caspase-3 dan menghasilkan fragmentasi DNA, degradasi protein sitoskeletal dan nukleus, ikatan silang protein, pembentukan badan apoptosis, ekspresi ligan untuk reseptor sel fagositik dan akhirnya diambil oleh sel fagosit. Jalur granzim a mengaktifkan jalur kematian sel paralel yang independen caspase melalui kerusakan DNA untai tunggal

4.5.5 Jalur Ekstrinsik:

Jalur pensinyalan ekstrinsik yang memulai apoptosis melibatkan interaksi yang diperantarai reseptor transmembran. Jalur ini diaktifkan oleh stimulasi reseptor kematian (termasuk Fas, TNFR1, DR4 dan DR5) setelah pengikatan ligan kematian (FasL, TNF α , TRAIL, dan TNFSF10). Reseptor kematian dicirikan oleh motif intraseluler yang mampu berinteraksi homotipik, termasuk itu domain kematian (DD) dan domain efektor kematian (DED). Pengikatan ligan, misalnya FasL, ke reseptor kematian mereorganisasi kompleks Fas yang tidak aktif dan merangsang perekrutan protein adaptor seperti domain kematian terkait Fas (FADD).

Protein adaptor FADD mengandung dua motif interaksi: domain DD yang berinteraksi dengan domain DD dari reseptor Fas, dan DED yang memfasilitasi perekrutan procaspase-8 (atau -10) dan pembentukan kompleks pensinyalan yang menginduksi kematian (DISC). Pembentukan DISC mengarah pada aktivasi autocatalytic caspase-8 yang kemudian membelah dan mengaktifkan downstream effector caspase-3. Setelah caspase-8 diaktifkan, fase eksekusi apoptosis dipicu pada gambar



Gambar 4. representasi skema dari kejadian apoptotik (Sumber: Iqbal et al., 2017).

4.5.6 Jalur Intrinsik:

Jalur apoptosis intrinsik, yang dimediasi oleh mitokondria, diaktifkan oleh banyak rangsangan ekstraseluler dan intraseluler termasuk hilangnya faktor kelangsungan hidup / trofik, racun, radiasi, hipoksia, stres oksidatif, reperfusi iskemia dan kerusakan DNA . Permeabilisasi membran luar mitokondria (MOMP) adalah peristiwa penting dalam jalur intrinsik apoptosis; anggota keluarga Bcl-2 memiliki peran utama dalam permeabilisasi yang bekerja pada membran mitokondria luar. Sinyal kematian menyebabkan protein Bcl-2 pro-apoptosis memungkinkan sitokrom c keluar dari mitokondria.

Sitokrom c yang dilepaskan dan faktor pengaktif protease apoptosis 1 (Apaf-1) berikatan dengan caspase 9, yang kemudian mengaktifkan kaskade caspase, yang menyebabkan kematian sel. Juga, induksi protein domain pro-apoptosis BH3 saja [Bid, Bad, Noxa dan p53-up-regulated modulator of apoptosis (PUMA)] dapat menyampaikan sinyal ke mitokondria. Setelah diinduksi, protein ini dapat memfasilitasi perakitan Bax dan Bak pro-apoptosis ke dalam pori-pori di membran luar mitokondria. Prosesnya melibatkan perubahan permeabilitas mitokondria dan pelepasan berbagai faktor yang terlibat dalam apoptosis, termasuk sitokrom c dan faktor pemicu apoptosis. MOMP menyebabkan pelepasan Cyt c ke dalam sitoplasma, di mana, dengan adanya dATP, ia menginduksi pembentukan kompleks makromolekul yang mengandung Apaf1 yang dikenal sebagai apoptosom. Kompleks ini mengikat dan mendorong aktivasi proteolitik dari procaspase-9. Caspase-9 yang matang tetap terikat pada apoptosom di mana ia merekrut dan mengaktifkan algojo caspase-3 dan/atau -7.

Selain pelepasan Cyt c, induksi MOMP menyebabkan pelepasan sitosolik dari molekul pro-apoptosis esensial lainnya seperti Smac/Diablo dan Omi/AtrA2, yang dapat meningkatkan eksekusi apoptosis dengan menonaktifkan inhibitor protein apoptosis (IAPs). Dalam kondisi yang tidak menimbulkan stres, pada kenyataannya, kaspase dihambat oleh IAP; protein XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis) ini dianggap yang paling efisien: ia mengikat bentuk aktif caspase-3, -7 dan -9 dan secara langsung menghambat aktivitas proteolitiknya. Intrinsik dan ekstrinsik (atau reseptor kematian) telah dijelaskan dengan baik yang melibatkan sejumlah protein

4.6 Mekanisme MAPK (RAF/RAS/ERK) Oleh Metabolit *lannea coromandelica* pada Sel Kanker

4.6.1 Jalur pensinyalan MAPK

Di antara banyak jalur pensinyalan intraseluler, jalur MAPK memainkan peran yang lebih penting dalam sel proliferasi, diferensiasi, apoptosis, angiogenesis dan metastasis tumor daripada jalur lain. Empat berikutt Kaskade MAPK telah diidentifikasi dalam sel eukariotik: ERK, JNK/protein kinase yang diaktifkan oleh stres, p38 MAPK dan Jalur transduksi sinyal ERK5. Setiap pensinyalan MAPK kaskade terdiri dari setidaknya tiga tingkatan: MAP3K, MAPKK dan MAPK (3,6) (Gbr. 1). Penelitian telah menunjukkan bahwa JNK dan p38 Jalur MAPK terutama terkait dengan stres dan apoptosis sel, sedangkan jalur pensinyalan ERK/MAPK, yang merupakan jalur pensinyalan MAPK yang paling banyak dipelajari, sangat dekat terkait dengan proliferasi dan diferensiasi sel dan memainkan peran penting dalam jaringan transduksi sinyal sel

Struktur dan fungsi ERK/MAPK

Di antara semua jaringan pensinyalan, jalur transmisi sinyal MAPK memainkan peran penting dalam mengendalikan berbagai proses fisiologis dalam

sel, seperti pertumbuhan, perkembangan, pembelahan dan kematian sel. ERK adalah anggota MAPK keluarga, dan jalur pensinyalan ERK/MAPK adalah intinya jaringan pensinyalan yang terlibat dalam mengatur pertumbuhan sel, pengembangan dan divisi. Langkah-langkah transmisi sinyal dasar ikuti kaskade enzimatis tersier MAPK, yang terdiri dari: dari urutan aktivator hulu, MAP3K, MAP2K dan MAPK. Di jalur ERK, Ras bertindak sebagai protein pengaktif hulu, Raf bertindak sebagai MAP3K, MAPK/ERK kinase (MEK) bertindak sebagai MAPKK dan ERK adalah MAPK, membentuk Jalur Ras-Raf-MEK-ERK . Anggota keluarga ERK. ERK, sejenis serin/reonin protein kinase, adalah protein transduksi sinyal yang mentransmisikan sinyal mitogen. ERK umumnya terletak di sitoplasma; setelah aktivasi, ERK memasuki nukleus dan mengatur aktivitas faktor transkripsi dan ekspresi gen. Melalui kloning buatan dan analisis sekuensing, keluarga ERK memiliki telah terbukti terdiri dari ERK 1, 2, 3, 5 dan 6. ERK1 dan ERK2 adalah dua anggota penting dari jalur MAPK/ERK, dengan berat molekul masing-masing 44 dan 42 kDa . C-terminus ERK5 berisi sinyal lokalisasi nuklir (NLS), dua daerah kaya prolin dan aktivasi transkripsi domain (TAD). ERK5 lebih dari dua kali berat molekul MAPK lainnya (110 kDa). Perbedaan struktural ini memungkinkan ERK5 aktif untuk memfosforilasi sendiri TAD terminal-C-nya, yang adalah kemampuan unik ERK5 untuk secara langsung mengontrol gennya sendiri transkripsi. Dalam keadaan tidak terfosforilasi, ERK5 berada di konformasi tidak aktif dan domain terminal N- dan C-nya saling berhubungan di dalam sitoplasma. Aktivasi MEK5 menginduksi konformasi terbuka ERK5, mengekspos NLS, mengurangi penghambatan diri dan mempromosikan translokasi ERK5 ke inti. Aktivitas ERK5 juga diatur oleh penyambungannya varian (a, b, dan c). Hanya ERK5a yang menunjukkan aktivitas kinase, dan baik ERK5b dan c kekurangan aktivitas protein kinase dan

dapat menghambat stimulasi ERK5a yang dimediasi MEK5. Itu manuskrip saat ini berfokus pada pensinyalan ERK1/2/MAPK jalan. Jalur ERK protein hulu dan mekanisme aktivasi kinase-nisma. Beberapa stimulan seperti faktor pertumbuhan, sitokin, virus, ligan reseptor berpasangan G-protein, dan onkogen mengaktifkan jalur ERK. Molekul kunci dalam ERK/MAPK jalur pensinyalan terutama mencakup protein G kecil Ras dan hilir Raf kinase, MEK1/2 dan ERK1/2. Ras adalah yang paling produk yang dilestarikan yang dikodekan oleh Ha-ras, Hi-ras, dan N-ras onkogen dari keluarga gen ras. Raf kinase adalah produk dari onkogen raf. MEK1 dan MEK2 adalah spesifisitas ganda yang langka kinase yang dapat mengaktifkan ERK melalui fosforilasi pada dua situs peraturan, Tyr 204/187 dan Thr 202/185. Ras. Ras, protein hulu dari jalur Raf-MEK-ERK, adalah protein G kecil yang paling awal ditemukan dan produk dari onkogen ras. Ini memiliki konformasi pengikatan GTP aktif dan konformasi pengikatan PDB yang tidak aktif. Proteinnya dapat bergantian antara dua konformasi untuk mengatur sinyal transduksi. Ras diaktifkan oleh banyak faktor perangsang, seperti faktor pertumbuhan epidermal (EGF), nekrosis tumor faktor, aktivator protein kinase C (PKC) dan keluarga Src anggota. Ketika sinyal ekstraseluler berikatan dengan reseptor, molekul konektor, pengikatan reseptor faktor pertumbuhan protein 2 (Grb2), berikatan dengan reseptor yang diaktifkan dan berinteraksi dengan urutan kaya prolin di C-terminus dari son of sevenless (SOS) untuk membentuk kompleks reseptor-Grb2-SOS. Pengikatan SOS ke situs fosforilasi Tyr pada reseptor atau protein substrat reseptor menyebabkan translokasi SOS sitoplasma ke membran, menghasilkan konsentrasi tinggi SOS dekat Ras. SOS dan Ras-GDP mempromosikan penggantian PDB dengan GTP di Ras, sehingga mengaktifkan Ras untuk memulai jalur Ras

Protein kinase Raf adalah protein yang dikodekan oleh raf gen dan terdiri dari 648 asam amino (aa) dengan molekul berat 40-75 kDa. Raf menunjukkan protein serin/treonin aktivitas kinase setelah mengikat Ras. Struktur molekulnya terdiri dari tiga kawasan konservasi: Kawasan konservasi (CR) I (terletak di aa 61-194), CR2 (terletak di aa 254-269) dan CR3 (terletak di aa 335-627). CR1, terletak di terminal amino, kaya akan sistein dan mengandung struktur seperti jari seng, mirip dengan wilayah pengikatan ligan PKC. CR1 adalah situs utama pengikatan Ras teraktivasi ke protein kinase Raf-1. CR2 hadir di dekat terminal amino dan mengandung banyak residu serin dan treonin. CR3, terletak di karboksi

4.6.2 Aktivasi jalur pensinyalan ERK/MAPK

Berbagai faktor perangsang, seperti sitokin, virus, Ligan dan onkogen reseptor berpasangan G-protein, memainkan peran pengaturan dengan mengaktifkan jalur pensinyalan ERK/MAPK. Jalur pensinyalan ERK/MAPK dapat diaktifkan melalui cara-cara berikut:

- i) aktivasi Ca^{2+} ;
- ii) reseptor tirosinaktivasi Ras kinase;
- iii) aktivasi yang dimediasi PKC; dan iv, G aktivasi reseptor berpasangan protein

4.6.3 Jalur pensinyalan ERK/MAPK dan tumorigenesis

Jalur pensinyalan ERK/MAPK tidak hanya terlibat dalam mengatur fungsi biologis seluler, seperti proliferasi sel, diferensiasi sel, regulasi siklus sel, apoptosis sel dan pembentukan jaringan, tetapi juga terkait dengan pembentukan tumor. Ekspresi ERK yang meningkat telah terdeteksi pada berbagai tumor manusia, seperti ovarium, usus besar, payudara dan kanker paru-paru. Denkert et al menemukan bahwa ekspresi MAPK phosphatase-1 (MKP-1) pada permukaan ovarium normal epitel dan kistadenoma jinak meningkat dibandingkan dengan

karsinoma invasif dan tumor potensial keganasan rendah dan tumor batas. Tingkat ekspresi MKP-1 dalam tumor jaringan pasien dengan penyakit stadium III/IV secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan pasien dengan penyakit stadium I/II. Ekspresi bentuk terfosforilasi ERK1/2 (p-ERK1/2) meningkat secara signifikan pada jaringan ovarium normal, jinak tumor dan tumor borderline. tingkat ekspresi p-ERK1/2 pada pasien stadium III/IV secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan pasien stadium I/II. Ada korelasi negatif yang signifikan antara MKP-1 dan p-ERK1/2 ekspresi dalam jaringan kanker ovarium yang sama terdeteksi oleh imunohistokimia dan western blotting. Ekspresi tidak normal MKP-1 dan ERK mungkin memainkan peran dalam pengembangan kanker ovarium. Hong et al menemukan bahwa tingkat ekspresi MAPK1 dan ERK pada jaringan kanker ovarium lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan normal yang berdekatan. Lee dkk menunjukkan bahwa tingkat fosforilasi MEK pada kanker usus besar, adenoma vili dan adenoma tubular adalah 76, 40 dan 30%, masing-masing, sedangkan fosforilasi MEK dalam keadaan normal sel mukosa kolon hampir tidak terdeteksi. Kontinu aktivasi jalur pensinyalan ERK/MAPK dapat meningkatkan transformasi sel normal menjadi sel tumor, sedangkan penghambatan jalur pensinyalan ERK / MAPK dapat memulihkan sel tumor ke keadaan tidak berubah secara in vitro dan dapat menghambat pertumbuhan tumor in vivo . Oleh karena itu, peningkatan aktivasi jalur pensinyalan ERK / MAPK mungkin terkait erat dengan terjadinya dan perkembangan tumor. Peran ERK/MAPK dalam proliferasi sel. Proliferasi sel tanpa batas, diferensiasi dan kurangnya apoptosis adalah penting karakteristik biologis tumor. Aktivasi dari jalur pensinyalan ERK/MAPK mendorong proliferasi dan memiliki efek anti-apoptosis. VEGF yang diinduksi hipoksia dapat menghambat apoptosis sel-sel yang kekurangan serum dengan mengaktifkan Jalur

pensinyalan ERK/MAPK. Menghambat ekspresi jalur ini dapat menghambat proliferasi dan kurangnya apoptosis pada sel tumor, dan mempromosikan diferensiasi mereka.

Gauthier et al menemukan bahwa jalur pensinyalan ERK1/2 terlibat dalam kelangsungan hidup sel setelah cedera usus, dan penghambatan jalur ini dapat mempromosikan apoptosis sel cedera usus. Huang et al menemukan bahwa memblokir Jalur pensinyalan ERK/MAPK menghambat proliferasi garis sel limfoma sel B besar yang menyebar dan sel yang dipromosikan apoptosis. Menghambat ekspresi jalur pensinyalan ERK / MAPK untuk menghambat proliferasi sel tumor mungkin melibatkan penghambatan siklus sel. Sebolt-Leopold dkk menunjukkan bahwa penggunaan inhibitor MEK1/2 untuk menghambat ERK1/2 aktivitas dalam sel kanker usus besar dapat mencegah sel dari memasuki fase S dari fase G1, dan menghambat pertumbuhan sel-sel yang melekat. Penghambatan ERK/MAPK jalur pensinyalan dapat mengurangi diferensiasi sel dan efek anti-apoptosis. Maemura et al melaporkan bahwa Jalur pensinyalan ERK/MAPK mendorong proliferasi dan menghambat apoptosis dengan mempengaruhi aktivitas downstream protein pengatur siklus sel, protein terkait apoptosis dan molekul efektor lainnya, seperti cyclin D1 spesifik G1/S. Ellipticine, alkaloid dengan aktivitas anti-tumor, menginduksi apoptosis dari garis sel kanker endometrium manusia RL95-2 dengan mengaktifkan spesies oksigen reaktif dan MAPK/ERK. Hormon pelepas gonadotropin menginduksi aktivasi Jalur pensinyalan MAPK pada sel normal dan karsinoma ovarium dan plasenta manusia. Protein seperti SPACRC (SPARCL1) diekspresikan secara berlebihan pada kanker ovarium; dengan menghambat aktivasi jalur pensinyalan MEK / ERK, SPARCL1 adalah diturunkan regulasi melalui jalur MEK/ERK dan menghambat proliferasi dan migrasi sel kanker ovarium.

4.6.4 Pensinyalan ERK / MAPK dalam invasi tumor dan metastasis

Invasi dan metastasis sel tumor terjadi dalam tiga tahap: Adhesi, degradasi dan migrasi. Sel tumor pecah dari tumor primer, melekat pada membran basal dan menjadi invasif. Sel tumor menyusup dan tumbuh di sekitar stroma dan memasuki sistem peredaran darah, di mana sebagian besar sel dibunuh oleh sistem kekebalan. Sejumlah kecil sel tumor dengan kemampuan bertahan hidup yang kuat mencapai target organ dan terus berkembang biak, membentuk metastasis baru di dengan cara yang sama seperti tumor primer. Proses ini melibatkan koordinasi beberapa jalur pensinyalan, dan Jalur pensinyalan ERK/MAPK memainkan peran penting dalam invasi tumor dan metastasis. Sung et al membuat model tikus metastatic xenotransplantasi menggunakan karsinoma ovarium manusia SK-OV-3 sel. Mereka menemukan bahwa subunit reseptor asam – aminobutirat

(GABRP) ekspresi diregulasi (>4 kali lipat) dalam metastasis jaringan dari tikus xenograft dibandingkan dengan SK-OV-3 sel. Knockdown GABRP mengurangi migrasi dan invasi sel SK-OV-3 dan mengurangi aktivasi ERK, sementara ekspresi berlebih dari GABRP menunjukkan peningkatan yang signifikan migrasi sel, invasi dan aktivasi ERK. MEK inhibitor U0126 adalah MEK1 spesifik dan non-ATP-kompetitif dan penghambat MEK2. U0126 bekerja pada MEK1 mutan yang diaktifkan konstitusi rekombinan (di situs DN3-S218E/S222D), memblokir transmisi sinyal MAPK. U0126 menghambat migrasi dan invasi sel SK-OV-3. Liu dkk menemukan bahwa protein terkait domain kematian 6 mempromosikan proliferasi dan migrasi sel asites kanker ovarium dengan mengaktifkan jalur pensinyalan ERK. Zhao dkk menemukan bahwa CD147 mempromosikan fosforilasi Sp1 di T453 dan T739 melalui jalur PI3K/AKT dan MAPK/ERK dan itu memblokir loop umpan balik positif dari

Sp1-CD147 mengurangi kemampuan invasif sel kanker ovarium manusia (ho8910). Itu Umpan balik positif Sp1-CD147 mungkin memainkan peran kunci dalam kemampuan invasif sel kanker ovarium. Down-regulasi dari gen inang RNA MIR4697 non-coding panjang (MIR4697HG) mempromosikan pertumbuhan dan metastasis sel kanker ovarium dengan menurunkan kadar matriks metaloproteinase-9, p-ERK, dan AKT terfosforilasi. Downregulasi MIR4697HG menghambat migrasi dan invasi sel. Jalur pensinyalan ERK/MAPK terlibat dalam degradasi matriks ekstraseluler tumor. Matriks metalloproteinase (MMPs) adalah enzim proteolitik yang menghidrolisis matriks ekstraseluler (ECM), yang merupakan salah satu proses invasi dan metastasis sel kanker. Ekspresi berlebihan MMP bermanfaat untuk invasi tumor tumor dan metastasis, sementara menghambat ekspresi MMP memiliki efek yang berlawanan. Maeda-Yamamoto et al menunjukkan bahwa penghambatan fosforilasi ERK oleh epigallocatechin gallate dalam sel fibrosarcoma HT1080 mengakibatkan penghambatan MMP-2 dan ekspresi MMP-9 dalam sel-sel ini. Ekspresi dari MMP-2 dan MMP-9 bergantung pada fosforilasi ERK.

Simon et al menemukan bahwa dalam sel kanker mulut, ERK1/ERK2 inhibitor aktivasi mengurangi aktivitas ERK1/ERK2 sambil menurunkan regulasi MMP-9 dan mengurangi invasi. Itu aktivasi jalur pensinyalan ERK/MAPK dapat meningkat invasi tumor dan metastasis dengan meningkatkan ekspresi MMP, sementara penghambatan jalur pensinyalan ini dapat mengurangi invasi tumor dan metastasis. Sebuah studi sebelumnya melaporkan bahwa mesothelin mengatur ekspresi MMP-7 melalui jalur transduksi sinyal MAPK/ERK, Jalur ERK1/2, AKT dan JNK, yang meningkatkan invasi kanker ovarium. In vitro, penghambat ERK1/2 atau protein aktivator umpan 1 oligonukleotida menghambat MMP-7 ekspresi dan migrasi kanker ovarium yang diobati dengan MSLN sel. Ekspresi

MMP-7 intra-tumoural dikurangi dengan a kinase / ERK inhibitor, mengakibatkan pertumbuhan tumor tertunda dan kelangsungan hidup tikus yang berkepanjangan. Jalur pensinyalan ERK/MAPK terlibat dalam sel tumor migrasi. Deformasi dan migrasi sel terjadi selama metastasis tumor. Ekspresi sitoskeletal dan protein terkait mikrofilamen terkait dengan deformasi dan migrasi sel tumor. Kanker usus besar manusia garis sel SW620 menunjukkan jumlah intraseluler yang lebih besar mikrofilamen dan jarak migrasi yang lebih jauh pada pengobatan dengan faktor pertumbuhan hepatosit (HGF) dibandingkan dengan pengobatan kontrol. Studi menunjukkan bahwa HGF meningkatkan migrasi sel dengan mengaktifkan pensinyalan ERK/MAPK jalur, sehingga mempromosikan invasi dan metastasis sel tumor. Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa fosforilasi protein dikaitkan dengan regulasi mikrofilamen sitoskeleton. Bray et al menunjukkan bahwa Jalur pensinyalan ERK/MAPK mentransduksi ekstraseluler sinyal dan mengatur ekspresi faktor transkripsi yang menyebabkan deformasi sitoskeleton dan meningkatkan tumor invasi dan metastasis. Memblokir pensinyalan ERK/MAPK jalur dapat menghambat peran HGF dan ekstraseluler lainnya sinyal yang mendorong pergerakan sel, yang menghambat tumor invasi dan metastasis

Target hilir ERK/MAPK, 70-kDa ribosomal S6 kinase 1 (p70S6K1), merupakan regulator penting dari progresi dan proliferasi siklus sel. Sebuah studi menunjukkan bahwa RNA pengganggu kecil berbasis vektor terhadap p70S6K1 menghambat aktivitas p70S6K1 dalam sel kanker ovarium dan menurunkan Ekspresi protein VEGF. Downregulasi p70S6K1 menghambat pertumbuhan dan angiogenesis tumor ovarium dan mengurangi tingkat proliferasi dan ekspresi VEGF dan hypoxia-inducible factor-1 α dalam jaringan tumor, selanjutnya menghambat pertumbuhan dan angiogenesis tumor ovarium

4.7 Tinjauan Islam

Tumbuhan memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan dalam kehidupan manusia termasuk penggunaannya dalam dunia kesehatan. Kesehatan merupakan sumber daya yang paling berharga, serta kekayaan yang paling mahal harganya. Allah swt. yang telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan manfaat yang beraneka ragam, dan dia pulalah yang mengatur semuanya dengan segala keteraturan yang sempurna. Alam dan segala isinya, termasuk manusia, hewan dan tumbuhan diciptakan dengan berbagai macam rahasia yang belum terungkap sehingga dibutuhkan kajian yang mendalam tentang ciptaanNYA. Allah berfirman dalam

Allah swt. berfirman dalam QS An-Nahl/16: 11, yang berbunyi:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (Kementerian agama RI, 2015: 403).

Berdasarkan tafsir Shihab Ayat di “ kaum yang memikirkan”

kalimat tersebut dapat dipahami sebagai isyarat Allah kepada ummat-Nya yang berilmu untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam yaitu tumbuh-tumbuhan (Shihab, 2012).

Dalam pandangan Islam, segala ciptaan Allah swt. tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang manfaatnya dapat diketahui dari melakukan penelitian-penelitian, termasuk diantaranya adalah tanaman kayu jawa (*Lannea coromandelica* hout merr).

Di dalam firman Allah swt. dalam QS. Thaha/20: 53, yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهَا زُرُوجًا مِّن تَبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahannya :

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam (Kementerian Agama RI, 2015: 315).

Ayat di atas menyatakan: Dia, yakni Allah swt. Yang telah menjadikan bagi kamu,“ bumi sebagai hamparan dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi dan Dia, Tuhan itu juga, Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalanjalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantaraan hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya (Shihab, 2012).

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang mampu tumbuh di bumi dengan adanya air hujan, banyak jenis tumbuh-tumbuhan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, ada tumbuhan yang tergolong ke dalam tumbuhan tingkat rendah yaitu tumbuhan yang tidak jelas bagian akar, batang dan daunnya. Golongan selanjutnya lebih mengalami perkembangan adalah tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan yang bisa dibedakan secara jelas bagian daun, batang dan akarnya (Sandi, 2008).

Di dalam firman Allah swt. dalam Q.S Yunus/10: 24, yang berbunyi:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ
النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ
عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ

الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-permiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir. (Kementerian Agama RI, 2015).

Berdasarkan tafsir shihab Kehidupan dunia dengan kesenangan dan keelokannya yang berakhir dengan kefanaan, bagaikan air yang turun dari langit, bercampur dengan tumbuhan bumi yang menjadi makanan manusia dan hewan. Tumbuh-tumbuhan itu lalu berbunga dan berbuah sehingga menambah keelokan bumi. Kemudian, ketika hiasan ini telah sampai pada kesempurnaannya dan penduduknya telah menguasai serta mengambil manfaat dari buah dan kebajikannya, tiba-tiba datang keputusan Kami untuk mematakannya. Sehingga Kami jadikan itu semua laksana sesuatu yang telah dipanen, seakan-akan tidak pernah berpenghuni dan tidak pernah menjadi bagus sebelumnya. Maka pada kedua keadaan itu yaitu keelokan yang menggembirakan manusia kemudian disusul dengan kehilangan dan kemusnahan sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dengan tamsil yang jelas ini Allah menjelaskan ayat-ayat dan merinci segala hukum dan bukti-bukti yang ada di dalamnya kepada kaum yang berpikir dan berakal.

Ayat ini menunjuk pada suatu hakikat yang mulai memperlihatkan tandatandanya, yaitu bahwa manusia mampu menggunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingannya dan dengannya manusia mampu mewujudkan tujuannya. Sehingga apabila hakikat ini telah mendekati kesempurnaannya, dan manusia

mengira bahwa dia merasa telah sampai pada puncak pengetahuan, maka ketentuan Allah akan datang (Shihab, 2012).

Di dalam firman Allah swt. dalam Q.S Ali-Imran/3: 24, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ
الدَّارِ

Terjemahannya :

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Berdasarkan Tafsir Shihab telah menjadi ciri Ulû al-Albâb bahwa mereka selalu merenungkan keagungan dan kebesaran Allah dalam hati di mana pun mereka berada, dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Mereka selalu merenungkan penciptaan langit dan bumi, dan keunikan yang terkandung di dalamnya sambil berkata, "Tuhanku, tidak Engkau ciptakan jagat ini tanpa ada hikmah yang telah Engkau tentukan di balik itu. Engkau tersucikan dari sifat-sifat serba kurang, bahkan ciptaan-Mu itu sendiri adalah bukti kekuasaan dan hikmah-Mu. Hindarkanlah kami dari siksa neraka, dan berilah kami taufik untuk menaati segala perintah-Mu. Yakni dalam setiap keadaan. Menurut Ibnu Abbas, bahwa maksudnya mereka melakukan shalat sesuai kemampuan, yakni jika tidak sanggup berdiri, maka sambil duduk dst. Namun demikian, ayat ini mencakup semua dzikir lainnya dengan lisan maupun hati. Memikirkan kekuasaan Penciptanya atau memikirkan maksudnya. Ayat ini menunjukkan bawa berpikir merupakan ibadah dan termasuk sifat wali-wali Allah yang mengenal-Nya.

Setelah mereka memikirkannya, mereka pun tahu bawa Allah tidak menciptakannya sia-sia. Bahkan di sana terdapat dalil sempurnanya kekuasaan-Mu. Yakni dari menciptakan sesuatu secara main-main. Termasuk juga di dalamnya meminta surga, karena ketika mereka meminta dilindungi dari neraka, maka secara langsung mereka juga meminta surga, akan tetapi karena besarnya rasa takut dalam hati mereka, maka mereka menyebut sesuatu yang paling merisaukan mereka (Shihab, 2012).

Di dalam firman Allah swt. dalam Q.S Yunus/10: 57, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُ مَوْعِظَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya :

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Berdasarkan tafsir shihab Wahai umat manusia, telah datang kepada kalian kitab Allah yang disampaikan melalui rasul-Nya, Muhammad. Di dalamnya terdapat peringatan untuk taat dan beriman serta nasihat untuk melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan. Di dalamnya juga terdapat kisah-kisah orang sebelum kalian agar dapat dijadikan bahan renungan dan juga terdapat anjuran untuk melakukan pengamatan terhadap rahasia- rahasia alam raya, sehingga kalian dapat menyadari keagungan ciptaan-Nya. Selain itu, kitab ini pun mengandung terapi penyakit hati, semisal kemusyrikan dan kemunafikan. Kitab yang diturunkan ini (al-Qur'ân) merupakan pedoman untuk mendapatkan jalan kebenaran. Semua itu adalah rahmat bagi orang-orang Mukmin yang menerimanya dengan baik (Shihab, 2012).

Di dalam firman Allah swt. dalam Q.S Asy-Syu'ara/42: 80, yang berbunyi:

وَإِذَا مَرَضْتُمْ فَهُوَ يُشْفِيكُمْ

Terjemahannya:

dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,

Berdasarkan tafsir Shihab Bila aku menderita sakit, Dialah yang menyembuhkan aku dengan mempermudah pengobatan sambil berserah diri kepada-Nya (Shihab, 2012).

Dalam dunia kesehatan jika suatu penyakit menyerang, manusia dianjurkan untuk mencari pengobatan, apakah itu menggunakan obat tradisional maupun obat sintetik karena berobat adalah salah satu bentuk usaha mencapai kesembuhan.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

Artinya :

Dari Jabir bin Abdullah : Bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah .(H.R. Muslim 2204).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa semua penyakit memiliki obat, Oleh karena itu manusia harus senantiasa berusaha mencari tahu dan meneliti tanaman yang berkhasiat untuk memperoleh pengobatan yang sesuai. Namun, tidak lupa bahwa kesembuhan dari suatu penyakit hanya karena izin Allah SWT. Dalam pengobatan Islam, dianjurkan untuk tidak melakukan pengobatan yang membawa kemudharatan dan menimbulkan masalah baru seperti merusak tubuh. Oleh karena itu, dalam kitab *Thibbun Nabawi* dianjurkan semampu mungkin agar umat manusia menjaga kesehatan tubuh secara jasmani dan rohani dengan berpegang teguh pada tuntutan syariat Islam (Ali et al., 2015).

Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat untuk penyakit dan merupakan anugrah Allah SWT, karena Allah

SWT tidak memberi penyakit tanpa disertai dengan obat. Inilah yang harus kita pelajari dan manfaatkan sebaik mungkin



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan studi literatur tersebut dapat disimpulkan jika aktivitas antikanker tanaman kayu tammate (*Lannea coromandelica*) diperoleh dari hasil isolat dan juga metabolit yang dihasilkan dari ekstraksi *Lannea coromandelica*. Metabolit tersebut diketahui pada tanaman ini memiliki mekanisme antikanker melalui jalur *MAPK (RAF/MEK/ERK)* dan *apoptosis couple membrane receptor*.

5.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait aktivitas antikanker *Lannea coromandelica* guna mengetahui mekanisme antikankernya secara langsung.



DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. B., Kwon, K. R., Lee, S. H., & Lee, S. H. (2017). *Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. induces heme oxygenase 1 (HO-1) expression and reduces oxidative stress via the p38/c-Jun N-terminal kinase-nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (p38/JNK-NRF2)-mediated antioxidant pathway*. *International Journal of Molecular Sciences*, 18(2). <https://doi.org/10.3390/ijms18020266>
- Agencies, C. (2020). *Cancer 3. March*, 1–7. <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cancer>
- Akter, R., Uddin, S. J., Grice, I. D., & Tiralongo, E. (2014). *Cytotoxic activity screening of Bangladeshi medicinal plant extracts*. *Journal of Natural Medicines*, 68(1), 246–252. <https://doi.org/10.1007/s11418-013-0789-5>
- Alam, B., Hossain, S., Habib, R., Rea, J., & Islam, A. (2012). *Antioxidant and analgesic activities of Lannea coromandelica Linn. Bark extract*. *International Journal of Pharmacology*, 8(4), 224–233. <https://doi.org/10.3923/ijp.2012.224.233>
- Alam, M. B., Kwon, K. R., Lee, S. H., & Lee, S. H. (2017). *Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. induces heme oxygenase 1 (HO-1) expression and reduces oxidative stress via the p38/c-Jun N-terminal kinase-nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (p38/JNK-NRF2)-mediated antioxidant pathway*. *International Journal of Molecular Sciences*, 18(2). <https://doi.org/10.3390/ijms18020266>
- Ali, S., Raden, I., Lampung, I., Endro, J. H., Sukarame, S., & Lampung, B. (n.d.). *Pengobatan Alternatif Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Archive, B. S. (2021). *Review Article ISSN: 2349-2678 Lannea coromandelica : An Overview J . N . Gunjal *, Prof . Mrs . M . S . Patil , Prof . Dr . K . P . Chittam Department of Pharmacognosy , DCS ' s A . R . A . College of Pharmacy , Mumbai -Agra Highway , Genus : Lannea Spe. 102–107*.
- Asia, S., Sri, I., Gardens, R. B., & Sigiriya, N. (2020). *Lannea coromandelica*. 2–3.
- Azzahrah, N. F., Jamaluddin, A. W., & Adikurniawan, Y. M. (2019). *Efektivitas Patch Sederhana Dari Ekstrak Daun Kayu Jawa (Lannea Coromandelica) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Mencit (Mus Musculus L)*. *Jurnal Farmasi Desember*, 11(02), 169–180.
- Burmistrova, O., Simões, M. F., Rijo, P., Quintana, J., Bermejo, J., & Estévez, F.

- (2013). Antiproliferative activity of abietane diterpenoids against human tumor cells. *Journal of Natural Products*, 76(8), 1413–1423.
<https://doi.org/10.1021/np400172k>
- C. Sivaraj 1, B. Pavithra 2, A. S. 2 and P. A. 1. (2018). *GC-MS analysis, antibacterial and anticancer activities of bark extract of lannea coromandelica (houtt.) Merr.* International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 9(7), 3047–3051.
[https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.9\(7\).3047-51](https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.9(7).3047-51)
- Dan Grander's Group. (2015). *Mechanisms of action of anti-cancer drugs.* . Retrieved April 16, 2017, from Oncology-Pathology Karolinska Institutet
- Haruna, N., Hamzah, Z. A., Syakri, S., Ismail, I., & Hamzah, N. (2018). *Efek Ekstrak Metanol dan Partisi dari Kulit Batang Kayu Jawa (Lansea coromandelica Houtt. Merr.) terhadap Pertumbuhan Sel HeLa dan MCF-7.* Ad-Dawaa' Journal of Pharmaceutical Sciences, 1(2).
<https://doi.org/10.24252/djps.v1i2.11338>
- Hossain, M. J., Biswas, S., Shahriar, M., Chowdhury, M. M., Islam, S., Ahsan, C. R., & Auther, C. (2018). *Phytochemical Screening, Antimicrobial Activity, Antioxidant Capacity And In Vivo Anticancer Activity Of Lansea Coromandelica Bark Extracts.* IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences Ver. II, 13(3, Ver II), 19–25. <https://doi.org/10.9790/3008-1303021925>
- Indrayangingsih, W. O. I., Ibrahim, N., & Anam, S. (2015). *Studi Etnofarmasi Tumbuhan Berkhasiat Obat Pada Suku Buton Di Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.* Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal), 1(2), 79–84.
<https://doi.org/10.22487/j24428744.2015.v1.i2.6236>
- Iqbal, J., Abbasi, B. A., Mahmood, T., Kanwal, S., Ali, B., & Khalil, A. T. (2017). *Asian Paci fi c Journal of Tropical Biomedicine Plant-derived anticancer agents: A green anticancer approach.* Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 1–23. <https://doi.org/10.1016/j.apjtb.2017.10.016>
- Ismail, I., Armisman Edy Paturusi, A., & Aridani, I. (2016). *Aktivitas Antimikroba Hasil Fraksinasi Korteks Kayu Jawa (Lansea coromandelica (Houtt.) Merr.).* Biogenesis: Jurnal Ilmiah Biologi, 4(1), 122–130.
<https://doi.org/10.24252/bio.v4i2.2518>
- Jacques Britto, N., & Durairaj, K. (2020). *Phytochemical profile and medicinal potentials of lansea coromandelica stem.* International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 11(3), 3465–3472.
<https://doi.org/10.26452/ijrps.v11i3.2490>

- Kementrian Kesehatan RI. (2019). *Penyakit Kanker di Indonesia Berada Pada Urutan 8 di Asia Tenggara dan Urutan 23 di Asia* _ Direktorat Jendral P2P. Kementrian Kesehatan, 12–13. <http://p2p.kemkes.go.id/penyakit-kanker-di-indonesia-berada-pada-urutan-8-di-asia-tenggara-dan-urutan-23-di-asia/>
- Kumar, T., & Jain, V. (2015). *Appraisal of Total Phenol, Flavonoid Contents, and Antioxidant Potential of Folkloric *Lannea coromandelica* Using In Vitro and In Vivo Assays* . Scientifica, 2015, 1–13. <https://doi.org/10.1155/2015/203679>
- Kumler, I., Stenvang, J., Moreira, J., Brunner, N., & Nielsen, D. L. (2015). *Drug transporters in breast cancer: responses to anthracyclines and taxanes. Expert Review of Anticancer Therapy*, 1075-1092; Volume 15, Issue 9.
- Luca, A. D., D'Alessio, A., Maiello, M. R., Gallo, M., Chicchinelli, N., Pergameno, M., Normanno, N. (2015). *Evaluation of the pharmacokinetics of Ixabepilone for the treatment of breast cancer. Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology*, 1177-1185; Volume 11, Issue 7.
- Manik, M. K., Wahid, M. A., Islam, S. M. A., Pal, A., & Ahmed, K. T. (2013). *A comparative study of the antioxidant, antimicrobial and thrombolytic activity of the bark and leaves of *Lannea Coromandelica**. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 4(7), 2609–2614. [https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.4\(7\).2609-14](https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.4(7).2609-14)
- Marquez J, Sanchez-Jimenez F, Medina MA, Quesada AR, De Castro IN (2002). *Nitrogen-Metabolism in Tumor-Bearing Mice. Arch. Biochem. Biophys.* 268: 667-675
- Nugroho, A. E. (2014). *Farmakologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ong, C. P., Lee, W. L., Tang, Y. Q., & Yap, W. H. (2020). *Honokiol: A review of its anticancer potential and mechanisms*. Cancers, 12(1), 1–51. <https://doi.org/10.3390/cancers12010048>
- Ozaslan M, Zümrütdal ME, Dağlıoğlu K, Kilic IB, Karagöz ID, Kalender ME, Tuzcu M, Colak O and Cengiz B (2011). *Antitumoral Effect of *L. inermis* in Mice with EAC. Int. J. Pharmacol.* 5(4): 263-267
- Paramudita, A. E., Ramdani, & Dini, I. (2017). *Isolasi dan Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Ekstrak n- Heksana Kulit Batang Kayu Jawa *Lannea coromandelica* (Houtt) Merr Isolation and Identification of Secondary Metabolite Compound n-Hexane Extract of Kayu Jawa Bark (*Lannea coromandelica* (Hou. Jurnal Chemica*, 18(1), 64–75.
- Park, C. M. (2018). *Fortified Antioxidative Potential by Chrysoeriol through the*

Regulation of the Nrf2 / MAPK-mediated HO-1 Signaling Pathway in RAW 264 . 7 Cells. 28(1), 43–49.

- Prawirodihardjo, E. (2014). *Uji Aktivitas Antioksidan dan Uji Toksisitas Ekstrak Etanol 70% dan Ekstrak Air Laut Batang Kayu Jawa (Lannea coromandelica)*. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 39.
- Rahayu, M., Sunarti, S., Sulistiarini, D., & Prawiroatmodjo, S. (2006). *Traditonal Use Of Medicinal Herbs By Local Community Of Wawonii Island, Southeast Sulawesi*. Biodiversitas Journal Of Biological Diversity, 7(3), 245–250. <https://doi.org/10.13057/Biodiv/D070310>
- Rahman, M., Khatun, A., Uddin, S. J., & Shilpi, J. A. (2016). *Comparative effect of lannea coromandelica (Houtt.) merr. leaves and stem barks on acetic acid induced pain model in mice and chromogenic reagents: Exploring the analgesic potential and phytochemical groups*. Pharmacologyonline, 2016(1), 146–152.
- Rao, V. S., Einstein, J. W., & Das, K. (2014). *Hepatoprotective and Antioxidant Activity of Lannea coromandelica Linn. on Thioacetamide Induced Hepatotoxicity in Rats*. International Letters of Natural Sciences, 8, 30–43. <https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilns.8.30>
- Siegel, R. L., Miller, K. D., & Jemal, A. (2018). *Cancer statistics, 2018*. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 68(1), 7–30. <https://doi.org/10.3322/caac.21442>
- Sandi, Evika Savitri. *Rahasia Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 6, 11, dan 15*
- Tia, L. J., Lui, A. G., Chua, N. S., & Strebel, H. M. (2015). *Chemotherapy-induced neutropenia, anemia and thrombocytopenia, among Filipino breast cancer patients on adjuvant chemotehraphy*. Original Article, 26; Volume 49 No.2.
- Weerapreeyakul, N., Junhom, C., Barusrux, S., & Thitimetharoch, T. (2016). *Induction of apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells by extracts of Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. and Diospyros castanea (Craib) Fletcher*. Chinese Medicine (United Kingdom), 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s13020-016-0091-z>
- Yumita, Y., Razak, A. R., Indriani, & Bahri, S. (2019). *Analisis Klt Bioautografi*

*Ekstrak Kulit Batang Tanaman Kayu Jawa (Lannea Coromandelica)
Terhadap Bakteri Staphylococcus Aureus Dan Shigella Dysenteriae.*
KOVALEN: Jurnal Riset Kimia, 5(2), 191–196.
<https://doi.org/10.22487/kovalen.2019.v5.i2.12786>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN



(Lampiran 1. tanaman *Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.)
Sumber : Pengambilan Gambar Asli)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Google Cendekia LANNEA COROMANDELICA MAPK

Artikel Sekitar 620 hasil (0,06 dtk)

Mungkin maksud Anda adalah: LANNEA COROMANDELICA **APK**

Lannea coromandelica (houitt.) merr. induces heme oxygenase 1 (HO-1) expression and reduces oxidative stress via the p38/c-jun n-terminal kinase–nuclear factor ... [PDF] mdpi.com
 MB Alam, KR Kwon, SH Lee, SH Lee - International journal of molecular ... 2017 - mdpi.com
 ... 2.1. High-Pressure Liquid Chromatography (HPLC) Analysis of **Lannea coromandelica** Bark Extract ... LCB Extract Activates NRF2 via Phosphorylation of JNK and p38 **MAPKs** ... II detoxifying enzymes via the KEAP1–NRF2 pathway in RAW 264.7 cells by activating **MAPK** (p38 and ...
 ☆ 99 Dirujuk 14 kali Artikel terkait 10 versi >>

Fortified antioxidative potential by chrysoeriol through the regulation of the Nrf2/**MAPK**-mediated HO-1 signaling pathway in RAW 264.7 cells [PDF] koreascience.or.kr
 CM Park - Journal of Life Science, 2018 - koreascience.or.kr
 ... but not JNK and p38 in macrophages [5]. In addition, the bark extract from **Lannea coromandelica** induced HO ... B) The relative in- duction of PI3K and **MAPKs** phosphor- ylation ... 5. Chrysoeriol induced HO-1 expression depends on the ERK, JNK and p38 **MAPK** signaling pathways ...
 ☆ 99 Dirujuk 1 kali Artikel terkait 2 versi >>

Protection of UVB-induced photoaging by fuzhuan-brick tea aqueous extract via **MAPKs**/Nrf2-mediated down-regulation of MMP-1 [HTML] mdpi.com
 P Zhao, MB Alam, SH Lee - Nutrients, 2019 - mdpi.com
 ... CrossRef [PubMed]; Alam, MB; Kwon, KR; Lee, SH; Lee, SH **Lannea coromandelica** (houitt.) merr ... mmp expression and promote type I procollagen production via repression of **mapk/ap-1** ... Figure 6. FBTA activates the mitogen-activated protein kinases (**MAPKs**) signaling pathway ...
 ☆ 99 Dirujuk 23 kali Artikel terkait 13 versi >>

Phytochemical Characterization of Dillenia indica L. Bark by Paper Spray Ionization-Mass Spectrometry and Evaluation of Its Antioxidant Potential Against t-BHP ... [PDF] mdpi.com
 MB Alam, A Ahmed, S Islam, HJ Choi, MA Motin, S Kim ... - Antioxidants, 2020 - mdpi.com

Kapan saja
 Sejak 2021
 Sejak 2020
 Sejak 2017
 Rentang khusus...
 2011 — 2021
 Telusuri

Urutkan menurut relevansi
 Urutkan menurut tanggal
 sertakan paten
 mencakup kutipan
 Buat lansiran

Google Cendekia LANNEA COROMANDELICA APOPTOSIS

Artikel Sekitar 720 hasil (0,08 dtk)

[HTML] Induction of **apoptosis** in human hepatocellular carcinoma cells by extracts of **Lannea coromandelica** (Houitt.) Merr. and Diospyros castanea (Craib) Fletcher [HTML] springer.com
 N Weerapreeyakul, C Junhom, S Barusrux ... - Chinese medicine, 2016 - Springer
 Herbal plants are a preferred source of anticancer agents. This study aims to screen the anticancer activity of a crude extract of twigs of (a) *Bombax anceps* Pierre var. *anceps* (BA) (b) *Catunaregam tomentosa* (Blume ex DC.) Tirveng (CT) (c) *Erythrophleum* ...
 ☆ 99 Dirujuk 10 kali Artikel terkait 18 versi

Zoosporicidal Activity of Polyflavonoid Tannin Identified in **Lannea coromandelica** Stem Bark against Phytopathogenic Oomycete *Aphanomyces cochlioides* [PDF] bltbsmrau.org
 MT Islam, T Ho, M Sakasai, S Tahara - Journal of agricultural and ... 2002 - ACS Publications
 ... 5,7-trimethoxydihydroflavonol were isolated from the stem bark of **Lannea coromandelica**, along with ... were isolated for the first time from the genus **Lannea**; furthermore, (2R, ... ribose) polymerase suppress nuclear fragmentation and **apoptotic**-body formation during **apoptosis** in HL ...
 ☆ 99 Dirujuk 63 kali Artikel terkait 10 versi

[HTML] ...-rich extracts from **Lannea stuhlmannii** and **Lannea humilis** (Anacardiaceae) exhibit hepatoprotective activities in vivo via enhancement of the anti-**apoptotic** ... [HTML] nature.com
 M Sobeh, MF Mahmoud, RA Hasan, MAO Abdelfattah ... - Scientific reports, 2018 - nature.com
 ... to interference with dimerization of the two opposing proteins Bcl-2: Bim, thus hindering **apoptosis** ... hepatoprotection of the extracts is due to antioxidant and anti-**apoptotic** effects ... MZ & Moniruzzaman, M. Antinociceptive effect of ethanol extract of leaves of **Lannea coromandelica** ...
 ☆ 99 Dirujuk 29 kali Artikel terkait 13 versi

Lannea coromandelica (houitt.) merr. induces heme oxygenase 1 (HO-1) expression and reduces oxidative stress via the p38/c-jun n-terminal kinase–nuclear factor ... [PDF] mdpi.com
 MB Alam, KR Kwon, SH Lee, SH Lee - International journal of molecular ... 2017 - mdpi.com

Kapan saja
 Sejak 2021
 Sejak 2020
 Sejak 2017
 Rentang khusus...

Urutkan menurut relevansi
 Urutkan menurut tanggal
 sertakan paten
 mencakup kutipan
 Buat lansiran

ALAUDDIN
 MAKASSAR

ScienceDirect Journals & Books Register Sign in

Find articles with these terms

LANNEA COROMANDELICA APOPTOSIS

Advanced search

9 results sorted by relevance | date

Refine by:

Years

2021 (1)

2020 (1)

2018 (1)

Show more

Article type

Review articles (4)

Research articles (2)

Encyclopedia (1)

Book chapters (1)

Show more

Research article

Label-free imaging of cancer cells using photonic crystal biosensors and application to cytotoxicity screening of a natural compound library

Sensors and Actuators B: Chemical, 16 June 2008, ...

Leo L. Chan, Saunjanya L. Gosangari, ... Brian T. Cunningham

Review article

Moringa gum and its modified form as a potential green polymer used in biomedical field

Carbohydrate Polymers, 10 August 2020, ...

Hemant Ramachandra Badwaik, Ashique Al Hoque, ... Tapan Kumar Giri

Want a richer search experience?

Sign in for article previews, additional search fields & filters, and multiple article download & export options.

Sign in

Feedback

ScienceDirect Journals & Books Register Sign in

Find articles with these terms

LANNEA COROMANDELICA MAPK

Advanced search

2 results sorted by relevance | date

Refine by:

Years

2018 (1)

2016 (1)

Publication title

Peptides (1)

Pharmacology & Therapeutics (1)

Subject areas

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (1)

Neuroscience (1)

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science (1)

Review article

Analysis of natural product regulation of opioid receptors in the treatment of human disease

Pharmacology & Therapeutics, 31 October 2017, ...

S. Badal, S. Turfus, ... S. L. Sandiford

Review article

Endogenous opiates and behavior: 2014

Peptides, January 2016, ...

Richard J. Bodnar

Want a richer search experience?

Sign in for article previews, additional search fields & filters, and multiple article download & export options.

Sign in

Display: 25 | 50 | 100 results per page

Feedback

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov

LANNEA COROMANDELICA MAPK

Advanced Create alert Create RSS Search User Guide

MY NCBI FILTERS

RESULTS BY YEAR

TEXT AVAILABILITY

Abstract

Free full text

Full text

ARTICLE ATTRIBUTES

Associated data

ARTICLE TYPE

Books and Documents

Clinical Trial

Meta-Analysis

Randomized Controlled Trial

8 results

Filters applied: Free full text. Clear all

1 **Lannea coromandelica** (Houtt.) Merr. Induces Heme Oxygenase 1 (HO-1) Expression and Reduces Oxidative Stress via the p38/c-Jun N-Terminal Kinase-Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2 (p38/JNK-NRF2)-Mediated Antioxidant Pathway.

Cite
Share

Alan MB, Eason KR, Lee SH, Lee SH.
Int J Mol Sci. 2017 Jan 28;18(2):266. doi: 10.3390/ijms18020266.
PMID: 28148274 **Free PMC article**.

The leaves of **Lannea coromandelica** (Houtt.) Merr. are used in the Garo, Pahan, and Tali tribal communities of Bangladesh as a traditional medicinal plant to treat hepatitis, diabetes, ulcers, heart disease, and dysentery. However, there have been limited phytochemic...

2 Protective effect of **Lannea coromandelica** Houtt. Merrill. against three common pathogens.

Cite
Share

Kaur R, Jassal M, Jain V.
J Ayurveda Integr Med. 2013 Oct;4(4):234-6. doi: 10.4103/0975-9476.123706.
PMID: 24459389 **Free PMC article**.

BACKGROUND: Ayurvedic text reports suggested **Lannea coromandelica** is used in various microbial origin disorders like dysentery, sore eyes and leprosy, genital wounds. OBJECTIVE: The present study was designed to investigate the antimicrobial effect of **L. coromandelica**...

3 Appraisal of Total Phenol, Flavonoid Contents, and Antioxidant Potential of Folkloric **Lannea coromandelica** Using In Vitro and In Vivo Assays.

Cite
Share

Kumar T, Jain V.

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov

LANNEA COROMANDELICA APOPTOSIS

Advanced Create alert Create RSS Search User Guide

Found 1 result for LANNEA COROMANDELICA APOPTOSIS

Save Email Send to Display options

Filters applied: Free full text. Clear all

> Chin Med. 2016 Apr 23;11:19. doi: 10.1186/s13020-016-0091-z. eCollection 2016.

Induction of apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells by extracts of Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. and Diospyros castanea (Craib) Fletcher

Natthida Weerapreeyakul¹, Chalpajorn Junhom², Sahapat Barusrux³, Thaweesak Thitimetharoch¹

FULL TEXT LINKS

Read free full text of **BMC**

PMC **FREE** Full text

ACTIONS

Cite

Favorites

RESEARCH

Open Access



Induction of apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells by extracts of *Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr. and *Diospyros castanea* (Craib) Fletcher

Natthida Weerapreeyakul¹, Cholpajorn Junhom², Sahapat Barusrux^{3*} and Thaweekas Thitimetharoch¹**Abstract**

Background: Herbal plants are a preferred source of anticancer agents. This study aims to screen the anticancer activity of a crude extract of twigs of (a) *Bombax anceps* Pierre var. *anceps* (BA); (b) *Catunaregam tomentosa* (Blume ex DC.) Tirveng. (CT); (c) *Erythrophloeum succirubrum* Gagnep. (ES); (d) *Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr. (LC); and (e) leaves and (f) twigs of *Diospyros castanea* (Craib) Fletcher (DC).

Methods: The 50 % ethanol–water extracts were prepared from each plant sample. In vitro anticancer effects of six extracts on the human hepatocellular carcinoma cell line (HepG2) in terms of cytotoxicity were investigated by neutral red assay, apoptosis induction by 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) staining, and DNA fragmentation by agarose gel electrophoresis. Normal Vero cells were tested for comparison and to determine cancer selectivity. Gas chromatography–mass spectrometry analysis was performed to identify the compounds in the extracts.

Results: The six crude extracts had different cytotoxicities and were classified into three groups based on their IC₅₀ value and selectivity index (SI). DC (twig) crude extract had both a high cytotoxicity and SI toward HepG2 cells comparable to melphalan ($P = 0.023$). The crude extracts of DC (leaves), LC (twig), and BA (twig) had moderate cytotoxicity and a lower SI. Although all crude plant extracts induced apoptosis in more than 50 % of the DAPI-positive apoptotic HepG2 cells, only DC (twig) and LC (twig) showed laddering in the DNA fragmentation assay. 2-Palmitoylglycerol was the major compound common to both. Pyrogallol and lupeol were the major compounds in DC (twig) crude extract. Hexadecanoic acid and octadecenoic acid were the major compounds in LC (twig) crude extract, which had high toxicity but low selectivity.

Conclusion: Ethanolic extracts from DC and LC twigs induced apoptosis in the HepG2 cell line. Pyrogallol and lupeol in DC (twig) might be responsible for the cytotoxicity toward the HepG2 cancer cells.

Keywords: *Diospyros castanea*, *Lannea coromandelica*, Hepatocellular carcinoma, HepG2, Cytotoxicity, Apoptosis



Received on 21 October, 2017; received in revised form, 06 June, 2018; accepted, 10 June, 2018; published 01 July, 2018

GC-MS ANALYSIS, ANTIBACTERIAL AND ANTICANCER ACTIVITIES OF BARK EXTRACT OF *LANNEA COROMANDELICA* (HOULT.) MERR.

C. Sivaraj^{*1}, B. Pavithra², Akshaya Srivastav² and P. Arumugam¹ARMATS Biotek Training and Research Institute¹, Chennai - 600032, Tamil Nadu, India.Department of Biotechnology², St. Joseph's College of Engineering, Chennai - 600119, Tamil Nadu, India.**Keywords:***Lannea coromandelica*,
Antibacterial, Anticancer,
MCF7, MTT assay, GC-MS**Correspondence to Author:**

C. Sivaraj

Postdoctoral Fellow,
Natural product Division,
ARMATS Biotek Training and
Research Institute, Chennai - 600032,
Tamil Nadu, India.

E-mail: shivaraj27@gmail.com

ABSTRACT: *Lannea coromandelica* is one of the important herbal plants well distributed in India. It is commonly called as Odiar, Gumphini in South India. It was extensively used by the tribes all over India to treat various diseases such as body pain, tooth ache, stomach ache, ulcers, sexual impotency. The aim of the present study was to evaluate the GC-MS analysis, antibacterial and anticancer activities of methanol bark extract of *L. coromandelica*. The methanol extract was subjected to GC-MS analysis to find out active volatile and semi-volatile compounds. The antibacterial activity was carried out by well diffusion method by using nutrient broth agar medium. Microorganisms such as *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, and *Bacillus subtilis* were used to evaluate antibacterial activity. The maximum zone of inhibition 21 mm was measured for *Bacillus subtilis* at 500 µg/mL concentration followed by *Staphylococcus aureus* was 19 mm and *Escherichia coli* was 18 mm. The anticancer activity was carried out by MTT assay method for MCF7 cell line. The maximum cell death was 74.20 ± 0.71% at 100 µg/mL concentration and the IC₅₀ was 23.83 µg/mL concentrations.

Phytochemical Screening, Antimicrobial Activity, Antioxidant Capacity And In Vivo Anticancer Activity Of *Lannea Coromandelica* Bark Extracts

Md. Jakir Hossain¹, Shashwata Biswas², Mohammad Shahriar³, Maisha Mosharrat Chowdhury⁴, Sohidul Islam¹ and Chowdhury Rafiqul Ahsan^{2*}

¹Department of Biochemistry and Microbiology, North South University, Dhaka 1229, Bangladesh.

²Department of Microbiology, University of Dhaka, Dhaka 1000, Bangladesh.

³Department of Pharmacy, University of Asia Pacific, Dhaka 1215, Bangladesh.

⁴Department of Mathematics and Natural Sciences, BRAC University, Dhaka 1212, Bangladesh.

Corresponding Author: Md. Jakir Hossain

Abstract: In this study, experiments were performed to evaluate the phytochemical components, antioxidant capacity, antimicrobial activity and in vivo anticancer activity of *Lannea coromandelica* bark extracts. In the phytochemical analysis alkaloids, carbohydrates, tannins, saponins, resins, phenolic compounds, proteins, and steroids were found to be present. An intermediate zone of sensitivity was found in antimicrobial activity assay of crude extract against *Escherichia coli*, *Shigella flexneri*, and *Staphylococcus aureus*. In antioxidant capacity experiments, the chloroform extract showed CUPRAC reducing capacity more than the standard (Butylated hydroxyl toluene), and the total flavonoid content (TFC), total phenolic compound (TPC) and total antioxidant capacity (TAC) showed significant results ($p < 0.01$). In case of in vivo anticancer effect of the chloroform extract, mice were seeded with approximately 1×10^5 Ehrlich ascites carcinoma (EAC) cells and after seven days of consecutive treatment the negative and positive control groups showed an average EAC cell count of 2.4×10^6 and 1.9×10^6 cells respectively and the experimental group showed 1.1×10^6 cells. Mice in the experimental group showed percent increase of life span (%ILS) of 33.3, when compared with the negative control mice. However, treatment in a cyclic manner showed the %ILS to be 88.85 for experimental group when compared negative control. All these results demonstrated the antimicrobial, antioxidant, and anticancer activity of the chloroform extract of *L. coromandelica* barks.

Keywords: *Lannea coromandelica*, Phytochemical screening, antioxidant capacity, Ehrlich ascites carcinoma cells.

Date of Submission: 09-05-2018

Date of acceptance: 24-05-2018

Cytotoxic activity screening of Bangladeshi medicinal plant extracts

Raushanara Akter · Shaikh J. Uddin ·
 I. Darren Grice · Evelin Tiralongo

Received: 26 March 2013 / Accepted: 10 June 2013
 © The Japanese Society of Pharmacognosy and Springer Japan 2013

Abstract The cytotoxic activity of 23 crude methanol extracts from 19 Bangladeshi medicinal plants was investigated against healthy mouse fibroblasts (NIH3T3), healthy monkey kidney (VERO) and four human cancer cell lines (gastric, AGS; colon, HT-29; and breast, MCF-7 and MDA-MB-231) using MTT assay. High cytotoxicity across all cell lines tested was exhibited by *Aegiceras corniculatum* (fruit) and *Hymenodictyon excelsum* (bark) extracts (IC_{50} values ranging from 0.0005 to 0.9980 and 0.08 to 0.44 mg/mL, respectively). Fourteen extracts from 11 plant species, namely *Clitoria ternatea* (flower and leaf), *Dillenia indica* (leaf), *Diospyros peregrina* (leaf), *Dipterocarpus turbinatus* (bark and leaf), *Ecbolium viride* (leaf), *Gliricidia oppositifolius* (whole plant), *Gnaphalium luteoalbum* (leaf), *Jasminum sambac* (leaf), *Lannea coromandelica* (bark and leaf), *Mussaenda glabrata* (leaf) and *Saraca asoca* (leaf), were also significantly cytotoxic ($IC_{50} < 1.0$ mg/mL) against at least one of the cancer cell lines tested. More selectively, *Avicennia alba* (leaf), *C. ternatea* (flower and leaf),

Caesalpinia pulcherrima (leaf), *E. viride* (leaf) and *G. oppositifolius* (whole plant) showed cytotoxicity only against both of the breast cancer cell lines (MCF-7 and MDA-MB-231). In contrast, *C. ternatea* (flower and leaf) exhibited high cytotoxic activity against MDA-MB-231 (IC_{50} values of 0.11 and 0.49 mg/mL, respectively), whereas *E. viride* and *G. oppositifolius* whole plant extracts exhibited high activity against MCF-7 cells (IC_{50} values of 0.06 and 0.15 mg/mL, respectively). The cytotoxic activity test results for 9 of the plant species correlate with their traditional use as anticancer agents, thus making them interesting sources for further drug development.

Keywords Bangladeshi medicinal plants · Traditional use · Cytotoxic activity · Anticancer · MTT assay

Introduction



COMPARATIVE EFFECT OF *LANNEA COROMANDELICA* (HOULT.) MERR. LEAVES AND STEM BARKS ON ACETIC ACID INDUCED PAIN MODEL IN MICE AND CHROMOGENIC REAGENTS: EXPLORING THE ANALGESIC POTENTIAL AND PHYTOCHEMICAL GROUPS

Rahman, M.^{1,2,3*}; Khatun, A.^{1,2,4}; Uddin, S.J.^{2,5,6}; Shilpi, J.A.²

¹Southern Cross Plant Science, Southern Cross University, Lismore, NSW-2480, Australia

²Phytochemistry and Pharmacology Research Laboratory, Pharmacy Discipline, Life Science School, Khulna University, Khulna-9208, Bangladesh

³Department of Pharmacy, Northern University Bangladesh, Dhaka-1205, Bangladesh

⁴Department of Pharmacy, Manarat International University, Dhaka-1216, Bangladesh

⁵Department of Structural Chemistry, Eskitis Institute, Griffith University, Nathan QLD 4111, Australia

⁶Division of Pharmacognosy, Department of Medicinal Chemistry, Uppsala University, Uppsala 75123, Sweden

*mahmudur.rahman@scu.edu.au

Abstract

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr (Anacardiaceae), a Bangladeshi medicinal plant, has long been used in indigenous medicine. The plant is reported to be used in the traditional medicine for all local swelling, pain and inflammation and in the treatment of tumour, ulcers, cancer, sprains, bruises, skin diseases, and dysentery. Both the leaves and the stem bark have painkilling and astringent property and so, mixed with toothpowder for use in toothache. The leaves are copped as fodder and fed the livestock in inflammatory and digestive problems. In this study, ethanol extracts of the leaves and stem bark of this traditionally valuable medicinal plant were screened for analgesic activity on acetic acid induced Swiss-albino mice- *Mus musculus* *in vivo* for the first time as well as studied for some important phytochemical groups. The dried extracts were dissolved in 99.8% ethanol and qualitatively analysed for bioactive chemical groups-alkaloids, glycosides, steroids, gums, reducing sugars, tannins, flavonoids, and saponins using standard chromogenic reagents. The colour intensity or the precipitate formation was used as analytical responses to these tests. Both the extracts were found to contain steroidal compounds, tannins, gums, reducing sugars, alkaloids as well as flavonoids as their major bioactive phytochemical groups. In analgesic activity test, the bark extract produced 92.92 % writhing inhibition and the leaf extract produced 95.14% writhing inhibition at the dose of 250 mg/kg of body weight compared to the standard diclofenac Na that inhibit 78.54% writhing inhibition at the dose of 25 mg/kg body weight by acetic acid induced writhing model in mice. Based on the results, it could be concluded that the ethanol extract of *Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr leaves and bark possess significant analgesic activity and mood of action might involve a peripheral mechanism. The results rationalize its use in folkloric remedies especially against pain and inflammation.



Article

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Induces Heme Oxygenase 1 (HO-1) Expression and Reduces Oxidative Stress via the p38/c-Jun N-Terminal Kinase–Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2 (p38/JNK–NRF2)-Mediated Antioxidant Pathway

Md Badrul Alam ^{1,†}, Kyoo-Ri Kwon ^{1,†}, Seok-Hyun Lee ¹ and Sang-Han Lee ^{1,2,*}

¹ Department of Food Science and Biotechnology, Graduate School, Kyungpook National University, Daegu 41566, Korea; mbalam@knu.ac.kr (M.B.A.); rbf10116@daum.net (K.-R.K.); sam4408@naver.com (S.-H.L.)

² Food and Bio-Industry Research Institute, Kyungpook National University, Daegu 41566, Korea

* Correspondence: sang@knu.ac.kr; Tel.: +82-53-950-7754; Fax: +82-53-950-6772

† These authors contributed equally to this work.

Academic Editor: Maurizio Battino

Received: 21 December 2016; Accepted: 23 January 2017; Published: 29 January 2017

Abstract: The leaves of *Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr. are used in the Garo, Pahan, and Teli tribal communities of Bangladesh as a traditional medicinal plant to treat hepatitis, diabetes, ulcers, heart disease, and dysentery. However, there have been limited phytochemical and biological studies on the bark of *L. coromandelica*. This study aimed to investigate the antioxidant activities of *L. coromandelica* bark extract (LCBE) and the underlying mechanism using RAW 264.7 cells. The LCBE was analysed by high-pressure liquid chromatography (HPLC) to detect its key polyphenolic compounds. Various *in vitro* antioxidant assays were performed using RAW 264.7 cells to assess the antioxidant effects of the LCBE and to understand the underlying molecular mechanism. HPLC revealed the presence of gallic acid, (–)-epigallocatechin-3-gallate, catechin, chlorogenic acid, and caffeic acid in the LCBE. The extract showed a very potent capacity to scavenge numerous free radicals through hydrogen atom transfer and/or electron donation and also quenched cellular reactive oxygen species (ROS) generation without showing any toxicity. The LCBE was found to combat the oxidative

Hepatoprotective and antioxidant activity of *Lannea coromandelica* Linn. on thioacetamide induced hepatotoxicity in rats

V. Srinivasa Rao¹, John Wilkin Einstein¹, Kuntal Das^{2,*}

¹St. John's Pharmacy College, #6, II Main, Vijaya Nagar, Bangalore - 560104, India

²Krupanidhi College of Pharmacy, # 12/1, Chikka Bellandur, Carmelaram Post, Varthur Hobli, Bangalore - 560035, India
Mob: +919632542846

*E-mail address: drkkdsd@gmail.com

ABSTRACT

Hepatoprotective and antioxidant activity of *Lannea coromandelica* bark extract (LCBE) was investigated on thioacetamide induced hepatotoxicity in rats. Hepatotoxicity was induced by thioacetamide (TAA) administration (100 mg/kg, s.c). LCBE at different doses (400 and 200 mg/kg) were administered orally to male wistar rats. Thioacetamide caused elevation of serum concentration of AST, ALT, ALP, serum bilirubin and also reduced serum concentration of total protein, albumin, sodium, potassium in animals as compared to control ($p < 0.05$) but LCBE treated rats showed maximum reduction of AST [(138±5.1) IU/L], ALT [(71 ±2.7) IU/L], ALP [(140 ±1.9) IU/L] with the high dose (400 mg/kg bw) of combined aqueous and alcoholic bark extract. Whereas, serum bilirubin, cholesterol, sugar and LDH content were varied with the treatments but showed higher with the only ethanolic extract at dose of 400 mg/kg. The IC_{50} value was observed as (83.28 ±2.12) µg/mL, for DPPH radical scavenging activity. Result concluded that ethanolic extract and combined aqueous and alcoholic bark extract of *L. coromandelica* showed a potential hepatoprotective and antioxidant activities might be due to the presence of phenolic groups, terpenoids and alkaloids.

Keywords: Antioxidant activity; biochemical parameters; hepatoprotective; *Lannea coromandelica*; thioacetamide

International Journal of Pharmacology 8 (4): 224-233, 2012
ISSN 1811-7775 / DOI: 10.3923/ijp.2012.224.233
© 2012 Asian Network for Scientific Information

Antioxidant and Analgesic Activities of *Lannea coromandelica* Linn. Bark Extract

¹Badrul Alam, ¹Sarowar Hossain, ²Razibul Habib,

³Julia Rea and ⁴Anwarul Islam

¹Department of Pharmacy, Atish Dipankar University of Science and Technology, Dhaka, Bangladesh

²Department of Pharmacy, East West University, Dhaka, Bangladesh

³Square Pharmaceutical Limited, Dhaka, Bangladesh

⁴Department of Pharmacy, Bangladesh University, Dhaka, Bangladesh

Abstract: Methanolic extract of *Lannea coromandelica* Linn. bark (MLCB) was subjected to evaluate its antioxidant and analgesic properties. The analgesic activity was determined for its central and peripheral pharmacological actions using hotplate as well as tail immersion method and acetic acid-induced writhing test with formalin induced pain in mice, respectively. To evaluate antioxidant potential of MLCB, total antioxidant activity, scavenging of 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical as well as total Reactive Oxygen Species (ROS) and assessment of reducing power were used. The extract, at the dose of 200 and 400 mg kg⁻¹, produced a significant ($p < 0.05$) increase in pain threshold in hotplate and tail immersion methods whereas significantly ($p < 0.05$) reduced the writhing caused by acetic acid and the number of licks induced by formalin in a dose dependent manner. In DPPH and total ROS scavenging method, MLCB showed good antioxidant potentiality with the IC_{50} value of 12.32±0.16 and 34.72±0.48 µg mL⁻¹, respectively with a good reducing power. In conclusion this study demonstrated the strong antioxidant and antinociceptive activities of methanolic extract of the bark of *L. coromandelica*. Altogether, these results suggest that the MLCB could be used as a potential antinociceptive agent along with its antioxidant potentiality.

Key words: Antioxidant, antinociceptive, *Lannea coromandelica*, free radical, formalin, ROS

INTRODUCTION

Free radical reactions are necessary for normal metabolism but can be detrimental to health as well and play a pivotal role in disease pathology (Gupta *et al.*, 2007). Free radicals cause depletion of immune system

antioxidants (Al-Mustafa and Al-Thunibat, 2008) and some natural antioxidant (e.g., rosemary and sage) are already exploited commercially either as antioxidant additives or a nutritional supplements but generally there is still a demand to find more information concerning the antioxidant potential of plant species. It has been

ORIGINAL ARTICLE

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN
PHARMACEUTICAL SCIENCES

Published by JK Welfare & Pharmascope Foundation

Journal Home Page: www.pharmascope.org/ijrps**Phytochemical profile and medicinal potentials of *Lannea Coromandelica* stem**Jacques Britto N¹, Kesavi Durairaj^{*2}¹Department of Anatomy, Research Scholar, Faculty of Medicine, Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research (DU), Porur, Chennai – 600116²Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research (DU), Porur, Chennai – 600116**Article History:**Received on: 29 Apr 2020
Revised on: 30 May 2020
Accepted on: 01 Jun 2020**Keywords:**Lannea Coromandelica (L.C.),
Phytochemical,
Medicinal plants,
Ethanol extract,
GCMS**ABSTRACT**

In the history of humanity, great ancestors of Indian sub-continent used plants that possessed unique medicinal properties. They identified the plants from jungles and derived crude drugs out of them for treating infectious diseases. This treatment process was a tradition. In the recent century, this plant-based drug extraction, processing and refining began scientifically by pharmaceutical industries. In this new era, plants with medicinal features are being used in curing broad spectrum of diseases. *Lannea Coromandelica* (L.C.) is a medicinal plant that belongs to this category. Tribals extensively used it in treating various infectious diseases and common injuries. There have been very few studies on the leaves, barks, flowers, gums and mucilage of this tree. But no preliminary phytochemical composition of L.C. stem has been studied. Therefore, the current work focusses on the screening of the phytochemical profile of the stem of L.C. by the sequential ethanolic extract. Stems of L.C. were procured from Mettur, Tamil Nadu. Thirteen different components were qualitatively analyzed using standard procedures from 100g of L.C. stem extract. In this study, seven components were identified, and their percentage was estimated. Using GC-MS, 50 components were identified of which Pentadecanoic acid, 14-methyl-methyl ester (1.0%) was the major component. The presence of these components in L.C. stem extract can be used in the treatment of

Hindawi Publishing Corporation
Scientifica
Volume 2015, Article ID 203679, 13 pages
<http://dx.doi.org/10.1155/2015/203679>

Hindawi

*Research Article***Appraisal of Total Phenol, Flavonoid Contents, and Antioxidant Potential of Folkloric *Lannea coromandelica* Using *In Vitro* and *In Vivo* Assays****Tekeshwar Kumar and Vishal Jain**

University Institute of Pharmacy, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh 492 010, India

Correspondence should be addressed to Vishal Jain; vishaljain123@gmail.com

Received 19 June 2015; Revised 2 September 2015; Accepted 2 September 2015

Academic Editor: Marcelo Farina

Copyright © 2015 T. Kumar and V. Jain. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

The aim of this study was to determine the impending antioxidant properties of different extracts of crude methanolic extract (CME) of leaves of *Lannea coromandelica* (*L. coromandelica*) and its two ethyl acetate (EAF) and aqueous (AqE) subfractions by employing various established *in vitro* systems and estimation of total phenolic and flavonoid content. The results showed that extract and fractions possessed strong antioxidant activity *in vitro* and among them, EAF had the strongest antioxidant activity. EAF was confirmed for its highest phenolic content, total flavonoid contents, and total antioxidant capacity. The EAF was found to show remarkable scavenging activity on 2,2-diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) (EC_{50} $63.9 \pm 0.64 \mu\text{g/mL}$), superoxide radical (EC_{50} $8.2 \pm 0.12 \text{ mg/mL}$), and Fe^{2+} chelating activity (EC_{50} $6.2 \pm 0.09 \text{ mg/mL}$). Based on our *in vitro* results, EAF was investigated for *in vivo* antioxidant assay. Intragastric administration of the EAF can significantly increase levels of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione (GSH), and glutathione peroxidase (GSH-Px) levels, and decrease malondialdehyde (MDA) content in the liver and kidney of CCl_4 -intoxicated rats. These new evidences show that *L. coromandelica* bared antioxidant activity.

Fortified Antioxidative Potential by Chrysoeriol through the Regulation of the Nrf2/MAPK-mediated HO-1 Signaling Pathway in RAW 264.7 Cells

Chung Mu Park*

Department of Clinical Laboratory Science, Dong-Eui University, Busan 47340, Korea

Received October 17, 2017 / Revised December 26, 2017 / Accepted December 27, 2017

Chrysoeriol is a widespread flavone, and it is usually found in alfalfa, which has been used as a traditional medicine to treat dyspepsia, asthma, and urinary system disorders. Recently, analysis has been conducted on the anti-inflammatory activity of chrysoeriol, but information on its antioxidative capacity is limited. In this study, the antioxidative potential of chrysoeriol against oxidative damage and its molecular mechanisms were evaluated by analysis of the cell viability, reactive oxygen species (ROS) formation, and Western blots in the RAW 264.7 cell line. Chrysoeriol significantly scavenged lipopolysaccharide (LPS)-induced intracellular ROS formation in a dose-dependent manner, without any cytotoxicity. Heme oxygenase-1 (HO-1), a phase II enzyme that exerts antioxidative activity, was also potently induced by chrysoeriol treatment, which corresponded to the translocation of nuclear factor-erythroid 2 p45-related factor 2 (Nrf2) into the nucleus. Moreover, mitogen-activated protein kinase (MAPK) and phosphoinositide 3-kinase (PI3K) were analyzed due to their important role in maintaining cellular redox homeostasis against oxidative stress. As a result, chrysoeriol-induced HO-1 upregulation was mediated by extracellular signal-regulated kinase (ERK), c-Jun NH₂-terminal kinase (JNK), and p38 phosphorylation. To identify the antioxidative potential exerted by HO-1, tert-butyl hydroperoxide (t-BHP)-induced oxidative damage was applied and mitigated by chrysoeriol treatment, which was confirmed by the HO-1 selective inhibitor and inducer, respectively. Consequently, chrysoeriol strongly strengthened the HO-1-mediated antioxidative potential through the regulation of the Nrf2/MAPK signaling pathways.

Key words : Chrysoeriol, heme oxygenase-1, mitogen activated protein kinase, nuclear factor-erythroid 2 p45-related factor 2

Introduction

regulated by an inducible transcription factor, nuclear fac-



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Suci Nurzakinah akrab disapa uci. Ia merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Amiruddin Puroso dan Ibu Nurlaely. Ia lahir di Palopo pada tanggal 20 April 1999. Ia mengawali pendidikannya di TK Islam Al-Azhar (2005). Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di SDN 27 Padang-Padang (2006-2011). Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Belopa (2011-2014). Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 01 Unggualan Kamanre (2014-2017). Kemudian penulis melanjutkan studinya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (2017-2021). Selama menempuh pendidikan di UINAM penulis aktif diberbagai organisasi yaitu penulis merupakan delegasi LK 2 ISMAFARSI INDTIM di kendari (2019), Koordinator divisi Logistik dan Keuangan HMJ Farmasi (2019/2020). Wakil Bendahara Umum SEMA (Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (2020/2021). Direktur Eksternal Sc. SUPREMASI Kesehatan (2020/2021). Dan sampai sekarang penulis aktif sebagai Tim Medis Paten Kolaborasi Kemanusiaan (Volunteer). Penulis memiliki motto hidup yaitu *Khoirunnas Alfauhum Linnas* yang artinya sebaik-baik manusia adalah ia yang bermanfaat untuk orang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R