

**“ STUDI LITERATUR POTENSI DAUN SEMBUKAN (*Paederia foetida*
Linn.) SEBAGAI AGEN ANTIKANKER”**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh:

DWI ASTUTY ARUM SARI

NIM. 70100116077

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
M A K A S S A R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Astuty Arum Sari
NIM : 70100116077
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 24 Maret 1998
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jalan Rimanyoko Gontang Raya No. 1
Judul : “Studi Literatur Potensi Daun Sembukan (*Paederia foetida*
Linn.) Sebagai Agen Antikanker”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari ini terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 19 Februari 2021

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Dwi Astuty Arum Sari
NIM :70100116077

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berupa Studi Literatur yang berjudul “Studi Literatur Potensi Daun Sembukan (*Paederia foetida* Linn.) Sebagai Agen Antikanker” yang disusun oleh Dwi Astuty Arum Sari, NIM : 70100116077, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum’at yang bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi

Samata, 19 Februari 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A. (.....)

Sekretaris : Apt. Nurul Muhlisah Maddepungeng, (.....)
M.Si

Pembimbing 1 : Apt. Mukhriani, S.Si., M.Si (.....)

Pembimbing 2 : Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si (.....)

Penguji 1 : Apt. Andi Asrul Ismail, S. Farm., M.Sc (.....)

Penguji 2 : Dr. Hj. Amrah Muhammad Kasim, Lc., (.....)
M.A

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes.,Sp.A.

NIP : 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis hanturkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Studi Literatur Potensi Daun Sembukan (*Paederia foetida Linn*) Sebagai Agen Antikanker” ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian penelitian dan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Dr. Mansur Ibrahim S.si., M.kes dan Ibunda Syamriwati, S. kep yang tidak pernah berhenti untuk terus memberikan bantuan, dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini. Dan keluarga besar ku tercinta, Ibrahim Family Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Apt. Andi Asrul Ismail S.Farm, M.Sc selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Apt. Mukhriani, S.Si., M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktu dan tenaganya, serta selalu memotivasi penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
5. apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktu dan tenaganya, serta selalu memotivasi penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Dr. Hj. Amrah Muhammad Kasim, Lc., M.A selaku Penguji Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi, atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.
8. Teman-teman D16OXIN Farmasi Angkatan 2016 yang tak henti-hentinya memberi semangat serta senantiasa saling mendukung dan merangkul dalam tahapan penyusunan skripsi di masa pademi COVID-19 ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Makassar, 19 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR SKEMA	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	5
1.4.Manfaat Penelitian.....	5
BAB II METODE PENELITIAN.....	7
2.1 Strategi Pencarian Literatur.....	7
2.1.1 Framework	8
2.1.2 Kata Kunci	10
2.1.3 Database.....	10
2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Jurnal/Artikel	10
2.2.1 Kriteria Inklusi	10
2.2.2 Kriteria Eksklusi.....	11
2.3 Seleksi Studi dan Pencarian Kualitas.....	11
2.3.1 Hasil Pencarian dan Seleksi Studi.....	11
2.3.2 Daftar Artikel Hasil Pencarian	12
BAB III HASIL DAN ANALISIS.....	14
3.1 Hasil.....	14
3.2 Analisis	14
3.3 Prisma Flow Diagram.....	19

BAB IV PEMBAHASAN	21
4.1 Pembahasan	21
4.2 Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan	31
BAB V PENUTUP	36
5. 1 Kesimpulan.....	36
5.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	42



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR SKEMA

Skema 1. Skema Kerja Penelitian	9
Skema 2. Seleksi Jurnal Inklusi dan Eklusi	11
Skema 3. Prisma Flow Diagram	20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Table 1. Kriteria Inklusi	10
Table 2. Daftar Artikel Hasil Analisis	12
Table 3. Hasil Analisis Artikel	14



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Pencarian dari Database Elektronik Research Gate.....	42
Lampiran 2. Hasil Pencarian dari Database Elektronik Science Direct	42
Lampiran 3. Hasil Pencarian dari Database Elektronik Google Scholar	43



ABSTRAK

Nama : Dwi Astuty Arum Sari
NIM : 70100116077
Jurusan : FARMASI
Judul Skripsi : Studi Literatur Potensi Daun Sembukan (*Paederia foetida* Linn.) Sebagai Agen Antikanker

Kanker merupakan suatu penyakit yang ditandai dari adanya pertumbuhan yang tidak terkendali sehingga menyebabkan penyebaran sel-sel abnormal yang bisa bermetastase. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tahun peningkatan angka kejadian kanker semakin bertambah dan tingginya efek samping dari pengobatan akibat kanker perlu mencari alternative untuk mengeksplorasi bahan-bahan alam yang dipercaya potensial sebagai alternatif agen antikanker seperti halnya yaitu daun sembukan (*Paederia foetida* Linn). Telah dilakukan studi literatur tentang potensi daun sembukan (*Paederia foetida* Linn) sebagai agen antikanker. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dari daun sembukan (*Paederia foetida* Linn) dan kandungan senyawa yang berperan sebagai agen antikanker. Penelusuran dan analisis literatur menggunakan metode PICO melalui kriteria inklusi dan eksklusi dengan menggunakan database yang diperoleh dari *Google scholar*, *sciencedirect*, dan *research gate*. Artikel yang digunakan sebagai data hanya yang relevan dengan judul review. Hasil penelusuran literatur diperoleh 9 jurnal yang menunjukkan bahwa Daun sembukan (*Paederia foetida* Linn.) memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai agen antikanker karena banyak mengandung senyawa fitokimia seperti Flavanoid, Alkaloid, Tanin, dan Steroid yang berkhasiat untuk dikembangkan sebagai bahan obat alami dan senyawa antikanker.

Kata Kunci : Antikanker, Daun sembukan, (*Paederia foetida* Linn.), sitotoksik, kanker, LC₅₀

ABSTRACT

Name : Dwi Astuty Arum Sari
NIM : 70100116077
Department : PHARMACY
Title : *A Literature Study of Potential Cured Leaves (Paederia foetida Linn.) As an Anticancer Agent*

Cancer is a disease characterized by uncontrolled growth that causes the spread of metastatic abnormal cells. As we know that every year the increase in the incidence of cancer is increasing and the high side effects of cancer treatment, it is necessary to find alternatives to explore natural ingredients that are believed to be potential as alternatives to anti-cancer agents, such as leaves of sembukan (*Paederia foetida* Linn). A literature study has been conducted on the potential of sembukan (*Paederia foetida* Linn) as an anticancer agent. This study aims to determine the potential of sembukan (*Paederia foetida* Linn) and its compounds that act as anticancer agents. The literature search and analysis used the PICO method through inclusion and exclusion criteria using databases obtained from Google scholar, sciencedirect, and research gate. Articles used as data are only relevant to the review title. The results of literature search were obtained by 9 journals which showed that sembukan (*Paederia foetida* Linn.) Has the potential to be used as an anticancer agent because it contains many phytochemical compounds such as flavonoids, alkaloids, tannins, and steroids which are efficacious to be developed as natural medicinal ingredients and anticancer compounds.

Keyword : *Anticancer, Sembukan leaves, (Paederia foetida Linn.), Cytotoxic, cancer, LC₅₀*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanaman obat merupakan unsur penting dalam sistem pengobatan di seluruh dunia. Obat tradisional tetap menjadi sumber pengobatan yang paling terjangkau dan mudah diakses. Penggunaan obat-obatan herbal secara “tradisional” menyiratkan penggunaan historis yang substansial. Tumbuhan obat merupakan sumber daya obat tradisional dan sebagian besar obat modern dihasilkan secara tidak langsung dari tumbuhan. (Hosseinzadeh et al., 2015). Salah satu sumber daya obat tradisional yang digunakan dalam pengobatan adalah Daun Sembukan (*Paederia foetida L*) sebagai obat antikanker.

Kanker ialah terjadinya pertumbuhan sel yang abnormal atau terus menerus dan tidak terkendali, yang dapat menyebabkan rusaknya jaringan yang berada disekitarnya dan bisa menjalar ketempat yang lain. “Kanker merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak pada manusia. Tingginya perkara kanker baru dan angka kematian akibat kanker bisa disebabkan sang faktor resiko, perilaku dan pola makan. Factor-faktor tadi merupakan indeks massa tubuh yang tinggi, kurangnya konsumsi sayur dan buah, kurangnya kegiatan fisik, merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Berbagai upaya dilakukan buat mengobati kanker, termasuk didalamnya menggunakan tanaman obat” (Emilio Kalonio et al., 2017) sedangkan menurut (Saíz-Urra et al., 2009) memprediksikan tingkat kematian yang ditimbulkan dari kanker cenderung semakin tinggi, menurut kurang lebih 9,0 juta kematian dalam tahun 2015 semakin tinggi menjadi sekitar 11,4 juta kematian dalam tahun 2030.

Pada tahun 2019 (World Health Organization, 2019) menginformasikan tentang kanker global terbaru yaitu beban kanker meningkat menunjukkan angka

18,1 juta akibat adanya kasus kanker baru dan 9,6 juta kematian akibat kanker pada tahun 2018. Akibat karena adanya penyakit kanker ini menyebabkan dampak yaitu satu dari 5 pria dan satu dari 6 wanita diseluruh dunia mengalami penyakit kanker selama masa hidup mereka, serta satu dari 8 pria dan satu dari 11 wanita meninggal. Indonesia sebagai negara dengan urutan ke-8 pada Asia tenggara dengan angka kejadian kanker mencapai 136,2 untuk 100.000 penduduk. Prevalensi kanker pada Indonesia terbukti dapat terjadinya peningkatan dari 1,4 pada tahun 2013 menjadi 1,79 buat setiap 1000 penduduk ditahun 2019 (Kemenkes, n.d.)

Menurut (Fachreza Erdi Pratama, 2013) “Saat ini sudah banyak pengobatan yang dilakukan buat pasien penderita kanker. Pemakaian radioaktif serta pembedahan merupakan salah satu cara pengobatan penyakit kanker. Selain pemakaian radioaktif serta pembedahan, pula mampu dilakukan metode kemoterapi. Perbedaan pengobatan dipasien kanker tadi sesuai jenis kanker yaitu kanker non metastatis serta metastatis. buat kanker non metastatis lebih efektif digunakan radioaktif dan pembedahan, berbeda menggunakan kanker metastatis yang menyerang banyak organ tubuh, pemakaian kemoterapi lebih efektif dibanding pembedahan dan radioaktif. Aneka macam pengobatan kanker pada pasien dengan memakai obat-obatan kemoterapi mempunyai efek samping yang sangat kuat. Hal ini ditimbulkan lantaran obat-obatan kemoterapi tidak hanya menyerang sel kanker namun juga dengan sel-sel normal yang terdapat ditubuh. Sel-sel normal yang biasa dihancurkan sang obat kemoterapi yaitu sel yang memiliki proliferasi yang cepat, contoh sumsum tulang belakang, folikel rambut, dan sel-sel saluran pencernaan. Karena efek samping inilah, banyak dilakukan penelitian buat mencari alternatif baru untuk pengobatan kanker”.

Penemuan dan penelitian tentang bahan alam yang dapat berguna sebagai bahan obat telah marak dilakukan, sebagaimana diketahui bahwa tumbuhan dapat melakukan proses yang mensintesis senyawa organik kompleks sehingga banyak senyawa-senyawa bermanfaat dengan aktifitas biologis dan farmakologi yang cocok untuk dikembangkan sebagai bahan baku obat. Tumbuhan dapat bermanfaat baik dalam bentuk mentah maupun bentuk yang sudah diolah atau dikembangkan (R. Hamidi et al., 2014).

Sejak zaman dahulu kala pengobatan berbagai macam penyakit salah satunya yaitu kanker digunakan tanaman herbal. Keanekaragaman tanaman yang sangat besar merupakan salah satu sumber yang sangat berpotensi dan berasal dari bahan-bahan alam/Senyawa kimia yang dipercaya memiliki aktivitas dalam efek antitumor serta efek sitotoksik (Emilio Kalonio et al., 2017).

Senyawa-senyawa antikanker yang diteliti dan ditemukan menghancurkan serta menyerang sel kanker dengan memacu apoptosis sel yang berarti menyebabkan kematian sel. semakin banyak serta membentuk antiproliferasi yang mengakibatkan pertumbuhan sel kanker tidak dilakukan dan mampu berhenti (Fachreza Erdi Pratama, 2013). Salah satu tanaman yang banyak dimanfaatkan sebagai obat adalah daun sembukan (*Paederia foetida*).

Daun sembukan (*Paederia foetida L*) dari keluarga *Rubiaceae* merupakan tanaman rambat kompetitif yang agresif dengan bau busuk yang tumbuh tinggi diberbagai habitat pohon. Daun sembukan (*Paederia foetida L*) merupakan bagian tanaman yang digunakan secara local sebagai agen penyembuhan alami dari beberapa penyakit (Ahmed, 2014).

Adanya daun sembukan memiliki banyak kegunaan yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat dan tidak terlepas dari banyaknya beragam manfaat yang terdapat dalam tanaman tersebut yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh

terutama karenanya adanya kandungan kimia yang dapat bermanfaat dalam pencegahan berbagai macam jenis penyakit (Nugroho et al., 2018). Beberapa peneliti mulai meneliti mengenai daun sembukan yang memiliki banyak kandungan fitokimia menurut (Ekawati et al., 2017) kandungan kimia yang terdapat dalam daun sembukan yaitu *deastilaperuloside*, *paederoside*, *iridoid glikosida*, *scanderoside*, *asam paderosidik*, arbutin, alkaloid, flavonoid, gamma sitosterol, minyak atsiri dan metil merkaptan.

Kesehatan ialah salah satu nikmat tuhan yang sangat patut untuk disyukuri sesuai dengan fitrah insan manusia untuk itu kita harus siap untuk memantapkan diri dalam menegakkan ajaran agama islam.

Keanekaragaman tumbuhan yang merupakan salah satu ciptaan Allah SWT sangat sering dimanfaatkan oleh insan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik itu sebagai bahan pangan ataupun akan menjadi bahan pengobatan. Begitu banyaknya manfaat atas segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT didalam bumi ini dan dijaga serta dikelola oleh insan manusia yang merupakan khalifah diatas bumi. Hanya saja sangat disayangkan karena dalam pengelolannya harus diperlukan adanya ilmu pengetahuan agar insan manusia yang akan menjadi khalifah diatas bumi ini dapat menggunakan manfaat dari tanaman yang telah diciptakan oleh Allah SWT dalam hal pemanfaatan pengobatan (QS. Thaahaa/20 :53)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ (٥٣)

Terjemahannya :

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka

kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam”

Dari ayat diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah SWT memberi hidayah kepada insan manusia menggunakan menurunkan air dari langit berupa hujan, lalu ditumbuhkan dari air itu banyak sekali serta jenis tumbuhan yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan sebagai rejeki bagi makhluk hidup hayati sebab ialah bahan pangan, bahan sandang, papan, dan bahan obat-obatan. Begitu banyak manfaat tumbuh-tumbuhan bagi makhluk hidup lain, sedangkan tumbuhan artinya makhluk yang tidak pernah mengharapkan balasan dari makhluk lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut telah dijelaskan bahwa kanker merupakan penyakit yang berbahaya diseluruh dunia termasuk di Negara Indonesia, serta terapi pengobatan untuk penyakit kanker nyatanya membuahkan banyak efek samping yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk mengambil bahan alam sebagai salah satu alternatif pengobatan yang relative murah dan aman untuk penderita penyakit kanker.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diperlukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap potensi kandungan daun sembukan (*Paederia foetida L.*) yang digunakan sebagai salah satu alternatif pengobatan antikanker

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu


1. Senyawa apa yang terkandung pada daun sembukan (*Paederia foetida Linn*) yang berpotensi sebagai antikanker?
2. Bagaimana potensi antikanker daun sembukan (*Paederia foetida Linn*) berdasarkan penelitian terdahulu?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui senyawa apa yang terkandung pada daun sembukan (*Paederia foetida L*) yang berpotensi sebagai antikanker.
2. Mengatahui potensi antikanker pada daun sembukan (*Paederia foetida Linn*) berdasarkan penelitian terdahulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan baik itu kepada penulis maupun masyarakat luas mengenai potensi pemanfaatan daun sembukan (*Paederia foetida L*) sebagai agen antikanker.



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Strategi Pencaharian Literatur

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian literatur review dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam *systematic review* digunakan buat mensintesis (merangkum) hasil penelitian yang bersifat deskriptif/naratif kualitatif. Metode mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian kualitatif ini diklaim menggunakan “meta-analisis”. Secara definisi, meta-analisis ialah Teknik melakukan integrasi data untuk menerima teori maupun konsep baru atau strata pemahaman yang lebih dalam serta menyeluruh (Siswanto, n.d.).

Tujuan dilakukan penelitian studi literatur yaitu untuk menyelesaikan permasalahan penelitian yang dilakukan sendiri dengan mengumpulkan beberapa informasi kepustakaan sehingga akan menambah wawasan dari peneliti mengenai permasalahan dalam penelitian dan membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang terjadi dalam penelitian yang telah sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Selain itu mendapatkan gambaran mengenai kajian teori dalam permasalahan penelitian (Marzali, 2017).

Pada penelitian studi literatur yang dilakukan menggunakan database yang diperoleh dari *Google scholar*, *Science direct*, dan *Research gate* yang menggunakan informasi kepustakaan dengan rentang waktu publikasi 9 tahun terakhir yaitu pada tahun 2012 – 2020 yang termasuk penelitian ilmiah.

2.1.1 Framework

Framework yang digunakan dalam penelitian study literatur ini adalah metode PICOS (*Population, Intervention, Control dan Outcome, Study*).

P (*Problem/ Population*) yaitu masalah dan populasi yang spesifik dalam suatu jurnal yang akan dianalisis, dalam penelitian ini yang menjadi population yaitu daun sembukan (*Paederia foetida L*).


I (*Intervention*) yaitu intervensi/Perlakuan yang dilakukan pada populasi terhadap fenomena yang terjadi pada suatu jurnal, dalam penelitian ini yang menjadi intervention yaitu Metode yang digunakan dalam pengujian antikanker dan potensi toksisitas dari daun sembukan (*Paederia foetida L*).

C (*Comperation*) yaitu Perbandingan intervensi atau control yang sudah/ pernah dilakukan pada populasi/problem terkait pada suatu jurnal. Yang menjadi *Comperation* dalam penelitian ini adalah pembanding/control yang digunakan dalam penelitian.

O (*Outcome*) Hasil yang didapatkan dari penelitian suatu jurnal, yang menjadi outcome dalam penelitian ini yaitu berupa nilai LC_{50} yang merupakan rujukan potensi daun sembukan (*Paederia foetida L*) sebagai antikanker.

S (*Study/Design*) dalam Framework yang dimaksud ini adalah eksperimental.

Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan dengan mengacu pada skema kerja sebagai berikut :



Skema 1. Skema Kerja Penelitian

2.1.2 Kata Kunci

Kata kunci yang digunakan yakni kandungan daun sembukan (*Paederia foetida*), *Pharmacology Effect of paderia foetida*, *Daun sembukan (Paederia foetida)*, *paderia foetida as anticancer*.

2.1.3 Database

Literatur diperoleh dalam mencari jurnal/ artikel dengan bersumber dari *Google scholar*, *science direct*, dan *Research gate*

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Jurnal/Artikel

2.2.1 Kriteria Inklusi

Table 1. Kriteria Inklusi

Kriteria	Inklusi/ Penyertaan
Jangka Waktu	Rentang waktu penerbitan jurnal maksimal 9 tahun (2012-2020)
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
Subjek	Daun Sembukan (<i>Paederia foetida L</i>)
Jenis Jurnal	Original Artikel Penelitian
Tema Isi Jurnal	Tema yang berkaitan dengan judul penelitian Potensi Daun sembukan (<i>Paederia foetida L</i>) sebagai antikanker
Index	Scopus dan Sinta


2.2.2 Kriteria Eksklusi

1. Artikel yang terdapat di database pencarian yang sama
2. Artikel yang tidak relevan dengan outcome.
3. Desain studi berdasarkan *review artikel* dan *sistemik review*.
4. Isi jurnal tidak sesuai dengan metode pengujian antikanker.

2.3 Seleksi Studi dan Pencaharian Kualitas

2.3.1 Hasil Pencaharian dan Seleksi Studi

Seleksi pencaharian literatur review menggunakan prinsip PRISMA *Flow Diagram Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) akan memindai secara ekstensif semua jurnal, artikel, dan sumber data lainnya untuk menemukan jawaban yang jelas dari pertanyaan penelitian. Dan akan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi untuk mengidentifikasi jurnal, artikel dan sumber data lainnya yang akan dimasukkan ke dalam suatu ulasan penelitian dan kemudian dilakukan proses sintesis (Selcuk, 2019).



Skema 2. Seleksi Jurnal Inklusi dan Eksklusi

2.3.2 Daftar Artikel Hasil Pencarian

Artikel hasil pencarian yang telah diseleksi disajikan pada table berikut

Table 2. Daftar Artikel Hasil Analisis

Judul Artikel	Penulis	Tahun	Nama Jurnal
Thrombolytic, Cytotoxic and Antidiabetic of <i>Paederia foetida</i> L Leaf Extract	A.M. Abu Ahmed, et al	2013	British Journal of Medicine & Medical Research
Skrining Fitokimia Ekstrak Kloroform daun sembukan (<i>Paederia foetida</i> Linn) dan Uji Toksisitas Menggunakan Metode Brine Shrimp Lethality Test [®]	Datin An Nisa Sukmawati. Et al	2020	Jurnal Inovasi Farmasi Indonesia
Uji Aktivitas Antioksidan dan Sitotoksisitas Fraksi Daun Kentutan (<i>Paederia foetida</i> L)	Djoko Parwanto & Muhammad Agus Wibowo	2015	JKK
In vitro anticancer and catalytic activity of <i>Paederia foetida</i> conjugated gold nanoparticles (PF-AuNPs)	Chhabi Garai et al	2019	Prayogik Rasayan
<i>Paederia foetida</i> induces anticancer activity by modulating chromatin modification enzymes and	Nibedita Pradhan, et al	2019	Food and Chemical Toxicology

altering pro-inflammatory cytokine gene expression in human prostate cancer cells			
Investigation of Cytotoxic Potential of Ethanolic Extract of Citrus limetta fruit peel, Paederia foetida Leaves and Methanolic Extract of Cusutta reflexa	Mohammed Aktar Sayeed, et al	2013	Journal of Medicinal Plants Studies
Cytotoxic and Antidiabetic Activity of Leaf Extracts of Paederia foetida L	Bhatnagar S, Sahoo M	2016	International Journal Of Pharmacognosy and Phytochemical Research
Antimicrobial and Cytotoxic Activity of the Methanol Extract Of Paderia Foetida Linn (Rubiaceae)	Hela Morshed, et al	2012	Journal of Applied Pharmaceutical Science
Uji Fitokimia dan Uji Toksisitas Ekstrak Etanol Tanaman Kesembukan (<i>Paderia foetida</i> Linn.) dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test	Datin An Nisa Sukmawati, et al	2014	Journal Of Alchemy

BAB III
HASIL DAN ANALISIS

3.1 Hasil

Berdasarkan strategi pencarian literatur diperoleh sebanyak 9 artikel yang terdiri dari hasil pencarian data-data berupa jurnal/artikel yang didapatkan dari Google scholar sebanyak 4 artikel, Science direct sebanyak 2 artikel, dan research gate 3 sebanyak artikel.

3.2 Analisis

PICO (Populasi, Intervensi, Control, Outcome)

Table 3. Hasil Analisis Artikel

Judul Jurnal	Population	Intervensi	Control	Outcome
Thrombolytic, Cytotoxic, and Antidiabetic of <i>Paederia foetida</i> L Leaf Extract	Daun sembukan (<i>Paederia foetida</i> L)	menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Bioassay	control negative DMSO, dan control positif Vincristine sulfate	Analisis regresi linier dari data mortalitas menunjukkan nilai LC ₅₀ ekstrak daun Paderia foetida dan vincristine sulfat masing-masing 65,31 dan 0,76 µg/mL

<p>Skrining Fitokimia Ekstrak Kloroform daun sembukun (<i>Paederia foetida Linn</i>) dan Uji Toksisitas menggunakan Metode Brine Shrimp Lethality Test</p>	<p>Daun Sembukan (<i>Paederia foetida Linn</i>)</p>	<p>Menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Bioassay</p>	<p>menggunakan an control DMSO (dimetil sulfoksida) tanpa adanya penambahan ekstrak daun sembukun</p>	<p>Hasil analisis probit dengan menghitung kematian larva pada udang <i>Artemia salina L</i> yang menunjukkan bahwa nilai LC₅₀ adalah 193,88 ppm dengan menggunakan ekstrak kloroform daun sembukun menunjukkan kandungan kimia steroid</p>
<p>Uji Aktivitas Antioksidan dan Sitotoksisitas Fraksi Daun Kentutan (<i>Paederia foetida L</i>)</p>	<p>Daun sembukun (<i>Paederia foetida</i>)</p>	<p>Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)</p>	<p>Pembanding /kontrol yang digunakan yaitu DMSO (dimetil sulfoksida)</p>	<p>fraksi dari daun (<i>Paederia foetida</i>) memiliki potensi toksisitas paling aktif terhadap udang <i>Artemia salina</i> sebesar 291,031 ppm.kandungan kimia yang terdapat pada daun sembukun yaitu flavonoid, alkaloid,</p>

				polifenol, dan terpenoid
In vitro anticancer and catalytic activity of <i>Paederia foetida</i> conjugated gold nanoparticles (PF-AuNPs)	Daun sembukan (<i>Paederia foetida</i> L)	aktivitas dari <i>Paederia Foetida</i> secara nanopartikel yang telah digunakan sebagai nanomedicine untuk tujuan diagnostik dan terapeutik pembawa pemberian obat menggunakan metode pengujian MTT sel kanker payudara MCF-7 dan sel HeLa	Kontrol yang digunakan sel limfosit normal	ekstrak daun sembukan (<i>Paederia foetida</i>) kayak akan fitokimia seperti flavanoid, steroid, dan tanin. konsentrasi penghambatan LC ₅₀ sel MCF-7 dan pertumbuhan sel HeLa adalah 47,45 dan 48,43 µg/mL
<i>Paederia foetida</i> induces anticancer activity by modulating chromatin modification enzymes and altering pro-inflammatory cytokine gene	Daun sembukan (<i>Paederia foetida</i>)	menggunakan garis sel kanker PC-3 dan DU-145	kontrol/ pembanding sel manusia normal keratinosit (HaCaT)	kandungan senyawa yang terdapat dalam ekstrak daun sembukan terdiri dari Flavanoid, alkaloid, β sitosterol, minyak atsiri dan glikosida iridoid yang terjadi

expression in human prostate cancer cells.				penurunan yang luar biasa dengan adanya peningkatan konsentrasi obat pada jalur sel kanker yang diuji menggunakan MTT. Sel normal (HaCaT) tidak ada efek yang mematikan. Nilai IC ₃₀ untuk sel PC-3 50 µg/ml dan untuk sel DU-145 40 µg/ml
Investigation of Cytotoxic Potential of Ethanolic Extract of Citrus Limetta fruit peel, Paderia foetida Leaves and Methanolic Extract of cusutta reflexa	Daun sembukan (<i>Paederia foetida</i>)	menggunakan metode BSLT (Brine Shrimp Lethality Test)	control negative DMSO untuk control positif yang digunakan Vincristine sulfat	Nilai LC ₅₀ pada daun <i>Paederia foetida</i> 42,57 µg/ml dari hasil ekstrak tersebut diketahui memiliki potensi sitotoksik.
Cytotoxic and Antidiabetic	Daun Sembukan	menggunakan metode BSLT	menggunakan beberapa	aktivitas sitotoksik


Activity of Leaf Extracts of (<i>Paederia foetida</i> L)	(<i>Paederia foetida</i> L)	(Brine Shrimp Lethality Test)	variasi konsentrasi dan pelarut dengan diinkubasi menggunakan Larutan KCL 1,8%	tertinggi diperoleh dalam ekstrak aseton dimasing-masing konsentrasi 64% dengan dosis 200 mikrogram/ml
Antimicrobial and Cytotoxic Activity of the Methanol Extraxt of <i>Paderia foetida</i> Linn (Rubiaceae)	Daun sembukan (<i>Paederia foetida</i>)	Menggunakan metode BSLT (Brine Shrimp Lethality Test)	menggunakan DMSO (Dimetil sulfoksida) sebagai control negative dan control positif obat standar Vincristin sulfat.	Nilai LC ₅₀ dari ekstrak metanol daun sembukan (<i>Paderia foetida</i>) diperoleh 1.5625 (μ/ml), dilihat dari nilai LC ₅₀ memiliki aktivitas sitotoksik.
Uji Fitokimia dan Uji Toksisitas Ekstrak Etanol Tanaman Ksembukan (<i>Paederia foetida</i> Linn.) dengan Metode Brine	Daun sembukan (<i>Paederia foetida</i>)	Menggunakan metode BSLT (<i>Brine Shrimp Lethality Test</i>)	menggunakan DMSO (Dimetil sulfoksida) sebagai control tanpa adanya penambahan ekstrak	ekstrak etanol daun sembukan (<i>Paederia foetida</i>) terdapat senyawa steroid. ekstrak daun sembukan (<i>Paederia foetida</i>) memiliki toksisitas terhadap larva

Shrimp Lethality Test				udang Artemia salina L dengan nilai LC_{50} 226,787 ppm.
--------------------------	--	--	--	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

3.3 Prisma Flow Diagram



Keterangan :

- : Total pencarian pada database berdasarkan keyword
- : Artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi
- : Jumlah Artikel

Skema 3. Prisma Flow Diagram

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan adanya pertumbuhan sel yang tidak terkendali, menginvasi ke jaringan sekitarnya dan menyebar (metastasis) ke bagian tubuh yang lain. Pada kanker, sel kehilangan fungsi kontrolnya terhadap siklus sel juga fungsi homeostasis, sebagai akibatnya sel bisa berproliferasi terus-menerus dan membentuk jaringan abnormal. Pada sel normal, sinyal antiproliferatif bekerja untuk menjaga keteraturan sel dan homeostatis jaringan (Darma et al., 2009). Kanker tak jarang dikenal oleh masyarakat sebagai tumor, padahal tidak semua tumor merupakan kanker. Tumor artinya segala benjolan tidak normal ataupun abnormal. Tumor dibagi pada 2 golongan yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Kanker ialah kata umum untuk semua jenis tumor ganas. Kanker bisa menimpa seluruh orang, di setiap bagian tubuh dan pada semua golongan umur, tetapi lebih sering menimpa orang yang berusia 40 tahun (Aprianti, 2012).

Menurut (Bott, 2014) “Tingginya kasus kanker baru kurang lebih 40% akibat kanker yang menyebabkan kematian yang sangat berkaitan erat dengan adanya faktor risiko kanker yang seharusnya dapat dicegah. Faktor risiko kanker yang terdiri berasal dari faktor risiko perilaku serta pola makan, diantaranya adalah: indeks massa tubuh tinggi, kurang konsumsi buah dan sayur, kurang kegiatan fisik, penggunaan rokok, konsumsi alkohol yang berlebihan. Faktor risiko kanker lainnya, ialah dampak dari paparan karsinogen fisik, misalnya ultraviolet (UV) dan radiasi ion karsinogen kimiawi, seperti benzo(a)pyrene, formalin serta aflatoxin (kontaminan makanan) dan serat contohnya asbestos, karsinogen biologis misalnya infeksi virus, bakteri dan parasit”.

Perkembangan kanker disebabkan oleh serangkaian mutase genetik pada gen termasuk onkagen, gen penekan tumor, dan gen yang terkait dengan stabilitas genom (Semi et al., 2013). Perbaikan DNA yang tidak sempurna, menyebabkan ketidakstabilan genom pada perkembangan siklus sel sehingga terjadi akumulasi yang lebih cepat dari mutasi DNA. Ketidakstabilan ini menjadi cara dimana sel yang sehat dapat mengakumulasi mutase yang cukup untuk menjadi ganas.

Pada sel normal, proses pembelahan sel terjadi ketika mereka menerima sinyal yang sesuai. Namun, pada sel kanker akan mengaktifkan pembelahan sel secara permanen sehingga sel akan terus membelah yang pada akhirnya tidak terkontrol dan jumlahnya melebihi kapasitas sel yang dibutuhkan. Ketika proses replikasi DNA pada sel normal mengalami kecacatan, maka sel normal akan mengaktifkan program penghancuran diri daripada membiarkan DNA melakukan replikasi dalam kondisi dimana gen bisa menjadi rusak, namun sel kanker akan memotong proses penghancuran otomatis, sel kanker akan menghilangkan dua gen master yaitu RB_1 (juga disebut gen retinoblastoma) dan TP53 (yang menghasilkan protein p53, stress sensor yang biasanya mencegah sel membelah ketika lingkungannya terganggu) dimana Ketika dua gen ini dihilangkan sel akan terus membelah dan juga tidak akan terjadi pemusnahan pada sel, sehingga memungkinkan pembelahan sel yang cacat secara terus menerus yang akan menjadi awal dari pembentukan dari massa tumor. Sel kanker juga akan mengaktifkan suatu enzim yang disebut telomerase yang memungkinkan penambahan telomer di akhir kromosom, dengan demikian sel akan terus membelah bahkan ketika melewati batas yang telah ditentukan (R.A Weiss, 1982).

Uji toksisitas adalah suatu pengujian yang dirancang untuk mengidentifikasi efek toksis suatu senyawa dalam waktu yang singkat. Pada uji

ini akan dilakukan pemberian konsentrasi terhadap senyawa uji pada hewan uji. Variasi konsentrasi yang bisa dipergunakan yaitu minimal empat tingkatan konsentrasi atau lebih, berdasarkan dari konsentrasi paling rendah dan hamper tidak dapat mematikan seluruhnya ataupun semua dari hewan uji. Pengujian ini dilakukan dengan jangka waktu 24 jam (Irnawati La Ode Izzatil; Reymon, Reymon; Karmila, Karmila, 2016).

Efek farmakologis dari tumbuhan disebabkan adanya senyawa metabolit sekunder yang terkandung didalamnya. Komponen senyawa aktif yang memiliki efek sebagai obat herbat dapat diujikan melalui analisis awal seperti analisis toksisitas. Metode yang sering digunakan pada analisis toksisitas yaitu “*Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)*”. Pengujian ini menggambarkan tingkat ketoksikan ekstrak terhadap larva *Artemia salina*. Hasil uji ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi bioaktivitas tanaman yang lebih luas (Zuraida, 2018)

Dalam jurnal (Meyer et al., 1982) mengenai metode BSLT mengatakan “*Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)* yaitu uji yang dipergunakan buat mengetahui toksisitas suatu sampel ekstrak atau senyawa terhadap pada hewan uji, yaitu larva udang *Artemia salina L.* Selain itu, uji ini dilakukan menjadi uji pendahuluan pada suatu uji sitotoksik dengan mengetahui jumlah kematian hewan uji. Nilai yang digunakan sesuai analisis probit adalah nilai lethal concentration 50 (LC_{50}). Uji toksisitas dengan metode BSLT ini mempunyai spektrum aktivitas farmakologi yang luas, prosedurnya sederhana, cepat serta tidak membutuhkan biaya yang besar, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, metode ini sering dikaitkan dengan menggunakan metode penapisan senyawa antikanker. Dengan alasan-alasan tersebut, maka uji ini sangat tepat digunakan dalam mengawali penelitian bahan alam”.

Metode ini ialah salah satu metode yang paling sering digunakan dalam pencarian senyawa antikanker yang bersumber dari tanaman. Dari hasil pengujian toksisitas metode ini sudah membuktikan akan adanya hubungan dengan daya sitotoksik dari senyawa antikanker. Selain itu metode ini juga digunakan karena memiliki kelebihan yaitu praktis untuk dikerjakan, murah cepat, dan relative akurat. Pengujian toksisitas merupakan skrining dari proses pencaharian atau penemuan senyawa obat antikanker (Nuraini et al., 2015).

Mekanisme Apoptosis menurut (Sudiana, 2008) "Apoptosis yang patologis yaitu kematian sel lantaran adanya suatu rangsangan. Proses kematian sel (apoptosis) ini bisa melalui beberapa jalur, antara lain jalur sitotoksik, terjadinya apoptosis melalui jalur sitotoksik ini dipicu oleh adanya sel yang mempunyai gen cacat (*gene defect*), menggunakan adanya kecacatan gen ini, maka sel tadi akan mengekspresikan protein asing. Protein asing yang didapatkan bisa bersifat imunogenik, sebagai akibatnya memicu terjadinya proses pembentukan antibody. Antibody yang terbentuk bisa melekat dipermukaan sel tertentu. Hal ini terjadi lantaran adanya beberapa sel yang dalam membrannya mempunyai *receptor* dari antibody yaitu sel *Killer*. Dengan adanya reseptor tadi, maka antibody akan melekat di permukaan sel *Killer*, selanjutnya antibody yang berada dipermukaan sel *Killer* akan mengikat protein asing yang berada di permukaan sel yang memiliki gen cacat. Adanya ikatan sel *Killer* tersebut akan melepaskan suatu enzim yang disebut sebagai sitotoksin, sitotoksin yang dilepas oleh sel *Killer* tersebut mengandung perforin dan *granzyme*".

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan berbagai macam keanekaragaman hayatinya serta manfaat dari potensi dari sumber daya alam. Keanekaragaman ini ialah berasal dari berbagai senyawa-senyawa kimia baik itu merupakan senyawa metabolit ataupun senyawa utama primer serta sekunder.

Adanya keanekaragaman hayati di Indonesia sangat dapat dipergunakan menjadi bahan pengobatan herbal sejak zaman dahulu yang secara turun temurun hingga sekarang dan salah satunya merupakan tanaman daun sembukan (*Paederia foetida*) (An et al., 2020)

Kandungan senyawa kimia dalam tumbuhan daun sembukan (*Paederia foetida* L) cukup banyak diantaranya asperuloside, memiliki berbagai macam efek seperti sebagai imunomodulator, antihepatotoksik, antispasmodic, hipoglikemik, anti-tumor, anti-inflamasi, antivirus, dan aktivitas purgative (Ekawati et al., 2017). Sedangkan menurut (Ojha et al., 2018) pada *Paederia foetida* fitokonsitituen berbeda seperti iridoid glikosida, minyak atsiri, triterpenoid, β -sitosterol, yang berimplikasi pada beragam bioaktivitas, selain itu juga mengandung alkaloid (paederine a dan b) juga Flavanoid dan mineral dengan proporsi unsur yang tinggi.

Oleh karena itu, untuk mendukung teori dalam kemampuan dan potensi daun sembukan (*Paederia foetida*) sebagai agen antikanker dilakukan beberapa jurnal untuk dianalisis dengan penelitian Potensi daun sembukan (*Paederia foetida*) sebagai agen antikanker. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ahmed, 2014) dengan judul penelitian “*Thrombolytic, Cytotoxic, and Antidiabetic Effect of Paederia foetida L. Leaf Extract*” menggunakan ekstrak metanol daun sembukan (*Paederia foetida*) untuk pengujian aktivitas sitotoksik menggunakan metode “BSLT (*Brine Shrimp Lethality Bioassay*)” yang merupakan indikator sitotoksitas dan berbagai tindakan farmakologis. Hasil penelitian yang menjelaskan bahwa uji in vitro sangat berkorelasi dengan uji in vivo dan berguna sebagai alternatif untuk memprediksi toksisitas pada ekstrak tumbuhan. Dalam pengujian ini menunjukkan analisis regresi linier dari data mortalitas menunjukkan nilai LC₅₀ ekstrak daun sembukan yaitu 65,31 μ g/mL

secara statistic signifikan yang dibandingkan dengan vincristine sulfat sebagai agen sitotoksik standar. Alasan yang mendasari efek sitotoksik dari ekstrak disebabkan oleh metabolit alami terutama flavonoid yang ada didalam ekstrak daun sembukan. Oleh karena itu, tanaman ini dapat menjadi sumber potensial penemuan senyawa sitotoksik baru.

Berdasarkan jurnal penelitian dari (An Datin et al., 2020) dengan judul “*Skrining Fitokimia Ekstrak Kloroform Tanaman Kesembukan (Paederia foetida) dan Uji Toksisitas Menggunakan Metode Brine Shrimp Lethality Test*” menggunakan ekstrak kloroform daun sembukan (*Paederia foetida*) yang memiliki tujuan untuk dapat menemukan adanya kandungan senyawa metabolit sekunder yang dapat digunakan sebagai pelarut semipolar yaitu kloroform dengan pengujian toksisitas menggunakan metode BSLT yang dianalisis berdasarkan analisis probit dilihat dari perhitungan kematian dari hewan uji yaitu *Artemia salina L* yang akan menjadi tolak ukur dari nilai LC_{50} . Hasil ekstrak kloroform daun sembukan yaitu sebesar 193,888 ppm. Dari hasil ekstrak kloroform daun sembukan dapat dikatakan adanya sifat toksik terhadap hewan uji yaitu *Artemia salina L* yang memiliki persentase 50% kematian dari larva udang.. Kandungan metabolik sekunder yang diuji menggunakan pelarut kloroform yaitu flavonoid, alkaloid, terpenoid, tanin, steroid, dan saponin. Hasil skrining fitokimia ekstrak kloroform daun sembukan (*Paederia foetida*) terdapat golongan steroid, steroid termasuk kedalam senyawa metabolit sekunder yang merupakan golongan terpenoid tersusun atas rantai panjang hidrokarbon dan dapat menyebabkan senyawa ini bersifat semi non polar, pelarut kloroform dapat melarutkan dan mengekstrak senyawa ini karena prinsip *like dissolve like* dimana kloroform memiliki kepolaran yang sama dengan senyawa steroid.

Menurut jurnal penelitian dari (Djoko :, 2015) dalam judul “*Uji Aktivitas Antioksidan dan Sitotoksitas Fraksi Daun Kentutan (Paederia foetida L.)*” pengujian aktivitas Toksisitas dengan membandingkan nilai LC_{50} dari tiga macam fraksi yang berbeda yaitu fraksi N-heksan, fraksi kloroform dan fraksi metanol

dan menggunakan metode “*Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)*” dengan pengujian menggunakan larva udang sebagai hewan uji karena pertumbuhan sel dari larva *Artemia salina* hampir sama dengan pertumbuhan sel kanker. Hasil yang ditunjukkan bahwa semua fraksi dari daun sembukun (*Paederia foetida*) memiliki potensi toksisitas. Sedangkan nilai LC_{50} yang paling memiliki potensi toksisitas terhadap udang *Artemia salina* yaitu fraksi n-heksan LC_{50} 291,031 ppm. Kandungan metabolik sekunder yang terdapat pada daun sembukun (*Paederia foetida*) pada fraksi n-heksan, metanol, dan kloroform yaitu pengujian alkaloid, flavonoid, tanin, dan steroid. Hasil uji metabolit semua fraksi menunjukkan bahwa mengandung berbagai macam fitokimia yang terdapat dalam daun sembukun yaitu alkaloid, flavonoid, tanin, dan steroid. Senyawa dominan pada fraksi n-heksan yaitu senyawa steroid, senyawa dominan pada fraksi kloroform yaitu senyawa alkaloid, senyawa dominan pada fraksi metanol yaitu senyawa flavonoid.

Menurut jurnal penelitian (Garai et al., 2019) dalam judul “*In Vitro anticancer and catalytic activity of Paederia foetida conjugated gold nanoparticles (PF-AuNPs)*” mengungkapkan bahwa kandungan fitokimia yang ada didalam ekstrak daun sembukun (*Paederia foetida*) digunakan untuk sintesis hijau nanopartikel emas terkonjugasi *paederia foetida* (PF-AuNPs) nanopartikel logam telah menarik minat karena ciri khasnya seperti katalitik, optik, magnet listrik, dan aktivitas obat-obatan. Diantara berbagai partikel nanologam, emas nanopartikel (AuNPs) telah digunakan sebagai nanomedicine untuk tujuan diagnostic dan terapeutik seperti pembawa untuk pemberian obat. Hal ini dilakukan karena AuNPs sintesis hijau terkonjugasi fitokimia menunjukkan hasil yang menjanjikan untuk membunuh sel kanker secara selektif tanpa banyak efek merugikan pada sel normal. Pengujian secara invitro MTT menunjukkan potensi, selektif, dan dosis

aktivitas antikanker sintesis PF-AuNPs pada sel MCF-7 dan sel HeLa. Hasil penelitian menunjukkan nilai IC_{50} dari kedua sel kanker MCF-7 dan HeLa masing-masing adalah 47,45 dan 48,43 $\mu\text{g/mL}$ hal ini menunjukkan aktivitas antikanker yang manjur terhadap kedua sel kanker dengan kemampuan membunuh sel kanker secara selektif.

Pada penelitian (Pradhan et al., 2019) dengan judul "*Paederia foetida anticancer activity by modulating chromatin modification enzymes and altering pro-inflammatory cytokine gene expression in human prostate cancer cells*" mengarahkan untuk mencari pengembangan senyawa turunan tanaman yang dapat dimakan salah satunya daun sembukan untuk dipertimbangkan sebagai obat yang menjanjikan untuk membuka jalan baru bagi terapi kanker. Menggunakan garis sel kanker PC-3 dan DU-145 dengan pembandingan sel manusia normal keratinosit (HaCaT) dengan nilai IC_{50} yang dapat menunjukkan aktivitas antikanker.

Menurut jurnal (Sayeed et al., 2013) dalam judul "*Investigation of Cytotoxic Potential of Ethanolic Extract of Citrus limetta Fruit peel, Paederia foetida Leaves and Methanolic Extract of Cuscuta reflexa*" menggunakan ekstrak etanol daun sembukan (*Paederia foetida*) dengan pengujian uji sitotoksitas menggunakan metode BSLT yang dibandingkan dengan vincristine sulfat dengan nilai LC_{50} 42,57 $\mu\text{g/mL}$ memiliki potensi sitotoksik.

Dari hasil yang didapatkan dengan penelitian (Bhatnagar & Sahoo, 2016) judul penelitian "*Cytotoxic and Antidiabetic Activity of Leaf Extracts of Paederia foetida L*" menggunakan empat macam ekstrak daun sembukan (*Paederia foetida*) yaitu heksana, kloroform, aseton, dan metanol dengan pengujian sitotoksik menggunakan metode BSLT yang diinkubasi dalam larutan KCL 1,8%. BSLT digunakan untuk mengetahui toksisitas dari tumbuhan sejak lama dan juga memiliki hubungan yang erat dengan aktivitas antikanker. Dari hasil penelitian

ekstrak lain menunjukkan aktivitas ringan serta yang tertinggi pada ekstrak aseton 64% dengan dosis 200 µg/mL.

Menurut jurnal penelitian (Morshed et al., 2012) dengan judul penelitian “*Antimicrobial and Cytotoxic Activity of the Methanol Extract of Paederia foetida Linn (Rubiaceae)*” menggunakan ekstrak metanol daun sembukan (*Paederia foetida*) dengan metode BSLT yang dilakukan menggunakan Nauplii garam dan dimetil sulfoksida (DMSO) sebagai pelarut serta Vincristine sulfat sebagai control. Dalam penelitian ini *Paederia foetida* telah diselidiki untuk bahan kimia dan evaluasi aktivitas biologis dengan penekanan khusus pada studi sitotoksik. Dalam bioassay tersebut, ekstrak metanol menunjukkan sifat mematikan terhadap aktivitas biologis dari senyawa yang ada di ekstrak. Nilai LC₅₀ untuk ekstrak metanol diperoleh 1,5625 µg/mL, nilai LC₅₀ menunjukkan bahwa sitotoksitas sangat signifikan.

Dalam jurnal penelitian (Datin et al., 2014) dalam judul penelitian “*Uji Fitokimia dan Uji Toksisitas Ekstrak Etanol Tanaman Kesembukan (Paederia foetida Linn.) dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test*” pada ekstrak etanol daun sembukan (*Paederia foetida L.*) dilakukan pengujian toksisitas dengan metode “BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*)” yang merupakan dasar dari pengujian pendahuluan pada penelitian yang mengarah pada uji sitotoksik. Sebagai parameter yang akan digunakan pada uji toksistas yaitu bioaktivitas dari suatu senyawa terhadap hewan uji dalam hal ini yaitu larva udang *artemia salina L.*, yang dapat menghitung jumlah kematian dari sel dengan adanya nilai LC₅₀. Pada penelitian yang dilakukan didapatkan hasil uji toksisitas ekstrak etanol yang dianalisis probitnya yaitu 226,787 ppm.

Berdasarkan analisis jurnal yang dilakukan dengan menggunakan metode PICO mengenai potensi daun sembukan (*Paederia foetida L.*) sebagai agen

antikanker membuktikan bahwa setiap ekstrak yang mempunyai potensi sebagai antikanker disebabkan karena adanya kandungan fitokimia yang terdapat pada daun sembukan (*Paederia foetida* L) yang telah diuji kandungan fitokimianya serta yang dapat memberikan efek sebagai agen antikanker. Adapun senyawa fitokimia tersebut diantaranya, Flavanoid, alkaloid, steroid/terpenoid, dan tanin/polifenol dari kandungan tanaman yang telah dilaporkan dan diuji dalam jurnal yang menjadi pembahasan atau kriteria inklusi. Ekstrak daun sembukan (*Paederia foetida*) yang terdapat dalam semua jurnal menggunakan berbagai macam pelarut yaitu (metanol, etanol, kloroform, N-heksan, dan aseton)

Daun sembukan (*Paederia foetida* Linn) memiliki kandungan senyawa aktif yang bisa berpotensi sebagai agen antikanker seperti Flavanoid dimana mekanisme asal dari flavonoid yaitu sebagai antikanker yang kaya akan antioksidan ada 3 cara yaitu pertama, melalui mekanisme pengaktifan jalur apoptosis sel kanker. Prosedur apoptosis sel kanker ini diakibatkan fragmentasi DNA, fragmentasi ini diawali dengan dilepasnya rantai proksimal DNA oleh senyawa oksigen reaktif seperti radikal hidroksi, senyawa ini terbentuk dari reaksi redoks Cu (II). Senyawa tembaga ini dimobilisasi oleh flavonoid ekstra sel maupun intra sel terutama yang berasal dari kromatin. Yang kedua yaitu flavonoid menjadi penghambat proliferasi tumor/kanker dengan cara menghambat kegiatan protein kinase sebagai akibatnya dapat menghambat atau mengganggu transduksi sinyal dari membran ke inti sel. Ketiga dengan cara menghambat aktivitas atau kegiatan tirosin kinase yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan keganasan, jika tirosin kinase dihambat aktivitasnya maka tidak akan terjadi peningkatan keganasan pada sel (Mardany et al., 2016)

Alkaloid yang berasal dari tumbuhan memiliki mekanisme sitotoksik yaitu berperan sebagai *tubulin inhibitor*. Pada proses siklus sel alkaloid berikatan

dengan tubulin yaitu suatu protein yang menyusun mikrotubulus. Terikatnya tubulin pada alkaloid mengakibatkan polimerisasi protein menjadi mikrotubulus akan terhambat sehingga pembentukan *spindle* mitotik akan terhambat pula dan siklus sel akan terhenti pada metafase. Karena itu tidak dapat melakukan pembelahan sel, sel tersebut kemudian akan mengalami apoptosis (Nuraini et al., 2015).

Menurut (Zakaria et al., 2011) “mekanisme steroid sebagai antikanker yaitu merusak permeabilitas membran mitokondria pada sel atau menyebabkan sel mengalami nekrosis dan kematian. Karena saponin secara structural memiliki satu atau lebih gugus glikosida hidrofilik dan dapat terlibat dalam replikasi DNA serta mencegah proliferasi sel kanker” (Sirait & Setyaningsih, 2019).

Tanin yang dapat berpotensi sebagai senyawa antikanker memiliki aktivitas antikanker dengan mekanisme penghambatan kerja suatu enzim sel, timbulnya kanker juga dapat dicegah dengan adanya senyawa tanin yang berupa pencegahan proses mutagenesis sel juga karena adanya pengaktifan dari sel makrofag pada kanker. Mekanisme kerja dari senyawa tanin ini sebagai antikanker karena merupakan inhibitor histone deacetylase.

4.2 Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan

Berbagai macam keanekaragaman tumbuhan yang diciptakan Allah SWT, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh insan manusia dalam mengatasi semua permasalahannya. Sebagai manusia, hendaknya kita berfikir bahwa segala yang kita butuhkan untuk kehidupan dunia telah disediakan oleh Allah SWT. Sebagai bentuk kasih sayangnya, karena tidak ada suatu ciptaan yang diciptakan secara sia-sia apapun itu dan bagaimanapun bentuknya pasti akan selalu ada hikmah dan manfaat didalamnya.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

Artinya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya tuhanmu benar-benar dialah yang Maha perkasa lagi Maha penyanggah (Qs. Asy-Syu’ara’, 26: 7-9)”.

Dalam (Shihab, 2002) “Apakah mereka enggan memperhatikan gugusan bintang dilangit dan apakah mereka tidak melihat ke bumi, berapa kali kami sudah tumbuhkan di sana dari setiap pasang tumbuhan dengan berbagai aneka macam jenis yang kesemuanya tumbuh subur lagi bermanfaat”

Selain itu, Allah subhanahu wata’ala juga berfirman dalam Qs Asy-Syu’ara/26 : 80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Terjemahannya :

“ Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku”

Berdasarkan kitab Tafsir al-Mishbah (Shihab, 2002) “dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut, kegiatan yang menjadikan aku sakit, maka hanya dia pula yang menyembuhkan aku sehingga kesehatanku kembali pulih”.

Perlu diingat bahwa semua penyembuhan dari segala macam penyakit bukan berarti usaha serta upaya manusia dalam meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Tetapi, hal ini telah banyak dijelaskan dalam berbagai hadits Nabi

Muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam yang memerintahkan untuk berobat (Shihab, 2002).

Sesuai buku Tafsir Ibnu Katsir, yang menceritakan dialog antara Ibrahim dan ayahnya. Ibrahim mengatakan “Aku menyembah yang maha kuasa yang menciptakan aku dan yang menunjukkan jalan bagiku yang memberi makan dan minum kepadaku dan bila aku sakit Dialah yang menyembuhkan penyakitku serta pula mematikan aku kemudian menghidupkan aku kembali pada hari kiamat dan Tuhan yang aku harapkan dengan sangat mengampuni kesalahan-kesalahanmu kelak di hari kiamat”.

Ayat tadi di atas menjelaskan pada kita untuk selalu terus berusaha dengan selalu berharap untuk yang menentukan hasil dari segala usaha kita yaitu *Allah subhanahu wata’ala* seperti halnya dalam dunia Kesehatan, jika kita diserang oleh suatu penyakit maka dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu dengan menggunakan obat tradisional ataupun menggunakan obat sintetik karena berobat merupakan salah satu bentuk usaha dan perjuangan untuk mencapai kesembuhan. Allah subhananu wata’ala menciptakan tumbuhan dan menumbuhkannya di bumi tidak lain untuk kebaikan bagi semua insan manusia karena banyak tumbuhan yang memberikan banyak manfaat bagi manusia. Untuk itu pentingnya ilmu pengetahuan pada hal ini. Sehingga pengolahan dan pemanfaatan tanaman termasuk daun semburan (*Paederia foetida*) ini dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan tuntutan Islam .

Di dunia ini setiap manusia pasti pernah merasakan sakit. Ketika manusia sakit, ia harus senantiasa berikhtiar mencari pengobatan untuk kesembuhannya karena Allah SWT tidak akan menurunkan suatu penyakit tanpa ada obatnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra dari Nabi SAW bersabda (Basyier, 2011)

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali dia juga menurunkan penawarnya.” (HR. Bukhari)

Dari hadist di atas, dapat diketahui bahwa yang memberikan penyakit adalah Allah SWT, namun sebagai insan manusia juga tidak lepas dari penyebab sakit itu sendiri.. Berlebih-lebihan pada makan dan minum akan membuat kerja sistem pencernaan makin berat, sirkulasi darah juga akan terganggu jika tubuh terlalu banyak dimasuki makanan . Kadar gula darah menjadi tinggi, tekanan darah tinggi, kolesterol, hingga terjadinya kanker bisa muncul sebab ulah manusia itu sendiri tapi sakit sehatnya seseorang dipengaruhi atas kehendak dari Allah SWT sesuai dengan Hadits di atas.

Tumbuhan makhluk hidup yang satu-satunya mampu menghasilkan bahan makanan dari dirinya sendiri. Daun yang ada pada tumbuhan artinya tempat pengolahan dan produksi menjadi bahan makanan dengan bantuan adanya klorofil yang ada pada daun karena warnanya yang mencolok yaitu berwarna hijau yang mempunyai peranan penting sebagaimana yang difirmankan Allah SWT surah Yasin ayat 80

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾

Artinya :

“Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu”

Mengenai daun yang dikeringkan saat tanaman tumbuh dan menghijau, bukannya kemudia dipanen tapi justru bahkan dibiarkan menguning dan kemudian hancur tetapi daun-daun yang kering itu memiliki banyak manfaat dan

kegunaan karena Allah SWT tidak menciptakan satupun dimuka bumi ini dengan sia-sia

Pengobatan cara nabi (thibbun nabawi) dengan pengobatan menggunakan obat-obat tradisional terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang optimal sehingga pengembangan dan peningkatan mutu disertai dengan konseptual dan sistematis pengobatan cara nabi (thibbun Nabawi) secara universal seperti layaknya ibnu sina bapak kedokteran islam

Bermunculan segala macam penyakit dizaman yang serba modern ini yang salah satu penyakit yang berbahaya yaitu kanker, dari penyakit ini sebagai insan manusia kita harus terus berupaya untuk terus menemukan dan mencari alternatif pengobatan. Salah satu metode pengobatan yang bersumber dari bahan alam dan tumbuh-tumbuhan serta memiliki banyak kandungan senyawa yang sangat bermanfaat dan sangat bisa digunakan menjadi obat untuk berbagai macam penyakit, sehingga kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT wajib untuk selalu berusaha untuk selalu mencari tau manfaat serta kandugan dari semua ciptaan-Nya dimuka bumi ini termasuk kandungan dari tumbuh-tumbuhan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian studi literatur yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa daun sembukan (*Paederia foetida Linn.*) dapat memberikan efek atau potensi sebagai antikanker karena mengandung senyawa fitokimia atau metabolit sekunder yang sangat berkhasiat.

Kandungan fitokimia yang terdapat pada daun sembukan (*Paederia foetida Linn*) yang didapatkan yaitu Flavanoid, Alkaloid, Steroid/terpenoid, dan tanin/polifenol. Pengujian terhadap sel kanker PC3 dan DU-145 menunjukkan penurunan yang signifikan dengan peningkatan konsentrasi obat pada jalur sel kanker yang diuji sedangkan untuk pengujian sel kanker MCF-7 dan sel HeLa menunjukkan aktivitas antikanker yang manjur secara selektif yang dibuktikan dengan nilai IC_{50} , sehingga daun sembukan (*Paederia foetida Linn.*) dapat menjadi alternatif pengobatan antikanker dengan menggunakan bahan alam.

5.2 Saran

Sebaiknya perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dan lebih spesifik mengenai daun sembukan (*Paederia foetida Linn*) sebagai penelitian eksperimental sitotoksik terhadap sel kanker yang spesifik, dan juga pada penelitian klinis dalam menguji efek atau potensi dari daun sembukan (*Paederia foetida Linn*) sebagai agen antikanker.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, A. (2014). Thrombolytic, Cytotoxic and Antidiabetic Effects of *Paederia foetida* L. Leaf Extract. *British Journal of Medicine and Medical Research*, 4(5), 1244–1256. <https://doi.org/10.9734/bjmmr/2014/5142>
- An, D., Sukmawati, N., Hayati, E. K., & Muti, R. (2020). Lethality Test Phytochemical Screening of Chloroform Extract Kesembukan (*Paederia foetida* Linn.) And Toxicity Assay Using Brine Shrimp Lethality Test Method Kesembukan (*Paederia foetida* L.) is known plant that is used as food and herbal medicine by p. 1(2), 86–94.
- An, D., Sukmawati, N., Hayati, E. K., Muti, R., Kimia, J., Sains, F., Maulana, U. I. N., Ibrahim, M., Farmasi, J., Sains, F., Maulana, U. I. N., & Ibrahim, M. (2014). KESEMBUKAN (*Paederia foetida* Linn.) dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test Pendahuluan Tanaman kesembukan (*Paederia foetida* L.) merupakan salah satu tanaman dari suku Rubiaceae (kopi-kopian) yang dapat hidup di daerah tropis dan merupakan tanaman. 3(2).
- Aprianti, M. (2012). *Meracik Sendiri Obat & Menu Sehat Bagi Penderita Kanker* (Flo (ed.); Pertama). Pustaka Bare Press.
- Basyier, A. (2011). *Kedokteran Nabi*. Shafa Publika.
- Bhatnagar, S., & Sahoo, M. (2016). Cytotoxic and antidiabetic activity of leaf extracts of *Paederia foetida* L. *International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research*, 8(4), 659–662.
- Bott, R. (2014). Data dan Informasi Kesehatan Situasi Penyakit Kanker. *Igarss 2014*, 1, 1–5. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Darma, A. P., Ashari, R. A., Nugroho, P. A., Monikawati, A., Fauzi, I. A., Hermawan, A., & Meiyanto, E. (2009). (*Physalis angulata* L.) Pada Sel Kanker Leher Rahim HeLa Melalui Modulasi Ekspresi Protein p53 Andita Pra Darma, Rosana Anna Ashari, Perdana Adhi Nugroho, Ameilinda Monikawati, Ilham Agusta Fauzi, Adam Hermawan dan Edy Meiyanto*.
- Ekawati, M. A., Suirta, I. W., & Santi, S. R. (2017). Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavanoid pada Daun Sembukan (*Paederia foetida* L) Serta Uji

- Aktivitasnya sebagai Antioksidan. *Jurnal Kimia*.
<https://doi.org/10.24843/jchem.2017.v11.i01.p07>
- Emilio Kalonio, D., Hendriani, R., Elisabeth Barung, dan N., Farmasi, J., Kesehatan Kemenkes Manado, P., Raya Bandung, J., & Km, S. (2017). Aktivitas Antikanker Tanaman Genus Clerodendrum (Lamiaceae): Sebuah Kajian Anticancer Activity Of Plant Genus Clerodendrum (Lamiaceae): A Review. *Traditional Medicine Journal*, 22(3), 2017.
- Fachreza Erdi Pratama, R. F. N. (2013). Farmaka. *Review: Senyawa Aktif Antikanker Dari Bahan Alam Dan Aktivitasnya*, 4, 1–15.
- Garai, C., Hasan, S. N., Barai, A. C., Dey, A., & Manna, S. (2019). *Rasayan foetida In-vitro anticancer and catalytic activity conjugated gold nanoparticles (PF - AuNPs) Paederia Rasayan*. 3(1), 4–12.
- Hosseinzadeh, S., Jafarikukhdan, A., Hosseini, A., & Armand, R. (2015). The Application of Medicinal Plants in Traditional and Modern Medicine: A Review of <i>Thymus vulgaris</i>. *International Journal of Clinical Medicine*, 06(09), 635–642.
<https://doi.org/10.4236/ijcm.2015.69084>
- Irnawati La Ode Izzatil; Reymon, Reymon; Karmila, Karmila, I. H. (2016). Uji Toksisitas Akut Infusa Kulit Batang Ubi Kayu (*Manihot esculenta* Crantz) menggunakan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). *Pharmauho*, 2(V2,No1(2016):Pharmauho),10–12.
<http://ojs.uho.ac.id/index.php/pharmauho/article/view/3473> *Kata kunci* : (2015). 4(1), 4–9.
- Kemkes.(n.d.).*NoTitle*.
<https://www.kemkes.go.id/article/view/19020100003/hari-kanker-sedunia-2019.html>
- Mardany, M. P., Chrystomo, L. Y., & Karim, A. K. (2016). Skrining Fitokimia dan Uji Aktivitas Sitotoksik dari Tumbuhan Sarang Semut (*Myrmecodia beccarii* Hook . f .) Asal Kabupaten Merauke. *Jurnal Biologi Papua*, 8(1), 13–22.
- Marzali, A.-. (2017). Menulis Kajian Literatur. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi*

- Indonesia*, 1(2), 27. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>
- Meyer, B. N., Ferrigni, N. R., Putnam, J. E., Jacobsen, L. B., Nichols, D. E., & McLaughlin, J. L. (1982). Brine shrimp: A convenient general bioassay for active plant constituents. *Planta Medica*, 45(1), 31–34. <https://doi.org/10.1055/s-2007-971236>
- Morshed, H., Islam, M. S., Parvin, S., Ahmed, M. U., Islam, M. S., Mostofa, A. G. M., & Sayeed, M. S. Bin. (2012). Antimicrobial and cytotoxic activity of the methanol extract of *Paederia foetida* Linn. (Rubiaceae). *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, 2(1), 77–80.
- Nugroho, R. A., Noprianti, D., & Sudiastuti, S. (2018). Pengaruh Ekstrak Air Daun Sembukan (*Paederia foetida* LINN.) Terhadap Morfometri dan Kelulushidupan Fetus Mencit (*Mus musculus* L.). *Jurnal Biota*, 4(2), 49–53. <https://doi.org/10.19109/biota.v4i2.2109>
- Nuraini, Ilyas, A., & Iin, N. (2015). Identifikasi dan karakterisasi senyawa bioaktif antikanker dari ekstrak etanol kulit batang kayu bitti (*Vitex cofassus*). *Al Kimia*, 15–27.
- Ojha, S., Raj, A., Roy, A., & Roy, S. (2018). Extraction of total phenolics, flavonoids and tannins from *paederia foetida* l. Leaves and their relation with antioxidant activity. *Pharmacognosy Journal*, 10(3), 541–547. <https://doi.org/10.5530/pj.2018.3.88>
- Pradhan, N., Parbin, S., Kausar, C., Kar, S., Mawatwal, S., Das, L., Deb, M., Sengupta, D., Dhiman, R., & Patra, S. K. (2019). *Paederia foetida* induces anticancer activity by modulating chromatin modification enzymes and altering pro-inflammatory cytokine gene expression in human prostate cancer cells. *Food and Chemical Toxicology*, 130(May), 161–173. <https://doi.org/10.1016/j.fct.2019.05.016>
- R. Hamidi, M., Jovanova, B., & Kadifkova Panovska, T. (2014). Toxicological evaluation of the plant products using Brine Shrimp (*Artemia salina* L.) model. *Macedonian Pharmaceutical Bulletin*, 60(01), 9–18. <https://doi.org/10.33320/maced.pharm.bull.2014.60.01.002>
- R.A Weiss. (1982). No Title. *Viral Mechanisms of Carcinogenesis*.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6891372/>

- Saíz-Urra, L., Pérez-Castillo, Y., González, M. P., Ruiz, R. M., Cordeiro, M. N. D. S., Rodríguez-Borges, J. E., & García-Mera, X. (2009). Theoretical prediction of antiproliferative activity against murine leukemia tumor cell line (L1210). 3D-morse descriptor and its application in computational chemistry). *QSAR and Combinatorial Science*, 28(1), 98–110. <https://doi.org/10.1002/qsar.200860060>
- Sayeed, M. A., Mamun, M., Rashid, U., & Taiseer, R. A. (2013). Investigation of Cytotoxic Potential of Ethanolic Extract of Citrus limetta fruit peel , Paederia foetida Leaves and Methanolic Extract of Cuscuta reflexa . *Journal of Medicinal Plants Studies*, 1(1), 34–37.
- Selcuk, A. A. (2019). A Guide for Systematic Reviews: PRISMA. *Turkish Archives of Otorhinolaryngology*, 57(1), 57–58. <https://doi.org/10.5152/tao.2019.4058>
- Semi, K., Matsuda, Y., Ohnishi, K., & Yamada, Y. (2013). Cellular reprogramming and cancer development. *International Journal of Cancer*, 132(6), 1240–1248. <https://doi.org/10.1002/ijc.27963>
- Shihab, M. . (2002). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Kesorasian al- qur'an* (9th ed.). Lentera Hati.
- Sirait, P. S., & Setyaningsih, I. (2019). Aktivitas antikanker ekstrak Spirulina yang dikultur pada media walne dan media organik. *Php*, 22(1), 50–59.
- Siswanto. (n.d.). Systematic Review sebagai Metode Penelitian untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian i.
- Sudiana, K. (2008). *Patobiologi Molekuler Kanker* (I. Dewi (Ed.)). Salemba Medika.
- World Health Organization. (2019). Indonesia Source GLOBOCAN 2018. *International Agency for Research on Cancer*, 256, 1–2. <http://gco.iarc.fr/>
- Zakaria, Z. A., Mohamed, A. M., Jamil, N. S. M., Somchit, M. N., Zuraini, A., Rofiee, M. S., Arifah, A. K., & Sulaiman, M. R. (2011). In vitro cytotoxic and antioxidant properties of the aqueous, chloroform and methanol extracts of dicranopteris linearis leaves. *African Journal of Biotechnology*, 10(2),

273–282. <https://doi.org/10.5897/AJB10.423>

Zuraida. (2018). Analisis Toksisitas Beberapa Tumbuhan Hutan dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) (Toxicity Analysis of Forestry Plants Using Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) Method). *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 36(3), 239–246.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Pencarian dari Database Elektronik Research Gate

The screenshot shows a web browser window with the ResearchGate search results page. The address bar displays the URL: `researchgate.net/search/publication?q=paederia%2Bfoetida%2Bas%2Banti%2Bcancer&page=3`. The page features an advertisement for GKinvest Indonesia at the top. Below the navigation tabs (Publications, Authors, Questions), there are two article listings. The first article is titled "Antithrombolytic and Antidiabetic Activity of Methanolic Extract of Paederia foetida", published in July 2012, with authors Helal Morshed, Muhammad Shahdaat Bin Sayeed, Agm Mostofa, Siddiqui Islam, and Salma Parvin. The second article is "Paederia foetida (Rubiaceae), new to the flora of North Carolina", published in December 1999 by P. Diamond. On the right side, there is a "FEATURED VIDEOS" section with a video thumbnail titled "Why you can bank on Candidate Search – now and in the future". At the bottom of the page, there is a taskbar showing several PDF files, including "KANDUNGAN KIM...", "JURNAL YANG ME...", "15884-Article Text...", "7.pdf Removed", and "112-Article Text-48...".

Lampiran 2. Hasil Pencarian dari Database Elektronik Science Direct

The screenshot shows a web browser window with the ScienceDirect search results page. The address bar displays the URL: `sciencedirect.com/search?qs=paederia%20foetida%20as%20anticancer&date=2010-2020&articleTypes=FLA`. The page features the ScienceDirect logo and navigation options like "Journals & Books", "Register", and "Sign in". The search query is "paederia foetida as anticancer" with filters for "Year: 2010-2020" and "Advanced search". The results show 16 results, sorted by relevance. The first result is a research article titled "Paederia foetida induces anticancer activity by modulating chromatin modification enzymes and altering pro-inflammatory cytokine gene expression in human prostate cancer cells", published in Food and Chemical Toxicology in August 2019, by Nibedita Pradhan, Sabnam Parbin, and Samir Kumar Patra. The second result is "Studies on green synthesized silver nanoparticles using Abelmoschus esculentus (L) pulp extract having anticancer (in vitro) and antimicrobial applications", published in Arabian Journal of Chemistry in December 2019, by Md. Masud Rahaman Mollick, Dipak Rana, and Dipankar Chattopadhyay. At the bottom, there is a taskbar showing several PDF files, including "KANDUNGAN KIM...", "JURNAL YANG ME...", "15884-Article Text...", "7.pdf Removed", and "112-Article Text-48...".

Lampiran 3. Hasil Pencarian dari Database Elektronik Google Scholar

The screenshot shows a Google Scholar search interface. The search query is "the potential of paderia foetida as an anti-cancer". The results are listed under the "Articles" tab, showing 117 results. The first three results are visible:

- Article 1:** (HTML) *Paederia foetida* Linn. leaf extract: an antihyperlipidemic, antihyperglycaemic and antioxidant activity. V Kumar, F Anwar, D Ahmad & Verma. ... and alternative medicine. 2014 - Springer. Forever, the antihyperlipidemic activity was exerted possible by lowering the higher level of lipid ... It was corroborate that the extract shown the *Paederia foetida* Linn leaves potential to be ... that majority of chemical constituents were found in leaves of *Paederia foetida* Linn. these ... Cited by 60. Related articles. All 19 versions. [HTML] springer.com
- Article 2:** *Paederia foetida* — a promising ethno-medicinal tribal plant of northeastern India. S Chanda, P Sarathy, B De, K Singh. Journal of forestry research. 2013 - Springer. ... Many of its therapeutic properties relate to the gastrointestinal system and suggest its potential utility for ... *P. foetida* has been reported to have wide-ranging therapeutic properties; the possible mechanisms of ... Antidiarrhoeal activity of the ethanol extract of *Paederia foetida* Linn ... Cited by 15. Related articles. All 8 versions. [PDF] researchgate.net
- Article 3:** A comparative analysis of phytochemical and antioxidant profile of *Paederia foetida*. L wild and cultivated varieties. M Sahoo, S Shanagar. 2015 - researchgate.net. ... stream of cultivation, this study was taken up to explore the medicinal potential of cultivated ... Abutnon indicum L. and *Paederia foetida* L. supported by TLC, FTIR and NMR Studies ... activity of ethanolic extract of *Bacopa monnieri* L. aerial parts: a possible mechanism of action ... Cited by 2. Related articles. All 2 versions. [PDF] researchgate.net

Below the search results, there are several PDF thumbnails, including "KANDUNGAN KIM...pdf", "JURNAL YANG ME...pdf", "15884-Article Text...pdf", "7.pdf Removed", and "112-Article Text-48...pdf".

Lampiran 4. Jurnal Inklusi

The screenshot shows a PDF document from the journal "JURNAL INOVASI FARMASI INDONESIA (JAIFI)". The page number is 86. The title of the article is "SKRINING FITOKIMIA EKSTRAK KLOOROFORM TANAMAN KESEMBUKAN (*Paederia foetida* Linn.) DAN UJI TOKSISITAS MENGGUNAKAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST". The authors are Datin An Nisa Sukmawati¹, Elok Kamilah Hayati², and Roihatul Mut'ah³. The affiliations are: ¹Program Studi Ilmu Farmasi, Universitas Kediri, Kediri; ²Program Studi Ilmu Kimia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang; ³Program Studi Ilmu Kimia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. The abstract discusses the traditional use of *Paederia foetida* L. as a food and medicine, and the study's aim to determine its phytochemical profile and toxicity using the Brine Shrimp Lethality Test (BSLT).

JURNAL INOVASI FARMASI INDONESIA (JAIFI) 86

SKRINING FITOKIMIA EKSTRAK KLOOROFORM TANAMAN KESEMBUKAN (*Paederia foetida* Linn.) DAN UJI TOKSISITAS MENGGUNAKAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST

*PHYTOCHEMICAL SCREENING OF CHLOROFORM EXTRACT KESEMBUKAN (*Paederia foetida* Linn.) AND TOXICITY ASSAY USING BRINE SHRIMP LETHALITY TEST METHOD*

Datin An Nisa Sukmawati¹, Elok Kamilah Hayati², Roihatul Mut'ah³

¹Program Studi Ilmu Farmasi, Universitas Kediri, Kediri
²Program Studi Ilmu Kimia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
³Program Studi Ilmu Kimia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Penulis Korespondensi:
 Datin An Nisa Sukmawati
 Universitas Kediri
datinnisa@unik-kediri.ac.id

ABSTRAK

Tanaman Kesembukan (*Paederia foetida* L.) merupakan tanaman yang sudah lama dikenal dan dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat tradisional oleh masyarakat. Tanaman tersebut mempunyai efek karmatif yang dapat meredakan kolik angin di perut dengan cara mengeluarkan gas dari saluran pencernaan, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkannya sebagai obat sakit perut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder dari tanaman Kesembukan dengan menggunakan skrining fitokimia dan untuk mengetahui tingkat toksistas tanaman tersebut dengan menggunakan metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT). Penelitian ini merupakan uji pendahuluan agar tanaman Kesembukan dapat diketahui kandungan senyawa aktif dan potensinya bila digunakan sebagai obat untuk penyakit

Revisi SKRIP 41-81 *1668 *2587 *528-2 16399 337-3 528-2 16399 1668 In_vitro *18235 JURNAL JU x + -

File | C:/Users/ASUS/Downloads/JURNAL%20DAUN%20SEMBUKAN/JURNAL%20IKLUSI%202.pdf ☆ ☆

1 of 6 — + ↻ A⁹ Read aloud Draw Highlight Erase

JKK, Tahun 2015, Volume 4(1), halaman 1-6 ISSN 2303-1077

**UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN SITOTOKSISITAS
FRAKSI DAUN KENTUTAN (*Paederia foetida* L.)**

Djoko Parwanto¹, Muhamad Agus Wibowo¹
¹Program Studi Kimia Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura,
 Jl. Prof. Dr. H. Hadrat Nawawi 78124
¹Email: Djo_ko15@yahoo.com

ABSTRAK

Kentutan (*Paederia foetida* L.) termasuk tumbuhan famili Rubiaceae. Tumbuhan ini telah diketahui memiliki sifat antioksidan dan sitotoksitas pada ekstrak kasar metanol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kandungan metabolit sekunder, kandungan total fenol, aktivitas penangkapan radikal 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (*DPPH*) dan aktivitas sitotoksik terhadap larva *Artemia salina* oleh fraksi-fraksi nya. Fraksi yang digunakan pada penelitian ini adalah fraksi n-heksana, fraksi kloroform, dan fraksi metanol. Berat sampel ekstrak daun *P. foetida* adalah 46,326 gram dengan rendemen dari masing-masing fraksi adalah 0,3084%, 0,5369%, dan 2,1243%. Hasil skrining fitokimia dan kromatografi lapis tipis (*KL*T) menunjukkan bahwa semua fraksi mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, polifenol, dan terpenoid. Fraksi metanol pada penelitian ini telah diketahui memiliki kandungan total fenol dan *IC₅₀* paling baik yaitu sebesar 37,960 µg TAE/mg dan 39,836. Sedangkan pada fraksi n-heksana memiliki nilai *LC₅₀* paling baik yaitu sebesar 291,031. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada fraksi-fraksi daun *P. foetida* berpotensi sebagai antioksidan dan sitotoksitas.

Kata kunci: Kentutan (*Paederia foetida* L.), Total fenol, Antioksidan, Sitotoksitas.

PENDAHULUAN

Kentutan (*Paederia foetida* L.) termasuk tanaman famili Rubiaceae yang tersebar luas di Indonesia. Masyarakat sering memanfaatkannya sebagai antirematik, penghilang rasa sakit, peluruh kentut, antibiotik, antibiotik, penghilang racun, obat cacang, dan pereda kejang (Hariana, 2007). Uji skrining fitokimia terhadap ekstrak metanol daun *P. foetida* telah diketahui mengandung senyawa bioaktif seperti fenol, ekstrak metanol kasar daun *P. foetida* telah dilakukan, namun perbandingan fraksi (metanol, kloroform dan n-heksana) belum pernah dilakukan. Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, maka penelitian ini bertujuan membandingkan kandungan total fenol dan aktivitas antioksidan ekstrak daun *P. foetida* diukur menggunakan metode 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (*DPPH*) serta aktivitas

Revisi SKRIP 41-81 *1668 *2587 *528-2 16399 337-3 528-2 16399 1668 In_vitro *18235 JURNAL JU x + -

File | C:/Users/ASUS/Downloads/JURNAL%20DAUN%20SEMBUKAN/JURNAL%20IKLUSI%203.pdf ☆ ☆

1 of 5 — + ↻ A⁹ Read aloud Draw Highlight Erase

ALCHEMY, Vol. 3 No.2 Oktober 2014, hal 189-193

**UJI FITOKIMIA DAN UJI TOKSISITAS EKSTRAK ETANOL TANAMAN
KESEMBUKAN (*Paederia foetida* Linn.) DENGAN METODE
BRINE SHRIMP LETHALITY TEST**

Datin An Nisa Sukmawati¹, Elok Kamilah Hayati¹, Rohatul Muti'ah²

¹Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
²Jurusan Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ABSTRACT

Kesembukan plant (*Paederia foetida* L.) is one of the plants from the Rubiaceae tribe which has been used by the people to cure thrush, fever, blown, high blood pressure, arthritis and herpes. The purposes of this research are to determine the level of toxicity of each Kesembukan plant extracts against the *Artemia salina* L. and to find the content of the compounds contained in each Kesembukan plant extract.

The research was conducted by extracting the sample using ethanol, chloroform and n-hexane. The concentrated extract was used to test the toxicity of *Artemia salina* L. using Brine Shrimp Lethality Test method (Meyer, et al., 1982) and phytochemicals with reagents. Compounds from phytochemical test results were identified using thin layer chromatography with the eluents to find out the best eluent. The mortality data of *Artemia salina* L. were analyzed by probit analysis to find *LC₅₀* values of each extract.

The results of this research show that each extract of Kesembukan plant (*Paederia foetida* L.) has the level of toxicity against *Artemia salina* L. with *LC₅₀* values indicated less than 1000 ppm. *LC₅₀* values of each extract ethanol, chloroform and n-hexane was 226,787; 482,014, and 146,181 ppm. Content of compounds from phytochemical test result using the reagent for each Kesembukan plant extract are the class of steroid compound. The best eluent for the separation of steroid compound in ethanol extract is n-hexane: ethyl acetate (8:2) with the values of *R_F* = 0.22 and 0.48 and for chloroform extract is n-hexane: ethyl acetate (7:3) with the values of *R_F* = 0.32; 0.45; 0.59; 0.63; 0.82; 0.85; 0.87 and 0.94 and for n-hexane extract is n-hexane: ethyl acetate (8:2) with the values of *R_F* = 0.12; 0.38 and 0.41.

Keywords : Kesembukan plant (*Paederia foetida* Linn.), *Artemia salina* Leach, toxicity test, phytochemical test

Rev | SKR | 41- | *16 | *25 | *52 | 163 | 337 | 526 | 163 | 166 | In_v | *18 | JUR | JUR | JUR | JUR | JUR | JUR | x + -

File | C:/Users/ASUS/Downloads/JURNAL%20DAUN%20SEMBUKAN/JURNAL%20INKLUSI%208.pdf

1 of 13

Food and Chemical Toxicology 130 (2019) 161–173

Contents lists available at ScienceDirect

Food and Chemical Toxicology

Journal homepage: www.elsevier.com/locate/foodchemtox

***Paederia foetida* induces anticancer activity by modulating chromatin modification enzymes and altering pro-inflammatory cytokine gene expression in human prostate cancer cells**

Nibedita Pradhan^a, Sabnam Parbin^{a,1}, Chahat Kausar^a, Swayamsiddha Kar^{a,2}, Shradha Mawatwal^a, Laxmidhar Das^a, Moonmoon Deb^{a,3}, Dipta Sengupta^{a,4}, Rohan Dhiman^a, Samir Kumar Patra^{a,*}

^aEpidemiology and Cancer Research Laboratory, Biochemistry and Molecular Biology Group, Department of Life Science, National Institute of Technology, Raurki, Raerki, Odisha, 767006, India

¹Laboratory of Mycobacterial Immunology, Department of Life Science, National Institute of Technology, Raerki, Raerki, Odisha, India

ARTICLE INFO

Keywords:
Paederia foetida
 prostate cancer
 Epigenetics and DNA methyltransferase
 E-cadherin
 Pro-inflammatory cytokines
 Inflammation & immunity

ABSTRACT

Aberrant epigenetic modifications are responsible for tumor development and cancer progression; however, readily reversible. Bioactive molecules from diets are promising to cure cancer by modulating epigenetic marks and changing immune response. These compounds specifically target the activity of DNMTs and HDACs to cure various human cancers. In view of this, we investigated the anticancer and epigenetic-regulatory activities of an edible-plant *Paederia foetida*. The efficacy of methanolic extract of *P. foetida* leaves (MEFL) was tested for the modulation of epigenetic factors in gene silencing, i.e. DNMT and HDAC and expression pattern of certain tumor-suppressor genes. After treatment of prostate cancer cells (PC-3 and DU-145) with MEFL, loperid and β -flutamide; induction of apoptosis, decrease in cellular viability and inhibition of cellular migration were noticed. Simultaneously there was inhibition of DNMT1, HDACs and pro-inflammatory, IL-6, IL-8, TNF- α and anti-inflammatory, IL-10 genes in cancer and THP1 cell lines. The DNMT1 protein content, enzyme activity and Bcl2 expression decreased significantly; however, expression of E-cadherin (CDH1) and pro-apoptotic gene Bax increased significantly after the treatment of cells with drug. We conclude plant-derived compounds can be considered to target epigenetic machineries involved with malignant transformation and can open new avenues for cancer therapeutics provoking immune response.

Rev | SKR | 41-8 | *166 | *256 | *526 | 163 | 337 | 526 | 163 | 166 | In_v | *182 | JUR | JUR | JUR | JUR | x + -

File | C:/Users/ASUS/Downloads/JURNAL%20DAUN%20SEMBUKAN/JURNAL%20INKLUSI%206.pdf

1 of 5

ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/350333381>

Cytotoxic and Antidiabetic Activity of Leaf Extracts of *Paederia foetida*. L

Article · April 2019

CITATIONS 0

READS 101

1 author:

Smita Bhattacharjya
 Regional Plant Resource Centre
 38 PUBLICATIONS 134 CITATIONS
 SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Macrobiochemical effects of medicinal plants: A drug discovery approach. View project

Rev | SKR | 41 | 16 | 25 | 52 | 163 | 337 | 528 | 163 | 166 | In_v | 18 | JUR | JUR | JUR | JUR | JUR | JUR | x + -

File | C:/Users/ASUS/Downloads/JURNAL%20DAUN%20SEMBUKAN/JURNAL%20INKLUSI%207.pdf

1 of 9

Prayogik Rasayan

In-vitro anticancer and catalytic activity of *Paederia foetida* conjugated gold nanoparticles (PF-AuNPs)

Chhabi Garai,¹ Sk Nurul Hasan,¹ Abir Chandan Barai,¹ Aditi Dey,² Subhankar Manna,²
Somenath Roy,² Braja Gopal Bag^{1*}


¹ Department of Chemistry and Chemical Technology, Vidyasagar University, Midnapore, West Bengal 721102, India.
Email: brajago@gmail.com

² Department of Human Physiology with Community Health, Vidyasagar University, Midnapore, West Bengal 721102, India.
Email: roysomenath1954@yahoo.in

Received: January 22, 2019 | Accepted: January 29, 2019 | Published online: January 30, 2019

ABSTRACT

Among the less-studied plants, *Paederia foetida* (commonly known as Ganda) has been used by various ethnic tribes as food and medicine. The phytochemicals present in the leaf extract of *Paederia foetida* were utilized for the green synthesis of *Paederia foetida* conjugated gold nanoparticles (PF-AuNPs). Characterization of PF-AuNPs was carried out by SPR absorption band, HRTEM, DLS and X-ray diffraction studies. Anticancer activity of the stabilized PF-AuNPs studied against MCF-7 breast cancer cell line and HeLa cell lines revealed that the stabilized PF-AuNPs were highly effective for the apoptosis of cancer cells selectively. Catalytic activity of PF-AuNPs has also been reported.



The abstract figure consists of three parts: a bar chart on the left showing the percentage of cell viability for MCF-7 cells and HeLa cells under various conditions (Control, 10 µg/ml, 20 µg/ml, 40 µg/ml, 80 µg/ml); a central chemical structure diagram of a gold nanoparticle conjugated with *Paederia foetida* phytochemicals; and a surface plasmon resonance (SPR) absorption spectrum on the right showing the surface plasmon resonance (SPR) band at approximately 450 nm for the synthesized PF-AuNPs.

BIOGRAFI PENULIS



Dwi Astuty Arum Sari sering dipanggil Wiwi, merupakan anak kedua dari empat bersaudara buah hati dari pasangan Dr. Mansur S.Si., M.Kes dan Ns. Syamriwati S.Kep lahir di Makassar, 24 Maret 1998. Saat ini berdomisili dimakassar dengan alamat Jalan Rimanyoko Gontang Raya No. 1, memulai Pendidikan di SDN Lanto Dg Pasewang setelah 6 tahun mengenyam Pendidikan kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 18 Makassar dan melanjutkan dibangku menengah atas yaitu MAN 2 Model Makassar. Memiliki hobi menonton dan mendengarkan musik. Saat ini telah menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R