

**ANALISIS EFEKVITAS BIAYA (AEB) PENGGUNAAN OBAT INFEKSI
SALURAN KEMIH (ISK) PADA PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (RSUD) LABUANG BAJI MAKASSAR TAHUN 2015**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

ANRIANI
70100112097

JURUSAN FARMASI

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

KATA PENGANTAR

Assalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Alhamdulillah, segala Puji bagi Allah *subhanahu wata’ala* atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda Bollo dan Ayahanda Baharuddin serta keluarga besarku yang tiada henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya, yang selalu mendukung baik dari segi materi maupun non materi, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M. Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. DR. Dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep, Ns., M.Kes selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. S.KM., M.Kes. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
5. Prof. Dr. Mukhtar Luthfi, M.Ag . selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

6. Haeria S.Si., M.Si selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar
7. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Afrisusnawati Rauf S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Alifia Putri Febrianti, M. Farm., Klin., Apt selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
10. DR. Syamsul Bahri, M.Si. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi.
11. Dosen serta seluruh staf Jurusan Farmasi Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Seluruh pihak dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
13. Seluruh Pengurus Study Club (SC) Al-‘Aafiyah dan alumni Study Club (SC) Al-‘Aafiyah yang senantiasa mendo’akan dan mendukung penulis selama proses penelitian hingga selesai.
14. Terima kasih pula kepada Murobbiyah dan Mudarrisah serta seluruh teman-teman halaqoh tarbiyah ‘Aabidat 12 dan halaqoh tahsin atas segala do’a dan dukungannya selama ini.

15. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar Barakah Farma yang senantiasa memberikan semangat dan toleransi selama proses penelitian hingga penyelesaian.
16. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012, kakak-kakak angkatan 2011, 2010, 2008, 2007, 2006 dan 2005, serta adik-adik angkatan 2013, 2014 dan 2015 mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah *subhānahu wata'āla*. Amin.

Wassalāmu 'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Gowa, Mei 2016

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A

ANRIANI
NIM. 70100112097

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
1. Definisi Operasional	6
2. Ruang Lingkup Penelitian	8
3. Kajian Pustaka	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Saluran Kemih	13
1. Saluran Kemih Atas	14
2. Saluran Kemih Bawah	16

B. Infeksi Saluran Kemih.....	17
a). Etiologi	18
b). Patogenesis	19
c). Klasifikasi Infeksi Saluran Kemih (ISK)	20
d). Diagnosis Infeksi Saluran Kemih (ISK)	22
e). Obat-obat Infeksi Saluran Kemih (ISK)	23
C. Farmakoekonomi.....	27
a). Cost Analysis	32
b). Cost Minimalisasi Analisis (CMA)	35
c). Cost Benefits Analisis (CBA)	36
d). Cost Efektivitas Analisis (CEA)	36
e). Cost utility Analisis (CUA)	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
1. Analisis Efektivitas Biaya (AEB)	43
C. Populasi dan Sampel	44
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62

B. Saran.....	62
KEPUSTAKAAN.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Terapi antibiotik Infeksi Saluran Kemih (dipiro 2105).....	23
2. Terapi empirik antibiotik Infeksi Saluran Kemih..	24
3. Kuadran analisis farmakoekonomi	38
4. Analisis Farmakoekonomi	46
5. Data Pasien Infeksi saluran Kemih	49
6. Daftar harga obat	50
7. Analisis efektivitas biaya Farmakoekonomi	51
8. Terapi infeksi saluran kemih (dipiro 2105)	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar/diagram	Halaman
1. Saluran Kemih.....	13
2. Ginjal Secara Normal.....	15
3. Kelompok BJS	44
4. Jenis pemerian	44
5. Lama Penggunaan Obat	44
6. Jenis Kelamin	55
7. Usia Pasien	55
8. Jenis Sediaan yang digunakan	56



ABSTRAK

Nama : Anriani

NIM : 70100112097

Judul : Analisis Efektivitas Biaya (AEB) Penggunaan Obat Antibiotik Pada Pasien Rawat Inap Infeksi Saluran Kemih (ISK) Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Makassar Pada Tahun 2015

Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri aerob dari flora usus. Farmakoekonomi merupakan salah satu cabang dalam bidang farmakologi yang mempelajari mengenai pembiayaan pelayanan kesehatan, dimana pembiayaan dalam hal ini mencakup bagaimana mendapatkan terapi yang efektif, bagaimana dapat menghemat pembiayaan, dan bagaimana dapat meningkatkan kualitas hidup. Efisiensi dan efektivitas penggunaan obat dan biaya merupakan faktor yang penting diperhatikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rata-rata biaya total dan mengetahui efektivitas terapi antibiotik yang digunakan pada pasien infeksi saluran kemih di RSUD Labuang Baji Makassar pada tahun 2015. Populasi yang digunakan ini adalah pasien yang menderita infeksi saluran kemih tahun 2015 dan untuk sampelnya yaitu pasien yang memenuhi kriteria inklusi yaitu 19 pasien. Biaya yang dihitung adalah biaya langsung yaitu biaya pelayanan, obat, alat kesehatan, rawat inap, dan biaya laboratorium yang digunakan oleh pasien. Analisis data yaitu menggunakan tabel Farmakoekonomi dengan menghitung biaya rata-rata dan biaya total dari pasien. Untuk rata-rata lama rawat inap untuk pasien yang menggunakan antibiotik ciprofloxacin yaitu 2 hari, Rp. 5.425.976 dengan rata-rata biaya Rp1.085.195. Untuk cefadroxil lama rawat inap yaitu 3 hari untuk total biaya yang digunakan pada antibiotik cefadroxyl Rp. .910.595 dengan rata-rata biaya Rp. 982.119.. Untuk cefriaxon yaitu 4 hari, dengan cost total (total biaya) yaitu Rp. 6.867.682 dengan biaya rata-rata yaitu Rp 1.337.536.

Kata kunci: Analisis biaya, efektivitas, infeksi saluran kemih, farmakoekonomi.

ABSTRACT

Name : Naswina Putrianti

NIM : 70100110079

Title : Formulation, Characterization and In Vitro Percutaneous Penetration Testing Seed Extract Patch Robusta coffee (*Coffea canephora*) For Anti-Cellulite.

Cellulite is graters uneven skin that looks like "orange peel." Caffeine is a derivate of methylxanthine that can be used as an anti-cellulite patches in preparation. Spent Robusta coffee bean extract (*Coffea canephora*), which has a high caffeine content. Study aimed to knowing how Chitosan and HPMC polymer ratio which can produce a patch with the characteristics and good penetration and shows how its release profile. patches made with chitosan concentrations: HPMC 1:1 (formula I), 2:1 (formula II), and 1: 2 (formula III) by the addition of glycerin and Tween 80 as plastizier penetration enhancers using solvent casting method. penetration ability was tested in vitro by means of a modified Franz diffusion using the prepuce. penetration test performed for 2 hours with sampling in the 5th minute, 10, 15, 45, 60, 90 and 120. Included footage msing measured on UV-Vis spectrophotometer. The results obtained by the three formulas yield characteristics of a good patch with the release profiles varying. Formula I and II show the Higuchi release profile, while the formula III shows zero-order release profile.

Keywords: Cellulite, Caffeine, Patch, In Vitro Penetration Testing, Release Profile

ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Melihat banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia maka kita tidak terlepas dari tingkat kualitas dari SDM itu sendiri yaitu salah satunya dengan melihat dari segi kondisi kesehatan masyarakat. Sehat merupakan suatu keadaan tubuh yang normal, sementara sakit adalah faktor yang mengganggu stabilitas fisik maupun psikis. Penyakit mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam tubuh, dan karena itu pengobatan bisa menjadi salah satu upaya untuk menghilangkan penyebab dari keadaan yang tidak seimbang tersebut, sehingga tubuh dapat kembali kepada kondisi normal (Rahman, 2007).

Rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit merupakan Kegiatan utama sebuah rumah sakit adalah menjual jasa perawatan, namun perawatan terhadap pasien tidak akan maksimal jika persediaan obat yang dimiliki rumah sakit tersebut tidak lengkap. Persediaan obat dalam suatu rumah sakit memiliki arti yang sangat penting karena persediaan obat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan suatu rumah sakit. Semua pelayanan yang

diberikan kepada pasien tidak lepas dari pembiayaan yang cukup tinggi. Obat-obat yang diresepkan setiap penyakit pun berbeda-beda sesuai dengan diagnosa dari seseorang (Saputra, Eka: 2007).

Seperti telah diketahui bersama bahwa obat dan perbekalan farmasi merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan; selain itu, telah diketahui pula bahwa biaya obat umumnya mencapai 30--40% dari total biaya pelayanan kesehatan dan cenderung untuk terus meningkat. Bahkan akhir-akhir ini diperkirakan biaya obat hampir mencapai 60% dari total biaya pelayanan kesehatan. Biaya obat dan bahan habis pakai merupakan beban bagi pasien, pihak asuransi (*third party payers*) dan pemerintah. Dalam rangka upaya peningkatan status kesehatan masyarakat, obat dan intervensi pengobatan lain, sangat berperan (Martuti Budiharto, Soewarta Kosen:2000).

Oleh karena itu, dalam memilih obat untuk pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat rentan harus dipikirkan penggunaan yang tepat; yaitu tepat jenis, jumlah dan kualitas, disamping perlu dipertimbangkan perhitungan biaya sehingga terjangkau oleh masyarakat. Di negara maju farmako-ekonomi telah lama diaplikasikan, seperti dalam pemilihan obat, penyusunan standar terapi, dan penyusunan formularium, hal ini sangat penting dalam kerangka pengendalian biaya obat berperan (Martuti Budiharto, Soewarta Kosen:2000).

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi bakteri yang terjadi pada saluran kemih (mencakup organ-organ saluran kemih, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra). Infeksi saluran kemih di Indonesia insiden dan prevalensinya masih cukup

tinggi. Keadaan ini tidak terlepas dari tingkat dan taraf kesehatan masyarakat Indonesia yang masih jauh dari standar dan tidak meratanya tingkat kehidupan sosial ekonomi, yang mau tidak mau berdampak langsung pada kasus infeksi saluran kemih di Indonesia. Infeksi Saluran Kemih (ISK) merupakan penyakit yang sering dijumpai di masyarakat, menyerang anak-anak maupun dewasa dan merupakan masalah kesehatan yang serius (Rahmawati, Rini:2007)

Pada umumnya ISK lebih banyak dijumpai pada wanita dibanding pada pria kemungkinan karena uretra wanita lebih pendek sehingga mikroorganisme dari luar lebih mudah mencapai kandung kemih dan juga letaknya dekat dengan daerah perianal dan vagina. Pada usia dewasa kasus ISK ini lebih sering timbul pada wanita dewasa muda (usia subur), salah satu kemungkinan adalah karena proses dari kehamilan (*obsetri history*). (Susan S Huang, Edward Septimus:2014).

Tetapi pada usia tua, insidens ISK cenderung meningkat pada orang laki-laki, kemungkinannya adalah akibat penggunaan instrumen, misal: *urethral catheter*. Insiden terjadinya ISK di setiap negara mempunyai data statistik yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh taraf kesehatan dan pelayanan medis di negara tersebut. ISK perlu mendapat perhatian khusus dari kalangan praktisi medis yang berjumpa langsung dengan kasus Infeksi Saluran Kemih (ISK) (Dian Pertiwi:2012).

Diduga bahwa sekitar 25% dari 70.000 sampai 150.000 kejadian bakteriuria yang dilaporkan setiap tahun terbukti mematikan. Kelanjutan penyakit ini bila tidak segera ditindak lanjuti meliputi pielonefritis, penyakit ginjal kronik, dan batu dalam kemih alkali yang disebabkan oleh bakteri pemecah urea. Di Amerika Serikat, infeksi

saluran kemih (ISK) merupakan merupakan penyebab dokter menulis kurang lebih 11,3 juta resep dengan biaya yang diperkirakan lebih dari \$1,6 miliar. Biaya pengobatan satu kali ISK di Amerika Serikat berkisar antara \$ 100 sampai \$ 175 untuk penderita rawat jalan dan memerlukan tambahan \$1000 bila dirawat inap. Bahkan dalam setahun biaya yang harus dikeluarkan oleh seluruh pasien wanita saja mencapai \$ 1 juta. Dapat disimpulkan bahwa ISK merupakan masalah kesehatan yang besar, dipandang dari proporsi populasi yang terkena, kelanjutan penyakit, serta biaya pengobatannya (Annette Epp, MD, Saskatoon SK:2014)

Sebagai penyakit infeksi yang umumnya ditemukan, infeksi saluran kemih mempunyai dampak finansial dan kesehatan publik humanistik yang signifikan. Pambudi (2005) menyatakan bahwa biaya pengobatan infeksi saluran kemih rawat jalan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta rata-rata sebesar Rp 46.167,86 dengan rata-rata biaya antibiotika sebesar Rp 26.526,84. (Dini Mardianhi dkk:2012).

Melihat banyaknya kasus infeksi saluran kemih yang ada di Indonesia pada bulan-bulan tertentu populasinya meningkat yaitu pergantian musim kemarau ke musim hujan serta banyaknya obat-obat yang digunakan dalam proses terapinya tentu hal ini juga berkaitan dengan biaya dan kualitas hidup dari pasien. Dan penyakit Infeksi saluran Kemih (ISK) ini tidak hanya di diderita oleh sebagian masyarakat saja akan tetapi semua lapisan masyarakat memiliki potensi yang sama. Sehingga melihat kondisi tersebut maka perlunya dilakukan penelitian tentang analisis efektivitas biaya penggunaan obat-obat Infeksi saluran Kemih (ISK) pada beberapa rumah sakit yang

ada di Makassar agar dapat menjadi acuan dalam memberikan pelayanan pada pasien dengan mempertimbangkan efek terapi dan biaya yang digunakan. (Jayanti:2012).

B. Rumusan Masalah

- a. Berapakah biaya penggunaan obat-obat infeksi saluran kemih (ISK)
- b. Bagaimanakah efektivitas biaya terapi yang digunakan pada pasien ISK?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Kajian farmakoekonomi yang mempertimbangkan faktor klinis (efektivitas) sekaligus faktor ekonomi (biaya) dapat membantu para pengambil kebijakan mendapatkan jawaban obyektif terhadap keempat pertanyaan tersebut. Dengan demikian, Ilmu Farmakoekonomi dapat membantu pemilihan obat yang rasional, yang memberikan tingkat kemanfaatan paling tinggi. (Departemen kesehatan RI:2013). Ada 4 metode analisis dalam kajian farmakoekonomi tapi dalam penelitian ini digunakan 2 metode analisis yaitu Analisis efektivitas-biaya (AEB—cost-effectiveness analysis, CEA) adalah teknik analisis ekonomi untuk membandingkan biaya dan hasil (outcomes) relatif dari dua atau lebih intervensi kesehatan (Tim Penyusun Buku Panduan Farmakoekonomi:2013). Analisis Minimalisasi-Biaya (AMiB) merupakan metode kajian farmakoekonomi paling sederhana, analisis minimalisasi-biaya (AMiB) hanya dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan, termasuk obat, yang memberikan hasil yang sama, serupa, atau setara atau dapat diasumsikan

setara. Karena hasil pengobatan dari intervensi (diasumsikan) sama, yang perlu dibandingkan hanya satu sisi, yaitu biaya. (Pedoman Farmakoekonomi:2013).

b. Infeksi saluran kemih adalah keadaan klinis akibat adanya mikroorganisme dalam urin dan berpotensi untuk invasi ke saluran kemih bagian atas, menginvasi mukosa pelvis ginjal, meluas ke dalam jaringan interstisial ginjal. Dalam keadaan normal, urin juga mengandung mikroorganisme, umumnya sekitar 10^2 hingga 10^4 bakteri/ml urin. Pasien didiagnosis ISK bila urinnya mengandung lebih dari 10^5 bakteri/ml. Adapun obat-obat Infeksi Saluran Kemih (ISK) yang biasa digunakan yaitu Seftriakson merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga yang memiliki spektrum luas terhadap bakteri gram negatif, namun efikasinya rendah pada bakteri gram positif. Meskipun demikian, antibiotik ini memiliki efikasi yang baik terhadap beberapa organisme yang resisten terhadap antibiotik tertentu. Mekanisme kerjanya dengan mengikat satu atau lebih protein pengikat penisilin, merupak sintesis sel dinding bakter, dan bersifat bakterisid.. Antibiotik ini berinteraksi dengan aminoglikosida yang mengakibatkan naiknya potensi nefrotoksik. Penggunaan bersamaan probenesid akan meningkatkan kadar seftriakson melalui penghambatan kliren. Kombinasi amoksisilin dan klavulanat, biasa disebut co-amoxiclav. Amoksisilin menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan terikat pada sisi protein pengikat penisilin. Penambahan klavulanat dapat menghambat enzim

beta laktamase yang dikeluarkan bakteri untuk merusak cincin beta laktam pada amoksisilin. Kombinasi ini jarang menimbulkan alergi dan efektif pada sebagian besar bakteri penginfeksi, kecuali pada spesies *mycoplasma* dan *legionella*. Sefotaksim merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga. Antibiotik ini sering digunakan sebagai terapi parenteral awal pasien pediatric yang mengalami pielonefritis akut. (Kamaria. 2010)

c. Pasien merupakan seseorang yang di nyatakan menurut pasal 1 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran menjelaskan bahwa pasien merupakan setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Sedangkan pasien dalam penelitian ini yaitu seseorang yang dinyatakan terinfeksi pada saluran kemih yang dibuktikan dengan data laboratorium.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Disiplin ilmu yang terkait dengan penelitian ini adalah Analisis efektivitas biaya penggunaan oba-obat Infeksi Saluran Kemih (ISK) pada beberapa Rumah sakit di Makasar pada tanggal bulan desember 2015.

3. Kajian Pustaka

- a. Peneliti Sri Aisyah Muhartati, Muhammad Muhlis dan Woro Supad Telah dilakukan penelitian analisis cost-effectiveness penggunaan seftriakson dan sefotaksim pada terapi profilaksis apendektomi di RS PKU Muhammdiyah Yogyakarta periode Januari 2006-Desember 2007. Penelitian ini dilakukan

untuk mengetahui direct medical cost, cost-effectiveness ratio, dan untuk mengetahui obat yang lebih cost-effective seftriakson atau sefotaksim ditinjau dari perspektif rumah sakit. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat retrospektif. Populasi penelitian ini adalah semua pasien rawat inap apendektomi yang memperoleh terapi profilaksis dengan seftriakson atau sefotaksim di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Populasi target penelitian ini adalah pasien rawat inap apendektomi yang memperoleh terapi profilaksis dengan seftriakson atau sefotaksim di kelas III RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada bulan Januari 2006-Desember 2007. Hasil dari penelitian ini menunjukkan direct medical cost pada pasien yang memperoleh terapi seftriakson adalah Rp.422.257, sedangkan yang memperoleh terapi sefotaksim adalah Rp.487.680. Cost-effectiveness ratio pada pasien yang memperoleh terapi seftriakson adalah Rp.105.564 per hari, sedangkan yang memperoleh terapi sefotaksim adalah Rp.162.560 per hari. Belum dapat menentukan obat mana yang lebih cost-effective. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui direct medical cost, cost-effectiveness ratio, dan untuk mengetahui penelitian ini adalah semua pasien rawat inap apendektomi yang memperoleh terapi profilaksis dengan seftriakson atau sefotaksim di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini bukan hanya berfokus pada 1 jenis obat akan tetapi menggunakan 2 atau lebih obat yang digunakan pada pasien

Infeksi Saluran Kemih (ISK) yang bukan hanya berfokus pada 1 rumah sakit tapi lebih dari 1 Rumah Sakit yang ada di Makassar.

- b. Peneliti Jayanti melakukan penelitian “Analisis Biaya dan Efektivitas Terapi pada Infeksi Saluran Kemih (ISK) dengan Injeksi Seftriakson dan Ciprofloxacin pada pasien rawat inap di RSUD Dr. Moewardi tahun 2010”. Penelitian ini menganalisis tentang biaya dan efektivitas terapi ISK dengan obat antibiotik Injeksi Seftriakson dan Ciprofloxacin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rata-rata biaya total dan mengetahui efektivitas terapi injeksi seftriakson dan siprofloksasin untuk terapi infeksi saluran kemih. Untuk penelitian yang saat ini akan dilakukan itu lebih luas cakupannya karena menganalisis semua jenis obat antibiotik pada pasien ISK.

Melihat penelitian-penelitian terdahulu, belum ada yang melakukan penelitian Analisis Efektivitas Biaya (AEB) yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Makassar dengan pada Infeksi Saluran Kemih maka dilakukanlah penelitian Analisis Efektivitas Biaya pada penggunaan obat-obat Infeksi Saluran Kemih pada tahun 2015.

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Untuk mengetahui biaya yang digunakan pada pasien Infeksi saluran Kemih (ISK) pada Rumah sakit Umum Daerah (RSUD)

- b. Untuk menentukan analisis efektivitas biaya terapi yang digunakan oleh pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK).

E. *Manfaat Penelitian*

1. *Bagi Manajemen Rumah Sakit*

Secara keseluruhan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Direktur rumah sakit, komisi medik, panitia farmasi dan terapi dan instalasi farmasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan mempertimbangkan dari segi biaya pasien.

2. *Bagi Peneliti*

Untuk menambah pemahaman tentang Farmakoekonomi dan penerapan ilmu Manajemen Farmasi Rumah Sakit yang diperoleh peneliti selama mengikuti pendidikan di Farmasi UIN Alauddin Makassar dan menerapkannya di tempat kerja nanti.

3. *Bagi Program Farmasi*

- a. Merupakan sumbangan bagi pengembangan ilmu farmasi rumah sakit tentang analisis Farmakoekonomi baik itu dari segi biaya obat-obat, perawatan, serta semua biaya yang digunakan selama sakit agar terwujud praktek kefarmasian yang baik.
- b. Menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan tindakan medis kepada pasien serta menjadi bahan evaluasi dalam perkembangan rumah sakit.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Saluran Kemih

Sistem kemih (*urinearia*) adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih di pergunakan oleh tubuh. Zat- zat yang tidak di pergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urine (air kemih). Sistem kemih terdiri atas saluran kemih atas (sepasang ginjal dan ureter), dan saluran kemih bawah (satu kandung kemih dan uretra) (kamaria:2010).

Gambar sistem saluran kemih pada manusia dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: www.detikhealth.com

Pembagian saluran kemih :

1. Saluran kemih atas

a). Ginjal


Dalam keadaan normal, manusia memiliki 2 ginjal. Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang berwarna merah tua, panjangnya sekitar 12,5 cm dan tebalnya sekitar 2,5 cm (kurang lebih sebesar kepalan tangan). Ginjal adalah organ yang berfungsi sebagai penyaring darah yang terletak di bagian belakang kavum abdominalis di belakang peritoneum melekat langsung pada dinding belakang **abdomen (ganti referensi)**

Setiap ginjal memiliki ureter, yang mengalirkan air kemih dari *pelvis renalis* (bagian ginjal yang merupakan pusat pengumpulan air kemih) ke dalam kandung kemih. Setiap ginjal terdiri atas 1-4 juta nefron. Selama 24 jam dapat menyaring darah 170 liter. Fungsi yang lainnya adalah ginjal dapat menyaring limbah metabolik, menyaring kelebihan natrium dan air dari darah, membantu mengatur tekanan darah, pengaturan vitamin D dan Kalsium (dr. Tamboyan:2010).

Ginjal mengatur komposisi kimia dari lingkungan dalam melalui suatu proses majemuk yang melibatkan filtrasi, absorpsi aktif, absorpsi pasif, dan sekresi. Filtrasi terjadi dalam glomerulus, tempat ultra filtrate dari plasma darah terbentuk. Tubulus nefron, terutama tubulus kontortus proksimal berfungsi mengabsorpsi dari substansi-substansi yang berguna bagi metabolisme tubuh, sehingga dengan demikian memelihara homeostatis lingkungan dalam. Dengan cara ini makhluk hidup terutama

manusia mengatur air, cairan intraseluler, dan keseimbangan osmostiknya.
(Departemen Farmakologi dan Terapi FKUI:2007)

Gangguan fungsi ginjal akibat BSK pada dasarnya akibat obstruksi dan infeksi sekunder. Obstruksi menyebabkan perubahan struktur dan fungsi pada traktus urinarius dan dapat berakibat disfungsi atau insufisiensi ginjal akibat kerusakan dari parenkim ginjal.



Gambar ginjal secara normal

b). Ureter

Ureter merupakan saluran kecil yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih (*vesica urinaria*), dengan panjang \pm 25-30 cm, dengan penampang \pm 0,5 cm. Saluran ini menyempit di tiga tempat yaitu di titik asal ureter pada pelvis ginjal, di titik saat melewati pinggir pelvis, dan di titik pertemuannya dengan kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar berupa jaringan ikat

(jaringan fibrosa), lapisan tengah terdiri dari lapisan otot polos, lapisan sebelah dalam merupakan lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih (*vesica urinae*). sehingga dapat mengatur kapan air kemih bisa lewat menuju ke dalam kandung kemih. Air kemih yang secara teratur tersebut mengalir dari ureter akan di tampung dan terkumpul di dalam kandung kemih. (dr. Tamboyan:2010).

2. Saluran Kemih Bawah

a). Kandung Kemih

Kandung kemih merupakan kantong muscular yang bagian dalamnya dilapisi oleh membran mukosa dan terletak di depan organ pelvis lainnya sebagai tempat menampung air kemih yang dibuang dari ginjal melalui ureter yang merupakan hasil buangan penyaringan darah. Dalam menampung air kemih kandung kemih mempunyai kapasitas maksimal yaitu untuk volume orang dewasa lebih kurang adalah 30-450 ml. Kandung kemih bersifat elastis, sehingga dapat mengembang dan mengkerut. Ketika kosong atau setengah terdistensi, kandung kemih terletak pada pelvis dan ketika lebih dari setengah terdistensi maka kandung kemih akan berada pada abdomen di atas pubis. Dimana ukurannya secara bertahap membesar ketika sedang menampung jumlah air kemih yang secara teratur bertambah. (Departemen Farmakologi dan Terapi FKUI:2007)

Setiap ginjal memiliki ureter, yang mengalirkan air kemih dari *pelvis renalis* (bagian ginjal yang merupakan pusat pengumpulan air kemih) ke dalam kandung kemih. Setiap ginjal terdiri atas 1-4 juta nefron. Selama 24 jam dapat menyaring darah 170 liter. Fungsi yang lainnya adalah ginjal dapat menyaring limbah metabolik, menyaring kelebihan natrium dan air dari darah, membantu mengatur tekanan darah, pengaturan vitamin D dan Kalsium. Ginjal mengatur komposisi kimia dari lingkungan dalam melalui suatu proses majemuk yang melibatkan filtrasi, absorpsi aktif, absorpsi pasif, dan sekresi. Filtrasi terjadi dalam glomerulus, tempat ultra filtrate dari plasma darah terbentuk. Tubulus nefron, terutama tubulus kontortus proksimal berfungsi mengabsorpsi dari substansi-substansi yang berguna bagi metabolisme tubuh, sehingga dengan demikian memelihara homeostatis lingkungan dalam. Dengan cara ini makhluk hidup terutama manusia mengatur air, cairan intraseluler, dan keseimbangan osmotiknya (dr. Tamboyan:2010).

B. Infeksi Saluran Kemih

Infeksi saluran kemih adalah keadaan klinis akibat adanya mikroorganisme dalam urin dan berpotensi untuk invasi ke saluran kemih bagian atas, menginvasi mukosa pelvis ginjal, meluas ke dalam jaringan interstisial ginjal. Dalam keadaan normal, urin juga mengandung mikroorganisme, umumnya sekitar 10² hingga 10⁴ bakteri/ml urin. Pasien didiagnosis ISK bila urinnya mengandung lebih dari 10⁵ bakteri/ml. Penderita ISK dapat tidak mengalami gejala, namun umumnya mempunyai gejala yang terkait dengan tempat dan keparahan infeksi. Gejalagejalanya dapat meliputi berikut ini, sendirian atau bersama-sama : (1) menggigil, demam, nyeri

pinggang, sering mual dan muntah (biasanya terkait dengan pielonefritis akut); dan (2) disuria, sering atau terburu-buru buang air kecil, nyeri suprapubik, dan hematuria yang biasanya terkait dengan sistitis (H. Afekouha, P. Bauneb Abbasc:2014)

a). Etiologi

Mikroorganisme yang paling umum menyebabkan ISK sejauh ini adalah *Escherichia coli* yang diperkirakan bertanggung jawab terhadap 80% kasus infeksi, 20% sisanya disebabkan oleh bakteri gram negatif lain seperti *Klebsiella* dan spesies *Proteus*, dan bakteri gram positif seperti *Cocci*, *Enterococci*, dan *Staphylococcus saprophyticus*. Organisme terakhir dapat ditemui pada kasus kasus ISK wanita muda yang aktif kegiatan seksualnya. ISK yang berhubungan dengan abnormalitas struktur saluran kemih sering disebabkan oleh bakteri yang lebih resisten seperti *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter* dan spesies *Serratia*. Bakteri-bakteri ini juga sering ditemui pada kasus infeksi nosokomial, terutama pada pasien yang mendapatkan katerisasi urin (H. Afekouha, P. Bauneb Abbasc:2014).

Selain karena bakteri, faktor lain yang dapat meningkatkan resiko terjadinya ISK antara lain kehamilan, menopause, batu ginjal, memiliki banyak pasangan dalam aktivitas seksual, penggunaan diafragma sebagai alat kontrasepsi, inflamasi atau pembesaran pada prostat kelainan pada uretra, immobilitas, kurang masukan cairan, dan kateterisasi urin (Knowles:2005).

Gejala klasik ISK bawah akut termasuk disuria, kemih frekuensi, dan suprapubik ditambah nyeri atau minus hematuria. Diagnosis meliputi vaginitis, akut uretritis, sistitis interstisial, dan penyakit radang panggul. Organisme lain yang

mungkin terlibat dan meniru sistitis akut termasuk Chlamydia, gonorrhea Neisseria, Candida, vaginosis bakteri, dan herpes simpleks virus (Judith E. Bosmans:2014)

Gejala klasik tampaknya sangat prediktif penyakit benar. Jika disuria, frekuensi, dan hematuria yang hadir dalam ketiadaan keputihan, probabilitas budaya positif adalah 81% .12 Wanita dengan berulang UTI dapat mendiagnosa diri pada berdasarkan gejala yang sangat akurat, dengan 84% positif budaya, faktor prediktif positif untuk ISK berulang pada wanita adalah gejala setelah berhubungan, sebuah riwayat pielonefritis, tidak adanya nokturia, dan resolusi yang cepat gejala (48 jam) setelah memulai pengobatan. Itu prediktor negatif utama adalah kehadiran nokturia dan kegigihan gejala antara episode diperlakukan infection (Judith E. Bosmans:2014)

b). Patogenesis ISK

Pada umumnya, mikroorganisme dapat masuk ke dalam saluran kemih melalui tiga jalur, yaitu infeksi *Ascending*, *descending* dan limfatik (Coyle dan Prince:2005; Schaeffer:1994)

a. Ascending

Mikroorganisme masuk lewat uretra. Cara inilah yang paling sering terjadi. Biasanya terjadi pada aktivitas seksual, kebiasaan toilet yang buruk, dan kontrol kemih yang buruk pada manula. Dekatnya uretra maupun lubang anal serta saluran uretra yang pendek pada wanita meningkatkan terjadinya ISK. Pengosongan kandung kemih yang tidak lancar atau tidak sepenuhnya proses pembuangan urin dapat menyebabkan bakteri yang ada di dalam saluran kemih tidak dapat terbang sempurna. Mekanisme pengeluaran kemih normal terbukti menghilangkan lebih

dari 99% organisme. Bakteri yang tidak dapat dikeluarkan ini kemudian dapat berkembang biak kembali dengan cepat. (Ihda Mufrida:2009)

1. Hematogenesis (descending)

Organisme masuk melalui sistem limfatik yang menghubungkan kandung kemih dengan ginjal. Organisme dapat pula menyebar melalui perluasan langsung dari flora usus ke dalam kandung kemih. Penggunaan kateter seringkali menyebabkan mikroorganisme masuk ke dalam kandung kemih, hal ini biasanya disebabkan kurang higienisnya alat ataupun tenaga kesehatan yang memasukkan kateter. Orang lanjut usia yang sukar buang air kecil umumnya menggunakan kateter untuk memudahkan pengeluaran urin, itulah sebabnya mengapa penderita ISK cenderung meningkat pada rentang usia ini (Ihda Mufrida:2009)

c). **Klasifikasi Infeksi Saluran Kemih**

Sebagian besar pustaka membedakan ISK menjadi ISK bagian bawah, meliputi uretra hingga kandung kemih dan prostat, atau disebut sistitis, dan ISK bagian atas, meliputi radang pada ginjal atau disebut pielonefritis (Schaeffer, 1994). Guideline WHO sendiri menyebutkan bahwa ISK diklasifikasikan menjadi ISK pada wanita tanpa komplikasi, ISK pada wanita terkomplikasi, ISK pada pria, ISK pada anak-anak, prostatitis, dan pielonefritis akut (Jayanti RD:2013).

Klasifikasi mempermudah identifikasi penderita dan merasionalkan pengobatan penderita ISK. Infeksi saluran kemih dibagi menjadi 3 golongan:

1) Infeksi pertama

Sekitar 80 % infeksi pertama disebabkan oleh *Escherichia coli*, sangat sensitif terhadap banyak agen antimikroba. Infeksi ini mudah disembuhkan sehingga bisa disembuhkan dengan terapi oral. 2) Bakteriuria tidak sembuh Keadaan ini menunjukkan kegagalan mensterilisasi urin walaupun diberi terapi antibiotik. Penyebab tersering adalah adanya mikroorganisme yang pada mulanya resisten atau yang menjadi resisten terhadap antibiotik. Penyebab lain adalah kegagalan untuk mencapai kadar hambat minimal agen antimikroba yang diberikan pada pasien yang biasa terjadi pada pasien gangguan ginjal dan pada jumlah bakteri yang terlalu banyak (Jayanti RD:2013)

Patogen penyebab utama yang terlibat pada wanita adalah *E. coli*, yang bertanggung jawab untuk sekitar 80% dari semua periode infeksi. Lain yang signifikan patogen termasuk *Staphylococcus saprophyticus*, *Klebsiella pneumoniae*, dan *Proteus mirabilis*, yang masing-masing menyebabkan sekitar 4% dari semua sistitis akut. *Citrobacter* dan *Enterococci* cenderung penyebab ISK pada Infeksi women.¹⁴ dengan organisme yang biasanya tidak menyebabkan UTI mungkin indikator kelainan struktural atau ginjal calculi.⁷ Uropathogenic *E. coli* memiliki faktor virulensi, seperti jenis fimbria, yang mempromosikan mengikat epitel vagina dan uretra dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menyebabkan sistitis. Faktor-faktor lain meningkatkan resistensi terhadap bakterisida serum mekanisme pertahanan aktivitas pada tubuh seseorang (Annette Epp, MD, Saskatoon SK: Recurrent Urinary Tract Infection:2014)

2). *Bakteriuria kambuh*

Jenis klasifikasi ini dinyatakan bila bakteriuria telah dinyatakan sembuh tetapi kembali terjadi infeksi setelah penghentian terapi antibiotik. Keadaan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, menetapkan bakteri dalam saluran kemih (misalnya dalam batu ginjal atau prostatitis bakteri) dapat menimbulkan infeksi kambuh dengan spesies yang sama. Biasanya diperlukan pembedahan untuk menghilangkan sumber bakteri untuk mengobati infeksi yang sering kambuh. Kedua, reinfeksi yang disebabkan oleh pemasukan kembali bermacam-macam bakteri dari lingkungan di luar saluran kemih. Kebanyakan infeksi kambuh pada wanita adalah reinfeksi dan memerlukan profilaksis antimikroba (Novi Praktika Wilianti.:2009)

d). Diagnosis ISK

Hal terpenting dari penegakan diagnosa ISK adalah kemampuan suatu metode untuk menunjukkan adanya sejumlah besar mikroorganisme yang signifikan pada spesimen urin yang terinfeksi. Pemeriksaan urin secara mikroskopis adalah langkah pertama dalam diagnosis ISK. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk menentukan jumlah, strain, dan jenis bakteri penginfeksi. Pasien didiagnosis ISK bila dalam urinnya mengandung lebih dari 10⁵ bakteri/ml urin. Tetapi angka ini patut dipertanyakan, pada wanita yang mengalami gejala klinis ISK yang hanya menunjukkan 10² bakteri/ml urin ternyata memberikan respon positif pada pengobatan. Sehingga mikroorganisme dalam pengambilan urin suprapubik, dengan jumlah berapapun pasien harus dirawat dengan status ISK (Novi Praktika Wilianti.:2009)

e). Obat - Obat Infeksi Saluran Kemih

Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau membunuh mikroba jenis lain. Antibiotik juga dapat dibuat secara sintesis (Anonim, 2000). Penggunaan antibiotik yang tidak tepat pada beberapa kasus dapat menyebabkan kekebalan bakteri terhadap agen antimikroba, yaitu munculnya bakteri-bakteri yang resisten terhadap suatu jenis agen mikroba, atau peningkatan biaya pengobatan ditambah lagi biaya terapi efek samping dari beberapa obat.

Adapun terapi pada infeksi saluran kemih untuk tiap pembagian yaitu:

Tabel 1. Terapi Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih (Dipiro 2015, 492)

Indikasi	Antibiotik	Dosis	Selang	Durasi (hari)
Simpleks	Trimethoprim–Sulfamethoxazole	1 tablet	2x sehari	3
	Nitrofurantoin Monohydrate	100 mg	2x sehari	5
	Fosfomycin	3 g	Dosis Tunggal	1
	Ciprofloxacin	250 mg	2x sehari	3
	Levofloxacin	250 mg	1x sehari	3
	Amoxicillin–clavulanate	500 mg	Tiap 8 jam	5-7
Kompleks	Trimethoprim–Sulfamethoxazole	1 DS tablet	2x1 sehari	7-10
	Ciprofloxacin	250–500 mg	2x1 sehari	7-10
	Levofloxacin	250 mg	1x sehari	10
		750 mg	1x sehari	5
Amoxicillin–clavulanate	500 mg	Tiap 8 jam	7-10	
Infeksi Kambuhan	Nitrofurantoin	50 mg	1x sehari	6 bulan
	Trimethoprim–sulfamethoxazole	1/2 SS tablet	1x sehari	6 bulan
Pyelonephritis	Trimethoprim–Sulfamethoxazole	1 DS tablet	2x sehari	14

	Ciprofloxacin	500 mg	2x sehari	14
		1000 mg ER	1x sehari	7
	Levofloxacin	250 mg	1x sehari	10
		750 mg	1x sehari	5
	Amoxicillin–clavulanate	500 mg	Tiap 8 jam	14

Tabel 2. Terapi Empirik Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih (Dipiro 2015, 494)

Diagnosa	Bakteri	Terapi	Durasi (hari)
Sistitis	<i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus</i> <i>Saprophyticus</i>	Nitrofurantoin	5
		Trimethoprim–sulfamethoxazole	3
		Fosfomycin	Dosis tunggal
		Fluoroquinolone	3
		β-Lactams	3-7
Sistitis (hamil dan menyusui)	<i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus</i> <i>Saprophyticus</i>	Amoxicillin–clavulanate	7
		Cephalosporin	7
		Trimethoprim–sulfamethoxazole	7
Pyelonephritis Akut			
Simpleks	<i>Escherichia coli</i> ,	Quinolone	7
		Trimethoprim–sulfamethoxazole	14
Kompleks	Gram-positive bacteria <i>E. coli</i> <i>P. mirabilis</i> <i>K. pneumoniae</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>Enterococcus faecalis</i>	Amoxicillin or amoxicillin–clavulanic acid 14 hari	14
		Quinolone	14
Prostatitis	<i>E. coli</i> <i>K. pneumoniae</i> <i>Proteus spp.</i> <i>P. aeruginosa</i>	Trimethoprim–sulfamethoxazole	4-6 minggu
		Quinolone	4-6 minggu

Tabel 4. Terapi Antibiotik untuk Pengobatan Infeksi Saluran berdasarkan *Guidelines on Urological Infections*

	Antibiotik	Dosis dan frekuensi	Durasi	
Sistitis	Fosfomycin trometamol	3 g <i>single dose</i>	1 hari	
	Nitrofurantoin	50 mg tiap 6 jam	7 hari	
	Nitrofurantoin macrocrystal	100 mg 2x1	5-7 hari	
	Pivmecillinam	400 mg 2x1	3 hari	
	Alternatif			
	Ciprofloxacin	250 mg 2x1	3 hari	
	Levofloxacin	250 mg 1x1	3 hari	
	Norfloxacin	400 mg 2x1	3 hari	
	Ofloxacin	200 mg 2x1	3 hari	
	Cefpodoxime proxetil	100 mg 2x1	3 hari	
pyelonefritis	Ciprofloxacin	500-750 mg 2x1	7-10 hari	
	Levofloxacin	250-500 mg 1x1	7-10 hari	
	Levofloxacin	750 mg 1x1	5 hari	
	Alternatif			
	Cefpodoxime proxetil	200 mg 2x1	10 hari	
	Ceftibuten	400 mg 1x1	10 hari	
kasus berat	Ciprofloxacin	400 mg 2x1		
	Levofloxacin	250-500 mg 1x1		
	Levofloxacin	750 mg 1x1		
	Cefotaxime	2 g 3x1		
	Ceftriaxone	1-2 g 1x1		
	Ceftazidime	1-2 g 3x1		
	Cefepime	1-2 g 2x1		
	Co-amoxiclav	1,5 g 3x1		
	Piperacillin/tazobactam	2,5-4,5 3x1		
	Gentamicin	5 mg/kg 1x1		
	Amikacin	15 mg/kg 1x1		
	Ertapenem	1 g 1x1		
	Imipenem/cilastatin	0,5/0,5 g 3x1		
	Meropenem	1 g 3x1		
Doripenem	0,5 g 3x1			

Cara kerja terpenting dari antibiotik adalah perintangannya terhadap sintesis protein, sehingga kuman musnah atau tidak berkembang lagi, misalnya kloramfenikol, tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida, dan linkomisin. Selain itu beberapa antibiotik

bekerja terhadap dinding sel (penisilin dan sefalosporin) atau membran sel (polimiksin dan imidazole). Untuk memilih antibiotik perlu dipertimbangkan tiga faktor utama, yaitu (Teti Dynaili Puteri:2011)

1) Kuman penyebab. Hal ini tergantung dari gejala-gejala klinis yang dikenali dan diperkuat oleh hasil pemeriksaan laboratorium. Seringkali pemilihan antibiotik hanya didasarkan pada diagnosis klinis saja, namun dengan pengalaman klinis dan pengetahuan tentang pemilihan obat yang tepat akan memudahkan dokter untuk memilih jenis antibiotik yang sesuai untuk setiap kasus infeksi.

2) Faktor infeksi. Faktor-faktor tersebut mencakup beratnya infeksi, status kekebalan tubuh, riwayat penyakit, status alergi, faktor farmakokinetik, dan bahkan adanya sifat genetik tertentu akan sangat mempengaruhi terapi yang akan diberikan.

3) Faktor antibiotik. Mencakup spektrum kepekaan kuman, ada tidaknya interaksi obat, dan efek samping yang berat, serta dosis maupun rute pemberiannya. Kombinasi sulfametoksazole dan trimethoprim atau biasa disebut kotrimoksazol dapat menghambat sintesis asam dihidrofolat bakteri melalui kompetisi dengan asam paraaminobenzoat mengakibatkan inhibisi pertumbuhan bakteri. Meskipun keduanya bersifat bakteriostatik, namun bila dikombinasikan dapat menjadi bakterisid terhadap bakteri yang sama. Pada umumnya, kombinasi ini merupakan kombinasi yang bersifat potensiasi (saling menguatkan) serta menurunkan resiko resistensi. Aktivitas antibakterinya cukup bagus pada banyak patogen penyebab ISK Kecuali pada *Pseudomonas aeruginosa* (Ahmad Dahlan: 2010).

Seftriakson merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga

yang memiliki spektrum luas terhadap bakteri gram negatif, namun efikasinya rendah pada bakteri gram positif. Meskipun demikian, antibiotik ini memiliki efikasi yang baik terhadap beberapa organisme yang resisten terhadap antibiotik tertentu. Mekanisme kerjanya dengan mengikat satu atau lebih protein pengikat penisilin, merupak sintesis sel dinding bakter, dan bersifat bakterisid. Dosis lazimnya antara 1-2 gram secara intravena pada 2 hingga 4 pemberian dalam sehari dan tidak melewati 4 gram sehari. Seftriakson kontraindikasi dengan pasien yang memiliki hipersensitifitas terhadap seftriakson. Antibiotik ini berinteraksi dengan aminoglikosida yang mengakibatkan naiknya potensi nefrotoksik. Penggunaan bersamaan probenesid akan meningkatkan kadar seftriakson melalui penghambatan kliren (Novi Praktika Wilianti.:2009)

Kombinasi amoksisilin dan klavulanat, biasa disebut co-amoxiclav. Amoksisilin menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan terikat pada sisi protein pengikat penisilin. Penambahan klavulanat dapat menghambat enzim beta laktamase yang dikeluarkan bakteri untuk merusak cincin beta laktam pada amoksisilin. Kombinasi ini jarang menimbulkan alergi dan efektif pada sebagian besar bakteri penginfeksi, kecuali pada spesies *mycoplasma* dan *legionella*. Dosis penggunaan pada dewasa antara 500-875 mg dua kali sehari peroral atau 250-500 mg tiga kali sehari selama 7-10 hari. Interaksinya dengan walfarin atau heparin dapat meningkatkan resiko pendarahan. Antibiotik ini akan bekerja sinergis bersama pemberian antibiotik golongan aminoglikosida (Rahman Wahyuni.:2007)

Sefotaksim merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga. Antibiotik ini sering digunakan sebagai terapi parenteral awal pasien pediatric yang

mengalami pielonefritis akut. Dosis dewasa 1-2 gram intravena atau intra muscular tiap 6-8 jam. Sefotaksim dikontra indikasikan pada pasien yang memiliki alergi terhadap sefotaksim. Konsentrasi sefotaksim akan meningkat bila berinteraksi dengan probenesid. Penggunaan sefotaksim sebaiknya berhati-hati pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal, alergi penisilin, dan memiliki riwayat colitis (Rahman Wahyuni.:2007)

C. Farmakoekonomi

Dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat yang berlaku di Indonesia saat ini, Jamkesmas dan/atau Jamkesda, proporsi biaya obat dialokasikan maksimal 30% dari biaya perawatan kesehatan. Kenyataannya, konsumsi obat nasional mencapai 40% dari belanja kesehatan secara keseluruhan dan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia (Kementerian Kesehatan:2009).

Karena itu, peningkatan efektivitas-biaya obat, bahkan di tingkat pemerintah daerah atau tingkat lokal rumah sakit, pada ujungnya akan memberikan dampak yang berarti terhadap efisiensi biaya perawatan kesehatan nasional. Dan, dengan menerapkan peningkatan efektivitasbiaya dan upaya lain berdasarkan kaidah farmakoekonomi pada penetapan kebijakan kesehatan secara menyeluruh, peningkatan efisiensi biaya perawatan kesehatan nasional yang dicapai akan maksimal. Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi ini disusun terutama untuk membantu para pengambil kebijakan baik di tingkat Pusat (Kementerian Kesehatan), Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) maupun fasilitas pelayanan (Rumah Sakit) serta instansi yang terkait pelayanan kesehatan, termasuk asuransi kesehatan lainnya, dalam memilih obat

yang secara obyektif memiliki efektivitas-biaya paling tinggi. (Kementerian Kesehatan:2009).

Contoh perhitungan yang diberikan terutama menampilkan analisis yang terkait dengan biaya obat. Namun demikian, Pedoman yang merupakan bagian dari Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK—Health Technology Assessment, HTA) ini dapat juga digunakan sebagai salah satu pedoman untuk melakukan analisis ekonomi yang lebih luas, hingga mencakup teknologi kesehatan secara keseluruhan, dan dengan metode yang lebih dari sekadar efektivitas biaya. Kajian farmakoekonomi yang mempertimbangkan faktor klinis (efektivitas) sekaligus faktor ekonomi (biaya) dapat membantu para pengambil kebijakan mendapatkan jawaban obyektif terhadap keempat pertanyaan tersebut. Dengan demikian, Ilmu Farmakoekonomi dapat membantu pemilihan obat yang rasional, yang memberikan tingkat kemanfaatan paling tinggi. Ada beberapa perspektif yang dapat di lihat yaitu :

a). Perspektif Penilaian

Perspektif penilaian merupakan hal penting dalam Kajian Farmakoekonomi, karena perspektif yang dipilih menentukan komponen biaya yang harus disertakan. Seperti yang telah disampaikan, penilaian dalam kajian ini dapat dilakukan dari tiga perspektif yang berbeda, yaitu:

b). Perspektif masyarakat (societal).

Sebagai contoh Kajian Farmakoekonomi yang mengambil perspektif masyarakat luas adalah penghitungan biaya intervensi kesehatan, seperti program penurunan konsumsi rokok, untuk memperkirakan potensi peningkatan produktivitas ekonomi (PDB,

produk domestik bruto) atau penghematan biaya pelayanan kesehatan secara nasional dari intervensi kesehatan tersebut.

c) Perspektif kelembagaan (institutional) (Idha Mufridha:2009).

Contoh kajian farmakoekonomi yang terkait kelembagaan antara lain penghitungan efektivitas-biaya pengobatan untuk penyusunan Formularium Rumah Sakit. Contoh lain, di tingkat pusat, penghitungan AEB untuk penyusunan DOEN dan Formularium Nasional (Idha Mufridha:2009)

d) Perspektif individu (individual perspective).

Salah satu contoh kajian farmakoekonomi dari perspektif individu adalah penghitungan biaya perawatan kesehatan untuk mencapai kualitas hidup tertentu sehingga pasien dapat menilai suatu intervensi kesehatan cukup bernilai atau tidak dibanding kebutuhan lainnya (termasuk hiburan). Karena pertanyaan yang harus dijawab oleh ketiga perspektif itu berbeda, jenis biaya yang diperhitungkan dalam Kajian Farmakoekonomi masing-masing perspektif tersebut juga tak sama. Secara ringkas, jenis biaya yang harus diperhitungkan dan kategorisasinya menurut beberapa perspektif yang lazim dilakukan (Dian Pertiwi:2012).

Farmakoekonomi awalnya didefinisikan sebagai deskripsi dan analisa dari biaya terapi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan, lebih spesifik lagi adalah sebuah penelitian tentang proses identifikasi, pengukuran dan perbandingan biaya, resiko dan keuntungan dari suatu program, pelayanan dan terapi serta determinasi suatu alternatif terbaik. Farmakoekonomi didefinisikan sebagai deskripsi dan analisis dari biaya terapi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan, lebih spesifik lagi adalah sebuah penelitian

tentang proses identifikasi, mengukur dan membandingkan biaya, resiko dan keuntungan dari suatu program, pelayanan dan terapi serta determinasi suatu alternatif terbaik. Evaluasi farmakoekonomi memperkirakan harga dari produk atau pelayanan berdasarkan satu atau lebih sudut pandang. Tujuan dari farmakoekonomi diantaranya membandingkan obat yang berbeda untuk pengobatan pada kondisi yang sama selain itu juga dapat membandingkan pengobatan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda (Orion:1997).

Farmakoekonomi merupakan salah satu cabang dalam bidang farmakologi yang mempelajari mengenai pembiayaan pelayanan kesehatan, dimana pembiayaan dalam hal ini mencakup bagaimana mendapatkan terapi yang efektif, bagaimana dapat menghemat pembiayaan, dan bagaimana dapat meningkatkan kualitas hidup. Farmakoekonomi (*pharmacoeconomics*) adalah suatu metoda baru untuk mendapatkan pengobatan dengan biaya yang lebih efisien dan serendah mungkin tetapi efektif dalam merawat penderita untuk mendapatkan hasil klinik yang baik (*cost effective with best clinical outcome*) (Anny VP:2007)

Farmakoekonomi merupakan penggabungan dari 2 disiplin ilmu yaitu ilmu ekonomi kesehatan dan farmasi klinis. Farmakoekonomi merangkum aspek ekonomi yaitu pengidentifikasian, perhitungan serta perbandingan biaya serta konsekuensi farmasetikal dan klinis produk obat. Dari uraian diatas, intervensi dari penelitian farmakoekonomi dinilai dapat mempengaruhi income-outcome terapi pengobatan (Anny VP:2007).

Adapun prinsip farmakoekonomi antara lain menetapkan masalah, identifikasi alternatif intervensi, menentukan hubungan antara *income* dan *outcome* sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat, identifikasi dan mengukur *outcome* dari alternatif intervensi, menilai biaya dan efektivitas, dan langkah terakhir adalah interpretasi dan pengambilan kesimpulan (Bodrar, George H., dan William S. Hopwood:2010).

Farmakoekonomi diperlukan karena adanya sumber daya terbatas misalnya pada RS pemerintah dengan dana terbatas. Hal yang terpenting adalah bagaimana memberikan obat yang efektif dengan dana yang tersedia, pengalokasian sumber daya yang tersedia secara efisien, kebutuhan pasien, profesi pada pelayanan kesehatan (dokter, farmasis, perawat) dan administrator (Vogenberg, 2001). Metode evaluasi farmakoekonomi terdiri dari lima macam: yaitu *Cost-Analysis* (CA), *Cost-Minimization Analysis* (CMA), *Cost-Effectiveness Analysis* (CEA), *Cost-Utility Analysis* (CUA), *Cost-Benefits Analysis* (CUA) (Dipiro *et al.*, 2005). Sedangkan menurut buku panduan farmakoekonomi ada 4 metode analisis dalam kajian farmakoekonomi yaitu Analisis efektivitas-biaya (AEB—cost-effectiveness analysis, CEA) adalah teknik analisis ekonomi untuk membandingkan biaya dan hasil (outcomes) relatif dari dua atau lebih intervensi kesehatan (Tim Penyusun Buku Panduan Farmakoekonomi:2013).

Analisis Minimalisasi-Biaya (AMiB) merupakan metode kajian farmakoekonomi paling sederhana, analisis minimalisasi-biaya (AMiB) hanya dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan, termasuk obat, yang memberikan hasil yang sama, serupa, atau setara atau dapat diasumsikan setara.

Karena hasil pengobatan dari intervensi (diasumsikan) sama, yang perlu dibandingkan hanya satu sisi, yaitu biaya. Analisis Utilitas-Biaya (AUB) Metode analisis utilitas-biaya (AUB) mirip dengan AEB, tetapi hasil (outcome)-nya dinyatakan dengan utilitas yang terkait dengan peningkatan kualitas atau perubahan kualitas akibat intervensi kesehatan yang dilakukan. Menurut Bootman (1996), hasil pengobatan dalam bentuk kuantitas dan kualitas hidup. Analisis Manfaat-Biaya Analisis Manfaat Biaya (AMB - cost benefit-analysis, CBA) adalah suatu teknik analisis yang diturunkan dari teori ekonomi yang menghitung dan membandingkan surplus biaya suatu intervensi kesehatan terhadap manfaatnya. Untuk itu, baik surplus biaya dan manfaat diekspresikan dalam satuan moneter (misal. Rupiah, US Dollar). (Pedoman Farmakoekonomi:2013)

a). Cost-Analysis (CA)

Cost-Analysis, yaitu tipe analisis yang sederhana yang mengevaluasi intervensi intervensi biaya (Tjandrawinata, 2000). *Cost-Analysis* dilakukan untuk melihat semua biaya dalam pelaksanaan atau pengobatan, dan tidak membandingkan pelaksanaan, pengobatan atau evaluasi efikasi Sulastomo (2003) menjelaskan adanya tiga syarat mutlak yang harus dilakukan, sebelum analisis biaya dilakukan, yaitu:

- 1) Struktur organisasi rumah sakit yang baik
- 2) Sistem akuntansi yang tepat
- 3) Adanya informasi statistik yang cukup baik

Penerapan analisis biaya (*cost analysis*) di rumah sakit selalu mengacu pada penggolongan biaya. Sulastomo menggolongkan biaya menjadi 8 macam, yaitu:

1) Biaya Langsung (*direct cost*) merupakan biaya yang melibatkan proses pertukaran uang untuk penggunaan sumber. Sumbernya bisa bermacam-macam, yaitu orang, alat, gedung, dan lain-lain. Kaitannya dengan pertukaran uang, misalnya pasien diberi obat, maka pasien tersebut harus membayarnya dengan sejumlah uang tertentu. Contoh biaya langsung adalah biaya obat-obatan, biaya operasional (misalnya upah untuk dokter dan perawat, sewa ruangan, pemakaian alat, dan lainnya), dan biaya lain-lain (seperti : bonus, subsidi, sumbangan).

2) Biaya tidak langsung (*indirect cost*) merupakan biaya yang tidak melibatkan proses pertukaran uang untuk penggunaan sumber karena berdasarkan komitmen. Contohnya adalah biaya untuk hilangnya produktivitas (tidak masuk kerja, upah), waktu (biaya perjalanan, menunggu), dan lain-lain (seperti biaya untuk penyimpanan, pemasaran, dan distribusi).

3) Biaya tak teraba (*intangible cost*) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tak teraba, sehingga sukar diukur. Biaya ini bersifat psikologis, sukar dijadikan nilai mata uang (maksudnya sukar dirupiahkan), sehingga sukar diukur. Contohnya adalah biaya untuk rasa nyeri atau penderitaan, cacat, kehilangan kebebasan, dan efek samping.

4) Biaya tetap (*fixed cost*) merupakan biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume keluarannya (*output*). Jadi biaya ini tidak berubah meskipun ada peningkatan atau penurunan *output*, kecuali untuk gaji berkala. Contohnya adalah gaji PNS (pegawai Negeri Sipil), sewa ruangan, dan ongkos peralatan.

5) Biaya tidak tetap (*variable cost*) merupakan biaya yang dipengaruhi oleh perubahan volume keluaran (*output*). Jadi, biaya ini akan berubah apabila terjadi peningkatan atau penurunan *output*. Contohnya adalah komisi penjualan dan harga obat.

6) Biaya rata-rata (*average cost*) merupakan biaya konsumsi sumber per unit *output*. Jadi hasil pembagian dari biaya total dengan volume atau kuantitas *output*. Biaya rata-rata adalah total biaya dibagi jumlah kuantitas *output*.

7) *Marginal cost* merupakan perubahan total biaya hasil dari bertambah atau berkurangnya unit dari *output*.

8) *Opportunity cost* merupakan besarnya biaya sumber pada saat nilai tertinggi dari penggunaan alternatif. Nilai alternatif harus sudah ada saat sesuatu diproduksi. *Opportunity cost* ini adalah ukuran terbaik dari nilai sumber. (Idha Mufridha:2012).

Sedangkan dalam Buku Panduan Farmakoekonomi 2013 biaya dibagi 3 yaitu:

a). *Biaya langsung*, Yaitu biaya yang dikeluarkan atau terkait langsung dengan hasil pengobatan yang dinikmati oleh pasien, antara lain terdiri dari:

- Biaya perawatan (*cost of treatment*). Berdasarkan *clinical pathway*, biaya perawatan adalah biaya medis yang dikeluarkan selama dirawat-inap sesuai pola penyakit berdasarkan *diagnosis-related group (DRG)*, misalnya biaya operasi, biaya obat, biaya kamar, dan- biaya dokter.

- Di rumah sakit dan puskesmas, data tentang biaya ini dapat diambil dari tagihan yang dibayar oleh pasien atau penjamin/asuransi.

b). *Biaya tidak langsung*, yaitu biaya yang dikeluarkan pasien dalam tahapan pengobatan suatu penyakit atau terkait langsung dengan hasil pengobatan yang

dinikmati pasien. Termasuk dalam komponen biaya ini adalah biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya tunggu, hilangnya produktivitas.

c). *Biaya total akibat sakit* (cost of illness, COI), yaitu biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh pasien, meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. (Tjiptoherijanto P., Soesetyo, B:2004)

b). Cost-Minimization Analysis (CMA)

Cost-Minimization Analysis adalah tipe analisis yang menentukan biaya program terendah dengan asumsi besarnya manfaat yang diperoleh sama. Analisis ini digunakan untuk menguji biaya relatif yang dihubungkan dengan intervensi yang sama dalam bentuk hasil yang diperoleh. Suatu kekurangan yang nyata dari analisis *cost-minimization* yang mendasari sebuah analisis adalah pada asumsi pengobatan dengan hasil yang ekuivalen. (Vogenberg, F.R:2001)

Jika asumsi tidak benar dapat menjadi tidak akurat, pada akhirnya studi menjadi tidak bernilai. Pendapat kritis analisis *cost-minimization* hanya digunakan untuk prosedur hasil pengobatan yang sama (Orion, 1997). Contoh dari analisis *cost-minimization* adalah terapi dengan antibiotika generik dengan paten, *outcome* klinik (efek samping dan efikasi sama), yang berbeda adalah onset dan durasinya. Maka pemilihan obat difokuskan pada obat yang biaya per harinya lebih murah (Vogenberg, 2001).

c. Cost-Benefits Analysis (CBA)

Analisis *Cost-Benefit* adalah tipe analisis yang mengukur biaya dan manfaat suatu intervensi dengan beberapa ukuran moneter dan pengaruhnya terhadap hasil

perawatan kesehatan. Tipe analisis ini sangat cocok untuk alokasi bahan-bahan jika keuntungan ditinjau dari perspektif masyarakat. Analisis ini sangat bermanfaat pada kondisi antara manfaat dan biaya mudah dikonversi ke dalam bentuk rupiah (Orion:1997).

Merupakan tipe analisis yang mengukur biaya dan manfaat suatu intervensi dengan beberapa ukuran moneter, dan pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan, sehingga dapat digunakan untuk membandingkan perlakuan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. *Cost-Benefits Analysis* merupakan tipe penelitian farmakoekonomi yang komprehensif dan sulit dilakukan karena mengkonversi *benefit* ke dalam nilai uang (Vogenberg, 2001). Pertanyaan yang harus dijawab dalam *cost-benefit analysis* adalah alternatif mana yang harus dipilih di antara alternatif-alternatif yang dapat memberikan manfaat atau *benefit* yang paling besar (Tjiptoherijanto dan Soesetyo:1994).

d). Cost-Effectiveness Analysis (CEA)

Analisis *Cost-Effectiveness* atau analisis efektivitas biaya (AEB) adalah tipe analisis yang membandingkan biaya suatu intervensi dengan beberapa ukuran non-moneter, yang berpengaruh terhadap hasil perawatan kesehatan. Analisis *Cost-Effectiveness* merupakan salah satu cara untuk memilih dan menilai program yang terbaik bila terdapat beberapa program yang berbeda dengan tujuan yang sama tersedia untuk dipilih. Kriteria penilaian program yang akan dipilih berdasarkan *discounted unit cost* dari masing-masing alternatif program sehingga program yang mempunyai *discounted unit cost* terendahlah yang akan dipilih oleh para analisis atau pengambil

keputusan (Tjiptoherijanto dan Soesetyo:1994). Dengan menggunakan tabel efektivitas-biaya (tabel 2.1), suatu intervensi kesehatan secara relatif terhadap intervensi kesehatan yang lain dapat dikelompokkan ke dalam satu dari empat posisi, yaitu:

1. Posisi Dominan Kolom G (juga Kolom D dan H)

Jika suatu intervensi kesehatan menawarkan efektivitas lebih tinggi dengan biaya sama (Kolom H) atau efektivitas yang sama dengan biaya lebih rendah (Kolom D), dan efektivitas lebih tinggi dengan biaya lebih rendah (Kolom G), pasti terpilih sehingga tak perlu dilakukan AEB.

2. Posisi Didominasi Kolom C (juga Kolom B dan F)

Sebaliknya, jika sebuah intervensi kesehatan menawarkan efektivitas lebih rendah dengan biaya sama (Kolom B) atau efektivitas sama dengan biaya lebih tinggi (Kolom F), apalagi efektivitas lebih rendah dengan biaya lebih tinggi (Kolom C), tidak perlu dipertimbangkan sebagai alternatif, sehingga tak perlu pula diikutsertakan dalam perhitungan AEB.

3. Posisi Seimbang Kolom E

Sebuah intervensi kesehatan yang menawarkan efektivitas dan biaya yang sama (Kolom E) masih mungkin untuk dipilih jika lebih mudah diperoleh dan/atau cara pemakaiannya lebih memungkinkan untuk ditaati oleh pasien, misalnya tablet lepas lambat yang hanya perlu diminum 1 x sehari versus tablet yang harus diminum 3 x sehari. Sehingga dalam kategori ini, ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan di

samping biaya dan hasil pengobatan, misalnya kebijakan, ketersediaan, aksesibilitas, dan lain-lain.

4. Posisi yang memerlukan pertimbangan efektivitas biaya Kolom A dan I

Jika suatu intervensi kesehatan yang menawarkan efektivitas yang lebih rendah dengan biaya yang lebih rendah pula (Kolom A) atau, sebaliknya, menawarkan efektivitas yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih tinggi, untuk melakukan pemilihan perlu memperhitungkan RIEB.

Tabel 3. Kuadran Analisis Efektivitas



Alat bantu lain yang dapat digunakan dalam AEB adalah diagram efektivitas-biaya. Suatu alternatif intervensi kesehatan, termasuk obat, harus dibandingkan dengan intervensi (obat) standar. Menurut diagram ini, jika suatu intervensi kesehatan memiliki efektivitas lebih tinggi tetapi juga membutuhkan biaya lebih tinggi dibanding intervensi standar, intervensi alternatif ini masuk ke Kuadran I (Tukaran, Trade-off). (Buku Panduan Farmakoekonomi:2013)

Pemilihan intervensi Kuadran I memerlukan pertimbangan sumberdaya (terutama dana) yang dimiliki, dan semestinya dipilih jika sumberdaya yang tersedia mencukupi. Suatu intervensi kesehatan yang menjanjikan efektivitas lebih rendah dengan biaya yang lebih rendah dibanding intervensi standar juga masuk kategori Tukaran, tetapi di Kuadran III. Pemilihan intervensi alternatif yang berada di Kuadran III memerlukan pertimbangan sumberdaya pula, yaitu jika dana yang tersedia lebih terbatas. Jika suatu intervensi kesehatan memiliki efektivitas lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah dibanding intervensi standar, intervensi alternatif ini masuk ke Kuadran II (Dominan) dan menjadi pilihan utama. Sebaliknya, suatu intervensi kesehatan yang menawarkan efektivitas lebih rendah dengan biaya lebih tinggi dibanding intervensi standar, dengan sendirinya tak layak untuk dipilih (Buku Panduan Farmakoekonomi:2013)

Analisis *cost-effectiveness* menganalisis suatu penyakit, berdasarkan pada perbandingan antara biaya suatu program pemberantasan tertentu dan akibat dari program tersebut dalam bentuk perkiraan dari kematian dan kasus yang bisa dicegah. Contoh sederhana, program A dengan biaya US \$ 25.000 dapat menyelamatkan 100 orang penderita. Sehingga *unit costnya* atau *CE rasionya* US \$ 250/ *life*. Sedangkan dengan biaya yang sama, program B hanya dapat menyelamatkan 15 orang penderita, berarti *unit costnya* atau *CE rasionya* mencapai \$ 1,677/*life*. Dalam hal ini jelaslah bahwa program A yang akan dipilih karena lebih efektif daripada program B (Tjiptoherijanto dan Soesetyo:1994). Aplikasi dari CEA misalnya dua obat atau lebih digunakan untuk mengobati suatu indikasi yang sama tapi *cost* dan efikasi berbeda.

Analisis *costeffectiveness* mengkonversi *cost* dan *benefit* (efikasi) ke dalam rasio pada obat. Berikut dapat dilihat contoh perhitungan AEB yang diambil dari kasus rawat jalan yang diadaptasi dari Rascati et al. Dibandingkan 3 (tiga) jenis intervensi dalam terapi asma, yaitu pemberian inhalasi kortikosteroid tunggal, pemberian kombinasi inhalasi kortikosteroid dengan obat A dan pemberian kombinasi inhalasi kortikosteroid dan obat B (Buku Panduan Farmakoekonomi:2013)

e). Cost-Utility Analysis (CUA)

Analisis *Cost- Utility* adalah tipe analisis yang mengukur manfaat dalam *utility*-beban lama hidup, menghitung biaya per *utility*, mengukur ratio untuk membandingkan di antara beberapa program. Analisis *cost-utility* mengukur nilai spesifik kesehatan dalam bentuk pilihan setiap individu atau masyarakat. Seperti analisis *cost-effectiveness*, *cost-utility analysis* membandingkan biaya terhadap program kesehatan yang diterima dihubungkan dengan peningkatan kesehatan yang diakibatkan perawatan kesehatan (Orion, 1997).

Dalam *cost-utility analysis*, peningkatan kesehatan diukur dalam bentukpenyesuaian kualitas hidup (*quality adjusted life years, QALYs*) dan hasilnya ditunjukkan dengan biaya per penyesuaian kualitas hidup. Data kualitas dan kuantitas hidup dapat dikonversi kedalam nilai *QALYs*, sebagai contoh jika pasien dinyatakan benar-benar sehat, nilai *QALYs* dinyatakan dengan angka 1 (satu). Keuntungan dari analisis ini dapat ditujukan untuk mengetahui kualitas hidup. Kekurangan analisis ini bergantung pada penentuan *QALYs* pada status tingkat kesehatan pasien (Orion:1997).

Di antara semua metode tersebut, analisis minimalisasi-biaya (AMiB) adalah yang paling sederhana. AMiB digunakan untuk membandingkan dua intervensi kesehatan yang telah dibuktikan memiliki efek yang sama, serupa, atau setara. Jika dua terapi atau dua (jenis, merek) obat setara secara klinis, yang perlu dibandingkan hanya biaya untuk melakukan intervensi (Buku Panduan Farmakoekonomi:2013).

Sesuai prinsip efisiensi ekonomi, jenis atau merek obat yang menjanjikan nilai terbaik adalah yang membutuhkan biaya paling kecil per periode terapi yang harus dikeluarkan untuk mencapai efek yang diharapkan. Untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan yang memberikan besaran efek berbeda, dapat digunakan analisis efektivitasbiaya (AEB). Pada AEB, hasil pengobatan tidak diukur dalam unit moneter, melainkan didefinisikan dan diukur dalam unit alamiah, baik yang secara langsung menunjukkan efek suatu terapi atau obat (misalnya, penurunan kadar LDL darah dalam mg/dL, penurunan tekanan darah diastolik dalam mm Hg) maupun hasil selanjutnya dari efek terapi tersebut (misalnya, jumlah kematian atau serangan jantung yang dapat dicegah, radang tukak lambung yang disembuhkan). Metode lain yang juga banyak digunakan adalah analisis utilitasbiaya (AUB). Seperti AEB, biaya pada AUB juga diukur dalam unit moneter (jumlah rupiah yang harus dikeluarkan), tetapi hasil pengobatan dinyatakan dalam unit utilitas, misalnya JTKD. Karena hasil pengobatannya tidak bergantung secara langsung pada keadaan penyakit (disease state) (Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi:2013)

Untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan yang memiliki tujuan berbeda atau dua program yang memberikan hasil pengobatan dengan unit

berbeda, dapat digunakan analisis manfaatbiaya (AMB). Perbandingan intervensi kesehatan dengan tujuan dan/atau unit hasil pengobatan berbeda ini dimungkinkan karena, pada metode AMB, manfaat (benefit) diukur sebagai manfaat ekonomi yang terkait (associated economic benefit) dan dinyatakan dengan unit yang sama, yaitu unit moneter. Namun demikian, karena alasan etika serta sulitnya mengkuantifikasi nilai kesehatan dan hidup manusia, AMB sering menuai kontroversi. Sebab itu, AMB juga agak jarang digunakan dalam kajian farmakoekonomi, bahkan dalam kajian ekonomi kesehatan yang lebih luas pun masih jarang sekali dilakukan. Sebagai edisi awal, Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi ini memfokuskan bahasan pada metode analisis yang sederhana, yaitu analisis minimalisasi-biaya (AMiB) dan analisis efektivitas-biaya (AEB)) (Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi:2013).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu observasional retrospektif cross sectional dengan analisis deskriptif eksperimental.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini berupa observasional retrospektif dengan analisis deskriptif eksperimental dengan mengambil data rekam medik pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK) pada tahun 2015 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji.

- Analisis Efektivitas Biaya (AEB)

Pada Analisis Efektivitas Biaya (AEB) dapat digunakan untuk memilih intervensi kesehatan yang memberikan nilai tertinggi dengan dana yang terbatas jumlahnya. Pada AEB, biaya intervensi kesehatan diukur dalam unit moneter (rupiah) dan hasil dari intervensi tersebut dalam unit alamiah/indikator kesehatan baik klinis maupun non klinis (non-moneter). Sebab itu, AEB hanya dapat digunakan untuk membandingkan intervensi kesehatan yang memiliki tujuan sama, atau jika intervensi

tersebut ditujukan untuk mencapai beberapa tujuan yang muaranya sama (Drummond:1997).

Pada penggunaan metode AEB perlu dilakukan penghitungan rasio biaya rerata dan rasio inkremental efektivitas-biaya (RIEB = incremental cost-effectiveness ratio/ICER). Dengan RIEB dapat diketahui besarnya biaya tambahan untuk setiap perubahan satu unit efektivitasbiaya. Selain itu, untuk mempermudah pengambilan kesimpulan alternatif mana yang memberikan efektivitas-biaya terbaik.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini yaitu semua pasien rawat inap Infeksi saluran Kemih (ISK) di Rumah Sakit Umum pada tahun 2015. Adapun sampel pada penelitian ini yaitu pasien rawat inap dengan diagnosa infeksi Saluran Kemih (ISK) yang memenuhi kriteria inklusi di RSUD Labuang Baji Makassar. Adapun perhitungan sampel minimal pada penelitian ini yaitu :

$$N = \frac{2n^2XPXQ}{D^2}$$

N = sampel

Keterangan :

N : banyaknya sampel

$2n^2$: nilai subjek penelitian

P : Prevalensi

Q : Prevalensi 2 (1-prevalensi)

D² : nilai % kesalahan

a). Kriteria Inklusi

1. Pasien infeksi saluran kemih
2. Menjalani terapi antibiotik
3. umur 12-60 tahun
4. Pasien yang dinyatakan sembuh oleh dokter

b). Kriteria eksklusi

- 1) Geriatri
- 2) Pediatri
- 3) Menderita infeksi lain
- 4) Pasien pulang paksa

D. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan seluruh kegiatan-kegiatan yang digunakan dalam variabel-variabel pada Analisis Efektivitas Biaya (AEB). Adapun data-data yang dibutuhkan yaitu:

- a). Jenis kelamin perempuan dan laki-laki,
- b). usia 12-60 tahun
- c). Data kondisi klinik pasien

d). Biaya langsung yang digunakan pasien

E. Analisis Data

Data yang terkumpul diperiksa terlebih dahulu dan dilakukan penyuntingan data untuk memastikan data yang diperoleh sudah sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian ini.

1. Melakukan pencatatan data-data yang ada di rekam medik
2. Analisis biaya terhadap biaya langsung pasien.
3. Analisis Efektivitas Biaya (AEB) diperhatikan lama pengobatan pasien serta menghitung frekuensi dari hilangnya rasa sakit/nyeri pada pasien hingga pasien keluar dari rumah sakit.
4. Cara perhitungan dari analisis pada penelitian ini yaitu dengan memasukkan ke tabel farmakoekonomi:

Tabel 4. Analisis Efektivitas Biaya (AEB)

No	Langkah	Contoh
1.	Tentukan tujuan.	Membandingkan efektivitas dan efisiensi terapi pada pasien infeksi saluran kemih dengan terapi dari masing-masing jenis penyakit ISK.
2.	Buat daftar untuk mencapai tujuan tersebut.	Membandingkan: a. ciprofloxacin b. cefadroxil c. ceftriaxon
3.	Identifikasi Tingkat efektivitas.	Hasil studi literatur menunjukkan: • Efektivitas Pengobatan A = N % • Efektivitas Pengobatan B = N % • Efektivitas Pengobatan C = N % • Efektivitas Pengobatan N = N %
4.	Identifikasi dan	Biaya yang teridentifikasi dan diukur adalah biaya

	hitung biaya pengobatan.	Obat, alat kesehatan, pelayanan, laboratorium dan biaya rawat inap: <ul style="list-style-type: none"> • Biaya rerata Pengobatan A = N/pasien • Biaya rerata Pengobatan B = N/pasien • Biaya rerata Pengobatan C = N/pasien • Biaya rerata Pengobatan N = N/pasien
5.	Hitung dan lakukan interpretasi efektivitas biaya dari pilihan pengobatan	Hitung rasio efektivitas-biaya (REB) setiap pengobatan. Rumus: Biaya / Efektivitas <ul style="list-style-type: none"> • REB Pengobatan A = Cost / tingkat efektivitas = N • REB Pengobatan B = cost / tingkat efektivitas = N • REB Pengobatan C = cost/ tingkat efektivitas = N • REB Pengobatan N = cost/ tingkat efektivitas = N Tentukan posisi alternatif pengobatan yang diberikan pada pasien ISK
6.	Nilai Inkremental	Hitung rasio inkremental efektivitas-biaya (RIEB) setiap pengobatan: <ol style="list-style-type: none"> RIEB Pengobatan B terhadap A = (pengobatan B – pengobatan A) / (Efektivitas B – Efektivitas A) = N RIEB Pengobatan C terhadap A = (pengobatan C – pengobatan A) / (Efektivitas C – Efektivitas A) = N RIEB Pengobatan A terhadap C = (pengobatan C – pengobatan A) / (Efektivitas C – Efektivitas A) = N
7.	Interpretasi.	Selanjutnya dianalisis data/hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan terapi yang paling efektif dan efesinesi yang digunakan pada pasien Infeksi saluran kemih.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Seluruh pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji yaitu 12.099 pasien. Dan untuk pasien Infeksi saluran Kemih (ISK) yaitu 27 pasien. Untuk sampel yang memenuhi kriteria inklusi yaitu 27 sampel akan tetapi hasil yang diperoleh untuk perhitungan minimal yaitu 19 pasien.

Dalam perhitungan sampel digunakan perhitungan deskriptik kategorik karena melihat prevalensi dari pasien yaitu kurang dari 20%. Untuk hasil 19 sampel tersebut merupakan hasil perkalian dari populasi dan prevalensi dari pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Makassar. Adapun perhitungan sampel minimal pada penelitian ini yaitu :

$$N = \frac{2n^2XPXQ}{D^2}$$

$$N = \frac{(1,96)^2 \times 0,002 \times 0,998}{0,022}$$

$$N = 19$$

Keterangan :

N : banyaknya sampel

$2n^2$: nilai subjek penelitian

P : Prevalensi

Q : Prevalensi 2 (1-prevalensi)

D² : nilai % kesalahan

Daftar harga obat tiap obat antibiotik ISK Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Makassar Labuang Baji

Tabel 5. Daftar harga obat di RSUD Labuang Baji

1. ciprofloxacin

1.	Ciprofloxacin 500 mg(G)	tablet	Rp 385,00
2.	Ciprofloxacin inf(G)	botol	Rp 15.000,00

2. Cefadroxyl

1.	Cefadroxyl 125 mg syr(G)	botol	Rp 5.286,00
2.	Cefadroxyl 250 mg syr(G)	botol	Rp 6.285,00
3.	Cefadroxyl 500 mg(G)	kapsul	Rp 529,00

3. Cefriaxon

1	Ceftriaxone		
2	Ceftriaxone inj(G)	vial	Rp 10.618,00

Adapun untuk data pasein yang menggunakan obat antibiotik pada pasien infeksi saluran kemih yaitu :

Tabel 6. Data pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK)

a. Cefadroxil

No.	No. RM	pembagian kelas	oral	Injeksi	jenis Kelamin	Usia	lama pengobatan
-----	--------	-----------------	------	---------	---------------	------	-----------------

1	320463	PBJS 1	√		Pria	43 tahun	3 hari
2	321657	BPJS 2	√		perempuan	52 tahun	2 hari
3	342190	BPJS 2	√		perempuan	29 tahun	5 hari
4	308002	BPJS 3	√		Pria	52 tahun	3 hari

b. Ceftriaxon

No	No. RM	Pembagian Kelas	Oral	Injeksi	Jenis Kelamin	Usia	Lama Pengobatan
1	319511	BPJS 1		√	pria	41 tahun	4 hari
2	268458	BPJS 1		√	pria	24 tahun	3 hari
3	320517	PBJS 1		√	perempuan	17 tahun	2 hari
4	312033	BPJS 2		√	perempuan	50 tahun	7 hari
5	326078	BPJS 2		√	pria	43 tahun	4 hari
6	314409	BPJS 3		√	pria	46 tahun	5 hari

c. Ciprofloxacin

NO	No.RM.	Pembagian Kategori	Oral	Injeksi	Jenis Kelamin	Umur	Lama Pengobatan
1	311606	BPJS 3	√		Perempuan	39 tahun	2 hari
2	281153	BPJS 3	√		Perempuan	33 tahun	4 hari
3	312387	BPJS 3	√		Perempuan	35 tahun	2 hari
4	320372	BPJS 3	√		Perempuan	18 tahun	4 hari
5	311439	BPJS 3	√		Perempuan	38 tahun	4 Hari
6	303773	BPJS 3	√	√	Pria	53 tahun	2 hari
7	331446	BPJS 3	√		Pria	46 tahun	2 hari

8	318920	BPJS 2	√	√	Perempuan	47 tahun	1 hari
9	327861	BPJS 2	√		Perempuan	32 tahun	2 hari

Adapun daftar biaya yang digunakan oleh pasien pada setiap obat yaitu :

a. Cefadroxil

No	No. RM	Daftar biaya langsung pasien					Total
		Obat	Laboratorium	pelayanan	Rawat inap	Alkes	
1	320463	105.854	245.000	204.000	428.000	97.889	1.080.743
2	321657	126.522	105.000	205.990	950.000	807.088	2.194.600
3	342190	255.997	215.000	289.600	200.000	112.968	1.023.565
4	308002	106.889	105.000	108.800	90.000	78.998	489.687
	Total	545.262	670.000	808.390	1.668.000	1.096.943	4.788.595
Rata-rata : 982.119							

b. Cefriaxon

No	Nomor rekam medik	Daftar Biaya Langsung					Total Biaya/Pasien
		obat	Laboratorium	Pelayanan	Rawat Inap	Alkes	
1	319511	304,980	250,000	236,455	320,000	168,995	1,280,430


2	268458	269,690	270,000	212,990	240,000	105,334	1,098,014
3	320517	234,007	175,000	201,211	160,000	89,667	859,885
4	312033	435,886	344,000	304,551	320,000	211,334	1,615,771
5	326078	267,686	250,000	265,889	160,000	113,552	1,057,127
6	314409	207,998	200,000	288,577	150,000	109,880	956,455
Total		1,720,247	1,489,000	1,509,673	1,350,000	798,762	6,867,682
Rata-rata							1,144,614

c. Ciprofloxacin


No	No. RM	Daftar biaya langsung pasien					Total
		Obat	Laboratorium	Pelayanan	Rawat inap	Alkes	
1.	311606	133.067	253.000	229.000	60.000	47.167	722.234
2.	281153	172.554	162.000	212.000	120.000	53.667	720.221
3.	312387	103.543	120.000	45.000	60.000	35.455	363.998
4.	320372	114.485	162.000	188.000	120.000	67.885	652.370
5.	311439	159.330	120.000	203.500	120.000	76.873	679.703
6.	303773	153.643	120.000	229.000	60.000	47.167	609.810
7.	331446	125.455	240.000	229.000	60.000	49.154	703.609
8.	318920	103.889	-	45.000	30.000	23.455	202.344
9.	254812	153.067	253.000	229.000	60.000	53.167	748.234
Total		1.219.033	1.430.000	1.609.500	690.000	477.443	5.425.976
Rata-rata							Rp. 602.886

Untuk diagram dari setiap hasil analisis dari data pasien untuk penelitian ini yaitu:


a. *Diagram pembagian kategori BPJS*




b. *Diagram jenis pemberian yang digunakan*




c. Diagram lama penggunaan obat




d. Diagram jenis kelamin pasien



e. *Diagram usia pasien*



f. *Diagram jenis obat yang digunakan*



B. Pembahasan

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji terletak di bagian selatan Kecamatan Mamajang Kota Makassar tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Makassar. Adapun batas-batas geografis RSUD Labuang Baji adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Landak Lama
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tupai
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Pendeta Ekss
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Dr. Ratulangi

➤ **Fasilitas Pelayanan RSUD Labuang Baji Makassar**

Fasilitas pelayanan di RSUD Labuang Baji Makassar meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan non medik.

a). Pelayanan Medik

1. Instalasi rawat jalan terdiri dari 16 poliklinik
2. Instalasi rawat darurat terdiri dari 12 ruangan
3. Instalasi rawat inap terdiri atas perawatan umum dan ruang perawatan khusus.
4. Instalasi rawat inap intensif dengan kapasitas 7 tempat tidur
5. Instalasi bedah sentral terdiri dari 7 kamar

b) Pelayanan Penunjang Medik

1. Radiologi
2. Instalasi patologi klinik
3. Instalasi patologi anatomi
4. Instalasi rawat intensif
5. Instalasi farmasi

c. *Pelayanan Penunjang Non Medik*

1. Instalasi gizi
2. Instalasi pemeliharaan sarana
3. Instalasi RS

➤ **Jenis Pelayanan RSUD Labuang Baji Makassar**

Jenis pelayanan di RSUD Labuang Baji Makassar yakni:

1. *Poliklinik Bedah:*

- Umum
- Urologi
- Orthopedic

2. *Poliklinik Penyakit Dalam*

- Endokrin
- Paru dan TB
- Kardiologi
- Ginjal dan hipertensi

3. Poliklinik Anak

4. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

5. Poliklinik Penyakit

Sistem kemih (*urinearia*) adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih di pergunakan oleh tubuh. Zat- zat yang tidak di pergunakan oleh tubuh

larut dalam air dan dikeluarkan berupa urine (air kemih). Sistem kemih terdiri atas saluran kemih atas (sepasang ginjal dan ureter), dan saluran kemih bawah (satu kandung kemih dan uretra) (kamaria:2010).

Infeksi saluran kemih adalah keadaan klinis akibat adanya mikroorganisme dalam urin dan berpotensi untuk invasi ke saluran kemih bagian atas, menginvasi mukosa pelvis ginjal, meluas ke dalam jaringan interstisial ginjal. Dalam keadaan normal, urin juga mengandung mikroorganisme, umumnya sekitar 10² hingga 10⁴ bakteri/ml urin. Pasien didiagnosis ISK bila urinya mengandung lebih dari 10⁵ bakteri/ml. Penderita ISK dapat tidak mengalami gejala, namun umumnya mempunyai gejala yang terkait dengan tempat dan keparahan infeksi. Gejalagejalanya dapat meliputi berikut ini, sendirian atau bersama-sama : (1) menggigil, demam, nyeri pinggang, sering mual dan muntah (biasanya terkait dengan pielonefritis akut); dan (2) disuria, sering atau terburu-buru buang air kecil, nyeri suprapubik, dan hematuria yang biasanya terkait dengan sistitis (H. Afekouha, P. Bauneb Abbasc:2014)

➤ *Analisis Efektivitas Biaya (AEB)*

Tabel 8. Hasil Analisis efektivitas Biaya Farmakoekonomi

No	Langkah	Analisis
1.	Tentukan tujuan.	Membandingkan biaya dan efektivitas terapi pada jenis Penyakit infeksi saluran kemih dengan terapi dari masing-masing jenis penyakit ISK.

2.	Buat daftar untuk mencapai tujuan tersebut.	Membandingkan penggunaan obat antibiotik: <ul style="list-style-type: none"> a. cefadroxil b. cefriaxon c. ciprofloxacxin
3.	Identifikasi Tingkat efektivitas.	Efektivitas menunjukkan: <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pengobatan ciprofloxacxin = 47% • Efektivitas Pengobatan cefadroxil= 21% • Efektivitas Pengobatan cefriaxon = 32%
4.	Identifikasi dan hitung biaya pengobatan.	Biaya yang teridentifikasi dan diukur adalah biaya Langsung yaitu biaya obat, biaya pelayanan, biaya alat kesehatan, rawat inap dan biaya laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya rerata Pengobatan cefadroxil = 982.119/pasien b. Biaya rerata Pengobatan cefriaxon = 1.144.614/pasien c. Biaya rerata Pengobatan ciprofloxacxin = 602.614/pasien
5.	Hitung dan lakukan interpretasi efektivitas biaya dari pilihan pengobatan	Hitung rasio efektivitas-biaya (REB) setiap pengobatan. Rumus: Biaya / Efektivitas <ul style="list-style-type: none"> • REB Pengobatan Cefadroxil = $982.119/0,21 = 4.676.757$ • REB Pengobatan Cefriaxon = $1.144.614/ 0,32 = \text{Rp. } 3.576.918$ • REB Pengobatan ciprofloxacxin = $602.614/0,47 = \text{Rp. } 1.282.157$
6.	Nilai Inkremental	Hitung rasio inkremental efektivitas-biaya (RIEB) setiap pengobatan: <ul style="list-style-type: none"> • RIEB Pengobatan B terhadap C $= (. 3.576.918-1.282.157)/(0,47-0,32)= 15.298.407$

		<ul style="list-style-type: none"> • RIEB Pengobatan A terhadap B $= (4.676.757 - 3.576.918) / (0,36 - 0,21) = 7.332260$
7.	Interpretasi.	Setelah melihat hasil yang dianalisis maka dapat dilihat bahwa untuk merekomendasikan antara obat B dan A maka dipilih obat B. Untuk rekomendasi antara obat C dan B maka di rekomendasikan obat C dan untuk obat A dan C maka direkomendasikan obat C.

Dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat yang berlaku di Indonesia saat ini, Jamkesmas dan/atau Jamkesda, proporsi biaya obat dialokasikan maksimal 30% dari biaya perawatan kesehatan. Kenyataannya, konsumsi obat nasional mencapai 40% dari belanja kesehatan secara keseluruhan dan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia (Kementerian Kesehatan:2009).


Karena itu, peningkatan efektivitas-biaya obat, bahkan di tingkat pemerintah daerah atau tingkat lokal rumah sakit, pada ujungnya akan memberikan dampak yang berarti terhadap efisiensi biaya perawatan kesehatan nasional. Dan, dengan menerapkan peningkatan efektivitasbiaya dan upaya lain berdasarkan kaidah farmakoekonomi pada penetapan kebijakan kesehatan secara menyeluruh, peningkatan efisiensi biaya perawatan kesehatan nasional yang dicapai akan maksimal. Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi ini disusun terutama untuk membantu para pengambil kebijakan baik di tingkat Pusat (Kementerian Kesehatan), Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) maupun fasilitas pelayanan (Rumah Sakit) serta instansi yang

terkait pelayanan kesehatan, termasuk asuransi kesehatan lainnya, dalam memilih obat yang secara obyektif memiliki efektivitas-biaya paling tinggi. (Kementerian Kesehatan:2009).

kesehatan (dokter, farmasis, perawat) dan administrator (Vogenberg, 2001). Metode evaluasi farmakoekonomi terdiri dari lima macam: yaitu *Cost-Analysis (CA)*, *Cost-Minimization Analysis (CMA)*, *Cost-Effectiveness Analysis (CEA)*, *Cost-Utility Analysis (CUA)*, *Cost-Benefits Analysis (CBA)* (Dipiro *et al.*, 2005). Sedangkan menurut buku panduan farmakoekonomi ada 4 metode analisis dalam kajian farmakoekonomi yaitu Analisis efektivitas-biaya (AEB—cost-effectiveness analysis, CEA) adalah teknik analisis ekonomi untuk membandingkan biaya dan hasil (outcomes) relatif dari dua atau lebih intervensi kesehatan (Tim Penyusun Buku Panduan Farmakoekonomi:2013).



Adapun jalur prosedur penelitian ini yaitu :



Adapun analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu Analisis Efektivitas Biaya (AEB) pada penggunaan obat Infeksi Saluran Kemih (ISK) pada pasien Rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji selama tahun 2015.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji merupakan salah satu rumah sakit rujukan pertama pada pasien dari daerah. Untuk bagian internal pada RSUD Labuang Baji itu sendiri saat ini belum memiliki spesialis bagian interna Infeksi Saluran Kemih (ISK). Pada proses pengambilan data pada penelitian ini terlebih dahulu kami melakukan observasi rumah sakit. Dan setelah kami mendapatkan izin dari pihak Rumah Sakit maka terlebih dahulu kami mendatangi bagian internal rawat jalan kemudian bagian internal rawat inap (bangsal) untuk mengambil data dan no rekam medik pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK) pada periode 2015.

Untuk jumlah keseluruhan pasien di RSUD Labuang Baji pada tahun 2015 yaitu 12.099. Data awal yang kami dapatkan di rawat inap jumlah pasien ISK di tahun 2015 yaitu 47 pasien akan tetapi setelah kami mengecek di bagian rekam medik maka data yang cocok hanya sebanyak 27 pasien. Dan jadi untuk prevalensi dari ISK sendiri hanya mengambil kuota 0,002 %. Dan perhitungan sampel minimal dan memenuhi kriteria inklusi yaitu 19 pasien. Dalam perhitungan sampel digunakan perhitungan deskriptik kategorik dengan diketahui prevalensi sampel akan tetapi kurang dari 20%. Untuk hasil 19 sampel tersebut merupakan hasil perkalian dari populasi dan prevalensi dari pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Makassar.

Penggunaan antibiotik pada pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK) di RSUD Labuang Baji tidak menggunakan guideline therapy, yaitu hanya menggunakan clinical guideline yaitu penggunaan antibiotik yang tersedia maka obat tersebut yang digunakan. Apalagi untuk pasien ISK sendiri untuk rawat inap bagian internal salah satunya Infeksi Saluran Kemih (ISK) hanya dapat mendapat perawatan medis hanya maksimal 7 hari dan apabila tingkat penyakitnya memerlukan penanganan yang serius maka akan di rujuk ke Rumah sakit Umum (RSU) Wahidin.

Pada pasien ISK maka jaminan kesehatan yang banyak di gunakan yaitu BPJS. Pada pasien ISK untuk pembagian kelasnya sendiri untuk golongan obat untuk pembagian kelas/kategori BPJS yang mendominasi untuk pasien ISK yaitu BPJS kelas 3 yaitu sebanyak 9 kemudian BPJS kelas 2 yaitu 6 pasien dan BPJS kelas 1 sebanyak 4 pasien. Untuk jenis terapi yang diberikan untuk ciprofloxacin sendiri itu menggunakan 2 jenis pemberian yaitu secara oral dan injeksi. Sedangkan untuk cefadroxil semuanya menggunakan oral, akan tetapi untuk cefriaxon jenis pemberiannya melalui injeksi.

Untuk antibiotik yang digunakan pada pasien Infeksi saluran Kemih di RSUD Labuang Baji yaitu ciprofloxacin dengan menduduki urutan pertama yaitu 47%, kemudian Cefriaxon 32% dan cefadroxyl yaitu 21%. Angka di peroleh dengan melihat hasil dari bahwa pasien dari obat antibiotik Ciprofloxacin 9 orang, begitu pula dengan cefadroxil yang hanya 4 orang dan cefriaxon 6 orang. Untuk rata-rata lama rawat inap untuk pasien yang menggunakan antibiotik ciprofloaxacin yaitu 2 hari, untuk cefadroxil yaitu 3 hari dan untuk cefriaxon yaitu 4 hari. Untuk analisis biaya yang digunakan pada

pasien Pasien ISK yang pada antibiotik ciprofloxacin, Rp. 5.425.976 dengan rata-rata biaya Rp.602.886. Untuk cefadroxil biaya yang digunakan Rp. 4.788.595 dengan rata-rata biaya Rp. 982.119. Untuk cefriaxon biaya yang digunakan yaitu 6.867.682 dengan biaya rata-rata yaitu Rp. 1.144.614. Untuk analisis efektivitas dapat dilihat dari hasil perhitungan analisis efektivitas biaya dengan menghitung nilai REB untuk cefadroxil yaitu Rp. 4.676.75, untuk cefriaxon Rp. 3.576.918 dan ciprofloxacin yaitu Rp. 1.282.157. Jadi dapat di ketahui bahwa untuk pengobatan yang memiliki efektivitas dan efisiensi lebih baik yaitu ciprofloxacin kemudian cefriaxon lalu obat cefadroxil. Jadi dapat di ketahui bahwasanya untuk pengobatan yang memiliki efektivitas dan efisiensi lebih baik yaitu ciprofloxacin kemudian cefriaxon lalu obat cefadroxil. Tentu hal ini sangat sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Isra: 27-30 yang menjelaskan tentang perilaku hidup hemat.

Tafsir dari ayat ini yaitu Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku sederhana (hemat) dalam menjalani hidup ini akan tetapi mencela juga sifat kikir. Dalam ayat ini dikatakan bahwa janganlah kamu membelenggu tanganmu, maksudnya yaitu kita dilarang kikir, bakhil dan semacamnya karena sifat tersebut dapat merugikan kita sendiri. Kemudian dalam ayat ini juga dikatakan bahwa janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Maksudnya bahwa ketika kita ingin berinfak atau bersedekah maka kita harus melihat kapasitas kita karena jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Jadi inti dalam ayat ini yaitu kita diperintahkan untuk berlaku seimbang (pertengahan) jadi tidak kikir dan tidak boros pula. (Tafsir Ibnu Katsir Jilid I:2005)

Sehingga hal ini menjadi patokan kita sebagai umat Islam yang memiliki peran dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi pasien, agar pasien dapat sembuh dengan biaya yang lebih hemat tanpa pengurangi dari kualitas pelayanan medis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Biaya yang digunakan pasien pada antibiotik ciprofloxacin, Rp. 5.425.976 dengan rata-rata biaya Rp.602.886. Untuk cefadroxil biaya yang digunakan Rp. 4.788.595 dengan rata-rata biaya Rp. 982.119. Untuk cefriaxon biaya yang digunakan yaitu 6.867.682 dengan biaya rata-rata yaitu Rp. 1.144.614.
- b. Untuk analisis efektivitas dapat dilihat dari hasil perhitungan analisis efektivitas biaya dengan menghitung nilai REB untuk cefadroxil yaitu Rp. 4.676.75, untuk cefriaxon Rp. 3.576.918 dan ciprofloxacin yaitu Rp. 1.282.157. Jadi dapat diketahui bahwa untuk pengobatan yang memiliki efektivitas dan efisiensi lebih baik yaitu ciprofloxacin kemudian cefriaxon lalu obat cefadroxil. .

B. Saran

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut analisis utilitas biaya pada penggunaan antibiotik pada pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK) pada rumah sakit yang memiliki prevalensi pasien yang lebih banyak.

KEPUSTAKAAN

- Alan R Tumbelaka. *Evidence-based Medicine (EBM) Vol. 3, No. 4, Maret 2002: 247 - 248* Sari Pediatri, FKUI-RSCM, Jakarta, 2002
- Andriana Sari. *Identifikasi Potensi Interaksi Obat Pada Pasien Rawat Inap Penyakit Dalam Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Dengan Metode Observasional Retrospektif Periode November 2007-Januari 2008*, Purwokerto. 2008
- Anonim. *Farmakologi dan Terapi*. edisi 5, Departemen Farmakologi Terapeutik, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia. 2007.
- Aslam, M., Tan. CK., Prayitno. A.,. *Farmasi Klinis : Menuju Pengobatan Rasional dan Penghargaan Pilihan Pasien.*, Penerbit PT Elex Media Kompusindo Kelompok Gramedia. Jakarta. 2007
- Asmah Useng, *Analisis penggunaan Antibiotika pada Pasien Infeksi Saluran Kemih berdasarkan Evidence Based Medicine (EBM) di Rumah Sakit X periode januari-Juni 2013*, Surakarta, 2014
- Aviv Triono. *Efektifitas Antibiotik Golongan Sefalosporin dan Kuinolon terhadap Infeksi Saluran Kemih*, Yogyakarta. 2014
- Baxter, K., 2008. *Stockley's Drug Interactions. 8th Edition*. London: The Pharmaceutical Press.
- Cippole, R.. J; Strand, L.M, Morley, P.C; *Pharmaceutical Care Practice*, The Me Graw Hill companies. 1998
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Depag RI. 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: PT. Syamil. 2010.
- F.H. Kayser *et al. Medical Microbiology*. New York. Thieme. 2010
- Farida, Helmia., dkk. *Penggunaan Antibiotik Secara Bijak Untuk Mengurangi Resistensi Antibiotik*. Semarang: Studi Intervensi di Bagian Kesehatan Anak RS Dr. Kariadi. 2008.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia *Obat Dan Pengobatan*. Jakarta: 2013
- FDA. *Food and Drug Administration, Title 21: Food and Drugs: Medical Devices*, Washington, DC. 2004.
- Fergiawan. *Identifikasi Pola Kepekaan dan Jenis Bakteri pada Pasien Infeksi Saluran*
- Gay, L.R. dan Diehl, P.L., *Research Methods for Business and Management*, MacMillan Publishing Company, New York. 1992
- Ginting Yosia. *Antimicrobial Usage of UTIs in Elderly in Abstracts Book 8th*. Jakarta : Divisi penyakit tropis dan Infeksi IPD-RSCM, 2007
- Hamita APT, Maksum Hadri. *Buku Ajar Analisa Hayati*. Jakarta: EGC. 2012.

- Hansen, Heimgartner dan Linden A. *Identification Reaction*. Zurich: UoZ Press. . 2002
- Henry F. Chambers. *Senyawa Antimikroba. Goodman and Gilman Dasar-dasar Farmakologi Terapi Edisi 10*. Jakarta: EGC. 2011.
- Henry. *Jenis-Jenis Drug Related Problems*. Jakarta: Indeks. 2010
- Irene Yuniar. *Evaluasi Penggunaan Antibiotik dengan Kartu Monitoring Antibiotik Gyssens*, Jakarta 2013 Sari Pediatri, Vol. 14, No. 6, April 2013
- Irianto, Koes. *Drug Related Problems*. Jakarta: Panduan Medis dan Klinis. 2013
- Istiantoro, Y.H, dan Gan. V.G.H.,. *Penisilin, Sefalosporin dan Antibiotik Betalaktam lainnya dalam Farmakologi dan Terapi*. Edisi kelima. Editor Sulistia G. Ganiswara. Jakarta. 2007
- Katzung, B.G, *Farmakologi Dasar dan Klinik*, , Buku III, sixth edition, Jakarta. Penerbit Salemba Medika. 2004
- Kemih di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta*, Yogyakarta. 2012
- Kurnia Dewi. *Drug Therapy Problems Pada Pasien Yang Menerima Resep Polifarmasi*, Surabaya, 2014.
- Lin, P. *Drug Interaction and Polypharmacy in the Elderly*. Canada: The Canadian Alzheimer Disease Review. 2003.
- Lumbanbatu, S.M.,: *Bakteriuria Asimtomatik pada Anak Sekolah Dasar Usia 9-12 Tahun*. Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara: 2003
- M. Grabe., et al. *Guidelines on Urological Infections*. Eropa: European Association of Urology. 2015.
- M.K. Lalitha. *Manual on Antimicrobial Susceptibility Testing*. Christian Medical College. Vellore, Tamil Nadu. 2011.
- Nguyen H.T. Bacterial Infection of the Genitourinary Tract In : Tanagho E.A., McAninch J.W. Editors: *Smith's General Urology*. . Singapore: McGraw-Hill Companies. 2004
- Pamela, D.S. *Evaluasi Kualitatif Penggunaan Antibiotika Dengan Metode Gyssens di Ruang Kelas 3 Infeksi Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM Secara Prospektif*. Tesis. Jakarta: Fakultas Farmasi UI. 2011.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta: *Tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik*. 2011.
- Pharmaceutical Care Network Europe Foundation.. *Classification for Drug related problems*. The Netherlands : PCNE. 2006
- Rovers, J.P., Curie, J.D., Hagel, H.P., McDonough, R.P., Sobotka, J.L., , *A Practical Guide To Pharmaceutical Care*, American Pharmaceutical Association, Washington DC, 2003
- Rusdijas., Ramayati, R. *Infeksi Saluran Kemih Dalam*. Jakarta: IDAI. 2002.

- Ruths S, Viktil, Blix.. *Classification of drug-related problems*. The Journal of the Norwegian Medical Association. Tidsskr Nor Lægeforen; 2007
- Shargel, L. dan Yu.. *Biofarmasetika dan Farmakokinetika Terapan*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005
- Shihab, M. Quraish. 2009. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 3. Jakarta: Lentera Hati.
- Shirly Kumala. Uji kepekaan bakteri yang diisolasi dari urin penderita Infeksi Saluran Kemih (ISK) terhadap beberapa antibiotika pada periode Maret-Juni 2008. Jakarta. 2009
- Stockley, I.H., , *Stockley's Drug Interaction*, Eighth Edition Pharmaceutical Press, London. 2008
- Sudung O. Pardede. *Konsensus Infeksi Saluran Kemih Pada Anak*. Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). 2011.
- Sukandar, E, *Infeksi Saluran Kemih Pasien Dewasa. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, Jilid I*. Jakarta: Balai Penerbit FK UI. 2004
- Tatro, D.S., *Drug Interaction Facts*, 6th Edition, Facts & Comparison A Wolters Kluwers Company. 2001.
- Tessy A, Ardayo, Suwanto. *Infeksi saluran kemih dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta : Balai Penerbit FKUI; 2001.
- Tjay, T.H., dan Rahardja, K. *Obat-Obat Penting*. Edisi V. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2002 .
- Utami Mega. *Analisis Potensi Interaksi Obat Antidiabetik Oral Pada Pasien Di Instalasi Rawat Jalan Askes Rumah Sakit Dokter Soedarso Pontianak Periode Januari- Maret 2013*, Pontianak, 2013
- Wiratna, Sujarweni, *SPSS untuk Paramedis*, Yogyakarta; Penerbit Gava Media. 2012
- Wisa Khaoirunnisa. *Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada pasien Infeksi Saluran Kemih Rawat Inap di rumah sakit X Jepara Pada Tahun 2011 Menggunakan Metode ATC/DDD*, Surakarta, 2012.

A. Data SPSS

```

DATASET ACTIVATE DataSet0.
SAVE OUTFILE='C:\Users\Windows7\Documents\analisis ani spss.sav'
/COMPRESSED.
FREQUENCIES VARIABLES=KLS_BPJS SED JK USIA LAMA JENIS
/STATISTICS=MEAN MEDIAN
/BARCHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.
    
```

Frequencies

Notes	
Output Created	06-JUN-2016 00:48:58
Comments	
Data	C:\Users\Windows7\Documents\analisis ani spss.sav
Active Dataset	DataSet0
Filter	<none>
Weight	<none>
Split File	<none>
N of Rows in Working Data	19
File	
Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
Missing Value Handling	Statistics are based on all cases with valid data.
Cases Used	FREQUENCIES VARIABLES=KLS_BPJS SED JK USIA LAMA JENIS /STATISTICS=MEAN MEDIAN /BARCHART PERCENT /ORDER=ANALYSIS.
Syntax	
Processor Time	00:00:01,15
Resources	Elapsed Time 00:00:01,22

[DataSet0] C:\Users\Windows7\Documents\analisis ani spss.sav

Statistics

		pembagian kelas BPJS	Sediaan	jenis kelamin	usia pasien	lama pengobatan
N	Valid	19	19	19	19	19
	Missing	0	0	0	0	0
Mean					38,84	3,16
Median					41,00	3,00

Statistics

		jenis obat
N	Valid	19
	Missing	0
Mean		
Median		

Frequency Table

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

pembagian kelas BPJS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BPJS 1	4	21,1	21,1	21,1
	BPJS 2	6	31,6	31,6	52,6
	BPJS 3	9	47,4	47,4	100,0
	Total	19	100,0	100,0	

Sediaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Oral	11	57,9	57,9	57,9
Injeksi	6	31,6	31,6	89,5
oral dan injeksi	2	10,5	10,5	100,0
Total	19	100,0	100,0	

jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki-laki	8	42,1	42,1	42,1
perempuan	11	57,9	57,9	100,0
Total	19	100,0	100,0	

usia pasien

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 17	1	5,3	5,3	5,3
18	1	5,3	5,3	10,5
24	1	5,3	5,3	15,8
29	1	5,3	5,3	21,1
32	1	5,3	5,3	26,3
33	1	5,3	5,3	31,6
35	1	5,3	5,3	36,8
38	1	5,3	5,3	42,1
39	1	5,3	5,3	47,4
41	1	5,3	5,3	52,6
43	2	10,5	10,5	63,2

46	2	10,5	10,5	73,7
47	1	5,3	5,3	78,9
50	1	5,3	5,3	84,2
52	2	10,5	10,5	94,7
53	1	5,3	5,3	100,0
Total	19	100,0	100,0	

lama pengobatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	5,3	5,3	5,3
2	7	36,8	36,8	42,1
3	4	21,1	21,1	63,2
Valid 4	4	21,1	21,1	84,2
5	2	10,5	10,5	94,7
7	1	5,3	5,3	100,0
Total	19	100,0	100,0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

jenis obat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ciprofloxacin	9	47,4	47,4	47,4
cefriaxon	6	31,6	31,6	78,9
cefadroxil	4	21,1	21,1	100,0
Total	19	100,0	100,0	