

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL DENGAN
ANEMIA PADA TRIMESTER II
(Literature Review)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Jurusan Kebidanan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

DEFIRA RAHMADANI

NIM. 70400117062

PROGRAM STUDI KEBIDANAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEFIRA RAHMADANI
Nim : 70400117062
TTL : Takalar, 18 Desember 1999
Jurusan/Prodi : Kebidanan (D3)
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata, Gowa
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Anemia
Pada Trimester II (*Literatre Review*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa,

Penulis

DEFIRA RAHMADANI
70400117062

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Defira Rahmadani
Nim : 70400117062
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal dengan Anemia Pada Trimester II (*Literatur Review*).

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam Seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 05 Maret 2020


Pembimbing I



Firdavanti, S.SiG, M.Keb

NIP: 19751113 200604 2 001

Pembimbing II



Dr. dr. Nadvah, M.Kes

NIP : 19790417 200801 2 018

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Anemia Pada Trimester II (*Literature Review*)". Yang disusun oleh Defira Rahmadani Nim: 70400117062, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 05 Maret 2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Sarafa, 05 Maret 2021
21 Rajab 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatrah, Sp.A., M.Kes (.....)

Sekretaris : Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST., M.Keb (.....)

Pembimbing I : Firdayanti, S.SiT., M.Keb (.....)

Pembimbing II : Dr. dr. Nadyah, M.Kes (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb (.....)

Penguji II : Dr. Sabir Maidin, M.Th.I (.....)

Diketahui oleh:



Dr. dr. Syatrah, Sp.A., M.Kes
Nip. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Berkat ridho dan inayah-Nya karya tulis yang berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Anemia Pada Trimester II (*Literature Review*) Tahun 2021**” dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Penyusunan Literatur Review ini penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian. Oleh karena itu masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Kasih sayang dan penghormatan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ibunda Syahriani Syam dan ayahanda Mapparessa yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, bimbingan dan pelajaran hidup yang begitu besar untuk saya dan juga kepada saudara-saudara tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan material selama masa studi serta kepada semua keluarga yang telah mendoakan dan memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penyusunan Literatur Review ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam negeri Makassar.
2. Kepada Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp(A), M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar.
3. Ibunda Firdayanti, S.SiT., M.Keb selaku ketua prodi kebidanan sekaligus sebagai pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya membantu, membimbing, dan memberi saran dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
4. Ibu Dr. dr. Nadyah, M.Kes selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu demi membimbing serta memberikan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan Literatur Review.
5. Ibu Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT, SKM., M.Keb selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Literatur Review.
6. Bapak Dr. Sabir Maidin, M.Th.I selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Literatur Review.
7. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
8. Kepada para saudariku Reski Ayu Awalia dan Sri Amalisa Kirani yang selalu mengerti dan memberikan dukungan serta menjadi penghibur pada saat saya berada pada masa-masa tersulit.

9. Kepada sahabat-sahabat saya selama menjalani studi yang telah memberikan warna selama berada dibangku perkuliahan serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal baik di sisi Allah SWT.


Akhir kata penulis berharap semoga Literatur Review ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagian kesehatan.

Samata, 1 Maret 2021

Penulis

DEFIRA RAHMADANI

NIM. 70400117062



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penulisan	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan	11
1. Definsi Kehamilan	11
2. Tanda Kehamilan	12
3. Perubahan Anatomi dan Fisiologi Pada Ibu Hamil	17
4. Kebutuhan Gizi Pada Ibu Hamil	23
B. Tinjauan Umum Tentang Anemia Dalam Kehamilan	30
1. Pengwertian Anemia	30
2. Etiologi	31
3. Tanda dan Gejala	32
4. Klasifikasi	33
5. Derajar Anemia	36
6. Faktor Resiko Dalam Kehamilan	37

7. Gejala Klinis Anemia Kehamilan	37
8. Dampak Anemia Pada Kehamilan	39
9. Patofisiologi	40
10. Pencegahan Anemia Dalam Kehamilan	41
11. Penanganan Anemia Dalam Kehamilan	42
C. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Anemia	44
D. Tinjauan umum Tentang Antenatal Care (ANC)	45
E. Standar Asuhan Kebidanan	50
F. Tinjauan Kehamilan Tentang Pandangan Islam	52
G. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	55
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan	55
2. Tahapan Dalam Manajemen Kebidanan	55
BAB III TELUSURAN EVIDANCE BACED LEARNING	68
A. Matriks Langkah I : Identifikasi Data Dasar	68
B. Matriks Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual	76
C. Matriks Langkah III: Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial	87
D. Matriks Langkah IV: Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi	98
E. Martiks Langkah V: Rencana Asuhan Kebidanan	107
F. Matriks Langkah VI: Implementasi Asuhan Kebidanan	114
G. Martiks Langkah VII: Evaluasi Asuhan Kebidanan	120
BAB IV PEMBAHASAN	126
A. Pembahasan Hasil Telaah Evidance Based Asuhan 7 langkah	126
1. Langkah I : Identifikasi Data Dasar	126
2. Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual	130
3. Langkah III: Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial	131
4. Langkah IV: Perlunya Tindakan Emergency/Kolaborasi	133
5. Langkah V: Rencana Asuhan Kebidanan	135
6. Langkah VI: Implementasi Asuhan Kebidanan	138
7. Langkah VII: Evaluasi Asuhan Kebidanan	139
B. Implikasi Kebidanan	141
BAB V PENUTUP	143

A. Kesimpulan	143
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	145



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Gambaran Anemia 41



ABSTRAK

**JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
LITERATUR REVIEW, FEBRUARI 2021**

Nama : Defira Rahmadani
NIM : 70400117062
Pembimbing 1 : Firdayanti,
Pembimbing 2 : Nadyah
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Anemia Pada Trimester II (Literature Review)

Anemia pada kehamilan adalah keadaan dimana ibu memiliki kadar Hb <11,00 g/dl pada trimester pertama dan ketiga serta kadar Hb <10,5 g/dl pada trimester kedua. Ibu hamil yang mengalami anemia di Indonesia dengan kadar hemoglobin (Hb) di bawah 11 g/dl sebanyak 30%, dan kadar Hb di bawah 7 g/dl sebanyak 0,5%.

Metode yang digunakan yaitu Literatur Review, yang dibuat dengan cara mengumpulkan beberapa referensi. Kemudian penulis menggabungkan setiap referensi berdasarkan Evidence Based Asuhan 7 Langkah Varney.

Berdasarkan dari banyaknya referensi yang saya dapatkan tanda dan gejala anemia pada ibu hamil antara lain pusing, rasa lemah, kulit pucat, mata berkunang-kunang, adanya luka pada lidah, nafsu makan berkurang, konsentrasi berkurang atau bahkan hilang, napas pendek dan keluhan mual muntah. Sedangkan untuk mendiagnosis anemia pada ibu hamil ditegakkan melalui pengukuran kadar hemoglobin dalam darah ibu.

Kesimpulan dari Literature Review ini berdasarkan dari berbagai referensi yang didapatkan yaitu melakukan penatalaksanaan pada pasien yang mengalami anemia dengan memberikan edukasi terkait kebutuhan gizi selama kehamilan. Pasien dianjurkan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi, asam folat, vitamin, dan protein. Makanan rendah lemak dan garam seperti telur, daging, ikan segar. Selama masa kehamilan minimal diberikan 90 tablet sampai 42 minggu setelah melahirkan, diberikan sejak pemeriksaan ibu hamil pertama. Setiap satu kemasan tablet besi terdiri dari 30 tablet.

Kata kunci : Kehamilan, Anemia, 7 Langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT UIN ALAUDDIN MAKASSAR LITERATURE REVIEW, FEBRUARY, 2021

Name : Defira Rahmadani
Reg. Number : 70400117062
Supervisor 1 : Firdayanti
Supervisor 2 : Nadyah
Title : Antenatal Midwifery Care Management on Trimester II Patients with the case of Anemia during Pregnancy (A Literature Review)

Anemia in pregnancy is a condition where the mother has an Hb level of less than 11.00 g/dl in the first and third trimesters and an Hb level of less than 10.5 g / dl in the second trimester. In Indonesia, there were around 30% of pregnant women who experienced the hemoglobin (Hb) levels of below 11 g/dl, and there were around 0.5% of pregnant women who experienced the hemoglobin (Hb) levels of below 7 g/dl.

The methodological approach taken in this research was a literature review. The data of this research were collected through various related references. The analysis was conducted by comparing the information from the selected articles where evidence-based research approach and 7 stages of Varney management approach were employed.

Based on the analysis, it was evident that a number of symptoms could be recognized in order to identify the case of anemia in pregnant women. Those symptoms include dizziness, weakness, pale skin, lightheaded eyes, sores on the tongue, the decrease of appetite, the lost of concentration, the shortness of breath, and nausea and vomiting. The diagnosis of anemia in pregnant women could be done by conducting the measurement on hemoglobin levels in patients' blood.

This research concluded that based on the analysis on various related references, it was apparent that the pregnant patients with anemia should be informed on the importance of maintaining the nutritional status during pregnancy. Pregnant patients with anemia are suggested to consume foods that contain lots of iron, folic acid, vitamins, and protein. The low- fat and salt foods such as eggs, meat, fresh fish are also highly recommended. During pregnancy, 90 tablets of anemia medication are prescribed and to be consumed regularly. The consumption of the medicine should be continued until 42 weeks after the delivery.

Key words: *Pregnancy, Anemia, 7-stages of Varney*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan merupakan fertilisasi atau bertemunya sel telur (Ovum) wanita dengan sel benih (Spermatozoa) pria. Penyatuan dari spermatozoa dan ovum dilanjutkan dengan pembelahan sel maka akan terjadi nidasi atau implantasi pada lapisan endometrium dinding kavum uteri. Pertumbuhan dan perkembangan zigot-embrio-janin menjadi bakal individu baru (Setiawati, 2013)

Anemia pada kehamilan merupakan permasalahan kesehatan di negara-negara dunia, baik negara maju maupun yang berkembang. Menurut WHO tahun 2011, presentase ibu hamil yang mengalami anemia di dunia adalah 38,2% dari populasi, di Asia Tenggara presentasi ibu hamil yang mengalami anemia adalah 48,7% dan sekitar 1,1% diantaranya mengalami anemia berat.

Di Indonesia, anemia pada ibu hamil masih merupakan permasalahan yang serius, dilihat dari data WHO tahun 2011, presentase ibu hamil yang mengalami anemia di Indonesia dengan kadar hemoglobin (Hb) di bawah 11 g/dl adalah 30%, dan kadar Hb di bawah 7 g/dl adalah 0,5%. Berdasarkan data WHO tersebut anemia pada ibu hamil di Indonesia diklasifikasikan dalam level sedang, di mana kejadian anemia pada ibu

hamil ini masih harus dieradikasi (Wirahartari, Herawati and Wandu, 2019).

Kasus ibu hamil di Nepal didapatkan insiden anemia pada ibu hamil terbanyak pada rentang usia 20-35 tahun yaitu 61,4%. Hal ini terkait dengan umur 20-35 tahun. Salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian anemia pada umur reproduktif sehat dan kehamilan banyak terjadi pada umur 20-35 tahun. Salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian anemia pada umur reproduktif adalah jarak kehamilan yang pendek (Kurang dari 2 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ibu hamil pada umur reproduksi sehat namun dengan jarak kehamilan yang pendek akan meningkatkan resiko anemia dibandingkan jarak kehamilan ideal (Udayana et al. 2019).

Profil Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan mencatat angka kejadian anemia pada ibu hamil tahun 2018 sebanyak 60,15% (Dinas Kesehatan 2018). Berdasarkan data yang diambil dari Puskesmas Batua Makassar dari tahun 2017 terdapat 98 orang ibu hamil yang mengalami Anemia selama hamil dari 760 ibu yang melakukan kunjungan antenatal. Pada tahun 2018 terdapat 106 orang ibu hamil yang mengalami Anemia selama hamil dari 811 ibu yang melakukan kunjungan antenatal. Dan pada tahun 2019 terdapat 114 ibu hamil yang menderita anemia dari 804 ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal (Data sekunder Puskesmas Batua Makassar, 2019).

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur status kesehatan ibu pada suatu wilayah. Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI Indonesia sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan target *Millenium Development Goals* (MDG's) adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Angka Kematian di Indonesia yang dihitung secara nasional merupakan gambaran Angka Kematian Ibu dari seluruh Provinsi di Indonesia. Meski diakui bahwa AKI di setiap provinsi tidak sama. Ada beberapa yang sangat menonjol, terutama daerah dengan kepadatan penduduk yang besar dan daerah dengan jangkauan fasilitas kurang oleh karena merupakan daerah terpencil (Firdayanti 2014).

Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Hasil Riskesdes 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan

kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri (Purwaningtyas and Prameswari, 2017).

Salah satu faktor penyebab masih tingginya defisiensi besi pada ibu hamil adalah rendahnya kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet Fe. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) tahun 2013 menunjukkan bahwa mengonsumsi tablet Fe selama kehamilan di Indonesia sebesar 89,1% ibu hamil yang mengonsumsi selama 90 hari kehamilan sebesar 33,3%. Ibu hamil yang mengonsumsi tablet Fe kurang dari 90 hari kehamilan sebesar 34,4% dan sebesar 21,4% yang tidak mengonsumsi table Fe (Kadir, 2019).

Salah satu penyebab yang dapat mempercepat terjadinya anemia pada wanita adalah jarak kehamilan pendek. Jarak kehamilan yang baik minimal 2 tahun menjadi sangat penting untuk diperhatikan sehingga tubuh ibu siap untuk menerima janin kembali. Jarak kehamilan yang kurang dari 24 bulan atau 2 tahun memungkinkan kondisi ibu belum pulih, sehingga zat besi yang ada di dalam tubuhnya terbagi untuk pemulihan tubuhnya dan kebutuhan selama kehamilan berikutnya (Tanzihah. Utama and Rosmiati, 2016).

Usia ibu diketahui dapat menjadi penyebab terjadinya anemia pada masa kehamilan. Usia ibu yang ideal dalam kehamilan yaitu pada kelompok usia 20-35 tahun pada usia tersebut resiko komplikasi dalam

kehamilan lebih kecil, serta memiliki reproduksi yang sehat, usia <20 tahun berisiko anemia sebab perkembangan biologis yaitu reproduksi belum optimal. Usia di atas 35 tahun merupakan kehamilan yang berisiko tinggi, wanita hamil dengan umur di atas 35 tahun juga akan rentan anemia (Ariyani, 2016).

Ibu yang mengalami anemia proporsi pada kelompok kasus lebih banyak yaitu sebesar 70%. Hasil uji *chi square* didapatkan bahwa anemia pada ibu saat hamil sebagai faktor risiko kejadian BBLR ($p=0.001$), sedangkan nilai OR membuktikan bahwa ibu yang mengalami anemia 9 kali lebih berisiko melahirkan bayi dengan BBLR dibanding dengan ibu yang tidak mengalami anemia pada saat hamil (Haryanti, 2019).

Suplemen untuk peningkatan darah yang diberikan selama kehamilan adalah setidaknya 90 tablet. Suplemen penambah darah harus diminum sebelum tidur untuk mencegah mual muntah dan penyerapan akan lebih baik jika dikonsumsi dengan vitamin C, seperti jus jeruk dan jus jambu biji. Dari konseling, ibu hamil akan meningkatkan pengetahuan mereka tentang pentingnya gizi selama kehamilan, sehingga mereka akan sadar konsumsinya gaya dan risiko anemia dapat dicegah meskipun anemia gravidarum sering terjadi pada ibu hamil (Andriani, Respati, and Astirin. 2016).

Menurut penelitian Ikeanyi dan Ibrahim (2015) menyarankan bahwa kualitas tinggi ANC adalah tindakan signifikan untuk mencegah anemia. Layanan perawatan antenatal bertujuan untuk mengidentifikasi

secara dini segala kemungkinan kelainan atau komplikasi selama kehamilan termasuk anemia. Pemerintah menetapkan bahwa wanita hamil harus mengunjungi layanan kesehatan untuk perawatan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan. Namun, jumlah kunjungan ANC di Indonesia menurun dari 87,48% pada 2015 menjadi 85,35% pada 2016 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Berdasarkan data di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Anemia Pada Trimester II”.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Karya Tulis Ilmiah ini meliputi Manajemen asuhan kebidanan Antenatal dengan Anemia pada Trimester II

1. Apa saja tanda gejala Anemia dalam kehamilan?
2. Apa saja data pendukung anamnesa ibu hamil dengan anemia?
3. Apa saja komplikasi yang dapat timbul ibu hamil dengan anemia?
4. Bagaimana tindakan segera yang dapat dilakukan bidan serati tindakan kolaborasi yang dilakukan dengan Tenaga kesehatan yang lain?
5. Apa saja perencanaan yang dapat dilakukan pada ibu hamil dengan anemia?
6. Apa saja implementasi tindakan pada ibu hamil dengan anemia?
7. Apa saja evaluasi yang dilakukan pada ibu hamil dengan anemia?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk :

1. Tujuan umum

Mampu menyusun literature review pada ibu hamil yang mengalami anemia pada Trimester II melalui pendekatan manajemen kebidanan 7 langkah varney sesuai dengan wilayah kerja Bidan.

2. Tujuan khusus

Adapun tujuan penulisan Literatur Review Asuhan Kebidanan Antenatal dengan anemia pada Trimester II adalah :

- a. Didapatkannya data Subjektif dan data Objektif dari tanda dan gejala dari berbagai referensi tentang ibu hamil dengan anemia pada Trimester II.
- b. Didapatkannya hasil rumusan diagnosis dari berbagai referensi tentang ibu hamil dengan anemia pada Trimester II.
- c. Didapatkannya informasi komplikasi yang biasa timbul dari berbagai referensi pada ibu hamil dengan anemia pada Trimester II.
- d. Didapatkannya informasi dari berbagai referensi tentang kondisi emergensi yang dapat terjadi serta penanganannya pada ibu hamil dengan anemia pada Trimester II.
- e. Didapatkannya simpulan dari berbagai referensi tentang intervensi apa saja penatalaksanaan yang tepat pada ibu hamil dengan anemia pada Trimester II.

- f. Didapatkannya penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan ke implementasi asuhan ibu hamil yang mengalami anemia pada Trimester II.
- g. Dididapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber kondisi yang menjadi dasar evaluasi pada Ibu hamil dengan anemia pada Trimester II.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian pada kasus ini yaitu :

1. Manfaat praktis

Sebagai salah satu persyaratan dalam mennyelesaikan ujian akhir program Diploma Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Manfaat Ilmiah

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumber informasi, menambah pengetahuan serta sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

3. Manfaat bagi Institusi

Diharapkan Literatur Review ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi institusi pendidikan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya.

4. Manfaat bagi penulis

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis dalam penerapan Asuhan Kebidanan Antenatal dengan Anemia Pada

Trimester II. Penulisan ini juga merupakan pengalaman yang berharga karena dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal dengan Anemia pada Trimester II.

5. Manfaat bagi pembaca

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal dengan Anemia Pada Trimester II

E. Metode Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, metode yang digunakan adalah Penulis mempelajari buku-buku, literatur, dan media internet yang berhubungan dengan Anemia pada ibu hamil.

F. Sistematika penulisan

HALAMAN JUDUL
 HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI
 1qaHALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH
 HALAMAN PENGESAHAN
 KATA PENGANTAR
 DAFTAR ISI
 DAFTAR TABEL
 DAFTAR GAMBAR
 DAFTAR SINGKATAN
 DAFTAR ISTILAH
 DAFTAR LAMPIRAN
 ABSRAK
BAB I PENDAHULUAN
 A. Latar belakang
 B. Rumusan Masalah
 C. Manfaat Penulisan

- D. Metode Penulisan
- E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan
- B. Tinjauan Umum Tentang Anemia
- C. Proses manajemen kebidanan

BAB III TELUSURAN *EVIDANCE BASED LEARNING*

- A. Matriks Langkah I
- B. Matriks Langkah II
- C. Matriks Langkah III
- D. Matriks Langkah IV
- E. Matriks Langkah V
- F. Matriks Langkah VI
- G. Matriks Langkah VII

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Pembahasan Hasil telaah Evidance Based Asuhan 7 langkah Varney berdasarkan Hasil penelusuran Referensi
- B. Implikasi Kebidanan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Umum Tentang Kehamilan*

1. Definisi Kehamilan

- a. Kehamilan adalah pembuahan ovum oleh spermatozoa, sehingga mengalami nidasi pada uterus dan berkembang sampai kelahiran janin (Pratiwi, 2018).
- b. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah bukan proses patologi tetapi kondisi normal dapat menjadi patologi/abnormal (Jannah Nurul, 2012).
- c. Kehamilan adalah masa dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi menjadi 3 triwulan pertama dimulai sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulan ke-4 sampai ke-6, triwulan ketiga dari bulan ke-7 sampai 9 bulan (Pudiastuti, 2012).

Menurut Saifuddin, masa kehamilan yaitu dimulai dari konsepsi sampai lamanya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir (Nadyah, 2013).

2. Tanda kehamilan

Tanda-tanda kehamilan adalah sekumpulan tanda atau gejala yang timbul pada wanita hamil dan terjadi akibat adanya perubahan fisiologis dan psikologis pada masa kehamilan (Jannah Nurul, 2012)

Terjadinya kehamilan dapat dikenali melalui tanda-tanda dan gejala secara garis besar terbagi menjadi tanda-tanda tidak pasti, tanda-tanda kemungkinan, dan tanda-tanda pasti (Pratiwi, 2018)

a. Tanda tidak pasti (*Presumptive Sign*)

1) Amenorea

Seorang perempuan yang sudah menikah, apabila mengeluhkan terlambat datang bulan, biasanya muncul asumsi bahwa perempuan tersebut hamil. Akan tetapi, sebetulnya terdapat faktor lain yang memengaruhi keterlambatan datang bulan seperti mengonsumsi obat-obatan, stress atau tertekan, penyakit kronis yang diderita dan sebagainya (Pratiwi, 2018)

2) Mual dan muntah

Mual dan muntah merupakan gejala umum. Pengaruh estrogen dan progesteron terjadi pengeluaran asam lambung yang berlebihan dan menimbulkan mual dan muntah yang terjadi terutama pada pagi hari yang disebut dengan *morning sickness*. Dalam batas tertentu hal ini masih fisiologis, tetap bila

terlampau sering dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang disebut *hiperemesis gravidarum* (Jannah, 2012).

3) Mastodinia

Salah satu gejala kehamilan adalah payudara terasa kencang dan sakit akibat membesar, yang disebut juga dengan mastodinia. Hormon estrogen dan progesteron berperan dalam hal ini, diantaranya vaskularisasi bertambah dan sinus dan duktus berproliferasi.

4) Keluhan kencing

Desakan rahim ke depan menyebabkan kandung kemih cepat terasa penuh dan sering kencing. Frekuensi kencing yang sering, terjadi pada trimester pertama akibat desakan uterus terhadap kandung kemih. Pada trimester kedua umumnya keluhan ini akan berkurang karena uterus yang membesar keluar dari rongga panggul. Pada trimester ketiga, gejala bisa timbul karena janin mulai masuk ke rongga panggul dan menekan kembali kandung kemih.

5) Konstipasi

Hormon progesteron berpengaruh terhadap gerakan peristaltik usus sehingga tidak jarang seorang ibu hamil mengalami kesulitan untuk buang air besar (BAB).

6) Hiperpigmentasi kulit

Pigmentasi kulit terjadi pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu. Terjadi akibat pengaruh hormon kortikosteroid plasenta yang merangsang melanofor dan kulit. Perubahan ini antara lain cloasma yakni warna kulit yang kehitam-hitaman pada dahi, punggung hidung dan kulit daerah tulang pipi. Pada dinding perut terdapat striae livied/gravidarum, striae nigra, linea alba.

7) Perubahan berat badan

Perubahan berat badan semata tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk mendeteksi kehamilan. Pada kehamilan 2-3 bulan justru akan terlihat bawa berat badan menurun. Hal ini karena mual muntah menyebabkan hilangnya nafsu makan. Namun, pada bulan berikutnya, seiring dengan mual muntah yang semakin berkurang, berat badan akan selalu meningkat sampai stabil menjelang persalinan. (Arantika dan Fatimah, 2018)

8) Varises atau penampakan pembuluh darah vena

Pengaruh estrogen dan progesteron menyebabkan pelebaran pembuluh darah terutama bagi wanita yang mempunyai bakat. Varises terjadi disekitar genetalia eksterna, kaki dan betis serta payudara. Penampakan pembuluh darah ini dapat hilang setelah persalinan.

b. Tanda kemungkinan hamil

Tanda kemungkinan hamil adalah perubahan-perubahan yang diobservasi oleh pemeriksa (bersifat obyektif), namun berupa dugaan kehamilan saja. Makin banyak tanda-tanda yang mungkin kita dapati, makin besar kemungkinan kehamilan.

1) Tanda hegar

Pada minggu ke-6, terlihat adanya pelunakan pada daerah isthmus uterus sehingga segmen di bawah uterus terasa lembek atau tipis saat diraba.

2) Tanda Chadwicks

Keadaan vagina berwarna kebiru-biruan yang dialami ibu hamil sekitar minggu ke-6 karena mengalami kongesti.

3) Tanda *Piscacec's*

Bagian uterus yang berada di dekat implantasi plasenta mengalami pertumbuhan yang tidak simetris.

4) Kontraksi Braxton His

Bila diberi stimulus atau rangsangan, uterus akan berkontraksi. Hal ini merupakan tanda khas pada uterus pada masa kehamilan.

5) Tanda Goodell's

Tanda ini diketahui melalui pemeriksaan bimanual, bagian serviks tampak lebih lunak. Seorang perempuan yang menggunakan kontrasepsi oral dapat terkena dampak ini.

6) Tanda Mc Donald

Fundus uteri dan serviks dapat difleksikan satu sama lain dengan mudah. Hal ini juga tergantung pada lunak atau tidaknya jaringan isthmus.

7) Terjadi pembesaran abdomen

Setelah minggu ke-16, tampak terjadi pembesaran abdomen atau perut. Hal ini karena uterus telah keluar dari rongga pelvis dan menjadi organ rongga perut.

8) Kontraksi uterus

Tanda kontraksi uterus akan timbul belakangan. Biasanya ibu hamil akan mengeluhkan perutnya terasa kencang, tetapi tidak muncul rasa sakit.

c. Tanda-tanda Pasti Hamil

1) Denyut Jantung Janin (DJJ)

Denyut jantung janin secara obyektif dapat diketahui oleh pemeriksa dan dapat didengar dengan stetoskop *leanec* pada minggu 18-20 minggu, pada orang gemuk, lebih lambat. Dengan sistem Doppler pada kehamilan usia kehamilan 12 minggu.

2) Terasa gerakan janin

Gerakan janin pada primigravida dapat dirasakan oleh ibu pada kehamilan 18 minggu. Sedangkan pada multigravida pada kehamilan 16 minggu karna telah berpengalaman dari

kehamilan terdahulu. Pada bulan ke IV dan V janin itu kecil jika dibandingkan dengan banyaknya air ketuban, maka kalau rahim didorong atau digoyangkan, maka anak melenting di dalam rahim. Gerakan janin dapat dirasakan dengan jelas setelah minggu 24.

3) Teraba bagian-bagian janin

Bagian-bagian janin secara obyektif dapat diketahui oleh pemeriksa dengan cara palpasi menurut Leopold pada akhir trimester kedua (Jannah Nurul, 2012).

3. Perubahan Anatomi dan Fisiologi Pada Ibu Hamil

a. Perubahan sistem reproduksi

1) Uterus

Pada usia kehamilan 24 minggu, uterus mencapai umbilikus dan mencapai *proceccus xiphoideus* pada usia kehamilan 36 minggu. Setelah usia kehamilan 36 minggu, uterus mulai turun ke dalam panggul. Bentuk uterus menjadi bulat (globular) karena cavum uterus berisi embrio yang sedang tumbuh. Cavum uterus menjadi lebih bulat seperti telur pada saat fetus tumbuh menjadi lebih panjang. Ukuran uterus saat hamil jelas akan mengalami perubahan. Perubahan ini terkait dengan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini akan mempengaruhi pembesaran uterus dengan cara meningkatkan

vaskularisasi dan dilantasi pembuluh darah, hiperplasia (Produksi serabut otot dan jaringan fibroelastis baru), hipertrofi (Pembesaran serabut otot dan jaringan fibroelastin yang telah ada), serta perkembangan desis dua.

2) Vagina / vulva.

Pada ibu hamil vagina terjadi Hipervaskularisasi menimbulkan warna merah ungu kebiruan yang disebut tanda Chadwick. Vagina ibu hamil berubah menjadi lebih asam, keasaman (pH) berubah dari 4 menjadi 6.5 sehingga menyebabkan wanita hamil lebih rentan terhadap infeksi vagina terutama infeksi jamur. Hypervaskularisasi pada vagina dapat menyebabkan hypersensitivitas sehingga dapat meningkatkan libido atau keinginan atau bangkitan seksual terutama pada kehamilan trimester dua.

3) Ovarium

Sejak kehamilan 16 minggu, fungsi diambil alih oleh plasenta, terutama fungsi produksi progesteron dan estrogen. Selama kehamilan ovarium tenang/beristirahat. Tidak terjadi pembentukan dan pematangan folikel baru, tidak terjadi ovulasi, tidak terjadi siklus hormonal menstruasi.

b. Perubahan metabolik

1) Sistem kardiovaskular

Pada minggu ke-5 *ardiac output* akan meningkat dan perubahan ini terjadi untuk mengurangi resistensi vaskular sistemik. Selain itu, juga terjadi peningkatan denyut jantung. Antara minggu ke-10 dan 20 terjadi peningkatan volume plasma sehingga juga terjadi peningkatan *preload*. Performa ventrikel selama kehamilan dipengaruhi oleh keturunan resistensi vaskular sistemik dan perubahan pada aliran pulsasi arterial. Kapasitas vaskular juga akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan. Peningkatan estrogen dan progesteron juga akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan penurunan resistensi vaskular perifer (Pratiwi, 2018).

a) Tekanan darah

Penurunan tahanan vascular perifer selama kehamilan terutama disebabkan karena relaksasi otot polos sebagai akibat pengaruh hormon progesteron. Penurunan tersebut mengakibatkan penurunan tekanan darah selama usia kehamilan pertama. Ada sedikit penurunan pada sistolik 5-10 mmHg dan diastolik 10-15 mmHg. Tekanan darah sedikit demi sedikit akan naik ke level sebelum hamil pada saat usia kehamilan lanjut. Perasaan lelah dan menurunnya semangat/lesu merupakan hal yang biasa terjadi selama

kehamilan. Peningkatan hormon darah bersamaan dengan distensi dari vena dan penambahan tekanan mekanik dari pembesaran uterus dapat menyebabkan odema pada kaki, vulva, dan anal, varises pada vena, dan haemoroid adalah hal yang umum ditemukan pada trimester III (Jannah Nurul 2012).

b) Distribusi aliran darah

Proporsi terbesar aliran darah diarahkan ke uterus 500 ml/menit dengan tujuan untuk memberikan nutrisi yang baik pada uterus yang sedang berkembang dan janin di dalamnya. Terdapat aliran dalam jumlah yang besar pula pada paru-paru, kulit 200ml/menit, membran mukosa dan pada ginjal 400 ml/menit. Pada kulit ditujukan untuk menghilangkan kelebihan panas yang ditimbulkan oleh meningkatnya metabolisme yang dialami pada kehamilan (Jannah Nurul, 2012).

c) Volume Darah

Volume darah semakin meningkat dan jumlah serum darah lebih besar dari pertumbuhan sel darah, sehingga terjadi pengenceran darah (*hemodilusi*), dengan puncaknya pada usia kehamilan 32 minggu. Volume darah bertambah sebesar sampai 30% sedangkan sel darah bertambah sekitar 20%. Curah jantung akan bertambah sekitar 30%.

Bertambahnya hemodilusi darah mulai tampak sekitar usia kehamilan 16 minggu, sehingga penderita penyakit jantung harus berhati-hati untuk hamil beberapa kali. Kehamilan selalu memberatkan kerja jantung sehingga wanita hamil dengan sakit jantung dapat jatuh dalam dekompensasi kordis. Pada post partum terjadi hemokonsentrasi dengan puncak hari ke tiga sampai kelima

2) Sistem Endokrin

Selama minggu-minggu pertama, korpus luteum dalam ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron, fungsi utamanya pada stadium ini adalah untuk mempertahankan pertumbuhan desidua dan mencegah pelepasan serta pembebasan desidua tersebut. Sel-sel trofoblast menghasilkan hormone korionik gonadotropin yang akan mempertahankan korpus luteum sampai plasenta berkembang penuh dan mengambil alih produksi estrogen dan progesteron dari korpus luteum.

3) Tractus Urinarius

Pada ginjal seorang wanita hamil bertambah berat, misalnya menemukan bahwa ginjal 1,5 cm lebih panjang selama masa nifas awal dari pada yang diukur 6 bulan kemudian. Kecepatan filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal bertambah pada awal kehamilan, yang pertama sebanyak 50 persen pada awal

trimester kedua, dan yang terakhir tidak cukup banyak, mekanisme tepat untuk meningkatnya hal-hal ini pada kehamilan belum diketahui.

4) Sistem Muskuloskeletal

Pada trimester pertama tidak banyak terjadi perubahan pada sistem musculoskeletal. Lordosis progresif merupakan gambaran karakteristik pada kehamilan normal. Sendi pubis bertambah besar dan menyebabkan rasa tidak nyaman di bagian bawah punggung khususnya pada akhir kehamilan mengakibatkan rasa pegal, mati rasa dan lemah dialami pada anggota badan atas.

5) Sistem Respirasi

Sistem respirasi terjadi perubahan guna dapat memenuhi kebutuhan O₂. Karena pembesaran uterus terutama pada bulan-bulan terakhir kehamilan dan kebutuhan oksigen yang meningkat $\pm 20\%$ untuk metabolisme janin. Oleh karena diafragmanya tidak dapat bergerak bebas menyebabkan bagian thorax juga melebar ke sisi luar. Dorongan rahim yang membesar terjadi desakan diafragma. Terjadi desakan rahim dan kebutuhan O₂ meningkat, bumil akan bernafas lebih cepat 20-25% dari biasanya (Prawihardjo, 2016).

4. Kebutuhan gizi pada ibu hamil

Kebutuhan energi pada trimester I meningkat secara minimal. Kemudian sepanjang trimester II dan III kebutuhan energi terus meningkat sampai akhir kehamilan. Energi tambahan selama trimester II diperlukan untuk pemekaran jaringan ibu seperti penambahan volume darah, pertumbuhan uterus, dan payudara, serta penumpukan lemak. Selama trimester III energi tambahan digunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta (Sukarni K, 2013).

Adapun ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang makanan yang bergizi dan sangat baik untuk dikonsumsi ibu hamil yaitu dalam Al-Qur'an surah An-Nahl: 69 :

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعُقُومٍ ۖ يَتَفَكَّرُونَ ٦٩

Terjemahannya:

“Kemudian makalah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempulah jalan yang telah dimudahkan (bagimu) dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, didalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkan” (Kementerian Agama RI, 2014 : 18)

Quraish Shihab dalam penafsirannya menyebutkan bahwa Allah SWT telah memberi petunjuk pada lebah untuk menjadikan buah-buahan dari berbagai jenis pohon dan tumbuhan sebagai makanannya. Karena petunjuk tersebut lebah menjalankan tugas-tugasnya dengan sangat mudah. dari dalam perut lebah keluar sejenis

minuman beraneka ragam dan berguna sekali bagi kesehatan manusia. Dan sesungguhnya dari ciptaan yang unik itu pertanda akan wujud sang Pencipta yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Madu merupakan jenis zat yang mengandung unsur glukosa dan perferentous (semacam zat gula yang sangat mudah dicerna) dalam porsi besar. Berdasarkan ilmu kedokteran menyimpulkan bahwa glukosa sangat berguna bagi proses penyembuhan dari berbagai macam jenis penyakit, madu juga memiliki kandungan vitamin yang cukup tinggi terutama vitamin B kompleks (Shihab Quraish, 2013)

Madu merupakan makanan sekaligus obat yang disebutkan oleh Allah swt. dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menyukai madu sebagai makanan atau sebagai penyembuh penyakit. Bahkan, beliau suka meminum madu di pagi hari dengan dicampur air dingin untuk menjaga atau mengobati penyakit usus. Riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas RA. Rasulullah saw. bersabda:

لَشِفَاءٌ فِي ثَلَاثَةٍ: شُرْبَةُ عَسَلٍ، وَشِرْطَةُ مُحَجِّمٍ، وَكَيْيَةِ نَارٍ، وَأَنَا أَنَّهُى
عَنِ الْكَيِّ

Artinya:

Kesembuhan itu ada pada tiga hal, yaitu dalam pisau pembekam, meminumkan madu, pengobatan dengan besi panas (kayy). Dan aku melarang ummatku melakukan pengobatan dengan besi panas (HR. Bukhari).

Dalam sebuah riwayat lain disebutkan,

عَلَيْكُمْ بِالشِّدْفَاءِ يَنْ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ

Artinya:

Hendaknya kalian menggunakan dua macam obat, madu dan al-Qur'an. (Hadits Ibnu Majah Nomor 3334).

Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah mengatakan, “Madu memiliki banyak khasiat. Madu dapat membersihkan kotoran yang terdapat pada usus, pembuluh darah, dapat menetralkan kelembaban tubuh, baik dengan cara dikonsumsi atau dioleskan, sangat bermanfaat untuk lanjut usia dan mereka memiliki keluhan pada dahak atau yang metabolisanya cenderung lembab dan dingin (Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, 1999).

Madu mengandung vitamin C, vitamin A, besi (Fe), dan vitamin B12 yang berfungsi sebagai pembentuk sel darah merah dan *hemoglobin*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengonsumsi madu dapat mencegah terjadinya anemia pada kehamilan (Wulandari P, 2015).

Berikut adalah beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu selama kehamilannya :

a. Karbohidrat

Janin memerlukan 40 gram glukosa setiap harinya yang nantinya akan digunakan sebagai sumber energi. Glukosa sangat dibutuhkan karena akan membantu dalam sintesis lemak, glikogen dan pembentukan struktur polisakarida. Karbohidrat merupakan sumber kalori utama yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan. Beberapa pilihan karbohidrat yang dianjurkan adalah seperti roti, sereal, nasi dan pasta. Karbohidrat mengandung vitamin dan mineral, selain itu juga dapat meningkatkan asupan serat yang dianjurkan selama

hamil karena dapat mencegah terjadinya konstipasi (sulit buang air besar) dan hemorrhoid (wasir)

b. Protein dan Asam amino

Selain untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, protein dan asam amino juga berperan dalam pembentukan plasenta dan cairan amnion, pertumbuhan jaringan maternal seperti pertumbuhan mammae ibu dan jaringan uterus, dan penambahan volume darah. Kebutuhan akan protein selama kehamilan bergantung pada usia kehamilan, total protein fetal yang diperlukan selama masa gestasi berkisar antara 350-450gr. Tambahan protein untuk ibu hamil adalah 0,75 gram/kg berat badan.

Secara keseluruhan jumlah protein yang diperlukan oleh ibu hamil yaitu kurang lebih 60-76 gram setiap hari atau sekitar 925 gram dari total protein yang dibutuhkan selama kehamilan. Dapat diartikan bahwa wanita hamil membutuhkan 10-15 gram lebih tinggi dari kebutuhan wanita yang tidak hamil. Terjadinya peningkatan volume darah hingga 50% selama kehamilan menyebabkan protein sangat diperlukan untuk menghasilkan sel darah yang baru. Sumber protein dapat diperoleh dari protein hewani dan nabati. Protein nabati seperti : kacang-kacangan, tahu, tempe, oncom, selai kacang dan lain-lain. Sedangkan untuk protein hewani seperti: daging, ikan, unggas, telur ataupun kerang.

c. Lemak

Asam lemak *Eicosapentanoic Acid* (EPA) dan *Docosa hexanoic Acid* (DHA) memainkan peranan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus, khususnya untuk mata dan otak. Lemak merupakan sumber tenaga yang vital dan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Pada kehamilan yang normal, kadar lemak dalam aliran darah akan meningkat pada akhir trimester III. Lemak dibutuhkan tubuh terutama untuk membentuk energi dan serta perkembangan sistem syaraf janin. Oleh karena itu ibu hamil jangan sampai kurang mengkonsumsi lemak tubuh. Namun ibu hamil juga tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang berlebih karena dapat mengakibatkan berat badan ibu hamil meningkat tajam yang nantinya dapat menyulitkan ibu dalam menjalani kehamilan dan pasca persalinan. Oleh karena itu ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tidak lebih dari 25% dari seluruh kalori yang dikonsumsi sehari.

d. Vitamin

Vitamin yang larut dalam lemak :

- 1) Vitamin A. Vitamin A dari ibu dibutuhkan oleh janin yaitu kurang dari 25 mg/hari, sedangkan vitamin A yang dibutuhkan pada trimester III yaitu berkisar 200 mg/hari. Ibu yang sedang hamil sebaiknya jangan terlalu sering mengkonsumsi vitamin A

dalam jumlah yang besar karena akan menjadi stimulator yang mengakibatkan feratogen.

- 2) Vitamin D. Kebutuhan vitamin D selama kehamilan belum diketahui pasti tetapi diperkirakan 10 mg/hari, sedangkan *Recommended Dayli Allowance* (RDA) atau Asupan Harian yang disarankan menganjurkan 5mg/hari untuk wanita hamil pada usia 25 tahun atau lebih.
- 3) Vitamin E. Untuk ibu hamil kebutuhannya sekitar 15 mg (22,5 IU) dan ibu menyusui sekitar 19 mg (28,5 IU). Vitamin E dibutuhkan sebagai antioksidan alamiah dan sebagai pembentukan eritrosit untuk mencegah anemia.
- 4) Vitamin K. Fungsi vitamin K belum begitu optimal pada masa kehamilan dalam fetus.

Vitamin larut dalam air :

- 1) Vitamin C. Kebutuhan vitamin C untuk ibu hamil yakni sebanyak 70 mg perhari. Untuk mencegah kekurangan vitamin C selama proses kehamilan diperlukan tambahan vitamin C sebanyak 10 mg perhari dengan peningkatan sebanyak 33%. Dibutuhkan untuk memperkuat pembuluh darah dan mencegah perdarahan, mengurangi resiko infeksi setelah melahirkan dan membantu untuk pertumbuhan gigi dan tulang bayi serta membantu memperbesar penyerapan zat FE.

- 2) Thiamin. Thiamin meningkat selama kehamilan sebanyak 25% namun tetap diperlukan tambahan thiamin sebanyak 0,4 mg/hari.
 - 3) Niasin dan Riboflavin. Niasin diperlukan selama kehamilan yaitu 2mg/hari dan 0,3 mg/hari dari riboflavin.
 - 4) Vitamin B6. Vitamin B6 diperlukan dalam jumlah yang besar untuk melakukan metabolisme dengan peningkatan 100%. Vitamin B6 dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu mengatasi mual.
 - 5) Asam folat. Asam folat merupakan kelompok vitamin B paling utama selama masa kehamilan kerana dapat mencegah cacat tabung syaraf 24 (*neural tube defects*) seperti Spina Bifida. Ibu hamil harus meningkatkan asupan folat hingga 0,4-0,5 mg per hari.
- e. Mineral
- 1) Kalsium. Pada usia 20 minggu laju penyaluran kalsium dari ibu ke fetus mencapai 50 mg/hari dan mencapai puncaknya apabila mendekati kelahiran yaitu 330 mg/hari. RDA untuk kalsium selama kehamilan adalah 1200 mg. Kalsium mengandung mineral yang penting untuk pertumbuhan janin dan membantu kekuatan kaki serta punggung.
 - 2) Magnesium. Magnesium dibutuhkan untuk perkembangan jaringan lunak. Konsentrasi magnesium meningkat selama

kehamilan dengan RDA 320 mg dan 50% dari magnesium diserap oleh ibu.

- 3) Fosfor. RDAnyanya sama dengan wanita yang tidak hamil yaitu 1250 mg/hari untuk wanita yang hamil dibawah 19 tahun dan 700 mg/hari untuk wanita diatas 19 tahun.
- 4) Zat Besi (Fe). Berperan dalam produksi dan fungsi sel darah merah. RDA wanita hamil yakni 30 mg/hari.
- 5) Seng. Seng diperlukan untuk mengembangkan jaringan tisu, terutama otak dan jenis kelamin. RDA wanita hamil mencapai 15 mg/hari.
- 6) Natrium. Selama kehamilan naik 5000-10000 Meq/hari sehubungan dengan peningkatan volume darah maternal (Sukarni K dkk, 2013 : 99-109).

B. Tinjauan Umum Tentang Anemia

1. Pengertian Anemia

- a. Anemia merupakan menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit dan eritrosit dibawah nilai normal (Pudiasuti, 2012)
- b. Anemia merupakan salah satu kelainan darah yang terjadi ketika kadar sel merah (eritrosit) dalam tubuh menjadi terlalu rendah. Kadar hemoglobin normal umumnya berbeda dari laki-laki dan perempuan. Untuk pria, anemia biasanya kadar hemoglobin kurang

dari 13,5 gram/100ml dan pada wanita sebagai hemoglobin kurang dari 12,0 gram/100ml (Proverawati, 2011)

- c. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Apabila jumlah sel darah merah kurang, asupan oksigen aliran darah menuju otak juga semakin berkurang. Selain itu, sel darah merah juga mengandung hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh (Pratiwi, 2018)
- d. Anemia adalah suatu keadaan tidak cukupnya sel dara merah yang sehat untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Ketika jaringan tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, maka fungsinya akan terganggu (Simbolon, 2018).

2. Etiologi

Anemia pada umumnya disebabkan oleh :

- a. Kurang gizi
- b. Kurang zat besi dalam diet
- c. Malabsopsi
- d. Kehilangan darah yang banyak pada persalinan yang lalu, haid dan lain-lain Penyakit kronik: TBC, Paru, Cacing usus, Malaria dan lain-lain (Marmi, A. Retno murti Suryaningsih 2014).

3. Tanda dan gejala

Tanda dan gejala anemia adalah antara lain pusing, rasa lemah, kulit pucat, mudah pingsan (Purwoastuti 2015).

a. Gejala

Pada ibu hamil, gejala yang paling mudah terlihat adalah cepat merasa lelah, sering merasa pusing, mata berkunang-kunang, adanya luka pada lidah, nafsu makan berkurang, konsentrasi berkurang atau bahkan hilang, napas pendek dan keluhan mual muntah yang lebih hebat pada usia kehamilan muda.

b. Tanda

Tanda-tanda anemia pada ibu hamil dapat diamati dari peningkatan kecepatan denyut jantung karena tubuh berusaha memberi oksigen lebih banyak ke jaringan, peningkatan kecepatan pernapasan karena tubuh berusaha menyediakan lebih banyak oksigen pada darah, kepala terasa pusing akibat kurangnya pasokan darah ke otak, pasien merasa lelah karena meningkatnya oksigenasi berbagai organ, kulit terlihat pucat karena berkurangnya oksigenasi, mual akibat penurunan aliran darah pada saluran cerna dan susunan saraf pusat, serta penurunan kualitas rambut dan kulit (Pratiwi, 2018).

4. Klasifikasi

Menurut Manuaba (2010), anemia dalam kehamilan terbagi menjadi:

- a. Tidak anemia bila Hb 11 gr%
- b. Anemia ringan bila Hb 9-10 gr%.
- c. Anemia sedang bila Hb 7-8 gr%.
- d. Anemia berat bila Hb <7 gr%.

Anemia dalam kehamilan terbagi atas anemia defisiensi besi, anemia megaloblastik, anemia hipoplastik, anemia hemolitik, dan anemia lainnya (Prawihardjo 2013).

- a. Anemia defisiensi besi

Anemia ini paling banyak dijumpai pada kehamilan. Anemia defisiensi besi berarti anemia akibat kekurangan zat besi. Kekurangan ini disebabkan kurangnya pasokan unsur besi dalam makanan, gangguan reabsorpsi, terlampau banyak zat besi yang keluar dari badan (Misalnya perdarahan). Tanda dan gejala anemia tipe ini adalah rambut rapuh dan halus; kuku tipis; rata dan mudah patah, lidah tampak pucat; licin dan mengkilat, berwarna merah daging, pecah-pecah yang disertai kemerahan di sudut mulut.

- b. Anemia megaloblastik

Dalam kehamilan, anemia jenis ini disebabkan oleh defisiensi asam folat. Gejala yang tampak adalah malnutrisi, glositis berat, diare, dan kehilangan nafsu makan.

c. Anemia hipoplastik

Anemia hipoplastik pada ibu hamil terjadi akibat sumsum tulang belakang kurang mampu membuat sel-sel darah baru.

d. Anemia hemolitik

Anemia hemolitik disebabkan oleh penghancuran sel darah merah yang berlangsung lebih cepat daripada pembuatannya. Ibu dengan anemia hemolitik biasanya sulit hamil. Bila ia hamil, biasanya akan terjadi anemia berat.

e. Anemia lainnya

Seorang wanita yang menderita suatu jenis anemia, baik anemia turunan, anemia karena malaria, cacung tambang, penyakit ginjal menahun, penyakit hati, dan sebagainya. Jika hamil, dapat berpotensi menimbulkan anemia yang berat. Dalam hal ini, anemia berat akan berpengaruh negatif terhadap ibu dan janinnya.

Klasifikasi anemia berdasarkan penyebabnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu:

- a. Anemia karena menurunnya produksi sel darah merah dapat disebabkan karena kekurangan unsur penyusun sel darah merah (asam folat, vitamin B12 dan zat besi), gangguan fungsi sumsum tulang (adanya tumor, pengobatan, toksin) tidak adekuatnya stimulus karena berkurangnya eritropoitin (pada penyakit ginjal kronik).

- b. Anemia karena hilangnya sel darah merah, terjadi akibat perdarahan karena berbagai sebab seperti perlukaan, perdarahan gastrointestinal, perdarahan uterus, perdarahan hidung, perdarahan akibat operasi.
- c. Anemia karena meningkatnya destruksi/kerusakan sel darah merah, dapat terjadi karena overaktifnya, *Reticuloendothelial System* (RES). Meningkatnya destruksi sel darah merah dan tidak adekuatnya produksi sel darah merah biasanya karena faktor-faktor:
- 1) Kemampuan respon sumsum tulang terhadap penurunan sel darah merah kurang karena meningkatnya jumlah retikulosit dalam sirkulasi darah.
 - 2) Meningkatnya sel-sel darah merah yang masih mudah dalam sumsum tulang dibandingkan yang matur/matang.
 - 3) Adanya atau tidaknya hasil destruksi sel darah merah dalam sirkulasi (seperti meningkatnya kadar bilirubin) (Tarwoto,2013:32).

Kriteria anemia menurut WHO:

- a. laki-laki dewasa :<13g/dl
- b. wanita dewasa tidak hamil :<12g/dl
- c. wanita hamil :<11g/dl
- d. anak umur 6-14 tahun :<12g/dl
- e. anak umur 6 bulan-6 tahun :<11g/dl

Secara klinis kriteria anemia Indonesia umumnya adalah:

- a. Hemaglobin < 10g/dl
- b. Hematokrit < 30%
- c. Eritrosit < 2.8 juta/mm (Tarwanto 2013).

5. Derajat Anemia

Penentuan anemia tidaknya seorang ibu hamil menggunakan dasar kadar Hb dalam darah. Dalam penentuan derajat anemia terdapat macam-macam pendapat yaitu:

Derajat anemia berdasarkan kadar hemoglobin menurut WHO:

- a. Ringan sekali :Hb 10g/dl-Batas anormal
- b. Ringan :Hb 8g/dl-9.9g/dl
- c. Sedang :Hb 6g/dl-7.9g/dl
- d. Berat :Hb < 6 g/dl

Dapartemen kesehatan menetapkan derajat anemia, yaitu:

- a. Ringan sekali :Hb 11 g/dl-Batas normal
- b. Ringan :Hb 8 g/dl- < 11 g/dl
- c. Sedang :Hb 6 g/dl- < 8 g/dl
- d. Berat :Hb < 5 g/dl (Astuti dan Ertiana, 2018).

6. Faktor Resiko Dalam Kehamilan

Tubuh berada pada resiko tinggi untuk menjadi anemia selama kehamilan jika:

- a. Mengalami dua kehamilan yang berdekatan.
- b. Hamil dengan lebih dari satu anak.
- c. Sering mual dan muntah karena sakit pagi hari.
- d. Tidak mengkonsumsi cukup zat besi.
- e. Mengalami menstruasi berat sebelum kehamilan.
- f. Hamil saat masih remaja.
- g. Kehilangan banyak darah (misal dari cedera atau selama operasi)
(Proverawati 2011).

7. Gejala Klinis Anemia Kehamilan

- a. Anemia ringan

Jika anemia ringan, biasanya tidak menimbulkan gejala apapun. Gejala anemia mungkin termasuk yang berikut.

- 1) Kelelahan
- 2) Penurunan energi
- 3) Kelemahan
- 4) Sesak nafas
- 5) Tampak pucat
- 6) Lesuh yang berkepanjangan.

b. Anemia sedang

- 1) Merasa lelah dan sering mengantuk
- 2) Merasa pusing dan lemah
- 3) Merasa tidak enak badan
- 4) Mengeluh sakit kepala
- 5) Konjungtiva pucat

c. Anemia berat

- 1) Perubahan warna tinja, termasuk tinja hitam dan tinja lengket dan berbau busuk, berwarna merah marun, atau tampak berdarah jika anemia karena kehilangan darah melalui saluran pencernaan.
- 2) Denyut jantung cepat
- 3) Frekuensi pernafasan cepat
- 4) Tekanan darah rendah
- 5) Pucat atau kulit dingin
- 6) Nyeri dada
- 7) Pusing atau kepala terasa ringan
- 8) Sesak nafas
- 9) Tidak bisa berkonsentrasi
- 10) Kelelahan atau kekurangan energi.
- 11) Sakit kepala
- 12) Kulit kuning disebut *jaundice* jika anemia karena kerusakan sel darah merah.

Adapun beberapa jenis anemia mungkin memiliki gejala yang lainnya, yaitu:

- 1) Sembelit
- 2) Daya konsentrasi rendah
- 3) Kesemutan
- 4) Rambut rontok (Proverawati, 2011).

8. Dampak Anemia Pada Kehamilan

a. Bahaya selama kehamilan

- 1) Dapat terjadi abortus
- 2) Persalinan prematurus
- 3) Hambatan tumbuh kembang janin dan rahim
- 4) Mudah terjadi infeksi
- 5) Ketuban pecah dini (KPD) proses melahirkan.

b. Bahaya persalinan

- 1) Gangguan his kekuatan mendedan
- 2) Kala pertama dapat berlangsung lama
- 3) Kala dua berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan
- 4) Kala empat dapat terjadi perdarahan post partum sekunder dan atonia uteri.

c. Bahaya pada nifas


1. Terjadi sub involusio uteri menimbulkan perdarahan postpartum
2. Pengeluaran ASI berkurang (Erlin, 2012).

9. Patofisiologi

Anemia lebih sering ditemukan dalam kehamilan karena keperluan akan zat-zat makanan makin bertambah dan terjadi pula perubahan-perubahan dalam darah dan sum-sum tulang. Volume darah bertambah banyak dalam kehamilan, yang lazim disebut hidemia atau hipervolemia. Akan tetapi, bertambahnya sel-sel darah kurang dibandingkan dengan plasma, sehingga terjadi pengenceran darah. Pertambahan tersebut berbanding sebagai berikut yaitu, plasma 30%, sel darah 18%, dan hemoglobin 19%.

Hemodilusi dianggap sebagai penyesuaian diri secara fisiologi dalam kehamilan dan bermanfaat bagi ibu yaitu dapat meringankan beban kerja jantung yang harus bekerja lebih berat dalam masa hamil, yang disebabkan oleh peningkatan *cardiac output* akibat hipervolemia. Kerja jantung lebih ringan apabila viskositas darah rendah. Resistensi perifer berkurang pula, sehingga tekanan darah tidak naik. Kedua, pada perdarahan waktu persalinan, banyaknya unsur besi yang hilang lebih sedikit dibandingkan dengan apabila darah itu tetap kental. Bertambahnya darah dalam kehamilan sudah mulai sejak kehamilan

umur 10 minggu dan mencapai puncaknya dalam kehamilan antara 32 dan 36 minggu (Tarwanto, 2013).



Gambar 1.1: Gambaran Anemia

(Sumber: <http://medicalhall.info>)

10. Pencegahan Anemia Dalam Kehamilan

Nutrisi yang baik adalah cara terbaik untuk mencegah terjadinya anemia jika sedang hamil atau mencoba menjadi hamil. Makan makanan yang tinggi kandungan zat besi (seperti sayuran yang berwarna hijau, daging merah, telur dan kacang tanah) dapat membantu memastikan bahwa tubuh menjaga pasokan besi yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Pemberian vitamin untuk memastikan bahwa tubuh memiliki cukup asam besi dan folat (Proverawati, 2011)

Pencegahan dapat dilakukan dengan mengatur pola makan yaitu dengan mengombinasikan menu makanan serta mengonsumsi buah dan sayuran yang mengandung vitamin C (seperti tomat, jeruk, jambu), mengandung zat besi (sayuran berwarna hijau tua seperti bayam). Kopi

dan teh adalah jenis minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi sehingga dianjurkan untuk tidak dikonsumsi (Pratiwi, 2018).

11. Penanganan Anemia Dalam Kehamilan

Berikut penanganan anemia dalam kehamilan menurut tingkat pelayanan. :

a. Pondok Bersalin Desa (Polindes)

Anemia pada ibu hamil idealnya harus dideteksi dan ditangani sejak pelayanan kesehatan dasar. Di desa, ibu hamil perlu berkunjung ke polindes untuk mengetahui kondisi kehamilannya dan mengetahui jika ibu hamil terjadi anemia. Penanganan anemia di Polindes meliputi:

- 1) Membuat diagnosis klinik dan rujukan pemeriksaan laboratorium ke tingkat pelayanan yang lebih lengkap
- 2) Memberikan terapi oral pada ibu hamil yang berupa pemberian tablet besi 90 mg/hari.

b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Wewenang puskesmas untuk menangani kasus anemia pada ibu hamil di antaranya dengan cara:

- 1) Membuat diagnosis dan terapi
- 2) Menentukan penyakit kronik (malaria, TBC) dan penanganannya.

c. Rumah sakit

Rumah sakit merupakan layanan kesehatan tingkat lanjutan jika polindes dan puskesmas tidak dapat menangani kasus anemia pada ibu hamil. Wewenang rumah sakit dalam menangani kasus anemia pada ibu hamil meliputi:

- 1) Memberi diagnosis dan terapi
- 2) Diagnosis thalasemia dengan elektrofosis Hb, bila ibu ternyata pembawa sifat, perlu tes pada suami untuk menentukan risiko pada bayi (Reni Yuli Astutik 2018).

Ibu hamil dengan anemia dapat diberikan suplemen Fe dosis rendah 30 mg pada trimester III, sedangkan pada ibu hamil dengan anemia defisiensi besi dapat diberikan suplemen sulfat 325 mg sebanyak 1-2 kali dalam sehari. Anemia yang disebabkan oleh defisiensi asam folat, dapat diberikan asam folat 1 mg/hari atau vitamin B12 dengan dosis 100-200 mcg/hari (Pratiwi, 2018).

Hal ini telah di jelaskan dalam suatu hadits Rasulullah saw yang mengatakan bahwa Allah swt tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Sebagaimana Rasulullah saw ucapkan kepada seseorang badui Arab yang bertanya kepada-Nya.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَأَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عِلْمُهُ مَنْ عِلْمُهُ وَجَهْلُهُ مَنْ جَهْلُهُ

Artinya :

Sesungguhnya Allah swt tidak menurunkan penyakit, kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Ada orang yang mengetahui ada pula yang tidak mengetahuinya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, Beliau menshahihkannya dan di sepakati oleh adz-Dzahabi. Al-Bushiri mensahihkan hadits ini dalam Zawa'idnya. Lihat takhrij Al-Amauth atas Zadul Ma'ad, 4/12-13).

C. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil dengan Anemia

1. Pemberian tablet zat besi selama kehamilan

Pemberian suplemen besi merupakan salah satu cara yang dianggap paling cocok bagi ibu hamil untuk meningkatkan kadar Hb sampai pada tahap yang diinginkan, karena sangat efektif dimana satu tablet mengandung 60 mg Fe dan 0.25 asam folat. Setiap tablet setara dengan 200 mg ferrosulfat. Selama masa kehamilan minimal diberikan 90 tablet sampai 42 minggu setelah melahirkan, diberikan sejak pemeriksaan ibu hamil pertama. Setiap satu kemasan tablet besi terdiri dari 30 tablet.

2. Pendidikan kesehatan yang meliputi pengetahuan anemia, pemilihan makanan tinggi zat besi, asupan zat besi.

3. Pengobatan anemia pada ibu hamil harus ditujukan pada penyebab anemia dan mungkin termasuk transfusi darah, pemberian kortikosteroid atau obat-obatan lainnya yang menekan sistem kekebalan tubuh, pemberian *Erythropoietin* obat yang membantu sumsum tulang membuat sel-sel darah merah, dan pemberian suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, atau vitamin dan mineral lainnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Antenatal Care (ANC)

1. Tujuan

Pelayanan antenatal terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil (Jannah Nurul, 2012)

Tujuan umum adalah :

Untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat.

Tujuan khusus adalah :

- a. Mempromosikan dan menjaga kesehatan fisik dan mental ibu dan bayi dengan pendidikan, nutrisi, kebersihan diri, proses kelahiran bayi.
- b. Mendeteksi dan melaksanakan komplikasi medis, beda, atau obstetric selama kehamilan.

- c. Mengembangkan persiapan persalinan serta kesiapan menghadapi komplikasi.
- d. Membantu menyiapkan ibu untuk menyusui dengan sukses, menjalankan nifas normal, serta merawat anak secara fisik, psikologis, dan sosial.
- e. Mempersiapkan ibu dan keluarga dapat berperan dengan baik dalam memelihara bayi agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal (Jannah Nurul 2012)

2. Indikator

- a. Kunjungan pertama (K1)

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama, sebaiknya sebelum minggu ke 8.

- b. Kunjungan ke-4 (K4)

K4 adalah ibu hamil dengan kontak 4 kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak 4 kali dilakukan sebagai berikut : sekali pada trimester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trimester ke-2 (>12-24 minggu), minimal 2 kali kontak pada trimester ke-3 dilakukan setelah minggu ke 24 sampai dengan minggu ke 36. Kunjungan antenatal bisa lebih dari

4 kali sesuai kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan. Kunjungan ini termasuk dalam K4.

c. Penanganan Komplikasi (PK)

PK adalah penanganan komplikasi kebidanan, penyakit menular maupun tidak menular serta masalah gizi yang terjadi pada waktu hamil, bersalin dan nifas. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi. Komplikasi kebidanan, penyakit dan masalah gizi yang sering terjadi adalah: perdarahan, Preeklampsia/eklampsia, persalinan macet, infeksi, abortus, Malaria, HIV/AIDS, sifilis, TB, Hipertensi, Diabetes Mellitus, Anemia gizi besi(AGB) dan Kurang Energi Kronis (KEK).

Dalam melakukan pemeriksaan antenatal, tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai standar terdiri dari:

a. Timbang berat badan

Penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Penambahan berat badan yang kurang dari 9 kilogram selama kehamilan atau kurang dari 1 kilogram setiap bulannya menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin.

b. Ukur lingkaran lengan atas (LILA)

Pengukuran LILA hanya dilakukan pada kontak pertama untuk skrining ibu hamil beresiko kurang energi kronis (KEK). Kurang

Energi Kronis disini maksudnya ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi dan telah berlangsung lama (beberapa bulan/tahun) dimana LILA kurang dari 23,5 cm. Ibu hamil dengan KEK akan dapat melahirkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

c. Ukur tekanan darah

Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya hipertensi (tekanan darah 140/90 mmHg) pada kehamilan dan preeklampsia (hipertensi disertai edema wajah dan atau tungkai bawah dan atau proteinuria).

d. Ukur tinggi fundus uteri

Pengukuran tinggi fundus pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak sesuai dengan umur kehamilan, kemungkinan ada gangguan pertumbuhan janin. Standar pengukuran menggunakan pita ukur setelah kehamilan 24 minggu.

e. Hitung denyut jantung janin (DJJ)

Penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester I dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. DJJ lambat kurang dari 120x/menit atau DJJ cepat lebih dari 160x/menit menunjukkan adanya gawat janin.

f. Tentukan presentasi janin

Menentukan presentasi janin dilakukan pada akhir trimester II dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. Pemeriksaan ini

dimaksudkan untuk mengetahui letak janin. Jika pada trimester III bagian bawah janin bukan kepala atau kepala janin belum masuk ke panggul berarti ada kelainan letak, panggul sempit atau ada masalah lain.

g. Beri imunisasi Tetanus Toksoid (TT)

Untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum, ibu hamil harus mendapat imunisasi TT. Pada saat kontak pertama, ibu hamil di skrining status imunisasi TT-nya. Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil, sesuai dengan status imunisasi saat ini.

h. Beri tablet tanda darah (tablet besi)

Untuk mencegah anemia gizi besi, setiap ibu hamil harus mendapat tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan diberikan sejak kontak pertama.

i. Periksa laboratorium (Rutin dan khusus)

Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat antenatal meliputi :

- 1) Pemeriksaan golongan darah
- 2) Pemeriksaan kadar hemoglobin darah (Hb)

Pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) darah ibu hamil dilakukan minimal sekali pada trimester pertama dan sekali pada trimester ketiga. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui ibu hamil tersebut menderita anemia atau tidak selama kehamilannya karena kondisi anemia dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang janin dalam kandungan.

- 3) Pemeriksaan protein dalam urine
 - 4) Pemeriksaan kadar gula darah
 - 5) Pemeriksaan darah malaria
 - 6) Pemeriksaan tes sifilis
 - 7) Pemeriksaan HIV
 - 8) Pemeriksaan BTA
- j. Tatalaksana/penanganan kasus
- k. KIE efektif

E. Standar Asuhan Kebidanan

Dalam standar pelayanan antenatal untuk pengelolaan anemia pada kehamilan terdapat pada standar enam dengan tujuan untuk menemukan anemia pada kehamilan secara dini, dan melakukan tindak lanjut yang memadai untuk mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung. Pada standar ini dilakukan pernyataan bahwa, bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan dan atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, prasyarat dalam standar ini yaitu, adanya pedoman pengelolaan anemia pada kehamilan, bidan mampu mengenali dan mengelola anemia pada kehamilan, memberikan penyuluhan gizi untuk mencegah anemia, alat untuk mengukur kadar Hb yang berfungsi baik, tersedia tablet zat besi dan asam folat, menggunakan KMS Ibu hamil/ buku KIA, Kartu ibu.

Adapun proses yang harus dilakukan untuk pengelolaan anemia pada kehamilan diantaranya:

1. Memeriksa kadar Hb semua ibu hamil pada kunjungan pertama, dan pada minggu ke-28. Hb dibawah 11 gr% pada kehamilan termasuk anemia dibawah 7 gr% adalah anemia berat. Bila alat pemeriksaan tidak tersedia, periksa kelopak mata dan perkirakan ada/tidaknya anemia.
2. tablet zat besi pada semua ibu hamil sedikitnya 1 tablet selama 90 hari berturut-turut. Bila Hb kurang dari 11 gr% teruskan pemberian tablet zat besi.
3. Beri penyuluhan gizi pada setiap kunjungan antenatal, tentang perlunya minum tablet zat besi, makanan yang mengandung zat besi sebelum/sesudah makan (teh/ kopi atau susu mengganggu penyerapan zat besi).
4. Jika prevalensi malaria tinggi, selalu ingatkan ibu untuk berhati-hati agar tidak tertular penyakit malaria. Beri tablet klorokuin 10 mg/kg BB per oral, sehari satu kali selama 2 hari. Kemudian anjurkan dengan 5 mg/kg BB pada hari ke-3. Klorokuin aman dalam 3 trimester kehamilan).
5. Jika ditemukan/diduga anemia (bagian dalam kelopak mata pucat), berikan 2-3 kali 1 tablet zat besi perhari.

6. Rujuk ibu hamil dengan anemia untuk pemeriksaan terhadap penyakit cacing/ parasit atau penyakit lainnya, dan sekaligus untuk pengobatannya.
7. Jika diduga ada anemia berat (misalnya: wajah pucat, cepat lelah, kuku pucat kebiruan, kelopak mata sangat pucat), segera rujuk ibu hamil untuk pemeriksaan dan perawatan selanjutnya. Ibu hamil dengan anemia pada triester ketiga perlu diberi zat besi dan asam folat secara IM.
8. Rujuk ibu hamil dengan anemia berat dan rencanakan untuk bersalin di rumah sakit.
9. Sarankan ibu hamil dengan anemia untuk minum tablet zat besi sampai 4-6 bulan setelah persalinan.

F. Tinjauan Kehamilan Terhadap Pandangan Islam

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kehamilan sangat banyak, umumnya terkait dengan tanda-tanda adanya Allah, kebesaran dan kekuasaan Nya.

Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt yang diturunkan kepada nabi-Nya Muhammad Saw yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir dan yang dituli pada mushaf mulai dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Al-Qur'an terdiri dari 114 surah dimana salah satu surahnya yakni surah Al-Mu'minun.

Surah Al-Mu'minun adalah surah ke 23 di dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 118 ayat dan termasuk golongan surah-surah makkiyah, dinamai Al-Mu'minun karena permulaan surah ini menerangkan bagaimana seharusnya sifat-sifat orang Mukmin yang menyebabkan keberuntungan mereka di akhirat dan ketentraman mereka di dunia.

Ayat-ayat alquran yang menjelaskan tentang kehamilan sangat banyak, umumnya terkait dengan tanda-tanda adanya Allah, kebesaran dan kekuasaanNya diantaranya. Al-Qur'an surat Al-Mukminum/23:12-14.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَةٍ مِنْ طِينٍ ۚ ۱۲ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۚ ۱۳ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۚ ۱۴

Artinya:

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik” (Q.S Al-Mukminum/23:12-14).

Dalam surat al-Mu'minun ayat 12-14 tafsir al-Maraghi telah menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari sari pati tanah. Ada segolongan ahli tafsir, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia disini adalah keturunan nabi Adam termasuk kita semua yang berasal dari sebuah air mani (sperma). Jika diadakan penyelidikan secara seksama, maka sebenarnya air mani (sperma) itu pun berasal dari tanah

setelah melalui beberapa proses. Makanan yang merupakan hasil bumi yang dimakan manusia dalam alat pencernaannya berubah menjadi cairan yang bercampur dengan darah yang menyalurkan bahan-bahan hidup dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia keseluruhan bagian anggotanya. Dan jika manusia itu meninggal dunia dan dimasukkan kedalam tanah maka badannya akan hancur lebur dan kembali menjadi tanah. (Ahmad Mustofa, 2006). Sedangkan Hamka dalam menafsirkan surat al-Muminun ayat 12-14 Dari nutfah air yang setitik menjadi darah segumpal dan daging segumpal dan tulang segumpal lalu diselimuti dengan daging lain, Umar menggelenggelengkan kepalanya sehingga terloncatlah dari mulutnya *fhatabarakallahu ahsanul kholiqin*. (Hamka, 1983).

Ayat tersebut mengisyaratkan adanya proses penciptaan manusia dalam alam arham (masa kehamilan), yang diawali dengan “sulalah min tin”, kemudian “menjadi nutfah, alaqah, mudghah, izaman, lahman dan khalqan”. Penciptaan manusia, berasal dari sulalah min tin, artinya saripati tanah, yaitu inti zat-zat yang ada dalam tubuh wanita dalam bentuk ovum dan dalam diri laki-laki dalam bentuk sperma. Sel telur yang telah dibuahi oleh sperma, atau zigot, disebut nutfah. Setelah terjadi pembuahan, zigot berjalan secara perlahan melalui tuba fallopi, menuju rahim (Shihab 2012).

Ayat diatas menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari saripati dari tanah kemudian menjadi air mani, kemudian menjadi segumpalan darah dan kemudian segumpalan dari

tersebut Allah ciptakan menjadi segumpal daging dan segumpalan daging Allah jadikan tulang beulang.

G. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, temuan, keterampilan dalam rangkaian/ tahapan yang logis untuk mengambil suatu keputusan yang terfokus pada klien.

Proses manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi (Jannah Nurul, 2012)

2. Tahapan Dalam Manajemen Kebidanan

Proses manajemen terdiri dari 7 langkah asuhan kebidanan yang dimulai dari pengumpulan data dasar dan diakhiri dengan evaluasi.

Tahapan dalam proses asuhan kebidanan ada 7 langkah, yaitu:

a. Langkah 1 Pengumpulan Data Dasar

Pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan pengumpulan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap seperti, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhannya, meninjau catatan

terbaru atau catatan selanjutnya, meninjau data laboratorium dan membandingkannya dengan hasil study (Rukiyah 2013).

Pada anamnesa ibu hamil dengan anemia akan didapatkan keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang dan keluhan mual muntah lebih hebat dari hamil muda.

Jika hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan penurunan hematokrit, konsentrasi hemoglobin dan hitung eritrosit yang akan tampak pada minggu ke 7 sampai ke 8 kehamilan dan terus menurun sampai minggu ke 16 sampai 22 minggu ketika titik keseimbangan tercapai.

Pada trimester pertama konsentrasi Hb tampak menurun, konsentrasi paling rendah didapatkan pada trimester kedua daripada trimester ketiga terjadi sedikit peningkatan Hb.

Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan khusus (Inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi) dan pemeriksaan penunjang (Laboratorium dan catatan terbaru serta catatan sebelumnya).

Pada ibu hamil dengan anemia dari anamnesis akan ditemukan ibu merasa lelah, sering mengantuk, merasa pusing, dan lemah, mengeluh sakit kepala, merasa tidak enak badan, perubahan mood dan kebiasaan tidur, dan mengeluh lidah mudah luka (Lecet).

Dari pemeriksaan fisik akan ditemukan pucat pada membran mukosa dan konjungtiva, kulit pucat, pucat pada kuku jari, muka ikterik dan data penunjang pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan Hb.

Melihat tanda dan gejala anemia pada ibu hamil seperti wajah pucat, lemah, letih, pusing dll, yang dikarenakan beberapa sebab yaitu kurang gizi, kurang zat besi, malabsorpsi zat besi, kekurangan banyak darah, serta riwayat keluarga anemia atau adanya penyakit kronis.

b. Langkah 2. Mengidentifikasi diagnosis atau masalah aktual

Mengidentifikasi data dengan cepat untuk mengidentifikasi diagnosa atau masalah aktual dengan klien berdasarkan data dasar, menguraikan bagaimana suatu data pada kasus diinterpretasikan menjadi suatu diagnosa atau secara teori data apa yang mendukung untuk timbulnya diagnosa tersebut. Masalah lebih sering berhubungan dengan bagaimana klien menguraikan keadaan yang ia rasakan, sedangkan diagnosa lebih sering diidentifikasi oleh bidan yang difokuskan pada apa yang dialami oleh klien (Rukiyah 2013).

Diagnosis pada ibu hamil dengan anemia dapat ditetapkan berdasarkan data objektif konjungtiva pucat serta data penunjang Hb <11 gr%.

Setelah melakukan pemeriksaan jika didapatkan pasien dengan anemia ringan bila kadar Hb 9-10 gr%, anemia sedang bila kadar Hb 7-8 gr% serta anemia berat bila kadar Hb <7 gr%.

c. Langkah 3. Mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang telah diidentifikasi, langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosis atau masalah potensial ini benar-benar terjadi.

Adapun masalah potensial anemia pada ibu hamil dimasa kehamilan, dapat mengakibatkan abortus karena janin membutuhkan zat besi yang semakin besar jika zat besi ibu kurang maka sel darah merah tidak dapat mengantarkan oksigen secara maksimal, dapat menyebabkan persalinan prematur, dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim terganggu (Bouthamley, 2013).

Pada masa persalinan anemia dapat mengakibatkan gangguan his atau kekuatan untuk mendedan, kala pertama dapat berlangsung lama, kala dua berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan, kala empat dapat terjadi perdarahan post partum sekunder dan atonia uteri.

Pada masa nifas terjadi subinvolutio uteri menimbulkan perdarahan postpartum, pengeluaran ASI berkurang (Salmariantity 2012).

Akibat anemia pada janin dapat terjadi gangguan dalam bentuk abortus, terjadi kematian intrauterine, persalinan prematuritas tinggi, berat badan lahir rendah, kelahiran dengan anemia, dapat terjadi cacat bawaan, bayi mudah mendapat infeksi sampai kematian perinatal.

d. Langkah 4. Penetapan kebutuhann/ tindakan segera

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah keempat mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Jadi manajemen bukan hanya selama asuhan primer periodik atau kunjungan prenatal saja, tetapi juga selama wanita tersebut bersama bidan terus menerus misalnya pada waktu tersebut dalam persalinan (Jannah Nurul 2012).

Pada penderita anemia tidak memerlukan tindakan emergency kecuali jika kondisi anemia berat yang disebabkan oleh perdarahan dan membutuhkan transfusi darah.

Transfusi untuk anemia dilakukan pada pasien dengan kondisi kadar Hb <7 gr% atau kadar hematokrit <20% atau kadar

Hb >7 gr% dengan gejala klinis pusing, pandangan berkunang-kunang atau takikardi (frekuensi nadi >100/menit).

e. Langkah 5. Intervensi/ Perencanaan tindakan asuhan kebidanan.

Pada langkah ini dilakukan perencanaan yang menyeluruh, ditentukan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi, pada langkah ini informasi atau data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi (Jannah Nurul 2012).

Tujuan yang ingin dicapai adalah kehamilan berlangsung normal, keadaan ibu dan janin baik, dan anemia dapat teratasi. Kriteria dalam mencapai tujuan yaitu ibu dapat mengatasi anemia yang dialaminya, dapat beradaptasi dengan kehamilannya.

Tindakan yang akan diambil jika ditemukan anemia pada ibu hamil yaitu pemberian suplemen besi merupakan salah satu cara yang dianggap paling cocok bagi ibu hamil untuk meningkatkan kadar Hb sampai pada tahap yang diinginkan. Selama masa kehamilan minimal diberikan 90 tablet sampai 42 minggu setelah melahirkan, diberikan sejak pemeriksaan ibu hamil pertama. Setiap satu kemasan tablet besi terdiri dari 30 tablet.

Memberikan informasi kepada ibu tentang pentingnya gizi pada ibu hamil, istirahat yang cukup serta kebersihan yang harus diperhatikan selama kehamilan sampai masa persalinan selesai.

Sedangkan tindakan segera atau kolaborasi yang akan dilakukan dengan anemia pada kehamilan jika dibutuhkan yaitu dengan pemasagan oksigen dan melakukan transfusi darah.

Dengan memberikan informasi kepada ibu mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besinya seperti buncis, daging, dan ubi rambat, kuning telur, ikan segar dan sayuran yang berwarna hijau dan makanan yang tinggi vitamin C-nya, seperti buah-buahan yang mengandung zat besi.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S.An-Nahl/16: 10-11 tentang pentingnya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ۱۱

Terjemahnya:

“Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Q.S.An-Nahl/16: 10-11).

Pada ayat lain, Allah swt. menjelaskan juga tentang pentingnya daging, daging yang masih segar seperti dalam Q.S: an-Nahl/16:14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى
الْفَلَكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَأَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۱۴

Terjemahnya:

“Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”(Q.S: an-Nahl/16:14)

Ayat ini menjelaskan bahwa memakan daging yang masih segar seperti ikan akan membantu pertumbuhan dan perkembangan badan seseorang. Hal ini menjadi bukti bahwa daging yang segar merupakan salah satu unsur yang mengandung zat besi yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan jasmani.

f. Langkah 6. Implementasi/ pelaksanaan asuhan

Pada langkah ini rencana asuhan yang menyeluruh dilangkah lima harus dilaksanakan secara efisien. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya, memastikan langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana. Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami komplikasi, maka keterlibatan bidan dalam

manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut.

Implementasi yang diberikan pada ibu adalah hasil pemeriksaan kepada ibu dan jelaskan hal-hal yang dianggap penting, agar ibu dapat mengetahui perkembangan kehamilannya serta merupakan tujuan utama pelayanan antenatal. Jelaskan penyebab anemia agar ibu tahu cara mengatasi anemianya. Dan anjuran pemberian tablet Fe untuk meningkatkan kadar Hb ibu disamping intake makanan yang mengandung zat besi, istirahat yang cukup serta kebersihan diri yang harus terjaga.

g. Langkah 7. Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif juga memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Adapun kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut lebih efektif sedang sebagian belum efektif (Jannah Nurul 2012)

Pada prinsip tahapan evaluasi adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai keefektifan

tindakan yang diberikan, bidan dapat menyimpulkan jumlah kadar Hb dengan melakukan pemeriksaan laboratorium kembali.

1. Pendokumentasian Tindakan Asuhan Kebidanan

Pendokumentasian yang benar adalah pendokumentasian mengenai asuhan yang telah dan akan dilakukan pada seorang pasien. Menurut Varney, didalamnya tersirat proses berfikir bidan yang sistematis dalam menghadapi seorang pasien sesuai langkah-langkah manajemen kebidanan maka didokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu :

a. S (Data Subjektif)

Data subjektif (S) merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah pertama (Pengkajian data), terutama data yang diperoleh melalui anamnesis. Data Subjektif ini berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis.

Berdasarkan teori data subjektif yang diperoleh pada ibu hamil dengan anemia yaitu ibu mengeluh sering merasa lelah, mengantuk, merasa pusing.

b. (Data Objektif)

Data Objektif (O) merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney pertama (Pengkajian

data), terutama data yang diperoleh melalui hasil observasi yang jujur dari pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan diagnostik lain. Catatan medik dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimaksudkan dalam data objektif ini.

Adapun data objektif pada ibu hamil dengan anemia yaitu, konjungtiva pucat dan hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan kadar Hb < 11 gr%.

c. A (Assessment)

A (*Analysis/Assessment*), merupakan pendokumentasian hasil analisis dan intepretasi (Kesimpulan) dari data subjektif dan objektif. Dalam pendokumentasian manajemen kebidanan, karena keadaan pasien yang setiap saat bisa mengalami perubahan, dan akan ditemukan informasi baru dalam data subjektif maupun data objektif, maka proses pengkajian data akan menjadi sangat dinamis.

Analysis/assessment merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut helen varney langkah kedua, ketiga, dan keempat sehingga mencakup hal-hal berikut ini: diagnosis/masalah kebidanan, diagnosis/masalah potensial serta perlunya mengidentifikasi kebutuhan tindakan segera untukantisipasi diagnosis/masalah potensial dan kebutuhan tindakan

segera harus diidentifikasi menurut kewenangan bidan, meliputi: tindakan mandiri, tindakan kolaborasi dan tindakan merujuk klien.


d. P (Planning)

Planning/perencanaan adalah membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Rencana asuhan ini bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien secara optimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraannya. Rencana asuhan ini harus bidan mencapai kriteria tujuan yang ingin dicapai dalam batas waktu tertentu. Tindakan yang akan dilaksanakan harus mampu membantu pasien mencapai kemajuan dan harus sesuai dengan hasil kolaborasi tenaga kesehatan lain, antara lain dokter.

Meskipun secara istilah, P adalah planning/perencanaan saja, namun P dalam metode SOAP ini juga merupakan gambaran pendokumentasian implementasi dan evaluasi. Dengan kata lain, P dalam SOAP meliputi pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah kelima, keenam, dan ketujuh. Pendokumentasian P dalam SOAP ini, adalah pelaksanaan asuhan sesuai rencana yang telah disusun sesuai dengan keadaan dan dalam rangka mengarasi masalah pasien. Pelaksanaan tindakan harus disetujui oleh pasien, kecuali bila tindakan tidak dilaksanakan akan membahayakan keselamatan pasien.

Perencanaan tindakan yaitu beritahu ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan berikan penyuluhan gizi, perlunya minum tablet zat besi, makanan yang mengandung zat besi dan kaya vitamin C, serta menghindari teh/kopi atau susu dalam 1 jam sebelum/sesudah makan (teh/kopi atau susu mengganggu penyerapan zat besi).

Melaksanakan perencanaan yaitu menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, jelaskan hal-hal yang dianggap penting, agar ibu dapat mengetahui perkembangan kehamilannya serta merupakan tujuan utama pelayanan antenatal. Jelaskan penyebab anemia agar ibu tahu cara mengatasi anemianya. Kemudian melakukan evaluasi kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai keefektifan tindakan yang diberikan, bidan dapat menyimpulkan jumlah kadar Hb dengan melakukan pemeriksaan laboratorium Kembali.



BAB III

TELUSURAN EVIDANCEBASED LEARNING

A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Mengumpulkan semua referensi yang akurat berkaitan dengan kondisi pasien ibu dengan anemia, sehingga dapat ditentukan intepetasi yang benar sesuai dengan referensi yang didapatkan

No	Judul Referensi	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Faktor Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	Melorys L. P., dan Galuh N. P.	2017	Faktor Penyebab	Penyebab umum timbulnya anemia pada ibu hamil yaitu kurang gizi atau tidak adekuatnya intake besi (malnutrisi) yang berhubungan dengan peningkatan kebutuhan kadar besi saat kehamilan, malabsorsi besi, pendarahan uterus dan menorrhagia dan kurangnya kesadaran ibu untuk memeriksakan kehamilannya	Penelitian ini terdapat populasi 272 ibu hamil tetapi yang digunakan sampel penelitian berjumlah 74 ibu hamil dengan metode pengambilan sampel	Pada peneliatian ini menggunakan sumber data primer merupakan hasil wawancara dari responden yaitu data tentang pendapatan, pengetahuan tentang anemia ibu hamil, pendidikan ibu, usia, tingkat kecukupan gizi zat besi, tingkat kecukupan gizi protein, tingkat kecukupan gizi vitamin C, status gizi, paritas, dan kebiasaan minum teh.	Pada penelitian ini terdapat tidak ada hubungan antara pendapatan, pengetahuan, pendidikan, usia, tingkat kecukupan zat besi, protein, vitamin C, paritas, kebiasaan minum teh dengan kejadian anemia ibu hamil tetapi ada hubungan status gizi dengan kejadian anemia ibu hamil

2.	Karakteristik Anemia Pada Kehamilan DiPoliklinik Kebidanan RSUP Sanglah Tahun 2016-2017.	Anfiksyar, K. Made. dkk.	2019	Karakteristik anemia pada kehamilan	Pada penelitian ini terdapat banyak faktor resiko yang dapat menyebabkan ibu mengalami anemia pada kehamilan yaitu umur kehamilan, usia ibu, tingkat pendidikan, konsentrasi hemoglobin, pekerjaan, gravida dan status gizi.	Sampel dalam penelitian tersebut masih kurang hanya 80% dari total populasi	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan waktu yang digunakan adalah <i>cross sectional</i> dimana populasi yang digunakan yaitu ibu hamil dengan anemia mulai pada tahun 2016-2017	Pada penelitian lain di Srilanka didapatkan kasus pada trimester kedua sebesar 19,7 %. Hasil yang sama di kawasan Afrika didapatkan kasus pada trimester kedua sekitar 71,6 %. Ibu hamil cenderung lebih sering melakukan ANC pada trimester pertama dan frekuensi ANC berkurang pada trimester kedua sehingga risiko anemia terus meningkat.
----	--	--------------------------	------	-------------------------------------	--	---	---	---

3.	Faktor Risiko Anemia Ibu Hamil di Indonesia	Ikeu Tanziha, dkk	2016	Faktor risiko terjadinya anemia	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa 38,2% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia (Hb<11 g/ dl). Prevalensi ibu hamil yang mengalami anemia di perdesaan sebesar 37,9% dan di perkotaan sebesar 38,2%. Uji chi-square menunjukkan bahwa usia, pendidikan, jumlah kelahiran, frekuensi kehamilan, jarak kehamilan dan antenatal care tidak berhubungan dengan anemia. Faktor risiko utama anemia ibu hamil di Indonesia adalah status gizi (Kurang Energi Kronis/KEK).</p>	<p>Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data Riskesdas 2013, sehingga desain penelitian mengacu desain penelitian Riskesdas 2013 yaitu cross-sectional.</p>	<p>Kategori data penelitian terdiri atas variabel dependen (kejadian anemia pada ibu hamil) dan variabel independen (usia, tingkat pendidikan, status gizi kurang energi kronis, frekuensi kehamilan, jarak kehamilan, konsumsi tablet besi, dan ANC).</p>	<p>Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khambalia et al. (2009) yang menunjukkan bahwa suplementasi besi pada ibu hamil tidak menurunkan anemia dan meningkatkan status besi, namun pada wanita yang tidak hamil ber- laku sebaliknya.</p>
----	---	-------------------	------	---------------------------------	--	--	--	--

4.	Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Buleleng III	Wigutomo Gozali	2018	Hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada ibu hamil	Dari hasil penelitian Terdapat hubungan yang signifikan antara pola makan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Desa asalangsker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Ibu hamil diharapkan memiliki pola makan yang baik sesuai jenis dan jumlah kebutuhan pada masa kehamilan.	Sampel yang digunakan sebagian dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.	Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional dimana pada penelitian ini variabel sebab akibat yang terjadi pada objek penelitian	Hubungan antara pola makan dengan kejadian anemia kuat, dengan intepretasi semakin kurang pola makan ibu hamil maka kejadian anemia semakin tinggi.
5.	Hubungan Tingkat Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Fe Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Desa Purwasari Wilayah Kerja Puskesmas Kuamang Kuning Tahun 2018	Sefryani Nursari SM	2018	Hubungan kejadian anemia pada ibu hamil dengan tingkat kepatuhan mengonsumsi tablet Fe.	Setelah dilakukan penelitian ada hubungan antara tingkat kepatuhan mengonsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Desa Purwasari Wilayah Kerja Puskesmas Kuamang Kuning Tahun 2018.	Setelah dilakukan penelitian tidak didapatkan pemberian edukasi tentang pentingnya mengonsumsi tablet Fe pada ibu hamil	Menggunakan penelitian analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i> dimana mempelajari hubungan antara faktor risiko (kepatuhan konsumsi tablet Fe) dengan faktor efek kejadian anemia) yang diambil datanya pada waktu dan tempat yang bersamaan	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ika Esti Anggraini, dkk (2016) bahwa ada hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia.

6.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Anemia	Atik Purwandari, dkk	2016	Faktor-faktor yang berhubungan terjadinya anemia	Adanya hubungan umur, paritas, kunjungan ANC serta konsumsi tablet Fe dengan tingkat anemia pada ibu hamil tetapi tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan responden dengan tingkat anemia pada ibu hamil	Alat ukur yang digunakan adalah buku register PWS KIA Puskesmas Tonsea Lama Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa tahun 2009-2010	Sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 ibu hamil tahun 2009-2010	Rendahnya konsumsi tablet tambah darah dan masih rendahnya cakupan program distribusi tablet tambah darah, maka perlu dilakukan upaya peningkatan cakupan dan peningkatan konsumsi.
7.	Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	Lilik Susilowati	2019	Faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia	Dapat diketahui ada hubungan antara umur, paritas, pendidikan dan pekerjaan menunjukan adanya hubungan yang bermakna dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Jati Bening Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Periode Januari – April Tahun 2018	Pengambilan data dilakukan dengan data sekunder berdasarkan rekam medik	Mampu mengetahui Faktor apa saja dan faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil.	Sebagian besar ibu hamil yang mengalami anemia pada kelompok umur >35 tahun yaitu sebanyak 53 (59,55%) ibu hamil. Untuk kelompok paritas, yang paling banyak mengalami anemia adalah kelompok multipara yaitu sebanyak 57 (64,0%) ibu hamil.

8.	Karakteristik Anemia Pada Kehamilan DiPoliklinik Kebidanan RSUP Sanglah Tahun 2016-2017.	Anfiksyar, K. Made. dkk.	2019	Mengetahui karakteristik anemia pada kehamilan	Insiden anemia pada ibu hamil di Poliklinik RSUP Sanglah adalah 88,3 %. Tingkat pendidikan terbanyak adalah tingkat pendidikan menengah. Umur kehamilan terbanyak yaitu trimester 3 . Umur ibu terbanyak pada umur 20-35. Konsentrasi hemoglobin terbanyak pada tingkat sedang. Jenis pekerjaan terbanyak adalah Swasta. Gravida terbanyak pada primigravida. Status nutrisi terbanyak adalah normal.	Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif <i>crosssectional</i> dengan sumber data rekam medis	Penelitian ini menjelaskan faktor resiko terjadinya anemia pada ibu hamil di beberapa negara.	Dalam penelitian yang dilakukan di kawasan Afrika ditemukan kasus primigravida lebih banyak dibanding multigravida, masing- masing 54,6 % dan 45,4 %.g
----	--	--------------------------	------	--	---	--	---	--

9.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Anemia Pada Ibu Hamil Trimester II	Syahroni Damanik	2019	Faktor -faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia pada ibu hamil	Faktor yang berpengaruh terhadap kejadian anemia ini adalah kurang gizi, selain itu anemia pada ibu hamil disebabkan karena kehamilan berulang dalam waktu singkat, cadangan zat besi ibu sebenarnya belum pulih, terkurus oleh keperluan janin yang di kandung berikutnya. Selain itu, pendidikan, status ekonomi juga dapat menyebabkan terjadinya anemia kehamilan	Anemia dalam kehamilan dapat berakibat fatal jika tidak segera diatasi akan dapat mengakibatkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi	Sampel yang digunakan ibu hamil trimester II dengan menggunakan metode <i>Accidental sampling</i> . yaitu responden yang kebetulan bertemu dengan peneliti di Puskesmas Kutalimbaru sebanyak 30 ibu hamil trimester II.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian Maulida 2015 dengan judul hubungan tingkat pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe (Besi) dengan kejadian anemia di Puskesmas Keling II Kabupaten Jepara.
10.	Hubungan Antara Status Gizi Ibu Hamil Dengan Kejadian Anemia	Tuti Meihartati,dkk	2017	Analisa hubungan status gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil	Dari penelitian ini diketahui bahwa tidak ada hubungan bermakna antara status gizi ibu hamil dengan kejadian anemia karena dari responden tidak berisiko	Penelitian ini tidak melakukan penelitian secara langsung kepada responden tetapi hanya melakukan penelitian menggunakan data pasien yang didapatkan di buku register.	Sampel yang digunakan sebanyak 305 responden.	Kunjungan antenatal yang teratur agar supaya segera terdeteksinya berbagai faktor risiko kehamilan salah satunya anemia

11.	Hubungan Pola Makan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja	Dina Mariana, dkk	2018	Hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada ibu hamil	Salah satu penyebab anemia pada kehamilan yaitu paritas dan umur ibu. Anemia pada wanita usia subur (WUS) dapat menimbulkan kelelahan, badan lemah, penurunan kapasitas/kemampuan atau produktifitas kerja. Penyebab paling umum dari anemia pada kehamilan adalah kekurangan zat besi, asam folat, dan perdarahan akut dapat terjadi karena interaksi antara keduanya	Desain penelitian ini menggunakan survey analitik dengan rancangan crosssectional dimana pengukuran atau pengamatan variabel independent	Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder.	Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sandrayayuk dkk (2013), dengan judul hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Pleret Bantul, dengan hasil ada hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Pleret Bantul.
-----	--	-------------------	------	---	--	--	--	--

B. Langkah II : Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Aktual

Identifikasi diagnosis, masalah dan kebutuhan pasien ibu dengan anemia berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No	Judul Referensi	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Asuhan Kebidanan Pathologi	Nugraheny, Esti.	2010	Tanda dan gejala pada anemia	Gejala anemia pada ibu hamil yang sering dijumpai yaitu mudah kelelahan, tampak pucat, sering pusing, mata berkunang-kunang, penurunan energi, sesak nafas, tidak bisa berkonsentrasi, dan nyeri dada	Tidak ada penjelasan materi mengenai pemeriksaan penunjang anemia pada ibu hamil	Penjelasan materi disertakan <i>Avidence Based</i>	Pada Nugraheny (2010) mengenai gejala anemia pada ibu hamil sependapat dengan Proeverawati (2011) bahwa gejala anemia pada ibu hamil yang biasa terjadi seperti mudah kelelahan, tampak pucat, sering pusing nyeri dada.

2.	Anemia dan Anemia Kehamilan..	Proverawati , A	2011	Gejala anemia pada ibu hamil	Gejala awal biasanya tidak ada atau tidak spesifik (misalnya, kelelahan, kelemahan, pusing, dispnea ringan dengan tenaga). Gejala dan tanda lain mungkin termasuk pucat dan, jika terjadi anemia berat, akan mengalami takikardi atau hipotensi. Anemia meningkatkan risiko kelahiran prematur dan infeksi ibu postpartum.	Buku menggunakan bahasa yang sulit untuk dimengerti	Buku ini menyediakan banyak materi mengenai anemia	Kejadian anemia pada ibu hamil akan meningkatkan risiko terjadinya kematian ibu dibandingkan dengan dengan ibu yang tidak anemia.
3.	Gambaran Anemia Pada Kehamilan Di Bagian Obstetri Dan Ginekologi RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012	Cut Mutiara Sabrina.	2017	Gambaran anemia pada kehamilan di bagian obstetrik dan ginekologi	Derajat anemia pada kehamilan yang paling banyak ditemukan adalah derajat sedang dan terjadi terutama pada multigravida. Anemia pada kehamilan terbanyak ditemukan pada paritas 1 dan mayoritas terjadi pada ibu dengan jarak kehamilan >3 tahun	Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data rekam medik.	Penelitian ini memperlihatkan angka kejadian anemia pada kehamilan sebanyak 75 kasus (2,2%) dari 3396 kehamilan	Penelitian sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa derajat anemia pada kehamilan yang paling sering terjadi adalah derajat sedang. Hal ini dikarenakan adaptasi fisiologis perempuan selama kehamilan.

4.	<p>Hubungan Tingkat Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Fe Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Desa Purwasari Wilayah Kerja Puskesmas Kuamang Kuning Thun 2018</p>	<p>Sefryani Nursari SM</p>	<p>2018</p>	<p>Hubungan tingkat kepatuhan dalam mengonsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil</p>	<p>Gejala anemia pada ibu hamil yaitu ibu mengeluh cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, malaise, lidah luka, nafsu makan turun (anoreksia), konsentrasi hilang, nafas pendek (pada anemia parah), dan keluhan mual muntah lebih hebat pada hamil muda. Anemia pada ibu hamil dapat digolongkan menjadi sebagai berikut yaitu pada anemia ringan Hb 9-8 gr%, anemia sedang Hb7-8 gr%, dan pada anemia berat Hb< 7 gr%.</p>	<p>Setelah dilakukan penelitian tidak didapatkan pemberian edukasi tentang pentingnya mengonsumsi tablet Fe pada ibu hamil</p>	<p>Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Accidental sampling.</p>	<p>Penyebab timbulnya anemia pada ibu hamil antara lain konsumsi makanan yang tidak seimbang, tidak konsumsi makanan sumber zat gizi yang masih kurang dan kepatuhan minum tablet tambah darah yang masih rendah.</p>
----	--	----------------------------	-------------	---	--	--	---	---

5.	Buku Saku Anemia Pada Ibu Hamil.	Tarwoto.	2013	Pengaruh anemia pada keadaan tubuh ibu hamil	Anemia derajat sedang memberi pengaruh pada keadaan tubuh saat hamil seperti kekurangan energi, kelemahan, dan menurunnya produktivitas kerja. Anemia derajat sedang berkaitan dengan pengaruh yang buruk seperti nafas pendek, takikardi, palpitasi, peningkatan curah jantung yang dapat menyebabkan gagal jantung. Adanya peningkatan kejadian pada persalinan seperti preeklamsi dan sepsis juga merupakan pengaruh dari anemia.	Tidak ada penjelasan materi mengenai pemeriksaan penunjang anemia pada ibu hamil	Manifestasi gambaran klinisnya lengkap dan disertai faktor potensial dari kehamilan pada ibu yang mengalami anemia	Ibu hamil dengan anemia merupakan faktor risiko terjadinya pertumbuhan plasenta yang tidak proporsional.
----	----------------------------------	----------	------	--	--	--	--	--

6.	Gambaran Indeks Eritrosi Pada Ibu Hamil di RSUD Sanglah Denpasar Tahun 2016	Luh Marina Wirahartari, dkk	2019	Melakukan pemeriksaan darah lengkap	Pencegahan dan pengontrolan anemia pada kehamilan sangat penting dilakukan Melakukan pemeriksaan darah lengkap di awal kehamilan untuk mencegah terjadinya dampak buruk anemia pada kehamilan	Penelitian ini adalah studi deskriptif-retrospektif yang dilakukan di RSUP Sanglah Denpasar dimana dalam memperoleh data melalui rekam medis terdapat keterbatasan	Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan klasifikasi anemia berdasarkan konsentrasi Hb dan berdasarkan indeks eritrosit pada ibu hamil yang mengalami anemia	Penelitian ini serupa juga dengan penelitian di Malaysia bahwa anemia pada ibu hamil paling banyak disebabkan oleh defisiensi besi yaitu sebanyak 81,3%.
----	---	-----------------------------	------	-------------------------------------	--	--	---	--

7.	Strategi Dalam Penanggulangan Anemia Pada Kehamilan Intan Parulian Tiurma Roosleyn	Intan Parulian Tiurma Roosleyn	2016	Penjelasan yang mempengaruhi jika kadar Hb rendah.	Kadar Hb yang rendah akan mempengaruhi keadaan sistem maternal untuk memindahkan oksigen dan nutrisi yang cukup ke janin. Risiko defisiensi zat besi meningkat selama kehamilan karena peningkatan kebutuhan zat besi ibu untuk pembentukan sel darah merah dan perkembangan plasenta dan janin	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif korelatif dimana metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meneliti variabel terikat dan variabel bebas.	Penyediaan pelayanan yang mudah dijangkau oleh keluarga yang memerlukan, dan tersedianya tablet tambah darah dalam jumlah yang sesuai.	Sebagian besar penyebab anemia di Indonesia adalah kekurangan besi yang berasal dari makanan yang dimakan setiap hari dan diperlukan untuk pembentukan Hb sehingga disebut “anemia kekurangan besi”.
----	--	--------------------------------	------	--	---	--	--	--

8.	Pengaruh Konsumsi Buah Pisang Ambon Terhadap Anemia Pada Ibu Hamil Trimester I Di Wilayah Kerja Puskesmas Balowerti Tahun 2016	Rahma Kusuma Dewi	2016	Pengaruh asupan zat besi pada ibu hamil	Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar Hb kurang dari 10,0 gr/100 mm (10 gr/dl). Beberapa faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin yaitu kecukupan besi dan metabolisme besi dalam tubuh. Oleh karena itu dalam pemenuhan gizi pada ibu hamil untuk kecukupan besi dibutuhkan asupan zat besi yang cukup.	Hanya menggunakan sampel pada ibu hamil trimester I yang mengalami anemia.	Penelitian dilakukan selama 7 hari dan responden diberikan pisang ambon sebanyak 320 gram setiap hari.	Salah satu alternatifnya untuk mengobati anemia pada ibu adalah mengonsumsi dua buah pisang setiap harinya untuk memenuhi asupan zat besi bagi pasien anemia.
----	--	-------------------	------	---	--	--	--	---

9.	<p>Hubungan Tingkat Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Fe Dengan Kejadian Amenia Pada Ibu Hamil Di Desa Purwasari Wilayah Kerja Puskesmas Kuamang Kuning Tahun 2018</p>	<p>Sefryani Nursari SM</p>	<p>2018</p>	<p>Kebutuhan zat besi pada ibu hamil</p>	<p>Kebutuhan zat besi akan meningkat pada trimester 2 dan 3 yaitu sekitar 6,3 mg/hari. Untuk memenuhi kebutuhan zat besi ini dapat diambil dari cadangan zat besi dan peningkatan adaptif penyerapan zat besi melalui saluran cerna.</p>	<p>Penelitian ini tidak memberikan edukasi mengenai anemia pada kehamilan untuk meminimalisir angka kejadian anemia.</p>	<p>Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Accidental sampling. Analisis Univariat menggunakan distribusi frekuensi dan Analisis Bivariat menggunakan uji Chi-square untuk menganalisis hasil observasi penelitian dengan tingkat kepercayaan 90%.</p>	<p>Penyebab timbulnya anemia pada ibu hamil antara lain konsumsi makanan yang tidak seimbang, tidak konsumsi makanan sumber zat gizi yang masih kurang dan kepatuhan minum tablet tambah darah yang masih rendah.</p>
----	---	--------------------------------	-------------	--	--	--	--	---

10.	Hubungan Kebiasaan Minum The Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester III Di Puskesmas Kota Bumi II Kabupaten Lampung Utara	Yudi Septiawan dan Erta Sugerta	2015	Penurunan konsentrasi haemoglobin (Hb) akibat hemodilusi	Anemia dalam kehamilan adalah suatu kondisi ibu dengan kadar nilai haemoglobin di bawah 11 gr % pada trimester satu dan tiga, atau kadar nilai haemoglobin kurang dari 10,5 gr % pada trimester dua. Perbedaan nilai batas diatas dihubungkan dengan kejadian hemodilusi	Pada penelitian ini tidak di dapatkan penjelasan mengenai Penatalaksanaan secara konservatif.	Distribusi frekuensi ibu hamil trimester II di Puskesmas Kotabumi II Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 yang tidak mengalami anemia yaitu sebanyak 62 responden (68,1%).	Selama kehamilan terjadi peningkatan kebutuhan zat besi hampir tiga kali lipat untuk pertumbuhan janin dan keperluan ibu hamil. Konsekuensi anemia pada ibu hamil dapat membawa pengaruh buruk kesehatan ibu maupun janinnya, keadaan ini dapat meningkatkan morbiditas maupun mortalitas ibu dan anak.
-----	--	---------------------------------	------	--	--	---	--	---

11.	Gambaran Jumlah Retikulosit Pada Ibu Hamil Dengan Anemia	Desty Rambu Bitu Emu, dkk.	2020	Mengetahui gambaran jumlah retikulosit pada ibu hamil dengan anemia	Retikulosit pada ibu hamil dengan anemia didapatkan hampir seluruh responden <i>Hiperproliferatif</i> . Jumlah retikulosit dalam darah pada ibu hamil mengalami peningkatan dikarenakan kebutuhan saat masa kehamilan meningkat dan pola hidup sehat yang kurang efektif, kebutuhan zat gizi ibu hamil kurang tercukupi seperti vitamin C dan zat besi sehingga menyebabkan proses penyerapan Fe dalam tubuh tidak stabil yang dapat mengakibatkan kadar hemoglobin dalam darah menurun sehingga produksi retikulosit meningkat.	Kurangnya Tindakan promosi sebagai Tindakan pencegahan anemia bagi masyarakat khususnya ibu hamil wilayah Cukir.	Teknik pengambilan sampe menggunakan <i>purposive sampling</i> dengan jumlah sampel 12 orang pada semua populasi ibu hamil di wilayah Cukir	Faktor penyebab terjadinya anemia gizi besi pada ibu hamil adalah kurangnya asupan zat besi baik dari makanan maupun dari suplemen zat besi (tablet Fe).
-----	--	----------------------------	------	---	--	--	---	--

12.	Anemia dan Anemia Kehamilan..	Proverawati , A	2011	Gejala anemia pada kehamilan	Gejala awal biasanya tidak ada atau tidak spesifik (misalnya, kelelahan, kelemahan, pusing, dispnea ringan dengan tenaga). Gejala dan tanda lain mungkin termasuk pucat dan, jika terjadi anemia berat, akan mengalami takikardi atau hipotensi	Tidak menjelaskan komplikasi yang dapat terjadi pada ibu maupun janin.	Buku ini menyediakan banyak materi mengenai anemia	Pada kehamilan rentan terjadi anemia karena ibu hamil mengalami hemodilusi (pengenceran) dengan peningkatan volume 30% sampai 40% dan puncaknya terjadi pada kehamilan 32 sampai 34 minggu.
-----	-------------------------------	-----------------	------	------------------------------	---	--	--	---

C. Langkah III : Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Potensial

Identifikasi masalah potensial pada kehamilan dengan anemia yang mungkin terjadi berdasarkan referensi yang telah didapatkan

No	Judul Referensi	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil Trimester III Terhadap Asfiksia Bayi Baru Lahir Di BPS Ny. Zakiyah Hadi	Fany Yanuarti	2016	Hubungan anemia ibu hamil trimester terhadap asfiksia pada bayi baru lahir	Hubungan anemia ibu hamil trimester II terhadap asfiksia bayi baru lahir di BPS Ny. Zakiyah Hadi Tahun 2016 yaitu hampir setengahnya ibu hamil trimester III mengalami anemia ringan (43%), hampir setengahnya bayi baru lahir mengalami asfiksia sedang (47%).	Setelah dilakukan penelitian tidak didapatkan pemberian edukasi mengenai konseling cara mengkonsumsi Fe yang benar dan makanan apa saja yang mengandung zat besi	Populasi sebesar 32 ibu hamil trimester III dan sampel sebesar 30 ibu hamil trimester III dengan tehnik probability sampling menggunakan random sampling. Ini merupakan jumlah yang cukup besar dan menyita perhatian bidan setempat.	Kurangnya kadar Hb pada ibu hamil menyebabkan oksigen yang di transfer ke janin melalui plasenta menjadi berkurang. Khususnya pada ibu hamil trimester III karena akan mendekati proses persalinan.

2.	Patologi Kehamilan: Memahami Berbagai Penyakit dan Komplikasi Kehamilan.	Fatimah dan Arantika	2019	Dampak terjadinya anemia pada ibu hamil	Ibu yang mengalami kejadian anemia memiliki risiko mengalami partus lama 1,681 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia tapi tidak bermakna secara statistik. Ini diduga karena terjadi ketidakseragaman pengambilan kadar Hb dan pada kontrolnya ada yang kadar Hb nya diambil pada trimester 1 dan bisa saja pada saat itu ibu sedang anemia.	Materi yang disajikan mengenai materi anemia cukup terbatas	Dalam buku tersebut menjelaskan penatalaksanaan yang dilakukan pada ibu hamil dengan kejadian anemia yang mudah dimengerti.	Ibu hamil yang memiliki riwayat anemia sebelumnya, riwayat penyakit kronis dan pendarah memiliki peluang lebih besar terjadinya anemia
----	--	----------------------	------	---	---	---	---	--

3.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Anemia Pada Ibu Hamil Trimester II	Syahroni Damanik	2019	Faktor -faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia pada ibu hamil	Pengaruh anemia dalam kehamilan dapat berakibat fatal jika tidak segera di atasi di antaranya dapat menyebabkan keguguran, partus prematus, inersia uteri, partus lama, atonia uteri dan menyebabkan perdarahan serta syok, sedangkan tingginya anemia yang menimpa ibu hamil memberikan dampak negatif terhadap janin yang di kandung dari ibu dalam kehamilan, persalinan maupun nifas yang di antaranya akan lahir janin dengan BBLR, partus premature, abortus, perdarahan post partum, partus lama dan syok.	Sampel yang digunakan ibu hamil trimester II dengan menggunakan metode <i>Accidental sampling</i> . yaitu responden yang kebetulan bertemu dengan peneliti di Puskesmas Kutalimbaru sebanyak 30 ibu hamil trimester II.	Analisis data menggunakan analisis univariat (distribusi frekuensi) dan analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square	Penelitian ini sejalan dengan penelitian Maulida 2015 dengan judul hubungan tingkat pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe (Besi) dengan kejadian anemia di Puskesmas Keling II Kabupaten Jepara
----	---	------------------	------	---	---	---	--	---

4.	Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil Aterm Dengan Berat Lahir Plasenta Dan Berat Lahir Bayi Di Rsu Kota Kupang Tahun 2014	Ignasensia D.Mirong dan Ni Luh Made Diah Putri A	2015	Hubungan anemia pada ibu hamil dengan berat plasenta.	Dari hasil penelitian bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara anemia dengan berat plasenta. Berat plasenta rata-rata hampir sama antara yang normal dan tidak pada ibu hamil aterm dengan anemia. Hal ini disebabkan karena ibu hamil masih dalam kategori anemia ringan dan sedang, belum sampai pada anemia berat sehingga masih bisa memberikan asupan nutrisi yang cukup baik bagi plasenta dan janin.	Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori ini disebabkan karena jumlah sampel yang kurang.	penelitian yang digunakan adalah analitik <i>cross sectional</i> dengan menggunakan sampel minimal yaitu 30 sampel.	Anemia pada ibu hamil merupakan masalah kesehatan terkait dengan insidennya yang tinggi dan komplikasi yang dapat timbul baik pada ibu maupun pada janin.
----	---	--	------	---	---	---	---	---

5.	Dampak Anemia Kehamilan Terhadap Perdarahan Post Partum	Indah Risnawati, Allania Hanung	2015	Hubungan yang signifikan antara anemia ringan dan perdarahan	Anemia yang menyebabkan perdarahan adalah anemia sedang dan berat. Sehingga hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara anemia ringan dan perdarahan.	Dalam penelitian ini menggunakan metode <i>cross sectional</i>	Dalam penelitian ini terdapat 30 sampel ibu hamil yang dibagi dua kelompok berdasarkan kategori tingkat hemoglobinnya.	Anemia dalam kehamilan juga sering dihubungkan dengan terjadinya retardasi pertumbuhan dalam rahim dan persalinan preterm.
6.	Hubungan Anemia Dengan Kejadian Abortus Di Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Aryanti Wardiyah	2016	Mengetahui hubungan anemia dengan kejadian abortus	Dari hasil penelitian mengatakan bahwa adanya hubungan antara anemia dengan kejadian abortus di RSUD Abdul Moeloek Tahun 2013. Karena risiko anemia dengan prevalensi anemia yang tinggi dapat berakibat negatif seperti kekurangan Hb dalam darah mengakibatkan kurangnya oksigen yang dibawa/ditransfer ke sel tubuh maupun ke otak	Dalam penelitian tersebut tidak memberikan penyuluhan mengenai nilai asupan gizi selama kehamilan, sehingga dapat mengurangi angka kejadian kematian ibu dan janin.	Dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 95 responden.	penelitian ini sejalan dengan teori yang kemukakan oleh Saifuddin (2006), bahwa anemia pada saat hamil dapat mengakibatkan efek yang buruk baik pada ibu maupun pada janin.

7.	Gambaran Anemia Pada Kejadian Perdarahan <i>Post Partum</i>	Rini Oktariza, dkk.	2020	Mengetahui gambaran anemia pada kejadian perdarahan post partum.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa gambaran anemia pada ibu hamil cenderung mengalami perdarahan. Karena kurangnya kadar hemoglobin pada tubuh ibu hamil yang menyebabkan pengenceran darah yang berlebihan pada saat persalinan sehingga mengakibatkan perdarahan.	Tidak dijelaskan bagaimana peran bidan sebelum merujuk jika terjadi kondisi anemia yang mengakibatkan kehilangan banyak darah.	Pada penelitian ini jumlah sampel sebanyak 176	Kurangnya kadar hemoglobin pada tubuh ibu hamil yang menyebabkan pengenceran darah yang berlebihan pada saat persalinan sehingga mengakibatkan perdarahan
----	---	---------------------	------	--	--	--	--	---

8.	Hubungan Pola Nutrisi Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di DTP Darmaraja Kabupaten Sumedang Tahun 2018.	Cahyani	2016	Masalah yang disebabkan kurangnya kadar hemoglobin pada ibu hamil	Melihat dari usia kehamilan sudah memasuki trimester III dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat sehingga dapat menyebabkan BBLR karena kurangnya kadar <i>Hemoglobin</i> yang berfungsi untuk mengikat oksigen yang akhirnya akan mengganggu suplai makanan pada metabolisme tubuh ibu	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode survei analitik dengan pendekatan kohort historikal dimana cara kohort ini memiliki keterbatasan kemungkinan subjek penelitian ada yang drop out sehingga dapat mengganggu hasil analisis.	Teknik pengambilan sampel menggunakan sistem random sampling dimana secara sistematis cara ini lebih teliti dan lebih mudah diterapkan.	Kehamilan yang disertai anemia dapat menyebabkan BBLR karena kurangnya suplay oksigen kadar Hb ke janin
----	---	---------	------	---	---	---	---	---

9.	Hubungan Dukungan Suami Dalam Pengelolaan Anemia Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	Candra Reta Francheska, dkk	2019	Resiko terjadinya anemia pada ibu hamil	Anemia pada masa kehamilan dapat menyebabkan kematian pada ibu dan janin. Dukungan suami untuk mengurangi resiko anemia pada masa kehamilan sangat penting.	Desain dalam penelitian ini menggunakan analitik korelasi dengan pendekatan cross sectional	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 54 responden mayoritas memiliki dukungan positif dan tidak anemia yaitu 24 responden (44,4%) sedangkan dukungan negatif dan anemia ringan 15 responden (25,9%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan dukungan suami dalam pengelolaan anemia.	Anemia lebih sering dijumpai dalam kehamilan, hal ini di karena pada masa kehamilan keperluan akan zat-zat makanan bertambah dan terjadi perubahan dalam darah dan sumsum tulang.
----	--	-----------------------------	------	---	---	---	--	---

10.	Pengaruh Anemia Terhadap Kematian Maternal	Abiyyi Pratama Husada Widoyoko dan Rendy Septianto	2020	Pengaruh anemia terhadap kematian ibu hamil.	Berdasarkan tingkat kejadian kematian, anemia masih menjadi salah satu masalah besar penyebab kematian ibu hamil namun belum ada informasi yang mendalam terhadap pengaruh anemia terhadap kematian maternal sehingga perlu dilakukannya studi literatur untuk mengetahui pengaruh anemia terhadap kematian maternal	Tidak membahas mengenai asuhan kebidanan yang dilakukan pada ibu yang mengalami anemia	Penulisan ini menggunakan metode literatur review. Sumber pustaka yang di gunakan yaitu 19 artikel yang berasal dari 5 judul buku terkait ilmu kandungan dan kebidanan, 9 jurnal nasional , dan 5 jurnal internasional.	Anemia pada saat kehamilan dapat menyebabkan perdarahan postpartum salah satunya adalah karena atonia uteri. Atonia uteri terjadi karena kontraksi serat-serat myometrium terutama saat berada di sekitar pembuluh darah yang mensuplai darah pada tempat perlekatan plasenta tidak dapat berkontraksi secara adekuat.
-----	--	--	------	--	--	--	---	--

11.	Anemia Dan Kek Pada Ibu Hamil Sebagai Faktor Risiko Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (Bblr) (Studi Di Wilayah Kerja Puskesmas Juwana Kabupaten Pati)	Susni Yunita Haryanti, dkk.	2019	Hubungan Anemia pada Ibu Saat Hamil dengan Kejadian BBLR	Ibu hamil yang menderita anemia menyebabkan kurangnya suplai darah pada plasenta yang akan berpengaruh pada fungsi plasenta terhadap janin. Hal ini akan mempengaruhi oksigen ke rahim dan mengganggu kondisi intrauteri khususnya pertumbuhan janin akan terganggu sehingga berdampak pada janin lahir dengan BBLR.	Penelitian ini tidak memberikan penyuluhan tentang gizi untuk pencegahan secara dini terjadinya faktor-faktor risiko terjadinya anemia yang dapat menyebabkan bayi dengan berat lahir rendah	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi lahir hidup pada bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2018 yaitu berjumlah 763 bayi.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian di wilayah kerja Puskesmas Suruh Kabupaten Semarang yang menunjukkan bahwa tingkat kecukupan protein yang lebih selama kehamilan dibutuhkan oleh plasenta untuk membawa makanan ke janin, serta untuk pembentukan hormon enzim ibu dan janin
-----	--	-----------------------------	------	--	--	--	--	---

12.	Hubungan Anemia Ibu Hamil Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Uptd Puskesmas Kampar Tahun 2018	Milda Hastuty	2020	Untuk mengetahui hubungan anemia ibu hamil dengan kejadian stunting pada balita	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara anemia ibu hamil dengan kejadian stunting pada balita di UPTD Puskesmas Kampar tahun 2018 dengan P value $0,017 < \alpha 0,05$.	Kurangnya sosialisasi terhadap ibu hamil dan balita untuk deteksi dini terjadinya anemia dan stunting	Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik kuantitatif dengan rancangan penelitian case control study. Studi ini bersifat retrospektif, yaitu menelusuri kebelakang penyebab penyebab yang dapat menimbulkan suatu penyakit dimasyarakat.	Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rolla Destarina (2017) yang berjudul Faktor Resiko Status Anemia Ibu Hamil Terdapat Panjang Badan Lahir Pendek Di Puskesmas Sentolo 1 bahwa hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa ibu hamil yang mengalami anemia di Puskesmas Sentolo 1 ada sebanyak 30% atau ada 96 ibu hamil
-----	--	---------------	------	---	--	---	--	--

D. Langkah IV : Identifikasi Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi

Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan ibu dengan anemia sedang dengan melakukan konsultasi dan kolaborasi berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No	Judul Referensi	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Anemia ibu hamil trimester I dan II meningkatkan risiko kejadian berat bayi lahir rendah di RSUD Wangaya Denpasar	Ketut Labir, dkk	2015	Akibat anemia akan dapat menimbulkan hipoksia	Semakin tinggi kadar haemoglobin ibu berarti jumlah zat besi yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dan pembentukan darah semakin banyak. Dengan semakin banyak darah yang dibentuk maka janin dan plasenta memperoleh kebutuhannya sesuai dengan kadar haemoglobin yang dimiliki ibu.	Tidak terdapat perbedaan angka kejadian BBLR antara anemia trimester I dengan anemia trimester II dengan RR=0,64 (95%CI 0,28-1,47)	Sampel diambil secara random sederhana dari catatan medik RSUD Wangaya Denpasar	Status gizi ibu pada waktu pembuahan dan selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung, gangguan nafsu makan selama masa-masa kehamilan trimester I dan adanya hemodilusi pada trimester II-III berhubungan dengan BBLR

2.	Hubungan Dukungan Suami alam Pengelolaan Anemia Dengan Kejadian Anemia Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	Candra Reta Francheska, dkk	2019	Anemia patologis dapat dicegah salah satunya dengan dukungan suami.	Untuk mengurangi jumlah kejadian anemia pada ibu hamildengan pemberian tablet Fe, selain itu juga dianjurkan untuk makan lebih banyak protein dan sayuran yang mengandung banyak mineral serta vitamin. Dukungan suami sangat diperlukan dalam pencegahan anemia pada ibu hamil, peran serta suami adalah sebagai faktor dasar penting yang berada di sekeliling ibu hamil.	Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian korelasi yaitu menjelaskan suatu hubungan, memperkirakan, dan menguji berdasarkan teori yang ada.	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil trimester II akhir dan trimester III yang tinggal dengan suami	Anemia lebih sering dijumpai dalam kehamilan, hal ini di karena pada masa kehamilan keperluan akan zat-zat makanan bertambah dan terjadi perubahan dalam darah dan sumsum tulang.
----	--	-----------------------------	------	---	---	---	---	---

3.	Determinan Kejadian Anemia Defisiensi Zat Besi Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Nagaswidak Palembang Tahun 2017	Tri Restu Handayani	2017	Faktor yang paling berhubungan dengan anemia defisiensi zat besi pada ibu hamil adalah kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe.	Apabila wanita hamil mengkonsumsi sesuai kebutuhan yang dianjurkan oleh petugas kesehatan dan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat merusak penyerapan zat besi, maka pemenuhan kebutuhan zat besi akan terpenuhi selama kehamilan	Penelitian ini metode penelitian observasional analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	Sampel berjumlah 40 ibu hamil yang memenuhi kriteria inklusi, memeriksakan kehamilannya	Penelitian ini sejalan dengan Penelitian Nurhidayati (2013) menunjukkan hasil terdapat hubungan bermakna antara jarak kehamilan dengan kejadian anemia pada ibu hamil, tidak terdapat hubungan bermakna paritas dengan kejadian anemia pada ibu hamil.
----	--	---------------------	------	--	---	--	---	--

4.	Faktor Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	Melorys Lestari Purwaningtyas, dkk	2017	Pengaruh pengambilan keputusan dalam memberikan gizi yang cukup bagi ibu dan bayinya untuk mengatasi anemia yang terjadi.	Keberhasilan dalam penanganan anemia yang sering terjadi pada ibu hamil yaitu dengan mengubah pola pikir masyarakat mengenai kebudayaan yang selama ini mereka percayai melalui pendekatan yang baik.	Teknik pengambilan sampel menggunakan semua anggota populasi.	Teknik pengambilan data pada penelitian ini dengan cara pengukuran dan wawancara. Pengukuran dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar hemoglobin.	Pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian anemia. Pendapatan yang rendah akan mempengaruhi ibu hamil terkena anemia karena tidak terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dikonsumsi sehari-harinya
----	---------------------------------------	------------------------------------	------	---	---	---	---	--

5.	Pola Pengobatan Anemia Pada Ibu Hamil di Salah Satu Rumah Sakit Ibu dan Anak	Dytha Andri Deswati, dkk	2019	Kebutuhan nutrisi makro yang dibutuhkan untuk proses pembentukan janin menjadi manusia.	Zat besi memiliki peran vital terhadap pertumbuhan janin selama hamil, asupan zat besi harus ditambah mengingat selama kehamilan, volume darah pada tubuh ibu meningkat. Sehingga, untuk dapat tetap memenuhi kebutuhan ibu dan menyuplai makanan serta oksigen pada janin melalui plasenta, dibutuhkan asupan zat besi yang lebih banyak..	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengumpulan data secara retrospektif	Jumlah sampel dihitung berdasarkan rumus Slovin jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 125 orang pasien.	Kekurangan zat besi sejak sebelum kehamilan bila tidak diatasi dapat mengakibatkan ibu hamil menderita anemia merupakan salah satu resiko kematian ibu. Selain itu, anemia kurang zat besi pada ibu hamil juga dapat meningkatkan risiko pada bayi yang dilahirkannya.
----	--	--------------------------	------	---	---	--	---	--

6.	Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Anemia Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	Lindung Purbadewi, dkk	2015	Mengetahui dan memahami akibat anemia dan cara mencegah anemia maka akan mempunyai perilaku kesehatan yang baik	Perilaku kesehatan yang demikian berpengaruh terhadap penurunan kejadian anemia pada ibu hamil. Semakin banyak ibu hamil yang mengetahui mengenai anemia maka akan meningkatkan anemia pada ibu hamil semakin kecil	Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang tercatat di register kohort ibu hamil dan memeriksakan kehamilan di Puskesmas	Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>accidental sampling</i>	Peningkatan pengetahuan tentang anemia ini dapat dilakukan dengan cara penyuluhan yang berdasarkan karakteristiknya agar materi penyuluhan dapat diterima oleh semua ibu hamil meskipun karakteristiknya berbeda.
7.	Interaksi Ibu Hamil Dengan Tenaga Kesehatan	Dina Dewi Angraini, dkk.	2018	Pemberian suplemen zat besi diprioritaskan pada ibu hamil.	Suplementasi pemberian zat besi dalam program penanggulangan anemia gizi telah dikaji dan diuji secara ilmiah efektivitasnya apabila dilaksanakan sesuai dengan dosis dan ketentuan.	Tidak menjelaskan secara detail tes kematangan serviks dengan menggunakan skor bishop.	Buku ini disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti.	Kepatuhan mengonsumsi tablet Fe diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan antara interaksi ibu hamil dengan tenaga kesehatan terhadap kepatuhan mengonsumsi tablet besi (Fe).

8.	Anemia Defisiensi Besi	Masrizal	2015	Agar anemia bisa dicegah atau diatasi maka harus banyak mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi.	Gangguan defisiensi besi sering terjadi karena susunan makanan yang salah baik jumlah maupun kualitasnya yang disebabkan oleh kurangnya penyediaan pangan, distribusi makanan yang kurang baik, kebiasaan makan yang salah, kemiskinan dan ketidaktahuan. Selain itu penanggulangan anemia defisiensi besi dapat dilakukan dengan pencegahan infeksi cacing dan pemberian tablet Fe yang dikombinasikan dengan vitamin C.	Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dimana sampel jenuh ini menggunakan semua populasi yang jumlahnya relatif kecil.	Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif observatif dengan membagi antara variabel bebas dan variabel terikat serta di analisis secara naratif yang perbandingannya terlihat jelas.	Diet yang kaya zat besi tidaklah menjamin ketersediaan zat besi dalam tubuh karena banyaknya zat besi yang diserap sangat tergantung dari jenis zat besi dan bahan makanan.
----	------------------------	----------	------	--	---	--	--	---

9.	Strategi dalam Penanggulangan Pencegahan Anemi pada Kehamilan.	Parulian, Intan.	2016	Pemberian tablet tambah darah sebagai salah satu upaya penting dalam pencegahan dan penanggulangan anemia akibat kekurangan zat besi dan atau asam folat.	Pada kasus anemia sedang tidak diperlukan tindakan segera kepada klien selama keadaan atau kondisi ibu yang mengalami anemia ini tidak merasakan seperti sesak nafas, pingsan, syok atau dalam keadaan tidak sadarkan diri. Untuk ibu hamil di konsumsi satu tablet setiap hari selama masa kehamilannya atau minimal 90 (sembilan puluh) tablet. Ibu hamil dengan anemia pada trimester ketiga perlu diberi zat besi dan asam folat secara IM.	Tidak menjelaskan secara detail tentang faktor dan pencegahan anemia	Buku ini disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti.	Jika diduga ada anemia berat (misalnya: kuku pucat kebiruan, kelopak mata sangat pucat), segera rujuk ibu hamil untuk pemeriksaan dan perawatan selanjutnya.
----	--	------------------	------	---	---	--	---	--

10.	Gambaran Indeks Eritrosit Anemia Pada Ibu Hamil Di RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016	Luh Marina Wirahartari, dkk	2019	Pencegahan dan pengontrolan anemia pada kehamilan sangat penting dilakukan karena anemia ringan yang terdeteksi pada awal kehamilan tidak menyebabkan dampak buruk.	Anemia yang paling umum terjadi pada ibu hamil yaitu anemia defisiensi besi. Keperluan zat besi selama kehamilan adalah 1000 mg, zat besi dari makanan saja tidak dapat memenuhi kebutuhan zat besi yang bertambah, sehingga jika cadangan besi pada tubuh wanita tersebut memang kurang, maka manifestasi klinis anemia defisiensi besi akan muncul	Penelitian ini adalah deskriptif-retrospektif yaitu rancangan penelitian yang hanya melakukan deskripsi melalui data sekunder	Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah pasien anemia pada ibu hamil dan mengetahui klasifikasi anemia berdasarkan kadar Hb dan indeks eritrosit	Anemia dapat disebabkan oleh respon sumsum tulang terhadap pengobatan zat besi atau sebagai tanda awal anemia defisiensi besi
-----	---	-----------------------------	------	---	--	---	---	---

E. Langkah V : Rencana Asuhan Kebidanan

Perencanaan secara menyeluruh dan rasional terhadap masalah kehamilan dengan anemia sedang berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No	Judul Referensi	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Strategi dalam Penanggulangan Pencegahan Anemi pada Kehamilan.	Parulian, Intan.	2016	Upaya penanggulangan anemia pada ibu hamil	Upaya-upaya dalam penanggulangan anemia gizi terutama pada wanita hamil salah satu caranya melalui Suplementasi tablet besi dianggap merupakan cara yang efektif karena kandungan besinya padat dan dilengkapi dengan asam folat yang sekaligus dapat mencegah dan menanggulangi anemia akibat kekurangan asam folat.	Dalam buku tersebut tidak menjelaskan mengenai etiologi terjadinya anemia.	Mampu mengeahui penanggulangan pencegahan secara mendasar terjadinya anemia pada ibu hamil	Keluarga dan anggota keluarga yang resiko menderita anemia harus mendapat makanan yang cukup bergizi.

2.	Anemia Sedang pada Kehamilan Trimester Ketiga	Inke Malahayati	2019	Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan anemia	Dalam perencanaan diupayakan untuk meningkatkan kadar Hb melalui edukasi tentang nutrisi dan pemberian tablet Fe.	Penelitian ini tidak memberikan edukasi pada calon ibu hamil agar menjarangkan kehamilan minimal > 2 tahun.	Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan	Kombinasi suplemen vitamin A dan zat besi untuk mengurangi anemia tampaknya lebih efektif daripada suplemen zat besi atau vitamin A secara terpisah.
3.	Pengaruh Konsumsi Buah Pisang Ambon Terhadap Anemia Pada Ibu Hamil Trimester I	Rahma Kusuma Dewi	2017	Mengonsumsi pisang dapat menjadi solusi anemia bagi ibu hamil yang mengalami hal tersebut.	Pengaruh Pemberian Buah Pisang Ambon Terhadap Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil Trimester I di Wilayah Kerja Puskesmas Balowerti Kota Kediri Tahun 2016 didapatkan sebagian responden mengalami peningkatan dari anemia ringan menjadi tidak anemia.	Hanya menggunakan sampel pada ibu hamil trimester I yang mengalami anemia.	Penelitian ini dapat digunakan bagi responden untuk menangani anemia dan meningkatkan kadar hemoglobin tanpa menggunakan obat kimia.	Pisang banyak mengandung asam folat atau vitamin B6 yang larut dalam air, yang diperlukan untuk membuat asam nukleat dan hemoglobin dalam sel darah merah.

4.	Hubungan Antara Ibu Hamil Usia Muda Dengan Anemia Di BPM “I” Cikutra Kota Bandung Tahun 2015	Haidir Syafrullah	2019	Pencegahan anemia pada ibu hamil adalah mengkonsumsi asupan zat besi, vitamin C dan tablet tambah darah.	Rencana asuhan utama yang akan dilakukan pada ibu hamil dengan anemia yaitu memperbaiki pola nutrisi ibu dan pemberian suplemen besi kepada ibu yang harus dikonsumsi secara rutin	Penelitian menggunakan metode analitik kuantitatif dengan pendekatan cross sectional	Populasi dalam penelitian adalah semua ibu kunjungan ANC dengan usia muda tahun 2015 sebanyak 64 orang.	Anemia dalam kehamilan adalah anemia karena kekurangan zat besi dan merupakan jenis anemia yang pengobatan relative mudah
5.	Hubungan Kebiasaan Minum Teh dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester II Di Puskesmas Kotabumi II Kabupaten Lampung Utara.	Yudi Septiawan, Erta Sugerta		Teh mengandung tanin yang merupakan polifenol yang dapat menghambat absorpsi besi dengan cara mengikatnya	Peneliti menyarankan ibu hamil untuk meningkatkan gizi mereka terutama penyerapan unsur besi dan mencegah teh langsung sebelum dan sesudah makan karena menahan penyerapan zat besi dalam darah	Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>cross-sectional</i>	Mampu mengetahui hubungan antara kebiasaan minum teh dan kasus anemia trimester II ibu hamil	Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Harnany (2006) bahwa tanin merupakan polifenol yang terdapat di dalam teh, kopi dan beberapa jenis sayuran serta buah, juga dapat menghambat absorpsi besi dengan cara mengikat besi.

6.	Hubungan Dukungan Suami Dalam Pengelolaan Anemia Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	Candra Reta Francheska, dkk	2019	Dukungan suami dapat mencegah terjadinya anemia	Semakin baik dukungan suami pada ibu hamil maka akan menurunkan resiko terjadinya anemia pada masa kehamilan karena Suami dapat membantu dalam upaya pencegahan anemia yaitu mengingatkan istrinya untuk rutin minum tablet Fe.	Penelitian ini menggunakan analitik korelasi dengan pendekatan cross sectional	Mampu mengetahui upaya pencegahan anemia	Dengan memberikan dukungan kepada ibu karena dengan kehadiran suami di samping ibu dapat meringankan beban ibu.
----	--	-----------------------------	------	---	---	--	--	---

7.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Anemia	Atik Purwandari	2016	Upaya peningkatan cakupan dan peningkatan konsumsi melalui pemberdayaan masyarakat dan proaktif dari petugas dalam menjangkau sasaran ibu hamil.	Tablet Zat Besi Tablet tambah darah dapat menghindari anemia besi dan anemia asam folat. Pada ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet zat besi minimal 90 tablet selama hamil. Ibu hamil yang mendapat tablet zat besi < 60 dan > 60 tablet	Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional.	Populasi adalah semua ibu hamil trimester III yang mengalami anemia dan memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Tonsea Lama Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa	Setiap ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi secara teratur tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan, karena pada wanita hamil cenderung mengalami defisiensi baik zat besi maupun folat
----	---	-----------------	------	--	--	---	---	--

8.	Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Anemia pada Ibu Hamil Trimester II	Syahroni Damanik	2019	Pemberian pengetahuan mengenai anemia pada ibu hamil dapat mencegah terjadinya anemia.	Ibu hamil yang mempunyai tingkat pengetahuan kurang tentang anemia berarti pemahaman tentang pengertian anemia, hal-hal yang menyebabkan anemia, tanda dan gejala anemia, hal-hal yang diakibatkan apabila terjadi anemia, maupun tentang perilaku kesehatan untuk mencegah terjadinya anemia menjadi kurang untuk dapat menghindari terjadinya anemia kehamilan.	Jenis penelitian ini adalah penelitian survei analitik desain cross sectional.	Analisis data menggunakan analisis univariat (distribusi frekuensi) dan analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square	Adanya hubungan antara tingkat pengetahuan tentang anemia dengan kejadian anemia pada ibu hamil
----	--	------------------	------	--	---	--	--	---

9.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Anemia Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Haurpanggung	Sukmawati, dkk.	2017	Keterlibatan masyarakat sebagai komunitas tempat tinggal klien anemia pada ibu hamil.	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kader kesehatan dan ibu hamil tentang anemia pada ibu hamil membawa perubahan yang signifikan terhadap sikap kader kesehatan dan ibu hamil dalam memahami penyakit anemia pada ibu hamil	Tidak memaparkan kandungan yang dimiliki daun kelor dalam mencegah dan menangani anemia pada ibu hamil	Penelitian ini melakukan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pelatihan kader kesehatan dengan puskesmas.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian Solehati (2018) didapatkan bahwa pendidikan kesehatan tentang deteksi dini dan pencegahan anemia dalam upaya menurunkan AKI berpengaruh dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kader kesehatan
10.	Hubungan Tingkat Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Fe Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Desa Purwasari Wilayah Kerja Puskesmas Kuamang Kuning 1 Tahun 2018	Sefryani Nursari	2018	Untuk mengatasi masalah anemia kekurangan zat besi pada ibu hamil dengan dilakukan suatu program pemberian tablet zat besi pada ibu hamil.	Tablet Zat Besi Tablet tambah darah dapat menghindari anemia besi dan anemia asam folat. Pada ibu hamil dianjurkan untuk mengonsumsi tablet zat besi minimal 90 tablet selama hamil. Ibu hamil yang mendapat tablet zat besi < 60 dan > 60 tablet	Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional.	Populasi adalah semua ibu hamil trimester III yang mengalami anemia dan memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Tonsea Lama Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa	Suplementasi besi atau pemberian tablet Fe merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah dan menanggulangi anemia, khususnya anemia kekurangan zat besi.

F. Langkah VI : Implementasi Asuhan Kebidanan

Mengidentifikasi pelaksanaan dari semua rencana terkait masalah kehamilan dengan anemia berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No	Judul Referensi	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Hubungan Pola Makan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di wilayah Kerja Puskesmas	Dina Mariana, dkk	2018	Ibu hamil dianjurkan untuk mengonsumsi beragam makanan yang memiliki jumlah kalori dan zat-zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan.	Pola makan yang baik selama kehamilan dapat membantu tubuh mengatasi permintaan khusus karena hamil, serta memiliki pengaruh positif pada kesehatan bayi. Pola makan sehat pada ibu hamil adalah makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil harus memiliki jumlah kalori dan zat-zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, serat dan air.	Upaya yang diberikan masih kurang sehingga perlu upaya untuk meningkatkan upaya kesehatan.	Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder.	Pola makan seimbang ibu sesuai dengan kebutuhan gizi sehingga dapat mencegah dan mengatasi masalah dialami oleh ibu hamil

2.	Hubungan Dukungan Suami Dalam Pengelolaan Anemia Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	Candra Reta Francheska, dkk	2019	Pentingnya dukungan suami dalam upaya pencegahan anemia.	Dukungan yang dapat diberikan suami meliputi dukungan emosional, penilaian, informasional, dan instrumental.	Kurangnya ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya kepada tenaga kesehatan sehingga tidak dapat dideteksi sedini	Mampu mengetahui dukungan suami dapat mengurangi resiko anemia pada masa kehamilan	Suami ibu memberikan dukungan karena dengan kehadiran suami di samping ibu dapat meringankan beban ibu.
3.	Interaksi Ibu Hamil Dengan Tenaga Kesehatan Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Ibu Hamil Mengonsumsi Tablet Besi (Fe) Dan Anemia Di Puskesmas Kota Wilayah Selatan Kota Kediri	Dina Dewi Anggraini, dkk	2017	Menganalisis pengaruh interaksi ibu hamil dengan tenaga kesehatan terhadap kepatuhan mengonsumsi tablet besi (Fe) dan anemia pada ibu hamil.	Semakin baik interaksi ibu hamil dengan tenaga kesehatan, maka semakin cenderung ibu hamil untuk patuh mengonsumsi tablet besi (Fe) pada masa kehamilan. Dan semakin tinggi tingkat kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet besi (Fe), maka semakin tinggi pula kecenderungan ibu hamil untuk tidak terkena anemia pada masa kehamilan.	Peneliti tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang asuhan yang diberikan	Sampel yang diambil adalah ibu hamil trimester III yang telah mendapatkan 90 tablet besi (Fe) sbesar 34 orang.	Kepatuhan pasien merupakan sejauh mana perilaku ibu hamil sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh petugas kesehatan

4	Implementasi permenkes 88 tahun 2014 di Pukesmas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Tri Hapsari Listyaningrum	2019	Pelaksanaan pemberian tablet Fe pada ibu hamil	Penanganan anemia pada ibu hamil menjadi lebih optimal karena adanya program <i>ante natal care</i> (ANC) terpadu dimana pasien dilakukan pemeriksaan kehamilan secara lengkap, sehingga terdapat ibu hamil dengan anemia dapat ditangani dengan baik tidak hanya di unit kerja bidan poli KIA tetapi bekerja sama dengan unit yang lain seperti laboratorium, poli gizi, dan dokter umum.	Dalam hasil penelitian tidak menjelaskan mengenai komplikasi yang dapat terjadi pada ibu.	Penelitian ini menggunakan data primer yang didukung dengan data sekunder.	Pemberian tablet Fe selain merupakan upaya preventif dan juga merupakan upaya kuratif bagi ibu hamil dengan anemia ringan dan sedang untuk dapat meningkatkan kadar Hb-nya
---	---	---------------------------	------	--	--	---	--	--

5.	Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil Trimester III Terhadap Asfiksia Bayi Baru Lahir Di BPS Ny. Zakiyah Hadi	Fadina Rizki, Nur Indrawati Lipoeto, Hirowati Ali.	2017	Analisis hubungan antara suplementasi tablet Fe dan kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester III.	Berdasarkan teoridiharapkan kadar Hb dapat normal pada ibu hamil yang mengkonsumsi tablet Fe, karena kebutuhan zat besi pada trimester III kehamilan tidak dapat dipenuhi hanya dari makanan saja. Sehingga pemenuhan kecukupan zat besi dianjurkan dipenuhi melalui suplementasi. Sehingga terdapat hubungan yang bermakna antara suplementasi tablet Fe dan kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester III	Perlu meningkatkan efektifitas program pemerintah dalam upaya penanggulangan anemia.	Sampel yang memenuhi kriteria inklusi berjumlah 66 orang	Penelitian ini sejalan dengan program pemerintah dalam upaya penanggulangan anemia gizi besi melalui pemberian tablet Fe kepada ibu hamil yang diberikan minimal 90 tablet dengan dosis 1 tablet per hari selama kehamilan
6.	Skrining Dan Tatalaksana Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Muaro Kumpeh Dan Klinik Mer-C Jambi	Herlambang, dkk	2018	Skrining dan tatalaksana anemia pada ibu hamil	peningkatan kadar Hb setelah intervensi dan peningkatan pengetahuan diharapkan menjadi fondasi dasar bagi penurunan anemia anemia pada ibu hamil diwilayah kerja mitra yang pada akhirnya memberikan dampak bagi penurunan angka mortalitas dan morbiditas pada ibu dan bayi.	Tidak adanya alat pemeriksaan sehingga klinik Mer-C Jambi belum mencakup skrining anemia rutin.	Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan ibu tentang anemia selama kehamilan yang akan diukur melalui lembar pretest dan post test sebelum dan sesudah penyuluhan.	Angka mortalitas dan morbiditas ibu hamil dengan anemia defisiensi besi lebih tinggi dibandingkan wanita hamil normal.

7.	Pola Pengobatan Anemia Pada Ibu Hamil di Salah Satu Rumah Sakit Ibu dan Anak	Dytha Andri Deswati, dkk.	2019	Penggunaan obat anemia pada ibu hamil.	Berdasarkan penelitian yang dilakukan di salah satu Rumah Sakit Ibu dan Anak Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa pola pengobatan anemia pada ibu hamil yang diterapkan sudah sesuai dengan standar pengobatan anemia, dengan mempertimbangkan efek samping yang akan diterima oleh ibu dan janin.	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder.	Penelitian ini terdapat jumlah sampel sebanyak 125 orang.	Dalam penelitian dokter banyak meresepkan obat paten, sebenarnya tidak semua obat ada dalam bentuk generik terkadang ada obat yang hanya ada pada obat paten
8.	Pengaruh Anemia Terhadap Maternal	Abiyyi Pratama Husada Widoyoko dan Rendy Septianto	2020	Pemberian zat besi diperlukan untuk hemopoiesis (pembentukan darah) dan juga diperlukan oleh berbagai enzim sebagai faktor penggiat.	Defisiensi zat besi tidak menunjukkan gejala yang khas (asymptomatik) sehingga anemia pada balita sukar untuk dideteksi sehingga pemeriksaan ANC secara rutin sangat penting untuk dilakukan.	Penulisan ini menggunakan metode literatur review	Sumber pustaka yang digunakan yaitu 19 artikel yang berasal dari 5 judul buku terkait ilmu kandungan dan kebidanan, 9 jurnal nasional, dan 5 jurnal internasional.	Pemberian asuhan pada kehamilan dengan anemia harus ditangani sesuai dengan tingkatan derajat anemia seperti anemia yang Hb dibawah 7 gr% harus dilakukan transfusi darah

9.	Faktor Risiko Kejadian Anemia pada Ibu Hamil (Risk Factors Related to Anemia in Pregnant Women)	Octa Dwienda Ristica	2015	Memberikan edukasi kepada ibu hamil sangat penting karena pendidikannya lebih rendah cenderung terkena anemia dari pada yang pendidikan tinggi	Kelompok yang umumnya kurang memahami akibat dari anemia, kurang mempunyai akses informasi anemia dan penanggulangannya, kurang dapat memilih bahan makanan bergizi yang mengandung zat besi lebih tinggi, sehingga pada penduduk yang tingkat pendidikannya lebih rendah cenderung terkena anemia dari pada yang berpendidikan tinggi	Jenis desain penelitian yang digunakan adalah studi penampang analitik (analytic cross sectional study)	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Tenayan Raya Pekanbaru sebesar 771 orang ibu hamil.	Pendidikan menunjukkan hubungan sebab akibat dengan kejadian anemia pada ibu hamil
10.	Gambaran Indeks Eritrosi Pada Ibu Hamil di RSUD Sanglah Denpasar Tahun 2016	Luh Marina Wirahartari, dkk	2019	Melakukan pemeriksaan darah lengkap di awal kehamilan untuk mencegah terjadinya dampak buruk anemia pada kehamilan	Pencegahan dan pengontrolan anemia pada kehamilan sangat penting dilakukan karena anemia ringan yang terdeteksi pada awal kehamilan tidak menyebabkan dampak buruk yang serius terhadap ibu dan bayi.	Penelitian ini adalah studi deskriptif-retrospektif yang dilakukan di RSUP Sanglah Denpasar	Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan klasifikasi anemia berdasarkan konsentrasi hemoglobin dan berdasarkan indeks eritrosit pada ibu hamil yang mengalami anemia	Kebutuhan fisiologi tersebut berbeda-beda pada setiap orang, berdasarkan usia, jenis kelamin, ketinggian tempat tinggal dari atas laut, dan juga berdasarkan kehamilan

G. Langkah VII : Evaluasi

Mengevaluasi semua perencanaan dan pelaksanaan kehamilan dengan anemia berdasarkan referensi yang telah didapatkan

No	Judul Referensi	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Hubungan Dukungan Suami Dalam Pengelolaan Anemia Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	Candra Reta Francheska, dkk	2019	Dukungan suami sangat diperlukan dalam pencegahan anemia pada ibu hamil	Dukungan yang diberikan suami kepada istrinya mencakup dukungan instrumental, dukungan informasional, dukungan emosional, dukungan penilaian	Pengolahan data dan analisa uji statistic dengan Cross Tabulation	Data diambil dengan menggunakan kuesioner dan pengukuran kadar hemoglobin.	Mengevaluasi apakah suami ibu memberikan dukungan karena dengan kehadiran suami di samping ibu dapat meringankan beban ibu.

2.	Anemia Defisiensi Besi	Masrizal.	2015	Melakukan pemberian tablet Fe yang dikombinasikan dengan vitamin C.	Selain pemberian tablet Fe mengkonsumsi makanan yang memiliki zat gizi saling melengkapi termasuk vitamin yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi, seperti vitamin C. Mengurangi konsumsi makanan yang bisa menghambat penyerapan zat besi seperti : fitat, fosfat, tannin.	Jenis penelitian ini adalah penelitian survei analitik desain cross sectional.	Analisis data menggunakan analisis univariat (distribusi frekuensi) dan analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square	Menilai kembali asuhan yang telah diberikan kepada ibu yaitu ibu rutin mengkonsumsi makanan yang bergizi dan tetap mengkonsumsi tablet Fe yang telah diberikan
3.	Pengaruh Anemia Terhadap Maternal	Abiyyi Pratama Husada Widoyoko dan Rendy Septianto	2020	Zat besi yang diberikan pada saat kunjungan ANC	Pemeriksaan ANC secara rutin sangat penting untuk dilakukan.	Penulisan ini menggunakan metode literatur review	Sumber pustaka yang di gunakan yaitu 19 artikel yang berasal dari 5 judul buku terkait ilmu kandungan dan kebidanan, 9 jurnal nasional , dan 5 jurnal internasional.	Evaluasi asuhan yang telah diberikan dengan menilai kepatuhan ibu untuk melakukan kunjungan ANC

4.	Faktor Penyebab Anemia pada Ibu Hamil Trimester II dan III.	Handayani, Sri	2016	Menjelaskan pendidikan pada ibu mengenai anemia dan melakukan pemeriksaan secara rutin agar tujuan asuhan dapat tercapai	Memberikan suplemen besi pada ibu meningkatkan kadar Hb. Pemberian suplemen besi harusnya di berikan pada awal kehamilan hingga 42 hari post partum atau 3 bulan.	Buku ini menggunakan bahasa yang sulit dimengerti.	Terdapat banyak materi asuhan kebidanan yang disertai dengan anemia dalam buku tersebut.	Evaluasi hasil pemberian tablet Fe selama ini dan mengevaluasi kembali mengenai tingkat pengetahuan ibu mengenai anemia
5.	Hubungan Pola Makan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di wilayah Kerja Puskesmas	Dina Mariana, dkk	2018	Mengajarkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang seperti buah-buahan, sayur-mayur, dan daging, tetap menjaga pola istirahat serta kebersihan ibu.	Pola makan sehat pada ibu hamil adalah makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil harus memiliki jumlah kalori dan zat-zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, serat dan air	Desain penelitian ini menggunakan survey analitik dengan rancangan crosssectional	Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder.	Mengevaluasi pola makan seimbang ibu sesuai dengan kebutuhan gizi sehingga dapat mencegah dan mengatasi masalah dialami oleh ibu hamil.

6.	Pola Pengobatan Anemia Pada Ibu Hamil di Salah Satu Rumah Sakit Ibu dan Anak	Dytha Andri Deswati, dkk.	2019	Penggunaan obat anemia pada ibu hamil.	Berdasarkan penelitian yang dilakukan di salah satu Rumah Sakit Ibu dan Anak Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa pola pengobatan anemia pada ibu hamil yang diterapkan sudah sesuai dengan standar pengobatan anemia, dengan mempertimbangkan efek samping yang akan diterima oleh ibu dan janin.	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder.	Penelitian ini terdapat jumlah sampel sebanyak 125 orang.	Mengevaluasi penggunaan obat anemia pada ibu hamil di salah satu Rumah Sakit Ibu dan Anak Kabupaten Karawang.
7	Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil.	Amartami, Rizki dkk	2015	Pemberian tablet Fe pada ibu, selain itu juga dianjurkan untuk makan lebih banyak protein dan sayuran yang mengandung banyak mineral serta vitamin	Mengonsumsi makanan bergizi tidak menjamin kecukupan asupan zat besi yang dibutuhkan sehingga dilakukan pemberian zat besi pada ibu hamil	Penelitian menggunakan metode korelasi.	Sampel dalam penelitian ini yaitu ibu hamil yang mengalami anemia	Mengevaluasi apakah ibu tetap mengonsumsi tablet Fe dan vitamin yang diberikan

8	Gambaran Indeks Eritrosi Pada Ibu Hamil di RSUD Sanglah Denpasar Tahun 2016	Luh Marina Wirahartari, dkk	2019	Melakukan pemeriksaan darah lengkap di awal kehamilan untuk mencegah terjadinya dampak buruk anemia pada kehamilan	Pencegahan dan pengontrolan anemia pada kehamilan sangat penting dilakukan	Penelitian ini adalah studi deskriptif-retrospektif yang dilakukan di RSUP Sanglah Denpasar	Tujuan penelitian ini untuk menentukan klasifikasi anemia berdasarkan konsentrasi hemoglobin dan berdasarkan indeks eritrosit pada ibu hamil yang mengalami anemia.	Evaluasi hasil pemeriksaan darah awal yang telah dilakukan
9.	Faktor Risiko Kejadian Anemia pada Ibu Hamil (Risk Factors Related to Anemia in Pregnant Women)	Octa Dwienda Ristica	2015	Pendidikan yang diberikan kepada ibu hamil sangat penting karena pendidikannya lebih rendah cenderung terkena anemia dari pada yang berpendidikan tinggi.	Informasi mengenai anemia dan penanggulangannya penting diberikan kepada ibu karena kurangnya pengetahuan ibu dapat berpengaruh terhadap kondisi ibu	Jenis desain penelitian yang digunakan adalah studi penampang analitik (analytic cross sectional study)	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Tenayan Raya Pekanbaru sebesar 771 orang ibu hamil.	Evaluasi pendidikan yang telah diberikan kepada ibu hamil yang disertai dengan anemia

10.	Implementasi permenkes 88 tahun 2014 di Pukesmas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Tri Hapsari Listyaningrum	2019	Pelaksanaan pemberian tablet Fe pada ibu hamil	Penanganan anemia pada ibu hamil menjadi lebih optimal karena adanya program <i>ante natal care</i> (ANC) terpadu dimana pasien dilakukan pemeriksaan kehamilan secara lengkap, sehingga terdapat ibu hamil dengan anemia dapat ditangani dengan baik tidak hanya di unit kerja bidan poli KIA tetapi bekerja sama dengan unit yang lain seperti laboratorium, poli gizi, dan dokter umum	Dalam buku tersebut tidak menjelaskan mengenai etiologi terjadinya anemia pada ibu hamil.	Penelitian ini menggunakan data primer yang didukung dengan data sekunder.	Pemberian tablet Fe selain merupakan upaya preventif dan juga merupakan upaya kuratif bagi ibu hamil dengan anemia ringan dan sedang untuk dapat meningkatkan kadar Hb-nya
-----	---	---------------------------	------	--	---	---	--	--

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Telaah Evidence Based Asuhan 7 Langkah Varney

Pada bagian pembahasan, setelah menguraikan berbagai referensi dalam bentuk matriks, akan dilakukan perbandingan dari referensi yang satu dengan referensi yang lain:

1. Langkah I: Identifikasi Data Dasar

Pada langkah ini, dilakukan identifikasi yang terjadi pada ibu hamil dengan anemia, mengumpulkan semua informasi akurat dan lengkap dari semua sumber yang telah melakukan penelitian terhadap ibu hamil dengan Anemia. Pada matriks langkah 1, akan didapatkan berbagai referensi tentang definisi, tanda dan gejala serta faktor-faktor yang memengaruhi anemia yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia kehamilan diantaranya gravida, umur, paritas, tingkat pendidikan, status ekonomi, pekerjaan dan kepatuhan tablet FE dan pola makan. berikut penjelasan tentang :

a. Faktor umur

Resiko dengan komplikasi kehamilan adalah umur 20 – 30 tahun, kehamilan beresiko umur <20 dan >35 tahun. Terkait dengan keadaan biologis dan psikologis dari ibu hamil. Hubungan dengan anemia pada umur <20 tahun dapat

menyebabkan anemia karena pada umur tersebut secara biologis dalam hal ini alat reproduksi belum optimal. Wanita yang hamil pada usia tua yaitu >35 tahun akan rentan terhadap anemia.

b. Pengetahuan

Kurang baiknya pengetahuan tentang anemia tidak terlepas dari banyaknya kasus yang didapatkan. Ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian ibu-ibu dalam mengetahui penyebab serta dampak atau akibat lanjut dari anemia tersebut. Dengan tahunya ibu-ibu tentang apa itu anemia pasti pengetahuan ibu-ibu tentang anemia akan bertambah terkhusus untuk ibu hamil.

c. Pola makan

Definisi makan adalah pola konsumsi makan sehari-hari yang sesuai dengan kebutuhan gizi setiap individual untuk hidup sehat dan produktif. Dapat mencapai keseimbangan gizi maka setiap orang harus mengkonsumsi minimal satu jenis bahan makanan dari tiap golongan bahan makanan yaitu karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, buah dan susu. Berikut ini zat-zat yang dibutuhkan pada saat hamil: zat besi, asam folat, vitamin B kompleks, energi, vitamin C, vitamin E dan protein.

d. Jumlah anak

Jumlah anak yang lebih dari dua serta jarak waktu kelahiran terlalu dekat salah satu penyebab yang dapat mempercepat terjadinya anemia. Anemia pada ibu hamil adalah karena jarak kelahiran pendek hal ini disebabkan kekurangan nutrisi yang merupakan mekanisme biologis dan memulihkan faktor hormonal. Jarak kehamilan sangat berpengaruh terhadap kejadian anemia pada saat kehamilan yang berulang dalam waktu singkat akan mengurangi cadangan zat besi ibu. Jumlah anak yang lebih dari dua serta jarak kehamilan yang baik minimal dua tahun menjadi penting untuk diperhatikan sehingga badan ibu siap untuk menerima janin kembali tanpa harus mengurangi cadangan zat besi yang dapat menyebabkan anemia. Jarak kehamilan yang berdekatan juga dapat memicu pengabdian pada anak pertama secara fisik maupun psikis yang dapat menimbulkan berbagai kasih sayang dari orang tuanya.

e. Pemeriksaan kehamilan

Peranan petugas kesehatan sangat diperlukan sekali selain pemeriksaan ANC, pemeriksaan ibu hamil untuk mengetahui status kesehatan sangat perlu dilakukan juga apakah ibu-ibu yang hamil menderita anemia atau tidak. Karena ibu-ibu hamil lebih rentan menderita anemia.

Berdasarkan tingkat pendidikan, status ekonomi dan umur, pendapat (Melory, 2017) sejalan dengan hasil penelitian (Dina Mariana,dkk 2018) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan, status ekonomi, dan umur. semakin tinggi pendidikan ibu hamil maka semakin banyak pula pengetahuannya tentang komplikasi kehamilan serta dapat melakukan pencegahan dan segera memeriksakan dirinya kepusat pelayanan sehingga kejadian anemia dalam kehamilan dapat ditanggulangi secara dini. #

Sedangkan faktor umur juga sangat berpengaruh dengan kejadian anemia kehamilan karena resiko dengan komplikasi pada umur 20–30 tahun, adalah kehamilan beresiko umur <20 dan >35 tahun. Terkait dengan keadaan biologis dan psikologis dari ibu hamil. Hubungan dengan anemia pada umur <20 tahun dapat menyebabkan anemia karena pada umur tersebut secara biologis dalam hal ini alat reproduksi belum optimal. Wanita yang hamil pada usia tua yaitu >35 tahun akan rentan terhadap anemia.

Kepatuhan mengonsumsi tablet FE dan pola makan yang baik juga berhubungan dengan kejadian anemia kehamilan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian (Sefriyani, N, dkk, 2018) mengatakan bahwa kepatuhan ibu hamil Untuk mengatasi masalah anemia kekurangan zat besi pada ibu hamil

sangat efektif untuk pencegahan dan penanggulangan anemia dalam kehamilan.

Berdasarkan hasil telaah dari berbagai sumber, penulis menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya anemia pada kehamilan karena kurangnya asupan makanan serta rendahnya konsumsi tablet tambah darah dan terjadinya hemodelusi atau penambahan volume darah.

2. Langkah II: Perumusan Diagnosis/Masalah aktual

Pada langkah ini perlu dilakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat dari referensi yang telah dikumpulkan. Menegakkan diagnosis dilakukan berdasarkan referensi yang didapatkan sehingga dapat didiagnosis bahwa ibu tersebut mengalami anemia.

Anemia pada Kehamilan adalah anemia yang ditandai dengan kadar *hemoglobin* < 11,0 g/dl atau < 10,5 g/dl pada trimester kedua. Anemia pada kehamilan dibagi menjadi 3 oleh WHO yaitu anemia ringan (*hemoglobin* 10,0-10,9 g/dl), anemia sedang (*hemoglobin* 7,0 – 9,9 g/dl), dan anemia berat (*hemoglobin* < 7,0 g/dl). (Anfiksyar, K. Made. dkk, 2019) Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Properawati, 2011) (Yudi Sertiawan dan Erta Sugerta, 2015) (Abiyi,2020) (Fatimah dan Arantikah, 2019) (Rahma, 2016) dan (Atik Purwandari, 2016).

Berdasarkan hasil telaah dari berbagai sumber, penulis menyimpulkan bahwa ibu hamil dapat didiagnosis mengalami anemia karena kurangnya kadar *Hemoglobin*, atau kadar *hemoglobin* yang tidak memenuhi standart.

3. Langkah III: Perumusan Diagnosis/Masalah Potensial

Pada langkah III, kita mengidentifikasi masalah potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang telah di diagnosis. Langkah ini membutuhkan antisipasi agar tidak terjadi komplikasi. Ibu yang mengalami kejadian anemia memiliki risiko mengalami partus lama 1,681 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia tapi tidak bermakna secara statistik. Ini diduga karena terjadi ketidak seragaman pengambilan kadar Hb dan pada kontrolnya ada yang kadar Hb nya diambil pada trimester 1 dan bisa saja pada saat itu ibu sedang anemia (Arantika, 2019)

Dari beberapa referensi matriks langkah III diatas maka didapatkan masalah potensial yang dapat terjadi pada ibu hamil dengan anemia dapat berakibat fatal jika tidak segera di atasi di antaranya dapat menyebabkan keguguran, partus prematus, inersia uteri, partus lama, atonia uteri dan menyebabkan perdarahan serta syok, sedangkan tingginya anemia yang menimpa ibu hamil memberikan dampak negative terhadap janin yang di kandung dari ibu dalam kehamilan, persalinan maupun nifas yang di antaranya akan lahir janin dengan berat badan lahir rendah (BBLR), partus

premature, abortus, pendarahan post partum, partus lama dan syok (Syahronik, 2019).

Penelitian (Fatimah dan Arantika, 2019) dan (Nurlaily, 2010) mengatakan bahwa Ibu yang mengalami kejadian anemia memiliki risiko mengalami partus lama, gangguan HIS serta berkurangnya produksi ASI dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia tapi tidak bermakna secara statistik. Ini diduga karena terjadi ketidak seragaman kadar *hemoglobin* dan pada kontrolnya ada yang kadar *hemoglobinnya* diambil pada trimester 1 dan bisa saja pada saat itu ibu sedang anemia.

Sedangkan (Cahyani, 2016) (Handayani, 2016) (Candra,2019) dan (Cut Mutiara, 2018) mengatakan bahwa ibu hamil yang mengalami anemia beresiko mengalami kematian janin dalam kandungan (KJDR), persalinan premature, BBLR karena kurangnya kadar *Hemoglobin* yang berfungsi untuk mengikat oksigen yang akhirnya akan mengganggu suplai makanan pada metabolisme tubuh ibu. Kemudian (Atik Purdanwari, 2016) dan (Sefryani, 2018) mengatakan bahwa ibu hamil yang mengalami anemia berpotensi mengalami perdarahan post partum hal ini disebabkan karena oksigen yang disuplai keuterus kurang sehingga uterus tidak berkontraksi dengan baik yang menyebabkan atonia uteri dan perdarahan.

Berdasarkan hasil telaah dari berbagai sumber, penulis menyimpulkan bahwa ibu hamil mengalami anemia berpotensi mengalami abortus, persalinan prematur, hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, ketuban pecah dini, dan saat persalinan dapat mengakibatkan gangguan HIS, kala pertama dalam persalinan dapat berlangsung lama dan terjadi partus terlantar, pada kala nifas dapat terjadi pendarahan postpartum, serta berkurangnya produksi ASI

4. Langkah IV: Tindakan Emergency/ Kolaborasi

Pada langkah ini, bidan atau dokter mengidentifikasi perlunya segera melakukan konsultasi atau melakukan kolaborasi bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya dengan kondisi klien. Dari beberapa referensi matriks langkah IV di atas maka didapatkan tindakan emergency atau kolaborasi dengan dokter jika terjadi komplikasi pada ibu hamil dengan anemia seperti lahir janin dengan berat badan lahir rendah (BBLR), partus premature, abortus, pendarahan post partum, partus lama dan syok. Maka dari komplikasi tersebut

Tindakan segera yang harus dilakukan menurut penelitian (Luh Marina, 2019) (Parulian, 2016) (Casey, 2010) (Dina, 2018) dan (Candra, 2018) yaitu melalui pemberian suplementasi tablet besi. Suplementasi tablet besi dianggap merupakan cara yang efektif karena kandungan besinya padat dan dilengkapi dengan

asam folat yang sekaligus dapat mencegah dan menanggulangi anemia akibat kekurangan asam folat serta mengonsumsi vitamin C untuk membantu proses penyerapan zat besi.

Sedangkan menurut penelitian (Melorys, 2017) (Lindung, 2015) (Dytha, 2019) dan (Ketut, 2015) tindakan segera yang harus dilakukan pada ibu hamil dengan anemia yaitu dengan memberikan edukasi tentang asupan makanan yang dapat mencegah atau menanggulangi permasalahan anemia kehamilan yaitu dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi tinggi seperti (sayuran hijau, sereal, daging merah, telur dan kacang-kacangan) buah-buahan dan mengurangi konsumsi teh dan kopi karena dapat menghambat proses penyerapan zat besi dalam tubuh. Memberikan edukasi tentang anemia kehamilan juga sangat penting agar ibu dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan anemia kehamilan, tanda dan gejala, pencegahan, penanggulangan serta mengetahui dampak buruk dari anemia kehamilan.

Berdasarkan hasil telaah dari berbagai sumber, penulis menyimpulkan bahwa tindakan segera yang dapat dilakukan pada ibu yang mengalami anemia kehamilan adalah memperbaiki asupan makanan ibu, pemberian tablet FE dan mengedukasi ibu tentang anemia kehamilan.

5. Langkah V: Rencana Tindakan

Pada langkah ini dilakukan perencanaan yang menyeluruh, ditentukan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atauantisipasi, pada langkah ini informasi atau data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Pada langkah ini akan diuraikan beberapa referensi yang mencakup penatalaksanaan pada ibu hamil dengan anemia.

Menurut hasil penelitian (Intan, 2016) Salah satu cara upaya untuk mencegah dan menanggulangi anemia yaitu melalui suplementasi tablet besi. Suplementasi tablet besi dianggap merupakan cara yang efektif karena kandungan besinya padat dan dilengkapi dengan asam folat yang sekaligus dapat mencegah dan menanggulangi anemia akibat kekurangan asam folat. pernyataan diatas sejalan dengan hasil penelitian (Atik, 2016) dan (Handayani, 2016).

Sedangkan (Proverawati,2011) Nutrisi yang baik adalah cara terbaik untuk mencegah terjadinya anemia jika sedang hamil atau Makan makanan yang tinggi kandungan zat besi (seperti sayuran berdaun hijau, daging merah, sereal, telur, dan kacang tanah)dapat membantu memastikan bahwa tubuh menjaga pasokan besi yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Pemberian vitamin untuk memastikan bahwa tubuh memiliki cukup asam besi

dan folat pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Haidir, 2019).

Menurut penelitian (Syahroni Damanik, 2019) Pemberian pengetahuan mengenai anemia pada ibu hamil karena kurang pengetahuan tentang anemia berarti pemahaman tentang pengertian anemia, hal-hal yang menyebabkan anemia, tanda dan gejala anemia, hal-hal yang diakibatkan apabila terjadi anemia, maupun tentang perilaku kesehatan untuk mencegah terjadinya anemia. Ibu hamil yang mempunyai tingkat pengetahuan kurang tentang anemia berarti pemahaman tentang pengertian anemia, hal-hal yang menyebabkan anemia, tanda dan gejala anemia, hal-hal yang diakibatkan apabila terjadi anemia, maupun tentang perilaku kesehatan untuk mencegah terjadinya anemia menjadi kurang untuk dapat menghindari terjadinya anemia kehamilan

(Rahma, 2017) mengatakan Pisang merupakan makanan terbaik karena mengandung vitamin yang diperlukan oleh ibu hamil. Buah pisang cukup memenuhi asupan zat besi pasien anemia. Pisang banyak mengandung asam folat atau vitamin B6 yang larut dalam air, yang diperlukan untuk membuat asam nukleat dan hemoglobin dalam sel darah merah. Pisang yang diperkaya vitamin B6 dapat menetralkan asam lambung dan meningkatkan pencernaan. Selain itu, pisang juga mengandung 467 mg kalium, dan ibu hamil perlu 2000 mg kalium setiap harinya. Pemberian

buah pisang ambon terhadap kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester I karena ada pengaruh konsumsi buah pisang ambon terhadap anemia pada ibu hamil trimester I beberapa faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin yaitu kecukupan besi dan metabolisme besi dalam tubuh.

Penelitian (Wulandari P, 2015) mengatakan madu adalah cairan gula yang memiliki kandungan zat gula berupa fruktosa dan glukosa yang merupakan jenis gula monosakarida yang mudah diserap oleh usus. Selain itu madu juga mengandung vitamin, mineral, asam amino, hormon, antibiotik dan bahan-bahan aromatik. Pada umumnya madu tersusun atas 17,1% air, dan 82,4% karbohidrat total, 0,5% protein, asam amino, vitamin dan mineral. Madu mengandung vitamin C, vitamin A, besi (Fe), dan vitamin B12 yang berfungsi sebagai pembentuk sel darah merah dan *hemoglobin*.

Berdasarkan hasil telaah dari berbagai sumber, penulis menyimpulkan bahwa rencana tindakan yang dapat dilakukan pada ibu yang mengalami anemia kehamilan adalah memperbaiki asupan makanan ibu, pemberian tablet FE dan mengedukasi ibu tentang anemia kehamilan serta menganjurkan ibu untuk mengonsumsi madu pisang ambon selama kehamilannya terutama pada trimester I.

6. Langkah VI : Implementasi

Pada langkah ini, akan dilakukan implementasi yang akan diberikan kepada ibu hamil dengan anemia. Berdasarkan dari referensi matriks langkah VI, implementasi pada ibu hamil dengan anemia yaitu dengan memberikan konseling tentang asupan makanan yang dibutuhkan ibu hamil, pendidikan dan pemberian tablet zat besi atau FE.

Penelitian (Dina Mariana, 2018) mengatakan Ibu hamil juga dianjurkan untuk mengonsumsi beragam makanan yang diolah dari empat jenis pokok makanan, yaitu: beras atau alternatif penggantinya, buah-buahan, sayur-mayur, dan daging atau alternatif penggantinya. Makanan yang dikonsumsi setiap harinya harus terdiri dari empat macam panganan ini. Hal ini disebabkan karena masing-masing golongan makanan ini mengandung nutrisi yang berbeda-beda, contohnya: daging serta alternatif penggantinya mengandung protein, namun tidak mengandung vitamin C yang sangat dibutuhkan oleh tubuh.

Pola makan yang baik selama kehamilan dapat membantu tubuh mengatasi permintaan khusus karena hamil, serta memiliki pengaruh positif pada kesehatan bayi. Pola makan sehat pada ibu hamil adalah makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil harus memiliki jumlah kalori dan zat-zat gizi yang sesuai dengan

kebutuhan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, serat dan air.

Penelitian (Candra Reta, 2019) mengatakan Dukungan suami sangat diperlukan dalam pencegahan anemia pada ibu hamil, peran serta suami adalah sebagai faktor dasar penting yang berada di sekeliling ibu hamil. Dukungan yang diberikan suami kepada istrinya mencakup dukungan instrumental, dukungan informasional, dukungan emosional, dukungan penilaian

Penelitian (Luh Marina, 2019) mengatakan bahwa Melakukan pemeriksaan darah lengkap di awal kehamilan untuk mencegah terjadinya dampak buruk anemia pada kehamilan. Pencegahan dan pengontrolan anemia pada kehamilan sangat penting dilakukan karena anemia ringan yang terdeteksi pada awal kehamilan tidak menyebabkan dampak buruk yang serius terhadap ibu dan bayi.

Penelitian (Amartami, 2015) dan (Masrizal, 2015) mengatakan pemberian zat besi (FE) dapat Pencegahan dan pengontrolan anemia pada kehamilan serta pemberian vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Hal ini sangat penting dilakukan karena anemia ringan yang terdeteksi pada awal kehamilan agar tidak menyebabkan dampak buruk yang serius terhadap ibu dan bayi.

7. Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah ini, akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah pemenuhan kebutuhan telah terpenuhi sesuai diagnosis atau masalah, serta mengetahui perubahan yang terjadi pada klien setelah dilakukan penanganan. Berdasarkan dari referensi matriks langkah VII diatas telah didapatkan evaluasi pada ibu hamil dengan anemia

Penelitian (Dina, 2018) dan (Candranita, 2010) mengatakan bahwa mengevaluasi pola makan seimbang ibu sesuai dengan kebutuhan gizi sehingga dapat mencegah dan mengatasi masalah dialami oleh ibu hamil Penelitian (Candra Reta, 2019) mengatakan bahwa mengevaluasi apakah suami ibu memberikan dukungan karena dengan kehadiran suami di samping ibu dapat meringankan beban ibu.

Penelitian (Ridayanti, 2012) mengatakan bahwa langkah yang harus dilakukan adalah mengevaluasi pendidikan yang telah diberikan kepada ibu hamil yang disertai dengan anemia. Penelitian (Masrizal, 2015) mengatakan bahwa pada langkah ini kita harus mengavualuasi hasil pemberian tablet FE selama ini apakah memberikan dampak yang baik dalam pencegahan dan penanggulangan anemia kehamilan

Penelitian (Luh Marina, 2019) mengatakan bahwa mengevaluasi pemeriksaan darah lengkap di awal kehamilan untuk

mencegah terjadinya dampak buruk anemia pada kehamilan. Pencegahan dan pengontrolan anemia pada kehamilan sangat penting dilakukan karena anemia ringan yang terdeteksi pada awal kehamilan tidak menyebabkan dampak buruk yang serius terhadap ibu dan bayi.

Penelitian (Abiyyi, 2020) mengatakan bahwa kita harus mengevaluasi pemeriksaan ANC secara rutin untuk menilai kepatuhan ibu melakukan kunjungan ANC. Penelitian (Rahma, 2017) mengatakan bahwa mengonsumsi pisang ambon dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya anemia kehamilan sedangkan menurut penelitian (Wulandari, 2015) mengatakan bahwa mengonsumsi madu juga dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya anemia kehamilan.

Berdasarkan hasil telaah dari berbagai sumber, penulis menyimpulkan bahwa tindakan yang harus dievaluasi pada ibu yang mengalami anemia kehamilan dampak pemberian tablet FE, pemeriksaan ANC, Pemeriksaan darah lengkap, dukungan suami, Pendidikan dan konsumsi makanan yang mengandung zat besi tinggi serta memperhatikan unsur (Halalan Toyayiban) makanan halal dan baik serta memperbanyak doa dan tawakkal agar kehamilan ibu normal sampai akhir masa kehamilannya.

B. Implantasi Kebidanan

Anemia adalah suatu kondisi dimana berkurangnya sel darah merah (eritrosit) dalam sirkulasi darah atau masa *hemoglobin* sehingga fungsi sebagai pembawa oksigen keseluruh jaringan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar *hemoglobin* di bawah 11 gr% pada trimester I dan III atau kadar *hemoglobin* < 10,5 gr% pada trimester II.

Anemia dapat terjadi karena disebabkan berbagai macam penyebab. Beberapa penyebab umum timbulnya anemia pada ibu hamil yaitu kurang gizi atau tidak adekuatnya intake besi (malnutrisi) yang berhubungan dengan peningkatan kebutuhan kadar besi saat kehamilan, malabsorpsi besi, pendarahan uterus dan menorrhagia, penyakit-penyakit kronis.

Anemia yang terjadi ibu hamil dapat menyebabkan komplikasi pada ibu dan janin. Anemia pada kehamilan sangat berhubungan dengan keadaan ibu maupun janin pada saat persalinan, seperti perdarahan post partum, prematuritas, berat badan lahir bayi rendah bahkan kematian janin.

Pencegahan anemia kehamilan yaitu dengan memberikan nutrisi yang baik. Pemberian nutrisi yang baik adalah cara terbaik untuk mencegah terjadinya anemia jika sedang hamil atau mencoba menjadi hamil. Makan makanan yang tinggi kandungan zat besi (seperti sayuran berdaun hijau, daging merah, sereal, telur, dan kacang tanah) dapat membantu memastikan bahwa tubuh menjaga pasokan besi yang diperlukan untuk berfungsi dengan

baik. Pemberian vitamin untuk memastikan bahwa tubuh memiliki cukup asam besi dan folat.



BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penulisan literatur review dengan kehamilan disertai anemia sedang serta menghubungkan dengan teori dan *Avidence Based* maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu :

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan referensi di dapatkan informasi bahwa data subjektif pada kejadian anemia pada ibu hamil yaitu identifikasi data dasar dengan kehamilan disertai anemia berdasarkan referensi maka didapatkan data dasar dengan kadar Hb < 11,00 gr%. Pada trimester I dan III atau kadar Hb < 10,5 gr% pada trimester II.
2. Berdasarkan referensi untuk mengetahui diagnosis pada ibu dengan kehamilan disertai anemia maka didapatkan diagnosa aktual dilihat dari perhitungan rumus Naegle yang diketahui dengan pasti, keadaan klinis, hasil pemeriksaan antenatal dan pemeriksaan *ultrasonografi* (USG) serta pemeriksaan laboratorium.
3. Berdasarkan referensi Komplikasi yang dapat terjadi pada ibu dengan kehamilan disertai anemia maka didapatkan diagnosa potensial diantisipasi terjadinya anemia berat, kelahiran prematur dan BBLR.
4. Berdasarkan referensi Tindakan segera dan kolaborasi pada ibu dengan kehamilan disertai anemia yang didapatkan maka tindakan segera dilakukan untuk pemberian tablet Fe dan memperbaiki pola nutrisi ibu serta memberikan pengetahuan kepada ibu mengenai anemia.

5. Berdasarkan referensi Rencana asuhan (intervensi) pada ibu dengan kehamilan disertai anemia maka didapatkan rencana asuhan yaitu perencanaan dilakukan untuk pemberian tablet Fe dan memperbaiki pola nutrisi ibu serta memberikan pengetahuan kepada ibu mengenai anemia.
6. Berdasarkan referensi Tindakan asuhan pada ibu dengan kehamilan disertai anemia maka didapatkan tindakan asuhan sesuai dengan intervensi yaitu melaksanakan dilakukan untuk pemberian tablet Fe dan memperbaiki pola nutrisi ibu serta memberikan pengetahuan kepada ibu mengenai anemia.
7. Berdasarkan referensi Evaluasi asuhan kebidanan pada ibu dengan kehamilan disertai anemia maka didapatkan hal-hal yang harus di evaluasi yaitu penanganan anemia yang tidak menimbulkan komplikasi pada ibu maupun pada janin

B. Saran

Melihat besarnya efek yang ditimbulkan dengan adanya masalah anemia pada kehamilan yang akan berdampak pada buruknya keadaan ibu dan janin, maka perlu diberikan tindakan yang tepat dan segera untuk mengantisipasi masalah tersebut. Oleh karena itu, adapun saran dari penulis sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya masalah anemia pada kehamilan maka perlu peningkatan kualitas pelayanan ANC dan pertolongan yang cepat dan tepat, sehingga dapat segera di antisipasi kemungkinan masalah lain yang dapat terjadi.

2. Seorang bidan harus dapat menilai dan mengetahui tanda bahaya kehamilan serta memberikan tindakan yang efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

- Abiyyi, P. (2019) Pengaruh Anemia Terhadap Kematian Maternal. *Jurnal Kesehatan Komunitas*. e-ISSN 2715-6885; p-ISSN 2714-9757
- Ahmad Musthafa Al-Maragi, Tafsir al-Maragi, Jilid 6, Bairut:Dar al-Fikri, 2006.
- Amartami, Rizki dkk. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil*. Jurnal Kebidanan, Vol. 7, No. 2, Oktober 2017. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2015
- Andriani, Yeni, Supriyadi Hari Respati, and Okid Parama Astirin. 2016. "Effectiveness of Pregnant Woman Class in The Prevention of Pregnancy Anemia in Banyuwangi, East Java." *Journal of Maternal and Child Health* 01 (04): 230–41. <https://doi.org/10.26911/thejmch.2016.01.04.04>.
- Anfiksyar, K. Made. dkk. (2019) Karakteristik Anemia Pada Kehamilan DiPoliklinik Kebidanan RSUP Sanglah Tahun 2016-2017. *Jurnal Medika Udayana*, ISSN: 2597-8012
- Anggraini, D. D., Purnomo, W., & Trijanto, B. (2018). Interaksi Ibu Hamil dengan Tenaga Kesehatan dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Ibu Hamil Mengonsumsi Tablet Besi (Fe) dan Anemia di Puskesmas Kota Wilayah Selatan Kota Kediri. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21(2), 92-89.
- Bouthamley. 2013. *Patofisiologi Dalam Kebidanan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Cahyani. *Hubungan Pola Nutrisi Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di DTP Darmaraja Kabupaten Sumedang Tahun 2018*. Jurnal Penelitian
- Candra, R. Noer, S. dkk. (2016) Hubungan Dukungan Suami Dalam Pengelolaan Anemia Pada Ibu Hamil.
- Cut, M. (2017). Gambaran Anemia Pada Kehamilan Di Bagian Obstetri Dan Ginekologi RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012. *Jurnal Kesehatan Andalas*. 2017; 6(1)
- Damanik, S. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi terjadinya Anemia pada Ibu Hamil Trimester II. *WAWASAN KESEHATAN: JURNAL ILMIAH ILMU KESEHATAN*, 5(1).
- Dinas Kesehatan. 2018. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Dina, M. Dwi, W. Padila. (2018) Hubungan Pola Makan Dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas. *Jurnal Kesehatan Silampari*, ISSN: 2581-1975.

- Dytha, A.dkk. (2016) Pola Pengobatan Anemia Pada Ibu Hamil di Salah Satu Rumah Sakit Ibu dan Anak. *Jurnal Family Edu*.
- Emu, D. R. B. (2019). *Gambaran Jumlah Retikulosit Pada Ibu Hamil Dengan Anemia (Studi Di Puskesmas Cukir Kabupaten Jombang)* (Doctoral dissertation, Stikes Insan Cendekia Medika Jombang).
- Fany, Y. (2015). Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil Trimester III Terhadap Asfiksia Bayi Baru Lahir Di BPS Ny. Zakiyah Hadi. *Jurnal Antara bidan*.
- Fatimah dan Arantika.2019.*Patologi Kehamilan: Memahami Berbagai Penyakit dan Komplikasi Kehamilan*.Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Firdayanti. 2014. *Problematika Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) Di Indonesia*. Cetakan I. Makassar: Alauddin University Press.
- Gozali, W. (2018). Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Buleleng III. *International Journal of Natural Science and Engineering*, 2(3), 117-122.
- Haidir Syafrullah, Yasmin Widad Chabellalia, Volume Xiii. 2019. “Hubungan Antara Ibu Hamil Usia Muda Dengan Anemia Di Bpm” XIII: 56–64.
- Hamka, Terjemahan Tafsir Al-Azhar, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983
- Handayani, S. (2017). FAKTOR PENYEBAB ANEMIA PADA IBU HAMIL TRIMESTER II DAN III (STUDI ANALISIS DI PUSKESMAS SELOGIRI). *Jurnal KEPERAWATAN GSH*, 6(1).
- Handayani, T. R. (2017). Determinan Kejadian Anemia Defisiensi Zat Besi pada Ibu Hamil di Puskesmas Nagaswidak Palembang Tahun 2017. *Masker Medika*, 5(2), 345-356.
- Hartati, N. N., & Deprianti, L. M. (2013). FAKTOR RISIKO TERJADINYA ANEMIA PADA IBU HAMIL. *Jurnal Gema Keperawatan*, 10(2), 186-193.
- Haryanti, Dkk. 2019. “ANEMIA DAN KEK PADA IBU HAMIL SEBAGAI FAKTOR RISIKO KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR) (Studi Di Wilayah Kerja Puskesmas Juwana Kabupaten Pati).” *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 7 (1): 322–29.
- Hastuty, M. (2020). HUBUNGAN ANEMIA IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI UPTD PUSKESMAS KAMPAR TAHUN 2018. *Jurnal Doppler*, 4(2), 112-116.
- Herlambang, Amelia Dwi Fitri, and Anggelia Puspasari. 2018. “Skrinning Dan Tatalaksana Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Muaro Kumpoh Dan Klinik Mer-c Jambi.” *MEDIC (Medical Dedication)* 1 (1): 1–7.
- Ibnu Katsir,Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III, Jakarta: GemaInsani Press, 2000.

- Ignasensia, D, dkk (2014) Hubungan Anemia pada Ibu Hamil Aterm dengan Berat Lahir Plesanta dan Berat Lahir Bayi di RSUD Kota Kupang Tahun 2014. *Jurnal Midwifery Medical Journal*. ISSN : 24068179.
- Indriyani, Elly, and Inke Malahayati. 2019. "Anemia Sedang Pada Kehamilan Trimester Ketiga." *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes* 10 (4): 69–72.
- Intan. *Strategi dalam Penanggulangan Pencegahan Anemia pada Kehamilan*. Jurnal Ilmiah, Vol. 3, No. 3, Juli 2016.
- Jannah Nurul. 2012. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Yogyakarta: C.V Andi Offest.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta.
- Ketut. K. dkk. (2016) Anemia ibu hamil trimester I dan II meningkatkan risiko kejadian berat bayi lahir rendah di RSUD Wangaya Denpasar. *Jurnal Ilmiah Bidan*
- Listyaningrum, Tri Hapsari. 2019. "Implementasi Permenkes 88 Tahun 2014 Di Pukesmas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)." *Journal of Health Studies* 3 (1): 1–11. <https://doi.org/10.31101/jhes.793>.
- Luh Marina, W.dkk. (2019) Gambaran Indeks Eritrosit Anemia Pada Ibu Hamil Di RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Bidan*. ISSN: 2597-8012
- Malahayati, I. (2019). Anemia Sedang pada Kehamilan Trimester III. *Jurnal Penelitian Kesehatan" SUARA FORIKES"(Journal of Health Research" Forikes Voice")*, 10(1), 69-72.
- Mariana, Dina, Dwi Wulandari, and Padila Padila. 2018. "Hubungan Pola Makan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas." *Jurnal Keperawatan Silampari* 1 (2): 108–22. <https://doi.org/10.31539/jks.v1i2.83>.
- Marmi, A. Retno murti Suryaningsih, Ery Fatmawati. 2014. *Asuhan Kebidanan Patologi*. Cetakan 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masrizal. (2015). Anemia Defisiensi Besi. *Jurnal Penelitian*.
- Meihartati, T. (2017). Hubungan Antara Status Gizi Ibu Hamil dengan Kejadian Anemia. *Jurnal Kesehatan STIKES Darul Azhar Batulicin*, 3.
- Melorys, L. dkk.(2017). Faktor Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil. *Jurnal Ilmiah Bidan*
- Nadyah. 2013. *Kegawatdaruratan Neonatal, Anak dan Maternal*. Makassar: Alauddin University Press.

- Nugrahaeny, S. (2010) *Asuhan Kebidanan Patologi*. Pustaka Rihama
- Nugroho Taufan. (2014). *Patologi Kebidanan*. Yosngyakarta: Naha Medik
- Pratama Abiyyi, Septianti Rendi. Volume. 2019. “Jurnal Penelitian Perawat Profesional” 1 (November): 89–94.
- Pratiwi, Fatimah. 2018. *Patologi Kehamilan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Prawihardjo. 2013. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawihadjo.
- . 2016. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawihadjo.
- Proverawati. 2011. *Anemia dan Anemia Kehamilan*. Cetakan 1. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Pudiasuti. 2012. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Normal dan Patologi*. Cetakan 1. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Purbadewi, L., & Ulvie, Y. N. S. (2013). Hubungan tingkat pengetahuan tentang anemia dengan kejadian anemia pada ibu hamil. *Jurnal Gizi*, 2(1).
- Purwandari, A., Lumy, F., & Polak, F. (2016). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia. *JIDAN (Jurnal Ilmiah Bidan)*, 4(1), 62-68.
- Purwaningtyas, Melorys Lestari, and Galuh Nita Prameswari. 2017. “Faktor Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil.” *Higeia Journal of Public Health Research and Development* 1 (3): 43–54.
- Purwoastuti, Endang. 2015. *Ilmu Obstetri Dan Ginekologi Sosial Bagi Kebidanan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Oktariza, Rini, Rostika Flora, and Mohammad Zulkarnain. 2020. “Gambaran Anemia Pada Kejadian Perdarahan Post Partum”. *JAMBI MEDICAL JOURNAL “Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan”* 8 (1): 15–18. <https://doi.org/10.22437/jmj.v8i1.9421>.
- Rahma, K. (2016). Pengaruh Konsumsi Buah Pisang Ambon Terhadap Anemia Pada Ibu Hamil Trimester I. *Jurnal Ilmu Kesehatan*
- Reni Yuli Astutik, Dwi Ertiana. 2018. *Anemia Dalam Kehamilan*. Cetakan I. Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi.
- Restuning Widiasih, Ardhini Dwi Utari, Tri Nur Jayanti, Anis Ardiyanti, and Geuis Anggi Siska Rinda Intan Sari. 2019. “Factors Associated With Anemia Among Pregnant Women In Indonesia: A Systematic Review.” *Jurnal Keperawatan Soedirman* 1: 14. <https://doi.org/10.20884/1.jks.2019.14.1.806>.

- Risnawati, Indah, and Allania Hanung. 2015. "Dampak Anemia Kehamilan Terhadap Perdarahan Post Partum." *STIKES Muhammadiyah Kudus* 6: 57–67.
- Risnawati, I., & PSN, A. H. (2015). Dampak Anemia Kehamilan Terhadap Perdarahan Post Partum. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 6(3).
- Rizki, F., Lipoeto, N. I., & Ali, H. (2018). Hubungan suplementasi tablet fe dengan kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester III di puskesmas air dingin kota padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 6(3), 502-506.
- Rukiyah, Ai Yeyeh. 2013. *Asuhan Kebidan I: Kehamilan*. Jakarta: Trans Info Media.
- Salmariantity. 2012. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Gajah Mada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012." *Fkm Ui*, 114.
- Sefryani, N, dkk. (2018). Hubungan Tingkat Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Fe Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Desa Purwasari Wilayah Kerja Puskesmas Kuamang Kuning 1 2018. *Jurnal Kebidanan*
- Setiawati, Dewi. 2013. *Kehamilan dan Pemeriksaan Kehamilan*. Cetakan I. Makassar: Alauddin University Press.
- Shihab, MQ. 2012. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan , Kesan Dan Keserasian Alquran, Vol. 8*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simbolon, dkk. 2018. *Pencegahan dan Penanggulangan KURANG ENERGI KRONIK (KEK) DAN ANEMIA PADA IBU HAMIL*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Siregar, N., Azhari, A., & Syukur, N. A. (2019). Hubungan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester III di Klinik Aminah Amin Samarinda Tahun 2018. *Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan*, 9(1), 492-504.
- Sukarni K. 2013. *Kehamilan, Persalinan, dan Nifas Dilengkapi Dengan Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sukmawati. 2018. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Anemia Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Haurpanggung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 No 9.
<http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20114/9904>.
- Susilowati, L., & Fauzi, L. N. (2019). FAKTOR–FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL. *JURNAL ANTARA KEBIDANAN*, 2(1), 46-53.
- Tanziha, Ikeu, Lalu Juntra Utama, and Risti Rosmiati. 2016. "Faktor Risiko

Anemia Ibu Hamil Di Indonesia” 11 (2) : 143–52.
<https://doi.org/10.25182/jgp.2016.11.2.%p>.

Tarwanto. 2013. *Buku Saku Anemia Pada Ibu Hamil*. Jakarta: Trans Info Media.

Udayana, Jurnal Medika, V O L No, K S S Anfiksyar, Made Bagus, Dwi Aryana, I Gede Ngr, Harry Wijaya, Maret Data, and Excell Hasil. 2019. “KARAKTERISTIK ANEMIA PADA KEHAMILAN DI POLIKLINIK KEBIDANAN RSUP SANGLAH TAHUN 2016-2017 Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana from Year to Year . The Purpose of This Study Is Knowing the Characteristics of Anemia in Pr” 8 (7): 1–7.

Wardiyah, A. (2016). Hubungan Anemia Dengan Kejadian Abortus Di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. *Jurnal Keperawatan*, 7(1).

Wirahartari, Luh Marina, Sianny Herawati, and I Nyoman Wandu. 2019. “Gambaran Indeks Eritrosit Anemia Pada Ibu Hamil Di RSUP SANGLAH Denpasar Tahun 2016” 8 (5): 7–10.

Wulandari, P. (2015). Honey to Prevent Iron Deficiency Anemia in Pregnancy. *Jurnal J Majority*

Yudi, S. dkk. (2019) Hubungan Kebiasaan Minum Teh Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester II Di Puskesmas Kota Bumi. *Jurnal Ilmiah Bidan*

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama : Defira Rahmadani
Nim : 70400117062
TTL : Takalar, 18 Desember 1999
Suku : Makassar
Agama : Islam
Alamat : Bontowa, Desa Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara
Kab. Takalar

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006-2011 SD NEGERI 45 MALOLO.
2. Tahun 2011-2014 SMP NEGERI 3 POLUT.
3. Tahun 2014-2017 SMA NEGERI 3 TAKALAR.
4. Tahun 2017-2021 Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.