

**EDUKASI TAYAMUM TERHADAP DISTRES SPIRITUAL (SALAT)  
PADA TN.B DENGAN DIAGNOSA FRAKTUR 1/3 TIBIA ET FIBULA  
DISTAL DI RUANG BAJI KAMASE RSUD LABUANG BAJI KOTA  
MAKASSAR**



**Karya Tulis Ilmiah**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Profesi Keperawatan Pendidikan Profesi Ners  
Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**MUSTABSYIRATUL AILAH**

**Nim: 70900119036**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudari Mustabsyiratul Ailah NIM: 70900119036, Mahasiswi Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kaus tugas akhir ners yang berjudul “Edukasi Tayamum Terhadap Distres Spirirtual (Salat) pada Tn. B dengan Diagnosa Fraktur 1/3 Tibia et Fibul Distal di Ruang Baji Kamase RSUD Labuang Baji Kota Makassar”, memandang bahwa Tugas Kahir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui utnuk diseminarkan

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut

Makassar, 11 Juli 2021



Pembimbing I



Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustabsyiratul Ailah  
NIM : 70900119036  
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 28 Maret 1997  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Profesi Ners  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Nusa Harapan Permai, Blok C9 No. 29  
Judul : Edukasi Tayamum Terhadap Distres Spiritual  
(Salat) Pada Tn.B Dengan Diagnosa Fraktur 1/3  
Tibia Et Fibula Di Ruang Baji Kamase Rsud  
Labuang Baji Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini adalah benal karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 11 Juli 2021

Penyusun, Mustabsyiratul Ailah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR



NIM: 70900119036

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "Edukasi Tayamum Terhadap Distres Spiritual (Salat) Pada Tn.B Dengan Diagnosa Fraktur 1/3 Tibia Et Fibula Distal Di Ruang Baji Kamase Rsud Labuang Baji Kota Makassar", yang disusun oleh Mustabsyiratul Ailah, NIM : 70900119036 mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, bertepatan dengan , dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa.....2021

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes (  )  
Sekretaris : Dr. Patima, S.Kep, Ns., M.Kep (  )  
Munaqisy I : Ns. Eka Hadrayani, S.Kep, M.Kep (  )  
Munaqisy II : Dr. Rahmi Damis, M.Ag (  )  
Pembimbing I : Ns. Wahdaniyah, S.Kep.,M.Kep (  )  
Pembimbing II : Dr. Patima, S.Kep, Ns., M.Kep (  )

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar, 



## KATA PENGANTAR

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah kita diberikan nikmat kesehatan hingga sampai sekarang ini. Dan tak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw serta para sahabat-sahabat-Nya, pengikut-pegikutnya hingga akhir zaman yang telah mengajarkan iman dan islam kepada kita, sehingga kita dapat menikmati indahnya keimanan dan Islam.

Dengan penuh rasa syukur Penulis ucapkan karena dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah Akhir dengan judul “Edukasi Tayamum Terhadap Risiko Distres Spiritual (Salat) Pada Tn.B Dengan Diagnosa Fraktur 1/3 Tibia Et Fibula Di Ruang Baji Kamase Rsud Labuang Baji Kota Makassar”. mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akhir ini banyak menerima suport moril, saran-saran dan arahan dari berbagai pihak. Penulis mempersembahkan terima kasih setinggi-tingginya untuk kedua orang tua H.Alimin dan HJ.Buwa yang tak henti-hentinya memberi support moril maupun materil, doa-doa yang selalu ditasbihkan dan usaha-usaha yang tak lelah dilakukan untuk mengantarkan penulis menyelesaikan amanah akademik sebagai Perawat Profesional.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhanis M.A, Ph.D selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaludiin, Sp.A.,M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta pada wakil dekan dan staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
3. Ibu Dr. Patimah, S.Kep, Ns, M.Kep selaku ketua Program Studi Profesi Ners sekaligus Pembimbing II dan Ns. Hj. Syisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp.Kep.J selaku sekretaris Program Profesi Ners, beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan.

4. Kepada Ns.Wahdaniah, S.Kep, M.Kes selaku pembimbing I dalam proses penyelesaian yang telah sedia membimbing dan mengawal di awal penulisan karya ilmiah, yang telah sabar, ikhlas meluangkan waktu di tengah rutinitasnya untuk berdiskusi dan memberi arahan kepada dan motivasi bagi penulis.
5. Kepada Ns.Eka Hadrayani, S.Kep, M.Kep selaku Penguji I dan Bapak Dr. Rahmi Damis, M.Ag selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dan kesediaan waktu membimbing sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang terbaik yang diharapkan dapat bermanfaat bagi orang lain.
6. Kepada para perawat di RSUD Labuang Baji Kota Makassar yang telah membersamai dan membimbing proses praktik pendidikan profesi
7. Kepada kakak-kakakku yang kuhormati dan kusayangi kak Hikmah & kak Mas'ud, Kak Syamsul & Kak Umi, dan Kak Dzikrullah & Kak Sakra yang banyak memberikan masukan moril maupun materil dan menjadai salah satu *support system* yang setia menemani saya sejak kecil sampai sekarang dalam menyelesaikan amanah akademik.
8. Kepada teman-teman seperjuangan, Ners Angkatan XVI UINAM yang telah sedia menerima penulis sebagai kawan mulai dari pembelajaran online hingga praktif offline. semoga ukhuwah yang terjalin tetap diertakan walau di kemudian hari telah disibukkan dengan urusan masing-masing.
9. Kepada seluruh teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Gowa dan *bilkhusus* Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Alauddin Makassar yang telah sedia menerima saya, sedia berbagi ilmu dan berbagi strategi untuk menjadi mahasiswa produktif dan menebar kebermanfaatan selama menempuh pendidikan di Tanah Gowa
10. Kepada Keluarga Besar UKM tercinta UKM Riset, Keilmuan dan Kemitraan Masyarakat (RITMA) UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang keduanya menjadi bekal menyelesaikan amanah pendidikan. Telah menghadirkan diri sebagai guru, teman dan saudara.

11. Kepada sahabatku Ali Imran yang telah sedia menjadi *support system* dari jarak jauh, dan sesekali direpotkan dalam proses penugasan akademik, senantiasa menasehati dan menyemangati untuk menyelesaikan amanah pendidikan dan senantiasa menebar kebermanfaatannya.

Di samping itu, penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah baik lisan maupun tindakan saat menempuh pendidikan di Kampus Tercinta, Kampus Peradaban UIN Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa menyempurnakan karya tulis ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan karya ilmiah selanjutnya. Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Sekian dan terima kasih

Makassar, 11 Juli 2021

Mustabsyiratul Ailah



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>7</b>
A...Latar Belakang.....	7
B...Rumusan Masalah.....	13
C...Tujuan Umum dan Khusus.....	13
D...Manfaat Penulisan.....	14
<b>BAB II KONSEP TEORI.....</b>	<b>15</b>
A...Konsep Medis.....	15
1...Definisi.....	15
2...Etiologi.....	16
3...Patofisiologi.....	16
4...Manifestasi klinik.....	17
5...Pemeriksaan penunjang.....	17
6...Penatalaksanaan.....	18
7...Komplikasi .....	19
B...Konsep keperawatan .....	20
1...Pengkajian.....	20
2...Diagnosis keperawatan.....	28
3...Intervensi Keperawatan.....	34
<b>BAB III LAPORAN KASUS.....</b>	<b>52</b>
A...Pengkajian.....	52

B...Diagnosis Keperawatan.....	78
C...Intervensi.....	79
D...Implementasi dan Evaluasi.....	85
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>106</b>
A...Analisa Kasus.....	106
B...Analisa Intervensi.....	107
C...Alternatif penyelesaian Masalah.....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
A...Kesimpulan.....	112
B...Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>



## ABSTRAK

Nama : Mustabsyiratul Ailah  
NIM : 70900119036  
Judul : Edukasi Tayamum Terhadap Distres Spirirtual (Salat) pada Tn. B dengan Diagnosa Fraktur 1/3 Tibia et Fibul Distal di Ruang Baji Kamase RSUD Labuang Baji Kota Makassar

---

**Latar belakang:** Fraktur tibia fibula dapat mengakibatkan gangguan muskuloskeletal dapat berefek pada disabilitas karena berkaitan langsung dengan ekstremitas bawah ditandai dengan keterbatasan dalam berbagai fungsi tubuh. Penurunan kemampuan fungsi tubuh tersebut dapat mengakibatkan klien mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar harus menjadi fokus pelayanan dalam pemberian asuhan keperawatan salah satunya aspek psikologis yang di dalamnya mencakup spiritual. **Tujuan:** Melaksanakan asuhan keperawatan pada klien dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula distal dengan masalah distres spiritual (salat) di ruang Baji Kamase RSUD Labuang Baji Kota Makassar. **Metode** yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan pemeriksaan fisik. **Hasil** analisis menunjukkan terdapat beberapa diagnosis yaitu nyeri akut, gangguan mobilitas fisik, distres spiritual, defisit perawatan diri, dan risiko infeksi. Salah satu intervensi yang dapat diberikan pada distres spiritual adalah melibatkan klien dalam aktivitas ritual seperti salat yang di dahului dengan tayamum sebagai alternatif pengganti wudhu bagi orang sakit. **Kesimpulan:** berdasarkan hasil evaluasi pada studi kasus yang dilakukan distres spiritual tidak teratasi dengan edukasi tayamum. Perawat perlu memahami secara menyeluruh perspektif teoritis yang berkaitan dengan perubahan perilaku kesehatan klien. Karena hal ini memberikan dampak terhadap konteks konseptual untuk memahami perilaku klien sehingga mudah mengaplikasi intervensi keperawatan dan menawarkan pendekatan alternatif untuk efektivitas perawatan klien

**Kata kunci:** Fraktur, Distres Spiritual, Edukasi Tayamum

## ABSTRACT

Name : Mustabsyiratul Ailah  
NIM : 70900119036  
Judul : Tayamum Education on Spiritual Distress (Salah) to Mr. B with a fracture of 1/3 of os tibia et fibul distal in Baji Kamase Room, Labuang Baji Hospital, Makassar City

---

**Background:** Tibia fibula fractures can cause musculoskeletal disorders that can have an effect on disability because they are directly related to the lower extremities characterized by limitations in various body functions. The decrease ability on body function can cause the client to have problems on basic needs. Fulfillment of basic needs must be the focus of service in providing nursing care, one of which is the psychological aspect which includes spirituality **Aim:** implement nursing care for clients with a fracture of 1/3 os tibia et fibula distal with spiritual distress (salah) in Baji Kamase room at Labuang Baji Hospital, Makassar City. **Method:** case study with data collection techniques through observation, interviews and physical examination. **Result:** The results of the analysis showed that there were several diagnoses, acute pain, impaired physical mobility, spiritual distress, self-care deficit, and risk of infection. One of the interventions that can be given to spiritual distress is to involve clients in ritual activities such as prayers preceded by tayammum as an alternative to ablution for sick people. **Dicussion:** based on the results of the evaluation, spiritual distress was not resolved by tayammum education. Nurses need to thoroughly understand the theoretical perspectives related to changing the client's health behavior. Because this has an impact on the conceptual context for understanding client behavior, It can make easy to apply nursing interventions and offers alternative approaches to the effectiveness of client care.

**Keywords:** Fracture, Spiritual Distress, Tayamum Education



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebutuhan dasar manusia merujuk pada konsep kebutuhan dasar Abraham Maslow dengan membagi hirarki piramida dari atas ke bawah yaitu: Kebutuhan (1) fisiologis, (2) kemananan, (3) rasa cinta dan kepemilikan (Sosial dan spiritual), (4) harga diri dan (5) aktualisasi diri. Urutan kebutuhan dasar pada piramida Maslow tersebut dibagi menjadi kebutuhan dasar (1-2), kebutuhan Psikologis (3-4), dan kebutuhan pemenuhan diri, aktualisasi diri (5). (McLeod, 2020). Dalam pemberian asuhan keperawatan klien, kebutuhan dasar fisiologis adalah prioritas utama yang harus ditangani yaitu: kebutuhan oksigen/udara, cairan, nutrisi, tidur dan istirahat, suhu tubuh, eliminasi dan seksual (Patrisia et al., 2020). Walau demikian, perawat tidak boleh mengabaikan aspek lain karena pemberian asuhan keperawatan harus mencakup berbagai aspek secara holistik meliputi biologis, psikologis, sosial, kultural dan spiritual.

Dalam pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan, perawat cenderung berfokus kepada pada satu aspek saja yaitu aspek fisiologi/biologis, sehingga dominan pekerjaan yang dilakukan perawat adalah melaksanakan instruksi medis sehingga tugas perawat dalam memberikan asuhan keperawatan terabaikan. Analisis situasi tersebut dilaporkan dalam hasil Survei Kemenkes RI terhadap Rumah Sakit di Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan 54-74% perawat melakukan instruksi medis, 20% perawat melakukan praktik keperawatan namun belum terkelola secara optimal, dan 68% tugas

pemenuhan kebutuhan dasar klien dikerjakan oleh keluarga, sedangkan hal tersebut adalah tugas perawat (Yusuf et al., 2016).

Pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang harus menjadi fokus pelayanan dalam pemberian asuhan keperawatan adalah aspek psikologis yang di dalamnya mencakup aspek spiritual. Spiritualitas mencakup semangat, makna hidup, keyakinan dan harapan yang berhubungan dengan dzat yang transendental. (Yusuf et al., 2016). Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis dalam menjalani Praktik Pendidikan Profesi Ners selama 7 hari tanggal 7-13 Maret 2021 di ruang Perawatan Baji Kamase RSUD Labuang Baji Makassar, didapatkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar klien hanya berfokus pada aspek fisiologis dengan menjalankan instruksi dokter berupa perawatan luka pada klien fraktur, dan penanganan nyeri dengan pemberian analgetik. Sedangkan aspek spiritual cenderung terabaikan. Selain itu, format pengkajian spiritualitas dalam rekam medik hanya menanyakan keyakinan/agama klien. Tidak terdapat *form* pertanyaan tentang kebiasaan spiritualitas klien sebelum sakit dan ritual keagamaan apa yang biasa dilakukan. Dalam pemenuhan kebutuhan spiritual yang bersifat ritual tidak terdapat buku/poster doa untuk kesembuhan, tuntunan salat untuk orang sakit dan tata cara tayamun sebagai alternatif pengganti wudhu.

Keyakinan dan pemenuhan spiritualitas sangat penting bagi klien karena hal tersebut dapat menjadi faktor klien mendapatkan kekuatan untuk menghadapi penyakit fisik seperti fraktur, rasa nyeri akibat fraktur yang diderita, dan stres emosional yang dapat dirasakan (Yusuf et al., 2016). Spiritualitas adalah salah satu aspek keberadaan manusia yang

memanifestasikan dirinya secara signifikan pada saat krisis dan stres. Spiritualitas menciptakan makna dalam hidup dan menginspirasi seseorang untuk menghadapi masalah (Ghodrati & Ebrahimi, 2019). Pada klien dengan faktor tibia fibula, dapat terjadi distress spiritual karena adanya perubahan aktivitas dan bentuk tubuh (Hidayat & Uliyah, 2015). Salah satu intervensi yang direkomendasikan oleh Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (PPNI, 2018) adalah dukungan spiritual diantaranya dengan melibatkan klien pada aktivitas ritual ibadah satunya adalah salat.

Hasil observasi yang dilakukan penulis di ruang Perawatan Baji Kamase dan Ruang CVCU RSUD Labuang Baji pada Tanggal 7-21 Maret 2021, terdapat masing-masing satu klien dengan diagnosis *Post op Apendisitis* dan *Cardiac Heart Failure (CHF)* dengan pemenuhan kebutuhan spiritualitas yang terpenuhi. Terdapat perbedaan pemenuhan kebutuhan dasar kedua klien tersebut dengan klien lainnya yang mengalami gangguan pada kebutuhan spiritual yang tidak terpenuhi.

Berdasarkan observasi penulis, klien dengan pemenuhan kebutuhan spiritual yang terpenuhi yaitu salat, dzikir dan berdoa, keyakinannya terhadap kesembuhan lebih baik dibandingkan klien lainnya. Selain itu, pola tidur dan *personal hygiene* kedua klien tersebut lebih terjaga karena mendisiplinkan diri untuk mengatur pola tidur sesuai waktu salat dan kebersihan dirinya terjaga agar memudahkan melakukan ibadah ritual. Selain itu, perbedaan fisik yang lebih nampak adalah raut wajah klien. Klien dengan kebutuhan spiritual yang terpenuhi nampak lebih segar dan bersemangat. Sedangkan klien dengan kebutuhan spiritual yang tidak terpenuhi nampak pucat, dan lemas. Walaupun

tentu terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi hal tersebut, akan tetapi jika merujuk pada makna spiritualitas menurut Yusuf, et.al (2016) hal tersebut berkaitan dengan semangat, makna hidup dan termasuk keyakinan terhadap kondisi kesehatan.

Berdasarkan kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan spiritual klien, hal itu dapat membantu terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya seperti kebutuhan istirahat dan tidur, serta kebutuhan *personal hygiene* dan memperbaiki pola koping terhadap penyakit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghodrati dan Ebrahimi (2019) menyebutkan bahwa intervensi untuk pemenuhan kebutuhan spiritual seperti berdoa, ibadah ritual lainnya dan salat efektif dalam mengurangi stres, depresi, kecemasan, rasa sakit pada pasien, dan meningkatkan kualitas hidup pada klien dengan kanker dan penyakit kronis. Rasa sakit merupakan salah satu karakteristik gejala yang dirasakan klien pada fraktur tibia fibula.

Hasil penelitian Majed & Hasan dari departemen Kedokteran Rumah Sakit GNP Jeddah dan Departemen Kardiologi Rumah sakit King Fahd Ahmed Jeddah menyebutkan bahwa salat memberikan efek positif bagi kesehatan di antaranya pada berbagai aspek tubuh seperti fisik, sistem saraf, sistem kardiovaskuler, dan sistem muskuloskeletal. Pada klien dengan fraktur tibia fibula, salah satu sistem yang utama dipengaruhi adalah sistem muskuloskeletal. Salat bukan hanya aktivitas fisik tetapi juga mencakup pembacaan berbagai ayat Al-Qur'an dan kinerja posisi postural tertentu. Salat adalah intervensi nonfarmakologis dan sumber kekuatan. Salat dapat

dimasukkkan dalam perawatan holistik dan program rehabilitasi yang ditujukan untuk kesejahteraan pasien. (Majed & Hassan, 2021).

Pada klien dengan faktor tibia fibula, terdapat gangguan mobilitas fisik dan kondisi penyakit yang tidak memungkinkan klien untuk melakukan salat secara sempurna dan berwudhu. Sehingga untuk memulai melakukan salat klien dapat dianjurkan untuk melakukan tayamum. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam Qs: Al-Maidah:[5]:6:

.. وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ  
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. . .

Terjemahannya:

“ . . . dan jika kalian sakit, atau dalam perjalanan, atau datang dari tempat buang air, atau kalian telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah dengan debu yang suci. . .”

Berdasarkan Qs.Al-Maidah:[5]:6 dijelaskan bahwa orang yang sakit dan tidak menemukan air, atau tidak mampu terkena air, maka baginya cukup dengan bertayamum menggunakan debu yang suci sebelum mendirikan salat .

Dukungan kebutuhan spiritual klien (Salat) tetap dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dengan memberikan edukasi tayamum. Gerakan tayamum dapat dilakukan di atas tempat tidur dan tidak mengganggu aktivitas fisik klien yang terbatas karena terdapat fraktur tibia fibula. Selain itu, gerakan tayamum tidak berpotensi meningkatkan skala nyeri pada lokasi fraktur karena gerakannya hanya berfokus pada tangan dan wajah. Hasil penelitian Sunardi et al., (2017) terhadap 16 pasien yang telah melakukan tayamum menunjukkan adanya peningkatan kebersihan kulit klien. Hal tu disebabkan mineral pada debu yang terdapat pada tayamum kita yang

digunakan klien mengandung bakteri intrinsik yang dapat meningkatkan kebersihan kulit.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan edukasi tayamum terhadap risiko gangguan pemenuhan kebutuhan spiritual (salat) pada Tn.B dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula di ruang Baji Kamase RSUD Labuang Baji Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena gangguan pemenuhan kebutuhan spiritual yang terdapat pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pada Karya Tulis Ilmiah: Studi Kasus ini adalah Bagaimana asuhan keperawatan pada klien dengan distres spiritual (salat) pada Tn.B diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula di ruang Baji Kamase RSUD Labuang Baji Kota Makassar?

## **C. Tujuan Umum dan Khusus**

### 1. Tujuan umum

Melaksanakan asuhan keperawatan pada klien dengan diagnosa diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula distal dengan masalah distres spiritual (salat) di ruang Baji Kamase RSUD Labuang Baji Kota Makassar.

### 2. Tujuan khusus

- a. Melaksanakan pengkajian yang komprehensif pada klien diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula distal
- b. Menegakkan diagnosis keperawatan pada klien dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula distal
- c. Membuat perencanaan dan implementasi keperawatan pada klien dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula distal

- d. Melakukan vealuasi keperawatan pada klien dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula distal
- e. Menerapkan edukasi tayamum untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan spiritual (salat) klien dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula distal

#### **D. Manfaat Penulisan**

##### **1. Manfaat Teoritis**

karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam proses pembelajaran untuk melakukan pemenuhan kebutuhan spiritual klien dengan diagnosa fraktur tibia 1/3 fibula distal

##### **2. Manfaat Aplikatif**

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi referensi intervensi terhadap masalah gangguan pemenuhan kebutuhan spiritual/risiko distres spiritual (salat) pada klien dengan diagnosa fraktur tibia 1/3 fibula.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Konsep Teori Fraktur

##### 1. Definisi

Fraktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan hilangnya kontinuitas tulang yang bersifat total atau sebagian. Fraktur adalah kerusakan yang terjadi pada kontinuitas tulang yang diakibatkan oleh tekanan eksternal yang diserap tulang lebih kecil dibandingkan stres yang terjadi (Suriya & Zuriati, 2019). Gabungan fraktur tibia dan fibula distal adalah salah satu fraktur diafisis yang paling umum terjadi di antara semua tulang panjang .

Fraktur poros tibialis adalah fraktur salah satu tulang kaki bagian bawah. Kaki bagian bawah memiliki dua tulang di dalamnya, tibia dan fibula. Tibia berfungsi sebagai penopang utama kaki. Fibula menambah stabilitas pada sendi lutut dan pergelangan kaki. Tibia Anda adalah tulang besar di antara lutut dan pergelangan kaki. Poros adalah bagian tengah dari tulang itu. Fraktur poros tibialis sering terjadi, tetapi tidak selalu berkaitan dengan fraktur fibula (Marchand, 2020)

Faktur terbagi menjadi 2 yaitu fraktur terbuka (*open fracture*) dan fraktur tertutup (*close fracture*). Fraktur terbuka adalah kondisi cedera yang menyebabkan tulang yang retak atau hematoma fraktur terpapar ke lingkungan eksternal melalui trauma pada jaringan lunak dan kulit. Luka yang nampak pada kulit dapat berada jauh dari lokasi fraktur, sehingga setiap fraktur yang terdapat luka harus dicurigai *open fracture* sampai terbukti bahwa itu adalah *close fracture*. Sedangkan *close fracture* adalah

cedera tulang yang menyebabkan kerusakan atau keretakan tetapi tidak hematoma dan fraktur tidak mencapai lingkungan eksternal. (Jessica L. & Aaron, 2021)

## 2. Etiologi

Fraktur akibat trauma. Hal itu paling sering terjadi akibat cedera berenergi tinggi, tetapi dapat pula terjadi akibat trauma kecepatan rendah ketika ujung tajam dari fragmen fraktur menembus kulit dan jaringan lunak. Fraktur terbuka karena energi tinggi sering dikaitkan dengan kondisi lain yang mengancam jiwa akibat poli-trauma dan menimbulkan risiko lain seperti cedera neurovaskular, kerusakan jaringan lunak, kontaminasi luka, dan pengelupasan kulit yang membuatnya lebih mungkin mengalami komplikasi (Jessica L. & Aaron, 2021).

Beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan fraktur yaitu: jatuh dari ketinggian, trauma, kecelakaan bermotor, kekerasan, pukulan langsung, Kekuatan berulang seperti yang disebabkan oleh berlari, dapat menyebabkan fraktur stres pada kaki, pergelangan kaki, tibia, atau pinggul (Benjamin, 2020).

## 3. Patofisiologi

Ketika cedera traumatis terjadi, tulang dan jaringan lunak menyerap energi yang timbul dari lingkungan eksternal. Ketika ambang absorpsi terlampaui, hubungan antar tulang mengalami kerusakan yang menyebabkan pengupasan periosteal dan kerusakan jaringan lunak. Fragmen tulang yang kominitif seringkali tidak melekat pada struktur penahan apapun yang memungkinkan mereka berpindah tempat

menyebabkan kerusakan jaringan lunak dan struktur neurovaskular yang signifikan. Saat kulit robek, itu menciptakan efek vakum yang kemudian menarik semua kotoran di sekitarnya ke dalam luka. Bahan asing dan kotoran sering dapat disimpan ke dalam korteks intramuskular dan tulang (Jessica L. & Aaron, 2021)..

#### 4. Manifestasi klinik

Tanda dan gejala yang dapat timbul pada fraktur yaitu: bengkak atau memar di atas tulang, deformitas, rasa sakit yang hebat di area cedera yang semakin meningkat ketika area tersebut dipindahkan atau ditekan, mobilitas terbatas atau ketidakmampuan menggerakkan anggota tubuh, hilangnya fungsi di area cedera. Pada fraktur terbuka, tulang menonjol dari kulit (Benjamin, 2020).

#### 5. Pemeriksaan penunjang

Menurut *American Academy Orthopaedic of Surgeons* (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Sinar X/Pemeriksaan roentgen : untuk menentukan lokasi, luas dan jenis fraktur. Sinar-X memberikan gambar struktur padat, seperti tulang. Rontgen dilakukan dari sejumlah sudut yang berbeda untuk mencari fraktur dan untuk melihat keselarasan tulang. Meskipun jarang, seseorang mungkin dilahirkan dengan tulang ekstra di patela yang belum tumbuh bersama. Kondisi ini disebut patela bipartit dan dapat disalahartikan sebagai fraktur. Sinar-X akan membantu mengidentifikasi patella bipartit. Karena banyak orang mengalami kondisi di kedua lutut.

- b. Scan tulang, tomogram, CT- scan/ MRI : memperlihatkan fraktur dan mengidentifikasi kerusakan jaringan lunak
  - c. Pemeriksaan darah lengkap : Ht mungkin meningkat (hemokonsentrasi) atau menurun (perdarahan bermakna pada sisi fraktur atau organ jauh pada trauma multiple). Peningkatan sel darah putih adalah respon stress normal setelah trauma.
  - d. Kreatinin : Trauma otot meningkatkan beban kreatinin untuk klirens ginjal. Profil koagulasi : perubahan dapat terjadi pada kehilangan darah, transfuse multiple, atau cedera hati
  - e. Pemeriksaan fisik, tepi-tepi fraktur sering dapat dirasakan melalui kulit, terutama jika fraktur tersebut tergeser. Selama pemeriksaan, akan diperiksa apakah terjadi *hemarthrosis*. Dalam kondisi ini, darah dari ujung tulang yang patah terkumpul di dalam ruang sendi, menyebabkan pembengkakan yang menyakitkan. Jika terdapat banyak darah di lutut, maka harus dikeringkan untuk membantu meringankan rasa sakit.
6. Penatalaksanaan
- a. Pembedahan

Pada fraktur terbuka umumnya memerlukan operasi. Pembedahan meningkatkan peluang Anda untuk sembuh dan memungkinkan klien untuk memulai rehabilitasi lebih cepat. Umumnya cedera ini adalah penempatan "batang" atau "paku" di pusat berongga atau poros tibia. Dokter bedah dapat memilih untuk menggunakan pelat jika fraktur meluas ke arah sendi lutut atau pergelangan kaki. Pembedahan

menstabilkan patah tulang dan membiarkannya sembuh. Klien akan diberikan antibiotik sebelum operasi, jadi penting untuk mengonfirmasi ke ahli bedah alergi antibiotik tertentu (Marchand, 2020).

b. Perawatan pasca operasi

Setelah melakukan operasi, klien akan beradaptasi dengan kondisinya yang menggunakan alat bantu berjalan. Hal ini tergantung dengan tingkat keparahan fraktur. Klien dapat diajarkan secara mandiri melakukan terapi fisik masuk dan keluar dari rumah sakit untuk membangun kembali kekuatan dan mendapatkan kembali fungsi muskuloskeletal, tetapi ini tidak selalu diperlukan. Klien akan diberikan analgetik untuk membantu mengurangi, tetapi tidak menghilangkan rasa sakit (Marchand, 2020).

c. Perawatan jangka panjang

Setelah operasi biasanya klien akan membutuhkan alat bantu berjalan atau kruk dalam jangka waktu tertentu. Pemberian Terapi fisik diperlukan untuk penguatan otot, peregangan dan pelatihan daya tahan (Marchand, 2020).

7. Komplikasi

Komplikasi fraktur poros tibia jarang terjadi tetapi hal tersebut berpotensi terjadi di antaranya pembekuan darah, infeksi, kesulitan berjalan, atau pincang. Risiko jangka panjang termasuk tulang tidak sembuh (nonunion), tidak sembuh pada posisi yang benar (malunion), dan perangkat keras yang mengganggu (bergejala). Semua komplikasi ini

mungkin memerlukan operasi lain, rawat inap di rumah sakit, antibiotik, atau intervensi lain. Terkadang beberapa atau semua perangkat keras atau alat yang ditanam pada area tulang saat operasi perlu dilepas (Marchand, 2020).

#### 8. Teori Model Keperawatan Spiritual

*Spirituality in Nursing* atau aspek spiritualitas dalam keperawatan merupakan salah satu konsep model keperawatan yang dikembangkan oleh Mary Elizabeth O'Brien dengan melibatkan dzat transendental dalam proses sehat sakit. Hal ini merupakan refleksi dari kisah pertemuan Musa dengan Allah dalam wujud api di bukit Sinai. Allah SWT mengingatkan Musa a.s bahwa ketika dia berpegang teguh, percaya kepada Allah maka lingkungan yang ada di sekitarnya menjadi suci, terdapat kekuatan transendental yang memberkati. Maka ketika perawat praktisi, perawat akademisi memiliki keyakinan kepada Tuhan lalu berhadapan dengan klien, dan menyakinkan klien terhadap kekuatan transendental yang dapat memberikan kesembuhan Tuhan akan ikut hadir dan lingkungan di sekitarnya memberikan energi positif yang bermanfaat untuk kesembuhan (O'Brien, 2017).

Aspek spiritualitas mencakup kepercayaan terhadap nilai yang diyakini termasuk konsep sehat sakit yang melibatkan dzat transendental dalam proses penyembuhan. Keperawatan adalah benar-benar tantangan intuisi dan spiritualitas. Keyakinan dan semangat akan nilai-nilai hidup dan kesehatan (O'Brien, 2017).

Sejalan dengan itu, Dalam Qs:Asy-Syu'ara:[28]:80 Allah SWT berfirman terkait kisah kepercayaan Ibrahim terdapat proses sehat sakit

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku”

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik spiritual dalam keperawatan adalah kepercayaan kepada Allah sebagai dzat transendental yang dapat memberikan kesembuhan.

## **B. Konsep Keperawatan**

### **1. Pengkajian**

Pengkajian merupakan langkah awal yang harus dilakukan perawat dengan mengumpulkan data-data secara komprehensif sebelum menentukan tindakan apa yang akan diberikan kepada klien. data yang ditemukan dikoordinasikan dengan informasi latar belakang, kondisi biopsikososial dan spirirtual klien yang dapat dikonfirmasi kepada keluarga, teman dan klien sendiri(Suriya & Zuriati, 2019).

Informasi dasar yang harus menjadi fokus perhatian pad agangguan sistem muskuloskeletal adalah aktivitas sehari-hari klien seperti ambulasi dan penggunaan alat bantu. Karakteristik utama pada fraktur tibia fibula adalah nyeri sehingga penting untuk dikaji secara komprehensif menggunakan *P (Problem)*, *Q (Quality)*, *S (Scale)*, *R (Region)*, *T (Time)* sebagai acuan dalam menetapkan diagnosis dan intervensi keperawatan (Suriya & Zuriati, 2019; Thompson et al., 2020).

Pengkajian harus dilakukan dengan teliti. Pengumpulan data secara menyeluruh terdiri dari data subjektif dan data objektif dilakukan melalui

anamnesis dan pemeriksaan fisik. Data-data yang harus dikumpulkan yaitu :

a. Identitas klien

Meliputi data pribadi yang digunakan untuk mengetahui informasi klien secara individual yaitu: nama, usia, jenis kelamin, alamat, penggunaan jenis transportasi dan orang-orang terdekat klien (Suriya & Zuriati, 2019).

b. Riwayat kesehatan yang lalu

Informasi ini mencakup kondisi kesehatan individu di masa lalu khususnya yang berdampak pada gangguan muskuloskeletal seperti riwayat jatuh, trauma, kelainan otot dan tulang, riwayat farmakologi (Suriya & Zuriati, 2019).

c. Riwayat kesehatan sekarang

Informasi ini mencakup keluhan utama, onset, keluhan atau gejala lain yang menyertai. Pada klien dengan fraktur tibia fibula, keluhan utama yang dapat muncul adalah nyeri dengan skala dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan tingkat keparahan dan pengalaman subjektif klien sebelumnya. Pemeriksaan dapat difokuskan pada nyeri, kelainan fungsi, deformitas, inflamasi, kemerahan, penurunan rentan gerak dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari (Suriya & Zuriati, 2019; Thompson et al., 2020).

d. Nyeri

Deskripsi nyeri dapat dikaji melalui pendekatan PQRST (Suriya & Zuriati, 2019):

P: *problem*. Penyebab timbul, faktor yang memperparah atau mengurangi gejala

Q: *quality*. Karakteristik nyeri yang dirasakan, seperti tertusuk-tusuk, tertekan atau perih

S: *scale*. Tingkat beratnya nyeri yang dirasakan klien, dapat diukur menggunakan *Numeric Rating Scale* (NRS) dengan kategori: Tidak nyeri (0), nyeri ringan (1-3), nyeri sedang (4-6), nyeri berat (7-10)

T: *time*. Frekuensi dan durasi nyeri yang dirasakan, apakah nyeri dirasakan tiba-tiba, menetap atau bertahap

e. Kekuatan otot dan sendi

Anamnesis dan lakukan pemeriksaan fisik pada lokasi seperti adanya kekakuan, luka terbuka atau tertutup, perubahan warna dan suhu kulit. Lakukan pemeriksaan pada kekuatan otot ekstremitas (Suriya & Zuriati, 2019). Pemeriksana tonus otot dapat dilakukan dengan membolak-balik estremitas secara pasif dengan penilaian sebagai berikut: (0) kelumpuhan, (1) hanya kontraksi, (2) dapat bergerak namun tidak mampu menahan gravitasi, (3) mampu menahan gravitasi tetapi tidak mampu menahan tekanan pemeriksa, (4) mampu menahan gravitasi dan tekanan pemeriksa, namun tidka normal, (5) kekuatan normal (Santoso, 2016).

f. Immobilitas

Kaji waktu kejadian dan sejak kapan keterbatasan gerak dirasakan. Apakah menimbulkan efek pada aktivitas sehari-hari dan efek pada bagian tubuh yang lain. pada klien dengan fraktur tibia fibula lazimnya ditemukan ketergantungan total dari immobilitas klien (Marchand, 2020; Suriya & Zuriati, 2019).

g. Perubahan sensori

Kaji adanya penurunan respon sensori pada lokasi fraktur dan tubuh yang lain. Fraktur dan bengkak dapat menurunkan respon sensori (Suriya & Zuriati, 2019).

h. Aktivitas sehari-hari

Kumpulkan informasi terkait pekerjaan dan kebiasaan sehari-hari klien sebelum sakit dan setelah sakit. Riwayat pekerjaan dapat membantu menganalisis kemungkinan kelainan otot lainnya yang dapat timbul, misal pada orang dengan kebiasaan bekerja membawa barang berat dapat menimbulkan cedera otot dan trauma. Kebiasaan aktivitas saat sakit dapat membantu menganalisis adanya keterbatasan gerak dan tingkat ketergantungan klien (Suriya & Zuriati, 2019).

i. Pemeriksaan fisik

Infomasi kondisi fisik klien dilakukan melalui pemeriksaan secara komprehensi dapat dilakukan dengan pendekatan *head to toe*. Pada klien dengan fraktur tibia fibula yang mengalami keterbatasan renan gerak, pemeriksana dapat dilakuakn di tempat tidur dengan gerakan

minimal untuk meminimalisir peningkatan nyeri (Marchand, 2020; Suriya & Zuriati, 2019). Pemeriksaan *head to to* pada klien dengan fraktur tibia fibula dapat ditemukan yaitu (Watulangi, 2019):

a. Kepala

1) Rambut dan kepala

Klien dengan fraktur tibia fibula biasanya disebabkan oleh kecelakaan dan trauma tumpul. Sehingga penting memeriksa bagian kepala apakah terdapat luka dan trauma.

2) Mata

Pada sekitar mata periksa konjungtiva apakah ada anemis. Memeriksa adanya kterik pada skeler atau akumulasi darah, kondisi penglihatan, penggunaan alat bantu, ukuran dan refleks pupil terhadap cahaya.

3) Telinga

Lakukan pemeriksaan pinna, kaji kesimetrisan dan kebersihan pada meatus akusticus eksterna, adanya serumen atau akumulasi cairan.

4) Hidung

Perhatikan kebersihan vestibulum nasal, adanya sekret, lesi, pernapasan cuping hidung dan penggunaan alat bantu pernapasan.

5) Mulut dan gigi

Kesimetrisan bibir, jumlah gigi, kebersihan, lesi, mukosa, dan kebersihan lidah

b. Leher

Kaji adanya pembesaran tyroid, kelenjar getah bening, distensi vena jugularis, dan kemampuan menelan. Pada klien dengan faktru tibia fibul jarang ditemukan kelainan pada leher kecuali terdapat faktor pencetus lain

c. Thoraks

Inspeksi: pegerakan dada, kesimetrisan, perhatikan adanya luka, dan frekuensi pernapasan 16-20 x/i

Palpasi : perhatikan adanya nyeri tekan, vokal premitus, dan kardiomeogali

Perkusi: lakukan perkusi untuk menilai organ, umumnya ditemukan sonor karena berisi udara pada paru-paru dan pekak pada jantung

Auskultasi: dengarkan bunyi paru umumnya ditemukan vesikuler, perhatikan adanya bunyi napas tambahan, irama jantung dan frekuensi nadi, nilai normal 60-100 x/i

d. Abdomen

Inspeksi: perhatikan warna kulit, lesi, dan pembengkakan

Auskultasi: dengarkan persitaltik usus. Normal peristaltik 5-30 x/menit usus adalah

Palpasi: perhatikan adanya nyeri tekan, pembesaran massa pada organ abdomen

Perkusi: pada perkusi abdomen biasanya didapatkan bunyi timpani

e. Punggung

Kaji kesimetrisan, warna kulit, pembengkakan, nyeri

f. Ekstremitas

Perhatikan kekuatan otot pada kedua ekstremitas atas dan bawah, kondisi luka, dan nyeri

g. Genitalia

Pada klien dengan fraktur tibia fibula umumnya mengalami ketergantungan sebagian hingga total sehingga terpasang kateter untuk memudahkan eliminasi

h. Integumen

Kaji warna kulit, kebersihan, turgor, kulit di sekitar luka, kelembapan, perubahan warna dan suhu

j. Nutrisi

Pada status nutrisi, kaji kebutuhan nutrisi klien, IMT, berat badan, kekurangan nutrisi, kemampuan menelan dan mengunyah, diet, alergi makanan, mual, muntah, kebiasaan makan dan penolakan makan. Kontrol pemenuhan kebutuhan nutrisi yang memadai perlu melibatkan keluarga (Patrisia et al., 2020)

k. Cairan

Perawat perlu mengkaji input dan output cairan klien. input cairan berikan intake oral dan makanan. Output cairan dihitung dari jumlah pengeluaran urin, muntah dan IWL (Patrisia et al., 2020).

l. Aktivitas dan latihan

Aktivitas dapat menstimulasi pikiran dan tubuh, latihan pada klien dapat menjaga integritas kulit, struktur tubuh, meningkatkan kesehatan melalui peningkatan sirkulasi dan respirasi. Kaji kemampuan aktivitas klien, aktivitas yang dapat dilakukan dan yang harus dibatasi (Patrisia et al., 2020).

m. Riwayat psikososial

Perawat perlu mengantisipasi masalah psikososial yang muncul pada klien dengan fraktur tibia fibula. Fraktur yang menyebabkan kecacatan dapat membuat klien kehilangan pekerjaan. Kemungkinan stres dapat terjadi pada klien dengan nyeri kronis perubahan bentuk tubuh. Merasa tidak berdaya, ketakutan, dan harga diri rendah. Perawat harus memantau kondisi psikososial klien secara terus menerus untuk mengantisipasi perubahan psikososial (Suriya & Zuriati, 2019).

n. Riwayat spiritual

Aspek spiritual merupakan bagian dari proses pengkajian secara holistik yang tidak boleh dimarginalkan oleh perawat. Kondisi spiritual dapat membantu klien meningkatkan status kesehatan dan memperbaiki pola coping saat sakit (Yusuf et al., 2016).

Kaji adanya ungkapan tentang arti kehidupan, penderitaan, kematian, penolakan melakukan ibadah, keragaun terhadap kepercayaannya, bantuan spiritual yang dibutuhkan. Masalah spiritual yang dapat muncul adalah distrses spiritual yang berkaitan dengan adanya ketidakmampuan melaksanakan ibadah ritual, dilema keyakinan spiritual, krisis penyakit, dan aturan kesehatan (Hidayat & Uliyah, 2015). Perawat sangat berperan penting dalam memnatu klien memenuhi kebutuhan spiritualnya saat sakit. Perawat dapat menyediakan doa-doa kesembuhan, vidio atau audio seperti murottal (Suriya & Zuriati, 2019).

Salah satu instrumen pengkajian spiritual yang dapat digunakan adalah pendekatan Puchalski's FICA Spiritual History Toll (Pulschalski, 199 dalam Widiyawati, 2020)

- a. F: *Faith*, keyakinan atau agama klien, makna hidup, kebiasaan spiritual
- b. I: *Impotance* dan *influence*, hal-hal yang penting dalam hidup, nilai yang diyakini yang berpengaruh dalam proses perawatan diri, nilai yang diyakini yang dapat mempengaruhi perilaku selama sakit
- c. C: *Community*, keterlibatan dalam kelompok, atau organisasi keagamaan, dukungan komunitas terhadap klien, dan orang berharag dalam komunitas tersebut
- d. A: *adress*, atensi klien terhadap perawat yang akan membantu dalam proses pemenuhan asuhan keperawatan.

## 2. Diagnosis Keperawatan yang Dapat Muncul

Berdasarkan SDKI 2017 beberapa diagnose keperawatan yang sesuai dengan kondisi klinis terkait fraktur yaitu:

### a. Nyeri Akut

#### 1) Definisi

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambar dan berintraksi ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan

#### 2) Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif : Mengeluh Nyeri

Objektif

- a) Tampak meringis
- b) Bersikap protektif (mis. Posisi menghindari nyeri)
- c) Gelisah
- d) Frekuensi nadi meningkat
- e) Sulit tidur

#### 3) Gejala dan tanda Minor

Objektif

- a) Tekanan darah meningkat
- b) Pola napas berubah
- c) Nafsu makan berubah
- d) Proses berfikir terganggu
- e) Menarik diri

- f) Berfokus pada diri sendiri
- g) Diaphoresis

b. Risiko Infeksi

1) Definisi

Beresiko mengalami peningkatan terserang organisms patogenik

2) Faktor Risiko

- a) Penyakit kronis
- b) Efek prosedur invasive
- c) Melnutrisi
- d) Peningkatan paparan organisme pathogen lingkungan
- e) Ketidakadekutan pertahanan tubuh primer: Gangguan peristaltic, Kerusakan integritas kulit, Perubahan sekresi Ph, Merokok
- f) Ketidakadekutan pertahanan tubuh sekunder: Penurunan hemoglobin, Imununosupresi, Leukopenia

c. Gangguan mobilitas fisik

1) Definisi

Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri

2) Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif: Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas

Objektif

- a) Kekuatan otot menurun
- b) Retang gerak menurun

3) Gejala dan tanda Minor

Subjektif

- a) Nyeri saat bergerak
- b) Enggan melakukan pergerakan
- c) Merasa cemas saat bergerak

Objektif

- a) Sendi Kaku
- b) Gerakan tidak terkoordinasi
- c) Gerakan terbatas
- d) Fisik Lemah

d. Risiko Jatuh

1) Definisi

Berisiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh

2) Faktor Risiko

- a) Usia > 65 tahu atau < 2 tahun
- b) Riwayat jatuh
- c) Anggota gerak bawah prosesis
- d) Penurunan tingkat kesadaran
- e) Perubahan fungsi kognitif
- f) Kondisi pasca operasi
- g) Enemia
- h) Kekuatan otot menurun

- i) Gangguan pendengaran
  - j) Gangguan penglihatan
- e. Risiko Perfusi Perifer Tidak Efektif
- 1) Definisi  
Berisiko mengalami penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh
  - 2) Faktor Risiko
    - a) Hiperglikemia
    - b) Gaya hidup kurang gerak
    - c) Hipertensi
    - d) Merokok
    - e) Prosedur endovaskuler
    - f) Trauma
    - g) Kurang terpapar informasi tentang faktor pembeda
- f. Gangguan integritas kulit/jaringan
- 1) Definisi  
Kerusakan kulit (dermis atau epidermis) atau jaringan (membrane mukosa, kornea, fascia, otot, tendon, tulang, ligament)
  - 2) Gejala dan Tanda Mayor  
Objektif: Kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit
  - 3) Gejala dan tanda Minor  
Objektif
    - a) Nyeri

- b) Pendarahan
- c) Kemerahan
- d) Hematoma

g. Risiko Distres Spiritual

1) Definisi

Berisiko mengalami gangguan keyakinan atau sistem nilai pada individu atau kelompok berupa kekuatan, harapan, dan makna hidup

2) Faktor risiko

- a) Perubahan hidup
- b) Perubahan lingkungan
- c) Bencana alam
- d) Sakit kronis
- e) Sakit fisik
- f) Penyalahgunaan zat
- g) Kecemasan
- h) Perubahan dalam ritual agama
- i) Perubahan dalam praktifi spiritual
- j) Konflik spiritual
- k) Depresi
- l) Ketidakmampuan memafkan
- m) Kehilangan
- n) Harga diri rendah
- o) Hubungan buruk

- p) Konflik rasial
  - q) Berpisah dengan sistem pendukung
  - r) Stres
- 3) Kondisi klinis terkait
- a) Penyakit kronis (mis, artritis rheumathoid, sklerosis multiple)
  - b) Penyakit terminal (mis, kanker)
  - c) Retardasi mental
  - d) Kehilangan ekstremitas
  - e) *Sudden infant syndrome (SIDS)*
  - f) Kelahiran maut, kematian janin, keguguran
  - g) Kemandulan

### 3. Intervensi Keperawatan

Intervensi yang dapat diberikan sesuai dengan diagnosis keperawatan yang sering muncul yaitu (PPNI, 2018, 2019)

#### a. Nyeri Akut

Manajemen Nyeri

##### 1) Kriteria hasil

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambar dan berintraksi ringan hingga berat dan konstan dapat menurut dengan kriteria hasil:

- a) Keluhan nyeri menurun
- b) Meringis dapat menurun
- c) Gelisah dapat menurun

- d) Sikap protektif dapat menurun
- e) Kesulitan tidur menurun

## 2) Intervensi keperawatan dan rasional

### Observasi

- a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri

Rasional : mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri dari pasien

- b) Identifikasi skala nyeri

Rasional : mengetahui tingkat nyeri yang dirasakan pasien

- c) Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri

Rasional : mengetahui hal-hal yang dapat memperberat ataupun memperingan nyeri yang dirasakan pasien

- d) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup

Rasional : mengetahui seberapa besar rasa nyeri mempengaruhi kualitas hidup pasien

### Terapeutik

- a) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam)

Rasional : mengurangi tingkat nyeri pasien/ mengalihkan pasien dari rasa nyerinya

- b) Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri

Rasional : mengurangi resiko factor yang dapat memperberat nyeri/menimbulkan nyeri

c) Fasilitasi istirahat dan tidur

Rasional : mengalihkan dan memenuhi kebutuhan istirahat pasien

**Edukasi**

a) Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri

Rasional : memberikan informasi terkait nyeri yang dirasakan pasien

b) Jelaskan strategi mengatasi nyeri

Rasional : membantu pasien mengatasi saat rasa nyeri muncul

c) Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri

Rasional : pasien dapat mengetahui sendiri karakteristik, penyebab, lokasi saat nyeri muncul

d) Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri

Rasional : memudahkan pasien untuk mengontrol nyeri dengan cara sederhana

**Kolaborasi**

Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu

Rasional : mengurangi/ menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien

**b. Risiko Infeksi**

## **Pencegahan Infeksi**

### 1) Tujuan dan Kriteria Hasil

Tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil:

- a) Demam menurun
- b) Nyeri menurun
- c) Kadar sel darah putih membaik

### 2) Intervensi Keperawatan dan rasional

#### **Observasi**

Monitor tanda dan gejala infeksi

Rasional :mengetahui tanda dan gejala adanya infeksi

#### **Terapeutik**

- 1) Cuci tangan sesudah dan sebelum kontak dengan pasien

Rasional :mengurangi risiko kontaminasi mikroorganime

- 2) Pertahankan teknik aseptik

Rasional :mengurangi kontaminasi mikroorganisme

#### **Edukasi**

- 1) Jelaskan tanda dan gejala infeksi

Rasional :memberikan infoemasi kepada pasien terkait  
tanda dan gejala infeksi

- 2) Ajarkan etika batuk

Rasional : mencegah penyebaran mikroorganime saat  
batuk

#### **Kolaborasi**

Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi

### c. Gangguan Mobilitas Fisik

#### Dukungan Mobilisasi

##### 1) Tujuan dan kriteria hasil

Kemampuan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri dapat meningkat dengan kriteria hasil:

- a) Pergerakan ekstremitas meningkat
- b) Kekuatan otot meningkat
- c) Rentang gerak meningkat

##### 2) Intervensi keperawatan dan rasional

#### Observasi

- a) Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya

Rasional : mengetahui keluhan lain pasien dan rencana tindakan berikutnya yang dapat dilakukan

- b) Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan

Rasional : mengetahui kemampuan dan batasan pasien terkait latihan/gerak yang akan dilakukan berikutnya

- c) Monitor frekuensi dan tekanan darah sebelum dan memulai mobilisasi

Rasional : mengetahui adanya perubahan status kerja frekuensi dan tekanan darah pasien

d) Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi

Rasional: mengetahui kondisi terkini pasien dan perubahan yang dapat terjadi selama melakukan mobilisasi

### **Terapeutik**

a) Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. Berpegang pada pagar tempat tidur)

Rasional : memberikan bantuan kepada pasien saat akan melakukan mobilisasi dan mengurangi resiko jatuh/ sakit saat berpindah

b) Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu

Rasional : meningkatkan status mobilitas fisik pasien

c) Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan

Rasional : keluarga dapat secara mandiri membantu pasien melakukan latihan pergerakan.

### **Edukasi**

a) Jelaskan tujuan dan Prosedur Tindakan

Rasional : memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan diberikan

b) Anjurkan mobilisasi dini

Rasional : untuk mengurangi resiko kekakuan dan kelemahan otot yang berkepanjangan

- c) Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan (mis. Duduk ditempat tidur, duduk disisi tempat tidur)

Rasional : melatih kekuatan otot dan pergerakan pasien agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi

#### **d. Risiko Jatuh**

##### **Pencegahan Jatuh**

- 1) Tujuan dan kriteria hasil

##### **Kriteria Hasil**

Derajat jatuh berdasarkan observasi atau sumber informasi menurun kriteria hasil: Jatuh dari tempat tidur menurun

- 2) Intervensi keperawatan dan rasional

##### **Observasi**

- a) Identifikasi factor risiko jatuh

Rasional :mengetahui factor yang dapat menyebabkan jatuh

- b) Identifikasi factor lingkungan

Rasional : mengetahui situasi lingkungan sekitar pasien yang dapat menyebabkan jatuh

##### **Terapeutik**

Pasang handrail tempat tidur

Rasional :mencegah pasien jatuh dari tempat tidur

##### **Edukasi**

Anjurkan memanggil perawat saat akan berpindah

Rasional : membantu pasien untuk berpindah dan meminimalisir pasien terjatuh.

**e. Risiko Perfusi Perifer Tidak Efektif**

**Perawatan Sirkulasi**

1) Tujuan dan kriteria hasil

Perfusi perifer dapat meningkat dengan kriteria hasil:

- a) Kekuatan nadi perifer meningkat
- b) Warna kulit pucat menurun
- c) Pengisian kapiler membaik
- d) Akral membaik
- e) Tugor kulit membaik

2) **Intervensi keperawatan dan rasional**

**Observasi**

- a) Periksa sirkulasi perifer (mis. Nadi perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu, ankle brachial index )

Rasional :mengetahui kemungkinan adanya gangguan pada perfusi perifer

- b) Identifikasi factor risiko gangguan sirkulasi

Rasional :beberapa penyakit seperti diabetes , hipertensi , hiperkolesterol dapat menyebabkan gangguan sirkulasi perifer

- c) Monitor panas, kemerahan nyeri atau bengkak pada ekstremitas

Rasional : mengetahui adanya masalah atau gangguan yang terjadi pada bagian perifer tubuh

### **Terapeutik**

- a) Hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan perfusi

Rasional : untuk mencegah kekurangan / perubahan sirkulasi perifer

- b) Hindari penekanan dan pemasangan tourniquet pada area yang cedera

Rasional : sirkulasi perifer yang terganggu dapat memperlambat penyembuhan luka pada area yang cedera

- c) Lakukan pencegahan infeksi

Rasional : untuk mencegah munculnya infeksi akibat invasi bakteri

- d) Lakukan perawatan kaki dan kuku

Rasional : mencegah terjadinya luka pada kaki

### **Edukasi**

- a) Anjurkan berhenti merokok

Rasional : merokok merupakan salah satu pemicu terjadinya gangguan perfusi perifer

- b) Anjurkan berolahraga rutin

Rasional : untuk memperlancar sirkulasi perfusi perifer

- c) Anjurkan minum obat pengontrol tekanan darah

Rasional : penyakit hipertensi merupakan salah satu penyebab gangguan sirkulasi perifer

- d) Anjurkan melakukan perawatan kulit yang tepat

Rasional : mencegah terjadinya luka

#### **f. Gangguan integritas kulit**

##### **Perawatan Integritas kulit**

- 1) Tujuan dan kriteria hasil

Integritas kulit dapat meningkat dengan kriteria hasil:

- a) Elastisitas meningkat
- b) Kerusakan jaringan menurun
- c) Nyeri menurun
- d) Pendarahan menurun
- e) Kemerahan menurun

- 2) Intervensi keperawatan dan rasional

##### **Observasi**

Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit/jaringan

Rasional : gangguan integritas kulit/jaringan dapat terjadi karena perubahan sirkulasi, perubahan nutrisi, penurunan kelembaban, suhu lingkungan ekstrim dan penurunan mobilitas

##### **Terapeutik**

- a) Ubah posisi tiap 2 jam tirah baring

Rasional : mencegah terjadinya lesi atau ulkus pada kulit yang tertindis

b) Gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering

Rasional : untuk menjaga kelembaban kulit

c) Hindari produk berbahan dasar alcohol

Rasional : produk berbahan dasar alcohol dapat mengiritasi kulit

### **Edukasi**

a) Anjurkan menggunakan pelembab

Rasional : menjaga kelembaban kulit

b) Anjurkan minum air yang cukup

Rasional : menjaga status hidrasi kulit

c) Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi

Rasional : menjaga kesehatan kulit tetap baik

d) Anjurkan menggunakan tabir surya

Rasional : sinar matahari dapat menyebabkan kerusakan kulit/ sensai terbakar

### **g. Distres Spiritual**

#### **Dukungan perkembangan spiritual**

1) Tujuan dan kriteria hasil

Memfasilitasi pengembangan kemampuan mengidentifikasi, berhubungan, dan mencari sumber makna, tujuan, kekuatan dan harapan dalam hidup. Dengan kriteria hasil:

a) Verbalisasi perasaan tenang meningkat (5)

b) Koping membaik (5)

- c) Verbalisasi makna dan tujuan hidup meningkat (5)
  - d) Verbalisasi percaya kepada orang lain
  - e) Verbalisasi perasaan bersalah menurun (4)
  - f) Perilaku merusak diri menurun (4)
- 2) Intervensi keperawatan

### **Terapeutik**

- a) Sediakan lingkungan yang tenang untuk refleksi diri  
Rasional: menyediakan lingkungan agar dapat lebih rileks
- b) Fasilitasi mengidentifikasi masalah spiritual  
Rasional: mengidentifikasi masalah spiritual secara mandiri
- c) Fasilitasi mengidentifikasi hambatan dalam pengenalan diri  
Rasional: mengidentifikasi kemampuan coping klien
- d) Fasilitasi mengeksplorasi keyakinan terkait pemulihan tubuh, pikiran, dan jiwa  
Rasional: mengidentifikasi prinsip nilai klien tentang kesehatan
- e) Fasilitasi hubungan persahabatan dengan orang lain dan pelayanan keagamaan  
Rasional: memberikan akses spiritual kepada komunitas

### **Edukasi**

- a) Anjurkan membuat komitmen spiritual berdasarkan keyakinan dan nilai  
Rasional: membantu membuat komitmen spiritual sesuai prinsip yang diyakini

- b) Anjurkan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah (hari raya, ritual) dan meditasi

Rasional: memfasilitasi kebutuhan spiritual ritual

#### **Kolaborasi**

- a) Rujuk pada pemuka agama/kelompok agama, jika perlu

Rasional: untuk mendapatkan penguatan dan dukungan khusus

- b) Rujuk kepada kelompok pendukung, swabantu, atau program spiritual, jika perlu

Rasional: untuk mendapatkan suport spiritual

### **3) Evidence Based Nursing**

#### **1. Tayamum**

Tayamum merupakan salah satu cara bersuci (thaharah) dari hadas kecil maupun hadas besar sebagai pengganti wudhu atau mandi. Tayamum merupakan aktivitas menyapukan debu yang suci ke permukaan wajah dan kedua belah tangan. tayamum merupakan alternatif pengganti wudhu dan mandi janabat yang dapat digunakan sebelum memulai salat fardhu. Penggunaan tayamum sebagai alternatif pengganti wudhu dan mandi ini hanya harus memenuhi beberapa syarat yaitu (Abdullah, 2018; Rahman, 2020)

- a. Telah masuk waktu salat
- b. Tidak menemukan air setelah berusaha mencarinya

- c. Terdapat udzur yang menyebabkan tidak mampu menggunakan air misalnya sakit, jika terkena air sakitnya kondisi sakitnya semakin memburuk
- d. Menggunakan debu yang suci

Tayamum hanya berlaku untuk satu waktu salat fardhu atau satu kali salat jama'. Untuk beberapa salat yang beriringan cukup menggunakan satu kali tayamum (Abdullah, 2018). Klien yang akan mendirikan salat saat sakit harus mengulang tayamum di setiap masuk waktu salat dengan memperhatikan rukun dan sunnah yang berlaku dalam tayamum yaitu (Rahman, 2020):

- a. Rukun Tayamum
  - 1) Niat, *kesengajaan dalam hati*
  - 2) Mengusap wajah dengan debu yang suci
  - 3) Mengusap kedua belah tangan
  - 4) Tertib, melakukan tayamum sesuai dengan urutan rukunnya
- b. Sunnah tayamum
  - 1) Membaca basmalah
  - 2) Menipiskan debu yang melekat pada kedua telapak tangan
  - 3) Mendahulukan anggota tayamum bagian kanan
  - 4) Membaca doa sebagaimana doa setelah berwudhu

Klien dan juga harus diedukasi hal-hal yang dapat membatalkan tayamum yaitu (Rahman, 2020):

- a. Menemukan air apabila hendak salat, kecuali bagi orang sakit
- b. Segala hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum

c. Murtad, keluar dan berpaling dari agama islam

## 2. Tujuan

Penggunaan tayamum bagi klien bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan spiritual ritual yaitu salat. Yusut et, al. (2016) menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual klien adalah aspek yang tidak boleh termarjinalkan dalam proses asuhan keperawatan. Majed & Hasan (2021) menyebutkan bahwa aktivitas ritual seperti salat, dan berdoa dapat mempengaruhi proses kesembuhan. Salat memberikan efek positif bagi kesehatan di antaranya pada berbagai aspek tubuh seperti fisik, sistem saraf, sistem kardiovaskuler, dan sistem muskuloskeletal. Pada klien dengan fraktur tibia fibula, salah satu sistem yang utama dipengaruhi adalah sistem muskuloskeletal. Salat bukan hanya aktivitas fisik tetapi juga mencakup pembacaan berbagai ayat Al-Qur'an dan kinerja posisi postural tertentu. Salat adalah intervensi nonfarmakologis dan sumber kekuatan. Salat dapat dimasukkan dalam perawatan holistik dan program rehabilitasi yang ditujukan untuk kesejahteraan pasien.

Tayamum adalah langkah awal yang harus dilakukan sebelum memulai salat sebagai alternatif pengganti wudhu. Klien harus diberikan penguatan secara rasional terkait efektifitas pemenuhan kebutuhan spiritual dalam proses kesembuhan salah satunya melalui tayamum untuk memulai salat. Klien yang mengalami perubahan status kesehatan biasanya akan mengalami kecemasan, ketakutan dan stres. Penguatan spiritual dapat membantu meminimalisir hal tersebut dan menjadi faktor pendorong kesembuhan (Yusuf, et. al, 2016).

Hubungan kondisi stres, kecemasan, ketakutan dengan berbagai penyakit dijelaskan dalam istilah psikoneuroimunologi yaitu kajian interaksi antara sistem imun, neuroendokrin dan behavior. Hal ini sangat terkait dengan neuroscience, perkembangan psikologi dan imunologi. Sistem saraf yang terlibat dalam imunoregulasi menghasilkan *learning proces* di otak dengan *out put* berupa kognisi tertentu yang dapat memodulasi respon sistem imun (Putra, 2019).

Stres dapat menyebabkan menurunnya kinerja sistem imun yang selanjutnya berdampak pada peningkatan risiko terserang penyakit. Stres dapat meningkatkan produksi glukokortikoid yang bersifat menekan kinerja sistem imun. Semua leukosit memiliki reseptor glukokortikoid. Peningkatan kinerja sistem imun diperkirakan dikendalikan oleh otak. Sehingga otak/pikiran sangat berperan penting dalam supresi imun (Putra, 2019).

Selain itu, sistem saraf juga mudah terstimulasi oleh endorfin dan enkefalin. Stimulasi peningkatan endorfin ini dapat dilakukan secara alami salah satunya melalui meditasi. Meditasi dalam konsep spiritual dapat dilakukan dengan cara salat, karena aktivitasnya tidak hanya berupa aktivitas fisik tetapi hal itu mencakup pembacaan beberapa ayat dari Al-Qur'an yang dapat memberikan efek tenang. Peningkatan produksi endorfin dan enkefalin mengakibatkan analgesia dan supersei *Natural Killer Cell* (NKC) sehingga dapat meningkatkan kesembuhan. Pada kasus fraktur tibia fibula, luka yang terdapat pada ekstremitas dapat menyebabkan risiko infeksi, sehingga peningkatan kinerja sistem imun

seperti leukosit dan NKC sangat penting untuk mencegah kondisi tersebut (Majed & Hassan, 2021; Putra, 2019).

Edukasi tayamum diharapkan dapat meningkatkan keinginan klien memenuhi kebutuhan spiritual berupa salat, dengan diikuti penjelasan secara rasional dan ilmiah terkait efektifitas salat melalui tayamum dalam meningkatkan proses kesembuhan.

### 3. Indikasi

Beberapa kondisi yang membolehkan dilakukan tayamum sebagai alternatif pengganti wudhu atau mandi yaitu (Rahman, 2020):

- a. Tidak adanya air yang mencukupi untuk wudhu ataupun mandi
- b. Tidak ada kemampuan untuk menggunakan air
- c. Sakit atau lambat sembuh
- d. Ada air, tapi ia perlu untuk sekarang ataupun untuk masa yang akan datang
- e. Khawatir hartanya rusak jika dia mencari air
- f. Iklim yang sangat dingin atau air menjadi sangat dingin
- g. Tidak ada alat untuk mengambil air, seperti tidak ada timba atau tali
- h. Khawatir terlewat waktu salat

Pada klien dengan fraktur 1/3 tibia et fibula secara terbuka, maka pemenuhan kebutuhan spiritual seperti salat harus diawali dengan tayammum. Walaupun terdapat hadist yang menyebutkan kebolehan membasuh bagian atas kaki yang tertutupi sepatu “kuf” naumun pada kondisi fraktur tibia fibula balutan pada luka tidak dapat disamakan

dengan kuf seperti pada hadis. Karena kondisi luka yang terbuka mengharuskan ditutup dengan balutan yang steril dan tidak boleh terkontaminasi dengan lingkungan sekitar.

#### 4. Kontraindikasi

Beberapa kondisi yang membuat tayammum tidak dapat dilakukan yaitu (Rahman, 2020):

- a. Terdapat air
- b. Kondisi sakit yang tidak memburuk jika bersentuhan air
- c. Cukup waktu untuk mencari air

#### 5. Prosedur pemberian dan rasionalisasi

Tata cara melakukan tayammum merujuk pada hadist dari Ammar bin Yasir yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim (Rahman, 2020):

عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَآبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَيْتَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَا فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً [رواه البخاري ومسلم]

Artinya:

“Diriwayatkan dari al-A’ masy dari Syaqiq; saya bersama Abdullah dan Abu Musa al-Asy’ari, lalu Abu Musa berkata; tidakkah kamu dengar perkataan Ammar kepada Umar; sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus aku dan engkau, lalu aku berjunub (kondisi junub), kemudian aku berguling-guling dengan debu (di atas tanah), lalu kami mendatangi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian menginformasikannya, lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Hanya saja cukuplah bagimu begini” (Rasulullah meletakkan tangannya di atas debu) dan mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya satu kali. [HR. al-Bukhari dan Muslim]”

Berdasarkan hadist di atas, maka tata cara tayammum yaitu (Rahman, 2020):

- a. Niat, *kesengajaan dalam hati*

- b. Menyediakan media tayamum, dapat menggunakan debu pada perbukaan bantal klien
- c. Meletakkan kedua tangan di atas media tayamum
- d. Mengusap seluruh wajah dengan kedua telapak tangan satu kali
- e. Mengusap kedua tangannya (Sampai pergelangan tangan) satu kali
- f. Berdoa sebagaimana doa setelah berwudhu

#### 6. Kriteria Evaluasi

Setelah diberikan edukasi tayamum sebagai upaya memfasilitasi pengembangan kemampuan mengidentifikasi, berhubungan, dan mencari sumber makna, tujuan, kekuatan dan harapan dalam hidup. Dengan kriteria hasil (SLKI, 20 18):

- a. Verbalisasi perasan tenang meningkat (5)
- b. Koping membaik (5)
- c. Verbalisasi makna dan tujuan hidup meningkat (5)



**BAB III**  
**LAPORAN KASUS**

**IDENTITAS KLIEN**

Nama klien : "Tn. B"  
Diagnosa medis : Open fraktur 1/3 tibia et fibula distal  
Umur : 57 tahun  
Tanggal pengkajian : 11 Maret 2021/ 09:00 Wita

**1. PENGKAJIAN**

**PENGKAJIAN AWAL**

Ruang Rawat : Baji kamse No 212  
No. Rekam medik : 391008  
Tgl/jam masuk : 10 Maret 2021/20:15 Wita  
Tgl/jam pengambilan data : 11 Maret 2021/09:00 Wita  
Diagnosa masuk : Open fraktur 1/3 tibia et fibula distal  
Cara masuk : Brankar  
Kiriman dari : RSUD H. Padjong Dg Ngalle Takalar  
Pindahan dari : IGD  
Perawat/tim yg b. jawab :

**A. IDENTITAS**

Nama : "Tn. B"  
Umur : 57 Tahun  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Petani  
Suku : Makassar  
Agama : Islam  
Alamat : Ujung Bori, Takalar  
Sumber informasi : Klien dan keluarga

**B. RIWAYAT KESEHATAN**

Keluhan utama : Nyeri akut  
Keluhan saat ini : Klien mengatakan nyeri dirasakan pada

ekstremitas bawah sinistra sejak dua hari yang lalu setelah mengalami kecelakaan tunggal bermotor. Klien mengatakan skala nyeri sedang (6) dengan frekuensi menetap dengan kualitas perih. klien mengatakan kurang nafsu makan dan hanya makan 2 sendok di setiap jam makan. Klien mengatakan sulit bergerak dan hanya bisa beraktivitas di atas tempat tidur

### C. KEADAAN UMUM

Kesadaran : Composmentis  
Pengetahuan : Pasien mengerti dengan penyakitnya  
Pasca operasi : Open fraktur 1/3 tibia et fibula distal

### D. KEBUTUHAN DASAR

#### NYERI

Suhu : 36,4°C  
Gambaran nyeri : Klien mengatakan nyeri sedang dirasakan pada ekstremitas bawah sinistra dengan kualitas perih dan frekuensi menetap  
P : Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan  
Q : Perih  
R : Ekstremitas bawah sinistra  
S : 6, nyeri sedang  
T : Menetap  
Respon emosional : Klien nampak meringis saat diberi penekanan pada nyeri (Saat ganti verband)  
Cara mengatasi nyeri : Tidur  
**Masalah keperawatan : Nyeri Akut**

#### NUTRISI

TB : 170 cm

BB : 60 kg

Kebiasaan makan : Isteri klien mengatakan sebelum sakit klien tidak terbiasa sarapan dengan makanan berat hanya meminum kopi dan makan dengan porsi besar 2x sehari. Isteri klien mengatakan sejak sakit klien hanya mampu menghabiskan 2 sendok bubur yang diberikan setiap jam makan. Klien mengatakan tidak mampu menghabiskan porsi makanan yang diberikan. Makanan klien nampak tidak dihabiskan

Keluhan saat ini : Klien mengatakan tidak mampu menghabiskan porsi makanan yang diberikan

Pembesaran tiroid : Tidak ada

Massa : Tidak ada

Holitis : Ada

Kondisi gigi/gusi : Nampak gigi seri bagian atas depan telah tanggal

Penampilan lidah : Permukaan lidah nampak warna putih

Bising usus : Tidak ada

Jenis cairan terpasang : RL 500 cc 23 tpm

Porsi makan yg dihabiskan : Isteri klien mengatakan klien hanya mampu menghabiskan 2 sendok makanan yang diberikan

Makanan disukai : -

Diet : Tidak ada

**Masalah keperawatan : Risiko Defisit Nutrisi**

## CAIRAN

Kebiasaan minum : Klien mengatakan sebelum sakit kadang-kadang hanya minum air putih setelah makan ±1500 cc perhari. Klien mengatakan sering mengonsumsi kopi  
 Jenis : Air putih dan kopi  
 Turgor kulit : Baik  
 CRT : <2 detik  
 Mata : Cekung  
 Konjungtiva : Tidak anemis  
 Sklera : Berwarna merah, nampak akumulasi darah pada sklera  
 Edema : Tidak ada edema  
 Distensi V.Jugularis : Tidak ada  
 Asites : Tidak ada  
 Spider Navy : Tidak ada  
 Infuse : Terpasang infuse RL 500 CC 23 tpm  
**Masalah keperawatan : Tidak ada**

#### PERSONAL HYGNE

Kebiasaan mandi : Klien mengatakan selama sakit belum pernah mandi. Isteri klien mengatakan selama sakit klien belum pernah mandi menggunakan waslap  
 Cuci rambut : Klien mengatakan selama sakit tidak pernah cuci rambut  
 Kebiasaan gosok gigi : Klien mengatakan selama dirawat tidak pernah menggosok gigi  
 Kebersihan badan : Nampak kotor pada abdomen, kedua tangan dan ekstremitas  
 Keadaan rambut : Distribusi rambut normal, dominan beruban  
 Keadaan kulit kepala : Kotor

Keadaan kuku	:	Kuku nampak kotor dan panjang
Keadaan vulva/perineal	:	Tidak dikaji
Keluhan saat ini	:	Klien mengatakan merasa tidak nyaman dengan kondisinya
Integritas kulit	:	Baik
Keadaan luka	:	Open fraktur pada tibia et fibula terpasang verband dan spalak. Terdapat luka terbuka pada occipital dektra
<b>Masalah keperawatan</b>	:	<b>Defisit Perawatan diri</b>

### AKTIVITAS DAN LATIHAN

Aktivitas waktu luang	:	Klien mengatakan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Klien nampak berbaring
Aktivitas/hoby	:	Klien mengatakan sehari-hari beraktivitas sebagai petani di sawah dan baru-baru ini selesai panen padi
Kesulitan bergerak	:	Klien mengatakan sulit menggerakkan ekstremitas bawah sinistra.
Postur	:	tidak dapat dikaji secara keseluruhan karena pasien hanya mampu berbaring
Rentang gerak	:	Terbatas
Keluhan saat ini	:	Klien mengatakan kesulitan bergerak, karena terdapat nyeri pada ekstremitas bawah sinistra pasca kecelakaan
Penggunaan alat bantu	:	Tidak ada penggunaan alat bantu. Klien nampak hanya mampu bergerak di atas tempat tidur
Pelaksanaan aktivitas	:	Total
Jenis aktivitas yg perlu dibantu	:	Pemenuhan cairan dan nutrisi, personal hygiene, eliminasi
Kekuatan otot	:	$\begin{array}{r l} 5 & 5 \\ \hline 1 & 5 \end{array}$

**Masalah keperawatan : Gangguan mobilitas fisik**

#### **ELIMINASI**

Kebiasaan BAB :  
- Sebelum sakit : 1-2 kali sehari  
- Saat sakit : Klien mengatakan sejak sakit satu kali pernah BAB. klien mengatakan terakhir kali BAB 1 hari yang lalu

Kebiasaan BAK :  
- Sebelum sakit : 1-2 kali sehari  
- Saat sakit : Terpasang kateter urin dengan pengeluaran

Penggunaan diuretic : 300 cc  
: Tidak ada

Peristaltik usus : 12 detik

Abdomen : Tidak ada pembesaran massa, tidak ada nyeri tekan. Terdapat perbedaan warna abdomen pada kuadran 2 & 3 dengan kuadran lainnya

Kateter urin : Terpasang kateter urin

**Masalah keperawatan : Tidak ada masalah**

#### **OKSIGENASI**

Nadi : 82x/i

Pernapasan : 24x/i

Tekanan Darah : 110/60 mmHg

Respirasi : Tidak ada penggunaan alat bantu napas, tidak suara napas tambahan, tidak ada pernapasan cuping hidung

Vokal premitus : Tidak dikasi karena pasien tidak mampu mengubah posisi ke semi fowler

Sputum : Tidak ada produksi sputum

Sirkulasi oksigenasi	:	Baik, klien tidak merasa pusing
Dada	:	Tidak ada penggunaan otot bantu napas
Oksigen kanul/mask	:	Tidak terpasang
WSD	:	Tidak terpasang
Riwayat penyakit	:	Klien mengatakan pernah dirawat di Rumah Sakit tiga tahun yang lalu karena .....
<b>Masalah keperawatan</b>	:	<b>Tidak ada</b>

### ISTIRAHAT DAN TIDUR

Kebiasaan tidur malam		
- Sebelum sakit	:	Klien mengatakan sebelum sakit tidur malam mulai pukul 23.00-06.00 dengan kualitas nyenyak
- Saat sakit	:	Klien mengatakan selama sakit tidak ada gangguan tidur. Klien mengatakan selama sakit lebih banyak tidur
Lama tidur		
- Malam	:	Klien mengatakan tidur malam $\pm$ 8 jam
- Siang	:	Klien mengatakan tidur siang $\pm$ 2 jam
Cara mengatasi	:	-
<b>Masalah keperawatan</b>	:	<b>Tidak ada masalah</b>

### NEUROSENSORI

Rasa ingin pingsan	:	Tidak ada, klien mengatakan tidak pusing
Stroke	:	Tidak ada riwayat
Kejang	:	Klien mengatakan tidak memiliki riwayat kejang
Status mental	:	Baik. klien mampu mengenali waktu, tempat dan orang-orang di sekitarnya
Kesadaran	:	Composmentis. GCS 15
Memori	:	Baik, klien mampu mengingat kejadian

	masa lampau
Kama mata	: Klien tidak menggunakan kaca mata
Alat bantu dengar	: Klien tidak menggunakan alat bantu dengar
Ukuran reaksi pupil	: 2 mm kiri dan kanan, isokor, miosis
Facial drop	: Tidak ada
Genggaman tangan	: Genggaman kedua tangan kuat
<b>Masalah keperawatan</b>	: <b>Tidak ada masalah</b>

### PENCEGAHAN TERHADAP BAHAYA

Refleksi	: Baik
Penglihatan	: Klien dapat melihat secara normal
Pendengaran	: Klien dapat mendengar dan merespon suara
Penciuman	: Penciuman klien baik
Perabaan	: Kemampuan meraba klien baik
<b>Masalah keperawatan</b>	: <b>Tidak ada masalah</b>

### KEAMANAN

Alergi	: Klien mengatakan tidak memiliki riwayat alergi
Riwayat penyakit	: Klien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit menular
Prilaku risiko tinggi	: Tidak ada
Transfusi darah	: Tidak pernah
Riwayat cedera	: Klien menegatakan mengalami kecelakaan kurang 2 hari yang lalu
Fraktur	: Terdapat open fraktur 1/3 tibia et fibula distal sinistra
Atritis sendi	: Tidak ada
Masalah punggung	: Tidak ada
Kekuatan punggung	: Tidak dapat dikaji karena pasien hanya

mampu berbaring  
ROM : Terbatas  
**Masalah keperawatan : Tidak ada**

### SEKSUALITAS

Hubungan seksual : Aktif  
Penggunaan kondom : Klien mengatakan tidak pernah menggunakan  
Gangguan prostat : Klien mengatakan tidak memiliki riwayat gangguan prostat  
Sirkumsisi : Klien mengatakan melakukan sirkumsisi waktu SD  
**Masalah keperawatan : Tidak ada**

### INTERAKSI SOSIAL

Masalah kesehatan/stres : Klien mengatakan merasa bosan  
Cara mengatasi stres : -  
Orang pendukung lain : Keluarga  
Sosiologis : Komunikasi lancar  
Perubahan bicara : Tidak ada  
Laringektomi : Tidak ada  
Psikologis : Baik  
Keputusan : Tidak ada  
Komunikasi verbal : Baik. lancar. Klien mampu berkomunikasi dan kooperatif dengan perawat  
Spiritual : Anak klien mengatakan selama sakit klien tidak pernah melaksanakan salat. Klien mengatakan tidak tau tata cara tayamum. Klien nampak hanya tersenyum ketika dikaji kebiasaan ritual keagamaan. Klien nampak tertutup dan tidak menjelaskan kondisi spiritualnya kepada perawat

- Kegiatan keagamaan : Klien mengatakan tidak mengikuti kegiatan keagamaan di tempat tinggalnya. Anak klien mengatakan klien tidak terbiasa salat. Anak klien mengatakan klien selalu menolak ketika diajak salat. Anak klien mengatakan klien menyampaikan bahwa walaupun salat hal itu tidak menyembuhkan
- Gaya hidup : Monoton. Klien mengatakan aktivitas sehari-harinya adalah berladang
- Masalah keperawatan : Distres spiritual**

#### E. PENYULUHAN DAN PEMBELAJARAN


- Bahasa dominan : Indonesia
- Informasi yang diberikan : Pengaturan jam besuk  
: Hak dan kewajiban klien  
: Petugas yang merawat
- Masalah yang dijelaskan : Perawatan diri di RS  
: Obat-obatan yang diberikan  
: Modifikasi diet

#### Obat yang diresepkan

Obat	Dosis	Waktu	Rute	Tujuan
Ceftriaxon	1 gr	18:00	IV	Antibiotik
Cetorolax	1 amp	07:00	IV	Analgetik
Gentamicin	1 amp	15:00	IV	Antibiotik
Ranitidin	1 amp	18:00	IV	Antirefluks

- Faktor risiko keluarga : Ibu klien mengatakan keluarga klien tidak memiliki riwayat penyakit menular dan tidak menular

## GENOGRAM



**Keterangan:**

- |   |   |
|---|---|
| <p>□ : Laki-laki</p> <p>○ : Perempuan</p> <p>⊗ : Meninggal</p> <p>■ : Klien</p> | <p>— : Garis perkawinan</p> <p>  : Garis keturunan</p> <p>--- : Garis serumah</p> |
|---|---|

- G1 : Kakek dan nenek klien telah meninggal. Semua kakek dan nenek klien tidak memiliki riwayat penyakit yang sama, atau penyakit menular dan tidak menular
- G2 : Kedua orang tua klien telah meninggal tanpa didaului sakit
- G3 : Klien merupakan anak ke 3 dari 6 bersaudara dan tinggal bersama isteri, kedua anak dan ketiga cucunya.

**PEMERIKSAAN PENUNJANG  
HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

<b>Jenis Pemeriksaan</b>	<b>Hasil</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Satuan</b>
<b>Kimia Klinik</b>			
SGOT	47	L:37 P:31	UI/L
SGPT	18	L:42 P:32	UI/L
Bilirubin Total	-	0.2 1.0	Mg/dl
Bilirubin Direk	-	0.05 0.3	Mg/dl
Bilirubin Indirek	-	-	-
Kolesterol Total	-	200	Mg/dl
Kolesterol LDL	-	130	Mg/dl
Kolesterol HDL	-	L: 35-55 P:45-55	Mg/dl
Trigliserida	-	150	Mg/dl
Ureum	22.8	10-50	Mg/dl
Kreatinin	1.11	0.6-1.1	Mg/dl
Asam Urat	-	L:3.4-7 P:2.4-5.7	Mg/dl
Gula Darah Sewaktu	149	110	Mg/dl
Gula Darah Puasa	-	100	Mg/dl
Gula Darah 2 jam PP	-	140	Mg/dl
Protein Total	-	6.6-8.7	Gr/dl
Albumin	-	3.4-4.8	Gr/dl
Globulin	-	-	-
Natrium	-	135-150	mmol/L
Kalium	-	3.5-5.5	mmol/L

## HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM DARAH RUTIN


Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
<b>Darah Rutin</b>			
WBC	12.9	4.0-10.0	UI/L
LYM	0.40	0.6-3.5	10 <sup>3</sup> /UI Y
MON	0.18	0.1-0.9	10 <sup>3</sup> /uL
GRA	12.33	1.3-6.7	10 <sup>3</sup> /uL
*LYM	3.1	20.0-40.0	10 <sup>3</sup> /uL
*MON	1.4	2.0-8.0	%
*GRA	95.5	50-70	%
RBC	4.17	3.50-5.50	%
HGB	11.5	11.0-17.9	g <sup>6</sup> /uL
HCT	34.7	40-50	g/dl
MCV	83.1	80.0-96.0	%
MCH	27.6	23.2-38.7	fL
MCHC	33.3	32-37	Pg
RDW-SD	46.0	37.0-54.0	g/dL
RDW-CV	13.7	10.0-18.0	fL
PLT	313	150-400	%
PCT	0.255	0.15-0.50	10 <sup>3</sup> /uL
MPV	8.2	6.5-11.0	fL
PDW	16.3	10.0-18.0	Fl
P-LCR	14.9	13.0-43.0	%

## HASIL PEMERIKSAAAN RADIOLOGI

### FOTO CRUSIS (s) Ap/lat

1. Fraktur komunatif 1/3 tangan tibia sinistra
2. Suspek fraktur distal tibia sinistra
3. Fraktur 1/3 tengah fibula sinistra
4. Soft tissue swelling
5. Miniralisasi tulamg normal
6. Genu joint sinistra normal

### PATOFISIOLOGI PENYIMPANGAN KDM



### KLASIFIKASI DATA

OBJEKTIF	SUBJEKTIF
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran composmentis</li> <li>2. GCS 15</li> <li>3. TTV Suhu: 36.4°C TD: 110/60 mmHg</li> <li>4. Open fraktur 1/3 tibia et fibula disnistra distal</li> <li>5. P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan Q: sedang, perih R: sektermitas bawah sinistra S: 6, nyeri hebat T: menetap</li> <li>6. Klien nampak meringis saat diberi penekanan pada nyeri (Saat ganti verband)</li> <li>7. Makanan klien nampak tidak dihabiskan</li> <li>8. Nampak gigi seri bagian atas depan telah tanggal</li> <li>9. Badan nampak kotor pada abdomen, kedua tangan dan ekstremitas</li> <li>10. Keadaan kulit kepala nampak kotor</li> <li>11. Kuku nampak kotor dan panjang</li> <li>12. Klien nampak berbaring</li> <li>13. Klien nampak hanya mampu bergerak di atas tempat tidur</li> <li>14. Rentang gerak klien terbatas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan nyeri dirasakan pada esktremitas bawah sinistra sejak dua hari yang lalu setelah mengalami kecelakaan tunggal bermotor</li> <li>2. Klien mengatakan skala nyeri sedang (6) dengan frekuensi menetap dengan kualitas perih</li> <li>3. Klien mengatakan nyeri sedang dirasakan pada ekstremitas bawah sinistra dengan kualitas perih dan frekuensi menetap</li> <li>4. klien mengatakan kurang nafsu makan dan hanya makan 2 sendok di setiap jam makan</li> <li>5. Isteri klien mengatakan sejak sakit klien hanya mampu menghabiskan 2 sendok bubur yang diberikan setiap jam makan.</li> <li>6. Klien mengatakan tidak mampu menghabiskan porsi makanan yang diberikan</li> <li>7. Klien mengatakan selama sakit belum pernah mandi</li> <li>8. Isteri klien mengatakan selama sakit klien belum pernah mandi menggunakan waslap</li> <li>9. Klien mengatakan selama sakit tidak pernah cuci rambut</li> <li>10. Klien mengatakan selama dirawat</li> </ol>

<p>15. Pelaksanaan aktivitas dibantu total</p> <p>16. Jenis aktivitas yang perlu dibantu: pemenuhan cairan dan nutrisi, personall hygne dan eliminasi</p> <p>17. Kekuatan otot</p> $\begin{array}{r} 5 \   \ 5 \\ \hline 1 \   \ 5 \end{array}$ <p>18. Klien nampak hanya tersenyum saat dikaji kebiasaan ritual keagamaan.</p> <p>19. Klien nampak tertutup dan tidak menjelaskan kondisi spiritualnya kepada perawat</p>	<p>tidak pernah menggosok gigi</p> <p>11. Klien mengatakan merasa tidak nyaman dengan kondisinya</p> <p>12. Klien mengatakan sulit bergerak dan hanya bisa beraktivitas di atas tempat tidur</p> <p>13. Klien mengatakan hanya bisa berbaring di tempat tidur.</p> <p>14. Klien mengatakan sulit menggerakkan ekstremitas bawah sinistra.</p> <p>15. Klien mengatakan kesulitan bergerak, karena terdapat nyeri pada ekstremitas bawah sinistra pasca kecelakaan</p> <p>16. Anak klien mengatakan selama sakit klien tidak pernah melaksanakan salat.</p> <p>17. Klien mengatakan tidak tau tata cara tayamum</p> <p>18. Klien mengatakan tidak mengikuti kegiatan keagamaan di tempat tinggalnya.</p> <p>19. Anak klien mengatakan klien tidak terbiasa salat.</p> <p>20. Anak klien mengatakan klien selalu menolak ketika diajak salat.</p> <p>21. Anak klien mengatakan klien menyampaikn bahwa walaupun salat hal itu tidak menyembuhkan</p>
--	---

### KATEGORI DATA

KATEGORI	SUBKATEGORI	DATA SUBJEKTIF & OBJEKTIF
Fisiologi	Respirasi	RR: Tidak ada pernapasan cuping hidung Tidak ada penggunaan alat bantu napas
	Sirkulasi	TD: 110/60 mmHg Suhu: 36.4°C CRT: <2 detik
	Nutrisi dan cairan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. klien mengatakan kurang nafsu makan dan hanya makan 2 sendok di setiap jam makan</li> <li>2. Isteri klien mengatakan sejak sakit klien hanya mampu menghabiskan 2 sendok bubur yang diberikan setiap jam makan.</li> <li>3. Klien mengatakan tidak mampu menghabiskan porsi makanan yang diberikan</li> </ol>
	Eliminasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan terakhir BAB 1 hari yang lalu</li> <li>2. Terpasang cateter urin dengan jumlah 300 cc</li> </ol>
	Aktivitas dan istirahat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan sulit bergerak dan hanya bisa beraktivitas di atas tempat tidur</li> <li>2. Klien mengatakan hanya bisa berbaring di tempat tidur.</li> <li>3. Klien mengatakan sulit menggerakkan ekstremitas bawah sinistra.</li> <li>4. Klien mengatakan kesulitasn</li> </ol>

		bergerak, karena terdapat nyeri pada ekstremitas bawah sinistra pasca kecelakaan 5. Klien mengatakan selama sakit tidak pernah salat
	Neurosensori	1. Tidak ada penggunaan alat bantu melihat dan mendengar 2. Indra penciuman dan perabaan baik
	Reproduksi dan seksualitas	1. Klien mengatakan melakukan sirkumsisi waktu SD
Psikologis	Nyeri dan kenyamanan	1. Klien mengatakan nyeri dirasakan pada ekstremitas bawah sinistra sejak dua hari yang lalu setelah mengalami kecelakaan tunggal bermotor 2. Klien mengatakan skala nyeri sedang (6) dengan frekuensi menetap dengan kualitas perih 3. Klien mengatakan nyeri sedang dirasakan pada ekstremitas bawah sinistra dengan kualitas perih dan frekuensi menetap P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan Q: sedang, perih R: ekstremitas bawah sinistra S: 6, nyeri hebat T: menetap
	Integritas ego	Klien nampak meringis saat diberi

		penekanan pada nyeri (Saat ganti verband)
	Pertumbuhan dan perkembangan	Tidak ada masalah khusus
Perilaku	Kebersihan diri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan selama sakit belum pernah mandi</li> <li>2. Isteri klien mengatakan selama sakit klien belum pernah mandi menggunakan waslap</li> <li>3. Klien mengatakan selama sakit tidak pernah cuci rambut</li> <li>4. Klien mengatakan selama dirawat tidak pernah menggosok gigi</li> <li>5. Klien mengatakan merasa tidak nyaman dengan kondisinya</li> </ol>
	Penyuluhan dan pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahasa dominan yang digunakan Bahasa Indonesia</li> <li>2. Informasi yang diberikan: Pengaturan jam besuk, Hak dan kewajiban klien, Petugas yang merawat</li> </ol>
	Interaksi sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan merasa bosan</li> <li>2. Komunikasi verbal klien Baik. lancar. Klien mampu berkomunikasi dan kooperatif dengan perawat</li> <li>3. Klien mengatakan selama sakit tidak pernah melaksanakan salat</li> <li>4. Klien mengatakan tidak tau tata cara tayamum</li> <li>5. Klien mengatakan tidak mengikuti</li> </ol>

		<p>kegiatan keagamaan di tempat tinggalnya.</p> <p>6. Anak klien mengatakan klien tidak terbiasa salat.</p> <p>7. Anak klien mengatakan klien selalu menolak ketika diajak salat.</p> <p>8. Anak klien mengatakan klien menyampaikn bahwa walaupun salat hal itu tidak menyembuhkan</p>
	Keamanan dan proteksi	<p>1. Open fraktur 1/3 tibia et fibula sinistra distal</p> <p>2. Tidak penggunaan alat bantu penglihatan dan pendengaran</p>

### ANALISA DATA

NO	DATA	ETIOLOGI	MASALAH KEPERAWATAN
1	<p><b>Data Subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klien mengatakan nyeri dirasakan pada esktremitas bawah sinistra sejak dua hari yang lalu setelah mengalami kecelakaan tunggal bermotor</li> <li>Klien mengatakan skala nyeri sedang (6) dengan frekuensi menetap dengan kualitas perih</li> <li>Klien mengatakan nyeri sedang dirasakan pada ekstremitas bawah sinistra dengan kualitas perih dan frekuensi menetap</li> </ol> <p><b>Data Objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>TTV Suhu: 36.4°C TD: 110/60 mmHg</li> <li>Open fraktur 1/3 tibia et fibula disnistra distal</li> <li>P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan Q: sedang, perih R: sektermitas bawah sinistra S: 6, nyeri hebat T: menetap</li> </ol>	<p>Trauma</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Terputusnya kontuinitas jaringan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Inflamasi jaringan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pelepasan mediator kimiawi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Implus nyeri</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Korteks serebri</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Nyeri dipersepsikan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Nyeri akut</p>	Nyeri akut

	4. Klien nampak meringis saat diberi penekanan pada nyeri (Saat ganti verband)		
2	<p><b>Data subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan sulit bergerak dan hanya bisa beraktivitas di atas tempat tidur</li> <li>2. Klien mengatakan hanya bisa berbaring di tempat tidur.</li> <li>3. Klien mengatakan sulit menggerakkan ekstremitas bawah sinistra.</li> <li>4. Klien mengatakan kesulitasn bergerak, karena terdapat nyeri pada ekstremitas bawah sinistra pasca kecelakaan</li> </ol> <p><b>Data objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien nampak berbaring</li> <li>2. Klien nampak hanya mampu bergerak di atas tempat tidur</li> <li>3. Rentang gerak klien terbatas</li> <li>4. Pelaksanaan aktivitas dibantu total</li> <li>5. Jenis aktivitas yang perlu dibantu: pemenuhan cairan dan nutrisi, personall hygne dan eliminasi</li> <li>6. Kekuatan otot</li> </ol>	<p>Trauma</p> <p>↓</p> <p>Terputusnya kontuinitas jaringan dan tulang</p> <p>↓</p> <p>Deformitas</p> <p>↓</p> <p>Penurunan fungsi otot dan tulang</p> <p>↓</p> <p>Keterbatasan gerak</p> <p>↓</p> <p>Gangguan mobilitas fisik</p>	Gangguan mobilitas fisik

	$\begin{array}{r} 5 \ 5 \\ \hline 2 \ 5 \end{array}$		
3	<p><b>Data subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien mengatakan selama sakit belum pernah mandi</li> <li>2. Istri klien mengatakan selama sakit klien belum pernah mandi menggunakan waslap</li> <li>3. Klien mengatakan selama sakit tidak pernah cuci rambut</li> <li>4. Klien mengatakan selama dirawat tidak pernah menggosok gigi</li> <li>5. Klien mengatakan merasa tidak nyaman dengan kondisinya</li> </ol> <p><b>Data objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan nampak kotor pada abdomen, kedua tangan dan ekstremitas</li> <li>2. Keadaan kulit kepala nampak kotor</li> <li>3. Kuku nampak kotor dan panjang</li> </ol>	<p>Truama</p> <p>↓</p> <p>Inflamasi jaringan</p> <p>↓</p> <p>Perubahan status kesehatan</p> <p>↓</p> <p>Stressor dan pola koping</p> <p>↓</p> <p>Kurang pengetahuan</p> <p>↓</p> <p>Defisit perawatan diri</p>	Defisit perawatan diri
4	<p><b>Distres subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak klien mengatakan selama sakit klien tidak</li> </ol>	<p>Truama</p> <p>↓</p> <p>Inflamasi</p>	Distres Spiritual

	<p>pernah melaksanakan salat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Klien mengatakan tidak tau tata cara tayamum</li> <li>3. Klien mengatakan tidak mengikuti kegiatan keagamaan di tempat tinggalnya.</li> <li>4. Anak klien mengatakan klien tidak terbiasa salat.</li> <li>5. Anak klien mengatakan klien selalu menolak ketika diajak salat.</li> <li>6. Anak klien mengatakan klien menyampaikn bahwa walaupun salat hal itu tidak menyembuhkan</li> </ol> <p><b>Data objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien nampak hanya tersenyum saat dikaji kebiasaan ritual keagamaan.</li> <li>2. Klien nampak tertutup dan tidak menjelaskan kondisi spiritualnya kepada perawat</li> </ol>	<p>jaringan</p> <p>↓</p> <p>Perubahan status kesehatan</p> <p>↓</p> <p>Stressor dan pola koping</p> <p>↓</p> <p>Distres spiritual</p>	
5	<p><b>Data subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. klien mengatakan kurang nafsu makan dan hanya makan 2 sendok di setiap jam makan</li> <li>2. Isteri klien mengatakan sejak sakit klien hanya mampu menghabiskan 2 sendok bubur yang</li> </ol>	<p>Truama</p> <p>↓</p> <p>Inflamasi jaringan</p> <p>↓</p> <p>Perubahan status kesehatan</p> <p>↓</p>	<p>Risiko defisit nutrisi</p>

	<p>diberikan setiap jam makan.</p> <p>3. Klien mengatakan tidak mampu menghabiskan porsi makanan yang diberikan</p> <p><b>Data objektif</b></p> <p>1. Makanan klien nampak tidak dihabiskan</p> <p>2. Nampak gigi seri bagian atas depan telah tanggal</p>	<p>Stressor dan pola koping</p> <p>↓</p> <p>Kurang pengetahuan</p> <p>↓</p> <p>Intake menurun</p> <p>↓</p> <p>Anoreksia</p> <p>↓</p> <p>Risiko defisit nutrisi</p>	
--	--	--	--

## 2. DIAGNOSIS KEPERAWATAN

- a. Nyeri akut
- b. Gangguan mobilitas fisik
- c. Distres Spiritual
- d. Defisit perawatan diri
- e. Risiko defisit nutrisi

## INTERVENSI KEPERAWATAN

Nama : Tn. "B"  
 Ruangan : Baji Kamase  
 No. Rekam Medik : 390750

No	Diagnosis Keperawatan	Luaran Keperawatan	Intervensi Keperawatan	Rasional
1.	Nyeri Akut	<p><b>Manajemen Nyeri</b></p> <p>a. Tujuan                      Mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konsisten.</p> <p>b. Kriteria Hasil                      1) Keluhan nyeri</p>	<p><b>1) Observasi</b></p> <p>a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p> <p>b) Identifikasi skala nyeri</p> <p>c) Identifikasi respon nyeri secara verbal</p> <p>d) Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri</p> <p>e) Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan</p>	<p>1. Mengetahui lokasi dan karakteristik nyeri untuk penentuan intervensi</p> <p>2. Mengurangi skala nyeri dan memberikan efek relaksasi</p> <p>3. Meperbaiki pola koping klien dan keluarga klien</p>

		<p>berkurang</p> <p>2) Napsu makan</p> <p>meningkat</p> <p>3) Kesulitan tidur</p> <p>menurun</p>	<p><b>2) Terapeutik</b></p> <p>a. Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (terapi musik, dan relaksasi napas dalam)</p> <p>b. Fasilitasi istirahat dan tidur</p> <p><b>3) Edukasi</b></p> <p>a. Jelaskan penyebab, periode dan penyebab nyeri</p> <p>b. Jelaskan strategi meredakan nyeri</p> <p>c. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri</p> <p>d. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat</p> <p><b>4) Kolaborasi</b></p> <p>Kolaborasi pemberian obat</p>	
--	--	--	--	--

2	Gangguan Mobilitas Fisik	<p><b>Teknik Latihan Penguatan Otot</b></p> <p>Tujuan: Memfasilitasi latihan otot resesif reguler untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuatan otot.</p> <p><b>Kriteri Hasil</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pergerakan ekstremitas meningkat</li> <li>2) Kekuatan otot meningkat</li> <li>3) Rentang gerak (ROM) meningkat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Observasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Identifikasi risiko latihan</li> <li>b) Identifikasi jenis dan durasi aktivitas pemanasan/pendinginan</li> <li>c) Monitor efektifitas latihan</li> </ol> </li> <li>2) <b>Terapeutik</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Lakukan latihan sesuai program yang ditentukan (ROM)</li> <li>b) Berikan instruksi tertulis tentang pedoman dan bentuk gerakan untuk setiap gerakan otot</li> </ol> </li> <li>3) <b>Edukasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jelaskan fungsi otot, fisiologi olahraga dan konsekuensi tidak digunakannya otot</li> <li>b) Ajarkan tanda dan gejala intoleransi selama dan setelah</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui kemampuan otot dan kemampuan pergerakan klien</li> <li>2. ROM berfungsi untuk mencegah kekakuan sendi dan mengembalikan fungsi otot</li> <li>3. Meningkatkan pengetahuan klien dan keluarga tentang pentingnya penggunaan otot dengan latihan</li> </ol>

			<p>sesi latihan</p> <p>c) Anjurkan menghindari latihan selama suhu ekstrim</p>	
3	Distres Spiritual	<b>Dukungan Spiritual</b>	<p><b>1) Terapeutik</b></p> <p>a. Sediakan lingkungan yang tenang untuk refleksi diri</p> <p>b. Fasilitasi mengidentifikasi masalah spiritual</p> <p>c. Fasilitasi mengeksplorasi keyakinan terkait pemulihan tubuh, pikiran, dan jiwa</p> <p><b>2) Edukasi</b></p> <p>a. Anjurkan membuat komitmen spiritual berdasarkan keyakinan dan nilai</p> <p>b. Anjurkan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah (hari raya, ritual) dan meditasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan lingkungan agar dapat lebih rilex</li> <li>2. Mengidentifikasi masalah spiritual secara mandiri</li> <li>3. Mengidentifikasi prinsip nilai klien tentang kesehatan</li> <li>4. Membantu membuat komitmen spiritual sesuai prinsip yang diyakini</li> <li>5. Memfasilitasi kebutuhan spiritual ritual</li> </ol>

4	Defisit perawatan diri	<p><b>Perawatan Diri</b></p> <p>a. Tujuan</p> <p>Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan perawatan diri</p> <p>b. Kriteria hasil</p> <p>1) Minta melakukan perawatan diri meningkat</p> <p>2) Mempertahankan kebersihan diri meningkat</p> <p>3) Meningkatkan kebersihan mulut</p>	<p><b>Dukungan Perawatan Diri: Mandi</b></p> <p><b>1) Observasi</b></p> <p>a) Identifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan</p> <p>b) Monitor kebersihan tubuh</p> <p>c) Monitor integritas kulit</p> <p><b>2) Terapeutik</b></p> <p>a) Fasilitasi mandi sesuai kebutuhan</p> <p>b) Fasilitasi menggosok gigi sesuai kebutuhan</p> <p><b>3) Edukasi</b></p> <p>a) Jelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi terhadap kesehatan</p> <p>b) Ajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien</p>	<p>1. Mengetahui kebutuhan personal hygiene klien</p> <p>2. Mengetahui faktor budaya dan kebiasaan yang menghambat perawatan diri</p> <p>3. Memberikan edukasi kepada klien dan keluarga agar dapat melakukan tindakan perawatan tubuh secara mandiri berikutnya.</p>

5	Risiko Defisit Nutrisi	<p><b>Manajemen Gangguan Makan</b></p> <p>a. Tujuan</p> <p>Mengidentifikasi dan mengelola diet yang buruk, olahraga berlebihan dan/atau pengeluaran makanan dan cairan berlebihan</p> <p>b. Kriteria hasil</p> <p>1) Frekuensi makan meningkat</p> <p>2) Nafsu makan membaik</p>	<p><b>1) Observasi</b></p> <p>Monitor asupan dan keluarnya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori</p> <p><b>2) Terapeutik</b></p> <p>Berikan penguatan positif terhadap keberhasilan target dan perubahan perilaku</p> <p><b>3) Edukasi</b></p> <p>a) Ajarkan pengaturan diet yang tepat</p> <p>b) Ajarkan keterampilan koping untuk penyelesaian masalah perilaku makan</p>	<p>1. Untuk mengetahui jumlah input dan output makanan dan cairan</p> <p>2. Membantu membantu koping positif terkait pemenuhan nutrisi</p> <p>3. Modifikasi diet untuk mempertahankan nutrisi</p>
---	------------------------	--	---	---

## IMPLEMENTASI KEPERAWATAN

**NAMA PASIEN : “Tn. B”**  
**UMUR PASIEN : 57 Tahun**


**NO. RM : 390750**  
**DX. MEDIS : Open Fraktur 1/3 tibia**  
**et fibula sinistra dstal**

NO	NO DX	Hari/Tgl /Jam	IMPLEMENTASI	EVALUASI	PARAF
1	1	Kamis 11 Maret 2021  09:30	<b>1 Observasi</b> a. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri b. Identifikasi skala nyeri Hasil: P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan Q: sedang, perih R: sektermitas bawah sinistra S: 6, nyeri hebat T: menetap	S: Klien mengatakan nyeri berat pada ekstremitas bawah sinistra. Klien mengatakan merasa lebih baik setelah melakukan relaksasi napas dalam O: Klien nampak meringis saat nyeri tiba-tiba timbul A: Nyeri akut belum teratasi P: Lanjutkan intervensi	

		<p>c. Identifikasi respon nyeri secara verbal  Hasil:  Klien nampak meringis</p> <p>d. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri  Hasil:  Klien mengatakan nyeri muncul tiba-tiba, walau tanpa digerakkan</p> <p><b>2 Terapeutik</b>  Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (teknis relaksasi napas dalam)  Hasil:  Klien melakukan teknis relaksasi napas dalam</p> <p><b>3 Edukasi</b></p> <p>e. Jelaskan penyebab, periode dan penyebab nyeri  f. Jelaskan strategi meredakan nyeri  g. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri  h. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat</p> <p>Hasil:</p>	<p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</li> <li>2. Identifikasi skala nyeri</li> <li>3. Identifikasi respon nyeri secara verbal</li> <li>4. Identifikasi respon nyeri secara verbal</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b>  Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (teknis relaksasi napas dalam dan terapi musik)</p> <p><b>Kolaborasi</b>  Kolaborasi pemberian analgetik  Cetoroloac 1 amp IV</p>	
--	--	---	---	--

		14:00	<p>klien paham penyebab dan cara memonitor nyeri</p> <p><b>4 Kolaborasi</b></p> <p>Kolaborasi pemberian analgetik</p> <p>Hasil: Injeksi ceterolax IV</p>	
2	3	12:00	<p><b>1. Terapeutik</b></p> <p>a. Sediakan lingkungan yang tenang untuk refleksi diri</p> <p>Hasil: meminimalisir keributan di ruangan, membatasi pengunjung, menyediakan ventilasi</p> <p>b. Fasilitasi mengidentifikasi masalah spiritual</p> <p>Hasil: klien dibimbing untuk mengidentifikasi masalah spiritual (semangat, keyakinan kesembuhan). Klien nampak lemas, klien nampak hanya tersenyum ketika ditanya</p> <p>c. Fasilitasi mengeksplorasi keyakinan terkait pemulihan tubuh, pikiran, dan jiwa</p> <p>Hasil: Klien mengatakan yakin akan sembuh tapi tidak bisa seperti kondisi sebelumnya. Klien</p>	<p>S: Anak klien mengatakan klien belum melaksanakan salat dzuhur, anak klien mengatakan klien belum bisa bertayamum</p> <p>O: klien nampak hanya tersenyum dan mengangguk, klien tidak mengulangi edukasi tayamum yang diberikan. Klien tidak mengulangi doa yang diajarkan</p> <p>A: Masalah distres spiritual belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p>

		<p>diberikan penguatan spiritual berupa penjelasan pentingnya pemenuhan kebutuhan spiritual dan efeknya untuk kesehatan</p> <p><b>2. Edukasi</b></p> <p>a. Anjurkan membuat komitmen spiritual berdasarkan keyakinan dan nilai Hasil: klien dianjurkan untuk berdoa meminta kesembuhan. Klien nampak hanya tersenyum dan mengangguk</p> <p>b. Anjurkan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah (hari raya, ritual) dan meditasi Hasil: klien diingatkan untuk melaksanakan salat dhuhur dan memberikan edukasi tayamum. Klien nampak tersenyum dan mengangguk</p>	<p><b>1. Terapeutik</b></p> <p>a. Sediakan lingkungan yang tenang untuk refleksi diri</p> <p>b. Fasilitasi mengidentifikasi masalah spiritual</p> <p>c. Fasilitasi mengeksplorasi keyakinan terkait pemulihan tubuh, pikiran, dan jiwa</p> <p><b>2. Edukasi</b></p> <p>a. Anjurkan membuat komitmen spiritual berdasarkan keyakinan dan nilai</p> <p>b. Anjurkan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah (hari raya, ritual) dan meditasi</p>	
--	--	--	--	--



3	2	14:15	<p><b>1 Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi risiko latihan</li> <li>b. Identifikasi jenis dan durasi aktivitas pemanasan/pendinginan</li> <li>c. Monitor efektifitas latihan</li> </ul> <p>Hasil: Latihan ringan yang dapat dilakukan adalah ROM beberapa gerakan untuk ekstremitas atas dan bawah kecuali ekstremitas bawah kiri</p> <p><b>2 Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lakukan latihan sesuai program yang ditentukan (ROM)</li> <li>b. Berikan instruksi tertulis tentang pedoman dan bentuk gerakan untuk setiap gerakan otot</li> </ul> <p>Hasil: ROM dilakukan pada ekstremitas kanan (atas bawah) dan ekstremitas atas kiri dengan gerakan fleksi, ekstensi, hiperekstensi adduksi dan abduksi</p>	<p>S: klien mengatakan sudah mampu menggerakkan ekstremitas kecuali ekstremitas bawah sinistra</p> <p>O: klien mampu menggerakkan lengan kanan atas mengikuti gerakan ROM. Klien masih beraktivitas di atas tempat tidur</p> <p>A: gangguan mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>1. Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi risiko latihan</li> <li>b. Identifikasi jenis dan durasi aktivitas pemanasan/pendinginan</li> <li>c. Monitor efektifitas latihan</li> </ul> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>Lakukan latihan sesuai program yang ditentukan (ROM)</p>	
---	---	-------	--	---	--

			<p><b>3 Edukasi</b></p> <p>a. Jelaskan fungsi otot, fisiologi olahraga dan konsekuensi tidak digunakannya otot</p> <p>b. Ajarkan tanda dan gejala intoleransi selama dan setelah sesi latihan</p> <p>Hasil:</p> <p>Klien memahami fungsi dan konsekuensi tidak digunakannya otot</p>		
4	2	<p>Kamis 11 Maret 2021  14:20</p>	<p><b>1) Observasi</b></p> <p>a) Identifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan</p> <p>d) Monitor kebersihan tubuh</p> <p>e) Monitor integritas kulit</p> <p>Hasil:</p> <p>Badan klien nampak kotor, gigi nampak kuning dan rambut berantakan, kuku tangan dan kaki panjang</p> <p><b>2) Terapeutik</b></p> <p>c) Fasilitasi mandi sesuai kebutuhan</p> <p>d) Fasilitasi menggosok gigi sesuai kebutuhan</p>	<p>S: Keluarga klien mengatakan klien belum mandi menggunakan waslap</p> <p>O: Kulit klien nampak kotor, kuku panjang dan rambut berantakan</p> <p>A: Defisit Perawatan diri belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan Intervensi</p> <p><b>Observasi</b></p> <p>a) Monitor kebersihan tubuh</p> <p>b) Monitor integritas kulit</p>	

			<p>Hasil: Keluarga klien menyediakan alat mandi dan gosok gigi</p> <p><b>3) Edukasi</b></p> <p>c) Jelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi terhadap kesehatan</p> <p>d) Ajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien</p> <p>Hasil: Klien dan keluarga klien memahami manfaat mandi untuk kesehatan</p>	<p><b>Terapeutik</b></p> <p>e) Fasilitasi mandi sesuai kebutuhan</p> <p>f) Fasilitasi menggosok gigi sesuai kebutuhan</p> <p><b>Edukasi</b></p> <p>e) Jelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi terhadap kesehatan</p> <p>f) Ajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien</p>	
5	5	<p>Kamis 11 Maret 2021  14:30</p>	<p><b>1. Observasi</b></p> <p>Monitor asupan dan keluarannya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori</p> <p>Hasil: Klien mengatakan hanya menghabiskan 2 sendok makan</p>	<p>S:Klien mengatakan tidak menghabiskan porsi makan siang. Klien mengatakan hanya makan 2 sendok</p> <p>O: Klien nampak tidak menghabiskan makan siang</p>	

		<p>siang dan segelas air putih</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>Berikan penguatan positif terhadap keberhasilan target dan perubahan perilaku</p> <p>Hasil:</p> <p>Klien mengerti pentingnya asupan nutrisi untuk kesehatan</p> <p><b>3. Edukasi</b></p> <p>Ajarkan pengaturan diet yang tepat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anjurkan makan walau sedikit tapi sering</li> <li>Berikan makanan kesukaan tetapi dengan tekstur lembut</li> </ol> <p>Hasil:</p> <p>Klien memahami pengaturan diet yang disampaikan perawat</p>	<p>A: Risiko defisit nutrisi belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>1 Observasi</b></p> <p>Monitor asupan dan keluarannya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori</p> <p><b>2 Terapeutik</b></p> <p>Berikan penguatan positif terhadap keberhasilan target dan perubahan perilaku</p> <p><b>3 Edukasi</b></p> <p>Ajarkan pengaturan diet yang tepat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anjurkan makan walau sedikit tapi sering</li> <li>Berikan makanan kesukaan tetapi dengan tekstur lembut</li> </ol>	
--	--	---	--	--

<b>POST ORIF OPEN FRAKTUR 1/3 TIBIA ET FIBULA SINISTRA DISTAL</b>					
6	1	Jumat 13 Maret 2021  16:30	<b>1. Observasi</b> a. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri b. Identifikasi skala nyeri c. Identifikasi respon nyeri secara verbal d. Identifikasi respon nyeri secara verbal Hasil: P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan Q: berat, perih R: sektermitas bawah sinistra S: 7, nyeri hebat T: menetap	S: klien mengatakan nyeri meningkat setelah operasi O: Klien nampak lemah, klien nampak meringis. Nampak nyeri tidak berkurang setelah melakukan teknik napas dalam A: Nyeri akut belum teratasi P: Lanjutkan intervensi <b>1. Observasi</b> a. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas,	

			<p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (teknis relaksasi napas dalam dan terapi musik)</p> <p>Hasil: Klien melakukan teknik relaksasi napas dalam</p> <p><b>3. Kolaborasi</b></p> <p>Kolaborasi pemberian analgetik Cetoroloac 1 amp IV</p> <p>Hasil: Injeksi Cetorolac 1 amp IV</p>	<p>intensitas nyeri</p> <p>b. Identifikasi skala nyeri</p> <p>c. Identifikasi respon nyeri secara verbal</p> <p>d. Identifikasi respon nyeri secara verbal</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (teknis relaksasi napas dalam dan terapi musik)</p> <p><b>3. Kolaborasi</b></p> <p>Kolaborasi pemberian analgetik Cetoroloac 1 amp IV</p>	
7	4	16:40	<p><b>1. Observasi</b></p> <p>a. Monitor kebersihan tubuh</p> <p>b. Monitor integritas kulit</p> <p>Hasil: Kulit tubuh nampak bersih, integritas kulit baik.</p>	<p>S: Keluarga klien mengatakan telah memandikan klien menggunakan waslap tadi pagi sebelum masuk ruang OK</p> <p>O: kulit klien nampak bersih,</p>	

			<p>rambut nampak berantakan, kuku tangan dan kaki panjang dan kotor</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>a. Fasilitasi mandi sesuai kebutuhan</p> <p>b. Fasilitasi menggosok gigi sesuai kebutuhan</p> <p>Hasil: Keluarga klien menyediakan waslap dan air hangat untuk klien</p> <p><b>3. Edukasi</b></p> <p>a. Jelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi terhadap kesehatan</p> <p>b. Ajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien</p> <p>Hasil: klien dna keluarga mengerti pentingnya mandi untuk melancarkan sirkulasi dan memberikan rasa nyaman pada klien</p>	<p>integritas kulit baik. rambut nampak berantakan, kuku tangan dan kaki nampak panjang dan kotor</p> <p>A: defisit perawatan diri belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>1. Observasi</b></p> <p>a. Monitor kebersihan tubuh</p> <p>b. Monitor integritas kulit</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>a. Fasilitasi mandi sesuai kebutuhan</p> <p>b. Fasilitasi menggosok gigi sesuai kebutuhan</p> <p><b>3. Edukasi</b></p> <p>Jelaskan kepada klien dna keluarga pentingnya memotong kuku untuk</p>	
--	--	--	---	--	--

				kesehatan dan berbias untuk kenyamanan klien	
8	5	16:45	<p><b>1. Observasi</b></p> <p>Monitor asupan dan keluarannya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori</p> <p>Hasil:</p> <p>Tidak ada pengeluaran makanan, vomiting dan nausea. Peneluaran urin 500 cc</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>Berikan penguatan positif terhadap keberhasilan target dan perubahan perilaku</p> <p>Hasil:</p> <p>Klien dan keluarga mengerti pentingnya asupan nutrisi selama sakit</p> <p><b>3. Edukasi</b></p> <p>Ajarkan pengaturan diet yang tepat</p> <p>e. Anjurkan makan walau seikit tapi sering</p>	<p>S: Klien mengatakan merasa kurang nafsu makan karena diberikan bubur dari RS. Keluarga klien mengatakan telah memberikan makanan dari rumah tetapi porsi tidak dihabiskan</p> <p>O: klien nampak lemah, lidah berwarna pucat, bibir nampak kering</p> <p>A: risiko defisit nutrisi belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>1. Observasi</b></p> <p>Monitor asupan dan keluarannya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori</p>	

			<p>f. Berikan makanan kesukaan tetapi dengan tekstur lembut</p> <p>Hasil: Klien dan keluarga memahami edukasi pentingnya mengatur pola makan</p>	<p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>Berikan penguatan positif terhadap keberhasilan target dan perubahan perilaku</p> <p><b>3. Edukasi</b></p> <p>a. Ajarkan pengaturan diet yang tepat</p> <p>b. Anjurkan makan walau seikit tapi sering</p> <p>c. Berikan makanan kesukaan tetapi dengan tekstur lembut</p>	
9	3	19:30	<p><b>1. Terapeutik</b></p> <p>a. Sediakan lingkungan yang tenang untuk refleksi diri</p> <p>Hasil: meminimalisir kebisingan di ruangan, membatasi pengunjung, menjaga privasi</p> <p>b. Fasilitasi mengidentifikasi masalah spiritual</p> <p>Hasil: klien dibimbing untuk mengidentifikasi</p>	<p>S: Anak klien mengatakan klien belum melaksanakan salat Isya, anak klien mengatakan klien belum bisa bertayamum. Anak klien mengatakan klien masih menolak untuk berdoa</p> <p>O: Klien nampak mengulangi edukasi</p>	

			<p>kesulitan melaksanakan aktivitas spiritual ritual. anak klien mengatakan klien belum mau berdoa (meminta kesembuhan) dan melaksanakan salat. Anak klien mengatakan klien menyampaikan bahwa berdoa dan salat tidak menyembuhkan penyakitnya</p> <p>c. Fasilitasi mengeksplorasi keyakinan terkait pemulihan tubuh, pikiran, dan jiwa</p> <p>Hasil: klien mengatakan dia akan sembuh dengan obat, memberikan penguatan spiritual bahwa sehat dan sakit datangnya dari Allah. Klien diberikan penguatan spiritual berupa penjelasan pentingnya pemenuhan kebutuhan spiritual dan efeknya untuk kesehatan.</p> <p><b>2. Edukasi</b></p> <p>a. Anjurkan membuat komitmen spiritual berdasarkan keyakinan dan nilai</p> <p>Hasil: Menganjurkan klien untuk berdoa meminta kesembuhan di setiap akan minum obat</p>	<p>tayamum hanya pada bagian tangan. Klien tidak mengulangi doa yang diajarkan</p> <p>A: Masalah distres spiritual belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>1. Terapeutik</b></p> <p>a. Sediakan lingkungan yang tenang untuk refleksi diri</p> <p>b. Fasilitasi mengidentifikasi masalah spiritual</p> <p>c. Fasilitasi mengeksplorasi keyakinan terkait pemulihan tubuh, pikiran, dan jiwa</p> <p><b>2. Edukasi</b></p> <p>a. Anjurkan membuat komitmen spiritual berdasarkan keyakinan dan</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p><b>b.</b> Anjurkan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah (hari raya, ritual) dan meditasi</p> <p>Hasil: klien diingatkan untuk melaksanakan salat isya dan diberikan edukasi tayamum. Klien nampak tersenyum dan mengangguk. Klien nampak mengulang tayammau hanya pada bagian tangan</p>	<p>nilai</p> <p><b>b.</b> Anjurkan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah (hari raya, ritual) dan meditasi</p>	
10	1	<p>Sabtu</p> <p>13 Maret</p> <p>2021</p> <p>15:00</p>	<p><b>1. Observasi</b></p> <p>a. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p> <p>b. Identifikasi skala nyeri</p> <p>c. Identifikasi respon nyeri secara verbal</p> <p>d. Identifikasi respon nyeri secara verbal</p> <p>Hasil:</p> <p>P: saat digerakkan</p> <p>Q: sedang, perih</p> <p>R: sektermitas bawah sinistra</p> <p>S: 6, nyeri sedang</p> <p>T: menetap</p>	<p>S: Klien mengatakan nyerinya meningkat tadi malam sehingga tidak bisa tidur. Klien mengatakan nyerinya telah berkurang mulai siang tadi dan sudah bisa tidur siang. Klien mengatakan nyeri lebih berkurang dan merasa lebih nyaman setelah melakukan relaksasi napas dalam</p> <p>O: klien sudah mampu menggerakkan ekstremitas, bawah. Klien nampak meringis namun saat kaki (post)</p>	

		<p><b>2. Terapeutik</b> Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (teknis relaksasi napas dalam) Hasil: Klien melakukan teknik relaksasi napas dalam</p> <p><b>3. Kolaborasi</b> Kolaborasi pemberian analgetik Cetoroloac 1 amp IV Hasil: Injeksi Cetorolac diberikan pukul 15:00</p>	<p>digerakkan A: Nyeri akut belum teratasi P: Lanjutkan Intervensi</p> <p><b>1. Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</li> <li>Identifikasi skala nyeri</li> <li>Identifikasi respon nyeri secara verbal</li> <li>Identifikasi respon nyeri secara verbal</li> </ol> <p><b>2. Terapeutik</b> Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (teknis relaksasi napas dalam)</p> <p><b>3. Kolaborasi</b> Kolaborasi pemberian analgetik</p>	
--	--	--	---	--


				Cetoro loac 1 amp IV	
10	4	16:20	<p><b>1. Observasi</b></p> <p>a. Monitor kebersihan tubuh</p> <p>b. Monitor integritas kulit</p> <p>Hasil:</p> <p>Integritas kulit baik, tidak kering. Kulit tubuh bersih. Kuku panjang, gigi kuning</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>a. Fasilitasi mandi sesuai kebutuhan</p> <p>b. Fasilitasi menggosok gigi sesuai kebutuhan</p> <p>Hasil:</p> <p>Keluarga klien menyediakan alat mandi secara mandiri, namun belum menyediakan alat gosok gigi</p> <p><b>3. Edukasi</b></p> <p>Jelaskan kepada klien dan keluarga pentingnya memotong kuku untuk kesehatan dan berhias untuk</p>	<p>S: Keluarga klien mengatakan telah memandikan klien menggunakan waslap dan air hangat. Keluarga klien mengatakan klien punya kebiasaan senang dengan air (mandi)</p> <p>O: Integritas kulit baik, tidak kering. Kulit tubuh bersih. Kuku panjang, gigi kuning</p> <p>A: Defisit perawatan diri belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>1. Observasi</b></p> <p>a. Monitor kebersihan tubuh</p> <p>b. Monitor integritas kulit</p>	

			<p>kenyamanan klien</p> <p>Hasil:</p> <p>Klien dan keluarga mengetahui pentingnya menjaga kebersihan kuku dan berhias</p>	<p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>a. Fasilitasi mandi sesuai kebutuhan</p> <p>b. Fasilitasi menggosok gigi sesuai kebutuhan</p> <p><b>3. Edukasi</b></p> <p>Jelaskan kepada klien dan keluarga pentingnya memotong kuku untuk kesehatan dan berhias untuk kenyamanan klien</p>	
11	3	19:30	<p><b>1. Terapeutik</b></p> <p>a. Sediakan lingkungan yang tenang untuk refleksi diri</p> <p>Hasil: meminimalisir pengunjung, mengurangi kebisingan dengan melibatkan keluarga klien. menjaga privacy klien</p> <p>b. Fasilitasi mengidentifikasi masalah spiritual</p> <p>Hasil: membantu mengidentifikasi masalah</p>	<p>S: Anak klien mengatakan klien belum mau melaksanakan salat Isya, anak klien mengatakan klien belum bisa bertayamum. Anak klien mengatakan klien masih menolak untuk berdoa</p> <p>O: Klien nampak tidak mengulangi edukasi tayamum. Klien nampak</p>	


			<p>spiritual klien. anak klien mengatakan klien masih menolak berdo'a dan salat. Klien diberikan penguatan spiritual berupa penjelasan pentingnya pemenuhan kebutuhan spiritual dan efeknya untuk kesehatan</p> <p>c. Fasilitasi mengeksplorasi keyakinan terkait pemulihan tubuh, pikiran, dan jiwa        Hasil: klien mengatakan yakin akan sembuh dengan rutin minum obat. Klien diberikan penguatan spiritual bahwa sehat dan sakit datang dari Allah.</p> <p><b>2. Edukasi</b></p> <p>a. Anjurkan membuat komitmen spiritual berdasarkan keyakinan dan nilai        Hasil: menganjurkan kepada klien berdo'a saat akan minum obat dan makan. Klien nampak hanya mengangguk</p> <p>b. Anjurkan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah (hari raya, ritual) dan meditasi</p>	<p>menutupi masalah spiritualnya terhadap perawat</p> <p>A: Masalah distres spiritual belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><b>1. Terapeutik</b></p> <p>a. Sediakan lingkungan yang tenang untuk refleksi diri</p> <p>b. Fasilitasi mengidentifikasi masalah spiritual</p> <p>c. Fasilitasi mengeksplorasi keyakinan terkait pemulihan tubuh, pikiran, dan jiwa</p> <p><b>2. Edukasi</b></p> <p>a. Anjurkan membuat komitmen spiritual</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>Hasil: klien dianjurkan untuk melaksanakan salat isya dan diberikan edukasi tayamum. Klien nampak hanya mengangguk dan tidak mengulang edukasi yang diberikan</p>	<p>berdasarkan keyakinan dan nilai</p> <p>b. Anjurkan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah (hari raya, ritual) dan meditasi</p>	
12	5	20:00	<p><b>1. Observasi</b></p> <p>Monitor asupan dan keluarnya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori</p> <p>Hasil:</p> <p>Tidak ada vomiting dan nausea. Terpasang kateter volume 250 cc</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>Berikan penguatan positif terhadap keberhasilan target dan perubahan perilaku</p> <p>Hasil: klien memahami pentingnya pengaturan pola makan</p> <p><b>3. Edukasi</b></p>	<p>S: klien mengatakan nafsu makannya mulai membaik walau belum mampu menghabiskan porsi makanan yang diberikan. Keluarga klien mengatakan klien makan ½ porsi makanan dari rumah (lebih banyak dari kemarin) dan rutin makan buah pisang</p> <p>O: Wajah klien nampak lebih segar, tidak pucat, bibir lembab. lidah berwarna merah muda</p> <p>P: Pertahankan intervensi</p>	

			<p>Ajarkan pengaturan diet yang tepat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anjurkan makan walau seikit tapi sering</li> <li>b. Berikan makanan kesukaan tetapi dengan tekstur lembut</li> </ol> <p>Hasil: keluarga klien memahami pentingnya pengaturan diet dan pola makan</p>	<p><b>1. Observasi</b></p> <p>Monitor asupan dan keluarannya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori</p> <p><b>2. Terapeutik</b></p> <p>Berikan penguatan positif terhadap keberhasilan target dan perubahan perilaku</p> <p><b>3. Edukasi</b></p> <p>Ajarkan pengaturan diet yang tepat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Anjurkan makan walau seikit tapi sering</li> <li>d. Berikan makanan kesukaan tetapi dengan tekstur lembut</li> </ol>	
--	--	--	--	---	--



--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisa Kasus**

Klien mengalami fraktur 1/3 tibia et fibula distal disebabkan kecelakaan tunggal bermotor yang dialami dua hari yang lalu. Aktivitas sehari-hari klien adalah berladang dan menggunakan motor sebagai transportasi utama. Benjamin (2020) menyebutkan salah satu faktor yang dapat menyebabkan fraktur adalah kecelakaan bermotor. Kecelakaan dapat mengakibatkan trauma langsung atau tidak langsung dengan energi pada tulang. Sejalan dengan itu, Jessica L. & Aaron (2021) menyebutkan fraktur dapat terjadi karena trauma berenergi tinggi dan dapat berakibat pada kerusakan jaringan lunak.

Keluhan utama yang dirasakan klien adanya nyeri dengan skala 6. Suriya & Zuriati (2019) dan Thompson et al. (2020) menyebutkan bahwa nyeri merupakan karakteristik utama pada fraktur tibia fibula dengan skala dan kualitas yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keparahan fraktur dan pengalaman subjektif klien. Dalam Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2017) disebutkan nyeri merupakan pengalaman sensorik atau emosional terkait dengan adanya kerusakan jaringan secara aktual maupun fungsional.

Nyeri akut adalah diagnosis keperawatan utama pada kasus ini. Masalah tersebut didapatkan di hari pertama saat klien masuk di rumah sakit. Klien mengatakan nyeri dirasakan pada kaki kiri sejak dua hari yang lalu. Hasil pengkajian komprehensif terhadap nyeri ditemukan P: Tiba-tiba, walau tanpa digerakkan, Q: perih, R: extremitas bawah sinistra, S: 6, nyeri sedang, T: Menetap. Oleh karena itu, klien nampak meringis dan mengalami kesulitan bergerak karena efek nyeri secara emosional dan fisik yang dialami klien.

Diagnosis keperawatan lainnya lain yang muncul pada kasus ini adalah distres spiritual. Masalah tersebut didapatkan di hari pertama saat dilakukan pengkajian secara komprehensif. Anak klien mengatakan selama sakit klien tidak pernah melaksanakan salat. Anak klien mengatakan klien tidak terbiasa salat, klien selalu menolak ketika diajak salat. Anak klien mengatakan klien menyampaikan bahwa walaupun ia salat hal itu tidak menyembuhkan.

Kemungkinan hal tersebut muncul karena adanya perubahan status kesehatan dan perubahan bentuk tubuh pada klien. Hidayat & Uliyah (2015) menyebutkan, salah satu faktor yang menyebabkan timbulkan distres spiritual adalah krisis penyakit yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Selain itu, Suriya & Zuriati (2019) mengatakan bahwa raktur tibia fibula dapat menyebabkan kecacatan yang membuat klien kehilangan pekerjaan. Kemungkinan stres dapat terjadi pada klien dengan nyeri kronis perubahan bentuk tubuh.

## **B. Analisis Intervensi**

Intervensi yang diberikan pada kasus ini untuk diagnosis utama nyeri akut adalah memberikan manajemen dengan pemberian teknik relaksasi napas dalam (PPNI, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini & Reskita (2018) menyebutkan bahwa pemberian teknik relaksasi napas dalam dapat menurunkan skala nyeri pada klien fraktur. Pemberian teknik relaksasi napas dalam dikolaborasikan dengan pemberian analgetik berupa cetorolac 1 amp IV.

Pada diagnosis distres spiritual, klien diberikan dukungan spiritual dengan memfasilitasi dan mengeksplorasi keyakinan terkait pemulihan tubuh,

fikiran dan jiwa (PPNI, 2018). Nilai-nilai yang diyakini klien sangat berpengaruh dalam proses penyembuhan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Yusuf et al (2016) bahwa keyakinan klien dapat membantu meningkatkan status kesehatan dan memperbaiki pola koping saat sakit. Selain itu, klien dianjurkan untuk membuat komitmen spiritual sesuai dengan keyakinan berupa anjurkan berdoa meminta kesembuhan pada saat waktu makan. Berdoa merupakan aktifitas mengingat Allah yang dapat memperbaiki pola koping terhadap penyakit. Sebagaimana disebutkan dalam Qs:Rad:[13]:28 Allah SWT Befirman (Depag RI, 2018):

.. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

“(yaitu orang-orang beriman dan yang merasa tenang) tentram (hati mereka karena mengingat Allah) mengingat janji-Nya. (ingatlah), hanya dengan mengngat Allah hati menjadi tentram”

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual seperti berdoa (mengingat Allah) dapat memperbaiki pola koping terhadap manajemen stress saat sakit sehingga hal itu diharapkan dapat mempercepat pemulihan kesehatan.

### C. Alternatif Pemecahan Masalah

Intervensi keperawatan yang diberikan pada diagnosis distres spiritual dalam kasus ini selain intervensi yang disebutkan di atas adalah memberikan dukungan spiritual berupa edukasi tayamum sebagai alternatif pengganti wudhu sebelum melakukan salat. Berdasarkan hasil penelitian oleh Sunardi, et. al (2017) menyebutkan bahwa tayamum dapat membantu membersihkan kulit klien dari mikroorganismenya. Tayamum merupakan langkah awal yang

dapat dilakukan sebelum memulai salat sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan spiritual. hal itu dapat menjadi salah satu faktor peningkatan status kesehatan. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Majed & Hasan (2021) bahwa salat memberikan efek positif bagi kesehatan di antaranya pada berbagai aspek tubuh seperti fisik, sistem saraf, sistem kardiovaskuler, dan sistem muskuloskeletal.

Pada kasus ini, klien mengalami open fraktur 1/3 tibia et fibula pada ekstremitas bawah sinistra. Pada klien dengan fraktur tibia fibula, salah satu sistem yang utama dipengaruhi adalah sistem muskuloskeletal yang memungkinkan klien tidak mampu melakukan wudhu secara sempurna sehingga dapat diganti dengan tayamum sebelum melaksanakan salat. Salat bukan hanya aktivitas fisik tetapi juga mencakup pembacaan berbagai ayat Al-Qur'an dan kinerja posisi postural tertentu. Salat adalah intervensi nonfarmakologis dan sumber kekuatan. Salat dapat dimasukkan dalam perawatan holistik dan program rehabilitasi yang ditujukan untuk kesejahteraan pasien (Majed & Hassan, 2021)

Evaluasi hasil implementasi yang dilakukan kepada Tn. B selama tiga hari ditemukan masalah distres spiritual belum teratasi. Klien hanya mengulangi edukasi tayamum yang diberikan sebanyak satu kali dan tidak mengulangi dengan sempurna. Klien hanya mengusap kedua tangan dan tidak mengusap wajah sebagai bagian dari anggota tayamum.

Pada hari pertama, intervensi dimulai dengan pendekatan spiritual melalui eksplorasi keyakinan klien terhadap prinsip dan nilai kepercayaan yang dianut, Klien diberikan penguatan spiritual berupa penjelasan

pentingnya pemenuhan kebutuhan spiritual dan efeknya untuk kesehatan. Bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual dapat membantu meningkatkan status kesehatan dan memperbaiki pola koping saat sakit (Yusuf et al., 2016). Kemudian dilanjut dengan pemberian edukasi tayamum. Namun klien tidak mengulangi edukasi yang diberikan. Respon klien hanya tersenyum dan mengangguk

Pada hari kedua, 5 jam setelah kembali dari ruang operasi intervensi dilanjutkan. Sebelum memulai edukasi tayammum, klien kembali diberikan dukungan spiritual bahwa sehat dan sakit datangnya dari Allah. Klien mengulangi edukasi tayamum yang diberikan namun tidak dilakukan secara sempurna. Klien hanya mengusap pada bagian tangan. Anak klien mengatakan klien belum bisa bertayamum dan menolak untuk berdoa. Klien mengatakan akan sembuh dengan berobat. Anak klien melaporkan bahwa klien menolak untuk berdoa dan menolak untuk salat karena menganggap hal tersebut tidak memberikan kesembuhan. Saat melakukan evaluasi, respon klien hanya mengangguk namun tidak mengulangi edukasi tayamum dan doa kesembuhan yang diajarkan.

Pada hari ketiga, implementasi dilanjutkan namun klien masih enggan melakukan tayamum dan salat. Anak klien mengatakan klien masih menolak berdoa. Namun saat ditemui perawat, klien memberikan respon motorik yang positif dengan mengangguk dan tersenyum setiap kali diberikan edukasi walaupun tidak mengulangi edukasi yang diberikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, perawat perlu memahami secara menyeluruh tentang perspektif teoritis yang berkaitan dengan perubahan

perilaku kesehatan klien. Pemahaman terhadap ilmu perilaku sangat penting bagi perawat karena hal ini memberikan dampak terhadap konteks konseptual untuk memahami perilaku klien sehingga mudah mengaplikasikan intervensi keperawatan dan menawarkan pendekatan alternatif untuk efektivitas perawatan klien (Sleet & Dellinger, 2020).

Melihat kondisi tersebut, perawat tetap wajib memberikan dampingan penguatan spiritual kepada klien sebagai implementasi dari proses keperawatan secara holistik. Pemenuhan kebutuhan spiritual tidak boleh termarginalkan, namun tidak boleh memaksakan intervensi kepada klien. mengingat aspek spiritual adalah terkait prinsip nilai yang diyakini oleh setiap orang (Yusuf et. al, 2016). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghodrati & Ebrahimi (2019) mengemukakan bahwa terdapat korelasi yang signifikan secara statistik antara terapi epiritualitas dan pengurangan nyeri, kecemasan, depresi dan meningkatkan kualitas hidup karena hal itu melibatkan psikoneuroimunologi. Terapi spiritual yang dimaksud adalah beribadah kepada Tuhan, dan berdoa.

Sejalan dengan itu Putra, (2019) mengatakan bahwa dengan memahami konsep sehat sakit melalui keterlibatan psikoneuroimunologi kita dapat mendapatkan paradigma baru terakit etiologi dan patofisiologi sebuah penyakit. Pemahaman pada kedua aspek dasar tersebut akan menjadi rujukan dalam penetapan intervensi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pemberian asuhan keperawatan pada “Tn.B” dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula distal dapat disimpulkan yaitu:

1. Hasil pengkajian ditemukan keluhan utama adalah nyeri
2. Diagnosis keperawatan yang muncul berjumlah 5 yaitu: nyeri akut, gangguan mobilitas fisik, distres spiritual, defisit perawatan diri, dan risiko defisit nutrisi
3. Intervensi dan implementasi yang dilakukan pada klien dengan fraktur 1/3 tibia et fibula distal yaitu: manajemen nyeri, teknik latihan penguatan, dukungan spiritual, perawatan diri, dan manajemen gangguan makan
4. Proses evaluasi keperawatan pada klien dengan diagnosa fraktur 1/3 tibia et fibula yaitu: nyeri akut belum teratasi (tidak ada perubahan skala nyeri), gangguan mobilitas fisik belum teratasi (klien telah menjalani operasi), distres spiritual belum teratasi, defisit perawatan diri teratasi, dan risiko defisit nutrisi teratasi.
5. Klien tidak mengikuti edukasi tayamum yang diberikan

#### **B. Saran**

##### **1. Bagi Profesi keperawatan**

Hasil studi kasus ini dapat dijadikan referensi dalam menetapkan intervensi pemenuhan kebutuhan spiritual klien. perawat tidak boleh memarjinalkan aspek spiritual dalam pemberian asuhan keperawatan, karena pemberian asuhan keperawatan harus dilakukan secara holistik meliputi aspek biopsikososio-spiritual. Perawat perlu memahami secara

lebih komprehensif pola perubahan perilaku kesehatan agar meningkatkan pelayanan asuhan keperawatan kepada klien.

## **2. Bagi Rumah Sakit**

Hasil studi kasus ini dapat dijadikan acuan dalam penerapan manajemen keperawatan yang harus diimplementasikan secara komprehensif sesuai dengan disiplin ilmu keperawatan

## **3. Bagi Intitusi Pendidikan**

Hasil studi kasus ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien fraktur 1/3 tibia et fibula distal. Pada pemberian intervensi edukasi tayamum di penelitian selanjutnya dapat menggunakan tayamum pack untuk sebagai media yang memudahkan klien memenuhi kebutuhan spiritual.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2018). *Fiqih Thaharah: Panduan Praktik Bersuci*. Pustaka Media.
- Aini, L., & Reskita, R. (2018). Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam terhadap Penurunan Nyeri pada Pasien Fraktur. *Jurnal Kesehatan*, 9(2). <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article>
- American Academy Orthopaedic of Surgeons. (2019). *Distal Femur (Thighbone) Fractures of The Knee*. American Academy Orthopaedic of Surgeon. <https://www.orthoinfo.org>
- Balitbangkes RI. (2013). *Riset dan Kesehatan Dasar*. Badan Penelitian dan Kesehatan Kemenkes RI.
- Benjamin. (2020, June 20). *What is Bone Fracture?* [Kesehatan]. Penn Medicine. <https://www.pennmedicine.org/for-patients-and-visitors/patient-information/conditions-treated-a-to-z/bone-fractures>
- Depag RI. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV Darus Sunnah.
- Ghodrati, F., & Ebrahimi, A. (2019). The Importance of Spirituality Therapy and its Elements; Prayer, religious worship, and prayer with God in Nursing Care. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(6). <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/1425>
- Hidayat, A. A., & Uliyah, M. (2015). *Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia*. Health Books Publishing.
- Jessica L. & Aaron. (2021). *Open Fracture Management*. Stat Pearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448083/>
- Li, C., Li, Z., Wang, Q., Shi, L., Gao, F., & Sun, W. (2021). The Role of Fibular Fixation in Distal Tibia-Fibula Fractures: A Meta-Analysis. *Advances in Orthopedics*, 2021, 6668467. <https://doi.org/10.1155/2021/6668467>
- Majed & Hassan. (2021). A review of the literature on the health benefits of Salat (Islamic prayer). *Med Journal Malaysia*, 76(1), 93–97.
- Marchand, L. S. (2020, July 21). *Tibial Shaft Fracture*. Orthopaedic Trauma Association. <https://ota.org/for-patients/find-info-body-part/3722>
- McLeod, S. (2020, December 29). *Maslow's Hierarchy of Needs* [Psikologi]. SimplyPsychology. <https://www.simplypsychology.org/maslow.html>
- O'Brien, M, E (2017). *Spiritualith In Nursing: Holy Ground. Six Edition*. Jonnes & Barlet Learning. USA


- Patrisia, I., Juhdeliana, Kartika, L., Pakpahan, M., Siregar, D., Biantoro, Hutapea, A. D., Khusniyah, Z., Sihombing, R. M., Mukhoirotin, & Togatorop, L. B. (2020). *Asuhan Keperawatan Pada Kebutuhan Dasar Manusia*. Yayasan Kita Menulis.
- PPNI, T. P. S. D. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia* (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI, T. P. S. D. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia* (1st ed.). DPP PPNI.
- Putra, S. T. (2019). *Psikoneuroimunologi Kedokteran* (2nd ed.). Airlangga University Press.
- Rahman, F. (2020). *Pintar Ibadah dilengkapi: Tuntunan shlaat wajib, salat sunat, zakat, puasa, haji, shalawat dan doa-doa*. Pustaka Media.
- Santoso, D. (2016). *Pemeriksaan Fisik Dasar*. Airlangga University Press.
- Sleet, D., & Dellinger, A. M. (2020). Using behavioral science theory to enhance public health nursing. *Public Health Nursing*, 37(2). <https://doi.org/10.1111/phn.12795>
- Sunardi, Ummatin, K., & Ubaidullah, Z. (2017). *The Use of Tayamum Pack to Reduce Number of Bacterial Colonies*. 2.
- Suriya, M., & Zuriati. (2019). *Asuhan Keperawatan Medikal Bedah Gangguan pada Sistem Muskuloskeletal Aplikasi NANDA NIC & NOC*. Pustaka Galeri Mandiri.
- Thompson, J. H., Koutsugiannis, P., & Jahangir, A. (2020, August 24). *Tibia Fractures Overview* [Kesehatan]. NCBI. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513267/>
- Watulangi, F. (2019). *Asuhan Keperawatan Pada Tn.T Dengan Fraktur Tibia Fibula Diruang Rawat Inap Bedah Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2019*. Stikes Perintis Padang. <http://repo.stikesperintis.ac.id/801/1/7%20FAJAR%20WATULANGI.pdf>.
- WHO. (2021a, February 8). *Musculoskeletal Condition* [Kesehatan]. World Helath Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions>
- WHO. (2021b, June 21). *Road Traffic Injuries* [Kesehatan]. World Helath Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>
- Widiyawati, W. (2020). *Keperawatan Jiwa*. Literasi Nusantara.

Yusuf, A., Nihayati, H. E., Iswari, M. F., & Okviasanti, F. (2016). *Kebutuhan Spiritual: Konsep dan Aplikasi Dalam Asuhan Keperawatan*. Mitra Wacana Media.



## LAMPIRAN

*Uji turnitin*



Z

## RIWAYAT HIDUP



MUSTABSYIRATUL AILAH, Lahir di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 28 Maret 1997. Anak keempat dari empat bersaudara pasangan H. Alimin dan Hj. Buwa. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Pesantren Qur'an Ar-Rahman Megamendung Bogor Jawa Barat. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 186 Mattirowalie pada tahun 2009. Pada tahun selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah menengah pertama (SMP) Al-Furqan Ereng-ereng Bantaeng dan tamat pada tahun 2012, pada tahun 2012 peneliti melanjutkan pendidikan menengah kejuruan di Sekolah menengah kejuruan (SMK) kesehatan Muhammadiyah Bulukumba dan tamat pada tahun 2015 dan kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada Program Studi Keperawatan kemudian Peneliti menyelesaikan kuliah strata 1 (S1) pada tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan Profesi Ners di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) dan dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah pada 14 Juli 2021.

