

**PERFORMA DAN *INCOME OVER FEED COST* BROILER
YANG DIBERIKAN BUNGKIL INTI SAWIT
(*Palm Kernel Meal*)**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains
dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

Oleh:

**M. IRVAN ALFAWZI
NIM. 60700117048**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Irvan Alfawzi

NIM : 60700117048

Tempat/Tanggal Lahir : Margolembo, 25 Oktober 1998

Jurusan : Ilmu Peternakan


Fakultas : Sains dan Teknologi

Judul : Performa dan *Income Over Feed Cost* Broiler yang Diberikan Bungkil Inti Sawit (*Palm Kernel Meal*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya Skripsi yang saya tulis adalah asli. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya Skripsi ini, terutama dalam Bab Hasil dan Pembahasan, tidak asli atau *plagiasi* maka bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Samata, 29 Juli 2021

Penyusun,



M.Irvan Alfawzi
60700117048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Performa dan *Income Over Feed Cost* Broiler yang Diberikan Bungkil Inti Sawit (*Palm Kernel Meal*)** yang disusun oleh **M.Irwan Alfawzi, NIM: 60700117048**, Mahasiswa pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 03 November 2021 M
27 Rabiul Awal 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.	(.....)
Pembimbing II	: Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Astati, S.Pt., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN
Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.

NIP. 1974041 200003 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas segala limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah **Performa dan *Income Over Feed Cost* Broiler yang Diberikan Bungkil Inti Sawit (*Palm Kernel Meal*)** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad saw., beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ayahanda saya tercinta **Arifin** dan Ibunda saya tercinta **Suryani** karena mereka saya bisa sampai ke tahap ini yang pastinya tidak terlepas dari doa dan dukungan tanpa pamrih, penuh kasih sayang

membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini. Teruntuk saudara kandung saya yang selalu mendoakan dan menyemangati saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.** selaku **Rektor** Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.** selaku **Dekan** Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ibu **Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.** selaku **Wakil Dekan 1 Bidang Akademik** Fakultas Sains dan Teknologi, ibu **Dr. Fatmawati Nur Khalik, S.Si., M.Si.** selaku **Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi** Fakultas Sains dan Teknologi, dan Bapak **Dr. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si.** selaku **Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Bapak **Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.** sebagai **Ketua Jurusan Ilmu Peternakan** Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan ibu **Dr. Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si.** selaku Sekretaris jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak **Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.** selaku **Dosen Pembimbing Pertama** dan ibu **Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.P.** selaku

Dosen Pembimbing Kedua, atas bimbinganya selama ini dan banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu **Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.** selaku **Dosen Penasehat Akademik**, yang telah menasehati penulis sejak awal perkuliahan dan tidak pernah bosan memberikan semangat yang luar biasa untuk penulis.
6. Ibu **Astati, S.Pt., M.Si.** selaku **Dosen Penguji Pertama** dan Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.** selaku **Dosen Penguji Kedua** yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu **Dosen, Laboran dan Staff Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
8. Bapak/Ibu **Civitas Akademik** Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah membantu dalam proses pengurusan administrasi.
9. Saudara (i) leting **Ilmu Peternakan Angkatan 2017 “K17ANG”** terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan canda tawa yang selama ini terjalin.
10. Tim penelitian, **Siti Nurjannah, Khusnul Khatima, Linda Ramadhani** dan **Muttahida**, yang telah bekerja sama selama penelitian.
11. Sahabat, yang selama ini telah hadir dalam suka dan duka mulai dari awal perkuliahan sampai proses selesainya skripsi ini.

12. Buat adinda dan kakanda senior khususnya di **HMJ Ilmu Peternakan**, yang telah memberikan bantuan dan masukkan, serta kebersamaan.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Samata, 29 Juli 2021
Penulis,



M.Irvan Alfawzi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Integrasi.....	6
B. Tinjauan Teoritis.....	10
1. Broiler	10
2. Pakan.....	13
3. Bungkil Inti Sawit.....	18
4. Tanaman Kencur.....	21
5. Performa Broiler	24
6. <i>Income Over Feed Cost</i>	31
C. Kajian Terdahulu.....	32
D. Kerangka Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Waktu dan Tempat.....	37
B. Materi Penelitian.....	37
C. Jenis Penelitian	37
D. Prosedur Penelitian.....	37
1. Rancangan penelitian.....	37
2. Tahap Persiapan.....	38
3. Tahap Pelaksanaan.....	41
E. Parameter yang Diukur.....	42
1. Pertambahan Bobot Badan.....	42
2. Konsumsi Ransum	42
3. Konversi Ransum.....	42
4. Persentase Karkas	43

5. <i>Income Over Feed Cost</i>	43
F. Analisis Data.....	43
G. Hipotesis	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Performa Broiler	45
1. Konsumsi Ransum	45
2. Pertambahan Bobot Badan.....	46
3. Konversi Ransum.....	47
4. Persentase Karkas	49
5. Persentase Dada	49
6. Persentase Paha.....	50
7. Persentase Sayap	51
8. Persentase Punggung	52
B. <i>Income Over Feed Cost Broiler</i>	53
C. Pembahasan Umum	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
1.	Kandungan Nutrisi Ransum Broiler.....	16
2.	Komposisi Zat Nutrisi Bungkil Inti Sawit (BIS)	19
3.	Kandungan Mikroorganisme yang Digunakan	20
4.	Komposisi Kimia Kencur Kering	23
5.	Konversi Ransum Broiler.....	27
6.	Berat Hidup Dan Pertambahan Bobot Badan Broiler	28
7.	Kandungan Nutrisi Bahan Pakan Penelitian	40
8.	Susunan Ransum Penelitian.....	40
9.	Kandungan Nutrisi Ransum Setiap Perlakuan	40
10.	Nilai Rataan Konsumsi Ransum, Pertambahan Bobot Badan dan Konversi Ransum.....	45
11.	Nilai Rataan Persentase Karkas, Persentase Dada, Persentase Paha, Persentase Sayap dan Persentase Punggung.	48
12.	Nilai Rataan <i>Income Over Feed Cost</i>	53

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	36



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : M.Irvan Alfawzi

NIM : 60700117048

Jurusan : Ilmu Peternakan

Judul : **Performa dan *Income Over Feed Cost* Broiler yang Diberikan Bungkil Inti Sawit (*Palm Kernel Meal*)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah maksimal penggunaan bungkil inti sawit untuk memperbaiki performa serta meningkatkan *income over feed cost* broiler. Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan setiap ulangan terdiri dari 2 ekor broiler, dengan perlakuan $R_0 = \text{Ransum Basal} + 0,16\% \text{ Tepung Kencur}$, $R_1 = \text{Ransum Basal} + 10\% \text{ BIS} + 0,16\% \text{ Tepung Kencur}$, $R_2 = \text{Ransum Basal} + 10\% \text{ BISF} + 0,16\% \text{ Tepung Kencur}$, $R_3 = \text{Ransum Basal} + 15\% \text{ BISF} + 0,16\% \text{ Tepung Kencur}$ dan $R_4 = \text{Ransum Basal} + 20\% \text{ BISF} + 0,16\% \text{ Tepung Kencur}$. Berdasarkan analisis data menunjukkan berbeda nyata ($P < 0,05$) terhadap *income over feed cost* dan persentase paha, sedangkan pada konsumsi ransum, penambahan bobot badan, konversi ransum, persentase karkas, persentase dada, persentase sayap dan persentase punggung menunjukkan tidak berbeda nyata ($P > 0,05$). Pada penelitian ini perlakuan R_2 (ransum basal + 10% BISF + 0,16% tepung kencur) merupakan perlakuan yang paling baik diantara perlakuan R_1 , R_3 dan R_4 serta dapat meningkatkan performa dan *income over feed cost* broiler.

Kata kunci : *Broiler, Bungkil Inti Sawit, Income Over Feed Cost, Performa.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Name : M.Irvan Alfawzi
NIM : 60700117048
Departement : Animal Science
Title : **Performance and Income Over Feed Cost of Broiler Given Palm Kernel Meal**

The focus of this research is to find the best way to use palm kernel meal to improve broiler performance and income over feed costs. A completely randomized design (CRD) was utilized in the research, which included five treatments and four replications, each with two DOC, with the help of treatment R_0 = basal feed + 0.16% kencur flour, R_1 = basal feed + 10% BIS + 0.16% kencur flour, R_2 = basal feed + 10% BISF + 0.16% kencur flour, R_3 = basal feed + 15% BISF + 0.16% kencur flour and R_4 = Basal Feed + 20% BISF + 0.16% kencur flour. Based on the analysis, income over feed cost and thigh percentage showed significantly different results ($P < 0.05$), whereas ration consumption, body weight gain, ration conversion, carcass percentage, chest percentage, wing percentage and back percentage showed no significant differences ($P > 0.05$). The R_2 treatment (basal feed + 10% BISF + 0.16 % kencur flour) it's the best treatment among the R_1 , R_3 and R_4 treatments and could improve broiler performance and income over feed costs.

Keywords : *Broiler, Palm Kernel Meal, Income Over Feed Cost, Performance.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan dalam menjalankan suatu usaha peternakan ditentukan atas tiga indikator penentu untuk meningkatkan produksi, antara lain yaitu ransum (*feed*), pemuliaan (*breed*) dan manajemen (*management*). Unsur ransum (*feeding*) di bidang peternakan perlu dikaji secara mendalam, karena seharusnya terkandung zat gizi yang diperlukan oleh ternak untuk kebutuhan hidup dan produksinya.

Ransum ialah suatu unsur yang berpengaruh terhadap penampilan fisik ternak dalam kaitannya dengan unsur genetiknya. Unsur ransum relatif praktis diatur daripada komponen lingkungan dalam hal menjamin produksi. Ransum ayam pedaging disediakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar serta untuk meningkatkan output, yang selama ini belum maksimal. Diperkirakan bahwa dengan memberikan ransum yang layak, tujuan peningkatan produksi ayam pedaging dapat terpenuhi secara maksimal dari potensi genetiknya.

Hingga sekarang, sekitar 80% dari unsur dasar ransum ayam yakni bahan baku impor termasuk jagung, bungkil kedelai dan tepung ikan, sehingga biayanya sangat tinggi. Akibat situasi ini, biaya pakan ayam diperkirakan antara 60-70 persen dari modal produksi. Dimaksudkan agar upaya mengidentifikasi pakan alternatif dalam ransum ayam dapat dilakukan untuk meminimalkan biaya pakan unggas. Bungkil inti sawit (BIS) yang merupakan limbah dari pengolahan kelapa sawit yang masih bermanfaat bagi ternak.

Proses pemerasan minyak inti sawit membuat kualitas produk menurun, disebabkan oleh rusaknya zat-zat pakan yang disebabkan oleh reaksi maillard. Oleh karenanya, bungkil inti sawit dapat dipadukan bersama enzim yang mampu mendorong peningkatan kualitas pakan. Enzim yaitu kumpulan polipeptida (protein) yang memiliki fungsi sebagai katalis (senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi) dalam proses reaksi kimia. Kumpulan bakteri atau jamur umumnya ialah penghasil enzim. Kegunaan enzim dari proses pembuatan produk dapat membuat efisiensi meningkat, menghasilkan peningkatan output.

Sebuah efisiensi biologis dan ekonomi dari ransum unggas harus diperhitungkan. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran sering dikenal dengan *income over feed cost*, digunakan untuk mengukur efisiensi ekonomi. Sedangkan efisiensi biologis dapat ditentukan berdasarkan kemampuan ternak dalam mengubah pakan menjadi hasil produksi yang maksimal (daging, susu dan telur), tanpa harus mempengaruhi performa ternak tersebut. Untuk broiler performa yang dimaksud berupa konsumsi ransum, konversi ransum, penambahan bobot badan serta persentase karkas.

Selain susunan ransum yang komplit, broiler juga dapat diberikan pakan tambahan (*feed additive*). Pakan tambahan (*feed additive*) digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan imunitas broiler, sehingga kualitas produksi mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satu alternatif *feed additive*, yaitu menggunakan bahan-bahan herbal atau alami seperti tanaman kencur.

Kencur (*Kaempferia galanga* L.) ialah obat herbal ginseng yang dapat dengan mudah tumbuh subur di Indonesia. Kencur diketahui memiliki keunggulan sebagai antiseptik dan antibakteri. Kencur memiliki khasiat sebagai penyebab kehangatan, penghilang rasa tidak nyaman dan juga penambah nafsu makan. Dari beberapa manfaat yang dimiliki oleh tanaman kencur tersebut dapat meningkatkan konsumsi dalam ransum serta sebagai antibiotik alami, yang kemudian akan berpengaruh terhadap produktivitas broiler. Beberapa manfaat tanaman kencur tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas daging broiler sehingga menjadi halalan thayyiban bagi yang mengkonsumsinya.

Allah swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Kementerian Agama RI, 2019).

Berdasarkan gambaran tersebut, maka penelitian ini dilakukan agar mengetahui bagaimana performa dan *income over feed cost* broiler yang diberikan bungkil inti sawit (*palm kernel meal*).

B. Rumusan Masalah

Kandungan yang dimiliki oleh bungkil inti sawit (BIS) sangat banyak manfaatnya. Diantaranya terdiri dari protein dan energi yang besar untuk perkembangan unggas, khususnya broiler. Tetapi dari manfaat yang terkandung

dalam bungkil inti sawit (BIS), terdapat pula serat kasar serta kandungan β -mannan yang tinggi. Ternak unggas merupakan ternak monogastrik yang hanya dapat mencerna serat kasar dalam dosis sedikit, sedangkan dari kandungan β -mannan ialah polimer manosa yang sulit diproses oleh ternak monogastrik karena enzim pencerna β -mannan tidak dimiliki oleh saluran pencernaan unggas. Dengan beberapa permasalahan di atas, maka perlu dilakukan fermentasi bungkil inti sawit (BIS) dengan bantuan enzim yang diisolasi dari bakteri. Oleh karena itu, berikut adalah rumusan masalah pada penelitian:

1. Apakah bungkil inti sawit (BIS) dapat memperbaiki performa broiler?
2. Berapa jumlah optimal penggunaan bungkil inti sawit (BIS) untuk meningkatkan performa broiler ?
3. Apakah dengan penggunaan bungkil inti sawit (BIS) dapat meningkatkan *income over feed cost* broiler ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh bungkil inti sawit (BIS) terhadap performa broiler.
2. Mengetahui jumlah optimal penggunaan bungkil inti sawit (BIS) untuk meningkatkan performa broiler.
3. Mengetahui bahwa bungkil inti sawit (BIS) dapat meningkatkan *income over feed cost* broiler.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai informasi akademik terkait performa dan *income over feed cost* broiler yang diberikan bungkil inti sawit (BIS).
2. Sebagai informasi bagi para peternak untuk membantu mereka mengetahui bagaimana memperbaiki performa dan *Income over feed cost* broiler dengan penggunaan bungkil inti sawit (BIS) sebagai bahan pakan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Integrasi

Allah swt. menciptakan hewan di muka bumi dengan berbagai jenis dan manfaat yang dapat kita ambil. Salah satu makhluk yang memiliki banyak hal baik bagi kehidupan manusia adalah hewan ternak. Ternak adalah hewan yang dibudidayakan serta hidupnya diatur serta diawasi manusia dan dipelihara khusus untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia yaitu sebagai bahan pangan dan juga dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Allah swt. berfirman dalam surah QS Al-An'am/6:38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَقْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan” (Kementerian Agama RI, 2019).

Tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat tersebut sebagai bukti paling kuat dari kekuatan, kelihain dan kebaikan Allah yaitu bahwa Dia ciptakan segala sesuatunya. Tidak ada makhluk yang merayap di bumi maupun burung yang terbang di langit kecuali jika Allah menciptakan berumpun-rumpun sepertimu. Kemudian, pada saat itu Dia memberikan sifat-sifat yang unik dan cara hidupnya yang khas. Sekalipun mereka tidak menerimanya, tidak ada yang luput dari catatan manusia dalam kitab yang Kami lestarikan (Al-lawh, Al-mahfûzh). Umat akan

dikumpulkan bersama negara-negara lain pada Hari Penghakiman untuk diadili. Makhluk hidup dikumpulkan ke dalam keluarga, masing-masing dengan silsilah, tanggung jawab dan kepribadiannya sendiri. Ada indikator perbedaan struktural dan gaya hidup antara makhluk hidup ini dalam ayat di atas, suatu tatanan yang berlaku untuk manusia dan makhluk hidup lainnya (Shihab, 2007).

Berbagai jenis tumbuhan umumnya bermanfaat bagi masyarakat sekitar, contohnya yakni komponen obat-obatan. Sesuatu yang dibuat oleh Allah swt. mempunyai manfaat hingga tersebar di muka bumi. Antara lain, kapasitasnya yakni dalam hal medis.

Allah swt. berfirman dalam surah QS Yunus/10:24

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهِمْ أَمْرًا يُبَدِّلُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْرَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

“Perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknnya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berpikir” (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini menjelaskan gagasan tentang kehidupan bersama dan ilustrasi yang sesuai dengan kematian mereka misalnya hilangnya harapan muncul dari dalam diri seseorang. Sifat dunia seperti ini diserupakan dengan air hujan yang diturunkan Allah dari langit. Gagasan tentang dunia ini dibandingkan dengan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Dengan air itu berkembang berbagai jenis tanaman dan rempah-rempah yang berbeda rasanya, yang menjadi makanan bagi manusia dan ternak. Kemudian, pada saat itu, lapisan luar bumi ditutupi oleh pemandangan indah pohon-pohon hijau, yang dilengkapi dengan bunga-bunga cerah dan buah-buahan yang beraneka warna. Di tengah harapan seperti itu, datanglah bencana yang memusnahkan tanaman dan pepohonan, sehingga bumi yang diramaikan pepohonan rindang, entah dari mana menjadi rata dan seolah-olah tidak pernah ditumbuhi apapun (Kementerian Agama RI, 2019).

Allah swt. berfirman dalam surah QS Thaahaa/20:53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

“(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan” (Kementerian Agama RI, 2019).

Menurut Shihab (2018) dalam tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan nikmat hidup dan perhatian kepada hamba-hamba-Nya. Dengan kekuatan-Nya, Dia telah membuat bumi menjadi bentangan bagi anda, membuka jalan untuk anda lalui dan menurunkan hujan ke bumi sehingga terciptalah sungai-

sungai. Dengan air itu Allah menumbuhkan tanaman dengan berbagai corak, rasa dan manfaat. Ada yang putih dan gelap, ada yang manis dan pahit.

Allah swt. berfirman dalam surah QS Al-Furqaan/25:2

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

Terjemahnya:

“Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan (Nya), dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya” (Kementerian Agama RI, 2019).

Pada ayat ini Allah menyatakan diri-Nya yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad yang disebut "hamba-Nya" untuk menjadi pemberitahuan kepada alam semesta (manusia dan jin). Dengan pujian terhadap diri-Nya sejak diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, cenderung dirasakan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang penting dan sangat dijunjung tinggi dalam memandang Allah, mengingat Al-Qur'an adalah petunjuk dan pedoman hidup bagi makhluk-Nya yang dimuliakan-Nya khususnya manusia, sedangkan manifestasi yang berbeda baik di langit maupun di bumi adalah untuk membantu manusia itu sendiri. Pada ayat ini Allah tidak mengacu pada Al-Qur'an melainkan Al-Furqan dengan alasan bahwa Al-Qur'an adalah kualifikasi antara yang baik dan yang buruk antara petunjuk dan kesesatan (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat di atas memberi gambaran bahwa Allah swt. telah memberi begitu banyak nikmat salah satunya berasal dari tanaman yang beraneka ragam bentuk, rasa dan warnanya. Dari tumbuhan tersebut terdapat pula banyak manfaat bagi

mahluk hidup lain baik itu manusia maupun hewan. Tumbuhan tersebut dapat dijadikan makanan pokok bagi hewan ternak, juga dapat dimanfaatkan sebagai makanan tambahan atau suplemen maupun sebagai obat bagi hewan ternak tersebut. Untuk meningkatkan kualitas tumbuhan menjadi pakan ternak yaitu melalui proses fermentasi. Fermentasi ialah perubahan kimiawi dari senyawa organik baik melalui aerob atau anaerob dengan katalis yang dibuat oleh organisme. Mikroba merupakan komponen utama dalam pelaksanaan fermentasi pakan, yang merupakan mahluk hidup kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang (mikroskopis). Salah satu mikroba yang digunakan dalam proses fermentasi yaitu bakteri, yang dapat mengurai kandungan nutrisi tanaman menjadi pakan ternak yang berkualitas.

B. Tinjauan Teoritis

1. Broiler

Broiler merupakan ayam ras tipe pedaging yang dikembangkan khusus sebagai sumber untuk melengkapi kebutuhan protein hewani, karena memiliki perkembangan yang cepat sehingga dengan waktu pemeliharaan yang singkat dapat menghasilkan berat badan yang tinggi. Keunggulan yang dimiliki broiler ini merupakan potensi genetik yang terus dikembangkan hingga mencapai puncak produksi karena hingga saat ini broiler masih memiliki beberapa kekurangan antara lain faktor kepekaan yang tinggi dari pengaruh lingkungan dan perlindungan tubuh yang rendah dari serangan berbagai penyakit mulai dari organisme mikroskopis patogen, infeksi virus dan parasit (Saputra dkk., 2013).

Menurut Taufiqurrohman (2017), taksonomi dari broiler adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Sub-Phylum : Vertebrata
Class : Aves
Ordo : Galliformes
Genus : *Gallus*
Spesies : *Gallus domesticus*

Budidaya broiler terus berkembang sejalan dengan meningkatnya pengetahuan mengenai pemeliharaan yang meliputi *breeding*, *feeding* dan manajemen. Unggas jenis broiler memiliki daging yang digemari masyarakat pada umumnya terdapat manfaat, diantaranya terdapat nutrisi berupa tingginya nilai protein yaitu 23,20%, nilai ini relatif tinggi daripada ternak lain (Andriyanto dkk., 2015).

Broiler mempunyai banyak kelebihan diantaranya memiliki daging yang lembut, ukuran tubuh yang besar, bentuk dada yang lebar dan tebal, kemampuan makan yang tinggi, dan penambahan berat badan yang cepat. Namun, pemeliharaan broiler harus ditingkatkan untuk memberikan manfaat yang tinggi agar menghasilkan produktivitas yang tinggi (Sari dkk., 2014). Faktor utama yang dianggap dapat mencapai pertumbuhan berat badan broiler yang optimal yakni tingginya suhu lingkungan dan kelembaban, yang membuat cekaman panas pada ayam. Umumnya, ayam berproduksi dimana membuatnya nyaman, jika lingkungannya dibawah atau diatas kenyamanannya maka ayam akan secara efektif menghadapi tekanan panas (Massolo, 2016).

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, genetik broiler menjadi cepat sehingga broiler dapat dipotong bukan lagi usia 35 hari melainkan dengan usia 29 hari. Ayam pedaging tumbuh cepat yang disertai dengan turunnya sistem imun tubuh sehingga butuh pakan tambahan ke dalam ransum untuk merangsang pertumbuhan berat badan dan ketahanan tubuh (Kiramang dan Jufri, 2013). Broiler dipanen pada usia 21-39 hari yang menghasilkan bobot badan antara 1-2,2 kg, untuk broiler dengan strain *Cobb*. Sedangkan bobot tubuh akhir broiler dengan strain *New Lohman MB* pada usia 30 hari yaitu mencapai 1,4 kg, lalu diusia 35 hari mencapai 1,8 kg (Massolo, 2016).

Waktu pemeliharaan ayam pedaging yang singkat yaitu satu bulan setengah dengan berat tubuh 1,5-1,56 kg/ekor serta dapat mengefisiensi lahan, sehingga lahan yang terjangkau dapat dimanfaatkan secara efektif. Masa produksi yang singkat ini dapat menarik minat peternak lain karena perputaran modal yang relatif cepat. Modal awal akan cepat kembali, sehingga keuntungan langsung didapat. Situasi ini mempengaruhi minat peternak lain untuk masih membudidayakan ayam pedaging (Yemima, 2014). Upaya yang dilakukan secara tertutup dan sistematis, maka populasi ternak serta hasil produksi dapat meningkat (Dahlan dan Hudi, 2011).

Pembudidayaan broiler akan efektif jika terpenuhi komponen ini, diantaranya pengadaan bibit, pakan, tatalaksana pemeliharaan, pencegahan penyakit dan pemasaran. Budidaya broiler memiliki dua tahap pemeliharaan, yakni masa pemeliharaan awal (*starter*), sejak anak ayam hingga berusia satu bulan dan masa pemeliharaan akhir (*finisher*), sejak usia satu bulan hingga ayam siap dipanen. Pemeliharaan ayam pedaging penting untuk dipertimbangkan, termasuk pakan dan

kandang, karena pakan adalah bagian yang paling mahal dari proses produksi dan diperlukan untuk pengembangan ayam pedaging. Dari anak ayam umur sehari (DOC) sampai panen, kandang diperlukan sebagai tempat tinggal (Tombuku dkk., 2014). Pada suhu 18-21°C, ayam pedaging akan berproduksi secara optimal. Pada tahap awal diperlukan suhu 29- 35°C, lalu periode akhir diperlukan suhu 20°C. Suhu pada kandang merupakan kombinasi dari panas matahari dan kehangatan yang dihasilkan oleh tubuh ayam itu sendiri. (Wijayanti dkk., 2011).

2. Pakan

Pakan ialah salah satu komponen yang terpenting yang harus dipenuhi dalam peternakan khususnya perunggasan. Pakan adalah sekumpulan bahan baku yang layak untuk dikonsumsi oleh ternak ayam dan telah tersusun atas dasar kebutuhan tertentu. Aturan itu, antaranya nilai kebutuhan dan kandungan nutrisi bagi ayam dari komponen pakan tersebut. Pemberian pakan untuk ayam pedaging dapat diberikan secara terus menerus, yakni dua kali sehari yaitu pagi dan sore hari, kemudian pakan yang tersisa ditimbang kembali setiap minggu (Kiramang dan Jufri, 2013).

Pakan ternak merupakan elemen paling penting dalam menentukan profitabilitas usaha peternakan, karena mencakup 60-70 persen dari total pengeluaran produksi. Masyarakat seharusnya memanfaatkan ketersediaan komponen pakan saat ini tanpa mengorbankan kualitas bahan pakan untuk menekan modal produksi dengan mengadopsi pakan unggas yang secara efektif. Pemilihan komponen pakan sebagai kombinasi atau sebagai tambahan dalam pakan sangat berpengaruh terhadap produktivitas ayam pedaging yang dihasilkan (Widodo dkk., 2010).

Pakan terdiri dari berbagai bahan alami maupun kimia yang diberikan untuk ternak, agar terpenuhi kebutuhan nutrisinya untuk dikonversi sebagai pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi. Kualitas pakan yang baik meliputi nutrisi seperti karbohidrat, lipid, protein, vitamin, mineral dan air yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok umur ternak tertentu serta dapat diserap pada sistem pencernaan. Kualitas pakan yang tinggi hampir pasti akan menghasilkan output yang tinggi (Dewi dkk., 2013).

Campuran zat gizi pakan terutama protein mempengaruhi perkembangan serta pembentukan tulang, sedangkan kandungan energi sangat penting agar aktivitas ayam pedaging dapat bertahan. Komponen utama organ tubuh dan jaringan lunak unggas adalah protein. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan, pengelolaan serta bagian enzim pada tubuh. Semua enzim dalam tubuh membutuhkan protein untuk perkembangan, kontrol dan transit. Protein nabati dan hewani merupakan sumber protein yang paling umum dalam pakan. Protein hewani lebih disukai daripada protein nabati dikarenakan kandungan asam amino yang lebih penting, diantaranya lisin dan metionin, dalam bentuk yang lebih seimbang. Karena saling melengkapi antara kekurangan tersebut, diharapkan keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan dapat dipenuhi dengan menggabungkan sumber protein asal nabati dan hewani (Tampubolon dan Bintang, 2012).

Selain jenis kelamin, genetik, usia dan lingkungan, banyak elemen yang dapat mengubah kebutuhan nutrisi ternak harus diperhitungkan saat memformulasi pakan ternak. Karena defisit energi yang mengubah protein menjadi energi, kadar protein

pada pakan seharusnya seimbang bersama energi guna tercukupinya kebutuhan protein minimum (Samadi, 2012).

Menurut Tampubolon dan Bintang (2012), produksi daging, yang merupakan hasil utama budidaya ayam pedaging, didasarkan pada pertumbuhan. Ayam pedaging memiliki kebutuhan yang berbeda berdasarkan tahap perkembangannya. Kandungan energi akan menghasilkan output yang optimal, bersamaan dengan kandungan protein, berdasarkan kebutuhan nutrisi ayam pedaging fase *finisher*. Kandungan protein harus sesuai kebutuhan protein dari pakan yang dikonsumsi. Jumlah pakan yang dikonsumsi berdampak pada asupan protein. Komposisi energi pakan memiliki dampak pada konsumsinya. Ayam pedaging masa akhir dibutuhkan di banyak lokasi di Indonesia dengan kandungan energi metabolik 3000 Kkal/kg dan kandungan protein 22%.

Unggas harus diberi pakan berdasarkan keperluan, nutrisi dengan anjuran tertentu, tidak tengik dan berjamur, tidak tercemar oleh benda asing yang tidak dimanfaatkan oleh unggas. Pakan yang baik yaitu memiliki nilai gizi sesuai kebutuhan unggas berdasarkan jenis dan benih, usia, berat tubuh, gender dan tahap produksi. Pakan yang baik berasal dari campuran komponen pakan yang baik, bersih, tidak berjamur dan basi, relatif murah dan disukai oleh ternak. Peningkatan efisiensi pencernaan komponen pakan dan nutrisi dalam tubuh ternak akan memperoleh hasil yang maksimal (Ketaren, 2010).

Kebutuhan hidup dan produksi yang mendasar, ayam membutuhkan berbagai bahan makanan, termasuk protein yang terdiri dari kualitas dan keseimbangan asam amino, energi yang berasal dari karbohidrat, lipid, vitamin dan mineral. Kandungan energi ransum mempengaruhi konsumsi di daerah tropis. Kandungan ransum yang

rendah mendorong ayam agar mengkonsumsi ransum lebih banyak agar terpenuhi kebutuhan energi hariannya, meskipun hal ini memiliki batasan terkait organ pencernaannya (tembolok). Akibatnya, ketika penurunan energi ransum, kekurangan energi pasti terjadi. Pakan yang kaya energi, di sisi lain membuat unggas memakan ransum relatif banyak, sehingga energinya tercukupi tetapi mengalami deficit protein. Karena ransum memiliki tingkat energi yang rendah, unggas akan mengkonsumsi lebih banyak ransum untuk memenuhi kebutuhan energi hariannya, sedangkan unggas akan membutuhkan lebih sedikit pakan yang berenergi tinggi (Siregar, 2010).

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Ransum Broiler

No	Kandungan Nutrisi	Ransum	
		Awal	Akhir
1	Energi metabolis (Kkal/kg)	3000	3100
2	Protein kasar (%)	20	19
3	Kalsium (%)	0,80-1.10	0,80-1.10
4	Lisin (%)	1,20	1,05
5	Metionin (%)	0,45	0,40
6	Treonin (%)	0,75	0,65
7	Triptofan (%)	0,19	0,18
8	Lemak kasar (%)	5	5
9	Serat kasar (%)	5	6
10	Abu (%)	8	8
11	Phospor (%)	0,50	0,45

Sumber : Standar Nasional Indonesia (SNI) (2015).

Jagung, dedak, bungkil kedelai, tepung daging dan tulang, tepung ikan, tepung gluten jagung, produk sampingan bioetanol atau digester, biji-bijian kering dengan pelarut, tepung kapur, minyak sawit mentah, bungkil kelapa, asam amino DL-*methionine*, asam amino L-*lysine*, vitamin mix, mineral mikro mix, kalsium fosfat, garam dan pakan pelengkap merupakan komponen pakan yang biasa terdapat dalam campuran ransum unggas komersil di Indonesia. Jagung, tepung ikan, kalsium fosfat dan asam amino masih impor di antara bahan tersebut. Impor bungkil kedelai, tepung

daging dan tulang, bungkil gluten jagung dan produk samping bioetanol terus berlanjut (Sinurat, 2012).

Pada tahun 2007, Indonesia impor 480.000 ton jagung, 1.880.000 ton bungkil kedelai, 280.000 ton tepung daging-tulang dan 10.000 ton tepung ikan (Ditjennak, 2009). Selain jagung, angka unsur pakan lain yang diimpor selalu tinggi. Kemampuan industri peternakan nasional untuk swasembada akan terhambat ketergantungannya pada bahan pakan impor sehingga mengancam ketahanan pangan. Sektor perunggasan dalam negeri dapat terganggu oleh faktor politik, tingginya nilai tukar mata uang, wabah suatu penyakit dan bencana alam di negara asal impor. Cara agar ketergantungan bahan pakan impor harus terus dilakukan (Sinurat, 2012).

Pilihan agar kecenderungan impor bahan pakan dapat berkurang yaitu memanfaatkan bahan pakan alternatif yang tersedia secara lokal, antara lain bungkil inti sawit, lumpur sawit (*Solid decanter* dan *Solid heavy phase (SHP)*), yang semuanya merupakan produk sampingan dari industri minyak sawit. Residu padat yang tersisa setelah pengepresan inti sawit untuk mengekstrak minyak inti sawit dikenal sebagai bungkil inti sawit. Lumpur sawit yaitu produk sampingan yang bersumber asal perasan daging buah sawit untuk mengekstrak minyak sawit mentah (CPO) yang dihasilkan dengan cara sentrifugasi limbah cair dengan decanter. Setelah ekstraksi lumpur sawit, terbentuk fase berat padat dari limbah cair. Meski tidak umum, ketiga bahan ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pakan ayam (Sinurat, 2012).

3. Bungkil Inti Sawit

Bungkil inti sawit (BIS) merupakan hasil sampingan dari teknik kimia dan mekanik yang digunakan untuk mengekstrak inti sawit. Memiliki banyak potensi sebagai pakan ayam dengan biaya terjangkau, karena mudah diperoleh, jumlahnya melimpah serta ramah lingkungan (Wandira dkk., 2014). Menurut BPS (2012), Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia, mencapai 21.958.120 ton pada tahun 2010 dan 22.508,011 ton pada tahun 2011.

Bungkil inti sawit masih memiliki protein dan energi yang cukup agar mendukung perkembangan unggas. Tingginya jumlah β -mannan (40-50%) dalam komponen pakan, bungkil inti sawit memiliki daya cerna yang sangat rendah. Karena enzim pencernaan β -mannan tidak ada pada sistem pencernaan ternak monogastrik, β -mannan adalah *polymer mannose* tidak bisa dicerna unggas. Jumlah minyak yang tertinggal setelah mengompres minyak secara mekanis masih cukup besar (sekitar 9,6 persen). Karena laju oksidasi lipid yang cepat dalam bungkil inti sawit, maka segera menjadi tengik (Hatta dkk., 2010).

Perkembangan sektor kelapa sawit, maka tersedia banyak bungkil inti sawit di Indonesia. Luas lahan kelapa sawit diperkirakan sekitar 4,4 juta hektar pada tahun 2004 dan 5,2 juta hektar pada tahun 2006. Pangkal buah segar untuk kelapa sawit diproduksi dengan laju 12,5-27,5 ton per hektar, dengan bungkil inti sawit sekitar 2% dari total. Penggunaan BIS sebagai kemungkinan pakan pada ruminansia, unggas dan bahkan ikan telah banyak didokumentasikan. Protein yang rendah daripada bungkil lainnya, yang dimiliki bungkil inti sawit, masih layak untuk dimanfaatkan sebagai pakan

sumber protein. Disebabkan oleh kandungan asam amino relatif kompleks serta kalsium dan fosfornya yang seimbang (Tumanggor, 2010).

Adapun komposisi zat nutrisi bungkil inti sawit (BIS) dapat dilihat pada 2 :

Tabel 2. Komposisi Zat Nutrisi Bungkil Inti Sawit (BIS)

Protein Kasar (%)	18,15
Serat Kasar (%)	15,89
Bahan Kering (%)	91,08
Energi Metabolisme (Kkal/g)	4.8964

Sumber : Loka Penelitian Kambing Potong Sei Putih (2005).

Bungkil inti sawit bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak sumber energi atau protein. Tetapi, tingginya kandungan serat kasar (21,7%), diantaranya hemiselulosa (*mannan* dan *galaktomanan*) serta rendahnya pencernaan asam amino, penggunaannya dalam pakan ayam menjadi terbatas. Jumlah maksimum bungkil inti sawit yang bisa dimanfaatkan dalam kombinasi pakan unggas bervariasi, mulai dari 5-10% untuk ransum ayam pedaging hingga 20-25% untuk pakan ayam petelur (Noferdiman, 2011).

Bungkil inti sawit fermentasi *Trichoderma viride* bisa dimanfaatkan untuk mensubstitusi 50% jagung pada pakan ayam petelur. Dalam pakan ayam petelur, produk bungkil inti sawit yang difermentasi bisa menggantikan hingga 50% protein bungkil kedelai. Demikian pula, bungkil inti sawit yang difermentasi yang mengandung jamur busuk putih, juga dikenal sebagai *Phanerochaete chrysosporium*, bisa dimanfaatkan sampai 30% pada ransum ayam pedaging diluar perkembangan ayam. Produk bungkil inti sawit fermentasi yang mengandung *Aspergillus niger* bisa dipakai pada pakan ayam pedaging dan itik dengan laju masing-masing 5% dan 15% (Sinurat, 2012).

Adapun kandungan mikroorganisme pada penelitian ini yaitu:

Tabel 3. Kandungan Mikroorganisme yang Digunakan

Jumlah	Kandungan
<i>Lactobacillus</i> sp.	$2,5 \times 10^7$ cfu/mL
<i>Azotobacter</i> sp.	$1,31 \times 10^6$ cfu/mL
<i>Streptomyces</i> sp.	$2,42 \times 10^6$ cfu/mL
<i>Saccharomyces</i> sp.	$8,20 \times 10^7$ cfu/mL
<i>Aspergillus</i> sp.	$1,90 \times 10^5$ cfu/mL
<i>Trichoderma</i> sp.	$2,8 \times 10^5$ cfu/mL

Sumber: NASA, 2019.

Lactobacillus sp. adalah spesies bakteri asam laktat yang ditemukan dalam berbagai makanan fermentasi, terutama yang berfermentasi secara alami, seperti asam jawa, sawi, sauerkraut, dan tempoyak. Bakteri asam laktat, seperti *Lactobacillus* sp., terkenal aman dalam fermentasi makanan. Bakteri *Lactobacillus* bersifat gram positif, katalase negatif, tahan asam, nonspora, kandungan G+C rendah, berbentuk sel batang atau *Coccobacilli*, *tolerant aero* atau *anaerobic*, *fastidious* dan mampu membuat asam laktat dari substrat glukosa (Widowati dkk., 2014).

Bakteri asam laktat (khususnya *Lactobacillus* sp.) umumnya digunakan dalam teknik pengawetan makanan selain perannya dalam fermentasi makanan. Bakteri asam laktat memiliki kapasitas untuk mengawetkan makanan karena mereka menciptakan banyak metabolit yang menghambat perkembangan bakteri kontaminan. Asam organik, hidrogen peroksida, alkohol dan komponen antibakteri seperti bakteriosin termasuk di antara metabolit ini. Setiap komponen metabolit bekerja dengan cara yang unik untuk mencegah bakteri kontaminasi asam laktat tumbuh pada substrat glukosa (Widowati dkk., 2014).

Azotobacter sp. dikenal untuk memproduksi hormon pertumbuhan seperti IAA (*indole acetic acid*) dan polisakarida ekstraseluler sambil memperbaiki nitrogen secara non simbiotik. *Azotobacter* sp. merupakan bakteri yang membuat polisakarida ekstraseluler seperti alginat dan polimer (Widiastuti dkk., 2010). Alginat dari *Azotobacter* sp. melindungi nitrogenase yang kemudian akan meningkatkan fiksasi nitrogen. Logam diserap oleh polisakarida ekstraseluler dalam sel bakteri. Biosorpsi logam adalah polisakarida 15,5, 20 dan 25 mg/g atau 12,5; 6,5; dan 10 mg/g sel kering untuk Cu, Zn, dan Fe, masing-masing (Karina, 2012).

Bakteri pengikat N non-simbiosis digunakan lebih luas daripada bakteri simbiosis. *Azotobacter* adalah genus bakteri pengikat nitrogen aerobik non-simbiosis. Kontribusi N bagi tanaman merupakan penghubung antara pemfiksasi N non-simbiosis dengan tanaman. Karena dapat menghasilkan hormon seperti IAA, *Azotobacter* sp. memiliki keunggulan dibandingkan bakteri penambat N atmosfer non simbiosis lainnya (asam indol asetat). Bakteri melepaskan IAA, yang meningkatkan perkembangan akar baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mendorong pemanjangan atau pembelahan sel (Karina, 2012).

4. Tanaman Kencur

Kencur (*Kaempferia galanga* L.) adalah obat herbal Indonesia yang digunakan oleh suku *Zingiberales*. Kencur digunakan sebagai antiseptik dan antibakteri untuk mencegah pembentukan sel-sel hati berlemak, serta sebagai antioksidan untuk melindungi dari bahan kimia radikal bebas yang merusak. Kencur adalah tanaman herbal kecil dengan siklus hidup satu musim atau multi

musim. Kencur terbagi tiga bagian antaranya akar dan rimpang, batang dan daun, serta bunga dan buah (Aji, 2021).

Menurut Nurhayati (2008), taksonomi kencur (*Kaempferia galanga* L.) pada posisi tata nama tumbuhan (sistematis) yaitu:

Divisi : Spermatophyta
Subdivisi : Angiospermae
Kelas : Monocotyledonae
Ordo : Zingiberceae
Famili : Zingiberceae
Genus : *Kaempferia*
Spesies : *Kaempferia galanga* L.

Kencur mengandung khasiat perangsang nafsu makan. Minyak atsiri kencur terdiri dari berbagai senyawa seperti etil *p-metoksisinamat* (58,47 persen), isobutil-*2-furylacrylate* (30,90 persen) dan heksil format (4,78 persen), turunan monoterpen teroksigenasi (misalnya *berneol* 0,03 persen dan 0,83 persen *kamper*) dan monoterpen hidrokarbon (misalnya 0,04 persen *kamper* (Aji, 2021).

Minyak atsiri disebut sebagai minyak esensial. Penampilannya tidak berwarna, namun oksidasi menyebabkannya berubah menjadi coklat, mencegahnya disimpan dalam wadah yang dingin, kering, tertutup rapat dan berubah warna menjadi gelap. Minyak atsiri rimpang kencur memiliki bau aromatik yang menyengat yang bervariasi tergantung dari umur rimpangnya. Minyak atsiri dapat membantu enzim pencernaan bekerja lebih efisien, memungkinkan kecepatan pakan meningkat dan produksi daging juga meningkat. Minyak atsiri dan kurkumin mempengaruhi getah pankreas, terdiri dari

enzim amilase, lipase dan protease, ditandai meningkatnya kualitas bahan pakan dengan meningkatkan kerja organ pencernaan (Aji, 2021). Kencur juga mengandung saponin dan flavonoid yang dapat membantu kinerja garam empedu serta sebagai antibiotik (Listiyanti, 2013).

Peningkatan performa ayam, tepung kencur dicampurkan ke dalam pakan dengan konsentrasi 0,16 persen. Penemuan tersebut tidak berpengaruh pada asupan pakan ayam pedaging, peningkatan bobot badan, atau konversi. Pemberian tepung kencur menurunkan angka kematian hingga 2,67 persen (Rahayu dkk., 2015).

Tabel 4. Komposisi Kimia Kencur Kering

Kriteria	Jumlah
Air	10,00
Abu	7,61
Lemak	6,42
Karbohidrat	51,21
Serat kasar	6,25
Nitrogen	1,41
Minyak atsiri	1,93

Sumber : Balai Penelitian Ternak, Ciawi Bogor, 2006.

Kencur biasa digunakan dalam ramuan obat tradisional maupun untuk penyedap masakan. Kencur bekerja dengan baik sebagai sumber panas, pereda nyeri dan perangsang rasa lapar. Minyak atsiri ditemukan hampir di setiap bagian tanaman kencur, dengan kandungan etil-p-metoksi sinamat yang paling melimpah ($C_{12}H_{14}O_3$). Identitas utama rimpang kencur adalah komponen etil-p-metoksi sinamat ($C_{12}H_{14}O_3$) (Muhammad dan Natamijaya, 2017).

5. Performa Broiler

a. Konsumsi Pakan

Konsumsi ransum adalah proses penambahan berbagai nutrisi ke ransum yang terdiri dari banyak item pakan agar sesuai dengan kebutuhan nutrisi ayam. Beberapa faktor mempengaruhi konsumsi ransum, termasuk ukuran dan jenis ayam, suhu lingkungan, tahap pembuatan dan energi pada ransum. Bentuk, jumlah, lokasi dan teknik pengisian ransum yakni hal-hal yang bisa mempengaruhi seberapa banyak jumlahnya dikonsumsi. Silsilah ayam (strain) dan lingkungan mempengaruhi konsumsi. Kesukaan atas *feed additive* yang bisa meningkatkan *palatable* disebut dengan palatabilitas pakan. Karakteristik berupa rasa, bau dan warna komponen pakan, mempengaruhi hubungan antara pakan dan palatabilitas. Jumlah ransum yang dikonsumsi juga dipengaruhi oleh bentuk fisik pakan, ayam lebih suka remahan dan pelet. Nilai Konsumsi ditentukan oleh kandungan energi. Namun, kadar serat kasar pada pakan dapat pula berpengaruh atas tingkat konsumsinya (Nurulloh, 2019).

Ransum *starter* diberi pada ayam berusia tiga minggu dan ransum *finisher* diberi pada ayam berusia empat minggu ke atas hingga panen. Pakan yang dikonsumsi oleh ternak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisinya. Setiap ternak mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang berbeda-beda. Nilai konsumsi yang diambil ternak dan jika diberikan secara terus menerus dimanfaatkan untuk menentukan konsumsi. Nutrisi yang ditemukan di dalamnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia serta produksi ternak. Konsumsi dipengaruhi oleh ukuran dan jenis ayam, iklim daerah, tahap produksi

dan energi dalam pakan. Konsumsi dipengaruhi oleh bobot, jenis kelamin, aktivitas, suhu dan kualitas pakan ayam (Ginting, 2020).

Komposisi ransum yang dihabiskan seminggu meningkat sebanding bersama peningkatan berat tubuh. Ayam-ayam melahap lebih banyak ransum setiap minggunya daripada minggu sebelumnya. Tujuan pemberian adalah untuk menjamin penambahan berat badan dan hasil daging yang menguntungkan. Setiap minggu, ransum yang dikonsumsi dikurangi dengan jumlah ransum pemberian pada awal minggu dengan sisa ransum pada akhir minggu (Rasyaf, 2011).

Selama tahap pemeliharaan, ayam pedaging starter harus diberi pakan tinggi protein dan rendah energi. Sedangkan pada tahap finisher diberi pakan yang rendah protein dan kaya energi, karena ayam pedaging lebih suka menyimpan energi dalam bentuk lemak (Suhaeni, 2007). Saat cuaca panas, ayam berusaha untuk tetap dingin dengan bernapas cepat (penting). Perilaku ini dapat mengakibatkan peningkatan aliran darah ke organ pernapasan sekaligus penurunan aliran darah menuju organ pencernaan, pencernaan dan metabolisme terganggu. Banyak nutrisi dalam pakan dibuang dalam bentuk feses karena pakan tidak dapat dicerna dengan baik (Ginting, 2020).

b. Konversi Pakan

Rasio konversi pakan ialah proporsi ransum yang dikonsumsi terhadap pertumbuhan berat tubuh. Jika perbandingan ayam dipanen dalam proporsi besar, waktu pemeliharaan yang singkat membuat konversi pakan lebih besar. Rendahnya konversi ransum, jumlah ransum yang dibutuhkan untuk membuat

satu kilogram daging makin berkurang. Semakin besar konversi ransum maka semakin banyak ransum yang terbuang (Woro dkk., 2019).

Konversi ransum digunakan sebagai ukuran untuk menganalisis efektivitas penjatahan dan kualitas pada ransum. Tingkat konversi ialah rasio ransum yang tertelan terhadap total berat tubuh selama periode tertentu. Satu unit berat hidup atau ransum yang diperlukan guna memproduksi telur dikenal dengan konversi ransum. Untuk menambah berat tubuh per satuan berat, maka angka konversi ransum yang tinggi menunjukkan bahwa diperlukan ransum yang lebih banyak. Kualitas ransum yang baik ditunjukkan dengan nilai konversi yang lebih rendah. Saat pakan ayam pedaging dikumpulkan, nilai konversinya kini kurang dari dua (Amrullah, 2004).

Jika menggunakan ayam yang dipanen pada proporsi besar, waktu pemeliharaan yang lebih singkat akan membentuk konversi pakan lebih besar. Tingkat konversi ransum akan berubah dari periode awal ke periode akhir karena setelah berusia empat minggu perkembangan ayam melambat atau mulai menurun, sedangkan ransum terus meningkat. Genetika, jenis pakan, kualitas pakan, suhu, bahan standar pakan yang dipergunakan serta manajemen pakan adalah semua faktor yang mempengaruhi konversi pakan. Jika rasionya besar maka konversi pakannya buruk, tetapi jika rasionya kecil maka konversi pakannya sangat baik (Rasyaf, 2008).

Nilai konversi ransum yang layak artinya antara 1,75 hingga 2,00. Variabel stres, penyakit, kadar amonia, teknik dan saat pemberian pakan, air, suhu, cahaya, kebisingan, bentuk fisik dan variabel antinutrisi semuanya mempengaruhi nilai

konversi ransum. Kandungan nutrisi ransum dan tingkat energinya merupakan dua faktor yang mempengaruhi konversinya (Amrullah, 2004).

Tabel 5. Konversi Ransum Broiler

Usia (Minggu)	Konversi Ransum	
	Mingguan	Kumulatif
1	0,80	0,85
2	1,29	1,05
3	1,60	1,26
4	1,88	1,44
5	2,13	1,61

Sumber : Cobb Vantress Inc, 2010.

c. Pertambahan Bobot Badan

Bobot badan ayam akan naik sebagai akibat dari pemuaiian dan pembelahan sel. Peningkatan berat otot, berasal dari protein dan air, pertumbuhan tulang, meningkatnya jaringan lemak dan meningkatnya volume bulu, kulit dan organ dalam adalah empat komponen dasar. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan yaitu galur ayam, jenis kelamin dan keadaan daerah yang baik (ransum dan manajemen) (Ginting, 2020).

Variabel energi dan non-genetik seperti jumlah pakan yang dimakan, iklim, atmosfer di dalam kandang dan kesehatan ayam berdampak pada peningkatan berat badan. Penimbangan berat badan dilakukan seminggu sekali dan berat badan dibagi tujuh untuk mendapatkan pertumbuhan berat badan harian (Rasyaf, 2011). Jenis kelamin, konsumsi pakan, lingkungan, benih dan kualitas pakan, menurut Qurniawan (2016), merupakan semua elemen yang mempengaruhi peningkatan bobot badan. Menurut Uzer dkk., (2013), peningkatan bobot badan erat kaitannya dengan konsumsi pakan dari segi kuantitas dan jika konsumsi pakan terganggu maka pertumbuhan akan terhambat.

Peningkatan berat badan yang diperoleh ayam selama periode waktu disebut sebagai pertumbuhan berat badan. Pertambahan berat badan dicapai dengan menimbang ayam secara berkala, seperti sekali sehari, seminggu sekali, sebulan sekali atau setahun sekali. Tingkat kenaikan berat badan mingguan tidak konsisten. Pertumbuhan ayam pedaging tumbuh setiap minggu hingga mencapai maksimum, setelah itu turun (Woro dkk., 2019). Perubahan berat badan mengikuti kurva sigmoid, yang naik perlahan, lalu cepat, lalu perlahan lagi atau akhirnya berhenti. Ketika ayam mencapai setengah dari berat badan dewasanya, ayam akan mencapai pertumbuhan maksimum (gram berat badan setiap hari) (Ginting, 2020).

Tabel 6. Berat Hidup dan Pertambahan Bobot Badan Broiler

Usia (Minggu)	Berat Hidup (g)	Pertambahan Bobot Badan (g)
0	42	-
1	175,40	31,0
2	486,60	53,7
3	931,80	70,2
4	1.467,3	80,4
5	2.049,2	84,3

Sumber : Cobb Vantress Inc, 2010.

Faktor yang menjadi patokan standar produksi ialah peningkatan bobot badan (Achmanu dan Muharlien, 2011). Sintesis protein tubuh, yang berasal dari ransum protein yang dicerna, menyebabkan pertumbuhan berat badan. Protein sebagai pertumbuhan jaringan, protein sebagai kehidupan dasar serta protein sebagai pertumbuhan bulu merupakan tiga unsur kebutuhan protein harian untuk perkembangan ayam pedaging (Mahfudz dkk., 2010).

d. Persentase Karkas

Perut, kaki, leher, kepala, bulu dan darah diambil dari tubuh ayam pedaging setelah disembelih. karkas kosong atau unggas yang telah disembelih dan diambil darahnya, organ dalam, kepala dan kaki, dipisahkan dari tubuh yang utuh. Ayam yang sudah dipotong kemudian direduksi menjadi bulu, darah, kepala, leher, kaki dan organ dalam tidak termasuk jantung, hati dan ampela dikenal sebagai karkas isi. Persentase karkas adalah metrik umum untuk mengevaluasi output daging hewan. Pertumbuhan komponen karkas dimulai dari pembentukan tulang, kemudian pembentukan otot, yang melambat setelah pubertas dan akhirnya pembentukan lemak. Genetika, jenis kelamin, fisiologi, umur, bobot badan dan zat gizi pakan merupakan faktor-faktor mempengaruhi berat karkas broiler (Ikasari, 2017).

Dada, paha, punggung dan sayap merupakan empat bagian karkas ayam. Kulit, tulang, daging dan jaringan lemak membentuk karkas. Berat karkas dan bobot tubuh akhir terkait erat. Sebelum penyembelihan, genetika, spesies, bangsa, jenis ternak, jenis kelamin, umur dan pola makan semuanya berdampak pada kualitas karkas. Karkas (daging) merupakan tujuan utama peternakan ayam pedaging, sedangkan lemak karkas ialah produk samping maupun limbah di rumah potong ayam (RPA). Karkas adalah ayam yang telah dikeluarkan dari karkas isinya, meliputi kepala, cakar dan jeroan (hati, jantung, ginjal, ampela dan usus). Berat karkas yaitu representasi dari output daging ayam dan pengukurannya merupakan aspek penting dalam mengukur produktivitas ternak. Tingginya bobot karkas, semakin besar keuntungan peternak (Pradana dkk., 2015).

Proporsi karkas sebanding dengan jenis kelamin, umur serta berat tubuh. Peningkatan karkas sejalan bertambahnya usia dan berat tubuh ayam. Secara umum, peningkatan bobot badan pada ayam disertai dengan penurunan kandungan lemak perut, sehingga output daging meningkat. Bangsa, jenis kelamin, umur, berat badan, hormon dan pola makan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi karkas. Perubahan organ tubuh, khususnya peningkatan lemak karkas, mengubah bobot karkas seiring bertambahnya usia (Pradana dkk., 2015).

Karkas broiler terbagi menjadi karkas segar (diproses tidak lebih dari enam jam dan belum mengalami perlakuan lebih lanjut), karkas segar dingin (langsung didinginkan, lalu diproses hingga suhu daging mencapai $4-5^{\circ}\text{C}$) dan karkas beku (mengalami proses pembekuan cepat atau lambat dengan suhu penyimpanan antara -4°C hingga -4°C) (Ikasari, 2017).

Broiler juga dapat dibeli sebagai potongan komersial, paha 10%, sayap 15%, betis 17% dan dada 30% dari berat karkas. Berat dada dan punggung dipotong menjadi 2, menghasilkan sepuluh potong karkas komersial. Berat karkas bervariasi menurut usia, dengan bobot karkas rata-rata 1,995 g dan proporsi bagian karkas sebesar 4,3 persen lemak perut, 9,6 persen sayap, 13,0 persen betis, 16,6 persen paha, 34,2 persen dada bertulang dan dada tanpa tulang 22,6 persen pada delapan minggu (Pradana dkk., 2015).

Persentase karkas kecil pengaruhnya terhadap kualitas karkas, tetapi berpengaruh signifikan terhadap performans ternak sebelum dipotong. Konsumen akan menilai karkas berdasarkan performans ternak yang masih hidup. Proporsi pembelian karkas terlalu tinggi, misalnya hanya 1%, konformasi tubuh serta derajat obesitas merupakan

faktor yang mempengaruhi persentase karkas yang dibeli. ternak yang gemuk memiliki persentase karkas yang tinggi dan tebal (Pradana dkk., 2015).

6. *Income Over Feed Cost*

Keuntungan yang dihasilkan dari selisih dengan pendapatan penjualan per ekor ayam dan biaya rata-rata penggunaan ransum per ekor dikenal sebagai *income over feed cost* (IOFC). Total IOFC terdiri atas pendapatan dihitung hanya untuk biaya ransum tanpa membedakan sumber pendapatan lain, serta biaya yang dihitung semata-mata sebagai pendapatan dari penjualan. Rumus total pendapatan-pengeluaran pakan digunakan untuk menentukan IOFC. Pengeluaran pakan sekitar 60-70 persen dibutuhkan dalam industri peternakan unggas. Nilai yang tinggi ini memerlukan efisiensi pakan yang baik untuk mencapai pendapatan yang tinggi di atas biaya pakan (Indra, 2015).

Bobot badan akhir, konsumsi pakan, harga pakan dan harga jual ayam pedaging semuanya mempengaruhi nilai *income over feed cost* (IOFC). Perbedaan yang nyata atau sedikit antara penjualan ayam dengan total biaya ransum yang dikeluarkan selama pemeliharaan menyebabkan nilai IOFC (Anggitasari, 2016). Semakin baik perawatannya, semakin besar nilai IOFC, karena semakin tinggi IOFC, semakin besar keuntungannya. Jika nilai IOFC lebih turun, keuntungan akan berkurang (Muji, 2014).

Keuntungan yang didapat dari penjualan seekor ayam pada akhir penelitian dikurangi pengeluaran rata-rata seekor ayam saat percobaan digunakan untuk menghitung pendapatan atas biaya pakan. Hasil perhitungan pendapatan adalah (produksi ayam pedaging per kg dikalikan harga ayam pedaging per kg). Biaya

ransum ditentukan dengan mengalikan jumlah kalori yang dikonsumsi dengan jumlah kalori (konsumsi ransum dikalikan dengan harga ransum perlakuan). Hasil perhitungan pendapatan dikurangi biaya ransum adalah pendapatan atas biaya pakan (Surtina dan Sari, 2020).

C. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang meneliti terkait hal yang saya teliti yaitu sebagai berikut:

Noferdiman, (2011), pada penelitiannya tentang “Penggunaan Bungkil Inti Sawit Fermentasi oleh Jamur *Pleurotus ostreatus* dalam Ransum terhadap Performans Broiler”, berusaha untuk menyelidiki dampak bungkil inti sawit (BISF) dengan jamur *Pleurotus ostreatus* dalam pakan terhadap kinerja ayam pedaging. Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan lima ulangan digunakan dalam penelitian ini. P0: tidak ada BISF dalam ransum, P1: sepuluh persen BISF dalam ransum, P2: dua puluh persen BISF dalam ransum dan P3: tiga puluh persen BISF dalam ransum adalah perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini. Konsumsi ransum, penambahan bobot badan, konversi ransum, bobot potong, bobot karkas relatif dan bobot lemak perut relatif merupakan karakteristik yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan ($P < 0,01$) dalam asupan ransum, peningkatan bobot badan, bobot potong, bobot karkas relatif dan bobot lemak perut relatif ketika BISF dimasukkan dalam pakan komersial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bungkil inti sawit fermentasi (BISF) dapat digunakan hingga 20% dari waktu dalam ransum tanpa mempengaruhi kinerja ayam pedaging.

Ikhwan dkk., (2016), pada penelitiannya tentang “Penurunan Kadar Amonia Feses Ayam Pedaging Menggunakan Probiotik Bungkil Inti Sawit dengan Inokulum Bakteri *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus bulgaricus* dan *Bacillus cereus*”. Karena kandang terletak di dekat daerah pemukiman, emisi amonia dari kotoran di kandang ayam pedaging menimbulkan kekhawatiran dan menjadi sumber masalah pernapasan bagi orang-orang di sekitarnya. Isolat bakteri penghasil asam yang dikombinasikan dengan prebiotik dari bungkil inti sawit (BIS) dapat digunakan sebagai agen bioremediasi pada feses ayam untuk meminimalkan emisi amonia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk bioteknologi yang dapat digunakan untuk meminimalkan emisi amonia di peternakan ayam pedaging. Tiga isolat bakteri, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus bulgaricus* dan *Bacillus cereus*, digunakan untuk memfermentasi BIS selama 48 jam pada suhu 38°C sebagai terapi. Setelah itu, produk fermentasi disuntikkan ke dalam feses pada konsentrasi 8 persen (b/b) dan diinkubasi selama 48 jam. Jumlah ammonia, pH dan mikroba dalam tinja diukur setelah 24 dan 48 jam inkubasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan kadar amoniak dan perubahan pH yang signifikan antara kontrol dan semua perlakuan, tetapi tidak ada perbedaan yang nyata antara perlakuan isolat bakteri. *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus bulgaricus*, dan *Bacillus cereus* mengurangi kadar amonia masing-masing sebesar 92,89 persen, 98,78 persen dan 98,56 persen, setelah masa inkubasi 24 jam, dan 90,67 persen, 89,60 persen dan 96,80 persen setelah inkubasi 48 jam.


Sinurat, (2012), pada penelitiannya tentang “Teknologi Pemanfaatan Hasil Sampingan Industri Sawit Untuk Meningkatkan Ketersediaan Bahan Pakan Unggas Nasional”. Dalam bisnis perunggasan, pakan merupakan komponen produksi yang paling mahal. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas sektor ini. Salah satunya adalah pemanfaatan komponen pakan standar seperti bungkil inti sawit, lumpur sawit (*solid decanter*) dan fase berat padat dari industri minyak sawit (SHP). Dua juta ton bungkil inti sawit, dua juta ton lumpur kelapa sawit kering dan empat juta ton SHP kering diproduksi di Indonesia pada tahun 2007. Proses biofermentasi dan enzimatik adalah dua teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan kandungan nutrisi dan membatasi penggunaan produk sampingan dari industri kelapa sawit. Biofermentasi *Aspergillus niger*. Fermentasi *Aspergillus niger* dapat meningkatkan kandungan protein dan metabolisme energi sekaligus menurunkan kadar serat kasar. Ransum ayam pedaging, ayam petelur, ayam kampung dan itik semuanya telah dicoba dengan produk fermentasi. Teknologi enzimatik dapat membuat SHP dan bungkil inti sawit lebih mudah dicerna, sehingga dapat dimanfaatkan dalam jumlah yang lebih besar. Teknologi ini harus dikembangkan untuk meningkatkan ketersediaan komponen pakan ayam di dalam negeri dan meminimalkan kebutuhan bahan pakan impor. Untuk menerapkan teknologi yang telah dikembangkan, lembaga penelitian dan industri harus bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang konsisten. Dengan meningkatkan kualitas produk sampingan sektor kelapa sawit, pemerintah dapat mendorong pelaku usaha kelapa sawit untuk berperan dalam memproduksi bahan pakan.

D. Kerangka Penelitian

Ayam pedaging merupakan jenis ayam pedaging yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan protein hewani karena perkembangannya yang pesat dan mampu menghasilkan bobot badan yang tinggi dengan masa panen yang singkat. Pakan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam setiap perusahaan, khususnya perunggasan. Karena pakan menyumbang 60-70 persen dari biaya produksi, ini adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan profitabilitas operasi peternakan. Peternak harus dapat memanfaatkan ketersediaan komponen pakan yang ada saat ini tanpa mengorbankan kualitas bahan pakan tersebut guna menekan biaya produksi.

Bungkil inti sawit dapat digunakan sebagai sumber energi atau protein dalam pakan ternak. Penggunaannya dalam pakan ayam terbatas, namun karena kandungan serat kasarnya yang tinggi (21,7%), yang meliputi hemiselulosa, serta kandungan asam amino dan kecernaannya yang buruk. Jumlah maksimum bungkil inti sawit yang dapat digunakan dalam kombinasi pakan unggas bervariasi, mulai dari 5-10% untuk ransum ayam pedaging hingga 20-25% untuk pakan ayam petelur. Dengan batasan tersebut maka dilakukan proses fermentasi bungkil inti sawit guna meningkatkan kandungan nutrisi dan mengurangi kandungan serat kasar dalam bahan pakan tersebut, sehingga jumlah penggunaannya dapat ditingkatkan. Bungkil inti sawit yang difermentasi ini juga diprediksi dapat menggantikan dedak padi yang mahal dalam ransum, sehingga menurunkan biaya pakan.

Penggunaan kencur yang merupakan tanaman jenis ginseng, diharapkan dapat menambah nafsu makan broiler terhadap ransum yang menggunakan bungkil inti sawit, sehingga performa broiler tersebut meningkat dan dapat mengefisiensi biaya pakan. Kerangka penelitian ini disajikan pada Gambar 1 :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April-Mei 2021 bertempat di Desa Tanakaraeng, Kec. Manuju, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Materi Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah ember, *fitting* lampu, gasolek, kabel, kandang *litter* yang memiliki sekat, lampu 15 watt, meteran, *spray gun*, tabung gas 3 kg, tempat minum, tempat pakan, terpal dan timbangan digital.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah air, aktivator (*Lactobacillus* sp., *Azotobacter* sp., *Streptomyces* sp., *Saccharomyces* sp., *Aspergillus* sp. dan *Trichoderma* sp.), bekatul (dedak halus), bungkil inti sawit, *day old chick* (DOC), desinfektan (Destan), jagung, kantong plastik, kertas koran, konsentrat CAB parama, molasses, pakan komersil BP-11, sekam padi dan tepung kencur.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan prosedur eksperimental, yaitu pendekatan untuk menentukan pengaruh perlakuan tertentu terhadap orang lain dalam lingkungan yang terkendali.

D. Prosedur Penelitian

1. Rancangan penelitian

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan dan empat ulangan, dengan dua ekor ayam pedaging pada setiap ulangan atau satuan percobaan. Berikut ini adalah unit penelitian:

$R_0 = \text{Ransum Basal} + 0,16 \% \text{ Tepung Kencur}$

$R_1 = \text{Ransum Basal} + 10\% \text{ BIS} + 0,16\% \text{ Tepung Kencur}$

$R_2 = \text{Ransum Basal} + 10\% \text{ BISF} + 0,16\% \text{ Tepung Kencur}$

$R_3 = \text{Ransum Basal} + 15\% \text{ BISF} + 0,16\% \text{ Tepung Kencur}$

$R_4 = \text{Ransum Basal} + 20\% \text{ BISF} + 0,16\% \text{ Tepung Kencur}$

2. Tahap Persiapan

a. Fermentasi Bungkil Inti Sawit

Pembuatan bungkil inti sawit fermentasi 1000 g mengacu kepada Manin dkk., (2012) yang dimodifikasi, yaitu bungkil inti sawit ditimbang 1000 g, air sebanyak 200 mL, 2 mL aktivator dan 2 mL molasses. Memasukkan bungkil inti sawit sebanyak 1000 g ke dalam baskom. Homogenkan 200 mL air dengan 2 mL aktivator dan molasses, lalu campurkan dengan bungkil inti sawit. Setelah bahan dicampurkan, bahan dimasukkan ke dalam kantong plastik kemudian ikat rapat hingga tidak ada udara didalamnya (*Anaerob*), lalu simpan pada suhu ruangan selama 3 hari. Setelah 3 hari proses fermentasi, bungkil inti sawit dikeringkan dalam oven dengan suhu 40°C hingga kering. Kandungan mikroorganisme dalam aktivator yang digunakan yaitu *Lactobacillus* sp., *Azotobacter* sp., *Streptomyces* sp., *Saccharomyces* sp., *Aspergillus* sp. dan *Trichoderma* sp.

b. Kandang

Pemeliharaan broiler dilakukan selama 30 hari, mula-mula kandang didesinfeksi menggunakan destan. Sebelum *day old chick* (DOC) yang berusia satu hari dimasukkan ke dalam unit percobaan, terlebih dahulu *day old chick* (DOC) masuk ke kandang *brooding* selama tujuh hari. Kandang *brooding* ini dirancang

senyaman mungkin yang terdiri dari tirai yang dibuat menggunakan terpal, gasolek serta lampu 15 watt sebanyak 4 buah. Hal itu dilakukan agar suhu pada kandang dapat terjaga sehingga *day old chick* (DOC) tetap merasa hangat walaupun terpisah dari induknya. *Litter* atau alas kandang memakai sekam padi dengan ketebalan 8-12 cm yang kemudian lapsi menggunakan kertas roll di permukaan sekam padi agar *day old chick* (DOC) tidak memakannya.

Setelah masa *brooding*, pada siang hari tirai mulai dinaikkan agar broiler mendapatkan cahaya matahari serta sirkulasi udara di dalam kandang dapat terganti. Pada saat itu, 40 ekor ayam pedaging berada pada 20 unit percobaan dengan panjang 80 cm, tinggi 60 cm dan lebar 60 cm. Setiap unit percobaan memiliki dua ayam pedaging, wadah pakan tiga kilogram dan wadah minum satu liter.

c. Pakan dan Air Minum

Campuran pakan pada penelitian ini merupakan ransum basal (konsentrat, jagung dan bekatul) ditambahkan bungkil inti sawit, yang diberikan sesuai dengan kebutuhan ayam per hari. Pakan diberikan sebanyak dua kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari, pada air minum diberikan secara terus menerus.

Pakan yang diberikan adalah pakan konsentrat dengan komposisi bahan adalah *soya bean meal* (SBM)/bungkil kedelai, *meat and bone meal* (MBM)/tepung daging dan tulang, *corn gluten meal* (CGM)/minyak jagung, *palm oil*/minyak sawit, asam amino esensial, mineral esensial, premix dan vitamin, kemudian akan diformulasikan dengan bekatul (dedak halus), jagung dan bungkil inti sawit (BIS).

Berikut komposisi ransum, nilai zat gizi bahan pakan dan nilai zat gizi ransum perlakuan penelitian:

Tabel 7. Kandungan Nutrisi Bahan Pakan Penelitian

No	Kandungan Nutrisi	Konsentrat *	Jagung **	Bekatul ***	BISF****	BIS****
1	EM (Kkal/kg)	2.700	3.350	3.086	2.550	2.087
2	PK (%)	38,50	8,00	10,46	15,76	19,87
3	LK (%)	3,00	3,80	8,46	9,20	12,98
4	SK (%)	7,00	2,20	7,53	32,23	48,86
5	Kalsium (%)	3,00	0,02	0,04	0,35	0,35
6	Phospor (%)	1,00	0,28	0,60	0,88	0,59
7	Abu (%)	15,00	0,76	7,88	4,05	3,68

Sumber: *PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk., 2021, **Nusfeed.Id, 2018
UNAIR, 2016 *UNHAS, 2021.

Tabel 8. Susunan Ransum Penelitian

No	Bahan Pakan	Perlakuan (%)				
		R0	R1	R2	R3	R4
1	Konsentrat	40	40	40	40	40
2	Jagung	50	50	40	40	40
3	Bekatul	10	0	10	5	0
4	BIS	0	10	0	0	0
5	BISF	0	0	10	15	20
Total		100	100	100	100	100

Tabel 9. Kandungan Nutrisi Ransum Setiap Perlakuan

Perlakuan (Treatmen)	Abu (%)	PK (%)	SK (%)	LK (%)	ME (%)	CA (%)	P (%)
R0	7,67	20,45	4,65	3,95	3.063,60	1,21	0,60
R1	7,25	21,39	8,79	4,40	2.963,70	1,25	0,60
R2	7,86	21,63	9,32	4,86	2.937,30	1,25	0,63
R3	7,65	22,10	11,39	5,09	2.887,35	1,26	0,63
R4	7,44	22,57	13,45	5,32	2.837,40	1,28	0,63

Sumber : Data Penelitian, 2021.

3. Tahap Pelaksanaan

Pemeliharaan broiler dilaksanakan selama 30 hari. Pada usia 1-7 hari *day old chick* (DOC) berada pada fase *brooding*, pada fase ini *day old chick* (DOC) masih membutuhkan indukan atau penghangat buatan (gasolek dan lampu) untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Gasolek akan dinyalakan pada malam hari dan akan dinyalakan pada siang hari apabila cuaca dingin (hujan), sedangkan pencahayaan pada fase *brooding* dilakukan selama 23 jam, di malam hari pukul 23.00-24.00 WITA penerangan atau lampu dimatikan bertujuan untuk merangsang hormon pertumbuhan. Pada fase *brooding*, *day old chick* (DOC) ini diberikan pakan komersial (BP-11), pemberian pakan dan air minum pada fase ini secara terus menerus.

Broiler diberikan ransum perlakuan setelah fase *brooding*, antara usia 8 sampai 30 hari (sampai panen). Pakan diberikan dua kali sehari, di pagi hari pada 06.00 WITA, lalu di sore hari pada 16.00 WITA, serta air minum diberikan secara terus menerus selama periode tersebut. Ayam tidak lagi menggunakan gasolek sebagai pemanas pada fase ini, melainkan memilih lampu untuk memungkinkan ayam menyesuaikan diri. Penerangan menyala selama 16 jam selama periode ini dan penerangan atau lampu dimatikan sekitar pukul 22.00-05.00 WITA pada malam hari.

Pemberian vitamin (*vita stress*) melalui air minum dilaksanakan pada pagi hari ketika broiler sudah dimasukkan ke dalam unit percobaan dengan dosis satu gram *vita stress* dilarutkan dengan satu liter air. Hal ini dilakukan setelah ayam pindah ke unit percobaan agar tidak stress, pergantian ke ransum perlakuan serta

pemulihan setelah ayam sakit, pemberian *vita stress* dilakukan selama tujuh hari berturut-turut. Pengendalian penyakit dengan menjaga kebersihan sekitar kandang sehingga terhindar dari bibit penyakit yang akan membahayakan ternak.

E. Parameter yang Diukur

1. Pertambahan Bobot Badan

Pertambahan bobot badan diperkirakan dengan mengurangkan berat badan akhir minggu dari berat badan minggu sebelumnya. Seminggu sekali ayam ditimbang. Rumus pertambahan berat badan (PBB) adalah sebagai berikut menurut Mirnawati dkk. (2012) :

$$\text{PBB} = \text{Bobot Badan Akhir} - \text{Bobot Badan Awal}$$

2. Konsumsi Ransum

Jumlah ransum yang diberikan dikurangi dari sisa ransum untuk menghitung konsumsi ransum (g/ekor). Seminggu sekali konsumsi ransum diukur. Rumus konsumsi ransum menurut Mirnawati dkk. (2012), adalah sebagai berikut:

$$\text{Konsumsi Ransum (g/ekor/hari)} = \text{Jumlah Ransum} - \text{Sisa Ransum}$$

3. Konversi Ransum

Dengan membagi konsumsi ransum dengan pertumbuhan berat badan, konversi ransum dihitung. Rumus konversi ransum adalah sebagai berikut, menurut Mirnawati dkk. (2012):

$$\text{Konversi Ransum} = \frac{\text{Konsumsi Ransum (g)}}{\text{Pertambahan bobot badan (g)}}$$

4. Persentase Karkas

Dengan membagi berat karkas dengan berat hidup ayam dan dikalikan dengan 100 persen, persentase karkas dihitung. Perhitungan persentase karkas menurut Mirnawati dkk. (2012), adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase karkas} = \frac{\text{Berat karkas (g)}}{\text{Berat hidup (g)}} \times 100 \%$$

Bobot setiap bagian karkas yang terdiri dari paha, dada, sayap dan punggung dibandingkan dengan bobot karkas (g) dikalikan 100 persen untuk menghasilkan persentase bagian karkas (%) (Nirwana, 2011):

$$\text{Persentase bagian-bagian karkas} = \frac{\text{Berat bagian-bagian karkas (g)}}{\text{Berat hidup (g)}} \times 100\%$$

5. *Income Over Feed Cost*

Keuntungan yang diperoleh dari penjualan satu ekor ayam pada akhir penelitian dikurangi pengeluaran rata-rata satu ekor ayam selama uji coba digunakan untuk menghitung *income over feed cost* (Surtina dan Sari, 2020).

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung *income over feed cost*:

$$\text{Income over feed cost} = \text{Pendapatan} - \text{Pengeluaran.}$$

Keterangan :

$$\text{Pendapatan} = \text{Harga Jual Ayam Per kg (Rp)} \times \text{Bobot Akhir Ayam (kg)}$$

$$\text{Pengeluaran} = \text{Konsumsi Ransum (kg)} \times \text{Harga Ransum Perlakuan (Rp)}$$

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran dianalisis dengan menggunakan analisis varians berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Jika terdapat perbedaan yang nyata pada perlakuan yang diberikan maka akan dilanjutkan dengan

uji beda nyata terkecil (BNT) (Kusnandar, 2004). Adapun rumus matematikanya adalah sebagai berikut :

Analisis varians berdasarkan rancangan acak lengkap (RAL) digunakan untuk menilai data yang diterima dari hasil pengukuran. Uji beda nyata terkecil (BNT) akan digunakan jika terdapat perbedaan yang bermakna pada perlakuan yang diberikan (Kusnandar, 2004). Berikut ini adalah rumus matematikanya:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

Keterangan :

Y_{ij} = Hasil pengamatan dari perubah pada penggunaan bungkil inti sawit

μ = Rata-rata pengamatan

τ_i = Pengaruh perlakuan i

ε_{ij} = Error/galat perlakuan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

G. Hipotesis

Berikut ini adalah hipotesis penelitian:

H_0 = Pemberian bungkil inti sawit (*palm kernel meal*) dalam ransum tidak berpengaruh nyata terhadap performa dan *income over feed cost* broiler.

H_1 = Pemberian bungkil inti sawit (*palm kernel meal*) dalam ransum minimal terdapat satu perlakuan berpengaruh nyata terhadap performa dan *income over feed cost* broiler.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Performa Broiler

Hasil penelitian yang diperoleh untuk mengetahui performa dan *income over feed cost* broiler yang diberikan bungkil inti sawit (*palm kernel meal*) dengan pemberian ransum yang berbeda dalam memperbaiki performa broiler diperoleh hasil perlakuan pada Tabel 10 dan Tabel 11 yaitu sebagai berikut:

Tabel 10. Nilai Rataan Konsumsi Ransum, Pertambahan Bobot Badan dan Konversi Ransum.

Variabel	Perlakuan					Nilai P
	R0	R1	R2	R3	R4	
KR (g/ekor/minggu)	623,19±52,55	593,27±59,52	614,88±29,39	592,90±40,21	616,79±21,40	P>0,05
PBB (g/ekor/minggu)	363,46±28,01	327,96±11,33	351,13±25,34	319,63±25,21	333,00±10,20	P>0,05
KVR	1,75±0,07	1,81±0,18	1,79±0,07	1,87±0,02	1,86±0,03	P>0,05

Keterangan : Konsumsi Ransum (KR), Pertambahan Bobot Badan (PBB) dan Konversi Ransum (KVR). R0 (Ransum Basal + 0,16% Tepung Kencur), R1 (Ransum Basal + 10% BIS + 0,16% Tepung Kencur), R2 (Ransum Basal + 10% BISF + 0,16% Tepung Kencur), R3 (Ransum Basal + 15% BISF + 0,16% Tepung Kencur) dan R4 (Ransum Basal + 20% BISF + 0,16% Tepung Kencur).

1. Konsumsi Ransum

Berdasarkan hasil penelitian, nilai konsumsi ransum maksimum diberikan pada bungkil inti sawit (BIS), perlakuan R0 memiliki rata-rata 623,19 g/ekor/minggu, sedangkan nilai konsumsi ransum minimum diberikan yaitu perlakuan R3 memiliki rata-rata 592,90 g/ekor/minggu. Rendahnya palatabilitas maupun bentuk fisik ransum perlakuan bersumber dari bungkil inti sawit (BIS) fermentasi dan belum difermentasi berdampak pada konsumsi ransum ini, sehingga konsumsi ransum perlakuan R1, R2, R3 dan R4 memiliki nilai yang relatif rendah dibanding perlakuan R0. Aroma bahan pakan dan aroma ransum perlakuan mengandung bungkil inti sawit, merupakan dua

unsur yang mempengaruhi palatabilitas BIS, perlakuan yang mengandung bungkil inti sawit (BIS) perlakuan R1, R2, R3 dan R4 relatif tinggi daripada ransum perlakuan R0. Ransum yang berbentuk *crumble* lebih banyak dikonsumsi dibandingkan ransum dalam bentuk *mash*, ini artinya ransum yang persentase jagungnya tinggi, lebih banyak dikonsumsi oleh broiler. Hal ini sejalan dengan pemikiran Nurullah (2019), bahwa berbagai faktor mempengaruhi hubungan antara pakan dan palatabilitas, salah satunya adalah aroma bahan pakan. Jumlah ransum yang dikonsumsi juga dipengaruhi oleh bentuk fisik pakan, ayam lebih suka remahan dan pelet.

Hasil analisis ragam menunjukkan hasil tidak berbeda nyata ($P > 0,05$), namun perlakuan R4 (20% BISF) memiliki kandungan energi paling rendah tetapi nilai konsumsinya tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan bungkil inti sawit (BIS). Hal ini berkaitan dengan pendapat Herlina dkk., (2015), bahwa untuk setiap perbedaan energi ransum 50 kkal, konsumsi ransum akan naik atau turun sebesar 1g (rendahnya kandungan energi ransum, akan meningkatkan konsumsi ransum).

2. Pertambahan Bobot Badan

Berdasarkan penelitian ini, perlakuan R0 (ransum kontrol) memiliki pertambahan bobot badan ayam broiler terbesar dari semua perlakuan, dengan rata-rata kenaikan 363,46 g/ekor/minggu. Dengan rata-rata kenaikan 319,63 g/ekor/minggu, R3 memiliki peningkatan terkecil. Pertambahan bobot badan broiler sebanding pada konsumsi ransum, artinya semakin besar nilai konsumsi ransum maka semakin tinggi juga nilai pertambahan bobot badan yang diperoleh, begitupun sebaliknya jika nilai konsumsi ransum rendah, akibatnya pertambahan bobot badan juga rendah. Hal ini sejalan dengan Uzer dkk., (2013), bahwa peningkatan bobot badan erat kaitannya dengan

pakan, dalam hal jumlah yang berhubungan dengan asupan pakan dan jika terganggunya konsumsi pakan akan menghambat pertumbuhan.

Walaupun hasil sidik ragam tidak berbeda nyata ($P>0,05$), tapi perlakuan R2 (10% BISF) memiliki nilai pertambahan bobot badan relatif tinggi daripada perlakuan yang diberikan bungkil inti sawit (BIS) lain (R3 dan R4), karena kandungan serat kasarnya lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan R3 dan R4. Meskipun kadar protein kasar pada perlakuan R3 dan R4 relatif rendah daripada perlakuan R2, namun kandungan serat kasarnya juga lebih tinggi. Tingginya kadar serat kasar dalam ransum akan mempengaruhi daya cerna dan adsorpsi protein pada usus kurang efektif, sehingga protein dalam pakan tidak terserap secara efisien oleh organisme dan akan dikeluarkan bersama dengan feses, yang menyebabkan penyerapan protein untuk disintesis menjadi daging terhambat sehingga pertumbuhan broiler juga lambat. Hal ini sejalan dengan Prawitasari dkk., (2012), bahwa besarnya kadar serat kasar dalam komponen pakan, membuat pencernaan pakan menurun, sehingga ayam tidak dapat mencerna protein yang ada dalam pakan dengan baik.

3. Konversi Ransum

Berdasarkan penelitian ini, perlakuan R0 (ransum kontrol) memiliki konversi ransum terendah memiliki rata-rata 1,75, sedangkan perlakuan R3 memiliki konversi ransum tertinggi dengan rata-rata 1,87. Rendahnya nilai konversi ransum, membuat efektivitas konsumsi ransum untuk pertumbuhan ayam pedaging, begitupun jika tingginya nilai konversi ransum akan mengurangi efisiensi konsumsi ransum untuk pertumbuhan ayam pedaging. Hal tersebut berkaitan dengan Woro dkk., (2019), bahwa

rendahnya konversi ransum menunjukkan penurunan jumlah ransum yang dibutuhkan untuk memperoleh satu kilogram daging. Besarnya konversi ransum, membuat penggunaan ransum boros.

Hasil analisis ragam menunjukkan tidak berbeda nyata ($P>0,05$) terhadap konversi ransum. Perlakuan R2 (10% BISF) bisa memperbaiki konversi ransum broiler, karena nilai konversi ransum hampir sama dengan perlakuan R0 (ransum kontrol) dan lebih rendah dari perlakuan R1 (10% BIS) yaitu 1,79. Angka tersebut lebih besar dari penelitian Mirnawati dkk. (2012), menemukan nilai konversi rata-rata 1,59-1,65 untuk ransum broiler. Berkaitan dengan peningkatan bobot badan dan konsumsi ransum, yang menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda dengan pasokan bungkil inti sawit (BIS), yang menunjukkan bahwa nilai konversi ransum mencerminkan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan kesimpulan Siregar (2010), bahwa nilai konversi ransum tidak banyak berubah dari jumlah konsumsi ransum dan pertumbuhan bobot badan dengan hasil tidak berbeda nyata.

Tabel 11. Nilai Rataan Persentase Karkas, Persentase Dada, Persentase Paha, Persentase Sayap dan Persentase Punggung.

Variabel	Perlakuan					Nilai P
	R0	R1	R2	R3	R4	
PK (%)	66,83±0,43	68,84±2,77	66,74±3,30	66,61±0,87	67,52±2,40	$P>0,05$
PD (%)	35,77±1,94	36,03±2,63	36,66±3,84	38,17±1,82	37,19±1,22	$P>0,05$
PP (%)	32,72±2,59 ^b	31,21±1,75 ^{ab}	32,46±1,16 ^b	29,65±0,84 ^a	29,07±1,87 ^a	$P<0,05$
PS (%)	10,95±0,43	10,82±2,77	11,41±3,30	11,62±0,87	11,29±2,40	$P>0,05$
PPG (%)	19,61±3,21	18,98±1,79	18,87±1,02	21,49±2,29	20,63±1,39	$P>0,05$

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perlakuan berbeda nyata ($P<0,05$). Persentase Karkas (PK), Persentase Dada (PD), Persentase Paha (PP), Persentase Sayap (PS) dan Persentase Punggung (PPG). R0 (Ransum Basal + 0,16% Tepung Kencur), R1 (Ransum Basal + 10% BIS + 0,16% Tepung Kencur), R2 (Ransum Basal + 10% BISF + 0,16% Tepung Kencur), R3 (Ransum Basal + 15% BISF + 0,16% Tepung Kencur) dan R4 (Ransum Basal + 20% BISF + 0,16% Tepung Kencur).

4. Persentase Karkas

Berdasarkan hasil penelitian ini, nilai persentase karkas tertinggi pada pemberian bungkil inti sawit (BIS) yaitu, pada perlakuan R1 dengan nilai rata-rata 68,84 %, sedangkan perlakuan R3 dengan nilai rata-rata 66,61% merupakan nilai persentase karkas terendah. Persentase karkas berbanding lurus dengan bobot hidup broiler, sehingga jika berat hidup tinggi maka berat karkas akan tinggi, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai Pradana dkk. (2015), peningkatan karkas seiring dengan peningkatan berat hidup. Secara umum, peningkatan bobot badan pada ayam disertai dengan penurunan kandungan lemak perut, sehingga output daging meningkat.

Hasil analisis ragam tidak berbeda nyata ($P>0,05$) terhadap persentase karkas. Perlakuan menggunakan bungkil inti sawit (BIS) fermentasi maupun tidak difermentasi mampu memperbaiki persentase karkas broiler. Hal ini karena memiliki nilai rata-rata persentase karkas yang relatif sama yaitu, berkisar antara 66-68,84%, nilai rata-rata persentase karkas relatif normal. Hal tersebut sesuai Noferdiman (2011), bahwa persentase karkas broiler dengan penggunaan BISF dalam ransum sebesar 10-30%, menghasilkan nilai rata-rata sebesar 66-70,42%.

5. Persentase Dada

Berdasarkan hasil penelitian ini, nilai persentase dada tertinggi pada pemberian bungkil inti sawit (BIS) yaitu pada perlakuan R3 dengan nilai rata-rata 38,17%, sedangkan nilai persentase dada terendah pada perlakuan R0 dengan nilai rata-rata 35,77%. Dikarenakan kadar nutrisi dalam ransum perlakuan mengandung bungkil inti sawit fermentasi (BISF) khususnya protein, sehingga deposisi daging bagian dada

tinggi yang menyebabkan nilai persentase karkas bagian dada juga relatif besar. Hal ini sejalan dengan Widiyawati dkk. (2020), bahwa ada kecenderungan peningkatan bobot karkas dada komersil disebabkan banyak mengandung jaringan otot yang perkembangannya lebih dipengaruhi oleh zat gizi berupa protein.

Hasil analisis ragam tidak berbeda nyata ($P>0,05$) terhadap persentase dada. Ransum perlakuan mengandung bungkil inti sawit fermentasi (BISF) relatif tinggi daripada perlakuan R0 (ransum kontrol) dan R1 (10% BIS) yaitu, dengan nilai rata-rata yang relatif sama antara 36-38%. Nilai persentase karkas bagian dada ini lebih tinggi dari penelitian Primasanti dkk., (2014), bahwa karkas ayam pedaging berumur 35 hari menyumbang 30% dari total bobot hidup.

6. Persentase Paha

Berdasarkan hasil penelitian ini, nilai persentase paha tertinggi pada pemberian bungkil inti sawit (BIS) dan tepung kencur yaitu pada perlakuan R0 dengan nilai rata-rata 32,72 %, sedangkan nilai persentase paha terendah pada perlakuan R4 dengan nilai rata-rata 29,07%. Hasil uji beda nyata terkecil (BNT) atau uji LSD mengungkapkan bahwa perlakuan R0 berbeda nyata ($P<0,05$) dari perlakuan R3 dan R4. Demikian pula, perlakuan R2 berbeda nyata ($P<0,05$) dari perlakuan R3 dan R4, sedangkan perlakuan R1, R3 dan R4 tidak ada perbedaan. Dengan nilai rata-rata 32,46 persen, perlakuan R3 (15% BISF) nilai persentase paha tidak berbeda nyata ($P>0,05$) dengan perlakuan R1 dan R4 pada penelitian ini. Angka persentase paha penelitian ini masih tergolong normal dan lebih tinggi dari penelitian Mianty dkk., (2020), bahwa rata-rata nilai persentase potongan komersil bagian paha sebesar 28,28-29,64%.

Pada penelitian ini perlakuan R3 (15% BISF) dan R4 (20% BISF) tidak mempengaruhi persentase paha dibandingkan ransum kontrol. Dikarenakan kandungan kalsium dan fosfor yang tinggi pada ransum perlakuan R3 (15% BISF) dan R4 (20% BISF) yang berperan dalam pembentukan tulang. Pertumbuhan tulang yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan daging, artinya dalam perlakuan R3 (15% BISF) dan R4 (20% BISF) mengalami pertumbuhan tulang yang tinggi dibandingkan dengan daging karkas bagian paha. Hal sesuai dengan Maghfiroh dkk., (2014), kalsium dan fosfor memiliki karakteristik dinamis, artinya keduanya dapat diproduksi kemudian diabsorpsi, sehingga memainkan peran penting dalam perkembangan tulang. Siahaan dkk., (2012), kalsium dalam ransum diserap menuju aliran darah dan menghasilkan ion-ion bebas, yang mengikat protein yang selanjutnya ion-ion yang tidak larut tersebut ditransfer untuk perkembangan tulang dan daging melalui usus halus.

7. Persentase Sayap

Berdasarkan hasil penelitian ini, nilai persentase sayap tertinggi pada pemberian bungkil inti sawit (BIS) yaitu, pada perlakuan R3 dengan nilai rata-rata 11.62 %, sedangkan nilai persentase sayap terendah pada perlakuan R1 dengan nilai rata-rata 10.82 %. Pada penelitian ini ransum perlakuan yang mengandung bungkil inti sawit fermentasi (BISF) relatif sama yaitu, berkisar 11%. Nilai rata-rata penelitian masih tergolong normal dan sejalan dengan penelitian Mianty dkk., (2020), bahwa rata-rata nilai persentase potongan komersil bagian sayap antara 11-12%.

Hasil analisis ragam tidak berbeda nyata ($P>0,05$) terhadap persentase sayap. Sayap merupakan bagian karkas yang memiliki banyak jaringan tulang daripada jaringan otot, memungkinkan mineral dalam makanan memiliki dampak yang lebih besar pada pertumbuhan. Pada penelitian ini ransum perlakuan yang menggunakan campuran bungkil inti sawit (BIS) memiliki kandungan mineral lebih tinggi dibandingkan ransum kontrol, yang berpengaruh pada persentase karkas broiler. Hal ini mendukung kesimpulan Antarani dkk. (2015), bahwa perlakuan tidak berpengaruh terhadap proporsi karkas sayap, kemungkinan nilai mineral (kalsium) di setiap ransum perlakuan relatif sama. Pembentukan tulang ayam pedaging bergantung pada mineral dan proporsi sayap yang tinggi dan rendah juga didasarkan oleh tulang. Tingginya proporsi sayap, akan meningkat pula berat tulang sayap, begitupun sebaliknya.

8. Persentase Punggung

Berdasarkan penelitian ini, angka persentase punggung tertinggi pada pemberian bungkil inti sawit (BIS) yaitu pada perlakuan R3 dengan nilai rata-rata 21,49%, sedangkan yang terendah pada perlakuan R2 dengan nilai rata-rata 18,87%. Perlakuan R3 (15% BISF) dan R4 (20% BISF) memiliki nilai rata-rata persentase punggung yang paling tinggi dan relatif sama yaitu, R3 (21,49%) dan R4 (20,63%), nilai tersebut tergolong normal serta sesuai dengan penelitian Antarani dkk., (2015), bahwa dalam penelitian ini proporsi punggung adalah 19,68-22,71 persen.

Hasil analisis ragam tidak berbeda nyata ($P>0,05$) terhadap persentase punggung. Perlakuan yang menggunakan bungkil inti sawit fermentasi (BISF) mengandung kalsium yang cukup tinggi, sehingga menghasilkan persentase punggung yang tinggi

pula. Punggung adalah bagian karkas yang tersusun lebih banyak tulang daripada daging seperti pada bagian sayap. Hal itu sependapat Antarani dkk., (2015), taraf zat mineral perlakuan yang hampir sama mempengaruhi proporsi bobot punggung, sehingga bagian tubuh yang memiliki komponen tulang lebih tinggi seperti sayap dan punggung, hasilnya tidak jauh berbeda.

B. *Income Over Feed Cost Broiler*

Hasil penelitian yang diperoleh untuk mengetahui performa dan *income over feed cost* broiler yang diberikan bungkil inti sawit (*palm kernel meal*) dengan pemberian ransum yang berbeda dalam memperbaiki *income over feed cost* broiler diperoleh hasil perlakuan pada Tabel 12 yaitu sebagai berikut:

Tabel 12. Nilai Rataan *Income Over Feed Cost*.

Perlakuan	Variabel	Nilai P
	<i>Income Over Feed Cost</i> (Rp)	
R0	16.388,47±1.111,19 ^b	P<0,05
R1	14.304,46±1.150,85 ^a	
R2	15.580,10±1.114,88 ^{ab}	
R3	14.339,92±1.128,28 ^a	
R4	14.479,78±1.208,87 ^a	

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perlakuan berbeda nyata (P<0,05). R0 (Ransum Basal + 0,16% Tepung Kencur), R1 (Ransum Basal + 10% BIS + 0,16% Tepung Kencur), R2 (Ransum Basal + 10% BISF + 0,16% Tepung Kencur), R3 (Ransum Basal + 15% BISF + 0,16% Tepung Kencur) dan R4 (Ransum Basal + 20% BISF + 0,16% Tepung Kencur).

Berdasarkan penelitian ini diperoleh *income over feed cost* (IOFC) pada pemberian bungkil inti sawit (BIS) dengan nilai rata-rata berturut-turut yaitu, Rp.16.388,47 (R0), Rp.15.580,10 (R2), Rp.14.479,78 (R4), Rp.14.339,92 (R3) dan Rp.14.304,46 (R1). Hal tersebut mengacu pada jumlah konsumsi pakan, banyaknya pakan yang dikonsumsi berakibat semakin baik pertumbuhan broiler, akan berdampak pada nilai jual ayam atau keuntungan. Hal tersebut sesuai

pendapat Anggitasari (2016), besar atau kecilnya keuntungan dari pemeliharaan broiler berkaitan pada nilai *income over feed cost* (IOFC).

Hasil uji lanjut BNT (beda nyata terkecil) atau LSD, menunjukkan perlakuan R0 berbeda nyata ($P < 0,05$) dengan perlakuan R3 dan R4, sedangkan perlakuan R1, R2, R3 dan R4 tidak berbeda. Pengaruh nyata terhadap nilai *income over feed cost* (IOFC) ini dikarenakan rendahnya modal pakan perlakuan yang dikeluarkan, sedangkan harga jual ayam yang tinggi ketika panen. Penggunaan pakan yang efisien akan mengurangi harga pakan. Hal tersebut sesuai pendapat Muzi (2014), tingginya pendapatan atas modal pakan menunjukkan pemeliharaan yang lebih baik karena IOFC yang lebih besar menunjukkan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika *income over feed cost* (IOFC) lebih rendah, keuntungan juga akan berkurang.

Hasil penelitian berbeda nyata ($P < 0,05$) pada *income over feed cost* (IOFC) dan persentase paha, menurut hasil analisis ragam dari pemberian bungkil inti sawit (BIS). Konsumsi ransum, penambahan bobot badan (PBB), konversi ransum, persentase karkas, persentase dada, persentase sayap dan persentase punggung menunjukkan tidak berbeda nyata ($P > 0,05$) dari pemberian bungkil inti sawit (BIS).

C. Pembahasan Umum

Perlakuan terbaik yaitu R2 (ransum basal + 10 % BISF + 0,16 % tepung kencur) karena mampu memperbaiki performa broiler (konsumsi ransum, penambahan bobot badan, konversi ransum dan persentase karkas, meliputi persentase dada, persentase paha, persentase sayap serta persentase punggung) maupun *income over feed cost*. Selain perlakuan R2, perlakuan R1 (ransum basal +

10 % BIS + 0,16 % tepung kencur) juga dianjurkan untuk digunakan karena mampu memperbaiki beberapa variabel performa dan *income over feed cost* broiler.

Pertambahan bobot badan (PBB) dan konsumsi ransum broiler dihubungkan dalam penelitian ini karena pertambahan bobot badan yang tinggi tergantung pada ransum yang dikonsumsi. Semakin tinggi kualitas atau kuantitas pakan yang dikonsumsi maka semakin tinggi pula pertumbuhan berat tubuh broiler. Hal tersebut sesuai dengan Uzer dkk. (2013), pertambahan berat tubuh terkait erat dengan pakan, dalam hal jumlah yang terkait dengan asupan pakan, dan jika konsumsi pakan terganggu, pertumbuhan akan terhambat. Sedangkan nilai konversi ransum dihitung dengan membandingkan nilai konsumsi ransum dan pertambahan berat tubuh broiler, maka konversi ransum broiler dikaitkan dengan konsumsi ransum dan pertambahan berat tubuh broiler. Pakan yang dikonsumsi pada peningkatan berat tubuh broiler relatif efisien bila nilai konversi ransum rendah. Hal tersebut sesuai dengan Woro dkk. (2019), rasio konversi pakan adalah proporsi ransum yang dikonsumsi terhadap pertumbuhan bobot badan. Dengan rendahnya tingkat konversi ransum, ransum yang dibutuhkan guna membuat sekilo daging semakin berkurang. Semakin besar konversi ransum, semakin boros penggunaan ransum.

Income over feed cost (IOFC) merupakan selisih dari pendapatan penjualan broiler saat panen dan pengeluaran biaya konsumsi ransum yang digunakan selama pemeliharaan, hal ini terkait dengan konsumsi ransum ayam pedaging. Tingginya nilai IOFC, akan meningkatkan keuntungan dari peternakan ayam pedaging. IOFC, menurut Indra (2015), merupakan keuntungan yang dihasilkan dari selisih antara pendapatan penjualan setiap ekor ayam dengan biaya rata-rata konsumsi ransum setiap

ekor. Nilai yang tinggi ini memerlukan efisiensi pakan yang baik untuk mencapai nilai IOFC yang tinggi.

Persentase karkas dikendalikan oleh bobot badan akhir ayam pedaging, maka persentase karkas dan komponen karkas (persentase dada, persentase paha, persentase sayap dan persentase punggung) dengan penambahan berat tubuh broiler saling berhubungan. Persentase karkas dihitung dengan mengalikan laju pertumbuhan dan penambahan berat tubuh, yang mempengaruhi berat hidup yang dihasilkan. Besarnya karkas yang dihasilkan akan berpengaruh pada berat hidup, diikuti dengan persentase komponen yang dihasilkan (persentase dada, persen paha, persentase sayap dan persentase punggung). Hal tersebut sependapat dengan Pradana dkk. (2015), bahwa proporsi karkas berkaitan jenis kelamin, usia serta berat tubuh. Meningkatnya karkas diikuti bertambahnya usia serta berat tubuh ayam pedaging. Secara umum, peningkatan bobot badan pada ayam disertai dengan penurunan kandungan lemak perut, sehingga output daging meningkat. Bangsa, jenis kelamin, umur, berat badan, hormon dan pola makan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi karkas.

Peningkatan kualitas produk peternakan telah banyak dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan performa dari hewan ternak guna menciptakan produk ASUH (aman, sehat, utuh dan halal), salah satunya dengan memperhatikan pakan ternak. Melalui perbaikan mutu dan kualitas pakan ternak maka akan menghasilkan hasil produksi terbaik dari hewan ternak seperti daging karkas broiler. Selain memperhatikan kualitas pakan, peternak juga seharusnya memperhatikan biaya pakan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Allah swt. telah menciptakan tumbuhan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan sebagai pakan ternak. Dari berbagai tumbuhan yang diciptakan Allah swt. terdapat salah satu mendaur ulang limbah sebagai pakan, pemanfaatan tersebut dapat menjauhkan dari sifat mubazir.

Allah swt. berfirman dalam surah QS As Sajdah/32:27

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ
أَنْعَمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

Terjemahnya:

“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya Makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan?” (Kementerian Agama RI, 2019).

Memaparkan bahwasannya Allah swt. memiliki kekuasaan yang dapat menghidupkan yang mati sebagaimana mengarahkan langit mendung menuju wilayah kekeringan, ialah wilayah yang gersang. Dari kekuasaan-Nya itu kemudian dapat menumbuhkan berbagai tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain untuk bertahan hidup serta memproduksi. Seperti tanaman sawit, darinya Allah swt. memberikan banyak manfaat. Indonesia merupakan wilayah yang memiliki iklim tropis basah, oleh karena itu banyak masyarakat membudidayakan tanaman sawit, dari tanaman sawit menghasilkan buah yang dapat dijual untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari hasil pengolahan buah sawit tersebut menghasilkan minyak sawit yang menjadi salah satu bahan pokok dalam kebutuhan rumah tangga. Sedangkan dari hasil samping pengolahan minyak, memperoleh buangan berupa BIS.

Bungkil inti sawit (BIS) ternyata mempunyai nilai zat gizi yang tinggi, serta masih layak dimanfaatkan sebagai pakan. Di lingkungan masyarakat, BIS masih tergolong limbah industri yang kurang dimanfaatkan. Padahal bungkil inti sawit mengandung kandungan lemak dan protein yang tinggi, hal ini menjadi mubazir apabila tidak dimanfaatkan. Untuk ternak ruminansia (kambing, kerbau dan sapi), BIS dimanfaatkan untuk sumber energi karena memiliki kandungan serat kasar yang tinggi, tetapi untuk ternak unggas seperti broiler dianjurkan untuk difermentasi terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai campuran pakan. Hal ini berkaitan dengan sistem pencernaan ternak unggas yang sangat terbatas dalam mencerna serat kasar, proses fermentasi ini dapat mengurangi kandungan serat kasar dalam bungkil inti sawit, sehingga tidak berbahaya terhadap fisiologis serta menghambat proses produksi broiler berupa pertumbuhan daging. Penggunaan bungkil inti sawit dapat meningkatkan kandungan protein ransum broiler, yang berperan penting dalam deposisi daging sehingga produksi karkas terutama bagian dada dapat meningkat. Selain itu, penggunaan ransum broiler yang mengandung bungkil inti sawit dapat mengurangi biaya pakan sehingga keuntungan peternak dapat meningkat.

Sesuai dengan potongan ayat di atas yaitu “Allah swt. menumbuhkan tanaman dengan air hujan untuk dimakan hewan ternak dan manusia”, Allah swt. Maha adil, menumbuhkan tanaman dari tanah yang tandus kemudian memberi makan manusia dari tanaman tersebut dan limbah pengolahan tanaman itu dimanfaatkan untuk ternak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan dari penelitian yang dilakukan:

1. Penggunaan bungkil inti sawit (BIS) dalam ransum belum mampu memperbaiki performa broiler dalam hal konsumsi ransum, penambahan bobot badan (PBB) dan konversi ransum, tetapi dapat meningkatkan persentase karkas dan persentase bagian karkas broiler, yang meliputi dada, paha, sayap dan persentase punggung.
2. Penggunaan bungkil inti sawit (BIS) yang optimal yaitu pada level 10% dalam ransum, karena dapat memperbaiki performa broiler seperti konsumsi ransum, penambahan bobot badan (PBB), konversi ransum, persentase karkas dan persentase bagian-bagian karkas diantaranya persentase dada, persentase paha, persentase sayap dan persentase punggung.
3. Penggunaan bungkil inti sawit (BIS) dalam ransum broiler juga dapat meningkatkan *income over feed cost* (IOFC), dikarenakan pakan alternatif tersebut dapat mengefisiensi biaya pakan selama pemeliharaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan menggunakan perlakuan R2 (ransum basal + 10% BISF + 0,16% tepung kencur) yang merupakan perlakuan paling baik diantara perlakuan R1, R3 dan R4 serta dapat memperbaiki performa dan meningkatkan *income over feed cost* broiler.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmanu dan Muharlién. 2011. *Ilmu Ternak Unggas*. Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Aji. P.N. 2021. Pengaruh penggunaan tepung kencur (*Kaempferia galanga* L.) sebagai campuran pakan terhadap pencernaan bahan kering dan lemak kasar pada ayam kampung super. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Amrullah, I. K. 2004. *Nutrisi Broiler*. Lembaga Satu Gunung Budi, Bogor.
- Andriyanto, Satyaningtjas. A.S., Yufiandri R., Wulandari. R., Darwin. V.M. dan Siburian. S.N.A. 2015. Performa dan pencernaan pakan broiler yang diberi hormon testosteron dengan dosis bertingkat. *Jurnal Acta Veterinaria Indonesiana*, 3 (1): 29-37.
- Anggitasari, S., Sjoftjan, O. dan Djunaidi, I. H. (2016). Pengaruh beberapa jenis pakan komersial terhadap kinerja produksi kuantitatif dan kualitatif ayam pedaging. *Buletin Peternakan*, 40 (3): 187-196.
- Antarani I., Laihad J.T., Poli Z. dan Montong P.R.R.I. 2015. Penampilan karkas ayam pedaging dengan pemberian kulit kopi (*Coffea* sp.) pengolahan sederhana substitusi sebagian jagung dengan level yang berbeda. *Zootec*. 40(1) : 172-181.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Cobb-Vantress. Cobb. 2010. *Broiler Management Guide*. Pasig City. Filipina.
- Dahlan, M. dan Hudi N. 2011. Studi manajemen perkandangan broiler di dusun wangket desa kaliwates kecamatan kembangbahu kabupaten lamongan. *Jurnal Ternak*, 2 (1) : 24-29.
- Dewi, F.F., Sudjarwo E. dan Sjoftjan. O. 2013. Pengaruh penggunaan beberapa varietas tepung jagung dalam pakan terhadap kualitas karkas ayam pedaging. *Jurnal Ilmu-ilmu Peternakan*. 11 (2) : 1- 12.
- Ginting. E.E. 2020. Penggunaan tepung temulawak dan tepung bawang putih sebagai imbuhan pakan pada performa broiler organik. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Haryadi, D. 2007. Pengaruh pemanfaatan bakteri penghasil fitase (*Pantoea agglomerans*) dalam ransum terhadap kualitas karkas broiler. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

- Hatta. U., Sundu. B., dan Damayanti. P. 2010. Pengaruh kombinasi enzim dan bungkil inti sawit terhadap keseragaman tumbuh, liveabilitas, *income over feed* dan *chick cost* broiler. *Jurnal*. Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako. Palu.
- Herlina B., Novita R. dan Karyono T. 2015. Pengaruh jenis dan waktu pemberian ransum terhadap performans pertumbuhan dan produksi broiler. *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*. 10 (2) : 107-113.
- Ikasari. T.A. 2017. Pengaruh pemberian probiotik terhadap persentase karkas dan lemak karkas pada broiler. *Skripsi*. Fakultas Sains dan Teknologi. UIN Alauddin Makassar. Makassar.
- Indra, W., Tanwiriah, W. dan Wudjastuti, T. (2015). Bobot potong, karkas, dan *income over feed cost* ayam sentul jantan pada berbagai usia potong. *Jurnal student*, 4(3).
- Karina A.I. 2017. Isolasi dan identifikasi bakteri penambat nitrogen, pelarut fosfat, dan bakteri pendegradasi selulosa pada tanah bekas tanaman bawang merah (*Allium cepa* L.) yang diberi *biofertilizer*. *Skripsi*. Perpustakaan Universitas Airlangga. Surabaya.
- Kementerian Agama RI. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kemenag RI. Jakarta.
- Ketaren, P.P. 2010. Kebutuhan gizi ternak unggas di Indonesia. *Wartazoa*, 20(4) : 172-205.
- Kiramang, K., dan Jufri, M. 2013. Pengaruh pemberian serbuk cengkeh (*Syzygium aromaticum*) pada ransum terhadap performan ayam ras pedaging (broiler). *Teknosains*, 7(2) : 219-230.
- Kusnandar. 2004. Kandungan kolesterol daging, lemak abdominal dan persentase organ dalam broiler yang diberi minum teh fermentasi kombucha pada waktu yang berbeda. *Skripsi*. Program Studi Nutrisi dan Makanan Ternak. Departemen Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.
- Laboratorium Loka Penelitian Kambing Potong Sei Putih (2005). Medan.
- Listiyanti, A. 2013. Pengaruh penambahan campuran herbal dalam ransum terhadap pencernaan protein kasar dan retensi nitrogen pada broiler. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.

- Maghfiroh K., Sukanto B. dan Mahfudz L.D. 2014. Penggunaan sorgum dan kulit pisang terhidrolisis terhadap retensi kalsium dan massa kalsium tulang pada broiler. *Agromedia*. 32(1) : 54-62.
- Mahfudz, L.D., Sarjana. T.A. dan Sarengat. W. 2010. Efisiensi penggunaan protein ransum yang mengandung limbah destilasi minuman beralkohol (Idmb) oleh burung puyuh (*Coturnix coturnix japonica*) jantan. *Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner*. Fak. Peternakan, Universitas Diponegoro.
- Massolo, R. 2016. Persentase karkas dan lemak abdominal broiler yang diberi prebiotik inulin umbi bunga dahlia (*Dahlia variabilis*). *Skripsi*. Fakultas Peternakan. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Mattjik. A. dan Sumertajaya. I. M. 2006. *Perancangan Percobaan*. IPB Press. Bogor.
- Mianty C.P., Mandey J.S., Kowel Y.H.S. dan Regar M.N. 2020. Pengaruh pemberian tepung labu kuning (*Cucurbita moschata*) dalam ransum terhadap persentase karkas, potongan komersial dan lemak abdominal pada ayam pedaging. *Zootec*. 40(2) : 746-755.
- Muhammad. Z. dan Nataamijaya. A.G. 2017. Lama pemeliharaan untuk mencapai bobot badan siap pasar broiler melalui penambahan tepung kencur (*Kaempferia galanga* L.). *Jurnal*. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Bogor.
- Muzi, K., Supartini, N., dan Darmawan, H. (2014). Tingkat konsumsi, konversi dan *income over feed cost* pada pakan ayam kampung dengan penambahan enzim papain. *Jurnal Fakultas Pertanian Tribuana Tungadewi*, 2(2).
- Nasional Nusantara. 2019. *Tangguh Probiotik*. Yogyakarta.
- National Research Council, 1994. *Nutrient Requirement of Poultry*. 8th ed. National Academic Press. Washington.
- Nirwana. 2011. Pemberian berbagai bentuk ransum berbahan baku lokal terhadap persentase karkas, lemak karkas dan lemak abdominal broiler. *Skripsi*. Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Noferdiman. 2011. Penggunaan bungkil inti sawit fermentasi oleh jamur *Pleurotus ostreatus* dalam ransum terhadap performans broiler. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan*, 14(1).
- Nurhayati, T. 2008. Uji efek sediaan serbuk instan rimpang kencur (*Kaempferia galanga* L.) Sebagai tonikum terhadap mencit jantan galur swiss webster.

Skripsi. Tidak Diterbitkan Surakarta : Fakultas Farmasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nurulloh. T.N.D. 2019. Pengaruh penambahan imbuhan pakan terhadap performa broiler. *Skripsi*. Universitas Padjadjaran. Sumedang.

Pradana. P.H., Busono. W. dan Widodo. E. 2015. Pengaruh penambahan whey keju dengan bakteri asam laktat (BAL) *Pediococcus pentosaceus* dalam pakan terhadap kualitas karkas ayam pedaging. *Skripsi*. Fakultas Peternakan. Universitas Brawijaya. Malang.

Prawitasari R.H., Ismadi V.D.Y.B. dan Estiningdriati I. 2012. Kecernaan protein kasar dan serat kasar serta laju digesta pada ayam arab yang diberi ransum dengan berbagai level *Azolla microphylla*. *Animal Agriculture Journal*. 1(1) : 471-483.

Primasanti. R.R., Mahfudz L.D. dan Sarengat W. 2014. Pengaruh penggunaan tepung rumput laut (*Gracilaria verrucosa*) terfermentasi dalam ransum terhadap produksi karkas broiler. *Animal Agriculture Journal*. 3(2) : 155-162.

Qurniawan, A. 2016. Kualitas daging dan performa broiler di kandang terbuka pada ketinggian tempat pemeliharaan yang berbeda di kabupaten takalar sulawesi selatan. *Tesis*. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Rahayu, I., HS dan Budiman, C. 2015. Pemanfaatan tanaman tradisional sebagai *feed additive* dalam upaya menciptakan budidaya ayam lokal ramah lingkungan. *Lokakarya Nasional Inovasi Teknologi Pengembangan Ayam Lokal*. Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Ternak. Institut Pertanian Bogor.

Rasyaf. 2008. *Panduan Beternak Ayam Pedaging*. Edisi ke-1. Penebar Swadaya. Jakarta.

Rasyaf. 2011. *Panduan Beternak Ayam Pedaging*. Edisi Ke-15. Kanisius. Yogyakarta.

Saputra, H.P., Sjojfan. O. dan Djunaidi. I.H. 2013. Pengaruh penambahan fitobiotik meniran (*Phyllanthus niruri* L.) dalam pakan terhadap pencernaan protein kasar dan energi metabolis ayam pedaging. *Jurnal Ilmu-ilmu Peternakan*, 24(2) : 1-9.

Sari. K.A., Sukamto. B. dan Dwiloka. B. 2014. Efisiensi penggunaan protein pada broiler dengan pemberian pakan mengandung tepung daun kayambang (*Salvinia molesta*). *Jurnal Agripet*, 14(2) : 76-83.

- Shihab, M.Q. 2007. *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat)*. PT. Mizan Pustaka. Bandung.
- Shihab, M.Q. 2018. *Islam yang Saya Pahami*. Lentera Hati, Tangerang.
- Siahaan N.B., Sunarti D. dan Yunianti V.D. 2012. Pengaruh penggunaan kulit pisang biokonversi dalam ransum terhadap penyerapan kalsium serta kekuatan tulang broiler. *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan*. 24(3) : 18-23.
- Sinurat. A.P. 2012. Teknologi pemanfaatan hasil samping industri sawit untuk meningkatkan ketersediaan bahan pakan unggas nasional. *Jurnal*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Siregar, R.M., 2010. Pengaruh pemberian bungkil inti sawit (BIS) termodifikasi terhadap performans broiler. *Skripsi*. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Standar Nasional Indonesia, 2015. *Pakan Ayam Ras Pedaging (broiler) Bagian 2-3*. Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI). Jakarta.
- Suhaeni. N. 2007. *Petunjuk Teknis Beternak Broiler*. Nuansa, Bandung.
- Sumadi. 2012. Optimasi produksi enzim β -*mannanase* ekstraseluler dari bakteri *Geobacillus stearothermophilus* L-07. *Jurnal Sains Teknologi*. 11(2) : 66-71.
- Surtina. D. dan Sari. M.R. 2020. Pengaruh pemberian minuman probiotik terhadap bobot hidup, persentase karkas dan *Income over feed cost* broiler. *Jurnal Peternakan Mahaputra (JPM)*, 1(1) : 1-7.
- Tampubolon dan Bintang. 2012. Pengaruh imbalanced energi dan protein ransum terhadap energi metabolis dan retensi nitrogen broiler. *Jurnal Jipbiol*. 1(2) : 1-5.
- Taufiqurrohmah, 2017. Pengaruh penggunaan bungkil inti sawit sebagai pengganti jagung dengan bentuk enzim yang berbeda terhadap karakteristik gizzard ayam pedaging. *Skripsi*. Program Studi Peternakan. Fakultas Peternakan. Universitas Brawijaya. Malang.
- Tombuku. A.T., Rawung. V., Montong. M. dan Poli. Z. 2014. Pengaruh berbagai macam ransum komersial dengan menggunakan sistem kandang yang berbeda terhadap kualitas karkas ayam pedaging. *Jurnal Zootehnik*, 34 : 76-84.
- Tumanggor. R.M. 2010. Pengaruh pemberian bungkil inti sawit (BIS) termodifikasi terhadap efek imunomodulasi pada ayam pedaging usia 42 hari. *Skripsi*. Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Medan.

- Usman, Y, Latif, H dan Abdillah, J. 2016. Pengaruh pemberian prebiotik immuno forte dengan level berbeda terhadap berat dan persentase karkas broiler. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah*. 1 (1) : 739-745.
- Uzer, F., Iriyanti. N. dan Roesdiyanto. 2013. Penggunaan pakan fungsional dalam ransum terhadap konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan broiler. *J. Ilmiah Peternakan*. 1(1) : 282-288.
- Wandira. D. 2014. Pengaruh penggunaan bungkil inti sawit fermentasi dengan *Eupenicillium javanicum* dalam ransum terhadap performa broiler. *Skripsi*. Fakultas Peternakan. Universitas Andalas. Padang.
- Widiastuti, Happy, Siswanto dan Suharyanto. 2010. Karakterisasi dan seleksi beberapa isolate *Azotobacter sp.* *Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan*. 1(2).
- Widiyawati I., Sjojfan O. dan Adli D.N. 2020. Peningkatan kualitas dan persentase karkas ayam pedaging dengan substitusi bungkil kedelai menggunakan tepung biji asam (*Tamarindus indica L.*). *Jurnal Nutrisi Ternak Tropis*. 3(1) : 35-40.
- Widodo, E., Sjojfan. O. dan Wijaya. A.Z. 2010. Limbah mie sebagai pengganti jagung dalam pakan ayam pedaging dan pengaruhnya terhadap kualitas karkas. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak*. 5(1) : 38-44.
- Widowati T.W., Hamzah B., Wijaya A., dan Pambayun R. 2014. Sifat antagonistik *Lactobacillus sp.* b441 dan ii442 asal tempoyak terhadap *staphylococcus aureus*. *Agritech*, 34(4).
- Wijayanti, R.P., Busono. W. dan Indrati. R. 2011. Pengaruh suhu kandang yang berbeda terhadap performans ayam pedaging periode starter. *Jurnal Ilmu Ternak*, 5(2) : 1-6.
- Wiyana, K.A., Ariana, I N.T. dan Vidyani, N.G.A.K.R. 2015. Pengaruh probiotik starbio dalam ransum komersil terhadap rechan karkas broiler. *Journal of Tropical Animal Science*. 3 (2) : 353 – 365.
- Woro I. D., Atmomarsono. U. dan Muryani. R. 2019. Pengaruh pemeliharaan pada kepadatan kandang yang berbeda terhadap performa broiler. *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*, 14(4) : 418-423.
- Yemima. 2014. Analisis usaha peternakan broiler pada peternakan rakyat di desa karya bakti, kecamatan rungan, kabupaten gunung mas, provinsi kalimantan tengah. *Jurnal Ilmu Hewani Tropika*, 3(1) : 27-32.

L

A

M


P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian.

A. Persiapan Kandang



1. Penyemprotan Desinfektan



2. Pemasangan Dinding Kandang



3. Penyemprotan Desinfektan



4. Pemasangan Dinding Kandang

B. Pembuatan BISF



C. Pembuatan Tepung Kencur



Lampiran 2. Hasil Descriptives Analisis Ragam Performa dan *Income Over Feed Cost* Broiler yang Diberikan Bungkil Inti Sawit (*palm kernel meal*).

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min.	Max.
						Lower Bound	Upper Bound		
KONSUMSI	R0	4	623.19	52.55	26.28	539.57	706.81	549.50	673.20
	R1	4	593.27	59.52	29.76	498.56	687.98	515.43	648.08
	R2	4	614.88	29.39	14.69	568.11	661.64	580.32	647.25
	R3	4	592.90	40.21	20.10	528.92	656.87	543.00	634.22
	R4	4	616.79	21.40	10.70	582.73	650.84	591.90	642.47
	Total	20	608.20	40.35	9.02	589.32	627.09	515.43	673.20
PBB	R0	4	363.46	28.01	14.01	318.89	408.03	327.50	394.83
	R1	4	327.96	11.33	5.67	309.93	345.99	313.00	340.33
	R2	4	351.13	25.34	12.67	310.81	391.44	318.00	374.50
	R3	4	319.63	25.21	12.61	279.51	359.74	287.50	345.33
	R4	4	333.00	10.20	5.10	316.77	349.23	323.50	347.33
	Total	20	339.03	25.13	5.62	327.27	350.79	287.50	394.83
KONVERSI_ RANSUM	R0	4	1.75	.07	.03	1.64	1.85	1.65	1.81
	R1	4	1.81	.18	.09	1.53	2.09	1.56	1.98
	R2	4	1.80	.07	.04	1.68	1.91	1.72	1.89
	R3	4	1.87	.02	.01	1.85	1.90	1.85	1.89
	R4	4	1.86	.03	.01	1.82	1.90	1.83	1.88
	Total	20	1.82	.09	.02	1.77	1.86	1.56	1.98
IOFC	R0	4	16,388.47	1,111.19	555.60	14,620.32	18,156.62	15,498.84	18,013.55
	R1	4	14,304.46	1,150.85	575.43	12,473.20	16,135.73	12,930.70	15,729.00
	R2	4	15,580.10	1,114.88	557.44	13,806.08	17,354.12	14,200.81	16,823.33
	R3	4	14,339.92	1,128.28	564.14	12,544.57	16,135.26	12,816.75	15,517.63
	R4	4	14,479.78	208.87	104.44	14,147.42	14,812.14	14,338.99	14,782.82
	Total	20	15,018.54	1,239.00	277.05	14,438.67	15,598.42	12,816.75	18,013.55
KARKAS	R0	4	66.83	.43	.22	66.14	67.52	66.38	67.42
	R1	4	68.84	2.77	1.38	64.44	73.25	67.03	72.91
	R2	4	66.74	3.30	1.65	61.48	71.99	62.12	69.94
	R3	4	66.61	.87	.44	65.22	68.00	65.51	67.32
	R4	4	67.52	2.40	1.20	63.70	71.34	65.49	70.97
	Total	20	67.31	2.17	.49	66.29	68.32	62.12	72.91
DADA	R0	4	35.77	1.94	.97	32.68	38.86	33.73	38.16
	R1	4	36.03	2.63	1.31	31.85	40.21	33.05	38.71
	R2	4	36.66	3.84	1.92	30.56	42.77	33.09	40.68

	R3	4	38.17	1.82	.91	35.27	41.07	35.52	39.43
	R4	4	37.19	1.22	.61	35.25	39.13	36.02	38.38
	Total	20	36.76	2.35	.53	35.66	37.87	33.05	40.68
PAHA	R0	4	32.73	2.59	1.29	28.60	36.85	30.59	36.43
	R1	4	31.21	1.75	.87	28.44	33.99	29.05	33.14
	R2	4	32.46	1.16	.58	30.61	34.31	30.92	33.74
	R3	4	29.65	.84	.42	28.32	30.98	28.73	30.65
	R4	4	29.07	1.87	.93	26.10	32.05	26.85	31.07
	Total	20	31.02	2.16	.48	30.01	32.03	26.85	36.43
SAYAP	R0	4	10.95	.25	.13	10.54	11.35	10.65	11.23
	R1	4	10.83	.49	.25	10.04	11.61	10.42	11.44
	R2	4	11.41	.82	.41	10.11	12.71	10.78	12.58
	R3	4	11.62	.19	.10	11.32	11.92	11.34	11.76
	R4	4	11.29	.29	.15	10.82	11.76	11.06	11.71
	Total	20	11.22	.51	.11	10.98	11.46	10.42	12.58
PUNGGUNG	R0	4	19.61	3.21	1.61	14.50	24.72	15.64	23.24
	R1	4	18.98	1.79	.90	16.13	21.83	17.69	21.58
	R2	4	18.87	1.02	.51	17.25	20.49	17.54	20.02
	R3	4	21.49	2.29	1.14	17.85	25.13	18.23	23.55
	R4	4	20.63	1.39	.70	18.42	22.84	18.78	21.75
	Total	20	19.92	2.12	.47	18.92	20.91	15.64	23.55

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Lampiran 3. Hasil Analisis Ragam ANOVA Performa dan *Income Over Feed Cost* Broiler yang Diberikan Bungkil Inti Sawit (*palm kernel meal*).

		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
KONSUMSI	Between Groups	3200.60	4	800.15	.43	.78
	Within Groups	27728.20	15	1848.55		
	Total	30928.80	19			
PBB	Between Groups	5,114.03	4	1,278.51	2.79	.07
	Within Groups	6,883.83	15	458.92		
	Total	11,997.86	19			
KONVERSIR ANSUM	Between Groups	.04	4	.01	1.28	.32
	Within Groups	.13	15	.01		
	Total	.17	19			
IOFC	Between Groups	13,811,045.75	4	3,452,761.44	3.37	.04
	Within Groups	15,356,405.21	15	1,023,760.35		
	Total	29,167,450.95	19			
KARKAS	Between Groups	13.78	4	3.44	.68	.62
	Within Groups	75.89	15	5.06		
	Total	89.67	19			
DADA	Between Groups	14.78	4	3.69	.61	.66
	Within Groups	90.56	15	6.04		
	Total	105.34	19			
PAHA	Between Groups	42.75	4	10.69	3.49	.03
	Within Groups	45.91	15	3.06		
	Total	88.66	19			
SAYAP	Between Groups	1.72	4	.43	1.96	.15
	Within Groups	3.30	15	.22		
	Total	5.02	19			
PUNGGUNG	Between Groups	20.13	4	5.03	1.16	.37
	Within Groups	65.21	15	4.35		
	Total	85.34	19			

M A K A S S A R

Lampiran 4. Hasil Uji Lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) atau LSD Performa dan *Income Over Feed Cost* Broiler yang Diberikan Bungkil Inti Sawit (*palm kernel meal*).

Dependent Variable	(I) BUNGKIL INTI SAWIT	(J) BUNGKIL INTI SAWIT	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
IOFC	R0	R1	2,084.01	715.46	.01	559.04	3,608.97
		R2	808.37	715.46	.28	-716.59	2,333.33
		R3	2,048.56	715.46	.01	523.59	3,573.52
		R4	1,908.69	715.46	.02	383.73	3,433.66
	R1	R0	-2,084.01	715.46	.01	-3,608.97	-559.04
		R2	-1,275.64	715.46	.09	-2,800.60	249.33
		R3	-35.45	715.46	.96	-1,560.42	1,489.51
		R4	-175.31	715.46	.81	-1,700.28	1,349.65
	R2	R0	-808.37	715.46	.28	-2,333.33	716.59
		R1	1,275.64	715.46	.09	-249.33	2,800.60
		R3	1,240.19	715.46	.10	-284.78	2,765.15
		R4	1,100.32	715.46	.14	-424.64	2,625.29
	R3	R0	-2,048.56	715.46	.01	-3,573.52	-523.59
		R1	35.45	715.46	.96	-1,489.51	1,560.42
		R2	-1,240.19	715.46	.10	-2,765.15	284.78
		R4	-139.86	715.46	.85	-1,664.83	1,385.10
	R4	R0	-1,908.69	715.46	.02	-3,433.66	-383.73
		R1	175.31	715.46	.81	-1,349.65	1,700.28
		R2	-1,100.32	715.46	.14	-2,625.29	424.64
		R3	139.86	715.46	.85	-1,385.10	1,664.83
PAHA	R0	R1	1.51	1.24	.24	-1.12	4.15
		R2	.27	1.24	.83	-2.37	2.90
		R3	3.08	1.24	.03	.44	5.71
		R4	3.65	1.24	.01	1.02	6.29
	R1	R0	-1.51	1.24	.24	-4.15	1.12
		R2	-1.25	1.24	.33	-3.88	1.39
		R3	1.57	1.24	.23	-1.07	4.20
		R4	2.14	1.24	.10	-.50	4.78
	R2	R0	-.27	1.24	.83	-2.90	2.37
		R1	1.25	1.24	.33	-1.39	3.88
		R3	2.81*	1.24	.04	.17	5.45
		R4	3.39*	1.24	.02	.75	6.02
	R3	R0	-3.08	1.24	.03	-5.71	-.44
		R1	-1.57	1.24	.23	-4.20	1.07
		R2	-2.81*	1.24	.04	-5.45	-.17
		R4	.58	1.24	.65	-2.06	3.21
	R4	R0	-3.65	1.24	.01	-6.29	-1.02
		R1	-2.14	1.24	.10	-4.78	.50
		R2	-3.39	1.24	.02	-6.02	-.75
		R3	-.58	1.24	.65	-3.21	2.06

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN (UIN) MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN ILMU PETERNAKAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II : Jl. H.M.Yasin Limpo No. 36, Romang polog-Gowa, (0411) 882862

SURAT KETERANGAN UJI PLAGIARISME

Nomor Paper: 1696384184/XI/2021

Pengelola Jurnal/karya tulis ilmiah Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	: M. Irvan Alfawzi
NIM	: 60700117048
Program	: Strata I (S1)
Jurusan	: Ilmu Peternakan
Pembimbing	: 1. Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt.,M.P 2. Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si


Judul Skripsi:

Performa dan Income Over Feed Cost Broiler yang Diberikan Bungkil Inti Sawit (Palm Kernel Meal)


Dinyatakan telah diperiksa/dicek dengan menggunakan Aplikasi pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dengan hasil uji Plagiasi sebesar **20%**. Demikian Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian Skripsi.*

Gowa, 11 November 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan


Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt.,M.P
NIP. 19750909 200912 1 001

Tim Uji Plagiasi


Muh. Arsan Jami, S.Pt., M.Si.
NIP. 19891217 201903 1 012

Catatan:	
1-24%	: "Tidak Terindikasi Plagiat"
25-49%	: "Revisi Minor, Konsultasikan dengan Pembimbing"
50-74%	: "Revisi Mayor, Konsultasikan dengan pembimbing"
75-100%	: "Revisi Total"

Performa_dan_Income_Over_Feed_Cost_Broiler_yang_Diberi...

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
2	quranhadits.com Internet Source	1%
3	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	1%
4	indonesiabibit.blogspot.com Internet Source	1%
5	online-journal.unja.ac.id Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	123dok.com Internet Source	1%
8	core.ac.uk Internet Source	1%
9	repo.unand.ac.id Internet Source	1%

10	www.scribd.com Internet Source	<1 %
11	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
12	eprints.unram.ac.id Internet Source	<1 %
13	docobook.com Internet Source	<1 %
14	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
16	nanopdf.com Internet Source	<1 %
17	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
18	veithzalrifai.wordpress.com Internet Source	<1 %
19	jrip.fp.unila.ac.id Internet Source	<1 %
20	docplayer.info Internet Source	<1 %
21	muslimsatu.com	

Internet Source

<1 %

22

scholar.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

23

adoc.pub

Internet Source

<1 %

24

jurnal.untad.ac.id

Internet Source

<1 %

25

repository.unhas.ac.id

Internet Source

<1 %

26

ojs.uho.ac.id

Internet Source

<1 %

27

ubb.ac.id

Internet Source

<1 %

28

usupress.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

29

download.garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1 %

30

Alfian Y. Nuraga, Florencia N. Sompie, Youdhie H. S. Kowel, Mursye N. Regar. "PENGARUH PENGGANTIAN SEBAGIAN JAGUNG DENGAN SILASE KULIT PISANG KEPOK (*Musa paradisiaca formatypica*) DALAM RANSUM TERHADAP PERFORMANS AYAM BROILER", ZOOTEK, 2018

<1 %

31	agribiznetwork.com Internet Source	<1 %
32	risalahmuslim.id Internet Source	<1 %
33	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
34	Irfan Danis Woro, Umiyati Atmomarsono, Rina Muryani. "Pengaruh Pemeliharaan pada Kepadatan Kandang yang Berbeda Terhadap Performa Ayam Broiler", Jurnal Sain Peternakan Indonesia, 2019 Publication	<1 %
35	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
36	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
37	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
38	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
39	doku.pub Internet Source	<1 %
40	fapet.ub.ac.id Internet Source	<1 %

- | | | |
|----|--|------|
| 41 | pt.scribd.com
Internet Source | <1 % |
| 42 | zombiedoc.com
Internet Source | <1 % |
| 43 | peternakan.unja.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 44 | www.gurupendidikan.co.id
Internet Source | <1 % |
| 45 | Submitted to Universitas Muhammadiyah
Sinjai
Student Paper | <1 % |
| 46 | medpub.litbang.pertanian.go.id
Internet Source | <1 % |
| 47 | U. Latifah, S. Kismiati, Sutopo Sutopo.
"Pengaruh Lama Penyimpanan Telur Tetas
Ayam Kedu Jengger Merah terhadap Kualitas
Interior Telur", Jurnal Sain Peternakan
Indonesia, 2020
Publication | <1 % |
| 48 | Dian Hidayatullah, Yosi Fenita, Endang
Sulistiyowati. "Efek Penggunaan Tepung
Limbah Biji Durian Fermentasi Dalam Ransum
Ayam Broiler Terhadap Performans Dan
Income Over Feed Cost (lofc) Ayam Broiler",
Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 2019 | <1 % |

49 ekasetiawanfapetunja.blogspot.com <1 %
Internet Source

50 www.slideshare.net <1 %
Internet Source

51 ejurnal.bppt.go.id <1 %
Internet Source

52 jurnalpolitanipyk.ac.id <1 %
Internet Source

53 Indriani Antarani, J.T. Laihad, Z. Poli, P.R.R.I. Montong. "PENAMPILAN KARKAS AYAM PEDAGING DENGAN PEMBERIAN KULIT KOPI (Coffea sp) PENGOLAHAN SEDERHANA SUBSTITUSI SEBAGIAN JAGUNG DENGAN LEVEL YANG BERBEDA", ZOOTEK, 2020 <1 %
Publication

54 Submitted to Udayana University <1 %
Student Paper

55 e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id <1 %
Internet Source

56 ejournal.unib.ac.id <1 %
Internet Source

57 garuda.ristekdikti.go.id <1 %
Internet Source

58

Anggraeni Anggraeni, Ristika Handarini, Shena Widiyantoro. "MORFOMETRYC PERCENTAGE OF GIBLET MOJOSARI ALABIO DUCK THAT GIVEN SALAM LEAF EXTRAC (SYZIGIUM POLIANTUM) IN DRINKING WATER", JURNAL PETERNAKAN NUSANTARA, 2019

Publication

<1 %

59

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

60

ekasetiawansetiawan.wordpress.com

Internet Source

<1 %

61

hobiternak.com

Internet Source

<1 %

62

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

63

Berta Putri, Siti Hudaidah, Widi Indra Kesuma. "PEMANFAATAN BUNGKIL INTI SAWIT SEBAGAI MEDIA PERTUMBUHAN CACING SUTRA (Tubifex sp.)", e-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan, 2018

Publication

<1 %

64

J.R. Leke, F.N. Sompie, F.J. Nangoy, B. Haedar, E.H.B. Sondakh. "Kualitas internal telur ayam ras MB 402 yang diberi tepung bawang putih (allium sativum l) sebagai feed additive dalam ransum", ZOOTEK, 2021

Publication

<1 %

65 Z. Lantowa, J.J.M.R. Londok, M.R. Imbar. "Pengaruh Pembatasan pakan terhadap performa ayam pedaging strain yang berbeda", ZOOTEK, 2021
Publication <1 %

66 Submitted to Nottingham Trent University
Student Paper <1 %

67 Siti Mariyam, Syahrio Tantalo, Riyanti, dan Dian Septinova. "PENGARUH KEPADATAN KANDANG TERHADAP KONSUMSI RANSUM, PERTAMBAHAN BERAT TUBUH, DAN KONVERSI RANSUM BROILER UMUR 14-28 HARI DI CLOSED HOUSE", Jurnal Riset dan Inovasi Peternakan (Journal of Research and Innovation of Animals), 2020
Publication <1 %

68 misaelpasaribu.blogspot.com
Internet Source <1 %

69 nanosmartfilter.com
Internet Source <1 %

70 www.jlsuboptimal.unsri.ac.id
Internet Source <1 %

71 www.newsriau.com
Internet Source <1 %

72 Sintia Tempomona, Betty Bagau, Fenny R. Wolayan, Mursye N. Regar. "PENGARUH <1 %

PENGGANTIAN SEBAGIAN RANSUM BASAL
DENGAN TEPUNG DAUN PEPAYA (*Carica
papaya* L) TERHADAP PERFORMANS AYAM
PEDAGING", ZOOTEK, 2020

Publication

73

Yolanda S. Mait, J.E.G. Rompis, B. Tulung, J. Laihad, J.J.M.R. Londok. "PENGARUH PEMBATASAN PAKAN DAN SUMBER SERAT KASAR BERBEDA TERHADAP BOBOT HIDUP, BOBOT KARKAS DAN POTONGAN KOMERSIAL KARKAS AYAM BROILER STRAIN LOHMAN", ZOOTEK, 2019

Publication

<1 %

74

Yona Chintya Salma, Maisuranti Maisuranti. "Penggunaan Bungkil Kelapa Fermentasi Dengan *Trichoderma Harzianum* Dalam Ransum Untuk Performa Broiler", *Journal of Livestock and Animal Health*, 2018

Publication

<1 %

75

efatalogos735u5.blogspot.com

Internet Source

<1 %

76

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

77

fapet.ugm.ac.id

Internet Source

<1 %

78

jurnal.polbangtanyoma.ac.id

Internet Source

<1 %

79	kulyahinternet.blogspot.com Internet Source	<1 %
80	repository.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
81	www.freepatentsonline.com Internet Source	<1 %
82	www.menlh.go.id Internet Source	<1 %
83	www.ternakpertama.com Internet Source	<1 %
84	Fatkur Rohman, Ristika Handarini, Hanafi Nur. "PERFORMANCE OF QUAILS (Coturnix-coturnix japonica) GIVEN DRINK CONTAINING MORINGA LEAF SOLUTION IN THEIR GROWING PERIOD", JURNAL PETERNAKAN NUSANTARA, 2019 Publication	<1 %
85	Nurrohman, A., Yuniyanto, V. D., Mangisah, I. "Penggunaan Tepung Biji Alpukat dan Pengaruhnya Terhadap Kecernaan Lemak Kasar dan Energi Metabolis Ransum Ayam Broiler", Jurnal Pengembangan Penyuluhan Pertanian, 2015 Publication	<1 %
86	Zulkifli Talib, P.R.R.I. Montong, Z. Poli, C.L.K. Sarayar. "PENGARUH LIMBAH KULIT KOPI	<1 %

PENGOLAHAN SEDERHANA DENGAN LEVEL
SUBSTITUSI SEBAGIAN JAGUNG TERHADAP
PENAMPILAN PRODUKSI AYAM PEDAGING",
ZOOTEC, 2020

Publication

87

livestock-livestock.blogspot.com

Internet Source

<1 %

88

archive.org

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M.Irvan Alfawzi
NIM : 60700117048
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul Skripsi : Performa dan *Income Over Feed Cost* Broiler yang Diberikan Bungkil Inti Sawit (*Palm Kernel Meal*)
Pembimbing II : Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.

No	Hari/Tanggal	Uraian	Paraf	
			Pembimbing	Mahasiswa
1.	Kamis, 14 Januari 2021	Konsultasi judul		
2.	Jum'at, 05 Februari 2021	Konsultasi 1 : Bab 3 Metode Penelitian		
3.	Sabtu, 13 Maret 2021	Konsultasi 2 : Bab 1, 2 dan 3		
4.	Selasa, 06 April 2021	Seminar proposal		
5.	Kamis, 17 Juni 2021	Konsultasi 1 : Data Hasil Penelitian		
6.	Senin, 12 Juli 2021	Konsultasi 2 : Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka		
7.	Jum'at, 23 Juli 2021	Konsultasi 3 : Skripsi lengkap		
8.	Jum'at, 06 Agustus 2021	Seminar Hasil Penelitian		
9.	Jum'at, 13 Agustus 2021	Konsultasi 1: Revisi hasil penelitian berdasarkan saran-saran penguji		
10.	Rabu, 18 Agustus 2021	Ujian Munaqasyah		








Samata, 03 November 2021

Mengetahui
Ketuan Jurusan Ilmu Peternakan


Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.
NIP. 19750909 200912 1 001

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M.Irvan Alfawzi
NIM : 60700117048
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul Skripsi : Performa dan *Income Over Feed Cost* Broiler yang Diberikan Bungkil Inti Sawit (*Palm Kernel Meal*)
Pembimbing II : Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si.

No	Hari/Tanggal	Uraian	Paraf	
			Pembimbing	Mahasiswa
1.	Selasa, 05 Januari 2021	Konsultasi judul	f	
2.	Sabtu, 06 Februari 2021	Konsultasi 1 : Bab 1, 2 dan 3	f	
3.	Sabtu, 13 Maret 2021	Konsultasi 2 : Bab 1, 2 dan 3	f	
4.	Selasa, 06 April 2021	Seminar proposal	f	
5.	Selasa, 22 Juni 2021	Konsultasi 1 : Data Hasil Penelitian	f	
6.	Kamis, 01 Juli 2021	Konsultasi 2 : Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka	f	
7.	Kamis, 29 Juli 2021	Konsultasi 3 : Skripsi lengkap	f	
8.	Jum'at, 06 Agustus 2021	Seminar Hasil Penelitian	f	
9.	Senin, 16 Agustus 2021	Konsultasi 1: Revisi hasil penelitian berdasarkan saran-saran penguji	f	
10.	Rabu, 18 Agustus 2021	Ujian Munaqasyah	f	

Samata, 03 November 2021

Mengetahui
Ketuan Jurusan Ilmu Peternakan


Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.
NIP. 19750909 200912 1 001



UIN ALAUDDIN
MAKASSAR

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2214 TAHUN 2020



TENTANG

PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA **M. IRVAN ALFAWSI** JURUSAN **ILMU PETERNAKAN**
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar tanggal 27 November 2020 tentang Penerbitan SK Pembimbing mahasiswa atas nama M. Irvan Alfawsi NIM 60700117048, Untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : "Pengaruh Penambahan Tepung Daun Kersen (*Montingia Calahura*) Dalam ransum Terhadap Pertambahan Berat Badan Serta Kandungan Kolesterol Daging Ayam Broiler"
- b. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Dekan.
- c. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 226.D tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

Pemrakarsa	Kasubag. Akademik
Paraf : 	Paraf: 

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI ATAS NAMA **M. IRVAN ALFAWSI** JURUSAN **ILMU PETERNAKAN** FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk saudara :
1. Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P. sebagai Pembimbing Pertama,
 2. Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si. sebagai Pembimbing Kedua,
- KEDUA : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Gowa

Pada Tanggal 2 Desember 2020

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



MUHAMMAD ALIFAH MUSTAMI

RIWAYAT HIDUP



M. Irvan Alfawzi lahir di Margolembo, 25 Oktober 1998. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan dari bapak Arifin dan ibu Suryani. Kediaman orang tuanya berada di Desa Sindu Agung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di SDN 157 Sindu Agung dan lulus pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mangkutana dan lulus pada tahun 2013. Kemudian di tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Mangkutana, mengambil program studi IPA dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus dari SMA tersebut, pada tahun 2017 melalui jalur UMM penulis lulus masuk Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, mengambil program studi Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi. Alhamdulillah berkat Do'a, kerja keras dan kegigihan penulis dapat menyelesaikan kuliah Strata satu (S1) pada tahun 2021, sehingga mendapatkan gelar Sarjana Peternakan (S.Pt.).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R