

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL
DENGAN PERSALINAN NORMAL
(Literatur Review)**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya
Diploma Kebidanan di Universitas Islam Negeri
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

Oleh:

NUR AFNI WULANDARI

NIM : 70400115038

**JURUSAN DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAAR
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Afni Wulandari

Nim : 70400115038

Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 29 Agustus 1997

Jurusan/Prodi : Kebidanan

Fakultas/Program : Kedokteran dan ilmu Kesehatan

Alamat : Samata, Gowa

Judul : Manajemen Asuhan kebidanan Intranatal dengan
Persalinan Normal

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa Karya Tulis ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti duplikat, tiruan. Plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka Karya Tulis ilmiah (KTI) dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa

Penulis

Nur Afni Wulandari

70400115038

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nur Afni Wulandari

Nim : 70400115038

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal dengan Persalinan Normal

Karya Tulis Ilmiah ini telah diselesaikan untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya tulis Ilmiah jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 19 Februari 2021

Pembimbing I



Firdavanti, S.ST., M.Keb

NIP : 19751113 200604 2 001

Pembimbing II



dr. Rini Fitriani, M.Kes

NIP : 1980008 200801 2 021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal dengan Persalinan Normal". Yang disusun oleh Nur Afni Wulandari Nim : 70400115038. Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan.

Samata 19 Februari 2021

07 Rajab 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Sitti Saleha, S.ST., SKM., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Firdayanti, S.SiT., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Rini Fitriani, M.Kes	(.....)
Penguji I	: Nurfaiza Alza, S.ST., M.Keb	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP : 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasurullah SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah Literatur Review ini dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Dengan Persalinan Normal”. KTI ini diajukan kepada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan.

Karya Tulis Ilmiah ini, penulis persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah tulus, ikhlas dan sabar dalam memberi nasehat, kasih sayang, cinta, perhatian dan senantiasa selalu berdo'a agar penulis sukses dalam menggapai mimpi. Serta keluarga lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dari awal sampai sekarang yang membuatku semakin berjuang untuk menggapai gelar ini.

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kepada Bapak prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

2. Kepada Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp(A), M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar.
3. Ibunda Firdayanti, S.ST.M.Keb selaku ketua Jurusan Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan selaku pembimbing I, yang telah meluangkan banyak waktu demi membantu, membimbing dan memberikan saran yang membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (*Literatur Review*).
4. Ibunda dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku pembimbing II, yang telah meluangkan banyak waktu demi membimbing dan memberi saran yang membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (*Literatur Review*).
5. Ibunda Nurfaiza Alza., S.ST., M.Keb selaku penguji I, yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan dalam mengoreksi dan memberikan saran yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan Karya Tulis Ilmiah (*Literatur Review*).
6. Kepada Dr. Rahmi Damis, M.Ag selaku penguji II, yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan Karya tulis Ilmiah (*Literatur Review*).
7. Segenap dosen terkhususnya para dosen Prodi Kebidanan dan para staf Akademik Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membantu dan membimbing selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (*Literatur review*).

8. Kepada yang tercinta dan terkasih kedua orang tua saya serta saudara-saudaraku dan orang-orang yang berada disekeliling saya yang selalu memberikan dukungan moral dan materi serta doa kepada penulis.

9. Kepada semua teman-teman Kebidanan khususnya angkatan 2015 serta teman yang lain diluar sana yang telah memberikan dukungan dan dorongan berupa semangat dan membantu penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (*Literatur Review*).

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan perkembangan ilmu di bidang Kebidanan pada umumnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini , masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang membangun dari segala pihak guna untuk kesempurnaa Karya Tulis Ilmiah ini.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Samata-Gowa, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Ruang lingkup pembahasan	6
C. Tujuan penulisan	6
1. Tujuan Umum	6
2. Tujuan Khusus	6
D. Manfaat penulisan.....	7
1. Manfaat Institusi	7
2. Manfaat Bagi Penulis	8
E. Metode penulisan	8

1. Studi Kepustakaan	8
F. Sistematika penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Persalinan.....	10
1. Pengertian Persalinan	10
2. Patofisiologi Persalinan	11
3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persalinan	13
4. Tahap-Tahap Persalinan	16
B. Teori Manajemen Kebidanan.....	45
1. Pengertian Manajemen Kebidanan	51
2. Tahapan Dalam Manajemen Kebidanan	51
C. Manajemen Asuhan Kebidanan	66
D. Tinjauan Keislaman	67

BAB III TELUSURAN *EVIDANCE BASED LEARNING*

A. Matriks langkah I	70
B. Matriks langkah II.....	76
C. Matriks langkah III.....	82
D. Matriks langkah IV	88
E. Matriks langkah V.....	99
F. Matriks langkah VI	108
G. Matriks langkah VII	115

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil telaah Evidance Based Asuhan 7 Langkah varney berdasarkan Hasil penelusuran Referensi	122
1. Langkah I : Identifikasi Data Dasar	122
2. Langkah II : Perumusan Diagnosis/Masalah Aktual	125
3. Langkah III : Perumusan Diagnosis/Masalah Potensial	129
4. Langkah IV : Tindakan Emergency/Kolaborasi.....	133
5. Langkah V : Rencana Tindakan	137
6. Langkah VI : Implementasi	142
7. Langkah VII : Evaluasi	145
B. Implikasi Kebidanan	149

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	152
B. Saran.....	153

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	13
Gambar 2. 2	25
Gambar 2. 3	26
Gambar 2. 4	27
Gambar 2. 5	27
Gambar 2. 6	28
Gambar 2. 7	29
Gambar 2. 8	29
Gambar 2. 9	30
Gambar 2. 10	42

ABSTRACT

Midwifery Department
UIN Alauddin Makassar
Scientific Paper, January 2021

Name : Nur Afni Wulandari
Reg. Number : 70400115038
Supervisor I : Firdayanti
Supervisor II : Rini Fitriani
Title : **Intranatal Midwifery Care Management on Patients with Normal Delivery (A Literature Review)**

Childbirth, also known as labour or delivery, is the ending process of pregnancy where one or more babies leave the uterus to the outside world. Normal delivery is a process of labor that occurs at weeks 37-42 of pregnancy. In normal delivery, babies leave the uterus by passing through birth canal that lasts within 18 hours. A delivery could be also considered to be normal when no complications are found in both the mother and the fetus.

One of the main factors that influence the success of the delivery process is the mother factor (power, passage, psychological). Other factors that may also play an important role in the success of childbirth are the fetus, placenta and amniotic fluid (passengers), and health workers. In terms of the stages of labor, stage I is divided into 2 phases, namely the latent phase and the active phase. Stage II is a phase of a complete opening until the release of the baby. Stage III is the phase of the birth of the baby to the birth of the placenta. Furthermore, stage IV is the phase of the birth of the placenta to 2 hours after the delivery.

The major objective of this study was to understand Intranatal Midwifery Care management with Normal Delivery. The method used in this study was a literature review. The research data were collected by tracing references such as books, journals, and internet media related to normal delivery.

Key Words: Delivery, Delivery Factors, Stages of Delivery.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persalinan normal merupakan proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan / kekuatan sendiri. Persalinan merupakan hubungan saling mempengaruhi antara dorongan psikologi dan fisiologis dalam diri wanita dengan pengaruh dorongan pada proses kelahiran bayi (Rapida Saragih, dkk.2020).

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil menjadi berisiko mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan antara lain adalah ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria, empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu dekat jaraknya, terlalu banyak anaknya) dan anemia yaitu kadar hemoglobin <11 g/dL (Kemenkes, 2015). Penyebab tingginya angka kematian ibu antara lain, terlalu muda atau terlalu tua saat melahirkan, tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, dan banyaknya persalinan yang ditolong oleh tenaga non professional (Koblinsky, 2010:10).

Di Afrika penyebab tingginya kematian ibu dikarenakan kurangnya tenaga kesehatan yang terampil dalam membantu proses persalinan sehingga hal tersebut

menjadi penyebab utama kematian ibu pada daerah tersebut. Dengan demikian, *intra-partum* yang meliputi persalinan yang ditolong

oleh tenaga kesehatan yang terampil sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu pada ibu (Abdurrahman, dkk, 2016:64).

Pada permasalahan tersebut pemerintah membentuk program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan kelanjutan dari *Millenium Develotment Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Menurut kemenkes RI (2015), terdapat 17 tujuan SDGs yang salah satu tujuannya adalah Sistem Kesehatan Nasional yaitu pada *Goals* ke 3 menerangkan bahwa pada 2030 mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup, mengakhirikematian premature akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental dan menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana (KB), informasi dan edukasi serta integrasi dan program nasional (Kemenkes RI, 2015).

Standar pelayanan kebidanan, bidan memberikan Asuhan Persalinan Normal (APN) yang merupakan bagian dari standar pelayanan kebidanan. Bidan harus menerapkan Asuhan Persalinan Normal (APN) pada setiapibu bersalin,sebagai dasarnya dalam melakukan pertolongan persalinan bidan harus mengacu pada Permenkes RI No 1464/Menkes/Pe/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan (Kemenkes, 2010).

Banyak penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa ibu-ibu di Indonesia tidak mau meminta pertolongan tenaga terlatih untuk memberikan asuhan persalinan dan melahirkan bayi. Sebagian dari mereka beralasan bahwa penolong terlatih tidak memperhatikan kebudayaan, tradisi dan keinginan pribadi pada ibu dalam persalinan dan kelahiran bayinya. Penyebab lain dari utilisasi atau pemanfaatan fasilitas kesehatan adalah peraturan yang rumit dan prosedur yang tak bersahabat/menakutkan bagi para ibu. Persalinan normal bukan hanya terjadi berlangsung normal tetapi ada komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi salah satu komplikasinya dalam persalinan normal yaitu kala I memanjang, kala II lama, kala III bisa terjadi atonia uteri dan kala IV bisa terjadi perdarahan post partum.

Angka kematian ibu (AKI) adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Menurut data *World Health Organization* (WHO), angka kematian ibu di dunia pada tahun 2015 adalah 216 per 100.000 kelahiran hidup atau diperkirakan jumlah kematian ibu adalah 303.000 kematian dengan jumlah tertinggi berada di negara berkembang yaitu sebesar 302.000 kematian. Angka kematian ibu di negara berkembang 20 kali lebih tinggi dibandingkan angka kematian ibu di negara maju yaitu 239 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan di negara maju hanya 12 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (WHO, 2015).

Kematian ibu di Indonesia tahun 2013 masih didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu perdarahan sebesar 30,13%, hipertensi dalam kehamilan sebesar 27,1%, dan infeksi sebesar 7,3%. Partus lama juga merupakan

salah satu penyebab kematian ibu di Indonesia yang angka kejadiannya terus meningkat yaitu 1% pada tahun 2010, 1,1 % pada tahun 2011, dan 1,8% pada tahun 2012. (Kemenkes RI, 2016).

Komplikasi selama kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan di antara wanita usia reproduksi di negara berkembang, komplikasi yang menyebabkan hampir 75% dari semua kematian ibu adalah perdarahan hebat, infeksi, tekanan darah tinggi selama kehamilan, aborsi yang tidak aman, dan penyakit selama kehamilan (WHO, 2018 dalam Masniati, dkk.2020).

Salah satu target SDGs (*Sustainable Development Goals*) periode 2016-2030 adalah pada tahun 2030 mengurangi rasio kematian ibu melahirkan global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data Riskesdas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, AKI (Angka Kematian Ibu) di tahun 2017 sebanyak 1.712 kasus. Jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 yaitu sebanyak 39 dan Kabupaten Polewali Mandar menjadi Kabupaten dengan angka terbesar jumlah kasus kematian ibu yaitu sebanyak 11 orang (Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, 2017 dalam Masniati, dkk.2020).

Tahun 2014 tercatat jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 138 kasus. Di antaranya 44 kasus (31,88%) disebabkan karena perdarahan, 55 kasus (39,85%) karena hipertensi dalam kehamilan, 3 kasus (2,17%) karena infeksi, 2 kasus (1,44%) karena gangguan sistem peredaran darah

(jantung, stroke, dll), dan 34 kasus (24,63%) karena penyakit bawaan seperti hipertensi, asma, jantung, dan diabetes mellitus (Depkes Sul-Sel, 2016).

Proses kehamilan dan persalinan masih merupakan sesuatu yang berisiko dan dapat mengancam jiwa perempuan dan bayi di Indonesia. Hasil survei Penduduk Antar Sensus 2015 menyebutkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 305/ 100.000 KH. Pemerintah tetap berupaya untuk tetap menurunkan AKI sesuai dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu sebesar < 70 per 100.000 KH(Kemenkes RI, 2018 dalam Gustina.2019).

Pada tahun 2015 diketahui angka kematian bayi (0-27 hari) bayi di dunia akibat asfiksia adalah 4,6 per 1000 kelahiran hidup (636.948 kasus). Sedangkan angka kematian bayi (0-27 hari) akibat asfiksia di Indonesia ialah 2,9 per 1000 kelahiran hidup (15.990 kasus). Kematian neonatal terbanyak di ketahui 18,9 % dari kasus kematian neonatal di sebabkan oleh asfiksia. Sekitar satu juta bayi baru lahir mati (75 %) dalam 24 jam pertama, dan kematian terjadi pada minggu pertama kehidupan. Sekitar 7000 kematian bayi setiap harinya yaitu sebesar 47 % dari seluruh kematian anak di bawah usia 5 tahun. Salah satu penyebab kematian neonatal pada tahun 2016 yaitu karena kelahiran premature, terkait dengan komplikasi persalinan (asfiksia atau kurangnya pernapasan saat lahir), infeksi, dan cacat bawaan (WHO, 2018, dalam Rosmini dkk.2018).

Menurut hasil survey di RSUD Syekh Yusuf Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan jumlah persalinan normal yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 1956 perkelahiran hidup. Pada tahun 2015 jumlah persalinan normal

sebanyak 1804 perkelahiran hidup. Pada tahun 2016 jumlah persalinan normal sebanyak 1578 perkelahiran hidup. Dan pada tahun 2017 jumlah persalinan normal sebanyak 2642 perkelahiran hidup.

Upaya meningkatkan standar Asuhan Persalinan Normal (APN) di perlukan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang ada. Salah satu upaya yaitu perlunya bidan mengikuti pelatihan APN bagi yang belum pernah mengikuti.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus persalinan normal. Sehingga penulis menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan judul Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal dengan Persalinan Normal.

B. Ruang Lingkup pembahasan

Dalam pembahasan studi ini menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan intranatal pada ibu dengan persalinan normal.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Mampu menyusun literatur review dengan manajemen asuhan pada ibu dengan persalinan normal melalui pendekatan 7 langkah Varney.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penulisan literatur review asuhan kebidanan pada ibu dengan persalinan normal adalah:

- a. Mendapatkan data subjektif dan data objektif dari tanda-tanda persalinan normal dari berbagai referensi tentang persalinan normal.
- b. Mendapatkan hasil rumusan diagnosis dari berbagai referensi tentang persalinan normal.
- c. Mendapatkan informasi komplikasi yang bisa timbul dari berbagai referensi tentang persalinan normal.
- d. Mendapatkan informasi dari berbagai referensi tentang kondisi emergency yang dapat terjadi serta penanganannya pada persalinan normal.
- e. Mendapatkan simpulan dari berbagai referensi tentang intervensi apa saja penatalaksanaan yang tepat pada persalinan normal
- f. Mendapatkan penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan ke implementasi asuhan pada persalinan normal.
- g. Mendapatkan penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber kondisi yang menjadi dasar evaluasi pada persalinan normal.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan pada kasus di atas tersebut adalah :

1. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi institusi

Sebagai bahan bacaan dan acuan bagi peneliti berikutnya dibidang kesehatan, dalam proses peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus jurusan DIII kebidanan mengenai “Manajemen Asuhan pada ibu dengan persalinan normal.

b. Manfaat bagi pembaca

Sebagai sumber informasi dan menambah pengetahuan bagi para pembaca tentang Asuhan Persalinan Normal.

E. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :

1. Studi kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur, jurnal dan media internet yang berhubungan dengan persalinan normal.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu pendahuluan, akan menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan teoritis akan menguraikan mengenai tinjauan umum balita, tinjauan khusus persalinan normal, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Pada bab III yaitu telusuran evidence based learning, akan menguraikan tentang matriks 7 langkah Varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/ masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, pelaksanaan/implementasi dan evaluasi .

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang hasil telaah evidence based learning asuhan 7 langkah Varney berdasarkan hasil penelusuran referensi. Serta implikasi kebidanan mengenai persalinan normal berdasarkan seluruh referensi.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat data literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang persalinan

1. Pengertian persalinan

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus ke dunia luar. Persalinan dan kelahirannya merupakan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam waktu 18 jam, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin. (Jannah, 2015)

Persalinan adalah bagian dari proses melahirkan sebagai respons terhadap kontraksi uterus, segmen bawah uterus teregang dan menipis, serviks berdilatasi, jalan lahir terbentuk dan bayi bergerak turun ke bawah melalui rongga panggul. (Hanretty, 2014)

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (janin + uri) yang dapat hidup ke dunia luar dari dalam rahim melalui jalan lahir dengan LBK atau dengan tenaga ibu sendiri, tanpa bantuan alat-alat, serta tidak melukai ibu dan bayi, yang umumnya berlangsung kurang dari 24 jam (Mochtar, 2013).

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang cukup bulan (37-42 minggu), lahir secara spontan segera menangis dengan presentasi belakang kepala, di susul dengan

pengeluaran plasenta dan selaput ketuban dari jalan lahir dan tanpa komplikasi baik ibu maupun janin.

Bentuk-bentuk persalinan berdasarkan teknik

- a. Persalinan spontan, yaitu persalinan berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir.
- b. Persalinan buatan, yaitu persalinan dengan tenaga dari luar dengan ekstraksi forceps, ekstraksi vakum dan section cesar.
- c. Persalinan anjuran yaitu bila kekuatan yang diperlukan untuk persalinan di timbulkan dari luar dengan pemberian rangsangan. (Ai yeyeh,dkk. 2014).

2. Patofisiologi persalinan

- a. Tanda-tanda persalinan sudah dekat

- 1) Lightening

Padaminggu ke 36 pada primigravida terjadi penurunan fundus karena kepala bayi sudah memasuki pintu atas panggul yang di sebabkan oleh : kontraksi *Braxton hicks*, ketegangan otot, ketegangan *ligamentum rotundum* dan gaya berat janin kepalakearah bawah.


- 2) Terjadinya his permulaan

Makin tua usia kehamilan pengeluaran *progesterone* dan *estrogen* semakin berkurang sehingga oksitosin dapat menimbulkan kontraksi, yang lebih sering disebut dengan his palsu, sifat his palsu yaitu rasa nyeri ringan dibagian bawah, datangnya tidak teratur, tidak ada

perubahan *serviks*, durasinya pendek, tidak bertambah jika beraktivitas (Ai Nursiah, dkk. 2014).

b. Tanda-tanda persalinan

- 1) Timbulnya his persalinan ialah his pembukaan dengan sifat-sifatnya sebagai berikut : nyeri melingkar dari punggung memancar ke perut bagian depan, teratur, makin lama makin pendek intervalnya dan makin kuat intensitasnya, jika dibawa berjalan bertambah kuat, dan mempunyai pengaruh pada pendataran atau pembukaan serviks (Dewi setiawati. 2013).
- 2) Keluar lender bercampur darah yang lebih banyak karena robekan-robekan kecil pada serviks (Mochtar,2013)
- 3) Kadang ketuban pecah dengan sendirinya (Yuanita Syaiful dan Lilis Fatmawati. 2020).
- 4) Dengan pendataran dan pembukaan
Lender dari *canalis servikalis* keluar disertai dengan sedikit darah. Perdarahan yang sedikit disebabkan karena selaput janin pada bagian bawah *segmen* bawah rahim hingga beberapa kapiler terputus (Dewi Setiawati. 2013).



Gambar 2.1 Pendataran dan Pembukaan Serviks

(Annisa UI Mutmainnah, dkk. Asuhan Persalinan Normal dan Bayi Baru lahir. 2017).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan

Keberhasilan proses persalinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ibu (*power, passage, psikologis*). Faktor janin, plasenta dan air ketuban (*passenger*) dan faktor penolong persalinan. Hal ini sangat penting, mengingat beberapa kasus kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh tidak terdeteksinya secara dini adanya salah satu dari faktor-faktor tersebut.

a. *Power (Tenaga/kekuatan)*

1) His(Kontraksi Uterus)

Merupakan kekuatan kontraksi uterus karena otot-otot polos rahim bekerja dengan baik dan sempurna. Sifat his yang baik adalah kontraksi simetris, *fundus dominal*, terkoordinasi dan relaksasi. Kontraksi ini bersifat *involunter* karena berada dibawah saraf *intrinsic*. (Ai Nursiah, dkk. 2014).

2) Tenaga Mengedan

Tenaga mengedan atau power meliputi His (Kontraksi ritmis otot polos uterus), kekuatan mengejan ibu, keadaan kardiovaskular, respirasi, dan metabolic ibu. Ibu melakukan kontraksi involunter dan volunteer secara bersamaan untuk mengeluarkan janin dan plasenta dari uterus. Kontraksi uterus involunter, yang disebut kekuatan primer, menandai permulaan persalinan. Apabila serviks berdilatasi, usaha volunteer dimulai untuk mendorong, yang disebut kekuatan sekunder, yang memperbesar kekuatan kontraksi involunter.

- a) Kekuatan primer, membuat serviks menipis (effacement) dan berdilatasi dan janin turun. Penipisan serviks selama tahap pertama persalinan. Serviks, yang dalam kondisi normal memiliki 2 panjang 2 sampai 3 cm dan tebal sekitar 1 cm, terangkat ke atas karena terjadi pemendekan gabungan otot uterus selama penipisan segmen bawah Rahim pada tahap akhir persalinan.
- b) Kekuatan sekunder, sifat kontraksi yang berubah yakni sifat mendorong keluar. Ibu merasa ingin mengedan, usaha mendorong kebawah (Kekuatan sekunder) dibantu dengan usaha volunteer yang sama dengan yang dilakukan saat buang air besar (Mengejan). Usaha mendorong ke bawah (kekuatan sekunder) dibantu dengan usaha volunteer yang sama dengan usaha volunteer

yang sama dilakukan saat buang air besar (Mengedan). (Jannah. 2014).

b. Passage (Jalan Lahir)

Merupakan jalan lahir yang harus dilewati oleh janin terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, *serviks*, dan vagina. Syarat agar janin dan plasenta dapat melalui jalan lahir tanpa ada rintangan, maka jalan lahir tersebut harus normal (Widia. 2015).

c. Passenger (Janin dan plasenta)

1) Janin

Passenger atau janin bergerak sepanjang jalan lahir merupakan akibat interaksi beberapa faktor, yakni kepala janin, presentasi, letak, sikap dan posisi janin. (Ai Nursiah, dkk. 2014).

2) Plasenta

Plasenta juga harus melewati jalan lahir maka dia di anggap sebagai bagian dari passenger yang menyertai janin. Namun plasenta jarang menghambat proses persalinan normal. (Widia, 2015).

d. Psikis Ibu Bersalin

Psikis ibu bersalin sangat berpengaruh dari dukungan suami dan anggota keluarga yang lain untuk mendampingi ibu selama bersalin dan kelahiran anjurkan mereka berperan aktif dalam mendukung dan mendampingi langkah-langkah yang mungkin sangat membantu kenyamanan ibu, hargai keinginan ibu untuk di damping, dapat membantu

kenyamanan ibu, hargai keinginan ibu untuk didampingi. (Ai Yeyeh, dkk 2014).

e. Penolong

Penolong persalinan adalah petugas kesehatan yang mempunyai legalitas dalam menolong persalinan antara lain dokter, bidan serta mempunyai kompetensi dalam menolong persalinan, menangani kegawatdaruratan serta melakukan rujukan jika diperlukan. Penolong persalinan selalu menerapkan upaya pencegahan infeksi yang dianjurkan termasuk diantaranya cuci tangan, memakai sarung tangan dan perlengkapan pelindung pribadi serta pendokumentasian alat bekas pakai. (Ai Yeyek, dkk. 2014).

4. Tahap-tahap persalinan

a. Kala I (pembukaan)

1) Pengertian Kala I

Persalinan kala I meliputi fase pembukaan 1-10 cm, yang ditandai dengan penipisan dan pembukaan *serviks*, kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan *serviks* (frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit), cairan lender bercampur darah (*show*) melalui vagina. Dara berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler serta kanalis servikalis karena pergeseran *serviks* mendatar dan terbuka. (Ai Nursiah, dkk. 2014).

Kala I dibagi menjadi dua fase yaitu :

- a) Fase laten, dimana pembukaan serviks berlangsung lambat dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan secara bertahap sampai pembukaan 3 cm, berlangsung selama 7-8 jam.
- b) Fase aktif (pembukaan serviks 4-10 cm), berlangsung selama 6 jam dan dibagi dalam 3 subfase :
 - (1) Periode akselerasi, berlangsung selama 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm.
 - (2) Periode dilatasi maksimal, berlangsung selama 2 jam, pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm.
 - (3) Periode fase deselerasi berlangsung lambat, dalam 2 jam pembukaan jadi 10 cm atau lengkap. (Nurul, 2017).

Pada fase aktif persalinan, frekuensi dan lama kontraksi uterus umumnya meningkat (kontraksi di anggap adekuat jika terjadi 3 kali atau lebih dalam 10 menit dan berlangsung selama 40 detik atau lebih) dan terjadi penurunan bagian terbawah janin. Dari pembukaan 4 hingga mencapai pembukaan lengkap atau 10 cm, akan terjadi dengan kecepatan rata-rata per jam (primipara) atau lebih 1 cm hingga 2 cm (multipara). (Ai Nursiah, dkk. 2014).

2) Perubahan Fisiologi kala I

a) Perubahan tekanan darah

Tekanan darah akan meningkat selama kontraksi disertai peningkatan sistolik rata-rata 10-20 mmHg dan diastolic rata-rata 5-10 mmHg. Pada waktu-waktu diantara kontraksi tekanan darah kembali ke tingkat sebelum persalinan. Dengan mengubah posisi ibu dari posisi terlentang ke posisi miring, perubahan tekanan darah selama kontraksi dapat dihindari. Nyeri, rasa takut dan kekhawatiran dapat semakin meningkatkan tekanan darah.

b) Perubahan Denyut nadi

Perubahan denyut nadi pada ibu bersalin mengalami perubahan yang lebih mencolok selama kontraksi. Frekuensi denyut nadi diantara kontraksi sedikit lebih meningkat dibanding selama periode menjelang persalinan.

c) Perubahan suhu badan

Perubahan suhu sedikit meningkat selama persalinan dan tertinggi selama dan segera setelah melahirkan. Perubahan suhu dianggap dalam batas nilai normal, apabila peningkatan suhu yang tidak lebih dari $0,5-1^{\circ}\text{C}$ yang mencerminkan peningkatan metabolisme selama persalinan.

d) Pernafasan

Peningkatan frekuensi pernafasan normal selama persalinan dan mencerminkan peningkatan metabolisme yang terjadi. Hiperventilasi yang memanjang adalah temuan abnormal dan dapat menyebabkan alkalosis (rasa kesemutan pada ekstremitas dan perasaan pusing).

e) Perubahan Metabolisme

Selama persalinan metabolisme karbohidrat aerobik maupun anaerobik akan naik secara perlahan, peningkatan ini sebagian besar karena kecemasan, peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, pernafasan, denyut jantung dan cairan yang hilang.

f) Perubahan pada ginjal

Poliuria sering terjadi selama persalinan karena diakibatkan peningkatan curah jantung selama persalinan dan peningkatan laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal. Poliuria menjadi kurang jelas pada posisi terlentang karena posisi terlentang dapat membuat aliran urine berkurang selama persalinan.

g) Perubahan pada ginjal

Kemampuan gerakan gastrik serta penyerapan makanan berkurang karena akan menyebabkan pencernaan hampir berhenti selama persalinan dan menyebabkan konstipasi.

h) Perubahan hemoglobin

Hemoglobin meningkat rata-rata 1,2 gr/100 ml selama persalinan kembali ke kadar sebelum persalinan pada hari pertama pasca partum.

3) Perubahan Psikologis Kala I

Perubahan psikologi pada ibu bersalin selama kala I yaitu :

- a) Memperlihatkan ketakutan atau kecemasan, yang menyebabkan wanita mengartikan ucapan pemberi perawatan atau kejadian persalinan secara pesimistik atau negative.
- b) Mengajukan banyak pertanyaan atau sangat waspada terhadap sekelilingnya.
- c) Memperlihatkan tingkah laku saat membutuhkan.
- d) Memperlihatkan reaksi keras terhadap kontraksi ringan atau terhadap pemeriksaan.
- e) Menunjukkan kebutuhan yang kuat untuk mengontrol tindakan pemberi perawatan.
- f) Tampak lepas control dalam persalinan saat nyeri hebat, menggeliat kesakitan, panik, menjerit, tidak merespon saran atau pertanyaan yang membantu.
- g) Respon melawan atau menghindari yang di picu oleh adanya bahaya fisik, ketakutan, kecemasan dan bentuk stress lainnya.

(Widia. 2015).

4) Masalah dan penyulit kala I

Apabila dalam proses persalinan terdapat indikasi-indikasi baik dari ibu, kondisi janin dan kemajuan persalinan. Maka seorang bidan harus konsultasi, kolaborasi dan rujukan ke tempat pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Indikasi-indikasi untuk melakukan tindakan dan melakukan rujukan segera selama persalinan :

- a) Tekanan darah $>140/90$ mmHg, lakukan rujukan segera, selama dalam perjalanan ke tempat rujukan, baringkan ibu dalam posisi miring kea rah kiri sambil difus dan larutan D5%.
- b) Suhu tubuh $>38^{\circ}\text{C}$ sebelum melakukan rujukan berikan ibu banyak minum dan beri antibiotic.
- c) DJJ <100 atau >160 x/menit segera lakukan posisi ibu menjadi tidur miring ke kiri, berikan oksigen, lakukan dehidrasi selama DJJ kembali normal, bila DJJ tetap abnormal segera lakukan rujukan.
- d) Kontraksi <2 x dalam 10 menit dan berlangsung <40 detik, lakukan perubahan posisi tidur, kosongkan kandung kemih, lakukan stimulasi putting susu, berikan asupan nutrisi, dan apabila melewati tidak ada kemajuan lakukan rujukan.

- e) Pembukaan serviks yang melewati garis waspada, segera rujuk dan beri hidrasi selama perjalanan menuju tempat rujukan.
- f) Cairan ketuban yang bercampur darah dengan mikonium/darah/berbau/kering, lakukan rujukan dengan segera.
- g) Bagian terendah janin yang tidak ada penurunan sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan rujukan. (Naomy. 2013).

5) Partograf

Partograf adalah alat bantu untuk mencatat informasi berdasarkan observasi, anamnesis, dan pemeriksaan fisik ibu dalam persalinan, dan sangat penting khususnya untuk membuat keputusan klinik selama kala I persalinan.

Tujuan utama menggunakan partograf adalah untuk mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan *serviks* melalui pemeriksaan dalam dan menentukan normal atau tidaknya persalinan. Dan juga dapat membuat deteksi secara dini, setiap kemungkinan terjadinya partus lama. Partograf akan membantu penolong persalinan untuk mencatat kemajuan persalinan, kondisi ibu dan janin, asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran, serta menggunakan informasi yang tercatat sehingga secara dini mengidentifikasi adanya penyulit

persalinan dan membuat keputusan klinik yang sesuai dan tepat waktu (Sarwono, 2014).

Adapun 10 komponen VT (Pemeriksaan dalam) salah satunya yaitu :

a) Ketuban

Warna dan adanya air ketuban di nilai air ketuban setiap kali melakukan pemeriksaan dalam dengan menggunakan lambang sebagai berikut:

U : Jika ketuban Utuh belum pecah.

J : Jika ketuban sudah pecah dan air ketuban Jernih.

M : Jika ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur dengan Mekoneum.

D : Jika ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur dengan Darah.

K : Jika ketuban sudah pecah dan air ketuban Kering

b) Penurunan

Skala 0 s/d 5 pada garis tepi sebelah kiri keatas, juga menunjukkan seberapa jauh penurunan kepala janin kedalam panggul. Dibawah lajur kotak dilatasi serviks dan penurunan kepala menunjukkan waktu/ jam dimulainya fase aktif, tertera kotak-kotak untuk mencatat waktu aktual saat pemeriksaan fase aktif

dimulai, setiap kotak menunjukkan 30 menit.

c) Penyusupan/ moulase kepala janin

Setiap kali melakukan periksa dalam, nilai penyusupan kepala janin dengan menggunakan lambang sebagai berikut:

- 0 : Tulang-tulang kepala janin terpisah, sutura dengan mudah dapat diraba.
- 1 : Tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan.
- 2: Tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih, tetapi masih dapat dipisahkan.
- 3: Tulang-tulang kepala janin tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan.

b. Kala II (kala pengeluaran)

1. Pengertian kala II

Kala II atau kala pengeluaran dimulai dengan pembukaan lengkap dari serviks (10 cm) dan berakhir dengan kalahiran bayi. (Jannah, 2014:6)


2. Tanda dan gejala kala II

- a) His terkoordinasi, kuat, cepat dan lebih lama, kira-kira 2-3 menit sekali.
- b) Kepala janin telah turun masuk ruang panggul sehingga terjadilah tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara reflektoris menimbulkan rasa mengejan.

- c) Tekanan pada rectum dan anus terbuka, serta vulva membuka dan perineum meregang. (Jannah, 2014).
- d) ketuban biasanya pecah ditandaidengan kaluarnya cairan berwarna kekuningan secara tiba-tiba dan banyak.
- e) Muncul perasaan ingin mengejan. (Naomy. 2013).

3. Mekanisme persalinan

Mekanisme persalinan merupakan gerakan janin dalam menyesuaikan ukuran dirinya dengan ukuran panggul saat kepala melewati panggul.




Gambar 2.2 Gerakan-gerakan Utama Kepala Pada Persalinan (Yuanita Syaiful dan Lilis Fatmawati. Asuhan Keperawatan Pada Ibu Bersalin. 2020).

Gerakan-gerakan janin dalam persalinan yaitu :

a) Penurunan kepala (Engagement)


Penurunan kepala adalah peristiwa ketika diameter biparetal melewati pintu atas panggul (PAP) dengan sutura sagitalis yang melintang/oblik di dalam jalan lahir dan fleksi. Pada primigravida terjadi pada bulan terakhir kehamilan, sedangkan pada multigravida dapat terjadi pada awal persalinan.



Gambar 2.3 Pengukuran Engagement
(Yuanita Syaiful dan Lilis Fatmawati. Asuhan Keperawatan Pada Ibu Bersalin. 2020).

b) Penurunan


Dimulai sebelum proses persalinan/inpartu, penurunan kepala terjadi bersamaan dengan mekanisme lainnya. Kekuatan yang mendukung yaitu tekanan pada anus, tekanan langsung fundus pada bokong, kontraksi otot-otot abdomen dan ekstensi dan penurunan badan janin atau tulang belakang.



Gambar 2.4 Penurunan Kepala
(Yuanita Syaiful dan Lilis Fatmawati. Asuhan Keperawatan Pada Ibu Bersalin. 2020).

c) Fleksi

Dengan adanya fleksi maka diameter oksipito-frontalis berubah menjadi sub oksipito-bregmantika, dan posisi dagu bergeser ke arah dada janin.




Gambar 2.5 Proses Fleksi
(Yuanita Syaiful dan Lilis Fatmawati. Asuhan Keperawatan Pada Ibu Bersalin. 2020).

d) Rotasi dalam (putaran paksi dalam)

Rotasi dalam atau putaran paksi dalam adalah pemutaran bagian terendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai ke bawah simfisis. Gerakan ini adalah upaya kepala


janin untuk menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir yaitu bidang tengah dan pintu bawah panggul. Rotasi ini terjadi setelah kepala melewati bidang Hodge III atau setelah di dasar panggul.



Gambar 2.6 Putaran Paksi Dalam
(Yuanita Syaiful dan Lilis Fatmawati. Asuhan Keperawatan Pada Ibu Bersalin. 2020).

e) Ekstensi

Setelah kepala janin sampai di dasar panggul dan UKK berada di bawah simpisis, terjadi ekstensi dari kepala janin. Hal ini disebabkan oleh sumbu jalan lahir pada pintu atas panggul mengarah ke depan dan atas, sehingga kepala menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya.



Gambar 2.7 Permulaan Ekstensi dan Ekstensi Kepala
(Yuanita Syaiful dan Lilis Fatmawati. Asuhan Keperawatan Pada Ibu Bersalin. 2020).

f) Rotasi luar (putaran paksi luar)


Gerakan memutar ubun-ubun kecil ke arah punggung janin, bagian belakang kepala berhadapan dengan *tuber ischiadikum* kanan atau kiri, sedangkan muka janin menhadap salah satu paha ibu.



Gambar 2.8 Rotasi Eksterna
(Yuanita Syaiful dan Lilis Fatmawati. Asuhan Keperawatan Pada Ibu Bersalin. 2020).

g) Ekspulsi

Ekspulsi merupakan pengeluaran janin dengan memegang biparietal bayi dengan kedua tangan, maka dapat dilahirkan bahu depan terlebih dahulu kemudian bahu depan. (Naomy, 2013).



Gambar 2.9 Kelahiran Bahu Depan dan Bahu Belakang
(Yuanita Syaiful dan Lilis Fatmawati. Asuhan Keperawatan Pada Ibu Bersalin. 2020).

4. Langkah-langkah pertolongan persalinan

a. Mengenali Gejala dan Tanda kala II

1) Mendengar dan melihat gejala tanda kala II

- a) Ibu merasa ada dorongan kuat dan ingin mengedan (dorani)
- b) Ibu merasakan regangan yang semakin meningkat pada raktum dan vagina (teknus)
- c) Perineum tampak menonjol (perjol)

- d) Vulva dan sfingter ani membuka (vulka)
- b. Menyiapkan pertolongan persalinan
- 2) Memastikan kelengkapan persalinan, bahan, dan obat esensial untuk menolong persalinan dan menatalaksanakan komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Siapkan tempat datar dank eras, dua buah kain dan satu handuk bersih dan kering, lampu sorot 60 watt dengan jarak penggunaan lampu 60 cmdari tubuh bayi asfiksia.
 - 3) Memakai celemek plastic
 - 4) Lepaskan dan simpan semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering.
 - 5) Pakai sarung tangan DTT untuk melakukan pemeriksaan dalam.
 - 6) Masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik (gunakan sarung tangan yang memakai sarung tangan DTT) dan steril (pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik).
- c. Memastikan Pembukaan Lengkap dan Keadaan Janin Baik
- 7) Membersihkan vulva dan perineum, menyekannya dengan hati-hati dari depan kebelakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi dengan air DTT.

- 8) Lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Apabila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi.
 - 9) Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kedalam larutan klorin 0,5%, kemudian lepaskan dan rendam dalam keadaan terbalik dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepas.
 - 10) Periksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi atau saat relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (120-160x/menit).
- d. Menyiapkan Ibu dan Keluarga untuk Membantu Proses Bimbingan Mengedan
- 11) Memberitahukan ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik serta bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman sesuai dengan keinginannya.
 - 12) Meminta keluarga membantu menyiapkan posisi mengedan. Apabila ibu merasa ingin mengedan dan terjadi kontraksi kuat, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi yang di inginkan dan pastikan ibu merasa nyaman.
 - 13) Laksanakan bimbingan mengedan pada saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk mengedan.

14) Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk mendedan dalam waktu 60 menit.

e. Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi

15) Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu apabila kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm.

16) Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu.

17) Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan.

18) Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan.

f. Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi

19) Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu kelahiran kepala. Anjurkan ibu untuk mendedan secara perlahan sambil bernapas cepat dan dangkal.

20) Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan segera sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi.

21) Tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan.

22) Setelah kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan, pegang secara biparietal. Anjurkan ibu untuk mengedan saat ada kontraksi. Gerakkan kepala ke arah bawah dan distal secara lembut hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis lalu gerakkan ke atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

g. Kelahiran Badan dan Tungkai

23) Setelah kedua bahu lahir, geser tangan ke bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas.

24) Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai dan kaki. Pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk diantara kaki dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya.

h. Penanganan Bayi Baru lahir

25) Lakukan penilaian sepiantas

a) Apakah bayi menangis kuat dan bernafas tanpa kesulitan?

b) Apakah bayi bergerak aktif ?

26) Keringkan dan posisikan tubuh bayi di atas perut ibu.

27) Periksa kembali perut ibu untuk memastikan tidak ada bayi lain dalam uterus atau hamil tunggal.

28) Beritahu ibu bahwa penolong akan menyuntikkan oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik.

29) Satu menit setelah lahir, suntikkan 10 oksitosin unit (*intramuscular*) di 1/3 paha atas bagian *distal lateral*. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin.

30) Jepit tali pusat 2 menit setelah lahir, sekitar 3 cm dari pusar atau umbilicus bayi dengan menggunakan klem. Dari sisi luar klem penjepit, dorong isi tali pusat ke arah distal ibu dan lakukan penjepitan pada 2 paha, sekitar 2 cm distal dari klem pertama.

31) Pemotongan dan pengikatan tali pusat

a) Angkat tali pusat yang telah dijepit dengan satu tangan, kemudian lakukan pengguntingan tali pusat (lindungi perut bayi) diantara 2 klem tersebut.

b) Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian lingkarkan kembali benang ke sisi berlawanan dan lakukan ikatan kedua menggunakan simpul kunci.

c) Lepaskan klem dan memastikan dalam wadah yang telah disediakan.

32) Tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit ibu ke kulit bayi. Letakkan bayi dengan posisi tengkurap di dada ibu.

33) Selimuti ibu dengan kain bersih dan hangat dan pasang topi di kepala bayi.

i. Penatalaksanaan akti Kala III

34) Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva.

35) Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, ditepi atas simfisis untuk deteksi. Tangan lain meregangkan tali pusat.

36) Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas (dorsocranial) secara hati-hati untuk mencegah inversion uteri.

j. Mengeluarkan Plasenta

37) Lakukan peregang tali pusat terkendali dan dorongan dorsocranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti proses jalan lahir (tetap melakukan tekanan dorsocranial).

- a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta.
 - b) Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat :
 - (1) Beri dosis ulang oksitosin 10 unit IM
 - (2) Lakukan kateterisasi (aseptic) jika kandung kemih parah.
 - (3) Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan.
 - (4) Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya.
 - (5) Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir atau bila terjadi.
 - (6) Perdarahan segera lakukan plasenta manual.
- 38) Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terlepas kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah di sediakan.
- k. Rangsangan Taktil atau Masase Uterus
- 39) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan mesase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi atau fundus teraba keras.

l. Menilai Perdarahan

40) Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi, dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan plasenta kedalam kantong plastic atau tempat khusus.

41) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan.

m. Melakukan asuhan pascapersalinan

42) Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

43) Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ibu dan bayi (di dada selama 1 jam).

44) Setelah 1 jam, lakukan penimbangan dan pengukuran bayi, memberikan salep mata antibiotic profilaksis dan vitamin K 1 mg IM dipaha kiri antero lateral.

45) Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi Hepatitis B dipaha kanan antero lateral.

n. Evaluasi

46) Lanjutakan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.

- 47) Anjurkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.
 - 48) Evaluasi dan estimulasi jumlah kehilangan darah.
 - 49) Memeriksa nadi ibu dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan tiap 30 menit selama 1 jam kedua pasca persalinan.
 - 50) Periksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik.
 - 51) Periksa kembali bayi untuk memastikan bayi bernapas dengan baik (40-60) serta suhu tubuh normal (36,5-37,5°C)
- o. Kebersihan dan keamanan
- 52) Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan clorin 0,5% untuk dekontaminasi.
 - 53) Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat yang sesuai.
 - 54) Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban.
 - 55) Lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering.
 - 56) Pastikan ibu merasa aman dan nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk member ibu makanan dan minuman yang di inginkan.

57) Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan clorin 0,5%

58) Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan clorin 0,5%, balik bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan clorin 0,5% selama 10 menit.

59) Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir.

p. Dokumentasi

60) Lengkapi partograf halaman depan dan belakang, periksa vital dan asuhan kala IV (Jannah. 2014).

5. Komplikasi dan Penyulit Kala II

a) Distosia bahu

Distosia bahu adalah kesulitan persalinan saat melahirkan bahu pada presentasi kepala, karena bahu anterior terjepit di atas simpisis pubis, sehingga bahu tidak dapat melewati panggul kecil atau bidang sempit panggul. Distosia bahu umumnya terjadi pada bayi makrosomia, dimana suatu keadaan yang ditandai oleh ukuran badan bayi yang relative lebih besar dari ukuran kepala.

b) Presentasi Muka

Komplikasi dan penyulit dapat terjadi pada presentasi muka bila keadaan kepala dalam kedudukan maksimal, sehingga oksiput tertekan pada punggung dan yang menjadi bagian

terendah adalah muka menghadap kebawah. Penyebabnya yakni panggul sempit, dan leher terdapt lilitan tali pusat.

c) Presentasi bokong (letak sungsang)

Presentasi bokong adalah suatu keadaan dimana janin dalam posisi membujur/memanjang, kepala berada pada fundus sedangkan bagian terendah adalah bokong (Naomy. 2013).

c. Persalinan kala III

Kala III di mulai sejak bayi lahir sampai lahirnya plasenta, rata-rata lama kala III berkisar 15-30 menit, baik itu pada primipara dan multipara. Penyebab terpisahnya plasenta dari dinding uterus yakni kontraksi uterus (spontan atau stimulus) setelah kala II selesai. (Naomy. 2013).

1) Tanda-tanda terlepasnya plasenta

a) Perubahan bentuk uterus

Perubahan bentuk uterus menjadi globuler atau berbentuk seperti buah alpukat. Setelah bayi lahir dan sebelum miometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh dan tinggi fundus uteri sekitar dibawah pusat. Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong kebawah, uterus berbentuk segitiga atau seperti buah pear atau alpukat dan fundus berada diatas pusat.


b) Semburan darah tiba-tiba

Darah yang terkumpul di belakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dibantu oleh gaya gravitasi. Apabila kumpulan darah (retroplacental pooling) dalam ruang di antara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas tampungnya maka darah tersembur keluar secara tiba-tiba dari tepo plasenta yang terlepas.

c) Tali pusat memanjang

Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva (tanda ahfeld). (Naomy, 2013).

2) Metode Pelepasan Plasenta



Gambar 2.10 Pengeluaran Plasenta Metode Schullze (A),
Pengeluaran Plasenta Metode Duncan (B).
(Legawati. Asuhan Persalinan dan Bayi baru Lahir. 2018).

a) Metode schullze

Metode yang lebih umum terjadi adalah plasenta terlepas dari satu titik dan merosot ke vagina melalui lubang kantong amnion, permukaan fetal plasenta muncul pada vulva dengan selaput ketuban yang mengikuti dibelakang seperti payung terbalik saat terkelupas dari dinding uterus.

b) Metode Matthews Duncan

Plasenta turun melalui bagian samping dan masuk ke vulva dengan pembatas lateral terlebih dahulu seperti kancing yang memasuki lubang baju, sehingga sebagian plasenta tidak berada dalam kantong. Metode ini berkaitan dengan plasenta letak rendah dalam uterus. Proses pelepasan berlangsung lebih lama dan darah yang hilang sangat banyak karena hanya sedikit serat oblik dibagian bawah segmen. (Nurul Jannah, 2017).

3) Pengeluaran Plasenta

Pengeluaran plasenta dimulai dengan penurunan plasenta kedalam segmen bawah uterus, plasenta keluar melewati serviks ke ruang vagina atas, dari arah plasenta keluar. Pada saat di lakukan penarikan plasenta dengan menarik tali pusat, maka plasenta akan terlahir dan terlihat di introitus vagina.

Pengeluaran plasenta dengan mekanisme schultze, pada saat plasenta lahir yang terlihat di introitus vagina. Bagian sisi janin (bagian fetal) yaitu sisi bagian plasenta yang berkilat karena diselubungi membrane janin. Sedangkan pengeluaran plasenta dengan mekanisme Duncan, pada saat plasenta lahir di introitus vagina terlihat bagian sisi ibu (bagian maternal) yaitu bagian plasenta yang menghadap kea rah dinding uterus yang terlihat kasar dan kemerahan.

Perdarahan yang terjadi setelah kala III persalinan, biasanya berhubungan dengan plasenta dan kontraksi uterus. Perdarahan kala III terjadi akibat pelepasan plasenta sebagian, penyebab terjadinya pelepasan plasenta sebagian karena kesalahan penatalaksanaan kala III, biasanya mencakup masase uterus sebelum plasenta lahir yang dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan kala III. Perdarahan akibat tidak adanya kontraksi uterus dapat mengakibatkan ibu bersakin kehilangan darah sekitar 350-500 ml, dengan adanya kontraksi uterus akan mengakibatkan tertekannya pembuluh darah uterus diantara anyaman miometrium yang dapat menghentikan perdarahan. (Naomy, 2013).

4) Pemeriksaan Plasenta

Pemeriksaan plasenta harus meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Selaput ketuban utuh atau tidak

b) Plasenta (ukuran plasenta) terdiri atas :

- 1) Bagian maternal, jumlah kotiledon, keutuhan pinggir kotiledon
- 2) Bagian fetal utuh atau tidak

c) Tali pusat meliputi :

- (1) Jumlah arteri dan vena
- (2) Adakah arteri atau vena yang terputus untuk mendeteksi plasenta suksenturia
- (3) Insersi tali pusat, apakah sentral, marginal, panjang tali pusat. (Jannah, 2014).

5) Deteksi dini dan persalinan kala III

a) Perdarahan kala III

Perdarahan pasca persalina adalah perdarahan atau hilangnya darah 500 cc atau lebih yang terjadi setelah anak lahir. Perdarahan dapat terjadi sebelum, selama, atau sesudah lahirnya plasenta. Perdarahan menurut waktunya dapat di bagi atas :

- (1) Perdarahan post partum primer, yang terjadi dalam 24 jam setelah anak lahir.
- (2) Perdarahan post partum sekunder, yang terjadi antara 24 jam dan 6 minggu setelah anak lahir. (Widia, 2015).

b) Atonia Uteri

Atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus otot/kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir.

Penyebab atonia uteri disebabkan oleh beberapa faktor predisposisinya yakni :

- (1) Regangan rahim berlebihan karena kehamilan gemeli, polihidramnion, atau anak terlalu besar.
- (2) Kelelahan karena persalinan lama.
- (3) Mioma uteri yang mengganggu kontraksi rahim.
- (4) Ada riwayat atonia uteri sebelumnya.

c) Robekan Jalan Lahir

Pada umumnya robekan jalan lahir terjadi pada persalinan dengan trauma. Robekan jalan lahir biasanya akibat episiotomy, robekan spontan perineum, trauma forceps atau vakum ekstraksi.

Robekan yang terjadi bisa ringan (lecet, laserasi), luka episiotomy, robekan perineum spontan derajat ringan sampai rupture perinea totalis (sfingter ani terputus), robekan pada dinding vagina, forniks uteri, serviks, daerah sekitar klitoris dan uretra dan bahkan yang terberat rupture uteri.

Teknik penjahitan memerlukan asisten, anastesi lokal, penerangan lampu yang cukup serta speculum dan memperhatikan kedalaman luka.

d) Retensio Plasenta

Retensio plasenta adalah plasenta yang belum lahir setengah jam setelah bayi lahir. Bila sebagian kecil dari plasenta masih tertinggal dalam uterus di sebut *rest plasenta* dan dapat menimbulkan perdarahan pascapersalinan primer atau (lebih sering) sekunder.

e) Inverse Uterus

Kegawatdaruratan pada kala III yang dapat menimbulkan perdarahan adalah inverse uterus. Inverse uterus adalah keadaan di mana lapisan dalam uterus (endometrium) turun dan keluar lewat ostium uteri eksternum, yang dapat bersifat inkomplit sampai komplit. (Sarwono, 2014).

d. Kala IV (Kala Pemantauan)

Kala IV dimulai sejak plasenta lahir sampai dengan dua jam kemudian. Selama kala IV di lakukan pemantauan ibu setiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada satu jam kedua setelah persalinan.

1) Evaluasi Uterus, konsistensi dan atonia uteri.

Setelah pengeluaran plasenta, uterus biasanya berada pada garis tengah dari abdomen kira-kira $\frac{2}{3}$ antara simpisis pubis dan umbilicus atau berada tepat diatas umbilicus. Uterus seharusnya teraba keras (kaku) bila diraba. Uterus yang lembek, berayun menunjukkan bahwa uterus dalam keadaan tidak berkontraksi dengan baik. (Ai Yeyek, 2014).

2) Pemeriksaan serviks, vagina dan perineum

Pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui terjadinya laserasi (adanya robekan) yang dapat diketahui dari adanya perdarahan pasca persalinan, plasenta yang lahir lengkap, dan adanya kontraksi uterus. Segera setelah kelahiran bayi, serviks, dan vagina harus diperiksa secara menyeluruh untuk mencari ada tidaknya laserasi dan perlu tidaknya dilakukan penjahitan.

Setelah proses persalinan, vagina akan mengalami peregangan dan lebih besar dari biasanya. Dengan perlahan periksa anus, apakah ada trauma atau hemoroid yang bisa menonjol keluar dan terjadi thrombosis setelah persalinan.

3) Pemantauan dan evaluasi lanjut

a) Tanda-tanda vital

Pemantauan tanda vital ibu yakni tekanan darah, denyut jantung, suhu, dan pernafasandilakukan selama kala IV

persalina dimulai setelah kelahiran plasenta. Pemantauan dilakukan 15 menit pada satu jam pertama dan 30 menit pada satu jam kedua.

Tanda syok pada ibu harus diperhatikan seperti nadi cepat dan lemah (110x/menit). Tekanan darah rendah sistolik kurang dari 90 mmHg, pucat, berkeringat dingin, kulit lembab, nafas cepat, kesadaran menurun, dan protein urine sangat sedikit. Perhatikan juga tanda dehidrasi, gejala infeksi, gejala preklamsia hingga eklamsi. Pemantauan suhu tubuh perlu dilakukan untuk mencurigai terjadinya infeksi.

b) Kontraksi uterus

Kontraksi yang baik pada uterus adalah bahwa uterus teraba keras dan tidak lembek dan tinggi fundus 1-2 jari dibawah pusat setelah melahirkan. Pemantauan kontraksi uterus harus dilakukan 15 menit pada satu jam pertama dan 30 menit pada satu jam kedua.

c) Lochea

Selama beberapa hari persalinan, lochea tampak merah karena ditemukan eritrosit atau disebut juga lochea rubra. Setelah 3 sampai 4 hari, lochea serosa, dan hari ke-10 lochia tampak putih atau putih kekuning-kuningan atau lochia alba. Lochea yang berbau dapat menjadi indikasi dugaan endometrosis.

d) Kandung kemih

Kandung kemih harus dievaluasi untuk memastikan kandung kemih tidak penuh. Kandung kemih yang penuh mendorong uterus keatas dan menghalangi uterus berkontraksi sepenuhnya.

e) Perineum

Perineum dievaluasi untuk melihat adanya edema atau hematoma. Bungkusannya dengan es yang dikenakan perineum mempunyai efek ganda untuk mengurangi ketidaknyamanan dan edema bila telah mengalami episiotomy atau laserasi.

f) Perkiraan darah yang hilang

Perkirakan jumlah darah yang hilang. Sangat sulit untuk memperkirakan kehilangan darah secara tepat karena darah sering kali bercampur dengan cairan ketuban atau urin dan mungkin terserap dihanduk, kain atau sarung. Cara yang baik untuk memastikan jumlah darah yang hilang dengan menyiapkan botol 500 ml yang digunakan untuk menampung darah. (Ai Yeyek, 2014).

4) Tanda bahaya kala IV

Selama kala IV, bidan harus memberitahu ibu dan keluarga tentang tanda bahaya :

- a) Demam.
- b) Perdarahan aktif.
- c) Bekuan darah banyak.
- d) Bau busuk dari vagina.
- e) Pusing.
- f) Lemas luar biasa.
- g) Kesulitan dalam menyusui.
- h) Nyeri panggul atau abdomen yang lebih kram uterus biasa.

(Naomy, 2013).

B. Teori Manajemen Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, penatalaksanaan dan *evaluasi* (Mudillah, dkk. 2012).

2. Tahapan dalam manajemen Kebidanan

Langkah-langkah asuhan kebidanan menurut varney (1997), yaitu sebagai berikut :

a. Langkah I : pengumpulan Data Dasar

Langkah pertama merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien/orang yang meminta asuhan. Kegiatan pengumpulan data dimulai

saat klien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan kebidanan berlangsung, data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber yang dapat memberikan informasi paling akurat yang dapat diperoleh secepat mungkin dan upaya sekecil mungkin. Pasien adalah sumber informasi yang akurat dan ekonomis, yang disebut sebagai sumber data primer. Sumber data alternative atau sumber data sekunder adalah data yang sudah ada, praktikan kesehatan lain dan anggota keluarga.

Data secara garis besar diklasifikasikan sebagai data subjektif dan data objektif. Pada waktu mengumpulkan data subjektif harus mengembangkan hubungan antar personal yang efektif dengan pasien/klien/yang diwawancarai, lebih diperhatikan hal-hal yang menjadi keluhan utama pasien dan mencemaskan, berupa pendapatan data/fakta yang sangat bermakna dalam kaitan dengan masalah pasien (Mufdillah, dkk. 2012).

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara *anamnesa* atau pengumpulan data subjektif yang terdiri dari :

a. Keluhan utama

Keluhan utama ditanyakan untuk mengetahui alasan pasien datang ke pelayanan kesehatan. Keluhan yang muncul adalah nyeri perut bagian bawah yang menjalar ke pinggang dikarenakan adanya kontraksi, adanya pengeluaran darah dan lendir.

b. Riwayat menstruasi

Ditanyakan untuk mengetahui, fungsi alat-alat reproduksi karena wanita yang matang alat reproduksinya siap untuk mengalami kehamilan, persalinan dan nifas. Hal ini perlu di persiapkan sejak wanita tersebut masih remaja dan mulai timbulnya menstruasi. Agar kesehatan dan kesejahteraan wanita dapat tercapai untuk kehamilan, persalinan dan nifas yang di alami sehat.

c. Riwayat perkawinan

Ditanyakan untuk mengetahui berapa kali ibu menikah, umur ibu waktu menikah, lama menikah untuk mengetahui adanya kemungkinan infertile.

d. Riwayat kehamilan sekarang

Ditanyakan untuk mengetahui usia kehamilan saat ini, HPHT, gerakan janin, tanda bahaya dan penyulit, imunisasi, obat seperti penambah darah, dan khawatiran khusus.

e. Riwayat kehamilan dan persalinan dan nifas yang lalu

Riwayat kehamilan yang lalu meliputi jumlah anak, anak yang lahir hidup, persalinan aterm, persalinan premature, penolong persalinan, keguguran atau kegagalan kehamilan, persalinan dengan tindakan (forceps, vakum atau operasi seksio sesarea), riwayat perdarahan pada kehamilan, persalinan, apakah menyusui atau tidak pada masa nifas sebelumnya, kehamilan dengan tekanan darah tinggi, berat badan bayi

<2.500 gram atau >4.000 gram dan masalah-masalah lain yang dialami ibu.

f. Riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu

Apakah pada saat sekarang ibu sedang menderita penyakit seperti TBC, jantung, DM, penyakit menular dan menurun, hipertensi dan asma. Dan riwayat kesehatan yang lalu apakah pasien pernah menderita penyakit seperti TBC, DM, jantung, hipertensi, asma dan penyakit menular dan menurun.

g. Riwayat kesehatan keluarga

Dikaji untuk mengetahui adanya resiko penyakit menular dan penyakit keturunan, kelainan-kelainan genetik dan keturunan kembar. Apabila terdapat riwayat kesehatan keluarga maka akan membahayakan ibu dan janinnya saat persalinan.

h. Riwayat Keluarga Berencana

Dikaji untuk mengetahui alat kontrasepsi yang dipakai sebelum masa kehamilan karena faktor hormone berperan penting dalam masa kehamilan.

i. Riwayat psikososial

Untuk mengetahui respon ibu dan keluarga terhadap kehamilannya, untuk mendukung ibu hamil dalam menjalani proses persalinannya.

Karena dukungan keluarga dan social yang di terima oleh ibu dapat menimbulkan rasa tenang, di perhatikan, dan rasa percaya diri. Dengan

adanya dukungan keluarga dan social membuat ibu merasa di cintai dan di hargai. Jadi semakin besar dukungan social yang di berikan kepada ibu bersalin, dapat mengurangi kecemasan saat proses persalinan.

j. Riwayat social dan ekonomi

Riwayat social dan ekonomi meliputi status perkawinan, respon ibu dan keluarga terhadap kehamilan ibu, riwayat KB, dukungan keluarga, pengambilan keputusan dalam keluarga, gizi yang dikonsumsi dan kebiasaan makan, kebiasaan hidup sehat, merokok dan minum-minuman keras, mengkonsumsi obat terlarang, beban kerja dan kegiatan sehari-hari, tempat dan petugas kesehatan yang diinginkan untuk membantu persalinan.

Sementara itu, dilakukan pula pengumpulan data secara objektif yang terdiri dari :

a. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara memeriksa keadaan umum ibu yakni :

- 1) Keadaan umum untuk mengetahui keadaan umum ibu apakah baik, sedang dan buruk.
- 2) Kesadaran untuk mengetahui tingkat kesadaran ibu apakah composmentis, somnolen atau koma.

- 3) Tekanan darah untuk mengetahui faktor resiko hipertensi dengan dinilai hipertensi dengan satuan mmHg. Batas normalnya 120/80 mmHg.
- 4) Suhu untuk mengetahui suhu badan dengan normalnya 36,5°C-37,5°C.
- 5) Nadi untuk mengetahui denyut nadi pasien dengan menghitung selama 1 menit, sedangkan normal denyut nadi dalam 1 menit adalah 60-100x/menit.
- 6) Pernafasan untuk mengetahui pernafasan pasien dalam batas normal. Dengan menghitung selama 1 menit dan pernafasan normalnya 18-24x/menit.
- 7) Pemeriksaan fisik (head to toe) pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk mendeteksi kelainan.
- 8) Pemeriksian dalam dilakukan untuk mengetahui kemajuan proses persalinan.

Pada persalinan kala I pasien inpartu akan mengalami nyeri perut bagian bawah yang menjalar ke pinggang dikarenakan adanya kontraksi uterus yang menyebabkan terjadinya penipisan atau dilatasi serviks. Hal ini juga sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa tanda-tanda persalinan meliputi terjadinya his yang menimbulkan pembukaan serviks, keluarnya lendir dan darah yang lebih banyak karena robekan-robekan kecil pada serviks, dan terjadinya pendataran dan pembukaan dimana lendir dari

carnalis servikalis keluar disertai dengan sedikit darah. Perdarahan yang sedikit disebabkan karena selaput janin pada bagian bawah rahim hingga beberapa kapiler terputus.

Pada persalinan kala II umumnya ibu merasakan adanya dorongan yang kuat untuk meneran, adanya tekanan pada anus dan tampak *perineum* menonjol, *vulva*, dan *spingter ani* membuka.

Pada kala III akan tampak pengeluaran plasenta dimana tali pusat akan bertambah panjang yang di sertai dengan adanya semburan darah secara tiba-tiba dan terjadi perubahan tinggi *fundus uteri*.

Serta pada kala IV atau kala observasi akan ditandai dengan kontraksi uterus yang baik, dan tanda-tanda vital dalam batas normal pada 2 jam *post partum*, dengan pemantauan 15 menit pada satu jam pertama dan 30 menit pada jam kedua *post partum*.

b. Langkah II : Interpretasi Diagnosa atau Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnose atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang dikumpulkan diinterpretasikan sehingga di temukan masalah atau diagnose yang spesifik. Langkah awal dari perumusan masalah/diagnose kebidanan adalah pengolahan/analisa data yang menggabungkan dan menghubungkan satu dengan lainnya sehingga tergambar fakta.

Pada kala I persalinan, lama pembukaan yang berlangsung pada primigravida yaitu berlangsung selama 12 jam sedangkan pada multigravida berlangsung selama 8 jam yang dimulai dari pembukaan 0 cm sampai dengan pembukaan 10 cm. pada fase laten persalinan yang dimulai sejak awal kontraksi menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap yang berlangsung hingga serviks membuka kurang dari 4 cm usng umumnya berlangsung selama 8 jam.

Kemudian pada fase aktif persalinan frekuensi dan kontraksi uterus meningkat secara bertahap (kontraksi yang adekuat/memadai jika terjadi 3x atau lebih dalam 10 menit, dan berlangsung selama 40 detik atau lebih), dari pembukaan 4 cm hingga mencapai pembukaan 10 cm dengan kecepatan rata-rata 1 cm per jam pada primigravida dan multigravida, atau lebih dari 1 sampai 2 cm pada multigravida.

Pada kala II persalinan, dimulai dari pembukaan serviks sudah lengkap (10 cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi, pada kala II kontraksi (his) menjadi lebih kuat, lebih sering dan semakin lama. Proses kala II ini berlangsung selama $\pm 1,5$ jam pada primigravida dan $\pm 0,5$ jam pada multigravida. Kala II ditandai dengan adanya dorongan kuat untuk meneran bersamaan dengan adanya kontraksi, adanya tekanan pada anus dan tampak *perineum* menonjol, *vulva* dan *spingter ani* membuka, serta meningkatnya produksi pengeluaran lendir bercampur darah. Tanda pasti

kala II di tentukan melalu pemeriksaan dalam yang hasilnya pembukaan *serviks* telah lengkap dan terlihat kepala bayi melalui *introitus vagina*.

Pada kala III persalinan, dimulai sejak lahirnya bayi hingga lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit setelah penyuntikan oksitosin. Pada manajemen aktif kala III ini bertujuan untuk meghasilkan kontraksi *uterus* yang lebih efektif sehingga mencegah terjadinya perdarahan dan mengurangi kehangatan darah. Tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu perubahan bentuk dan tinggi fundus, tali pusat memanjang, dan terjadinya semburan darah secara tiba-tiba dan singkat.

Pada kala IV persalinan, dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama *post partum*, dimana pemantauan dilakukan dengan mengobservasi tanda-tanda vital, kontraksi uterus, perdarahan dan kandung kemih pada 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua *post partum*.

c. Langkah III : mengidentifikasi Diagnosa atau Masalah potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnose yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi.

Untuk mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dilakukan pengantisipasi penanganan yang kemungkinan muncul pada kala I yaitu

terjadinya kala I lama, peningkatan atau penurunan tanda-tanda vital, DJJ kurang dari 100 atau lebih dari 180x/menit, terjadinya perdarahan pervaginam selain dari lendir dan darah, ketuban pecah yang bercampur dengan mekonium kental yang disertai dengan tanda gawat janin, kontraksi uterus kurang dari 2 kontraksi dalam 10 menit dan berlangsung kurang dari 20 detik serta di temukan perubahan serviks dalam 1-2 jam, pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada pada partograf.

Pada kala II persalinan, kemungkinan masalah yang dapat terjadi yaitu terjadinya kala II lama yang disertai dengan partus macet/kasep, dimana partograf melewati garis waspada, terjadinya distosia bahu, presentasi muka, presentasi bokong (letak sungsang), kontraksi tidak teratur dan kurang, tanda-tanda vital meningkat, dan ibu tampak kelelahan.

Pada manajemen aktif kala III persalinan, masalah yang dapat terjadi yaitu diantaranya terjadinya perdarahan pervaginam dikarenakan terjadinya lacerasi jalan lahir, atonia uteri karena kontraksi uterus yang tidak baik, dan terjadinya retensio plasenta dimana plasenta belum lahir 30 menit setelah bayi lahir.

Pada kala IV persalinan, masalah yang dapat terjadi yaitu terjadinya perdarahan pervaginam dengan pembekuan darah yang banyak, tanda-

tanda vital melewati batas normal dimana tekanan darah dan suhu tubuh meningkat, serta kontraksi uterus yang tidak baik.

d. Langkah IV : Mengidentifikasi dan Menetapkan Kebutuhan yang Memerlukan Penanganan Segera

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu dan bayi, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu intruksi dokter. Mungkin juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan.

Dalam persalinan tindakan yang memerlukan penanganan segera diantaranya pada kala I persalinan yang terjadinya kala I lama yang mengakibatkan gawat janin, dan KPD (ketuban pecah dini). Persalinan pada kala II yang membutuhkan tindakan segera seperti kala II lama yang disertai dengan partus macet/kasep dan distosia bahu. Sedangkan pada kala III seperti atonia uteri, retensio plasenta dan rest plasenta. Kemudian pada kala IV seperti perdarahan pervaginam.

e. Langkah V : Merencanakan Asuhan Yang Komprehensif/Menyeluruh

Pada langkah ini di rencanakan asuhan yang menyeluruh di tentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau

antisipasi, pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap di lengkapi.

Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. Rencana yang dibuat harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date serta evidence terkini serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien.

Adapun penatalaksanaan yang diberikan pada persalinan normal yaitu, memantau perubahan tubuh ibu untuk menentukan apakah persalinan dalam kemajuan yang normal, memeriksa perasaan ibu dan respon fisik terhadap persalinan, membantu ibu memahami apa yang sedang terjadi sehingga ia berperan serta aktif dalam menentukan asuhan. Membantu keluarga dalam merawat ibu selama persalinan, menolong kelahiran dan memberikan asuhan pasca persalinan dan mengenali masalah secepatnya dan mengambil keputusan yang tepat guna dan tepat waktu (efektif dan efisien).

Pada kala I perencanaan asuhan tindakan yang perlu dilakukan juga dapat berupa, pemantauan terus menerus kemajuan persalinan menggunakan partograf, pemantauan TTV ibu dan janin, memenuhi kebutuhan nutrisi dan dehidrasi ibu, menganjurkan ibu perubahan

ambulasi dan posisi ibu, menganjurkan tindakan yang memberikan rasa nyaman, serta menganjurkan keluarga memberikan dukungan pada ibu.

Pada kala II perencanaan asuhan tindakan yang perlu dilakukan yaitu melihat tanda dan gejala kala II, siapkan alat dan bahan persalinan, pastikan pembukaan sudah lengkap, periksa keadaan janin, siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses persalinan, letakkan handuk bersih diatas perut ibu dan dibawah bokong ibu, pimpin persalinan jika kepala sudah terlihat membuka vulva 5-10 cm, periksa lilitan tali pusat, tunggu kepala bayi sampai melakukan putaran paksi luar kemudian lanjutkan melahirkan bahu depan dan bahu belakang. Setelah kedua bahu bayi lahir, dilanjutkan dengan sanggah susur untuk melahirkan badan bayi, setelah bayi lahir bebaskan jalan napas, keringkan dan lakukan penilaian sepiantas, jepit tali pusat. Bayi IMD dengan posisi tengkurap agar tidak bayi tidak kehilangan suhu tubuh.

Pada kala III perencanaan asuhan tindakan yang perlu dilakukan yaitu pemberian oksitosin, peregangan tali pusat dan masase uterus. Periksa tinggi fundus uteri untuk memastikan tidak ada janin, pemberian oksitosin dilakukan setelah 1 menit bayi lahir. Setelah itu, suntikkan oksitosin secara IM di sepertiga bagian atas paha ibu dan segera lakukan IMD.

Pada kala IV perencanaan asuhan tindakan yang perlu dilakukan yaitu memantau tanda-tanda vital ibu, pemantauan perdarahan, kontraksi

uterus, kandung kemih dan tinggi fundus uteri. Pemantauan dilakukan tiap 15 menit pada jam pertama dan tiap 30 menit pada jam kedua, serta mengukur suhu tubuh ibu tiap 1 jam pertama dan 1 jam kedua. Setelah dilakukan pengawasan selama 2 jam ibu dipindahkan ke ruangan nifas.

f. Langkah VI : Melaksanakan Perencanaan dan Penatalaksanaan

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti telah diuraikan pada langkah ke 5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, bidan tetap bertanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana). Dalam situasi ini bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi serta bertanggungjawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut.

Pada kala I dilangkah ini melakukan pemantauan DJJ, nadi, dan his tiap 30 menit. Memastikan DJJ dalam batas normal (120-160 kali per menit), Nadi (60-100 kali per menit) dan his yang teratur dan adekuat.

Pada kala II melakukan asuhan persalinan normal sesuai dengan APN. Melakukan penanganan bayi baru lahir dengan cara bebaskan jalan napas, mengeringkan bayi, mencegah hipotermi dan mencegah infeksi.

Pada kala III perencanaan asuhan tindakan yang perlu dilakukan yaitu pemberian oksitosin, peregangan tali pusat dan masase uterus. Periksa tinggi fundus uteri untuk memastikan tidak ada janin, pemberian oksitosin dilakukan setelah 1 menit bayi lahir. Setelah itu, suntikkan oksitosin secara IM di sepertiga bagian atas paha ibu dan segera lakukan IMD.

Pada kala IV perencanaan asuhan tindakan yang perlu dilakukan yaitu memantau tanda-tanda vital ibu, pemantauan perdarahan, kontraksi uterus, kandung kemih dan tinggi fundus uteri. Pemantauan dilakukan tiap 15 menit pada jam pertama dan tiap 30 menit pada jam kedua, serta mengukur suhu tubuh ibu tiap 1 jam pertama dan 1 jam kedua. Setelah dilakukan pengawasan selama 2 jam ibu dipindahkan ke ruangan nifas.

g. Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedangkan sebagian belum efektif (Mufdillak, dkk. 2012).

Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan persalinan pada ibu, kemungkinan akan terjadi perdarahan postpartum, infeksi pada masa

nifas. Begitu juga halnya dengan yang bisa terjadi pada bayinya yaitukemungkinan terjadi hipotermi, asfiksia, kejang dan berat badan lahir rendah.

3. *Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan (SOAP)*

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif yang meliputi diagnosis, antisipasi diagnosis atau masalah potensial serta konseling untuk tindak lanjut.

1) Subjektif (S)

Subjektif merupakan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa.

2) Objektif (O)

Objektif merupakan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, lab, dan tes diagnosis lain yang dirumuskan dalam data focus yang mendukung assessment.

3) Assessment (A)

Assessment merupakan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi atau masalah potensial.

4) Planning (P)

Planning merupakan pendokumentasian dari perencanaan dan evaluasi berdasarkan assessment (Ai Yeyek, 2014).

C. Tinjauan Islam Tentang manajemen Persalinan

Dalam al-Qur'an sudah di gambarkan proses persalinan yang dialami oleh Maryam dengan rasa sakit. Seperti dalam QS. Maryam 19 : 23-26 yaitu :

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا
 أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي
 وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ
 إِنْسِيًّا

Terjemahnya :

Maka rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar ke pangkal pokok korma, seraya berkata: Wahai, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini, dan jadilah aku seseorang yang tidak berarti, lagi dilupakan. Maka menyerulah dia kepadanya dari tempat yang rendah: Janganlah kau bersedih hati, Sesungguhnya Tuhan telah menjadikan di dekatmu sebuah anak sungai. Dan goyanglah pangkal pokok korma itu ke arahmu, niscaya pokok korma itu akan menggugurkan kepadamu korma yang masak rahum. Maka makanlah dan minumlah dan senangkanlah hatimu, maka jika engkau melihat ada manusia agak seorang, katakanlah: Sesungguhnya aku telah bernazar di depan Tuhan Yang Maha Pengasih, maka sekali-kali tidaklah akupun bercakap-cakap, sejak hari ini dengan seorang manusia pun. (Depertemen Agama RI, 2005)

Pada ayat diatas dijelaskan juga bahwa buah kurma merupakan makanan yang sangat baik bagi wanita yang sedang dalam masa nifas/selesai melahirkan karena ia mudah dicerna, lezat, lagi mengandung kalori yang tinggi. Dalam ayat ini terlihat bagaimana Maryam yang dalam keadaan lemah itu masih diperintahkan untuk melakukan kegiatan dalam bentuk menggerakkan pohon guna memperoleh rezeki, walaupun boleh jadi pohon itu tdak dapat bergerak karena

lemahnyafisik maryam setelah melahirkandan walaupun suasana ketika itu adalah suasana suprarasional. Ini sebagai isyarat kepada semua pihak untuk tidak berpangku tangan menanti datangnya rezeki, tetapi berusaha dan terus berusaha sepanjang kemampuan yang dimiliki (M. Quraish Shihab, 2002).

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa melalui proses biasa, yakni kehamilan selama 9 bulan, proses yang memakan waktu lebih lama dari masa pengucapan *kun fayakun*. Ayat ini hanya mengisyaratkan bahwa setelah kehamilan itu terdapat tanda-tanda persalinan yang sangat sulit disembunyikan. Desakan janin untuk keluar mengakibatkan kontraksi sehingga menimbulkan rasa sakit. Dari sini dapat dipahami dalam arti sakit yang mendahului kelahiran anak.

Setiap wanita yang hendak melahirkan mengalami cobaan yang begitu berat, apalagi ketika mengalami kesulitan ketika melahirkan, oleh karena itu Allah mengabadikan perjuangan seorang wanita (ibu) selama kehamilan dan persalinannya. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an surah Luqman ayat 31:14 yaitu :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ

Terjemahnya:

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu alasan kenapa Allah memberi wasiat pada manusia agar berbakti kepada pada orang tua adalah karena proses persalinan yang dialami ibu merupakan suatu proses yang sangat berat.

Ayat diatas juga menjelaskan bahwa betapa besar perjuangan (jasa) seorang ibu terhadap anaknya, yaitu dimulai dari mengandung dalam keadaan lemah yang senantiasa bertambah berat dalam kandungannya dari waktu ke waktu lalu beliau melahirkan anaknya dengan susah payah yang menimbulkan rasa sakit, kemudian memelihara dan menyusui anaknya selama 2 tahun.

Islam juga menggambarkan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang bidan dalam melakukan manajemen asuhan. Sebaiknya kita memposisikan diri untuk beribadah terhadap Allah swt. Dalam melakukan segala upaya sebagai bentuk kewajiban, biadan dapat berperan aktif serta mampu memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkannya khususnya pada ibu melahirkan yang membutuhkan pertolongan. Dan yang paling penting sebagai seorang bidan dalam menjalankan tugasnya tentu harus memiliki sifat tawaddu' (merendahkan diri) demi memberikan pelayanan yang baik bagi pasiennya.

BAB III

TELUSURAN EVIDENCE BASED LEARNING

A. Matriks langkah I

Pada langkah pertama ini identifikasi dilakukan segera pada ibu dengan persalinan normal, semua informasi akurat dan lengkap di kumpulkan dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Didalam langkah ini akan di peroleh berbagai referensi tentang definisi, tanda dan gejala, serta faktor faktor penyebabnya. Untuk memperoleh data di lakukan.

Judul : manajemen asuhan kebidanan pada persalinan normal

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Asuhan persalinan normal dan bayi baru lahir	Annisa UI Mutmainnah, dkk.	2017	Asuhan persalinan normal menjelaskan tentang kehamilan cukup bulan yang di tandai dengan tanda-tanda persalinan tanpa terjadinya komplikasi yang dapat	Kehamilan cukup bulan (37-42 minggu) lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik ibu dan janin.	Dari buku tersebut tidak dijelaskan komplikasi yang dapat terjadi pada ibu dan janin dalam proses persalinan normal.	Mampu menjelaskan definisi persalinan normal secara jelas.	Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang berlangsung dalam 18 jam tanpa terjadinya komplikasi baik ibu maupun janin.

				membahayakan baik ibu maupun janin yang membutuhkan penanganan segera.				
2	Buku ajar asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir	Mika Oktarina	2015	Pada asuhan persalinan normal terdapat tanda-tanda persalinan	Tanda-tanda persalinan yaitu terjadinya his persalinan, keluarnya lendir bercampur darah pervaginam (Snow), dilatasi dan effacement.	Dari penjelasan buku tidak dijelaskan secara efektif tentang tanda-tanda persalinan.	Buku tersebut mampu menjelaskan tanda-tanda persalinan.	Tanda-tanda persalinan yaitu terjadinya his persalinan, keluarnya lendir bercampur darah, dilatasi dan effacement.
3.	Hubungan senam hamil dengan persalinan normal di BPM Ernita Kota Pekanbaru	Silvia Nova	2019	Senam hamil berpengaruh terhadap persalinan normal	Senam hamil secara teratur dapat memperlancar proses persalinan normal sebanyak 86% tanpa	Dari jurnal tersebut dinilai menggunakan populasi yang kurang yaitu 46 orang.	Dari pengertian persalinan dapat diketahui pengertian persalinan tersebut.	Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan

	Tahun 2018				ada komplikasi baik ibu maupun janin.			(37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin.
4.	Hubungan Riwayat Pre Eklamsia, Retensio Plasenta, Atonia Uteri Dan Laserasi Jalan Lahir Dengan Kejadian Perdarahan Post Partum Pada Ibu Nifas	Yuliawati dan Yetti Anggraini	2015	Riwayat kejadian preeklamsia pada ibu bersalin.	Kejadian pre eklamsia sering di alami ibu bersalin di awali dari ibu hamil dikarenakan pada ibu hamil mengalami peningkatan volume plasma yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah dan oedema dan protein urea.	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif.	Populasi dalam penelitian ini terdiri dari populasi kasus.	Preeklamsia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu dari faktor tersebut adalah paritas.

5.	Paritas Dan Jarak Kelahiran Sebagai Profil Pasien Dengan Ruptur Perineum Pada Persalinan Normal Di Rsup Sanglah Denpasar Tahun 2018	Airin Priskah Lenden, dkk	2018	Jarak kelahiran dapat mempengaruhi kejadian ruptur perineum.	Kejadian ruptur perineum berdasarkan karakteristik jarak kelahiran tingginya kejadian ruptur perineum pada kelompok dengan jarak kelahiran <2tahun sebanyak (67,7%) dan ruptur perineum terjadi pada kelompok yang melahirkan dengan jarak ≥ 5 tahun. Alasannya karena jarak kelahiran	Berdasarkan perhitungan diperoleh jumlah minimal sampel yang akan diteliti adalah 96 orang.	Metode penelitian yang di gunakan adalah <i>cross-sectional</i> .	Jarak kelahiran yang terlalu jauh atau terlalu lama dapat mempengaruhi struktur reproduksi seorang wanita, dimana perineum termasuk otot-otot perineum akan kembali kaku dan sulit menahan regangan dari kepala bayi sehingga dapat terjadi ruptur perineum.
----	---	---------------------------	------	--	---	---	---	--

					yang terlalu jauh atau terlalu lama dapat mempengaruhi struktur reproduksi seorang wanita, dimana perineum termasuk otot-otot perineum akan kembali kaku dan sulit menahan regangan dari kepala bayi sehingga dapat terjadi ruptur perineum.			
6.	Hubungan Jarak Kelahiran Dan Berat Bayi Lahir Dengan	Juliati, dkk	2020	Jarak Kelahiran dapat mempengaruhi terjadinya komplikasi	Jarak kelahiran kurang dari dua tahun tergolong resiko tinggi	Metode yang di gunakan adalah deskriptif analitik dengan jenis	Pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan data	Jarak kelahiran adalah rentang waktu antara kelahiran anak sekarang dengan

	Kejadian Ruptur Perineum Pada Persalinan Normal Di Rsu Tgk Chik Ditiro Tahun 2019			persalinan.	karena dapat menimbulkan komplikasi pada persalinan. Jarak kelahiran 2-3 tahun merupakan jarak kelahiran yang lebih aman bagi ibu dan janin.	penelitian kuantitatif.	sekunder.	kelahiran anak sebelumnya.
7	Keperawatan Maternitas	Sitti Fauziah	2015	Tanda-tanda pengeluaran plasenta	Pengeluaran plasenta dimana tali pusat akan bertambah panjang, darah berwarna gelap keluar tiba-tiba dari introitus vagina dan perubahan bentuk uterus.	Dari penjelasan dari buku tidak menjelaskan masalah yang akan terjadi jika plasenta tidak dilahirkan setelah 30 menit.	Penjelasan dari buku mengenai tanda-tanda pelepasan plasenta mudah dimengerti.	Dalam keadaan normal beberapa kontraksi pertama 5-7 menit setelah kelahiran bayi, plasenta akan lepas dari lapisan basal.

8	Pengalaman perempuan dengan persalinan pervaginam di usia dini di desa mambu tapua dan ba'ba di wilayah kerja puskesmas matangnga	Masniati, dkk.	2020	Pentingnya pengalaman perempuan dengan persalinan pervaginam diusia dini	pengalaman perempuan menjelang persalinan, adanya perubahan pola hidup pasca melahirkan, dampak pernikahan di usia dini, peran tenaga kesehatan terhadap pelayanan kesehatan, harapan terhadap pelayanan kesehatan.	Secara keseluruhan pelayanan yang dilakukan belum memuaskan pasien.	Penelitian ini hanya berfokus pada penemuan fakta terkait persalinan pervaginam di usia dini.	Partisipan dalam penelitian ini adalah perempuan dengan persalinan pervaginam di usia dini.
9.	Nyeri persalinan	Dyah permata Sari, dkk.	2018	Nyeri persalinan ditandai dengan adanya kontraksi rahim	Nyeri persalinan ditandai dengan adanya kontraksi rahim, kontraksi	Tidak di jelaskan secara spesifik tentang persalinan normal.	Dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi persalinan.	Nyeri persalinan merupakan pengalaman subjektif tentang sensasi fisik yang terkait dengan

					sebenarnya telah terjadi pada minggu ke-30 kehamilan yang disebut kontraksi Braxton hicks akibat perubahan-perubahan dari hormon estrogen dan progesteron tetapi sifatnya tidak teratur.			kontraksi uterus, dilatasi dan penipisan serviks, serta penurunan janin selama 'persalinan.
10	Perbedaan kadar hemoglobin ibu sebelum dan sesudah persalinan normal	Desi Rusmiati	2017	Perbedaan kadar hemoglobin ibu sebelum dan sesudah persalinan normal	Kadar HB ibu sebelum persalinan yaitu 11,6gr% sedangkan kadar HB ibu sesudah persalinan yaitu 10,9gr%.	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan quasi experiment one group pre and pro design.	Dalam jurnal tersebut mampu menguraikan perbedaan kadar hemoglobin ibu sebelum dan sesudah persalinan.	Dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi yang tinggi serta mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama

								kehamilan, dan masa nifas maka ibu hamil dan ibu nifas dapat terhindar dari anemia.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

B. Matriks langkah II

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data-data yang telah di kumpulkan. Penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan tentang persalin normal.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Asuhan Keperawatan pada Ibu Bersalin	Yuanita Syaiful dan Lilis Fatmawati	2020	Tanda-tanda inpartu	Tanda-tanda inpartu yaitu kekuatan his bertambah, keluarnya lender dan darah lebih banyak, kadang ketuban pecah dengan sendirinya dan pada pemeriksaan dalam serviks	Tidak menjelaskan secara spesifik tentang tanda-tanda inpartu.	Penjelasan dari buku tentang tanda-tanda inpartu mudah dimengerti.	Ketika adanya tanda-tanda inpartu maka dapat mempermudah untuk mengetahui bahwa proses persalinan.

					mulai mendarat dan pembukaan lengkap.			
2	Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir	Mika Oktarina	2016	Tanda-tanda persalinan	Tanda-tanda persalinan yaitu terjadinya his persalinan, keluarnya lendir bercampur darah pervaginam(snow), kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya dan dilatasi dan effacement.	menjelaskan secara spesifik tentang tanda-tanda inpartu.	Penjelasan dari buku tentang tanda-tanda inpartu mudah dimengerti.	Dari tanda-tanda persalinan makan dapat diketahui mulainya proses persalinan.
3	Efektifitas statik kontraksi otot dasar panggul, <i>Transversus abdominis</i> , dan <i>ekstremitas inferior</i> terhadap Pembukaan	Akim Yohana dan Wiwit Desi Intarti	2019	Statik kontraksi otot dasar panggul, <i>Transversus abdominis</i> , dan <i>ekstremitas inferior</i> dapat mempengaruhi kontraksi uterus sehingga	Statik Kontraksi Otot Dasar Panggul, <i>Transversus Abdominis</i> Dan <i>Ekstremitas Inferior</i> efektif dapat meningkatkan kontraksi uterus dan penambahan pembukaan serviks	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode <i>sampling</i> yang digunakan adalah <i>non probability sampling</i> berupa <i>Purposive Sampling</i> .	Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 responden yaitu Primigravida	Salah satu faktor persalinan adalah kontraksi

	serviks kala 1 persalinan			meningkatkan pembukaan serviks.	persalinan kala 1.			
4	Karakteristik Dan Tingkat Nyeri Persalinan Kala I Fase Laten	Livana PH, dkk.	2017	Nyeri persalinan kala I fase laten ditandai dengan adanya pembukaan serviks.	Fase laten yaitu fase pembukaan yang sangat lambat dari 0 sampai 3 cm yang membutuhkan waktu 8 jam. Pada kala I persalinan, nyeri timbul akibat pembukaan serviks dan kontraksi uterus.	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian <i>kuantitatif</i> dengan pendekatan metode <i>deskriptif</i> .	Jumlah sampel penelitian ini adalah ibu bersalin normal sebanyak 30 responden.	Apabila nyeri tidak segera teratasi maka dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi, karena nyeri menyebabkan pernafasan dan denyut jantung ibu akan meningkat yang menyebabkan aliran darah dan oksigen ke plasenta terganggu.
5	Gambaran Lama Waktu Pelepasan Plasenta	Euis Sisca Alviani, dkk	2015	Manajemen Aktif kala III	Disimpulkan bahwa, lama pelepasan plasenta dengan MAK III dan	Pengambilan sampel menggunakan <i>accidental sampling</i> .	Sample dalam penelitian ini sebanyak	MAK III yaitu suntik oksitosin 1 menit setelah bayi lahir

	dengan Manajemen Aktif Kala III dan Masase Fundus Setelah Bayi Lahir di Rsud Kelas B Kabupaten Subang				masase fundus uteri setelah bayi lahir terbanyak <15 menit.		66 ibu bersalin	ketika tidak ada janin ke dua, penegangan tali pusat terkendali, masase fundus uteri setelah plasenta lahir.
6	Manajemen Intervensi Fase Laten Ke Fase Aktif Pada Kemajuan Persalinan	Dini Kurniawati	2017	Tahap awal dari persalinan yaitu kala I yang dimulai dari fase laten dan fase aktif	Fase laten dimulai dengan adanya kontraksi yang teratur dan diikuti dilatasi servik sampai dengan 3 cm sedangkan fase aktif yaitu setelah fase laten yang diikuti dilatasi servik hingga lengkap (10 cm).	Penelitian ini tidak menjelaskan metode yang digunakan untuk penelitian.	Penjelasan dalam referensi ini mudah di mengerti.	Kontraksi menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap.
7	Karakteristik Ibu Bersalin Kaitannya	Ni Gusti Made Ayu dan Elin Supliyani	2017	Ibu bersalin dengan intensitas nyeri yang	Kontraksi pada saat melahirkan akan menimbulkan	Metode penelitian <i>kuantitatif</i> menggunakan	Sampel dilakukan secara <i>proporsion</i>	Nyeri saat persalinan dipengaruhi oleh faktor

	Dengan Intensitas Nyeri Persalinan Kala 1 Di Kota Bogor			timbul akibat kontraksi serviks	perasaan nyeri yang timbul akibat kontraksi serviks serta dilatasi serviks dan segmen bawah rahim. Intensitas nyeri sebanding dengan kekuatan kontraksi dan tekanan yang terjadi, nyeri bertambah ketika mulut rahim dalam keadaan dilatasi penuh akibat tekanan bayi terhadap stuktur panggul.	desain <i>cross sectional</i> .	<i>al random samping</i> dengan jumlah sampel sebanyak 56 responden.	fisiologis (kontraksi uterus, dilatasi serviks, tekanan kepala janin pada pelvik, peregangan jalan lahir) dan faktor psikososial.
8	Keperawatan Maternitas	Sitti Fauziah	2015	Tanda-tanda pelepasan plasenta	Pelepasan plasenta di tandai dengan, Fundus uteri yang berkontraksi kuat. Perubahan bentuk uterus dari bentuk cakram menjadi	Dari buku Tidak di jelaskan masalah yang akan terjadi jika plasenta tidak d lahirkan setelah 30	Di jelaskan dengan jelas tanda-tanda pelepasan plasenta	Dalam keadaan normal, beberapa kontraksi kulit pertama 5-7 menit setelah kelahiran

					<p>oval bulat, sewaktu plasenta bergerak ke arah segmen bagian bawah rahim. Darah berwarna gelap keluar dengan tiba-tiba dari introitus vagina. Tali pusat bertambah panjang dengan majunya plasenta mendekati introitus vagina. Plasenta terlihat memenuhi introitus vagina, pada pemeriksaan vagina atau rectum atau membrane janin terlihat di introitus vagina.</p>	menit.		<p>bayi, plasenta akan lepas dari lapisan basal.</p>
9	Peran IMD Terhadap Kala III Persalinan	Dyah Triwidiyanti	2021	IMD dapat mempengaruhi kala III persalinan	Kala III dimulai dari lahirnya bayi sampai dengan plasenta lahir	Metode yang digunakan yaitu pengumpulan	Mampu menjelaskan manajemen	Kontraksi uterus yang efektif mempercepat

					dalam waktu tidak lebih dari 30 menit setelah penyuntikan oksitosin.	literatur dengan cara mengumpulkan jurnal yang merupakan data sekunder.	aktif kala II pada persalinan.	pengeluaran plasenta, mencegah perdarahan, dan mengurangi kehilangan darah.
10	Asuhan Persalinan Normal dan Bayi Baru Lahir	Annisa UI Mutmainnah, dkk.	2017	Asuhan persalinan normal pada kala IV di lakukan pemantauan tanda-tanda vital dan kontraksi uterus.	Kala IV persalinan dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama post partum dimana pemantauan dilakukan dengan mengobservasi tanda-tanda vital dan kontraksi uterus.	Dari buku tidak dijelaskan secara spesifik tentang pemantauan pada kala IV.	Penjelasan dari buku mudah dimengerti.	Pada kala IV persalinan dilakukan pemantauan keadaan ibu untuk mengetahui terjadinya komplikasi yang dapat terjadi.

C. Matriks langkah III

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan. Bidan di harapkan waspada dan bersiap mencegah diagnosis/masalah potensial terjadi. Langkah ini akan menguraikan beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada persalinan normal jika tidak ditangani dengan tepat.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
----	-------	------	-------	--------------	-------	-----------	-----------	--------------

1.	Cara persalinan dan terjadinya komplikasi persalinan berdasarkan tingkat resiko kehamilan menurut skor Peodji Rochjati di praktik mandiri bidan F Banjarmasin	Nur Latifah, Fitri Yuliana.	2019	Kejadian komplikasi persalinan	Komplikasi persalinan yang dapat terjadi yaitu kala II lama, kala fase aktif memanjang, persalinan dengan hipertensi, retensio plasenta dan perdarahan post partum.	Distribusi frekuensi komplikasi persalinan terdapat 32 orang.	Ibu dengan kelompok risiko tinggi tetap dapat melahirkan normal.	Ibu yang mengalami komplikasi persalinan adalah ibu yang saat hamil tergolong pada kehamilan risiko sangat tinggi dan risiko tinggi.
2.	Dampak kecemasan pada ibu terhadap proses persalinan	Eka Oktaviani dan Esti Nugraheny	2019	Dampak kecemasan pada ibu bersalin dapat mempengaruhi persalinan lama kala I	persalinan lama kala I yaitu sebanyak 4 orang (13%), Persalinan kala II sebanyak 2 orang (7%). Ibu bersalin yang	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian <i>deskriptif</i> dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang.	Dampak dari kecemasan dapat menimbulkan rasa sakit pada persalinan serta berakibat timbulnya dilatasi serviks yang tidak baik dan

					mengalami kecemasan yang tinggi atau stres dapat mengakibatkan persalinan lama, kontraksi yang tidak adekuat sehingga bisa yang dapat mempengaruhi asfiksia pada bayi,			menyebabkan persalinan lama.
3.	Komplikasi Persalinan Dengan Riwayat Kehamilan Resiko Tinggi di Puskesmas Gerokgak I Tahun 2020	Ni Komang Sulyastini dan Luh Nik Armini	2020	Komplikasi Persalinan dengan riwayat kehamilan resiko tinggi	Komplikasi yang paling banyak terjadi adalah pada faktor resiko umur terlalu tua ≥ 35 Tahun yaitu dengan komplikasi terbanyak adalah ketuban pecah	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode <i>deskriptif</i> .	Populasi dalam penelitian ini yaitu ibu bersalin dengan riwayat kehamilan resiko tinggi di Puskesmas Gerokgak I kabupaten	Usia ibu hamil 35 tahun atau lebih. Ibu hamil pada usia ini dapat mengalami komplikasi seperti ketuban pecah dini (KPD), hipertensi, partus lama, partus macet,

					dini, Berat Badan lahir rendah, Aspekia, post Date, IUFD, dan hipertyroid.		Buleleng dengan jumlah 538 orang ibu bersalin.	dan perdarahan postpartum.
4.	Anemia dan kontraksi rahim dalam proses persalinan	Novita Rudiyantri dan Diana Metti	2014	Kejadian anemia dan kontraksi rahim dalam persalinan dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi persalinan yaitu partus lama.	Adanya hubungan yang signifikan antara anemia dengan kontraksi rahim pada kala I karena ibu yang anemia beresiko akan mengalami kontraksi rahim yang tidak adekuat sehingga dapat menyebabkan terjadinya partus lama.	Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan <i>Cross sectional</i> .	Populasi dalam penelitian ini sebanyak 136 ibu bersalin.	Kontraksi rahim yang tidak adekuat dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi yaitu partus lama.
5.	Lamanya	Slelvia HS	2018	Komplikasi	lamanya	Komplikasi	Penelitian ini	Ada hubungan

	proses persalinan kala II dapat beresiko asfiksia neonatorum	dan Mega Rahmawati		lamanya persalinan kala II dengan kejadian asfeksia neonatorum	persalinan kala II dapat menyebabkan terjadinya asfeksia neonatorum.	yang di jelaskan hanya mengenai komplikasi pada bayi.	menggunakan metode analitik dengan penelitian <i>cross sectional</i> .	antara lamanya persalinan kala II dengan kejadian asfeksia neonatorum.
6.	Hubungan antara partus lama dengan kejadian perdarahan postpartum dini Di Kamar Bersalin Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang	Siti Candra Windu Baktiyani, dkk.	2016	Partus lama dapat mempengaruhi perdarahan postpartum dini	Komplikasi yang dapat terjadi pada persalinan normal yaitu partus lama sebanyak 76%. Semakin lama proses persalinan maka akan terjadi perdarahan postpartum dini.	Metode penelitian yang digunakan yaitu <i>observasional analitik</i> dengan desain <i>cross sectional</i> .	Sampel dalam penelitian ini yaitu ibu bersalin yang mengalami partus lama.	partus lama merupakan faktor risiko terjadinya perdarahan postpartum dini.

7	Hubungan berat badan lahir bayi dengan tingkat rupture perineum pada ibu dengan persalinan normal di Rumah sakit Ibu dan Anak Siti fatimah Makassar tahun 2018	Ernawati Pohan	2018	Hubungan berat badan lahir bayi dengan tingkat rupture perineum pada ibu dengan persalinan normal	Ada hubungan antara berat badan lahir bayi terhadap kejadian rupture perineum. Karena berat badan bayi yang terlalu besar dapat menyebabkan terjadinya rupture perineum.	Pengambilan sampel menggunakan <i>teknik sampling</i> .	Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitik dengan jenis penelitian kuantitatif.	Faktor yang mempengaruhi janin terlalu besar yaitu riwayat penyakit ibu saat hamil dan gizi yang berlebihan.
8	Hubungan faktor maternal terhadap posisi pada waktu persalinan kala II dengan kejadian rupture perineum.	Wa ode Hajrah, Niken Purbowati, dkk.	2019	Hubungan antara umur dan paritas dengan kejadian ruptur perineum	Dari hasil penelitian ada hubungan antara umur, paritas dengan kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin. Ibu yang mengalami	Penelitian ini menggunakan desain survei analitik dengan pendekatan potong lintang (cross Sectional).	Sampel penelitian yang digunakan adalah sampel penelitian accidental random sampling yaitu semua persalinan dengan	Umur seorang ibu bersalin mempengaruhi elastisitas otot, termasuk otototot di perineum, dengan demikian dapat mempengaruhi peregangan

					rupture perineum yang berumur beresiko untuk melahirkan yaitu <20 tahun dan >35 tahun.		rupture perineum.	pada daerah perineum saat bersalin yang akhirnya dapat memungkinkan terjadinya ruptur perineum.
9	Suami dan karakteristik his terhadap persalinan lama Di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2019	Yeti Yuwangsyah	2019	Hubungan karakteristik his terhadap persalinan lama	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara positif dan signifikan karakteristik his terhadap persalinan kala I dan II. Ibu bersalin dengan his yang tidak maju, tidak stabil dapat menyebabkan persalinan	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode peneliti <i>survei</i> .	Sampel dalam penelitian ini adalah ibu bersalin normal pada periode januari-februani sebanyak 30 orang.	His adalah salah satu kekuatan pada ibu yang menyebabkan serviks membuka dan mendorong janin kebawah.

					lama.			
10	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian persalinan lama pada ibu bersalin Di Puskesmas Larangan Utara Periode September 2015-Juni 2016	Yulis Setyaningsih	2017	Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan lama yaitu umur dan paritas.	Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan lama yaitu umur dan paritas yang dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi persalinan seperti kala I memanjang dan kala II memanjang.	Metode yang di gunakan yaitu metode penelitian <i>deskriptif</i> .	Populasi dalam penelitian ini seluruh ibu bersalin yang mengalami persalinan lama berjumlah 36 orang.	Ibu yang mengalami persalinan lama di sebabkan oleh kala I memanjang dan kala II memanjang.

D. Matriks langkah IV

Pada langkah ini, bidan atau dokter mengidentifikasi perlunya segera melakukan konsultasi atau melakukan kolaborasi bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya dengan kondisi klien.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Asuhan kebidanan dengan atonia uteri	Nurwinda Saputri, dkk.	2019	Tindakan pada komplikasi atonia uteri	Tindakan segera pada atonia uteri yaitu Masase	Metode penelitian yang digunakan	Sampel dalam penelitian ini ibu yang	atonia uteri disebabkan karena drip oksitosin

					fundus uteri selama 15 detik, Drip oksitosin 20 unit, melakukan KBI, menyuntikan Ergometrin 0,2 mg secara IV, melakukan KBE, dan uterus mulai berkontraksi dengan baik	yaitu <i>deskriptif</i> .	mengalami komplikasi persalinan yaitu atonia uteri.	pada kala I karena kontraksi tidak adekuat, oksitosin memaksa uterus untuk berkontraksi sehingga otot uterus lemah. Setelah dilakukan penanganan atonia uteri sesuai dengan SOP uterus berkontraksi dengan baik.
2.	Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Lama Persalinan Kala I (Studi Di	Henny Sulistyawati	2020	Penanganan lama persalinan kala I	Tindakan untuk mempercepat proses persalinan dengan cara pemberian musik klasik	Metode penelitian yang digunakan yaitu <i>quasi eksperimental</i> dengan rancangan	Populasi pada penelitian ini yaitu semua ibu bersalin di wilayah kerja BPM	Setelah dilakukan tindakan tersebut ibu menjadi rileks dan ibu merasa nyaman, hal

	BPM Lilis Suryawati Jombang)				karena mengurangi atau menghilangkan kecemasan pada persalinan sehingga waktu persalinan lebih pendek dan tidak menyebabkan persalinan lama sebanyak (75%).	<i>posttest only with control group design.</i>	Lilis Suryawati Jomban.	ini dapat disebabkan karena akibat kontraksi uterus, ketegangan otot-otot dan kecemasan ibu menurun.
3.	Karakteristik dan penanganan perdarahan pada ibu postpartum	Sholaikhah Sulistyoningtyas dan Fitnaningsih Endang Cahyawati	2020	Tindakan segera pada perdarahan postpartum	Penanganan yang dilakukan pada kasus perdarahan yaitu masase fundus uteri dan kompresi Bimanual Serta tampon Kateter sampai Histerektomi sehingga angka kejadian perdarahan dapat	Metode penelitian yang digunakan yaitu <i>diskriptif</i> .	Populasi yang diteliti adalah semua ibu bersalin yang mengalami perdarahan Post Partum	Perdarahan dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Atonia Uteri Retensio Plasenta.

					tertangani.			
4	Perdarahan Pascapersalinan oleh Karena Retensi Plasenta pada P4a0 Postpartum Spontan, Janin Besar, dengan Hipertensi dalam Kehamilan	Ivanna Beru Brahmana	2018	Tindakan pada perdarahan pasca persalinan.	Tindakan yang dilakukan pada perdarahan pascapersalinan dini dengan kontraksi uterus lembek dilakukan penatalaksanaan perdarahan pascapersalinan dengan masase uterus, kompresi bimanual, dan pemberian uterotonika. Pemberian uterotonika berupa oksitosin intravena melalui infus sebanyak 20-40 IU dalam 1000 ml cairan infus, dengan tetesan sekitar	Pada penelitian ini tidak di jelaskan metode yang di gunakan untuk penelitian.	Tindakan yang di jelaskan mudah di mengerti.	Faktor risiko terjadinya perdarahan pascapersalinan pada pasien ini yaitu kehamilan yang keempat dengan usia ibu lebih dari 40 tahun, janin besar oleh karena berat lahir bayi lebih dari 4000g dan adanya hipertensi dalam kehamilan.

					150 ml per jam.			
5	Faktor Yang Berhubungan Dengan Ketidاكلancar an Proses Persalinan Normal (Studi di Rumah Sakit Umum Lewoleba Kabupaten Lembata.	Veronika Uba Petan, dkk	2019	Tindakan segera pada kala I yang mengakibatkan KPD.	Tindakan segera pada kala I yang mengakibatkan KPD, dimana Ketuban pecah dini biasanya terjadi pada saat pembukaan jalan lahir sudah lengkap, terkadang harus dipecahkan pada saat proses persalinan berlangsung.	Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang melakukan persalinan secara normal sejumlah 141 ibu.	Metode penelitian yang di gunakan adalah <i>cross sectional</i> .	Faktor yang menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini adalah multigravida , pernah mengalami riwayat ketuban pecah dini sebelumnya.
6	Asuhan Persalinan Normal dan Bayi Baru Lahir .	Annisa UI Mutmainnah, dkk	2017	Penanganan segera pada persalinan kala III	Penatalaksanaan yang dapat dilakukan antara lain. Jika plasenta terlihat dalam vagina, mintalah ibu	Tidak di jelaskan masalah yang akan terjadi ketika kala III berlangsung lebih dari 30	Dijelaskan dengan jelas penatalaksanaan manajemen aktif kala III	Penatalaksanaan manajemen kala III adalah proses keluarnya plasenta.

					<p>untuk mengejan, jika dapat merasakan adanya plasenta dalam vagina, keluarkan plasenta tersebut. Pastikan kandung kemih kosong, jika di perlukan lakukan kateterisasi. Jika plasenta belum keluar, berikan oksitosin 10 unit IM. Jika plasenta belum di lahirkan setelah 30 menit pemberian oksitosin dan uterus akan berkontraksi,</p>	<p>menit setelah bayi lahir.</p>		
--	--	--	--	--	---	----------------------------------	--	--

					<p>lakukan PTT. Jika traksi tali pusat terkendali belum berhasil, cobalah untuk mengeluarkan plasenta secara manual, jika perdarahan terus berlangsung, lakukan uji pembekuan darah sederhana. Jika terdapat tanda-tanda infeksi.</p>			
7	Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal	Ani triana, dkk	2015	Penanganan segera atonia uteri.	<p>Penanganan atonia uteri, yaitu berikan 10 unit oxytisin secara IM, lakukan masase uterus, kemudian lakukan KBI, jika terjadi kontraksi,</p>	<p>Pada refrensi ini hanya menjelaskan tentang kegawatdaruratan maternal dan neonatal.</p>	<p>Penejelasan dari referensi tersebut mudah di mengerti.</p>	<p>Dengan melakukan penangan atonia uteri, maka dapat mencegah terjadinya perdarahan.</p>

					pertahankan hingga uterus berkontraksi dengan baik dan ibu di pantau dengan ketat. Jika tidak terjadinya kontraksi maka lakukan KBE, kemudian injeksi ergometrin, pasang infus drips ixytosin 20 Unit 60 tetes, jika perdarahan tidak berhenti maka di lakukan rujukan ke rumah sakit yang fasilitasnya memadai.			
8	Buku Ajar Asuhan Kebidanan	Ni Komang Yuni Rahyani, dkk	2020	Penanganan segera pada manajemen	Jika plasenta terlihat di dalam vagina,	Pada referensi ini hanya	Pada referensi ini dari	Jika dilakukan, penatalaksan

	Patalogi Bagi Bidan.			aktif kala III	anjurkan ibu untuk meneran, pastikan kandung kemih ibu kosong, jika plasenta belum keluar maka berikan oxytosin 10 UI, lakukan PTT, jika PTT tidak berhasil, maka lakukan pengeluaran plasenta secara manual, jika perdarahan terjadi erus menerus maka lakukan pengujian darah.	menjelaskan tentang komplikasi.	referensi buku, menjelaskan secara jelas dan rinci tentang penanganan kala III persalinan.	aan manajemen aktif kala III dengan benar, maka dapat mencegah terjadinya komplikasi.
9	Perdarahan Post Partum Dini e.c Retensio Plasenta	Budiman dan Diana Mayasari	2017	Penalaksanaaan perdarahan pada ibu post partum.	Penatalaksanaaan yang dilakukan pada ibu dengan perdarahan post partum yaitu, segera	Tidak dijelaskan metode penelitian yang digunakan.	Dijelaskan penatalaksanaan yang dapat di mengerti	Perdarahan post partum (PPP) dini adalah perdarahan lebih dari 500 cc yang

					<p>dinilai perdarahannya dan segera dilakukan resusitasi cairan pada pasien. Kemudian dilakukan observasi perdarahan, tanda-tanda vital (TTV), pemeriksaan penunjang, diberikan infus dengan cairan (RL) 500 cc tetesan 30 x/menit, injeksi oksitosin 2 ampul, injeksi ceftriaxone 2x1 gr, dilakukan transfusi sebanyak 5 kantong whole blood, pemeriksaan</p>			<p>terjadi setelah bayi lahir pervaginam atau lebih dari 1.000 mL setelah persalinan abdominal yang terjadi setelah kala III hingga 24 jam pertama.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

					darah lengkap dan dilanjutkan manual plasenta.			
10	Buku Ajar Asuhan Persalinan & Manajemen Nyeri Persalinan	Istri Utami dan Enny Fitriahadi	2019	Penangan segera pada ibu dengan gawat janin	DJJ <100 atau >160 x/menit, lemah, tidak teratur maka persalinan kala II segera diakhiri dengan episiotomi dan tindakan (vakum ekstraksi, forcep/ SC).	Dari referensi tidak di jelaskan dengan baik hal-hal yang terjadi jika terjadinya gawat janin.	Dari penjelasan yang terdapat pada referensi, dapat di mengerti dengan baik.	Gawat janin bila tidak segera di tangani maka dapat menyebabka n bayi mengalami hipoksia.

E. Matriks langkah V

Pada langkah ini dilakukan perencanaan yang menyeluruh, ditentukan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atauantisipasi, pada langkah ini informasi atau data dasar yang tidak lengkap dapat di lengkapi. Pada langkah ini akan di uraikan beberapa referensi yang mencakup penatalaksanaan pada kasus persalinan normal.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Hubungan dukungan pendamping persalinan	Bardiati Ulfah, dan Asty Susanti	2019	Dukungan pendamping persalinan dapat	Hasil penelitian menyatakan bahwa ada	Meode penelitian yang digunakan	Populasi dalam penelitian ini adalah	Persalinan di pengaruhi oleh banyak faktor salah

	terhadap kelancaran persalinan Di Wilayah Kerja Puskesmas Martapura 1 Tahun 2019			memberi rasa nyaman dan dapat memperlancar persalinan	hubungan antara dukungan pendamping dengan kelancaran persalinan. Karena pendamping juga dapat menumbuhkan suasana yang lebih nyaman bagi psikologis ibu sehingga tumbuh kepercayaan diri yang mengantarkan ibu bersalin dengan lancar dan tanpa hambatan.	yaitu <i>cross sectional</i> .	seluruh ibu bersalin di Wilayah Kerja Puskesmas Martapura 1 Tahun 2019.	satunya yaitu faktor pendukung.
2	Studi Komparasi Ibu Bersalin Normal Dengan	Vevi Endriani	2015	Tindakan yang dilakukan pada manajemen	Suntikan oksitosin dengan dosis 10 unit diberikan	Metode penelitian yang digunakan yaitu	Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu bersalin	Tiga langkah dalam manajemen aktif kala III yaitu

	Tindakan Massase Uterus, Perangsangan Puting Susu Ibu Dan Manejemen Aktif Kala III Terhadap Kontraksi Uterus Serta Aspek Public Health Di Bps.H Ciganjur 2012			aktif kala III	secara intramuskuler (IM) pada sepertiga bagian atas paha bagian luar (aspektus lateralis). Oksitosin dapat menyebabkan uterus berkontraksi dengan kuat dan efektif sehingga dapat membantu pelepasan plasenta dan mengurangi kehilangan darah.	penelitian <i>eksperimental</i> .	normal	Pemberian suntikan oksitosin. Penegangan tali pusat terkendali. Masase fundus uteri.
3	Efektivitas kombinasi birth massage dan perubahan posisi terhadap	Evi Rinata dan Rafhani Rosyidah	2020	Perubahan posisi dapat mempengaruhi penurunan nyeri persalinan	Perubahan posisi tidak hanya membantu ibu mengatasi rasa nyeri	Metode yang digunakan yaitu <i>Quasi Eksperimental Design</i> .	Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 48 ibu bersalin.	Ambulasi dan perubahan posisi pada ibu bersalin dapat memberikan

	penurunan nyeri persalinan kala I fase aktif			kala I fase aktif	selama persalinan, tetapi posisi tegak akan memungkinkan gravitasi bumi menarik kepala janin turun, dimana perubahan posisi dan pergerakan yang aktif dari tulang pelvis akan membantu janin menempati posisi yang paling tepat dan sesuai.			rasa nyaman.
4	Hubungan senam zumba dengan kemajuan persalinan pada ibu bersalin kala 1 fase aktif di	Desak Ketut Sugiartini dan Luh Ayu Purnami	2019	senam zumba berpengaruh terhadap kemajuan persalinan	Senam zumba dapat mempengaruhi kemajuan persalinan sehingga dapat memperlancar	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan <i>Cross sectional</i>	Jumlah sampel yang digunakan adalah 32 responden.	senam zumba akan memberikan banyak manfaat dalam proses persalinan salah satunya

	<p> klinik bersalin tukad luah desa tianyar kecamatan tianyar kabupaten karangasem. </p>				<p> proses persalinan </p>	<p> yaitu pengukuran variabel bebas dan terikat hanya satu kali pada satu saat. </p>		<p> dapat memperlancar persalinan. </p>
5	<p> Pengaruh pemberian kurma terhadap kemajuan persalinan kala ii ibu bersalin di Rumah Sakit Aura Syifa Kabupaten Kediri </p>	<p> Lely Ayu Permata Addini, Ira Titisari, dkk. </p>	2020	<p> Pengaruh pemberian kurma terhadap kemajuan persalinan kala II </p>	<p> Kurma selain mengandung sumber gula yang tinggi juga dapat memberikan perasaan rileks dan tenang. Asam lemak pada kurma selain menghasilkan energi juga membantu menyediakan prostaglandin sehingga dapat membantu menyimpan energi serta </p>	<p> Metode penelitian yang di gunakan yaitu desain pra-eksperimental I (<i>pre experimental design</i>). </p>	<p> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin yang melakukan persalinan di RS Aura Syifa. </p>	<p> Kurma selain mengandung sumber gula yang tinggi juga dapat memberikan perasaan rileks dan tenang. </p>

					memperkuat otot rahim.			
6	Efektifitas posisi miring dengan posisi setengah duduk terhadap lama persalinan kala II	Ayu Nurdiyan	2019	Efektifitas posisi miring dengan posisi setengah duduk terhadap lama persalinan kala II	Hasil penelitian ini mengatakan ada Efektifitas antara lama persalinan kala II dengan posisi miring dan posisi setengah duduk. Karena pada posisi ini mudah untuk dilakukan, dapat memperbaiki oksigenasi janin dan menambah dimensi pintu atas panggul.	Metode yang di gunakan adalah <i>pra-eksperimental desain</i> .	Populasi adalah seluruh subjek dan sampel adalah ibu bersalin di Puskesmas Koto Bangko Kabupaten Padang Pariaman.	posisi miring adalah 13,12 menit, dan rata-rata lama persalinan kala II pada ibu bersalin dengan posisi setengah duduk adalah 18,50 menit.
7	Efektifitas massage perineum	Isofi Laspriyanti, Lina	2020	Efektifitas massage perineum	Dari hasil penelitian menyimpulkan	Lamanya pengambilan data dari	Peneliti menyimpulkan bahwa	Salah satu upaya pencegahan

	untuk percepatan persalinan kala II pada ibu bersalin	Puspitasari .		persalinan kala II	n bahwa dengan melakukan massage perineum efektif untuk percepatan persalinan kala II pada ibu bersalin dengan waktu rata rata 10 menit.	tanggal 2 januari sampai tanggal 25 januari 2019 yang hanya berjumlah 3 sampel pasien.	massage perenium efektif untuk percepatan persalinan kala II pada ibu bersalin dengan waktu rata-rata 10 menit.	terjadinya persalinan kala II lama adalah dengan melaksanakan proses pimpinan persalinan secara efektif sehingga dapat memanfaatkan his secara optimal dengan proses dorongan melalui tenaga meneran dari ibu atau dorongan manual dari bidan itu Kala II memanjang merupakan salah satu penyebab Angka Kematian Ibu.
--	---	---------------	--	--------------------	--	--	---	---

								Untuk menurunkan AKI yang disebabkan oleh kala II memanjang diperlukan Asuhan sayang Ibu dalam pemilihan posisi meneran sendiri.
8	Efek Kombinasi Counterpressure dan Pelvic Rocking terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Persalinan Normal Kala I Fase Aktif	Yuliawati	2019	Pengaruh counterpressure dan pelvic rocking terhadap penurunan intensitas nyeri persalinan	Hasil penelitian didapatkan ada pengaruh yang signifikan penurunan tingkat rasa nyeri persalinan normal kala I fase aktif sebelum dan sesudah dilakukan	Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan <i>pre test and post test design group</i> , tidak ada kelompok pembandingan (kontrol).	Populasi dalam penelitian adalah seluruh ibu bersalin inpartu kala I yang datang ke di BPM Sulistyono Rahayu dan di BPM Eka Santi.	Terapi kombinasi teknik counterpressure dan pelvic rocking memberikan efek penurunan tingkat rasa nyeri persalinan normal kala I fase aktif.

					counterpressure dan pelvic rocking.			
9	Penurunan Rasa Nyeri Pada Persalinan Kala I Fase Aktif Melalui Masase Punggung Pada Ibu Inpartu Di Klinik Hj. Hamidah Kota Medan	Juneris Aritonan, dkk.	2020	Masase punggung pada ibu inpartu dapat mempengaruhi nyeri persalinan	Ibu yang di masase 20 menit setiap jam selama tahapan persalinan akan lebih bebas dari rasa sakit. Hal ini dikarenakan masase merangsang tubuh melepaskan senyawa endorphin yang dapat menghilangkan sakit secara alamiah sehingga lebih nyaman.	Metode yang digunakan yaitu <i>quasi-eksperimen</i> .	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu inpartu kala I fase aktif.	Masase dilakukan pada ibu inpartu bertujuan melepaskan senyawa endorphin sehingga mengurangi nyeri.
10	Kompres panas dingin dapat	Dainty Maternity	2019	Efektifitas setelah diberikan	kompres panas dingin dapat	Metode penelitian yang	Sasaran dalam penelitian	kompres panas dingin dapat

	<p>mengurangi nyeri kala I persalinan Di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin</p>			<p>kompres panas dingin yang bertujuan untuk mengurangi intensitas nyeri kala I</p>	<p>mengurangi nyeri persalinan dikarenakan pada saat dilakukan kompres panas dingin selain mengurangi ketegangan pada otot juga mengurangi rasa takut atau kecemasan yang ada pada diri pasien dan juga ketika dilakukan kompres panas dingin, ibu merasakan sentuhan sehingga merasa nyaman.</p>	<p>digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan <i>quasi eksperimen</i>.</p>	<p>adalah seluruh ibu bersalin kala I pembukaan 4-8 cm.</p>	<p>mengurangi ketegangan pada otot.</p>
--	---	--	--	---	---	--	---	---

F. Matriks Langkah VI

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan pasien serta kerjasama tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah di rencanakan.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Gambaran Penatalaksanaan Pencegahan Infeksi Pada Saat Proses Pertolongan Persalinan Di Puskesmas Jongaya Makassar Tahun 2017	Yovita Sakona dan Sumarni H.P	2017	Penatalaksanaan pencegahan infeksi terhadap proses persalinan.	Pencegahan infeksi dapat diberikan selama proses persalinan secara konsisten dan sistematis mulai dari mencuci tangan, penggunaan sarung tangan, menjaga sanitasi lingkungan yang sesuai proses persalinan serta proses peralatan bekas pakai.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.	Populasi merupakan seluruh subyek penelitian.	Infeksi merupakan penyebab kedua terbanyak setelah perdarahan pada saat proses persalinan.
2	Hubungan Penatalaksanaan Manajemen Aktif Kala Iii	Yuni Ginarsih dan Sherly Jeniawaty	2017	Penatalaksanaan Manajemen Aktif Kala III	Penatalaksanaan kala III persalinan adalah	Metode penelitian ini menggunakan jenis	Populasi ibu bersalin sebanyak 38 orang.	lah penatalaksanaan secara aktif pada kala III

	Dengan Kejadian Hemorrhagic Post Partum (Hpp) Primer Pada Ibu Nifas.				pemberian suntikan oksitosin segera setelah bayi lahir, penegangan tali pusat terkendali, dan melakukan masase fundus	penelitian analitik <i>observasional</i> dengan rancangan <i>cross sectional</i> .		(pengeluaran aktif plasenta), untuk membantu menghindari terjadinya perdarahan pasca persalinan.
3	Hubungan Keberhasilan Penatalaksanaan Atonia Uteri Dengan Perdarahan Pasca Salin Di BPM Wilayah Madiun Selatan	Suprijati dan Sri Wuriyani	2015	Penatalaksanaan atonia uteri dengan perdarahan postpartum	Penatalaksanaan atonia uteri yaitu dengan di lakukannya Kompresi Bimanual Internal (KBI) sehingga ibu tidak kehilangan banyak darah.	Jenis penelitian ini merupakan <i>penelitian observasional</i> .	Populasi yang digunakan adalah sibjek penelitian	Atonia uteri adalah suatu kondisi dimana myometrium tidak dapat berkontraksi dan bila ini terjadi maka darah yang keluar dan bekas tempat melekatnya plasenta menjadi tidak terkendali.
4	Lama persalinan kala II pada ibu bersalin	Dini Fitri damayanti, Natalia Nonita, dkk	2019	Posisi miring kiri dapat memperlancar proses	Pada posisi miring kiri sumbu panggul dan posisi janin	Penelitian ini menggunakan design penelitian	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh	Posisi miring kiri pada proses persalinan dapat mencegah

	primipara berdasarkan posisi.			persalinan.	berada pada arah gravitasi, sehingga memudahkan penurunan kepala janin, memperluas rongga panggul, dan memperkuat dorongan untuk meneran yang dapat mempersingkat kala II sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi pada ibu (kelelahan, atonia uteri dan ruptur uteri) dan mencegah bayi lahir asfiksia.	experimental case study dengan menggunakan teknik observasional.	ibu bersalin RSUD Dokter Rubini Mempawah.	terjadinya komplikasi.
5	Pengaruh Pemberian Effluerage Massage Di Fundus Uteri Terhadap	Risza Choirunissa, dkk	2019	Pemberian Effluerage Massage Di Fundus Uteri Terhadap Lamanya	Teknik ini menimbulkan efek relaksasi, teknik ini di lakukan dengan menggunakan 1	Metode penelitian yang digunakan yaitu <i>the static-group</i>	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin normal di	Pemberian massage effluerage di fundus uteri adalah salah satu upaya yang

	Lamanya Persalinan Kala I Pada Multigravida Di Puskesmas Kecamatan Menteng Jakarta Pusat Tahun 2019			Persalinan Kala I	tangan dengan cara mengusap belakang ibu , relaksasi yang dialami ibu dapat merangsang otak untuk menurunkan kadar hormon adrenalin dan meningkatkan produksi oksitosin yang merupakan faktor penting timbulnya kontraksi uterus yang adekuat,	<i>comparison</i> dengan <i>teknik total sampling</i> .	Puskesmas Kecamatan Menteng Jakarta Pusat sebanyak 20 responden.	dapat mengefektifkan frekuensi his agar adekuat untuk menghindari persalinan lama.
6	Gambaran Inisiasi Menyusu Dini (Imd) Terhadap Lama Kala III Pada Ibu Bersalin di Ruang Mina Rs Muhammadiyah Tuban.	Umu Qonitun, dan Ida Nur Aini	2017	IMD berpengaruh terhadap Kala III	Penatalaksanaan IMD bagi ibu dan bayi untuk menghangatkan bayi saat menyusui, menurunkan risiko hipotermi, bayi mendapatkan	Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif.	Populasi penelitian adalah seluruh ibu bersalin yang berjumlah 29 ibu bersalin.	Penatalaksanaan IMD dengan lama kala III yang diukur setelah bayi lahir dapat mempercepat lahirnya plasenta, mencegah

					kolostrum (ASI pertama, dan penatalaksanaan untuk ibu, yaitu sentuhan dan isapan bayi pada puting ibu akan merangsang keluarnya oksitosin, menyebabkan rahim berkontraksi membantu mengeluarkan plasenta dan mengurangi perdarahan pada ibu .			perdarahan.
7	Pengaruh Waktu Pemberian Oxytocin Dengan Lama Pengeluaran Plasenta Pada Kala III Persalinan.	Sugi Purwanti.	2017	Pemberian oxytosin berpengaruh terhadap pengeluaran plasenta.	Pemberian oxytocin 10 unit dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir secara intramuscular pada sepertiga bagian atas paha bagian luar.	Metode penelitian yang di gunakan yaitu, <i>analitik korelasi</i> dengan pendekatan	Populasi penelitian ini semua ibu bersalin.	Manajemen aktif kala III adalah tindakan untuk megupayakan kontraksi yang adekuat dari uterus dan mempersingkat

					Pemberian okxytosin pada manajemen aktif kala III yaitu untuk mengasikkan kontraksi uterus yang adekuat, sehingga akan mempercepat proses pengeluaran plasenta, mengurangi kejadian perdarahan.	<i>cross sectional.</i>		kala III dan menurunkan angka kejadian retensio plasenta.
8	Hubungan rangsangan taktil papilla mammae terhadap kemajuan persalinan kala I fase aktif Di Klinik Henny Kota Medan	Mastaida Tambun	2019	Hubungan rangsangan taktil papilla mammae terhadap kemajuan persalinan.	Dari hasil penelitian mengatakan bahwa ada hubungan rangsangan taktil papilla mammae dengan kemajuan persalinan. Karena dengan melakukan	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan <i>desain cross sectional.</i>	populasinya adalah ibu bersalin yang berada di klinik henny	Dengan melakukan rangsangan taktil papilla Mammae dapat merangsang hormone oksitosin sehingga mempercepat kontraksi dan mempercepat pembukaan.

					rangsangan taktil papilla mammae dapat merangsang hormone oksitosin untuk mempercepat kontraksi.			
9	Tehnik Massage Punggung Untuk Mengurangi Nyeri Persalinan Kala I.	Indah Puspitasari dan Dwi Astuti	2017	Massage Punggung Untuk Mengurangi Nyeri Persalinan Kala I.	Masase selama 30 menit pada bahu dan punggung yang dilakukan pada ibu bersalin kala I fase aktif dapat mengurangi nyeri dan meberikan dukungan psikologis pada saat proses persalinan.	Penelitian ini merupakan jenis penelitian <i>eksperimen</i> .	Populasi dalam penelitian ini yaitu semua ibu inpartu.	Masase dapat meningkatkan pelepasan oksitosin yang dapat mempercepat proses persalinan dan dapat mengurangi nyeri persalinan.
10	Pengaruh pijat oksitosin terhadap nyeri persalinan pada ibu Bersalin Di Rumah Sakit	Laily Himawati dan Nurul Kodiyah	2020	Pengaruh pijat oksitosin dapat menurunkan nyeri persalinan	Hasil penelitian mengatakan bahwa pijat oksitotin dapat menurunkan nyeri pada	Metode yng digunakan yaitu penelitian analitik dilakukan	Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang melahirkan	pijat oksitosin sangat bermanfaat untuk ibu bersalin karena dapat

	Permata Bunda Purwodadi Grobogan				ibu bersalin.	dengan <i>eksperimental</i> menggunakan <i>pre post test only control group design</i> .	di Rumah Sakit PermataBunda Purwodadi Bulan November 2018.	menurunkan nyeri saat bersalin.
--	----------------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------------------------

G. Matriks langkah VII

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah di berikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah di identifikasi di dalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat di anggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Adapun kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut lebih efektif sedang sebagian belum efektif.

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Evaluasi manajemen aktif kala III persalinan Di Rumah Bersalin Pangestu Bandung	Eti Sukmiati	2018	Evaluasi manajemen aktif kala III persalinan	Berdasarkan hasil evaluasi maka didapatkan manajemen aktif III dinilai baik pada pemberian oksitosin dan pada peregangan tali pusat terkendali serta masase uterus dinilai kurang baik.	Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif.	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh persalinan normal yang berjumlah 30 orang di RB Pangestu Bandung	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan manajemen aktif kala III yang sesuai standar pada persalinan normal.
2	Asuhan	Nila Trisna	2019	Evaluasi	Evalusi pada	Belum	Mampu	Kala II

	Kebidanan Persalinan dan Bayi baru lahir	Yulianti dan Karnilan Lestari		pada kala II persalinan	kala II yaitu pada primigravida berlangsung selama 2 jam dan pada multipara selama 1 jam.	menjelaskan secara lengkap tentang evaluasi yang dilakukan.	menguraikan penjelasan tentang persalinan kala II.	persalinan dimulai ketika pembukaan servik sudah lengkap dan berakhir dengan lahirnya bayi.
3	Evaluasi Tehnik Relaksasi Yang Paling Efektif Dalam Penatalaksanaan Nyeri Persalinan Kala I Terhadap Keberhasilan Persalinan Normal	Rika Herawati	2016	Evaluasi tehnik relaksasi	Dari hasil evaluasi yang dilakukan maka pasien yang melakukan Teknik relaksasi paling efektif dalam pengurangan nyeri pada persalinan kala I yaitu relaksasi pernapasan.	Metode yang digunakan yaitu Penelitian ini merupakan penelitian <i>Ekperimental</i> dengan <i>One group pretest design</i> .	Pengambilan sampel dilakukan dengan cara total sampling, yakni seluruh ibu yang akan bersalin di BPS tersebut mulai bulan Mei - Oktober 2015.	Dengan adanya tehnik relaksasi pernapasan dapat mengurangi nyeri persalinan.
4	Hubungan Pijat Oksitosin Dengan	Ari Kusmiwati dan Reni	2018	Evaluasi penurunan TFU	Evaluasi yang dilakukan untuk penurunan TFU	Metode penelitian yang	Populasi dalam penelitian	Pemberian pijat oksitosin

	Penurunan Tfu Dan Pengeluaran Lochea Pada Ibu Postpartum Normal	Wahyu Triningsih			dengan melakukan pijat oksitosin sebagian besar normal, yaitu 90,9%.	digunakan yaitu <i>quasi eksperimen</i> dengan rancangan <i>post test only design with control group</i> .	ini adalah seluruh ibu postpartum normal sebanyak 23 orang.	merupakan salah satu cara untuk mempercepat penurunan involusi uterus.
5	Studi Komparasi Ibu Bersalin Normal Dengan Tindakan Massase Uterus, Perrangsangan Puting Susu Ibu Dan Manejemen Aktif Kala III Terhadap Kontraksi Uterus Serta Aspek Public Health Di Bps.H Ciganjur 2012	Vevi Endriani	2014	Evaluasi manajemen aktif kala III	Evaluasi manajemen aktif kala III yaitu Pemberian suntikan oksitosin, Penegangan tali pusat terkendali dan masase fundus uteri.	Metode penelitian yang digunakan yaitu <i>eksperimental</i> yaitu <i>True Experimen</i> .	Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu bersalin normal.	Pemberian suntikan oksitosin dilakukan dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir.

6	Asuhan persalinan dan bayi baru lahir	Legawati	2018	Pemantauan kala III	Berdasarkan hasil pemantauan dari buku di dapatkan palpasi uterus dan menilai bayi baru lahir dalam keadaan stabil.	Pada buku tersebut belum dijelaskan secara detail tentang pemantauan kala III.	Dapat menjelaskan bahwa pasien perlu dilakukan pemantauan agar dapat mengetahui kondisi pasien.	Dengan adanya pemantauan kala III maka dapat digambarkan kondisi pasien.
7	Asuhan persalinan normal dan bayi baru lahir	Annisa UI Mutmainnah, Hj. Erni Johan, dkk.	2017	Evaluasi pada kala IV	Berdasarkan dari buku evaluasi pemantauan di lakukan pada uterus, serviks vagina dan perineum dan tanda-tanda vital.	Pada buku tersebut belum dijelaskan secara detail tentang evaluasi kala IV	Perjelasan dari buku mudah dimengerti.	Dengn adanya evaluasi tim kesehatan dapat mengetahui kondisi pasien.
8	Keperawatan Maternitas	Sitti Fauziah	2015	Evaluasi Kala I persalinan	Evaluasi kemajuan dan hasil akhir persalinan kala I. Ibu bersalin menunjukan kemajuan persalinan yang normal sementara	Tidak di jelaskan masalah yang akan terjadi jika terjadinya persalinan kala I lama.	Dijelaskan dengan jelas evaluasi dari tindakan yang di lakukan saat kala I persalinan.	Evaluasi kemajuan dari hasil akhir yang di harapkan merupakan aktivitas yang terus di lakukan selama kala I

					denyut jantung janin/djj tetap dalam batas normal tanpa ada tanda tanda-tanda stress janin. Ibu bersalin menunjukan rasa puas terhadap bantuan bantuan dari pendukungnya dan staf perawat. Ibu bersalin menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi dalam perawatannya selama persalinan dan berpartisipasi sebatas kemampuannya selama persalinan. Ibu bersalin			persalinan.
--	--	--	--	--	---	--	--	-------------

					mempunyai status hidrasi yang memadai dan dapat mengosongkan kandung kemih sesuai kebutuhan. Ibu bersalin dapat memberitahu pendukungnya dan staf perawat tentang tindakan yang membantu untuk mengurangi nyeri dan membantu perasaan rileks.			
9	Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin dan Bayi Baru lahir	Luh Putu Widiastini	2018	Evaluasi pada kala IV	Evaluasi kontraksi uterus pada persalinan kala IV dapat dilakukan dengan masase uterus, untuk membantu uterus berkontraksi	Belum menjelaskan secara lengkap tentang kontraksi uterus pada kala IV.	Mampu menjelaskan tentang kontraksi uterus pada kala IV.	Kontraksi uterus yang lemah dapat menyebabkan terjadinya atonia uteri yang dapat mengganggu keselamatan ibu.

					dengan baik.			
10	Buku Ajar Asuhan Persalinan dan Manajemen Nyeri Persalinan	Istri Utami dan Enny Fitriahadi	2019	Evaluasi pemantauan manajemen aktif kala III.	Perdarahan. Jumlah darah diukur, disertai dengan bekuan darah atau tidak. Kontraksi uterus, bentuk uterus, intensitas. Robekan jalan lahir/laserasi.	Hanya menjelaskan tentang persalinan.	Di jelaskan dengan bahasa yang jelas sehingga mudah di mengerti.	Dimulai sejak bayi lahir sampai lahirnya plasenta/uri, dengan durasi 15-30 menit.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan hasil telah *Evidence Based* asuhan 7 langkah varney berdasarkan Hasil penelusuran Referensi.

1. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pada langkah pertama ini identifikasi dilakukan segera pada persalinan normal, semua informasi akurat dan lengkap dikumpulkan dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi pasien. Dalam langkah ini akan diperoleh berbagai referensi tentang definisi, tanda dan gejala, serta faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan dari referensi matriks langkah I diatas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi, tanda gejala dan faktor penyebab persalinan normal.

Persalinan normal adalah pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu) lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin. Tanda-tanda persalinan yaitu terjadinya his persalinan, keluarnya lendir bercampur darah, dilatasi dan effacement (Annisa UI Mutmainnah, dkk. 2017).

Tanda-tanda persalinan yaitu terjadinya his persalinan, keluarnya lendir bercampur darah pervaginam (Snow), dilatasi dan affacement. Dilatasi adalah terbukanya kanalis servikalis secara berangsur-angsur

akibat pengaruh his. Effacement adalah pendataran atau pemendekan kanalis servikalis yang semua panjang 1-2 cm menjadi hilang sama sekali, sehingga tinggal hanya ostium yang tipis seperti kertas (Mika Oktarina, 2015).

Senam hamil merupakan terapi latihan gerak untuk mempersiapkan ibu hamil, secara fisik dan mental, pada persalinan cepat, aman dan spontan, senam hamil bertujuan mempersiapkan dan melatih otot-otot sehingga dapat dimanfaatkan untuk berfungsi secara optimal dalam persalinan normal. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara senam hamil dengan persalinan normal. Karena ibu yang melakukan senam hamil secara teratur dapat memperlancar proses persalinan normal tanpa ada komplikasi baik ibu maupun janin (Silvia Nova, 2019).

Pengalaman perempuan menjelang persalinan, adanya perubahan pola hidup pasca melahirkan, dampak pernikahan di usia dini, sehingga peran tenaga kesehatan terhadap pelayanan kesehatan, harapan terhadap pelayanan kesehatan, seperti penyuluhan kesehatan umum, gizi, keluarga berencana, kesiapan dalam menghadapi kehamilan, dan menjadi calon orang tua (Masniati, 2020).

Beberapa hal yang dapat menimbulkan masalah saat persalinan yaitu jarak antara persalinan dan berat bayi saat lahir, salah satu hal yang dapat di sebabkan oleh berat bayi saat lahir adalah terjadinya ruptur

perineum, dimana semakin besar bayi yang lahir melalui jalan lahir ibu, maka dimungkinkan semakin besar pula robekan jalan lahir terutama robekan perineum yang akan terjadi pada saat persalinan. Berat badan bayi berpengaruh pada peregangan perineum sehingga pada perineum yang kaku mudah terjadi rupture (Juliati, dkk. 2019).

Pengeluaran plasenta dimana tali pusat akan bertambah panjang dengan majunya plasenta mendekati introitus vagina, darah berwarna gelap keluar tiba-tiba dari introitus vagina dan perubahan bentuk uterus. Setelah plasenta lepas dan menempati segmen bawah rahim, maka uterus muncul pada rongga abdomen (Sitti Fauziah. 2015).

Kejadian ruptur perineum berdasarkan karakteristik jarak kelahiran adalah paling tinggi pada dengan jarak kelahiran <2 tahun yakni sebanyak (67,7%). kejadian ruptur perineum dengan jarak kelahiran <2 tahun. Selain itu melahirkan dengan jarak ≥ 5 tahun. Alasannya karena jarak kelahiran yang terlalu jauh atau terlalu lama dapat mempengaruhi struktur reproduksi seorang wanita, dimana perineum termasuk otot-otot perineum akan kembali kaku dan sulit menahan regangan dari kepala bayi sehingga dapat terjadi ruptur perineum (Airin Priskah Lenden, dkk. 2018).

Nyeri persalinan ditandai dengan adanya kontraksi rahim, kontraksi sebenarnya telah terjadi pada minggu ke-30 kehamilan yang disebut kontraksi Braxton hicks akibat perubahan-perubahan dari hormon

estrogen dan progesteron tetapi sifatnya tidak teratur (Dyah permata Sari, dkk. 2018).

Kejadian preeklampsia sering diawali pada ibu hamil dikarenakan pada ibu hamil mengalami peningkatan volume plasma yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah dan oedema dan protein urea. Selain itu besarnya frekuensi ibu dengan pre eklampsia kemungkinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu dari faktor tersebut adalah paritas. Seorang ibu dengan primigravida dan grandemulti mempunyai risiko lebih besar terjadinya hipertensi dalam kehamilan jika dibandingkan dengan multigravida. Selain itu, faktor lain yang kemungkinan dapat menjadi penyebab frekuensi pre eklampsia adalah umur ibu (Yuliawati dan Yetti Anggraini.2015).

Ibu dapat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi yang tinggi serta mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan dan selama masa nifas maka ibu hamil dan ibu nifas dapat terhindar dari anemia. Kadar HB ibu sebelum persalinan yaitu 11,6gr% sedangkan kadar HB ibu sesudah persalinan yaitu 10,9gr% (Desi Rusmiati, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian dari referensi, masalah yang banyak terjadi adalah jarak kehamilan dimana jarak kehamilan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap persalinan yang dapat membahayakan ibu maupun janin. Karena ketika jarak kehamilan terlalu dekat maka akan

menimbulkan komplikasi yang serius pada kehamilan maupun proses persalinan. Masalah yang di timbulkan pada ibu apabila ibu mempunyai riwayat jarak kehamilan yang dekat dengan kehamilan yang sebelumnya yaitu perdarahan pasca persalinan dan sampai kematian, karena rahim ibu yang jarak kehamilannya terlalu dekat belum siap untuk menjadi tempat tumbuh kembang janin yang baru.

Resiko yang di alami pada janin jika ibu memiliki riwayat jarak kehamilan terlalu dekat, maka akan mengakibatkan bayi mengalami BBLR dan kelahiran premature, karena kondisi rahim ibu yang belum mampu menjadi tempat tumbuh kembang janin, karena ketika janin berkembang tubuh ibu tidak dapat memberi makanan/nutrisi sesuai dengan kebutuhan janin secara maksimal sehingga mengakibatkan bayi mengalami gangguan perkembangan.

Kehamilan dengan jarak yang terlalu dekat tidak dapat memberikan ibu waktu untuk pulih dengan kelahiran yang lalu, sehingga zat gizi yang ada di dalam tubuh ibu berkurang yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan janin karena tidak dapat memenuhi kebutuhan masing-masing, karena pada saat hamil, ibu sangat membutuhkan zat gizi untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin sehingga tidak terjadi komplikasi yang membahayakan ibu maupun janin.

2. Langkah II : perumusan Diagnosis/Masalah Aktual

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan sehingga mengetahui bahwa pasien melahirkan secara normal. Dikemuka setiap referensi yang ditemukan dan disimpulkan perbedaan dan persamaan dari setiap data diagnosis dari sumber referensi yang satu dengan referensi yang lainnya.

Pada saat proses persalinan, ibu akan mengalami tanda-tanda inpartu yaitu kekuatan his bertambah, keluarnya lendir dan darah lebih banyak, kadang ketuban pecah dengan sendirinya dan pada pemeriksaan dalam serviks mulai mendatar dan pembukaan lengkap, dengan adanya tanda-tanda tersebut maka ibu dalam proses persalinan (Yuanita Syaiful dan Lilis Fatmawati.2020).

Tanda-tanda persalinan yaitu terjadinya his persalinan, keluarnya lendir bercampur darah pervaginam(snow), kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya, dilatasi dan effacement, dengan adanya tanda-tanda persalinan pada ibu, maka dapat dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui kemajuan persalinan, jika ada masalah yang terjadi dapat terdeteksi dengan cepat (Mika Oktarina.2016).

Pada ibu bersalin yang mengalami anemia akan lebih mudah mengalami kelelahan otot uterus yang mengakibatkan his menjadi terganggu. Apabila his yang di timbulkan sifatnya lemah, pendek, dan

jarang maka akan mempengaruhi turunnya kepala dan yang akhirnya akan mengganggu proses persalinan (Akim Yohana dan Wiwit Desi Intarti.2019).

Fase laten merupakan fase pembukaan yang sangat lambat dari 0 sampai 3 cm yang membutuhkan waktu 8 jam. Intensitas rasa nyeri yang dialami setiap ibu bersalin berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh psikologis ibu saat bersalin (rasa takut dan berusaha melawan persalinan). Dari hasil beberapa penelitian didapatkan bahwa tingkat kecemasan ibu mempengaruhi proses persalinan yaitu dapat menyebabkan partus lama (Livana PH. 2017).

Disimpulkan bahwa, lama pelepasan plasenta dengan MAK III dan masase fundus uteri setelah bayi lahir terbanyak <15 menit, waktu pelepasan plasenta adalah 5-15 menit. Namun, itu adalah kisaran normal untuk tahap persalinan plasenta, risiko perdarahan meningkat ketika kala III lebih dari 30 menit terutama antara 30 dan 60 menit.⁴ Namun, bila kala III melebihi 15 menit maka penggunaan uterotonika dapat diberikan untuk membantu pengeluaran plasenta. Tempat perlekatan plasenta menentukan kecepatan pemisahan dan metode ekspulsi plasenta (Euis Sisca Alviani, dkk.2015).

Fase laten dimulai dengan adanya kontraksi yang teratur dan diikuti dilatasi servik sampai dengan 3 cm sedangkan fase aktif yaitu setelah fase laten yang diikuti dilatasi servik hingga lengkap (10 cm),

Fase laten mempunyai durasi lebih lama dari pada fase aktif, sehingga memungkinkan intervensi lebih banyak dilakukan oleh penolong pada fase ini. Intervensi dan lamanya fase laten akan menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan pada ibu saat menunggu kemajuan fase ini (Dini Kurniawati.2017).

Kontraksi pada saat melahirkan akan menimbulkan perasaan nyeri yang timbul akibat kontraksi serviks serta dilatasi serviks dan segmen bawah rahim. Intensitas nyeri sebanding dengan kekuatan kontraksi dan tekanan yang terjadi, nyeri bertambah ketika mulut rahim dalam keadaan dilatasi penuh akibat tekanan bayi terhadap struktur panggul. Nyeri saat persalinan dipengaruhi oleh faktor fisiologis (kontraksi uterus, dilatasi serviks, tekanan kepala janin pada pelvik, peregangan jalan lahir) dan faktor psikososial kecemasan, ketakutan, tingkat pendidikan, kemampuan untuk coping ibu, lingkungan fisik, kebudayaan dan etnis, serta dukungan emosional (Ni Gusti Made Ayu dan Elin Supliyani.2017).

Pelepasan plasenta di tandai dengan, Fundus uteri yang berkontraksi kuat. Perubahan bentuk uterus dari bentuk cakram menjadi oval bulat, sewaktu plasenta bergerak ke arah segmen bagian bawah rahim. Darah berwarna gelap keluar dengan tiba-tiba dari introitus vagina. Tali pusat bertambah panjang dengan majunya plasenta mendekati introitus vagina. Plasenta terlihat memenuhi introitus vagina, pada

pemeriksaan vagina atau rectum atau membrane janin terlihat di introitus vagina (Sitti Fauziah.2015).

Kala III dimulai dari lahirnya bayi sampai dengan plasenta lahir dalam waktu tidak lebih dari 30 menit setelah penyuntikan oksitosin. Ibu yang melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini mengalami pengeluaran plasenta lebih cepat, pada proses menyusui oksitosin memiliki peranan yang besar dalam menghasilkan produksi ASI. Aktifitas oksitosin tidak hanya menyebabkan kontraksi otot-otot myoepitel disekitar alveoli mammae, tetapi juga memberikan reflek neuroendokrin, memproduksi analgetik, mengurangi respon stress dan kecemasan, menyebabkan kontraksi uterus dan berperan meningkatkan perilaku bonding pada ibu dan bayi (Dyah Triwidiyantari.2021).

Kala IV persalinan dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama post partum dimana pemantauan dilakukan dengan mengobservasi tanda-tanda vital dan kontraksi uterus, adanya pemantauan kontraksi uterus yang di lakukan untuk mempercepat pemulihan saat proses persalinan, karena ketika uterus tidak berkontraksi dengan baik, maka dapat membahayakan bagi ibu (Annisa UI Mutmainnah, dkk).

Berdasarkan referensi di atas, terdapat tanda-tanda inpartu yaitu kekuatan his bertambah, keluarnya lender dan darah lebih banyak, kadang ketuban pecah dengan sendirinya dan pada pemeriksaan dalam serviks mulai mendatar dan pembukaan lengkap, ketika terjadi tanda-tanda

tersebut, ibu telah memasuki kala I fase laten dan nyeri yang di rasakan ibu mulai berbeda seiring bertambahnya pembukaan.

Setelah itu ibu akan memasuki fase aktif dimana pembukaan dari 4-10 cm, yang berlangsung lebih lama dari fase laten, saat fase ini ibu harus di perhatikan karena, dapat terjadi berbagai hal yang dapat terjadi seperti, tidak adanya kemajuan persalinan, kala I lama, hal ini dapat membahayakan ibu dan janin saat proses persalinan. Saat proses persalinan ibu akan mengalami nyeri yang di sebabkan oleh kontraksi dan dilatasi yang membuat ibu merasa tidak nyaman.

Setelah terjadinya proses persalinan, ibu akan mengalami kontraksi saat proses manajemen aktif kala III atau proses pengeluaran plasenta, di mana ibu di suntikkan oksitosen untuk mempermudah proses pelepasan plasenta dari perekatannya, adapun tanda-tanda pelepasan plasenta yang dapat di lihat yaitu, adanya semburan darah tiba-tiba dan tali pusat semakin memanjang.

3. Langkah III : perumusan Diagnosis/Masalah potensial.

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipas, bila memungkinkan membuahkan pencegahan. Bidan diharapkan waspada dan bersiap mencegah diagnosisi/masalah potensial terjadi. Langkah ini akan menguraikan

beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada persalinan normal jika tidak ditangani dengan tepat.

Komplikasi persalinan yang di dapatkan pada penelitian ini adalah kala II lama, kala Fase aktif memanjang, persalinan dengan hipertensi, retensio placenta dan perdarahan post partum. Ibu yang mengalami komplikasi persalinan ini adalah ibu yang saat hamil tergolong pada kehamilan risiko sangat tinggi dan risiko tinggi. Pada penelitian ini, faktor risiko yang paling banyak terjadi adalah penyakit yang menyertai ibu yaitu kurang darah (anemia). Dari hasil penelitian bahwa ada hubungan yang signifikan antara Tingkat Risiko Kehamilan dan Kejadian Komplikasi Persalinan (Nur Latifah, 2019).

Ibu bersalin biasanya mengalami kecemasan yang tinggi atau stress, sehingga dapat mengakibatkan persalinan lama, kontraksi yang tidak adekuat dan bisa dapat mempengaruhi pada bayi, dampak dari kecemasan dapat menimbulkan rasa sakit pada persalinan serta berakibat timbulnya dilatasi seriks yang tidak baik dan menyebabkan persalinan lama yang sangat berpengaruh pada persalinan (Eka Oktaviani, dkk.2019).

Dilihat dari komplikasi yang terjadi bahwa komplikasi yang paling banyak terjadi adalah pada faktor resiko umur terlalu tua ≥ 35 Tahun yaitu dengan komplikasi terbanyak adalah ketuban pecah dini, Berat Badan lahir rendah, Asphiksia, post Date, IUFD, dan hipertyroid. Pada kehamilan risiko tinggi memungkinkan terjadinya kegawatdaruratan pada saat

persalinan. Komplikasi tersebut dialami oleh ibu hamil pada usia tersebut dikarenakan organ jalan lahir sudah tidak lentur dan memungkinkan mengalami penyakit sehingga kejadian kehamilan risiko tinggi dipengaruhi oleh umur dan paritas (Ni Komang Sulyastini, dkk.2020).

Komplikasi yang dapat terjadi pada persalinan normal yaitu partus lama sebanyak 76%. Semakin lama proses persalinan maka akan terjadi perdarahan postpartum dini. Setelah bayi dilahirkan, uterus secara spontan berkontraksi. Kontraksi dan retraksi otot-otot uterus menyelesaikan proses ini pada akhir persalinan. Sesudah berkontraksi, sel miometrium tidak relaksasi, melainkan menjadi lebih pendek dan lebih tebal. Dengan kontraksi yang berlangsung kontinyu, miometrium menebal secara progresif, dan kavum uteri mengecil sehingga ukuran juga mengecil (Siti Candra Windu Baktiyani, dkk.2016).

His adalah salah satu kekuatan pada ibu yang menyebabkan serviks membuka dan mendorong janin ke bawah. Pada presentasi kepala, bila his sudah cukup kuat, kepala akan turun dan mulai masuk ke dalam rongga panggul. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara positif dan signifikan karakteristik his terhadap lama persalinan kala I dan II. Ibu bersalin dengan his yang tidak maju, tidak stabil dapat menyebabkan persalinan lama (Yeti Yuwangsyah, 2019).

Penyebab partus lama yaitu stress psikologis, janin besar, presentasi janin, dan KPD, sehingga berdampak pada bayi yang akan

dilahirkan yaitu terjadi asfiksia Neonatorum. Maka untuk menghindari terjadinya asfiksia yaitu dengan mencegah partus lama, asuhan persalinan menggunakan partograf untuk memantau kondisi ibu dan janin serta kemajuan proses persalinan dan penanganan segera bayi baru lahir (Sielvia HS, 2019).

Berat badan lahir bayi berhubungan dengan tingkat ruptur perineum karena apabila janin besar dan kepala janin besar akan mempengaruhi peregangan perineum yang dapat meningkatkan perlukaan perineum. Dari jurnal disimpulkan bahwa Ada hubungan antara berat badan bayi lahir normal terhadap kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin. Ibu yang mengalami ruptur perineum yang berumur beresiko (Ernawati Pohan, 2018).

Wanita yang melahirkan anak pada usia <20 tahun fungsi organ reproduksinya belum berkembang dengan sempurna untuk mengalami proses persalinan serta otot-otot daerah perineum yang kaku dan tidak elastis, sehingga pada saat terjadi proses persalinan, maka vagina akan udah sekali terjadi ruptur, sedangkan pada usia ≥ 35 tahun fungsi organ reproduksi pada seorang wanita sudah mengalami penurunan, maka untuk terjadinya komplikasi pasca persalinan, terutama perdarahan akan lebih besar, dibandingkan usia 20-35 tahun, dimana organ-organ reproduksi sudah matang dan siap untuk terjadinya proses persalinan. Dari hasil penelitian yang mengalami ruptur perineum yang berumur beresiko

untuk melahirkan yaitu <20 tahun dan >35 tahun dan dari hasil penelitian ada hubungan antara umur, paritas dengan kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin (Wa ode Hajrah, 2018).

Kejadian anemia dan kontraksi rahim dalam persalinan dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi persalinan yaitu partus lama. Adanya hubungan yang signifikan antara anemia dengan kontraksi rahim pada kala I karena ibu yang anemia beresiko akan mengalami kontraksi rahim yang tidak adekuat sehingga dapat menyebabkan terjadinya partus lama (Novita Rudiyaniti dan Diana Metti, 2014).

Persalinan lama paling banyak terjadi pada kala II karena sering terjadi pada seorang ibu dengan panggul sempit atau janin besar, atau dengan kelainan gaya eksplusif, maka kala II dapat sangat memanjang. Persalinan kala II memanjang juga merupakan fase terakhir dari suatu partus yang macet dan berlangsung terlalu lama sehingga timbul gejala – gejala seperti dehidrasi, infeksi, kelelahan ibu serta asfiksia dan kematian janin dalam kandungan (IUFD). Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan lama yaitu umur dan paritas yang dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi persalinan seperti kala I memanjang dan kala II memanjang.

Berdasarkan referensi di atas, hal yang dapat menyebabkan terjadinya komplikasi yang banyak terjadi adalah partus lama/kala I dan II memanjang, dimana partus lama sangat berpengaruh terhadap ibu maupun

janin, partus lama merupakan salah satu penyebab kematian ibu. Partus lama disebabkan oleh 3 faktor yaitu, *Powers, Passenger, Passage*, partus lama dapat terjadi karena ketidaknormalan dari dilatasi serviks, yang mengakibatkan pembukaan serviks berlangsung secara lambat, karena tidak terjadi penurunan kepala untuk menekan serviks tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya oedema pada serviks dan akan lebih sulit terjadi dilatasi.

Faktor resiko yang terjadi apabila partus lama tidak segera di tangani yaitu adanya komplikasi yang terjadi pada ibu dan janin, salah satunya yaitu janin akan mengalami asfiksia.. Maka untuk menghindari terjadinya asfiksia pada janin maka perlu di lakukan pencegahan terjadinya partus lama, dengan cara di lakukan pemantauan persalinan menggunakan partograf untuk memantau kondisi ibu dan janin serta kemajuan proses persalinan dan penanganan segera bayi baru lahir.

4. Langkah IV : Tindakan Emergency/Kolaborasi

Pada langkah ini, bidan atau dokter mengidentifikasi perlunya segera melakukankonsultasi atau melakukan kolaborasi bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya dengan kondisi klien. Dari beberapa referensi matriks langkah IV diatas maka didapatkan tindakan emergency atau kolaborasi dengan dokter jika terjadi komplikasi pada persalinan normal.

Tindakan yang dilakukan pada perdarahan pascapersalinan dini dengan kontraksi uterus lembek dilakukan penatalaksanaan perdarahan pascapersalinan dengan masase uterus, kompresi bimanual, dan pemberian uterotonika. Pemberian uterotonika berupa oksitosin intravena melalui infus sebanyak 20-40 IU dalam 1000 ml cairan infus, dengan tetesan sekitar 150 ml per jam (Ivanna Beru Brahmana.2018).

Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Henny Sulistyawati (2020) yaitu tentang tindakan untuk mempercepat proses persalinan dengan cara pemberian musik klasik karena mengurangi atau menghilangkan kecemasan pada persalinan sehingga waktu persalinan lebih pendek dan tidak menyebabkan persalinan lama sebanyak sehingga tidak terjadinya komplikasi atau bahaya pada ibu dan janin (Henny Sulistyawati.2020).

Pada saat ibu mengalami atonia uteri, tindakan segera pada atonia uteri yaitu Masase fundus uteri selama 15 detik, Drip oksitosin 20 unit, melakukan KBI, menyuntikan Ergometrin 0,2 mg secara IV, melakukan KBE, dan uterus mulai berkontraksi dengan baik (Nurwinda Saputri, dkk.2019).

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Sholaikhah Sulistyoningtyas dan Fitnaningsih Endang Cahyawati (2020). Penanganan yang dilakukan pada kasus perdarahan yitu masase fundus uteri dan kompresi Bimanual Serta tampon Kateter sampai Histerektomi sehingga

angka kejadian perdarahan dapat tertangani (Sholaikhah Sulistyoningtyas dan Fitnaningsih Endang Cahyawati.2020).

Ketuban pecah dini biasanya terjadi pada saat pembukaan jalan lahir sudah lengkap, terkadang harus dipecahkan pada saat proses persalinan berlangsung. Berdasarkan teori apabila ketuban pecah dini terjadi lebih dari 24 jam dan persalinan belum terjadi maka harus segera dilakukan persalinan dengan tindakan. Cara responden mengidentifikasi adanya ketuban pecah dini adalah responden pernah mengalami ketuban pecah dini sehingga responden bisa mengidentifikasinya sendiri adanya KPD, selain itu juga ada responden yang dibantu keluarganya untuk mengidentifikasi adanya KPD. Tindakan awal yang dilakukan responden sangat membantu responden sehingga petugas kesehatan dapat mengambil suatu tindakan untuk mengatasi masalah tersebut (Veronika Uba Petan, dkk. 2019).

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan antara lain. Jika plasenta terlihat dalam vagina, mintalah ibu untuk mengejan, jika dapat merasakan adanya plasenta dalam vagina, keluarkan plasenta tersebut. Pastikan kandung kemih kosong, jika di perlukan lakukan kateterisasi. Jika plasenta belum keluar, berikan oksitosin 10 unit IM. Jika plasenta belum di lahirkan setelah 30 menit pemberian oksitosin dan uterus akan berkontraksi, lakukan PTT. Jika traksi tali pusat terkendali belum berhasil, cobalah untuk mengeluarkan plasenta secara manual, jika

perdarahan terus berlangsung, lakukan uji pembekuan darah sederhana. Jika terdapat tanda-tanda infeksi (Annisa UI Mutmainnah, dkk.2017).

Jika plasenta terlihat di dalam vagina, anjurkan ibu untuk meneran, pastikan kandung kemih ibu kosong, jika plasenta belum keluar maka berikan oxytosin 10 UI, lakukan PTT, jika PTT tidak berhasil, maka lakukan pengeluaran plasenta secara manual, jika perdarahan terjadi erus menerus maka lakukan pengujian darah (Ni Komang Yuni Rahyani, dkk.2017).

Pentalaksanaan yang di lakukan saat ibu mengalami atonia uteri, yaitu berikan 10 unit oxytisin secara IM, lakukan masase uterus, kemudian lakukan KBI, jika terjadi kontraksi, pertahankan hingga uterus berkontraksi dengan baik dan ibu di pantau dengan ketat. Jika tidak terjadinya kontraksi maka lakukan KBE, kemudian injeksi ergomertin, pasang infus drips ixytosin 20 Unit 60 tetes, jika perdarahan tidak berhenti maka di lakukan rujukan ke rumah sakit yang fasilitasnya memadai (Ani triana, dkk.2015).

Gawat janin dapat terjadi dalam persalinan karena partus lama, infuse oxytosin, perdarahan, infeksi, insufisiensi plasenta ataupun prolapses tali pusat, hal ini harus segera di detksi dan perlu penanganan segera. Penanganan Gawat janin yang di lakukan yaitu, DJJ <100 atau >160 x/menit, lemah, tidak teratur maka persalinan kala II segera diakhiri

dengan episiotomi dan tindakan vakum ekstraksi, forcep/ SC (Istri Utami dan Enny Fitriahadi. 2019).

Penatalaksanaan yang di lakukan pada ibu dengan perdarahan post partum yaitu, segera dinilai perdarahannya dan segera dilakukan resusitasi cairan pada pasien. Kemudian dilakukan observasi perdarahan, tanda-tanda vital (TTV), pemeriksaan penunjang, diberikan infus dengan cairan (RL) 500 cc tetesan 30 x/menit, injeksi oksitosin 2 ampul, injeksi ceftriaxone 2x1 gr, dilakukan transfusi sebanyak 5 kantong whole blood, pemeriksaan darah lengkap dan dilanjutkan manual plasenta (Budiman dan Diana Mayasari, 2017).

Berdasarkan referensi di atas, ada beberapa tindakan yang di lakukan pada saat terjadinya komplikasi dalam persalinan salah satu yang biasa terjadi adalah ketuban pecah dini (KPD), dimana ketika KPD berlangsung lebih dari 24 jam maka akan mengakibatkan bahaya terhadap ibu maupun janin, sehingga perlu di lakukan tindakan segera yaitu melakukan persalinan dengan tindakan seperti Sectio cesarean (SC).

Selain KPD, ada juga hal yang memerlukan tindakan segera dimana saat terjadinya perdarahan pasca persalinan, perdarahan pasca persalinan terjadi karena kurangnya kontrakri uterus setelah plasenta lahir, hal ini di sebabkan dari beberapa faktor, salah satunya adalah usia, dimana pada ibu yang usianya lebih dari 35 tahun maka rentan terjadinya perdarahan pasca persalinan, tindakan yang di lakukan untuk

menghentikan perdarahan yaitu dengan masase uterus, kompresi bimanual, dan pemberian uterotonika.

Lilitan pusat merupakan salah satu masalah yang membutuhkan tindakan segera, dimana ketika bayi mengalami lilitan tali pusat, maka segera di lakukan penanganan dengan cara melihat kondisi lilitan, apabila lilitan tali pusat longgar maka dapat dikeluarkan melalui kepala bayi sedangkan jika lilitan tali pusat kencang maka dilakukan pemotongan tali pusat secara langsung, sehingga tidak terjadi hal yang membahayakan bayi.

5. Langkah V : Rencana Tindakan

Pada langkah ini dilakukan perencanaan yang menyeluruh, ditentukan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau anisipasi, pada langkah ini informasi atau data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Pada langkah ini akan diuraikan beberapa referensi yang mencakup penaalaksanaan pada persalinan normal.

Pada kala I di lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dengan meminta keluarga untuk memberi ibu makan dan minum di seka-sela kontraksi, memantau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf, sehingga tidak terjadi masalah yang akan membahayakan ibu dan janin, menganjurkan ibu untuk merubah posisi ibu ibu.

Pada kala II, melihat tanda gejala persalinan, seperti adanya dorongan kuat untuk meneran, bersamaan dengan adanya kontraksi, adanya tekanan pada anus, dan perineum tampak menonjol, vulva dan sfingter ani membuka, serta meningkatnya pengeluaran lender bercampur darah, setelah melihat tanda-tanda gejala kala II maka anjurkan ibu untuk mengambil posisi yang nyaman saat melakukan proses persalinan sehingga persalinan dapat terjadi dengan cepat dan aman, dan tidak terjadi persalinan kala II memanjang, dimana kala II memanjang ini terjadi karena kurangnya kekuatan ibu sendiri (power), faktor jalan lahir (passage), faktor janin (pasanger), posisi ibu.

Pada kala III, perencanaan asuhan yang di lakukan yaitu, pemberian oksitosin yang dapat membantu ibu untuk proses lahirkan plasenta, setelah itu lakukan peregangan tali pusat terkendali untuk melahirkan plasenta, setelah lakukan peregangan tali pusat terkendali perhatikan tanda-tanda pelepasan plasenta dengan adanya semburan darah, dan tali pusat semakin panjang, maka segera lahirkan plasenta, jika plasenta telah lahir maka lakukan masase uterus untuk menjaga kontraksi uterus tetap baik.

Pada Kala IV, rencana asuhan yang di lakukan adalah, memantau tanda-tanda vital ibu setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan setiap 30 menit, sehingga jika terjadi masalah dapat segera di tangani, memantau kontraksi uterus agar kontraksi tetap baik, memantau kandung kemih ibu

agar selalu kosong hal ini dilakukan untuk menjaga kandung kemih tetap pada posisinya.

Hasil penelitian menyatakan bahwa ada hubungan antara dukungan pendamping dengan kelancaran persalinan. Karena pendamping juga dapat menumbuhkan suasana yang lebih nyaman bagi psikologis ibu sehingga tumbuh kepercayaan diri yang mengantarkan ibu bersalin dengan lancar dan tanpa hambatan (Bardiati Ulfah, dan Asty Susanti.2016).

Suntikan oksitosin dengan dosis 10 unit diberikan secara intramuskuler (IM), Pemberian suntikan oksitosin dilakukan dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir. Namun perlu diperhatikan dalam pemberian suntikan oksitosin adalah memastikan tidak ada bayi lain (undiagnosed twin) di dalam uterus. Tujuan pemberian suntikan oksitosin dapat menyebabkan uterus berkontraksi dengan kuat dan efektif sehingga dapat membantu pelepasan plasenta dan mengurangi kehilangan darah (Vevi Endriani.2015)

Perubahan posisi tidak hanya membantu ibu mengatasi rasa nyeri selama persalinan, tetapi posisi tegak akan memungkinkan gravitasi bumi menarik kepala janin turun, dimana perubahan posisi dan pergerakan yang aktif dari tulang pelvis akan membantu janin menempati posisi yang paling tepat dan sesuai. Perubahan posisi dipilih sesuai keinginan ibu dan yang memberikan rasa nyaman. Sebagian besar ibu bersalin memilih

posisi duduk mengangkang di kursi serta posisi miring ke kiri (Evi Rinata dan Rafhani Rosyidah.2020).

Senam zumba dapat mempengaruhi kemajuan persalinan sehingga dapat memperlancar proses persalinan Senam Zumba dimulai setelah kehamilan 28 minggu dan minimal dilakukan selama 30-60 menit. Senam zumba bukan merupakan keharusan, namun dengan melakukan senam zumba akan memberikan banyak manfaat dalam proses persalinan, Pergerakan dan latihan dari senam zumba tidak saja menguntungkan sang ibu, hal ini dikarenakan gerakan Zumba memiliki bermacam-macam gerakan yang dimulai dari gerakan salsa. Gerakan salsa adalah gerakan menari lembut dengan iringan music klasik sehingga dapat membantu pula dan juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan bayi yang dikandungnya. Pada saat bayi mulai dapat bernafas sendiri, maka oksigen akan mengalir kepadanya melalui plasenta, yaitu dari aliran darah ibunya ke dalam aliran darah bayi yang dikandung (Desak Ketut Sugiartini dan Luh Ayu Purnami.2019).

Kurma mengandung sumber gula yang tinggi juga dapat memberikan perasaan rileks dan tenang. Asam lemak pada kurma selain menghasilkan energi juga membantu menyediakan prostaglandin sehingga dapat membantu menyimpan energi serta memperkuat otot rahim. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Kordi et.al (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kurma kaya akan

karbohidrat sebagai sumber tenaga, mempengaruhi kemajuan persalinan, spontanitas dalam persalinan dikarenakan karbohidrat yang terdapat dalam kurma sebagai penguat ini adalah gula yang diserap dan digunakan oleh sel tubuh tidak lama setelah dikonsumsi. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh pemberian kurma terhadap kemajuan persalinan Kala II tetapi dengan mengonsumsi kurma dapat menambah tenaga untuk mengedan (Lely Ayu Permata Addini, 2020).

Persalinan kala II dengan posisi setengah duduk paling cepat adalah selama 10 menit dan paling lama adalah selama 25 menit dengan range 15 menit dan rata-rata 18 menit adalah normal. Posisi ini mudah untuk dilakukan, dapat memperbaiki oksigenasi janin dan menambah dimensi pintu atas panggul. Posisi setengah duduk dapat mengurangi rasa nyeri, memudahkan ibu untuk meneran, mengurangi trauma vagina dan perineum, serta mencegah terjadinya infeksi (Ayu Nurdiyan, 2019).

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan melakukan massage perineum efektif untuk percepatan persalinan kala II pada ibu bersalin dengan waktu rata-rata 10 menit. Massage perineum dapat mempercepat persalinan kala II dengan cara melancarkan aliran darah di daerah perineum dan vagina, serta aliran hormon yang membantu

melemaskan otot-otot dasar panggul sehingga proses persalinan kala II jadi lebih mudah (Isofi Laspiriyanti, Lina Puspitasari.2020).

Hasil penelitian didapatkan ada pengaruh yang signifikan penurunan tingkat rasa nyeri persalinan normal kala I fase aktif sebelum dan sesudah dilakukan counterpressure dan pelvic rocking. Adanya penurunan tingkat nyeri sesudah dilakukan counterpressure pada ibu bersalin kala I fase aktif dan memperoleh hasil terjadinya penurunan nyeri (Yuliawati, 2019).

Ibu yang di masase 20 menit setiap jam selama tahapan persalinan akan lebih bebas dari rasa sakit. Hal ini dikarenakan masase merangsang tubuh melepaskan senyawa endorphin yang dapat menghilangkan sakit secara alamiah sehingga lebih nyaman, karena masase merangsang tubuh melepaskan senyawa endorphin yang dapat menghilangkan sakit secara alamiah sehingga lebih nyaman (Juneris Aritonan, dkk.2020).

Terdapat penelitian lain menjelaskan bahwa ibu yang mendapatkan teknik kompres panas dan dingin yang sesuai nyeri persalinan yang ringan hal ini dikarenakan pada saat dilakukan kompres panas dingin selain mengurangi ketegangan pada otot juga mengurangi rasa takut atau kecemasan yang ada pada diri pasien dan juga ketika dilakukan kompres panas dingin, ibu merasakan sentuhan sehingga merasa nyaman (Dainty Maternity, 2019).

Berdasarkan referensi yang di pelajari, pada saat ibu bersalin, emosional ibu sangat berpengaruh seperti ibu cemas dan takut, sehingga ibu membutuhkan pendamping saat persalinan. Karena pendamping juga dapat menumbuhkan suasana yang lebih nyaman bagi psikologis ibu yang membuat ibu lebih percaya dirindan proses persalinan berlangsung dengan cepat tanpa ada hambatan. Selain pendamping persalinan, posisi ibu juga sangat berpengaruh terhadap kecepatan proses persalinan, dimana ibu dapat memilih posisi sesuai keinginan ibu dan yang memberikan rasa nyaman.

Pada saat proses persalinan, ada beberapa hal yang di lakukan untuk mempercepat proses persalinan, seperti massage perineum karena massage perineum dapat mempercepat persalinan kala II dengan cara melancarkan aliran darah di daerah perineum dan vagina, serta aliran hormon yang membantu melemaskan otot-otot dasar panggul sehingga proses persalinan kala II jadi lebih mudah, selain itu ada juga kompres panas yang di lakukan untuk mengurangi ketegangan pada otot dan mengurangi kecemasan pada ibu sehingga proses persalinan dapat berlangsung cepat dan nyaman bagi ibu.

6. Langkah VI : Implementasi

Berdasarkan dengan referensi diatas maka didapatkan beberapa imlementasi yang dapat diberikan pada pasien dengan persalinan normal yaitu pemeriksaan kepada pasien dan menjelaskan hal-hal yang dianggap

penting, agar pasien dapat mengetahui keadaannya serta penataklasanan untuk mencegah munculnya komplikasi.

Berdasarkan penyebab kematian ibu tersebut infeksi merupakan penyebab kedua terbanyak setelah perdarahan yang sebenarnya dapat dicegah dengan penerapan pencegahan. Pencegahan infeksi dapat diberikan selama proses persalinan secara konsisten dan sistematis mulai dari mencuci tangan, penggunaan sarung tangan, menjaga sanitasi lingkungan yang sesuai proses persalinan serta proses peralatan bekas pakai (Yovita Sakona dan Sumarni H.P.2017).

Manajemen aktif persalinan kala III adalah penatalaksanaan secara aktif pada kala III (pengeluaran aktif plasenta), untuk membantu menghindarkan terjadinya perdarahan pasca persalinan. Penatalaksanaan kala III persalinan adalah pemberian suntikan oksitosin segera setelah bayi lahir, penegangan tali pusat terkendali, dan melakukan masase fundus. Tujuan manajemen aktif kala III mempersingkat kala III, mempercepat lahirnya plasenta, mengurangi jumlah kehilangan darah, mengurangi kejadian retensio plasenta (Yuni Ginarsih dan Sherly Jeniawaty.2017).

Atonia uteri adalah suatu kondisi dimana mionetrium tidak dapat berkontraksi dan bila ini terjadi maka darah yang keluar dari bekas tempat melekatnya plasenta menjadi tidak terkendali. Penatalaksanaan atonia uteri yaitu dengan di lakukannya Kompresi Bimanual Internal (KBI)

sehingga ibu tidak kehilangan banyak darah (Suprijati dan Sri Wuriyani.2015).

Pada posisi miring kiri sumbu panggul dan posisi janin berada pada arah gravitasi, sehingga memudahkan penurunan kepala janin, memperluas rongga panggul, dan memperkuat dorongan untuk meneran yang dapat mempersingkat kala II sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi pada ibu (kelelahan, atonia uteri dan ruptur uteri) dan mencegah bayi lahir asfiksia (Dini Fitri damayanti, Natalia Nonita, dkk.2019).

Lama kala I tidak hanya dipengaruhi oleh kontraksi uterus, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologi. Teknik ini menimbulkan efek relaksasi, teknik ini dilakukan dengan menggunakan 1 tangan dengan cara mengusap Ebelakang ibu , relaksasi yang dialami ibu dapat merangsang otak untuk menurunkan kadar hormon adrenalin dan meningkatkan produksi oksitosin yang merupakan faktor penting timbulnya kontraksi uterus yang adekuat (Risza Choirunissa, dkk.2019).

Penatalaksanaan IMD bagi ibu dan bayi untuk menghangatkan bayi saat menyusui, menurunkan risiko hipotermi, bayi mendapatkan kolostrum (ASI pertama, dan penatalaksanaan untuk ibu, yaitu sentuhan dan isapan bayi pada puting ibu akan merangsang keluarnya oksitosin, menyebabkan rahim berkontraksi membantu mengeluarkan plasenta dan mengurangi perdarahan pada ibu (Umu Qonitun, dan Ida Nur Aini.2017).

Pemberian oxytocin 10 unit dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir secara intramuscular pada sepertiga bagian atas paha bagian luar. Pemberian oksitosin pada manajemen aktif kala III yaitu untuk mengasilkan kontraksi uterus yang adekuat, sehingga akan mempercepat proses pengeluaran plasenta, mengurangi kejadian perdarahan (Sugi Purwanti.2017).

Pengaruh rangsangan taktil papilla mammae terhadap kemajuan persalinan kala I fase aktif, responden yang melakukan rangsangan taktil papilla mammae dan kemajuan persalinan yang sangat cepat. Jadi dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ibu yang melakukan rangsangan taktil papilla mammae mengalami kemajuan persalinan lebih cepat dibandingkan ibu yang tidak melakukan rangsangan taktil papilla mammae. Karna dengan melakukan rangsangan taktil papilla mammae dapat merangsang hormone oksitosin sehingga mempercepat kontraksi dan mempercepat pembukaan (Mastaida Tambun, 2019).

Pijat oksitosin pada saat pasien merasakan nyeri akibat persalinan dapat membantu bidan dalam memberikan asuhan kebidanan, karena pemberian pijat oksitosin pada ibu bersalin normal kala I fase aktif persalinan ini dapat meminimalkan efek samping yang muncul dan dengan biaya yang murah. pijat oksitosin sangat bermanfaat untuk ibu bersalin karena dapat menurunkan nyeri saat bersalin. Ketika nyeri dapat ditangani, ibu akan merasa rileks dan nyaman

sehingga bisa mengikuti proses persalinan dengan tenang. Ketika kondisi ibu saat persalinan dalam kondisi tenang persalinan akan berjalan dengan normal (Laily Himawati, 2020).

Pada referensi di dapatkan penjelasan tentang penatalaksanaan yang di lakukan bidan jika terjadinya komplikasi selama proses persalinan, adapun hal- hal yang dapat terjadi saat persalinan dan membutuhkan penatalaksanaan yang tepat yaitu jika terjadinya infeksi, penatalaksanaan yang harus di lakukan adalah dengan melakukan pencegahan infeksi dengan cara selama proses persalinan mencuci tangan, penggunaan sarung tangan, memperhatikan lingkungan sekitar.

Selain itu ada juga hal yang terjadi yang membutuhkan penatalaksanaan segera yaitu Atonia Uteri, dimana atinoa uteri merupakan masalah yang terjadi pada uterus yang menyebabkan uterus tidak berkontraksi dengan baik sehingga ibu mengalami perdarahan penatalaksanaan yang di lakukan adalah kompresi Bimanual Internal (KBI) sehingga ibu tidak kehilangan banyak darah.

Hal yang dapat di lakukan untuk membantu menghindari terjadinya perdarahan pasca persalinan. Dengan cara di lakukan penatalaksanaan kala III persalinan dengan pemberian suntikan oksitosin segera setelah bayi lahir, penegangan tali pusat terkendali, dan melakukan masase fundus. Hal ini di lakukan untuk mempercepat lahirnya plasenta,

mengurangi jumlah kehilangan darah, serta mengurangi kejadian retensio plasenta.

7. Langkah VII : Evaluasi

Segera Setelah Bayi Lahir dalam pelaksanaan manajemen aktif kala III tetap meletakkan kain bersih dan kering diatas perut ibu hal ini dilakukanakan mencegah kontaminasi langsung dari tangan penolong persalinan (yang sudah memakai sarung tangan) dan darah pada perut ibu. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah rasa tidak nyaman pada ibu karena terkena darah dari tangan penolong. Begitu juga tindakan pemeriksaan uterus untuk memastikan tidak ada bayi kedua. Sebagian besar belum melakukannya (80%). Serta langsung memberikan suntikan oksitosin (Eti Sukmiati.2018).

Kala II persalinan di mulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap dan berakhir dengan lahirnya bayi, dimana evaluasi yang di lakukan pada kala II yaitu pada primigravida berlangsung selama 2 jam dan pada multipara selama 1 jam, sehingga tidak terjadi komplikasi yang dapat membahayakan ibu dan janin, dimana pada kala II dapat terjadi komplikasi seperti kala II lama (Nila Trisna Yulianti dan Karnilan Lestari.2019).

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Rika Herawati (2016). Dari hasil evaluasi yang dilakukan maka pasien yang melakukan teknik relaksasi teknik ini di lakukan yang bertujuan untuk pengurangan nyeri

pada persalinan kala 1 yaitu relaksasi pernapasan. Relaksasi pernapasan adalah suatu cara untuk menurunkan bahkan menghilangkan rasa nyeri dengan cara mengatur pernafasan setiap waktu.

Evaluasi manajemen aktif kala III yaitu Pemberian suntikan oksitosin, Penegangan tali pusat terkendali dan masase fundus uteri. Karena perangsangan puting susu ibu bisa memberikan efek yang kuat, mirip seperti oksitosin buatan (sintetis) yang sering dipakai saat induksi persalinan. Tujuan pemberian suntikan oksitosin dapat menyebabkan uterus berkontraksi dengan kuat dan efektif sehingga dapat membantu pelepasan plasenta dan mengurangi kehilangan darah (Vevi Endriani.2014).

Berdasarkan hasil pemantauan dari buku di dapatkan palpasi uterus dan menilai bayi baru lahir dalam keadaan stabil. Dimana palpasi uterus dilakukan untuk menentukan apakah ada bayi kedua atau tidak jika terdapat janin kedua maka tunggu sampai janin lahir, jika tidak ada janin kedua maka segera lakukan penyuntikan oksitosin dan segera lahirkan plasenta (Legawati.2018).

Berdasarkan dari buku evaluasi pemantauan di lakukan pada uterus, serviks vagina dan perineum dan tanda-tanda vital. Dimana uterus yang berkontraksi noral harus terasa keras, ketika di sentuh atau di raba, serviks vagina dan perineum, segera setelah bayi bru lahir tangan bisa

masuk, tetapi setelah 2 jam introitus vagina hanya bisa di masuki 2 atau 3 jari. Edema atau memar pada introitus atau pada area perineum sebaiknya di catat. Setelah itu di lakukan pemantauan tekanan darah dan nadi, hal ini di lakukan untuk mendeteksi terjadinya syok akibat kehilangan darah yang berlebihan (Annisa UI Mutmainnah, Hj. Erni Johan, dkk.2014).

Evaluasi kemajuan dan hasil akhir persalinan kala I. Ibu bersalin menunjukkan kemajuan persalinan yang normal sementara denyut jantung janin/djj tetap dalam batas normal tanpa ada tanda tanda-tanda stress janin. Ibu bersalin menunjukkan rasa puas terhadap bantuan bantuan dari pendukungnya dan staf perawat. Ibu bersalin menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi dalam perawatannya selama persalinan dan berpartisipasi sebatas kemampuannya selama persalinan. Ibu bersalin mempunyai status hidrasi yang memadai dan dapat mengosongkan kandung kemih sesuai kebutuhan. Ibu bersalin dapat memberitahu pendukungnya dan staf perawat tentang tindakan yang membantu untuk mengurangi nyeri dan membantu (Sitti Fauziah.2015).

Kontraksi uterus dalam persalinan kala IV sangat diperlukan, selain untuk mencegah terjadinya perdarahan, kontraksi uterus juga dibutuhkan untuk pengembalian uterus ke bentuk normal. Kontraksi uterus yang lemah dapat menyebabkan terjadinya atonia uteri yang dapat mengganggu keselamatan ibu. Untuk membantu uterus berkontraksi

dengan baik dapat dilakukan dengan masase fundus (Luh Putu Widiastini. 2018).

Perdarahan. Jumlah darah diukur, disertai dengan bekuan darah atau tidak. Kontraksi uterus, bentuk uterus, intensitas. Robekan jalan lahir/laserasi. Pemantuan di lakukan sebelum manajemen aktif kala III hal ini di lakukan untuk mengetahui adanya perdarahan atau tidak, manajemen aktif kala III di lakukan untuk mencegah perdarahan, dan membuat kontraksi uterus lebih efektif (Istri Utami dan Enny Fitriahadi.2019).

Berdasarkan referensi di atas, di lakukan evaluasi persalinan kala I, dimana Ibu bersalin menunjukkan kemajuan persalinan yang normal sementara denyut jantung janin/djj tetap dalam batas normal tanpa ada tanda-tanda stress pada ibu dan janin, pada langkah I sangat penting di lakukan evaluasi karena bisa terjadi komplikasi yang membahayakan ibu dan janin.

Selanjutnya evaluasi yang di lakukan pada pemantauan kala III, dimana evaluasi pada manajemen aktif kala III yaitu pemeriksaan uterus untuk memastikan tidak ada bayi kedua. Serta langsung memberikan suntikan oksitosin dan membantu melahirkan plasenta. Setelah plasenta lahir selanjutnya di lakukan evaluasi pemnatauan kala IV dimana pemantauan uterus, serviks vagina dan perineum dan tanda-tanda vital.

Evaluasi yang dilakukan pada pemantauan kala IV sangat diperlukan, seperti kontraksi uterus dimana kontraksi uterus dapat mencegah terjadinya perdarahan, dan dapat mengembalikan uterus ke bentuk normal. Hal yang dapat diwaspadai pada kala IV yaitu atonia uterus yang dapat membahayakan ibu karena dapat mengganggu keselamatan ibu. Sehingga untuk membantu uterus berkontraksi dengan baik dapat dilakukan dengan masase.

B. Implikasi kebidanan

Persalinan dan kelahiran normal merupakan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin. Tanda-tanda persalinan sudah dekat yaitu pada primigravida terjadi penurunan fundus karena kepala bayi sudah memasuki pintu atas panggul yang disebabkan oleh kontraksi braxton hicks, ketegangan otot, ketegangan ligamentum rotundum dan gaya berat janin kepala kearah bawah. Dan terjadinya his permulaan dimana makin tua usia kehamilan pengeluaran progesteron dan estrogen semakin berkurang sehingga oksitosin dapat menimbulkan kontraksi.

Tanda-tanda persalinan yaitu timbulnya his, keluar lendir bercampur darah karena adanya robekan-robekan kecil pada serviks, dan dengan adanya pendataran dan pembukaan. Faktor yang mempengaruhi persalinan yaitu power (his dan tenaga mengejan), passage (ukuran panggul, otot-otot dasar

panggul), passanger (janin, plasenta, air ketuban), psikis ibu bersalin dan penolong dapat mempengaruhi persalinan. Tahap-tahap persalinan terdiri dari kala I (kala pembukaan), kala II (kala pengeluaran), kala III (kala uri) dan kala IV (kala pemantauan).

Pada saat persalinan ketika terjadinya his pada ibu primipara akan lebih terasa nyeri pada kala I fase leten, sehingga ada beberapa faktor yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri pada ibu bersalin dengan cara melakukan teknik abdominal lifting untuk mengurangi nyeri yang dirasakan oleh ibu, selain itu ada beberapa cara yang digunakan untuk mempercepat proses persalinan pada ibu primipara yaitu dengan memposisikan ibu dengan posisi miring kiri sehingga dapat menguatkan otot-otot perut.

Pada ibu bersalin terjadinya kala II lama atau kala fase aktif memanjang, di mana kala II memanjang adalah hal yang sangat berbahaya untuk ibu karena merupakan salah satu penyebab kematian ibu, untuk itu dilakukan asuhan sayang ibu, sehingga ibu merasa aman untuk proses persalinan, ibu juga dapat memilih posisi meneran yang nyaman sehingga ibu merasa aman dan tidak mengalami robekan jalan lahir, karena robekan jalan lahir sangat beresiko pada ibu bersalin yang usianya <20th dan >35th.

Ketika pada saat proses persalinan dan terjadi kegawat daruratan maka segera dilakukan tindakan untuk mencegah terjadinya komplikasi, pada ibu primigravida akan mengalami lama persalinan kala I dan itu berpengaruh

dengan lamanya proses persalinan, sehingga di lakukan metode akupresur untuk mempercepat persalinan.

Ada beberapa faktor yang di lakukan untuk mencegah lamanya proses persalinan yaitu dengan melakukan senam ibu hamil, adapun hal yang lain yang dapat dilakukan yaitu dengan metode pelvic rocking, yaitu duduk dengan perlahan mengayunkan dan menggoyangkan pinggul kedepan dan belakang, sisi kanan, sisi kiri, dan melingkar, metode ini di lakukan untuk tekanan dari kepala bayi pada leher rahim tetap konstan ketika ibu bersalin diposisi tegak, sehingga dilatasi (pembukaan) servik dapat terjadi lebih cepat.

Kelancaran persalinan juga dapat di pengaruhi oleh ibu multigravida karena otot-otot panggul cenderung lebih mudah dilalui oleh pengeluaran janin karena pada ibu bersalin multigravida sudah pernah melahirkan sebelumnya. ibu bersalin yang pernah melahirkan sebelumnya lebih banyak yang lancar dalam persalinan kala II, karena secara anatomi jalan lahir sudah pernah dilewati seorang bayi. Kesiapan dari seorang ibu berpengaruh terhadap kecepatan persalinan, selain itu juga pendamping persalinan juga sangat penting di lakukan karena pendamping dapat membantu dan memberi support kepada ibu.

Evaluasi yang dilakukan menunjukkan hasil pelaksanaan asuhan kebidanan berkesinambungan pada pelaksanaan, Penggunaan partograf secara rutin oleh bidan dapat memastikan ibu dan bayinya mendapatkan

asuhan persalinan secara aman, adekuat dan tepat waktu serta membantu mencegah terjadinya penyulit yang dapat mengancam keselamatan jiwa.

BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari berbagai macam teori yang didapatkan dari referensi seperti jurnal maupun buku mengenai persalinan normal, sehingga penulis menghubungkan dengan teori dan konsep asuhan kebidanan pada persalinan normal maka dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu :

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan referensi terdapat tanda gejala persalinan adalah his persalinan, keluarnya lender bercampur darah, dilatasi dan effacement. Dengan adanya tanda tersebut bidan dapat mengetahui bahwa ibu akan memulai proses persalinan.
2. Berdasarkan referensi di dapatkan diagnose pada kala I yaitu fase laten dimulai dengan adanya kontraksi yang teratur dan diikuti dilatasi serviks sampai dengan 3 cm, kemudian fase aktif dimana pembukaan dari 4-10 cm. Pada kala II kontraksi akan timbulnya kontraksi serviks serta dilatasi serviks dan segmen bawah rahim. Pada kala III, dimulai dari lahirnya bayi sampai dengan plasenta lahir dalam waktu tidak lebih dari 30 menit setelah penyuntikan oksitosin yang ditandai dengan, tali pusat memanjang, dan adanya semburan darah secara tiba-tiba. Pada kala IV, dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama post partum dimana pemantauan dilakukan dengan mengobservasi tanda-tanda vital dan kontraksi uterus.

3. Berdasarkan referensi, komplikasi yang sering terjadi yaitu persalinan lama, dimana semakin lama proses persalinan, maka semakin membahayakan ibu dan janin, selain itu komplikasi yang biasa terjadi adalah perdarahan pasca persalinan, dimana terjadinya atonia uteri.
4. Berdasarkan referensi, tindakan segera dan kolaborasi dengan dokter pada saat terjadinya komplikasi dalam persalinan seperti KPD, perdarahan saat persalinan, dan partus lama, karena komplikasi tersebut membutuhkan tindakan segera untuk menyelamatkan ibu dan janin.
5. Berdasarkan referensi, rencana tindakan pada persalinan normal yaitu, pada saat proses persalinan menganjurkan ibu untuk memilih posisi yang nyaman sehingga dapat mengurangi nyeri yang di rasakan ibu dan akan mempercepat berlangsungnya persalinan.
6. Berdasarkan referensi implementasi yang dilakukan pada persalinan normal yaitu mepercepat persalinan pada kasus persalinan lama, karena ketika tidak di tangani maka akan membahayakan bagi ibu dan bayi.
7. Berdasarkan referensi dilakukan tindakan evaluasi pada persalinan yaitu pemantauan kala III dimana pada kala ini di lakukan pemantauan perdarahan, dan evaluasi pemantauan kala IV di lakukan pemantauan kontraksi uterus, TTV, dan kandung kemih.

B. Saran

Berdasarkan komplikasi yang akan terjadi pada persalinan normal maka penulis menyarankan:

1. Bagi peneliti

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih efektif dengan melakukan penelitian dengan metode surveillance yang bersifat social dan tidak mengandalkan data rekam medic rumah sakit. Selanjutnya peneliti juga mendapatkan hasil penelitian yang langsung observasional pada ibu dengan persalinan normal.

2. Untuk bidan

a. Dalam melakukan tugas sebagai bidan untuk memberikan tindakan perlu diketahui rasional setiap tindakan yang diberikan kepada klien dan harus dengan persetujuan klien.

b. Sebagai bidan dalam melakukan tindakan perlu membina hubungan yang baik antara klien

ataupun keluarga sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

c. Profesi bidan harus mampu mengambil suatu keputusan klinik untuk menghindari keterlambatan dalam merujuk sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi yang mengancam jiwa.

3. Untuk institusi

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu kiranya penerapan manajemen kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat bahwa proses sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan tenaga kesehatan yang berpotensi dan professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Addini, Lely Ayu Permata, Ira Titisari dan Ribut Eko Wijanti. 2020. *Pengaruh Pemberian Kurma Terhadap Kemajuan Persalinan Kala I Ibu Bersalin Di Rumah Sakit Aura Syifa Kabupaten Kediri*. Jurnal Kebidanan Kestra Vol. 2 No. 2
- Alvian, Euis Sisca, dkk. 2015. *Gambaran Lama Waktu Pelepasan Plasenta dengan Manajemen Aktif Kala III dan Masase Fundus Setelah Bayi Lahir di Rsud Kelas B Kabupaten Subang*. JSK Vol 3 No 4
- Aritonang Juneris, dkk. 2020. *Penurunan Rasa Nyeri Pada Persalinan Kala I Fase Aktif Melalui Masase Punggung Pada Ibu Inpartu Di Klinik Hj. Hamidah Kota Medan*. Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 6 No 1
- Ayu Ni Gusti Made dan Elin Supliyani. 2017. *Karakteristik Ibu Bersalin Kaitannya Dengan Intensitas Nyeri Persalinan Kala I Di Kota Bogor*. Jurnal Kebidanan Vol 3 No 4
- Baktiyani Siti Candra Windu. 2016. *Hubungan Antara Partus Lama Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum Dini Di Kamar Bersalin Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang*. Majalah Kesehatan FKUB Vol 3, No 4
- Brahmana Ivanna Beru. 2018. *Perdarahan Pascapersalinan oleh Karena Retensi Plasenta pada P4a0 Postpartum Spontan, Janin Besar, dengan Hipertensi dalam Kehamilan*. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Vol 18 No 1
- Budiman dan Diana Mayasari. 2017. *Perdarahan Post Partum Dini e.c Retensio Plasenta*. J Medula Unila Vol 7 No 3
- Choirunissa Risza, dkk. 2019. *Pengaruh Pemberian Effluerage Massage Di Fundus Uteri Terhadap Lamanya Persalinan Kala I Pada Multigravida Di Puskesmas Kecamatan Menteng Jakarta Pusat Tahun 2019*. JAKHKJ Vol. 5 No. 2
- Damayanti, Dini Fitri, dkk. 2019. *Lama Persalinan Kala II Pada Ibu Bersalin Primipara Berdasarkan Posisi*. Mikia Vol. 3 No. 2
- Depkes RI, 2015. *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta.
- Dinas kesehatan Sulawesi-selatan, 2016.
- Endriani Vevi. 2015. *Studi Komparasi Ibu Bersalin Normal Dengan Tindakan Massase Uterus, Perrangsangan Puting Susu Ibu Dan Manejemen Aktif Kala*

III Terhadap Kontraksi Uterus Serta Aspek Public Health Di Bps.H Ciganjur 2012. Stikes Prima Jambi

Ginarsih Yuni dan Sherly Jeniawaty. 2017. *Hubungan Penatalaksanaan Manajemen Aktif Kala Iii Dengan Kejadian Hemorrhagic Post Partum (Hpp) Primer Pada Ibu Nifas*. Tunas-Tunas Riset Kesehatan Vol VII No 4

Hajrah Wa Ode, Niken Purbowati dan Novia Nuraini. 2019. *Hubungan Faktor Maternal terhadap Posisi pada Waktu Persalinan Kala II dengan Kejadian Ruptur Perineum*. Jurnal Bidan Cerdas Vol. 2

Himawati, Laily Nurul Kodiyah. 2020. *Pengaruh Pijat Oksitosin Terhadap Nyeri Persalinan Pada Ibu Bersalin Di Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi Groboga*. Journal Of Midwifery Vol. 8 No. 1

Ilmiah, Widia Shofa. 2015. *Buku ajar Asuhan Persalinan Normal*, Yogyakarta: Nuha Medika.

Jannah , 2012. *Buku Ajar Asuhan kebidanan Kehamilan*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.

Jannah,Nurul. *ASKEB II Persalinan Berbasis Kompetensi*, Jakarta : ECG, 2017.

Jurnal Terpadu Ilmu Kebidanan, *Volume 5, No.2, Desember 2014:01-15*

Jurnal Terpadu ilmu Kesehatan, *Volume 5, No.1, Mei 2016:01-05*

Juliati. 2020. *Hubungan Jarak Kelahiran Dan Berat Bayi Lahir Dengan Kejadian Ruptur Perineum Pada Persalinan Normal Di Rsu Tgk Chik Ditiro Tahun 2019*. Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 6 No. 1

Kepmenkes RI “Standar Profesi Bidan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007”.

profesi/def_121_slide_keputusan_mentri_kesehatan_republik_indonesia_nomor_369_menkesskii2007_tentang_standar_profesi_bidan_menteri_kesehatan_republik_indonesia.pdf. (Diakses tanggal 15 juni 2017).

Kurniawati Dini. 2017. *Manajemen Intervensi Fase Laten Ke Fase Aktif Pada Kemajuan Persalina*. Jurnal Keperawatan dan Pemikiran Ilmiah

- Kusmiwiyati Ari dan Reni Wahyu Triningsih. 2018. *Hubungan Pijat Oksitosin Dengan Penurunan TFU dan Pengeluaran Lochea Pada Ibu Postpartum Normal*. Jurnal Kebidanan Vol X No. 2
- Lathifah Nur dan Fitri Yuliana. 2019. *Cara Persalinan dan Terjadinya Komplikasi Persalinan Berdasarkan Tingkat Risiko Kehamilan Menurut Skor Poedji Rochjati Di Praktik Mandiri Bidan F Banjarmasin*. Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Vol 10 No.1
- Legawati. 2018. *Asuhan persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Malang : Wineka Media
- Leny, RR. Catur, Wulandari dan Sri Wahyuni. 2019. *Efektivitas Pelvic Rocking Exercise Pada Ibu Bersalin Kala I Terhadap Kemajuan Dan Lama Persalinan*. Jurnal Ilmiah Keperawatan, Vol.7 No.1
- Livana PHI, dkk. 2017. *Karakteristik dan Tingkat Nyeri Persalinan Kala I Fase Laten*. Jurnal Ners Widya Husada Vol.4 No.3
- Masniati, Musniati dan Immawanti. 2020. *Pengalaman Perempuan dengan Persalinan Pervaginam Di Usia Dini Di Desa Mambu Tapua dan Ba'ba Tapua Di Wilayah Kerja Puskesmas Matangnga*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol 6 No 1
- Maternity Dainty. 2019. *Kompres Panas Dingin Dapat Mengurangi Nyeri Kala I Persalinan Di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin*. Jurnal Kebidanan Vol 5 No 1
- Maru, Abdurrahman Suleiman, dkk “Exploring challenges in decreasing maternal mortality in Africa with respect to failure to achieve Millennium Development Goals (MDGS) year 2016”. Journal of Research in Nursing and Midwifery. Vol. 5 no. 3 (September, 2016).
- Marle, Naomy. *Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*, Jakarta : Penerbit In Media, 2013.
- Mufdillak , dkk. *Konsep Kebidanan Edisi Revisi*, Yogyakarta :NuhaMedika : 2012.
- Mutmainnah, Annisa UI, Hj Herni Johan dan Stepanhie Sorta Llyod. 2017. *Asuhan Persalinan Normal dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta : Andi (Anggota IKAPI)
- Nurdiyan, Ayu. 2019. *Efektifitas Posisi Miring Dengan Posisi Setengah Duduk Terhadap Lama Persalinan Kala II*. Jurnal Kesehatan Vol 10 No. 2

- Nova, Silvia dan Een Mardiani. 2019. *Hubungan Senam Hamil dengan Persalinan Normal Di Bpm Ernita Kota Pekanbaru Tahun 2018*. Al-Insyirah Midwifery Vol. 8 No. 1
- Nursiah, Ai, dkk. 2014. *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Oktarina, Mika. 2016. *Buku ajar asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Oktaviani Eka , Esti Nugraheny.2019. *Dampak Kecemasan Pada Ibu Terhadap Proses Persalinan*. Jurnal Ilmu Kebidanan Vol 6 No 1
- Petan Veronika Uba.2019. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Ketidاكلancaran Proses Persalinan Normal (Studi di Rumah Sakit Umum Lewoleba Kabupaten Lembata Tahun 2015)*. Journal of Public Health Volume 1 Nomor 1
- Poha, Ernawati. 2018. *Hubungan Berat Badan Lahir Bayi dengan Tingkat Ruptur Perineum Pada Ibu dengan Persalinan Normal Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2018*. Akademi Kebidanan Sandi Karsa Makassar
- Prawirohardjo, Sarwono. 2014. *Ilmu Kebidanan*, Jakarta : PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Qonitun Umu dan Ida Nur Aini. 2017. *Gambaran Inisiasi Menyusu Dini (Imd) Terhadap Lama Kala Iii Pada Ibu Bersalin Di Ruang Mina Rs Muhammadiyah Tuba*. STIKES Nahdatu Uama Tuban
- Rahyani Ni Komang Yuni. 2020. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Patologi Bagi Bidan*. Yogyakarta : Anggota IKAPI
- Rinata Evi dan Rafhani Rosyidah. 2020. *Efektivitas kombinasi birth massage dan perubahan posisi terhadap penurunan nyeri persalinan kala I fase aktif*. Jurnal Riset Kebidanan Indonesia Vol 4 No 1
- Rudiyanti, Novita, dkk. 2014. *Anemia Dan Kontraksi Rahim Dalam Proses Persalinan*. Jurnal Keperawatan, Volume X, No. 1.
- Rusmiati, Desi. 2019. *Perbedaan Kadar Hemoglobin Ibu Sebelum dan Sesudah Persalinan Normal*. Kesehatan dan Kebidanan Vol. VIII No 1
- Sari, Dyah Permata, dkk. 2018. *Nyeri Persalinan*, Mojokerto : STIKes Majapahit Mojokerto


- Sakona Yovita dan Sumarni H.P. 2018. *Gambaran Penatalaksanaan Pencegahan Infeksi Pada Saat Proses Pertolongan Persalinan Di Puskesmas Jongaya Makassar Tahun 2017*. Jurnal Ilmiah Media Bidan Volume 3 Nomor 2
- Sagita, yona desni dan Martina. 2019. *Pemberian Aromaterapi Lavender untuk Menurunkan Intensitas Nyeri persalinan*. Wellness and Healthy Magazine Vol. 1 No. 2
- Saputri Nurwinda, dkk. 2019. *Asuhan Kebidanan Dengan Atonia Uteri*. Jurnal Kesehatan, Vol VIII No 2
- Setyaningsih, Yulis. 2017. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Persalinan Lama Pada Ibu Bersalin Di Puskesmas Larangan Utara Periode september 2015-Juni 2016*.
- Setiawati, Dewi. 2013. *Kehamilan dan pemeriksaan Kehamilan*. Makassar : Alauddin University Press.
- Sielvia HS1 dan Mega Rahmawati. 2018. *Lamanya Proses Persalinan Kala Ii Dapat Beresiko Asfiksia Neonatorum*. Akademi Kebidanan Patriot Bangsa Husada
- Sugiartini, Desak Ketut dan Luh Ayu Purnam. 2019. *Hubungan Senam Zumba dengan Kemajuan Persalinan Pada Ibu Bersalin Kala I Fase Aktif Di Klinik Bersalin Tukad Luah Desa Tianyar Kecamatan Tianyar Kabupaten Karangasem*. Jurnal Kesehatan Midwinerslion Vol. 4 No. 1
- Suprijati dan Sri Wuriyani. 2015. *Hubungan Keberhasilan Penatalaksanaan Atonia Uteri Dengan Perdarahan Pasca Salin Di BPM Wilayah Madiun Selatan*. Jurnal Delima Harapan Vol 3 No.2
- Sukmiati, Eti. 2018. *Evaluasi Manajemen Aktif Kala Iii Persalinan Di Rumah Bersalin Pangestu Bandung*. Bandung
- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah*, Jakarta : Lentera hati.
- Sulyastini Ni Komang.2020. *Komplikasi Persalinan Dengan Riwayat Kehamilan Resiko Tinggi di Puskesmas Gerokgak I Tahun 2020*. Seminar Nasional Riset Inovatif
- Sulistyoningtyas Sholaikhah dan Fitnaningsih Endang Cahyawati. 2020. *Karakteristik Dan Penanganan Perdarahan Pada Ibu Postpartum*. Jurnal Keperawatan Vol 12 No 1

- Sulistiyawati Henny. 2020. *Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Lama Persalinan Kala I (Studi Di BPM Lilis Suryawati Jombang)*. Jurnal Ilmiah, Vol. 3 No. 2
- Syaiful Yuanita dan Lilis Fatmawati. 2020. *Asuhan Keperawatan Pada Ibu Bersalin*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing
- Tambun, Mastaida. 2019. *Hubungan Rangsangan Taktil Papilla Mammae Terhadap Kemajuan Persalinan Kala I Fase Aktif Di Klinik Henny Kota Medan*. Jurnal Ilmiah Maksitek Vol. 4 No 4
- Triana Ani, dkk. 2015. *Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*. Yogyakarta : CV Budi Utama
- Triwidiyantari Dyah. 2021. *Peran Imd Terhadap Kala III Persalinan*. Jurnal Sehat Masada Vol. Xv No 1
- Utami Istri dan Enny Fitriahadi. 2019. *Buku Ajar Asuhan Persalinan & Manajemen Nyeri Persalinan*. Yogyakarta
- Yeyek, Ai, dkk. 2014. *Asuhan kebidanan II Persalinan*, DKI Jakarta : CV-Trans Info Media.
- Yohana, Akim dan Wiwit Desi Intarti. 2019. *Efektifitas Statik Kontraksi Otot Dasar Panggul, Transversus Abdominis, Dan Ekstremitas Inferior Terhadap Pembukaan Serviks Kala 1 Persalinan*. Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap
- Yuliyawati dan Yetti Anggraini. 2015. *Hubungan Riwayat Pre Eklamsia, Retensio Plasenta, Atonia Uteri Dan Laserasi Jalan Lahir Dengan Kejadian Perdarahan Post Partum Pada Ibu Nifas*. Jurnal Kesehatan Vol VI, No1.
- Yulianti Nila Trisna dan Karnilan Lestari Ningsi Sam. 2019. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru lahir*. Makassar : Cendekia Publisher
- Yuwansyah, Yeti. 2019. *Suami dan Karakteristik His Terhadap Persalinan Lama Di Rsud Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2019*. Jurnal kampus stikes YPIB Majalengka Volume VII No. 15
- Yuliyawati. 2019. *Efek Kombinasi Counterpressure dan Pelvic Rocking Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Persalinan Normal Kala I Fase Aktif*. Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai Vol. 12 No 2

LAMPIRAN

PARTOGRAF

No. Register Nama Ibu : _____ Umur : _____ G. _____ P. _____ A. _____
 No. Puskesmas Tanggal : _____ Jam : _____ Alamat : _____
 Ketuban pecah Sejak jam _____ mules sejak jam _____



Partograf (lembar depan).

CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal :
2. Nama bidan :
3. Tempat Persalinan :
 Rumah Ibu Puskesmas
 Polindes Rumah Sakit
 Klinik Swasta Lainnya :
4. Alamat tempat persalinan :
5. Catatan : rujuk, kala : I / II / III / IV
6. Alasan merujuk:
7. Tempat rujukan:
8. Pendamping pada saat merujuk :
 Bidan Teman
 Suami Dukun
 Keluarga Tidak ada

KALA I

9. Partogram melewati garis waspada : Y / T
10. Masalah lain, sebutkan :
11. Penatalaksanaan masalah Tsb :
12. Hasilnya :

KALA II

13. Episiotomi :
 Ya, Indikasi
- Tidak
14. Pendamping pada saat persalinan
 Suami Teman Tidak ada
 Keluarga Dukun
15. Gawat Janin :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
16. Distosia bahu :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
17. Masalah lain, sebutkan :
18. Penatalaksanaan masalah tersebut :
19. Hasilnya :

KALA III

20. Lama kala III :menit
21. Pemberian Oksitosin 10 U Im ?
 Ya, waktu : menit sesudah persalinan
 Tidak, alasan
22. Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
 Ya, alasan
- Tidak
23. Penegangan tali pusat terkendali ?
 Ya,
 Tidak, alasan

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi		Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1								
2								

Masalah kala IV :

Penatalaksanaan masalah tersebut :

Hasilnya :

24. Masase fundus uteri ?
 Ya.
 Tidak, alasan
25. Plasenta lahir lengkap (*intact*) Ya / Tidak
 Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
 a.
 b.
26. Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya / Tidak
 Ya, tindakan :
 a.
 b.
 c.
27. Laserasi :
 Ya, dimana
- Tidak.
28. Jika laserasi perineum, derajat : 1 / 2 / 3 / 4
 Tindakan :
 Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
 Tidak dijahit, alasan
29. Atoni uteri :
 Ya, tindakan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
30. Jumlah perdarahan : ml
31. Masalah lain, sebutkan
32. Penatalaksanaan masalah tersebut :
33. Hasilnya :

BAYI BARU LAHIR :

34. Berat badangram
35. Panjang cm
36. Jenis kelamin : L / P
37. Penilaian bayi baru lahir : baik / ada penyulit
38. Bayi lahir :
 Normal, tindakan :
 mengeringkan
 menghangatkan
 rangsang taktil
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 Aspiksia ringan/pucat/biru/lemas/tindakan :
 mengeringkan bebaskan jalan napas
 rangsang taktil menghangatkan
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 lain - lain sebutkan
- Cacat bawaan, sebutkan :
- Hipotermi, tindakan :
 a.
 b.
 c.
39. Pemberian ASI
 Ya, waktu :jam setelah bayi lahir
 Tidak, alasan
40. Masalah lain,sebutkan :
- Hasilnya :

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama : **NUR AFNI WULANDARI**

Nim : 70400115038

TTL : Jeneponto, 29 Agustus 1997

Suku : Makassar

Agama : Islam

Alamat : Tamarunang, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten
Jeneponto

Nama orang tua

Ayah : Muh. Arsyad

Ibu : Sayana. L

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2003-2009 SD Inpres 112 Tamarunang
2. Tahun 2009-2012 MTsN 1 Jeneponto
3. Tahun 2012-2015 SMK Primanegara Jeneponto
4. Tahun 2015-2021 UIN Alauddin Makassar