MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA NY "I" DENGAN HIPERTENSI GESTASIONAL GESTASI 36-38 MINGGU DI PUSKESMAS BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA TANGGAL 15 JANUARI-12 MARET 2020

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan DIII Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RIKA
70400116002

JURUSAN DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2020

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Rika
Nim	: 70400116002
Tempat/Tgl. Lahir	: Lantang, 30 April 1998
Jur/Prodi/Konsentrasi	: D3 Kebidanan
Fakultas/Program	: Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat	: Jl. Permandian, Desa Lantang, Kec. Polongbangkeng selatan, Kab. Takalar.
Judul	: Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya tulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 28 September 2020 M
10 Safar 1442 H

Penyusun

RIKA
Nim. 70400116002

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Rika

Nim : 70400116002

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal pada Ny "I" dengan *Hipertensi Gestasional Gestasi* 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar ujian Karya Tulis Ilmiah Program studi Kebidanan DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas islam Negeri Alauddin Makassar UIN Alauddin Makassar.

Samata, 28 Agustus 2020
10 Safar 1442 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Firdayanti, S.Si.T.,M.Keb	Ferawati Taherong,S.ST.,M.Keb
NIP.197511132006042001	NIP.198709242019032012

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **"Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny"I" Dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu Di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020"**, yang disusun oleh **Rika Nim: 70400116002** Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Kamis 28 September 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 28 September 2020
10 Safar 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: **Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes**	(.....)
Sekertaris	: **Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST.,M.Keb**	(.....)
Pembimbing I	: **Firdayanti, S.SiT., M.Keb**	(.....)
Pembimbing II	: **Ferawati Taherong, S.Si.T., M.Keb**	(.....)
Penguji I	: **Dr. dr. Hj. Nadyah Haruna, M.Kes**	(.....)
Penguji II	: **Prof. Hj. Siti Aisyah, M.A., Ph.D**	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah memberikan pencerahan akan kebenaran kepada seluruh umat manusia dimuka bumi terutama kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **" Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020".** Karya Tulis ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajiannya. Oleh karena itu masukan, kritikan, serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Terima kasih kepada kedua orang tua saya, ayahanda Simolla dan Ibunda Kasmawati, yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, bimbingan, dan pelajaran hidup yang begitu besar untuk saya dan juga kepada adik saya, Abdul Rahim serta keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan moril dan material selama masa studi serta mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes beserta wakil dekan dan seluruh staf administrasi
3. Ibunda Firdayanti, S.Si.T., M.Keb selaku ketua prodi kebidanan dan sebagai pembimbing utama yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dan telah ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan senantiasa mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh penulis,sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah.
4. Ibunda Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dan telah ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan senantiasa mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah.
5. Ibunda Dr. dr. Hj Nadya Haruna, M.Kes, selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah.
6. Ibunda Prof. Hj. Siti Aisyah, M.A., Ph.D selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah.
7. Para dosen jurusan kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

8. Kepala Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah.
9. Kepada semua teman-teman kebidanan khususnya angkatan 2016 serta kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga semua perjuangan kita sebagai amal baik di sisi-Nya.

Niat yang baik dari hati akan mendapatkan hasil yang baik pula, dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda “Innamal a‟maalu bin niyyah” (Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat), kalimat itulah yang selalu menjadikan pedoman bagi penulis agar menjadi lebih semangat meskipun dalam menyusun KTI ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Allahumma Amin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Samata, 28 September 2020
10 Safar 1442 H

Penulis

RIKA
Nim. 70400116002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar belakang 1

B. Ruang Lingkup Pembahasan 3

C. Tujuan Penulisan 4

D. Manfaat Penulisan 5

E. Metode Penulisan 6

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan 10

1. Definisi Kehamilan 10

2. Proses kehamilan 15

3. Kebutuhan Dasar Ibu Hamil Sesuai dengan Tahap Perkembangannya 18

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

B. Tinjauan Khusus Tentang Hipertensi Gestasional 22

1. Defenisi 22

2. Faktor Risiko Hipertensi Gestasional..... 22

3. Patofisiologi Hipertensi Gestasional 24

4. Etiologi 30

5. Diagnosis Hipertensi Gestasional 33

6. Komplikasi Hipertensi Gestasional dalam Kehamilan. 33

7. Penatalaksanaan Hipertensi Gestasional 36

C. Tinjauan Manajemen Asuhan Kebidanan 38

D. Tinjauan Umum Hipertensi Gestasional pada Ibu Hamil Menurut Pandangan Agama Islam 47

BAB III STUDI KASUS 54

A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar 54

B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual 61

C. Langkah III. Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial 67

D. Langkah IV. Identifikasi Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi 68

E. Langkah V. Rencana Tindakan 69

F. Langkah VI. Implementasi Asuhan Kebidanan 73

G. Langkah VII. Evaluasi 75

BAB IV PEMBAHASAN..... 138

A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar 138

B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual 143

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

C. Langkah III : Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial 146

D. Langkah IV : Identifikasi Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi 148

E. Langkah V : Rencana Asuhan 149

F. Langkah VI : Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan 153

G. Langkah VII : Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan 156

H. Pendokumentasian 158

BAB V PENUTUP 159

A. Kesimpulan 159

B. Saran 161

DAFTAR PUSTAKA 163

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 pemantauan pada kasus Ny “I”……136

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Lembar Rekomendasi Etik

Lampiran II : Surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Lampiran III : Surat permohonan izin penelitian dari Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) kepada Bupati Gowa.

Lampiran IV : Surat Izin Rekomendasi Penelitian dari Bupati Gowa /Kepala Badan Kesbang Dan Politik Kabupaten Gowa Kepada Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Lampiran V : Surat keterangan selesai penelitian dari Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, 17 AGUSTUS 2020

Nama : Rika
NIM : 70400116002
Pembimbing I : Firdayanti
Pembimbing II: Ferawati Taherong
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu Di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari – 12 Maret 2020

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa protein urin dan normal setelah kehamilan. Hipertensi gestasional merupakan hipertensi ringan (tingkat I) dengan tekanan darah 140/90 sampai dengan 149/99 mmHg.

Tugas akhir ini untuk melakukan pendekatan Asuhan Kebidanan Antenatal pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional gestasi 36-38 minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa tahun 2020 selama 8 minggu dengan melakukan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah menurut Helen Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Asuhan yang diberikan pada Ibu dengan kasus kehamilan Hipertensi Gestasional yaitu memantau tekanan darah dan protein urin, mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi serta mengurangi mengkonsumsi garam. Asuhan ini dilakukan mulai dari awal pemeriksaan pada usia kehamilan 36 minggu 1 Hari sampai dengan 42 hari post partum.

Hasil yang didapatkan pada pemeriksaan awal tekanan darah 150/100 mmHg tanpa protein urin, menjadi 130/90 mmHg setelah melahirkan, dan pada hari ketiga post partum tekanan darah ibu kembali normal yaitu 110/80 mmHg.

Kata kunci : Hipertensi Gestasional, persalinan, postpartum 7 langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SCIENTIFC PAPER, AUGUST 17 2020

Name : **Rika**

Reg. Number : **70400116002**

Supervisor I : **Firdayanti**

Supervisor II : **Ferawati Taherong**

Tittle : **The Management of an Antenatal Midwifery Care for Mrs. "I" with a Gestational Hypertension on the Period of 36-38 Weeks at Bontomarannu Health Center of Gowa on January 15th to March 12th of 2020**

Gestational hypertension is hypertension that appears after 20 weeks of gestation. This type of hypertension has been related to urine protein. The gestational hypertension was considered as a moderate hypertension (level I) with a blood pressure of 140/90 to 149/99 mmHg.

This final report aims to describe the management of the antenatal midwifery care for Mrs. "I" with a gestational hypertension on the period of 36-38 weeks at Bontomarannu Health Center of Gowa in 2020. The study was conducted for 8 weeks by employing 7-stages midwifery care approach suggested by Helen Varney and SOAP documentation procedure.

The research findings suggested that the antenatal midwifery care arranged for Mrs. "I" with a gestational hypertension included the monitoring on the patient's blood pressure and urine protein. In addition, the patient was advised to consume foods containing nutrients and to reduce salt consumption. The caring management was carried out from the initial examination at 36 weeks and 1 day of gestation up to the 42 days during the post partum.

The results obtained at the first examination on the patient's blood pressure was 150/100 mmHg without urine protein. After the delivery, the examination result was 130/90 mmHg. Finally, on the third day of post partum, the patient's blood pressure returned to normal pressure namely 110/80 mmHg.

Key Words: Gestational hypertension, Delivery, Postpartum, 7-stages of Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa protein urin dan normal setelah kehamilan. Hipertensi gestasional merupakan hipertensi ringan (tingkat I) dengan tekanan darah 140/90 sampai dengan 149/99 mmHg. Sehingga biasanya tidak diperlukan tindak lanjut setelah persalinan kecuali jika ditemukan adanya riwayat hipertensi sebelum kehamilan (Andrei Brateanu, 2019).

Hal ini disebabkan selain oleh etiologi yang belum jelas, juga oleh perawatan dalam persalinan yang masih ditangani oleh petugas non medik dan system rujukan yang belum sempurna. Terdapat banyak faktor resiko untuk terjadinya hipertensi gestasional dalam kehamilan yang meliputi: mola hidatidosa, kehamilan multiple, diabetes militus, bayi besar, usia, riwayat keluarga pernah menderita hipertensi, riwayat preeklampsia atau eklampsia, penyakit-penyakit ginjal dan hipertensi yang sudah ada sebelum hamil, dan obesitas (Jumaiza, dkk 2018).

Akibat dari hipertensi gestasional selama kehamilan yaitu dapat menyebabkan komplikasi ibu yang parah, termasuk kejang eklampsia, perdarahan intraserebral, edema paru (karena kebocoran kapiler, disfungsi miokard, pemberian cairan intravena berlebihan). Komplikasi janin meliputi plasenta abruptio, pembatasan pertumbuhan intrauterine, persalinan prematur, dan kematian janin intrauterine (Nur Islamiah 2012).

Dampak dari hipertensi kehamilan lebih lanjut antara lain risiko kematian maternal, angka prematuritas, berat badan bayi lahir rendah, dan angka kematian perinatal meningkat (Nur Islamiah 2012).

World Health Organization (WHO) menunjukkan pada tahun 2017 jumlah kasus hipertensi gestasional sebanyak 839 juta kasus. Kasus ini diperkirakan akan semakin tinggi pada tahun 2025 dengan jumlah 1,15 milyar kasus atau sekitar 29% dari total penduduk dunia. Secara global, 80% kematian ibu hamil yang tergolong dalam penyebab kematian ibu secara langsung, yaitu disebabkan karena terjadi perdarahan (25%) biasanya perdarahan pasca persalinan, hipertensi pada ibu hamil (12%), partus macet (8%), aborsi (13%) dan karena sebab lain (7%) (WHO) 2017.

Di Indonesia kematian ibu peringkat pertama disebabkan oleh hipertensi gestasional 30% dan komplikasi/perdarahan yaitu 31%. Hipertensi pada kehamilan masih merupakan penyebab utama kematian maternal dan perinatal terutama di negara berkembang diperkirakan 15–40% kematian maternal (Profil kesehatan, 2017).

Berdasarkan hasil laporan tahunan bidan kesehatan masyarakat jumlah kematian ibu sebanyak 121 orang disebabkan karna perdarahan sebanyak 63 orang (52,07%) , hipertensi gestasional sebanyak 28 orang (1,65%), infeksi 2 orang (0,02%), abortus 1 orang (0,82%), partus lama 1 orang (0,82%), karena penyebab lain sebanyak 26 orang (21,48%) (Dinkes Sul- Sel,2014:57).

Data yang diperoleh dari Puskesmas Bontomarannu mengenai kasus hipertensi gestasional di dapatkan data yang diperoleh dari ruangan rekam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

medik, menunjukan jumlah kasus hipertensi gestasional tahun 2015 sebanyak 110 kasus dan tahun 2016 sebanyak 126, 2017 sebanyak 131 tahun 2018 sebanyak 133 dan terakhir tahun 2019 dari bulan Januari sampai bulan Maret sebanyak 4 kasus (Rekam Medik Puskesmas Bontomarannu 2019).

Oleh karena itu bidan berperan sesuai dengan standar kompetensi bidan yang ke-3 yaitu Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi deteksi dini, pengobatan atau rujukan dalam hal ini bidan memberikan asuhan antenatal berupa edukasi sebagai tindak pencegahan dan deteksi dini risiko kehamilan salah satunya yaitu hipertensi gestasional, selain pencegahan bidan juga dapat memberikan pengobatan dan rujukan sebagai tindak lanjut dari hipertensi gestasional (Kemenkes 2016).

Berdasarkan latar belakang diatas harapan penulis jika kasus diatas tidak bisa di tangani setidaknya tidak memperparah kejadian atau membuat jumlah AKI semakin meningkat, sehingga diperlukan untuk mendukung pembangunan kesehatan,dengan melakukan asuhan kebidanan antenatal pada Ny “I” dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan karya tulis ilmiah ini adalah manajemen asuhan kebidanan antenatal pada Ny “I” dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dilakukannya Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020 dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi atau wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

a. Dilakukannya pengkajian Manajemen Asuhan kebidanan Antenatal pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020

b. Dilakukannya perumusan diagnosa/masalah aktual kasus pada Manajemen Asuhan kebidanan Antenatal pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020

c. Dilakukannya perumusan diagnosa/masalah potensial pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020

d. Dilakukannya tindakan segera dan kolaborasi pada kasus Manajemen Asuhan kebidanan Antenatal pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

e. Dilakukannya rencana tindakan Manajemen Asuhan kebidanan Antenatal pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020

f. Dilakukannya tindakan Manajemen Asuhan kebidanan Antenatal pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020

g. Dilakukannya evaluasi asuhan kebidanan yang telah di berikan pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020.

h. Dilakukannya pendokumentasian semua hasil tindakan Manajemen Asuhan kebidanan Antenatal pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat praktis

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

2. Manfaat ilmiah

Sebagai bahan masukan atau informasi bagi tenaga bidan, maupun tenaga kesehatan lainnya khususnya yang berkaitan dengan hipertensi gestasional.

3. Manfaat institusi

Sebagai bahan acuan yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan institusi dan penulisan karya ilmiah selanjutnya.

4. Manfaat bagi penulis

Sebagai bahan tambahan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis untuk memperluas dan menambah wawasan dalam asuhan kebidanan.

E. Metode Penulisan

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini berdasarkan teori ilmiah yang dipadukan dengan praktek dan pengalaman menulis memerlukan data yang objektif dan relevan dengan teori–teori yang terjadi dasar analisa dalam pemecahan masalah. Untuk itu penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari buku–buku literatur dan mengambil data-data dari internet (scholar/cendikia), antara lain : membaca buku dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hipetensi gestasional, mengakses data melalui internet dan mempelajari karya tulis ilmiah yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

2. Studi Kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi 7 langkah varney yaitu: identifikasi dan analisa data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, antisipasi diagnosa/masalah potensial, melakukan tindakan segera dan kolaborasi, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi hasil tindakan untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik.

a. Anamnesa/wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan pasien dan suami maupun keluarganya serta bidan dan dokter yang dapat membantu memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan dalam memberikan asuhan kebidanan.

b. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematik meliputi inspeksi, palpasi, auskultasi dan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan ultrasonigrafi (USG) dan lain-lain.

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

3. Studi dokumentasi

Membaca dan mempelajari status yang berhubungan dengan keadaan pasien yang bersumber dari catatan dokter, bidan, perawat, petugas laboratorium dan atau hasil pemeriksaan penunjang lainnya.

4. Kasus

Mengadakan konsultasi dengan bidan dan dokter yang menangani pasien serta pembimbingan karya tulis ilmiah mengenai masalah yang dialami pasien yakni hipertensi gestasional.

F. Sistematika Penulisan

BAB 1, di bab ini terdapat pendahuluan. Dimana akan diuraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini dibahas tentang tujuan umum kehamilan (pengertian kehamilan, tanda dan gelaja kehamilan dan nutrisi dalam kehamilan), pengertian, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan diagnostik, penatalaksanaan, komplikasi dan yang terahir membahas tentang proses manajemen asuhan kebidanan (pengertian manajeman asuhan kebidanan dan proses manajemen asuhan kebidanan).

BAB III, membahas tentang langkah 1 pengkajian dan analisa data dasar, langkah II merumuskan diagnosa/masalah aktual, langkah III antisipasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV tindakan segera dan kolaborasi, langkah V rencana tindakan asuhan kebidanan, langkah VI penatalaksanaan tindakan asuhan kebidanan dan langkah VII evaluasi hasil asuhan kebidanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV, bab ini membahas tentang persamaan, perbedaan dan atau kesenjangan yang terjadi antara kasus yang telah diteliti dengan teori yang telah dibahas sebelumnya dan juga menjawab tujuan penelitian.

BAB V, bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah diberikan, semua temuan serta pengetahuan yang telah didapatkan dari hasil asuhan, Terakhir terdapat daftar pustaka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan.

1. Kehamilan

Menurut *Federasi Obstetri Ginekologi Internasional*, kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, dimana trimester kesatu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke 13 hingga 27 mingggu), dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke 28- 40) (Prawirohaedjo, Sarwono, 2014: 213).

Masa kehamilan yaitu dimulai dari konsepsi sampai akhirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus adalah kira-kira 280 hari, dan tidak lebih 300 hari (43 minggu). Kehamilan 40 minggu ini disebut matur (cukup bulan). Bila kehamilan lebih dari 43 minggu disebut kehamilan prematur (Nadyah, 2013 : 37)

Menurut Taufan (2014) kehamilan merupakan proses yang alamiah. Perubahan-perubahan yang terjadi pada wanita selama kehamilan normal adalah bersifat fisiologis, bukan patologis. Oleh

karenanya, asuhan yang di berikan pun adalah asuhan yang meminimalkan intervensi. Kehamilan merupakan pengalaman yang sangat bermakna begi perempuan, keluarga dan masyarakat. Perilaku ibu selama masa kehamilannya akan mempengaruhi kehamilannya, perilaku ibu dalam mencari penolong persalinan akan mempengaruhi kesehatan ibu dan janin yang dilahirkan. (Zuhrotunida 2016).

Kehamilan merupakan fertilisasi atau bertemunya sel telur (ovum) wanita dengan sel benih (spermatozoa) pria. Penyatuan dari spermatozoa dan ovum dilanjutkan dengan pembelahan sel (zigot). Setelah terjadinya pembelahan sel maka akan terjadi nidasi atau implantasi pada lapisan endometrium dinding kavum uteri. Pertumbuhan dan perkembangan zigot-embrio-janin menjadi bakal individu baru (Setiawati, 2013:7).

Kehamilan adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh didalam tubuhnya. Kehamilan merupakan suatu proses reproduksi yang perlu perawatan khusus agar dapat berlangsung dengan baik, karena ibu hamil yang pada mulanya normal, secara tiba-tiba dapat menjadi beresiko tinggi (Setyaningsih, 2014).

a. Tanda–tanda kehamilan

1. Tanda yang tidak pasti/tanda mungkin kehamilan

a) Amenorhea

Bila seorang wanita dalam masa mampu hamil, apabila sudah kawin mengeluh terlambat haid, maka perkiraan bahwa dia hamil, meskipun keadaan stres, obat-

obatan, penyakit kronis dapat pula mengakibatkan terlambat haid (Pantiawati, 2010: 75).

b) Mual dan Muntah

Mual dan muntah merupakan gejala umum, mulai dari rasa tidak enak sampai muntah yang berkepanjangan. Dalam kedokteran sering dikenal dengan *morning sickness* karena munculnya seringkali di pagi hari. Mual dan muntah diperberat oleh makanan yang baunya menusuk dan juga oleh emosi penderita yang tidak stabil. Untuk mengatasi penderita diberi makan-makanan ringan, mudah dicerna (Ika dan Saryono, 2010: 65).

c) Mastodinia

Mastodinia adalah rasa kencang dan sakit pada payudara disebabkan payudara membesar. Pembesaran payudara disebabkan oleh stimulasi hormon estrogen, progeteron, *hormon plasenta laktogen* (HPL) dan sedikit prolaktin yang mengakibatkan bertambahnya vaskularisasi dan proliferasi asinus dan duktus kelenjar mammae. *Mastodinia* dapat pula terjadi pada masa pra-menstruasi.

d) Quickening

Quickening adalah persepsi gerakan janin pertama, biasanya disadari oleh wanita pada kehamilan 18-20 minggu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

e) Keluhan kencing

Frekuensi kencing bertambah dan sering kencing malam, disebabkan karena desakan uterus yang membesar dan tarikan oleh uterus ke cranial.

f) Konstipasi

Ini terjadi karena efek relaksasi progesterone yang menyebabkan relaksasi otot polos, termasuk otot polos usus, menyebabkan tonus otot polos berkurang, suka kontraksi sehingga sukar buang air besar. Konstipasi juga dapat berubah karena pola makanan.

g) Perubahan berat badan

Pada kehamilan 2-3 bulan sering terjadi penurunan berat badan karena nafsu makan menurun dan muntah-muntah. Pada bulan selanjutnya berat badan akan terus meningkat sampai stabil menjelang aterm (Ika dan Saryono, 2010: 68).

h) Perubahan temperatur basal

Kenaikan temperatur basal lebih dari 3 minggu biasanya merupakan tanda telah terjadinya kehamilan.

i) Perubahan warna kulit

Perubahan ini antara lain chluasma yakni warna kulit yang kehitam-hitaman pada dahi, punggung, hidung dan daerah tulang pipi, terutama pada wanita warna kulit tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Biasanya muncul pada usia kehamilan 16 minggu. Pada daerah dan puting payudara, warna kulit menjadi lebih hitam. Perubahan–perubahan ini disebakan oleh stimulasi *melanocyte stimulating hormon* (MSH) (Ika dan Saryono, 2010: 80).

j) Perubahan payudara

Akibat stimulasi prolaktin dan HPL, payudara mensekresi kolostrum, biasanya setelah kehamilan lebih dari 16 minggu (Ika dan Saryono, 2010: 80).

k) Perubahan uterus

Uterus mengalami perubahan pada ukuran, bentuk dan konsistensi. uterus berubah menjadi lunak, bentuknya globular. Teraba *ballotement*, tanda ini muncul pada minggu ke 16-20 minggu, setelah rongga rahim mengalami obliterasi dan cairan amnion cukup banyak (Ika dan Saryono, 2010: 80).

l) Tanda *piskacek's*

Terjadinya pertumbuhan yang asimetris pada bagian uterus yang dekat dengan implantasi plasenta (Ika dan Saryono, 2010: 80).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

2. Tanda pasti kehamilan

a. Denyut jantung janin (DJJ)

b. Palpasi yang akan jelas setelah minggu ke 22. Gerakan janin dapat dirasakan sangat jelas setelah 24 minggu.

c. Ultrasonikgrafi (USG).

d. Rontgenografi

Gambaran tulang-tulang janin tampak setelah minggu ke 12 sampai 14. Pemeriksaan ini boleh dikerjakan bila terdapat keraguan dalam diagnosa kehamilan dan atas indikasi yang mendesak sekali, sebab janin sangat peka terhadap sinar X.

e. Fetal electro cardiografi (ECG) dapat direkam pada minggu ke 12.

f. Tes laboratorium bertujuan untuk mendeteksi adanya HCG dalam urine (Nur Islamiah 2012: 54).

2. Proses Kehamilan

Fertilisasi (pembuahan) adalah persatuan *ovum*(oosi sekunder) dan *spermatozoa*yang biasanya berlangsung di ampula tuba. Fertilisasi meliputi penetrasi spermatozoa kedalam ovum, fusi spermatozoa dan ovum diakhiri dengan fusi materi genetik. Hanya satu spermatozoa harus melewati *korona radiata*yaitu dua lapisan yang menutupi dan mencegah ovum mengalami fertilisasi lebih dari satu spermatozoa. Suatu molekul komplemen khusus dipermukaan kepala spermatozoa kemudian mengkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ZP3 *glikoprotein* di zona pelusida. Peningkatan ini memicu *akrosom* melepaskan *enzim*yang membantu spermatozoa menembus zona pelusida.

Dari beberapa jam setelah pembuahn terjadi, mulailah pembelahan *zigot*. Hal ini dapat berlangsung oleh karena *sitoplasma ovum*mengandung banyak zat *asam amino*dan *.enzim.* segera setelah pembelahan ini terjadi, pembelahan-pembelahan selanjutnya berjlan dengan lancar, dan dalam 3 hari terbentuk suatu kelompoksel yang sama besarnya. Hasil konsepsi berada dalam *stadium morula.* Energi untuk pembelahan ini diperoleh oleh morula. Dengan demikian, zona pelusida tetap tuh, atau dengan perkataan lain.

Besarnya hasil konsepsi tetap sama. Dalam ukuran yang sama ini hasil konsepsi disalurkan terus ke pars ismuska dan pars interstisialis tuba (bagian-bagian tuba yang sempit) dan terus disalurkan ke arah *kavum uteri*oleh arus sert gerakan silia pada permukaan sel-sel dan kontraksi tuba.

Selanjutnya pada hari ke empat hasil konsepsi mencapai stadium *blastula*disebut *blastokista*, suatu bentuk yang dibagian luarnya adalah trofoblas dan dibagian dalamnya disebut massa *inner cell*.Massa inner cell ini berkembang menjadi janin dan trofoblas akan berkembang menjadi plasenta. Dengan demikian, blastoista diselebungi oleh suatu simpai yang disebut dengan keberhasilan *nidasi*(implantasi), produksi hormon kehamilan, proteksi imunitas bagi janin, peningkatan aliran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

darah maternal ke dalam plasenta, dan kelahiran bayi, sejak tropoblas terbentuk, produksi hormon *Human Chorionic Gonadotropin* (HCG) dimulai, suatu hormon yang memastikan bahwa *endometrium* akan menerima (resptif) dalam proses kehamilan.

Nidasi diatur oleh proses yang kompleks antara *trofoblas* dan endometrium. Di satu sisitrofoblas mempunyai kemampuan invasif yang kuat, disisi lain endometrium mengontrol invasi tropoblas dengan menyeksresi faktor-faktor yang aktif plasentasi yang normal adalah hasil keseimbangan proses antara trofoblas dan endometrium.

Invasi trofoblas diatur oleh pengaturan kadar HCG. Sinsisiotrofoblas menghasilkan HCG yang akan mengubah sitotrofoblas menyekresikan hormon yang noninvatif. Trofoblas yang semakin dekat dengan endometrium menghasilkan kadr HCG yang semakin rendah, dan membuat trofoblas berdiferensasi dalam sel-sel jangkar yang menghasilkan protein perekat plasenta yaitu t*roobouteronectin* trofoblas-trofoblasinvasif lain lepas dan berimgrasi kedalam endometrium dan miometrium akan menghasilkan protase dan inhibitor protase yang diduga mengfasilitasi proses invasi kedalam jaringan maternal.

Kelainan dalam optimalisasi aktivitas trofoblas dalam proses nidasi akan berlanjut dengan berbagai macam penyakit dalam kehamilan. Apabila inivas trofoblas ke arteri spiraslis maternal lemah atautidak terjadi makan arus darah uteroplasenta rendah dan menimbulkan sindrom preeklampsia. Kondisi ini juga akan menginduksi plasenta menyekresi

substansi vasoaktif yang memicu hipertensi maternal. Kenaikan tekanan darah ibu dapat merusak arteri spiralis dan tersumbat, sehingga terjadi infark plasenta. Sebaliknya onvasi trofoblas yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyakit trofoblas gestasional seperti molahidatidosa dan kariokarsinoma.

Selanjutnya pembentukan struktur dan jenis plasenta. Setelah nidasi embrio kedalam endometrium, plasentasi dimulai. Pada manusia plasentasi berlangsung sampai 12-18 minggu setelah fertilisasi. Dalam 2 minggu pertama perkemvangan hasil konsepsi, trofoblas invasif telah melakukan penetrasi ke pembuluh darah dan endometrium. Terbentuklah sinus intertrofoblastik yaitu ruangan-ruangan yang berisi darah maternal dan pembulu-pembuluh darah yang dihancurkan. Pertumbuhan ini berjalan terus, sehinga timbul ruangan-ruangan tersebut sampai terbentuknya plasenta (Prawirohardjo Sarwono, 2014: 139-146).

3. Kebutuhan Dasar Ibu Hamil Sesuai dengan Tahap Perkembangannya

a. Kebutuhan nutrisi ibu hamil trimester I, II, III

Sangat penting untuk memperhatikan kebutuhan nutrisi seorang ibu hamil. Karena makanan yang dikonsumsi ibu bukanlah untuk ibu sendiri tetapi di asup pula oleh sang jabang bayi. Sehingga seorang ibu hamil wajib memperhatikan kebutuhan gizinya.berikut ini merupakan informasi kebutuhan gizi penting selama hamil serta cara memenuhinya (Yanuarti, dkk, 2014: 8).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

1) Kalori

Pada 3 bulan pertama kehamilan, asupan energi tidak perlu ditingkatkan apabila mengkomsumsi makanan bergizi. Sedangkan pada trimester dua akhir, tubuh sangat membutuhkan tambahan 300 kalori per hari dibandingkan waktu sebelum hamil (Yanuarti, dkk, 2014: 9).

2) Protein

Ibu hamil dan bayi sangat memerlukan banyak protein sebagai nutrisi penunjang pertumbahan jaringan. Ibu hamil perlu mengkonsumsi 60 gram protein perhari, yaitu 20-36% lebih tinggi dari kebutuhan normal. Beberapa sumber protein hewani yang bisa dikonsumsi adalah ikan, seafood, unggas, daging sapi, hati, dan telur. Sedangkan untuk sumber protein nabati adalah tahu, tempe, kacang polong, kacang-kacangan, dan serealia (Yanuarti, dkk, 2014: 9).

3) Lemak

Lemak dapat membantu tubuh untuk menyerap banyak nutrisi. Lemak juga menghasilakan energi, dan menghemat protein untuk dimanfaatkan dalam fungsi-fungsi pertumbuhan namun demikian, dalam keadaan hamil sekalipun ibu hamil harus membatasi asupan lemak karena kandungan kalorinya amat tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Jika ibu hamil mengkonsusmsi makanan berlemak terlalu banyak, berat badan ibu hamil akan cepat sekali naik. Makanan yang tinggi lemak anatara lain daging berlemak, susu, keju, mentega, margarin dan minyak. Dengan mengonsumsi beberapa diantaranya akan memperoleh cukup energi dari lemak (Yanuarti, dkk, 2014: 9).

4) DHA

Selama masa kehamilan, asam lemak *dokosaheksaenoat* (DHA) sangat penting untuk perkembangan otak bayi. Bayi dalam kandungan sangat bergantung pada kecukupan asupan DHA yang dimiliki. Penelitian menunjukan bahwa suplementasi DHA dari ibu dapat meningkatkan status DHA bayi. Para ahli menganjurkan agar wanita hamil mengkonsumsi 300 mg DHA perhari (Yanuarti, dkk, 2014: 10).

5) Karbohidrat dan Serat

Karbohidarat dan serat adalah salah satu sember energi penting. Bahan makanan sumber karbohidrat antara lain nasi, roti, sereal, gandum, dan pasta agar kebutuhan energi dapat terpenuhi, makanlah 3 porsi karbohidrat/serat setiap hari (seiris roti sama dengan 1 porsi karbohidrat/serat makanan). Pilihlah makanan yang dipercaya dan terbuat dari padi-padian, misalnya havermut, rye (sejenis gandum) dan gandum. Makanan dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

padi-padian lebih kaya gizi dan serat dibandingkan produk olahannya.

Serat sangat penting, terutama bagi wanita hamil yang sering mengalami konstipasi. Makanan berserat tinggi seperti misalnya padi-padian, buah segar, dan sayuran segar bisa mengatasi kesulitan buang air besar (konstipasi) tersebut (Yanuarti, dkk, 2014: 10).

6) Vitamin dan mineral

Seorang wanita hamil memiliki kebutuhan vitamin dan mineral lebih tinggi dari biasanya. Buah- buahan dan sayuran memberikan berbagai vitamin dan mineral lebih banyak dibandingkan makanan lain. Setiap hari, anda harus mengkonsumsi bauh jeruk dan makanan berwarna hijau atau kuning dalam porsi yang besar buah dan sayuran lain yang juga penting untuk dikonsumsi adalah apel, pir, anggur, pisang, nanas, beri, jambu, mangga, pepaya, kurma, melon, wortel, bit, tomat, dan kembang kol.

Konsumsi buah dan sayuran segar lebih disarankan dibanding buah/sayuran kaleng, karena jumlah gizinya yang lebih banyak serta tidak mengandung tambahan gula, garam dan lemak (Yanuarti, dkk, 2014: 11).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

7) Vitamin B2

Manfaat vitamin B2 membantu melepas energi dari protein serta membantu memenuhi kebutuhan protein yang meningkat selama hamil. Adapun jenis makanan yaitu telur dan keju cheddar (Yanuarti, dkk, 2014: 11).

B. Tinjauan khusus tentang Hipertensi Gestasional

1. Defenisi

Hipertensi gestasional yaitu hipertensi yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu dan kembali normal setelah kehamilan (Andrei Brateanu, 2019)

Hipertensi gestasional merupakan tekanan darah 140/90 mmHg atau tekanan sistolik meningkat sebanyak 30 mmHg atau tekanan diastolik meningkat sebanyak 15 mmHg diatas kadar prakehamilan dan tidak terdapat protein urin (Pilltteri, Adele, 2013: 73).

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang timbul setelah minggu ke 20 atau pada awal nifas tetapi tanpa preeklampsia (protein urin dan edema) dan kembali normal setelah postpartum (Darmawansyih, 2011: 105).

2. Faktor Risiko Hipertensi Gestasional

Terdapat banyak faktor risiko untuk terjadi hipertensi gestasional yang dapat dikelompokkan dalam faktor resiko sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

a. Primigravida

Sekitar 85% hipertensi dalam kehamilan terjadi pada kehamilan pertama. Jika ditinjau dari kejadian hipertensi dalam kehamilan, graviditas paling aman adalah kehamilan kedua sampai ketiga (Esti Nugraheny, 2010).

b. Hiperplasentosis

Faktor kehamilan seperti molahilatidosa, hydrops fetalis dan kehamilan ganda berhubungan dengan hipertensi dalam kehamilan. Preeklampsi dan eklampsi mempunyai risiko 3 kali lebih sering terjadi pada kehamilan ganda. Dari 105 kasus bayi kembar dua, didapatkan 28,6% kejadian preeklampsi dan satu kasus kematian ibu karena eklampsi (Cunningham *et al.*, 2012).

c. Umur

Umur ibu pada saat hamil merupakan salah satu faktor internal yang berperang penting dalam kehamilan. Umur yang aman untuk kehamilan dalam reproduksi sehat adalah 20-36 tahun. Umur ibu yang beresiko tinggi untuk hamil adalah pada umur <20 tahun atau >35 tahun. Keadaan ini disebabkan belum matangnya alat reproduksi untuk hamil pada usia dibawah 20 tahun sedangkan pada usia >35 tahun fungsi alat reproduksi telah mengalami kemunduran (Jumaiza, Dkk, 2018:127).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

d. Riwayat keluarga pernah menderita preeklampsia/eklampsia

Terdapat peranan genetik pada hipertensi dalam kehamilan. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat riwayat keluarga dengan hipertensi dalam kehamilan (Esti Nugraheny, 2010).

e. Penyakit-penyakit ginjal dan hipertensi yang sudah ada sebelum hamil.

Riwayat hipertensi kronis yang dialami selama kehamilan dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan, dimana komplikasi tersebut dapat mengakibatkan superimpose preeklampsi dan hipertensi kronis dalam kehamilan (Cunningham *et al.*, 2012).

f. Obesitas

Obesitas merupakan masalah gizi karena kelebihan kalori, kelebihan gula dan garam yang bisa menjadi faktor risiko terjadinya berbagai jenis penyakit degeneratif, seperti diabetes melitus, hipertensi dalam kehamilan, penyakit jantung koroner, reumatik dan berbagai jenis keganasan (kanker) dan gangguan kesehatan lain. Hal tersebut berkaitan dengan adanya timbunan lemak berlebih dalam tubuh (Esti Nugraheny, 2010).

3. Patofisiologi Hipertensi Gestasional

Vasospasme adalah dasar patofisiologi hipertensi. Konsep ini yang pertama kali diungkapkan oleh Volhard (1918), yang didasarkan pada pengamatan langsung pembuluh-pembuluh darah halus di bawah kuku,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

fundus okuli, dan konjungtiva bulbar, serta dapat diperkirakan dari perubahan-perubahan histologis yang tampak di berbagai organ yang terkena. Konstriksi vaskular menyebabkan resistensi terhadap aliran darah dan menjadi penyebab hipertensi arterial. Besar kemungkinan bahwa vasopasme itu sendiri menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah.

Selain itu, angiotensin II menyebabkan sel endotel berkontraksi. Perubahan-perubahan ini mungkin menyebabkan kerusakan sel endotel dan kebocoran dicelah antara sel-sel endotel. Dengan demikian konstituen darah, termasuk trombosit dan fibrinogen, mengendap di sub endotel. Perubahan-perubahan vaskular ini, bersama dengan hipoksia jaringan di sekitarnya, diperkirakan menyebabkan perdarahan, nekrosis, dan kerusakan organ lain yang terkadang dijumpai dalam hipertensi yang berat.

Menurut Prawirohardjo (2014) banyak teori telah dikemukakan tentang terjadinya hipertensi dalam kehamilan, tetapi tidak ada satupun teori tersebut yang dianggap mutlak benar. Teori-teori yang sekarang banyak dianut adalah:

1. Teori kelainan vaskularisasi plasenta

   Pada hipertensi dalam kehamilan tidak terjadi invasi sel-sel trofoblas pada sel-sel trofoblas pada lapisan otot arteri spiralis dan jaringan matriks sekitarnya. Lapisan otot arteri spiralis menjadi tetap kaku dan keras sehingga lumen arteri spiralis tidak memungkinkan

mengalami distensi dan vasodilatasi. Akibatnya, arteri spiralis relative mengalami vasokontriksi, dan terjadi kegagalan *"remodeling arteri spiralis"*, sehingga aliran darah uteroplasenta menurun, dan terjadilah hipoksia dan iskemia plasenta.

2. Teori iskemia plasenta, radikal bebas, dan disfungsi endotel

   a. Iskemia plasenta dan pembentukan oksidan/radikal bebas

      Sebagaimana dijelaskan pada teori invasi trofoblas, pada hipertensi dalam kehamilan terjadi kegagalan *"remodeling arteri spiralis"*, dengan akibat plasenta mengalami iskemia. Plasenta yang mengalami iskemia dan hipoksia akan menghasilkan oksidan (disebut juga radikal bebas).

      Oksidan atau radikal bebas adalah senyawa penerima elektron atau atom/molekul yang mempunyai elektron yang tidak berpasangan. Salah satu oksidan penting yang dihasilkan plasenta iskemia adalah radikal hidroksil yang sangat toksis, khususnya terhadap membran sel endotel pembuluh darah.

      Sebenarnya produksi oksidan pada manusia adalah suatu proses normal, karena oksidan memang dibutuhkan untuk perlindungan tubuh. Adanya radikal hidroksil dalam darah, maka dulu hipertensi dalam kehamlian disebut *"toxaemia"*.

      Radikal hidroksil akan merusak membran sel, yang mengandung banyak asam lemak tidak jenuh menjadi peroksida lemak. Peroksida lemak selain akan merusak membrane sel,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

juga akan merusak nukleus, dan protein sel endotel. Produksi oksidan (radikal bebas) dalam tubuh yang bersifat toksis, selalu diimbangi dengan produksi anti oksidan

b. Peroksida lemak sebagai oksidan pada hipertensi dalam kehamilan.

Pada hipertensi dalam kehamilan telah terbukti bahwa kadar oksidan, khususnya peroksida lemak meningkat, sedangkan antioksidan, misal vitamin E pada hipertensi dalam kehamilan menurun, sehingga terjadi dominasi kadar oksidan peroksida lemak yang *relative* tinggi.

Peroksidan lemak sebagai oksidan/radikal bebas yang sangat toksis ini akan beredar diseluruh tubuh dalam aliran darah dan akan merusak membran sel endotel. Membran sel endotel lebih mudah mengalami kerusakan oleh peroksida lemak, karena letaknya langsung berhubungan dengan aliran darah dan mengandung banyak asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh sangat rentan terhadap oksidan radikal hidroksil, yang akan berubah menjadi peroksida lemak.

c. Disfungsi sel endotel

Akibat sel endotel terpapar terhadap peroksida lemak, maka terjadi kerusakan sel endotel, yang kerusakannya dimulai dari membran sel endotel mengakibatkan terganggunya fungsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

endotel, bahkan rusaknya seluruh struktur sel endotel. Keadaan ini disebut disfungsi endotel.

3. Teori intoleransi imunologi antara ibu dan janin

Dugaan bahwa faktor imunologik berperan terhadap terjadinya hipertensi dalam kehamilan terbukti dengan fakta sebagai berikut :

1) Primigravida mempunyai risiko lebih besar terjadinya hipertensi dalam kehamilan jika dibandingkan dengan multigravida.
2) Ibu multipara yang kemudian menikah lagi mempunyai risiko lebih besar terjadinya hipertensi dalam kehamilan jika dibandingkan dengan suami yang sebelumnnya.
3) Seks oral mempunyai risiko lebih rendah terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Lamanya periode hubungan seks sampai saat kehamilan ialah makin lama periode ini, makin kecil terjadinya hipertensi dalam kehamilan.

4. Teori adaptasi kardiovaskular

Pada hipertensi dalam kehamilan kehilangan daya refrakter terhadap bahan vasokonstriktor, dan ternyata terjadi peningkatan kepekaan terhadap bahan-bahan vasopresor. Artinya daya refrakter pembuluh darah terhadap bahan vasopresor hilang sehingga pembuluh darah menjadi sangat peka terhadap bahan-bahan vasopresor pada hipertensi dalam kehamilan sudah terjadi pada trimester I (pertama).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Peningkatan kepekaan pada kehamilan yang akan menjadi hipertensi dalam kehamilan, sudah dapat ditemukan pada kehamilan dua puluh minggu. Fakta ini dapat dipakai sebagai prediksi akan terjadinya hipertensi dalam kehamilan.

5. Teori defisiensi gizi

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan defisiensi gizi berperan dalam terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Penelitian yang penting yang pernah dilakukan di inggris ialah penelitian tentang pengaruh diet pada preeklampsia beberapa waktu sebelum pecahnya Perang dunia ke II. Suasana serba sulit mendapat gizi yang cukup dalam persiapan perang menimbulkan kenaikan insiden hipertensi dalam kehamilan. Penelitian terakhir membuktikan bahwa konsumsi minyak ikan, termaksud minyak hati halibut dapat mengurangi risiko preeklampsia.

6. Teori inflamasi

Teori ini berdasarkan fakta bahwa lepasnya debris trofoblas di dalam sirkulasi darah merupakan rangsangan utama terjadinya proses inflamasi. Pada kehamilan normal, jumlah debris trofoblas masih dalam batas wajar, sehingga reaksi inflamasi juga masih dalam batas normal. Berbeda dengan proses apoptosis pada preeklampsia, dimana ada preeklampsia terjadi peningkatan stresoksidatif, sehingga produksi febris apoptosis dan nekrotik trofoblas juga meningkat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makin banyak sel trofoblas plasenta, misalnya pada plasenta besar, pada hamil ganda, maka reaksi stress oksidatif kan sangat meningkat, sehingga jumlah sisa debris trofobls juga makin meningkat.

Keadaan ini menimbulkan beban reaksi inflamasi dalam darah ibu menjadi juh lebih besar, dibanding reaksi inflamasi pada kehamilan normal. Respons inflamasi ini akan mengaktifasi sel endotel, dan sel-sel makrofag/granulosit, yang lebih besar pula, sehingga terjadi reaksi sistemik inflamasi yang menimbulkan gejala-gejala pada preeklampsia pada ibu.

4. Etiologi

Hipertensi gestasional dalam kehamilan tidak berdiri sebagai satu penyakit, melainkan terbentuk sebagai kumpulan dari beberapa faktor yang melibatkan faktor maternal, plasenta, dan janin. Berikut beberapa etiologi dari hipertensi dalam kehamilan.

a. Faktor genetik

Hipertensi dalam kehamilan merupakan suatu penyakit multifactorial dan bersifat poligenik. Suatu studi menyatakan bahwa resiko penurunan preeklamsia dari ibu yang mengalami preeklamsia kepada anak perempuannya yaitu sebesar 20-40 %, dan 22-47 % antara saudara kembar. Genotipe ibu lebih menentukan terjadinya hipertensi dalam kehamilan secara familiar, jika dibandingkan dengan genotipe janin (Cunningham *et al.*, 2012).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

b. Faktor nutrisi

Penelitian terakhir membuktikan bahwa konsumsi minyak ikan, termasuk minyak hati halibut, dapat mengurangi resiko preeklamsia karena mengandung banyak asam lemak tidak jenuh yang dapat menghambat produksi tromboksan, menghambat aktivitas trombosit, dan mencegah vasokonstriksi pembuluh darah. Defisiensi kalsium pada diet perempuan hamil juga akan meningkatkan resiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan (Cunningham *et al.*, 2012).

c. Invasi trofoblas yang abnormal

Pada proses implantasi normal, arteria spiralis mengalami proses remodeling akibat terinvasi oleh trofoblas. Invasi trofoblas ini menyebabkan jaringan matriks menjadi gembur dan memudahkan lumen arteri spiralis mengalami distensi dan dilatasi. Distensi dan vasodilatasi lumen arteri spiralis akan menurunkan tekanan darah, menurunkan resistensi vascular, dan meningkatkan aliran darah uteroplasenta. Dengan begitu, aliran darah ke janin menjadi adekuat dan perfusi jaringan juga meningkat, sehingga pertumbuhan janin terjamin dengan baik.

Pada hipertensi dalam kehamilan, tidak terjadi invasi sel-sel trofoblas pada lapisan otot arteri spiralis dan jaringan matriks sekitarnya. Lapisan otot arteri spiralis tetap kaku dan keras tidak memungkinkan mengalami distensi serta vasodilatasi. Akibatnya, arteri spiralis relatif mengalami vasokonstriksi, mengalami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

kegagalan remodeling arteri spiralis, sehingga aliran darah uteroplasenta menurun, menyebabkan terjadinya hipoksia dan iskemia plasenta. (Cunningham *et al.*, 2012).

d. Intoleransi imunologik antara janin dan ibu

Beberapa studi menghasilkan fakta-fakta yang menunjukan bahwa faktor imunologik turut berperan terhadap hipertensi dalam kehamilan. Resiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan pada primigravida lebih besar dibandingkan dengan multigravida. Ibu multipara yang menikah lagi juga mempunyai resiko lebih besar terkena hipertensi dalam kehamilan jika dibandingkan dengan suami yang sebelumnya. (Cunningham *et al.*, 2012)

e. Aktifitas sel endotel

Akibat iskemia pada plasenta karena kegagalan invasi trofoblas, maka plasenta akan menghasilkan oksidan. Oksidan adalah penerima elektron atau atom/molekul yang mempunyai elektron yang tidak berpasangan. Salah satu contohnya adalah radikal hidroksil yang bersifat toksis, khususnya terhadap membran sel endotel pembuluh darah.

Radikal hidroksil akan merusak membran sel, mengubah asam lemak tidak jenuh menjadi peroksida lemak yang merusak membran sel, nukleus, dan protein sel endotel. Kerusakan sel endotel akan mengakibatkan disfungsi sel endotel sehingga terjadi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

1. Gangguan metabolisme prostaglandin yaitu menurunnya produksi prostasiklin, suatu vasodilator kuat.
2. Agregasi sel trombosit pada daerah endotel yang mengalami kerusakan sehingga memproduksi tromboksan, suatu vasokonstriktor kuat yang memicu terjadinya kenaikan tekanan darah.
3. Perubahan pada sel endotel kapiler glomerulur.
4. Peningkatan permeabilitas kapiler.
5. Peningkatan produksi bahan vaspresor yaitu endotelin yang merupakan vasokonstriktor dan.
6. Peningkatan faktor koagulasi. (Cunningham *et al.*, 2012).

5. Diagnosis Hipertensi Gestasional
   a. Hipertensi yang didapatakan tekanan darah sistolik 140 atau diastolik 90 mmhg untuk pertama kalinya dalam kehamilan diatas 20 minggu.
   b. Tidak didapatkan proteinuria.
   c. Tekanan darah kembali normal setelah beberapa hari postpartum.
   d. Diagnosis hanya dibuat pada postpartum.
   e. Mungkin memiliki tanda–tanda atau gejala preeklamsia, misalnya.tidak nyaman atau trombositopenia epigastrika (Setiawati, Dewi, 2013: 142).
6. Komplikasi Hipertensi Gestasional

   Komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu hamil yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

a. Preeklampsia ringan

Preeklampsia ringan dapat terjadi apabila tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg atau terjadi peningkatan tekanan darah sistolik hingga 30 mmHg atau peningkatan tekanan darah diastolik hingga 15 mmHg dari tekanan darah awal dan disertai dengan adanya protein urin +1 (Yulia, 2012:27).

b. Berkurangnya aliran darah ke plasenta

Risiko yang mungkin dialami ibu hamil dengan hipertensi adalah berkurangnya aliran pasokan darah, oksigen dan nutrisi ke bayi. Hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan bayi bertambah dan dapat terjadinya bayi baru lahir (Prawirohaedjo, Sarwono, 2014: 224).

c. Penyakit kardiovaskuler dimasa depan

Wanita yang mengalami preeklampsia (ditandai dengan tingginya tekanan darah dan protein dalam urin setelah 20 minggu kehamilan beresiko mengalami peningkatan penyakit kardiovaskuler dimasa yang akan datang, meskipun fakta menunjukan bahwa tekanan darah akan kembali normal setelah melahirkan (Prawirohaedjo, Sarwono, 2014: 224).

d. Plasenta absurpsio (plasenta lepas sebelum waktunya)

Pada beberapa kasus ibu hamil dengan hipertensi, plasenta dapat terlepas dan terpisah dan rahim. Absurpsio plasenta akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

menghentikan pasokan oksigen ke bayi dan menyebabkan perdarahan yang berat. Resikonya adalah kematian pada janin.

e. Pertumbuhan janin terhambat

Pertumbuhan janin terhambat ditentukan bila berat janin kurang dari 10% dari berat yang diharuskan dicapai pada usia kehamilan tertentu. Biasanya perkembangan yang terhambat diketahui setelah 2 minggu tidak ada pertumbuhan dimana penyebab pertumbuhan janin terhambat adalah hipertensi dalam kehamilan (Prawirohardjo, 2014:679).

f. Kelahiran bayi prematur

Untuk mencegah terjadinya komplikasi berbahaya yang mungkin mengancam nyawa bayi dan ibu. Tidak jarang masa kehamilan dipercepat sebelum waktunya sehingga bayi beresiko lahir secara premature (Prawirohaedjo, Sarwono, 2014: 224).

g. Kebutaan

Preeklampsia dapat memicu gangguan pada pembuluh darah dimata. Pembuluh darah mata diretina bisa pecah memicu kebutaan. Tapi lanjutannya, pada kondisi yang akan mengalami pembengkakan pada otak yang mengenai saraf mata. Hal ini hanya dapat berdampak kebutaan sementara (Prawirohaedjo, Sarwono, 2014: 224)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

7. Penatalaksanaan Hipertensi Gestasional

a. Deteksi dini prenatal

Waktu pemeriksaan prenatal dijadwalkan setiap 4 minggu sampai usia kehamilan 28 minggu, kemudian setiap 2 minggu hingga usia kehamilan 36 minggu, setelah itu setiap minggu (Imami N. Rachmawati, 2016).

b. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan Penunjang Pemeriksaan yang perlu dilakukan dalam kasus hipertensi sebagai komplikasi kehamilan adalah proteinuria, untuk diagnosis dini preeklampsi yang merupakan akibat dari hipertensi kehamilan. Pemeriksaan proteinuria dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara Esbach dan Dipstick. Pengukuran secara Esbach, dikatakan proteinuria jika didapatkan protein ≥300 mg dari 24 jam jumlah urin. Nilai tersebut setara dengan kadar proteinuria ≥30 mg/dL (+1 dipstick) dari urin acak tengah yang tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi saluran kencing (fitriani, Rini, 2016).

c. Pemantauan Denyut jantung janin (DJJ)

Pemantauan (DJJ) harus selalu dinilai pada setiap kali pasien melakukan pemeriksaan hamil (umumnya setelah kehamilan trimester pertama) dengan hipertensi gestasional. DJJ dapat dipantau dengan stetoskop Laenek atau Doppler DJJ dihitung secara penuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

dalam satu menit dengan memperhatikan keteraturan serta frekuensinya (Rukiyah, 2010:24).

d. Diet

Diet tinggi kalium yang terdapat pada buah-buahan (semangka, alpukat, melon) dan sayuran (buah pare, labu siam, mentimun,lidah buaya, seledri, bawang putih). Kandungan kalium dapat menurunkan tekanan darah dengan mengurangi kandungan nutrium dalam urine dan air dengan cara yang sama seperti diuretik serta menganjurkan ibu untuk mengurangi asupan nutrium seperti asin-asinan garam.

Natrium yang masuk kedalam tubuh akan langsung diserap kedalam pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kadar natrium dalam darah meningkat. Natrium mempunyai sifat menahan air, sehingga menyebabkan volume darah menjadi naik (Rukiyah, 2010:24).

e. Istirahat

Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, menganjurkan ibu untuk banyak istirahat yang cukup jangan terlalu banyak aktifitas agar kerja jantung tidak berat Menurut asumsi peneliti terlalu sedikit atau terlalu banyak tidur pada saat hamil akan memicu kenaikan tekanan darah pada trimester III.

Hal ini karena proses hemostasis yang memegang peranan dalam pengaturan keseimbangan tekanan darah ibu hamil. Ibu hamil juga harus mendapatkan cukup istirahat dan berolahraga demi menjaga kebugaran tubuh. Istirahat yang cukup dapat menghindari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ibu hamil dari kondisi stress karena saat stres produksi hormon adrenalin meningkat sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Kondisi ini tentunya dapat menyebabkan tekanan darah ibu hamil menjadi tinggi Anjurkan ibu untuk memperbanyak asupan kalium (Rukiyah, 2010:25).

f. Melakukan Pemberian obat antihipertensi misalnya obat nefedifin 10 mg (2x1)

C. Tinjauan Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Definisi

Menurut Helen Varney (1997) bahwa manajemen asuhan kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang ditemukan oleh perawat dan bidan pada awal 1970-an.

a. Langkah 1: Identifikasi Data Dasar

Langkah 1 merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien atau orang yang meminta asuhan. Memilih informasi yang tepat diperlukan analisa atau situasi yang menyangkut manusia yang rumit karena sifat manusia yang kompleks.

Tahapan ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapan data yang sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selajutnya, sehingga pada pendekatan ini harus komprehensif meliputi data subjektif, objektif dan hasil pemeriksaan

sehingga dapat menggambarkan kondisi atau masukan klien yang sebenarnya. Dalam pengumpulan data dasar pada umumnya klien yang mengalami hipertensi dalam kehamilan datang dengan keluhan sakit kepala, pusing dan disertai dengan perasaan lemas.

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara: melakukan anamneses yang berupa tanya jawab dengan pasien meliputi: riwayat kesehatan, riwayat reproduksi: riwayat haid, riwayat obtetrik, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas, riwayat ginekologi, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi dan psikologi.

Dalam pemeriksaan fisik, klien yang umumnya mengalami hipertensi memiliki usia kehamilan diatas 20 minggu, disertai dengan tekanan darah ≥140/90mmHg, dengan hasil pemeriksaan lab didapatkan urin negatif. Kemudian pemeriksaan fisik dilakukan secara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

b. Langkah II: Interpretasi data

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien. Berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik.

Pada pasien yang mengalami hipertensi dalam kehamilan umumnya memiliki tekanan darah yang melebihi batas normal, dimana ia memiliki tekanan darah yang 140/90 mmHg. Atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

mengalami peningkatan pada sistolilk 140 mmHg dan diastolik sebesar 90 mmHg, biasanya pasien mengalami hipertensi pada umur kehamilan diatas 20 minggu, tanpa disertai dengan adanya protein urin, untuk mengetahui diagnostik lebih jelas maka perlu adanya pemeriksaan *CT-Scan hepar* dan pemeriksaan *MRI*.

c. Langkah III: Identikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis/masalah yang sudah diidentifikasi. Pada kasus ibu hamil dengan hipertensi gestasional masalah potensial yang mungkin terjadi adalah berkurangnya aliran darah ke plasenta yang mungkin dialami ibu hamil dengan hipertensi adalah berkurangnya aliran pasokan darah, oksigen dan nutrisi ke bayi. Hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan bayi bertambah dan dapat terjadi bayi baru lahir.

Penyakit kardiovaskuler dimasa depan dapat menunjukkan fakta bahwa tekanan darah akan kembali normal setelah melahirkan. Kemudian plasenta absurpsio akan menghentikan pasokan oksigen ke bayi dan menyebabkan perdarahan yang berat, resiko yang dapat terjadi yaitu kematian pada janin. Kelahiran bayi premature yang disebabkan karena mungkin mengancam nyawa bayi dan ibu. Sehingga kehamilan di percepat sebelum waktunya sehingga bayi beresiko lahir secara premature. Komplikasi selanjutnya adalah menyebabkan kebutaan yang dimana preklamsia dapat memicu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

gangguan pada pembuluh darah dimata. Kelanjutannya pada kondisi yang akan mengalami pembengkakan pada otak yang mengenai saraf mata hal ini hanya dapat berdampak kebutaan sementara.

d. Langkah IV: Tindakan Segera/Kolaborasi

Menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera untuk melakukan konsultasi, kolaborasi dengan segera dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai denga kondisi klien.

Penanganan segera pada kasus ini adalah melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter obgyn untuk mencegah terjadinya komplikasi hipertensi lebih lanjut, kolaborasi dengan dokter SpOG untuk mengetahui pola makan, dan jenis makanan yang perlu dihindari pada ibu hamil dengan hipertensi.

kolaborasi dengan laboratorium untuk mendeteksi perkembangan penyakit hipertensi menjadi preeklampsia dengan cara memeriksa adanya protein urin dan pemeriksaan tekanan darah agar tidak menimbulkan bentuk kelainan patologis. Anjurkan ibu untuk memeriksakan diri ke dokter untuk memberi obat antihipertensi misalnya nefedifin 10 mg (2x1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

e. Langkah V: Menyusun Rencana Tindakan

Melakukan penyusunan secara menyeluruh rencana (intervensi) asuhan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Pada langkah ini informasi data yang tidak lengkap dapat dilengkapi.

Asuhan kebidanan yang direncanakan pada pasien dengan hipertensi dilakukan dengan:

1) Deteksi dini prenatal : Waktu pemeriksaan prenatal dijadwalkan setiap 4 minggu sampai usia kehamilan 28 minggu, kemudian setiap 2 minggu hingga usia kehamilan 36 minggu, setelah itu setiap minggu (Imami N. Rachmawati, 2016).
2) Penatalaksanaan di puskesmas: memantau keadaan ibu,menimbang berat badan ibu, analisis proteinuria, pengukuran tekanan darah, Informasikan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga, anjurkan ibu untuk mengurangi asupan natrium, anjurkan ibu untuk tidak banyak fikiran dan beri dukungan, anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, anjurkan ibu untuk memperbanyak asupan kalium, anjurkan pasien untuk kunjungan pemeriksaan kehamilan lebih sering yaitu 1 minggu sekali. ajarkan pada ibu menilai gerakan janin setiap 1 jam, apakah gerakan janin teratur atau berkurang, sehingga dapat digunakan untuk menilai keadaan janin. anjurkan ibu untuk mengkonsumsi obat anti hipertensi misalnya Nefedifin 10 mg (2x1), (Rukiyah, 2010).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

f. Langkah VI: Implementasi/Pelaksanaan Asuhan

Pada langkah ini dilakukan pelaksanaan asuhan langsung secara efisien dan aman. Pada langkah keenam ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. perencanaan ini dapat dilakukan oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota tim lainnya. walau bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengerahkan pelaksanaannya (misal: memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana).

Pelaksaan dikerjakan sesuai dengan rencana asuhan yang telah dibuat yaitu:

1) Memberikan asuhan antenatal berupa edukasi sesuai dengan peran dan standar kompetensi bidan.
2) Memantau tekanan darah, proteinurine, refleks pada lutut, dan monitor DJJ.
3) Memberi informasi yang jelas tentang keadaan pasien dan keadaan kehamilannya.
4) Menganjurkan untuk banyak istirahat yaitu dengan menghindari pekerjaan berat yang bisa dikerjakan sebelum hamil.
5) Menganjurkan diet makanan tinggi protein, tinggi karbohidrat, cukup vitamin, rendah lemak, dan diet rendah garam.
6) Menganjurkan pasien untuk kunjungan pemeriksaan kehamilan lebih sering yaitu 1 minggu sekali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

7) Mengajarkan pada ibu menilai gerakan janin setiap 1 jam, apakah gerakan janin teratur atau berkurang, sehingga dapat digunakan untuk menilai keadaan janin.

8) Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi obat anti hipertensi misalnya Nefedifin 10 mg (2x1),

g. Langkah VII: Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi kefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar tetap terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam diagnosa dan masalah. rencana tersebut dianggap efektif jika memang benar dalam pelaksanaannya.

Evaluasi pada ibu hamil dengan hipertensi:

1) Telah dilakukan pengukuran tekanan darah terjadi penurunan yaitu 130/80 mmHg, protein urine (-), refleks patella (+), dan DJJ terdapat 138x/menit dan teratur.

2) Ibu telah mengerti tentang keadaannya dan kehamilannya.

3) Ibu bersedia istirahat yang cukup dan menghindari pekerjaan berat yang biasa dikerjakan sebelum hamil.

4) Ibu bersedia diet makanan tinggi protein, tinggi karbohidrat, cukup vitamin, rendah lemak, dan diet rendah garam.

5) Ibu bersedia melakukan kunjungan ulang lebih sering yaitu 1 minggu sekali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

6) Ibu bersedia memantau gerakan janinnya setiap 1 jam, apakah gerakan janin teratur atau berkurang,

7) Ibu bersedia mengkonsumsi obat anti hipertensi misalnya Nefedifin 10 mg (2x1),

2. Pendokumentasian Dalam Bentuk SOAP

Varney menyatakan bahwa alur berfikir bidan saat menghadapi klien meliputi tujuh langkah, agar diketahui orang lain apa yang telah dilakukan oleh seseorang bidan melalui proses berfikir sistematis, maka dilakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yaitu:

a. Subjektif (S)

Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa.

b. Objektif (O)

Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien (Keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik), hasil laboratorium dan u ji diagnosis lain yang merumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan.

c. Assesment (A)

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif juga data objektif dalam suatu identifikasi.

1) Diagnosis masalah.

2) Antisipasi diagnosis/masalah potensial.

3) Tindakan segera.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

d. Planning (P)

Merupakan ringkasan dari langkah V, VI, dan VII dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana *planning* ini dilakukan berdasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi terhadap keputusan klien yang diambil dalam rangka mengatasi masalah klien dan memenuhi kebutuhan klien.

SOAP ini dilakukan pada asuhan terhadap ibu hamil dengan hipertensi gestasional pada tahap berikutnya, dengan kunjungan antenatal setiap 4 minggu sekali sampai usia kehamilan 28 minggu, 2 minggu sekali sampai usia kehamilan 36 minggu 1 hari dan selebihnya melakukan pemeriksaan setiap minggu,dan dilanjutkan dengan asuhan berkelanjutan hingga post partum.

Pada kunjungan pertama menganjurkan ibu untuk mengurangi mengkonsumsi makanan yang dapat memperberat masalah yang dialami oleh ibu dan menganjurkan untuk mengurangi aktivitas yang berat dan melakukan pemantauan tekanan darah, proteinurine dan monitor Denyut Jantung Janin (DJJ). Serta menganjurkan ibu untuk memperbanyak mendengar lantunan ayat suci Al-qur'an agar kehamilan dan persalinan ibu berjalan dengan lancar.

Kunjungan selanjutnya melakukan pemantauan pada saat persalianan ibu normal atau adanya masalah pada saat persalinan seperti Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Kematian Janin dalam Rahim (KJDR), kelahiran prematur, dan kematian pada ibu.

Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan adanya dampak yang disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan pada proses persalinan ibu dan bayi yang dilahirkan.

D. Tinjauan Umum Hipertensi Gestasional pada Ibu Hamil Menurut Pandangan Agama Islam

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kehamilan sangat banyak, umumnya terkait dengan tanda-tanda adanya Allah, kebesaran dan kekuasaanNya. Diantaranya

Surat an-nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

> Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Ayat ini ditujukan kepada yang berada disekeliling seorang yang sakit dan diduga segera kan meninggal. Pendapat ini adalah pilihan banyak pakar tafsir, seperti ath-Thabari, Fakhruddin ar-Razi dan lain-lain. Ada juga yang memahaminya sebagai ditujukan kepada mereka yang menjadi wali anak-anak yatim itu seperti perlakuan yang mereka harapkan kepada anak-anaknya yang lemah bila kelak para wali itu meninggal dunia. Pendapat ini, menurut ibnu Katsir, didukung pula oleh ayat berikut yang mengandung ancaman kepada mereka yang menggunkan harta anak yatim secara aniaya.

Muhammad Sayyid Thanthawi berpendapat bahwa ayat di atas ditujukan kepada semua pihak, siapa pun, karena semua diperintahkan untuk berlaku adil, berucap yang benar dan tepat, dan semua khawatir akan mengalami apa yang digambarkan di atas.

Ayat yang memerintahkan pemverian sebagian warisan kepada kerabat dan orang-orang lemah tidak harus dipertentangkan dengan ayat-ayat kewarisan karena ini merupakan anjuran dan yang itu adalah hak yang tidak dapat dilebihkan ayat dikurangi.

Kata *sadidan* terdiri dari hurud *sin* dan *dal* yang menurut pakar bahasa Ibn Faris, menunjukan kepada makna *meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya.* Ia juga berarti *istiqamah*/konsistemsi. Kata ini juga digunakan untuk menunjuk kepada *sasaran.* Seorang yang menyampaikan sesuatu/ucapan yang benar dan mengena tepat pada sasarannya dilukiskan dengan kata ini. Dengan demikian, kata *sadidan* dalam ayat di atas, tidak sekedar berarti benar, sebagaimana terjemahan sementara penerjemah, tetapi ia juga harus berarti tepat sasaran.

Dalam konteks ayat diatas keadaan sebagai anak-anak yatim yang hakikatnya berbeda dengan anak-anak kandung, dan ini menjadikan mereka lebih peka, sehingga membutuhkan perlakuan yang lebih hati-hati dalam kalimat-kalimat yang lebih terpilih, bukan saja yang kandungannyaa benar, tetapi juga yang tepat. Sehingga, kalau memberi informasi atau menegur, jangan sampai menimbulkan kekeruhan dalam hati mereka, tetapi teguran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

yang disampaikan hendaknya meluruskan kesalahan sekaligus membina mereka.

Pesan ayat ini berlaku umum sehingga pesan-pesan agama pun, jika bukan pada tempatnya, tidak diperkenankan untuk disampaikan "Apabila Anda berkata kepada teman Anda pada hari Jumaat saat imam berkhutbah: Diamlah (dengarkan khutbah), Anda telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.

Dari kata *sadidan* yang mendangung makna *menurunkan sesuatu kemudian memperbaikinya* diperoleh pula petunjuk bahwa ucapan yang meruntuhkan, jika disamapaaikan harus pula dalam saat sma memperbaiki dalam kritik yang disampaikan kehendaknya merupakan *kritik yang membangun* atau dalam arti informasi yang disampaikan harus mendidik

Pesan ilahi diatas didahului oleh ayat sebelumnya yang menekankan perlunya memilih *qaulan ma'rufan* yakni kalimat-kalimat yang baik dan sesuai dengan kebiasan dalam masing-masing masyarakat, selama kalimat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Ayat ini mengamanahkan agar pesan hendaknya disampaikan dalam bahasa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang baik menurut ukuran setiap masyarakat.

Ayat-ayat diatas dijadikan juga oleh sementara ulama sebagai bukti adanya dampak negatif dari perlakuan kepada anak yatim yang dapat terjadi dalam kehidupan dunia ini. Sebaliknya, amal-amal saleh yang dilakukan seorang ayah dapat mengantarkan terpeliharanya harta dan peninggalan orang tua untuk anaknya yang telah menjadi yatim (Shihab, 2002: 426-427)

Selain dari ayat diatas ada beberapa haditz yang menjelaskan untuk tetap terhindar dari depresi yaitu menjauhi sikap sedih, cemas, atau hazan. Biasanya, orang itu sedih akibat masa lalu yang buruk menimpanya. Seperi terkena musibah, kecelakaan, ditinggal orang yang disayanginya, dan lainnya. Disini sangat jelas bahwa penyebab kesedihan adalah masa lalu. Sebaliknya penyebab ketakutan adalah masa depan. Dalam Surat Al-Baqarah [2:153], Allah menyerukan agar kita senantiasa menjadikan sabar dan shalat sebagai penolong.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

Perintah ayat di atas merupakan solusi agar kita mengatasi segala kesulitan dan problematika yang datang silih berganti. Allah memerintahkan kita memohon pertolongan kepada-Nya dengan mengedepankan sikap sabar dan menjaga shalat dengan istiqamah. Kedua hal ini merupakan sarana meminta tolong yang terbaik ketika menghadapi berbagai kesulitan. Rasulullah SAW memberi contoh dalam mengamalkan ayat ini. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dijelaskan bahwa, “Sesungguhnya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam apabila menghadapi suatu persoalan, beliau segera mengerjakan shalat.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Itulah dua terapi diri bagi seorang muslim dalam mengatasi stres dan depresi. Obat stres karena takut pada masa depannya adalah tawakkal kepada Allah dan obat depresi karena sedih akibat masa lalunya adalah sabar dan shalat. Itu solusi dalam Alquran. Jika keduanya diabaikan tanpa ia tawakkal kepada Allah, sabar, dan shalat, maka perpaduan antara stres dan depresi nantinya akan mengakibatkan psychosomatic.

Orang tawakkal itu selalu kembali kepada Allah karena hanya Allah yang maha mematikan dan menghidupkan. Jika ia anak buah, pekerja, atau karyawan, dia tidak perlu menjilat kepada atasannya, atau mencari muka, dan lain-lain. Itulah prinsip orang yang tawakkal.

Begitu juga yang biasa terjadi pada paranoid. Penyakit jiwa ini dimulai dari kekhawatiran dan kecemasan dalam dirinya yang tidak penting. Curiga saja bawaannya. Lalu berfantasi seolah ada yang memburu atau akan membunuh dia. Nah penyakit ini muncul jarena tidak paham dengan Asma Allah, sabarnya kurang, tawakkalnya kurang, akhirnya paranoid. Lebih kencang lagi jika sudah dipengaruhi oleh jin.

Apa yang dilihat seperti pada hakikatnya, bisa saja karena jin berubah wujud. Jadi ilusi itu berkembang karena ada bisikan jin. Sementara, jika setan sudah mengambil mata hati manusia, sangat mudah mengambil mata kepalanya.

Imam Al Ghazali punya teori begini. Jiwa yang sudah dipenuhi hawa nafsu atau amarah, jika ia memandang sesuatu, tidak sesuai lagi dengan hakikatnya. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kita dilarang mengharamkan apa yang halal, disini ditegaskannya perintah makanan yang halal dengan demikian, melalui ayat ini dan ayat sebelumnya, yang menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang halal. Dengan perintah ini tercegah pulalah praktik-praktik keberagaman yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal, yakni yang bukan haram *lagi baik*, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan *dari* apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu terhadap-Nya adalah *mu'minun,* yakni orang-orang yang mantap keimanannya.

Yang dimaksud dengan kata makan dalam ayat ini adalah segala aktivitas manusia. Pemilihan kata makan, disamping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas.

Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Ketika menafsirkan Q.S. Al-Baqarah/2:168, penulis antara lain mengemukakan bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal sendiri dari empat macam, yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, ia makruh atau sangat tidak disukai Allah, yaitu pemutusan hubungan. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada yang halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan adalah yang halal lagi baik. (Abu Muhammad Ibnu Shalih Bin Hasbullah,2013:15

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

TINJAUAN KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA NY "I'' DENGAN HIPERTENSI GESTASIONAL GESTASI 36-38 MINGGU DI PUSKESMAS BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA TANGGAL 15 JANUARI - 12 MARET 2020

No Register : 19xxx

Tanggal Masuk :15 Januari 2020 Pukul 09:00 Wita

Tanggal Pengkajian :15 Januari 2020 Pukul 09:00 Wita

Nama Pengkaji : Rika

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "I"/Tn "A"

Umur : 36 tahun/38 tahun

Nikah/lamanya : 1x/±8 tahun

Suku : Makassar /Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/S1

Pekerjaan : IRT/Guru

Alamat : B

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

B. Riwayat Keluhan

1. Keluhan utama : Ibu datang ke Puskesmas Bontomarannu dengan keluhan sakit kepala disertai rasa pusing sejak tanggal 12 Januari 2020

C. Riwayat Kehamilan Sekarang

1. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan yang kedua dan tidak pernah keguguran.
2. HPHT 07 Mei 2019.
3. Ibu mengatakan usia kehamilannya ± 8 bulan.
4. Pergerakan janin mulai dirasakan sejak bulan September 2019.
5. Ibu mengatakan pergerakan janin kuat dirasakan pada kuadran kanan perut bawah ibu.
6. Ibu melakukan kunjungan ANC sebanyak 4x dan telah mendapat imunisasi *Tetanus Toksoid*
   a. Kunjungan I tanggal 11 September 2019 dengan keluhan ibu tidak ada, berat badan 64 kg dan tekanan darah 120/90 mmHg dan telah mendapat imunisasi TT I.
   b. Kunjungan II tanggal 28 0ktober 2019 dengan keluhan tidak ada, berat badan 66kg, tekanan darah 120/80 mmHg dan telah mendapat imunisasi TT II.
   c. Kunjungan III tanggal 02 Desember 2019 dengan keluhan pusing, tekanan darah 140/100 mmHg dengan berat badan 67 kg dan telah mendapat imunisasi TT II.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

d. Kunjungan IV tanggal 15 Januari 2020 dengan keluhan sakit kepala disertai rasa pusing, dengan tekanan darah 150/100 mmHg dengan berat badan 69 kg.

D. Riwayat Reproduksi

1. Menarche umur 13 tahun
2. Siklus haid 28-30 hari
3. Lamanya haid 28-30 hari
4. Tidak ada rasa nyeri ketika haid

E. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

Ibu melahirkan pada tahun 2017 dengan kehamilan aterm dan imunisasi TT lengkap dengan usia kehamilan 38 minggu 5 hari dengan tekanan darah 120/80 mmhg tidak ada riwayat peningkatan tekanan darah dan tidak ada komplikasi yang dialami ibu selama kehamilan. Persalinan normal ditolong oleh bidan di puskesmas dengan jenis kelamin perempuan dengan berat badan 2900 gram, panjang badan 49 cm. Tidak ada komplikasi selama persalinan dan tidak ada peningkatan tekanan darah Masa nifas berjalan normal dan ASI eksklusif 7 bulan dan imunisasi lengkap.

F. Riwayat keluarga berencana

Ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan setelah anak pertama lahir dan tidak ada kelainan selama menjadi akseptor KB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

G. Riwayat kesehatan yang lalu

Ibu mengatakan tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya dan tekanan darah sebelum hamil dalam batas normal yaitu tekanan darah 120/80 mmHg, tidak ada riwayat penyakit asma, DM dan jantung.

H. Riwayat kesehatan dan penyakit keluarga

Ibu tidak memiliki riwayat penyakit keturunan dalam keluarga seperti hipertensi, keturunan kembar dan riwayat penyakit menular lainnya.

I. Riwayat psikososial, ekonomi, dan spiritual

a. Suami maupun keluarga senang dengan kehamilan ibu
b. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami
c. Ibu mengerjakan rumah tangga dibantu oleh keluarga
d. Ibu dan keluarga beragama Islam dan taat menjalankan ibadah
e. Hubungan keluarga dan tetangga baik
f. Suami sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya
g. Ibu menganggap bahwa kehamilannya merupakan anugerah dari Allah SWT
h. Ibu dan keluarga ingin persalinannya berjalan lancar dan ditolong oleh bidan ataupun dokter.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

J. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1. Nutrisi

Ibu mengatakan sebelum hamil makan 3x/hari, minum 5-6 gelas/hari, komposisi nasi, sayur, dan lauk, sedangkan selama hamil makan 3x/hari dengan porsi lebih banyak dari pada sebelum hamil, komposisi nasi, sayur,

lauk dan minum 7-8 gelas/hari dan ibu mengatakan selama hamil ia lebih suka mengkonsumsi makanan yang tinggi garam dan lemak seperti bakso.

2. Eliminasi

   Ibu mengatakan selama hamil selalu lancar buang air besar 1x/hari dengan eksistensi lembek warna kuning, sedangkan buang air kecil sebelum hamil antara 3-4x/hari dan selama hamil 5-6x/hari dengan warna kuning jernih.

3. Istirahat/tidur

   Ibu mengatakan sebelum dan selama hamil jarang tidur siang dan tidur malam minimal 6-8 jam/hari.

4. Aktivitas

   Ibu mengatakan sebelum dan selama hamil tetap melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, menyapu, mengepel, memasak dll.

5. Personal *hygiene*

   Ibu mengatakan sebelum dan selama hamil selalu mandi 2x/hari, menggosok gigi, mencuci rambut 2 hari sekali dan ganti baju setiap setelah mandi sore.

6. Perilaku kesehatan

   Ibu mengatakan sebelum dan selama hamil tidak pernah merokok dan minum minuman alkohol.

K. Pemeriksaan Fisik Umum

1. Keadaan umum ibu tampak lemas
2. Kesadaran composmentis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

3. Pemeriksaan tanda-tanda vital

   Tekanan Darah : 150/100 mmHg

   Nadi : 88x/menit

   Pernapasan : 22x/menit

   Suhu : 36,9°C

4. TB : 158 cm
5. LILA : 25,5 cm
6. BB sebelum hamil 60 kg
7. BB sekarang 69kg.
8. Pemeriksaan fisik *head to toe*.

   a. Mata : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sklera putih.

   b. Mulut : Bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada *caries* gigi.

   c. Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar limfe, tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis.

   d. Payudara : Simetris kiri dan kanan, *hyperpigmentasi* pada *areola mammaae*, putting susu menonjol, tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

   e. Abdomen : Terdapat linia nigra, striae alba dan tidak terdapat luka bekas operasi, dan pada pemeriksaan leopold didapatkan hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Leopold I : 3 Jrbpx, TFU 30 cm, bokong.

Leopold II : Punggung kiri

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 90 cm

TBJ : TFU x LP = 30 x 90 =2.700 gram

Auskultasi DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit secara teratur.

f. Ekstremitas: Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices, tidak ada oedema, refleks patella kiri dan kanan (+).

9. Pemeriksaan Penunjang

a. Pemeriksaan Laboratorium

Hb : 12,5 gr/dl

Albumin : Negatif (-)

Reduksi : Negatif (-)

b. Pemeriksaan USG

Hasil USG : tunggal, hidup, presentasi kepala, usia kehamilan 36-38 minggu, JK : laki-laki, TBJ 2.700 gram. Adapun tujuan dari USG ini adalah untuk mengetahui keadaan janin serta letak plasenta. Pemeriksaan ini di lakukan oleh dr Alamsyah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

G2P1A0, gestasi 36 minggu 1 hari, situs memanjang, intrauterin, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan hipertensi gestasional.

1. G2P1A0

   Data Dasar :

   DS : Ibu mengatakan hamil anak kedua dan tidak pernah keguguran, ibu merasakan adanya pergerakan janin pada usia kehamilan 4 bulan.

   DO : Tampak pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, tampak striae alba, linea nigra, dan terdapat :

   Leopold I : 3 Jrbpx, TFU 30 cm, bokong

   Leopold II : Punggung kiri

   Leopold III : Kepala

   Leopold IV : BAP

   Auskultasi DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit secara teratur.

   Analisa dan Interpretasi Data

   Pada pemeriksaan kulit perut tampak adanya linea nigra, striae livid yang menandakan kehamilan yang pertama, terdapatnya denyut jantung dan terabanya bagian-bagian janin pada saat dipalpasi hal ini merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan, serta dan otot

perut sudah kendor menandakan perut ibu sudah pernah mengalami peregangan sebelumnya (Prawirohardjo, 2014:179).

2. Gestasi 36-38 minggu

Data dasar :

DS : Ibu mengatakan HPHT tanggal 07 Mei 2019, ibu mengatakan umur kehamilannya sekarang ±8 bulan dan pada usia kehamilan sebelumnya ibu dengan tekanan darah 150/100 mmhg.

DO : Pemeriksaan leopold I, tinggi fundus 3 jari di bawah *processus xyphoideus*dan tafsiran persalinan tanggal 15 Februari 2020 berdasarkan rumus *Naegle.*

Analisa dan Interpretasi Data

Dari hasil pemeriksaan dilihat dengan menggunakan rumus *Naegle* dimulai dari HPHT tanggal 07 Mei 2019, sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 36 minggu 1 hari.(Prawirohardjo, 2014:279).

3. Situs Memanjang

Data Dasar :

DS : Ibu mengatakan pergerakan janin kuat disebelah kanan perut ibu

DO : Leopold I : 3 Jrbpx, TFU 30 cm, bokong

Leopold II : Punggung kiri

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Auskultasi DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit secara teratur.

Analisa dan Interpretasi Data

Dengan teraba bagian berat janin yaitu bokong difundus dan kepala pada bagian terendah, DJJ terdengar jelas pada kuadran kiri bawah dan gerakan janin yang dirasakan ibu pada salah satu sisi perut ibu menunjukkan bahwa sumbu panjang janin sejajar dengan sumbu panjang ibu (Prawirohardjo, 2014:205-206)

4. Intrauterin

Data Dasar

DS : Ibu merasakan pergerakan janin kuat terutama pada perut sebelah kiri.

DO : Ibu tidak merasakan nyeri perut ketika dipalpasi, TFU sesuai umur kehamilan dan pada palpasi leopold teraba bagian-bagian janin yaitu :

Leopold I : 3 Jrbpx, TFU 30 cm, bokong.

Leopold II : punggung kiri

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Analisa dan Interpretasi Data

Bagian dari uterus yang merupakan tempat janin dapat tumbuh dan berkembang adalah kavum uteri dimana rongga ini merupakan tempat yang luas bagi janin untuk dapat bertahan hidup sampai aterm tanpa ada rasa nyeri perut yang hebat. Tempat tersebut berada dalam korpus uteri yang disebut dengan kehamilan intrauterin (Baety,2012:9).

5. Tunggal

Data Dasar :

DS : Ibu mengatakan pergerakan janin kuat pada satu sisi perut yaitu sisi perut bagian sebelah kiri.

DO : Pada palpasi abdomen didapatkan hasil leopold dimana pada

Leopold I : 3 Jrbpx, TFU 30 cm, bokong.

Leopold II : Punggung kiri

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

Pada auskultasi hanya terdapat satu denyut jantung janin (DJJ) yaitu terdengar jelas, kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit secara teratur.

Analisa dan Interpretasi Data

Di dalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu (Baety, 2012:10-11).

6. Hidup

Data Dasar

DS : Ibu merasakan pergerakan janinnya aktif dan kuat pada usia kehamilan 4 bulan sampai sekarang dan ibu merasakan pergerakan janinnya 12 kali dalam sehari.

DO : Pada auskultasi DJJ terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit dan teratur.

Analisa dan Interpretasi Data

Adanya gerakan janin dan denyut janin (DJJ), merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antar 120-160x/menit, selain itu tanda janin juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertambah (Prawirahardjo, 2014:285).

7. Keadaan Janin Baik

Data Dasar

DS : Ibu merasakan pergerakan janin kuat dan biasanya bergerak 12 kali dalam sehari.

DO : Auskultasi DJJ terdengar kuat, jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit dan teratur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Analisa dan Interpretasi Data

Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dan bunyi jantung janin teratur dengan frekuensi 140x/menit yang menandakan bahwa janin dalam kondisi baik.

8. Hipertensi gestasional

Data Dasar

DS : Ibu mengeluh kadang mengalami sakit kepala yang disertai dengan rasa pusing, ibu mengatakan tidak ada riwayat hipertensi pada kehamilan yang lalu dengan tekanan darah 120/80 mmhg dan ibu juga tidak memiliki riwayat penyakit keturunan seperti hipertensi dalam keluarga.

DO : Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil TD :150/100 mmHg, albumin negatif.

Anallisa dan Interpretasi Data

Didapatkan tekanan darah sistolik 140 atau diastolik 100 mmHg untuk pertama kalinya pada kehamilan di atas 20 minggu tidak ada proitenuria, tekanan darah kembali normal sebelum 12 minggu postpartum, diagnosis hanya dibuat pada postpartum, mungkin memiliki tanda-tanda atau gejala preeklampsia (Dewi Setiawati, 2013:142).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LANGKAH III. MERUMUSKAN DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Potensial terjadinya :

1. Preeklampsia ringan

   Preeklampsia ringan dapat terjadi apabila tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg atau terjadi peningkatan tekanan darah sistolik hingga 30 mmHg atau peningkatan tekanan darah diastolik hingga 15 mmHg dari tekanan darah awal dan disertai dengan adanya protein urin +1 (Yulia, 2012:27).

2. Pertumbuhan janin terhambat

   Pertumbuhan janin terhambat ditentukan bila berat janin kurang dari 10% dari berat yang diharuskan dicapai pada usia kehamilan tertentu. Biasanya perkembangan yang terhambat diketahui setelah 2 minggu tidak ada pertumbuhan dimana penyebab pertumbuhan janin terhambat adalah hipertensi dalam kehamilan (Prawirohardjo, 2014:679).

3. Berkurangnya aliran darah ke plasenta

   Risiko yang mungkin dialami ibu hamil dengan hipertensi adalah berkurangnya aliran pasokan darah, oksigen dan nutrisi ke bayi. Hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan bayi bertambah dan dapat terjadinya bayi baru lahir (Prawirohaedjo, Sarwono, 2014: 224).

4. Penyakit kardiovaskuler dimasa depan

   Wanita yang mengalami preeklampsia (ditandai dengan tingginya tekanan darah dan protein dalam urin setelah 20 minggu kehamilan beresiko mengalami peningkatan penyakit kardiovaskuler dimasa yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

akan datang, meskipun fakta menunjukan bahwa tekanan darah akan kembali normal setelah melahirkan (Prawirohaedjo, Sarwono, 2014: 224).

5. Plasenta absurpsio (plasenta lepas sebelum waktunya)

   Pada beberapa kasus ibu hamil dengan hipertensi, plasenta dapat terlepas dan terpisah dan rahim. Absurpsio plasenta akan menghentikan pasokan oksigen ke bayi dan menyebabkan perdarahan yang berat. Resikonya adalah kematian pada janin.

6. Kelahiran bayi prematur

   Untuk mencegah terjadinya komplikasi berbahaya yang mungkin mengancam nyawa bayi dan ibu. Tidak jarang masa kehamilan dipercepat sebelum waktunya sehingga bayi beresiko lahir secara premature (Prawirohaedjo, Sarwono, 2014: 224).

7. Kebutaan

   Preeklampsia dapat memicu gangguan pada pembuluh darah dimata. Pembuluh darah mata diretina bisa pecah memicu kebutaan. Tapi lanjutannya, pada kondisi yang akan mengalami pembengkakan pada otak yang mengenai saraf mata. Hal ini hanya dapat berdampak kebutaan sementara (Prawirohaedjo, Sarwono, 2014: 224)

LANGKAH IV. PERLUNYA TINDAKAN SEGERA ATAU KOLABORASI

Pada kasus hipertensi gestasional tidak membutuhkan tindakan segera jika tekanan darah 150/110 mmHg, dan tidak ditemukan protein urin. Jika tidak segera ditangani maka akan terjadi tanda-tanda seperti kejang atau syok jika telah melakukan kunjungan *antenatal care* 2 minggu berturut-turut.

Jika pasien telah mengalami sakit kepala terus-menerus atau terdapat protein urin maka akan dilakukan tindakan segera dengan berkolaborasi dengan dokter dengan melakukan tindakan *emergency* atau melakukan rujukan. Namun sebelum melakukan rujukan, tenaga kesehatan dapat melakukan tindakan pemberian obat Nefedifin 10 mg (2x1) pada pasien hipertensi atau preeklampsia dengan tindakan awal untuk mencegah kejang atau syok.

LANGKAH V.RENCANA TINDAKAN

Tanggal 15 Januari 2020

1. Sampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan jelaskan hal-hal yang dianggap perlu seperti peningkatan tekanan darah dan protein urin.

   Rasional : Penyampaian dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kepada ibu sangat penting agar ibu dapat mengetahui perkembangan kehamilannya serta merupakan tujuan utama pemeriksaan antenatal yang berkualitas.

2. Berikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien.

   Rasional : Dukungan psikologis dan keterlibatan suami dan keluarga merupakan psikoterapi dalam perawatan klien sehingga dapat memberikan semangat dan membantu dalam proses penyembuhan. Agar ibu lebih optimis menghadapi kehamilannya dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

3. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang :

   a. Istirahat

      Rasional : Adanya peningkatan fungsi-fungsi fisiologis tubuh diperlukan istirahat yang cukup untuk memberikan relaksasi yang cukup pada otot serta mengurangi beban kerja jantung

   b. Diet seimbang dalam kehamilan terhadap makanan yang mengandung karbohidrat, tinggi protein, rendah lemak dan rendah garam.

      Rasional : Ibu hamil tetap membutuhkan makanan yang bergizi dan tinggi protein termasuk pada ibu yang mengalami preeklampsia ringan, akan tetapi pada ibu hamil yang mengalami preklampsia ringan harus memperhatikan asupan makanan seperti mengurangi mengkonsumsi makanan yang megandung karbohidrat, rendah lemak dan pembatasan cairan dan garam karena hal ini bisa mencegah terjadinya preeklampsia ringan.

   c. Menjaga personal *hygiene* dalam kehamilan

      Rasional : Menjaga personal *hygiene* sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi pada klien dan dapat memberikan rasa nyaman pada ibu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

4. Memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi dalam kehamilan dan cara mengatasi dan memantau preeklampsia ringan

   Rasional : Dengan ibu telah mengetahui tentang hipertensi dalam kehamilan maka ibu dapat mengerti dengan kondisi yang sekarang dialaminya dan cara mengatasi apabila ada tanda-tanda mengarah preeklampsia ringan.

5. Anjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan bayinya.

   a. Waktu menghitung gerakan dilakukan sekali dalam sehari
   b. Dihitung hingga 10 kali gerakan dengan sekurang-kurangnya 10 gerakan dalam 10 jam.
   c. Ibu harus memberitahu bidan/dokter apabila gerakan janinnya kurang dari 10 kali dalam 10 jam.

   Rasional : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mengerti cara menghitung gerakan janinnya dalam sehari.

6. Ajarkan ibu untuk mengenali tanda-tanda terjadi preeklampsia ringan yaitu sakit kepala, rasa nyeri pada daerah perut, penglihatan kabut dan terdapat proteinurin.

   Rasional : Agar ibu mengerti dan dapat mengambil keputusan klinik yang tepat jika muncul tanda-tanda preeklampsia ringan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

7. Diskusikan dengan ibu tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya

   Rasional : Dengan adanya diskusi antara ibu dan keluarga baik secara fisik maupun psikis dan finansial akan siap menghadapi persalinan dan kelahiran bayinya tanpa rasa cemas yang berlebihan.

8. Menganjurkan ibu untuk melakukan USG.

   Rasional : Ultrasonografi (USG) merupakan suatu metode diagnostik dengan menggunakan gelombang ultrasonik, untuk mempelajari struktur jaringan berdasarkan gambaran ultrasonik yang dipantulkan oleh jaringan, yang manfaatnya untuk memantau keadaan janin

9. Pemberian obat Nefedifin 10 mg (2x1)

   Rasional : Obat nefedipin adalah obat anti hipertensi yang aman bagi ibu hamil dan tidak mengganggu pertumbuhan janin.

10. Anjurkan ibu untuk senantiasa berdoa dan berdzikir kepada Allah Swt agar dapat mengurangi kecemasan dalam dirinya dan semoga kehamilannya lancar tidak ada komplikasi yang di timbulkan sampai persalinan dan meminta kesembuhan darinya Sesuai dengan (HR Bukhari dan Muslim).

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لاَ شَافِىَ إِلاَّ أَنْتَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمً

Terjemahnya :

"Ya Allah Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembukanlah ia. (Hanya) Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dariMu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi"

Rasional : Ibu bersedia berdoa dan berdzikir kepada Allah Swt

11. Menganjurkan kepada ibu untuk ke fasilitas kesehatan apabila ibu mengalami kelainan dalam kehamilannya.

    Rasional : Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan.

LANGKAH VI. IMPLEMENTASI ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 15 Januari 2020

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa ibu dalam keadaan hipertensi dalam kehamilan
2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien
3. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang :
    a. Istirahat

       Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari minimal 1-2 jam dan pada malam hari minimal 6-8 jam

    b. Diet seimbang

       Menganjurkan kepada ibu tentang diet seimbang dalam kehamilan dengan makan makanan yang tinggi protein, rendah lemak dan diet garam dan juga mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti : nasi, gandum, jagung dan umbi-umbian, makanan yang tidak perlu dikurangi pada saat hamil seperti banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, tahu, tempe dan banyak minum air putih untuk kesehatan ibu dan juga janinnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

c. Personal hygine

Menganjurkan ibu untuk mengganti pakaian dalam tiap kali lembab atau basah.

4. Memberikan ibu pendidikan kesehatan hipertensi dalam kehamilan
5. Menganjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan janin
6. Menganjurkan ibu untuk memantau tanda-tanda terjadinya preeklampsia ringan yaitu sakit kepala, rasa nyeri di daerah perut, penglihatan kabur dan terdapatnya protein urin pada pemeriksaan laboratorium.
7. Mendiskusikan kepada ibu tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya seperti : pemilihan tempat persalinan, penolong persalinan, biaya persalinan, kendaraan saat menuju tempat persalinan dan pendamping pada saat persalinan dan pakaian ibu dan bayinya.
8. Menganjurkan ibu untuk melakukan USG
9. Memberikan obat Nefedifin 10 mg (2x1)
10. Anjurkan ibu untuk senantiasa berdoa dan berdzikir kepada Allah Swt agar dapat mengurangi kecemasan dalam dirinya dan semoga kehamilannya lancar tidak ada komplikasi yang di timbulkan sampai persalinan dan meminta kesembuhan darinya Sesuai dengan (HR Bukhari dan Muslim).

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لاَ شَافِىَ إِلاَّ أَنْتَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمً

Terjemahnya :

> "*Ya Allah Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembukanlah ia. (Hanya) Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dariMu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi"*

11. Menganjurkan kepada ibu untuk ke fasilitas kesehatan apabila ibu mengalami kelainan dalam kehamilannya.

LANGKAH VII. EVALUASI

Tanggal 15 Januari 2020

1. Keadaan ibu dengan hipertensi gestasional belum teratasi dan keadaan janin baik ditandai dengan.
   a. Tekanan darah : 150/100 mmHg
   b. Albumin : Negatif (-)
   c. Djj :Terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit dan teratur.
2. Ibu telah merasa tenang dengan kehamilan yang dialaminya dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. *Health Education* telah diberikan kepada ibu.
4. Ibu telah mengerti apa itu hipertensi dalam kehamilan yang sedang dialaminya.
5. Ibu telah mengerti cara menghitung pergerakan janinnya..
6. Tidak terjadi preeklampsia yang ditandai dengan
   a. Tekanan darah : 150/100 mmHg
   b. Albumin : Negatif (-)

7. Ibu telah mempersiapkan semua peralatan untuk persalinan dan peralatan bayinya.
8. Ibu telah melakukan USG.
9. Ibu telah mendapatkan obat Nefedifin 10 mg (2x1)
10. Ibu telah mengerti dan mau berdoa dan berdzikir kepada Allah Swt..
11. Menganjurkan kepada ibu untuk ke fasilitas kesehatan apabila ibu mengalami kelainan dalam kehamilannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA NY "I" DENGAN HIPERTENSI GESTASIONAL GESTASI 36-38 MINGGU DI PUSKESMAS BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA TANGGAL 15 JANUARI 2020

No. register : 19xxx

Tanggal masuk : 15 Januari 2020 Pukul 09:00 Wita

Tanggal pengkajian : 15 Januari 2020 Pukul 09:00 Wita

Nama pengkaji : Rika

IDENTITAS ISTRI/SUAMI

Nama : Ny "I"/Tn "A"

Umur : 36 tahun/38 tahun

Nikah/lamanya : 1x/±8 tahun

Suku : Makassar /Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/S1

Pekerjaan : IRT/Guru

Alamat : B

A. DATA SUBJEKTIF

1. Ibu datang ke Puskesmas bontomarannu untuk memeriksa kehamilannya.

2 sakit kepala disertai pusing sejak 2 hari yang lalu.

3 Ibu mengatakan HPHT 07 Mei 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

4 Ibu tidak ada riwayat penyakit hipertensi, asma, jantung, DM, penyakit menular ataupun penyakit menular.

B. DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu lemas
2. Kesadaran composmentis
3. HTP 14 Februari 2020
4. Gestasi 36 minggu 1 hari
5. Tinggi badan : 158 cm
6. Berat badan sebelum hamil : 60 kg

   Berat badan sekarang : 69 kg
7. Lila : 25,5 cm
8. Tanda-tanda vital

   Tekanan darah : 150/100 mmHg

   Nadi : 88x/menit

   Pernapasan : 22x/menit

   Suhu : 36,9°C
9. Pemeriksaan Penunjang

   Pemeriksaan USG

   Hasil USG : tunggal, hidup, presentasi kepala, usia kehamilan 36-38 minggu, JK : laki-laki, TBJ 2.700 gram. . Adapun tujuan dari USG ini adalah untuk mengetahui keadaan janin serta letak plasenta. Pemeriksaan ini di lakukan oleh dr Alamsyah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

C. ASSESMENT

Ny "I" G2P1A0, gestasi 36 minggu 1 hari, situs memanjang, intauterin, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan hipertensi gestasional, dan Antisipasi terjadinya preeklampsia ringan dan pertumbuhan janin terhambat.

D. PLANNING (P)

Tanggal 15 Januari 2020

1. Sampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan jelaskan hal-hal yang dianggap perlu seperti peningkatan tekanan darah dan protein urin.

   Hasil : Penyampaian dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kepada ibu sangat penting agar ibu dapat mengetahui perkembangan kehamilannya serta merupakan tujuan utama pemeriksaan antenatal yang berkualitas.

2. Berikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien.

   Hasil : Dukungan psikologis dan keterlibatan suami dan keluarga merupakan psikoterapi dalam perawatan klien sehingga dapat memberikan semangat dan membantu dalam proses penyembuhan. Agar ibu lebih optimis menghadapi kehamilannya dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

3. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang :

   a. Istirahat

      Rasional : Adanya peningkatan fungsi-fungsi fisiologis tubuh diperlukan istirahat yang cukup untuk memberikan relaksasi yang cukup pada otot serta mengurangi beban kerja jantung

   b. Diet seimbang dalam kehamilan terhadap makanan yang mengandung karbohidrat, tinggi protein, rendah lemak dan rendah garam.

      Rasional : Ibu hamil tetap membutuhkan makanan yang bergizi dan tinggi protein termasuk pada ibu yang mengalami preeklampsia ringan, akan tetapi pada ibu hamil yang mengalami preeklampsia ringan harus memperhatikan asupan makanan seperti mengurangi mengkonsumsi makanan yang megandung karbohidrat, rendah lemak dan pembatasan cairan dan garam karena hal ini bisa mencegah terjadinya preeklampsia ringan.

   c. Menjaga personal *hygiene* dalam kehamilan

      Hasil : Menjaga personal *hygiene* sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi pada klien dan dapat memberikan rasa nyaman pada ibu.

4. Memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi dalam kehamilan dan cara mengatasi dan memantau preeklampsia ringan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Hasil : Dengan ibu telah mengetahui tentang hipertensi dalam kehamilan maka ibu dapat mengerti dengan kondisi yang sekarang dialaminya dan cara mengatasi apabila ada tanda-tanda mengarah preeklampsia ringan.

5. Anjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan bayinya.

   Hasil : Dengan mengajarkan ibu cara menghitung gerakan janinnya ibu dapat memantau sendiri kondisi janinnya secara objektif sekalipun meningkatkan pengetahuan ibu tentang kehamilan.

6. Ajarkan ibu untuk memantau tanda-tanda terjadi preeklampsia ringan yaitu sakit kepala, rasa nyeri pada daerah perut, penglihatan kabut dan terdapat proteinurin.

   Hasil : Agar ibu mengerti dan dapat mengambil keputusan klinik yang tepat jika muncul tanda-tanda preeklampsia ringan.

7. Menganjurkan ibu dan keluarga menyiapkan semua persiapan untuk persalinan serta pakaian bayi.

   Hasil : Ibu telah menyiapkan semua persiapan persalinan serta pakaian bayi.

8. Menganjurkan ibu untuk melakukan USG

   Hasil : Ibu telah melakukan pemeriksaan USG, pada hasil USG ibu tidak terdapat kelainan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

9. Memberikan obat Nefedipin 10 mg (2x1) dengan istirahat dari dokter dan menganjurkan ibu untuk meminum setiap hari dan teratur dengan jadwal minum yang telah diberikan.

   hasil : Ibu mengeri dan mau melakukan anjuran yang telah diberikan yaitu meminum obat yang telah diresepkan sesuai jadwal yang telah diberikan.

10. Anjurkan ibu untuk senantiasa berdoa dan berdzikir kepada Allah Swt agar dapat mengurangi kecemasan dalam dirinya dan semoga kehamilannya lancar tidak ada komplikasi yang di timbulkan sampai persalinan dan meminta kesembuhan darinya Sesuai dengan (HR Bukhari dan Muslim).

    Hasil : Ibu bersedia berdoa dan berdzikir kepada Allah Swt

11. Menganjurkan kepada ibu untuk ke fasilitas kesehatan apabila ibu mengalami kelainan dalam kehamilannya.

    Hasil : Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA NY "I" DENGAN HIPERTENSI GESTASIONAL GESTASI 37-39 MINGGU DI RUMAH PASIEN KABUPATEN GOWA

TANGGAL 23 JANUARI 2020

No. register : 19xxx

Tanggal Kunjungan : 23 Januari 2020 Pukul 09:30 Wita

Tanggal pengkajian : 23 Januari 2020 Pukul 09:30 Wita

Nama pengkaji : Rika

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan sakit kepala sudah mulai berkurang
2. Ibu mengatakan masih merasakan sedikit pusing
3. Ibu mengatakan masih cemas dengan kehamilannya
4. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat disebelah kanan
5. Ibu mengatakan telah meminum obatnya dengan teratur

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Gestasi 37 minggu 2 hari
4. Berat badan : 70 kg

5. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 140/90 mmHg

Nadi : 84x/menit

Pernapasan : 22x/menit

Suhu : 36,9°C

6. Pemeriksaan fisik

a. Mata : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda dan sklera putih.

b. Payudara : Simetris kiri dan kanan, putting susu menonjol, tidak ada benjolan.

c. Abdomen : Tampak linea nigra, striae alba dan tidak terdapat luka bekas operasi.

Leopold I : 2 Jrbpx, TFU 31 cm, bokong

Leopold II : Punggung kiri

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

Lp : 92 cm

TBJ : TFU x LP : 31 x 92 : 2.852 gram

DJJ terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 144x/menit secara teratur.

d. Ekstremitas : Tidak ada varices, tidak ada oedema pada kedua kaki, refleks patella kiri dan kanan (+)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ASSESMENT (A)

Ny "I" G2P1A0, Gestasi 37 minggu 2 hari, situs memanjang, intauterin, tunggal, hidup. Keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan hipertensi gestasional.

PLANNING (P)

Tanggal 23 Januari 2020

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa ibu dalam keadaan hipertensi dan keadaan janinnya baik.

   Hasil : Ibu mengerti dan bahagia atas kondisinya saat ini
2. Memberikan dukungan mental kepada ibu agar tidak cemas dengan kehamilannya.

   Hasil : Telah diberikan.
3. Mengingatkan kembali tentang HE
   a. Istirahat

      Menganjurkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup dan jangan melakukan aktivitas yang berat.
   b. Diet yang seimbang

      Menganjurkan kepada ibu tentang diet seimbang dalam kehamilan dengan makan-makanan yang tinggi protein, rendah lemak dan diet garam dan juga mengurangi mengkonsumsi makanan yang tidak perlu dikurangi pada saat hamil seperti banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, tahu, tempe dan banyak minum air putih untuk kesehatan dirinya dan juga janinnya.

c. Personal hygiene

Menganjurkan kepada untuk mengganti pakaian dalam apabila basah ataupun lembab.

Hasil : ibu mengerti

4. Menjelaskan kepada ibu tentang tanda bahaya pada kehamilan Trimester III

1. Perdarahan pervaginam
2. Pergerakan janin kurang/tidak ada
3. Ketuban pecah sebelum waktunya

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia datang ke fasilitas kesehatan jika mengalami salah satu tanda bahaya.

5. Menjelaskan kepada ibu tentang tanda-tanda persalinan

a. Nyeri perut tembus ke belakang disertai pengeluaran lendir dan darah
b. Adanya rasa ingin meneran yang kuat
c. Perineum menonjol

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Menganjurkan kepada ibu atau keluarga menyiapkan semua persiapan untuk persalinan termasuk pakaian ibu serta pakaian bayi

Hasil : Ibu telah menyiapkan semua persiapan persalinan serta pakaian bayi

7. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk rajin mengkonsumsi obat yang telah diberikan sesuai jadwal dan aturan minum yang telah dijelaskan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Hasil : Ibu bersedia melakukannya untuk kesehatan dirinya dan bayinya karena dengan rajin mengkonsumsi obat Nefedifin 10 mg (2x1) terdapat penurunan tekanan darah 140/90 mmhg dari usia kehamilan 36 minggu 1 hari.

8. Anjurkan ibu untuk senantiasa berdoa dan berdzikir kepada Allah Swt agar dapat mengurangi kecemasan dalam dirinya dan semoga kehamilannya lancar tidak ada komplikasi yang di timbulkan sampai persalinan dan meminta kesembuhan darinya Sesuai dengan (HR Bukhari dan Muslim).

   Hasil : Ibu bersedia berdoa dan berdzikir kepada Allah Swt

9. Menganjurkan kepada ibu ke fasilitas kesehatan apabila ibu mengalami kelainan pada kehamilannya

   Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY "I" DENGAN HIPERTENSI GESTASIONAL GESTASI 38-40 MINGGU DI PUSKESMAS BONTOMARANNU GOWA TANGGAL 31 JANUARI 2020

No. register	: 19xxx	
Tanggal Masuk	: 31 Januari 2020	Pukul 10:20 Wita
Tanggal Pengkajian	: 31 Januari 2020	Pukul 10:20 Wita
Tanggal Partus	: 31 januari 2020	Pukul 14:45 Wita
Nama Pengkaji	:Rika	

Identitas Istri/Suami

Nama	: Ny "I"/Tn "A"
Umur	: 36 tahun/38 tahun
Nikah/lamanya	: 1x/±8 tahun
Suku	: Makassar /Makassar
Agama	: Islam/Islam
Pendidikan	: SMA/S1
Pekerjaan	: IRT/Guru
Alamat	: B

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KALA I

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan ini kehamilan yang kedua dan tidak pernah keguguran
2. Hari pertama haid terakhir 07 Mei 2019
3. Umur kehamilan ± 9 bulan
4. Ibu mengatakan sedikit pusing
5. Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama hamil
6. Ibu telah memeriksakan kehamilannya sebanyak 5 kali Puskesmas Bontomarannu
7. Ibu tidak pernah menderita penyakit serius
8. Ibu tidak pernah di rawat di puskesmas dan di rumah sakit karena penyakit yang serius
9. Ibu mengatakan sakit perut tembus kebelakang sejak tanggal 31 Januari 2020 pukul 03.30 Wita
10. Sakit yang dirasakan hilang timbul dan semakin lama semakin sering sakitnya
11. Ibu mengatakan adanya pengeluaran lendir dan darah sejak tanggal 31 Januari 2020 pukul 08.00 Wita
12. Ibu mengatakan tidak ada pengeluaran air dari jalan lahir.

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran *composmentis*
3. Gestasi 38 minggu 3 hari
4. Tanda-tanda vital

   Tekanan darah : 140/90 mmHg

   Nadi : 82x/menit

   Pernapasan : 22x/menit

   Suhu : 36,7°C
5. Pemeriksaan Fisik

   a. Mata : Simetris kiri dan kanan,konjungtiva merah muda,sklera putih.

   b. Mulut : Bibir lembab, keadaan mulut bersih, tidak ada caries pada gigi

   c. Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis

   d. Payudara : Simetris kiri dan kanan, putting susu menonjol, tampak *hyperpigmentasi* pada *areola mammae,* tidak ada benjolan dan nyeri tekan dan terdapat kolostrum apabila putting susu dipencet.

   e. Abdomen : Tampak pembesaran perut sesuai usia kehamilan, tampak *linea nigra,* dan striae alba dan tidak ada luka bekas operasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Leopold I : 3 Jrbpx, TFU 32 cm, bokong

Leopold II : Punggung kiri

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP, 3/5

LP : 94 cm

TBJ : TFU x LP : 32 x 94 : 3.008 gram

His : 3 kali dalam 10 menit, dengan durasi 30-35 detik

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 138x/menit secara teratur

f. Ekstremitas : Simetris, tidak ada varices, tidak ada oedema pada tungkai, tidak ada nyeri tekan dan *refleks patella*kiri dan kanan (+)

g. Genetalia : Tidak ada varices, tidak ada oedema, tidak ada pembesaran kelenjar batholin, dan tampak pengeluaran lendir dan darah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Pemeriksaan dalam tanggal 31 Januari 2020, pukul 10.20 Wita

1. Keadaan vulva dan vagina : Tidak ada kelainan
2. Portio : Tebal
3. Pembukaan : 5 cm
4. Ketuban : Utuh
5. Presentase : Ubun-ubun kecil kiri lintang
6. Penurunan : Hodge II 3/5
7. Molase : Tidak ada

8. Penumbungan : Tidak ada
9. Kesan panggul : Normal
10. Pelepasan : Lendir dan darah

ASSESMENT (A)

Ny "I" G2P1A0, inpartu kala I fase aktif, gestasi 38 minggu 3 hari,Pu-ki, Presentase kepala, situs memanjang, bergerak dalam panggul (BDP), intrauterin, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan hipertensi gestasional.

PLANNING (P)

Tanggal 31 Januari 2020

1. Menjelaskan pada ibu penyebab nyeri yang dirasakan yaitu adanya penekanan pada ujung-ujung syaraf dan ketegangan uterus saat berkontraksi.

   Hasil : Ibu mengerti.
2. Mengajarkan ibu teknik relaksasi dan pengaturan nafas pada saat kontraksi dengan cara ibu menarik nafas panjang melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut.

   Hasil : Ibu mengerti dan mau melakukannya
3. Mengajarkan ibu untuk miring ke kiri agar suplai oksigen ke janin menjadi lancar

   Hasil : ibu bersedia melakukannya yaitu dengan mengambil posisi miring ke kiri

4. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum di sela-sela kontraksi agar ibu memiliki tenaga untuk mengedan

   Hasil : Ibu bersedia melakukan anjuran yang di berikan dan ibu makan dan minum di sela-sela kontraksi

5. Mengajarkan ibu doa menahan rasa sakit ketika dalam proses persalinan dengan *memegang bagian tubuh yang sakit lalu membaca* doa.

   بِاسْمِ اللَّهِ (×3)

   أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ (×7)

   Artinya :

   Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dan kuasa-Nya dari kejelekan yang aku dapatkan dan aku waspadai (HR. Muslim no. 2202).

   Hasil : ibu mengerti dan mau melakukannya.

6. Mengobservasi His, Nadi, Djj, dan tekanan darah setiap 30 menit.

No	Jam (Wita)	DJJ (X/menit)	TD (mmHg)	Nadi (X/menit)	His	
					Frekuensi (x/menit)	Durasi (Detik)
1	10.50	140x/menit	-	86x/menit	3x10	30-35
2	11.20	138x/menit	-	88x/menit	3x10	30-35
3	11.50	140x/menit	-	88x/menit	3x10	35-40
4	12.20	142x/menit	140/90	84x/menit	4x10	40-45
5	12.50	138x/menit	-	82x/menit	4x10	40-45
6	13.20	138x/menit	-	84x/menit	4x10	40-45
7	13.50	140x/menit	-	86x/menit	5x10	45-50
8	14.20	140x/menit	140/90	88x/menit	5x10	45-50

7. Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 31 Januari 2020 pukul 14:20 Wita
   a. Keadaan vulva dan vagina : Tidak ada kelainan
   b. Porsio : Melesap
   c. Pembukaan : 10 cm
   d. Ketuban : Jernih
   e. Presentase : Ubun-ubun kecil depan
   f. Penurunan : Hodge IV 0/5
   g. Molase : Tidak ada
   h. Penumbungan : Tidak ada
   i. Kesan panggul : Normal
   j. Pelepasan : Lendir, darah dan air ketuban
8. Menyiapkan alat dan bahan penolong persalinan
   a. Alat Perlindungan Alat (APD) : Penutup kepala, masker, kacamata, celemek, sepatu tertutup (sepatu *boot*).
   b. Partus set : *Handscoon*steril, 2 buah klem kocher, ½ kocher, 1 buah gunting episiotomy, 1 buah gunting tali pusat, 1 buah kateter nelaton, kassa steril, pengisap lendir, penjepit tali pusat.
   c. On steril : 2 buah handuk kering dan bersih, pakaian bersih ibu dan bayi meliputi baju, pembalut, sarung, celana dalam, pakaian bayi, popok, topi/tutup kepala, sarung tangan/kaki, kain selimut untuk membedong.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

d. Heacting set : 1 buah pinset cirugis, buah pinset anatomi, nal puder, 2 buah jarum (1 jarum circle dan 1 jarum VI circle), gunting benang, benang cromic, 1 pasang handscoon steril.

e. Obat-obatan esensial : Lidocain 1 ampul, oksytocin 10 IU, spoit 3 cc dan spoit 1 cc.

f. Peralatan lain : Larutan Clorin 0,5 %, air DTT, kantong plastik, tempat sampah kering dan basah, safety box, bengkok, waslap dan tempat sampah plasenta. Menyiapkan tempat penerangan dan lingkungan untuk kelahiran bayi, dengan memastikan ruangan sesuai kebutuhan bayi baru lahir, meliputi ruangan bersih, hangat, pencahayaan cukup dan bebas dari tiupan angin.

KALA II

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan sakit yang dirasakan semakin kuat
2. Ibu merasa ingin BAB dan ibu merasakan adanya tekanan pada anus
3. Ibu mengatakan adanya dorongan untuk meneran
4. Ibu mengatakan sakitnya bertambah kuat dan tembus ke belakang

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tampak tanda dan gejala kala II dimana tampak :
   a. Tampak perineum menonjol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

b. Vulva vagina dan sfingter ani membuka

c. Meningkatnya pengeluaran lendir bercampur dengan darah

d. Tampak rambut bayi pada vulva

ASSESMENT (A)

Perlangsungan kala II

PLANNING (P)

Tanggal 31 Januari 2020

1. Melihat adanya tanda dan gejala kala II

   Hasil : Tampak tanda dan gejala kala II

   Adanya dorongan kuat untuk meneran

   Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum

   Perineum menonjol

   Vulva, vagina dan spingter ani membuka

2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan 1 ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali pakai ke dalam wadah partus set

   Hasil : Alat dan bahan telah siap

3. Memakai celemek

   Hasil : Celemek telah dipakai

4. Melepas semua perhiasaan yang dipakai di tangan, lalu mencuci tangan di bawah air mengalir dengan teknik 6 langkah

   Hasil : Tangan telah di cuci

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

5. Menggunakan sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam

   Hasil : Sarung tangan telah dipakai

6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang telah terpasang handscoon, isi dengan okstosin dan letakkan kembali ke dalam wadah partus set

   Hasil : Spoit telah di isi dengan oksitosin dan telah di letakkan kembali di wadah partus set

7. Membersihkan vulva dan perineum, mengusapnya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas DTT

   Hasil : Telah dilakukan

8. Lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap (bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi

   Hasil : Pemeriksaan dalam tanggal 31 Januari 2020 pukul 14:20 Wita

   a. Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan
   b. Portio : Melesap
   c. Ketuban : Jernih
   d. Pembukaan : 10 cm
   e. Prensentase : Ubun-ubun kecil depan
   f. Penurunan : Hodge IV
   g. Molase : Tidak ada
   h. Penumbungan : Tidak ada
   i. Kesan panggul : Normal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

j. Pelepasan : Lendir, darah dan air ketuban

9. Mendekontaminasi sarung tangan kotor ke dalam larutan clorin 0,5 % dan membukanya secara terbalik, lalu rendam selama 10 menit

   Hasil : Sarung tangan telah dibuka secara terbalik dan didekontaminasi di larutan clorin 0,5 % selama 10 menit

10. Memeriksa DJJ setelah kontraksi, untuk memastikan DJJ dalam batas normal yaitu 120-160x/menit

    Hasil : DJJ terdengar jelas kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit secara teratur.

11. Beritahu ibu dan keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin serta ibu dalam keadaan baik

    Hasil : Ibu dan keluarga telah di beritahu

12. Minta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi meneran (Bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman)

    Hasil : Keluarga bersedia membantu

13. Lakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran, diantaranya : bimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran, berikan dukungan dan semangat atas usaha ibu untuk meneran, anjurkan ibu beristrahat diantara kontraksi dan anjurkan ibu untuk minum di sela-sela kontraksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Hasil : Telah dilakukan pimpinan meneran, ibu beristirahat dan minum diantara kontraksi, serta ibu telah diberi semangat

14. Jika ibu telah memiliki keinginan untuk meneran, anjurkan ibu untuk berjalan, jongkok, atau mengambil posisi yang menurut ibu nyaman

    Hasil : ibu telah memilih posisi yang nyaman yaitu dengan posisi miring kiri

15. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih diatas perut ibu

    Hasil : Handuk bersih telah diletakkan di atas perut ibu

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu

    Hasil : Telah dilakukan

17. Membuka partus set untuk memastikan kelengkapan alat dan bahan

    Hasil : Alat dan bahan telah lengkap

18. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan

    Hasil : Sarung tangan steril telah dipakai

19. Setelah kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lakukan penyokongan dengan melindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering, kemudian letakkan tangan yang lain pada kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut untuk mencegah terjadinya gerakan defleksi maksimal

    Hasil : Telah dilakukan penyokongan dan kepala bayi telah lahir

20. Memeriksa adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Hasil : Tidak terjadi lilitan tali pusat

21. Tunggu kepala sampai melakukan putaran paksi luar secara spontan

    Hasil : Kepala telah melakukan putaran paksi luar secara spontan

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar secara spontan, lakukan peregangan secara biparietal, dengan menempatkan kedua tangan pada sisi muka bayi. Anjurkan ibu meneran pada kontraksi berikutnya, dengan lembut tarik bayi kebawah untuk melahirkan bahu depan, kemudian tarik keatas untuk melahirkan bahu belakang

    Hasil : Peregangan biparietal telah dilakukan, dan kedua bahu telah lahir

23. Setelah kedua bahu bayi lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas

    Hasil : Lengan bayi telah lahir

24. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut kepunggung, bokong, tungkai dan kaki serta pegang masing-masing kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya

    Hasil : Telah dilakukan, dan bayi lahir spontan tanggal 31 Januari 2020 pukul 14.45 Wita dengan jenis kelamin laki-laki

25. Lakukan penilaian sepintas, dengan menilai apakah bayi menangis kuat, bernafas tanpa kesulitan, bayi bergerak aktif dan bagaimana warna kulitnya

    Hasil : Bayi lahir segera menangis, bernafas tanpa kesulitan dan bergerak aktif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

26. Bersihkan dan keringkan bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks caseosa. Ganti handuk yang basah dengan handuk kering dan biarkan bayi di atas perut ibu

    Hasil : Bayi telah dibersihkan dan dikeringkan.

KALA III

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah
2. Ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya
3. Ibu merasakan adanya pengeluaran darah
4. Ibu merasa sedikit pusing

DATA OBJEKTIF (O)

1. Bayi lahir spontan segera menangis tanggal 31 Januari 2020 pukul 14.45 Wita, dengan jenis kelamin laki-laki, BBL : 2.700 gram, PBL : 48 cm, A/S = 8/10
2. Kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras
3. Tinggi fundus uteri setinggi pusat
4. Plasenta belum lahir
5. Kandung kemih ibu kosong

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ASSESMENT (A)

Perlangsungan kala III

PLANNING (P)

Tanggal 31 Januari 2020

1. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus

   Hasil : Ibu hamil tungal
2. Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntikkan oksitosin agar uterus berkontraksi baik

   Hasil : Ibu telah diberitahu dan ibu bersedia di suntik
3. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 IU IM di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin)

   Hasil : oksitosin telah disuntikkan
4. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusat bayi dengan mendorong tali pusat kearah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama

   Hasil : Tali pusat telah dijepit
5. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut

   Hasil : Tali pusat telah digunting
6. Lakukan penjepitan tali pusat dengan penjepit tali pusat

   Hasil : Tali pusat telah dijepit

7. Letakkan bayi secara tengkurap di dada ibu agar ada kontak kulit ibu dengan bayi. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada/perut ibu. Usahakan kepala bayi berada diantara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari putting payudara ibu

   Hasil : Telah dilakukan

8. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan bersih lalu pasang topi dikepala bayi

   Hasil : Bayi dan ibu telah di selimuti dengan kain hangat dan bayi telah di pasangkan topi

9. Pindahkan klem pada taali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva

   Hasil : Klem telah di pindahkan

10. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat

    Hasil : Telah dilakukan

11. Setelah uterus berkontraksi, regangkan tali pusat kearah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus kearah belakang-atas (dorso cranial) secara hati-hati (untuk mencegah iversion uteri). Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur

    Hasil : Telah dilakukan dorongan dorso cranial

12. Melakukan pegangan dan dorongan dorso cranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso cranial)

Hasil : Telah dilakukan

13. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah jarum jam untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban

    Hasil : Plasenta telah lahir 10 menit setelah bayi lahir pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 14.55 Wita

14. Segera setelah plasenta lahir, lakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

    Hasil : Telah dilakukan masase uterus

15. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukkan kedalam kantong plastik yang bersedia

    Hasil : Plasenta lahir lengkap dengan kotiledon dan selaput ketubannya

16. Mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila ada laserasi yang menyebabkan perdarahan

    Hasil : terdapat robekan pada jalan lahir

17. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Hasil : Telah dilakukan dan uterus berkontraksi dengan baik teraba bundar dan keras

18. Biarkan bayi melakukan kontak kulit dengan ibu paling sedikit 1 jam

    Hasil : Telah dilakukan dengan membiarkan bayi melakukan kontak kulit selama 1 jam

19. Setelah 1 jam, lakukan penimbangan/pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg secara intramuskuler (IM) di paha kiri anterolateral

    Hasil : Bayi telah diberi tetes mata/salep mata antibiotic profilaksisi, dan telah di suntikkan vitamin K secara intramusculer di paha kiri anterolateral

    Hasil Timbangan/pengukuran

    BBL = 2.700 gram PBL = 48 cm

    LK = 32 cm LD = 31 cm

    LP = 30 cm

20. Setelah 1 jam pemberian suntikkan vitamin K, lakukan penyuntikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan antero lateral secara intramuscular

    Hasil : telah dilakukan penyuntikkan hepatitis B di paha kanan anterolateral

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KALA IV

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan nyeri pada perut bagian bawah
2. Ibu merasa lelah dan lapar setelah melahirkan
3. Ibu merasa pusing

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

   Tekanan Darah : 130/90 mmHg

   Nadi : 88x/menit

   Pernapasan : 22x/menit

   Suhu : 36,8°C
4. Plasenta dan selaput ketuban telah lahir lengkap
5. Ibu tampak kelelahan setelah proses persalinan
6. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras
7. Tinggi fundus uteri setinggi pusat
8. Terdapat robekan jalah lahir dan jumlah perdarahan ± 250 cc

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ASSESMENT (A)

KALA IV

PLANNING (P)

Tanggal 31 Januari 2020

1. Lanjutkan pemantauan kontraksi dan pencegahan perdarahan pervaginam

   Hasil : kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras

2. Mengajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi

   Hasil : telah dilakukan dan ibu mengerti yang diajarkan

3. Mengevaluasi dan mengstimulasi jumlah kehilangan darah setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan, dan setiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinank

   Hasil : Jumlah perdarahan adalah ± 250 cc

4. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ibu (kecuali pernapasan), tinggi fundus uteri, kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam ke 2 pasca persalinan

   Hasil :

No	Jam (wita)	TD (mmhg)	Nadi (x/menit)	Suhu	Tinggi Fundus	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1	15.10	130/90	84x/i	36,8°C	STP	Baik	Kosong	50 cc
	15.25	130/90	86x/i		STP	Baik	Kosong	50 cc
	15.40	130/90	86x/i		STP	Baik	Kosong	50 cc
	15.55	130/90	82x/i		STP	Baik	Kosong	40 cc
2	16.25	130/90	84x/i	36,7°C	STP	Baik	Kosong	30 cc
	16.55	130/90	82x/i		STP	Baik	Kosong	30 cc

5. Periksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik (40-60x/menit) serta suhu tubuh normal yaitu (36,5°C-37,5°C)

   Hasil : Telah dilakukan pemeriksaan dan bayi bernafas normal dengan pernapasan 48x/menit dan suhu tubuh normal yaitu 36,7°C

6. Tempatkan semua peralatan bekas pakai kedalam larutan clorin 0,5% untuk didekontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas setelah didekontaminasi

   Hasil : Telah dilakukan dan peralatan telah direndam dilarutan clorin untuk didekontaminasi

7. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi kedalam tempat sampah yang sesuai

   Hasil : Telah dilakukan

8. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah, dan bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering

   Hasil : Ibu telah dibersihkan dan ibu telah memakai pakaian bersih dan kering

9. Pastikan ibu merasa aman dan nyaman. Bantu ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya, dan anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan

   Hasil : Ibu telah merasa nyaman, ibu telah menyusui bayinya, dan ibu telah makan daan minum dibantu oleh keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

10. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan clorin 0,5 %

    Hasil : Telah dilakukan

11. Dekontaminasi sarung tangan kotor kedalam larutan clorin 0,5 % dan buka secara terbalik dengan bagian dalam ke luar, lalu rendam dalam larutan clorin 0,5 % selama 10 menit

    Hasil : Telah dilakukan

12. Cuci kedua tangan dengan sabun di bawah air mengalir dengan menggunakan teknik cuci tangan 7 langkah

    Hasil : Telah dilakukan dan tangan telah dicuci

13. Lengkapi partograf (halaman depan dan belakang)

    Hasil : Partograf telah dilengkapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PADA NY "I" DENGAN HIPERTENSI DI PUSKESMAS BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA TANGGAL 31 JANUARI 2020

No. Register	: 19xxx	
Tanggal Partus	: 31 Januari 2020	Pukul 14:45 Wita
Tanggal Masuk Ruang Nifas	: 31 Januari 2020	Pukul 17:00 Wita
Tanggal Pengkajian	: 31 Januari 2020	Pukul 18:00 Wita
Nama Pengkaji	: Rika	

IDENTITAS ISTRI/SUAMI

Nama	: Ny "I"/Tn "A"
Umur	: 36 tahun/38 tahun
Nikah/lamanya	: 1x/±8 tahun
Suku	: Makassar /Makassar
Agama	: Islam/Islam
Pendidikan	: SMA/S1
Pekerjaan	: IRT/Guru
Alamat	: B

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ini merupakan persalinan kedua dan tidak pernah keguguran
2. Ibu mengatakan sedikit pusing.
3. Ibu melahirkan spontan pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 14.45 Wita dengan JK : Laki-laki, BBL : 2.700 gram, PBL : 48 cm, A/S : 8/10
4. Ibu merasa lelah setelah melahirkan
5. Ibu merasa sedikit nyeri pada jalan lahir
6. ASI sudah keluar tapi masih sangat sedikit
7. Ibu sudah BAK namun belum BAB

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital

   Tekanan Darah : 130/90 mmHg

   Nadi : 82x/menit

   Pernapasan : 22x/menit

   Suhu : 36,9°C

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ASSESMENT (A)

P2A0, post partum hari pertama dengan hipertensi

PLANNING (P)

Tanggal 31 Januari 2020

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa tekanan darah ibu sudah kembali normal

   Hasil : ibu mengerti
2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga

   Hasil : ibu merasa tenang dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Menjelaskan pada ibu cara mengetahui baik tidaknya kontraksi uterus

   Hasil : Ibu mengerti bahwa kontraksi baik apabila perut teraba keras dan bundar
4. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochea setiap hari

   Hasil : TFU 1 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik (teraba bundar dan keras)dan pengeluaran lochea rubra
5. Menganjurkan ibu untuk selalu mengganti pembalut minimal 3 kali sehari atau saat lembab untuk menghindari infeksi

   Hasil : Ibu mengerti dan akan rutin mengganti pembalutnya
6. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (*personal hygiene*) yaitu : Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan sampo, dan sikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

   Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

7. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

   Hasil : Ibu miring kanan dan kiri di atas tempat tidurnya dan sudah bisa jalan kekamar mandi untuk berkemih

8. Memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya istirahat yang cukup

   Hasil : Ibu mengerti dan akan melakukan anjuran yang diberikan

9. Menganjurkan ibu untuk diet seimbang dengan makan makanan yang tinggi protein, rendah lemak dan diet garam dan juga mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti : nasi, gandum, jagung dan umbi-umbian, makanan yang tidak perlu dikurangi pada saat hamil seperti banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, tahu, tempe dan banyak minum air putih untuk kesehatan ibu.

   Hasil : Ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang diberikan

10. Menganjurkan ibu cara menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (*on demand*) secara bergantian pada payudara kiri dan kanan

    Hasil : Ibu menyusui sesering mungkin dan segera setiap bayinya lapar.

11. Mengajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar, posisi menyusui serta cara perawatan payudara yang baik dan benar. Memberitahu ibu sebelum menyusui, lakukan masase dan bersihkan areola dengan air susu ibu (ASI) setelah itu barulah bayi disusui

    Hasil : Ibu mengerti

12. Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

rahim masih terbuka makan akan beresiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup diluar bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

13. Memberikan konseling tentang KB yang tidak mengganggu produksi ASI

    Hasil : Ibu mengerti dan akan mendiskusikannya dengan suami

14. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi obat yaitu

    Asam Mafenamat (3x1)

    Vitamin C (3x1)

    B.Complex (3x1)

    Hasil : Ibu mengerti dan mau meminum obat yang telah diberikan

15. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT.

    Hasil : Ibu mengerti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL PADA NY "I" DENGAN POST PARTUM HARI KE-2 DI PUSKESMAS BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA

TANGGAL 01 JANUARI 2020

No. Register	: 19xxx	
Tanggal Partus	: 31 Januari 2020	Pukul 14:45 Wita
Tanggal Masuk Ruang Nifas	: 31 Januari 2020	Pukul 17:00 Wita
Tanggal Pengkajian	: 01 Januari 2020`	Pukul 09.30 Wita
Nama Pengkaji	: Rika	

IDENTITAS ISTRI/SUAMI

Nama	: Ny "I"/Tn "A"
Umur	: 36 tahun/38 tahun
Nikah/lamanya	: 1x/±8 tahun
Suku	: Makassar /Makassar
Agama	: Islam/Islam
Pendidikan	: SMA/S1
Pekerjaan	: IRT/Guru
Alamat	: B

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan sudah tidak merasa pusing lagi
2. Ibu mengatakan kepalanya sudah tidak sakit lagi
3. Ibu mengatakan sudah tidak cemas dengan keadaanya
4. Ibu mengatakan teratur meminum obatnya
5. ASI ibu sudah keluar tapi masih sedikit
6. Ibu sudah BAB
7. Ibu mengatakan rasa nyeri sudah tidak terlalu terasa

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

   Tekanan Darah : 110/80 mmHg

   Nadi : 84x/menit

   Pernapasan : 22x/menit

   Suhu : 36,7°C
4. Putting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan, massa dan benjolan serta pada saat putting susu dipencet terdapat pengeluaran ASI KOLOSTRUM
5. Tidak ada nyeri tekan, kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU 2 jari dibawah pusat, kandung kemih kosong.
6. Tampak pengeluaran lochea rubra

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ASSESMENT (A)

P2A0, Post partum hari kedua

PLANNING (P)

Tanggal 01 Januari 2020

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

   Hasil : ibu merasa tenang dengan kondisinya
2. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus dan pengeluaran lochea

   Hasil : TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras,dan pengeluaran lochea rubra tidak berbau
3. Menganjurkan ibu mencuci daerah vulva (dari arah depan ke belakang) hingga bersih setiap selesai BAK dan BAB

   Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya
4. Menganjurkan ibu untuk selalu mengganti pembalut minimal 3 kali sehari atau saat lembab untuk menghindari infeksi

   Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya
5. Menganjurkan ibu menjaga kebersihan dirinya (*personal hygiene*) yaitu mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan sampo, dan sikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

   Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya istirahat yang cukup

   Hasil : ibu mengerti dan akan melakukan anjuran yang diberikan

7. Mengajarkan ibu teknik menyusui yang dan benar. Memberitahu ibu sebelum menyusui, lakukan masase dan bersihkan areola dengan air susu ibu setelah itu baru bayi disusui

   Hasil : ibu mengerti

8. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara ekslusif minimal 6 bulan tanpa makanan tambahan selain ASI dan menjelaskan bahwa Allah Swt telah memerintahkan seorang ibu untuk menyusui bayinya selama 2 tahun sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah :233.

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Terjemahnya :

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada pada ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanyya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

9. Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas mulut rahim masih terbuka maka akan beresiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup diluar bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi

   Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan
10. Memberikan konseling tentang KB yang tidak menggangu produksi ASI

    Hasil : ibu mengerti dan masih mendiskusikannya dengan suami
11. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT.

    Hasil : ibu mengerti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN POSTNATAL CARE PADA NY "I" DENGAN POST PARTUM HARI KETIGA DI RUMAH PASIEN TANGGAL 02 JANUARI 2020

Tanggal Pengkajian : 02 Januari 2020 Pukul 10:30 Wita

Tempat : Rumah Pasien

Nama Pengkaji : Rika

IDENTITAS ISTRI/SUAMI

Nama : Ny "I"/Tn "A"

Umur : 36 tahun/38 tahun

Nikah/lamanya : 1x/±15 tahun

Suku : Makassar /Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/S1

Pekerjaan : IRT/Guru

Alamat : B

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan ASI sudah mulai agak banyak
2. Ibu mengatakan kondisinya sudah mulai fit
3. Ibu mengatakan masih ada pengeluaran darah pada jalan lahir
4. Ibu mengatakan bayinya aktif menyusui

5. Ibu telah BAB dan BAK

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

   Tekanan Darah : 110/80 mmHg

   Nadi : 82x/menit

   Pernapasan : 20x/menit

   Suhu : 36,7°C
4. Putting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan, massa dan benjolan serta pada saat putting susu dipencet terdapat pengeluaran ASI
5. Kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU 3 jari dibawah pusat.

ASSESMENT (A)

P2A0, post parum hari ketiga

PLANNING (P)

Tanggal 02 Januari 2020

1. Memberitahu kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik

   Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan
2. Mengobservasi uterus untuk memastikan involusio uterus berjalan dengan baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Hasil : TFU 3 jari dibawah pusat, involusio berjalan normal

3. Menganjurkan kepada ibu tetap melakukan mobilisasi dini, namun tetap menghindari pekerjaan berat

   Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya darah dari jalan lahir adalah lochea yang merupakan cairan rahim selama masa nifas dan mengalami perubahan warna pada waktu-waktu tertentu karena adanya proses involusi. Lochea yang keluar hari ketiga masih akan berwarna merah seperti yang terjadi pada ibu

   Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan sudah tidak khawatir

5. Memberikan Health Education (HE) kepada ibu tentang :

   a. Istirahat

      Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak mengerjakan sesuatu yang berat dan menganjurkan ibu untuk tidak banyak pikiran

   b. Gizi seimbang

      Menganjurkan ibu tetap menjaga pola makan agar tekanan darah tetap dalam batas normal.

   c. Personal Hygiene

      Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya yaitu mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan sampo, dan sikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Melakukan perawatan payudara untuk menjaga kebersihan payudara dan menghindari bendungan payudara
   a. Membersihkan putting terlebih dahulu
   b. Memakai baby oil untuk mempermudah pengurutan
   c. Melakukan pengurutan payudara
      1) Pengurutan yang pertama

         Licinkan kedua tangan dengan minyak atau baby oil ditempatkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara lakukan pengurutan, dimulai dari atas lalu arah sisi samping kiri kemudia kearah kanan, lakukan terus pengurutan kebawah atau melintang. Lalu kedua tangan dilepas dari payudara, ulangi gerakan 20-30 kali untuk setiap satu payudara.

      2) Pengurutan kedua

         Menyokong payudara kiri dengan tangan kiri, kemudia dua atau tida jari tangan kanan mulai dari pangkal payudara dan berakhir pada putting susu. Lakukan tahap mengurut payudara dengan sisi kelingking dari arah tepi kearah putting susu. Lakukan gerakan 20-30 kali

      3) Pengurutan ketiga

         Menyokong payudara dengan satu tangan, sedangkan tangan lain mengurut dan menggenggam dari pangkal menuju ke putting susu. Lakukan gerakan 20-30 kali

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

d. Mengompres payudara dimulai dari air hangat lalu kemudian dengan air dingin

Hasil : Perawatan payudara telah dilakukan, ibu mengerti dan dapat mempraktekannya sendiri

7. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal 6 bulan

   Hasil : Ibu mengerti dan bersedia menyusui bayinya

8. Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka maka akan beresiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup diluar bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi

   Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

9. Menanyakan ibu apakah sudah memilih alat kontrasepsi yang ingin digunakan

   Hasil : ibu masih memikirkan metode KB yang akan dia gunakan

10. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT

    Hasil : Ibu mengerti dan selalu berdoa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE PADA NY "I" DENGAN POST PARTUM HARI KE ENAM DI RUMAH PASIEN TANGGAL 05 FEBRUARI 2020

Tanggal Kunjungan : 05 Februari 2020 Pukul 09:30 Wita

Tempat : Rumah Pasien

Nama pengkaji : Rika

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan ASI banyak, lancar dan ibu rajin menyusui bayinya
2. Ibu mengatakan masih ada cairan yang keluar dari vagina berwarna merah kekuningan
3. Ibu mengatakan bayinya aktif menyusui
4. Ibu mengatakan sudah tidak merasakan sakit kepala
5. Ibu mengatakan kondisinya sudah fit

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

   Tekanan Darah : 120/80 mmHg

   Nadi : 84x/menit

   Pernapasan : 22x/menit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Suhu : 36,8°C

4. Putting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan massa dan benjolan serta pada saat putting susu dipencet terdapat pengeluaran ASI
5. Kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU pertengahan simpisis dan pusat
6. Tampak pengeluaran lochea sanguilenta

ASSESMENT (A)

P2A0, Post partum hari keenam

PLANNING (P)

Tanggal 05 Februari 2020

1. Memberitahu kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik

   Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan
2. Mengobservasi uterus untuk memastikan involusio uterus berjalan dengan baik

   Hasil : TFU pertengahan pusat-simfisis, involusi berjalan normal
3. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya cairan dari jalan lahir adalah lochea yang merupakan cairan rahim selama masa nifas dan mengalami perubahan warna pada waktu-waktu tertentu karena adanya proses involusi. Lochea yang keluar pada hari keenam akan berwarna merah kekuningan yang merupakan cairan berupa darah bercampur lendir disebut dengan lochea sanguilenta seperti yang terjadi pada ibu

   Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

4. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap melakukan mobilisasi dini, namun tetap menghindari pekerjaan berat

   Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukan yang diberikan

5. Memberikan *Health Educatian* (HE) pada ibu tentang :

   a. Istirahat

      Menganjurkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan yang berat

   b. Gizi Seimbang

      Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, roti) protein (ikan, telur, tahu, tempe, daging) vitamin (buah dan sayur)

   c. Personal *Hygiene*

      Menganjurkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan dirinya yaitu mandi 2 kali sehari, keramas 2 kali semiggu, sikat gigi 3 kali sehari dan menganjurkan ibu untuk mencuci daerah vulva (dari arah depan ke belakang) hingga bersih setiap selesai BAK dan BAB

      Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal selama 6 bulan

   Hasil: Ibu mengerti dan bersedia menyusui bayinya

7. Menjelaskan dan menganjurkan pada ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka maka akan beresiko karena mengakibatkan kuman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

dan bakteri yang hidup diluar bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

8. Menanyakan ibu apakah sudah memilih alat kontrasepsi yang ingin digunakan.

   Hasil : Ibu mengatakan ingin memakai kb suntik 3 bulan

9. Menganjurkan ibu untuk tetap berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT

   Hasil : Ibu mengerti dan sering berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE PADA NY "I" DENGAN POST PARTUM HARI KE-14 DI RUMAH PASIEN TANGGAL 13 FEBRUARI 2020

Tanggal Kunjungan : 13 Februari 2020 Pukul 15.40 Wita

Tempat : Rumah Pasien

Nama pengkaji : Rika

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan ASI banyak, lancar dan ibu rajin menyusui bayinya
2. Ibu mengatakan masih ada cairan yang keluar dari vagina berwarna kuning kecoklatan
3. Ibu mengatakan bayinya aktif menyusui
4. Ibu mengatakan kondisnya sudah fit

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

   Tekanan Darah : 120/80 mmHg

   Nadi : 82x/menit

   Pernapasan : 24x/menit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Suhu : 36,6°C

4. Payudara banyak mengeluarkan ASI
5. TFU tidak teraba
6. Tampak pengeluaran lochea serosa

ASSESMENT (A)

P2A0, Post partum hari keempat belas

PLANNING (P)

Tanggal 13 Februari 2020

1. Memberitahu kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik

   Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan
2. Mengobservasi uterus untuk memastikan involusio uterus berjalan dengan baik

   Hasil : TFU pertengahan pusat-simfisis, involusi berjalan normal
3. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya cairan dari jalan lahir adalah lochea yang merupakan cairan rahim selama masa nifas dan mengalami perubahan warna pada waktu-waktu tertentu karena adanya proses involusi. Lochea yang keluar pada hari keempat belas berwarna kecoklatan yang merupakan cairan berupa sedikit darah dan banyak serum

   Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan
4. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap melakukan mobilisasi dini, namun tetap menghindari pekerjaan berat

   Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan yang diberikan

5. Memberikan *Health Educatian* (HE) pada ibu tentang :
   a. Istirahat
   b. Menganjurkan kepada ibu untuk istrahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan yang berat
   c. Gizi Seimbang

      Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, roti) protein (ikan, telur, tahu, tempe, daging) vitamin (buah dan sayur)
   d. Personal *Hygiene*

      Menganjurkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan dirinya yaitu mandi 2 kali sehari, keramas 2 kali semiggu, sikat gigi 3 kali sehari dan menganjurkan ibu untuk mencuci daerah vulva (dari arah depan ke belakang) hingga bersih setiap selesai BAK dan BAB

      Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya
6. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal selama 6 bulan

   Hasil: ibu mengerti dan bersedia menyusui bayinya
7. Menjelaskan dan menganjurkan pada ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka maka akan beresiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup diluar bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi

   Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

8. Menganjurkan ibu untuk tetap berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT

   Hasil : ibu mengerti dan sering berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE PADA NY "I" DENGAN POST PARTUM HARI KE-42 DI RUMAH PASIEN TANGGAL 12 MARET 2020

Tanggal Kunjungan : 12 Maret 2020 Pukul 13:00 Wita

Tempat : Rumah Pasien

Nama pengkaji : Rika

DATA SUBJEKTIF (S)

1 Ibu mengatakan tidak ada keluhan yang dialami sekarang

2 Ibu sudah memebawa bayinya imunisasi pada tanggal 2 Maret 2020 di puskesmas bontomarannu

3 Ibu mengatakan Kb yang yang dipakai tidak ada masalah dan tidak ada keluhan

4 Ibu peneluaran darah yang berwarna kunin dari jalan lahir

5 Ibu sudah aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

   Tekanan Darah : 120/80 mmHg

   Nadi : 82x/menit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Pernapasan : 24x/menit

Suhu : 36,6°C

4. Payudara banyak mengeluarkan ASI
5. TFU tidak teraba
6. Tampak pengeluaran lochea alba

ASSESMENT (A)

P2A0, Post partum hari ke 42 hari

PLANNING (P)

Tanggal 12 Maret 2020

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu,bahwa ibu dalam kondisi baik

   Hasil : ibu merasa senang terhadap pemeriksaan yang dilakukan

2. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya dan bayinya

   Hasil : ibu bersedia melakukan

3. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal selama 6 bulan

   Hasil: ibu mengerti dan bersedia menyusui bayinya

4. Menganjurkan ibu untuk datang ke puskesmas apabila sudah waktunya untuk mengganti KB yang digunakan, atau apabila ibu mengalami keluhan terhadap KB yang digunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Hasil : ibu bersedia dating kembali ke puskesmas bontomarannu sesuai anjuran yang diberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tabel 1.1 Pemantauan pada kasus Ny''I'' di Puskesmas Bontomarannu dan di Rumah pasien

No	Tanggal kunjungan	Hasil pemeriksaan TTV	Keluhan	Keterangan
1.	**Kunjungan I** Tanggal 15-01-2020 Pukul 09.00 Wita	TD:150/100 mmhg N: 88/ menit S: 36,9°C P: 22x/ menit Protein urin :(-)	Sakit kepala di sertai dengan rasa pusing sejak 2 hari yang lalu	Istirahat yang cukup dan rutin mengkonsumsi obat Nefedifin 10 mg (2x1)
2.	**Kunjungan II**Tanggal 23-01-2020 Pukul 09.30 Wita	TD:140/90 mmhg N: 84x/menit P: 22x/menit S: 36,9°C	Sakit kepala dan masih merasakan sedikit pusing	Istirahat yang cukup dan rutin mengkonsumsi obat Nefedifin 10 mg (2x1)
3	**Kunjungan III** Tanggal 31-02-2020 Pukul 10.20 Wita	TD:140/90 mmhg N: 82x/menit P: 22x/menit S: 36,7°C Protein urin: (-)	Ibu mengatakan adanya pengeluaran lendir dan darah dan ibu mengatakan sedikit pusing	Istirahat yang cukup dan rutin mengkonsumsi obat Nefedifin 10 mg (2x1)
4	**Kunjungan IV** Tanggal 31-02-2020 Pukul 18.00 Wita	TD:130/90 mmhg N: 82x/menit P: 22x/menit S: 36,9°C	Ibu mengatakan sedikit pusing.dan ibu mengatakan ASI sudah keluar tapi masih sedikit	Istirahat yang cukup dan TFU ibu 1 jrbpst
5	**Kunjungan V** Tanggal 01-02-2020 Pukul 09.30 Wita	TD:110/80 mmhg N: 84x/menit P: 22x/menit S: 36,7°C	Ibu mengatakan sudah tidak pusing lagi	Istirahat yang cukup dan TFU ibu 2 jrbpst
6	**Kunjungan VI** Tanggal 02-02-2020 Pukul 10.30 Wita	TD:110/80 mmhg N: 82x/menit P: 20x/menit S: 36,7°C	Ibu mengatakan Asi sudah mulai banyak dan kondisi ibu sudah mulai fit	Istirahat yang cukup dan TFU ibu 3 jrbpst
7	**Kunjungan VII**	TD:120/80 mmhg	Ibu mengatakan sudah tidak	Istirahat yang cukup dan TFU pertengahan

	Tanggal 05-02-2020 Pukul 09.30 Wita	N: 84x/menit P: 22x/menit S: 36,8°C	merasakan sakit kepala dan ibu mengatakan ASI banyak dan rajin menyusui bayinya	pusat.
8	**Kunjungan VIII** Tanggal 13-02-2020 Pukul 15.40 Wita	TD:120/80 mmhg N:82x/menit P:24x/menit S: 36,6°C	Ibu mengatakan kondisinya sudah fit dan bayinya aktif menyusui	Istirahat yang cukup dan TFU Tidak Teraba
9	**Kunjungan IX** Tanggal 12-03-2020 Pukul 13.00 Wita	TD:120/80 mmhg N:82x/menit P:24x/menit S: 36,6°C	Tidak ada keluhan	Istirahat yang cukup dan TFU Tidak Teraba

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang asuhan kebidanan antenatal pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020. Asuhan ini dilakukan selama ± 8 minggu yang dimulai saat pasien masuk di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa sampai kunjungan di rumah pasien.

Dalam hal ini pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan 7 langkah Varney yaitu : pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

A. LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengaevaluasi klien, riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium. Pada langkah ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Pada langkah ini, bidan mengumpulkan data dasar awal secara lengkap (Betty mengkuji dkk, 2014:5).

Kegiatan pengumpulan data dimulai saat klien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan kebidanan berlangsung. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat memberikan informasi paling akurat yang dapat diperoleh secepat mungkin dan upaya sekecil mungkin. Pasien adalah sumber informasi yang paling akurat dan ekonomis yang disebut dengan sumber data primer. Sumber data alternatif atau sumber data sekunder adalah data yang sudah ada. Praktikkan kesehatan lain dan anggota keluarga (Dwi Asri, 2012:27-28).

Ny "I" usia 36 tahun, G2P1A0, datang ke Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa pada tanggal 15 Januari 2020 Pukul 09.00 Wita dengan keluhan sakit kepala disertai pusing sejak tanggal 12 Januari 2020 , pasien mengatakan selama hamil pergerakan janinnya kuat dan bergerak pada bagian sebelah kanan perut ibu, pasien mengatakan telah melakukan kunjungan *Antenatal Care* sebanyak 4 kali di Puskesmas Bontomarannu, pasien mengatakan hari pertama haid terakhir 02 Mei 2019, pasien mengatakan usia kehamilannya ± 8 bulan, pasien mengatakan selama hamil ia tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat.`

Pasien mengatakan tidak pernah mengalami trauma/penyulit selama kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu. Pasien tidak pernah memiliki riwayat penyakit seperti Hipertensi, Asma, Jantung, Diabetes Mellitus dan penyakit menular lainnya. Pasien tidak memiliki riwayat mengkonsumsi obat-obatan selama hamil tanpa resep bidan atau dokter.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

pasien mengatakan pernah menggunakan alat kontrasepsi berupa suntik 3 bulan dimulai dari anak pertama dan pasien berhenti ber KB karena ingin hamil lagi, pasien tidak pernah mengalami penyakit yang serius dan tidak pernah di rawat di Rumah Sakit atau Puskesmas, selama hamil pola makan pasien kurang baik, di mana pasien sering mengkonsumsi makanan yang tinggi garam dan lemak, istirahat pasien kurang baik dikarenakan terlalu sibuk dengan pekerjaannya.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran komposmentis, keadaan umum ibu lemas, Tekanan Darah: 150/100 mmHg, N: 88 x/menit, S: 36,9˚C, P:22x/menit. Tidak ada benjolan di sekitar kepala dan tidak ada nyeri tekan,kulit dan rambut bersih, tidak rontok. Wajah ibu tampak lemas,kedua konjungtiva mata merah muda dan sklera putih, tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid dan vena jugularis, payudara tampak simetris, puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi aerola mammae

Hasil usia kehamilan dilihat dengan menggunakan rumus *naegel*, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 36 minggu 1 hari (Prawirohardjo, 2014 : 279).

Pada pemeriksaan abdomen tampak linia nigra dan striae alba yang menandakan kehamilan lebih dari satu dan otot perut sudah kendor, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat dipalpasi merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan (Prawirohardjo, 2014 : 179)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Pada pemeriksaan leopold untuk menentukan tinggi fundus uteri dilakukan pada uterus tidak sedang berkontraksi, dengan posisi ibu setengah duduk, lalu mulai melakukan pengukuran dengan menempelkan ujung pita dari tepi atas simfisis pubis dan puncak fundus uteri, hal tersebut dilakukan untuk menilai tinggi fundus uteri apakah tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan atau tidak, dan untuk menentukan presentasi janin dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk, ukuran dan kepadatan bagian tersebut, jika dalam perabaan pada fundus uteri bulat, keras dan melenting maka dapat dilakukan sebagai presentasi bokong karena kepala janin berada pada bagian fundus, atau jika pada bagian uteri teraba lunak, kurang melenting, dapat dikatakan presentasi kepala (Ai Nursiah, dkk, 2014:75-76).

Untuk menilai penurunan kepala janin dilakukan dengan menghitung proporsi bagian terbawah janin yang masih berada di atas dan dapat diukur dengan lima jari tangan (per limaan), bagian di atas simfisis adalah proporsi yang belum masuk pintu atas panggul (PAP) dan sisanya telah memasuki pintu atas panggul (PAP) (Widia,2015:64).

Di dalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu (Baety, 2012:10-12).

Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ) merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014:285).

Hipertensi gestasional yaitu hipertensi yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu dan kembali normal setelah kehamilan (Andrei Brateanu, 2019)

Faktor yang mempengaruhi hipertensi gestasional yaitu kebanyakan dipengaruhi oleh pola makan yang kurang baik dikonsumsi oleh ibu hamil seperti yang mengandung lemak berlebihan, konsumsi makanan yang mengandung garam atau natrium yang berlebihan kedalam masakan.Kebiasaan makan-makanan berlemak dan bergaram sering dihubungkan dengan tekanan darah karena konsumsi lemak berlebih dapat memicu aterosklerosisi yang merupakan faktor penyebab terjadinya hipertensi sedangkan konsumsi garam berlebih dapat meningkatkan timbunan cairan dalam darah (diuretik) yang menyebabkan sirkulasi darah terganggu sehingga jantung akan bekerja lebih kuat dan akhirnya tekanan darah seseorang akan tinggi. (Pesta Corry Sihotang, dkk, 2016:72)

Peningkatan tekanan darah cenderung terjadi pada orang-orang yang kurang tidur. Karena, jika kurang tidur hormon stress pada tubuh akan meningkat dan juga terjadi peningkatan peradangan. Faktor lama tidur tidak saja menjadi penyebab adanya hubungan dengan tekanan darah, tetapi bisa juga ada faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan tekanan darah yaitu faktor yang tidak dapat dimodifikasi seperti umur, jenis kelamin, dan genetik (Pesta Corry Sihotang, dkk, 2016:73).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan pada kunjungan rumah tanggal 23 Januari 2020 dengan kasus hipertensi gestasional pada Ny "I" didapatkan data subjektif ibu masih merasakan sedikit sakit kepala dan pusing, ibu mengatakan ini kehamilan yang kedua dan tidak pernah keguguran sebelumnya, ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat, ibu mengatakan sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi sesuai anjuran yang telah diberikan, ibu mengatakan tidak melakukan aktivitas yang berat lagi.

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada hipertensi gestasional. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

B. LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA MASALAH AKTUAL

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosis atau masalah. Diagnosis yang dirumuskan adalah diagnosis dalam lingkup praktik kebidanan yang tergolong pada nomenklatur standar diagnosis, sedangkan perihal yang berkaitan dengan pengalaman klien ditemukan hasil pengkajian (Betty Mengkuji dkk, 2014:5)

Hasil pengkajian data subjektif dan objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosis hipertensi dalam kehamilan di mana pasien datang tanggal 15 Januari 2020 Pukul 09.00 Wita, dengan keluhan sakit kepala yang disertai dengan rasa pusing. Kehamilan ibu adalah kehamilan yang kedua dan tidak pernah keguguran sebelumnya, ibu mengatakan usia kehamilannya sekarang ± 8 bulan.

Riwayat kesehatan yang lalu Ny"I" tidak pernah mengalami penyakit yang serius yang dirawat di rumah sakit ataupun puskesmas. Pemeriksaan abdomen didapatkan yaitu tinggi fundus uteri (TFU) 3 jari di atas pusat, 30 cm, teraba bokong, sesuai dengan usia kehamilan 36 minggu 1 hari, punggung kiri, presentasi kepala. Situs memanjang bergerak atas panggul (BAP), terdengar DJJ dengan frekuensi 140 x/menit, janin intrauterin, tunggal dan hidup. Pada pemeriksaan laboratorium, didapatkan Hb 12,5 gr%, albumin negatif, reduksi negatif.

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa hipertensi gestasional didefinisikan sebagai kenaikan tekanan darah yang melebihi batas normal yaitu sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan darah diastolic ≥ 90 mmHg. Umumnya pasien hipertensi akan mengeluh sakit kepala yang disertai dengan rasa pusing. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan pada neurologik yang disebebkan oleh *hiperperfusi* pada otak (Prawirohardjo, 2014:532)

Pada pemeriksaan Leopold untuk menentukan tinggi fundus uteri dilakukan pada uterus tidak sedang berkontraksi, dengan posisi ibu berbaring dan kaki sedikit ditekuk, lalu mulai melakukan pengukuran dengan menempelkan ujung pita dari tepi atas simfisis pubis dan puncak fundus uteri, hal tersebut dilakukan untuk menilai tinggi fundus uteri apakah tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan atau tidak dan untuk menentukan presentase janin dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk, ukuran dan kepadatan bagian tersebut, jika dalam perabaan pada fundus uteri bulat, keras dan melenting maka dapat dilakukan sebagai presentasi bokong karena kepala janin berada pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

bagian fundus, atau jika pada bagian fundus uteri teraba lunak, kurang melenting, dapat dikatakan presentasi kepala (Ai Nursiah, dkk, 2014:75-76)

Untuk menilai penurunan kepala janin dilakukan dengan menghitung proporsi bagian terbawah janin yang masih berada diatas simfisis dan dapat diukur dengan lima jari tangan (per limaan), bagian di atas simfisis adalah proporsi yang belum masuk pintu atas panggul (PAP) dan sisanya telah memasuki pintu atas panggul PAP (Widia, 2015:64).

Di dalam kehamilan, janin dikatakan jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung. Sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas,kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu (Baety, 2012:10-11).

Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ) merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160x/menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014:285)

Berdasarkan uraian di atas maka diagnosis pada kasus hipertensi gestasional tersebut adalah G2P1A0, gestasi 36 minggu 1 hari, presentasi kepala, situs memanjang, bergerak atas panggul (BAP), intrauterin, tunggal, hidup dengan hipertensi dalam kehamilan. Demikian penerapan tinjauan pustaka pada kasusu Ny “I” secara garis besar tampak adanya persamaan antara teori dengan diagnosis aktual yang ditegakkan sehingga memudahkan tindakan selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

C. LANGKAH III. ANTISIPASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan diharapkan dapat waspada dan bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi (Frisca Tresnawati, 2012:3-4).

Langkah ini membutuhkan antisipasi bila kemungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi dan dilakukan asuhan yang aman. Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah didentifikasi.

Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman. Dalam mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dilakukan pengantisipasian penanganan yang kemungkinan muncul pada hipertensi gestasional yaitu preeklampsia ringan, pertumbuhan janin terhambat yang mengakibatkan kelahiran prematur,berkurangnya aliran darah ke plasenta,penyakit kardiovaskular dimasa depan,kebutaan dan plasenta absubsio (plasenta lepas seblum waktunya).

Preeklampsia ringan dapat terjadi apabila tekanan darah sistolik lebih dari 120 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg atau terjadi peningkatan tekanan darah sistolik hingga 30 mmHg atau peningkatan tekanan darah diastolik hingga 15 mmHg dari tekanan darah awal, dan disertai dengan adanya protein urin +1. Diagnosis preeklampsia ringan ditegakkan berdasarkan

atas timbulnya hipertensi yang disertai protein urin dan atau oedema setelah kehamilan 20 minggu (Prawirohardjo, 2014:543).

Preeklampsia dapat mempengaruhi sistem tubuh yang berbeda dan mempersulit kehamilan pada wanita yang sudah memiliki suatu kelainan patologi sebelumnya. Perubahan yang terjadi pada preeklampsia tampaknya disebabkan oleh gabungan kompleks antara abnormalitas genetik, faktor imunologi, dan faktor plasenta. Terjadinya implantasi plasenta yang normal mengharuskan sel tropoblas menginvasi desidua dan miometrium, memodifikasi dan memperbesar arteri spiralis uterus. Modifikasi ini melibatkan penghancuran dinding elastik pembuluh darah, yang menurunkan resistensi dan menjamin suplai darah yang baik ke plasenta dan janin.

Pada preeklampsia, terjadi invasi oleh sel tropoblas yaitu arteri spiralis mempertahankan tonusnya dan berdilatasi hanya 40% dari yang biasa terjadi pada hipoksia janin kronis. Hasilnya adalah berkurangnya perfusi plasenta dan terjadi hipoksia janin kronis. Akibat plasenta yang dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya penurunan kondisi pada janin dan pertumbuhan janin dapat terhambat (Judi Bothamley, 2013:193).

Penyakit hipertensi gestasional merupakan kelainan vaskuler yang terjadi sebelum kehamilan atau timbul dalam kehamilan atau pada permulaan persalinan hipertensi gestasional menjadi penyebab penting dari kelahiran mati dan kematian neonatal. Ibu dengan hipertensi akan menyebabkan terjadinya insufisiensi plasenta, hipoksia sehingga pertumbuhan janin terhambat dan sering terjadi kelahiran prematur. Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa terdapat hubungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

yang bermakna antara hipertensi gestasional dengan hasil luaran janin (Idawati,2012).

Pada kelainan sirkulasi uteroplasenta akibat dari perkembangan plasenta yang abnormal, pasokan oksigen, masukan nutrisi dan pengeluaran hasil metabolik menjadi abnormal. Janin menjadi kurang oksigen dan nutrisi pada trimester akhir sehingga timbul pertumbuhan janin terhambat yang asimetrik yaitu lingkar perut menjadi jauh lebih kecil dari pada lingkar kepala. Pada keadaan yang parah mungkin akan terjadi tingkat seluler berupa kelainan nukleus dan mitokondria. Pada keadaan hipoksia, produksi radikal bebas di plasenta menjadi sangat banyak dan antioksidan yang relative kurang. Penyebab pertumbuhan janin terhambat ialah faktor janin atau lingkungan uterus yang kronik seperti terjadinya diabetes dan hipertensi gestasional (Prawirahardjo, 2014:697)

Pada kasus Ny "I" penulis tidak menemukan tanda-tanda infeksi atau kelainan komplikasi pada ibu maupun janin yang mungkin akan terjadi pada hipertensi gestasional, karena penanganan yang dilakukan pada ibu yang hipertensi gestasional telah sesuai dengan teori sehingga tidak ada diagnosa potensial dan tidak ada kesenjangan antara teori dana kasus.

D. *LANGKAH IV. IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA ATAU KOLABORASI*

Pada langkah ini, yang dilakukan oleh bidan adalah mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi klien. Ada kemungkinan, data yang diperolah memerlukan tindakan yang harus segera

dilakukan oleh bidan, sementara kondisi yang lain masih bisa menunggu beberapa waktu lagi (Betty Mangkuji, 2014:6).

Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan yang terjadi dalam kondisi darurat. Kondisi darurat dapat terjadi pada saat mengelolaan ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir. Kondisi darurat merupakan kondisi yang membutuhkan tindakan dengan segera untuk menangani diagnosis maupun masalah darurat yang terjadi apabila tidak segera dilakukan tindakan segera, selain di atas juga berupa observasi/pemeriksaan.

Pada studi kasus Ny "I" tidak ada tindakan segera yang dilakukan karena dalam pemantauan dan pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan adanya setiap 1 jam, apakah gerakan janin teratur atau berkurang, setiap 1 jam, apakah gerakan janin teratur atau berkurang, setiap 1 jam, apakah gerakan janin teratur atau berkurang, setiap 1 jam, apakah gerakan janin teratur atau berkurang, setiap 1 jam, apakah gerakan janin teratur atau berkurang, protein pada urin. Tindakan segera atau kolaborasi akan segera dilakukan jika pasien telah mengalami sakit kepala secara terus-menerus dan pada pemeriksaan laboratorium terdapat urin ≥+2 dan tindakan segera juga akan dilakukan jika sudah ditemui tanda-tanda seperti kejang dan syok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

E. *LANGKAH V. RENCANA ASUHAN*

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang didentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Rencana asuhan

yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi-kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya, apakah dibutuhkan penyuluhan, konseling dan apakah perlu merujuk klien bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial-ekonomi, kultural atau masalah psikologis.

Bila diagnosis asuhan hipertensi gestasional ditegakkan, rencana asuhan yang diberikan adalah memberitahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan, melakukan pemantauan tanda-tanda vital ulang setiap 2 sampai 4 jam untuk mengetahui keadaan tekanan darah pada ibu, melakukan perencanaan pada ibu untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dan USG untuk memastikan tidak adanya protein urin dan juga untuk memastikan bahwa keadaan janin dalam kandungan ibu dalam keadaan baik, memberikan dukungan psikologis pada ibu, menjaga privasi dan kebersihan ibu.

Memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi dalam kehamilan dan cara mengatasi dan memantau preeklampsia ringan dan menganjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan bayinya Waktu menghitung gerakan dilakukan sekali dalam sehari Dihitung hingga 10 kali gerakan dengan sekurang-kurangnya 10 gerakan dalam 10 jam dan mengenali tanda-tanda terjadi preeklampsia ringan yaitu sakit kepala, rasa nyeri pada daerah perut, penglihatan kabut dan terdapat proteinurin.

Penatalaksanaan pada kasus hipertensi gestasional yaitu dilakukan secara konsisten dari sistemik menggunakan praktik pencegahan dengan memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

asuhan secara rutin selama 8 minggu sampai tekanan darah ibu berada dalam batas normal, setiap tindakan yang dilakukan dapat berupa asuhan yang terfokus seperti dengan penerapan asuhan sayang ibu yang dilakukan secara rutin selama pemantauan, termasuk menjelaskan kepada ibu dan keluarganya mengenai segala tindakan dan tujuan yang akan dilakukan dalam pemeriksaan.

Rencana asuhan pada kasus Ny "I" disusun berdasarkan teori dengan melihat kondisi dari kebutuhan pasien. Hasil pengkajian anamnesis, pemeriksaan fisik dan pada pasien Ny "I" datang dengan keluhan sakit kepala yang disertai rasa pusing. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran composmentis, keadaan umum ibu tampak lemas, TD:150/100 mmHg, N:88x/menit, S:36,9°C, P:22x/menit, ekspresi wajah ibu tampak cemas, tidak tenang dan tampak lesuh, kedua konjungtiva mata tidak anemis dan ikterik, tidak ada pembesaran pada kelenjar tyroid dan vena jugularis, payudara tampak simetris, tampak *hyperpigmentasiareola mammae.*

pemeriksaan abdomen didapatkan hasil yaitu : TFU 3 jari di bawah *Prosessus Xyphoideus* dan pusat 30 cm, teraba bokong pada fundus dan sesuai usia kehamilan 36 minggu 1 hari, punggung kiri, presentasi kepala, situs memanjang, bergerak atas panggul (BAP), pada auskultasi terdengar denyut jantung janin dengan frekuensi 140x/menit, intrauterin, tunggal da hidup, pada pemeriksaan penunjang didapatkan hasil laboratorium Hemoglobin 12,5 gr/dl, Albumin : (-) Negatif tidak terdapat protein dalam urin, Reduksi : (-) Negatif. Dari hasil pemeriksaan UltraSonografi didapatkan : tunggal, hidup, presentasi kepala, usia kehamilan 36-38 minggu, jk : laki-laki, TBJ : 2.700 gram.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Rencana tindakan yang telah disusun yaitu : menyapa ibu dan keluarga untuk meningkatkan rasa percaya sehingga ibu menjadi lebih koperatif dengan petugas, memberitahu hasil pemeriksaan ibu, menganjurkan keluarga untuk memberikan support dan semangat kepada ibu, memberikan HE tentang istirahat yang cukup, diet seimbang dan menjaga personal hygiene dalam kehamilan, minta persetujuan ibu dan keluarga untuk melakukan *inform consent,* laksanakan tindakan sesuai dengan penerapan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) hipertensi yang ada Puskesmas Bontomarannu dan memberikan terapi obat-obatan seperti Nefedifin(2x1).

Rencana tindakan pada kasus Ny "I" adalah melakukan pemantauan tekanan darah yang dilakukan selama 8 minggu yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2020 sampai tanggal 12 Maret 2020. Rencana asuhan yang diberikan yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada ibu untuk memastikan pertambahan/penurunan tekanan darah pada ibu, menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola makan dengan makan makanan yang bergizi dan sedikit mengkonsumsi natrium yang berupa garam, makanan yang berlemak, serta menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola tidur di mana ibu harus lebih banyak beristirahat dan tidak terlalu banyak pikiran atau stress, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi obat-obatan yang telah diberikan sesuai dengan intruksi dokter.

Rencana asuhan kebidanan yang telah disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial, hal ini menunjukkan tidak ada

kesenjangan antara teori dengan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus di lahan praktek.

F. *LANGKAH VI. PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN*

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh klien, atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan penatalaksanaanya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana) (Dwi Asri, dkk. 2012:31).

Pada studi kasus Ny "I" dengan hipertensi gestasional, semua tindakan yang direncanakan terlaksana dengan baik. Seperti dengan menyampaikan hasil pemeriksaan pada pasien dengan baik, memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya apabila ada hal yang tidak dia mengerti, memberikan dukungan moril kepada ibu dan keluarga untuk mengambil keputusan penting dalam setiap tindakan yang akan dilakukan seperti dengan pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan USG.

Penjelasan telah disampaikan, pasien dan keluarga mengerti dengan keadaannya, memberikan dukungan psikologis kepada ibu, memberikan pengetahuan kepada ibu tentang pentingnya Health Education selama kehamilan seperti pada pola istirahat yang cukup, pola makan yang seimbang /diet seimbang dalam kehamilan terutama dengan menghindari makanan yang tinggi kadar garam, lemak dan makanan yang banyak mengandung bahan pengawet, serta memberikan terapi obat-obatan pada ibu yang dapat menurunkan tekanan darah

berupa Nefedifin yang diminum sesuai dengan intruksi dokter yaitu diminum 2x dalam sehari.

Pemantauan selanjutnya yang dilakukan di Puskesmas Bontomarannu pada tanggal 15 Januari 2020, yaitu ibu merasakan sakit kepala disertai pusing, keadaan umum ibu baik, tampak cemas dengan keadaanya, pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil tekanan darah 150/100 mmHg, Nadi :, pernapasan :, dan suhu :. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil Hb=12,5 gr/dl, albumin negatif dan reduksi negatif. Pada pemeriksaan USG didapatkan hasil tunggal, hidup, presentasi kepala, usia kehamilan 36-38 minggu, jk : laki-laki, TBJ : 2.700 gram.

Tindakan yang dilakukan dalam rencana tindakan pada pemantauan tanggal 15 Januari 2020 yaitu dengan menjelaskan penyebab nyeri kepala yang disertai rasa pusing pada ibu, menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola makan dan istirahat serta tidak terlalu banyak pikiran, menganjurkan pada ibu untuk dapat mengenali tanda-tanda preklampsia yaitu sakit kepala, rasa nyeri di bagian perut, penglihatan kabur, terdapat protein urin, menganjurkan ibu untuk tetap rutin melakukan kunjungan *Antenatal Care* agar kesehatan ibu dan janinnya dapat dipantau dengan baik, memberikan kepada ibu obat penurun tekanan darah berupa Nefedipin 10 mg.

Pemantauan selanjutnya yaitu pemantauan yang dilakukan di rumah ibu pada tanggal 23 Januari 2020, pemantauan ini dilakukan dengan mengobservasi kembali tanda-tanda vital ibu untuk memastikan tekanan darah ibu bertambah/berkurang dan hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah yaitu

140/90 mmHg, ibu masih meraskan sakit kepala dan pusing, ibu mengatakan tidak teratur meminum obatnya. Setelah dilakukan pemeriksaan menganjurkan ibu untuk tetap mengatur pola makan dan pola istirahatnya agar tekanan darah ibu bisa kembali normal, serta mengingatkan kembali untuk teratur meminum obat yang diberikan sesuai dengan intruksi dokter.

Setelah dilakukan pemantauan selama 2 minggu ibu telah datang ke Puskesmas Bontomarannu pada tanggal 31 Januari 2020, Pukul 14.45 wita dengan nyeri perut tembus kebelakang disertai pengeluaran lendir dan darah, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pemantauan dari kala I sampai kala IV sampai lahirnya bayi dengan melihat dampak dari hipertensi yang terjadi selama proses persalinan.

Setelah persalinan selesai kemudian melakukan pemantauan pada ibu 2 jam pasca post partum hal yang dilakukan adalah mengobservasi tekanan darah ibu yaitu 130/90 mmHg, dan ibu merasakan sudah tidak sakit kepala, melakukan observasi tinggi fundus uteri, kontraksi uterus dan pengeluaran lochea. Memberikan *Health Education* pada ibu berupa istirahat yang cukup, diet seimbang dan personal hygiene, mobilisasi dini, dan memberikan obat penurun tekanan darah sesuai intruksi dokter yaitu Nefedifin 10 mg (1x1). Dan pada tanggal 1 Januari 2020 dilanjutkan pemantauan di Puskesmas Bontomarannu didapatkan hasil pemeriksaan tekanan darah ibu yang sudah normal yaitu 120/80 mmHg.

Menganjurkan ibu untuk tetap mengatur pola makan dan pola istirahatnya agar tekanan darah ibu tidak kembali tinggi. Kemudian dilanjutkan kunjungan ke

rumah ibu. Kunjungan di rumah ibu dilakukan sebanyak 5 kali dimulai tanggal 23 Januari 2020 sampai tanggal 12 Maret 2020.

Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena seluruh tindakan yang dilakukan sudah berorientasi pada kebutuhan klien.

G. *LANGKAH VII. EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN*

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan di mana pada tahap ini ditemukan kemajuan atau keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien. Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan, pada tahap ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplilkasi. Hasil anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan USG, diagnosa yang ditegakkan pada nyonya adalah hipertensi gestasional.

Rencana asuhan yang telah disusun berorientasi sesuai dengan kebutuhan pasien dan dilaksanakan secara menyeluruh. Adanya kerjasama antara pasien dengan petugas kesehatan sehingga tidak ditemukan hambatan pasa saat pelaksanaan asuhan.

Diet yang seimbang dan istirahat yang cukup merupakan penanganan sederhana yang dilakukan dalam kasus hipertensi gestasional, dimana pola makan yang tidak seimbang seperti tingginya mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak, banyak mengonsumsi garam dan juga banyak mengonsumsi makanan yang mengandung pengawet dapat mempengaruhi tekanan darah dimana

tekanan darah dapat menjadi meningkat melebihi batas normal, sehingga dapat membahayakan ibu maupun janinnya.

Pemberian terapi obat-obatan yang berupa Nefedifin yang diberikan sesuai intruksi dokter juga dapat membantu menurunkan tekanan darah apabila dikonsumsi dengan teratur. Selain pemberian obat-obatan, ibu dan keluarga diberikan dukungan dengan menganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap bersabar dan meyakinkan ibu bahwa kejadian yang dialami adalah kehendak Allah SWT.

Tindakan akhir untuk mencegah terjadinya preeklampsia dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan tidak ada atau tidak adanya protein dalam urin. Serta dilakukan kolaborasi dengan dokter obgyn atau ahli kandungan dalam pemeriksaan USG untuk memastikan bahwa keadaan janin dalam keadaan baik dan sehat serta tidak ada kelainan.

Selama pemantauan berlangsung, ibu telah diberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan ibu dan mendapatkan pendampingan oleh keluarga dan bidan. Keadaan psikologis sosial ibu baik meskipun masih merasa cemas, akan tetapi ibu dalam keadaan baik, ditandai dengan keadaan tanda-tanda vital yang sudah kembali normaldan meminta ibu untuk tetap berserah dirik kepada Allah SWT. Agar ibu tetap dalam keadaan sehat.

Maka disimpulkan bahwa mulai dari pemantauan pertama sampai pemantauan terakhir, semuanya berlangsung dengan baik, tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu maupun janin. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

H. *PENDOKUMENTASIAN*

Pendokumentasian pada kasus Ny "I" ini dimulai pada kontak pertama pada kunjungan antenal di poli KIA Puskesmas Bontomarannu pada tanggal 15 Januari 2020 Telah dilakukan pengumpulan data subjektif dan objektif dan berdasarkan data maka ditetapkan diagnosis. Berdasarkan diagnosa tersebut, ditentukan diagnosa potensial yang akan timbul. Pada kasus Ny "I" tidak didapatkan adanya tindakan segera. Pada kasus Ny "I", implementasi telah dilakukan berdasarkan semua intervensi yang telah ditetapkan. Intervensi dilakukan mulai dari kunjungan pertama dan kunjungan rumah.

Intervensi dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya preklampsia pada ibu dan pertumbuhan janin terhambat. Evaluasi dilakukan pada kunjungan kelima, keluhan yang sering dirasakan telah menghilang, pemeriksaan fisik normal, tekanan darah normal.

Hasil dari kasus yang dialami Ny "I" dengan hipertensi gestasional diatas dengan membantu ibu untuk memperbaiki pola makan dan jenis makanan yang dikonsumsi,pola istirahatnya dan menganjurkan ibu untuk tidak terlalu stress. Sakit kepala disertai pusing teratasi dan tanda-tanda vital ibu kembali normal, serta ibu tampak sudah tenang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

Setelah membahas dan menguraikan kasus Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa Tanggal 15 Januari-12 Maret 2020. maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu.

A. KESIMPULAN

1. Telah dilakukan pengkajian dan analisa data dasar sehingga ditemukan data subjektif dan objektif pada Ny "I". Data subjektif yaitu ibu dengan sakit kepala disertai pusing sejak 2 hari yang lalu sedangkan data objektifnya yaitu keadaan umum ibu lemas dengan TD 150/100 mmhg.
2. Telah dilakukan perumusan diagnosa / masalah aktual pada Ny "I" di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa berdasarkan interpretasi data yang telah dilakukan, yaitu GIIPIA0,gestasi 36-38 minggu,keadaan umum ibu lemah dengan hipertensi gestasional.
3. Telah dilakukan perumusan diagnosa / masalah potensial Pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa masalah potensial yang mungkin terjadi yaitu preeklampsia ringan dan pertumbuhan janin terhambat.
4. Telah dilakukan tindakan pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

untuk memantau perkembangan penyakit hipertensi menjadi preeklampsia dengan cara memeriksa protein urin dan pemeriksaan tekanan darah.

5. Telah dilakukan rencana asuhan atau intervensi pada Ny "I" yaitu memberikan obat antihipertensi seperti nefedifin 10 mg (2x1) di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa dengan diet seimbang dalam kehamilan terhadap makanan yang mengandung karbohidrat,tinggi protein,rendah lemak dan rendah garam,menganjurkan ibu istirahat yang cukup,dan mengajarkan ibu tanda–tanda terjadi preeklampsia ringan dan memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu.
6. Telah dilakukan asuhan atau implementasi pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa sesuai dengan rencana asuhan yang telah disusun dan sesuai syariat islam seperti memperbanyak dzikir kepada Allah dan berdoa untuk kesembuhannya dan selalu diberikan kesehatan.
7. Telah dilakukan evaluasi pada hasil asuhan yang dilakukan pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa, serta tidak di temukan kelainan maupun komplikasi.
8. Telah dilakukan pendokumentasian pada setiap asuhan dan tindakan yang di berikan pada Ny "I" dengan Hipertensi Gestasional Gestasi 36-38 Minggu di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

B. Saran

1. Bagi Klien
   a. Menganjurkan kepada ibu agar tetap banyak istirahat
   b. Menganjurkan ibu untuk tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi garam
   c. Menganjurkan ibu untuk selalu memperhatikan keadaannya dan kesehatan janinnya
   d. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang
   e. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi obat secara teratur sesuai intruksi yang diberikan
   f. Menganjurkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan organ genetalianya.
2. Saran untuk bidan
   a. Bidan sebagai tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang potensial sehingga dapat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian perinatal (AKP). Oleh karena itu bidan harus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, melalui program pendidikan, pelatihan-pelatihan, seminar agar menjadi bidan yang berkualitas sesuai dengan perkembangan IPTEK.
   b. Bidan harus memberikan asuhan sesuai wewenang untuk itu manajemen kebidanan perlu dikembangkan karena merupakan alat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

yang mendasari bagi bidan untuk memecahkan masalah klien dan berbagai kasus.

c. Seorang bidan hendaknya menganggap bahwa semua ibu hamil mempunyai resiko untuk komplikasi yang dapat mengancam jiwa ibu dan janin, oleh karena itu bidan diharapkan mampu mendeteksi secara dini adanya tanda-tanda bahaya kehamilan dan menganjurkan ibu dan keluarga segera kepelayanan kesehatan bila mengalami hal tersebut.

3. Saran untuk institusi kebidanan

a. Untuk mendapatkan hasil manajemen asuhan kebidanan yang baik perlu menyediakan tenaga bidan yang profesional untu menunjang pelaksanaan tugas.

b. Untuk pelayanan yang lebih berkualitas sesuai dengan kemajuan teknologi, sebaiknya bidan yang sudah bertugas diberi kesempatan untuk melanjutkan atau semacam pelatihan-pelatihan.

c. Demi mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan perlukiranya penyediaan fasilitas/alat-alat yang memadai untuk penunjang pelaksanaan tugas-tugas kebidanan dan untuk meningkatkan Keterampilan bidan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

Abu, Muhammad Ibnu Shalih Bin Hasbullah. *Tuntunan Praktis Dan Pada Pada Ibu Hamil Dari A Sampai Z*. Pustaka Ibnu Umar. 2013.

Asri, Dwi dan Cristine Clervo P. *Asuhan Persalinan Normal Plus Contoh Askeb dan Patologi Persalinan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.

Andrei, Brateanu, *Et Al*, *Hypertension In Pregnancy: Pathophysiology And Treatment*, Department of Internal Medicine, Cleveland Clinic, USA, 2019.

Baety, Aprilia Nurul. *Kehamilan dan Persalinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Bothamley, Judy dan Maureen Boyle. *Patofisiologi dalam Kebidanan (Medical Conditins Affering Pregnancy and Childbirth)*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013.

Corry Sihotang, Pesta, dkk. *Hubungan Pola Makan Dan Kecukupan Istirahat Tidur Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Biromaru.* Jurnal Kesehatan Tadulako Vol. 2 No. 1, Januari 2016.http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/HealthyTadulako/article/download/ 5747/4513. (Diakses tanggal, 28 Januari 2019)

Cunningham, F. G. *et al. Obstetri Williams*. Jakarta: ECG. 2012.

Darmawansyih. *Farmakologi Kebidanan*. Makassar-Gowa: Alauddin University press. 2011.

Darmawansyih. *Penyakit Kronik Dalam Kehamilan*. Alauddin University Press, 2014.

Esti Nugraheny, *Asuhan Kebidanan Patologi*. Bantul, Yogyakarta: Pustaka Rihama. 2010.

Evangelia Kintiraki *Et al*, *Pregnancy-Induced Hypertension*, Unit of Reproductive Endocrinology and Unit of Human Reproduction. 2015.

Fauziah, Yulia. *Obstetric PATOLOGI untuk mahasiswa kebidanan dan keperawatan*. Medical Book, Jakarta: 2012.

Fitriani, Rini. *Penyakit Sistemik Pada Kehamilan*. Makassar-Gowa: Alauddin University Press. 2016.

Hasrianah, *Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ny "A" Dengan Hipertensi Dalam Kehamilan Di Rsud Syekh Yusuf Kab. Gowa.* Program Studi D3 Kebidanan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar 2017.

Idawati, Mugiati. *Hipertensi Dalam Kehamilan Terhadap Hasil Luaran Janin.* Jurnal Keperawatan, Volume VIII, No. 2, Oktober 2012.

Ika, P. S., & Saryono, S. M. *Asuhan Kebidanan 1 (Kehamilan).* Yogyakarta : Nuha Medika. (2010).

Ilmiah, Widia Shofa. *Buku Ajar Asuhan Persalinan Normal*. Nuha Medika. Jakarta: 2015

Jumaisa, dkk . *Analysis of Factors Related to Incidence of Hypertension on Pregnant Women Trimester III.* Akademi Kebidanan Panca Bhakti Pontianak. Volume 4, Nomor 2 Januari 2018

Kementerian kesehatan RI. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu Di Fasilitas Kesehatan Dasar Dan Rujukan', E-book*, pp. 22–34 (2012).

Kemenkes RI. PMK No.202820 ttg Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.pdf. 2016

Nadyah (2013). Kegawatdaruratan Neonatal, Anak dan Maternal. Makassar.

Nur Islamiah *Gambaran Faktor Risiko Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Rumah Bersalin Mattirobaji* . Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmukesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2013

Nursiah, Ai, dkk. *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan*. PT. Refika Aditama. Bandung: 2014

Pantiawati, Ika, dkk. *Asuhan Kebidanan (Kehamilan).* Yogyakarta: Luha Medika, 2010.

Pillitteri, Adele. *Buku Saku Asuhan Ibu dan Anak.* Yokyakarta: C.V Andi Offset, 2013.

Prawiharjo Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pusaka. 2014

Profil Kesehatan RI www.depkes.go.id/resources/*download/info-terkini/materi_rakorpop_Hasil%20*Riskesdas 2017 (Diakses Pada Tanggal 19 April 2019)

Rekam Medik Puskesmas BontoMarannu 2019

Rukiyah. *Asuhan Kebidanan 1 Kehamilan* . Jakarta Timur: Trans Info Media. 2010

Setiawati, Dewi. *Kehamilan dan Pemeriksaan Kehamilan*. Makassar-Gowa: Alauddin University Press, 2013.

Setyaningsih, Rahayu, dkk :jurnal ilmiah kesehatan, Pengaruh Pemberian Pemeliharaan Kesehatan Tentang Hipertensi Kehamilan Terhadap Upaya Pemeliharaan Tekanan Darah Pada Ibu Hamil di Desa Ngeong Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Vol. 2 No. 1 Maret 2014

Shihab, Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati, 2012

Tresnawati, Frisca. Asuhan Kebidanan. Prestasi Pustaka Publisher. 2013

World Health Organization 2017 *World Health Satatistic*

Yanuarti P dkk, *Tingkat Asupan Energi Dan Ketersediaan Pangan Berhubungan Dengan Risiko Kekurangan Energi Kronik (KEK) Pada Ibu Hamil.* Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia Vol. 2, No. 3, September 2014: 140-149.

Yulifah, Rita, dkk. *Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan.* Salemba Medika. Jakarta. 2014

Zuhrotunida, Yudiharto Ahmad. 2016. *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Proses Persalinan di Puskesmas Kecamatan Mauk Kabupaten Tangeran Tahun 2016*. Tangeran : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus II : JL. Sultan Alauddin No.36 Samata – Gowa Telp. 824835 Fax. 424836

PARTOGRAF

No. Register [19xxx]
No. Puskesmas
Ketuban pecah Sejak jam _____

Nama Ibu : Ny "I" Umur : 36 thn G. II P. I A. 0
Tanggal : 31-1-2020 Jam : 10 20 wita Alamat : Borongloe
mules sejak jam 03 30 wita



CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal : 31 Januari 2020
2. Nama bidan : .....
3. Tempat Persalinan :
   ☐ Rumah Ibu ☑ Puskesmas
   ☐ Polindes ☐ Rumah Sakit
   ☐ Klinik Swasta ☐ Lainnya : .....
4. Alamat tempat persalinan : .....
5. Catatan ☐ rujuk, kala : I / II / III / IV
6. Alasan merujuk .....
7. Tempat rujukan .....
8. Pendamping pada saat merujuk :
   ☐ Bidan ☐ Teman
   ☐ Suami ☐ Dukun
   ☐ Keluarga ☐ Tidak ada

KALA I

9. Partogram melewati garis waspada : Y / (T)
10. Masalah lain, sebutkan : .....
11. Penatalaksanaan masalah Tsb : .....
12. Hasilnya : .....

KALA II

13. Episiotomi :
    ☐ Ya, Indikasi .....
    ☑ Tidak
14. Pendamping pada saat persalinan
    ☐ Suami ☐ Teman ☐ Tidak ada
    ☑ Keluarga ☐ Dukun
15. Gawat Janin :
    ☐ Ya, tindakan yang dilakukan
    a. .....
    b. .....
    c. .....
    ☑ Tidak
16. Distosia bahu :
    ☐ Ya, tindakan yang dilakukan
    a. .....
    b. .....
    c. .....
    ☑ Tidak
17. Masalah lain, sebutkan :
18. Penatalaksanaan masalah tersebut : .....
19. Hasilnya : .....

KALA III

20. Lama kala III : 10 menit
21. Pemberian Oksitosin 10 U im ?
    ☑ Ya, waktu : 1 menit sesudah persalinan
    ☐ Tidak, alasan .....
22. Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
    ☐ Ya, alasan .....
    ☑ Tidak
23. Penegangan tali pusat terkendali ?
    ☑ Ya,
    ☐ Tidak, alasan .....
24. Masase fundus uteri ?
    ☑ Ya.
    ☐ Tidak, alasan .....
25. Plasenta lahir lengkap (*intact*) Ya / Tidak
    Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
    a. .....
    b. .....
26. Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya / (Tidak)
    ☐ Ya, tindakan :
    a. .....
    b. .....
    c. .....
27. Laserasi :
    ☑ Ya, dimana Perineum
    ☐ Tidak.
28. Jika laserasi perineum, derajat : 1 / (2) / 3 / 4
    Tindakan :
    ☑ Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
    ☐ Tidak dijahit, alasan .....
29. Atoni uteri :
    ☐ Ya, tindakan
    a. .....
    b. .....
    c. .....
    ☑ Tidak
30. Jumlah perdarahan : ± 250 ml
31. Masalah lain, sebutkan .....
32. Penatalaksanaan masalah tersebut : .....
33. Hasilnya : .....

BAYI BARU LAHIR :

34. Berat badan 2700 gram
35. Panjang 48 cm
36. Jenis kelamin (L) / P
37. Penilaian bayi baru lahir : baik / ada penyulit
38. Bayi lahir :
    ☑ Normal, tindakan :
    ☑ mengeringkan
    ☑ menghangatkan
    ☑ rangsang taktil
    ☑ bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
    ☐ Aspiksia ringan/pucat/biru/lemas/,tindakan :
    ☐ mengeringkan ☐ bebaskan jalan napas
    ☐ rangsang taktil ☐ menghangatkan
    ☐ bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
    ☐ lain - lain sebutkan .....
    ☐ Cacat bawaan, sebutkan :
    ☐ Hipotermi, tindakan :
    a. .....
    b. .....
    c. .....
39. Pemberian ASI
    ☑ Ya, waktu : 1 jam setelah bayi lahir
    ☐ Tidak, alasan .....
40. Masalah lain,sebutkan : .....
    Hasilnya : .....

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi		Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1	15.10	130/90 mmHg	84 x/1	36,8°C	Setinggi Pusat	Baik	Kosong	± 50 cc
	15.35	130/90 mmHg	86 x/1		Setinggi Pusat	Baik	Kosong	± 50 cc
	15.40	130/90 mmHg	86 x/1		Setinggi Pusat	Baik	Kosong	± 50 cc
	15.55	130/90 mmHg	82 x/1		Setinggi Pusat	Baik	Kosong	± 40 cc
2	16.25	130/90 mmHg	84 x/1	36,7°C	Setinggi Pusat	Baik	Kosong	± 30 cc
	16.55	130/90 mmHg	82 x/1		Setinggi Pusat	Baik	Kosong	± 30 cc

Masalah kala IV : .....
Penatalaksanaan masalah tersebut : .....
Hasilnya : .....

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I : JL. Sultan Alauddin No 63. Telp (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : D.006/KEPK/FKIK/XII/2019
Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Berkelanjutan Pada Ibu Hamil Trimester II Dengan Hipertensi Gestasional Di Puskesmas Bontomarannu Tahun 2019
Nama Peneliti : Rika
No. Register

U	I	N	A	M	1	9	1	2	D	0	0	6

A	Rangkuman penilaian oleh *reviewers* terlampir
B	Perlu *full board* : ☐ Ya ☑ Tidak a. Ya (terus ke C) b Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (*Full Board*) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian
	☑ a. Disetujui
	☐ b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
	☐ c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
	☐ d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
	☐ e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes

Gowa, 30 Desember 2019
Ketua

(Dr.dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes)
NIP. 19800701 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411)841879 Fax.0411-8221400 Gowa
Email: www.fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-96 /FKIK/PP.00.9/01/2020 Gowa,13 Januari 2020
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPMD Prov. Sul-Sel.
di-
Jl. Bougenville No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama	: Rika
NIM	: 70400116002
Program Studi	: Kebidanan
Judul Penelitian	: Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Berkelajutan Pada Ibu Hamil Trimester II Dengan Hipertensi Gestasional di Puskesmas Bontomarannu Tahun 2019.
Tempat Penelitian	: Puskesmas Bontomarannu
Dosen Pembimbing	: 1. Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.
	2. Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
a.n. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Gemy Nastity Handayany

Tembusan:

Dekan FKIK UIN Alauddin Makssar (sebagai laporan)

1 2 0 2 0 1 9 3 0 0 0 0 9 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **239/S.01/PTSP/2020**
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-96/FKIK/PP.00.9/01/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	:	**RIKA**
Nomor Pokok	:	70400116002
Program Studi	:	Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa(S1)
Alamat	:	Jl. Slt Alauddin No. 63, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL BERKELANJUTAN PADA IBU HAMIL TRIMESTER II DENGAN HIPERTENSI GESTASIONAL DI PUSKESMAS BONTOMARANNU TAHUN 2019 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***14 Januari s/d 28 Maret 2020***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 Januari 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 14 Januari 2020

Nomor : 070/ 41 /BKB.P/2020
Lamp : -
Perihal : ***Rekomendasi Penelitian***

Kepada
Yth. Ka.Puskesmas Bontomarannu

Di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 239/S.01/PTSP/2019 tanggal 13 Januari 2020 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: **RIKA**
Tempat/Tanggal Lahir	: Lantang, 30 April 1998
Jenis kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswi (S1)
Alamat	: Jl. Alauddin

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "***MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL BERKELANJUTAN PADA IBU HAMIL TRIMESTER II DENGAN HIPERTENSI GESTASIONAL DI PUSKESMAS BONTOMARANNU TAHUN 2019***"

Selama	: 14 Januari 2020 s/d 28 Maret 2020
Pengikut	: Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **KEPALA BADAN**
SEKRETARIS

DRS. ALWI ARIFIN. M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19680808 19881 1 012

Tembusan :
1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gowa
3. Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BONTOMARANNU

SURAT KETERANGAN
Nomor : 446.12.1/ 3uf /ADMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Hj. Ipmawaty Z, S.Kep, NS
Pangkat / Gol	: Pembina / IV a
NIP	: 19740612 199803 2 010
Jabatan	: Kepala Tata Usaha

Menerangkan Bahwa

Nama	: Rika
NIM	: 70400116002
Pekerjaan / Lembaga	: Mahasiswi

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada UPT Puskesmas Bontomarannu , sebagai syarat Skripsi/Tesis dengan judul

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL BERKELANJUTANPADA IBU HAMIL TRIMESTER II DENGAN HIPERTENSI GESTASIONAL yDI PUSKESMAS BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA "

Demikian surat ini dibuat agar dipergunakan seperlunya dan di ucapkan terimah kasih

Bontomarannu, 14 januari 2020
Kepala UPT Puskesmas Bontomarannu

Hj. Ipmawaty Z, S.Kep, Ns
Pangkat : Pembina
NIP . 19740612 199803 2 010

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BONTOMARANNU
Jl. Poros Malino Km. 12 Kel. Bontomanai (92172) Email : puskesmas.bontomarannu@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 446.12.1/ 316 / Admen

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	:	Hj. Ipmawaty Z., S.Kep.,Ns
N I P	:	19710612 199403 2 006
Pangkat/Gol	:	Pembina / IV a
Jabatan	:	Kepala Tata Usaha

Berdasarkan Permohonan dari :

N a m a	:	Rika
NIM	:	70400116002
Tempat/Tanggal Lahir	:	Lantang, 30 April 1998
0Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Mahasiswi
Alamat	:	Jl. Alauddin

Telah melaksanakan Penelitian/Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan Skripsi/Tesis " **yang berjudul "MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL BERKELANJUTANPADA IBU HAMIL TRIMESTER II DENGAN HIPERTENSI GESTASIONAL DI PUSKESMAS BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA** " Sejak tanggal 15 Januari s/d 28 Maret 2020.

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontomanai, 6 Agustus 2020
Kepala Tata Usaha
Puskesmas Bontomarannu

Hj. Ipmawaty Z., S.Kep.,Ns
Nip: 19710612 199403 2 006

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PENULIS

Nama	: Rika
NIM	: 70400116002
Tempat/Tanggal Lahir	: Lantang, 30 April 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Permandian, Desa Lantang, Kec. Polongbangkeng selatan, Kab. Takalar.
Nama Orang Tua	:
1. Ayah	: Simolla
2. Ibu	: Kasmawati

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD : SDN NO 15 Lantang tahun 2010
2. Tamat SMP : SMP Negeri 4 Takalar tahun 2013
3. Tamat SMA : SMA Negeri 1 Polongbangkeng selatan tahun 2016
4. Tahun 2016 mengikuti pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R