

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI  
DENGAN ASFIKSIA SEDANG  
(Literatur Review)**



**Karya Tulis Ilmiah**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Meraih Gelar  
Ahli Madya Kebidanan pada Jurusan Kebidanan  
Fakultas kedokteran dan Ilmu kesehatan  
Uneversitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar**

**Oleh :**

**SITI SEPRINITA VANATH  
NIM : 70400115029**

**JURUSAN KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2020**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Seprinita Vanath

Nim : 70400115029

Tempat tanggal lahir : Bemo, 03 September 1998

Jurusan/Prodi : Kebidanan

Fakultas/Program : Kedokteran dan ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Andi Tondro VII Jongaya

Judul : Manajemen Asuhan kebidanan Pada Bayi dengan Asfiksia  
Sedang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa Karya Tulis ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti duplikat, tiruan. Plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka Karya Tulis ilmiah (KTI) dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa

Penulis

**Siti Seprinita Vanath**

**70400115029**

## HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Siti Seprinita Vanath


Nim : 70400115029

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi dengan Asfiksia Sedang

Karya Tulis Ilmiah ini telah diselesaikan untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya tulis Ilmiah jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata 19 Februari 2021


Pembimbing I



Dr. Hi. Sitti Saleha, S.SiT.SKM, M.Keb

NIP : 19760126200604 2 001

Pembimbing II



dr. Rini Fitriani, M.Kes

NIP : 1980008 200801 2 021

## PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi dengan Asfiksia Sedang”. Yang disusun oleh **Siti Seprinita Vanath** Nim : **70400115029** Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jumat 19 Februari 2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan.

Samata 19 Februari 2021 M  
7 Rajab 1442 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes (.....)

Sekretaris : Firdayanti, S.SiT., M.Keb (.....)

Pembimbing I : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb (.....)

Pembimbing II: dr. Rini Fitriani, M.Kes (.....)

Penguji I : Nurfaizah Alza, S.ST., M.Keb (.....)

Penguji II : Dra.Hj. Hartini, M.Hi (.....)

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP : 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah, semua yang tercurah kepada kita sehingga segala aktivitas bernilai ibadah di sisi Allah. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabiyullah Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang telah membawa kebenaran, sehingga membuat penulis semangat dalam menyusun KTI yang berjudul “ **Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi dengan Asfikiksia Sedang**” Karya Tulis Ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Kebidanan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun merupakan masukan dan penyempurnaan selanjutnya sangat dibutuhkan. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya. Untuk hal itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hamdan Johannis, MA., Ph.D sebagai rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
2. Ibu Dr. dr. Hj. Syatirah Djalaluddin., M.kes., Sp.A, sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta pembantu

Dekan I, pembantu Dekan II, dan pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.

3. Ibu Firdayanti, S.SiT, M.Keb, selaku ketua jurusan Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah mengajarkan kami banyak hal dan selalu memberi motivasi.
4. Ibu Anieq Mumthi'ah Al Kausar. S.ST.M.Keb. selaku sekretaris jurusan, yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT, M.Keb, selaku pembimbing I Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar Amd. Keb.
6. Ibu dr. Rini Fitriani. M.Kes selaku pembimbing akademik dan pembimbing II Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar Amd. Keb.
7. Ibu Nurfaizah Alza, S.ST., M.Keb, selaku penguji I Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan banyak masukan dan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar Amd. Keb
8. Ibu Dra. Hj. Hartini M.Hi selaku penguji agama Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan masukan serta motivasi khususnya dalam bidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

9. Para dosen dan seluruh staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan dan nasehat selama penulis menimba ilmu di Jurusan Kebidanan.
10. Kedua orang tua penulis, dan keluarga besar penulis yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan materi dan doa yang selalu di panjatkan setiap saat untuk penulis sehingga bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain.
11. Sahabat kampus penulis, yang telah menjadi tempat berbagi di kala suka maupun duka selama proses awal penyusunan KTI ini hingga selesai.
12. Kepada semua saudari seperjuanganku di Kebidanan UIN Alauddin Makassar Angkatan 2015 yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan motivasinya serta do'a kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Alauddin Makassar.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya semoga segala kebaikannya di balas oleh Allah dan menjadi ibadah dan amal jariyah. Amin

Samata-Gowa,

Penulis

**Siti Seprinita Vanatah**  
**NIM. 70400115029**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan penulisan .....	7
D. Manfaat penulisan .....	8
E. Metode penulisan .....	9
F. Sistematika penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Bayi Baru Lahir Normal .....	11
B. Tinjauan Khusus Asfiksia .....	16
C. Tinjauan Islam Tentang Bayi Baru Lahir .....	35
D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan .....	39

### BAB III TELUSURAN *EVIDANCE BASED LEARNING*

A. Matriks langkah I .....	46
B. Matriks langkah II .....	59
C. Matriks langkah III .....	67
D. Matriks langkah IV .....	75
E. Matriks langkah V .....	84
F. Matriks langkah VI .....	90
G. Matriks langkah VII .....	100

### BAB IV PEMBAHASAN

#### A. Pembahasan Hasil telaah Evidance Based Asuhan 7

Langkah varney berdasarkan Hasil penelusuran Referensi

1. Langkah I : Identifikasi Data Dasar .....	110
2. Langkah II : Perumusan Diagnosis/Masalah Aktual ...	113
3. Langkah III : Perumusan Diagnosis/Masalah Potensial..	116
4. Langkah IV : Tindakan Emergency/Kolaborasi .....	118
5. Langkah V : Rencana Tindakan .....	121
6. Langkah VI : Implementasi .....	124
7. Langkah VII : Evaluasi .....	126
B. Implikasi Kebidanan .....	130

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	136
B. Saran .....	138

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
SCIENTIFIC PAPER, JANUARY 2020

**Name** : Siti Seprinita Vanath  
**Reg. Number** : 70400115029  
**Supervisor 1** : Hj. Sitti Saleha, S.SiT. SKM. M.Keb  
**Supervisor 2** : dr. Rini Fitriani. M.Kes  
**Title** : Midwifery Care Management on Infants with Moderate Asphyxia  
(A Literature Review)

---

*Neonatal asphyxia is one of the major causes of mortality and morbidity in newborns. The cases of neonatal asphyxia have been found in patients during the neonatal period in both developing and developed countries. According to IDAI (Indonesian Pediatrician Association), asphyxia neonatorum is a spontaneous and regular respiratory failure during birth process or some time after birth process characterized by hypoxemia, hypercarbia, and acidosis. Several factors that may influence the occurrences of asphyxia cases are discussed. Firstly, the maternal factor which include the maternal age at pregnancy, the gestational age at delivery, the mother's health status, and the mother's parietal status. Another factor is a labor factor consisting of two namely the cases of premature rupture of membranes (PROM) and the types of delivery (normal or surgery). The other influencing factor is fetal factor including the low birth weight cases, the mixing of amniotic fluid with meconium, and complicated pregnancies such as breech delivery, twins, and shoulder dystocia. The last influencing factor is placental factor namely the cases of umbilical cord loops, short umbilical cord, and umbilical cord prolapse.*

*The major purpose of this research was to understand midwifery care management in infants with asphyxia. The method used in this study was a literature Review. References related to asphyxia in newborns such as books, journals, literature, and internet media were analysed according to evidence-based research approach. The findings of this research indicated that the treatment that could be given to newborns with asphyxia was in the form of resuscitation. Resuscitation is the process of correcting physiological disorders such as lack of breathing, circulatory disorders, or stalled brain. It is an important part on intensive care medicine and emergency medicine. The success of newborn resuscitation is to be based on several treatments such as anticipatory environmental control, assessment, stimulation, effective ventilation, cardiac compression, intubation, and drug administration. This research concludes that appropriate treatments based on evidence-based research should be given to infants with the case of asphyxia. In addition, it is significant to inform mothers on the importance of maintaining a healthy lifestyle during pregnancy.*

**Key words:** *Asphyxia, Infants, Midwifery Care*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Asfiksia neonatorum adalah salah satu penyebab mortalitas dan morbiditas bayi baru lahir dan akan membawa beberapa dampak pada periode neonatal baik di negara berkembang atau negara maju. Asfiksia neonatorum menurut IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) adalah kegagalan napas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir yang ditandai dengan hipoksemia, hiperkarbia, dan asidosis (Saputra, 2014 dalam Nasrawati dan Elisa Ermawati, 2016).

*World Health Organization* (WHO, 2016), pada tahun 2013 Angka Kematian Bayi (AKB) di dunia 34 per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 dengan Angka Kematian Bayi (AKB) 43 per 1.000 kelahiran hidup. Di kawasan Asia Tenggara, AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup (WHO 2016 dalam Nasrawati dan Elisa Ermawati, 2016)

Laporan WHO dari 8 juta kematian bayi di dunia 48% adalah kematian neonatal. Dari seluruh kematian neonatal, sekitar 60% merupakan kematian bayi umur < 7 hari yang disebabkan oleh gangguan perinatal yang salah satunya adalah asfiksia. Di negara berkembang, 3% dari semua bayi baru lahir (3,6 juta) mengalami asfiksia sedang dan berat. Dari jumlah tersebut, sekitar 840.000 meninggal dan hampir dengan jumlah yang sama mengalami akibat lebih lanjut

(epilepsi, retardasi mental) serta kecacatan pada manusia (Katiandago dan Kusmiyati.2015).

Data dari Riset Kesehatan Dasar (RisKesDas) menyebutkan bahwa penyebab kematian neonatus 0-28 hari adalah asfiksia sebesar 37%, bayi lahir prematur sebesar 34%, dan sepsis 12%, sedangkan dalam profil kesehatan Indonesia dijelaskan bahwa penyebab kematian bayi yang terbanyak adalah disebabkan karena pertumbuhan janin yang lambat, kekurangan gizi pada janin, kelahiran prematur dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sedangkan penyebab lainnya yang cukup banyak terjadi adalah kejadian kurangnya oksigen dalam rahim (hipoksia intrauterus) dan kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir (Dinas Kesehatan SulSel, 2012, dalam Rahma dan Armah.2013).

Angka kejadian asfiksia di Sulawesi Selatan cukup tinggi dan masih menjadi masalah kesehatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan kejadian asfiksia neonatorum pada tahun 2015 sebanyak 392 kasus (16,59%), mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu terdapat 212 kasus (21,74%) asfiksia neonatorum (Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, 2015 dalam Farhdiba, dkk.2017).

Kematian bayi merupakan indikator pertama dan utama dalam menentukan derajat kesehatan anak sebagai cerminan dari status kesehatan masyarakat. Adapun penyebab terbanyak kematian pada bayi yaitu asfiksia, bayi berat lahir rendah (BBLR), dan infeksi. Dimana BBLR dipengaruhi oleh faktor ibu yaitu salah satunya adalah anemia dalam kehamilan (Kementerian Kesehatan RI, 2016 dalam Rahmawati, dkk.2017).

*World Health Organization* (WHO) 2017 melaporkan bahwa kasus kematian neonatus akibat asfiksia masih tinggi yakni sekitar 151.497 di Asia Tenggara dan 13.843 di Indonesia. Tingginya angka kejadian dan kematian asfiksia berhubungan dengan banyaknya faktor yang dapat meningkatkan risiko asfiksia, baik dari ibu maupun neonatus (Ramadhana, dkk. 2020)

Adapun penyebab kematian bayi baru lahir di Indonesia, salah satunya asfiksia yaitu sebesar 27% yang merupakan penyebab ke-2 kematian bayi baru lahir setelah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) (Kemenkes RI, 2011). Komplikasi neonatal di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015 sebanyak 29,51% sedangkan kematian neonatal tahun 2015 sebanyak 406 kasus. Untuk Kota Kendari kematian bayi tahun 2015 sebanyak 157 kasus atau rata-rata 3/1000 kelahiran hidup (Rahmawati, 2017 dalam Batubara dkk.2020).

Sekitar 56% kematian terjadi pada periode sangat dini yaitu di masa neonatal, setiap lima menit terdapat satu neonatus yang meninggal. Penyebab kematian bayi baru lahir di Indonesia salah satunya asfiksia yaitu sebesar 27% yang merupakan penyebab ke-2 kematian bayi baru lahir setelah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Adapun penyebab langsung kematian bayi baru lahir 29% disebabkan berat bayi lahir rendah (BBLR), asfiksia (13%), tetanus (10%), masalah pemberian makan (10%), infeksi (6,7%), gangguan hematologik (5%), dan lain-lain (27%) (BKKBN, 2017, dalam Batubara dkk.2020).

Pada tahun 2015 diketahui angka kematian bayi (0-27 hari) bayi di dunia akibat asfiksia adalah 4,6 per 1000 kelahiran hidup (636.948 kasus). Sedangkan angka kematian bayi (0-27 hari) akibat asfiksia di Indonesia ialah 2,9 per 1000

kelahiran hidup (15.990 kasus). Kematian neonatal terbanyak di ketahui 18,9 % dari kasus kematian neonatal di sebabkan oleh asfiksia. Sekitar satu juta bayi baru lahir mati ( 75 % ) dalam 24 jam pertama, dan kematian terjadi pada minggu pertama kehidupan. Sekitar 7000 kematian bayi setiap harinya yaitu sebesar 47 % dari seluruh kematian anak di bawah usia 5 tahun. Salah satu penyebab kematian neonatal pada tahun 2016 yaitu karena kelahiran premature, terkait dengan komplikasi persalinan ( asfiksia atau kurangnya pernapasan saat lahir ), infeksi, dan cacat bawaan (WHO, 2018, dalam Rosmini dkk.2018).

Berdasarkan data angka kematian bayi menurut laporan *World Health Organization* (WHO) 2016 pada negara ASEAN (Association of South East Asia Nations) seperti Indonesia 27 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab utama kematian bayi baru lahir atau neonatal di dunia antara lain bayi lahir prematur 29%, sepsis dan pneumonia 25% dan 23% merupakan bayi lahir dengan Asfiksia dan trauma. Asfiksia lahir menempati penyebab kematian bayi ke 3 di dunia dalam periode awal kehidupan (WHO, 2016, dalam Ardyana.2019).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian asfiksia pada bayi baru lahir adalah faktor ibu : meliputi usia ibu pada saat hamil, usia kehamilan saat melahirkan, status kesehatan, dan status parietas. factor dari persalinan : yang meliputi ketuban pecah dini ( KPD ), dan jenis persalinan , Faktor janin : meliputi Berat badan lahir rendah, air ketuban yang bercampur dengan mekonium, persalinan yang terjadi dengan penyulit seperti letak sungsang, kembar, distosia bahu, faktor plasenta : yang meliputi lilitan tali pusat, tali pusat pendek, dan prolapsus tali pusat (Tridge, 2010 dalam Gilang, dkk. 2014).

Dari data awal yang saya ambil di RSUD syekh yusuf gowa tentang asfiksia pada tahun 2013 sebanyak 68 bayi, pada tahun 2014 sebanyak 100 bayi, pada tahun 2015 sebanyak 83 bayi, pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu menjadi 31 bayi yaitu: Asfiksia berat 12 bayi, asfiksia sedang 12 bayi, dan asfiksia ringan 7 bayi, pada tahun 2017 sebanyak 30 bayi yaitu: Asfiksia berat 9 bayi, asfiksia sedang 14 bayi, asfiksia ringan 7 bayi, pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu asfiksia berat tidak ada, asfiksia sedang 2 bayi, dan asfiksia ringan tidak ada, sedangkan tahun 2019 terdapat asfiksia berat 1 bayi, asfiksia sedang 1 bayi dan asfiksia ringan tidak ada.

WHO menyebutkan bahwa setiap tahun kasus asfiksia mencapai 3,6 juta dari 120 juta kelahiran bayi di mana 1 juta diantaranya mengalami kematian. Sedangkan kasus kematian pada masa bayi baru lahir di Indonesia berjumlah 38% dari total keseluruhan kematian. Setiap tahun, kasus asfiksia pada neonatal menjadi faktor penyumbang mortalitas sebesar 19% dari 5 juta angka mortalitas neonatal. Data menunjukkan bahwa angka mortalitas asfiksia sebesar 41,94% di rumah sakit pusat rujukan di Indonesia. Pada awal kehidupan, jumlah neonatal yang membutuhkan bantuan ringan sampai resusitasi lanjut untuk mulai bernapas sekitar 10% di mana hanya 1 % dari jumlah tersebut yang membutuhkan bantuan resusitasi ekstensif . Sumber lain memaparkan sekitar 5% bayi memerlukan stimulasi bernafas pada saat lahir, 1-10% memerlukan bantuan ventilasi, sedangkan jumlah bayi yang memerlukan tindakan intubasi dan kompresi dada hanya sedikit (Umar, dkk.2020).

Pencegahan asfiksia dapat dimulai dari masa kehamilan, persalinan dan beberapa saat setelah persalinan, diantaranya dengan cara melakukan pemeriksaan antenatal rutin minimal 4 kali kunjungan, melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap pada kehamilan yang diduga berisiko bayinya lahir dengan asfiksia, memberikan terapi kortikosteroid antenatal untuk persalinan pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu, melakukan pemantauan yang baik terhadap kesejahteraan janin dan deteksi dini terhadap tanda-tanda asfiksia selama persalinan dengan kardiotokografi, meningkatkan keterampilan tenaga obstetric dalam penanganan asfiksia dimasing-masing tingkat pelayanan kesehatan (Prawirohardjo, 2014, dalam Mandasari.2018).

Dalam hal ini pemerintah telah mengupayakan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu ( AKI ) dan Angka Kematian Neonatal ( AKN ) yakni dengan upaya pemerintah dengan meningkatkan pemeriksaan kehamilan ANC (antenatal care) minimal 4 kali selama kehamilan, dan melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi dalam kehamilan (Kemenkes, 2017, dalam Rosmini dkk.2018).

## **B. Rumusan Masalah**

Ruang lingkup pembahasan Karya Tulis Ilmiah ini meliputi Manajemen asuhan kebidanan pada Bayi dengan Asfiksia Sedang.

1. Apa saja Tanda gejala Asfiksia ?
2. Apa saja Komplikasi yang dapat timbul pada bayi yang mengalami asfiksia ?
3. Bagaimana tindakan segera yang dapat dilakukan bidan serati tindakan kolaborasi yang dilakukan dengan Tenaga kesehatan yang lain?
4. Apa saja perencanaan yang dapat dilakukan pada bayi dengan asfiksia sedang ?
5. Apa saja implementasi tindakan pada Bayi dengan Asfiksia Sedang ?
6. Apa saja evaluasi yang dilakukan pada Bayi dengan Asfiksia Sedang ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk :

### **1. Tujuan umum**

Mampu menyusun literature review pada Bayi dengan Asfiksia Sedang Melalui pendekatan manajemen kebidanan 7 langkah varney sesuai dengan wilayah kerja Bidan.

### **2. Tujuan khusus**

Adapun tujuan penulisan Literatur Review Asuhan Kebidanan pada Bayi dengan Asfiksia Sedang adalah :

- a. Didapatkannya data Subjektif dan data Objektif dari tanda dan gejala dari berbagai referensi tentang Bayi dengan Asfiksia Sedang.
- b. Didapatkannya hasil rumusan diagnosis dari berbagai referensi tentang Bayi dengan Bayi dengan Asfiksia Sedang.

- c. Didapatkannya Informasi Komplikasi yang bias timbul dari berbagai referensi pada Bayi dengan Asfiksia Sedang.
- d. Didapatkannya informasi dari berbagai referensi tentang kondisi emergensi yang dapat terjadi serta penanganannya pada Bayi dengan Asfiksia Sedang.
- e. Didapatkannya simpulan dari berbagai referensi tentang intervensi apa saja / penatalaksanaan yang tepat pada Bayi dengan Asfiksia Sedang.
- f. Didapatkannya penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan ke implementasi asuhan bayi baru lahir yang mengalami Asfiksia Sedang.
- g. Dididapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber kondisi yang menjadi dasar evaluasi pada Bayi dengan Asfiksia Sedang.

### **3. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penelitian pada kasus ini yaitu :

- a. Manfaat praktis

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir program diploma Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- b. Manfaat Ilmiah

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumber informasi, menambah pengetahuan serta sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

c. Manfaat bagi Institusi

Diharapkan Literatur Review ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi institusi pendidikan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya.

d. Manfaat bagi penulis

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis dalam penerapan Asuhan Kebidanan pada Bayi dengan Asfiksia Sedang. Penulisan ini juga merupakan pengalaman yang berharga karena dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi dengan Asfiksia Sedang.

e. Manfaat bagi pembaca

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi dengan Asfiksia Sedang.

#### **D. Metode Penulisan**

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, metode yang digunakan adalah Penulis mempelajari buku-buku, literatur, dan media internet yang berhubungan dengan Bayi dengan Asfiksia Sedang

#### **E. Sistematika penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu pendahuluan, akan menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan teoritis akan menguraikan mengenai tinjauan umum bayi dengan asfiksia, tinjauan khusus bayi dengan asfiksia , proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Pada bab III yaitu telusuran evidence based learning, akan menguraikan tentang matriks 7 langkah Varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/ masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, pelaksanaan/implementasi dan evaluasi .

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang hasil telaah evidence based learning asuhan 7 langkah Varney berdasarkan hasil penelusuran referensi. Serta implikasi kebidanan mengenai bayi yang mengalami asfiksia berdasarkan seluruh referensi.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat data literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Tinjauan Umum Bayi Baru Lahir Normal**

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan presentase belakang kepala, melalui vagina, tanpa memakai alat, pada usia kehamilan 37 minggu – 42 minggu, dengan berat badan 2.500-4.000 gram, nilai apgar > 7 dan tanpa cacat bawaan (Rukiyah & Yulianti. 2015).

##### 1. Ciri-ciri Bayi Normal

- a. Berat badan 2500-4000 gram.
- b. Panjang badan lahir 48-52 cm.
- c. Lingkar dada 30- 38 cm.
- d. Lingkar kepala 33-35 cm.
- e. Frekuensi jantung 180x/menit, kemudian menurun sampai 120-140x/mnit.
- f. Pernapasan pada beberapa menit pertama cepat, kira-kira 80x/menit, kemudian menurun sampai 40x/menit.
- g. Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan cukup terbentuk dan diliputi verniks kaseosa.
- h. Rambut lanugo tidak terlihat, rambut kepala biasanya telah sempurna.
- i. Kuku agak panjang dan lemas.
- j. Genitalia :Labia mayora sudah menutupi labia minora(pada perempuan),testis sudah turun skrotum sudah ada (pada laki-laki).
- k. Refleks isap dan menelan sudah terbentuk dengan baik.

- l. Refleks morrow atau gerak memeluk bila dikagetkan.
  - m. Refleks graps atau menggenggam sudah baik.
  - n. Eliminasi baik, mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama, mekonium berwarna hitam kecokelatan (M.K.Rochmah.dkk. 2012).
2. Adaptasi bayi baru lahir di luar uterus
- a. Sistem Pernapasan

Paru berasal dari titik tumbuh (jaringan endoderm) yang muncul dari faring yang kemudian bercabang kembali membentuk struktur percabangan bronkus. Proses ini terus berlanjut setelah kelahiran hingga sekitar usia 8 tahun, sampai jumlah bronkiolus dan alveolus sepenuhnya berkembang, walaupun janin memperlihatkan gerakan napas sepanjang trimester 2 dan 3. Ketidakmatangan paru akan mengeurangi peluang kelangsungan hidup bayi baru lahir sebelum usia 24 minggu, yang disebabkan oleh keterbatasan permukaan alveolus, ketidakmatangan sistem kapiler paru dan tidak mencukupinya jumlah surfaktan (M.K.Rochmah dkk. 2012).

- b. Pertukaran gas

Oksigenasi yang memadai merupakan faktor yang sangat penting dalam memperthankan pertukaran gas yang adekuat. Peningkatan aliran darah paru akan memperlancar pertukaran gas dalam alveolus dan menghilangkan cairan paru, peningkatan aliran darah ke paru akan mendorong peningkatan sirkulasi limfe dan membantu menghilangkan cairan paru serta merangsang perubahan sirkulasi janin menjadi sirkulasi luar rahim (M.K.Rochmah dkk. 2012).

c. Sistem kardiovaskular

- 1). Napas yang pertama akan mengembangkan paru-paru neonatus dengan menurunkan resistensi paru.
- 2). Penjepitan tali pusat dengan klem meningkatkan resistensi vaskular sistemik dan tekanan atrium kiri.
- 3). Perubahan yang terjadi ketika neonatus beradaptasi dengan kehidupan luar rahim.
  - a) Perubahan tekanan atrium secara fisiologis akan menutup foramen ovale hampir dengan segera setelah neonatus lahir (fibrosis baru akan terjadi beberapa minggu hingga satu tahun kemudian).
  - b) Peningkatan tekanan parsial oksigen ( $P_{O_2}$ ) akan menimbulkan konstriksi duktus arteriosus.
  - c) Penjepitan dan pemotongan tali pusat segera menutup vena umbilikalis, arteri umbilikalis, dan duktus venosus (fibrosa terjadi dalam waktu 3 hingga 7 hari, dan struktur ini akhirnya akan berubah menjadi ligamen) (Lockhart & Saputra.2014).

d. Sistem hematoposisi

- 1) Volume darah pada neonatus yang aterm berkisar dari 80-110mL/kg berat badan yaitu rata-rata sekitar 300ml.
- 2) Jumlah darah yang terikat pada hemoglobin lebih sedikit pada neonatus dibandingkan pada janin.
  - a) Tekanan parsial oksigen dalam darah lebih rendah pada neonatus dibandingkan pada janin.

- b) Neonatus dilahirkan dengan jumlah eritrosit yang tinggi sebagai akibat dari sirkulasi darah janin dan perlunya memastikan oksigenasi yang adekuat.
- c) Kadar vitamin k pada neonatus lebih rendah dari pada kadarnya yang normal sehingga waktu pembekuannya meningkat (Lockhart & Saputra.2014).

e. Sistem metabolisme glukosa

Agar berfungsi dengan baik. Otak memerlukan glukosa dalam jumlah tertentu. Pada saat kelahiran, begitu tali pusat di klem, seorang bayi harus mulai mempertahankan kadar glukosa darahnya sendiri. Pada setiap bayi baru lahir, kadar glukosa akan turun dalam waktu cepat (1-2 jam) (M.K. Rochmah dkk. 2012).

f. Sistem termogenesis

- 1) Pengaturan suhu tubuh masih imatur pada neonatus karena permukaan tubuh yang luas terhadap massa tubuh dan karena ketidakmampuan tubuh neonatus untuk menghasilkan panas dari gerakan menggigil.
- 2) Neonatus yang normal dapat memproduksi cukup panas dalam lingkungan termal yang optimis (Lockhart & Saputra.2014).

g. Sistem ginjal

Walaupun ginjal sangat penting dalam kehidupan janin, muatannya terbilang kecil hingga setelah lahir. Urine bayi encer, berwarna kekuning-kuningan, dan tidak berbau. Warna cokelat dapat disebabkan oleh lendir

bebas memberan mukosa dan udara asam dan akan hilang setelah bayi banyak minum (M.K.Rochmah dkk .2012).

h. Sistem imun

- 1) Sistem imun neonatus terutama tergantung pada tiga jenis imunoglobulin (Ig) yaitu Ig G, Ig M dan Ig A.
- 2) Ig G yaitu imunoglobulin yang di transfer lewat plasenta akan memberikan antibodi kepada neonatus untuk melawan agen bakteri dan virus.
- 3) Janin mensintesis Ig M pada kehamilan minggu ke-20.
- 4) IgA tidak terdeteksi pada saat lahir, IgA tidak menyebrangi plasenta. Neonatus memiliki pertahanan tubuh yang rapuh terhadap infeksi (Lockhart & saputra.2014).

i. Sistem neurologi

- 1) Fungsi neurologik secara umum akan terlihat lewat gerakan neonatus.
- 2) Gerakan neonatus masih belum terkoordinasi dan memiliki kontrol yang buruk; keadaan ini menunjukkan imaturitas pada sistem neurologik neonatus.
- 3) Neonatus akan memperlihatkan sejumlah refleksi primitif yang akan menghilang ketika memasuki periode infant dan refleksi ini akan digantikan oleh aktivitas.
- 4) Sistem neurologik neonatus yang aterm harus menghasilkan kekuatan yang sama dan kesimetrisan dalam hal respon serta refleksnya.

- 5) Berkurangnya atau tidak adanya refleks dapat menunjukkan suatu permasalahan neurologik yang serius, dan respons yang asimetris (M.K.Rochmah dkk. 2012).

## **B. Tinjauan Khusus Asfiksia**

### **1. Pengertian Asfiksia**

Asfiksia adalah suatu keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur yang ditandai dengan hipoksemia dan asidosis. Asfiksia neonatorum merupakan suatu keadaan pada bayi baru lahir yang mengalami gagal bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, sehingga bayi tidak dapat memasukan oksigen dan tidak dapat mengeluarkan zat asam arang dari tubuhnya, Asfiksia dapat terjadi karena kurangnya kemampuan organ pernapasan bayi dalam menjalankan fungsinya, seperti pengembangan paru-paru (Karlina dkk .2016).

#### **a. Klasifikasi asfiksia:**

Klasifikasi asfiksia berdasarkan APGAR :

- 1) Asfiksia berat dengan nilai APGAR 0-3.
- 2) Asfiksia sedang dengan nilai APGAR 4-6.
- 3) Asfiksia ringan dengan nilai APGAR 7-9. (Ghai 2010 dalam Maryunani dan Sari.2013).

Apgar score merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengkaji kesehatan neonatus dalam menit pertama setelah lahir sampai 5 menit setelah lahir serta dapat diulang pada menit ke 10-15. Nilai apgar merupakan standar

evaluasi neonatus dan dijadikan sebagai data dasar untuk evaluasi dikemudian hari (Wahyuni 2012 dalam Karlina dkk. 2016).

#### Prosedur penilaian APGAR

1. Pastikan pencahayaan baik
2. Catat waktu kelahiran, Nilai apgar pada 1 menit pertama dengan cepat, jumlahkan hasilnya.
3. Lakukan tindakan dengan cepat dan tepat sesuai hasilnya.
4. Ulangi pada menit ke 5
5. Ulangi pada menit ke 10
6. Dokumentasikan hasil dan lakukan tindakan yang sesuai (Syafrudin, dkk. 2011).

Aspek Pemantauan Bayi baru lahir	Skor		
	0	1	2
Appearance / Warna kulit	Seluruh tubuh bayi berwarna kebiruan.	Warna kulit tubuh merah mudah tetapi tangan dan kaki berwarna kebiruan.	Warna kulit seluruh tubuh merah mudah
Pulse / Denyut jantung	Tidak ada	< 100x/ menit	>100x/ menit
Grimace/ Respon refleks	Tidak ada	Wajah menringis saat di stimulasi	Menangis, bersin

			saat di stimulasi
Activity	Tidak ada gerakan	Lengan dan kaki dalam posisi fleksi dengan sedikit gerakan	Bergerak aktif dan spontan
Respiratory/ pernapasan	Tidak ada	Menangis lemah, tidak teratur	Menangis kuat, baik dan teratur

(Walyani & Porwoastuti.2014)

b. Etiologi asfiksia

Beberapa faktor yang diketahui dapat menyebabkan terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor Ibu.
  - a) Partus lama atau partus macet.
  - b) Demam pada saat persalinan.
  - c) Infeksi berat (malaria, sifilis, TBC, HIV).
  - d) Kehamilan postmatur (setelah usia kehamilan 42 minggu)
- 2) Faktor Tali Pusat

Faktor yang dapat menyebabkan penurunan sirkulasi utero plasenter yang dapat mengakibatkan menurunnya pasokan oksigen ke bayi sehingga dapat menyebabkan asfiksia pada bayi baru lahir.

- a) Lilitan tali pusat.
  - b) Tali pusat pendek.
  - c) Simpul tali pusat.
- 3) Faktor Bayi

Asfiksia dapat terjadi didahului dengan tanda gejala gawat janin. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor berikut ini :

- a) Bayi prematur (sebelum 37 minggu kehamilan).
- b) Persalinan dengan tindakan (sungsang, bayi kembar, distosia bahu).
- c) Kelainan dan air ketuban bercampur mekonium.

Penolong persalinan harus mengetahui faktor resiko terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir. Apabila ditemukan adanya faktor resiko, maka penolong persalinan harus mempersiapkan tindakan antisipasi untuk mengatasi kemungkinan perlunya tindakan resusitasi (Karlina dkk. 2016).

c. Patofisiologi Asfiksia

Kondisi patofisiologi yang menyebabkan asfiksia meliputi, kurangnya oksigenasi sel, retensi karbon dioksida berlebihan dan asidosis metabolik. Kombinasi ketiga peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan sel dan lingkungan biokimia yang tidak cocok dengan kehidupan. Patofisiologi asfiksia neonatorum dapat dijelaskan dalam dua tahap yaitu dengan mengetahui cara bayi memperoleh oksigen sebelum dan sesudah lahir (Karlina dkk. 2016).

- 1) Cara bayi memperoleh oksigen sebelum dan sesudah lahir
  - a). Sebelum lahir

Paru janin tidak berfungsi sebagai sumber oksigen atau jalan untuk mengeluarkan karbondioksida. Pembuluh arteriol yang ada di dalam paru janin dalam keadaan konstruksi sehingga tekanan oksigen parsial rendah. Hampir seluruh darah dialirkan dari jantung kanan tidak dapat melalui paru karena kontraksi pembuluh darah janin, sehingga darah dialirkan melalui pembuluh darah yang bertekanan rendah yaitu duktus arteriosus kemudian ke aorta (Karlina, .2016).

b). Setelah Lahir

Bayi akan segera bergantung kepada paru-paru sebagai sumber oksigen utama. Cairan yang mengisi alveoli akan diserap ke dalam jaringan paru, dan alveoli akan berisi udara. Pengisian alveoli oleh udara akan memungkinkan oksigen mengalir ke dalam pembuluh darah di sekitar alveoli (Maryunani & Sari. 2013).

Arteri dan vena umbilikal is akan menutup sehingga menurunkan tahanan pada sirkulasi plasenta dan meningkatkan tekanan darah sistemik. Akibat tekanan udara dan peningkatan kadar oksigen di alveoli, pembuluh darah paru akan mengalami relaksasi sehingga tahanan terhadap aliran darah berkurang (Karlina dkk.2016).

Keadaan relaksasi tersebut dan peningkatan tekanan darah sistemik, menyebabkan tekanan pada arteri pulmonalis lebih rendah di bandingkan tekanan sistemik sehingga aliran darah paru meningkat sedangkan aliran pada duktus arteriosus menurun (Maryunani & Sari.2013).

#### c). Komplikasi

Asfiksia neonatorum dapat menyebabkan komplikasi pasca hipoksia. Pada keadaan hipoksia akut akan terjadi redistribusi aliran darah sehingga organ vital seperti otak, jantung, akan mendapatkan aliran yang lebih banyak di bandingkan organ lain. Perubahan pada redistribusi aliran terjadi karena penurunan resistensi vaskular pembuluh darah otak dan jantung serta meningkatnya resistensi vaskular di perifer (Karlina dkk.2016).

##### 1). Komplikasi jangka pendek

Meskipun bayi sudah mulai bernafas teratur mungkin bayi bisa menangis. Bila bayi baru lahir tidak segera bernafas selama 5-6 menit dapat menyebabkan hipoksia otak (keterlambatan menangis) (Nanny,2014 dalam Karlina dkk. 2016).

##### 2). Komplikasi jangka panjang

Pada jangka panjang kasus asfiksia bila apneu selama 30 menit dapat menyebabkan cedera otak

dan bila selama 2 jam dapat menyebabkan kerusakan cranial. Penurunan frekuensi jantung dan tekanan darah, dan bayi tidak kunjung bernafas maka bayi akan mengalami kematian (Nanny,2014 dalam Karlina dkk. 2016).

#### d. Penanganan

Sebelum bidan memutuskan untuk dilakukan resusitasi, maka perlu ada identifikasi dari bayi yang didasarkan pada kondisi bayi yang trauma, asfiksia janin, dan syok. Berdasarkan adanya kemungkinan faktor-faktor inilah, maka bidan seharusnya mempersiapkan yang maksimal terhadap kelahiran bayi, diantaranya, tempat kondusif untuk melakukan resusitasi, peralatan dan obat-obatan yang selalu dalam keadaan siap pakai (Karlina dkk.2016 ).

Prinsip penatalaksanaan asfiksia sebagai berikut :

##### a) Pengaturan Suhu

Segera setelah lahir, badan dan kepala neonatus hendaknya dikeringkan seluruhnya dengan kain hangat, Kemudian bayi diletakkan telanjang di bawah alat/lampu pemanas radiasi atau pada tubuh ibunya. Bayi dan ibu sebaiknya di selimuti dengan baik, namun harus diperhatikan pula agar tidak terjadi pemanasan yang berlebihan pada tubuh bayi (Jenny J.S. 2013:180).

## b) Tindakan A-B-C-D

*Airway* : Membersihkan jalan napas.

*Breathing* : Mengusahakan pernapasan.

*Circulation* : Memperbaiki sirkulasi tubuh.

*Drug* : Memberikan obat.

## c) Memastikan Saluran nafas terbuka

- 1) Meletakkan bayi dalam posisi kepala defleksi, bahu di ganjal.
- 2) Menghisap mulut, hidung, trakea.
- 3) Bila perlu, pipa ET dimasukkan untuk memastikan saluran pernapasan terbuka.

## d) Memulai Pernapasan

- 1) Memakai rangsangan taktil untuk memulai pernapasan.
- 2) Memakai VTP bila perlu, seperti sungkup dan balon, pipa ET dan balon, mulut ke mulut (dengan penghindaran paparan infeksi).

- e) Mempertahankan sirkulasi darah
  - 1) Kompresi dada.



- 2) Pengobatan.

(Sondakh .2013).

## 2. Resusitasi

Resusitasi adalah segala usaha untuk mengembalikan fungsi system pernafasan, peredaran darah dan otak yang terhenti atau terganggu sedemikian rupa agar kembali normal seperti semula. Keberhasilan resusitasi bayi baru lahir didasarkan dengan antisipasi controllingkungan, pengkajian, stimulasi, ventilasi efektif,, dan yang jarang, kompresi jantung, intubasi, dan pemberian obat (Karlina dkk. 2016).

### a. Prinsip dasar resusitasi

Beberapa prinsip dasar pelaksanaan resusitasi :

- 1) Memberikan lingkungan yang baik dan mengushakan saluran pernapasan.
- 2) Memberikan bantuan pernapasan secara aktif.

- 3) Melakukan koreksi terhadap asidosis.
- 4) Menjaga agar darah tetap baik.

b. Persiapan resusitasi pada bayi baru lahir

1) Persiapan keluarga

Menurut Nanny (2014) mengemukakan bahwa cara penyampaian dengan keluarga harus dengan kata-kata yang dijaga supaya tidak menimbulkan kepanikan, tetapi juga jangan memberikan harapan kosong (Karlina dkk. 2013).

a. Persiapan tempat resusitasi

- 1) Gunakan ruang yang terang.
- 2) Tempat resusitasi hendaknya datar, keras, rata, bersig, kering, dan hangat.
- 3) Dekat pancaran panas (lampu 60 watt dengan jarak dari lampu ke bayi 60cm).
- 4) Tidak berangin (jendela dan pintu yang terbuka), dekat tabung oksigen.
- 5) Jauh dari api (Karlina dkk. 2016).

b. Persiapan diri (penolong)

Pakailah alat pelindung diri untuk melindungi dari kemungkinan infeksi dengan cara :

- 1) Memakai alat perlindungan diri pada persalinan (celemek plastik, masker, penutup kepala, kacamata, sepatu penutup).
- 2) Lepaskan perhiasan, cincin, jam tangan, sebelum cuci tangan.

3) Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau campuran alkohol, keringkan dengan handuk bersih.

4) Gunakan sarung tangan sebelum menolong (Karlina dkk. 2016).

c. Perlengkapan dan Peralatan Resusitasi

1) Perlengkapan Resusitasi.

2) Suction karet.

3) Suction dan selang mekanis.

4) Kateter suction, 5F atau 6F, 8F, 10F, atau 12F.

5) Selang pemberian makan 8F dan spuit 20 ml.

6) Aspirator mekonium.

7) Peralatan Kantong dan Masker.

8) Bag resusitasi neonatus dengan katup pelepasan tekanan atau manometer tekanan, bag tersebut harus mampu mengalirkan 90-100% oksigen.

9) Masker wajah, dengan ukuran bayi baru lahir dan ukuran bayi prematur.

10) Oksigen dengan pengukuran aliran (kecepatan aliran sampai 10 L/menit) (Sondakh.2013)

d. Peralatan Intubasi

1) Laringoskopi dengan bilah lurus, nomor 0 (bayi kurang bulan) dan nomor 1 (bayi cukup bulan).

2) Bola lampu dan baterai tambahan untuk laringoskopi.

3) Selang endotrakea, dengan diameter internal 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm.

- 4) Stylet (pilihan).
  - 5) Gunting.
  - 6) Plester atau alat fiksasi untuk endotrakea.
  - 7) Spons alkohol.
  - 8) Detektor karbondioksida (pilihan).
  - 9) Jalan napas buatan berupa masker laringeal (pilihan).
  - 10) Obat – obatan
    - a) Epineprin 1:10.000 (0.1 mg/mL) dalam ampul 3 mL atau 10 mL.
    - b) Kristaloid isotonik (salin normal, ringer laktat) untuk mengekspansi volume 100 atau 250 mL.
    - c) Natrium bikarbonat 4.2% (5 mEq/10 mL) di dalam ampul 10 mL.
    - d) Nalokson hidroklorida 0.4 mg/mL dala ampul 1 mL atau 1.0 mg/mL dalam ampul 2 mL.
    - e) Dekstrosa 10%, 250 ml.
    - f) Salin normal untuk membilas.
    - g) Selang pemberian makan (pilihan) (Jenny J.S. 2013:181).
- e. Lain – Lain
- 1) Sarung tangan dan pelindung diri yang dibutuhkan.
  - 2) Lampu penghangat.
  - 3) Permukaan resusitasi yang padat dan berbantalan.
  - 4) Jam .

- 5) Linen yang di hangatkan.
- 6) Stetoskop.
- 7) Monitor jantung dan oksimetri elektroda atau oksimetri nadi dan probe.
- 8) Jalan napas buatan orofaring(ukuran 0. 00. 000. Atau panjang 30, 40, 50 mm) (Sondakh.2013).

f. Prosedur pelaksanaan resusitasi

Sebelum melakukan langkah awal

- 1) Beritahu ibu dan keluarganya bahwa bayinya memerlukan bantuan untuk memulai bernapas.
- 2) Minta keluarga mendampingi ibu (memberi dukungan moral, menjaga dan melaporkan kepada penolong apabila terjadi perdarahan) (Nanny. 2014 dalam Karlina dkk. 2016).
- 3) Langkah Awal (dilakukan dalam 30 detik)
  - a) Jaga Bayi tetap hangat.
  - b) Letakkan bayi di atas kain yang ada di atas perut ibu atau dekat perineum.
  - c) Selimuti bayi dengan kain tersebut.
  - d) Pindahkan bayi ke atas kain ke tempat resusitasi.
- 4) Atur posisi bayi

Biarkan bayi terlentang dengan kepala di dekat penolong.

  - a) Isap lendir

Gunakan alat penghisap lendir DeeLe atau bola karet.

- b) Isap lendir mulai dari mulut dulu, kemudian dari hidung.
- c) Lakukan penghisapan saat alat penghisap ditarik keluar, tidak pada saat memasukkan.
- d) Jangan lakukan penghisapan terlalu dalam (jangan lebih dari 5cm ke dalam mulut atau lebih dari 3cm ke dalam hidung) karena dapat menyebabkan denyut jantung bayi menjadi lambat atau bayi tiba-tiba berhenti bernapas.

Apabila penghisapan dilakukan dengan balon karet lakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Tekan bola air di luar mulut.
  - b) Masukkan ujung penghisap di rongga mulut dan lepaskan (lendir akan terhisap).
  - c) Untuk hidung masukkan ke lubang hidung (Sondakh. 2013).
- 5) Mengeringkan dan merangsang bayi
- a) Kerangkan bayi mulai dari wajah, kepala, dan bagian tubuh lainnya dengan sedikit tekanan. Rangsangan ini dapat membantu BBL mulai bernapas.
  - b) Lakukan rangsangan taktil dengan beberapa cara dibawah ini
    - 1) Menepuk atau menyentil telapak kaki.
    - 2) Menggosok punggung/perut/dada/tungai bayi dengan telapak tangan.

- 6) Mengatur Kembali Posisi kepala dan selimuti bayi
  - a) Ganti kain yang telah basah dengan kain kering di bawahnya.
  - b) Selimuti bayi dengan kain kering tersebut jangan menutupi muka agar bisa memantau pernapasan bayi.
  - c) Atur kembali posisi kepala bayi sehingga kepala sedikit ekstensi.
- 7) Melakukan penilaian bayi

Lakukan penilaian apakah bayi bernapas normal, tidak bernapas, atau megap-megap.

  - a) Bila bayi bernapas normal, lakukan asuhan pascaresusitasi.
  - b) Bila bayi megap-megap atau tidak bernapas, mulai lakukan ventilasi bayi (Sondakh. 2013).

### **3. Ventilasi**

Ventilasi adalah tahapan tindakan resusitasi untuk memasukan sejumlah volume udara ke dalam paru dengan tekanan positif untuk membuka alveoli paru agar bayi bisa bernapas spontan dan teratur. Langkah – langkah ventilasi adalah sebagai berikut :

- a. Pasang sungkup

Pasang dan pegang sungkup agar menutupi dagu, mulut, dan hidung.

- b. Ventilasi 2 kali

- 1) Lakukan tiupan atau pemompaan dengan tekanan 30cm air

Tiupan awal tabung sungkup atau pemompaan awal balon sungkup sangat penting untuk membuka alveoli paru agar bayi bisa mulai bernapas dan menguji apakah jalan napas bayi terbuka.

2) Lihat apakah dada bayi mengembang

Saat melakukan tiupan/pemompaan, perhatikan apakah dada bayi mengembang dan bila tidak mengembang :

- a) Periksa posisi sungkup dan pastikan tidak ada udara yang bocor.
- b) Periksa posisi kepala, pastikan posisi sudah benar.
- c) Periksa cairan atau lendir di mulut. Bila ada lendir atau cairan lakukan penghisapan.
- d) Lakukan tiupan 2 kali dengan tekanan 30 cm air ( ulangan), bila dada mengembang, lakukan tahap berikutnya (Sondakh. 2013).

3) Ventilasi 20 kali dalam 30 menit

Lakukan tiupan dengan tabung dan sungkup atau pemompaan dengan balon dan sungkup sebanyak 20 kali dalam 30 detik dengan tekanan 20 cm air sampai bayi mulai menangis dan bernapas spontan.

- a) Pastikan dada mengembang saat dilakukan peniupan atau pemompaan setelah 30 detik, lakukan penilaian ulang napas.

- b) Jika bayi mulai bernapas spontan atau menangis, hentikan ventilasi secara bertahap.
  - c) Lihat dada, apakah ada retraksi dinding dada bawah.
  - d) Hitung frekuensi napas per menit, dengan cara jika bernapas >40 per menit dan tidak ada retraksi berat ( jangan ventilasi lagi), letakkan bayi dengan kontak kulit ke kulit pada dada ibu dan lanjutkan asuhan BBL), jika bayi megap-megap atau tidak bernapas, lanjutkan ventilasi (Sondakh.2013).
- 4) Ventilasi setiap 30 detik
- a) Hentikan dan lakukan penilaian ulang napas.
  - b) Lanjutkan ventilasi 20 kali dalam 30 menit (dengan tekanan 20 cm air).
  - c) Hentikan ventilasi setiap 30 detik, lakukan penilaian apakah bayi bernapas, tidak bernapas atau megap- megap. (jika bayi megap-megap atau tidak bernapas teruskan ventilasi 20 kali dalam 30 detik kemudian lakukan penilaian ulang napas setiap 30 detik).
- 5) Menyiapkan rujukan
- a) Jika bayi belum bernapas spontan sesudah 2 menit resusitasi.
  - b) Jelaskan pada ibu apa yang terjadi, apa yang anda lakukan dan mengapa.
  - c) Mintahlah ke;luarga untuk mempersiapkan rujukan.
  - d) Teruskan ventilasi selama mempersiapkan rujukan.

- 6) Catat keadaan bayi pada formulir rujukan dan rekam medik persalinan.
- 7) Melanjutkan ventilasi sambil memeriksa denyut jantung bayi  
Bila dipastikan denyut jantung bayi tidak terdengar dan pulsasi tali pusat tidak teraba, lanjutkan ventilasi selama 10 menit. Hentikan resusitasi, jika denyut jantung tetap tidak terdengar dan pulsasi tali pusat tidak teraba. Jelaskan pada ibu perihal dukungan kepadanya, serta keluarga lakukan pencatatan bayi yang mengalami asistole selama 10 menit, kemungkinan besar mengalami kerusakan otak permanen (Sondakh. 2013).

#### **4. Asuhan Pasca Resusitasi**

Asuhan pasca resusitasi diberikan dengan keadaan bayi setelah menerima tindakan resusitasi. Setelah tindakan resusitasi, diperlukan asuhan pasca resusitasi yang merupakan perawatan intensif selama 2 jam pertama. Penting sekali pada tahap ini dilakukan konseling, asuhan bayi baru lahir dan pemantauan secara intensif yaitu sebagai berikut :

##### **a. Resusitasi berhasil**

Resusitasi berhasil jika bayi menangis dan bernafas normal sesudah langkah awal atau sesudah ventilasi. Ajari ibu dan keluarga untuk membantu bidan menilai keadaan bayi. Jelaskan pada ibu mengenai pemantauan bayi baru lahir dan bagaimana memperoleh pertolongan segera bila bayi mengalami masalah. Pantau tanda-tanda bahaya bayi, seperti adanya tanda-tanda tidak dapat menyusu, kejang,

mengantuk atau tidak sadar, napas cepat ( lebih dari 60 per menit), merintih, retraksi dinding dada bawah, sianosis sentral (Sondakh. 2013).

b. Jika perlu rujukan

Jika resusitasi belum berhasil atau kurang berhasil, maka bayi perlu rujukan, yaitu jika sesudah resusitasi 2 menit, bayi belum bernafas atau mengap-megap. Rujuk segera bila terdapat salah satu tanda bahaya tersebut. Sebelum dirujuk, lakukan tindakan prarujukan berikut :

- 1) Pemantauan dan perawatan tali pusat.
- 2) Bila napas bayi dan warna kulit normal, berikan bayi kepada ibunya.
- 3) Pencegahan hipotermi.
- 4) Pemberian vit K.
- 5) Pemeriksaan fisik.

c. Resusitasi tidak berhasil

Resusitasi tidak berhasil jika setelah 10 menit sesudah resusitasi bayi tetap tidak bernapas dan tidak ada denyutan jantung. Tindakan berikutnya adalah bidan melakukan pencatatan dan pelaporan (Sondakh. 2013).

### C. Tinjauan Islam Tentang Bayi Baru Lahir

Islam adalah agama yang istimewa, karena memperhatikan proses kehidupan manusia dari saat penciptaannya sampai dia wafat, di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang proses kehidupan manusia pada saat masa tersebut manusia juga mendapat gangguan, gangguan ini berupa sakit, salah satu yang terjadi pada bayi adalah asfiksia.

#### a. Surah yang menjelaskan tentang asfiksia

Asfiksia neonatorum merupakan suatu keadaan pada bayi baru lahir yang mengalami gagal bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Qiyaamah/75:26-30 :

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۖ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۖ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۖ وَالنَّفْسُ  
السَّاقُ بِالسَّاقِ ۖ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۖ ٣٠

Terjemahnya:

”Sekali-kali jangan. Apabila napas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan, dan dikatakan (kepadanya), "Siapakah yang dapat menyembuhkan?" Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan (dengan dunia), dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan), kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau”.(Burhanudin H.N. 2012).

Pada kerongkongan ada saluran untuk pernapasan dan makanan, ayat diatas tidak detail menjelaskan tentang bayi tapi menjelaskan secara umum ketika seseorang susah bernapas dan telah sampai kekerongkongan

sehingga merasa sesak dan tidak dapat menghirup udara, itulah yang terjadi pada bayi yang mengalami asfiksia.

Terdapat beberapa faktor penyebab asfiksia neonatorum salah satunya adalah faktor ibu . Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- Ahqaf 46:15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً  
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ  
 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ  
 وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

”Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.

Seperti yang dijelaskan pada ayat tersebut bahwa betapa susahnya ibu mengandung dan susah payah melahirkan, dan menurut saya betapa susahnya ibu mengandung selama 9 bulan dan selama kehamilan tersebut ibu akan mengalami komplikasi yang akan membahayakan ibu dan bayi,

dimana salah satunya adalah asfiksia, sehingga di turunkannya ayat tersebut untuk kita selalu berbuat baik dan menghormati orang tua kita.

Tidak semua bayi lahir normal ada bayi yang lahir dengan kelainan seperti kebutaan, tuli, atau kelainan lainnya, dan sikap orang tua akan di warnai oleh kekecewaan dan kegelisahan mengenai normal tidaknya bayi tersebut, sehingga orang tua harus siap menerima keadaan bayi yang di lahirkan ( Saleha. 2013).

b. Pentingnya pemberian nama pada bayi baru lahir.

Nama adalah ciri atau tanda, maksudnya adalah orang di beri nama dapat mengenal dirinya atau di kenal oleh orang lain.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Maryam 19:7


يُنزِكُنَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ  
سَمِيًّا

Terjemahannya :

“Hai zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”.

Dan hakikat pemberian nama kepada anak adalah agar ia dikenal serta bersepakat akan wajibnya memberi nama kepada anak laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu jika ada orang yang tidak di beri nama maka dia menjadi orang yang *mahjul* (tidak di kenal) oleh masyarakat (Abu muhammad abdurrahman sarijan. 2007).

Dari faktor penyebab terjadinya asfiksia, salah satunya yaitu faktor ibu, di mana ketika ibu tidak dapat menjaga kesehatan dengan baik, maka hal tersebut juga dapat berpengaruh ke ibu dan janin, seperti yang sudah di jelaskan di dalam Q.S Al Baqarah 1:195



Terjemahnya :

“ Dan Infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah sungguh allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Pada ayat tersebut di jalesakan untuk jangan jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan, maksud dari ayat tersebut bahwa kepada orang-orang yang tidak bisa menjaga kesehatan dengan baik karena orang-orang yang tidak bisa menjaga kesehatan termasuk dalam golongan orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan, sebab dia tidak mensyukuri nikmat sehat yang telah allah berikan, sebagaimana salah satu penyebab asfiksia pada bayi baru lahir yaitu bayi yang lahir premature atau bayi yang lahir <37 Minggu, dimana salah satu penyebab bayi mengalami premature yaitu ibu yang kekurangan gizi, hubungan dengan ayat tersebut adalah Ibu yang

kurang memperhatikan kesehatan bagi dirinya dan janin sehingga hal tersebut dapat membahayakan ibu dan janin.

#### **D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.**

##### a. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Bentuk pendekatan yang dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan dengan menggunakan metode pemecahan masalah. Proses manajemen adalah proses pemecahan masalah dengan menggunakan metode yang terorganisasi, meliputi pikiran dan tindakan dalam urutan yang logis untuk keuntungan pasien dan pemberian asuhan.

Manajemen Kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, temuan, keterampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk mengambil sebuah keputusan yang terfokus pada klien.

##### b. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

Varney mengatakan bahwa seorang bidan perlu lebih kritis melakukan analisis dalam menerapkan manajemen untuk mengantisipasi diagnosis dan masalah potensial.

Tujuh langkah manajemen kebidanan menurut *Helen Varney*.

###### a) Identifikasi Data Dasar

Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk evaluasi keadaan secara lengkap, menyeluruh dan fokus yaitu menanyakan riwayat kesehatan.

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara:

1) Anamnese, meliputi:

Melakukan Tanya jawab untuk memperoleh data meliputi: riwayat persalinan dan riwayat kesehatan. Pada bayi asfiksia dari hasil anamnesa bisa didapatkan dari riwayat kehamilan ibu dengan usia saat hamil, riwayat persalinan, serta pengetahuan pasien. Pada hasil anamnesa akan didapatkan kemungkinan bayi akan mengalami asfiksia. Tahap ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya, sehingga data yang di dapatkan harus sesuai data subjektif, objektif, dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi yang di alami klien.

2) Pemeriksaan fisik

Keadaan umum bayi, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik seperti tidak bernapas atau napas megap-megap atau pernafasan lambat (kurang dari 30 kali permenit), Pernafasan tidak teratur, dengkur atau retraksi (pelekukan dada), tangisan lemah atau merintih, warna kulit pucat atau biru, tonus otot lemah atau ekstremitas terkulai, denyut jantung tidak ada atau lambat (bradikardia) kurang dari 100 kali per menit), dan dilakukan pemeriksaan penunjang bila perlu. Tahap ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapan data yang sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan proses

interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga dalam pendekatan ini harus komprehensif meliputi data subjektif, objektif dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi atau masukan klien yang sebenarnya.

b) Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual

Pada langkah ini identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah kebutuhan klien berdasarkan interpretasi atas data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah dan diagnosa. Keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat terselesaikan, tetapi sudah membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien.

Masalah asfiksia yang didapatkan dengan adanya tanda gejala: Tidak bernapas atau napas megap-megap atau pernafasan lambat (kurang dari 30 kali per menit), Pernafasan tidak teratur, dengkur atau retraksi (pelekukan dada), tangisan lemah atau merinti, warna kulit pucat atau biru, tonus otot lemas atau ekstremitas terkulai, denyut jantung tidak ada atau lambat (bradikardia) kurang dari 100 kali per menit).

## APGAR Score

Nilai	0	1	2
Warna kulit	Biru atau pucat	Tubuh merah dan ekstrmitas biru	Seluruh tubuh merah
Denyut jantung	Tidak ada	< 100	>100
Gerakan / tonus otot	Tidak ada	Sedikit fleksi	Fleksi
Refleks	Tidak ada	Lemah/lambat	Kuat
Pernafasan	Tidak ada	Tidak teratur	Teratur


## c) Identifikasi Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain, yang berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman.

Masalah yang bisa timbul yaitu dapat mengakibatkan hipoksian dan iskemik otak yang berakibat terjadinya edema otak, hal ini juga dapat menimbulkan perdarahan otak.

## d) Tindakan Segera

Mengeidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan untuk dikonsultasikan atau di tangani bersama anggota kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.



Sumber: Titamedia Wordpress

## e) Rencana Tindakan Asuhan yang menyeluruh

Rencana untuk pemecahan masalah dibagi menjadi tujuan, rencana pelaksanaan dan evaluasi. Rencana ini disusun berdasarkan kondisi klien (diagnosa, masalah dan diagnosa potensial) berkaitan dengan semua aspek asuhan kebidanan. Rencana dibuat harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori

yang terkini serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien. Adapun penatalaksanaan pada kasus asfiksia dengan tahapan –tahapan yang dikenal sebagai ABC resusitasi yaitu:

- 1) Pastikan saluran terbuka: Meletakkan bayi dalam posisi kepala defleksi bahu diganjal 2-3 cm. Menghisap mulut, hidung, dan kadang trachea. Bila perlu masukkan pipa endo trachel (pipa ET) untuk memastikan saluran pernapasan terbuka.
- 2) Memulai pernapasan: Memakai rangsangan taksil untuk memulai pernapasan memakai VTP bila perlu seperti: sungkup dan balon pipa ET dan balon atau mulut ke mulut (hindari paparan infeksi).
- 3) Mempertahankan sirkulasi: Rangsangan dan pertahankan sirkulasi darah dengan cara–kompresi dada.

f) Pelaksanaan (Implementasi)

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan, klien, keluarga klien, dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Bidan harus melaksanakan implementasi yang efisien terhadap waktu, biaya dan kualitas pelayanan.

Tahapan–tahapan yang dikenal sebagai ABC resusitasi yaitu:

- 1) Pastikan saluran terbuka: Meletakkan bayi dalam posisi kepala defleksi bahu diganjal 2-3 cm. Menghisap mulut, hidung, dan

kadang trachea. Bila perlu masukkan pipa endo trachel (pipa ET) untuk memastikan saluran pernapasan terbuka.

- 2) Memulai pernapasan: Memakai rangsangan taksil untuk memulainya pernapasan memakai VTP bila perlu seperti: sungkup dan balon pipa ET dan balon atau mulut ke mulut (hindari paparan infeksi).
- 3) Mempertahankan sirkulasi: Rangsangan dan pertahankan sirkulasi darah dengan cara-kompresi dada.

g) Evaluasi

Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi keefektifan asuhan yang diberikan. Hasil evaluasi dapat menjadi data dasar untuk menegakkan diagnosa dan rencana selanjutnya. Yang di evaluasi adalah apakah diagnosa sesuai, rencana asuhan efektif, masalah teratasi, masalah telah berkurang, timbul masalah baru, dan kebutuhan telah terpenuhi. Di evaluasi sampai bayi pernafasan bayi kembali normal dan tidak ada masalah lainnya.

### BAB III

#### TELUSURAN *EVIDANCE BASED LEARNING*

##### A. Matriks Langkah I Identifikasi Data Dasar

###### Matriks Tanda Gejala dan dan Etiologi Asfiksia Neonatorum

	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Hubungan Usia Ibu dan dan Asfiksia Neonatorum dengan Kejadian Respiratory Distres Syndrome (RDS) Pada	Sri Wahyuni dan Ni Wayan Wiwin.	2020	Hubungan Usia ibu dengan kejadian asfiksia dan menjelaskan tanda gejala asfiksia.	Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara Asfiksia Neonatorum dengan kejadian Respiratory Distress Syndrome (RDS) dengan tanda gejala sebagai berikut.  Hipoksia, RR> 60	Melakukan observasi melalui lembar rekam medic.	Rancangan penelitian ini mengunakaa n bentuk Analitik yaitu cross sectional.	Penelitian yang di lakukan oleh Sri wahyuni dan Ni wayan wiwin (2020) terdapat perbandingan dengan penelitian yang di lakukan oleh Siti N.J. dkk, (2017).

	Neonatus di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.				x/mnt atau < 30 x/mnt, napas megap-megap/gasping sampai dapat terjadi henti napas, bradikardia, tonus otot berkurang, arna kulit sianotik/pucat.			
2.	Hubungan BBLR dengan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir.	Wahyu Utami Ekasari dan Dita Septiyanti Rahayu	2015	Hubungan BBLR dengan kejadian asfiksia dan tanda gejala terjadinya asfiksia.	BBLR cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan transisi akibat berbagai penurunan pada sistem pernapasan, diantaranya : penurunan jumlah alveoli fungsional,	Tidak di jelaskan berapa banyak sample yang di gunakan pada saat penelitian.	Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasi dan menggunakan desain penelitian cross sectional.	Penelitian yang di lakukan oleh Wahyu utami ekasari dkk (2015) sama dengan penelitian yang di lakukan oleh Ida bagus Wiadyana

					defisiensi kadar surfaktan, lumen pada sistem pernapasan lebih kecil, jalan napas lebih sering kolaps dan mengalami obstruksi, kapiler-kapiler paru mudah rusak dan tidak matur, otot pernapasan yang masih lemah sehingga sering terjadi apneu, asfiksia dan sindroma gangguan pernapasan.			(2018).
3.	Faktor-	Junita	2015	Faktor yang	Berdasarkan hasil	Tidak	Populasi	Penelitian ini

	<p>Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.</p>	<p>Caroline Gerungan, dkk.</p>		<p>berhubungan dengan kejadian asfiksia dan tanda gejala asfiksia.</p>	<p>penelitian yang dilakukan terdapat hubungan yang signifikan antara paritas, usia ibu, umur kehamilan dengan kejadian asfiksia neonatorum dengan tanda gejala sebagai berikut, bayi terlihat lemah, mengalami penurunan denyut jantung secara cepat, tubuh menjadi biru atau pucat dan refleks-refleks melemah</p>	<p>dijelaskan apa saja variabel penelitian yang akan dijeaskan pada pembahasan dan hasil.</p>	<p>adalah semua bayi penderita asfiksia neonatorum.</p>	<p>sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Mardiyaningrum (2014 )dan Arif Z. R, Kristiyanasari (2014).</p>
--	---	--------------------------------	--	--	--	---	---	--

					sampai menghilang.			
4.	Analisis Faktor Risiko Kejadian Asfiksia Bayi Baru Lahir di RSUD Wate.	Melania Wahyuningsih dan Anita Liliana.	2015	Analisis hubungan antara faktor kejadian asfiksia pada bayi baru lahir dan gejala asfiksia neonatorum.	Berdasarkan hasil penelitian ada hubungan antara umur ibu, umur kehamilan, jenis persalinan dan berat badan bayi dengan nilai apgar pada bayi baru lahir yang mengalami asfiksia neonatorum dengan gejala pernapasan lambat, relatif tidak memiliki reaksi terhadap	Jenis penelitian mengambil data sekunder dari rekam medic.	Pendekatan penelitian dengan cross sectional.	Terdapat persamaan dengan penelitian dari Yuanita Syaiful (2016).

					rangsangan dari luar dan dari dalam.			
5.	Hubungan Lilitan Tali Pusat, Partus Lama dan Plasenta Previa dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum.	Dina Ardyana dan Erma Puspita Sari.	2019	Hubungan Lilitan Tali Pusat, Partus Lama dan Plasenta Previa dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum dan etiologi terjadinya asfiksia neonatorum.	Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara Lilitan tali pusat, partus lama dan plasenta previa dengan kejadian asfiksia neonatorum. Karena lilitan tali pusat dapat menimbulkan bradikardi dan hipoksia janin. Jika lilitan tali pusat erat juga menyebabkan	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi.	Desain Penelitian ini menggunakan survey analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukarni dkk (2014).

					<p>gangguan (kompresi) pada pembuluh darah umbilical, dan bila berlangsung lama akan menyebabkan hipoksia janin yang mengakibatkan bayi mengalami asfiskia. Sama halnya dengan plasenta previa hal ini karena ibu yang mengalami plasenta previa dapat terjadi perdarahan yang menimbulkan</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					syok sehingga dapat mengganggu proses pertukaran O <sub>2</sub> dan CO <sub>2</sub> antara ibu dan janin yang dapat mengakibatkan janin mengalami hipoksia janin.			
6.	Risk Factors That Causes Asphyxia Neonatorum In Lotus Room Of Muna District Hospital In	Rosminah Mansyarif.	2019	Faktor resiko kejadian asfiksia dan tanda gejala asfiksia neonatorum.	Analisis dengan menggunakan Odds Ratio (OR) menunjukkan OR = 2,06. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa preeklamsia memiliki peluang	Tidak di jelaskan dengan rinci berapa banyak populasi yang di gunakan untuk melakukan penelitian.	Jenis penelitian analitik yang bersifat observasiona l dengan menggunakan rancangan Case Control Study .	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Soppo Henno.

	2016.				2,06 kali melahirkan bayi asfiksia dengan tanda-tanda klinis pada janin atau bayi yang mengalami asfiksia sebagai berikut, yaitu DJJ lebih dari 100x/menit atau kurang dari 100x/menit tidak teratur, mekonium dalam air ketuban pada janin letak kepala, tonus otot buruk karena kekurangan oksigen pada otak,			
--	-------	--	--	--	--	--	--	--

					otot, dan organ lain, bradikardi (penurunan frekuensi jantung) karena kekurangan oksigen pada otot-otot jantung atau sel-sel otak, tekanan darah rendah karena kekurangan oksigen pada otot jantung, kehilangan darah atau kekurangan aliran darah yang kembali ke darah.			
7.	Gambaran Kematian Neonatal di RSUD Dr. M.	Magdalena Paunno.	2019	Gambaran kematian neonatal,	Berdasarkan hasil penelitian kematian neonatal	Tidak di jelaskan berapa	Jenis penelitian menggunakan	Penelitian ini terdapat persamaan

	Haulussy Ambon.			<p>asfiksia neonatorum serta tanda gejala asfiksia.</p>	<p>akibat asfiksia sebanyak 15 neonatal (29,4%), yang dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu asfiksia berat 10 neonatal (66,6%) dan asfiksia sedang berjumlah 5 neonatal (33,3%). Dengan tanda dan gejala yang muncul pada asfiksia seperti Frekuensi jantung kecil, yaitu &lt;40kali per menit, tidak ada usaha nafas pada</p>	<p>banyak sample yang di gunakan untuk melakukan penelitian.</p>	<p>penelitian deskriptif.</p>	<p>dengan referensi lain.</p>
--	--------------------	--	--	---	---	--	-------------------------------	-------------------------------

					neonatal, Tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada, Bayi tidak dapat beraksi jika diberi rangsangan, Bayi tampak pucat bahkan sampai berwarna kelabu, terjadi kekurangan oksigen yang berlanjut.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.	Hubungan antara Preeklamsia dalam Kehamilan dengan Kejadian	Siti Nur Indah dan Ety Apriliana.	2016	Hubungan antara preeklampsia dengan kejadian asfiksia dan tanda gejala	Berdasarkan hasil penelitian preeklampsia dalam kehamilan pada ibu meningkatkan resiko terjadinya asfiksia pada	Tidak di jelaskan dengan jelas metode yang di lakukan saat penelitian.	Dijelaskan dengan jelas pengertian dan tanda gejala asfiksia neonatorum.	Terdapat persamaan dengan referensi lain.
----	---	-----------------------------------	------	--	---	--	--	---

	Asfiksia pada Bayi Baru Lahir.			asfiksia pada bayi baru lahir.	bayi baru lahir dengan tanda dan gejala asfiksia neonatorum yaitu bayi tidak bernafas atau bernafas megap –megap, warna kulit kebiruan, kejang dan penurunan kesadaran.			
9.	Hubungan Ketuban Pecah Dini (Kpd) Dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir Di Rsud Dr. H. Abdoel Moeloek Provinsi Lampung Tahun	Dewi Yuliasari.	2017	Hubungan KPD dengan kejadian asfiksia dan tanda gejala asfiksia.	Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara KPD dengan kejadian asfiksia dengan tanda dan gejala denyut jantung janin yang kurang.	Pendekatan cohort retrospektif Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin.	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.	Penelitian ini sejalan dengan penelitan lain dan penelitian yang di lakukan oleh suniarti (2015).

	2017.							
10.	Hubungan Prematuritas Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum.	Dika Ardiana dan Wafi Nur Muslihatun.	2016	Hubungan prematuritas dengan kejadian asfiksia.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan prematuritas dengan kejadian asfiksia neonatorum. Menit pertama pada bayi hal ini dibuktikan dengan hasil analisis uji Chi-square didapatkan-nilai $p= 0,000$ ( $p.O,Ot$ ). Nitai $p= 9,900$	Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional.	Penelitian ini menggunakan desain n desain cross sectional.	Tidak terdapat perbandingan dengan referensi lain.

					(p.O,Ot ) membuktiian bahwa ada hubungan yang bermakna antara prematurnitas dengan kejadian asfiksia neonatorum menit pertama pada bayi baru lahir.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

### B. Matriks Langkah 2 Identifikasi Masalah Aktual

N o	Judul	Nama	Tahu n	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandinga n
1.	Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kejadian	Annisa Khoiriah dan Tiara Pratiwi.	2019	Faktor yang mempengaruhi kejadian Asfiksia pada bayi baru	Dari hasil penelitian faktor ibu dan bayi yang berpengaruh	Tidak terdapat kelemahan dalam penelitian	Analisis ini dilakukan untuk mengetahui distribusi	Penelitian ini terdapat persamaan dengan beberapa

	Asfiksia pada Bayi Baru Lahir.			lahir.	terhadap kejadian asfiksia neonatorum yaitu anemia pada saat hamil, umur ibu <20 tahun dan >35 tahun, dan hipertensi pada saat hamil.	tersebut.	frekuensi dan presentase dari tiap variabel dependen (asfiksia pada bayi baru lahir) dan variabel independen.	penelitian lainnya.
2.	Risiko Asfiksia Neonatorun Berdasarkan Keadaan Air Ketuban di RDU Dr. H. Koesnadi tahun 2018.	Jenie Palupi, dkk	2018	Resiko asfiksia neonatorum.	Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa ibu bersalin yang melahirkan bayi dengan asfiksia disebabkan oleh keadaan air ketuban yang keruh. Pernafasan spontan pada bayi baru lahir bergantung pada kondisi janin saat masa kehamilan dan persalinan. Jika pertukaran	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin.	Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan air ketuban keruh dapat mempengaruhi terjadinya asfiksia neonatorum akibat dihirupnya mekonium ke paru-paru janin sehingga janin	Tidak ada pebandingan dengan penelitian lainnya.

					gas/pengangkutan oksigen selama kehamilan dan persalinan terganggu asfiksia yang lebih berat dapat terjadi.		mengalami hipoksia sehingga saat lahir bayi mengalami asfiksia.	
3.	Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di RS Muhammadiyah Gresik.	Yuanita Syaiful, Umi Khudzaifah .	2016	Kejadian asfiksia neonatorum.	Hasil analisa statistik dengan Spearman's Rho menunjukkan bahwa signifikan hasil hitung $\rho=0,014$ artinya ada hubungan antara kedua variabel lama persalinan dengan Kejadian Asfiksia pada bayi baru lahir dengan nilai $r =0,419$ yang berarti ada hubungan.	Populasi dalam penelitian ini adalah semua bayi baru lahir yang di diagnosa asfiksia neonatorum yang lahir dalam kurun waktu satu	Jenis penelitian adalah penelitian observasional analitik dengan rancangan atau desain studi kasus kontrol (case control study). Rancangan	Penelitian ini terdapat kesamaan dengan beberapa peneliti lainnya.

						bulan	penelitian ini bersifat retrospektif yaitu penyakit atau faktor risiko diidentifikasi dengan melihat catatan medic.	
4.	Hubungan Kehamilan Lewat Waktu dan Preeklampsia Berat (PEB) dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum.	P. Mandasari	2018	Kehaliman lewat waktu dan preeklampsia berat dengan kejadian asfiksia.	Hasil Penelitian tentang hubungan kehamilan lewat waktu dan preeklampsia berat dengan kejadian asfiksia, maka dapat disimpulkan, ada	Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu yang melahirkan .	Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data rekam medis di Rumah Sakit Umum	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh suryaningsih .

					hubungan antara kehamilan lewat waktu dengan kejadian asfiksia.		Daerah Kota Prabumulih.	
5.	Hubungan Berat Badan Lahir Risiko (<2500gr daqn >4000gr) dengan Asfiksia Neonatorum di RSD Mayjen HM Ryacudu Kota Bumi Lampung Utara tahun 2018.	Elfira Awalia Rahmawati dkk.	2018	Hubungan BBLR dengan asfiksia neonatorum di RSD Mayjen HM ryacudu lampung .	Hasil penelitian diketahui bahwa berat badan lahir risiko berhubungan dengan kejadian asfiksia dan memiliki nilai peluang untuk kejadian asfiksia sebanyak 2,2 kali lipat dibandingkan dengan berat badan lahir tidak risiko.	Populasi dalam penelitian ini adalah bayi yang lahir yaitu berjumlah 820 bayi.	Mampu mengetahui tingkat kejadian BBLR dengan Asfiksia neonatorum di RSD Mayjen HM Ryacudu Kota bumi Lampung.	Penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh rahmawati dan ningi pada tahun 2016.
6.	Hubungan Preeklampsia dengan	Andi Setiawan Tahang,	2017	Hubungan preeklampsia dengan	Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat oleh	Tidak terdapat kelemahan dalam	Pengambilan data dilakukan dengan	Penelitian ini terdapat persamaan

	Asfiksia di RSUD Kota Mataram tahun 2017.	dkk		kejadian asfiksia neonatorum.	peneliti, maka dilakukan uji statistik Chi Square menggunakan SPSS 16 dan diperoleh hasil nilai p adalah 0,008 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kedua variable yaitu preeklampsia dan asfiksia.	penelitian tersebut	penelusuran rekam medis pasien yang melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.	dengan penelitian yang di lakukan oleh suci dan sunarsih bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara preeklampsia dengan kejadian asfiksia.
7.	Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil Yang	Subriah.	2018	Hubungan anemia pada ibu hamil dengan	Hasil uji statistik dengan chi square diperoleh nilai $p = 0.000$ ( $p < 0,05$ ). Hal ini ini berarti ada	Tidak di jelaskan dengan rinci	Jenis penelitian Survey Analitik	Penelitian ini sejalan dengan penelitian

	Menjalani Persalinan Spontan Dengan Angka Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rsdkia Pertiwi Kota Makassar.			kejadian asfiksia neonatorum.	hubungan anemia pada ibu hamil yang menjalani persalinan spontan dengan angka kejadian asfiksia neonatorum.	berapa banyak populasi yang di butuhkan saat penelitian.	dengan rancangan Case Control.	yang di lakukan oleh Handini (2015) dan Muliawati (2015)
--	---	--	--	-------------------------------	---	--	--------------------------------	--

8.	Hubungan Ketuban Pecah Dini (KPD) dengan Kejadian Asfiksia.	Arifah Istiqomah, Yesi Astria.	2015	Hubungan KPD dengan kejadian asfiksia.	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kejadian KPD dengan kejadian asfiksia neonatorum.	Sampel. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan catatan rekam medis.	Populasi adalah ibu bersalin dengan KPD dan ibu bersalin normal, di RS Nurhidayah Bantul Yogyakarta tahun 2015.	Terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatkhiyah, azizah, dan Nova linda.
----	---	--------------------------------	------	--	---	---	---	---

9.	The Relationship Between Labor Premature Rupture of Membranes Asphyxia Neonatorum at Public Hospitas Gunungsitoli.	Nova Linda Rambe.	2018	Hubungan KPD dengan kejadian asfiksia neonatorum.	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tingkat signifikan nilai chi kuadrat ( $p < 0,005$ ). Hal ini secara statistik menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan antara ketuban pecah dini dengan kejadian asfiksia neonatorum.	Tidak terdapat kelemahan dalam penelitian tersebut.	Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan Kohort retrospektif, yaitu rancangan penelitian dengan mengolompokkan kelompok terpapar dan tidak terpapar kemudian dimaati, ada tidaknya fenomena dari suatu kejadian yang berhubungan dengan kejadian yang diteliti.	Terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatkhiyah dan azizah.
10.	Hubungan Paritas dan Berat Bayi	El Vina	2019	Hubungan paritas ibu dengan	Hasil uji statistik chi – square uji Chi-square diperoleh nilai	Jenis penelitian yang	Desain penelitian case control.	Hasil penelitian ini terdapat persamaan dengan

	<p>Lahir Rendah dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum pada Bayi Baru Lahir.</p> <p>Hubunga Asfikdia Neonatorum dan Fraktur Clavikula dengan Persalinan Pervaginam Letak Sungsang.</p>			<p>kejadian asfiksia neoantorum.</p>	<p>p (value) = 0,003 pada <math>\alpha = 0,05</math>. Karena nilai p (value) <math>0,003 &lt; 0,05</math> yang berarti menunjukkan ada pengaruh antara paritas dengan kejadian asfiksia neonatorum pada bayi baru lahir.</p>	<p>digunakan adalah studi analitik observasional.</p>		<p>penelitian yang dilakukan oleh Yuliana, Kusmiyati, gilang dkk.</p>
--	---	--	--	--------------------------------------	--	---	--	---

### C. Matriks Langkah III Masalah Potensial

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Hubungan Asfiksia Neonatorum Dengan Daya Reflek Sucking Pada Bayi Baru Lahir Di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.	Atika Rakhmahayu, dkk.	2020	Komplikasi yang terjadi pada bayi asfiksia.	Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan yang signifikan antara asfiksia neonatorum dengan daya reflek <i>sucking</i> pada bayi baru lahir. Analisis data menggunakan uji statistik SPSS for Windows 16.0 dengan uji Mann Whitney didapatkan hasil p sebesar 0.001. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang	Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional.	Teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling.	Tidak terdapat perbandingan dengan referensi lain.

					signifikan antara asfiksia neonatorum dengan daya reflek <i>sucking</i> pada bayi baru lahir.			
2.	Kejadian asfiksia dan perkembangan anak usia 6-24 bulan di rumah sakit Luwuk, Sulawesi Tengah.	Inaya Dg Taha, dkk.	2017	Komplikasi pada bayi dengan asfiksia.	Uji koefisien kontingensi menunjukkan terdapat hubungan antara bayi asfiksia neonatorum dengan perkembangan bayi usia 3-6 bulan yang mengalami perkembangan yang menyimpang.	Penelitian ini merupakan analitik <i>observasional</i> .	Pada penelitian ini di lakukan pendekatan <i>cross sectional</i>	Tidak terdapat perbandingan dengan referensi lain.

3.	Hubungan sepsis neonatorum, BBLR dan asfiksia dengan kejadian ikterus pada bayi baru lahir.	Susi Widiawati.	2017	Komplikasi yang terjadi pada bayi dengan asfiksia.	Hubungan asfiksia dengan kejadian ikterus didapatkan sebanyak 49 bayi (75,4%) mengalami asfiksia, dan hasil uji statistic didapatkan nilai OR sebesar 4,900, nilai p-value=0,000, artinya bayi yang mengalami asfiksia memiliki risiko 4,900 kali terjadi ikterus neonatorum dibandingkan dengan bayi yang tidak mengalami asfiksia.	Populasi kontrol sebanyak 167 bayi yang tidak terdiagnosa ikterus.	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan case control.	Tidak terdapat perbandingan dengan referensi lain.
4.	Kadar Neuron-Specific Enolase Serum dan	Agus Wijata, dkk.	2016	Komplikasi asfiksia neonatorum .	Dari hasil penelitsn di dapatkan hasil rerata kadar NSE serum pada	Metode penelitian yang di gunakan	Sampel penelitian adalah bayi dengan	Tidak terdapat perbandingan dengan

	Derajat Encefalopati Hipoksik Iskemik pada Asfiksia Neonatorum.				<p>bayi dengan EHI derajat 1 adalah 14,10 <math>\mu\text{g/L}</math>, rerata kadar NSE serum pada bayi dengan EHI derajat 2 adalah 48,50 <math>\mu\text{g/L}</math>, dan rerata kadar NSE serum pada bayi dengan EHI derajat 3 adalah 141,48 <math>\mu\text{g/L}</math>. Kadar NSE serum yang didapatkan memiliki hubungan positif bermakna dengan derajat EHI pada bayi yang mengalami asfiksia. Semakin tinggi kadar NSE serum maka semakin berat</p>	<p>adalah analitik observasional.</p>	<p>asfiksia neonatorum yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.</p>	<p>referensi lain.</p>
--	---	--	--	--	---	---------------------------------------	---	------------------------

					derajat EHI yang terjadi pada asfiksia neonatorum.			
5.	Pengaruh Asfiksia Neonatal Terhadap Gangguan Pendengaran.	Gatot Irawan Sarosa, dkk	2015	Komplikasi yang terjadi pada bayi dengan asfiksia neonatorum	Komplikasi Asfiksia neonatal dapat menyebabkan kerusakan koklea akibat kurangnya oksigenasi dan perfusi jaringan yang dapat berlanjut menjadi kematian sel melalui mekanisme selective neuronal necrosis dan apoptosis.	Penelitian observasional telah dilakukan dengan ranelitian observasional telah dilakukan dengan rancangan kohort prospektif.	Subyek penelitian adalah neonatus asfiksia.	Tidak terdapat perbandingan dengan referensi lain.
6.	Risiko Kejadian Ikterus Neonatorum	Titik Maga Anggelia, dkk	2017	Komplikasi yang terjadi pada bayi dengan	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bayi	Penelitian ini adalah penelitian analitik	Jenis penelitian case control.	Tidak terdapat perbandingan dengan peneliti lain.

	Pada Neonatus Dengan Riwayat Asfiksia Bayi Baru Lahir Di Rsd Dr. Soebandi Jember Pada Tahun 2017.			asfiksia.	yang mempunyai riwayat asfiksia sebagian besar mengalami ikterus neonatorum yakni sebesar 37,5%, Oleh karena OR hitung responden dengan riwayat asfiksia sebesar $2,88 > 1$ , maka mengandung pengertian bahwa riwayat asfiksia bayi baru lahir mempunyai risiko sebesar 2,88 kali mengalami kejadian ikterus neonatorum.	observasional.		
7.	Analisis Kasus	Sri Puji Rahayu, dan	2016	Komplikasi yang terjadi	Berdasarkan hasil penelitian	Tidak di jelaskan	Penelitian ini	Penelitian ini

	Asfiksia Pada Kematian Neonatal Di Rsud Tugurejo Semarang	Sri Tjahjowati		pada bayi dengan asfiksia.	percobaan dengan uji statistik Chi Square didapatkan hasil nilai p value dibawah 0,005 yang berarti ada hubungan antara asfiksia dengan karakteristik neonatal, karakteristik ibu dan karakteristik tempat serta karakteristik waktu adalah : Umur neonatal (P value=0,004), Pendidikan ibu (P value = 0,027) komplikasi kehamilan (P value = 0,037) dan komplikasi persalinan (P value = 0,008).	populasi yang di gunakan saat penelitian.	merupakan studi kuantitatif, yang dilakukan secara deskriptif observatif dengan pendekatan waktu retrospektif .	terdapat perbandingan dengan penelitian lain.
--	---	----------------	--	----------------------------	--	---	---	---

8.	Pengaruh Asfiksia Terhadap Ukuran Lingkar Kepala Anak Usia 6 Bulan - 2 Tahun Di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	Melati Inayati Albayani, dkk	2018	Komplikasi yang terjadi pada bayi dengan asfiksia.	<p>Hasil penelitian di dapatkan analisis menunjukkan bahwa riwayat asfiksia mempunyai pengaruh yang bermakna dengan ukuran lingkar kepala dengan melihat nilai p</p> <p><math>&lt; 0,001</math> dan OR = 6,67 (95% CI: 1,98-35,03). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa bayi yang mengalami asfiksia beresiko mengalami mikrosefal 7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengalami</p>	Penelitian ini adalah penelitian observasional.	Pada penelitian ini di gunakan pendekatan kuantitatif.	Tidak terdapat perbandingan dengan penelitian lain.
----	---	------------------------------	------	--	---	---	--	---

					asfiksia.			
9.	Hubungan Asfiksia Neonatorum Dan Kejang Neonatorum Di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr Margono Soekarjo Purwokerto Periode 2016-2017	Abdul Khanis dan Mustika Ratnaningsih Purbowati	2016	Komplikasi yang terjadi pada bayi dengan asfiksia neonatorum .	Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan nilai $P < 0,045$ yang berarti hasil signifikan atau terdapat pengaruh dari asfiksia neonatorum terhadap kejang neonatorum. Selain itu didapat juga nilai odds ratio sebesar 2,79 yang berarti kelompok asfiksia neonatorum memiliki risiko 2 kali lebih besar mengalami kejang neonatorum dibandingkan	Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional.	Pada penelitian ini di gunakan metode casem control.	Tidak terdapat perbandingan dengan referensi lain.

					dengan kelompok tidak asfiksia.			
10	Hubungan Karakteristik Ibu Dan Anak Dengan Perkembangan Balita Dengan Riwayat Asfiksia Neonaturum Di Puskesmas Makassar Jakarta Timur	Wiwit Wijayanti, dkk	2019	Komplikasi yang terjadi pada bayi dengan asfiksia.	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa balita dengan riwayat Asfiksia Neonaturum yang memiliki 1-2 anak (primipara) yang lebih banyak mengalami perkembanganya tidak sesuai / meragukan (38,5 %) dibandingkan dengan yang perkembanganya sesuai.	Populasi dari penelitian ini adalah seluruh balita yang mengalami asfiksia neonaturum.	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.	Tiada terdapat perbandingan dengan referenai lain.

#### D. Matriks Langkah IV Tindakan Segera

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Analisis Kesesuaian Prosedur Tindakan Resusitasi Psds Neonatus dengan Asfiksia di Ruang Peristi RSUD Anutapura Palu.	Nurlailah Umar, dkk	2020	Tindakan segera, Kesesuaian prosedur tindakan resusitasi pada neonates dengan asfiksia.	Berdasarkan hasil penelitian Persiapan alat resusitasi bayi baru lahir sebagian besar lengkap yaitu 14 (93,3%). Dari 15 bayi yang dilakukan tindakan resusitasi, ada 9 bayi (60%) yang dilakukan resusitasi awal serta resusitasi lanjutan. Waktu yang digunakan untuk resusitasi awal yaitu	Deskriptif dengan observasional merupakan desain yang digunakan dalam penelitian ini.	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh neonatus dengan asfiksia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semua neonatus dengan asfiksia yang ditemukan pada saat penelitian.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharmasetiawati .

					<p>hampir sama antara tindakan resusitasi selama &gt; 30 detik 8 tindakan (53,3%) dengan tindakan resusitasi <math>\leq</math> 30 detik yaitu 7 tindakan (46,7%).</p> <p>Respon bayi setelah resusitasi awal yaitu sebagian besar bayi tidak menangis, apnea dan cyanosis yaitu 9 bayi (60%). Dari 9 bayi yang dilakukan resusitasi lanjutan, ada 8 bayi (88,9%) yang hanya dilakukan</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					ventilasi tekanan positif. Waktu dilakukan resusitasi lanjutan bervariasi, dari 9 bayi ada 4 bayi (44,4%) dilakukan tindakan 5 menit. Respon bayi setelah resusitasi lanjutan sebagian besar bayi bernapas spontan yaitu 8 bayi (88,9%) dan 1 bayi (11,1%) meninggal.			
2.	Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita.	Ai Yeyeh Rukiyah, dan Lia Yulianti	2015	Asuhan neonates pada bayi ndan balita yang menjelaskan	Tindakan umum, bersihkan jalan nafas, kepala bayi diletakkan lebih rendah	Tidak terdapat kelemahan pada referensi	Dijelaskan dengan jelas sehingga yang membaca dapat	Terdapat persamaan dengan referensi lain.

				tentang tindakan segera yang di lakukan untuk bayi yang dengan kejadian asfiksia.	agar lender mudah mengalir, rangsang refleks pernapasan, dilakukan setelah 20 detik bayi tidak memperlihatkan bernafas dengan cara memukul kedua telapak kaki menekan tanda achiles, mempertahankan suhu tubuh.	terkait.	mengerti.	
3.	Hubungan Berat Bayi Lahir Rendah dengan Kejadian Asfiksi Neonatorum Di RSUD dr. Iskak Tulungagung	Reni Yuli Astuti, dkk	2016	Tindakan segera yang di lakukan pada bayi dengan asfiksia.	Berdasarkan ada hubungan yang signifikan antara bayi berat lahir rendah dengan kejadian asfiksia neonatorum dengan segera di lakukan tindakan penanganan yang tepat agar dapat mengatasi	Pada penelitian ini menggunakan variabel bebas	Jenis penelitian survei analitik yang menggunakan desain penelitian korelasional.	Tidak terdapat perbandingan dengan penelitian lain.

					gejala ikutan yang akan timbul atau untuk mempertahankan hidup.			
4.	Faktor Dominan Penyebab Kematian Neonatal	Siti Masitoh, dkk	2015	Tindakan segera pada bayi dengan asfiksia.	Tindakan awal yaitu mengeringkan, menghangatkan dan memberi rangsang taktil pada bayi. Apabila bayi belum memberi respon bernafas dengan tindakan awal ini maka dilanjutkan dengan melakukan resusitasi pada	Populasi adalah seluruh neonates yang dirawat.	Penelitian ini menggunakan desain kasus kontrol.	Terdapat persamaan dengan penelitian lain.

					bayi baru lahir tersebut.			
5.	Hubungan Bayi Berat Lahir Rendah (Bblr) Dengan Kejadian Asfiksia Di Ruang Perinatologi Resiko Tinggi (Peristi) Rsud. Dr. H. Soewondo Kendal.	Tri Sakti W, dkk	2017	Hubungan BBLR dengan kejadian asfiksia dan tindakan yang di lakukan pada kejadian asfiksia.	Penanganan pada asfiksia secara umum yaitu bersihkan jalan nafas dengan cara penghisapan lendir, rangsang reflek pernafasan dengan cara memukul kedua telapak kaki menekan tanda achiles dan mempertahankan suhu tubuh.	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif non eksperimen.	Desain atau rancangan dalam penelitian ini menggunakan cross sectional.	Penelitian ini sama dengan beberapa referensi lain.
6.	Risiko Kejadian Ikterus Neonatorum Pada Neonatus Dengan Riwayat	Titik Maga Anggelia , dkk	2017	Resiko kejadian icterus pada bayi dengan riwayat asfiksia dan tindakan segera yang	Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara kejadian icterus pada bayi dengan riwayat asfiksia.	Penelitian ini adalah penelitian analitik observasional .	Penelitian survei analitik yang menyangkut bagaimana	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Adriani, dkk.

	Asfiksia Bayi Baru Lahir Di Rsd Dr. Soebandi Jember Pada Tahun 2017			di lakukan pada bayi dengan kejadian asfiksia.	Tindakan yang di lakukan pada bayi baru lahir dengan hangatkan tubuh bayi, atur posisi bayi, isap lender, keringkan bayi, atur posisi bayi dan kemudian dilakukan dengan penilaian. Dari penilaian ini dapat diketahui nilai APGAR skor menit pertama.		faktor risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospective.	
7.	Analisis Pelaksanaan Program Stabilisasi Bayi Asfiksia Oleh Bidan di Puskesmas Kota Pare	Harima M, dkk.	2016	Tindakan segera pelaksanaan stabilitas bayi asfiksia.	Pelaksanaan program stabilisasi bayi asfiksia. Menurut Teori, sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor yang	Penelitian ini adalah penelitian analitik observasional .	Penelitian survei analitik yang menyangkut bagaimana faktor risiko	Tidak terdapat perbandingan dengan penelitian lain

	pare.				mempunyai konsekuensi dalam implemetasi kebijakan, jika pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini ada dukungan, kemungkinan mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dan sebaliknya bila tingkah laku atau perseptif para pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan, maka		dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospective.	
--	-------	--	--	--	---	--	---	--

					proses suatu kebijakan menjadi lebih sulit.			
8.	Efektifitas Muscle Pumping dalam Meningkatkan SCORE APGAR Pada Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia.	Wiwit Desi Intari, dkk.	2016	Tindakan segera untuk meningkatkan score apgar pada bayi asfiksia.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan hasil $p$ value = 0,001 dan nilai $Z$ hitung lebih besar dari $Z$ table ( 4,508 > 2,021), maka $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa muscle pumping efektif dalam meningkatkan skor APGAR pada 20 bayi baru lahir	Jenis penelitian adalah penelitian eksperimental dengan Randomais Control Trial.	Desain penelitian atau rancangan penelitian ditetapkan dengan tujuan agar peneitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien	Tidak terdapat perbandingan dengan penelitian lain.

					dengan asfiksia. Tindakan awal penanganan asfiksia bayi baru lahir adalah resusitasi efektif yang ditambah dengan muscle pumping.			
9.	Studi Kasus Manajemen Kebidanan pada Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia Sedang .	Daini Zulmi	2018	Tindakan segera pada bayi baru lahir dengan asfiksia neonatorum.	Membersikan jalan nafas bayi dari muka, hidung, dan mulut bayi, menggosok punggung bayi dan melakukan rangsang taktil.	Tidak di jelaskan metode yang di lakukan saat penelitian.	Menjelaskan dengan jelas tentang asuhan pada ibu hamil, bersalin,nifas dan bayi baru lahir.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Sriwahyuni.
10	Gambaran Kejadian Asfiksia di UPTD Puskesmas Ajangale pada Tahun .	Arfan Nur	2016	Tindakan segera pada bayi asfiksia.	Berdasarkan hasil penelitian tindakan segera yang dapat di lakukan difokuskan pada persiapan	Tidak ditemukan kelemahan pada referensi	Sampel dalam penelitian ini yaitu semua bayi yang mengalami asfiksia.	Tidak ditemukan perbandingan dengan penelitian lain.

	2016.				resusitasi, keputusan resusitasi bayi baru lahir, tindakan resusitasi, asuhan pasca resusitasi, asuhan tindak lanjut pasca resusitasi dan pencegahan infeksi.	terkait.		
--	-------	--	--	--	---	----------	--	--

#### E. Matriks Langkah V Rencana Tindakan

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Hubungan Persalinan Prematur Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum	Bety Mayasari, dkk	2018	Hubungan persalinan premature dengan kejadian asfiksia, serta pelaksanaan	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil analisa data dengan menggunakan uji Korelasi Spearman	Tidak di jelaskan dengan rinci berapa sample yang di gunakan	Desain penelitian yang digunakan adalah CrossSectional.	Tidak terdapat perbandingan dengan referensi terkait.

	Di Ruang Bersalin Rsu Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto			kejadian asfiksia.	dengan tingkat kemaknaan/signifikasi $0,00 (\alpha < 0.05)$ , yang berarti bahwa $H_0$ ditolak dan $H_1$ diterima. Serta didapatkan hasil koefisien korelasi ( $\rho$ ) = 0,875, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan sangat kuat antara dua variabel yaitu persalinan prematur dengan kejadian asfiksia neonatorum. Penatalaksanaan yang tepat dan efektif pada asfiksia neonatorum dalam beberapa menit pertama kehidupan dapat mempengaruhi hasil jangka panjang terhadap kehidupan bayi premature,	untuk penelitian.		
--	--	--	--	--------------------	---	-------------------	--	--

					memerlukan penatalaksanaan berupa resusitasi neonatal dan membutuhkan pemeriksaan serta penanganan intensif lanjutan.			
2.	Faktor Persalinan Dan Kejadian Asfiksia Di Rsud Kota Bogor.	Fauzia, dan Sri Wahyuni	2017	Faktor persalinan dan kejadian asfiksia serta pelaksanaan kejadian asfiksia.	Manifestasi asfiksia neonaturum dalam pelayanan kebidanan adalah dengan melakukan penilaian Apgar Skore. Nilai Apgar pada umumnya dilaksanakan pada 1 menit dan 2 menit sesudah bayi lahir. Tapi penilaian harus dimulai segera sesudah bayi lahir.	Desain penelitian adalah sequential explanatory.	Pengambilan sampel dengan cara simple random sampling dimana dengan melihat dokumentasi persalinan.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian khalal.
3.	Buku Saku Manajemen Masalah Bayi Baru Lahir.	Pamalih Eko Dan Eny Meiliya	2019	Masalah yang terjadi pada bayi baru lahir.	Pasang selang oksigen, lakukan perawatan berkelanjutan, berikan selang IV,	Tidak di jelaskan dengn rinci tahapan resusitasi.	Di jelaskan dengan bahasa yang mudah di mengerti.	Terdapat persamaan dengan beberapa referensi

					batasi volume cairan yang di masukkan, lakukan pemantauan.			lainya.
4.	Hubungan Kehamilan Serotinus dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir.	Anggit Eka, dk	2016	Pelaksanaan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir.	Ada hubungan kehamilan serotinus dengan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir, dan pelaksanaan kejadian asfiksia, maka di lakukan tindakan resusitasi merupakan tindakan yang harus dilakukan dengan segera dan merupakan tindakan kritis sebagai upaya untuk menyelamatkan bayi baru lahir yang mengalami gawat nafas.	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin dengan kehamilan serotinus.	Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif dengan desain penelitian case-control.	Terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulastin.
5.	Analisis Kesesuaian	Nurlailah Umar,	2015	Analisis prosedur	Prosedur resusitasi bayi baru lahir yaitu	Deskriptif dengan	Sampel yang digunakan	

	Prosedur Tindakan Resusitasi Pada Neonatus Dengan Asfiksia Di Ruang Peristi Rsu Anutapura Palu	dkk		tindakan resusitasi pada neonates dengan asfksia	bayi yang mengalami depresi pernapasan, tonus otot kurang dan frekuensi jantung kurang dari 100 kali/menit segera lakukan pengisapan trakea dengan memasukkan laringoskop dan kateter pengisap serta memasukkan pipa endotrakeal.	observasion al merupakan desain yang digunakan dalam penelitian ini.	dalam penelitian ini yaitu semua neonatus dengan asfiksia.	
6.	Terapi Hipotermia untuk Neonatus Asfiksia.	Giovani Gilberta	2020	Terapi hipotermi yang di lakukan untuk membantu pelaksanaan bayi dengan kejadian asfiksia.	Terapi hipotermia dapat digunakan pada asfiksia neonatus yang memenuhi kriteria indikasi dan eligibilitas. Terapi harus diinisiasi dalam 6 jam pasca-kelahiran. Proses dua tahap, yaitu hipotermia dan rewarming, masing-masing	Tidak di jelaskan dengan rinci metode apa yang di gunakan saat penelitian.	Untuk mengetahui terapi hipotermi juga dapat di lakukan pada bayi asfiksia.	idak terdapat perbandingan dengan penelitian lain.

					membutuhkan teknik berbeda.			
7.	Asuhan neonatus bayi dan anak balita.	Ai yeyeh rukiyah, lia yulianti.	2015	Pelaksanaan Asfiksia neonatorum.	Tindakan umum, bersihkan jalan nafas, kepala bayi diletakkan lebih rendah agar lender mudah mengalir, rangsang refleks pernapasan, dilakukan setelah 20 detik bayi tidak memperlihatkan bernafas dengan cara memukul kedua telapak kaki menekan tanda achiles, mempertahankan suhu tubuh.	Tidak terdapat kelemahan pada referensi terkait.	Dijelaskan dengan jelas sehingga yang membaca dapat mengerti.	Tidak terdapat persamaan dengan referensi lain.
8.	Pencegahan dan Penatalaksanaan asfiksia neonatorum.	Rulina Suradi.	2015	Pelaksanaan yang di lakukan pada bayi dengan kejadian asfiksia.	Memberikan kehangatan pada bayi, memposisikan bayi, membersihkan jalan napas, mengeringkan bayi, merangsang	Tidak di jelaskan dengan rinci metode apa yang di gunakan saat	Kita dapat mengetahui pelaksanaan yang di lakukan pada bayi asfiksia.	Tidak terdapat perbandingan dengan penelitian lain.

					pernapasan, dan kompresi dada.	penelitian.		
9.	Gambaran Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rumah Sakit Di Kediri.	Lia Agustina	2016	Penatalaksanaan cara mengatasi asfiksia pada bayi baru lahir.	Cara mengatasi asfiksia secara garis besar yaitu dengan menghangatkan bayi terlebih dahulu, membersihkan jalan nafas, mengeringkan bayi, pemberian oksigen. Jika asfiksia berat bisa menggunakan ambubag dan ETT (endotracheal tube).	Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bayi	Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan pendekatan cross section.	Tidak terdapat perbandingan dengan penelitian lain.
10.	Hubungan Persalinan Prematur Dengan Kejadian Asfiksia Di RSUD Jombang	Maria Magdalena Anabanu, dkk	2019	Persalinan premature dengan kejadian asfiksia dan pelaksanaan asfiksia.	Pada kejadian asfiksia diperlukan tindakan resusitasi dengan menggunakan peralatan resusitasi dengan benar pada bayi baru lahir.	Desain penelitian ini adalah observasi non eksperimen dengan rancangan bangun korelasional atau survey	Analisis data yang digunakan untuk menguji perbedaan antara kedua variabel	Tidak terdapat perbandingan dengan penelitian lain.

	Tahun 2019					analitik.	tersebut adalah menggunakan uji Chi-Square.	
--	------------	--	--	--	--	-----------	---	--

#### F. Matriks Langkah VI Implementasi

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Gambaran Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir yang Mengalami Asfiksia Neonatorum di RSUD DR.H.Soewondo Kabupaten Kendal.	Mimi Ruspita, dan Heny Rosiana.	2018	Gambaran penatalaksanaan pada bayi baru lahir yang mengalami asfiksia.	SOP penatalaksanaan asfiksia neonatorum di RSUD DR.H.Soewondo Kendal yaitu prosedur pertama yang dilakukan dengan langkah awal resusitasi. Bila bayi tidak bernafas atau megap-megap atau tetap sianosis setelah diberi	Populasinya adalah semua bayi baru lahir yang mengalami asfiksia neonatorum di RSUD dr.H.Soewondo Kendal.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Survey.	Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh nurlailah dkk.

					<p>oksigen 100%, lakukan segera VTP. Bila tidak bernafas atau megap-megap atau frekuensi jantung &lt;100-60 x/menit atau sianosis teruskan VTP, melanjutkan penatalaksanaan dengan Kompresi Dada. Bila frekuensi jantung <math>\leq</math> 60 kali/menit, berikan pengobatan dengan epinefrin, melalui pipa ET (lebih diutamakan) atau jalur intra vena. Kemudian segera lakukan kompresi dada dan VTP dengan koordinasi yang baik selama 30 detik dan nilai keadaan bayi.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.	Faktor Yang Mempengaruhi Asfiksia Neonatorum Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.	Tin Utami dan Erni Purwati	2015	Faktor yang mempengaruhi asfiksia dan pelaksanaan kejadian asfiksia.	Penatalaksanaan kejadian asfiksia, dengan hangatkan, atur posisi, isap lendir, keringkan badan bayi, atur posisi kembali dan lakukan penilaian pada awal penanganan dan dilanjutkan dengan ventilasi Tekanan Positif (VTP) dan Resusitasi Jantung Paru (VTP) pada bayi dengan denyut jantung kurang dari 60x/ menit.	Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari register bayi baru lahir.	Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardyaningrum.
3.	Hubunan Persalinan Prematur dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di Ruang Bersalin	Bety Mayasari, dkk.	2018	Penatalaksanaan perawatan pada kejadian asfiksia.	Penatalaksanaan berupa resusitasi neonatal dan membutuhkan pemeriksaan serta penanganan intensif lanjutan, salah satunya adalah pemeriksaan untuk	Tidak dijelaskan secara detail berapa sample yang di butuhkan saat penelitian.	Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian korelasional, dimana peneliti mengkaji hubungan	Tidak terdapat perbandingan dengan penelitian lain.

	RSU DR. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.				menentukan rasio lesitin-sfngomielin dan amniosintesis yaitu memeriksa tingkat maturitas paru dan volume cairan surfaktan sehingga bayi mendapatkan penanganan berupa penambahan cairan surfaktan untuk meningkatkan ekspansi paru bayi.		antara variable.	
4.	Analysis of The Suitability of Neonatal Resuscitation Procedures with Birth Asphyxia.	Fitria Masulili, dkk	2015	Pelaksanaan resusitasi pada bayi askifisia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tindakan resusitasi awal hampir seimbang antara tindakan yang sesuai dengan tindakan yang kurang sesuai. Komponen dalam prosedur tindakan resusitasi yang kurang dipenuhi	Deskriptif dengan observasional merupakan desain yang digunakan dalam penelitian ini.	Variabel penelitian yaitu kesesuaian tindakan resusitasi pada neonatus dengan prosedur tindakan.	Terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlailah umar dkk.

					oleh pelaksana resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia yaitu waktu atau lama tindakan resusitasi awal. Hal ini tampak dari waktu yang digunakan untuk resusitasi awal yaitu dari 15 tindakan, ada 8 tindakan yang membutuhkan waktu lebih dari 30 detik, dan hasil observasi waktu yang digunakan ada yang mencapai lebih dari 2 menit..			
5.	Hubungan Antara Ketuban Pecah Dini dan Persalinan Sectio	Yona Desni Sagita.	2016	Penatalaksanaan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir..	Penatalaksanaan resusitasi yang tanggap dan tepat dalam menangani kegawatdaruratan pada bayi baru lahir. Dengan memposisikan bayi	Tidak dijelaskan dengan rinci berapa sample yang dibutuhkan untuk	Penelitian ini menggunakan teknik Simple Random Sampling.	Tidak terdapat perbandingan dengan referensi lain.

	dengan Kejadian Asfiksia pada Bayi Baru Lahir.				di bawah sinar, lakukan VTP.	penelitian.		
6.	Efektifitas Muscle Pumping dalam Meningkatkan SCORE APGAR Pada Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia.	Wiwit Desi Intari, dkk.	2016	Penatalaksanaan untuk meningkatkan score apgar pada bayi asfiksia.	Kekuatan otot pernafasan dapat terlatih ketika bayi baru lahir membutuhkan banyak oksigen, sehingga teknik muscle pumping yang peneliti lakukan pada bayi asfiksia dapat merangsang pernafasan bayi baru lahir. Darah pada ekstremitas yang dipompa	Jenis penelitian adalah penelitian eksperimental dengan Randomais Control Trial.	Desain penelitian atau rancangan penelitian ditetapkan dengan tujuan agar peneitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.	Tidak terdapat perbandingan dengan penelitian lain.

					menuju jantung dapat melancarkan peredaran darah karena pasokan darah sudah ada. Nilai APGAR skor akan meningkat dan bayi baru lahir tidak lagi mengalami asfiksia.			
7.	Hubungan Ketuban Pecah Dini (KPD) dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru lahir di RSUD Jombang tahun 2017.	Hirohyati, dkk.	2017	Penatalaksanaan asfiksia neonatorum.	Terdapat hubungan antara ketuban pecah dini dengan kejadian asfiksia. Secara rehabilitatif bila terjadi asfiksia dilakukan upaya untuk menjaga agar tubuh bayi tetap hangat, menempatkan bayi dalam posisi yang tepat, penghisap lendir secara benar,	Penelitian ini tidak ada kontrol dan tidak ada internal validitas dan hasilnya berupa observasi.	Pendekatan yang digunakan adalah retrospektif yaitu: mempelajari dinamika korelasi dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan	Penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya.

					<p>memberikan rangsangan taktil dan melakukan pernafasan buatan (bila perlu). Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk mencegah asfiksia, memberikan pertolongan secara tepat dan adekuat bila terjadi asfiksia dan dapat mencegah hipotermi.</p>		<p>data dimana variabel independentnya diukur waktu lampau dan dependentnya diukur saat ini.</p>	
8.	<p>Pengetahuan Dan Sikap Perawat Dengan Penanganan Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir Di Ruang Nicu Rsup Prof Dr R.D Kandou</p>	<p>Sutriani Lumatauw, dkk.</p>	2015	<p>elaksanaan Penangan Asfiksia pada bayi baru lahir.</p>	<p>Bayi yang mengalami Asfiksia akan mengalami gangguan pada berbagai fungsi organ, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan multidisiplin.</p>	<p>Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengambilan non probability.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan desain penelitian Survei Analitik dengan pendekatan Cross Sectional.</p>	<p>Tidak terdapat perbandingan dengan penelitian lain.</p>

	Manado.				Penanganan ensefalopati hipoksik-iskemik meliputi upaya mempertahankan suhu tubuh bayi tetap normal, menjaga perfusi dan ventilasi yang baik, menjaga keseimbangan asam basa dan elektrolit serta penanganan kejang.			
9.	Hubungan Persalinan Prematur Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Ruang Bersalin Rsu Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto	Dian Fitra Arismawati, dkk	2018	Pelaksanaan perawatan pada kejadian asfiksia.	Penatalaksanaan berupa resusitasi neonatal dan membutuhkan pemeriksaan serta penanganan intensif lanjutan, salah satunya adalah pemeriksaan untuk menentukan rasio lesitin-sfngomielin dan amniosintesis yaitu memeriksa tingkat maturitas	Tidak di jelaskan secara detail berapa sample yang di butuhkan saat penelitian.	Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian korelasional, dimana peneliti mengkaji hubungan antara variable.	Tidak terdapat perbandingan dengan penelitian lain.

					paru dan volume cairan surfaktan sehingga bayi mendapatkan penanganan berupa penambahan cairan surfaktan untuk meningkatkan ekspansi paru bayi.			
10.	Gambaran Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rumah Sakit Di Kediri.	:Lia Agustin.	2016	Penatalaksanaan cara mengatasi asfiksia pada bayi baru lahir.	Cara mengatasi asfiksia secara garis besar yaitu dengan menghangatkan bayi terlebih dahulu, membersihkan jalan nafas, mengeringkan bayi, pemberian oksigen. Jika asfiksia berat bisa menggunakan ambu bag dan ETT	Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bayi yang lahir di rumah sakit Kediri.	Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan pendekatan cross sectional.	Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya.

					(endotracheal tube).			
--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

### G. Matriks Langkah VII Evaluasi

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Nilai Apgar Persalinan per Vaginam di RS UKI 2016.	Diravita CFL Marsaulina, dkk.	2016	Faktor yang berhubungan dengan nilai Apgar dan Evaluasi apgar pada bayi asfiksia.	Nilai apgar ialah suatu metode penilaian yang digunakan untuk mengkaji kesehatan neonatus dalam menit pertama setelah lahir, serta dapat diulang pada menit ke-10 dan ke-15. Pemeriksaan ini dilakukan secara cepat pada bayi baru lahir untuk mengevaluasi keadaan fisik dari bayi baru lahir dan sekaligus mengenali adanya	Kelemahan penelitian ini adalah tidak dijelaskan berapa populasi yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.	Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif sesuai dengan data yang diperoleh dengan menggunakan program Statistical Product and Service Solutions.	Tidak terdapat perbandingan dengan penelitian lain.

					tanda-tanda darurat yang memerlukan dilakukannya tindakan segera terhadap bayi baru lahir.			
2.	Stabilisasi dan Transportasi Neonatus.	Minerva Riani Kadir	2018	Evaluasi resusitasi pada bayi asfiksia.	Penanganan pasca resusitasi pada neonatus yang mengalami asfiksia perinatal sangat kompleks dan membutuhkan monitoring yang ketat dan tindakan antisipasi yang cepat, karena bayi berisiko mengalami disfungsi multi organ dan perubahan dalam kemampuan mempertahankan homeostasis fisiologis. Deteksi dan intervensi dini terhadap gangguan fungsi organ sangat	Tidak di jelaskan metode penelitian yang di lakukan.	Pada penelitian ini di jelaskan alur resusitasi dan pasca resusitasi.	Tidak terdapat perbandingan dengan penelitian lain.

					mempengaruhi luaran dan harus dilakukan di ruang perawatan intensif untuk mendapatkan perawatan dukungan, monitoring, dan evaluasi diagnostik yang lebih lanjut.			
3.	Partus Lama dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir di RSUD Pangkep.	Nurhikmah	2016	Kewaspadaan padaan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir.	Puncak kewaspadaan dilaksanakan dengan melakukan rujukan penderita ke pusat pelayanan dengan fasilitas yang lebih memadai setelah melampaui garis waspada agar penderita diterima di pusat pelayanan dalam keadaan optimal. Bidan diharapkan bekerjasama dengan dukun	Populasi yang di butuhkan dalam penelitian tidak aada jumlah tertentu yaitu seluruh ibu bersalin.	Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan rancangan metode Cross Sectional Study.	Tidak terdapat perbandingan dengan penelitian lain.

					melalui pendidikan dukun sehingga dapat mengenal penderita dan dengan tepat dilakukan rujukan medis.			
4.	Pengaruh Lama Kala II Pengaruh Lama Kala II dengan Nilai APGAR SCORE Menit Pertama Kelahiran.	Sugi Purwanti, dkk	2016	Evaluasi penilaian apgar score pada bayi asfiksia.	Penilaian APGAR untuk menentukan keadaan bayi pada menit ke 1 dan 5 sesudah lahir. Nilai ini berkaitan dengan keadaan asidosis dan kelangsungan hidup bayi. Pada periode ini sangat penting untuk mengetahui kondisi bayi dengan cepat. Apabila hasil penilaian APGAR bayi kurang dari 6 artinya bayi mengalami Asfiksia.	Populasi dalam penelitian adalah semua ibu bersalin.	Tehnik pengambilan sampel penelitian adalah purposive sampel dengan kriteria kelengkapan data.	Tiada terdapat perbandingan dengan penelitian lain.

5.	Hubungan Tingkat Pendidikan Perawat Pelaksana Terhadap Tindakan Resusitasi pada Neonatus yang Mengalami Kegawatan Pernafasan di Ruang Perinatologi RS Mitra Idaman Banjar.	Abdurrauf, dkk.	2019	Evaluasi tindakan resusitasi.	Tindakan resusitasi merupakan tindakan yang harus dilakukan dengan segera sebagai upaya untuk menyelamatkan hidup seorang bayi. Resusitasi pada neonatus yang mengalami gawat nafas merupakan tindakan kritis yang harus dilakukan oleh perawat dan bidan yang kompeten.	Pada penelitian ini tidak di jelaskan secara detail pengambilan sampelnya.	Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional atau asosiasi yaitu penelitian yang mengkaji hubungan antara variabel sehingga peneliti dapat menjelaskan suatu hubungan, memperkirakan dan mengujinya berdasarkan teori yang ada.	Tidak terdapat perbandingan dengan penelitian lain.
6.	Analisis Upaya Bidan	Endah Marlina,	2015	Evaluasi penanganan	Upaya bidan dalam melaksanakan	Tidak di jelaskan	Metode penelitian ini	Terdapat persamaan

	dalam Penanganan Asfiksia Bayi Baru Lahir di Puskesmas Kabupaten Karanganyar.	dkk.		Asfiksia pada bayi baru lahir.	standar penanganan asfiksia adalah kemampuan bidan dalam melaksanakan proses penanganan asfiksia pada bayi baru lahir. Faktor yang mempengaruhi kemampuan adalah pengetahuan dan ketrampilan.	berapa sample yang di butuhkan dalam melakukan penelitian ini.	merupakan penelitian obsevasi eksplanatory analitik.	dengan penelitian yang di lakukan oleh Reni Yuli Astuti dkk (2016).
7.	Asfiksia Neonatorum Pada Bayi Berat Lahir Rendah.	Sari, KP	2015	Asfiksia neonatorum dan evaluasi pemberian oksigenasi dan resusitasi pada bayi dengan asfiksia untuk memperthankan kelangsungan hidupnya.	Pada saat dilakukan oksigenasi dan resusitasi bertujuan untuk memberikan cukup oksigen dan memberikan ventilasi yang adekuat sehingga tercapai tujuan penanganan asfiksia yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bayi dan membatasi gejala sisa yang	Tidak di jelaskan dengan rinci metode penelitian yang di gunakan saat penelitian.	Penjelasan di dalam penelitian mudah di pahami.	Tidak terdapat perbandingan dengan referensi lain.

					mungkin timbul di kemudian hari.			
8.	Risiko Derajat Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Jenis Persalinan.	Laras Putri Kusumawati, dkk	2019	Evaluasi penanganan bayi dengan asfiksia sedang.	Jika asfiksia tidak segera di tangani, maka akan bertambah buruk apabila penanganan bayi tidak dilakukan secara sempurna. Tindakan yang akan dikerjakan pada bayi bertujuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan membatasi gejala-gejala lanjut yang mungkin timbul.	Tidak di jelaskan populasi yang di gunakan saat penelitian.	Desain penelitian menggunakan analitik korelasional dengan desain retrospektif.	Tidak terdapat perbandingan dengan referensi lain.
9.	APGAR SCORE Pada Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia Neonatorum Pasca Resusitasi	Suroso, dan Sunarsih.	2015	Evaluasi keberhasilan tindakan resusitasi pada bayi asfiksia.	Keberhasilan tindakan RJP ditunjukan dengan adanya perubahan dari lima sistem penilaian dalam apgar score yang meliputi fungsi	Tidak di jelaskan dengan detail berapa sample yang di butuhkan untuk	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen, dengan desain penelitian	Tidak ada perbandingan dengan penelitian lain.

	Jantung Paru.				pernafasan, jantung, warna kulit, reflek terhadap rangsang dan tonus otot.	melakukan penelitian.	eksperimen semu.	
10.	Analisis Pelaksanaan Program Stabilisasi Bayi Asfiksia Oleh Bidan di Puskesmas Kota Pare pare	Harima M, dkk	2016	Evaluasi program Stabilitasi pada bayi asfiksia.	Stabilisasi yang direkomendasikan oleh Amerivcan Akademic Pediatrics yaitu stabilisasi neonatus dalam S.T.A.B.L.E terdiri dari: sugar and safe care (S), temperature (T), airway (A), blood pressure (B), lab study (L) dan emotional support (E). Singkatan S.T.A.B.L.E tersebut akan memudahkan petugas kesehatan mengingat aspek penting dalam proses stabilisasi.	Penelitian dilaksanakan dua Puskesmas dengan kriteria Puskesmas.	Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen.	Tidak terdapat perbandingan dengan penelitian lain.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pembahasan Hasil Telaah Evidence Based Asuhan 7 Langkah Varney**

##### **1. Langkah I : Identifikasi Data Dasar**

Asfiksia adalah kegagalan untuk memulai dan melanjutkan pernafasan secara spontan dan teratur pada bayi baru lahir atau beberapa saat sesudah dilahirkan. Bayi yang mengalami asfiksia berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Utami Ekasari, dkk (2015) dapat dijelaskan dari 87 responden, bayi yang mengalami asfiksia ringan sebanyak 29 kasus (33,3%), bayi asfiksia sedang sebanyak 15 (17,2%), dan bayi yang mengalami asfiksia berat sebanyak 43 kasus (49,4%).

Asfiksia dimulai dari periode apneu disertai dengan penurunan frekuensi jantung, selanjutnya bayi menunjukkan usaha bernafas (gasping) yang kemudian diikuti dengan pernafasan teratur, namun pada asfiksia berat, usaha bernafas tidak tampak dan bayi selanjutnya berada dalam periode apneu kedua dan jika terlambat dilakukan resusitasi, maka gawat nafas akan terjadi. Tanda dan Gejala asfiksia neonatorum hipoksia, RR > 60 x/mnt atau < 30 x/mnt, napas megap-megap/gasping sampai dapat terjadi henti napas, bradikardia, tonus otot berkurang, warna kulit sianotik/pucat (Sri Wahyuni dan Ni Wayan Wiwin, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Junita caroline Gerungan, dkk (2015). Salah satu penyebab kejadian asfiksia neonatorum adalah faktor ibu salah satunya paritas. Paritas didefinisikan sebagai jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup yaitu kondisi yang menggambarkan kelahiran sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksi. Beberapa tanda dan gejala bayi yang

mengalami asfiksia sebagai berikut, bayi terlihat lemah, mengalami penurunan denyut jantung secara cepat, tubuh menjadi biru atau pucat dan refleks-refleks melemah sampai menghilang

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Melania Wahyuningsih, dkk (2015). Dari data karakteristik responden diperoleh bahwa sebagian besar ibu yang melahirkan di usia 20 – 35 tahun sebanyak 75,4% dan hanya 4,1 % berusia kurang dari 20 tahun.. Usia ini merupakan usia yang berisiko karena ibu yang melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun organ reproduksi belum tumbuh dengan optimal, sehingga ibu yang hamil dan melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun ada kemungkinan m untuk melahirkan bayi dengan asfiksia sedang ataupun berat.

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Dina ardyana, dkk (2019) tentang penyebab terjadinya asfiksia neonatorum, salah satunya adalah tali pusat dimana berdasarakan hasil penelitian terdapat hubungan antara Lilitan tali pusat,partus lama dan plasenta previa dengan kejadian asfiksia neonatorum.Karena lilitan tali pusat dapat menimbulkan bradikardi dan hipoksia janin. Jika lilitan tali pusat erat juga menyebabkan gangguan (kompresi) pada pembuluh darah umbilical, dan bila berlangsung lama akan menyebabkan hipoksia janin yang mengakibatkan bayi mengalami asfiskia. Sama halnya dengan plasenta previa hal ini karena ibu yang mengalami plasenta previa dapat terjadi perdarahan yang menimbulkan syok sehingga dapat mengganggu proses pertukaran O<sub>2</sub> dan CO<sub>2</sub> antara ibu dan janin yang dapat mengakibatkan janin mengalami hipoksia janin.

Penelitian yang di lakukan oleh Magdalena Paunno (2019) menjelaskan gambaran kejadian kematian neonatal dan salah satunya adalah asfiksia, dimana

Kasus asfiksia pada bayi akan mengalami asidosis sehingga memerlukan perbaikan dan resusitasi aktif dengan segera. Tanda dan gejala yang muncul pada asfiksia berat seperti Frekuensi jantung kecil, yaitu <40kali per menit, tidak ada usaha nafas pada neonatal, Tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada, Bayi tidak dapat beraksi jika diberi rangsangan, Bayi tampak pucat bahkan sampai berwarna kelabu, terjadi kekurangan oksigen yang berlanjut.

Asfiksia biasanya merupakan akibat hipoksia janin yang menimbulkan tanda-tanda klinis pada janin yaitu DJJ lebih dari 100x/menit atau kurang dari 100x/menit tidak teratur, mekonium dalam air ketuban pada janin letak kepala, tonus otot buruk karena kekurangan oksigen pada otak, otot, dan organ lain, bradikardi (penurunan frekuensi jantung) karena kekurangan oksigen pada otot-otot jantung atau sel-sel otak, tekanan darah rendah karena kekurangan oksigen pada otot jantung, kehilangan darah atau kekurangan aliran darah yang kembali ke plasenta sebelum dan selama proses persalinan, takipnu (pernafasan cepat) karena kegagalan absorpsi cairan paru-paru atau nafas tidak teratur/megap-megap, sianosis (warna kebiruan) karena kekurangan oksigen didalam darah (Rosminah Mansyarif, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Indah, dkk (2016), tanda dan Gejala asfiksia neonatorum yaitu bayi tidak bernafas atau bernafas megap –megap, warna kulit kebiruan, kejang dan penurunan kesadaran. Gejala asfiksia diklasifikasikan berdasarkan nilai apperance (colour = warna kulit), pulse (heart rate = denyut nadi), Grimace (refleks terhadap rangsangan), activity (tonus otot), dan Respiration (usaha bernapas) atau sering disebut APGAR. Asfiksia

diklasifikasi menjadi tiga jenis yaitu asfiksia berat (nilai APGAR 0-3) asfiksia ringan-sedang (nilai APGAR 4-6) dan bayi normal (nilai APGAR 7-10).<sup>17</sup> Skor APGAR dinilai pada menit pertama, menit kelima, dan menit kesepuluh setelah bayi lahir, untuk mengetahui perkembangan keadaan bayi tersebut. Namun dalam situasi tertentu, skor APGAR juga dinilai pada menit ke sepuluh, kelima belas, dan kedua puluh, hingga total skor sepuluh.

## **2. Langkah II : Identifikasi Masalah Aktual**

Menurut penelitian yang dilakukan Annisa Khoiriah, dan Tiara Pratiwi (2019) Asfiksia neonatorum adalah suatu keadaan bayi baru lahir yang mengalami gagal bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Kondisi persalinan yang dapat menyebabkan asfiksia neonatorum adalah persalinan dengan sungsang, proses persalinan lama/macet. Dari hasil penelitian yang dilakukan ada hubungan bermakna antara Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir dengan partus lama.

Terdapat hal lain yang menyebabkan kejadian asfiksia neonatorum yaitu Ketuban Pecah Dini (KPD) seperti penelitian yang dilakukan oleh Jennie Palupi dkk (2018), Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa ibu bersalin yang melahirkan bayi dengan asfiksia disebabkan oleh keadaan air ketuban yang keruh. Pernafasan spontan pada bayi baru lahir bergantung pada kondisi janin saat masa kehamilan dan persalinan. Jika pertukaran gas/pengangkutan oksigen selama kehamilan dan persalinan terganggu asfiksia yang lebih berat dapat terjadi. Keadaan ini dapat mempengaruhi fungsi sel tubuh dan jika tidak teratasi akan menyebabkan kematian.

Penelitian yang sama juga di lakukan oleh Nova Linda Rambe (2018), bahwa Ketuban pecah dini (KPD) bahwa ibu yang bersalin dengan KPD berisiko mengalami asfiksia. Hal ini disebabkan karena aliran nutrisi dan O<sub>2</sub> tidak cukup, sehingga menyebabkan metabolisme janin menuju metabolisme anaerob dan terjadi penimbunan asam laktat dan piruvat yang merupakan hasil akhir dari metabolisme anaerob. Keadaan ini akan menimbulkan kegawatan janin (fetal distress) intrauteri yang akan berlanjut menjadi asfiksia neonatorum pada bayi baru lahir. Ketuban pecah dini juga dapat menyebabkan terjadinya persalinan prematur, pada kehamilan preterm organ janin belum berfungsi optimal misalnya organ paru. Komplikasi jangka pendek pada bayi lahir preterm dikaitkan dengan pematangan paru janin yang menyebabkan hipoksia sehingga saat lahir bayi mengalami asfiksia.

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Yuanita Syaiful dan Umi Khudzaifah (2016), tentang faktor yang mempengaruhi kejadian asfiksia neonatorum yaitu faktor persalinan seperti, ketuban pecah dini, partus lama dan jenis persalinan, kelahiran sungsang adapun faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya Asfiksia Neonatorum yaitu adanya persalinan dengan tindakan seperti penggunaan alat pada tindakan vakum ekstraksi dan adanya penggunaan obat bius dalam tindakan seksio sesarea.

Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh P.Mandasari (2018), yaitu salah satu penyebab terjadinya asfiksia yaitu faktor ibu dimana adanya

hubungan antara preeclampsia dengan kejadian asfiksia neonatorum, hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan pemindahan sel tropoblast yang menyebabkan kegagalan pengiriman darah melalui pembuluh arteri sehingga menyebabkan iskemia pada plasenta. Mengecilnya aliran darah menuju sirkulasi plasenter pada ibu hamil dengan preeklamsia menimbulkan gangguan pertukaran nutrisi, CO<sub>2</sub> dan O<sub>2</sub> yang menyebabkan asfiksia.

Ada juga faktor lain terjadinya asfiksia yaitu faktor bayi itu sendiri dimana penelitian yang dilakukan oleh Elfira Awalia Rahmawati, dkk (2018), dimana adanya hubungan antara BBLR dengan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir ini dikarenakan berat badan lahir bayi merupakan salah satu indikator kesehatan bayi baru lahir. Hasil penelitian diketahui bahwa berat badan lahir risiko berhubungan dengan kejadian asfiksia Hal ini disebabkan oleh hipoksia janin dalam uterus dan hipoksia ini berhubungan dengan faktor-faktor yang timbul dalam kehamilan, persalinan, atau segera setelah bayi lahir. Akibat-akibat asfiksia akan bertambah buruk apabila penanganan bayi tidak dilakukan secara sempurna. Tindakan yang akan dikerjakan pada bayi bertujuan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Salah satu masalah pada ibu yang mempunyai riwayat anemia dalam kehamilan yang akan menyebabkan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir, karena pengangkutan oksigen ke janin terganggu. Gangguan dapat ini akan menyebabkan hipoksia pada janin yang berada di dalam kandungan sehingga pada waktu kelahiran bisa menyebabkan asfiksia neonatorum. Kesulitan yang terjadi dalam kandungan, baik sebelum atau selama persalinan, biasanya akan

menimbulkan gangguan pada aliran darah di plasenta atau tali pusat. Tanda klinis awal dapat berupa deselerasi frekuensi jantung janin (Subriah.2018).

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh EL Vina (2019), ibu yang baru pertama kali melahirkan cenderung mengalami kesulitan dibandingkan dengan ibu yang sudah pernah melahirkan, hal ini disebabkan karena ibu dengan paritas primipara akan mengalami kesulitan saat persalinan akibat otot-otot masih kaku dan belum elastis sehingga akan mempengaruhi lamanya persalinan sehingga menyebabkan bayi mengalami asfiksia. Salah satu kesulitan yang di alami ibu saat persalinan adalah bayi dengan letak sungsang, karena kondisi yang ditemukan bahwa persalinan sungsang yang terjadi hampir semua mengalami asfiksia pada bayi hal ini di sebabkan karena pada saat persalinan sungsang melahirkan kepala bayi terkadang sulit sehingga proses kelahiran kepala lambat yang mengakibatkan suplai O<sub>2</sub> kejanin kurang dan mengakibatkan asfiksia saat bayi dilahirkan yang ditandai dengan bayi tidak segera menangis pada saat dilahirkan.

### **3. Langkah III: Identifikasi Masalah Potensial**

Ketika terjadi asfiksia neonatorum, terjadi gangguan pertukaran gas fetalplasental yang menyebabkan terjadinya penurunan pH (asidosis), peningkatan karbon dioksida (hiperkapnia), dan penurunan kadar oksigen (hipoksemia). Ketiga hal tersebut memicu terjadinya metabolisme anaerob. Metabolisme anaerob menyebabkan penurunan cardiac output sehingga terjadi penurunan aliran darah dan oksigen ke sistem saraf akibat kehilangan energi dan hipotensi yang ditimbulkan oleh asfiksia neonatorum pada bayi baru lahir. Hal ini menimbulkan

keadaan hipoksia dan iskemia pada sistem saraf tepi yang salah satu pendukung pemeriksaannya adalah dengan gerak refleks (Rakhmahayu dkk.2020).

Komplikasi yang terjadi pada bayi dengan asfiksia neonatorum yaitu hipoksia yang terjadi akan mengganggu metabolisme oksidatif serebral sehingga asam laktat meningkat dan pH menurun, menyebabkan proses glikolisis anaerobik tidak efektif. Jaringan otak yang mengalami hipoksia akan meningkatkan penggunaan glukosa. Adanya asidosis yang disertai dengan penurunan glikolisis, hilangnya autoregulasi serebrovaskular, dan penurunan fungsi jantung menyebabkan hipoperfusi otak dan dapat berlanjut menjadi iskemik dari otak. Perubahan yang terjadi di SSP akibat iskemik dari otak ini adalah aktivasi glikolisis anaerob, aktivasi enzim protease dan fosfolipase, aktivasi sistem caspase, stres oksidatif dan disfungsi mitokondrial yang pada akhirnya asfiksia neonatorum akan menyebabkan kematian sel-sel neuron otak (Agus Wijata, dkk.2016).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susi Widiawati (2017), salah satu komplikasi pada bayi yang mengalami asfiksia yaitu icterus dan dapat dicegah dengan cara memantau kehamilan guna mencegah terjadinya gawat janin atau asfiksia pada janin dan penanganan resusitasi pada neonatus yang mengalami asfiksia secara cepat dan tepat, sehingga angka kematian neonatus dapat berkurang. Terjadinya kekurangan oksigen pada janin mengakibatkan asupan oksigen ke organ dan jaringan berkurang sehingga neonatus dapat mengalami ikterus neonatorum. Karena pada masa neonatus fungsi hepar belum berfungsi dengan optimal sehingga proses glukoronidasi bilirubin tidak terjadi secara

maksimal atau jika terdapat gangguan dalam fungsi hepar akibat hipoksia, asidosis atau kekurangan glukosa sehingga dapat menyebabkan kadar bilirubin indirek dalam darah meninggi.

Komplikasi yang terjadi pada bayi dengan asfiksia yaitu terganggunya regulasi transport oksigen otak memainkan peranan penting dalam patogenesis kerusakan otak pada asfiksia perinatal. Satu juta anak yang mengalami asfiksia saat lahir hidup dengan kelainan syaraf kronis diantaranya cerebral palsy, keterbelakangan mental dan kecacatan.<sup>14</sup> hipoperfusi otak pasca asfiksia mengakibatkan konsumsi O<sub>2</sub> berkurang pada awal kehidupan neonatus dengan asfiksia berat, yang akan menyebabkan kerusakan otak (Albayani dkk.2018).

#### **4. Tindakan Segera**

Menurut Nurlailah Umar dkk (2020), dalam tindakan segera untuk menangani bayi yang mengalami asfiksia yaitu dengan melakukan tindakan resusitasi awal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu menghangatkan bayi, mengatur posisi sedikit ekstensi, mengisap lendir, mengeringkan dan merangsang taktil, serta memposisikan kembali bayi. Respon bayi baru lahir terhadap tindakan tersebut dari hasil observasi yaitu ada bayi yang menangis kuat atau bernapas spontan atau normal, serta warna kulit merah. Ada juga bayi yang menangis lemah, terdengar merintih dan warna kulit cyanosis. Beberapa bayi tidak bernapas atau apnea. Hasil observasi ditemukan bahwa komponen lain yang kurang dipenuhi oleh pelaksana resusitasi pada neonatus dengan asfiksia yaitu saat pemberian rangsang taktil, tekanan yang dilakukan terlalu kuat atau keras serta tepukan yang sangat kuat pada telapak kaki bayi.

Sebagian besar bayi dilakukan tindakan resusitasi lanjutan yaitu ventilasi tekanan positif dan ada 1 bayi membutuhkan ventilasi tekanan positif serta kompresi dada. Jumlah bayi yang membutuhkan tindakan lanjutan pada penelitian ini cukup besar disebabkan faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya asfiksia, salah satunya yaitu sebagian besar adanya ketuban bercampur mekonium. Bayi dengan ketuban bercampur mekonium dan dalam kondisi tidak bugar secara teori sebelum dilakukan tindakan resusitasi awal dianjurkan melakukan pengisapan dari mulut dan trakea untuk mencegah aspirasi mekonium dan memperberat gangguan pernapasan<sup>1</sup>, tetapi dari hasil observasi tindakan pengisapan lendir pada resusitasi awal hanya dilakukan di mulut atau hidung bayi. Hal ini dapat menjadi langkah lanjut untuk mengurangi respon bernapas pada bayi jika mekonium mencapai saluran napas.

Sama dengan penelitian di atas, Ai yeyeh (2015), menjelaskan tindakan umum yang dilakukan pada bayi yang mengalami asfiksia, yaitu dengan bersihkan jalan nafas, kepala bayi diletakkan lebih rendah agar lender mudah mengalir, rangsang refleks pernapasan, dilakukan setelah 20 detik bayi tidak memperlihatkan bernafas dengan cara memukul kedua telapak kaki menekan tanda achilles, mempertahankan suhu tubuh.

Penelitian yang dilakukan oleh Reni Yuli Astutik, dkk (2016), Asfiksia memerlukan tindakan penanganan yang tepat agar dapat mengatasi gejala ikutan yang akan timbul atau untuk mempertahankan hidup. Sedangkan upaya untuk menekan komplikasi-komplikasi dari kejadian asfiksia yaitu dengan diberikan

intervensi berupa resusitasi tepat waktu sehingga efek biokimia akibat asfiksia dapat dikembalikan dengan demikian kerusakan otak dan organ dapat dicegah.

Penelitian yang sama juga di lakukan oleh Tri Sakti W, dkk (2017). Penanganan pada asfiksia secara umum yaitu bersihkan jalan nafas dengan cara penghisapan lendir, rangsang reflek pernafasan dengan cara memukul kedua telapak kaki menekan tanda achilles dan mempertahankan suhu tubuh. Karena asfiksia neonatorum atau asfiksia perinatal merupakan penyebab mortalitas dan morbiditas, sehingga ketika terjadinya asfiksia maka segera berikan kebutuhan resusitasi dan intervensi untuk meminimalkan mortalitas dan morbiditas.

Tindakan yang di lakukan pada bayi baru lahir dengan segera dapat dilakukan dengan hangatkan tubuh bayi, atur posisi bayi, isap lender, keringkan bayi, atur posisi bayi dan kemudian dilakukan dengan penilaian. Dari penilaian ini dapat diketahui nilai APGAR skor menit pertama. Akibat-akibat asfiksia akan bertambah buruk apabila penanganan bayi tidak dilakukan secara sempurna. Tindakan yang akan dikerjakan pada bayi bertujuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan membatasi gejala-gejala lanjut yang mungkin timbul dan membahayakan bayi (Titik Maga Anggelia, dkk.2018).

Penelitian yang di lakukan Mimi Ruspita, Heny Rosiana (2018), SOP penatalaksanaan asfiksia neonatorum yaitu prosedur pertama yang dilakukan dengan langkah awal resusitasi yaitu HAIKAL, Bila bayi tidak bernafas atau megap-megap atau tetap sianosis setelah diberi oksigen 100%, lakukan segera VTP. Bila tidak bernafas atau megap-megap atau frekuensi jantung <100-60

x/menit atau sianosis teruskan VTP, melanjutkan penatalaksanaan dengan Kompresi Dada. Bila frekuensi jantung  $\leq 60$  kali/menit, berikan pengobatan dengan epinefrin, melalui pipa ET (lebih diutamakan) atau jalur intra vena. Kemudian segera lakukan kompresi dada dan VTP dengan koordinasi yang baik selama 30 detik dan nilai keadaan bayi. Keputusan untuk menghentikan resusitasi bila setelah 15 menit melakukan Resusitasi awal, VTP dan Kompresi dada dengan benar, tetap tidak ada denyut jantung.

Asfiksia pada bayi baru lahir termasuk risiko Oleh karena itu asfiksia memerlukan intervensi dan tindakan yang tepat untuk meminimalkan terjadinya kematian bayi, yaitu dengan pelaksanaan manajemen asfiksia pada bayi baru lahir yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bayi dan membatasi gejala sisa berupa kelainan neurologi yang mungkin muncul, dengan kegiatan yang difokuskan pada persiapan resusitasi, keputusan resusitasi bayi baru lahir, tindakan resusitasi, asuhan pasca resusitasi, asuhan tindak lanjut pasca resusitasi dan pencegahan infeksi (Arfan Nur.2016).

## **5. Perencanaan**

Penelitian yang dilakukan oleh Jenni Palupi dkk, yaitu tentang pencegahan asfiksia neonatorum dapat dilakukan dengan meminimalkan atau menghilangkan faktor risiko penyebab asfiksia. Derajat kesehatan ibu hamil harus baik dan komplikasi kehamilan, persalinan dan melahirkan harus dihindari. Beberapa intervensi penyebab rendahnya derajat kesehatan wanita khususnya ibu hamil yaitu akibat beberapa faktor seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, kepercayaan, adat istiadat dan lain sebagainya.

Terdapat pendapat lain yang dilakukan oleh Handriani Irwan dkk, yaitu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir adalah ibu hamil disarankan untuk melakukan kontrol secara teratur ke dokter kandungan, kontrol teratur bisa membantu memastikan kondisi kehamilan dan kesehatan janin dalam kondisi baik. Pada proses persalinan hal yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya asfiksia dengan melihat tanda-tanda gawat janin yaitu denyut jantung kurang dari 100x/menit atau lebih dari 160x/menit dan melihat mekonium dalam air ketuban, pengeluaran mekonium menunjukkan gawat janin.

Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuanita Syaiful dan Umi Khudzaifah (2016), tentang salah satu cara untuk menghindari Asfiksia Neonatorum pada bayi baru lahir, salah satunya yaitu persalinan pada ibu yang berlangsung lebih lama maka diperlukan intervensi dan tindakan yang tepat untuk mencegah partus lama yaitu dengan melakukan observasi menggunakan partograf untuk memantau kondisi ibu dan bayi serta kemajuan proses persalinan dan ketepatan tenaga medis dalam penanganan segera bayi baru lahir.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maria Magdalena Anabanu, dkk (2019). Pencegahan yang komprehensif dimulai dari masa kehamilan, persalinan dan beberapa saat setelah persalinan. Pencegahan berupa : Melakukan pemeriksaan antenatal rutin minimal 4 kali kunjungan, Melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap pada kehamilan yang diduga berisiko bayinya lahir dengan asfiksia. Memberikan terapi kortikosteroid antenatal untuk persalinan pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Melakukan

pemantauan yang baik terhadap kesejahteraan janin dan deteksi dini terhadap tanda-tanda asfiksia fetal selama persalinan dengan kardiotokografi. Meningkatkan ketrampilan tenaga obstetri dalam penanganan asfiksia di masing-masing tingkat pelayanan kesehatan.

Bedasarkan penelitian yang di lakukan oleh Dian Purnama Sari (2019). Ibu di harapkan untuk selalu memeriksakan kehamilannya, agar sewaktu persalinan maupun saat lahirnya bayi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan pada ibu preeklampsi, karena pada ibu dengan preeklampsia dapat terjadi penyempitan pembuluh darah sehingga menyebabkan terganggunya sirkulasi peredaran darah ke plasenta yang dapat mengakibatkan hipoksia intra uterine pada janin yang dapat berlanjut menjadi asfiksia pada bayi baru lahir.

Penelitian yang sama juga di lakukan oleh Suyani (2017), dimana untuk mengurangi kejadian asfiksia, ibu hamil agar lebih intensif dalam melakukan kunjungan ANC kepada petugas kesehatan agar dapat di ketahui kondisi janin dan berkonsultasi dengan petugas kesehatan untuk pemenuhan gizi selama masa kehamilan untuk menghindari terjadinya bayi BBLR dan Asfiksia, karena asfiksia merupakan salah satu penyebab kematian bayi baru lahir yang masih tinggi.

Penelitian yang di lakukan oleh Handriani, dkk (2019), terdapat hubungan antara beberapa faktor dengan kejadian asfiksia. Sehingga perlu beberapa hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir adalah ibu hamil di sarankan untuk melakukan kontrol secara teratur ke dokter kandungan, kontrol teratur bisa membantu memastikan kondisi kehamilan dan kesehatan janin dalam kondisi baik. Pada proses persalinan hal yang dapat di

lakukan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya asfiksia dengan melihat tanda-tanda gawat janin yaitu denyut jantung kurang dari 100x/menit atau lebih dari 160x/menit dan melihat mekonium dalam air ketuban, pengeluaran mekonium menunjukkan gawat janin.

## **6. Implementasi**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mimi Ruspita, dan Heny Rosiana (2018), penatalaksanaan asfiksia neonatorum di RSUD DR.H.Soewondo Kendal yaitu prosedur pertama yang dilakukan dengan langkah awal resusitasi. Bila bayi tidak bernafas atau megap-megap atau tetap sianosis setelah diberi oksigen 100%, lakukan segera VTP. Bila tidak bernafas atau megap-megap atau frekuensi jantung  $<100-60$  x/menit atau sianosis teruskan VTP, melanjutkan penatalaksanaan dengan Kompresi Dada. Bila frekuensi jantung  $\leq 60$  kali/menit, berikan pengobatan dengan epinefrin, melalui pipa ET (lebih diutamakan) atau jalur intra vena. Kemudian segera lakukan kompresi dada dan VTP dengan koordinasi yang baik selama 30 detik dan nilai keadaan bayi.

Penatalaksanaan berupa resusitasi neonatal dan membutuhkan pemeriksaan serta penanganan intensif lanjutan, salah satunya adalah pemeriksaan untuk menentukan rasio lesitin-sfngomielin dan amniosintesis yaitu memeriksa tingkat maturitas paru dan volume cairan surfaktan sehingga bayi mendapatkan penanganan berupa penambahan cairan surfaktan untuk meningkatkan ekspansi paru bayi (Bety Mayasari, dkk.2018).

Menurut Fitria Masulili, dkk (2015), yaitu komponen dalam prosedur tindakan resusitasi yang kurang dipenuhi oleh pelaksana resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia yaitu waktu atau lama tindakan resusitasi awal. Hal ini

tampak dari waktu yang digunakan untuk resusitasi awal yaitu dari 15 tindakan, ada 8 tindakan yang membutuhkan waktu lebih dari 30 detik, dan hasil observasi waktu yang digunakan ada yang mencapai lebih dari 2 menit. Hasil ini tidak sesuai dengan prosuder resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia menurut literature lain bahwa waktu yang digunakan pada resusitasi awal sejak bayi lahir sampai memposisikan kembali atau reposisi yaitu selama 30 detik.1.

Bayi baru lahir yang tidak bernapas atau apnea setelah dilakukan tindakan resusitasi awal membutuhkan tindakan resusitasi lanjutan contohnya yaitu ada 9 bayi, dan ada 4 bayi yang tepat dalam penggunaan waktu resusitasi awal yaitu 30 detik, tetapi ada 5 bayi saat dilakukan tindakan resusitasi awal membutuhkan waktu lebih dari 30 detik. Hasil observasi ditemukan ada bayi yang membutuhkan waktu sampai 2 menit. Tindakan dalam kurun waktu tersebut seperti pengeringan dan perangsangan pada kulit punggung, perut dan telapak kaki merupakan intervensi penilaian dan resusitasi. Prosedur tindakan ini dapat menstimulus neonatus untuk bernapas, tetapi bila bayi gagal bernapas spontan (apnea) atau menggap-mengap atau kecepatan denyut jantung kurang dari 100 kali/menit maka bantuan ventilasi harus segera dilakukan (Fitria Masulili, dkk, 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dian fitria arismawati, dkk (2018) yaitu penatalaksanaan berupa resusitasi neonatal dan membutuhkan pemeriksaan serta penanganan intensif lanjutan, salah satunya adalah pemeriksaan untuk menentukan rasio lesitin-sfngomielin dan amniosintesis yaitu memeriksa tingkat maturitas paru dan volume cairan surfaktan sehingga bayi mendapatkan

penanganan berupa penambahan cairan surfaktan untuk meningkatkan ekspansi paru bayi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sutriani Lumatauw, dkk. (2015). Bayi yang mengalami asfiksia akan mengalami gangguan pada berbagai fungsi organ, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan multidisiplin. Penanganan ensefalopati hipoksik-iskemik meliputi upaya mempertahankan suhu tubuh bayi tetap normal, menjaga perfusi dan ventilasi yang baik, menjaga keseimbangan asam basa dan elektrolit serta penanganan kejang.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hirohyati, dkk (2017). Terdapat hubungan antara ketuban pecah dini dengan kejadian asfiksia. Secara rehabilitatif bila terjadi asfiksia dilakukan upaya untuk menjaga agar tubuh bayi tetap hangat, menempatkan bayi dalam posisi yang tepat, penghisap lendir secara benar, memberikan rangsangan taktil dan melakukan pernafasan buatan (bila perlu). Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk mencegah asfiksia, memberikan pertolongan secara tepat dan adekuat bila terjadi asfiksia dan dapat mencegah hipotermi.

## **7. Evaluasi**

Evaluasi yang dilakukan yaitu dengan melihat APGAR SCORE karena Nilai apgar merupakan standar evaluasi neonatus, dapat dijadikan sebagai data dasar untuk evaluasi di kemudian hari dengan menilai keadaan denyut jantung (heart rate), respirasi (respiratory effort), tonus otot (muscle tone), refleks respon terhadap stimulasi (respon to stimuli), dan warna kulit (colour). Nilai apgar ialah suatu metode penilaian yang digunakan untuk mengkaji kesehatan neonatus

dalam menit pertama setelah lahir, serta dapat diulang pada menit ke-10 dan ke-15. Pemeriksaan ini dilakukan secara cepat pada bayi baru lahir untuk mengevaluasi keadaan fisik dari bayi baru lahir dan sekaligus mengenali adanya tanda-tanda darurat yang memerlukan dilakukannya tindakan segera terhadap bayi baru lahir (Diravita CFL Marsaulin, dkk, 2016).

Nilai apgar menit pertama menunjukkan toleransi bayi terhadap proses kelahirannya, dan menit kelima selanjutnya menunjukkan adaptasi bayi terhadap lingkungan barunya. Bila nilai apgar masih di bawah 7 atau bayi membutuhkan resusitasi, maka penilaiannya dilakukan setiap lima menit sampai normal atau usianya 20 menit sedangkan bayi normal memunyai nilai apgar lebih dari 7. Pada umumnya, nilai maksimum bayi yang prematur berkurang karena tonus otot yang buruk dan respon yang lebih lemah terhadap rangsangan daripada bayi yang cukup bulan (Diravita CFL Marsaulin, dkk, 2016).

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Minerva Riani Kadir (2018), yaitu Penanganan pasca resusitasi pada neonatus yang mengalami asfiksia perinatal sangat kompleks dan membutuhkan monitoring yang ketat dan tindakan antisipasi yang cepat, karena bayi berisiko mengalami disfungsi multi organ dan perubahan dalam kemampuan mempertahankan homeostasis fisiologis. Deteksi dan intervensi dini terhadap gangguan fungsi organ sangat mempengaruhi luaran dan harus dilakukan di ruang perawatan intensif untuk mendapatkan perawatan dukungan, monitoring, dan evaluasi diagnostik yang lebih lanjut.

Sedangkan Menurut Sugi Purwanti, dkk (2016), Penilaian APGAR untuk menentukan keadaan bayi pada menit ke 1 dan 5 sesudah lahir. Nilai ini berkaitan dengan keadaan asidosis dan kelangsungan hidup bayi. Pada periode ini sangat penting untuk mengetahui kondisi bayi dengan cepat. Apabila hasil penilaian APGAR bayi kurang dari 6 artinya bayi mengalami Asfiksia. Periode menit pertama kelahiran bayi merupakan golden time atau sebagai waktu penentuan keberhasilan bagi bayi untuk beradaptasi dari dalam rahim ke kondisi di luar rahim. Keberhasilan adaptasi bayi baru lahir berdasarkan indikator nilai APGAR. Besarnya nilai APGAR saat menit pertama kelahiran sangat menentukan kondisi bayi beberapa menit selanjutnya. Bayi baru lahir dengan nilai APGAR kurang dari 7 memiliki risiko lebih besar mengalami kegagalan nafas pertama kali segera setelah lahir. Petugas kesehatan harus segera melakukan resusitasi untuk meningkatkan kemampuan pernafasan bayi atau mempertahankan ventilasi jantung paru bayi sehingga bayi dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan di luar uterus. Kegagalan dalam penentuan diagnosa bayi pada menit pertama menyebabkan keterlambatan dalam tindakan resusitasi segera setelah lahir. Hal ini dapat menyebabkan kematian organ, kecacatan ataupun kematian bayi baru lahir.

Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, menurut penelitian Nurhikmah (2016), puncak kewaspadaan dilaksanakan dengan melakukan rujukan penderita ke pusat pelayanan dengan fasilitas yang lebih memadai setelah melampaui garis waspada agar penderita diterima di pusat pelayanan dalam keadaan optimal. Bidan diharapkan bekerjasama dengan dukun melalui pendidikan dukun sehingga dapat mengenal penderita dan dengan tepat dilakukan

rujukan medis. Tindakan resusitasi merupakan tindakan yang harus dilakukan dengan segera sebagai upaya untuk menyelamatkan hidup seorang bayi. Resusitasi pada neonatus yang mengalami gawat nafas merupakan tindakan kritis yang harus dilakukan oleh perawat dan bidan yang kompeten (Abdurrauf, dkk, 2020).

Di dalam keberhasilan suatu tindakan resusitasi perlu upaya bidan dalam melaksanakan standar penanganan asfiksia sesuai dengan kemampuan bidan dalam melaksanakan proses penanganan asfiksia pada bayi baru lahir yang sangat mempengaruhi ketrampilan dan pengetahuan (Endah Marlina, dkk, 2015). Hal ini sesuai dengan kemampuan bidan dalam upaya melakukan penatalaksanaan asfiksia bayi baru lahir dengan benar sehingga akan mengurangi angka kematian bayi karena asfiksia (Endah Marlina, dkk, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, KP (2015). Pada saat dilakukan oksigenasi dan resusitasi bertujuan untuk memberikan cukup oksigen dan memberikan ventilasi yang adekuat sehingga tercapai tujuan penanganan asfiksia yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bayi dan membatasi gejala sisa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Harima (2016), yaitu tentang salah satu pelaksanaan yang dapat dilakukan kepada bayi yang mengalami asfiksia yaitu dengan program stabilisasi yang direkomendasikan oleh American Academic Pediatrics yaitu stabilisasi neonatus dalam S.T.A.B.L.E terdiri dari: sugar and safe care (S), temperature (T), airway (A), blood pressure (B), lab study (L) dan emotional support (E). Program stabilisasi bertujuan memastikan kondisi bayi

dalam keadaan baik selama proses rujukan guna mencegah meningkatnya angka kematian, kesakitan dan timbulnya jejas (sequele) akibat asfiksia bayi baru lahir.

## **B. Implikasi Kebidanan**

Asfiksia adalah keadaan dimana bayi tidak dapat bernafas secara spontan atau teratur setelah lahir atau beberapa menit setelah lahir yang biasanya ditandai dengan hipoksia dan asidosis. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya asfiksia yaitu faktor ibu, faktor bayi dan faktor tali pusat, dari beberapa faktor tersebut ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian tentang hubungan antara faktor ibu, dimana pada ibu yang mengalami partus lama, usia yang sangat muda, preeklampsia, anemia, dan masalah selama kehamilan, akan sangat rentan mengakibatkan terjadinya asfiksia neonatorum, pada faktor tali pusat yaitu terjadinya lilitan tali pusat yang dapat menimbulkan bradikardi dan hipoksia janin, dan bila jumlah lilitannya banyak akan mengakibatkan gangguan pada pembuluh darah umbilical yang menyebabkan gangguan sirkulasi darah ke janin sehingga mengakibatkan janin mengalami asfiksia, faktor bayi yaitu BBLR diketahui bahwa BBLR sangat rentan terhadap berbagai masalah, salah satunya adalah rentan mengalami asfiksia neonatorum. Karena ketidakmatangan sistem organ yang menjadi salah satu pemicu utama terjadinya asfiksia neonatorum.

Jika asfiksia tidak di tangani dengan cepat maka akan menyebabkan kematian pada bayi, hal pertama yang di lakukan oleh bidan adalah, melakukan penilaian sepiantas, setelah itu membersihkan jalan nafas bayi, menghisap lendir pada hidung dan mulut bayi dengan menggunakan deller, memberi bayi nafas

buatan atau memasang oksigen, lakukan rangsangan taktil, jika tindakan pertama yang dilakukan tidak terjadinya perubahan maka lakukanlah resusitasi, setelah dilakukan resusitasi lakukan penilaian apgar score pada menit ke 5, jika bayi tidak bernafas masih megap-megap atau tetap sianosis setelah dilakukan resusitasi maka lakukan segera berkolaborasi dengan dokter untuk melakukan VTP. Jika bayi masih tidak bernafas atau megap-megap dan frekuensi jantungnya lemah dan masih sianosis maka teruskan VTP, tetap lakukan VTP dengan koordinasi yang baik selama 30 detik dan nilai keadaan bayi. Lakukanlah penilaian Apgar Score, jika Apgar Score meningkat maka hentikan resusitasi, jika bayi tetap tidak ada denyut jantung maka keputusan untuk menghentikan resusitasi dan memberikan asuhan pada keluarga bayi jika bayinya selamat, namun ketika bayinya tidak tertolong jelaskan pada keluarga dan memberi dukungan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Asfiksia adalah suatu keadaan dimana bayi tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur setelah lahir atau beberapa menit setelah lahir yang biasanya di tandai dengan hipoksia dan asidosis. Ada beberapa faktor resiko terjadinya asfiksia yaitu faktor ibu, faktor bayi, dan faktor tali pusat, berdasarkan *Literatur Review* maka dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Data objektif dari asfiksia dapat di lihat dari beberapa faktor yang sangat beresiko menyebabkan terjadinya asfiksia yaitu bisa di lihat dari beberapa peneliti yang menjelaskan tentang adanya hubungan faktor ibu, faktor bayi, dan faktor tali pusat dengan kejadian asfiksia neonatorum.
2. Faktor resiko ibu yang menyebabkan asfiksia yaitu ibu bersalin yang melahirkan bayi dengan keadaan air ketuban yang keruh. Pernafasan spontan pada bayi baru lahir bergantung pada kondisi janin saat masa kehamilan dan persalinan. Jika pertukaran gas/pengangkutan oksigen selama kehamilan dan persalinan terganggu asfiksia yang lebih berat dapat terjadi
3. Adapun beberapa komplikasi asfiksia pada bayi baru lahir yaitu hipoksia, hiperkarbia dan asidemia yang selanjutnya akan mengganggu sirkulasi bayi sehingga menimbulkan disfungsi berbagai organ tubuh pada bayi asfiksia seperti organ vital yang dapat memperburuk keadaan bayi yang lahir dengan asfiksia.
4. Tindakan segera yang di lakukan yaitu prosedur pertama yang dilakukan dengan langkah awal resusitasi Bila bayi tidak bernafas atau megap-megap atau tetap

- sianosis setelah diberi oksigen 100%, lakukan segera VTP. Bila tidak bernafas atau megap-megap atau frekuensi jantung  $<100-60$  x/menit atau sianosis teruskan VTP, melanjutkan penatalaksanaan dengan Kompresi Dada. Bila frekuensi jantung  $\leq 60$  kali/menit, berikan pengobatan dengan epinefrin, melalui pipa ET (lebih diutamakan) atau jalur intra vena. Kemudian segera lakukan kompresi dada dan VTP dengan koordinasi yang baik selama 30 detik dan nilai keadaan bayi. Keputusan untuk menghentikan resusitasi bila setelah 15 menit melakukan Resusitasi awal, VTP dan Kompresi dada dengan benar, tetap tidak ada denyut jantung.
5. Rencana tindakan yang di lakukan untuk penatalaksanaan yang tepat dan efektif pada asfiksia neonatorum dalam beberapa menit pertama kehidupan dapat mempengaruhi hasil jangka panjang terhadap kehidupan bayi premature, memerlukan penatalaksanaan berupa resusitasi neonatal dan membutuhkan pemeriksaan serta penanganan intensif lanjutan
  6. Pelaksanaan resusitasi yang di lakukan pada bayi dengan asfiksia neonatorum di R yaitu prosedur pertama yang dilakukan dengan langkah awal resusitasi. Bila bayi tidak bernafas atau megap-megap atau tetap sianosis setelah diberi oksigen 100%, lakukan segera VTP. Bila tidak bernafas atau megap-megap atau frekuensi jantung  $<100-60$  x/menit atau sianosis teruskan VTP, melanjutkan penatalaksanaan dengan Kompresi Dada. Bila frekuensi jantung  $\leq 60$  kali/menit, berikan pengobatan dengan epinefrin, melalui pipa ET (lebih diutamakan) atau jalur intra vena. Kemudian segera lakukan kompresi dada dan VTP dengan koordinasi yang baik selama 30 detik dan nilai keadaan bayi.

7. Mengevaluasi keadaan fisik bayi yang mengalami asfiksia neonatorum dengan melakukan penilaian apgar dimana apgar ialah suatu metode penilaian yang digunakan untuk mengkaji kesehatan neonatus dalam menit pertama setelah lahir, serta dapat diulang pada menit ke-10 dan ke-15. Pemeriksaan ini dilakukan secara cepat pada bayi baru lahir untuk mengetahui keadaan fisik dari bayi baru lahir dan sekaligus mengenali adanya tanda-tanda darurat yang memerlukan dilakukannya tindakan segera.

## **B. Saran**

Dalam penyusunan *Litratur review* ini masih terdapat banyak kekurangan dan diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi penelitian selanjutnya mengenai Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir dengan menggunakan pendekatan 7 langkah Varney. Dengan didapkannya penjelasan mengenai Afiksia Pada Bayi Baru Lahir, maka peneliti menyarankan alangkah baiknya asuhan yang diberikan kepada pasien dengan adekuat untuk menghindari hal-hal yang dapat timbul selanjutnya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut terutama pada penanganan asfiksia sehingga leboh banyak referensi terbaru yang di dapatkan oleh orang lain. Kepada peneliti selanjutnya lebih efektif juga melakukan penelitian dengan melakukan metode *surveillance* yang bersifat sosial dan tidak mengandalkan data dari rekam medic Rumah Sakit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf & Pitriawati Pia. (2019) . *Hubungan Tingkat Pendidikan Perawat Pelaksana Terhadap Tindakan Resusitasi Pada Neonatus Yang Mengalami Kegawatdaruratan Pernafasan di Ruang Perinatologi Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar*. Banjar.
- Agustin Lia. (2016) . *Gambaran Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rumah Sakit Di Kediri*. Kediri.
- Albayani Melati Inayati, Djauhar Ismail, & Mei Neni Sitaresmi. (2018) . *Pengaruh Asfiksia Terhadap Ukuran Lingkar Kepala Anak Usia 6 Bulan - 2 Tahun Di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat*. NTB.
- Aliyanto Warjadin & Putrian Yeyen. (2015). *Faktor Ibu dan Janin yang Mempengaruhi Kejadian Asfiksia*. Tanjung Karang.
- Anabanu Magdalena Maria, Fatmawati Istiadah, & Sumbini Tri Gempi. (2019) . *Hubungan Persalinan Prematur Dengan Kejadian Asfiksia Di Rsud Jombang Tahun 2019*.Jombang.
- Anggelia Mega Titik. Sasmito Lulut, & Purwaningrum Yuniasih. (2017) . *Risiko Kejadian Ikterus Neonatorum Pada Neonatus Dengan Riwayat Asfiksia Bayi Baru Lahir Di Rsd Dr. Soebandi Jember Pada Tahun 2017*.Jember.
- Ardiana Dika & Wafi Nur Muslihatun. (2015) . *Hubungan Prematuritas Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum*. Yogyakarta.
- Ardyana Dina dan Sari Puspita Erma. (2019) . *Hubungan Lilitan Tali Pusat, Partus Lama, dan Plasenta Previa dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum*. Palembang.
- Arismawati Dian & Idayanti Titiek. (2018). *Hubungan Persalinan Prematur Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Ruang Bersalin Rsu Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto*.Mojokerto.
- Astuti Yuli Reni & Ferawati Nancy . (2016) . *Hubungan Berat Bayi Lahir Rendah dengan Kejadian Asfiksi Neonatorum Di RSUD dr. Iskak Tulungagung*. Kediri
- Batubara Ramadhan Apriany dan Fauziah Nana. 2020, *Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rsu Sakinah Lhokseumawe*. Banda Aceh.
- Burhanudin H.N. (2012). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.Fitra rabbani.Garut.
- Dewi Safriana Anggita & Khofiya Nidatul. (2020) . *Resiko Persalinan Induksi Terhadap Kejadian ASfiksia pada Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta.
- Dg Taha Inaya , Elizabeth Herini , & Djauhar Ismail. (2017) . *Kejadian asfiksia dan perkembangan anak usia 6-24 bulan di rumah sakit Luwuk, Sulawesi Tengah*.Luwuk.

- Ekasari Utami Wahyu & Rahayu Septiyanti Dita. (2015) . *Hubungan BBLR dengan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir*. Purwodadi.
- Eko Pamalih. (2019). *Buku Saku Manajemen Masalah Bayi Baru Lahir*.Lampung.
- Fajarwati Novia , Pudji Andayani, Lena Rosida.(2016) . *Hubungan Antara Berat Badan Lahir Dan Kejadian Asfiksia Neonatorum*.Banjarasin.
- Farhdiba Idha, & MS Rahmat Basuki. (2017) . *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terjadinya Asfiksia pada Bayi Baru Lahir di Rumah Sakit Syech Yusuf Gowa Tahun 2017*.Gowa.
- Fauzia & Wahyuni Sri. (2017) . *Faktor Persalinan dan Kejadian Asfiksia di RSUD Kota Bogor*. Bogor.
- Gerungan Careline Junita, Adam Syuul, & Losu Nancy Fredrika. (2015). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado*. Manado.
- Giovanni Gilberta. (2020) . *Terapi Hipotermia untuk Neonatus Asfiksia*. Jakarta.
- Gilang, Notoatmodjo Harsoyo & Rakhmawatie Dian Maya. (2014) . *Faktor yang berhubungan kejadian asfiksia neonatorum*.Surakarta.
- Handayan Mustika Ayui. (2019) . *Hubungan Usia Ibu dan Partus Lama Terhadap Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Raden Mattaaher Provinsi Jambi*. Jamabi.
- Hirohyati, Fatmawati Istadah, & Sari Anjas Wahyu. (2017) . *Hubungan Ketuban Pecah Dini (KPD) dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir di RSUD Jombang Tahun 2017*. Jombang.
- Indah Nur Siti, & Apriliana Ety. (2016) . *Hubungan antara Preeklamsia dalam Kehamilan dengan Kejadian Asfiksia pada Bayi Baru Lahir*. Lampung.
- Intarti Desi Wiwit, Puspitasari Lina, & Pradani Ika Restu. (2016) . *Efektifitas Muscle Pumping dalam Meningkatkan Score Apgar pada Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia*.Cilacap.
- Irwan Handriani, Meliana Nila, & Muammir Alifa Putri. (2019) . *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2019*. Makassar.
- Istiqomah Arifah & Astria Yesi. (2014) . *Hubungan Ketuban Pecah Dini (KPD) dengan Kejadian Asfiksia*. Yogyakarta.
- Kadir Riani Minerva. (2018) . *Stabilisasi dan Transportasi Neonatus* . Palembang.
- Katiandagho Novisye & Kusmiati. (2015). *Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum*.Manado.
- Karlina Novvi, Ermalinda Elsi & Pratiwi Mulya Wulan. (2016) . *Asuhan kegawatdaruratan maternal dan neonatal*.In medika. Sumatra barat.

- Khanis Abdul & Purbowati Ratnaningsih Mustika. (2017) . *Hubungan Asfiksia Neonatorum Dan Kejang Neonatorum Di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr Margono Soekarjo Purwokerto Periode 2016-2017*. Purwokerto.
- Khoiriah Annisa & Pratiwi Tiara. (2019) . *Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Asfiksia pada Bayi Baru Lahir*. Palembang.
- KP. Sari. (2015) . *Asfiksia Neonatorum Pada Bayi Berat Lahir Rendah*. Lampung.
- Kusumawati Laras Putri, Syiska Atik Maryanti, & Mohammad Wildan. 2019. *Risiko Derajat Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Jenis Persalinan*. Malang.
- Lockhart Anita & Dr. Lyndon Sapitra. (2014) . *Neonatus Normal dan patologis*. Bina aksara. Tangerang.
- Lumatauw Sutriani , Kumaat Lucky, & Karundeng Michael. (2016) . *Hubungan Pengetahuan dan Sikap Perawat dengan Penanganan Asfiksia Berat pada Bayi Baru Lahir di Ruang Nicu RSUP Prof DR. R.D Kandou Manado*. Manado.
- M.Harima, Kartasurya Irene Martha, & Fatimah Siti. (2016) . *Analisis Pelaksanaan Program Stabilisasi Bayi Asfiksia Oleh Bidan di Puskesmas Kota Parepare*. Parepare.
- M. K. Rochmah, Vasra elita, Dahliana & Sumastri Heni. (2012) . *Asuhan neonatus bayi, dan balita*. Buku kedokteran EGC. Jakarta.
- Mansyarif Rosminah. (2016) . *Risk Factors That Causes Asphyxia Neonatorum In Lotus Room Of Muna District Hospital In 2016*. Kendari.
- Mandasari P. (2018) . *Hubungan Kehamilan Lewat Waktu dan Preeklampsia Berat (PEB) dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum*. Bangka Belitung.
- Marlina Endah & Apriyanti Any. (2015) . *Analisis Upaya Bidan dalam Penanganan Asfiksia Bayi Baru Lahir di Puskesmas Kbupaten Karanganyar*. Karanganyar.
- Marsaulina CFL Diravita, Tamba Ernawaty, & Pasaribu Mesinna Dona. (2016) . *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Nilai Apgar Persalinan per Vaginam di RS UKI 2016*. Jakarta.
- Maryunani Anik & Sari Puspita Eka. (2013) . *Asuhan kegawatdaruratan maternal dan neonatal*. Trans info media. Jakarta.
- Mayasari Bety, Arismawati Dian Fitra, Idayanti Titik, & Wardani Aprilia Riska. (2018) . *Hubungan Persalinan Premature dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di Ruang Bersalin RSU DR Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto*. Mojokerto.
- Masitoh Sitti. (2015) . *Asfiksia Faktor Dominan Penyebab Kematian Neonatal*. Semarang.
- Masulili Fitria, Emy Nurmalisa, & Nurlailah. (2020) . *Analysis of The Suitability of Neonatal Resuscitation Procedures with Birth Asphyxia at High Risk Patients Room of Anutapura General Hospital*. Palu.

- Musyahida. (2019) . *Hubungan Asfiksia Neonatorum dan Fraktur Clavikula dengan Persalinan Pervaginam Letak. Pare-pare.*
- Nasrawati & Wati Erma Elisa. (2016) .*Hubungan Berat bayi lahir rendah dengan kejadian asfiksia neonatorum di rumah sakit umum dewi sartika prov silawesi tenggara.* Kendari.
- Nugroho Cahyo Maulana Prima, Dewiyanti Lilia, & Rohmani Afiana. (2015) . *Tingkat Keparahan Asfiksia Neonatorum Pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).* Semarang.
- Nur Arfan. (2017). *Gambaran Kejadian Asfiksia di UPTD Puskesmas Ajangale pada Tahun 2016.* Bone.
- Nurhikmah. (2016) . *Partus Lama dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir di RSUD Pangkep.*Pangkep.
- Palupi Jenni, Widada Wahyudi , & Fitriyaningsih Agustina Ayu. (2018) . *Risiko Asfiksia Neonatorum berdasarkan Keadaan Air Ketuban di RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2018.*Malang.
- Palupi Jenni & Maryanti Atik Syatik. (2020) . *Resiko Kejadian Asfiksia Neonatorum pada Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Kalisat Jember.* Jember.
- Paunno Magdalena. (2019) . *Gambaran Kematian Neonatal di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon.* Ambon.
- Putra Rizema Sitiatava. (2012) . *Asuhan natus bayi dan balita untuk keperawatan dan kebidanan.*Diva press.Yongyakarta.
- Purwanti Sugi, Trisnawati Yuli, & Retnowati Misrina. (2016) . *Pengaruh Lama Kala II Pengaruh Lama Kala II dengan Nilai APGAR SCORE Menit Pertama Kelahiran.* Purwokerto.
- Rahayu Sri Puji, & Sri Tjahjowati. (2016) . *Analisis Kasus Asfiksia Pada Kematian Neonatal Di Rsud Tugurejo Semarang.*Semarang.
- Rahma Sitti Andi & Mahdinah Armah. (2014) . *Analisis faktor resiko kejadian asfiksia pada bayi baru lahir di RSUD syekh yusuf gowa dan RSUP dr wahidin sudirohusodo makassar tahun 2013.* Jurnal kesehatan. Makassar.
- Rahmawati Awalia Elfira, Lestari Yuli, & Pelitawati Surbardiah Ida. (2018) . *Hubungan Berat Badan Lahir Resiko (<2500gr DAN >4000gr) dengan Asfiksia di RSD Mayjen HM Ryacudu KOTabumi Lampung tahun 2018.* Lampung.
- Rahmawati Rosa,Umar Syaniah & Meti. (2017) . *Hubungan Anemia Ibu Hamil dengan Kejadian Asfiksia dan Bayi Berat Lahir Rendah di RSKD Ibu dan Anak Sitti Fatimah Makassar.* Makassar.
- Ramadhana Nur Awaliya, Andayani Pudji, & Rosida Lena. (2020). *Hubungan Faktor Ibu dan Neonatus dengan Jumlah Eritrosit Berinti pada Asfiksia Neonatorum di RSUD Ulin Banjarmasin.* Banjarmasin.
- Rambe Linda Nova. (2018) . *The Relationship Between Labor Premature Rupture Of Membranes Asphyxia Neonatorum at Public Hospital Gunungsitoli.* Medan.

- Rakhmahayu Atika, Evi Rokhayati, & Erindra Budi Cahyanto. (2020). *Hubungan Asfiksia Neonatorum Dengan Daya Reflek Sucking Pada Bayi Baru Lahir Di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah*. Jawa Tengah.
- Ratnawati Eka Anggit & Yusnawati Nani. (2016) . *Hubungan Kehamilan Serotinus dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta.
- Rizkina Rullyta Farah, Andayani Pudji, & Rosida Lena. (2020) . *Hubungan Faktor Ibu dan Neonatus Dengan LDH Serum pada Asfiksia Neonatorum*. Banjarmasin.
- Rosmini, & Djufri Sutarni. (2018) . *Hubungan Partus Lama dengan Kejadian Bayi Asfiksia di RSUD Wates Kulonprogo Yogyakarta tahun 2018*. Yogyakarta.
- Rukiya Yeyeh Ai & Yulianti Lia. (2015) . *Asuhan Neonatus bayi dan anak balita*. Buku mahasiswa kebidanan. Jakarta.
- Ruspita Mimi & Rosiana Heny. (2018) . *Gambaran Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir yang Mengalami Asfiksia Neonatorum di Rumah Sakit Umum Daerah DR.H.Soewondo Kabupaten Kendal*. Kendal.
- Sagita Desni Yona. (2016) . *Hubungan Antara Ketuban Pecah Dini dan Persalinan Sectio Caesarea dengan Kejadian Asfiksia pada Bayi Baru Lahir*. Lampung.
- Saleha Sitti. (2013) .*Asuhan kebidanan pada masa nifas*. Salemba medika. Jakarta.
- Sari Purnama Dian. (2019). *The Relationship of The Preeklampsia Events and Events Asfiksia Neonatorum*. Banjarmasin.
- Sarijan Abdurrahman Muhammad Abu. (2007). *Etika pemberian nama anak dalam islam*. Jakarta.
- Sarosa Gatot Irawan, Alifiani Hikmah Putranti, & Tri Kartika Setyarini. (2015) . *Pengaruh Asfiksia Neonatal Terhadap Gangguan Pendengaran*. Semarang.
- Sondakh J.S.Jenny. (2013) .*Asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir*. Erlangga medical series. Jakarta.
- Subriah. (2018) . *Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil Yang Menjalani Persalinan Spontan Dengan Angka Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rsdkia Pertiwi Kota Makassar*. Makassar.
- Suradi Rulina. 2015 .*Pencegahan dan Penalaksanaan Asfiksia Neonatorum*. Jakarta.
- Suroso & Sunarsih. (2015) . *Apgar Score pada Bqayi Baru Lahir dengan Asfiksia Neonatorum Pasca Resusitasi Jantung Paru*. Jawa Tengah.
- Suyanti. (2017) . *Hubungan jenis persalinan dan berat lahir dengan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka tahun 2017*. Majalengka.

- Syafrudin, Karningsi Nr, & Dairi Mardiana. (2011) . *Untaian materi penyulihan KIA*. Jakarta.
- Syaiful Yuanita & Khudzaifah Umi. (2016) . *Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di RS Muhammadiyah Gresik*. Gresik.
- Tahang Setiawan Andi, Nauval Muhammad, & Afna Reisiya Niky. (2017) . *Hubungan Preeklampsia dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Kota Mataram Tahun 2017*. Mataram.
- Umar Nurlailah, Masulili Fitria, & Nurmalisa Emy Baiq. (2020) . *Analisis Keseuaian prosedur Tindakan Resusitasi pada Neonatus dengan Asfiksia di Ruang Peristi RSUD Anutapura Palu*. Palu.
- Utami Tin dan Purwati Era. (2018) . *Faktor yang mempengaruhi asfiksia neonatorum di rsud prof. Dr. Margono soekarjo purwokerto tahun*. Purwekerto.
- Vina El. (2019) . *Hubungan Paritas dan Berat Bayi Lahir dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum pada Bayi Baru Lahir*. Batam.
- W Sakti Tri, Rohana Nana, & P Fika Ayu. (2017) . *Hubungan Bayi Berat Lahir Rendah (Bblr) Dengan Kejadian Asfiksia Di Ruang Perinatologi Resiko Tinggi (Peristi) Rsud. Dr. H. Soewondo Kendal*. Kendal.
- Wahyuni Sri & Wiwin Wayan Ni. (2020). *Hubungan Usia Ibu dan Asfiksia Neonatorum dengan Kejadian Respiratory Distress Syndrome (RDS) pada Neonatus di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda*. Samarinda.
- Wahyuningsih Melania & Liliana Anita. (2015) . *Analisa Faktor Resiko Kejadian Asfiksia Bayi Baru Lahir di RSUD Wates*. Yogyakarta.
- Widiawati Susi. (2017) . *Hubungan sepsis neonatorum, BBLR dan asfiksia dengan kejadian ikterus pada bayi baru lahir*. Jakarta.
- Wijata Agus, Rocky Wilar, Sarah M. Warouw, & Johnny Rompis. (2016) . *Kadar Neuron-Specific Enolase Serum dan Derajat Ensefalopati Hipoksik Iskemik pada Asfiksia Neonatorum*. Manado.
- Wijayanti Wiwit, Nani Hendriani, Okta Zenita & Siti Fatimah. (2019) . *Hubungan Karakteristik Ibu Dan Anak Dengan Perkembangan Balita Dengan Riwayat Asfiksia Neonaturum Di Puskesmas Makasar Jakarta Timur*. Jakarta.
- Yuliasari Dewi. (2019) . *Hubungan Ketuban Pecah Dini (Kpd) Dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir Di Rsud Dr. H. Abdoel Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2017*. Lampung.
- Zulmi Diani. (2018) . *Studi Kasus Manajemen Kebidanan pada Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia Sedang*. Jakarta.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS PEMILIK

**Nama** : Siti Seprinita Vanath  
**Nim** : 70400115029  
**Tempat Tanggal Lahir** : Bemo, 03 September 1998  
**Agama** : Islam  
**Alamat** : Desa Bemo, Kecamatan Werinama, Maluku

**Nama Orang Tua**  
**Ayah:** Abdul K Vanath (alm)  
**Ibu** : Safia Voth

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2003-2009 SD Negeri Bemo
2. Tahun 2009-2012 SMP Negeri I Werinama
3. Tahun 2012-2015 SMA Negeri I Werinama
4. Tahun 2015-2021 UIN Alauddin Makassar