

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA WANITA
PADA FASE PRA KONSEPSI DENGAN KEK
(KEKURANGAN ENERGI KRONIK)**

(LITERATUR REVIEW)



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Meraih Gelar
Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

SRI ANDRIANI

NIM : 70400117080

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Andriani
Nim : 70400117080
TTL : Pajalayya-02-Mei-1999
Jurusan prodi : Kebidanan
Fakultas program : Kedokteran Dan Ilmu kesehatan
Alamat : Samata Gowa
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita
Fase Pra Konsepsi Dengan KEK (Kekurangan
Energi Kronik) (*Litereatur Review*).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa karya tulis ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Samata-Gowa, 15 Juli 2021

Penulis

Sri Andriani

70400117080

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Sri Andriani


Nim : 70400117080

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita Fase Pra konsepsi
Dengan KEK (Kekurangan Energi Kronik) (*Literatur Review*)

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa 15-Juli-2021

Pembimbing I



Zelna Yuni Andryani. S.ST.,M.Keb
NIP :198903282 019032 2 018

Pembimbing II



dr. Darmawansyih.M.kes
NIP:19850228 201101 2 000

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita Fase Pra Konsepsi Dengan KEK (Kekurangan Energi Kronik)". Yang disusun oleh Sri Andriani Nim: 70400117080, mahasiswi jurusan kebidanan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji karya tulis ilmiah yang diselenggarakan pada kamis, 15 Juli 2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 15 Juli 2021
5 Zulhijah 1442

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SiT.,M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Zelna Yuni Andyani, S.ST.,M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Darmawansyih.M.Kes	(.....)
Penguji I	: Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST.,M.Keb	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Rahmi Damis, Ag	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes
Nip. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, kebaikan dan izinya sehingga penulis mampu menyelesaikan Literatur Review ini dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan pada wanita fase pra konsepsi dengan kekurangan energi kronik (KEK).

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kemusyrikan dan membentangkan permadani-permadani keislaman sehingga kebaikannya dapat kita rasakan seperti saat ini.

Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sang ratu yang tak bermahkota namun bertelapak kaki syurga Ibunda tercinta Harianti cinta pertamaku karena doamu adalah kunci keberhasilanku.
2. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam negeri Makassar
3. Kepada Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp(A), M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar sekaligus pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya demi membantu, membimbing, serta memberikan saran yang membangun dalam penyusunan proposal studi *Literatur Review* ini

4. Ibunda Firdayanti, S..ST.,M.Keb selaku Ketua Jurusan Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Makassar
5. Ibunda Zelna Yuni Andryani, S.ST,M.Keb selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan saran yang membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (*Literatur Review*)
6. Dr. Darmawansyih, M.Kes selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan saran yang membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (*Literatur Review*)
7. Ibunda Aniq Mumthi'ah Al-kausar, S.ST.,M. Keb. selaku penguji I yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan saran yang membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (*Literatur Review*)
8. Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag selaku penguji Agama yang telah senantiasa memberikan saya tambahan ilmu agama serta memberikan masukan dan saran yang bersifat islamiah pada Karya Tulis Ilmiah sehingga penulis dapat mengetahui hubungan kasus yang penulis angkat dan kaitannya dengan islam.
9. Segenap dosen tekhususnya para dosen Prodi Kebidanan dan para staf akademik Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dan membimbing penulis selama dalam penyusunan proposal ini berlangsung

10. Kepada Ismail jr orang yang mensupport saya pada saat saya *down* dan paling mengerti dan memberikan dukungan dan berusaha menghibur saat berada pada masa-masa tersulit.
11. Kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan nasehat dan masukan untuk kebaikan penulis sendiri. Terima kasih untuk selalu menjadi alasan penulis untuk tetap berpendidikan.
12. Kepada sahabat-sahabat saya dikampus Ida Yana Fitmatan, Novita, Nurfadila Aulia, A'isa, Defira Ramadani, dan saudari-saudari seperjuangan Aviditas Kebidanan 2017 yang membuat bangku perkuliahan menjadi lebih berwarna.
13. Semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan Literatur Review ini.

Samata-Gowa, 15 Juli 2021

Penulis

Sri Andriani
70400117080

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
1. Tujuan umum.....	5
2. Tujuan khusus	6
D. Manfaat penulisan.....	6
1. Manfaat bagi praktis	6
2. Manfaat ilmiah.....	6
3. Manfaat institusi	6
4. Manfaat penulis.....	7
5. Manfaat bagi pembaca	7
E. Metode Penulisan.....	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II Tinjauan Pustaka	9
A. Tinjauan Umum Tentang pra konsepsi.....	9
1. Pengertian pra konsepsi	9
2. Karakteristik periode pra konsepsi	10
3. Kesehatan dalam periode pra konsepsi.....	12

4. Konseling pra konsepsi.....	13
5. Imunisasi pranikahan.....	14
6. Menentukan masa subur	14
7. Kebutuhan gizi pada masa pra konsepsi.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Menstruasi	25
1. Definisi KEK	25
2. Etiologi KEK	26
3. Tanda dan gejala.....	28
4. Patofisiologi KEK.....	28
5. Diagnosa	30
6. Komplikasi.....	31
7. Penatalaksanaan.....	32
8. Faktor resiko terjadinya KEK.....	35
9. Pengukuran lingkaran lengan atas (LILA)	39
10. Indeks massa tubuh.....	41
11. Perencanaan kehamilan dalam periode kehamilan	44
C. Tinjauan Umum pra konsepsi Menurut Pandangan Agama Islam	45
D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	50
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan.....	50
2. Tahapan Manajemen Asuhan Kebidanan	50
3. Manajemen Asuhan Kebidanan dalam Bentuk SOAP	57
BAB III TELUSURAN EVIDENCE BASED LEARNING	61
A. Matriks Langkah	161
B. Matriks Langkah II.....	76
C. Matriks Langkah III	90
D. Matriks LangkahIV	100
E. Matriks Langkah V	112

F. Matriks Langkah VI.....	126
G. Matriks Langkah VII.....	138
DAFTAR PUSTAKA	156

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kebutuhan Energi, Protein, Lemak, Karbohidrat, Serat, Dan Air pada Masa Pra Konsep	26
Tabel 2.2 Kebutuhan Vitamin E, Dan C, Asam Folat, Zat Besi,Seng dan Selenium pada Masa Pra Konsepsi.....	27
Tabel 2.3 Klasifikasi KEK Berdasarkan IMT	28
Tabel 2.4 Klasifikasi KEK Menggunakan Dasar Lila pada Wanita Usia Subur.....	28
Tabel 2.5 Klasifikasi ambang Batas IMT untuk Indonesia.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pita LILA.....	42
Gambar 2.2 Cara mengukur LILA	43

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, MARET, 2021

Nama : Sri Andriani
Nim : 70400117080
Pembimbing I : Zelna Yuni Andryani
Pembimbing II : Darmawansyih
Judul :Manajemen Asuhan Kebidanan pada Wanita Fase Pra
Konsepsi dengan KEK (Kekurangan Energi Kronik)
(*Literatur Review*)

Kekurangan energi kronik didefinisikan sebagai keadaan ketika wanita mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan dan lingkaran lengan atas dibawah 23,5 cm dan Indeks Massa Tubuh (IMT) dibawah 18,5 kg.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami asuhan kebidanan pada wanita pra konsepsi dengan KEK (Kekurangan Energi Kronik) metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi Literatur (Literatur Review) dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, Literatur dan media internet yang berhubungan tentang kekurangan energi kronik sesuai dengan evidence based.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk menegakan diagnosis kekurangan energi kronik (KEK) yaitu melakukan pengukuran lingkaran lengan atas (LILA) dan menghitung Indeks massa tubuh (IMT) pada wanita pra konsepsi. Penatalaksanaan KEK dapat dilakukan yaitu memberikan asuhan sesuai dengan evidence based dengan cara memberikan konseling dan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang bagi wanita pra konsepsi dengan KEK (kekurangan Energi kronik).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penatalaksanaan yang tepat dan efektif sesuai evidence based pada wanita pra konsepsi dengan KEK (Kekurangan energi Kronik) serta pentingnya melakukan konseling dan memberikan edukasi dan penyuluhan tentang pemenuhan gizi seimbang.

Kata kunci : KEK. Wanita Pra Konsepsi, Asuhan Kebidanan

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, MARECH, 2021

Nama : Sri Andriani
Nim : 70400117080
Pembimbing I : Zelna Yuni Andryani
Pembimbing II : Darmawansyih
Judul : Midwifery Care Management on Preconception Women with the Case of Chronic Energy Deficiency (Literature Review)

Chronic energy deficiency (CED) is a condition of a body characterizes by low body weight and low energy stores on women, possibly limited physical capacity due to deprivation of food over a long period of time with an upper arm circumference of below 23.5 and body mass index of less than 18.5 kg.

The major objective of this study was to investigate midwifery care management on preconception women with the case of Chronic Energy Deficiency. The method used in this research was Literature Review. The data were collected from various related books and journals from the internet.

The findings of this research indicated that the examinations that could be done to diagnose the case of chronic energy deficiency in preconception women were in the forms of upper arm circumference measurement and body mass index calculation. The treatments could be given in the forms of providing medical care according to evidence based research. Besides, counseling and education related to the importance of balanced nutrition for pre-conception women should also be given.

This research concluded that appropriate and effective management needs to be given to pre-conceptional women with CED (Chronic Energy Deficiency). In addition, counseling and education related to the fulfillment of balanced nutrition must be provided to the society.

Key words: CED, Preconception Women, Midwifery Treatments.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umumnya penyakit kekurangan gizi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menyangkut multidisiplin dan selalu harus dikontrol terutama masyarakat yang tinggal di negara-negara berkembang. Selanjutnya karena menyangkut masyarakat banyak, kekurangan gizi yang terjadi pada sekelompok masyarakat tertentu menjadi masalah utama di dunia. Masalah gizi masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di negara berkembang termasuk Indonesia dan merupakan penyebab kematian ibu dan anak secara tidak langsung yang sebenarnya dapat dicegah (Puli et al. n.d, 2014).

Pra konsepsi merupakan masa sebelum hamil atau masa sebelum terjadinya pertemuan antara ovum (sel telur) dengan sperma. Wanita pra konsepsi diasumsikan sebagai wanita dewasa atau wanita usia subur yang siap menjadi seorang ibu.

Kekurangan Energi Kronis (KEK) didefinisikan sebagai keadaan ketika wanita mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun. Kekurangan energi kronis (KEK) ditandai dengan lingkaran lengan atas <23,5 cm. kekurangan energi kronis pada wanita usia subur (pra konsepsi) yang berlangsung secara terus menerus dan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan gangguan kesehatan.

Asupan energi dan protein yang tidak mencukupi pada ibu hamil dapat menyebabkan kekurangan energi kronis (KEK). Gizi janin tergantung sepenuhnya kepada ibu. Oleh karena itu kecukupan gizi ibu sangat mempengaruhi janin yang dikandungnya. Asupan energi dan protein yang tidak mencukupi pada ibu hamil dapat menyebabkan kekurangan energi kronis (KEK). Wanita hamil beresiko mengalami KEK jika memiliki lingkaran lengan atas (LILA) < 23,5 cm. Ibu hamil beresiko mengalami KEK dan jika tidak ditangani dengan baik akan beresiko mengalami anemia, terutama anemia defisiensi besi.

Peran pemerintah dan tenaga kesehatan agar memperhatikan status gizi masyarakat khususnya wanita pra konsepsi agar dapat lebih memperhatikan status kesehatan dan kualitas gizi. Serta pentingnya pemberian informasi kepada wanita pra konsepsi melalui penyuluhan, *flip-chart* dan poster tentang kesehatan (Puli et al. n.d. 2014).

Perbaikan kesehatan pra konsepsi berdampak pada peningkatan kesehatan reproduksi dan dapat menurunkan resiko pengeluaran biaya yang mungkin muncul karena masalah kesehatan reproduksi. Meskipun masalah kekurangan energi kronis (KEK) ibu dapat mempengaruhi kematian ibu dan anak, namun program yang dilakukan pemerintah masih belum efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini terlihat disalah satu program yang dilakukan pemerintah, yaitu SUCATIN. Program tersebut tidak dilakukan oleh beberapa KUA dan jika dilaksanakan belum memuat materi mengenai gizi prakonsepsi dengan

lengkap sehingga pengetahuan gizi calon pengantin masih sedikit (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019).

Menurut data (WHO 2018) prevalensi KEK secara global yaitu 35%-75%. Kejadian kekurangan energi kronik di Negara-negara berkembang seperti Bangladesh, india, Thailand, Indonesia, Myanmar, dan Srilangka adalah 15%-47% yaitu dengan BMI <18,5%. Adapun Negara yang mengalami kejadian yang tertinggi adalah Bangladesh yaitu 47%, sedangkan Indonesia merupakan urutan keempat terbesar setelah india dengan prevelasi 35,5% dan yang paling rendah adalah Thailand dengan prevalensi 15-25%.

Berdasarkan survei Demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menyebutkan bahwa wanita usia subur (pra konsepsi) yang tidak hamil yang mengalami KEK sebesar 14,5%, Sedangkan wanita yang hamil usia 15-49 tahun yang mengalami KEK sebesar 17,3%. Sedangkan berdasarkan data kemenkes RI pada tahun 2016, khususnya di Sulawesi Selatan data kejadian KEK mencapai angka 12,50%, wanita usia subur, usia 15-19 tahun yang beresiko mengalami KEK sebanyak 30,6%, sedangkan wanita hamil sebanyak 38,5%. Dan pada usia 20- 25 tahun yang tidak hamil sebanyak 30,1% sedangkan yang hamil 30,6% yang mengalami KEK.

Prevalensi anemia ibu hamil di Indonesia masih cukup tinggi. yaitu 48,9% dan sebagian besarnya adalah wanita usia 15-24 tahun. Selain itu prevalensi anemia gizi besi pada wanita usia subur menunjukkan

peningkatan, dari 23,40% menjadi 25,12%, menurut penelitian yang dilakukan oleh Asyumdah (2016) didapatkan prevalensi ibu hamil dengan kadar Hb<11 gr/dL sebanyak 59,7%. Anemia merupakan salah satu penyebab terjadinya perdarahan dan infeksi yang merupakan faktor kematian ibu.(Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019).

Angka kejadian Kematian perinatal di Indonesia sebesar 460 per 100.000 kelahiran setiap tahunnya, pada umumnya berkisar antara 77,3%-137,7% per 1.000 kelahiran hidup (Mahmudah, Cahayati and Wahyuningsih, 2011). Menurut WHO 2014 angka kematian pada bayi yang disebabkan karena Berat badan lahir rendah (BBLR) yang terjadi sebesar 60-80% (Hartiningrum and Fitriyah, 2016). Menurut WHO angka kematian bayi yang disebabkan karena menderita cacat lahir pada tahun 2013 ada 2,761 juta kematian pada bayi lahir, yang diantaranya terdapat kematian bayi sebesar 276.000 (1%) meninggal dunia karena menderita cacat lahir (Muslim and Marnis, 2016). Angka kejadian IUFD (*IntraUterine Death*) pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebanyak 125 kasus (4,4%) dari 2856 persalinan, dari tahun 2011 kejadian IUFD masih termasuk dalam 10 kasus obstetri (Triana, 2012).

Data yang terdapat di Puskesmas Palangga Kabupaten Gowa menunjukkan pada tahun 2018 terdapat wanita pra konsepsi sebanyak 297 orang. Ditahun 2019 terdapat 291 wanita pra konsepsi, dari 291 wanita pra konsepsi terdapat 34 orang yang mengalami KEK (kekurangan energi kronis). Sedangkan pada tahun 2020 pada bulan januari terdapat 14 wanita

pra konsepsi dan 3 wanita yang mengalami KEK,. (kekurangan energi kronik).

Komplikasi pada kekurangan energi kronik (KEK) yaitu: Pada masa pra konsepsi yaitu Gangguan reproduksi, anemia, kekurangan nutrisi, dan rentang terkena penyakit. Pada ibu Hamil keguguran, anemia, dan IUFD, Pada Persalinan perdarahan, anemia, persalinan lama dan infeksi, Pada Bayi berat badan lahir rendah (BBLR), kematian perinatal, dan cacat lahir. Menurut Riskesdas angka kejadian keguguran pada tahun 2017 di Indonesia sebesar 4% pada kelompok perempuan pernah kawin usia 10-59 tahun, persentase kejadian abortus spontan di Indonesia berdasarkan kelompok umur yaitu 3,8 pada kelompok umur 15-19 tahun 5,8% pada kelompok umur 15-19 tahun, 5,8% pada kelompok umur 20-24 tahun, 5,7% pada kelompok umur 25-29 tahun 5,7% pada kelompok umur 30-39% tahun (kemenkes RI, 2015). Besarnya kemungkinan keguguran yang terjadi pada wanita usia subur adalah 10%-25% (Purwaningrum *et al.*, 2017).

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian manajemen asuhan kebidanan pada wanita pada fase pra konsepsi dengan KEK (kekurangan energi kronik) di Puskesmas Pallangga Kabupaten Gowa.

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan karya tulis ilmiah ini menyangkut tentang manajemen asuhan kebidanan pra konsepsi pada pada ny “ Y”

dengan KEK (kekurangan energi kronis) di Puskesmas Palangga tanggal/bulan/ 2020.

B. Tujuan Penulisan

1. Tujuan umum

Dapat menyusun literatur review pada wanita pada fase pra konsepsi dengan KEK (kekurangan energi kronis) di Puskesmas Pallangga dengan menggunakan proses asuhan kebidanan yang sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan khusus

Adapun tujuan penulisan Literature Review Asuhan Kebidanan pada Wanita pada Fase Pra Konsepsi dengan KEK (kekurangan energi kronik):

- a. Didapatkannya data subjektif dan data objektif dari tanda dan gejala dari berbagai referensi tentang KEK pada wanita pra konsepsi.
- b. Didapatkannya hasil rumusan diagnosis dan berbagai referensi tentang wanita pra konsepsi dengan kek.
- c. Didapatkannya informasi komplikasi yang bisa timbul dari berbagai referensi pada wanita prakonsepsi dengan kek.
- d. Didapatkannya informasi dari berbagai referensi tentang kondisi emergensi yang dapat terjadi serta penanganannya pada wanita pra konsepsi dengan kek.
- e. Didapatkannya simpulan dari berbagai intervensi apa saja penatalaksanaan yang tepat pada wanita pra konsepsi dengan kek.

- f. Didapatkannya penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan ke implementasi asuhan pada wanita pra konsepsi yang mengalami kek.
- g. Didapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber kondisi yang menjadi dasar evaluasi pada wanita pra konsepsi dengan kek.

C. Manfaat Penulisan

1. Manfaat praktis

Sebagai salah satu persyaratan dan menyelesaikan ujian akhir program diploma kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Manfaat ilmiah

Diharapkan penelitian ini dapat dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi institusi pendidikan dalam penyusunan karya Tulis Ilmiah selanjutnya.

3. Manfaat bagi institusi

Diharapkan Literature review ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi institusi pendidikan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya.

4. Manfaat bagi penulis

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis dalam penerapan asuhan kebidanan pada wanita pra konsepsi dengan kek. Penulisan ini juga merupakan pengalaman yang berharga karena dapat

meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang manajemen Asuhan Kebidanan pada wanita pra konsepsi dengan kek.

5. Manfaat bagi pembaca

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang manajemen asuhan kebidanan pada wanita pra konsepsi dengan kek.

D. Metode penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, metode yang digunakan adalah penulisan mempelajari buku-buku, literatur, dan media internet yang berhubungan dengan wanita pra konsepsi dengan kek.

E. Sistematika Penulisan

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar belakang
- b. Rumusan masalah
- c. Manfaat penulisan
- d. Metode penulisan
- e. Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- a. Tinjauan umum tentang pra konsepsi
- b. Tinjauan umum tentang kek
- c. Proses manajemen kebidanan

BAB III TELUSURAN *EVIDENCE BASED LEARNING*

- a. MATRIKS LANGKAH I
- b. MATRIKS LANGKAH II
- c. MATRIKS LANGKAH III
- d. MATRIKS LANGKAH IV
- e. MATRIKS LANGKAH V
- f. MATRIKS LANGKAH VI
- g. MATRIKS LANGKAH VII

BAB IV PEMBAHASAN

- a. Pembahasan hasil telah *evidence based* asuhan 7 langkah varney berdasarkan hasil penelusuran referensi.
- b. Implikasi kebidanan.

BAB V PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pra Konsepsi

1. Pengertian Pra Konsepsi

- a. Masa pra konsepsi merupakan masa sebelum hamil atau masa sebelum terjadinya pertemuan antara ovum (sel telur) dengan sperma. Wanita pra konsepsi diasumsikan sebagai wanita dewasa atau wanita usia subur yang siap menjadi seorang ibu. Reproduksi manusia merupakan hasil dari pembentukan kompleks yang melibatkan interaksi berbagai proses, seperti genetik, biologis, lingkungan dan tingkah laku. Proses pra konsepsi dialami oleh pria dan wanita sebagai tahap sebelum konsepsi (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019)
- b. Masa pra konsepsi merupakan fase dalam siklus kehidupan yang memerlukan perhatian khusus terutama dari segi pencakupan kebutuhan energi dan zat gizinya. Status gizi wanita yang optimal dalam masa persiapan kehamilan merupakan hal yang krusial dan mempengaruhi *outcome* dari kehamilan. Dikhawatirkan dengan asupan makan yang kurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, dapat berakibat buruk bagi calon ibu, salah satu dampaknya adalah penambahan berat badan saat kehamilan yang tidak adekuat. Penambahan berat badan dibutuhkan saat kehamilan

sesuai dengan status gizi ibu sebelum hamil (Anggraeny and Aristiningsih, 2017)

2. Karakteristik Periode Pra Konsepsi

a. Karakteristik fisiologis

Periode pra konsepsi ini dipengaruhi oleh beberapa karakteristik, fisiologis, seperti ciri fisik wanita dan ciri fisik pria.

a) Karakteristik fisiologis wanita

Sistem reproduksi pria dan wanita mulai berkembang pada bulan pertama setelah konsepsi dan berlanjut untuk perkembangan ukuran dan kompleksitas fungsi selama pubertas. Wanita dilahirkan dengan ovum yang belum matang, sedangkan pria dengan kemampuan memproduksi sperma, sekitar 7 juta ovum yang belum matang dibentuk pada awal perkembangan janin, namun hanya 3 juta sel telur yang tersisa pada pubertas. sekitar 400-500 sel telur akan matang selama masa subur yang dilepaskan untuk kesuburan dan hanya sedikit sekali sel telur yang tersisa saat menopause.

b) Karakteristik fisiologis pria

Kemampuan reproduksi pada pria ditentukan dari interaksi kompleks antara hipotalamus, kelenjar pituitari, dan testis, fluktuasi ladar sinyal GnRH dan LH. FSH menstimulasi maturasi sperma, sedangkan LH

menstimulasi testis untuk mensekresikan testosteron. Testosterone akan menstimulasi maturasi organ reproduksi pria, sperma dan pembentukan jaringan otot pematangan sel sperma membutuhkan waktu sekitar 70-80 hari. Sperma yang matang akan disimpan di epididimis. Pada proses ejakulasi, sperma bercampur dengan berbagai secret yang disebut semen. Secara simultan proses ini memproduksi sperma matang didalam tubulus seminiferus dan jumlahnya mencapai lebih kurang 200 juta dalam setiap ejakulasi.

c) Karakteristik sosial

Fase prakonsepsi berada pada masa dewasa awal (setelah remaja, namun sebelum dewasa akhir). Oleh karena itu karakteristik yang terjadi pada fase pra konsepsi tidak jauh berbeda dengan karakteristik sosial pada masa dewasa.

d) Karakteristik psikologis

Fase pra konsepsi dapat digolongkan ke dalam psikologi, perkembangan, yaitu masa dewasa awal. Dari sisi psikologis, masa ini ditandai dengan ciri-ciri kedewasaan, terjadi masa transisi fisik, intelektual, dan peranan sosial. Berbagai masalah muncul sebagai dampak masa transisi dari ketergantungan ke masa

mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan, menentukan diri sendiri, maupun pandangan tentang masa depan yang sudah lebih realitas (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019)

3. Kesehatan Dalam Periode Pra Konsepsi

Wanita usia subur (WUS) adalah wanita yang sedang dalam peralihan masa remaja akhir hingga usia dewasa awal. Karakteristik WUS yang paling utama adalah ditandai dengan peristiwa fisiologis, seperti menstruasi dan tercapainya puncak kesuburan dengan fungsi organ reproduksi yang sudah berkembang dengan baik. WUS diasumsikan sebagai wanita dewasa yang siap menjadi seorang ibu. Kebutuhan pada masa ini berbeda dengan masa anak-anak, remaja, ataupun lanjut usia. Kebutuhan zat gizi pada masa ini menjadi penting karena merupakan masa dalam mempersiapkan kehamilan dan menyusui.

WUS sebagai calon ibu merupakan kelompok rawan yang harus diperhatikan status kesehatannya, terutama status gizinya. Kualitas seorang generasi penerus akan ditentukan oleh kondisi ibunya sejak sebelum hamil dan selama kehamilan, masa pernikahan dapat dikaitkan dengan masa pra konsepsi karena setelah menikah wanita akan menjalani proses konsepsi (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019)

4. **Konseling Pra Konsepsi**

Calon pengantin perlu diberikan konseling mengenai resiko yang ada dan ditawarkan intervensi yang mungkin memperbaiki prognosis kehamilan. Konseling berupa kesehatan reproduksi, usia ibu, *lifestyle* yang beresiko, diet, olahraga, kekerasan dalam rumah tangga, konseling kondisi medis spesifik, seperti diabetes, penyakit ginjal, hipertensi dan, epilepsi, serta kondisi kejiwaan dan masalah psikis yang mungkin berpengaruh.

Sebaiknya, ada juga kelas individual dibicarakan masalah yang sangat pribadi. Sementara itu, pada kelas bersama dilakukan diskusi interaktif antara pasangan lain dibawah bimbingan seorang konselor (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019).

Konseling pra konsepsi dalam praktik pelayanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi wanita pra konsepsi dalam mempersiapkan diri menghadapi kehamilan dan diet yang tepat dan seimbang untuk mencukupi kebutuhan gizinya. Dengan konseling tersebut diharapkan wanita pra konsepsi tersebut diharapkan wanita pra konsepsi dapat mengatur dan mengubah pola konsumsi makanan yang dimakan sehari-hari. Pola konsumsi makanan dapat berubah maka diharapkan indeks massa tubuhnya akan berubah juga (Labuan, 2019).

5. Imunisasi Pranikah

Imunisasi yang dianjurkan diantaranya imunisasi tetanus untuk mencegah penyakit tetanus (kejang) pada bayi baru lahir akibat tali pusatnya terinfeksi, imunisasi MMR untuk mencegah penyakit mumps, measles, dan rubella, serta imunisasi hepatitis (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019).

6. Menentukan Masa Subur

Masa subur dimulai dari hari ke 14, dihitung dari mulai mendapatkan menstruasi. Untuk siklus menstruasi 28 hari, ovulasi akan terjadi dihari ke 14 dan masa subur adalah 2-3 hari sebelum dan sesudah ovulasi. Jadi masa subur antara hari ke 11 sampai hari ke 17.

Selain itu harus juga diperhatikan tanda-tanda atau sinyal tubuh jika dalam masa subur kemungkinan bisa berpeluang hamil jika ada sperma yang mampu menemukan sel telur. Contohnya, suhu badan naik penyebabnya adalah saat sel telur matang, Rahim akan bersiap menerima sel telur yang dibuahi. Hal inilah yang membuat suhu tubuh naik. Lendir leher Rahim yang keluar melalui vagina jadi lebih kental. Lendir ini kenyal, lengket seperti *jelly* namun tidak terputus jika ditarik. Dimasa ovulasi, pembuluh darah ditubuh ikut membesar, termasuk pembuluh darah dikelamin. Akibatnya, vulva (organ seksual perempuan) ikut membengkak dan lebih sensitife sehingga menjadikan kita lebih mudah terangsang, dan jangan terkejut jika tubuh terlihat gemuk dibandingkan hari sebelumnya (Puspita, 2010)

Masa infertil wanita sekitar 2/3 dari siklus menstruasi, lebih kurang 5-9 hari sebelum ovulasi dan 7-13 hari setelah ovulasi. Sementara itu pada pria yang sehat, secara konstan fertile dari remaja hingga meninggal. Waktu yang terbaik untuk merencanakan kehamilan, yaitu selama fase masa subur (fertil) pada siklus menstruasi wanita. Pria secara konstan memproduksi sperma sehingga selalu berada pada masa subur satu sperma dapat menciptakan mucus fertil, dan sperma dapat bertahan selama 5-7 hari. Ciri wanita yang berada pada masa fertil, yaitu saat mucus basah, jernih dan elastis, waktu tersebut merupakan waktu yang paling tepat untuk berhubungan seksual karena cairan semen dapat bingung dengan cairan fertil. Hubungan seksual pada waktu lain dapat mempermudah mengobservasi mukus. jika tidak berencana untuk hamil maka jangan melakukan hubungan seksual selama masa fertil, kecuali menggunakan kondom atau diafragma. Beberapa metode yang digunakan monitor ovulasi antara lain sebagai berikut.

a. Metode kalender

Cara menentukan masa subur dapat dilakukan dengan metode kalkulasi. Identifikasi panjangnya siklus terpendek selama 6 bulan terakhir. Setelah itu, panjangnya hari setelah siklus terpendek dikurangi 21 hari. Contohnya jika siklus terpendeknya 27 hari maka 27 hari dikurangi 21 hari dan didapatkan 6, dengan begitu, maka subur berada dihari ke-6. Bahkan jika tidak

ditemukan perubahan mukus fertil pada hari ke-6 tersebut tetap berada di fase fertil.

Keterbatasan metode kalender adalah variasi yang panjang pada fase folikuler (pra ovulasi) dan fase-fase luteal (post ovulasi) pada siklus menstruasi. Penggunaan kontrasepsi oral juga dapat menunda waktu ovulasi. Walaupun penyesuaian dapat digunakan pada metode kalender untuk estimasi kehamilan, namun metode kalender kurang tepat dipergunakan untuk memperkirakan paparan pra konsepsi. Penggunaan kalender dengan pendekatan waktu ovulasi sering kurang akurat 1 minggu atau lebih.

b. Metode hari standar

Metode hari standar adalah penentuan masa subur dengan mengidentifikasi hari ke-8 hingga hari ke-19 siklus menstruasi (inklusif) sebagai hari ketika terjadi hubungan seksual yang akan menyebabkan kehamilan. Untuk mencegah kehamilan, pasangan harus mencegah hubungan seksual selama 12 hari pada masa subur tersebut. Metode ini sesuai dengan pada wanita yang memiliki siklus menstruasi 26-32 hari.

c. Metode *symptothermal* (STM)

Metode *symptothermal* didasarkan ada gejala cairan serviks (*sympto*) yang menunjukkan aktivitas ovarium, perubahan suhu tubuh (*thermal*) yang mengidentifikasi proses ovulasi, dan tanda operasional lainnya. Tanda operasional tersebut yaitu pengecekan

serviks, yang sangat berguna pada situasi yang tidak jelas seperti saat sekresi mukus serviks tidak dapat diobservasi divulva. Observasi lainnya adalah nyeri pada payudara, nyeri intermenstrual (antara menstruasi), dan sindrom premenstrual dapat digunakan untuk membantu analisis masa subur.

Terdapat dua cara untuk mengobservasi mukus serviks terkait dengan penentuan puncak masa subur. Pertama dengan melihat dan dengan menyentuh dari luar atau dari dalam melalui sensasi vagina yang tidak terlihat. Kedua pendekatan tersebut terlihat komplementer karena *symptom* memberikan prioritas dengan observasi eksternal untuk menentukan akhir masa fertil(Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019)

7. Kebutuhan Gizi Pada Masa Pra Konsepsi

Status gizi adalah keadaan tubuh manusia sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Adapun kategori dari status gizi dibedakan menjadi tiga, yaitu gizi lebih, gizi baik, dan gizi kurang. Baik Buruknya status gizi manusia dipengaruhi oleh 2 hal pokok yaitu konsumsi makanan dan keadaan kesehatan tubuh infeksi. Dalam ilmu gizi, status gizi lebih dan status gizi kurang disebut sebagai malnutrisi, yakni suatu keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif maupun absolut satu atau lebih zat gizi (Mardalena.i, 2017)

Energi dibutuhkan supaya metabolisme tubuh berjalan dengan baik. kecukupan yang dianjurkan dibedakan sesuai dengan usia dan

jenis kelamin. Kebutuhan energi pada laki-laki lebih kurang 260-2750 kkal, sedangkan pada wanita 2100-2250 kkal. Energi tersebut paling banyak diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan protein (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019)

Pasangan usia subur yang menginginkan kehamilan diharapkan mempunyai berat badan ideal. Dengan kondisi ini akan relative lebih mudah menjalani kehamilan dibandingkan dengan calon ibu dengan berat badan berlebih atau terlalu kurus. Kenyataannya adalah, data menunjukkan bahwa sepertiga (35,6%) wanita usia subur menderita kekurangan energi kronis (KEK). Kondisi ini akan menghambat pertumbuhan janin sehingga akan menimbulkan resiko pada bayi dengan BBLR. Mengingat besarnya angka wanita subur menderita KEK maka terdapat potensi terjadinya gagal tumbuh antargenerasi.

Pengaturan gizi sebelum hamil (sebelum terjadinya konsepsi) perlu mendapatkan perhatian, karena status gizi yang baik bagi ibu sebelum kehamilan datang, akan menjadi dasar yang baik bagi kehamilan yang membutuhkan asupan gizi lebih dari yang sebelum kehamilan. Ibu hamil yang berat badanya kurang pada waktu konsepsi mempunyai kemungkinan bayi lahir dini (prematuur) dan mengalami toksemia, lebih-lebih bila ibu mengalami anemia (Badriah., 2018)

a. Karbohidrat

Merupakan sumber energi utama tubuh, setiap 1 gram karbohidrat yang dikonsumsi menghasilkan energi sebesar 4 kkal. Contoh bahan makanan yang sumber karbohidrat adalah nasi, kentang, jagung, singkong, ubi, roti, dan mie. Konsumsi karbohidrat dianjurkan sebesar 55-70% dari kebutuhan energi sehari.

b. Protein

Kebutuhan protein pada masa pra konsepsi sebesar 10-30% dari kebutuhan energi sehari. Protein berfungsi sebagai zat pembangun, pengatur, serta perbaikan jaringan dalam sel-sel yang rusak. Fungsi utama protein bukanlah sebagai sumber energi, tetapi protein dapat menjadi sumber energi tetapi protein dapat menjadi sumber energi dengan menyediakan 4 kkal per gram. Kebutuhan protein dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi bahan makan sumber protein hewani seperti ikan, telur, daging, daging ayam, susu serta bahan makanan sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, tempe.

c. Lemak

Lemak merupakan sumber energi terbesar dibandingkan dengan karbohidrat dengan protein. Satu gram lemak menghasilkan 9 kkal. Anjuran asupan lemak per hari adalah 20-30%. Lemak berperan dalam penyerapan vitamin, A, D, E dan K. Asupan lemak berperan dalam jumlah lemak tubuh, yang berhubungan dengan produksi hormon, baik pada wanita maupun pria. Sel lemak yang menjaga ketersediaan

hormon dalam tubuh akan mempengaruhi siklus menstruasi pada wanita pada produksi serta kematangan sperma pada pria. Sumber makanan yang mengandung lemak banyak ditemukan pada daging merah, ayam, ikan, keju, minyak.

d. Serat

Serat merupakan komponen yang sangat penting pada asupan setiap orang. Asupan serat yang kurang dapat mengakibatkan susah buang air besar (sembelit, konstipasi), hemoroid (ambeien), dan obesitas, untuk mencegah terjadinya gangguan pencernaan, tiap individu harus mengonsumsi serat dalam jumlah yang cukup untuk membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kebutuhan serat pada masa pra konsepsi untuk pria adalah 37-38 gram dan wanita sebesar 30-35 gram. Sumber serat yang baik adalah sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan.

e. Cairan

Rekomendasi asupan cairan adalah 1,5-2 liter air/hari atau setara dengan 8 air gelas per hari. Kebutuhan cairan dapat dipenuhi dari air minum, dan air dalam makan. Air putih lebih disarankan dari pada kopi, teh, sirup dan minuman bersoda.

f. Vitamin A

Angka kecukupan gizi (AKG) vitamin A pada wanita pra konsepsi adalah sebesar 500 mcg, sedangkan pada pria adalah 600 mcg. Bahan

makanan sumber vitamin A, antara lain daging, kuning telur, susu, mentega, wortel, tomat, kacang panjang, dan bayam.

g. Vitamin D

Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak dan berperang dalam mengoptimalkan kesehatan tulang, serta fungsi otot. Vitamin D terdapat dalam bahan makanan seperti hati, telur, dan ikan. kebutuhan vitamin D menurut AKG 2013 untuk pria dan wanita pada masa pra konsepsi sebanyak 15 mcg.

h. Vitamin E

Sumber utama vitamin E adalah minyak nabati, (seperti minyak jagung, minyak matahari, minyak zaitun). Kacang-kacangan dan biji-bijian (seperti biji bunga matahari, kacang kenari), serta alpukat. Angka kecukupan gizi (AKG) vitamin E pria dan wanita pada masa pra konsepsi adalah 15 mg/hari.

i. Vitamin K

Kebutuhan vitamin K berdasarkan (AKG) 2013 untuk pria dan wanita pada masa pra konsepsi adalah 1,3-1,4 mg/ hari. Bahan makanan yang banyak mengandung vitamin K, diantaranya alpukat, minyak kedelai, sayuran hijau, dan pisang.

j. Vitamin C

Kebutuhan vitamin C berdasarkan AKG adalah 90 mg/ hari pada pria dan 75 mg/ hari pada wanita. Sumber utama vitamin C adalah buah dan sayuran segar.

k. Asam folat

Mengonsumsi folat diketahui dapat menurunkan kejadian ovulasi infertil pada wanita. Selain itu, asupan asam folat yang cukup juga berkaitan dengan berkurangnya sperma abnormal, pada pria. Angka kecukupan gizi (AKG) folat pada pria dan wanita saat masa pra konsepsi adalah 400 mgc/ hari. Asam folat terdapat pada bangai bahan makanan, seperti daging, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, wijen dan serealialia (biji-bijian).

l. Zat besi

Zat besi diperlukan tubuh untuk pembentukan hemoglobin dan mioglobin yang dibutuhkan dalam proses metabolisme tubuh. Untuk mencegah kekurangan zat besi dapat diangkat pada masa pra konsepsi. Angka kecukupan gizi (AKG) zat besi pada pria adalah 13-15 mg/hari sedangkan pada wanita sebesar 26 mg/hari. Zat besi dapat diperoleh dari daging, ikan dan unggas.

m. Seng (zinc)

seng berperang penting untuk fungsi kekebalan, antioksidan, serta reproduksi. Angka kecukupan gizi (AKG) seng pada pria pada masa pra konsepsi adalah 13-17 mg/hari. Sementra itu, pada wanita kebutuhan seng sebanyak10 mg/har. Kekurangan seng pada pria menyebabkan rendahnya kualitas sperma. Seng banyak terdapat di dalam bahan makanan seperti ikan, kerang daging, serta kacang-kacangan.

n. Selenium

Angka kecukupan gizi (AKG) selenium pria dan wanita pada masa pra konsepsi adalah 30 mg/har. Selenium, banyak terdapat dalam daging, ikan, telur, kerang, biji-bijian dan padi-padian (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019).

Dengan gizi seimbang sumber gizi tersebut dapat digunakan wanita untuk memenuhi masa *menarche*, menstruasi, pra konsepsi, infertil/fertil, premenopause, menopause dan setelah menopause. Dengan gizi yang dikonsumsi oleh setiap wanita, diharapkan dapat menjadi berguna bagi tubuh kita ini yang sangat memerlukan sumber makanan, vitamin dan juga energi yang diambil dari nilai gizi suatu makanan. Berat badan yang sangat rendah juga dapat mengganggu fungsi fertilitas seorang wanita.

Skrining gizi adalah alat pengukur secara antropometri (TB, LILA, BB) dan secara biokimia massal kadar hb. Kesehatan reproduksi menjadi titik awal perkembangan kesehatan ibu dan anak yang dapat dipersiapkan secara dini, bahkan sebelum seorang perempuan menjadi ibu, persiapan tersebut dapat dilakukan melalui *skrining* pra nikah.

Menurut *Centers For Disease Control And Prevention* (CDC), *skrining* pra nikah atau disebut juga perawatan pra pembuahan, adalah serangkaian intervensi yang bertujuan mengidentifikasi dan memodifikasi resiko biomedis, perilaku, dan sosial yang berkaitan dengan kesehatan wanita serta hasil kehamilan nantinya. *Skrining* pra

nikah, dilakukan sebagai langkah pertama untuk memastikan kesehatan calon ibu serta anak sedini mungkin, bahkan sebelum proses pembuahan terjadi.

Upaya peningkatan kesehatan reproduksi dilaksanakan pada setiap siklus kehidupan *life cycle* melalui pendekatan pelayanan yang berkesinambungan (*continuum of care*). *Continuum of care (life cycle)* semua pemeriksaan kesehatan juga dimulai dari remaja. Secara umum terdapat hal-hal utama yang perlu diperhatikan pada *skrining* pra nikah, terutama pada calon ibu. Menurut panduan *American association of family physician (AAFP)*, hal-hal tersebut yaitu sebanyak 800 mg, dimana 500 mg digunakan untuk pertumbuhan sel darah merah ibu, 300 mg untuk janin dan plasenta (Diantoko, 2019).

Table 2.1 kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air pada masa pra konsepsi

Usia	Energi	Protein	Lemak	Karbohidrat	Serat	Air
	(kkal)	(gr)	(gr)	(gr)	(gr)	(ml)
Pria						
17-18 th	2675	66	89	368	37	2200
19-29 th	2775	62	81	375	37	2500
30-40	2625	65	73	394	38	2600
Wanita						
16-18 th	2125	59	71	2923	30	2100
19-29 th	2250	56	75	305	32	2300

Sumber : Angka kecukupan Gizi, 2013

Table 2.2 kebutuhan vitamin E, vitamin C, asam folat, zat besi, seng dan selenium pada masa pra konsepsi

Usia	Vitamin E	Vitamin C	Asam folat	Zat besi	Seng/zinc	Selenium
	Mg	Mg	Mcg	Mg	Mg	Mcg
Pria						
17-18 th	15	90	400	15	17	30
19-29 th	15	90	400	13	13	30
30-49 th	15	90	400	13	13	30
Wanita						
16-18 th	15	75	400	26	14	30
19-29 th	15	75	400	26	10	30
30-35 th	15	75	400	26	10	30

Sumber : Angka kecukupan gizi, 2013

B. Tinjauan Khusus Tentang Pra Konsepsi Dengan KEK

1. Definisi KEK

Kekurangan energi kronis didefinisikan sebagai keadaan ketika wanita mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun. Kekurangan energi kronis (KEK) ditandai dengan lingkar lengan atas <23,5 cm. kekurangan energi kronis pada wanita usia subur (pra konsepsi) yang berlangsung secara terus menerus dan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Selain lingkar lengan terhadap batasan lain untuk mendefinisikan kekurangan energi kronis, yaitu jika indeks masa tubuh (IMT) <18,5 kg/m. IMT

dikategorikan dalam tiga tingkatan, yaitu *underweight* ringan (*mild*), *underweight* sedang (*moderate*), dan *underweight* berat (*serve*) (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019)

Tabel 2.3 klasifikasi KEK berdasarkan IMT

Tingkat KEK	IMT kg/m
Normal	>18,5
Tingkat I	17,0-18,4
Tingkat II	16,0-16,6
Tingkat III	<16,0

Sumber: (Fillah Firah Dieny, dkk, 2019)

Tabel 2.4 klasifikasi KEK menggunakan dasar IILA (cm) pada wanita usia subur

Klasifikasi	Batas ukur
KEK	<23,5 cm
Normal	23,5 cm

Sumber: (Fillah Firah Dieny. dkk, 2019)

2. Etiologi KEK

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian kekurangan energi kronis (KEK) diantaranya terdapat faktor penyebab langsung dan faktor penyebab tidak langsung. Factor penyebab langsung yaitu tingkat konsumsi energi, tingkat konsumsi protein, penyakit infeksi dan usia *menarche*. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah pengetahuan tentang gizi pra konsepsi dan aktivitas fisik (Labuan, 2019)

Kekurangan energi kronis terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu pada tahapan awal akan terjadi ketidakcukupan zat gizi, terutama energi dan protein. Jika keadaan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama maka cadangan jaringan akan digunakan, Tahap kedua adalah terjadinya kemerosotan jaringan karena penggunaan cadangan terus menerus yang ditandai dengan penurunan berat badan, Ketiga terjadi perubahan biokimia dan dapat dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019)

Secara umum KEK pada remaja disebabkan karena makanan yang terlalu sedikit. Penurunan berat badan yang secara drastis pada remaja seperti takut gemuk seperti ibunya atau dipandang kurang seksi oleh lawan jenis (Depkes 2010). Makanan-makanan yang bervariasi dan cukup mengandung kalori dan protein termasuk makanan pokok seperti nasi, ubi dan kentang setiap hari serta makanan yang mengandung protein seperti daging, ikan telur, kacang-kacangan, atau susu perlu dikonsumsi oleh para remaja tersebut sekurang-kurangnya sehari sekali (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019)

Calon pengantin wanita tergolong wanita usia subur yang rentang mengalami KEK. Faktor penyebab KEK, antara lain keadaan sosial ekonomi yang menyebabkan rendahnya pendidikan yang akan mempengaruhi pekerjaan dan penghasilan. Selain itu,

rendahnya asupan baik secara kualitas dan kuantitas juga mempengaruhi kejadian KEK.

Kualitas dan kuantitas diet merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya resiko terjadinya KEK. Kualitas diet merupakan indeks yang penting untuk mengetahui asupan zat gizi makro, serta pola diet yang mempengaruhi terjadinya resiko penyakit terkait dengan diet. Menurut penelitian yang telah dilakukan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia dan India diketahui bahwa kualitas diet seorang akan mempengaruhi status gizi pada wanita usia subur (WUS) termasuk CPW. (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019)

3. Tanda Dan Gejala KEK

Kekurangan energi kronis (KEK) memberikan tanda dan gejala yaitu dapat dilihat dan diukur. Tanda dan gejala KEK yaitu lingkaran lengan atas (LILA) kurang dari 23,5 cm dan pengukuran IMT (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019).

4. Patofisiologi KEK

Patofisiologi kekurangan energi kronis terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu pada tahapan awal akan terjadi ketidakcukupan zat gizi, terutama energi dan protein. Jika keadaan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama maka cadangan jaringan akan digunakan, Tahap kedua adalah terjadinya kemerosotan jaringan karena penggunaan cadangan terus menerus

yang ditandai dengan penurunan berat badan, Ketiga terjadi perubahan biokimia dan dapat dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium.

KEK biasanya terjadi pada masa remaja dan akan berlanjut ke masa sebelumnya jika tidak ditangani. KEK pada calon pengantin wanita akan menyebabkan masalah pada masa selanjutnya saat wanita tersebut hamil dan menyusui. Wanita yang mengalami KEK pada masa kehamilan dapat mengalami anemia, komplikasi pada masa kehamilan, perdarahan dan mudah terserang penyakit infeksi, pengaruh kurang energi kronis pada proses persalinan dapat mengakibatkan proses pada persalinan menjadi sulit dan lama, persalinan sebelumnya waktunya (prematuur), dan persalinan melalui operasi. Ibu yang kek akan mengakibatkan janin yang dikandungnya keguguran, abortus, bayi lahir mati, cacat bawaan, anemia pada bayi, mati dalam kandungan (*asfiksia intrapartum*), dan berat badan lahir rendah BBLR, kekurangan energi kronis pada ibu menyusui dapat berpengaruh pada kualitas dan volume Asi.(Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019).

Wanita dengan rentang usia 19-26 tahun memiliki kemungkinan hamil 2 kali lebih besar dari pada wanita dengan rentang usia antara 35- 39 tahun. pada tabel dibawah ini akan

terlihat besarnya kesempatan bagi seorang wanita untuk hamil dikaitkan dengan faktor usia (Sibagariang., 2010)

5. Diagnosis

Diagnosis pada kasus ini yaitu dengan Pengukuran LILA adalah suatu cara untuk mengetahui KEK ibu hamil, wanita usia subur dan termasuk remaja putri, pengukuran LILA tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. Pengukuran dilakukan menggunakan pita LILA dan ditandai dengan sentimeter, dengan batas ambang 23,5 cm (batas antara merah dan putih di pita LILA). Apabila tidak tersedia pita LILA dapat digunakan sentimeter/metlin yang biasa dipakai tukang jahit pakaian. Apabila ukuran LILA kurang dari 23,5 cm (dibagian merah pita LILA) artinya mempunyai resiko KEK. Hal-hal yang harus diperhatikan pada pengukuran dengan pita LILA (Diantoko, 2019) Data kekurangan energi kronis (KEK) didapatkan dengan pengukuran antropometri yaitu dengan pengukuran lingkaran lengan atas (LILA) dengan menggunakan pita meter. Dikatakan mengalami KEK apabila diameter lingkaran lengan atas (LILA) <23,5 cm, sedangkan dikatakan tidak mengalami KEK gizi baik apabila diameter lingkaran lengan atas (LILA) kurang lebih 23,5 cm (Angraini *et al.*, 2018).

Lingkar lengan atas (LILA) merupakan salah satu cara untuk menentukan status gizi yang mudah, murah, dan cepat yang

dapat memberikan gambaran tentang jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. LILA mencerminkan cadangan energi sehingga dapat digunakan untuk mengetahui risiko KEK pada wanita pra konsepsi (Fillah Fitria Dieny, 2019)

6. Komplikasi KEK

KEK jika tidak segera ditangani pada masa pra konsepsi maka sangat beresiko mengalami gangguan alat reproduksi, anemia, dan rentang terkena penyakit, pada masa kehamilan dapat terjadi keguguran, anemia, dan IUFD, pada saat melahirkan menyebabkan perdarahan, anemia, persalinan lama dan infeksi, sedangkan dampak pada bayi yaitu cacat lahir, kematian perinatal dan berat lahir rendah atau BBLR (berat kurang dari 2500 gr). Bayi yang dilahirkan BBLR akan mengalami hambatan perkembangan dan kemunduran pada fungsi intelektualnya, dan akan mempunyai resiko kematian (Diantoko, 2019).

Dampak jangka panjang dari berat badan lahir rendah pada bayi adalah rendahnya tingkat kecerdasan anak, gangguan neurologis, dan gangguan tumbuh kembang. Bayi dengan berat badan lahir rendah juga dapat mengalami *cerebral palsy*. *Cerebral palsy* adalah kelompok gangguan yang menyebabkan penderitanya tidak dapat mengontrol pergerakan dan sering disertai dengan gangguan kognitif. Dampak jangka panjang dari KEK akan seperti rantai tidak terputus. Hal yang dapat dilakukan untuk memutus

rantai lingkaran tersebut adalah dengan pencegahan KEK pada calon pengantin (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019).

Kekurangan nutrisi pada seseorang akan berdampak pada penurunan fungsi reproduksi. Hal ini dapat diketahui apabila seseorang mengalami anorexia nervosa maka berat badannya akan menurun yang bisa menyebabkan perubahan pada hormon-hormon tertentu dalam tubuh yang berhubungan dengan gangguan fungsi hipotalamus akibatnya perubahan siklus ovulasi dan menstruasi. Wanita dengan ekonomi rendah dan kekurangan gizi buruk akan menyebabkan kelahiran dengan BBLR dan reproduksi ASI sedikit. Data kesehatan nasional dan survei pengujian ilmu gizi, wanita umur 11-15 tahun konsumsi energi bervariasi yaitu:

1. Terendah 1329 kali dan tertinggi 1958 kali.
2. Umur 11-15 tahun : 2200 kali.
3. Umur 15 tahun ke atas :1900 kali.

(Sibagariang., 2010)

7. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan pada pasien pra konsepsi dengan KEK yaitu:

- a. Perbaikan gizi pada wanita pra konsepsi merupakan paradigma baru dalam menangani masalah gizi ibu hamil di Indonesia, yang didasari oleh keterlambatan ibu hamil yang pada kontak pertama dengan pelayanan antenatal (Labuan, 2019).

b. Melakukan konseling

Calon pengantin perlu diberikan konseling mengenai resiko yang ada dan ditawarkan intervensi yang mungkin memperbaiki prognosis kehamilan. Konseling berupa kesehatan reproduksi, usia ibu, *lifestyle* yang beresiko, diet, olahraga, kekerasan dalam rumah tangga, konseling kondisi medis spesifik, seperti diabetes, penyakit ginjal, hipertensi dan, *epilepsi*, serta kondisi kejiwaan dan masalah psikis yang mungkin berpengaruh (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019)

Konseling pra konsepsi dalam praktik pelayanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi wanita pra konsepsi dalam mempersiapkan diri menghadapi kehamilan dan diet yang tepat dan seimbang untuk mencukupi kebutuhan gizinya. Dengan konseling tersebut diharapkan wanita pra konsepsi tersebut diharapkan wanita pra konsepsi dapat mengatur dan mengubah pola konsumsi makanan yang dimakan sehari-hari. Pola konsumsi makanan dapat berubah maka diharapkan indeks massa tubuhnya akan berubah juga (Labuan, 2019).

Deteksi dini kekurangan energi kronis (KEK)

1. Dilakukan pada kontak pertama dengan pelayanan kesehatan dengan mengukur lingkaran lengan atas (LILA) dengan memakai pita LILA.
2. Ibu hamil, wanita usia subur, remaja dengan LILA <23,5 cm berarti menderita resiko KEK, harus dirujuk ke puskesmas/sarana pelayanan kesehatan lainnya, untuk mendapatkan konseling dan PMT ibu hamil.
3. Pengukuran LILA dapat dilakukan oleh kader.
4. Konseling dapat dilakukan oleh kader atau petugas gizi di Puskesmas atau disarana kesehatan lain (Diantoko, 2019)

c. Penyuluhan

Peran pemerintah dan tenaga kesehatan agar mendorong masyarakat khususnya wanita pra konsepsi agar dapat lebih memperhatikan status kesehatan dan ketersediaan pangan ditingkat keluarga. Serta pentingnya pemberian informasi kepada wanita pra konsepsi melalui penyuluhan, *flipchart* dan poster tentang kesehatan (Puli et al. n.d. 2014).

d. Perbaiki nutrisi

Pentingnya masa pra konsepsi (pembuahan) dalam menunjang kesehatan bayi yang sehat dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut.

1. Melengkapi pola makan yang bervariasi untuk nutrisi yang seimbang. Hindari makanan siap saji yang tidak sehat pada 6 bulan sebelum kehamilan.
2. Cermati jumlah konsumsi makanan, sehingga terhindar dari kondisi makanan berlebih.
3. Mengurangi konsumsi makanan yang mengandung pengawet. Makanan yang diawetkan seperti makanan kaleng, instan dan minuman dengan bahan kimia merupakan jenis makanan yang mengandung dalam proses regenerasi sel tubuh.

8. Faktor Resiko Terjadinya KEK

Kekurangan energi kronik (KEK) bias juga terjadi pada:

1) Remaja

Kekurangan energi kronis biasa saja terjadi pada masa remaja dan akan berlanjut ke masa sebelum hamil dan saat hamil jika tidak ditangani, KEK pada calon pengantin wanita atau calon ibu akan menyebabkan masalah pada masa selanjutnya saat wanita tersebut hamil dan menyusui.

Wanita yang mengalami KEK pada masa kehamilan dapat mengalami anemia, komplikasi pada masa kehamilan, perdarahan dan mudah terserang penyakit infeksi, pengaruh kurang energi kronik pada proses persalinan dapat mengakibatkan proses pada persalinan menjadi sulit dan lama, persalinan sebelumnya waktunya (prematuur), dan persalinan melalui operasi. Ibu yang KEK akan mengakibatkan janin yang dikandungnya keguguran, abortus, bayi lahir mati, cacat bawaan, anemia pada bayi, mati dalam kandungan (*asfiksia intrapartum*), dan berat badan lahir rendah BBLR.

Masa remaja merupakan masa perubahan yang dramatis dalam diri seseorang. Pertumbuhan pada usia anak yang relatif terjadi dengan kecepatan yang sama, secara mendadak meningkat saat memasuki usia remaja. Usia remaja 10-18 tahun merupakan periode rentang gizi karena berbagai sebab seperti penyebab langsung yaitu penyakit anak atau mungkin penyakit infeksi yang diderita anak. Penyebab tidak langsung yaitu seperti ketahanan pangan dikeluarga, pola pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan lingkungan dan kebiasaan makan yang buruk.

2) Wanita Usia Subur

WUS sebagai calon ibu merupakan kelompok rawan yang harus diperhatikan status kesehatannya, Terutama status gizinya. Kualitas seorang generasi penerus akan ditentukan oleh kondisi ibunya sejak sebelum hamil dan selama kehamilan, masa pernikahan dapat dikaitkan dengan masa pra konsepsi karena setelah menikah wanita akan menjalani proses konsepsi (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019)

Untuk mencegah resiko KEK pada ibu hamil sebelum kehamilan wanita usia subur harus mempunyai gizi yang baik dengan LILA tidak kurang dari 23,5 cm. apabila LILA ibu sebelum hamil kurang dari angka tersebut, sebaiknya kehamilan ditunda sehingga tidak beresiko melahirkan BBLR (Diantoko, 2019)

Kesehatan ibu hamil ketika mempersiapkan kehamilannya sangat menunjang kelahiran bayi yang sehat. Secara umum, gizi yang baik dapat mendukung kelahiran bayi sehat tanpa komplikasi. Oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan asupan gizi bagi calon ibu hamil pada masa konsepsi. Periode pra konsepsi adalah periode selama sebelum kehamilan atau satu bulan sebelum pembuahan yang menentukan kualitas kehidupan.

Masa pra konsepsi yang didukung dengan kondisi gizi yang baik pada calon ibu akan menunjang fungsi yang optimal reproduksi. Hal tersebut berkaitan dengan proses pematangan telur, produksi sel telur dengan kualitas, serta membuat proses pembuahan yang sempurna. Gizi yang baik juga akan mempersiapkan cadangan energi untuk tumbuh kembang janin. Pemenuhan asupan nutrisi yang cukup akan mempengaruhi kondisi secara menyeluruh pada masa kontrasepsi.

3) Ibu Hamil

Ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dengan LILA <23,5 cm, keadaan dimana ibu hamil mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama dan menahun disebabkan karena ketidak seimbangan asupan gizi, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan tubuh baik fisik maupun mental tidak sempurna seperti yang seharusnya.

Untuk mencegah resiko KEK pada ibu hamil sebelum kehamilan wanita usia subur harus mempunyai gizi yang baik dengan LILA tidak kurang dari 23,5 cm. apabila LILA ibu sebelum hamil kurang dari angka

tersebut, sebaiknya kehamilan ditunda sehingga tidak beresiko melahirkan BBLR.

Kondisi KEK pada ibu hamil harus segera ditindak lanjuti sebelum usia kehamilan mencapai 16 minggu. Pemberian makan tambahan makanan yang tinggi energi dan tinggi protein melalui pemberian PMT ibu hamil selama 90 hari dan dipadukan dengan penerapan porsi kecil tapi sering, akan berhasil menekan angka kejadian BBLR di Indonesia. Penambahan 200-450 kalori dan 12-20 gram protein dan kebutuhan ibu adalah angka yang mencukupi untuk memenuhi gizi janin. Maka makan yang bervariasi dan cukup mengandung energi dan protein (termasuk makanan pokok seperti nasi, ubi dan kentang setiap hari dan makan yang mengandung protein seperti daging, ikan, telur, kacang-kacangan atau susu sekurang-kurangnya sehari sekali. Minyak dari kelapa atau mentega dapat ditambahkan pada makanan untuk meningkatkan pasokan energi. PMT dan pemberian zat gizi pada ibu hamil yang menderita KEK dapat meningkatkan konsentrasi hb (Diantoko, 2019)

9. Pengukuran Lingkar lengan atas (LILA)

Pengukuran LILA adalah suatu cara untuk mengetahui resiko KEK ibu hamil, wanita usia subur dan termasuk remaja putri,

pengukuran LILA tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. Pengukuran dilakukan menggunakan pita LILA dan ditandai dengan sentimeter, dengan batas ambang 23,5 cm (batas antara merah dan putih dipita LILA). Apabila tidak tersedia pita LILA dapat digunakan sentimeter/metlin yang biasa dipakai tukang jahit pakaian. Apabila ukuran LILA kurang dari 23,5 cm (di bagian merah pita LILA) artinya mempunyai resiko KEK. Hal-hal yang harus diperhatikan pada pengukuran dengan pita LILA (Diantoko, 2019)

Pengukuran dilakukan dibagian tengah antara bahu dan siku lengan yang tidak dominan digunakan dalam aktifitas.

- a. Lengan harus dalam posisi bebas , lengan baju dan otot lengan dalam keadaan tidak tegang atau kencang.
- b. Alat pengukur dalam keadaan baik dalam arti tidak kusut atau sudah di lipat-lipat, sehingga permukaannya sudah tidak rata.

Gambar 2.1. pita LILA



Sumber: (Fillah Firah Dieny. dkk, 2019)

Lingkar lengan atas (LILA) merupakan salah satu cara untuk menentukan status gizi yang mudah, murah, dan cepat yang dapat memberikan gambaran tentang jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. LILA mencerminkan cadangan energi sehingga dapat digunakan untuk mengetahui risiko KEK pada wanita pra konsepsi (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019)

Gambar 2.2 Cara Mengukur LILA



Sumber: Buku peranan gizi dalam siklus kehidupan

Data kekurangan energi kronis (KEK) didapatkan dengan pengukuran antropometri yaitu dengan pengukuran lingkar lengan atas (LILA) dengan menggunakan pita meter. Dikatakan mengalami KEK apabila diameter lingkar lengan atas (LILA) $< 23,5$ cm, sedangkan dikatakan tidak mengalami KEK atau gizi baik apabila diameter lingkar lengan atas (LILA) $\geq 24,9$ cm (Angraini *et al.*, 2018).

10. Indeks Massa Tubuh (IMT)

Indeks massa tubuh merupakan cara sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa yang berumur diatas 18 tahun, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Indeks massa tubuh bias didapatkan dari berat badan dalam kilogram dibagi tinggi proporsi berat badan berdasarkan tinggi badan. Namun, IMT ini tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan, termasuk orang dengan keadaan khusus seperti asites, edema, dan hepatomegali (Dieny, Ayu and Dewi Marfu'ah Kurniawati, 2019)

Berikut merupakan cara perhitungan indeks massa tubuh pada orang dewasa.

$$\text{Indeks massa tubuh} = \frac{\text{Berat badan (kg)}}{\text{Tinggi badan (M}^2\text{)}}$$

Tabel. 2.5 klasifikasi ambang batas IMT untuk Indonesia

Kategori	Keterangan	IMT (kg/m²)
Sangat kurus	Kekurangan berat badan tingkat berat	<17,0
Kurus	Kekurangan berat badan tingkat ringan	17,0-18,4
Normal	Optimal	18,5-24,9
<i>Overweight</i>	Kelebihan berat badan tingkat sedang	23,0-24,9
Gemuk (obesitas I)	Kelebihan berat badan tingkat sedang	25,0-26,9

Sangat gemuk (obesitas II)	Kelebihan berat badan tingkat berat	$\geq 27,0$
-------------------------------	--	-------------

Salah satu cara untuk menilai postur tubuh yang ideal adalah dengan pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri, yang paling sering digunakan adalah rasio antara berat badan (kg) dan tinggi badan (m) kuadrat, yang disebut indeks massa tubuh (IMT).

$$\text{Rumus IMT sebagai berikut : } \text{IMT} = \frac{\text{BB (kg)}}{\text{TB (M)}^2}$$

Status Gizi Wanita dan Laki-laki

Normal : wanita: 17-23 ; laki-laki 18-25

Kegemukan : wanita: 33-37 ; laki-laki 25-27

Obesitas : wanita: > 27 ; laki-laki > 27

BB = Berat Badan, TB = Tinggi Badan

Contoh: wanita dengan TB = 161 cm, BB = 58 kg

$$\text{IMT} = \frac{58}{1,61 \times 1,61} = 22,37 \text{ (normal)}$$

Putro (2005) menegaskan bahwa IMT yang normal antara 18-25. Seseorang dikatakan kurus bila IMT-nya < 18 dan gemuk bila IMT-nya > 25. Bila IMT > 30 orang tersebut menderita obesitas dan perlu diwaspadai karena biasanya orang tersebut menderita penyakit degeneratif seperti Diabetes Mellitus, Hipertensi, Hiperkolesterol, dan kelainan metabolisme lain yang memerlukan

pemeriksaan lanjut, baik klinis maupun laboratorium (Badriah, 2018).

11. Perencanaan Kehamilan Dalam Periode Kehamilan

Ada dua hal penting dalam membicarakan kehamilan seorang wanita yaitu perencanaan kehamilan dan periode dalam kehamilan itu sendiri.

a. Aspek psikologis

Seorang calon ibu diharapkan siap secara psikologis, ia harus mengetahui bahwa kehamilan yang nanti dijalannya akan memberikan dampak pada perubahan fisik ibu yang akan mengubah secara total penampilanya. Seorang calon ibu yang tidak matang secara psikologis, misalnya remaja sekolah yang hamil, kemungkinan akan menghadapi keadaan yang besar.

b. Status gizi calon ibu

Pasangan usia subur yang menginginkan kehamilan diharapkan mempunyai berat badan ideal. Dengan kondisi ini seseorang akan relative lebih mudah menjalani kehamilan dibandingkan dengan calon ibu dengan berat badan berlebih atau terlalu kurus. Kenyataannya adalah, data menunjukkan bahwa sepertiga (35,6%) wanita usia subur menderita kekurangan energi kronik (KEK). Kondisi ini akan menghambat pertumbuhan janin sehingga akan

menimbulkan resiko pada bayi dengan BBLR. Mengingat besarnya angka wanita subur menderita KEK maka terdapat potensi terjadinya gagal tumbuh antargenerasi (Badriah., 2018)

C. Tinjauan Umum Tentang Pra Konsepsi Dengan KEK Menurut Pandangan Islam

Untuk mengembalikan kesehatan fisik pra konsepsi diperlukan asupan gizi yang cukup. Dalam al-Qur'an juga menjelaskan hal tersebut seperti dalam:

QS.al-Ma'idah/5:88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝٨٨

Terjemahnya :

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (kementrian agama RI tahun 2016).

Menurut Quraish Shihab tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis baik. Karena yang halal terdiri dari empat macam yaitu: *wajib*, *sunnah*, *mubah*, *makruh*. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal baik untuk si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya walau baik untuk yang lain. Karena itu, yang dianjurkan adalah makanan dan minuman yang “halal” lagi ”baik”. Dan *makanlah* makanan yang

halal, yakni yang bukan haram *lagi baik*, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan *dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada kamu, dan bertakwa;ah kepada Allah* yakni orang-orang yang mantap keimananya.

Jadi makanan yang diberikan kepada wanita pada masa pra konsepsi dengan KEK (Kekurangan Energi Kronik) harus halal dan toyyiban dalam arti sesuai dengan kondisi seseorang makanan yang dibutuhkan untuk memulihkan kesehatan, makanan yang merusak kesehatan atau memperburuk kondisi fisik sekalipun itu baik dan halal.

untuk itulah makanan sangat diperhatikan dalam QS:

QS.al-Baqarah/2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ ١٦٨

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Menurut Quraish Shihab, ajakan ayat diatas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi juga untuk seluruh manusia seperti terbaca diatas (*an-nas*). Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapa pun untuk memonopoli hasil-

hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah swt.

Seluruh manusia diajak untuk memakan makanan halal dan bergizi (baik). Karena itu baik bagi tubuh mereka dalam jangka panjang dan dapat menunjang berbagai aktivitas harian mereka di dunia. Menurut sebagian ulama, kata *kulu* pada ayat ini tidak bersifat wajib, tetapi bersifat anjuran yang sebaiknya dilaksanakan (*mendekati posisi wajib*).

Tidak semua yang ada didunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, tetapi antara lain, untuk digunakan biasanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakannya untuk memakan serangga merusak tanaman. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal.

Makanan yang halal dilihat dari jenisnya dan sumbernya yakni sekalipun jenis makanan tersebut halal tapi jika sumber dan makanan tersebut didapatkan dari sumber yang haram maka akan mempengaruhi kehalalan makan tersebut jadi sumber makanan juga harus halal.

Sekali lagi, perlu digaris bawah bahwa perintah ini ditujukan kepada seluruh manusia, percaya kepada Allah atau tidak. Seakan-akan Allah berfirman: wahai orang-orang kafir, makanlah yang halal, bertindak sesuai dengan hukum, karena itu bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan dunia kalian.

Makanan atau aktifitas yang berkaitan dengan jasmani sering kali digunakan setan untuk memperdaya manusia. Karena itu, lanjutan ayat ini mengingatkan, *dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan* (Shihab 2012)

D. Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Langkah-langkah manajemen kebidanan merupakan suatu proses penyelesaian masalah yang menuntut bidan untuk lebih kritis dalam mengantisipasi masalah. Ada tujuh langkah dalam manajemen kebidanan menurut (Sari, 2012).

2. Tahap Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen asuhan kebidanan terdiri dari beberapa langkah yang berurutan yang dimulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Langkah-langkah tersebut membutuhkan kerangka yang lengkap yang bisa diaplikasikan dalam semua situasi. Akan tetapi, setiap langkah tersebut bisa dipecahkan kedalam tugas tertentu dan semuanya bervariasi sesuai dengan

kondisi klien. Berikut langkah-langkah dalam proses penatalaksanaan menurut varney adalah sebagai berikut :

a. Langkah I : Pengumpulan data dasar

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien secara lengkap. Data yang dikumpulkan antara lain : hasil anamnesa dengan klien, orang tua/keluarga, hasil pemeriksaan, dan dari dokumentasi pasien atau catatan tenaga kesehatan yang lain.

Anamnesa meliputi : melakukan Tanya jawab kepada ibu untuk memperoleh data meliputi : riwayat kesehatan, riwayat penyakit ibu dan keluarga, menanyakan frekuensi makan ibu dalam sehari, menanyakan HPHT untuk menentukan masa subur.

Meninjau data laboratorium. Pada langkah ini, dikumpulkan semua informasi yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Pada langkah ini, bidan mengumpulkan data dasar awal secara lengkap.

b. Langkah II : Interpretasi data dasar

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan semua data dasar yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosis atau masalah. Diagnosis yang dirumuskan adalah diagnosis dalam lingkup praktik kebidanan

yang tergolong pada nomenklatur standar diagnosis, sedangkan perihal yang berkaitan dengan pengalaman klien ditemukan dari hasil pengkajian. Rumusan masalah dan keduanya digunakan karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosis tetapi tetap membutuhkan penanganan.

Masalah kekurangan energi kronis (KEK) berdasarkan interpretasi dasar yang dikumpulkan bahwa KEK akan menimbulkan masalah bila tidak segera ditangani secara dini pada masa pra konsepsi, pada ibu hamil, bayi lahir tidak normal seperti BBLR, lahir mati, dan cacat dan komplikasi lainnya.

c. Langkah III : Identifikasi diagnosa/masalah potensial

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Berdasarkan temuan tersebut, bidan dapat melakukan antisipasi agar diagnosis/masalah tersebut tidak terjadi. Selain itu, bidan harus bersiap-siap apabila diagnosis/masalah tersebut benar-benar terjadi.

Pada ibu pra konsepsi dengan KEK untuk melakukan antisipasi terjadinya masalah potensial berupa komplikasi pada saat kehamilan atau persalinan dan juga kelahiran bayi yang tidak normal seperti BBLR dengan memberikan konseling tentang gizi atau kebutuhan dasar sebelum hamil.

d. Langkah IV: melaksanakan tindakan *emergency*

Pada langkah ini, yang dilakukan bidan adalah mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama oleh anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien. Ada kemungkinan, data yang kita peroleh memerlukan tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan, sementara kondisi yang lain masih bisa menunggu beberapa waktu lagi. Pada langkah ini bidan, dokter dan ahli gizi melakukan identifikasi yang memungkinkan terdapat kondisi untuk melakukan kolaborasi dan tindakan segera bersama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi klien.

Pada kondisi KEK pada WUS dimana LILA $<23,5$ yang merupakan masalah gizi yang harus segera ditangani secara dini, bidan dan dokter maupun ahli gizi memberikan asuhan sebelum terjadinya kehamilan dengan perbaikan gizi, dengan masalah potensial kelahiran bayi dengan BBLR, prematur, kematian janin, dan cacat lahir.

e. Langkah V: Perencanaan asuhan

Pada langkah ini, direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi hal yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi dilihat juga dari apa yang akan diperkirakan

terjadi selanjutnya, apakah dibutuhkan konseling dan apakah perlu merujuk klien. Setiap asuhan yang direncanakan harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu bidan dan pasien.

Adapun penatalaksanaan KEK pada wanita pra konsepsi yaitu diberikan konseling berupa perbaikan gizi, Makanan-makanan yang bervariasi dan cukup mengandung kalori dan protein termasuk makanan pokok seperti nasi, ubi dan kentang setiap hari serta makanan yang mengandung protein seperti daging, ikan telur, kacang-kacangan, atau susu perlu dikonsumsi, sekurang-kurangnya sehari sekali.

Pentingnya masa konsepsi (pembuahan) dalam menunjang kesehatan bayi yang sehat dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut.

1. Melengkapi pola makan yang bervariasi untuk nutrisi yang seimbang. Hindari makanan siap saji yang tidak sehat pada 6 bulan sebelum kehamilan.
2. Cermati jumlah konsumsi makanan, sehingga terhindar dari kondisi makanan berlebih.

Mengurangi konsumsi makanan yang mengandung pengawet. Makanan yang diawetkan seperti makanan kaleng, instan dan minuman dengan bahan kimia merupakan jenis makanan yang mengandung dalam proses regenerasi sel tubuh.

f. Langkah VI: Pelaksanaan

Pada langkah keenam ini, kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan rencana asuhan yang sudah dibuat pada langkah kelima secara aman dan efisien. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh bidan atau anggota tim kesehatan yang lain. Jika bidan melakukan sendiri, bidan tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. Dalam situasi ini, bidan harus berkolaborasi dengan tim kesehatan lain atau dokter. Dengan demikian, bidan harus bertanggung jawab atas terlaksananya rencana asuhan yang menyeluruh yang telah dibuat bersama tersebut.

Penatalaksanaan pada pasien pra konsepsi dengan KEK yaitu:

- a. Perbaikan gizi pada wanita pra konsepsi merupakan paradigma baru dalam menangani masalah gizi ibu hamil di Indonesia, yang didasari oleh keterlambatan ibu hamil yang pada kontak pertama dengan pelayanan antenatal (Labuan, 2019).
- b. Melakukan konseling

Calon pengantin perlu diberikan konseling mengenai resiko yang ada dan ditawarkan intervensi yang mungkin memperbaiki prognosis kehamilan. Konseling berupa kesehatan reproduksi, usia ibu, *lifestyle* yang beresiko, diet, olahraga, kekerasan dalam rumah tangga, konseling kondisi medis spesifik, seperti diabetes, penyakit

ginjal, hipertensi dan, *epilepsi*, serta kondisi kejiwaan dan masalah psikis yang mungkin berpengaruh.

Konseling pra konsepsi dalam praktik pelayanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi wanita pra konsepsi dalam mempersiapkan diri menghadapi kehamilan dan diet yang tepat dan seimbang untuk mencukupi kebutuhan gizinya. Dengan konseling tersebut diharapkan wanita pra konsepsi tersebut diharapkan wanita pra konsepsi dapat mengatur dan mengubah pola konsumsi makanan yang dimakan sehari-hari. Pola konsumsi makanan dapat berubah maka diharapkan indeks massa tubuhnya akan berubah juga.

g. Langkah VII: Evaluasi

Pada langkah terakhir ini, yang dilakukan oleh bidan adalah Melakukan evaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan, yang mencakup pemenuhan kebutuhan, untuk menilai apakah sudah benar-benar terlaksana/terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam masalah dan diagnosis. Mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif untuk mengetahui mengapa proses manajemen ini tidak efektif.

3. Manajemen Asuhan Kebidanan Dalam Bentuk SOAP

Asuhan merupakan catatan yang bersifat sederhana, jelas, logis dan tertulis. Bidan hendaknya menggunakan dokumentasi

SOAP setiap kali bertemu pasien. Alasan catatan SOAP dipakai dalam pendokumentasian adalah karena metode SOAP merupakan kemajuan informasi yang sistematis yang mengorganisir penemuan dan kesimpulan dalam rencana asuhan, metode SOAP dapat dipakai sebagai penyaring intisari proses penatalaksanaan kebidanan dalam tujuan penyediaan dan pendokumentasian asuhan, dan dengan SOAP dapat membantu bidan dalam mengorganisir pikiran dan asuhan yang menyeluruh (Mangkuji *et al.*, 2013).

a) **S**=Subjektif

Data subjektif adalah data yang diperoleh dari sudut pandang pasien atau segala bentuk pertanyaan atau keluhan dari pasien. Data atau fakta yang merupakan informasi yang merupakan biodata, meliputi nama, umur, status perkawinan, pendidikan dan alamat, serta keluhan yang dialami dan dirasakan oleh pasien, riwayat keluhan, riwayat kesehatan yang lalu, jika pasien memiliki riwayat kehamilan yang terdahulu, riwayat persalinan dan nifas yang lalu, riwayat ginekologi dan riwayat KB yang diperoleh dari wawancara langsung pada pasien atau dari keluarga terdekat pasien.

b) **O**=Objektif

Data objektif merupakan data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan/observasi bidan atau tenaga kesehatan lain. Yang termasuk dalam data objektif meliputi pemeriksaan fisik pasien,

pemeriksaan laboratorium, ataupun pemeriksaan diagnostik lainnya.

Pemeriksaan umum meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan. Sedangkan pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan *head to toe* serta melihat adanya serta melihat adanya pembengkakan pada tungkai. Untuk menunjang hasil yang efektif maka dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium untuk melihat adanya proteinuria.

c) **A=Assessment**

Assessment merupakan keputusan yang ditegakkan dari data-data subjektif dan objektif yang telah dikumpulkan. Penegakan diagnosa kebidanan dijadikan sebagai dasar tindakan dalam upaya menanggulangi ancaman kesehatan pada pasien.

d) **P=Planning**

Planning (perencanaan) adalah rencana yang dibuat berdasarkan hasil analisa. Rencana asuhan ini meliputi rencana saat ini dan akan datang. Implementasi dapat dikerjakan sebagian atau seluruh bidan serta dilakukan oleh pasien itu sendiri. pada wanita usia subur yang mengalami KEK akan dilakukan perbaikan nutrisi dan jika tidak bisa ditangani lagi maka akan di tindak lanjuti, yaitu bila perlu dirujuk (Mangkuji *et al.*, 2013).

BAB III

TELUSURAN *EVIDENCE BASED LEARNING*

A. Matriks Langkah I

Matriks Pengertian Prakonsepsi

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
1	Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin	Kementerian Kesehatan RI	2015	Definisi Pra konsepsi.	Pra artinya sebelum, konsepsi artinya pertemuan sel ovum dengan sperma artinya pembuahan, atau pra konsepsi yaitu masa sebelum hamil atau masa sebelum terjadinya pertemuan antara ovum (sel telur dengan sperma.)	Kelebihan dari literatur ini adalah menjelaskan berbagai informasi tentang kesiapan pra konsepsi, kehamilan dan pencegahan komplikasi persalinan.	Tidak terdapat kekurangan dalam literatur terkait.	Literatur ini tidak ada kesamaan dengan literatur lain karena menjelaskan tentang berbagai informasi kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin.

NO	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kekurangan	Kelebihan	Perbandingan
2	Kurang Energi Kronis pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo	Yeni Paramata dan Marselia Sandalayuk	2019	Definisi KEK	Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah salah satu keadaan malnutrisi. Dimana keadaan ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronik) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara relatif atau absolut satu atau lebih zat gizi	Kelebihan pada literatur ini adalah Penelitian ini menggunakan metode survey dengan desain deskriptif dan pendekatan cross sectional yang bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik dan Kurang Energi Kronik pada Wanita Usia Subur	Kekurangan dalam penelitian ini adalah menggunakan Desain penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif	Pembahasan pada literatur ini sama dengan literatur yang telah diuraikan sebelumnya.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
3.	Hubungan status ekonomi dengan kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil di puskesmas Ngambon Kabupaten Bojonegoro	Putri Oktaviana, Siti Patonah	2010	Definisi KEK	Kurang energi kronik (KEK) adalah keadaan dimana ibu mengalami kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronis) yang mengakibatkan timbulnya gangguan – gangguan kesehatan ibu dengan tanda – tanda atau gejala antara lain badan lemah dan muka pucat (Dep Kes RI, 2003;25). Kurang energi kronik (KEK)	penelitian ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang digunakan untuk memberikan informasi pada ibu hamil tentang kejadian KEK yang berhubungan dengan status ekonomi Sebagai bahan masukan bagi ibu hamil tentang masalah kurang energi kronik (KEK) ibu hamil dan memberikan	Tidak terdapat kekurangan pada literatur ini.	Kurang energi kronik (KEK) dapat terjadi pada wanita usia subur (WUS) dan pada ibu hamil yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain peranan diet, faktor status ekonomi, kepadatan penduduk, infeksi, kemiskinan (Poorwo Soedarmo, 2003 ; 104). Salah satu indikator penyebab KEK adalah status ekonomi. Status ekonomi rendah secara tidak

					<p>dapat terjadi pada wanita usia subur (WUS)</p> <p>solusi pada masyarakat secara umum dalam bentuk pelayanan gratis (memeriksa an kehamilan); Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan keperawatan pada ibu hamil tentang masalah kurang energi kronik (KEK), Penelitian ini merupakan pengalaman</p>		<p>langsung akan mempengaruhi ibu dalam memenuhi kebutuhan gizi seimbang.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

						dalam bidang penelitian dan penerapan dalam bidang kesehatan, penelitian dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian yang lebih lanjut Hasil penelitian dapat digunakan sebagai parameter dalam memberikan perawatan pada ibu hamil.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
4	Gizi Prakonsepsi, kehamilan dan menyusui	Olivia Anggraeny, Ayuningtyas Dian Ariestiningasih	2017	Panduan teknis dalam penyusunan menu bagi masa prakonsepsik ehamilan dan menyusui.	Memberikan informasi yang tepat bagi wanita dalam masa prakonsepsi, yang dimana artinya sebelum terjadi pertemuan sel sperma dengan ovum pembuahan sebelum hamil.	Pada literatur ini menjelaskan tentang edukasi tentang gizi untuk persiapan prakonsepsi.	Tidak terdapat kekurangan pada literatur ini.	Pembahasan pada literatur ini berbeda dengan literatur yang telah diuraikan sebelumnya.

Matriks Tanda dan Gejala

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
1	Kesiapan Fisik Dewasa Awal Sebagai Calon Ibu Pada Mahasiswa Tingkat Akhir Prodi Diii Kebidanan Di Poltekkes Kemenkes Jakarta III	Wafiqah	2017	Menggambarkan kesiapan fisik dewasa awal sebagai calon ibu.	Dalam penelitian ini didapatkan juga gambaran pada status gizi sebanyak 43 (71,7%) masuk kategori normal, 85% tidak memiliki risiko KEK, pola makan didapatkan sebanyak 35 (58,3%) memiliki pola makan yang baik, adanya tanda dan gejala anemia 31 (51,7%), gangguan siklus menstruasi 34 (56,7%,	Rekomendasi agar mahasiswi meningkatkan aktivitas fisik dan menyeimbangkan asupan zat gizi sesuai anjuran konsep gizi seimbang.	Kekurangan dalam penelitian ini adalah menggunakan Desain penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lusiana El Sinta B 2017.

					sebagian besar 61,7% tidak memiliki riwayat penyakit, dan 31 responden (51,7%) memiliki lingkungan fisik yang baik.			
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
2	Hubungan Faktor Keluarga dengan Kejadian Kurang Energi Kronis pada Wanita Usia Subur di Kecamatan Terbanggi Besar	Dian Isti Angraini	2018	Tanda dan gejala pada kekurangan energi kronik (KEK).	Data kurang energi kronis (KEK) didapatkan dengan pengukuran antropometri yaitu dengan pengukuran lingkaran lengan atas (LiLA) dengan menggunakan pita meter. Dikatakan mengalami	Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan cross sectional. Penelitian dilakukan di kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah pada bulan agustus sampai november 2016	jumlah sampel minimal yang harus dipenuhi adalah 166 orang ditambah 10% sehingga didapatkan total sampel 183 orang.	Faktor–faktor yang mempengaruhi KEK pada WUS terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Internal (individu) yaitu genetik, riwayat obstetri, seks dan lain sebagainya.

					KEK apabila diameter lingkaran lengan atas (LiLA) < 24,9 cm, sedangkan dikatakan tidak mengalami KEK/ gizi baik apabila diameter lingkaran lengan atas (LiLA) > 24,9 cm.			Sedangkan eksternal adalah gizi, obat-obatan, lingkungan, keluarga, dan penyakit. 6
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
3	Perbedaan persiapan prakonsepsi ibu hamil primigravida yang mengalami kurang energi kronik dan tidak kurang energi kronik	Ketut Pramana Adiputra, IGN Indraguna Pinatih, dkk	2017	Kejadian KEK pada wanita underweight dan normal	Hasil penelitian mendapatkan bahwa terdapat perbedaan angka kejadian KEK apabila dilihat dari status gizi dan status gizi yang menyebabkan KEK adalah underweight	Tidak terdapat kelemahan pada penelitian ini	Indeks masa tubuh (IMT) sebelum kehamilan dan lingkaran lengan atas (LILA) pada ibu hamil dengan KEK, penelitian ini menggunakan kategori underweight	Ada beberapa penelitian yang sama kemaknaan akan tetapi ada variabel yang berbeda pada penelitian ini.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
4	Hubungan Asupan Energi Terhadap Status Gizi Wanita Subur Di Kelas Xii Ipa Sma Negeri 1 Cigugur Kabupaten Kuningan	Aep Saepudin.	2018	Hubungan status gizi dengan KEK.	Status gizi baik apabila tubuh memperoleh zat-zat gizi yang seimbang dalam jumlah yang cukup. Status gizi kurang apabila twrjadi kekurangan karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Status gizi lebih jika terdapat ketidakseimbangan antara konsumsi energy dan pengeluaran energi yang berlebih dapat menimbulkan overweight dan obesitas.	Kelebihan dari penelitian adalah berfokus pada satu komponen yaitu mengenai kekurangan energi kronik.	Kekurangan penelitian ini adalah hanya menilai gambaran status gizi tanpa mengetahui asupan yang dikonsumsi setiap harinya.	Perbandingan penelitian ini adalah status gizi baik berbeda dengan penelitian yang dilakukan Cindy Fariski dkk 2019 mengenai Status kesehatan periode prakonsepsi berperan penting untuk mempersiapkan kehamilan.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
5	Kurang Energi Kronis pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo	Yeni Parramatta dkk	2019	Tanda dan gejala KEK	Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah keadaan dimana remaja putri/wanita mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun	Kelebihan pada penelitian ini adalah menilai KEK pendidikan dan pekerjaan pada usia subur	Tidak terdapat kekurangan pada literatur terkait.	Terdapat perbandingan pada penelitian ini yaitu KEK dengan status kehamilan.
6	Peranan Edukasi Bidan dalam Mencegah Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil di Provinsi Sulawesi Tengah	Sri Restu Tempali, Sumiaty	2019	Penyebab dan resiko KEK	KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibuyaitu anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal dan terkena penyakit infeksi.	Tidak terdapat kelemahan pada penelitian ini.	Kelebihan pada penelitian ini metode yang digunakan metode penelitian observasional dengan desain cross sectional Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh yang membahas tentang penyebab KEK.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
7	Hubungan Pengetahuan ,Sikap,Tingkat Konsumsi Energi, Protein, dan Indeks Massa Tubuh/ Umur dengan Kekurangan Energi Kronik pada Remaja Putri	Agustin Dwi Arista dkk	2017	Tanda dan gejala KEK pada remaja	Status gizi didapatkan dengan membandingkan antara IMT dan umur remaja putri. Dalam penelitian ini jika IMT/U remaja putri normal atau berlebih (gemuk dan obesitas) maka tidak berisiko untuk mengalami KEK. Sebaliknya, jika IMT/U kurang (kurus dan sangat kurus) akan berisiko mengalami KEK.	Kelebihan pada penelitian ini yaitu menilai asupan dengan hubungan KEK.	Kelemahan pada penelitian ini yaitu jumlah sampel yang digunakan dengan lama penelitiannya.	Perbedaan pada penelitian ini adalah menjelaskan tentang konsumsi energi, protein dan IMT sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dian Isti Anggraini and Sofyan Musyabiq Wijaya (2019) adalah mengenai Malnutrisi energi kronis memiliki korelasi.

A. Langkah II Identifikasi Masalah Aktual

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Perbedaan persiapan prakonsepsi ibu hamil primigravida yang mengalami kurang energi kronik dan tidak kurang energi kronik di Puskesmas Gianyar 1	Ketut Pramana Adiputra, dkk	2017	Kehamilan dengan kekurangan energi kronik (KEK) pada wanita normal dan underweight.	Hasil penelitian ini kejadian KEK pada wanita underweight dan normal, tidak terdapat perbedaan antara kejadian KEK dengan usia, riwayat penyakit, dan pendapatan sebelum hamil.	Kelemahan pada penelitian ini adalah sampel yang digunakan untuk penelitian prakonsepsi ibu hamil awal bukan wanita usia subur.	Kelebihan pada penelitian ini adalah menentukan perbedaan persiapan prakonsepsi kehamilan awal yang mengalami KEK.	Perbedaan pada penelitian ini adalah sampel yang diteliti, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin Dwi Arista (2017) yang menjelaskan mengenai konsumsi protein dengan KEK dan sampel yang digunakan adalah wanita atau remaja putri.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
2	Hubungan Sosial Ekonomi Dengan Kekurangan Energi Kronik (Kek) Pada Wanita Prakonsepsi Di Kota Makassar	Tenri Puli, dkk	2015	Faktor resiko pendidikan dan pengeluaran pangan dengan KEK.	Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pendidikan baik belum tentu memiliki status gizi yang baik, hal ini disebabkan karena pendidikan tidak hanya didapatkan dari pendidikan formal saja tetapi bisa juga diperoleh dari pendidikan non formal seperti penyuluhan, perbaikan gizi di posyandu setempat dan melalui berbagai	Kekurangan pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sedikit adalah 16 orang.	Kelebihan dalam penelitian ini yaitu mengaitkan antara pendidikan dan pengeluaran pangan dengan KEK.	Tidak ada kesamaan penelitian ini dengan literatur yang telah diuraikan sebelumnya.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	media seperti dimajalah dan media lainnya, Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
3	Kekurangan energi kronik (KEK) ibu hamil dengan bayi berat lahir rendah (BBLR).	Sumiaty, Sri Restu.	2019	Komplikasi KEK pada ibu hamil.	KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibu antara lain: anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal dan terkena penyakit infeksi. Pengaruh KEK terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (prematuur),	berjumlah 1.051 ibu. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh Peneliti. Besar Sampel dihitung menggunakan Rumus Slovin dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 290 ibu.	Kelebihan penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan jenis penelitian kohort retrospektif.	ibu hamil menderita gizi buruk atau KEK , kondisi ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan janin yang dikandungnya. Pengaruh ini akan menentukan berat badan lahir bayinya yang akan kurang dari seharusnya. Berat badan bayi yang rendah ini akan sangat berpengaruh

					<p>pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi. KEK ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intra partum, lahir dengan berat lahir rendah (BBLR) (Proverawati, dkk.2010:50)</p>			<p>terhadap kematian bayi yang lebih besar. Sebuah hasil studi di Guatemala (Amerika Serikat)</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	---

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
4	Tingkat asupan energi dan ketersediaan pangan berhubungan dengan risiko kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil	Yanuarti Petrika1 , Hamam Hadi2 , Detty Siti Nurdiati3	2014	Faktor penyebab KEK	Salah satu dampak yang dapat dialami ibu hamil jika asupan zat gizi kurang yaitu akan mengalami KEK yang dilihat berdasarkan pengukuran lingkaran lengan atas (LILA), Salah satu faktor penyebab KEK adalah konsumsi makan yang tidak cukup mengandung energi dan protein	Tidak terdapat kelemahan dari penelitian ini.	Kelebihan pada penelitian ini adalah menjelaskan pentingnya kesehatan ibu sebelum konsepsi dan faktor risiko utama untuk hasil kelahiran yang merugikan	Perbedaan yang sangat terlihat dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tenri puli (2015) adalah prakonsepsi untuk hasil kelahiran dan risiko penyakit dikemudian hari.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
5	Hubungan Asupan Makan Dengan Kejadian Kurang Energi Kronis (Kek) Pada Wanita Usia Subur (Wus) Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	Meriska Cesia Putri	2017	Akibat kekurangan gizi pada WUS	Hasil penelitian responden menderita KEK dengan mayoritas responden memiliki asupan energi kurang (54,1%), asupan karbohidrat lebih (72,1%), asupan protein kurang (91,8%), asupan lemak kurang (98%), dan asupan zat besi kurang (100%), dengan hasil analisis bivariat fisher exact didapatkan bahwa asupan energi tidak berhubungan secara	Tidak ada terdapat kelemahan pada penelitian ini.	Penelitian ini menggunakan kuesioner food recall 2x24 jam untuk mengetahui data asupan makannya responden.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tenri puli, tidak menggunakan food recall untuk mengetahui asupan makannya.

					<p>signifikan asupan karbohidrat tidak berhubungan secara signifikan asupan protein tidak berhubungan secara signifikan asupan lemak berhubungan secara signifikan dengan kejadian KEK, dan asupan zat besi tidak dapat diukur signifikansinya karena seluruh responden memiliki asupan zat besi yang kurang.</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

6	Tingkat asupan energi dan ketersediaan pangan berhubungan dengan risiko kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil	Yanuarti Petrikal , Hamam Hadi2 , Detty Siti Nurdiati	2014	Salah satu faktor penyebab KEK	Salah satu faktor penyebab KEK adalah konsumsi makan yang tidak cukup mengandung energy dan protein. Kehamilan menyebabkan meningkatnya metabolisme energi, sehingga kebutuhan energi dan zat gizi lainnya meningkat. Selama kehamilan, diperlukan tambahan energi ekstra sebesar 340-450 Kalori setiap hari pada trimester II dan III (5,6).	Kelemahan penelitian ini yaitu Kriteria eksklusi yaitu ibu hamil yang dalam perawatan atau pernah menderita penyakit selama 3 bulan ke belakang yang mengganggu asupan makanan, mengalami edema bagian atas terutama lengan tangan, tidak mempunyai tangan (cacat) dan menderita penyakit penyerta yang berat seperti gangguan kesadaran/koma	Kelebihan pada penelitian ini , proporsi risiko KEK akan semakin menurun jika asupan protein ibu hamil >60,7 gram (kuartil 3, 4, dan 5). Secara keseluruhan, semakin tinggi asupan protein ibu hamil, maka proporsi risiko KEK cenderung menurun dan proporsi risiko tidak KEK cenderung meningkat.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adrianingtias (2015) yang membahas tentang tingkat konsumsi.
---	---	---	------	--------------------------------	---	---	---	---

					<p>Kekurangan asupan energi selama kehamilan juga akan mempengaruhi kebutuhan protein. Jika ibu kekurangan zat energi maka fungsi protein untuk membentuk glukosa akan didahulukan. Pemecahan protein tubuh ini pada akhirnya akan menyebabkan melemahnya otot-otot dan jika hal ini terjadi secara terus menerus, akan terjadi depleksi masa otot karena</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					salah satu fungsi dari protein adalah untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel-sel.			
7	Relationship Between Cultural And Race Toward Chronic Energi Malnutrition (Cem) Risk On Women Of Childbearing Age In Terbanggi Besar Districts Central Lampung Regency	Meti Destriyana	2016	Resiko makanan pantangan yang mengakibatkan an KEK pada WUS	Hasil penelitian menunjukkan 4,1% responden KEK; 16,4% responden memiliki pantang makan; 29% responden menikah pada usia risiko tinggi; 4,1% responden dengan paritas tinggi; 74% responden dengan ras Jawa.	Kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak menjelaskan prakonsepsi.	Kelebihan dari penelitian ini adalah variabel persepsi dan ras dihubungkan dengan KEK.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilita Noor Amelia (2016) variabelnya adalah Pengetahuan sikap dan perilaku dengan KEK.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
8	Analisis faktor resiko kekurangan energi kronik (KEK) pada wanita pra konsepsi di kota makassar	Fauziah Hamid, A. Razak Thaha, Abdul Salam	2019	Faktor resiko kekurangan energi kronik pada wanita pra konsepsi.	Hasil penelitian ini membahas Malnutrisi dapat mempermudah tubuh terkena penyakit infeksi dan juga infeksi akan mempermudah status gizi dan mempercepat malnutrisi, yang salah satunya berdampak pada penurunan asupan gizi akibat kurang nafsu makan. Dalam hal ini jumlah asupan makan/asupan gizi dan penyakit/infeksi menjadi langsung masalah gizi.	Kelemahan penelitian ini yaitu Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner. Analisis data yang dilakukan adalah univariat, bivariat, multivariat dengan uji chi square, uji odds ratio, dan uji regresi logistik. Penyajian data dalam bentuk tabel dan disertai narasi.	Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 48 orang yang terdiri dari 16 kelompok kasus (KEK) dan 32 kelompok kontrol (non KEK). Berdasarkan karakteristik umum wanita prakonsepsi di Kota Makassar menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 18-29	Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainya yang telah dibahas sebelumnya.

					<p>Gambaran pola penyakit di Kota Makassar masih didominasi oleh penyakit infeksi yang berhubungan erat dengan keadaan gizi⁵ . Rendahnya asupan makanan dapat disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan perilaku makan seseorang. Rendahnya pengetahuan gizi dapat menyebabkan rendahnya pemilihan makanan dan memiliki peran dalam masalah nutrisi. Faktor</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					lain yang berperan dalam menentukan status kesehatan seseorang adalah tingkat sosial ekonomi, dalam hal ini adalah pendidikan, pekerjaan, dan pengeluaran 6 . penyebab			
9	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kurang Energi Kronis Pada Wanita Di Kulon Progo	Diana Oktaviastuti Dharmasetya	2020	Faktor usia menikah dengan KEK	Hasil dari penelitian ini membahas responden yang memiliki pantang makan dan usia menikah sehingga terjadi KEK.	Kekurangan pada penelitian ini hanya menjelaskan mengenai usia menikah yang dikaitkan dengan KEK.	Kelebihan dari penelitian ini adalah menjelaskan faktor yang mempengaruhi KEK antara lain Ras dan KEK, paritas dan Usia menikah, Budaya dan KEK.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adrianingtias (2015) yang membahas mengenai tingkat konsumsi.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
10	Gambaran kejadian anemia pada remaja putri KEK yang Mendapatkan tablet tambah darah Pada siswi SMA.N 3 kota ternate, wilayah suburban	Hasna soleman	2018	Masalah akibat kekurangan gizi pada remaja putri.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 45 remaja putri KEK umumnya berusia 15 tahun, pekerjaan ayah dominan wiraswasta 33,3% dan pekerjaan ibu dominan Ibu rumah tangga 75,6%. Dari segi asupan remaja putri 100% kekurangan Mengonsumsi energi, asam folat, fe dan zink. Untuk konsumsi ttd sebanyak 86,7% remaja putri tidak pernah mengonsumsi	Tidak terdapat kekurangan pada penelitian ini.	Kelebihan dari penelitian ini yaitu memikirkan hingga frekuensi sarapan dan sanitasi lingkungan.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang telah dibahas sebelumnya.

					ttd, mengonsumsi tidak rutin 6,7% dan tidak mengonsumsi 6,7% kemudian untuk remaja putri anemia Sebanyak 48,9%.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

B. Matriks Langkah III

No	Judul	Oleh	Tahun	General Ide	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Hubungan Pemanfaatan Posyandu Prakonsepsi dengan Status Gizi Wanita Prakonsepsi di Desa Lokasi Fokus Stunting Kabupaten	Dwi Wahyu Balebu	2019	Masalah potensial pada KEK	Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan posyandu prakonsepsi dengan status anemia wanita prakonsepsi tidak ada hubungan yang	Tidak terdapat kekurangan pada penelitian ini.	Kelebihan dalam penelitian ini motivasi dan dorongan yang dilakukan pada program posyandu.	Perbandingan dengan penelitian sebelumnya adalah Status Gizi di tandai dengan Status Anemia, Lingkaran Atas (LILA) dan Indeks Masa

	Banggai				signifikan antara pemanfaatan posyandu prakonsepsi dengan status KEK wanita prakonsepsi			Tubuh (IMT).
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
2	Anemia dan KEK sebagai faktor risiko kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Juwana Kabupaten Pati)	Susi Yunita Haryanti, Dina Rahayuning Pangestuti, Apoina Kartini.	2019	Penyebab ibu hamil dengan KEK.	KEK akan berpengaruh terhadap masa pra konsepsi yaitu gangguan alat reproduksi kekurangan nutrisi dan anemia, pada persalinan seperti persalinan sulit dan lama, persalinan belum waktunya (prematuur), perdarahan setelah	Jumlah sampel sebanyak 40, untuk kelompok kasus bayi yang lahir hidup dengan BBLR .	Peneliti lain diharapkan dapat melakukan kelebihan penelitian ini l untuk mengetahui faktor-faktor risiko kejadian bayi berat lahir rendah lainnya seperti pengetahuan tentang gizi saat hamil, penyakit infeksi, faktor genetik.	Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian di wilayah kerja Puskesmas Suruh Kabupaten Semarang yang menunjukkan bahwa tingkat kecukupan protein yang lebih selama kehamilan dibutuhkan oleh plasenta untuk

					persalinan, dan persalinan dengan proses operasi semakin meningkat. Ibu hamil yang mengalami KEK juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan janin seperti: keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia, pada bayi janin mati dalam kandungan, serta lahir dengan BBLR.			membawa makanan ke janin, serta untuk pembentukan hormon enzim ibu dan janin. Kekurangan zat gizi energi dan protein pada ibu hamil dapat mengurangi inti DNA dan RNA yang dapat mempengaruhi profil asam lemak sehingga transfer zat gizi ibu ke janin menjadi terganggu.
3	Kekurangan energi kronik (KEK) ibu	Sumiaty, Sri Restu	2016	Komplikasi KEK pada ibu hamil.	KEK pada masa pra konsepsi dapat	berjumlah 1.051 ibu. Pengambilan sampel dilakukan	Kelebihan penelitian ini adalah penelitian	ibu hamil menderita gizi buruk atau

	hamil dengan bayi berat lahir rendah (BBLR).			menyebabkan gangguan alat reproduksi, kurang nutrisi dan anemia sedangkan ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibu antara lain: anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal dan terkena penyakit infeksi. Pengaruh KEK terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (prematuur),	dengan teknik purposive sampling dengan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh Peneliti. Besar Sampel dihitung menggunakan Rumus Slovin dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 290 ibu.	observasional analitik dengan jenis penelitian kohort retrospektif.	KEK , kondisi ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan janin yang dikandungnya. Pengaruh ini akan menentukan berat badan lahir bayinya yang akan kurang dari seharusnya. Berat badan bayi yang rendah ini akan sangat berpengaruh terhadap kematian bayi yang lebih besar. Sebuah hasil studi di Guatemala (Amerika
--	--	--	--	---	---	---	---

					pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi. KEK ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intra partum, lahir dengan berat lahir rendah (BBLR) (Proverawati, dkk.2010:50)			Serikat)
--	--	--	--	--	--	--	--	----------

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
4	Status ekonomi dan pengetahuan zat gizi pada ibu hamil	Aisyah Susanti , dkk.	2018	Komplikasi KEK	Komplikasi gizi kurang terhadap WUS yaitu gangguan alat reoroduksi proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (prematuur), pendarahan setelah persalinan.	Tidak terdapat kekurangan pada penelitian ini.	Kelebihan pada penelitian ini Dengan totalitas bukti ilmiah yang ada saat ini berpotensi untuk memodifikasi penyebab penyakit faktor penentu kehamilan, kegagalan untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan dapat membuat anggota komunitas medis secara kolektif dan secara individu bersalah atas penyakit yang dapat dicegah pada	Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Stephen J. Genius (2016).

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
5	<i>Food insecurity and nutritional status of preconcepti on women in a rural population Of North Karnataka, India</i>	Shivanand C. Mastiholi, et al.	2018	kekurangan gizi kronis selama masa prakonsepsi	Status gizi ibu prakonsepsi tergolong miskin dan anemia lebih banyak terjadi pada kelompok sosial ekonomi rendah dan populasi rawan pangan, keadaan yang mengakibatkan kesehatan dan kesehatan bayi berat lahir rendah.	Kelemahan terlalu banyak menggunakan sampel pada penelitian.	Dilakukan pengukuran antropometri dan estimasi hemoglobin.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya.
6	<i>Preconception Care: A New Standard of</i>	Stephen J. Genius and Rebecca A. Genius	2015	Faktor-faktor yang menyebabkan kekurangan	Kekurangan Nutrisi dapat mengakibatkan kekurangan	Tidak terdapat kelemahan dari penelitian ini.	Dengan totalitas bukti ilmiah yang ada saat ini berpotensi untuk	Penelitian ini berbeda dengan penelitian

	<i>Care within Maternal Health Services</i>			energi kronik	Energi kronik pada wanita prakonsepsi. pendidikan kesehatan lingkungan tentang kesehatan ibu sangat perlu ditingkatkan guna untuk mencegah terjadinya KEK pada wanita pra konsepsi maupun pada wanita hamil.		memodifikasi penyebab penyakit faktor penentu kehamilan, kegagalan untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan dapat membuat anggota komunitas medis secara kolektif dan secara individu bersalah atas penyakit yang dapat dicegah pada anak-anak.	yang telah diuraikan sebelumnya.
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
7	Penyebab kejadian energi kronik pada KEK resiko tinggi	Linda Syahadhatun, Nisa, Christyana Sandra, Sri	2018	Penyebab KEK yang menyebabkan anemia dan	Pendarahan menempati persentase tertinggi penyebab	Jumlah sampel sebanyak 42 responden dengan teknik pengambilan	Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross	Sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki akses

	dan pemanfaatan antenatal care di wilayah kerja puskesmas Jalbuk Jember	Utami.		perdarahan	kematian ibu (28%), anemia dan Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil menjadi penyebab utama terjadinya pendarahan dan infeksi yang merupakan faktor kematian utama ibu (Apriyanti, 2017). Salah satu bentuk faktor risiko pada ibu hamil adalah Kurang Energi Kronis (KEK) dengan lingkaran lengan atas kurang dari 23,5 cm, atau penambahan berat badan < 9 kg selama masa kehamilan	sampel menggunakan simple random sampling. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner dan studi dokumentasi.	sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu risiko tinggi yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) di wilayah kerja Puskesmas Jelbuk yang berjumlah 75 orang.	ke pelayanan kesehatan yang cukup baik yaitu sebanyak 25 orang responden (59,5%). Sebagian besar responden menilai pelayanan petugas kesehatan cukup baik sebanyak 31 orang responden (73,8%).
--	---	--------	--	------------	---	---	--	--

					(Kemenkes RI, 2015)			
8	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil di puskesmas Belimbing Padang	Laila Rahmi	2015	Masalah potensial KEK	Pra konsepsi yang mengalami kek beresiko mengalami gangguan alat reproduksi, kekurangan nutrisi, dan anemia sedangkan Ibu hamil yang mengalami resiko KEK akan menimbulkan beberapa permasalahan, baik pada ibu maupun janin. KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibu antara lain:	Tidak terdapat kekurangan pada penelitian ini.	Metode penelitian yang digunakan harus ditulis sesuai dengan cara ilmiah, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Seyogyanya disebutkan waktu dan tempat penelitian secara jelas, berikut data maupun alat dan bahan yang dipakai dalam penelitian	Terdapat kesamaan yang terlihat pada penelitian ini dengan yang telah diuraikan sebelumnya.

					<p>anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan serangan penyakit infeksi. Sedangkan pengaruh KEK terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (prematuur), pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat. KEK ibu hamil dapat mempengaruhi</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum (mati dalam kandungan), lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).			
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
9	Resiko kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil di	Sandjaja	2018	Komplikasi KEK	Bila ibu mengalami resiko KEK selama hamil akan	Tidak terdapat kekurangan pada penelitian ini..	Kelebihan Penelitian Ini menjelaskan secara lengkap mengenai resiko	Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang

	indonesia.			<p>menimbulkan masalah baik pada ibu maupun janin. KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu antara lain Anemi, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi. KEK pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, cacat lahir, kematian perinatal,</p>		<p>yang akan terjadi pada wanita dengan KEK dan juga menjelaskan mengenai hubungan KEK dengan resiko yang akan terjadi.</p>	<p>menjelaskan resiko atau komplikasi yang akan terjadi apabila kekurangan gizi</p>
--	------------	--	--	--	--	---	---

					<p>anemia pada bayi, asfeksia, intraparum (mati dalam kandungan), dan lahir den lahir dengan berat bayi lahir rendah (BBLR). Dan Pengaruh KEK terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (prematuur), perdarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
10	Hubungan Asupan Makan Dengan Kejadian Kurang Energi Kronis (Kek) Pada Wanita Usia Subur (Wus) Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	Meriska Cesia Putri	2017	Asupan nutrisi dengan kejadian KEK.	Hasil penelitian terdapat hubungan signifikan antara asupan lemak dengan kejadian KEK pada WUS di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.	Kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak dijelaskan berapa lama penelitian yang dilakukan.	Kelebihan pada penelitian ini adalah mengukur asupan makanan dengan food recall 2x24 jam dan juga dilakukan pengukuran LILA.	Terdapat perbandingan lama penilaian melalui food recall dengan penelitian yang dilakukan oleh Adrianingtias, Widya (2015).

C. Matriks Langkah IV

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Peranan Edukasi Bidan dalam Mencegah Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil di Provinsi Sulawesi Tengah	Sri Restu Tempali, Sumiaty.	2015	Kolaborasi dengan Ahli gizi.	Upaya yang dapat dilakukan bidan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan yaitu melakukan rujukan ke petugas tenaga gizi dan berkolaborasi untuk membantu memonitoring serta mengevaluasi asupan pemberian makanan dan kenaikan berat badan. Upaya lainnya dalam menanggulangi masalah dan	Tidak terdapat kelemahan pada penelitian ini.	Kelebihan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran edukasi bidan dalam mencegah Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara peran edukasi bidan dengan rendahnya kejadian KEK	Tidak ada perbandingan penelitian yang dilakukan.

					mencegah dampak dari kurang energi kronis pada ibu hamil yaitu mengusahakan agar ibu hamil memeriksakan kehamilan secara rutin sejak hamil muda untuk mendeteksi secara dini kejadian kurang energi kronis.			
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
2	Hubungan Pengetahuan, Sikap, Tingkat Konsumsi Energi, Protein, dan Indeks Massa Tubuh/Umur dengan Kekurangan	Agustin Dwi Arista, Ir. Lakshmi Widajanti, dkk	2017	Perbaikan pola nutrisi pada WUS	Memperbaiki pola konsumsi makanan yang sesuai yaitu dengan gizi seimbang dan juga sesuai dengan lingkaran atas 23,5 cm, perbaikan	Kekurangan penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional dimana pengukuran variabel hanya	Kelebihan dari hasil penelitian ini menggunakan Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas antara lain pengetahuan tentang gizi, sikap	Pembahasan pada literature ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Patricia Stephanie (2016) yang membahas

	Energi Kronik pada Remaja Putri				pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.	dilakukan pada satu saat tertentu saja.	tentang gizi, tingkat konsumsi energi, tingkat konsumsi protein, dan Indeks Massa Tubuh/Umur. Variabel terikat yaitu Kekurangan Energi Kronik.	tentang perbaikan gizi.
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
3	Perbedaan persiapan prakonsepsi ibu hamil primigravida yang	Ketut Pramana Adiputra, IGN Indraguna Pinatih, Luh	2018	Melakukan promosi kesehatan tentang asupan zat	Melaksanakan program promosi kesehatan terhadap wanita usia reproduktif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan bermakna antara kejadian KEK	Kurangnya asupan protein dan gizi akan menyebabkan sistem imun menurun	Salah satu faktor yang mempengaruhi seorang ibu hamil mengalami

	mengalami kurang energi kronik dan tidak kurang energi kronik di Puskesmas Gianyar 1 periode Januari-Agustus 2017	Serian		gizi	mengenai asupan zat gizi yang dikonsumsi serta meningkatkan berat badan sesuai dengan yang dianjurkan sebelum kehamilan.	pada wanita underweight dan normal, selain itu tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara kejadian KEK dengan usia, riwayat penyakit, dan pendapatan sebelum hamil.	sehingga rawan terhadap infeksi dan mengalami penyakit. Hal ini akan menyebabkan nafsu makan menurun yang apabila tidak ditangani akan menyebabkan kurang gizi	KEK adalah jumlah dan pola konsumsi protein Pada tubuh kita, protein memiliki banyak fungsi yaitu sebagai sumber energi, katalis, dan membentuk struktur sel
4	Efektivitas program pemberian makanan tambahan-pemulihan pada ibu hamil kurang energi kronikdikota Palembang.	Rosyati Pastuty, Rochmah KM, Teti Herawati	2018	Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK	Kekurangan Energi Kronis (KEK) merupakan keadaan dimana ibu mengalami kekurangan makanan dalam jangka waktu lama yang dapat mengakibatkan dampak	Namun, hingga saat ini belum ada evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberian makanan tambahan dalam mengatasi KEK pada ibu hamil.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan pada ibu hamil KEK di kota Palembang.	program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan dari input, proses dan output telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Berdasarkan analisis

					kesehatan pada ibu dan janin. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan pada ibu hamil KEK merupakan salah satu upaya Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk mengatasi masalah tersebut.			Wilcoxon Test menunjukkan ada perbedaan ukuran Lingkaran Atas sebelum dan sesudah Pemberian Makanan Tambahan- Pemulihan pada ibu hamil.
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
5	Pengaruh Konseling Gizi Prakonsepsi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Wanita Pranikah Di	Abdul Malik Simatupang	2018	Memberikan konseling gizi pada wanita pra konsepsi	Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan pada pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah	Tidak dijelaskan kriteria responden dan umur.	Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode konseling dan pemberian kuesioner. Analisis data menggunakan uji	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya.

	Kecamatan Batang Kuis				intervensi. Konseling gizi prakonsepsi dapat mempersiapkan kehamilan yang lebih aman, proses kehamilan lancar dan bayi yang dilahirkan sehat.		wilcoxon dan uji T-dependent.	
6	Pengaruh Konseling Mengenai Gizi Prakonsepsi Terhadap Asupan Protein, Kalsium, Zat Besi, Asam Folat Dan Status Gizi Pada Wanita Usia Subur Di Desa	Khairun Nisa	2018	Konseling gizi pada wanita pra konsepsi	Hasil penelitian diperoleh yang menunjukkan ada pengaruh konseling mengenai gizi prakonsepsi terhadap asupan protein.	Tidak terdapat kelemahan pada penelitian ini.	Salah satu metode pengukuran konsumsi makanan untuk individu adalah metode Food Recall 24 jam. Dalam metode ini, responden disuruh menceritakan semua yang dimakan dan diminum selama 24 jam yang lalu.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anny tahun 2012 yang menyebutkan bahwa ada peningkatan asupan protein setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi prakonsepsi yaitu.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
7	Gambaran kejadian kekurangan energi kronik pada pola makan wanita usia subur di desa pesinggahan kecamatan dawan kalungkung bali.	Patricia Stephanie, Sari Komang Ayu Kartika.	2016	Meningkatkan pengetahuan wanita usia subur mengenai nutrisi	Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran kejadian KEK, pengetahuan nutrisi dan dampak KEK serta pola makan WUS. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan khususnya kepada UPTD Puskesmas Dawan I agar dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam penyuluhan dan	Tidak terdapat kekurangan pada penelitian ini.	Kelebihan penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang lebih efektif dalam penyuluhan dan promosi kesehatan lainnya sehingga nantinya dapat meningkatkan pengetahuan wanita usia subur mengenai makanan seimbang,	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang di uraikan sebelumnya.

					promosi kesehatan lainnya sehingga nantinya dapat meningkatkan pengetahuan wanita usia subur mengenai makanan seimbang, pemilihan makanan, frekuensi makan, porsi makan dan dampak KEK			
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
8	Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kurang energi Kronik (kek) pada ibu hamil di upt	Rapih Mijayanti, Yona Desni Sagita, Nur Alfi Fauziah, Yetty Dwi Fara	2010	Pemenuhan Nutrisi Ibu Hamil Dengan KEK	Makanan tambahan pemulihan ibu hamil dengan KEK adalah makanan bergizi yang diperuntukan bagi ibu hamil	Analisis dan pengolahan data didapatkan faktor yang berhubungan dengan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil Di Upt	Masalah kesehatan dan gizi timbul karena ketidaktahuan atau kurang informasi tentang kesehatan dan gizi yang	Memberikan penyuluhan dan melaksanakan nasehat atau anjuran tambahan makanan. Makanan pada

	puskesmas rawat inap Sukoharjo kabupaten pringsewu tahun 2020.				sebagai makanan tambahan untuk pemulihan gizi, makanan tambahan ibu hamil diutamakan berupa sumber protein hewani maupun nabati misalnya seperti ikan, telur, daging, ayam, kacang-kacangan dan hasil olahan seperti tempe dan tahu.	Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo Kabupaten.	memadai. Ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK) sebagian besar (76,5%) berpendidikan rendah.	ibu hamil sangat penting, karena makanan merupakan sumber gizi yang dibutuhkan ibu hamil untuk perkembangan janin dan tubuhnya sendiri.
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
9	Pengaruh Pendampingan Gizi terhadap Perubahan Perilaku	Demsa Simbolon1 , Antun Rahmadi2 , Jumiyati3	2019	Melakukan penyuluhan tentang gizi	penyuluhan gizi yang dilaksanakan melalui program pendampingan gizi merupakan	Penelitian ini membuktikan bahwa perilaku ibu hamil KEK dapat berubah dari adanya	Pendampingan dilakukan pada ibu hamil KEK trimester II selama 3 bulan mulai bulan Mei-	Pendampingan gizi adalah kegiatan dukungan dan layanan bagi keluarga agar

	Pemenuhan Gizi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)				salah satu upaya pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang gizi.	pendampingan Gizi.	Juli 2018 berupa konseling kebutuhan gizi ibu hamil KEK, pemantauan konsumsi PMT ibu hamil, pemantauan konsumsi tablet Fe, motivasi pemeriksaan kehamilan ke Puskesmas.	dapat mencegah dan mengatasi masalah gizi anggota keluarganya. Pendampingan dilakukan dengan cara memberikan perhatian, menyampaikan pesan, menyemangati, mengajak, memberikan pemikiran/solusi, menyampaikan layanan/ bantuan, memberikan nasihat, merujuk, menggerakkan dan bekerjasama
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
10	Perbedaan persiapan	Ketut Pramana	2017	kejadian KEK pada	Hasil penelitian mendapatkan	Tidak terdapat kelemahan pada	Indeks masa tubuh (IMT)	Ada beberapa penelitian yang

	prakonsepsi ibu hamil primigravida yang mengalami kurang energi kronik dan tidak kurang energi kronik	Adiputra1, IGN Indraguna Pinatih2, Luh Seriani2		wanita underweight dan normal	bahwa terdapat perbedaan angka kejadian KEK apabila dilihat dari status gizi dan status gizi yang menyebabkan KEK adalah underweight.	penelitian ini	sebelum kehamilan dan lingkaran lengan atas (LILA) pada ibu hamil dengan KEK, penelitian ini menggunakan kategori underweight	sama kemaknaan akan tetapi ada variabel yang berbeda pada penelitian ini.
--	---	---	--	-------------------------------	---	----------------	---	---

D. Matriks Langkah V (Perencanaan)

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Perbedaan pengetahuan gizi prakonsepsi dan tingkat konsumsi energi protein pada wanita usia subur (WUS) usia 15-19 tahun kurang energi kronis (KEK) dan tidak	Igna Nur' Arofah Umisah, dkk.	2018	Status gizi wanita usia subur (WUS) sering dikaitkan dengan persiapan menghadapi masa konsepsi atau prakonsepsi	Masa pra konsepsi merupakan fase dalam siklus kehidupan yang memerlukan perhatian khusus terutama dari segi	Tidak dijelaskan berapa lama penelitian dilakukan.	Data tingkat konsumsi energi dan protein diperoleh dengan wawancara kepada responden tentang makanan yang dikonsumsi selama 3 bulan	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cindy Fariski, dkk (2019) yang menjelaskan gizi dengan anemia.

	KEK di SMA Negeri 1 Pasawahan				pencukupan kebutuhan energi protein bersama karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi bagi tubuh Protein tersusun dari molekul-molekul yang disebut asam amino. Setiap asam amino didegradasi menjadi piruvat atau zat siklus asam sitrat dan dapat menjadi prekursor sintesis glukosa di hepar yang disebut		terakhir dengan metode Semi Quantitative-Food Frequency Questionnaire (SQ-FFQ). Kuantitas tingkat konsumsi energi dan protein dirata-ratakan dalam sehari kemudian diinput ke dalam Nutrisurvey	
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	---	--

					glukogenik atau glukoneogenik.			
2	Analisis faktor resiko kekurangan energi Kronik (KEK) Pada Wanita Prakonsepsi di kota Makassar	Fauziah Hamid, A. Razak Thaha, Abdul Salam	2018	Konseling tentang dampak kekurangan gizi	Dari hasil wawancara responden, sebagian besar cukup memahami tentang gizi kurang, dampak gizi kurang, serta pola makan untuk persiapan kehamilan,	pengeluaran bukan faktor risiko KEK pada wanita prakonsepsi. Penyakit infeksi merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel KEK.	Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner. Analisis data yang dilakukan adalah univariat, bivariat, multivariat dengan uji chi square, uji odds ratio, dan uji regresi logistik. Penyajian data dalam bentuk tabel dan disertai narasi.	Tidak terdapat perbandingan yang signifikan pada penelitian ini.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
3	Pengetahuan dan harapan wanita prakonsepsi terhadap pelayanan prakonsepsi sebelum dan sesudah edukasi di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar	Andi Tenri Kawareng, A.Razak Thaha, Aminuddin Syam	2015	Memberikan pengetahuan pada wanita pra konsepsi tentang gizi dan kesehatan reproduksi	Wanita prakonsepsi terhadap pengetahuan gizi dan kesehatan reproduksi didasarkan berdasarkan pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain, edukasi yang pernah dilaksanakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengetahuan wanita prakonsepsi saat ini.	Tidak terdapat kelemahan pada penelitian in.	Jenis penelitian yang digunakan adalah mixed methodology yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Hamid, A. Razak Thaha, Abdul Salam (2018).

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
4	Gizi Prakonsepsi, kehamilan dan menyusui.	Olivia Anggraeny, Ayuningtyas Dian Ariestiningasih	2017	Panduan teknis dalam penyusunan menu bagi masa prakonsepsi, kehamilan dan menyusui.	Memberikan informasi yang tepat bagi wanita dalam masa prakonsepsi, yang dimana memberikan edukasi tentang pola gizi seimbang dan memberitahu pentingnya nutrisi yang seimbang pada masa kehamilan dan menyusui.	Pada literatur ini menjelaskan tentang edukasi tentang gizi untuk persiapan prakonsepsi.	Tidak terdapat kekurangan pada literatur ini.	Pembahasan pada literatur ini berbeda dengan literatur yang telah diuraikan sebelumnya.
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
5	Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode Peer Education	Lusiana El Sinta B	2017	Konseling pra konsepsi	Klien yang mendapatkan manfaat dari adanya konseling	Kelebihan dari penelitian ini yaitu edukasi yang	Kekurangan pada penelitian ini yaitu dapat merubah perilaku secara	Tidak ada perbandingan penelitian yang

	<p>Mengenai Skrining Prakonsepsi Terhadap Sikap Dan Motivasi Wanita Usia Subur</p>				<p>premarital ini mempunyai karakteristik yang sama yaitu riwayat agresi, sedang mengalami krisis, bertindak destruktif, dan pasangan yang merasakan bahwa keluarga masing-masing memberikan dukungan. Jadi dengan adanya konseling premarital akan merubah perilaku calon pengantin tersebut.</p>	<p>dilakukan dapat mempengaruhi perilaku wanita usia subur.</p>	<p>negatif jika terdapat dampak negatif juga pada role model yang dipilih.</p>	<p>dilakukan.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	-------------------

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
6	Buku Pedoman Pendidikan Profesi Bidan	Dewi Ariani, dkk	2018	Asuhan remaja dan usia pra konsepsi	Memberikan asuhan kebidanan bagi remaja dan usia pra konsepsi maupun kepada orang tua atau walinya menyangkut karakteristik pertumbuhan fisik, alat kelamin sekunder dan kejiwaan remaja sesuai dengan usianya. Elemen psikomotor dan afektif. Dan asuhan pra konsepsi tentang	Kelebihan dalam literatur ini dijelaskan banyak hal hingga asuhan kebidanan komunitas.	Kekurangan dari literatur ini adalah penjelasannya terlalu banyak dibahas beban studi profesi bidan.	Literatur ini berbeda dengan literatur kementerian kesehatan 2015 yang menjelaskan berfokus pada pra konsepsi dan komplikasi.

					persiapan kehamilan dan perbaikan gizi sedini mungkin yaitu 6 bulan sebelum kehamilan sehingga terhindar dari kekurangan energi kronik dan komplikasi lainnya.			
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
7	Peran edukasi bidan dalam mencegah kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil di provinsi	Sri Restu, Tempali, dkk	2019	Perencanaan edukasi dalam mencegah kekurangan energy kronik (KEK)	Upaya yang dapat dilakukan bidan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan yaitu	Tidak terdapat kekurangan pada literatur terkait.	Kelebihan pada literatur ini yaitu pada penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional	Penelitian ini hampir menyerupai penelitian yang dilakukan oleh Meriska putri (2017) yang

	Sulawesi selatan				membantu memonitoring serta mengevaluasi asupan pemberian makanan dan kenaikan berat badan. Upaya lainnya dalam menanggulangi masalah dan mencegah dampak dari kurang energi kronis pada ibu hamil yaitu mengusahakan agar ibu hamil memeriksakan kehamilan secara rutin sejak hamil muda untuk mendeteksi secara dini		populasi tentang penyuluhan dan asupan nutrisi	menggunakan pengukuran antropometri.
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

					kejadian kurang energi kronis, dan penyuluhan tentang asupan nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil. Bidan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, senantiasa berupaya mempersiapkan ibu hamil sejak kontak pertama saat pemeriksaan kehamilan untuk mencegah terjadinya			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
8	Edukasi Gizi Berbasis Media Sosial Meningkatkan Pengetahuan Dan Asupan Energi- Protein Remaja Putri Dengan Kurang Energi Kronik (Kek)	Ibnu Zaki dkk	2019	Pemberian edukasi tentang asupan energi protein pada remaja putri melalui media sosial	Tidak ada perbedaan peningkatan pengetahuan gizi asupan energi protein antara pedesaan dan perkotaan. Ada perbedaan pengetahuan gizi, asupan energi, dan protein sebelum dan sesudah edukasi gizi berbasis media sosial di pedesaan maupun perkotaan.	Tidak terdapat kekurangan pada penelitian ini.	Kelebihan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian yang digunakan yaitu quasi experiment dan dengan memakai tiga uji untuk menentukan jumlah peningkatan skor pengetahuan gizi, asupan energi, dan protein tidak berbeda antara pedesaan dan perkotaan.	Tidak ada kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah diuraikan diatas.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
9	Pengaruh Konseling Gizi Prakonsepsi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Wanita Pranikah Di Kecamatan Batang Kuis	Abdul Malik Simatupang	2019	Melakukan konseling gizi.	Melakukan konseling gizi adalah suatu cara untuk meningkatkan penegetahuan dan kemampuan individu atau keluarga melalui bentuk pendekatan guna mendapatkan pengertian yang lebih baik , sehingga diharpkan indivisu atau keluarga mampu mengambil langkah-langkah untuk	Tidak terdapat kekurangan pada literatur ini.	Kelebihan pada penelitian ini menilai sikap, karakteristik responden, pengetahuan dan melakukan konseling 3 kali pengulangan.	Tidak ada perbandingan yang terlihat pada penelitian ini.

					mengatasi masalah gizi termasuk perubahan pola makan serta memecahkan masalah terkait gizi kearah kebiasaan hidup sehat.			
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
10	Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ny. A Di Puskesmas Kecamatan Cilincing Jakarta Utara	Arum Sari Pratiwi.	2019	Asuhan kebidanan komprehensif yang dilakukan merupakan asuhan kebidanan yang diberikan secara menyeluruh dari mulai, pra konsepsi	Asuhan yang diberikan pada masa pra konsepsi yaitu memberikan konseling berupa perbaikan nutrisi sebelum hamil dan pada saat hamil mencukupi kebutuhan	Tidak dijelaskan mengenai kekurangan energi kronik hanya menjelaskan mengenai pra konsepsi hingga masa nifas.	Kelebihan pada penelitian ini adalah mengkaji keseluruhan proses pra konsepsi hingga masa nifas dan resiko yang kemungkinan akan terjadi	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya penelitian ini membahas kasus.

				hamil, bersalin, nifas sampai pada bayi baru lahir.	nutrisi ibu dan janin sehingga tidak terjadi kekurangan energi kronik dan tidak terjadi komplikasi pada saat bersalin. tingkat emosi pada ibu bersalin cenderung kurang dapat terkendali yang diakibatkan oleh perubahan – perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri serta pengaruh dari orang – orang terdekatnya, ibu bersalin			
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					<p>biasanya lebih sensitif terhadap semua hal. Untuk dapat lebih tenang dan terkendali biasanya lebih sering bersosialisasi dengan sesama ibu – ibu hamil lainnya untuk saling tukar pengalaman dan pendapat.</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

E. Langkah VI (Pelaksanaan)

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Pengaruh Pendidikan Booklet Terhadap Pengetahuan Dan	Heni Irawati	2018	Sikap kesehatan reproduksi calon	Intervensi program kesehatan ibu tidak bisa	Kelemahan pada penelitian ini adalah tidak jelas mengenai	Kelebihan dan penelitian ini adalah Membuat	Penelitian ini berbeda dengan penelitian

	Sikap Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Terkait Pencegahan Risiko Kehamilan Di Kabupaten Pematang.			pengantin terkait pencegahan risiko kehamilan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan pada kelompok perlakuan	dilakukan dibagian hilir saja yaitu pada ibu hamil, namun juga harus ditarik ke bagian hulu yaitu pada kelompok remaja dan dewasa muda untuk memastikan individu dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.	uraian hasil penelitian yang sesuai dengan variabel yang diteliti.	Booklet.	yang telah diuraikan sebelumnya.
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
2	<i>Dietary fat intake and fecundability in two preconception cohort studies</i>	Lauren A. Wise, et all	2017	Asupan dari total lemak jenuh, tak jenuh tunggal, tak jenuh ganda, dan omega 6	Hubungan antara lemak makanan dan kesuburan tidak dipelajari dengan baik. Kami mengevaluasi asupan lemak	Tidak terdapat kekurangan pada penelitian ini.	Implementasi yang dilakukan jauh memikirkan asupan lemak bukan lagi mengenai makanan yang	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya.

					total, asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh tunggal, asam lemak tak jenuh ganda 51, asam lemak trans (TFA), dan asam lemak omega-3 dan-6 dalam kaitannya dengan kesuburan dalam 52 studi kohort prakonsepsi Denmark dan Amerika Utara		dimakan.	
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
3	Peranan Edukasi Bidan dalam Mencegah Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil di Provinsi Sulawesi Tengah	Sri Restu Tempal, Sumiaty	2019	Edukasi bidan dalam mencegah kekurangan energi kronik	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran edukasi bidan dalam mencegah Kurang Energi	Tidak ada kekurangan pada penelitian ini.	Kelebihan Hasil analisis Chi-Square hubungan peran edukasi bidan dalam mencegah KEK	Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya.

				<p>Kronis (KEK) Pada upaya pencegahan KEK, Bidan hendaknya memberikan edukasi kepada ibu sedini mungkin, yaitu dengan melakukan edukasi melalui edukasi prenatal</p> <p>Peran edukasi yang dilakukan bidan meliputi konseling tentang pentingnya nutrisi selama kehamilan, komposisi nutrisi yang baik dan dibutuhkan selama kehamilan, pemeriksaan</p>		<p>yaitu adanya hubungan antara peran edukasi bidan dengan pencegahan kejadian KEK pada ibu hamil selama kehamilan</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--

					kehamilan secara teratur khususnya penimbangan berat badan dan pengukuran lingkar lengan atas (LILA), cara pengolahan makanan tambahan dan daftar makanan penukar yang disesuaikan dengan bahan makanan lokal.			
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
4	Determinan Kejadian Kekurangan Energi Kronis (Kek) Pada Wanita Usia Subur (Wus) Yang Menikah Di Usia Remaja Di Kecamatan	Raisa Fajaryanti	2018	Pola konsumsi makanan pada WUS	Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan pola konsumsi makanan yang sering dikonsumsi WUS yang menikah di usia	Tidak terdapat kelemahan pada penelitian ini.	Melakukan Kerjasama lintas sektoral dengan dilaksanakannya program pemberdayaan dan pembinaan kepada remaja	Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang sudah dijelaskan diatas.

TlogosariKabupaten Bondowoso				remaja adalah nasi, singkong, telur ayam, ikan pindang, tahu, tempe, minyak goreng, sawi hijau, bayam, salak dan pisang. Sedangkan tingkat konsumsi energi, karbohidrat, protein dan lemak sebagian besar mengalami defisit.		yang terlanjur menikah di usia dini seperti pelatihan mengasah keterampilan sesuai kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui determinan kejadian kekurangan energi kronis yang lain dengan menambahkan variabel yang belum diteliti pada penelitian	
---------------------------------	--	--	--	--	--	---	--

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
5	Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ny ^{”N”} Dengan Kekurangan Energi Kronik (Kek) Di Pbm Nurhayati, Sst Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto, Jombang	Siti Juwariyah, Dwi Anik K, Nurlia Isti M	2018	Pemberian makanan tambahan berupa biskuit	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang tinggi kalori dan tinggi protein, yang berupa biskuit lapis dengan komposisi gizi dalam 100 gram produk (per saji). Setiap ibu hamil sasaran PMT yang diberikan berupa makanan tambahan untuk 90 hari sebanyak 9 kg biskuit lapis atau 100 gram/hari.	Membandingkan antara teori dan kasus yang ditemukan dilapangan dengan menggunakan pendekatan asuhan SOAP note.	Bagi ibu hamil yang usia kehamilannya 7 bulan keatas, makanan tambahan diberikan sampai melahirkan, memberitahu untuk periksa secara rutin dan melakukan ANC terpadu untuk mendeteksi secara dini kelainan atau penyakit yang mungkin diderita ibu hamil, karena sering kali pada ibu hamil	Suplementasi gizi dalam bentuk makanan tambahan dengan formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan mineral sebagai tambahan selain makanan utama bagi kelompok sasaran guna memenuhi kebutuhan gizi.

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
6	Pengetahuan dan harapan wanita prakonsepsi terhadap pelayanan prakonsepsi sebelum dan sesudah edukasi di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar	Andi Tenri Kawareng, A.Razak Thaha, Aminuddin Syam	2015	Memberikan pengetahuan pada wanita pra konsepsi tentang gizi dan kesehatan reproduksi	Wanita prakonsepsi terhadap pengetahuan gizi dan kesehatan reproduksi didasarkan berdasarkan pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain, edukasi yang pernah dilaksanakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengetahuan	Tidak terdapat kelemahan pada penelitian ini	Jenis penelitian yang digunakan adalah mixed methodology yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Hamid, A. Razak Thaha, Abdul Salam (2018).

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	wanita prakonsepsi saat ini. Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
7	Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ny. A Di Puskesmas Kecamatan Cilincing Jakarta Utara	Arum Sari Pratiwi	2019	Asuhan kebidanan komprehensif.	Tingkat emosi pada ibu bersalin cenderung kurang dapat terkendali yang diakibatkan oleh perubahan – perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri serta pengaruh dari orang – orang terdekatnya, ibu bersalin biasanya lebih sensitif terhadap semua hal. Untuk dapat lebih tenang dan terkendali	Tidak dijelaskan mengenai kekurangan energi kronik. Hanya menjelaskan mengenai prakonsepsi hingga masa nifas.	Kelebihan pada penelitian ini adalah mengkaji keseluruhan proses prakonsepsi hingga masa nifas dan resiko yang kemungkinan akan terjadi.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini membahas kasus.

					biasanya lebih sering bersosialisasi dengan sesama ibu – ibu hamil lainnya untuk saling tukar pengalaman dan pendapat.			
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
8	Hubungan Pengetahuan Tentang Gizi Kehamilan Dengan Kejadian Kurang Energi Kronik (KEK) Pada Kehamilan	Tita Rosmawati Dafiu	2017	Pemberian edukasi tentang deteksi KEK	memberikan motivasi kepada ibu hamil untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya tentang gizi kehamilan dengan lebih mengoptimalkan pelayanan ANC terpadu seperti deteksi KEK pada ibu hamil lebih awal, konseling	Penelitian ini menggunakan desain cross sectional yang melakukan pengukuran pada variabel bebas dan terikat pada satu waktu yang sama kepada satu responden. Sebuah penelitian akan lebih baik apabila	Memotivasi ibu hamil dengan lebih mengoptimalkan pelayanan ANC terpadu seperti deteksi KEK pada ibu hamil lebih awal, konseling dengan ahli gizi lebih sering untuk mencegah komplikasi dari KEK selama masa kehamilan	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum Sari Pratiwi (2019)

					dengan ahli gizi lebih sering untuk mencegah komplikasi dari KEK selama masa kehamilan dan persalinan.	dilakukan dengan desain kohort prospektif yang mengikuti dari awal masa kehamilan hingga akhir masa kehamilan, sehingga bias dapat meminimalkan.	dan persalinan.	
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
9	<i>Education of Sejam Kusuka Video Effectively Increases Preconception Health Knowledge and Attitudes of Reproductive Age Women at University of Setia Budi Surakarta</i>	Megayana Y.Maretta, Yunia Renny Andhikantias .	2016	Minimnya informasi tentang kesehatan pada masa prakonsepsi merupakan salah satu penyebab masih banyaknya jumlah WUS	Hasil penelitian menunjukkan WUS yang mendapatkan edukasi Video Sejam Kusuka memiliki tingkat pengetahuan dan sikap kesehatan prakonsepsi lebih baik	Subjek yang tidak mendapatkan edukasi Video Sejam Kusuka berisiko 1,2 kali memiliki sikap kurang (negatif) terhadap kesehatan prakonsepsi dibandingkan	Edukasi Video Sejam Kusuka dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan prakonsepsi pada WUS. Penelitian ini merupakan penelitian quasi	Penelitian ini berbeda dengan penelitian booklet.

				berisiko hamil.	dibandingkan WUS yang mendapatkan edukasi dengan metode ceramah.	subjek yang mendapatkan edukasi Video Sejam Kusuka	eksperimen before and after with control pada 60 mahasiswi Universitas Setia Budi Surakarta. Pengetahuan dan sikap diukur dengan kuesioner.	
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
10	Perbedaan Tingkat Konsumsi Energi, Protein dan Status Gizi berdasarkan Keikutsertaan dalam Program Keluarga Harapan di Desa Boto dan Desa Plumutan Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang	Nanik Erna Hastuti1, Ali Rosidi 2	2017	Perbedaan tingkat konsumsi energi dan protein serta status gizi berdasarkan keikutsertaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan konsumsi energi dan protein antara peserta PKH dan non peserta PKH dengan p Sedangkan untuk status gizi	Kekurangan pada penelitian ini adalah tidak nampak jumlah sampel penelitian, dan cara pengambilan sampel.	Kelebihan mengukur tingkat konsumsi energi protein dan status gizi.	Penelitian ini ada kesamaan dengan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya.

					menunjukkan ada perbedaan status gizi peserta PKH dan non peserta PKH dengan dibawah			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

F. Langkah VII (Evaluasi)

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Kurang Energi Kronis pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo	Yeni Parramatta dkk	2019	Menilai KEK pendidikan dan pekerjaan pada usia subur.	Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kejadian KEK terbanyak pada kelompok wanita usia 15-24 tahun. Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah keadaan dimana remaja putri/wanita	Tidak terdapat kekurangan pada literatur terkait.	Kelebihan pada penelitian ini adalah menilai KEK pendidikan dan pekerjaan pada usia subur.	tidak ada yang dibandingkan dapat yang terlihat dengan penelitian sebelumnya.

					mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun.			
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
2	Survei Intervensi dan pemantauan LILA dan BB Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) di Kecamatan Jatinangor Tahun 2015	Arsy Prawita, Ari Indra Susanti,dkk	2015	Pemantauan berat badan (BB) dan lingkaran lengan atas (LILA).	Pemantauan BB ini dilakukan setiap bulan sesuai dengan kelompok trimester ibu hamil dengan KEK. Sedangkan, LiLA diukur pada saat pertama kali ibu kunjungan di tenaga kesehatan (K1) dan setelah dilakukan	Kekurangan Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah ibu hamil dengan KEK yang diberikan intervensi. Sedangkan kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah ibu hamil dengan KEK yang tidak bersedia menjadi responden, ibu hamil dengan KEK yang	intervensi dilakukannya pemeriksaan BB dan LiLA pada Ibu Hamil dengan KEK sebanyak 100%. Artinya, sebanyak 33 orang ibu hamil dengan KEK, diberikan intervensi BB dan LiLA pada saat	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Muliawati (2012) yang membahas tentang pengukuran lingkaran lengan atas (LILA) dan berat badan (BB).

					<p>intervensi selama 3 bulan, Berdasarkan teori yang didapat, tujuan pemberian makanan tambahan ini adalah untuk pemulihan gizi berbasis makanan lokal bagi ibu hamil dengan KEK. PMT dilakukan selama 90 hari dan evaluasi setiap bulan dengan melihat pertambahan berat badan dan LiLA, sehingga status gizi ibu menjadi normal.</p>	<p>mempunyai penyulit obstetric</p>	<p>pertama kali ibu tersebut memeriksakan kehamilannya dan setelah dilakukan intervensi mengenai konseling kesadaran gizi (Kadarzi) atau pemberian makanan tambahan (PMT).</p>	
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
3	Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode Peer Education Mengenai Skrining Prakonsepsi Terhadap Sikap Dan Motivasi Wanita Usia Subur	Lusiana El Sinta B	2017	Edukasi yang dilakukan dapat mempengaruhi perilaku prakonsepsi terhadap sikap dan motivasi wanita usia subur.	Klien yang mendapatkan manfaat dari adanya konseling premarital akan merubah perilaku calon pengantin tersebut.	Kelebihan dari penelitian ini yaitu edukasi yang dilakukan dapat mempengaruhi perilaku wanita usia subur.	Kekurangan pada penelitian ini yaitu dapat merubah perilaku secara negatif jika terdapat dampak negatif juga pada role model yang dipilih.	Tidak ada perbandingan penelitian yang dilakukan.
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
4	Faktor penyebab ibu hamil kekurangan energi kronik di Puskesmas Sambu Kecamatan Sambu Kabupaten	Sitti Muliawati.	2012	Penentuan pengukuran LILA	LILA adalah suatu cara untuk mengetahui risiko Kekurangan Energi Kronis wanita usia subur termasuk remaja putri.	Tidak terdapat kekurangan pada literatur terkait.	Kelebihan pada penelitian ini adalah menilai lingkaran lengan atas (LILA) dan memantau perubahan	Terdapat persamaan pada penelitian sebelumnya yaitu KEK dengan pengukuran lingkaran lengan atas (LILA) dan berat badan

	Boyowali tahun 2012.				Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. Hasil pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) ada dua kemungkinan yaitu kurang dari 23,5 cm dan diatas atau sama dengan 23,5 cm. Apabila hasil pengukuran < 23,5 cm berarti risiko Kekurangan Energi Kronis		gizi dalam jangka pendek.	(BB).
--	----------------------	--	--	--	---	--	---------------------------	-------

					dan $\geq 23,5$ cm berarti tidak beresiko Kekurangan Energi Kronis.			
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
5	Asupan Energi dan Protein Setelah Program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik di Puskesmas Kota Surabaya	Evi Yunita, Nugrahin, dkk	2014	Penyuluhan dan pemberian makan tambahan.	Strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah gizi pada ibu hamil KEK dengan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) dan penyuluhan bagi ibu	Tidak terdapat kekurangan pada penelitian ini.	Kelebihan dari penelitian ini Menggunakan data penelitian kuantitatif diperoleh dari pengisian lembar food recall 2x24 jam, food frequency questioner	Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Herdini Widyaning Pertiwi, Tri Martini, yang menyebutkan tentang pemberian makanan tambahan.

					<p>hamil.3,7 Penelitian di India menyatakan bahwa makanan tambahan sangat mempengaruhi kenaikan berat badan ibu, pertumbuhan janin intrauterin,</p>		<p>(FFQ) ibu hamil, pengukuran lingkaran lengan atas (LiLA) ibu hamil dengan menggunakan pita LiLA dan catatan evaluasi pelaksanaan program PMT-P. Data penelitian kualitatif dari hasil wawancara mendalam pada ibu hamil tetap KEK setelah 3 bulan mendapatkan PMT-P anggota keluarga ibu hamil, dan</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
6	Efektivitas program pemberian makanan tambahan pemulihan pada ibu hamil kekurangan energi kronik di kota Palembang.	Rosyati Pastuty, 1 Rochmah KM, Teti Herawati	2017	Evaluasi LILA dan BB dengan menggunakan efektifitas pemberian makanan tambahan.	Tujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program PMT-P pada Ibu hamil KEK di Kota Palembang. Efektivitas program PMT-P diukur berdasarkan pendekatan sistem berupa input, proses dan output. Output dari	Kelemahan Secara umum gambaran program PMT pada ibu hamil KEK dijelaskan dengan menggunakan pendekatan system yang dilakukan pada komponen input, proses dan output.	petugas gizi puskesmas untuk konfirmasi jawaban ibu hamil. Kelebihan penelitian ini adalah Mixed Methods dengan metodologi penelitian Concurrent Mixed Methods. 15 Analisis data kualitatif menggunakan content analysis yaitu data diperoleh dengan melakukan indepth	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diuraikan sebelumnya.

					<p>program PMT-P dilihat berdasarkan kenaikan berat badan ibu atau perubahan ukuran LiLA setelah diberikan PMT-P selama 90 hari. evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberian makanan tambahan dalam mengatasi KEK pada ibu hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program</p>		interview	
--	--	--	--	--	---	--	-----------	--

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
7	Peranan Edukasi Bidan dalam Mencegah Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil di Provinsi Sulawesi Tengah	Sri Restu, Tempali, dkk	2019	Memonitoring dan mengevaluasi asupan gizi	Pemberian Makanan Tambahan-Pemulihan pada ibu hamil. Upaya yang dapat dilakukan bidan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan yaitu membantu memonitoring serta mengevaluasi asupan pemberian makanan dan kenaikan berat badan. Upaya lainnya dalam menanggulangi	Tidak terdapat kekurangan pada literatur terkait.	Kelebihan pada penelitian ini yaitu Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bidan yang berjumlah Jumlah sampel sebanyak 400	Penelitian Ini sejalan Dengan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Cindy Fariski, Dkk (2019) Yang Menjelaskan tentang penyuluhan dan asupan nutrisi.

					masalah dan mencegah dampak dari kurang energi kronis pada ibu hamil yaitu mengusahakan agar ibu hamil memeriksakan kehamilan secara rutin sejak hamil muda untuk mendeteksi secara dini kejadian kurang energi kronis, dan penyuluhan tentang asupan nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil. Bidan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,		bidan. Jumlah sampel 98 dengan penentuan sampel dengan teknik simple random sampling. Analisis statistik menggunakan uji chi-square.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					khususnya ibu hamil, senantiasa berupaya mempersiapkan ibu hamil sejak kontak pertama saat pemeriksaan kehamilan untuk mencegah terjadinya KEK pada Ibu hamil.			
No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
8	Perbedaan Pengetahuan Gizi Prakonsepsi Dan Tingkat Konsumsi Energi Protein Pada Wanita Usia Subur (Wus) Usia 15-19 Tahun Kurang Energi	Cigna Nur Arofah Umroh Dan Dyah Intan Puspitasari.	2017	Status Gizi Wanita Usia Subur (WUS) sering dikaitkan dengan persiapan menghadapi masa konsepsi atau prakonsepsi	Protein bersama karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi bagi tubuh. protein tersusun dari molekul-molekul yang disebut asam	Tidak Dijelaskan Berapa Lama Penelitian Dilakukan.	Data Tingkat konsumsi energi dan protein diperoleh dengan wawancara kepada responden tentang makanan yang	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh cindy fariski, dkk (2019) yang menjelaskan gizi dengan anemia.

	Kronis (Kek) Dan Tidak Kek Di Sma Negeri 1 Pasawahan				amino. setiap asam amino didegradasi menjadi piruvat atau zat siklus asam sitrat dan dapat menjadi prekursor sintesis glukosa di hepar yang disebut glukogenik atau glukoneogenik.		dikonsumsi selama 3 bulan terakhir dengan metode semi quantitative-food frequency questionnaire (Sq-Ffq). kuantitas tingkat konsumsi energi dan protein dirata-ratakan dalam sehari kemudian diinput ke dalam nutrisurvey	
--	---	--	--	--	--	--	---	--

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
9	Hubungan pemberian makanan tambahan (PMT) dengan perubahan lingkaran lengan atas ibu hamil, kekurangan energi kronik (KEK)	Herdini Widyaning Pertiwi, Tri Martini, dkk	2019	Pemberian makanan tambahan (PMT)	Upaya untuk meningkatkan status gizi ibu selama hamil dalam menangani KEK (Kekurangan Energi Kronik) adalah PMT (Pemberian Makanan Tambahan). Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) berasal dari pemerintah dan dilaksanakan di semua puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten	Tidak terdapat kekurangan pada penelitian ini.	Kelebihan pada penelitian ini menggunakan Sampel penelitian adalah semua ibu hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Plupuh II. Jumlah sampel 24 responden. Mekanik sampel adalah total sampling. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, lembar Informed	Penelitian Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Yunita, Nugrahin yang menjelaskan tentang program pemberian makanan tambahan (PMT).

					<p>Sragen termasuk Puskesmas Plupuh II dan dilakukan selama 3 bulan secara terus menerus dan tidak terputus dengan sasaran ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronik) dengan indikator LILA (Lingkar Lengan) kurang dari 23,5 cm.</p>		<p>Consent, lembar ceklis pemberian biskuit dan lembar observasi kenaikan LILA. Analisis univariat dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis distribusi frekuensi responden yaitu ibu hamil KEK sebelum dan sesudah diberikan makanan tambahan. Analisis Bivariat dilakukan</p>	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

No	Judul	Nama	Tahun	General idea	Hasil	Kelebihan	Kekurangan	Perbandingan
							yang digunakan pada penelitian ini adalah Chi Square.	
10	Pengaruh Pendampingan Gizi terhadap Perubahan Perilaku Pemenuhan Gizi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Demsa Simbolon , Antun Rahmadi, Jumiyati	2019	Pemberian edukasi dan melibatkan keluarga dalam program perbaikan gizi	Hasil penelitian di Kabupaten Barru menemukan bahwa kader posyandu serta tokoh masyarakat, setelah dilatih menjadi komunikator lokal akan mampu melakukan promosi kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai	Tidak terdapat kekurangan pada penelitian ini.	Kelebihan pada Penelitian menggunakan desain Quasi experiment dengan rancangan non randomized control group pre-test post-test design. Intervensi yang diberikan berupa pendampingan ibu hamil	Tidak ada perbandingan yang terlihat pada penelitian ini.

					<p>pengecahan KEK dengan dibekali media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang berisi materi pencegahan dan penanggulangan KEK upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan status gizi ibu hamil KEK adalah pemberian edukasi gizi melalui pendampingan oleh kader dan tenaga kesehatan. Pendampingan gizi adalah</p>		<p>KEK dan keluarga dengan memberikan promosi gizi yang disampaikan oleh kader kesehatan dalam bentuk konseling menggunakan modul yang diberikan pada kader dan dipegang oleh ibu hamil KEK. Pendampingan dilakukan pada ibu hamil KEK trimester II selama 3 bulan mulai bulan Mei-Juli 2018 berupa</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>kegiatan dukungan dan layanan bagi keluarga agar dapat mencegah dan mengatasi masalah gizi anggota keluarganya. Pendampingan dilakukan dengan cara memberikan perhatian, menyampaikan pesan, menyemangati, mengajak, memberikan pemikiran/ solusi, menyampaikan layanan/ bantuan, memberikan nasihat, merujuk,</p>		<p>konseling kebutuhan gizi ibu hamil KEK, pemantauan konsumsi PMT ibu hamil, pemantauan konsumsi tablet Fe, motivasi pemeriksaan kehamilan ke Puskesmas. Kelompok kontrol mendapat pelayanan standar puskesmas dan diberikan booklet.</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					menggerakkan dan bekerjasama.			
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Telaah vidance Based Asuhan 7 Langkah Varney

1. Langkah I: Identifikasi Data Dasar

Referensi 1 : Pra artinya sebelum, konsepsi artinya pertemuan sel ovum dengan sperma artinya pembuahan, atau pra konsepsi yaitu masa sebelum hamil atau masa sebelum terjadinya pertemuan antara ovum (sel telur dengan sperma.)

Referensi 2 : Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah salah satu keadaan malnutrisi. Dimana keadaan ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronik) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara relatif atau absolut satu atau lebih zat gizi

Referensi 3 : Kurang energi kronik (KEK) adalah keadaan dimana ibu mengalami kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronis) yang mengakibatkan timbulnya gangguan – gangguan kesehatan ibu dengan tanda – tanda atau gejala antara lain badan lemah dan muka pucat (Dep Kes RI, 2003 ; 25). Kurang energi kronik (KEK) dapat terjadi pada wanita usia subur (WUS)

Referensi 4 : Memberikan informasi yang tepat bagi wanita dalam masa prakonsepsi, yang dimana artinya sebelum terjadi pertemuan sel sperma dengan ovum pembuahan sebelum hamil.

Referensi 5 : Dalam penelitian ini didapatkan juga gambaran pada status gizi sebanyak 43 (71,7%) masuk kategori normal, 85% tidak memiliki risiko KEK, pola makan didapatkan sebanyak 35 (58,3%) memiliki pola makan yang baik, adanya tanda dan gejala anemia 31 (51,7%), gangguan siklus menstruasi 34 (56,7%, sebagian besar 61,7% tidak memiliki riwayat penyakit, dan 31 responden (51,7%) memiliki lingkungan fisik yang baik.

Referensi 6 : Data kurang energi kronis energi kronis (KEK) didapatkan dengan pengukuran antropometri yaitu dengan pengukuran lingkaran lengan atas (LiLA) dengan menggunakan pita meter. Dikatakan mengalami KEK apabila diameter lingkaran lengan atas (LiLA) < 24,9 cm, sedangkan dikatakan tidak mengalami KEK/ gizi baik apabila diameter lingkaran lengan atas (LiLA) > 24,9 cm.

Referensi 7 : Hasil penelitian mendapatkan bahwa terdapat perbedaan angka kejadian KEK apabila dilihat dari

status gizi dan status gizi yang menyebabkan KEK adalah underweight

Referensi 8 : Status gizi baik apabila tubuh memperoleh zat-zat gizi yang seimbang dalam jumlah yang cukup. Status gizi kurang apabila terjadi kekurangan karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Status gizi lebih jika terdapat ketidakseimbangan antara konsumsi energi dan pengeluaran energi yang berlebih dapat menimbulkan overweight dan obesitas.

Referensi 9 : Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah keadaan dimana remaja putri/wanita mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun

Referensi 10 : KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibu antara lain: anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal dan terkena penyakit infeksi.

Referensi 11 : Status gizi didapatkan dengan membandingkan antara IMT dan umur remaja putri. Dalam penelitian ini jika IMT/U remaja putri normal atau berlebih (gemuk dan obesitas) maka tidak berisiko untuk mengalami KEK. Sebaliknya, jika IMT/U kurang (kurus dan sangat kurus) akan berisiko mengalami KEK.

Dari beberapa referensi yang diatas dapat di simpukan bahwa pra konsepsi yaitu masa sebelum hamil atau masa sebelum terjadinya pertemuan antara ovum (sel telur dengan sperma.). pada fase prakonsepsi terdapat resiko yang sering terjadi yaitu Kurang energi kronik (KEK) yang merupakan keadaan dimana ibu mengalami kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronis) yang mengakibatkan timbulnya gangguan – gangguan kesehatan ibu. Tanda dan gejala yang timbul pada wanita prakonsepsi yang mengaami KEK dapat diihat dari hasil anamnesa dan hasil pemeriksaan antropometri meliputi pengukuran LILA dan menghitung IMT.

2. Langkah II Masalah Aktual

Referensi 1 : Hasil penelitian ini kejadian KEK pada wanita underweight dan normal, tidak terdapat perbedaan antara kejadian KEK dengan usia, riwayat penyakit, dan pendapatan sebelum hamil.

Referensi 2 : Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pendidikan baik belum tentu memiliki status gizi yang baik, hal ini disebabkan karena pendidikan tidak hanya didapatkan dari pendidikan formal saja tetapi bisa juga diperoleh dari pendidikan non formal seperti penyuluhan, perbaikan gizi di posyandu setempat dan melalui berbagai media seperti dimajalah dan media lainnya.

Referensi 3 : KEK pada ibu hamil meyebabkan risiko dan komplikasi pada ibu antara lain: anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal dan terkena penyakit infeksi. Pengaruh KEK terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (prematuur), pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi. KEK ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intra partum, lahir dengan berat lahir rendah (BBLR) (Proverawati, dkk.2010:50)

Referensi 4 : Salah satu dampak yang dapat dialami ibu hamil jika asupan zat gizi kurang yaitu akan mengalami KEK yang dilihat berdasarkan pengukuran lingkaran lengan atas (LILA), Salah satu faktor penyebab KEK adalah konsumsi makan yang tidak cukup mengandung energi dan protein

Referensi 5 : Hasil penelitian responden menderita KEK dengan mayoritas responden memiliki asupan energi kurang (54,1%), asupan karbohidrat lebih (72,1%), asupan protein kurang (91,8%), asupan lemak kurang (98%),

dan asupan zat besi kurang (100%), dengan hasil analisis bivariat fisher exact didapatkan bahwa asupan energi tidak berhubungan secara signifikan asupan karbohidrat tidak berhubungan secara signifikan asupan protein tidak berhubungan secara signifikan asupan lemak berhubungan secara signifikan dengan kejadian KEK, dan asupan zat besi tidak dapat diukur signifikansinya karena seluruh responden memiliki asupan zat besi yang kurang.

Referensi 6 : Salah satu faktor penyebab KEK adalah konsumsi makan yang tidak cukup mengandung energy dan protein. Kehamilan menyebabkan meningkatnya metabolisme energi, sehingga kebutuhan energi dan zat gizi lainnya meningkat. Selama kehamilan, diperlukan tambahan energi ekstra sebesar 340-450 Kalori setiap hari pada trimester II dan III (5,6). Kekurangan asupan energi selama kehamilan juga akan mempengaruhi kebutuhan protein. Jika ibu kekurangan zat energi maka fungsi protein untuk membentuk glukosa akan didahulukan. Pemecahan protein tubuh ini pada akhirnya akan menyebabkan melemahnya otot-otot dan jika hal ini terjadi secara terus menerus, akan terjadi

depleksi masa otot karena salah satu fungsi dari protein adalah untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel-sel.

Referensi 7 : Hasil penelitian menunjukkan 4,1% responden KEK; 16,4% responden memiliki pantang makan; 29% responden menikah pada usia risiko tinggi; 4,1% responden dengan paritas tinggi; 74% responden dengan ras Jawa.

Referensi 8 : Hasil penelitian ini membahas Malnutrisi dapat mempermudah tubuh terkena penyakit infeksi dan juga infeksi akan mempermudah status gizi dan mempercepat malnutrisi, yang salah satunya berdampak pada penurunan asupan gizi akibat kurang nafsu makan. Dalam hal ini jumlah asupan makan/asupan gizi dan penyakit/infeksi menjadi langsung masalah gizi. Gambaran pola penyakit di Kota Makassar masih didominasi oleh penyakit infeksi yang berhubungan erat dengan keadaan gizi⁵ . Rendahnya asupan makanan dapat disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan perilaku makan seseorang. Rendahnya pengetahuan gizi dapat menyebabkan rendahnya pemilihan makanan dan memiliki peran dalam masalah nutrisi. Faktor lain yang berperan dalam menentukan status kesehatan seseorang adalah tingkat sosial

ekonomi, dalam hal ini adalah pendidikan, pekerjaan, dan pengeluaran.

Referensi 9 : Hasil dari penelitian ini membahas responden responden yang memiliki pantang makanan dan usia menikah sehingga terjadi KEK

Referensi 10 : Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 45 remaja putri KEK umumnya berusia 15 tahun, pekerjaan ayah dominan parawisata 33,3% dan pekerjaan ibu dominan ibu rumah tangga 75,6% dari segi asupan remaja putri 100% kurang mengkonsumsi energy, asam folat dan zink. Untuk konsumsi ttd sebanyak 86,7% remaja putri tidak pernah mengkonsumsi 6,7% kemudian untuk remaja putri anemia sebanyak 48,9%.

Kesimpulan dari beberapa referensi diatas yaitu kekurangan energi kronik (KEK) dapat di diagnosa berdasarkan hasil anamnesa dan hasil pengukuran LILA kurang dari 23,5 cm dan menghitung IMT wanita prakonsepsi.

3. Langkah III Masalah Potensial

Referensi 1 : Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan posyandu prakonsepsi dengan status anemia wanita prakonsepsi tidak ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan

posyandu prakonsepsi dengan status KEK wanita prakonsepsi.

Referensi 2 : KEK pada masa pra konsepsi akan mempengaruhi atau mengganggu kesehatan reproduksi dan ibu akan rentan terkena penyakit infeksi karena kekurangan nutrisi dan dan menyebabkan anemia.

Referensi 3 : KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibu antara lain: anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal dan terkena penyakit infeksi. Pengaruh KEK terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (prematuur), pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi. KEK ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intra partum, lahir dengan berat lahir rendah (BBLR).

Referensi 4 : Komplikasi gizi kurang terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (premature), pendarahan setelah persalinan.

Referensi 5 : Status gizi ibu prakonsepsi tergolong miskin dan anemia lebih banyak terjadi pada kelompok sosial ekonomi rendah dan populasi rawan pangan, keadaan yang mengakibatkan kesehatan dan kesehatan bayi berat lahir rendah.

Referensi 6 : Kekurangan Nutrisi dapat mengakibatkan kekurangan Energi kronik pada wanita prakonsepsi. pendidikan kesehatan lingkungan tentang kesehatan ibu sangat perlu ditingkatkan guna untuk mencegah terjadinya KEK pada wanita pra konsepsi maupun pada wanita hamil.

Referensi 7 : Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil menjadi penyebab utama terjadinya pendarahan dan infeksi yang merupakan faktor kematian utama ibu

Referensi 8 : Ibu hamil yang mengalami resiko KEK akan menimbulkan beberapa permasalahan, baik pada ibu maupun janin. KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibu antara lain: anemia, pendarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan serangan penyakit infeksi. Sedangkan pengaruh KEK terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (prematuur), pendarahan setelah

persalinan, serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat. KEK ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum (mati dalam kandungan), lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

Referensi 9 : Bila ibu mengalami risiko KEK selama hamil akan menimbulkan masalah, baik pada ibu maupun janin. KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu antara lain: anemia, pendarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi. Pengaruh KEK terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (prematuur), pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat. KEK ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum (mati dalam kandungan), lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR).

Referensi 10 : Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan asupan makanan dengan kejadian KEK dan hasilnya menjelaskan bahwa Tidak terdapat hubungan antara asupan energi dengan kejadian KEK, Tidak terdapat hubungan antara asupan karbohidrat dengan kejadian KEK, Tidak terdapat hubungan antara asupan protein dengan kejadian KEK, dan Terdapat hubungan antara asupan lemak dengan kejadian KEK.

Kompikasi atau resiko yang akan terjadi pada wanita KEK pada fase prakonsepsi, gangguan reproduksi, kehamian, persalinan hingga bayi yaitu anemia, pendarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi. Pengaruh KEK terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (prematuur), pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat. KEK ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum (mati dalam kandungan), lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR).

4. Langkah IV Tindakan segera dan kolaborasi

Referensi 1 : Upaya yang dapat dilakukan bidan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan yaitu melakukan rujukan ke petugas tenaga gizi dan berkolaborasi untuk membantu memonitoring serta mengevaluasi asupan pemberian makanan dan kenaikan berat badan. Upaya lainnya dalam menanggulangi masalah dan mencegah dampak dari kurang energi kronis pada ibu hamil yaitu mengusahakan agar ibu hamil memeriksakan kehamilan secara rutin sejak hamil muda untuk mendeteksi secara dini kejadian kurang energi kronis

Referensi 2 : Memperbaiki pola konsumsi makanan yang sesuai yaitu dengan gizi seimbang dan juga sesuai dengan lingkaran lengan atas 23,5 cm, perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Referensi 3 : Melaksanakan program promosi kesehatan terhadap wanita usia reproduktif mengenai asupan zat gizi yang dikonsumsi serta meningkatkan berat badan sesuai dengan yang dianjurkan sebelum kehamilan

- Referensi 4 : Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) merupakan keadaan dimana ibu mengalami kekurangan makanan dalam jangka waktu lama yang dapat mengakibatkan dampak kesehatan pada ibu dan janin. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan pada ibu hamil KEK merupakan salah satu upaya Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk mengatasi masalah tersebut.
- Referensi 5 : Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan pada pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah intervensi. Konseling gizi prakonsepsi dapat mempersiapkan kehamilan yang lebih aman, proses kehamilan lancar dan bayi yang dilahirkan sehat.
- Referensi 6 : Hasil penelitian diperoleh yang menunjukkan ada pengaruh konseling mengenai gizi prakonsepsi terhadap asupan protein.
- Referensi 7 : Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran kejadian KEK, pengetahuan nutrisi dan dampak KEK serta pola makan WUS di Desa Pesinggahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan khususnya kepada UPTD Puskesmas Dawan I agar dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam penyuluhan dan promosi kesehatan lainnya sehingga

nantinya dapat meningkatkan pengetahuan wanita usia subur mengenai makanan seimbang, pemilihan makanan, frekuensi makan, porsi makan dan dampak KEK.

Referensi 8 : Makanan tambahan pemulihan ibu hamil dengan KEK adalah makanan bergizi yang diperuntukan bagi ibu hamil sebagai makanan tambahan untuk pemulihan gizi, makanan tambahan ibu hamil diutamakan berupa sumber protein hewani maupun nabati misalnya seperti ikan, telur, daging, ayam, kacang-kacangan dan hasil olahan seperti tempe dan tahu.

Referensi 9 : Penyuluhan gizi yang dilaksanakan melalui program pendampingan gizi merupakan salah satu upaya pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang gizi.

Referensi 10 : Hasil penelitian mendapatkan bahwa terdapat perbedaan angka KEK apabila dilihat dari status gizi yang menyebabkan KEK adalah underweight.

Tindakan segera yang dilakukan pada wanita kekurangan energi kronik yaitu melakukan rujukan ke petugas tenaga gizi dan berkolaborasi untuk membantu memonitoring serta mengevaluasi asupan pemberian makanan dan kenaikan berat badan, Memperbaiki pola konsumsi makanan yang sesuai yaitu dengan gizi seimbang dan

juga sesuai dengan lingkar lengan atas 23,5 cm, perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, perbaikan perilaku sadar gizi, Penyuluhan gizi yang dilaksanakan melalui program pendampingan gizi merupakan salah satu upaya pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang gizi.

5. Langkah V Perencanaan

Referensi 1: Masa pra konsepsi merupakan fase dalam siklus kehidupan yang memerlukan perhatian khusus terutama dari segi pencukupan kebutuhan energi protein bersama karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi bagi tubuh Protein tersusun dari molekul-molekul yang disebut asam amino. Setiap asam amino didegradasi menjadi piruvat atau zat siklus asam sitrat dan dapat menjadi prekursor sintesis glukosa di hepar yang disebut glukogenik atau glukoneogenik.

Referensi 2: Dari hasil wawancara responden, sebagian besar cukup memahami tentang gizi kurang, dampak gizi kurang, serta pola makan untuk persiapan kehamilan.

Referensi 3: Wanita prakonsepsi terhadap pengetahuan gizi dan kesehatan reproduksi didasarkan berdasarkan pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain, edukasi yang pernah

dilaksanakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengetahuan wanita prakonsepsi saat ini.

Referensi 4: Memberikan informasi yang tepat bagi wanita dalam masa prakonsepsi, yang dimana memberikan edukasi tentang pola gizi seimbang dan memberitahu pentingnya nutrisi yang seimbang pada masa kehamilan dan menyusui.

Referensi 5: Klien yang mendapatkan manfaat dari adanya konseling premarital ini mempunyai karakteristik yang sama yaitu riwayat agresi, sedang mengalami krisis, bertindak destruktif, dan pasangan yang merasakan bahwa keluarga masing-masing memberikan dukungan. Jadi dengan adanya konseling premarital akan berupa perilaku calon pengantin terset.

Referensi 6: Memberikan asuhan kebidanan bagi remaja dan usia pra konsepsi maupun kepada orang tua yang walinya menyangkut karakteristik pertumbuhan fisik, alat kelamian sekunder dan kejiwaan remaja sesuai dengan usianya. Elemen psikomotor dan afektif. Dan asuhan pra konsepsi tentang persiapan kehamilan dan perbaikan gizi sedini mungkin yaitu 6 bulan sebelum kehamilan sehingga terhindar dari kekurangan energy kronik dan komplikasi lainnya.

Referensi 7: Upaya yang dapat dilakukan bidan berdasarkan berdasarkan keputusan menteri kesehatan yaitu membantu memonitoring serta mengevaluasi asupan pemberian makanan dan kenaikan berat badan. Upaya lainnya dalam menanggulangi masalah dan mencegah dampak dari kekurangan energy kronik pada ibu hamil yaitu mengusahakan agar ibu hamil memeriksakan kehamilan secara rutin sejak hamil muda untuk mendeteksi secara sejak hamil muda untuk mendeteksi secara dini kejadian kekurangan energy kronik, dan penyuluhan tentang asupan nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil. Bidan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya ibu hamil, senantiasa berupaya mempersiapkan ibu hamil sejak kontak pertama saat memeriksa kehamilan untuk mencegah terjadinya KEK pada ibu hamil.

Referensi 8: Tidak ada perbedaan peningkatan pengetahuan energy asupan energi asupan protein antara pedesaan dan perkotaan. Ada perbedaan pengetahuan gizi, asupan energi dan protein sebelum dan sesudah edukasi gizi berbasis media sosial di pedesaan maupun perkotaan.

Referensi 9: Melakukan konselin gizi adalah suatu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu atau keluarga melalui pendekatan guna mendapatkan

pengertian yang lebih baik, sehingga diharapkan individu atau keluarga mampu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi gizi termasuk perubahan pola makan serta memecahkan masalah terkait gizi kearah kebiasaan hidup sehat.

Referensi 10: Asuhan yang diberikan pada masa pra konsepsi yaitu memberikan konseling berupa perbaikan nutrisi sebelum hamil dan pada saat hamil mencukupi kebutuhan nutrisi ibu dan janin sehingga tidak terjadi kekurangan energi kronik dan tidak terjadi komplikasi pada saat bersalin. tingkat emosi pada ibu bersalin cenderung kurang dapat terkendali yang diakibatkan oleh perubahan – perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri serta pengaruh dari orang – orang terdekatnya, ibu bersalin biasanya lebih sensitif terhadap semua hal. Untuk dapat lebih tenang dan terkendali biasanya lebih sering bersosialisasi dengan sesama ibu – ibu hamil lainnya untuk saling tukar pengalaman dan pendapat.

Memberikan informasi yang tepat bagi wanita dalam masa prakonsepsi, yang dimana memberikan edukasi tentang pola gizi seimbang dan memberitahu pentingnya nutrisi yang seimbang pada masa kehamilan dan menyusui, Upaya yang dapat dilakukan bidan berdasarkan berdasarkan keputusan menteri kesehatan yaitu membantu

memonitoring serta mengevaluasi asupan pemberian makanan dan kenaikan berat badan, Asuhan yang diberikan pada masa pra konsepsi yaitu memberikan konseling berupa perbaikan nutrisi sebelum hamil dan pada saat hamil mencukupi kebutuhan nutrisi ibu dan janin sehingga tidak terjadi kekurangan energi kronik dan tidak terjadi komplikasi pada saat bersalin.

6. Langkah VI Perencanaan

Referensi 1: Intervensi program kesehatan ibu tidak bisa dilakukan dibagian hilir saja yaitu pada ibu hamil, namun juga harus ditarik ke bagian hulu yaitu pada kelompok remaja dan dewasa muda untuk memastikan individu dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.

Referensi 2: Hubungan antara lemak makanan dan kesuburan tidak dipelajari dengan baik. Kami mengevaluasi asupan lemak total, asam lemak jenuh tunggal, asam lemak tak jenuh ganda, asam lemak trans (TFA), dan asam lemak omega - 3 dan -6 dalam kaitanya dengan kesuburan dalam study kohort pra konsepsi Denmark dan Amerika Utara

Referensi 3: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran edukasi bidan dalam mencegah Kekurangn Energi Kronik (KEK) pada upaya pencegahan KEK. Bidan hendaknya memberikan edukasi kepada ibu sedini mungkin, yaitudengan melakukan edukasi melalui edukasi prenatal

peran edukasi yang dilakukan bidan meliputi konseling tentang pentingnya nutrisi selama kehamilan, komposisi nutrisi yang baik dibutuhkan selama kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara teratur khususnya penimbangan berat badan dan pengukuran lingkaran lengan atas (LILA), cara pengolahan makanan tambahan dan daftar makanan penukar yang disesuaikan dengan bahan makanan local.

Referensi 4: Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan pola konsumsi makanan yang sering dikonsumsi WUS yang menikah diusia remaja adalah nasi, singkong, telur ayam, ikan pindang, tahu, tempe, minyak goreng, sawi hijau, bayam, salak dan pisang. Sedangkan tingkat konsumsi energy, karbohidrat, protein dan lemak sebagian besar mengalami defisit.

Referensi 5: Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang tinggi kalori dan tinggi protein yang berupa biscuit lapis dengan komposisi gizi dalam 100 gram produk (persaji). Setiap ibu hamil sasaran PMT yang diberikan berupa makanan tambahan untuk 90 hari sebanyak 9 kg biscuit lapis atau 100 gram/hari.

Referensi 6: Wanita pra konsepsi terhadap pengetahuan gizi dan kesehatan reproduksi didasarkan berdasarkan pengalaman

sendiri dan pengalaman orang lain, edukasi yang pernah dilaksanakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengetahuan wanita pra konsepsi saat ini.

Referensi 7: Tingkat emosi pada ibu bersalin cenderung kurang dapat terkendali yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri serta pengaruh dari orang-orang terdekatnya, ibu bersalin biasanya lebih sensitive terhadap semua hal. Untuk dapat lebih tenang dan terkendali biasanya lebih sering bersosialisasi dengan sesama ibu-ibu hamil lainnya untuk saling bertukar pengalaman dan pendapat.

Referensi 8: Memberikan motivasi kepada ibu hamil untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya tentang gizi kehamilan dengan lebih mengoptimalkan pelayanan ANC terpadu seperti deteksi KEK pada ibu hamil lebih awal, konselin dengan ahli gizi lebih sering untuk mencegah komplikasi KEK selama masa kehamilan dan persalinan.

Referensi 9: Hasil penelitian menunjukkan WUS yang mendapatkan edukasi video sejam kusuka memiliki pengetahuan dan sikap kesehatan pra konsepsi lebih baik dibandingkan WUS yang mendapatkan edukasi dengan metode ceramah.

Referensi 10: Penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan konsumsi energi dan protein antara peserta PKH dan non

peserta PKH dengan p Sedangkan untuk status gizi menunjukkan ada perbedaan status gizi peserta PKH dan non peserta PKH dengan dibawah.

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang tinggi kalori dan tinggi protein yang berupa biscuit lapis dengan komposisi gizi dalam 100 gram produk (persaji). Setiap ibu hamil sasaran PMT yang diberikan berupa makanan tambahan untuk 90 hari sebanyak 9 kg biscuit lapis atau 100 gram/hari, Memberikan motivasi kepada ibu hamil untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya tentang gizi kehamilan dengan lebih mengoptimalkan pelayanan ANC terpadu seperti deteksi KEK pada ibu hamil lebih awal, konselin dengan ahli gizi lebih sering untuk mencega komplikasi KEK selama masa kehamilan dan persalinan. Memberikan motivasi kepada ibu hamil untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya tentang gizi kehamilan dengan lebih mengoptimalkan pelayanan ANC terpadu seperti deteksi KEK pada ibu hamil lebih awal, konselin dengan ahli gizi lebih sering untuk mencega komplikasi KEK selama masa kehamilan dan persalinan.

7. Langkah VII Evaluasi

Referensi 1: Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kejadian KEK terbanyak pada kelompok wanita usia 15-24 tahun. Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah keadaan

dimana remaja putri/wanita mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun

Referensi 2: Pemantauan BB ini dilakukan setiap bulan sesuai dengan kelompok trimester ibu hamil dengan KEK. Sedangkan, LiLA diukur pada saat pertama kali ibu kunjungan di tenaga kesehatan (K1) dan setelah dilakukan intervensi selama 3 bulan, Berdasarkan teori yang didapat, tujuan pemberian makanan tambahan ini adalah untuk pemulihan gizi berbasis makanan lokal bagi ibu hamil dengan KEK. PMT dilakukan selama 90 hari dan evaluasi setiap bulan dengan melihat pertambahan berat badan dan LiLA, sehingga status gizi ibu menjadi normal.

Referensi 3: Klien yang mendapatkan manfaat dari adanya konseling premarital akan merubah perilaku calon pengantin tersebut.

Referensi 4: LILA adalah suatu cara untuk mengetahui risiko Kekurangan Energi Kronis wanita usia subur termasuk remaja putri. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. Hasil pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) ada dua kemungkinan yaitu kurang dari 23,5 cm dan diatas atau sama dengan 23,5 cm. Apabila hasil pengukuran $< 23,5$ cm berarti risiko

Kekurangan Energi Kronis dan $\geq 23,5$ cm berarti tidak beresiko Kekurangan Energi Kronis

Referensi 5: Strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah gizi pada ibu hamil KEK dengan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) dan penyuluhan bagi ibu hamil.^{3,7} Penelitian di India menyatakan bahwa makanan tambahan sangat mempengaruhi kenaikan berat badan ibu, pertumbuhan janin intrauterin

Referensi 6: Tujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program PMT-P pada Ibu hamil KEK di Kota Palembang. Efektivitas program PMT-P diukur berdasarkan pendekatan sistem berupa input, proses dan output. Output dari program PMT-P dilihat berdasarkan pertambahan kenaikan berat badan ibu atau perubahan ukuran LiLA setelah diberikan PMT-P selama 90 hari. evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberian makanan tambahan dalam mengatasi KEK pada ibu hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas program Pemberian Makanan Tambahan-Pemulihan pada ibu hamil KEK di kota Palembang.

Referensi 7: Upaya yang dapat dilakukan bidan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan yaitu membantu

memonitoring serta mengevaluasi asupan pemberian makanan dan kenaikan berat badan. Upaya lainnya dalam menanggulangi masalah dan mencegah dampak dari kurang energi kronis pada ibu hamil yaitu mengusahakan agar ibu hamil memeriksakan kehamilan secara rutin sejak hamil muda untuk mendeteksi secara dini kejadian kurang energi kronis, dan penyuluhan tentang asupan nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil. Bidan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, senantiasa berupaya mempersiapkan ibu hamil sejak kontak pertama saat pemeriksaan kehamilan untuk mencegah terjadinya KEK pada Ibu hamil.

Referensi 8: Protein bersama karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi bagi tubuh. protein tersusun dari molekul-molekul yang disebut asam amino. setiap asam amino didegradasi menjadi piruvat atau zat siklus asam sitrat dan dapat menjadi prekursor sintesis glukosa di hepar yang disebut glukogenik atau glukoneogenik

Referensi 9: Upaya untuk meningkatkan status gizi ibu selama hamil dalam menangani KEK (Kekurangan Energi Kronik) adalah PMT (Pemberian Makanan Tambahan). Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) berasal dari pemerintah dan dilaksanakan di semua puskesmas

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen termasuk Puskesmas Plupuh II dan dilakukan selama 3 bulan secara terus menerus dan tidak terputus dengan sasaran ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronik) dengan indikator LILA (Lingkar Lengan) kurang dari 23,5 cm.

Referensi 10: Hasil penelitian di Kabupaten Barru menemukan bahwa kader posyandu serta tokoh masyarakat, setelah dilatih menjadi komunikator lokal akan mampu melakukan promosi kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai pencegahan KEK dengan dibekali media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang berisi materi pencegahan dan penanggulangan KEK upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan status gizi ibu hamil KEK adalah pemberian edukasi gizi melalui pendampingan oleh kader dan tenaga kesehatan. Pendampingan gizi adalah kegiatan dukungan dan layanan bagi keluarga agar dapat mencegah dan mengatasi masalah gizi anggota keluarganya. Pendampingan dilakukan dengan cara memberikan perhatian, menyampaikan pesan, menyemangati, mengajak, memberikan pemikiran/ solusi, menyampaikan layanan/ bantuan, memberikan nasihat, merujuk, menggerakkan dan bekerjasama.

Pemantauan BB ini dilakukan setiap bulan sesuai dengan kelompok trimester ibu hamil dengan KEK. Sedangkan, LiLA diukur pada saat pertama kali ibu kunjungan di tenaga kesehatan, Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. Hasil pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) ada dua kemungkinan yaitu kurang dari 23,5 cm dan diatas atau sama dengan 23,5 cm, Upaya untuk meningkatkan status gizi ibu selama hamil dalam menangani KEK (Kekurangan Energi Kronik) adalah PMT (Pemberian Makanan Tambahan).

B. Implikasi Kebidanan

Tingkat pengetahuan gizi seseorang dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dalam pemilihan makanan. Semakin tinggi pengetahuan gizi seseorang maka semakin baik pula keadaan gizinya. Hal ini didukung dengan penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi dengan KEK pada wanita prakonsepsi, dengan responden yang berpengetahuan gizi rendah memiliki peluang 3,852 kali menderita KEK dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan gizi baik.

Masa pra konsepsi merupakan masa sebelum hamil yang diasumsikan sebagai wanita dewasa atau wanita usia subur (WUS) yang siap menjadi seorang ibu. Status gizi prakonsepsi akan mempengaruhi kondisi kehamilan dan kesejahteraan bayi yang akan lebih baik jika pencegahannya dilaksanakan pada saat sebelum hamil. Wanita usia 20-35 merupakan usia sasaran yang

paling tepat dalam pencegahan masalah gizi terutama KEK yang merupakan keadaan ketika seseorang menderita ketidakseimbangan asupan gizi yang berlangsung menahun terutama pada wanita usia subur termasuk remaja pu

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekurangan energi kronik (KEK) merupakan keadaan dimana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung lama dan menahun dimana ukuran lingkaran lengan atas (LILA) kurang dari 23,5 cm.

1. Data objektif kekurangan energi kronik (KEK). KEK ditandai dengan hasil pengukuran Lingkaran Lengan Atas (LILA) lebih dari 23,5cm. Oleh sebab itu, edukasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wanita periode prakonsepsi tentang masalah gizi.
2. Diagnosis kekurangan energi kronik KEK dapat ditegakkan berdasarkan anamnesa dan hasil pemeriksaan yaitu dengan lingkaran lengan atas (LILA) dibawah batas normal (23,5 cm) dan indeks massa tubuh (IMT). Kekurangan energi kronik yaitu kurangnya asupan energi yang berasal dari zat gizi makro (karbohidrat, protein dan lemak) maupun zat gizi mikro terutama vitamin A, vitamin D, asam folat, zat besi, seng, kalsium dan yodium serta zat gizi mikro lain pada wanita usia subur yang berkelanjutan (remaja sampai masa kehamilan), yang berakibat pada masa kehamilan.
3. Komplikasi yang terjadi pada wanita prakonsepsi dengan kekurangan Energi Kronis (KEK) merupakan salah satu masalah gizi yang terjadi pada pra konsepsi yang menyebabkan kekurangan nutrisi, gangguan alat

reproduksi, anemia dan pada ibu hamil yang dapat berdampak buruk pada kehamilan seperti keguguran melahirkan berat bayi lahir rendah (BBLR), cacat lahir, kematian perinatal, IUFD, dan dapat terjadi pendarahan dan persalina lama pada saat persalinan.

4. Tindakan segera yang dapat dilakukan pada kasus KEK yaitu Melakukan kolaborasi dengan dokter atau ahli gizi untuk memberikan asuhan perbaikan gizi pada wanita yang mengalami KEK.
5. Perencanaan yang dilakukan yaitu pemberian edukasi atau penyuluhan, konseling dan perbaikan pola nutrisi.
6. Penatalaksanaan KEK pada pra konsepsi yang dijelaskan pada beberapa referensi yang menyatakan bahwa memberikan informasi pada wanita melalui penyuluhan, *flip chart* dan poster tentang kesehatan, Memberikan konseling pada wanita pra konsepsi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan perbaikan nutrisi, seperti memperbaiki pola makanan dengan nutrisi yang seimbang, cermati jumlah konsumsi makanan sehingga terhindar dari kondisi makan yang berlebih mengurangi konsumsi makanan yang mengandung pengawet, makanan yang diawetkan seperti makanan kaleng, instan dan minuman dengan bahan kimia.
7. Evaluasi dan penatalaksanaan yang telah dilakukan yaitu: Mengevaluasi program penyuluhan atau edukasi menu seimbang apakah berjalan dengan baik, pengkajian kembali pada klien apakah klien paham akan konseling yang diberikan dengan cara umpan balik atau menanyakan

kembali mengenai gizi seimbang. dan memberikan motivasi konseling terhadap wanita pra konsepsi, dengan melibatkan keluarga, bahwa menu seimbang adalah salah satu program tenaga kesehatan.

B. Saran

Untuk memperbaiki status gizi pada wanita pada pra konsepsi ditahun selanjutnya maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pelayanan: adanya penjelasan tentang gizi kurang diharapkan kepada pemberi asuhan kebidanan untuk memberikan asuhan atau tindakan yang bisa lebih tepat untuk mengatasi gizi kurang seperti memberikan penyuluhan, edukasi tentang gizi seimbang.
2. Bagi Penelitian selanjutnya :Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut meneliti Penilaian asupan makan dengan sebelumnya melakukan penjelasan tentang ukuran rumah tangga (URT) dan metode lain, misalnya dengan metode penimbangan makanan.
3. Bagi Pendidikan : Untuk pendidikan diharapkan kepada para mahasiswa mempelajari lebih dalam tentang gizi kurang dan penanganan yang tepat dilakukan.
4. Bagi Masyarakat : Untuk masyarakat masih perlunya pendidikan tentang kesehatan dan edukasi tentang gizi dan memberikan penyuluhan tentang gizi seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianingtias (2015) *Hubungan Tingkat Konsumsi Energi Dan Zat Gizi Makro (Karbohidrat, Protein Dan Lemak) Terhadap Status Gizi*.
- Aep Saepudin (2018) *Hubungan Asupan Energi Terhadap Status Gizi Wanita Subur Di Kelas Xii Ipa Sma Negeri 1 Cigugur Kabupaten Kuningan*.
- Amelia, A. N. (2016) *Hubungan Pengetahuan, Sikap Dengan Perilaku Makan Sumber Energi Pada Wanita Prakonsepsi Yang Dilyani Kua Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Tahun 2016*.
- Anggraeny, O. and Arisiningsih, ayunigtiyas dian (2017) *gizi pra konsepsi, kehamilan, dan menyusui. 1st edn. Edited by H. Kusuma Rahayu. Malang: UB Press*.
- Angraini, D. I. et al. (2018) *Hubungan Faktor Keluarga dengan Kejadian Kurang Energi Kronis pada Wanita Usia Subur di Kecamatan Terbanggi Besar The Association of Family Factors With Chronic Energy Deficiencies in Women of Childbearing Age in Terbanggi Besar Subdistrict, 2, pp. 146–150*.
- Ariani, D. (2018) *Buku Panduan Pendidikan Profesi Bidan*.
- Arista, A. D. et al. (2017) *Hubungan Pengetahuan, Sikap, Tingkat Konsumsi Energi, Protein, Dan Indeks Massa Tubuh/Umur Dengan Kekurangan Energi Kronik Pada Remaja Putri (Studi Di Sekolah Menengah Kejuruan Islamic Centre Baiturrahman Semarang Pada Puasa Ramadhan Tahun 2017)*
- Badriah., D. L. (2018) *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi. 1st edn. Edited by n. F. Atif. Bandung: pt rafika aditama*.
- Dean, S. V. et al. (2014) *Preconception care: Nutritional risks and interventions*.
- DeVilbiss, E. A. et al. (2019) *Preconception Folate Status And Reproductive Outcomes Among A Prospective Cohort Of Folate-Replete Women*.
- Dian, I. A. (2018) *Hubungan Faktor Keluarga dengan Kejadian Kurang Energi Kronis pada Wanita Usia Subur di Kecamatan Terbanggi Besar*
- Diana Oktaviastuti Darmasetya (2020) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya*.
- Diantoko, V. (2019) *Buku Pegangan Petugas Kua sebagai konselor 1000 HPK dalam mengedukasi calon pengantin menuju bengkulu bebas stunting. 1st edn. Edited by D. N. Diantoko. yogyakarta: CV Budi Utama*.
- Dieny, F. F. et al. (2020) *Kualitas diet, kurang energi kronis (KEK), dan anemia*

pada pengantin wanita di Kabupaten Semarang

- Dieny, F. F., Ayu, R. and Dewi Marfu'ah Kurniawati (2019) *Gizi Prakonsepsi. Edited by nur syansiah. jakarta: Bumi Medika.*
- Doloksaribu, L. G. and Simatupang, A. M. (2019) *Kecamatan Batang Kuis.*
- Dunneram, Y. and Jeewon, R. (2015) *Healthy Diet and Nutrition Education Program among Women of Reproductive Age: a Necessity of Multilevel Strategies or Community Responsibility*
- Dwi Apriliant and Jonni Syah R. Purba (2018) *Jurusan Gizi , Poltekkes Kemenkes Pontianak , Indonesia.*
- Dwi wahyu balebu, A. L. (2019) *Hubungan Pemanfaatan Posyandu Prakonsepsi Dengan Status Gizi Wanita Prakonsepsi Di Desa Lokasi Fokus Stunting Kabupaten Banggai.*
- Fajaryanti, R. (2018) *Determinan Kejadian Kekurangan Energi Kronis (Kek) Pada Wanita Usia Subur (Wus) Yang Menikah Di Usia Remaja Di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.*
- Fariski, C., Dieny, F. F. and Wijayanti, H. S. (2020) *Kualitas Diet, Status Gizi Dan Status Anemia Wanita Prakonsepsi Antara Desa Dan Kota.*
- Fauziah Hamid, A. Razak Thaha, A. S. (2018) *Wanita Prakonsepsi Di Kota Makassar Analysis of Risk Factors Chronic Energy Deficiency (CED) Preconception Women in Makassar Fauziah Hamid , A . Razak Thaha , Abdul Salam Bagian Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Masalah gizi di I.*
- Genius, S. J. and Genius, R. A. (2016) *Preconception Care: A New Standard of Care within Maternal Health Services.*
- Hartiningrum, I. and Fitriyah, N. (2016) *Bayi Berat Lahir Rendah (Bblr) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016.*
- Hasna Soleman (2018) *Gambaran Kejadian Anemia Pada Remaja Putri Kek Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah Pada Siswi Sman 3 Kota Ternate, Wilayah Suburban.*
- Hubu, N., Nuryani, N. and Hano, Y. H. (2018) *Pengetahuan, Asupan Energy dan Zat Gizi Berhubungan dengan Kekurangan Energi Kronis pada Wanita Prakonsepsi.*
- JK Unila (2018) *Hubungan Faktor Keluarga dengan Kejadian Kurang Energi Kronis pada Wanita Usia Subur di Kecamatan Terbanggi Besar*
- Indriani (2019) *Pengaruh Konseling Gizi Prakonsepsi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Wanita Pranikah.*

- Israaq (2017) *Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan Jurusan Kebidanan Diploma IV Bidan Klinik Politeknik Kesehatan Kendari.*
- Kairun Nisa (2018) *Pengaruh Konseling Mengenai Gizi Prakonsepsi Terhadap Asupan Protein, Kalsium, Zat Besi, Asam Folat Dan Status Gizi Pada Wanita Usia Subur Di Desa Paluh Kemiri.*
- Kawareng, Andi Tenri; Thaha, A. Razak; Syam, A. (2014) *Pengetahuan dan Harapan Wanita Prakonsepsi Terhadap Pelayanan Prakonsepsi Sebelum dan Sesudah Edukasi Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.*
- Kementerian Kesehatan RI (2015) *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi calon Pengantin.*
- Ketut Pramana Adiputra, IGN Indraguna Pinatih, L. S. (2018) *Perbedaan Persiapan Prakonsepsi Ibu Hamil Primigravida Yang Mengalami Kurang Energi Kronik dan Tidak Kurang Energi Kronik di Puskesmas Gianyar 1 periode Januari-Agustus 2017.*
- Labuan, D. W. B. dan A. (2019) *Hubungan Pemanfaatan Posyandu Pra Konsepsi Dengan Status Gizi Wanita Pra Konsepsi Di Desa Lokasi Fokus Stunting Kabupaten Banggai.*
- Lauren A (2018) *SC Danish and North American Preconception Cohort Studies . Female Pregnancy Planners.*
- LORENA, E. V. A. and Rahmiwati, A. (2018) *Ketahanan Pangan Dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronik (Kek) Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Pagar Gunung Kabupaten Lahat.*
- Mahirawati, V. K. (2014) *Faktor-faktor yang berhubungan dengan kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di Kecamatan Kamoning dan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur (Related Factors of chronic Energy Deficiency at Pregnant Woman in kamoning and Tambelangan Sub Distri.*
- Mahmudah, U., Cahayati, W. H. and Wahyuningsih, A. S. (2011) *Faktor Ibu Dan Bayi Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kematian Perinatal.*
- Manguji, B. et al. (2013) *Asuhan Kebidanan: 7 Langkah Soap. Edited By Eka Anisa Mardela. Jakarta: egc.*
- Mardalena,i, I. (2017) *Dasar-dasar Ilmu Gizi dalam Keperawatan. 1st edn. Edited by S. P. Tikah kumala. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.*
- meriska cesia putri (2017) *Hubungan Asupan Makan Dengan Kejadian Kurang Energi Kronis (Kek) Pada Wanita Usia Subur (Wus) Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah (Skripsi) Oleh Meriska Cesia*

Putri.

- Meti Destriyana (2016) *Relationship Between Cultural And Race Toward Chronic Energy Malnutrition (Cem) Risk On Women Of Childbearing Age In Terbanggi Besar Districts Central Lampung Regency.*
- Muslim, C. and Marnis, M. (2016) *Beberapa Kejadian Cacat Bawaan Bayi Lahir Di Rumah Sakit M . Yunus.*
- Novira Hendriyani (2018) *Hubungan Antara Stres Dengan Status Gizi Pada Wanita Usia Subur (Wus) Pranikah Di Kabupaten Bantul.*
- Oktaviani (2018) *Kualitas Diet, Status Gizi Dan Status Anemia Wanita Prakonsepsi Antara.*
- Olivia Anggraeny, Ayuningtyas, D. A. (2017) *Gizi Prakonsepsi, Kehamilan dan Menyusui.*
- Paramata, Y. and Sandalayuk, M. (2019) *Kurang Energi Kronis pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.*
- Pramana, K., Pinatih, I. G. N. I. and Seriani, L. (2018) *Perbedaan Persiapan Prakonsepsi Ibu Hamil Primigravida Yang Mengalami Kurang Energi Kronik dan Tidak Kurang Energi Kronik di Puskesmas Gianyar 1 periode Januari-Agustus 2017.*
- Puli, T. et al. (2016) *Hubungan Sosial Ekonomi Dengan Kekurangan Energi Kronik (Kek) Pada Wanita Prakonsepsi Di Kota Makassar Socio-Economic Relations with Chronic Energy Deficiency (CED) for Preconceptions Women in Makassar.*
- Purwaningrum, E. D. et al. (2017) *Higeia Journal Of Public Health.*
- Puspita, Y. (2010) *No Titlean cepat mendapatkan buah hati. 1st edn. Edited by W. Swasti. jogjakarta: CV. Diandra Prima Mitra Media.*
- Qalbi, M. N., Thaha, A. R. and Syam, A. (2015) *Indikator Antropometri dan Gambaran Conjunctiva sebagai Prediktor Status Anemia pada Wanita Prakonsepsi di Kota Makassar.*
- Sari, R. N. (2012) *Konsep Kebidanan. 1st edn. Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Shihab, M. Q. (2012) *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.*
- Sibagariang., E. ellya (2010) *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi. Edited by Agus Setiawan. jakarta: CV. Trans Info Media.*
- Simatupang, A. M. (2019) *Pengaruh Konseling Gizi Prakonsepsi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Wanita Pranikah Di Kecamatan Batang Kuis.*

- Stephenson, J. *et al.* (2018) *Before The Beginning: Nutrition And Lifestyle In The Preconception Period And Its Importance For Future Health.*
- Triana, A. (2012) *Pengaruh Kadar Hb dan Paritas dengan Kejadian Intra Uterine Fetal Death (IUFD) di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru . Associated Hb and Parity with the Incidence of Intrauterine Fetal Death (IUFD) General Hospital Arifin Achmad Pekanbaru.*
- Umisah, I. N. and Puspitasari, D. I. (2017) *Perbedaan Pengetahuan Gizi Prakonsepsi dan Tingkat Konsumsi Energi Protein pada Wanita Usia Subur (WUS) Usia 15-19 Tahun Kurang Energi Kronis (KEK) dan Tidak KEK di SMA Negeri 1 Pasawahan.*
- Wafiqah (2017) *Kesiapan Fisik Dewasa Awal Sebagai Calon Ibu Pada Mahasiswa Tingkat Akhir Prodi Diii Kebidanan Di Poltekkes Kemenkes Jakarta III.*
- Zaki, I. and Sari, H. P. (2019) *Edukasi Gizi Berbasis Media Sosial Meningkatkan Pengetahuan Dan Asupan Energi- Protein Remaja Putri Dengan Kurang Energi Kronik (Kek).*

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas penulis

1. Nama : Sri Andriani
2. Nim : 70400117080
3. Tempat/ tanggal lahir : Pajalayya 02-Mei-1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Dusun Pajalayya
7. Nama orang tua:
 - a. Ayah : Mustari
 - b. Ibu : Harianti

B. Riwayat pendidikan

1. SD : SDN 27 BUNGENG 2004-2010
2. SMP : SMP NEGERI 1 TAROWANG 2011-2013
3. SMA : SMK NEGERI 7 ARUNGKEKE 2014-2016
4. Tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan.