

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN GANGGUAN SISTEM

REPRODUKSI DENGAN MIOMA UTERI

(Literatur Review)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan

Jurusan Kebidanan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

ST.HUSNAYENI

NIM. 70400117065

PROGRAM STUDI KEBIDANAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ST HUSNAYENI

Nim : 70400117065

TTL : Makassar, 02 Oktober 1999

Jurusan/Prodi : Kebidanan (D3)

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl.bontobiraeng No.4

Judul : MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN GANGGUAN
SISTEM REPRODUKSI DENGAN MIOMA UTERI (Literatur
Review)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa,

Penulis

ST HUSNAYENI
70400117065

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : ST HUSNAYENI

Nim : 70400117065


Judul : MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN GANGGUAN SISTEM
REPRODUKSI DENGAN MIOMA UTERI (Literatur Review)

Karya Tulis Ilmiah ini telah diselesaikan untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 1 Maret 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST.,M.Keb
NIP: 19890116 201903 2 009


dr. Darmawansyih M.Kes
NIP : 19850228 201101 2 000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Gangguan Sistem Reproduksi dengan Mioma Uteri”. Yang disusun oleh **ST. HUSNAYENI** NIM: 70400117065, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 05 Maret 2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Mahdya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 05 Maret 2021
21 Rajab 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes** (.....)

Sekretaris : **Firdayanti, S..SiT.,M.Keb** (.....)

Pembimbing I : **Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST.,M.Keb** (.....)

Pembimbing II: **dr. Darmawansyih, M. Kes** (.....)

Penguji I : **Dr. dr. Nadyah, M.Kes** (.....)

Penguji II : **Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si** (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Berkat ridho dan inayah-Nya karya tulis yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Gangguan Sistem Reproduksi Dengan Mioma Uteri”** dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Literatur Review ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian. Oleh karena itu masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Kasih sayang dan penghormatan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ibunda Nurhayati H dan ayahanda Agussalim AT,S.sos yang telah memberikan doa, perhatian, bimbingan dan pelajaran hidup yang begitu besar untuk saya dan juga kepada saudara-saudara tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan material selama masa studi serta kepada semua keluarga yang telah mendoakan dan memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penyusunan Literatur Review ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Dr. dr. Hj. Syatirah Djalaluddin, Sp.A, M.Kes beserta seluruh staf administrasi. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
3. Ibu Firdayanti, S.ST., M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan yang telah meluangkan waktu demi membimbing serta memberikan saran dan arahan bagi penulis
4. Ibu Anieq Mumthi'ah Al Kautsar, S.ST., M.Keb selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu demi membimbing serta memberikan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan Literatur Review
5. Ibu Dr. Darmawansyih, M.Kes selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktu demi membimbing serta memberikan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan Literatur Review
6. Ibu Dr. dr Nadyah, M. Kes. selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Literatur Review
7. Bapak Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Literatur Review.
8. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
9. Kepada para saudara dan saudari kandung saya yang selalu mengerti dan memberikan dukungan serta menjadi penghibur pada saat saya berada pada masa-masa tersulit.

Akhir kata penulis berharap semoga Literatur Review ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagian kesehatan.

Samata, 1 Maret 2021
Penulis

ST HUSNAYENI
NIM. 70400117065



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penulisan.....	5
C. Manfaat Penulisan.....	7
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Khusus Tentang Mioma Uteri.....	10
B. Manajemen Asuhan Kebidanan	26
C. Tinjauan Islam Tentang Mioma Uteri.....	28
D. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan.....	34
BAB III LITERATUR REVIEW	
A. Matriks Langkah I : Identifikasi Data Dasar.....	43
B. Matriks Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual.....	53
C. Matriks Langkah III: Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial.....	61
D. Matriks Langkah IV: Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi.....	70

E. Martiks Langkah V: Rencana Asuhan Kebidanan.....	78
F. Matriks Langkah VI: Implementasi Asuhan Kebidanan.....	87
G. Martiks Langkah VII: Evaluasi Asuhan Kebidanan	95

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Telaah Evidance Based Asuhan 7 langkah Varney Berdasarkan Hasil penelusuran Referensi	103
B. Implikasi Kebidanan	112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
LITERATUR REVIEW, AGUSTUS 2020

Nama : St. Husnayeni
NIM : 70400117065
Pembimbing 1 : Anieq Mumthi'ah Al Kautsar
Pembimbing 2 : Darmawansyih
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Gangguan Sistem Reproduksi Dengan Mioma Uteri

Mioma uteri atau tumor jinak dari otot rahim adalah salah satu masalah kesehatan reproduksi wanita yang sangat penting. Jumlah penderita mioma uteri ini sulit diketahui secara akurat karena banyak yang tidak menimbulkan keluhan sehingga penderita tidak memeriksakan dirinya ke dokter oleh sebab itu setiap tahun selalu terjadi peningkatan kejadian mioma uteri.

Literatur review ini bertujuan untuk mendapatkan sumber materi mengenai Manajemen Asuhan Kebidanan Gangguan Sistem Reproduksi Dengan Mioma Uteri menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah menurut Helen Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Dari materi yang didapatkan bahwa tidak ditemukannya kendala dalam menangani masalah gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri jika dilakukan asuhan sesuai dengan standar asuhan kebidanan. Dalam penatalaksanaan gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu pemberian asuhan yang cepat dan tepat seperti pemeriksaan tanda-tanda vital ibu serta melakukan pemeriksaan USG, melakukan konseling tentang diet seimbang dan mengajurkan ibu untuk banyak minum air putih, mengajurkan ibu untuk tetap berdoa, mengajurkan ibu untuk mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter hal ini dilakukan untuk membantu proses penyembuhan pada ibu.

Kesimpulan dari literatur review dengan menggunakan manajemen asuhan 7 langkah varney pendokumentasian dalam bentuk SOAP yakni komplikasi pada ibu tidak terjadi jika asuhan yang diberikan kepada ibu yang mengalami gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri sudah sesuai standar asuhan kebidanan dan ibu melaksanakan semua apa yang telah dianjurkan oleh bidan.

Kata kunci: Mioma Uteri, Gangguan Sistem Reproduksi, 7 Langkah Varney

ABSTRAK

MIDWIFERY
DEPARTMENT ALAUDDIN STATE ISLAMIC
UNIVERSITY OF MAKASSAR
LITERATURE REVIEW, AUGUST 2020

Name : St. Husnayeni Student
Reg. No. : 70400117065
Supervisor 1 : Anieq Mumthi'ah Al Kautsar
Supervisor 2 : Darmawansyih
Title : **The Management of Midwifery Care for Reproductive System Disease with Uterine Myoma**

Uterine Myoma is a benign tumor that grows on uterine muscles and has become a concerning reproductive health problem for many women. Uterine myoma case is particularly difficult to measure because it does not cause any health complaints unless examined by doctors. For that reason, the number of uterine myoma case has been increasing.

This literature review aims to look into existing studies concerning the management of Midwifery Care for Reproductive System Disease with Uterine Myoma that use the 7-step midwifery care approach suggested by Helen Varney and SOAP documentation.

The research analysis suggests that uterine myoma cases are mostly treatable using standardized midwifery care management without significant challenges. From a number of studies, this research found that the management of midwifery care for reproductive system disease with uterine myoma included the examination of patient's vital signs and USG, providing counselling sessions on a balanced diet, abundant consumption of water, continuous prayers, as well as following the prescribed medication to speed up the recovery.

This research concludes that complication rarely happen if the management of midwifery care procedure is conducted in accordance with the standardized 7- step Varney midwifery care and SOAP documentation.

Keywords: Uterine Myoma, Reproductive System Disease, 7-step Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi reproduksi serta proses dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit kecacatan serta dibentuk berdasarkan mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual. (Marmi, 2014). Kesehatan reproduksi wanita merupakan parameter kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. (Manuaba IBG, 2013:7,11).

Kesehatan reproduksi dari suatu negara sering kali dinyatakan dengan menggunakan nilai angka reproduksi. *World Health Education* (WHO) menyebutkan bahwa angka kesehatan reproduksi menjadi perhatian bersama dan bukan hanya individu yang bersangkutan, karena dampaknya luas menyangkut berbagai aspek kehidupan dan menjadi parameter kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat (Apriyani, 2013).

Kasus mioma uteri lebih banyak terjadi pada usia reproduksi yaitu sekitar 20-25%. Kasus ini belum pernah ditemukan pada wanita yang belum menarche dan yang sudah menopause hanya sekitar 10%. Tumbuhnya mioma uteri sangat dipengaruhi oleh hormon reproduksi, dan hanya bermanifestasi selama usia reproduksi (Mirasantana, 2017).

Menurut penelitian WHO memperkirakan di seluruh dunia 20-50% wanita penderita mioma uteri. *Medical Surveillance monthly Report, Armed Force* Amerika Serikat tahun 2009-2013 melapor terdapat 11,931 kasus mioma uteri (insidens rate 57,6 per 10.000 tiap tahun) pada wanita usia reproduksi aktif (Benson, 2013) .

Berdasarkan penelitian WHO setiap tahun jumlah penderita mioma bertambah mencapai 6,25 juta orang dalam 10 tahun mendatang diperkirakan 9 juta orang akan meninggal setiap tahun akibat mioma di dunia akan berada dinegara-negara yang sedang berkembang (Setiati E,2014).

Resiko mioma uteri meningkat seiring dengan peningkatan umur. Penelitian di Italia (2004) melaporkan 73 kasus mioma uteri dari 341 wanita pada usia 30-60 tahun dengan prevalensi 21.4%. Di India (2006) terdapat 150 kasus mioma uteri,77 kasus (51%) terjadi pada wanita usia 40-49 tahun dan 45 kasus (30%) terjadi pada wanita umur lebih dari 50 tahun. Pada Tahun 2014 di Negeria melaporkan persoalan kesehatan dari segala aspek lapisan masyarakat dan memiliki jumlah kasus mioma uteri yang mencakup tinggi. (Syahlani Ahmad, 2016)

Salah satu masalah kesehatan reproduksi wanita adalah mioma uteri. Mioma uteri merupakan jenis tumor jinak yang paling umum ditemukan dari berbagai jenis tumor jinak lainnya. Mioma jarang sekali ditemukan sebelum usia pubertas,sangat dipengaruhi oleh hormon reproduksi,dan hanya bermanifestasi selama usia reproduksi. Jumlah kejadian penyakit ini di Indonesia menempati urutan kedua setelah kanker serviks. Sebesar 2,9%-

11,87% dari semua pasien gineologi yang dirawat. Mioma uteri merupakan suatu tumor jinak berbatas tegas tidak berkapsul yang berasal dari otot polos dan jaringan ikat *fibrous*, biasa juga disebut *fibromioma uterine*, *leiomioma uterine* atau *uterine fibroid*, mioma uteri ini merupakan neoplasma jinak yang sering ditemukan pada traktus genitalia wanita, terutama wanita sudah produktif atau menopause (Pratiwi, 2013).

Organ kelamin wanita terdiri atas organ genitalia interna dan eksterna, kedua bagian besar organ ini sering mengalami gangguan salah satunya adalah mioma, Mioma dapat mengenai organ genitalia interna dengan berbagai macam manifestasi dan akibat, kasus tersebut sering ditemukan pada wanita usia reproduksi (20%-25%) dimana prevelensi mioma uteri meningkat lebih dari 70% dengan pemeriksaan patologi anatomi uterus, membuktikan banyak wanita yang menderita mioma uteri (Nugroho, 2012).

Di Indonesia, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012-2013, angka kasus Mioma Uteri sebesar 20 per 1000 wanita dewasa. Dalam 1 tahun, sekitar 49.598 wanita mengalami Mioma Uteri (Kursih Sulastriningsih, 2019). Kasus mioma uteri di Jawa tengah merupakan indikasi utama dilakukannya histerektomi yaitu sekitar 600.000 kasus setiap tahun, sedangkan miomektomi hanya sekitar 37.000 kasus setiap tahun (Laurensia, 2012)

Berdasarkan otopsi, Novak Pada Tahun 2013 menemukan 27% wanita berumur 25 tahun mempunyai sarang mioma, pada wanita yang berkulit hitam ditemukan lebih banyak. Mioma uteri belum pernah

(dilaporkan) sebelum menarche. Setelah menopause hanya kira-kira 10% mioma yang masih bertumbuh. Di Indonesia mioma uteri ditemukan 2.39-11.7% pada semua penderita ginekologi, penyebab mioma uteri belum diketahui secara pasti sampai saat ini. Apapun asalnya, mioma mulai dari benih-benih multiple yang sangat kecil dan terbesar pada miometrium. Benih ini tumbuh sangat kecil dan tersebar pada miometrium. Benih ini tumbuh sangat lambat tetapi progresif dibawah pengaruh estrogen dan jika terdeteksi dan tidak diobati dapat membentuk tumor dengan berat 10 kg atau lebih, namun sekarang sudah jarang karena cepat terdeteksi (Apriani Yosi, 2017)

Etiologi pasti terjadinya mioma uteri sampai saat ini belum diketahui, tidak hanya faktor usia saja yang dapat memicu terjadinya mioma uteri, tetapi juga indeks masa tubuh, paritas, alat kontrasepsi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya mioma uteri. Umumnya mioma terjadi di beberapa tempat. Pertumbuhan mikroskopik menjadi masalah utama dalam penanganan mioma karena hanya tumor soliter dan tampak secara makroskopik yang memungkinkan untuk ditangani dengan cara enukleasi. Ukuran rerata tumor ini adalah 15 cm, tetapi cukup banyak yang melaporkan kasus mioma uteri dengan berat mencapai 45 kg. (Anwar A, dkk 2011).

Terjadinya kanker ovarium tidak terlepas dari penyakit-penyakit yang dapat memicu terjadinya kanker ovarium yang salah satunya adalah mioma uteri. Menurut WHO memperkirakan diseluruh dunia setiap tahunnya lebih dari 585.000 orang meninggal karena mioma uteri di temukan sebesar 39-11,7 % pada semua penderita ginekologi yang dirawat. Mioma uteri juga

dapat menyebabkan komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh mioma uteri yaitu dapat menutupi *malignasi ginekologi* lainnya, misalnya sarcoma uterus, kanker ovarium, degenerasi fibroid yang menyebabkan nyeri serta dapat *prolaps* melalui *serviks* atau *mioma geburt*. (Risksedes, 2015).

Mioma uteri dapat mengakibatkan permukaan endometrium yang lebih luas dari pada biasanya, perdarahan mioma uteri dapat berdampak pada ibu hamil dan penderita mioma uteri itu sendiri. Ibu hamil akan mengalami dampak berupa abortus spontan, persalinan, prematur, dan mal presentasi. Pada penderita mioma uteri akan mengalami perdarahan yang banyak dan dapat mengakibatkan anemia. Perdarahan yang banyak juga dapat terjadi pada pencernaan karena perluasan dan pembesaran mioma uteri sehingga pasien mioma uteri tidak hanya dilakukan operasi pada alat kelamin, tetapi juga dilakukan operasi pencernaan (*coloctomy*). Pada kasus ini mioma uteri mengalami komplikasi yang berat dan dapat memperburuk kesehatan pasien tersebut mengalami penurunan kesehatan karena terjadi gangguan pada nutrisi dan tubuh mengalami kelemahan hingga menjadi syok, dan pada akhirnya menimbulkan kematian (Pertwi, K. D, 2011).

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan literatur review asuhan pada ibu dengan persalinan post matur sebagai berikut:

- I.** Telah didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai data subjektif dan data objektif dari tanda dan gejala ibu yang mengalami gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri.

2. Telah didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai diagnosis tentang ibu yang mengalami gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri.
3. Telah didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai komplikasi yang bisa timbul pada ibu yang mengalami gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri.
4. Telah didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai kondisi emergensi yang dapat terjadi serta penanganan pada ibu yang mengalami gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri.
5. Telah didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai simpulan dari berbagai sumber tentang intervensi apa saja / penatalaksanaan yang tepat pada ibu yang mengalami gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri.
6. Telah didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan ke implementasi asuhan ibu yang mengalami gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri.
7. Telah didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber yang menjadi dasar evaluasi pada ibu yang mengalami gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri.

C. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan literatur review sebagai berikut:

1. *Manfaat Institusi*

Sebagai bahan pembelajaran dan sumber pengetahuan untuk penulis berikutnya.

2. *Manfaat bagi penulis*

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri berdasarkan *Avoidance Based*.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam literatur review ini sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

HALAMAN PERSETUJUAN

KARYA TULIS ILMIAH

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR ISTILAH

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penulisan
- E. Metode Penulisan
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan
- B. Tinjauan Khusus Tentang Anemia Pada Kehamilan
- C. Standar Pelayanan Kebidanan
- D. Manajemen Kebidanan Asuhan Kebidanan

BAB III TELUSURAN EVIDANCE BASED LEARNING

- A. Matriks Langkah I
- B. Matriks Langkah II
- C. Matriks Langkah III
- D. Matriks Langkah IV
- E. Matriks Langkah V
- F. Matriks Langkah IV
- G. Matriks Langkah VII

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Pembahasan Hasil Telaah Evidence Based Asuhan 7 langkah Varney
Berdasarkan Hasil penelusuran Referensi
- B. Implikasi Kebidanan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Khusus Tentang Mioma Uteri

1. Definisi Mioma Uteri

Mioma uteri atau tumor jinak dari otot rahim adalah salah satu masalah kesehatan reproduksi wanita yang sangat penting. Jumlah penderita mioma uteri ini sulit diketahui secara akurat karena banyak yang tidak menimbulkan keluhan sehingga penderita tidak memeriksakan dirinya ke dokter oleh sebab itu setiap tahun selalu terjadi peningkatan kejadian mioma uteri (Manuaba, Ida A.C, 2013). Mioma uteri merupakan tumor jinak otot rahim disertai jaringan ikatnya, sehingga dapat dalam bentuk padat karena jaringan ikatnya dominan dan lunak serta otot rahimnya dominan (Ida Ayu Sri Kusuma, 2010:87).

Dikenal juga sebagai leiomyoma ini adalah tumor jinak dari myometrium. Pada usia 50 tahun, hampir 70% wanita kulit putih dan lebih dari 80% wanita kulit hitam menderita penyakit mioma uteri, lebih umumnya dengan bertambahnya usia selama masa reproduksi, pada wanita kulit hitam dan Asia yang lebih mungkin memiliki multi fibroid, pada wanita obesitas, mereka dengan menarche dini (sebelum usia 11 tahun) dan pada wanita dengan yang terkena tingkat pertama. Pada wanita menopause yang telah menggunakan progesteron kontrasepsi oral atau suntik kombinasi, situs fibroid dapat berukuran tunggal dan berkisar dari

beberapa millimeter hingga tumor masih mengisi perut. Mioma intramular, subserosa atau submukosa secara bertahap membentuk polip intrakavitas, unsur otot dan berserat halus dan dibagian melintang (Wiley Blackwell, 2017: 22).

Mioma uteri jarang terjadi setelah menopause, akan tetapi lebih banyak terjadi pada masa reproduksi karena adanya rangsangan estrogen. Mioma uteri tidak dijumpai sebelum haid (menarche). Mioma uteri yang terjadi pada masa mendekati menopause akan mengalami pengecilan, bila mioma uteri bertambah besar pada masa post menopause, harus dipikirkan terjadinya degenerasi maligna (sarcoma). Sebagai pedoman, tumor yang besar menyebabkan gejala-gejala penekanan harus diangkat (histrektomi) bila pasien sudah mempunyai anak (Rukiyah, 2012).

Mioma adalah suatu tumor jinak pada rahim yang berasal dari otot rahim. Tumor ini letaknya pada alat reproduksi wanita, asal mulanya penyakit mioma uteri. Beberapa teori menyebutkan pertumbuhan tumor ini disebabkan rangsangan hormon estrogen. Pada jaringan mioma jumlah reseptor estrogen lebih tinggi dibandingkan jaringan otot kandungannya, sehingga mioma uteri ini sering kali tumbuh lebih cepat pada kehamilan membesar pada usia reproduksi biasanya mengecil pada pasca menopause.

Mioma uteri merupakan tumor jinak yang struktur utamanya adalah otot polos rahim, mioma uteri terjadi pada 20%-25% perempuan di usia reproduksi, tetapi oleh faktor yang tidak diketahui secara pasti. Insidennya

3-9 kali lebih banyak pada ras kulit berwarna hitam dibandingkan dengan ras kulit putih. Selama 5 dekade terakhir, ditemukan 50% kasus mioma uteri terjadi pada ras kulit berwarna hitam (Sarwono, 2014:274).

Sering kali tumor jinak rahim ke arah rongga membesar dan bertumbuh keluar dari mulut rahim. Tumor yang ada dalam rahim ke arah rongga membesar dan bertumbuh keluar dari mulut rahim. Tumor yang ada di dalam rahim dapat tumbuh lebih dari satu, teraba seperti kenyal, bentuknya bulat dan berbenjol-benjol sesuai ukuran tumor, beratnya bervariasi, mulai dari beberapa gram saja, namun bisa juga mencapai 5 kilogram atau lebih (Koes Irianto, 2014).

Penyebab kejadian mioma uteri belum diketahui secara pasti, diduga merupakan penyakit multifaktorial. Faktor penduga pertumbuhan mioma uteri antara lain umur, paritas, faktor ras dan genetik (riwayat keluarga), usiamenarche, obesitas, serta hormone estrogen dan progesteron (Fahrunniza et al, 2015).

Mioma adalah tumor jinak miometrium dengan ciri tersendiri, bulat keras, berwarna putih hingga merah muda pucat, sebagian besar terdiri otot polos dengan beberapa jaringan ikat. Di perkirakan 95% berasal dari korpus uteri dan 5% dari serviks. Hanya kadang-kadang saja berasal dari tuba falopi atau ligamentum rotundum. Leiomioma adalah tumor pelvis yang paling sering terjadi di perkirakan 25% wanita kulit putih dan 50% kulit hitam pada umur 50 tahun. Mioma menyebabkan sekitar 10% masalah ginekologi dan mencapai puncak insiden pada decade kelima.

Meskipun penyebabnya tidak diketahui, setiap tumor (98% multiple) berasal dari sel otot (apakah sisa sel embrionik atau otot polos, pembuluh darah tidak jelas). Sel ini membesar sebagai respons terhadap estrogen. Karena itu pembesaran jelas terlihat dengan adanya kehamilan. Leiomioma premenarcho jarang terjadi dan menopause atau kastrasi menyebabkan regresi (Ralph C. Benson, M.D, 2013:546).

Sebelum masa pubertas dan tumbuh selama masa reproduksi. Jarang sekali mioma uteri ditemukan pada wanita berumur 20 tahun atau kurang, paling banyak pada umur 35-45 tahun yaitu kurang dari 25%. Dan setelah menopause banyak mioma menjadi lisut, hanya 10% saja yang masih dapat tumbuh lebih lanjut. Mioma uteri lebih sering dijumpai pada wanita nullipara atau kurang subur. Bila mioma uteri bertambah besar pada masa post menopause harus dipikirkan kemungkinan terjadinya degenerasi maligna (sarcoma) dengan pertumbuhan (Octavia Amrina, dkk 2016).

Setelah kehamilan disingkirkan alam kelompok usia reproduksi, penyebab pembengkakan uterus adalah fibroid (leiomioma). Fibroid merupakan bentuk neoplasma jinak saluran genitalia yang paling banyak di jumpai. Fibroid paling sering dijumpai pada perempuan usia reproduksi dan sifatnya dipengaruhi oleh produksi hormon, karena mioma memiliki reseptor dan progesterone. Mioma semakin besar dalam kehamilan karena hormon estrogen yang banyak, dan mengecil bila diberikan analog hormon pelepas gonadotropin. Manifestasinya berupa nodul sferis yang padat

ketika disentuh (khas) dan sering kali multiple. Ukurannya berkisar dari beberapa millimeter hingga beberapa sentimeter dan biasanya ditemukan di korpus uteri, terkadang di jumpai di serviks atau ligamentum latum (Tony Hollingworth, 2012:262-263).

2. Etiologi

Ada beberapa faktor predisposisi terjadinya mioma uteri.

a. Estrogen

Mioma uteri dijumpai setelah menarche, sering kali pertumbuhan tumor yang cepat selama kehamilan terjadi dan dilakukan terapi estrogen eksogen. Mioma uteri akan mengecil pada saat menopause. Mioma uteri banyak ditemukan bersamaan dengan anovulasi ovarium dan wanita dengan sterilitas. Enzim hidroxidesidrogenase mengubah estradiol (sebuah estrogen kuat) menjadi estrogen (estrogen lemah). Aktivitas enzim ini berkurang pada jaringan miomatous, yang juga mempunyai jumlah reseptor yang lebih banyak daripada miometrium normal.

b. Progesteron

Progesteron menghambat pertumbuhan tumor dengan dua cara, yaitu mengaktifkan hidroxidesidrogenase dan menurunkan jumlah reseptor estrogen pada tumor.

c. Hormon pertumbuhan (growth hormon)

Level hormon pertumbuhan menurun selama kehamilan, tetapi hormon yang mempunyai struktur dan aktivitas biologis serupa yaitu

HPL, terlihat pada periode ini dan memberi kesan bahwa pertumbuhan yang cepat dari leiomioma selama kehamilan mungkin merupakan hasil dari aksi sinergistik antara HPL dan estrogen.

d. Umur

Mioma uteri ditemukan sekitar 20% pada wanita usia produktif dan sekitar 40 tahun. Mioma uteri jarang ditemukan sebelum menarche. (sebelum mendapatkan haid).

e. Hormon Endogen (endogenous hormonal)

Konsentrasi estrogen pada jaringan mioma uteri lebih tinggi daripada jaringan miometrium normal.

f. Riwayat keluarga

Wanita dengan garis keturunan dengan tingkat pertama dengan penderita mioma uteri mempunyai 2,5 kali kemungkinan untuk menderita mioma dibandingkan dengan wanita tanpa garis keturunan penderita mioma uteri.

g. Kehamilan

Kehamilan dapat mempengaruhi mioma uteri karena tingginya kadar estrogen dalam kehamilan jika ibu sedang hamil maka janin dan mioma akan bersaing makanan sedangkan vaskularisasi lebih banyak ke mioma sehingga dapat mempercepat pembesaran mioma uteri dibandingkan ke janin, sehingga janin kecil, karena kurangnya asupan makanan.

3. Paritas

Mioma uteri lebih sering terjadi pada wanita multipara dibandingkan dengan wanita yang mempunyai riwayat melahirkan 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali. Faktor terbentuknya tumor:

4. Patofisiologi

Patofisiologi mioma uteri sebagai tumor monoklonal yang tumbuh dari jaringan otot halus di uterus yaitu pada lapisan miometrium. Tumor ini tergolong dalam tumor jinak yang terdiri dari miofibroblas-miofibroblas tidak beraturan yang terkubur dalam matriks ekstraseluler yang berjumlah besar. Matriks ekstraseluler ini sendiri berkontribusi cukup besar pada volume tumor. Kejadian yang mencetuskan tumor ini sendiri masih belum diketahui secara pasti (Vilos G, Allaire C, Laberge P, 2015;37(2):157-178).

5. Klasifikasi

Berdasarkan teori genitoblast (sel nest), rangsangan terus menerus setiap bulan dari estrogen, membuat pertumbuhan mioma uteri menjadi berlapis seperti barambang dan lokasi bervariasi:

a. Leiomioma intramural

Merupakan leiomioma yang paling sering dijumpai, dan bila berukuran besar, dapat mengubah penampang uterus menjadi massa besar yang tidak teratur. Jenis mioma ini dapat menyebabkan masalah menstruasi dan mempersulit kehamilan.

b. Leiomioma submukosa

Dapat menyebabkan perdarahan, walaupun berukuran kecil, akibat penekanan endometrium di atasnya sehingga mengganggu pasokan darahnya. Seiring semakin membesarnya kelainan ini, leiomioma submukosa dapat meluas ke dalam rongga endometrium dan meningkatkan area permukaan endometrium. Fertilitas mungkin dapat terganggu penyulit dalam kehamilan juga dapat dijumpai, seperti abortus spontan, ketuban pecah dini, distoshia, inversio uteri dan perdarahan pascapartum. Meskipun jarang, mioma jenis ini dapat bertangkai dan mengalami prolaps melewati serviks.

c. Leiomioma subserosa

Timbul di awal eritoneum yang menutupi permukaan luar uterus dan dapat bebas atau bertangkai. Leiomioma subserosa bertangkai dapat mengalami torsio, infeksi, dan bahkan pemisahan dari uterus itu sendiri. Ketika terjadi pemisahan, dapat terjadi perlekatan ke struktur panggul lainnya, dan menyebabkan "leiomioma parasitik"

d. Leiomioma intraligamitosa

Dinamakan demikian karena timbul diantara ligamentum latum cabang peritoneum anterior dan posterior. Mioma ini dapat menekan organ sekitar, menimbulkan gejala defekasi dan miksi. Konstipasi hingga obstruksi usus, frekuensi berkemih, inkontinensia urgensi, retensi urine, dan kemungkinan obstruksi ureter dapat terjadi (Tony Hollingworth, 2012:262).

6. Gejala dan Tanda

Gejala mioma uteri adalah adanya hormon estrogen dan progesterone dependen selama kehamilan, mioma sama-sama cenderung tumbuh menyusut atau tidak menunjukkan perubahan, mioma menurun setelah menopause karena berkurangnya hormon yang beredar, setiap mioma berasal dari monoclonal. Gambaran klinis riwayat 50% tidak menunjukkan gejala dan hanya ditemukan pada pemeriksaan fisik atau USG. Gejala lebih terkait dengan situs daripada ukuran, misalnya mioma submukosa berdiameter 2 cm sering akan menyebabkan perdarahan menstruasi yang tidak normal, sedangkan mioma subserosa berdiameter 2 cm biasanya akan bersifat tanpa gejala. Masalah menstruasi, perdarahan menstruasi yang berat terjadi pada 30% meskipun waktu menstruasi biasanya tidak berubah. Kehilangan intermenstrual dapat terjadi jika mioma bersifat submukosa atau polypoid. Nyeri mioma dapat menyebabkan dismenorhea, jarang menyebabkan rasa sakit kecuali torsion, degenerasi merah atau perubahan sarkomatosa. Gejala lain mioma dapat menekan kandung kemih dapat menyebabkan frekuensi retensi urin, yang menekan ureter dapat menyebabkan hidronefrosis, efek tekanan lainnya juga biasa dirasakan. Kesuburan bisa terganggu jika tuba atau mioma submukosa mencegah implantasi (Wiley Blackwell, 2017:23).

Mioma uteri memiliki gejala yang tidak terlalu menonjol dirasakan penderitanya. Mioma uteri yang sampai menimbulkan gejala yang hanya dirasakan oleh 35-50% dari penderita mioma uteri. Gejala umum yang

ditimbulkan pada penderita mioma uteri yaitu pendarahan yang berlebihan, rasa nyeri yang kian menyiksa dan tekanan sekitar panggul yang menjalar hingga ke punggung (Cahyasari dan Sakti, 2014).

Gejala yang timbul bergantung pada lokasi dan besarnya tumor, namun yang paling sering ditemukan adalah:

- a. Perdarahan yang banyak dan lama selama haid ataupun di luar masa haid. Bila perdarahan berlebihan akan menyebabkan anemia. Rasa nyeri karena tekanan tumor dan terputarnya tungkai tumor, serta adanya infeksi di dalam rahim.
- b. Penekanan pada organ di sekitar tumor seperti kandung kemih, ureter, rectum, atau organ rongga panggul lainnya, menimbulkan gangguan buang air besar dan buang air kecil, pelebaran pembuluh darah vena dalam panggul, gangguan ginjal karena pembengkakan tungkai tumor.
- c. Gangguan sulit hamil karena terjadi penekanan pada saluran indung telur sehingga menghalangi pertumbuhan sperma dan sel telur.
- d. Pada bagian bawah perut dekat rahim terasa kenyal.
- e. Pasangan suami istri sering kali sulit untuk punya anak infertelitas, disebabkan gangguan pada tuba, gangguan implantasi pada endometrium, penyumbatan, dan sebagainya.
- f. Mioma uteri dapat mengganggu kehamilan dengan dampak berupa kelahiran letak bayi, dan plasenta, terhalangnya jalan lahir, kelemahan pada saat kontraksi rahim, perdarahan yang banyak setelah melahirkan

dan gangguan pelepasan plasenta, bahkan biasa menyebabkan keguguran (Koes Irianto, 2014).

Hampir separuh kasus mioma uteri ditemukan secara kebetulan pada pemeriksaan ginekologik karena tumor ini tidak mengganggu. Gejala yang dikeluhkan sangat tergantung pada tempat sarang mioma ini berada (serviks intramural, submukus, subserus), besarnya tumor, perubahan dan komplikasi yang terjadi. Gejala tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

Perdarahan abnormal gangguan perdarahan yang terjadi umumnya adalah hiperminore, menoragia dan dapat juga terjadi metroragia. Beberapa faktor yang menjadi penyebab perdarahan ini, antara lain adalah:

- 1) Pengaruh ovarium sehingga terjadilah hyperplasia endometrium sampai adenokarsinoma endometrium.
- 2) Permukaan endometrium yang lebih luas dari pada biasa.
- 3) Atrofi endometrium diatas mioma submukosum.
- 4) Miometrium tidak dapat berkontraksi optimal karena adanya sarang mioma diantara serabut miometrium, sehingga tidak dapat menjepit pembuluh darah yang melaluinya dengan baik.

Rasa nyeri bukanlah gejala yang khas tetapi dapat timbul karena gangguan sirkulasi darah pada sarang mioma, yang disertai nekrosis setempat dan peradangan. Pada pengeluaran mioma submukosum yang akan dilahirkan, pula pertumbuhannya yang menyempitkan kanalis servikalis dapat menyebabkan juga dismenore.

5) Pemeriksaan penunjang

- a) Laparaskopi: untuk mengetahui ukuran dan lokasi tumor
- b) USG abdominal dan transvaginal
- c) Biopsi: Untuk mengetahui adanya keganasan
- d) Dilatasi serviks dan kuretase akan mendeteksi adanya mioma subserous (Frisca Tresnawati, 2013:192).

6) Komplikasi

- a) Pertumbuhan limioma

Yaitu tumor yang tumbuh dari miometrium, dan merupakan 50-70 % dari semua sarcoma uteri. Ini timbul apabila suatu mioma uteri yang selama beberapa tahun tidak membesar, akan menjadi lebih besar jika hal itu terjadi setelah menopause.

- b) Torsi (putaran tungkai)

Ada kalanya tungkai pada mioma uteri subserosa mengalami putaran kalau proses ini terjadi mendadak, tumor akan mengalami gangguan sirkulasi akut dengan nekrosis jaringan, dan akan nampak gambaran klinik dari abdomen akut.

- c) Nekrosis dan infeksi

Pada mioma submukosa, yang menjadi polip, ujung tumor kadang-kadang dapat melalui kanalis servikalis dan dilahirkan di vagina. Dalam hal ini ada kemungkinan gangguan sirkulasi dengan akibat nekrosis dan infeksi sekunder.

Riwayat alami/komplikasi mioma pembesaran bisa sangat lambat.

Mioma tumbuh dan sering berkapur setelah menopause, meskipun estrogen dalam terapi penggantian hormone (HRT) dapat merangsang pertumbuhan lebih lanjut

Keganasan: Sekitar 0.1% mioma adalah leiomyoma ini mungkin hasil perubahan ganas atau denovomaligna transformasi otot polos normal.

Biasanya diagnosis hanya pada histology, diagnosis potensial harus dipertimbangkan ketika ada pertumbuhan, mioma pada wanita pasca menopause atau mioma yang membesar dengan cepat atau timbulnya nyeri yang mendadak pada wanita dari segala usia. Resiko tumor yang menyebar melalui intra abdominal morcellation dari leiomioma yang tidak disangka selama miomektomi laparoskopi harus dipertimbangkan.

Mioma uteri dapat berdampak pada kehamilan dan prsalinan, yaitu:

- a) Mengurangi kemungkinan wanita menjadi hamil, terutama pada mioma uteri submukosum.
- b) Kemungkinan abortus bertambah.
- c) Kelainan letak janin dalam rahim, terutama pada mioma yang besar dan letak subserosus.
- d) Menghalangi lahirnya bayi, terutama pada mioma yang letaknya di serviks.
- e) Inersia uteri dan atonia utri terutama pada mioma yang letanya dalam dinding rahim atau apabila terdapat banyak mioma.
- f) Mempersulit lepasnya plasenta, terutama pada mioma yang letaknya submukus dan intramural (Manuaba, 2012).

7) Diagnosis

Mioma sering kali ditemukan secara kebetulan. Berarti diagnosa ditegakkan bukan karena berdasarkan gejala klinis, bahkan sering kali berdasarkan temuan pada rahim yang sudah diangkat.

Diagnosa biasa saja ditegakkan berdasarkan keluhan klinik dengan cara:

- a) Histerosalpingogram, dimana foto rontgen uterus diambil setelah rahim diisi dengan zat medium, kontras.
- b) MRI (Magnetik Resonan Imaging), dilakukan bersama dengan penyuntikan kontras Gadolinium. (Yatim, 2008)

Apabila diagnosa ini dilakukan oleh dokter ahlinya, maka keberhasilan mendiagnosa mioma adalah 90% benar. Karena mioma termasuk jenis tumor yang sering dijumpai, maka perlu mengadakan pemeriksaan untuk mengevaluasi penderita yang mengalami perdarahan pervaginam yang tidak wajar. Kekeliruan juga sering terjadi pada pemeriksaan penderita yang mengeluh perdarahan pervaginam yang tidak wajar dimana pemeriksaan mioma tidak ditemukan. Hingga diberi obat hormonal tetapi tidak efektif sehingga kadang-kadang dilakukan operasi pengangkatan rahim. (histerektomi) untuk mengatasi perdarahan.

8) Pengobatan

- a) Terapi penggantian hormon dapat menyebabkan pertumbuhan mioma lanjutan setelah menopause. Pengobatan untuk wanita menopause atau HRT

- b) Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis yaitu USG adalah metode penyaringan awal dan menentukan jumlah, ukuran dan posisi mioma.
- c) Magnetic resonance imaging (MRI) kadang-kadang digunakan jika diagnosis tidak jelas atau jika akurasi yang lebih besar diperlukan, terutama ketika memutuskan mode pengobatan.
- d) Adenomiosis biasa ada sebagai massa seperti mioma dibedakan oleh MRI.
- e) Histerektomi, ultasonografi transvaginal saline atau hysterosalpingram (HSG) digunakan untuk menilai distorsi rongga uterus, terutama jika kesuburan adalah masalah.
- f) Untuk membangun kebugaran: konsentrasi hemoglobin mungkin rendah sebagai akibat perdarahan vagina, tetapi juga tinggi karena mioma dapat mengeluarkan eritropoietin, perawatan mioma hanya membutuhkan pengobatan ketika menyebabkan gejala, jika kualitas hidup seorang wanita dipengaruhi oleh mioma maka kesuburan rahimnya kemungkinan akan memandu.
- g) Pengambilan keputusan apakah akan mengamati atau melanjutkan perawatan medis, radiologi atau pembedahan.
- h) Perawatan medis obat analgetik, sistem intrauterine progesterone (IUS) adalah pengobatan yang sangat baik untuk wanita dengan HMB tanpa adanya mioma, bukti untuk kemanjurannya pada wanita dengan mioma terbatas, tidak dapat digunakan jika rongga uterus

terdistors, dan mioma submukosa dapat menyebabkan lonjakan. Gonadotrophin releasing hormone (GnRh) agonis menyebabkan penyusutan amenorea dan mioma sementara dengan menginduksi keadaan menopause sementara. Efek samping dan kepadatan tulang membatasi penggunaannya hanya 6 bulan, biasanya menjelang menopause atau operasi lebih mudah dan lebih aman, namun, penggunaan “add back” secara bersamaan.

- i) HRT dapat mencegah efek tersebut tanpa menyebabkan pembesaran, memungkinkan pemberian lebih lama. Setelah agonis GnRH dihentikan dan kadar hormon kembali normal maka mioma akan kembali ke ukuran sebelumnya.

Pengobatan agonis GnRH tidak sesuai untuk wanita hamil karena anovulasi yang diinduksi dan kembalinya mioma dengan penghentian obat.

- j) Modulator reseptor progesterone selektif (SPRMS) misalnya ulipristal acetat adalah obat baru yang mengurangi HMB, biasanya menyebabkan amenorea reversibel dan mengecilkan mioma (volume berkurang 50% mirip dengan agonis (GnRh) tanpa kehilangan kepadatan tulang dan sisi menopause, dapat digunakan jangka pendek dalam persiapan untuk operasi atau jangka panjang untuk mengontrol gejala mioma dan menghindari operasi sama sekali.

- k) Perawatan bedah histerekskopi polip mioma atau mioma submukosa kecil hingga 3 cm yang menyebabkan masalah menstruasi atau

subfertilitas dapat direseksi pada histereskopi reseksi transervikal mioma (TCRF). Pretreatment dengan agonosis GnRh selama 1-2 bulan akan mengecilkan mioma, mengurangi vaskularisasi dan mengencerkan endometrium, sehingga membuat reseksi lebih mudah dan lebih aman.

- l) Miomektomi mioma dapat dikeluarkan dari uterus dengan miomektomi terbuka atau laparskopi. Kehilangan darah mungkin berat risiko transfusi darah atau histerektomi untuk menyelamatkan hidup, dan fibroid kecil dapat berkembang. Miomektomi dilakukan jika perawatan medis telah gagal tetapi pelestarian fungsi reproduksi diperlukan dan embolisasi arteri uterine tidak diinginkan, miomektomi dapat didahului dengan 2-3 bulan dengan analog GnRh atau ulipristal asetat untuk mengecilkan mioma dan mengurangi vaskularisasi. Injeksi asam tranexamat untuk mengurangi kehilangan darah (Wiley Blackwell, 2017).

B. Manajemen Asuhan Kebidanan

Bidan dapat melakukan beberapa asuhan pada kasus mioma uteri. Mioma uteri merupakan salah satu penyakit gangguan sistem reproduksi, sebagaimana telah diatur dalam menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/Sk/2007 tentang standar profesi Bidan, sebagai berikut :

1. Pengetahuan Dasar

- a Penyuluhan kesehatan mengenai kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual (PMS), HIV/AIDS.
- b Tanda dan gejala infeksi saluran kemih serta penyakit sesual yang lazim terjadi.
- c Tanda, gejala dan penatalaksanaan pada kelainan ginekologi meliputi: keputihan, perdarahan tidak teratur dan penundaan haid.

2. Keterampilan Dasar

- a Mengidentifikasi gangguan masalah dan kelainan-kelainan sistem reproduksi.
- b Memberikan pengobatan pada perdarahan abnormal dan abortus spontan (bila belum sempurna).
- c Melakukan kolaborasi dan atau rujukan secara tepat pada wanita/ibu dengan gangguan sistem reproduksi.
- d Memberikan pelayanan dan pengobatan sesuai dengan kewenangan pada gangguan sistem reproduksi meliputi: keputihan, perdarahan tidak teratur dan penundaan haid.

3. Asuhan yang dapat dilakukan oleh Bidan yaitu :

- a. Pengumpulan data klien melalui anamnesa.
- b. Tanda gejala yang diperoleh dari hasil bertanya dari klien, suami, atau keluarga (identitas umum, keluhan riwayat persalinan, riwayat KB, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit keturunan, riwayat psikologis, dan pola hidup).

- c. Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan fisik klien, hasil laboratorium.
- d. Melakukan pemeriksaan tanda KU, vital sign, pemeriksaan fisik, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, perkusi.
- e. Perlunya tindakan segera/kolaborasi oleh dokter SpOG untuk dikonsultasikan seperti pemasangan infus, pemberian obat:
 - 1) Ringer Laktat (RL): Dextrose (Ds): 2:1/28 tetes/menit
 - 2) Injeksi: Cefotaxime 1 gr / 12 jam / IV
Drips Metronidazole 0,5 gr / 8 jam / IV
Ketorolac 1 amp / 8 jam / IV
Ranitidine 1 amp / 8 jam / IV
Transamin 1 amp / 8 jam / IV

C. Tinjauan Islam Tentang Mioma Uteri

Islam adalah agama yang kaya khazananya mencakup segenap aspek kehidupan manusia, termasuk diantaranya masalah kesehatan dan pengobatan. Ilmu pengobatan Islam sebenarnya tidak kalah dengan ilmu pengobatan barat. Contohnya, Ibnu Sina seorang muslim yang menjadi pionir ilmu kedokteran modern. Ilmu pengobatan Islam bertumpu pada cara-cara alami dan metode ilahinya yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi seorang muslim dalam menjaga kesehatan dan mengobati penyakitnya.

Sebagai khalifah di muka bumi, manusia dibekali akal oleh Allah SWT, disamping sebagai insan yang mendorong manusia untuk mencari segala

sesuatu yang dibutuhkan untuk melangsungkan hidupnya seperti makan, minum dan tempat berlindung.

Manusia akan mendapat pengalaman yang baik dan yang kurang baik maupun yang membahayakan dalam mencari hal tersebut. Maka Allah yang mengolah, hasil yang lebih baik, oleh karena itu manusia selalu dalam proses mencari dan menyempurnakan hingga selalu progresif. Berbeda dengan binatang yang hanya dibekali instink saja, hingga hidup mereka sudah terarah dan bersifat statis. Allah yang membentuk serta membimbing kebudayaan manusia termasuk dalam pengobatan.

Jauh sebelum perkembangan ilmu dan teknologi Allah mengetahui tentang rahasia janin seperti masa depan anak, penyakit seperti penyakit mioma uteri merupakan penyakit jenis tumor jinak pada rahim yang berasal dari otot rahim.

Hal ini terbukti dengan firman Allah SWT. QS. ar-Rad/13:8

﴿ ۞ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝﴾

Terjemahnya:

Allah Mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisi-Nya. (Kementrian Agama RI, 2018, H:225).

Ayat tersebut membuktikan kekuasaan Allah SWT, kini diuraikan ilmu-Nya yang sangat luas lagi mencakup segala yang kecil dan besar. Tuhan yang Maha mengetahui-lah yang menentukan juga jenis ayat atau mujizat yang diturunkannya kepada setiap rasul. (Tafsir Al- Mishbah)

Setiap penyakit dalam bentuk apapun pasti ada obatnya asalkan manusia selalu berusaha dan berdo'a kepada Allah SWT agar diberi petunjuk dan kemudahan melalui al-Qur'an dan hadis untuk mencapai kesembuhan terhadap penyakit yang ada pada dalam diri seperti Do'a Nabi Ayyub dalam Q.S. Al Anbiya/21:83 sebagai berikut:

وَإِيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketiga ia menyeru Tuhannya: “(Ya Tuhanku), Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua Penyayang”. (Kementrian Agama RI, 2018, H:322).

Ayat ini menjelaskan tentang kesabaran dalam menghadapi ujian. Hal ini dengan memberi contoh melalui Nabi Ayyub a.s yang juga memperoleh limpahankarunia, tetapi diuji dengan kebiasaan dan kehancuran anugrah itu, bahan dengan penyakit beliau derita. Namun demikian, hendaklah yang diuji meladani sikap Nabi Ayyub a.s yang diuraikan kisahnya oleh ayat ini. Nabi Muhammad saw diperintahkan agar meningkat dan mengingatkan pula tentang kisah Nabi ayyub a.s, ketika ia yakni menggerutu, tidak pula mengadu kepada selain Allah. Beliau hanya menjadikan keadaannya dengan berkata: ”Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa kesulitan menyangkut diriku disebabkan oleh ulah setan.” (Tafsir Al-Baghawi)

Dengan Mengajarkan pasien Mioma Uteri Hendak selalu Berdo'a seperti Contoh Nabi Ayyub a.s yang memperoleh limpahan karunia, tetapi diuji dengan diberikan suatu penyakit.

Disamping Al-Qur'an mengisyaratkan tentang pengobatan juga menceritakan tentang keindahan alam semesta yang dapat kita jadikan sumber dari obat-obatan. Dalam firman Allah QS. an-Nahl/16:69

ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan (Kementerian Agama RI, 2009.: 635).

Dalam hadis tersebut menjelaskan Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit melainkan juga Allah menurunkan obatnya tanpa menyebutkan apa obatnya dan cara memakainya, masalah ini harus dikerjakan oleh manusia dengan akal, ilmu dan penyelidikan yang sekarang dinamai sains bersama teknologinya. Sebelumnya telah dijelaskan tentang penanganan mioma uteri, untuk itu manusia tidak boleh pasrah begitu saja terhadap takdir adalah suatu kewajiban setiap muslim untuk menyakininya, namun sebagai umat islam tidak dapat menyerah begitu saja harus ada upaya untuk berubah ke yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. ar-Rad/13:11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مَنْ خَلْفَهُمْ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Kementrian Agama RI, 2009, : 226).

Ayat tersebut menganjurkan kita untuk selalu berusaha melakukan hal yang positif, misalnya usaha untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mencegah timbulnya penyakit, serta pengobatan terhadap penyakit.

M. Quraish Shihab telah berpandangan, ketika sedang mengomentari pendapat para ulama yang memahami bahwa ayat-ayat *al-Qur'an* itu tersebut, dapat mengobati atau menyembuhkan segala sesuatu penyakit jasmani. Menurutnya, bukan penyakit jasmani, melainkan ia adalah sesuatu penyakit ruhani (jiwa) yang berdampak pada jasmani.

Thabathaba'i, telah memahami bahwa fungsi dari *al-Qur'an* adalah sebagaimana yang telah dikutip oleh M. Quraish Shihab, untuk memahami fungsi dari *al-Qur'an* itu adalah sebagai obat, dalam arti, menghilangkan dengan bukti- bukti yang dipaparkan dari aneka keraguan (*syubhat*), serta dalih (*alasan*) yang boleh jadi hinggap dihati sementara orang.

Rahmat adalah suatu kepedihan di dalam hati karena melihat tidak berdayaan pihak lain, sehingga telah mendorong yang sangat pedih hatinya itu untuk membantu dalam menghilangkan atau mengurangi ketidakberdayaan itu tersebut. Ini adalah sebuah manusia/makhluk. Rahmat Allah swt. dipahami dalam arti bantuan-Nya, sehingga ketidak berdayaan itu dapat tertanggulangi.

Bahkan seperti telah ditulis oleh Thabathaba'i, rahmatnya adalah sebuah limpahan karunia-Nya terhadap wujud dan sarana kesinambungan wujud serta nikmat yang tidak dapat terhingga. Rahmat Allah swt. yang dilimpahkan-Nya kepada orang- orang mukmin adalah suatu kebahagiaan hidup dalam setiap berbagai aspeknya, seperti suatu pengetahuan tentang ketuhanan yang benar, akhlak yang luhur, amal-amal kebajikan, kehidupan berkualitas di dunia dan di akhirat, termasuk perolehan surga dan ridha-Nya. Karena itu, jika *al-Qur'an* disifati sebagai rahmat untuk orang mukmin, maka maknanya adalah sebuah limpahan karunia dari kebajikan dan keberkatan yang disediakan oleh Allah swt, bagi mereka yang telah menghayati dan mengamalkan dari nilai-nilai yang sudah diamanatkan oleh *al- Qur'an*.

Ayat ini telah membatasi rahmat dari *al-Qur'an* itu tersebut untuk orang- orang mukmin, karena mereka itulah yang paling berhak untuk dapat

menerimanya, sekaligus yang paling banyak untuk memperolehnya. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa selain mereka tidak dapat memperoleh secercah dari rahmat akibat kehadiran *al-Qur'an*.

Jadi, kesimpulan dari ayat di atas tersebut adalah bahwa kitab *al-Qur'an* ini adalah merupakan sebagai suatu rahmat petunjuk dan penawar (obat penyembuh) bagi orang-orang mukmin (Nurul, 2019: 46-49)



D. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah suatu proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, temuan, keterampilan dalam rangkaian tahapan yang logis untuk mengambil suatu keputusan yang terfokus pada klien (Ida Ayu Sri Kusuma, 2015: 102).

2. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

Adapun 7 (tujuh) langkah manajemen kebidanan menurut Helen Varney adalah:

a. Langkah I (pengumpulan Data Dasar)

Langkah pertama merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien. Memilih informasi data yang tepat diperlukan analisa suatu situasi yang menyangkut manusia yang kompleks. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara:

1) Anamnesa

Anamnesa melalui melakukan tanggung jawab untuk memperoleh data meliputi data pasien, keluhan utama waktu masuk, riwayat penyakit, riwayat kehamilan, persalinan, nifas yang lalu, dan riwayat operasi.

Pada kasus mioma uteri klien akan mengeluh adanya nyeri saat menstruasi, nyeri pada saat berhubungan, nyeri pada punggung

terkadang menjalar sampai ke kaki, nyeri saat buang air kecil/ atau buang air besar, dan siklus menstruasi tidak teratur sampai terkadang jumlah darah keluar banyak.

2) Pemeriksaan fisik

Keadaan umum pasien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara inspeksi, palpasi, dan dilakukan pemeriksaan penunjang (USG). Pada kasus mioma uteri terdapat massa pada perut klien saat pemeriksaan palpasi dan adanya nyeri saat ditekan di daerah perut klien.

b. Langkah II (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual)

Pada langkah ini, dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi atas data-data dan kebutuhan klien yang dikumpulkan di inteprestasikan sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik.

Kasus mioma uteri ditetapkan berdasarkan data dasar yang dikumpulkan bahwa klien tersebut didapatkan pada waktu pemeriksaan fisik adanya massa dan nyeri tekan di daerah perut klien dan pemeriksaan USG pada myoma uteri akan terlihat sebagai struktur kistik yang bulat (kadang-kadang oval) dan terlihat sangat echolucent dengan dinding-dinding yang tipis/tegas /licin dan di tepi belakang mioma nampak bayangan echo yang lebih putih dari dinding depannya.

c. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah/Potensial yang Membutuhkan Antisipasi Masalah Potensial)

Merumuskan diagnosa atau masalah potensial yaitu pada langkah ini, Bidan mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi, langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati kondisi klien. Bidan diharapkan bersiap-siap bila diagnosa atau masalah potensial benar-benar terjadi. Pada kasus mioma uteri, masalah potensial yang bisa terjadi yaitu, perdarahan abnormal, gangguan miksi, dan menimbulkan infertilitas. Seperti dalam bentuk hal untuk mencegah terjadinya perdarahan bidan dan tenaga kesehatan yang terlibat harus memastikan bahwa rahim klien sudah dalam keadaan bersih dan jaringan-jaringan mioma yang masih menempel pada rahim. Oleh sebab itu, bidan dan tenaga kesehatan harus memberikan asuhan yang aman dalam menangani kondisi klien.

d. Langkah IV (perlunya Tindakan Segera/kolaborasi)

Pada langkah ini bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.

Pada kasus mioma uteri perdarahan dapat terjadi apabila pertolongan tidak diberikan pada waktunya. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan

segera seperti memasang infus dan mengecek Hb. Jika hb klien rendah, maka harus segera dilakukan transfusi darah untuk mencegah terjadinya anemia.

e. Langkah V (Merencanakan Asuhan yang menyeluruh)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Dan pada langkah ini reformasi data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi.

Untuk menghindari perencanaan asuhan yang tidak terarah, maka dibuat terlebih dahulu pola pikir seperti tentukan tujuan tindakan yang akan dilakukan meliputi sasaran dan target hasil yang akan dicapai. Penyusunan rencana asuhan ini, didasarkan pada penanganan terhadap mioma uteri rencana asuhan yang diberikan adalah mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital, memberi intake infuse, berkolaborasi dengan dokter Sp. OG untuk melakukan pemeriksaan USG, untuk melihat jenis dan bentuk dari mioma uteri itu sendiri. Agar dapat dilakukan tindakan segera.

f. Langkah VI (Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan)

Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman.

Pemberian asuhan dapat dilakukan oleh bidan, klien/keluarga, atau tim kesehatan lainnya namun tanggung jawab utama tetap pada bidan untuk

mengarahkan pelaksanaannya. Asuhan yang dilakukan secara efisien yaitu hemat waktu, hemat biaya dan mutu meningkat.

Menganjurkan ibu untuk selalau Berdo'a sebagaimana Nabi Ayyub a.s menghadapi suatu penyakit dimana do'a tersebut dalam Q.S.Al Anbiya/21:8

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang".

g. Langkah VII (Evaluasi)

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang telah diberikan, hasil evaluasi dapat menjadi data dasar untuk menegakkan diagnosa sesuai rencana asuhan efektif, masalah teratasi, masalah telah berkurang timbul masalah baru, atau apakah kebutuhan klien telah terpenuhi.

Evaluasi yang dilakukan pada kasus mioma uteri yaitu antara lain keadaan umum, tanda-tanda vital, tanda-tanda syok, perdarahan, apakah terjadi anemia, dan tanda-tanda infeksi.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Soap adalah sebuah cara untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah pasien, merupakan suatu yang membutuhkan manajemen atau diagnostik termasuk medis, sosial ekonomi, dan masalah demografis. Bidan melakukan pencatatan secara lengkap, singkat, dan jelas mengenai

keadaan yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan dalam bentuk catatan perkembangan SOAP.

a. Subjektif (S)

- 1) Data subjektif (Observasi klien).
- 2) Menggambarkan pendokumentasian hanya pengumpulan data klien melalui anamnesa.
- 3) Tanda gejala subjektif diperoleh dari hasil bertanya dari klien, suami, atau keluarga (identitas umum, keluhan riwayat persalinan, riwayat KB, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit keturunan, riwayat psikologis dan pola hidup).
- 4) Catatan ini berhubungan dengan masalah sudut pandang pasien. ekspresi klien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosa.

b. Objektif (O)

- 1) Data objektif (observasi dan pemeriksaan)
- 2) Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan fisik klien, hasil laboratorium dan tes diagnose lainnya yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung analisis.
- 3) Tanda gejala objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan (tanda KU, vital sign, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kebidanan, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang), pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, perkusi.

- 4) Data ini memberi bukti gejala klinis dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis. Data fisiologis, hasil observasi yang jujur, informasi kajian, teknologi (hasil laboratorium, sinar X, rekam CTG, dan lain-lain). Apa yang diobservasi oleh bidan akan menjadi komponen yang berarti dari diagnosis yang ditegakkan.

c. Assesmant (A)

- 1) Masalah atau diagnosis yang ditegakkan berdasarkan data atau informasi subjektif maupun objektif dan seing diungkapkan secara terpisah-pisah, proses pengkajian adalah suatu hal yang penting dalam mengikuti perkembangan klien dan menjamin suatu perhubungan baru yang cepat diketahui dan dapat diikuti sehingga dapat diambil tindakan yang cepat.
- 2) Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dalam suatu identifikasi.
 - a) Diagnosa/masalah
 - (1) Diagnosis adalah rumusan dari hasil pengkajian kondisi klien :

Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir dan gangguan sistem reproduksi. Berdasarkan hasil analisa data yang didapat.
 - (2) Masalah yang menyimpang sehingga kebutuhan klien terganggu, kemungkinan mengganggu kehamilan/kesehatan tetapi tidak masuk dalam diagnosis.

b) Antisipasi masalah lain/diagnosis potensial

d. Planning (P)

Membuat rencana tindakan saat itu atau yang akan datang Untuk mengusahakan tercapainya kondisi klien yang sebaik mungkin atau menjaga mempertahankan kesejahterannya. Proses ini termasuk tujuan tertentu dari kebutuhan pasien yang harus dicapai dalam batas waktu tertentu. Perencanaan diambil harus sesuai dengan intruksi dokter. Dalam perencanaan harus tertuang asuhan yang akan direncanakan, bagaimana pelaksanaan dan hasil dari suatu asuhan yang telah diberikan (Irianti Bayu, 2014:337-339).

Soap ini dilakukan pada asuhan gangguan sistem reproduksi dengan kasus mioma submukosa pada tahap berikutnya. kunjungan berikutnya dilakukan selama 4 kali kunjungan untuk memantau perkembangan klien.

Adapun jadwal kunjungan tersebut sebagai berikut :

- 1) Kunjungan pertama adalah kunjungan yang dilakukan pada saat pertama datang menanyakan tentang keluhan yang dirasakan pada ibu, riwayat penyakit, riwayat genetik, riwayat kesehatan yang lalu, riwayat menstruasi, riwayat ginekologi, dan pola hidup, melakukan pemeriksaan fisik, pemerisaan penunjang, observasi keadaan klien, kolaborasi dengan dokter SpOg pemberian obat.

- 2) Kunjungan kedua adalah kunjungan dimana operasi telah di jadwalkan. Kunjungan kedua ini bertujuan untuk :
 - a) Mengkaji tingkat dan karakteristik nyeri, termasuk kualitas, frekuensi, durasi, lokasi dan intensitasnya.
 - b) Ajarkan pasien latihan teknik relaksasi nafas dalam.
 - c) kontrol tanda-tanda vital pasien
- 3) Kunjungan ketiga kunjungan ketiga adalah kunjungan yang dilakukan untuk followup pasca operasi, dengan tujuan :
 - a) Mengkaji tanda-tanda vital.
 - b) Mengkaji tingkat perdarahaan.
 - c) Mengkaji keadaan fisiologis individual klien misal perubahan mental, kelemahan, gelisah, pucat, berkeringat, peningkatan suhu.
 - d) Mengtur jumlah tetesan infus
- 4) Kunjungan empat
Kunjungan keempat adalah kunjungan terakhir yang dilakukan pada ibu dimana Bidan memastikan bahwa kondisi klien dalam keadaan baik. Dimana rahim telah bersih dari mioma uteri dan klien sudah bisa beraktivitas seperti biasanya.
 - a) Kaji kondisi klien.
 - b) Motivasi klien untuk melakukan perawatan diri.

BAB III

LITERATUR REVIEW

A. Langkah I: Identifikasi Data Dasar

Mengumpulkan semua referensi yang akurat berkaitan dengan kondisi pasien ibu gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri, sehingga dapat ditentukan intrepetasi yang benar sesuai dengan referensi yang didapatkan.

Judul: **Manajemen Asuhan Kebidanan Gangguan Sistem Reproduksi Dengan Mioma Uteri.**

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan
1.	Karakteristik Penderita Mioma Uteri Rawat Inap Di RSUD Deli Sedang Lubuk Pakam Tahun 2013-2015	Yulianti, s. dkk	2015	Penjelasan kesehatan reproduksi	Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya	Penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana cara menekan angka kejadian mioma uteri sehingga angka kejadian mioma uteri tidak terjadi penurunan secara signifikan	Menggunakan metode yang sesuai yaitu <i>prospective study</i> yaitu penelitian analitik yang bersifat observasional.

2.	Karekateristik Penderita Mioma Uteri Rawat Inap Di Rumah Sakit Tentara TK-IV Pematangsiantar 2016	Sheyna, Z, dkk	2016	Definisi mioma uteri	Mioma uteri merupakan tumor jinak yang paling sering ditemukan pada organ reproduksi wanita	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tidak dijelaskan pada bab-bab sebelumnya sehingga pembaca kurang mengerti mengenai tindakan atau asuhan yang diberikan pada kasus mioma uteri	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang menderita mioma uteri karena tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik <i>Cluster Sampling</i>
3.	Karakteristik Penderita Mioma Uteri Yang Di Rawat Di RSUD dr Pirngadi Medan Tahun 2016-2017	Linda, Y, dkk	2017	Pengertian mioma uteri	Mioma uteri adalah tumor jinak otot polos yang terdiri dari sel-sel jaringan otot polos, jaringan pengikat fibroid dan kolagen. Pada umumnya letak mioma adalah intramural, namun dapat juga tumbuh menonjol kearah rongga peritoneum (subserosa) dan ke arah kavum uteri (submukosa).	Tidak melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian mioma uteri belum terjadi penurunan secara signifikan.	Menggunakan metode yang benar. Teknik sampiling yang digunakan yaitu <i>Accidental sampling</i> sehingga data yang diperoleh lebih lengkap

4.	Optimisme Kebutuhan Pada Penderita Mioma Uteri	Setyana, M, dkk	2015	Definisi mioma uteri	Mioma uteri ialah neoplasma jinak yang berasal dari otot uterus dan jaringan ikat. Neoplasma ialah pertumbuhan jaringan baru yang tidak normal pada tubuh, dan dikenal juga dengan istilah tumor yang banyak terjadi pada organ reproduksi wanita	Penelitian ini hanya perfokus pada penanganan mioma uteri dan tidak melakukan tindakan pencegahan terjadinya mioma uteri	Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik total sampling karena sampell telah memenuhi kriteria penelitian yaitu ibu melahirkan bayi dengan diagnosis mioma uteri secara klinis
5.	Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita	Manuaba, Ida A.C.	2013	Penjelasan mioma uteri atau tumor jinak	Mioma uteri merupakan tumor terbanyak pada organ reproduksi wanita, dan dapat menimbulkan dampak fisik berupa rasa nyeri, efek tekanan, serta pendarahan abnormal.	Dari pembahasan kurang terperinci mengenai faktor penyebab terjadinya mioma uteri	Metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan melakukan analisis data dan kesimpulan data sampai

							dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik.
6.	Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Mioma Uteri,	Ahmad, S	2010	Pengertian mioma uteri	Mioma uteri merupakan tumor jinak otot rahim disertai jaringan ikatnya, sehingga dapat dalam bentuk padat karena jaringan ikatnya dominan dan lunak serta otot rahimnya dominan.	Penelitian ini lebih berfokus pada faktor-faktor yang berhubungan dengan mioma uteri	Jumlah responden kasus ialah seluruh kasus mioma uteri yaitu 45 orang dan responden kontrol yaitu 25 orang, sehingga total responden sebesar 35 orang.

Selain dari definisi mioma uteri terdapat juga tanda dan gejala serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mioma uteri yang didapatkan dari referensi yang relevan, dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Judul Referensi	Oleh (sebutkan nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan
1.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Mioma Uteri Pada Wanita di RSUD Pasar Rebo Tahun 2017	Kursih, S	2015	Faktor penyebab terjadinya mioma uteri	Faktor penyebab berdasarkan beberapa teori yang menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya mioma uteri seperti stimulasi estrogen, umur, paritas, dan usia menarche.	Lebih banyak membahas tentang asuhan yang diberikan selama ibu di rumah namun tidak membahas mengenai asuhan yang diberikan selama ibu berada di rumah sakit	Metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan melakukan analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik.

2.	Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Mioma Uteri Di Ruang Poli Kandungan RSUD Ulin Banjarmasin Tahun 2014	Ahmad, S, dkk	2016	Faktor pendukung terjadinya mioma uteri	Ada beberapa faktor yang diduga kuat sebagai faktor predisposisi mioma uteri yaitu umur, riwayat keluarga, Obesitas.	Penelitian ini lebih berfokus pada faktor-faktor yang berhubungan dengan mioma uteri	Jumlah responden kasus ialah seluruh kasus mioma uteri yaitu 45 orang dan responden kontrol yaitu 25 orang, sehingga total responden sebesar 35 orang.
3.	Hubungan Usia Reproduksi Dengan Kejadian Mioma Uteri Di Ruang Tulip RS TK II dr. Soepraoen Ksdam V Brawijaya	Zainal, A	2017	Faktor resiko yang menyebabkan mioma uteri.	Faktor-faktor penyebab mioma uteri belum diketahui, namun ada 2 teori yang menjelaskan faktor penyebab mioma uteri, yaitu teori stimulasi, berpendapat bahwa estrogen sebagai faktor indikator. Selain itu ada teori cellnest atau Genitoblas, yaitu mioma uteri terjadi	Penelitian bersifat non reaktif karena menggunakan data sekunder sehingga data yang diperoleh kurang akurat dibandingkan dengan penelitian lain	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan melakukan analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya

					tergantung pada sel-sel otot imatur yang terdapat pada cell nest		mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik.
4.	Hubungan Usia Reproduksi dengan Kejadian Mioma	Lilis, dkk	2015	Salah satu penyebab terjadinya mioma uteri	Mioma uteri memiliki banyak faktor risiko, yang meningkat seiring dengan peningkatan usia. Kasus mioma uteri terbanyak pada kelompok usia 40-49 tahun, dengan usia rata-rata 42,97 tahun sebanyak 51%. Risiko mioma uteri meningkat pada wanita nullipara.	Kurangnya pelayanan petugas kesehatan yang optimal terhadap konseling mengenai pencegahan dan penanganan mioma uteri sehingga angka kejadian mioma uteri masih terbilang cukup tinggi	Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode survei analitik dengan desain kasus-kontrol sehingga diperoleh data yang lebih akurat
5.	Hubungan Usia dan Paritas dengan Kejadian Mioma Uteri di RSUP	Wisman, A, dkk	2017	Faktor-faktor yang menginisiasi pertumbuhan mioma uteri	Etiologi mioma uteri belum diketahui dengan pasti, tetapi terdapat korelasi antara pertumbuhan	Ketidaksesuaian hasil penelitian ini, yaitu tidak adanya hubungan antara paritas dengan kejadian	Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik total sampling

	Dr.Mohammad Hoesin Palembang Periode Januari 2016–Januari 2017				tumor dengan peningkatan reseptor estrogenprogesteron pada jaringan mioma uteri serta adanya faktor predisposisi yang bersifat hereditier dan faktor hormonal yang mempengaruhinya.	mioma uteri. Kejadian mioma uteri diduga terkait dengan status gizi ibu.	karena sampel telah memenuhi kriteria penelitian yaitu ibu melahirkan bayi dengan diagnosis mioma uteri secara klinis
--	--	--	--	--	---	--	---

1. Perbandingan langkah 1

Yulianti, s. dkk (2015) kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Tidak sejalan dengan Sheyna, Z, dkk (2016) mioma uteri merupakan tumor jinak yang paling sering ditemukan pada organ reproduksi wanita.

Lindah, Y, dkk (2017) Mioma uteri adalah tumor jinak otot polos yang terdiri dari sel-sel jaringan otot polos, jaringan pengikat fibroid dan kolagen. Pada umumnya letak mioma adalah intramural, namun dapat juga tumbuh menonjol ke arah rongga peritoneum (subserosa) dan ke arah kavum uteri (submukosa). Sejalan dengan Setyana, M, dkk (2015) mioma uteri ialah neoplasma jinak yang berasal dari otot uterus dan jaringan ikat. Neoplasma ialah pertumbuhan jaringan baru yang tidak normal pada tubuh, dan dikenal juga dengan istilah tumor yang banyak terjadi pada organ reproduksi wanita.

Manuaba, Ida A.C (2013) mioma uteri merupakan tumor terbanyak pada organ reproduksi wanita, dan dapat menimbulkan dampak fisik berupa rasa nyeri, efek tekanan, serta pendarahan abnormal. Sependapat dengan Ahmad, S (2010) mioma uteri merupakan tumor jinak otot rahim disertai jaringan ikatnya, sehingga dapat dalam bentuk padat karena jaringan ikatnya dominan dan lunak serta otot rahimnya dominan.

Kursih, S (2015) faktor penyebab berdasarkan beberapa teori yang menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya mioma uteri seperti stimulasi estrogen, umur, paritas, dan usia menarche. Tidak sependapat dengan Wisman, A, dkk (2017) etiologi mioma uteri belum diketahui dengan pasti, tetapi terdapat korelasi antara pertumbuhan tumor dengan peningkatan reseptor estrogenprogesteron pada jaringan mioma uteri serta adanya faktor predisposisi yang bersifat herediter dan faktor hormonal yang mempengaruhinya.

Zainal, A (2017) faktor-faktor penyebab mioma uteri belum diketahui, namun ada 2 teori yang menjelaskan faktor penyebab mioma uteri, yaitu teori stimulasi, berpendapat bahwa estrogen sebagai faktor indikator. Selain itu ada teori cellnest atau Genitoblas, yaitu mioma uteri terjadi tergantung pada sel-sel otot imatur yang terdapat pada cell nest. Berbeda dengan Lilis, dkk (2015) mioma uteri memiliki banyak faktor risiko, yang meningkat seiring dengan peningkatan usia. Kasus mioma uteri terbanyak pada kelompok usia 40-49 tahun, dengan usia rata-rata 42,97 tahun sebanyak 51%. Risiko mioma uteri meningkat pada wanita nullipara.

B. Langkah II: Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Aktual

Identifikasi diagnosis, masalah dan kebutuhan pasien ibu dengan mioma uteri berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan
1.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Mioma Uteri Pada Wanita di RSUD Pasar Rebo Tahun 2017	Kursih, S	2019	Mioma uteri dipengaruhi oleh stimulasi hormon estrogen	Pada umumnya mioma uteri jarang timbul sebelum menarche dan sesudah menopause, tumbuh dengan lambat serta sering dideteksi secara klinis pada kehidupan dekade keempat Pada usia reproduksi sekresi hormon estrogen oleh ovarium meningkat, berkurang pada usia klimakterium, dan pada usia menopause hormon estrogen tidak disekresikan lagi oleh ovarium	Lebih banyak membahas tentang asuhan yang diberikan selama ibu di rumah namun tidak membahas mengenai asuhan yang diberikan selama ibu berada di rumah sakit	Metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan melakukan analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik.

2.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Mioma Uteri Di Ruang Poli Kandungan RSUD Ulin Banjarmasin Tahun 2014	Ahmad, S	2016	Diagnosa mioma uteri	Seringkali penderita mengeluh akan rasa berat dan adanya benjolan pada perut bagian bawah. Mioma uteri ini menimbulkan masalah besar dalam kesehatan dan terapi yang efektif belum didapatkan, karena sedikit sekali informasi mengenai etiologi mioma itu sendiri.	Penelitian ini lebih berfokus pada faktor-faktor yang berhubungan dengan mioma uteri	Jumlah responden kasus ialah seluruh kasus mioma uteri yaitu 45 orang dan responden kontrol yaitu 25 orang, sehingga total responden sebesar 35 orang.
3.	Hubungan Usia Reproduksi Dengan Kejadian Mioma Uteri Pada Pasien Mioma Uteri Di Ruang Tulip RS TK II dr. Soepraoen Kesdam V Briwijaya	Zainal, A	2017	Pemeriksaan pada wanita usia reproduksi	Mioma uteri berbatas tegas, tidak berkapsul, dan berasal dari otot polos jaringan fibrous, sehingga mioma uteri dapat berkonsistensi padat jika jaringan ikatnya dominan, dan berkonsistensi lunak jika otot rahimnya yang dominan	Penelitian bersifat non reaktif karena menggunakan data sekunder sehingga data yang diperoleh kurang akurat dibandingkan dengan penelitian lain	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan melakukan analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik.

4.	Hubungan Paritas Dengan Kejadian Mioma Uteri Di RSUD Dr. Goeteng Taradibrata Purbalingga	Mariah, U	2017	Melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi kejadian mioma uteri	Mioma uteri atau tumor jinak tumbuh biasanya pada daerah rahim atau lebih tepatnya otot rahim dan jaringan ikat disekitarnya. Tumor jinak ini berasal dari otot uterus dan jaringan ikat yang menumpangnya.	Kurangnya kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lain sehingga sulit untuk memberikan penanganan secara tepat pada pasien	Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik <i>Purposive Sampling</i> yaitu penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah sehingga data yang diperoleh lebih lengkap
5.	Perbedaan Resiko Terjadinya <i>Mioma Uteri</i> antara Faktor Usia Menikah dan Faktor Paritas pada Ibu di Poli Kandungan Rumah Sakit TK IV Kota Kediri	Nurita, N	2018	Mendeteksi kejadian mioma uteri	Benih ini tumbuh sangat lambat tetapi progresif (bertahun-tahun, bukan dalam hitungan bulan), dibawah pengaruh estrogen sirkulasi, dan jika tidak terdeteksi dan diobati dapat membentuk tumor dengan berat 10 kg atau lebih namun sekarang sudah jarang karena dapat terdeteksi	Melakukan deteksi dini terjadinya kelahiran mioma uteri hanya dari faktor ibu (usia) dan tidak memperhatikan faktor lain sehingga hasil penelitian hanya berfokus kepada 1 objek saja.	Penelitian ini merupakan penelitian <i>Analitik Komparasional</i> dengan menggunakan lembar pengumpul data.

6.	Hubungan Faktor Risiko dan Kejadian Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang	Devy, I	2015	Tindakan histerektomi pada kasus mioma uteri	Pertumbuhan mioma uteri yang tetap membesar pada saat menopause dicurigai terjadi keganasan sehingga tindakan histerektomi perlu dilakukan.	Penelitian ini tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistic dengan kehamilan pada remaja dengan kejadian mioma uteri	Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis deskriptif dan analisis inferensia. Teknik penelitian ini bertujuan untuk mengambil kesimpulan untuk populasi dengan menganalisis sampel yang digunakan.
7.	Kehamilan Dengan Mioma Uteri Post Miomektomi	Rajuddin, D	2018	Pemeriksaan USG	Kebanyakan fibroid tidak menimbulkan gejala namun dapat mempengaruhi masa kehamilan dan persalinan bergantung pada lokasi dan ukuran. Hasil pemeriksaan ultrasonografi dapat memudahkan diagnosis dan penanganan fibroid pada kehamilan	Dari pembahasan kurang terperinci mengenai faktor penyebab terjadinya mioma uteri sehingga asuhan yang diberikan pada kasus mioma uteri kurang tepat	s penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan <i>Cross sectional study</i> karena jenis penelitian ini merupakan metode penelitian yang lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan jenis penelitian lain.

8.	Karakteristik Mioma Uteri Di RSUD Prof DR Margono Soekarjo Banyumas	Islimsyaf, A	2015	Pemeriksaan ginekologik	Wanita dengan mioma uteri tidak menunjukkan gejala (asimtomatik), hampir setengah dari kasus mioma uteri ditemukan secara kebetulan pada pemeriksaan ginekologik	Riwayat melahirkan tidak berpengaruh terhadap kejadian mioma uteri karena pada dasarnya kejadian umumnya disebabkan oleh berbagai macam faktor.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian <i>Deskriptif Analitik</i> karena jenis penelitian ini merupakan metode penelitian yang dianggap dapat menghasilkan data yang lebih mudah dengan hasil penelitian yang lebih akurat
9.	Mioma Geburt Dengan Anemia Laporan Kasus	Elgitha, R	2019	Diagnosa mioma Geburt sesuai dengan keluhan	Darah yang keluar banyak dan kadang bergumpal. Perdarahan menjadi manifestasi klinik utama pada mioma dan perdarahan terjadi pada 30% penderita.	Tidak menerapkan upaya preventif dalam menekan angka kejadian mioma uteri sehingga angka kejadian mioma uteri tidak mengalami penurunan secara signifikan.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan retrospective study dengan tujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan social

10.	Manajemen Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi Pada Ny "S" Dengan Mioma Submukosa di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tangga 04 Februari-25 Februari Tahun 2019	Astuti, Dkk	2020	Pemeriksaan abdomen dan USG	Abdomen tidak ada bekas operasi, terdapat massa pada kiri bawah perut ibu dan adanya nyeri tekan, genetalia tampak lembab tidak ada oedema dan nyeri tekan. Dan hasil USG tampak uterus membesar, kontur abnormal dengan gambaran massa lobulated pada adnexa kiri tampak massa kistik, ukuran $\pm 5 \times 6,5$ cm, tidak ada cairan bebas.	Tidak adanya penelitian lebih lanjut dengan desain studi yang lebih baik seperti studi kohort / penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh kurang relevan	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan social
-----	--	-------------	------	-----------------------------	---	---	---

2. Perbandingan langkah 2

Kursih, S (2019) pada umumnya mioma uteri jarang timbul sebelum menarche dan sesudah menopause, tumbuh dengan lambat serta sering dideteksi secara klinis pada kehidupan dekade keempat. Pada usia reproduksi sekresi hormon estrogen oleh ovarium meningkat, berkurang pada usia klimakterium, dan pada usia menopause hormon estrogen tidak disekresikan lagi oleh ovarium. Tidak sejalan dengan Ahmad, S (2016) seringkali penderita mengeluh akan rasa berat dan adanya benjolan pada perut bagian bawah. Mioma uteri ini menimbulkan masalah besar dalam kesehatan dan terapi yang efektif belum didapatkan, karena sedikit sekali informasi mengenai etiologi mioma itu sendiri.

Zainal, A (2017) mioma uteri berbatas tegas, tidak berkapsul, dan berasal dari otot polos jaringan fibrous, sehingga mioma uteri dapat berkonsistensi padat jika jaringan ikatnya dominan, dan berkonsistensi lunak jika otot rahimnya yang dominan. Sejalan dengan Mariah, U (2017) mioma uteri atau tumor jinak tumbuh biasanya pada daerah rahim atau lebih tepatnya otot rahim dan jaringan ikat disekitarnya. Tumor jinak ini berasal dari otot uterus dan jaringan ikat yang menumpangnya.

Nurita, N (2018) benih ini tumbuh sangat lambat tetapi progresif (bertahun-tahun, bukan dalam hitungan bulan), dibawah pengaruh estrogen sirkulasi, dan jika tidak terdeteksi dan diobati dapat membentuk tumor dengan berat 10 kg atau lebih namun sekarang sudah jarang karena dapat terdeteksi. Tidak sejalan dengan Devy, I (2015) pertumbuhan mioma uteri yang tetap membesar pada saat menopause dicurigai terjadi keganasan sehingga tindakan histerektomi

perlu dilakukan.

Rajuddin, D (2018) kebanyakan fibroid tidak menimbulkan gejala namun dapat mempengaruhi masa kehamilan dan persalinan bergantung pada lokasi dan ukuran. Hasil pemeriksaan ultrasonografi dapat memudahkan diagnosis dan penanganan fibroid pada kehamilan. Sejalan dengan Islimsyaf, A (2015) wanita dengan mioma uteri tidak menunjukkan gejala (asimtomatik), hampir setengah dari kasus mioma uteri ditemukan secara kebetulan pada pemeriksaan ginekologik.

Astuti, dkk (2020) abdomen tidak ada bekas operasi, terdapat massa pada kiri bawah perut ibu dan adanya nyeri tekan, genetalia tampak lembab tidak ada oedema dan nyeri tekan. Dan hasil USG tampak uterus membesar, kontur abnormal dengan gambaran massa lobulated pada adnexa kiri tampak massa kistik, ukuran $\pm 5 \times 6,5$ cm, tidak ada cairan bebas. Sependapat dengan Elgitha, R (2019) darah yang keluar banyak dan kadang bergumpal. Perdarahan menjadi manifestasi klinik utama pada mioma dan perdarahan terjadi pada 30% penderita.

C. Langkah III : Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Potensial

Identifikasi masalah potensial pada gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri yang mungkin terjadi berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan
1.	Karakteristik Penderita Mioma Uteri Yang Du Rawat Inap Di RSUD DR Pirngadi Medan Tahun 2014-2014	Linda, Y	2015	Gejala klinis mioma uteri	Perdarahan merupakan gejala klinis yang paling sering dialami penderita mioma uteri, dimana jumlah perdarahan dipengaruhi oleh ukuran mioma sedangkan tingkat keparahan perdarahan dipengaruhi lokasi mioma submukosa.	Tidak melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian mioma uteri belum terjadi penurunan secara signifikan.	Menggunakan metode yang benar. Teknik sampling yang digunakan yaitu <i>Accidental sampling</i> sehingga data yang diperoleh lebih lengkap
2.	Optimisme Kesembuhan Pada Penderita Mioma Uteri	Setyana, M	2015	Masalah potensial pada kasus mioma uteri	Mioma uteri menimbulkan efek pada penderita, yang dapat berdampak pada	Penelitian ini hanya perfokus pada penanganan mioma uteri	Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik total sampling karena

					timbulnya permasalahan seksual, ketakutan akan kekambuhan penyakit, dan mengurangi rasa feminin karena kehilangan organ reproduksi	dan tidak melakukan tindakan pencegahan terjadinya mioma uteri	sampell telah memenuhi kriteria penelitian yaitu ibu melahirkan bayi dengan diagnosis mioma uteri secara klinis
3.	Usia Paritas Dengan Kejadian Mioma Uteri	Amrina, O, dkk	2015	Komplikasi mioma uteri	Pada kasus mioma akan menimbulkan komplikasi seperti hipermenore (menstruasi dengan volume darah yang banyak dan lama), sering kencing, nyeri tekan pada perut bagian bawah, dan mengalami infertilitas. Wanita yang beresiko tinggi pemeriksaan dokter lebih sering dan rutin.	Peneliti hanya menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu.	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif sederhana karena peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpul dengan lembar pengumpulan data peneliti

4.	Karakteristik Penderita Mioma Uteri Di RSUP Prof DE.R.D Kondou Manado	Hana, a. dkk	2019	Keluhan dan masalah yang diakibatkan oleh mioma uteri tergantung dari lokasi, arah pertumbuhan, jenis, besar dan jumlah.	Masalah yang timbul akibat mioma uteri perdarahan, dan sisanya mengeluh dismenore, nyeri perut bagian bawah dan pinggang, gangguan defekasi, gangguan miksi, dan infertilitas	Penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana cara menekan angka kejadian mioma uteri	Menggunakan metode yang sesuai yaitu <i>prospective study</i> yaitu penelitian analitik yang bersifat observasional.
5.	Prevalensi Mioma Uteri Berdasarkan Umur Di RSUP DR.D Kandou Manado	Sabrianti, d. dkk	2015	Masalah yang dapat ditimbulkan mioma uteri	Mioma uteri yang menimbulkan masalah klinik seperti menoragia, ketidaknyamanan pelvis, serta disfungsi reproduksi. Sehingga tidak ada korelasi antara besarnya mioma dengan keluhan yang muncul	Terdapat ketidaksesuaian antara judul penelitian dengan isi dari pembahasan jurnal.	Studi ini dari berbagai sumber, buku, internet, pustaka dan jurnal baik nasional maupun jurnal internasional.

6.	Karakteristik Mioma Uteri Di RSUD Prof dr Margono Soekardjo Banyumas	Islimsyaf, A, dkk	2015	Masalah potensial pada kasus mioma uteri	Kejadian mioma uteri juga menimbulkan pendarah dan rasa nyeri yang berbeda beda tergantung pada jenis, ukuran, lokasi, dan adanya kehamilan.	Riwayat melahirkan tidak berpengaruh terhadap kejadian mioma uteri karena pada dasarnya kejadian umumnya disebabkan oleh berbagai macam faktor.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian <i>Deskriptif Analitik</i> karena jenis penelitian ini merupakan metode penelitian yang dianggap dapat menghasilkan data yang lebih mudah dengan hasil penelitian yang lebih akurat
7.	Kehamilan Dengan Mioma Uteri Post Miomektomi	Rajuddin, D	2018	Komplikasi mioma uteri terhadap kehamilan	Walaupun dalam beberapa kasus mioma tidak menyebabkan gangguan pada kehamilan, tetapi kebanyakan kasus berakhir dengan masalah seperti aborsi, persalinan prematur, disfungsi	Dari pembahasan kurang terperinci mengenai faktor penyebab terjadinya mioma uteri sehingga asuhan yang diberikan pada kasus mioma uteri	s penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan <i>Cross sectional study</i> karena jenis penelitian ini merupakan metode penelitian yang

					uterus, partus lama, malpresentasi, malposisi dan lainnya.	kurang tepat	lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan jenis penelitian lain.
8.	Perbedaan Resiko Terjadinya <i>Mioma Uteri</i> antara Faktor Usia Menikah dan Faktor Paritas pada Ibu di Poli Kandungan Rumah Sakit TK IV Kota Kediri	Nurita, N	2019	Efek dari mioma uteri jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat	Pengaruh mioma uteri pada kehamilan antara lain, menyebabkan infertilitas, kemungkinan abortus bertambah, kelainan letak janin dalam rahim, menghalangi kemajuan persalinan, inersia, dan atonia, uteri, mempersulit lepasnya plasenta dan dapat mengganggu proses involusi dalam masa nifas, tingginya insiden section sesarea.	Melakukan deteksi dini terjadinya kelahiran mioma uteri hanya dari faktor ibu (usia) dan tidak memperhatikan faktor lain sehingga hasil penelitian hanya berfokus kepada 1 objek saja.	Penelitian ini merupakan penelitian <i>Analitik Komparasional</i> dengan menggunakan lembar pengumpul data.

9.	Hubungan Paritas Dengan Kejadian Mioma Uteri Di RSUD Dr Goenteng Tarunadibrata Purbolingga	Mariah, U	2017	Resiko mioma uteri	Komplikasi yang dapat timbul apabila mioma uteri tidak segera ditangani yaitu dapat menimbulkan perlukaan pada dinding uterus, terjadinya ketidakseimbangan elektrolit dan komplikasi paling parah yang terjadi pada mioma uteri adalah perdarahan	Kurangnya kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lain sehingga sulit untuk memberikan penanganan secara tepat pada pasien	Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik <i>Purposive Sampling</i> yaitu penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah sehingga data yang diperoleh lebih lengkap
10.	Hubungan Usia Reproduksi Dengan Kejadian Mioma Uteri Pada Pasien Mioma Uteri Di Ruang Tulip RS TK II dr. Soepraoen Kesdam V Brawijaya	Zainal, A	2017	Pengaruh mioma uteri	Mioma uteri memang tidak berbahaya tetapi kehadirannya sangat mengganggu bahkan sering menimbulkan anemia.	Penelitian bersifat non reaktif karena menggunakan data sekunder sehingga data yang diperoleh kurang akurat dibandingkan dengan penelitian lain	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan melakukan analisis data dan kesimpulan data

							sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik.
--	--	--	--	--	--	--	---

3. Perbandingan langkah 3

Lindah, Y (2015) perdarahan merupakan gejala klinis yang paling sering dialami penderita mioma uteri, dimana jumlah perdarahan dipengaruhi oleh ukuran mioma sedangkan tingkat keparahan perdarahan dipengaruhi lokasi mioma submukosa. Tidak sejalan dengan Setyana, M (2015) mioma uteri menimbulkan efek pada penderita, yang dapat berdampak pada timbulnya permasalahan seksual, ketakutan akan kekambuhan penyakit, dan mengurangi rasa feminin karena kehilangan organ reproduksi.

Amrina, O, dkk (2015) pada kasus mioma akan menimbulkan komplikasi seperti hipermenore (menstruasi dengan volume darah yang banyak dan lama), sering kencing, nyeri tekan pada perut bagian bawah, dan mengalami infertilitas. Wanita yang beresiko tinggi pemeriksaan dokter lebih sering dan rutin. Sependapat dengan Hana, A, dkk (2019) masalah yang timbul akibat mioma uteri perdarahan, dan sisanya mengeluh dismenore, nyeri perut bagian bawah dan pinggang, gangguan defekasi, gangguan miksi, dan infertilitas.

Sabrianti, D, dkk (2015) mioma uteri yang menimbulkan masalah klinik seperti menoragia, ketidaknyamanan pelvis, serta disfungsi reproduksi. Sehingga tidak ada korelasi antara besarnya mioma dengan keluhan yang muncul. Sejalan dengan Islimsyaf, A, dkk (2015) kejadian mioma uteri juga menimbulkan pendarah dan rasa nyeri yang berbeda beda tergantung pada jenis, ukuran, lokasi, dan adanya kehamilan.

Rajuddin, D (2018) walaupun dalam beberapa kasus mioma tidak menyebabkan gangguan pada kehamilan, tetapi kebanyakan kasus berakhir dengan masalah seperti aborsi, persalinan prematur, disfungsi uterus, partus lama, malpresentasi, malposisi dan lainnya. Tidak sependapat dengan Nurita, N (2019) pengaruh mioma uteri pada kehamilan antara lain, menyebabkan infertilitas, kemungkinan abortus bertambah, kelainan letak janin dalam rahim, menghalangi kemajuan persalinan, inersia, dan atonia, uteri, mempersulit lepasnya plasenta dan dapat mengganggu proses involusi dalam masa nifas, tingginya insiden section sesarea.

Mariah, U (2017) komplikasi yang dapat timbul apabila mioma uteri tidak segera ditangani yaitu dapat menimbulkan perlukaan pada dinding uterus, terjadinya ketidakseimbangan elektrolit dan komplikasi paling parah yang terjadi pada mioma uteri adalah perdarahan. Sejalan dengan Zainal, A (2017) mioma uteri memang tidak berbahaya tetapi kehadirannya sangat mengganggu bahkan sering menimbulkan anemia.

D. Langkah IV: Identifikasi Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi

Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan ibu dengan mioma uteri dengan melakukan konsultasi dan kolaborasi berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan
1.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Mioma Uteri Pada Wanita di RSUD Pasar Rebo Tahun 2017	Kursih, S	2017	Upaya untuk menurunkan mortalitas dan morbiitas	Adapun keterampilan dasar yang harus dimiliki bidan yakni mengidentifikasi gangguan masalah dan kelainan-kelainan sistem reproduksi, memberikan pengobatan perdarahan abnormal, melakukan kolaborasi rujukan segera, memberikan pelayanan dan pengobatan sesuai dengan wewenang pada gangguan sistem reproduksi	Lebih banyak membahas tentang asuhan yang diberikan selama ibu di rumah namun tidak membahas mengenai asuhan yang diberikan selama ibu berada di rumah sakit	Metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan melakukan analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik.

2.	<p>Hubungan Usia Reproduksi Dengan Kejadian Mioma Uteri Pada Pasien Mioma Uteri Di Riang Tulip RS TK. II dr. Soepaorn Kesdam V Brawijaya</p>	Zainal, A	2017	<p>Upaya untuk menekan angka kejadian mioma uteri</p>	<p>Jenis mioma yang terjadi pada responden merupakan salah satu kejadian kasus reproduksi yang sering terjadi pada wanita sehingga perlu adanya tindakan atau peran dari tenaga kesehatan untuk mengatasi masalah tersebut seperti melakukan penyuluhan dan melakukan skrining dini terhadap kesehatan.</p>	<p>Penelitian bersifat non reaktif karena menggunakan data sekunder sehingga data yang diperoleh kurang akurat dibandingkan dengan penelitian lain</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan melakukan analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik.</p>
3.	<p>Hubungan Obesitas Dan Riwayat Keluarga Dengan Kejadian Mioma Uteri Di Ruang Poli Kandungan RSUD dr.H. Moch. Ansari Saleh</p>	Novalia, W	2018	<p>Memperhatikan pola nutrisi</p>	<p>Mengajarkan ibu menghindari makanan pencetus munculnya mioma uteri, seperti junk food dan jenis makanan tidak sehat lainnya yang tidak diimbangi dengan olahraga dan menjaga kesehatan, sehingga orang yang obesitas cenderung</p>	<p>Perlu adanya peran aktif bidan dalam memberikan penyuluhan tentang kejadian mioma uteri karena pada penelitian ini angka kejadian mioma uteri</p>	<p>Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik <i>Purposive Sampling</i> yaitu sebanyak 55 orang. Instrument pengumpulan data menggunakan lembar kuisioner.</p>

	banjarmasin Tahun 2016				mengakibatkan munculnya berbagai penyakit.	tidak terjadi penurunan secara signifikan	
4.	Hubungan Paritas Denga Kejadian Mioma Uteri Di RSUD Dr. goteng Tarunadibrata Purbalingga	Mariah, U	2017	Memperbaiki asupan gizi	Memperbaiki asupan gizi yang dikonsumsi, alat kontrasepsi yang dipakai serta polahidup, tetapi sampai saat ini belum diketahui apakah infertilitas menyebabkan mioma uteri atau sebaliknya mioma uteri yang menyebabkan infertilitas, atau apakah kedua keadaan ini saling mempengaruhi	Kurangnya kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lain sehingga sulit untuk memberikan penanganan secara tepat pada pasien	Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik <i>Purposive Sampling</i> yaitu penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah sehingga data yang diperoleh lebih lengkap
5.	Perbedaan Resiko Terjadinya Mioma Uteri antara Faktor Usia Menikah dan Faktor Paritas pada Ibu	Nurita, N	2019	Kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain	Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain seperti dokter, laboran yang dilakukan upaya penanganan salah satunya dengan melakukan	Melakukan deteksi dini terjadinya kelahiran mioma uteri hanya dari faktor ibu (usia) dan tidak	Penelitian ini merupakan penelitian <i>Analitik Komparasional</i> dengan menggunakan lembar pengumpul data.

	di Poli Kandungan Rumah Sakit TK IV Kota Kediri				pemeriksaan secara dini, USG, pemeriksaan lab.	memperhatikan faktor lain sehingga hasil penelitian hanya berfokus kepada 1 objek saja.	
6.	Hubungan Faktor Risiko dan Kejadian Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang	Devy, I	2015	Tindakan operasi	Melibatkan tenaga kesehatan yang dalam melakukan tindakan operasi yaitu histerektomi (pengangkatan rahim) atau pada wanita yang ingin mempertahankan kesuburannya, miomektomi (pengangkatan mioma) dapat menjadi pilihan	Penelitian ini tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistic dengan kehamilan pada remaja dengan kejadian mioma uteri	Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis deskriptif dan analisis inferensia. Teknik penelitian ini bertujuan untuk mengambil kesimpulan untuk populasi dengan menganalisis sampel yang digunakan.
7.	Karakteristik Penderita Mioma Uteri Rawat Inap Di RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam Tahun	Yulianti, S, dkk	2015	Melakukan pengobatan pada kasus mioma uteri	Pada pasien yang pulang berobat jalan tetap melakukan kontrol ulang khususnya pada pasien pasca operasi baik secara histerektomi	Penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana cara menekan angka kejadian mioma uteri	Menggunakan metode yang sesuai yaitu <i>prospective study</i> yaitu penelitian analitik yang bersifat

	2013-2015				maupun miomektomi untuk mengobservasi luka pasca operasi dan mengganti perban serta memberi terapi selanjutnya seperti antibiotik, penghilang rasa nyeri dan obat lain jika diperlukan	sehingga angka kejadian mioma uteri tidak terjadi penurunan secara signifikan	observasional.
8.	Optimisme Kesembuhan Pada Penderita Mioma Uteri.	Setyana, M	2015	Pengobatan mioma uteri	Pengobatan penyakit mioma uteri tergantung gejala yang dialami pasien, usia, status kehamilan, rencana reproduksi, kesehatan umum, serta ukuran dan lokasi dari mioma. Pembedahan merupakan pengobatan utama mioma uteri.	Penelitian ini hanya perfokus pada penanganan mioma uteri dan tidak melakukan tindakan pencegahan terjadinya mioma uteri	Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik total sampling karena sampel telah memenuhi kriteria penelitian yaitu ibu melahirkan bayi dengan diagnosis mioma uteri secara klinis
9.	Evaluasi pasca Radiofrequency Thermal Ablation pada Mioma Uteri Dan Adenomiosis	Dinata, dkk	2015	RF <i>thermal ablation</i> .	Radiofrequency (RF) <i>thermal ablation</i> merupakan pendekatan baru yang menjanjikan untuk terapi konservatif mioma uteri. Teknik ini relatif	Kurangnya data yang diperoleh dari rumah sakit sehingga perlu dilengkapi dan di perbaiki agar lebih jelas dan mudah dipahami	Pada penelitian pendahuluan ini, miolisis dengan radiofrequency thermal ablation telah berhasil mengurangi

					<p>murah dan prosedurnya mudah, dengan efektivitas dan pengaruh pada gejala yang berhubungan dengan mioma, dibandingkan dengan temuan lain yang bersifat minimal invasive</p>		<p>volume mioma uteri dan adenomiosis serta menghilangkan gejalanya.</p>
10.	Usia Dan Paitas Dengan Kejadian Mioma Uteri	Amrina, O	2015	<p>Melakukan pengobatan maupun pencegahan.</p>	<p>Segera melakukan pemeriksaan ke dokter ahli apabila mengalami gejala-gejala mioma seperti hipermenore (menstruasi dengan volume darah yang banyak dan lama), sering kencing, nyeri tekan pada perut bagian bawah, dan mengalami infertilitas. Wanita yang beresiko tinggi pemeriksaan dokter lebih sering dan rutin.</p>	<p>Peneliti hanya menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu.</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif sederhana karena peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpul dengan lembar pengumpulan data peneliti</p>

4. Perbandingan langkah 4

Kursih, S (2017) adapun keterampilan dasar yang harus dimiliki bidan yakin mengidentifikasi gangguan masalah dan kelainan-kelainan sistem reproduksi, memberikan pengobatan perdarahan abnormal, melakukan kolaborasi rujukan segera, memberikan pelayanan dan pengobatan sesuai dengan wewenang pada gangguan sistem reproduksi. Tidak sejalan dengan Zainal, A (2017) jenis mioma yang terjadi pada responden merupakan salah satu kejadian kasus reproduksi yang sering terjadi pada wanita sehingga perlu adanya tindakan atau peran dari tenaga kesehatan untuk mengatasi masalah tersebut seperti melakukan penyuluhan dan melakukan skrining dini terhadap kesehatan.

Novalia, W (2018) mengajurkan ibu menghindari makanan pencetus munculnya mioma uteri, seperti junk food dan jenis makanan tidak sehat lainnya yang tidak diimbangi dengan olahraga dan menjaga kesehatan, sehingga orang yang obesitas cenderung mengakibatkan munculnya berbagai penyakit. Sependapat dengan Mariah, U (2017) memperbaiki asupan gizi yang dikonsumsi, alat kontrasepsi yang dipakai serta polahidup, tetapi sampai saat ini belum diketahui apakah infertilitas menyebabkan mioma uteri atau sebaliknya mioma uteri yang menyebabkan infertilitas, atau apakah kedua keadaan ini saling mempengaruhi.

Nurita, N (2019) melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain seperti dokter, laboran yang dilakukan upaya penanganan salah satunya dengan melakukan pemeriksaan secara dini, USG, pemeriksaan laboratorium. Sejalan dengan Devy, I (2015) melibatkan tenaga kesehatan yang dalam melakukan

tindakan operasi yaitu histerektomi (pengangkatan rahim) atau pada wanita yang ingin mempertahankan kesuburannya, miomektomi (pengangkatan mioma) dapat menjadi pilihan.

Yulianti, S, dkk (2015) pada pasien yang pulang berobat jalan tetap melakukan kontrol ulang khususnya pada pasien pasca operasi baik secara histerektomi maupun miomektomi untuk mengobservasi luka pasca operasi dan mengganti perban serta memberi terapi selanjutnya seperti antibiotik, penghilang rasa nyeri dan obat lain jika diperlukan. Sejalan dengan Setyana, M (2015) pengobatan penyakit mioma uteri tergantung gejala yang dialami pasien, usia, status kehamilan, rencana reproduksi, kesehatan umum, serta ukuran dan lokasi dari mioma. Pembedahan merupakan pengobatan utama mioma uteri.

Dinata, dkk (2015) radiofrequency (RF) *thermal ablation* merupakan pendekatan baru yang menjanjikan untuk terapi konservatif mioma uteri. Teknik ini relatif murah dan prosedurnya mudah, dengan efektivitas dan pengaruh pada gejala yang berhubungan dengan mioma, dibandingkan dengan temuan lain yang bersifat minimal invasive. Tidak sejalan dengan Amrina, O (2015) segera melakukan pemeriksaan ke dokter ahli apabila mengalami gejala-gejala mioma seperti hipermenore (menstruasi dengan volume darah yang banyak dan lama), sering kencing, nyeri tekan pada perut bagian bawah, dan mengalami infertilitas. Wanita yang berresiko tinggi pemeriksaan dokter lebih sering dan rutin.

E. Langkah V: Rencana Asuhan Kebidanan

Perencanaan secara menyeluruh dan rasional terhadap masalah gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri

berdasarkan referensi yang telah didapatkan

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan
1.	Usia Dan Paitas Dengan Kejadian Mioma Uteri	Amrina, O	2015	Pemeriksaan dilakukan secara dini	Bagi pasangan yang akan menikah dianjurkan untuk tes kesehatan pranikah yang sebaiknya dilakukan calon pengantin wanita dan pria, enam bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini dari mioma uteri.	Peneliti hanya menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu.	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif sederhana karena peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpul dengan lembar pengumpulan data peneliti
2.	Evaluasi pasca Radiofrequency Thermal Ablation pada Mioma Uteri dan Adenomiosis	Dinata, F, dkk.	2015	Pemeriksaan melalui USG	Melakukan pemeriksaan ultrasonografi transvaginal mengenai jumlah, ukuran dan lokasi massa. Gambaran	Kurangnya data yang diperoleh dari rumah sakit sehingga perlu dilengkapi dan di perbaiki agar lebih jelas dan mudah dipahami	Pada penelitian pendahuluan ini, miolisis dengan radiofrequency thermal ablation telah berhasil mengurangi

					massa mioma dan adenomiosis pada USG		volume mioma uteri dan adenomiosis serta menghilangkan gejalanya.
3.	Karakteristik Penderita Mioma Uteri Rawat Inap Di RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam Tahun 2013-2015	Yulianti, D, dkk.	2015	Memperhatikan asupan nutrisi	Tindakan operatif, pasien mendapatkan transfusi darah dan asupan makanan yang baik untuk menormalkan kembali kadar hemoglobin dan kemudian dilakukan operasi. Setelah pasca operasi pasien dirawat sampai benar-benar pulih dan mendapat izin dokter untuk pulang	Penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana cara menekan angka kejadian mioma uteri sehingga angka kejadian mioma uteri tidak terjadi penurunan secara signifikan	Menggunakan metode yang sesuai yaitu <i>prospective study</i> yaitu penelitian analitik yang bersifat observasional.
4.	Perbedaan Resiko Terjadinya Mioma Uteri antara Faktor Usia Menikah dan Faktor Paritas pada Ibu	Nurita, N	2019	Upaya penanganan mioma uteri.	Pemberian terapi konservatif adalah terapi medikamentosa. Preparat yang digunakan untuk terapi medikamentosa adalah analg, GNRH,	Melakukan deteksi dini terjadinya kelahiran mioma uteri hanya dari faktor ibu (usia) dan tidak memperhatikan faktor lain sehingga	Penelitian ini merupakan penelitian <i>Analitik Komparasional</i> dengan menggunakan lembar pengumpul data.

	di Poli Kandungan Rumah Sakit TK IV Kota Kediri				progesteron, danasol, gestrinon, tamaksifen, geserrelin, antiprostaglandin, dan agen-agen lain. Sedangkan untuk terapi operatif dilakukan apabila mioma uteri lebih besar dari kehamilan 10-12 minggu, tumor yang berkembang cepat, terjadi torsi pada tangkai.	hasil penelitian hanya berfokus kepada 1 objek saja.	
5.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Mioma Uteri Pada Wanita di RSUD Pasar Rebo Tahun 2017	Kursih, S	2017	Memberikan pelayanan dan pengobatan.	Upaya meningkatkan derajat kesehatan untuk menurunkan mortalitas juga menurunkan morbiitas pada wanita. Salah tentang kesehatan reproduksi melalui program paket kesehatan reproduksi esensial (PKRK) dan paket kesehatan reproduksi	Lebih banyak membahas tentang asuhan yang diberikan selama ibu di rumah namun tidak membahas mengenai asuhan yang diberikan selama ibu berada di rumah sakit	Metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan melakukan analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan,

					komprehensif (PKRK)		rumus dan kepastian data numerik.
6.	Hubungan Usia Reproduksi Denga Kejadian Mioma Uteri Pada Pasien Mioma Uteri Di Ruang Tulip RS TK.II dr. Soepraoen Kesdam V Briwijaya	Zainal, A	2017	Upaya untuk mencegah komplikasi	Gejala yang berbahaya maka tindakan yang akan dilakukan pengangkatannya dilakukan secepat-cepatnya setelah tiga bulan, akan tetapi pada saat itu mioma kadang-kadang sudah demikian mengecil sehingga tidak diperlukan pembedahan	Penelitian bersifat non reaktif karena menggunakan data sekunder sehingga data yang diperoleh kurang akurat dibandingkan dengan penelitian lain	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan melakukan analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik.
7.	Hubungan Obesitas Dan Riwayat Keluarga Dengan Kejadian Mioma Uteri Di Ruang Poli	Novalia, W	2016	Pentingnya menjaga asupan nutrisi	Ukuran besar kecilnya mioma uteri juga dipengaruhi oleh banyak timbunan kalorinya dan membuat mioma tumbuh cepat. Maka dari itu ibu	Perlu adanya peran aktif bidan dalam memberikan penyuluhan tentang kejadian mioma uteri karena pada penelitian ini angka kejadian mioma	Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik <i>Purposive Sampling</i> yaitu sebanyak 55 orang. Instrument pengumpulan data

	Kandungan RSUD dr.H.Moch. Ansari Saleh banjarmasin Tahun 2016				yang mengalami mioma uteri perlu menjaga asupan nutrisi dan berolahraga secara teratur untuk menghindari terjadinya penumpukan lemak	uteri tidak terjadi penurunan secara signifikan	menggunakan lembar kuisisioner.
8.	Hubungan Faktor Risiko dan Kejadian Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang	Devy, I, dkk.	2015	Pengobatan mioma uteri	Untuk mencegah atau mengobati terjadinya mioma uteri pada ibu maka perlu dijaga asupan gizi yang dikonsumsi, alat kontrasepsi yang dipakai serta pola hidup.	Penelitian ini tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistic dengan kehamilan pada remaja dengan kejadian mioma uteri	Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis deskriptif dan analisis inferensia. Teknik penelitian ini bertujuan untuk mengambil kesimpulan untuk populasi dengan menganalisis sampel yang digunakan.

9.	Kehamilan Denga Mioma Uteri Post Miomektomi	Rajuddin dan Donny	2018	Melakukan tindakan operasi	Pengangkatan fibroid pada operasi sesar tidak rutin dilakukan karena tindakan ini sering kali dipersulit dengan perdarahan hebat. Beberapa peneliti mengemukakan bahwa semua fibroid anterior harus selalu diangkat dan operasi sesar menjadi pilihan dalam melakukan persalinan.	Penelitian ini tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistic dengan kehamilan pada remaja dengan kejadian mioma uteri	Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis deskriptif dan analisis inferensia. Teknik penelitian ini bertujuan untuk mengambil kesimpulan untuk populasi dengan menganalisis sampel yang digunakan.
----	---	--------------------	------	----------------------------	---	--	---

10.	Karakteristik Mioma Uteri Di RSUD Prof DR Margono Soekarjo Banyumas	Islimsyaf, A	2015	Pengangkatan rahim	Histerektomi adalah bedah pengangkatan rahim (uterus) yang sangat umum dilakukan. Biasanya histerektomi merupakan terapi pilihan pada wanita tua, wanita yang tidak ingin memiliki keturunan lagi dan pasien yang mengalami perdarahan haid berlebihan atau gejala penekanan oleh massa tumor	Penelitian ini tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistic dengan kehamilan pada remaja dengan kejadian mioma uteri	Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis deskriptif dan analisis inferensia. Teknik penelitian ini bertujuan untuk mengambil kesimpulan untuk populasi dengan menganalisis sampel yang digunakan.
-----	---	--------------	------	--------------------	---	--	---

5. Perbandingan langkah 5

Amrina, O (2015) bagi pasangan yang akan menikah dianjurkan untuk tes kesehatan pranikah yang sebaiknya dilakukan calon pengantin wanita dan pria, enam bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini dari mioma uteri. Tidak sejalan dengan Dinata, F, dkk (2015) melakukan pemeriksaan ultrasonografi transvaginal mengenai jumlah, ukuran dan lokasi massa. Gambaran massa mioma dan adenomiosis pada USG

Yulianti, D, dkk (2015) Tindakan operatif, pasien mendapatkan transfusi darah dan asupan makanan yang baik untuk menormalkan kembali kadar hemoglobin dan kemudian dilakukan operasi. Setelah pasca operasi pasien dirawat sampai benar-benar pulih dan mendapat izin dokter untuk pulang. Tidak sejalan dengan Nurita, N (2019) pemberian terapi konservatif adalah terapi medikamentosa. Preparat yang digunakan untuk terapi medikamentosa adalah analg, GNRH, progesteron, danasol, gestrinon, tamaksifen, geserrelin, antiprostaglandin, dan agen-agen lain. Sedangkan untuk terapi operatif dilakukan apabila mioma uteri lebih besar dari kehamilan 10-12 minggu, tumor yang berkembang cepat, terjadi torsi pada tangkai.

Kursih, S (2017) upaya meningkatkan derajat kesehatan untuk menurunkan mortalitas juga menurunkan morbiitas pada wanita. Salah tentang kesehatan reproduksi melalui program paket kesehatan reproduksi esensial (PKRK) dan paket kesehatan reproduksi komprehensif (PKRK). Tidak sejalan dengan Zainal, A (2017) gejala yang berbahaya maka tindakan yang akan dilakukan pengangkatannya dilakukan secepat-cepatnya setelah tiga bulan, akan

tetapi pada saat itu mioma kadang-kadang sudah demikian mengecil sehingga tidak diperlukan pembedahan

Novalia, W (2016) ukuran besar kecilnya mioma uteri juga dipengaruhi oleh banyak timbunan kalorinya dan membuat mioma tumbuh cepat. Maka dari itu ibu yang mengalami mioma uteri perlu menjaga asupan nutrisi dan berolahraga secara teratur untuk menghindari terjadinya penumpukan lemak. sejalan dengan Devy, I, dkk (2015) untuk mencegah atau mengobati terjadinya mioma uteri pada ibu maka perlu dijaga asupan gizi yang dikonsumsi, alat kontrasepsi yang dipakai serta pola hidup.

Rajuddin dan Donny (2018) pengangkatan fibroid pada operasi sesar tidak rutin dilakukan karena tindakan ini sering kali dipersulit dengan perdarahan hebat. Beberapa peneliti mengemukakan bahwa semua fibroid anterior harus selalu diangkat dan operasi sesar menjadi pilihan dalam melakukan persalinan. Sejalan dengan Islimsyaf, A (2015) histerektomi adalah bedah pengangkatan rahim (uterus) yang sangat umum dilakukan. Biasanya histerektomi merupakan terapi pilihan pada wanita tua, wanita yang tidak ingin memiliki keturunan lagi dan pasien yang mengalami perdarahan haid berlebihan atau gejala penekanan oleh massa tumor.

F. Langkah VI: Implementasi Asuhan Kebidanan

Mengidentifikasi pelaksanaan dari semua rencana terkait masalah gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri berdasarkan referensi yang telah didapatkan

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan
1.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Mioma Uteri Di Rumah Sakit Bengkulu	Erlindawati dan Sri Sumiari	2015	Pemberian dukungan moral	Memberikan dukungan moral kepada penderita mioma uteri terlebih ibu yang belum mempunyai anak dapat merasa kehilangan harga dirinya sebagai seorang wanita	Kurang menjelaskan secara detail mengenai asuhan pada kasus mioma uteri sehingga angka kejadian mioma uteri tidak mengalami penurunan secara drastic	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif sederhana karena peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpul dengan lembar pengumpulan data peneliti
2.	Hubungan Usia Reproduksi Dengan Kejadian Mioma Uteri Di Ruang Tulip Rs	Zainal, A	2015	Pemberian antibioatik	Pemberian antibioatik kepada penderita mioma uteri. Pemberian antibiotic dianggap perlu, dapat dilakukan laparotomi	Penelitian bersifat non reaktif karena menggunakan data sekunder sehingga data	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan

	TK. II dr Soepraen Kesdam V Brawijaya				percobaan dan tindakan selanjutnya dapat disesuaikan dengan apa yang ditemukan waktu perut dibuka.	yang diperoleh kurang akurat dibandingkan dengan penelitian lain	melakukan analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik.
3.	Hubungan Paritas Dengan Kejadian Mioma Uteri Di RSUD Dr. Goeteng Tarunadibrata Purbalingga	Mariah, U	2017	Memperhatikan asupan gizi	Mengajarkan ibu untuk menjaga pola asupan gizi yang dikonsumsi, alat kontrasepsi yang dipakai serta pola hidup, tetapi sampai saat ini belum diketahui apakah infertilitas menyebabkan mioma uteri atau sebaliknya mioma uteri yang menyebabkan infertilitas, atau apakah kedua keadaan ini saling mempengaruhi.	Kurangnya kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lain sehingga sulit untuk memberikan penanganan secara tepat pada pasien	Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik <i>Purposive Sampling</i> yaitu penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah sehingga data yang diperoleh lebih lengkap

4.	Evaluasi pasca Radiofrequency Thermal Ablation pada Mioma Uteri dan Adenomiosis	Dinata, dkk	2015	Terapi bedah	Teknik laparoskopik operatif yang maju mulai berkembang dan dapat diangkat secara laparoskopik pada pasien yang menolak histerektomi. Di sisi lain, telah dikembangkan suatu teknik per laparaskopi yang disebut miolisis untuk kasus miomata subserosum dan intramural sebagai alternatif untuk miomektomi dan histerektomi.	Kurang data yang diperoleh dari rumah sakit sehingga perlu dilengkapi dan diperbaiki agar lebih jelas dan mudah dipahami	Pada penelitian pendahuluan ini, miolisis dengan radiofrequency thermal ablation telah berhasil mengurangi volume mioma uteri dan adenomiosis serta menghilangkan gejalanya.
5.	Optimisme Kebutuhan Pada Penderita Mioma Uteri	Setyana, M, dkk	2015	Pengobatan penyakit mioma uteri	Pembedahan merupakan pengobatan utama mioma uteri. Miomektomi merupakan pengambilan sarang mioma tanpa pengangkatan uterus/rahim, Miomektomi	Penelitian ini hanya perfokus pada penanganan mioma uteri dan tidak melakukan tindakan pencegahan terjadinya mioma uteri	Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik total sampling karena sampel telah memenuhi kriteria penelitian yaitu ibu melahirkan bayi dengan diagnosis

					merupakan pilihan untuk pasien yang ingin mempertahankan fertilitasnya		mioma uteri secara klinis
6.	Karakteristik Penderita Mioma Uteri Yang Di Rawat Di RSUD dr Pirngadi Medan Tahun 2016-2017	Linda, Y, Dkk	2017	Proporsi penatalaksanaan medis	Secara umum sebelum tindakan operatif (khususnya histerektomi) dilakukan penderita harus menjalani beberapa pemeriksaan, dan kemudian mendapat perawatan dari pihak rumah sakit sampai kondisi pasien benar-benar pulih.	Tidak melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian mioma uteri belum terjadi penurunan secara signifikan.	Menggunakan metode yang benar. Teknik sampling yang digunakan yaitu <i>Accidental sampling</i> sehingga data yang diperoleh lebih lengkap
7.	Karakteristik Penderita Mioma Uteri Rawat Inap Di Rumah Sakit Tentara TK-IV Pematangsiantar 2016	Sheyna, Z, Dkk	2016	Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.	Pengobatan operatif seperti histerektomi cocok dilakukan pada wanita berumur 40 tahun keatas dan yang tidak menghendaki anak. Sementara miomektomi dilakukan pada tumordengan tangkai yang jelas yang dengan mudah dapat dijepit dan diikat, serta	Penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana cara menekan angka kejadian mioma uteri sehingga angka kejadian mioma uteri tidak terjadi penurunan secara signifikan	Menggunakan metode yang sesuai yaitu <i>prospective study</i> yaitu penelitian analitik yang bersifat observasional.

					cocok bagi wanita yang masih menghendaki anak.		
8.	Karakteristik Penderita Mioma Uteri Rawat Inap Di RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam Tahun 2013-2015	Yulianti, s. Dkk	2015	Melakukan perawatan pada ibu yang mengalami mioma uteri	Penatalaksanaan medis yang dilakukan ialah dengan histerektomi. Sebelum dilakukan tindakan operatif, pasien mendapatkan transfusi darah dan asupan makanan yang baik untuk menormalkan kembali kadar hemoglobin dan kemudian dilakukan operasi. Setelah pasca operasi pasien dirawat sampai benar-benar pulih dan mendapat izin dokter untuk pulang.	Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan desain case series	Populasi penelitian ini adalah seluruh data penderita mioma uteri rawat inap di RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam

9.	Karakteristik Mioma Uteri Di RSUD Prof DR Margono Soekarjo Banyumas	Islimsyaf, A	2015	Penanganan dari miomi uteri	Pengobatan mioma uteri dengan gejala klinik umumnya adalah tindakan histerektomi(pengangkatan rahim). Ibu yang melakukan operasi pengangkatan rahim dilakukan atas indikasi adanya mioma uteri	Penelitian ini tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistic dengan kehamilan pada remaja dengan kejadian mioma uteri	Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis deskriptif dan analisis inferensia. Teknik penelitian ini bertujuan untuk mengambil kesimpulan untuk populasi dengan menganalisis sampel yang digunakan.
10.	Mioma Geburt Dengan Anemia Laporan Kasus	Elgitha, R	2019	Memperbaiki keadaan umum ibu	Penatalaksanaan yang diberikan kepada pasien seperti ini meliputi tindakan konservatif dan tindakan operatif. Tindakan konservatif yang dilakukan pada kasus ini adalah pemberian tablet zat besi, antibiotik, anti perdarahan dan transfusi PRC.	Tidak menerapkan upaya preventif dalam menekan angka kejadian mioma uteri sehingga angka kejadian mioma uteri tidak mengalami penurunan secara signifikan.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan retrospective study dengan tujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan social

6. Perbandingan langkah 6

Zainal, A (2015) pemberian antibiotik kepada penderita mioma uteri. Pemberian antibiotic dianggap perlu, dapat dilakukan laparotomi percobaan dan tindakan selanjutnya dapat disesuaikan dengan apa yang ditemukan waktu perut dibuka. Tidak sejalan Mariah, U (2017) mengajurkan ibu untuk menjaga pola asupan gizi yang dikonsumsi, alat kontrasepsi yang dipakai serta pola hidup, tetapi sampai saat ini belum diketahui apakah infertilitas menyebabkan mioma uteri atau sebaliknya mioma uteri yang menyebabkan infertilitas, atau apakah kedua keadaan ini saling mempengaruhi.

Dinata, dkk (2015) teknik laparoskopik operatif yang maju mulai berkembang dan mioma uteri yang besar dapat diangkat secara laparoskopik pada pasien yang menolak histerektomi. Di sisi lain, telah dikembangkan suatu teknik per laparoskopi yang disebut miolisis untuk kasus miomata subserosum dan intramural sebagai alternatif untuk miomektomi dan histerektomi. Sependapat dengan Setyana, M, dkk (2015) pembedahan merupakan pengobatan utama mioma uteri. Miomektomi merupakan pengambilan sarang mioma tanpa pengangkatan uterus/rahim, Miomektomi merupakan pilihan untuk pasien yang ingin mempertahankan fertilitasnya.

Linda, Y, dkk (2017) secara umum sebelum tindakan operatif (khususnya histerektomi) dilakukan penderita harus menjalani beberapa pemeriksaan, dan kemudian mendapat perawatan dari pihak rumah sakit sampai kondisi pasien benar-benar pulih. Sejalan dengan Sheyna, Z, dkk (2016) pengobatan operatif seperti histerektomi cocok dilakukan pada wanita berumur 40 tahun keatas dan

yang tidak menghendaki anak. Sementara miomektomi dilakukan pada tumordengan tangkai yang jelas yang dengan mudah dapat dijepit dan diikat, serta cocok bagi wanita yang masih menghendaki anak.

Yulianti, S, dkk (2015) penatalaksanaan medis yang dilakukan ialah dengan histerektomi. Sebelum dilakukan tindakan operatif, pasien mendapatkan transfusi darah dan asupan makanan yang baik untuk menormalkan kembali kadar hemoglobin dan kemudian dilakukan operasi. Setelah pasca operasi pasien dirawat sampai benar-benar pulih dan mendapat izin dokter untuk pulang. Tidak sejalan dengan Islimsyaf, A (2015) pengobatan mioma uteri dengan gejala klinik umumnya adalah tindakan histerektomi (pengangkatan rahim). Ibu yang melakukan operasi pengangkatan rahim dilakukan atas indikasi adanya mioma uteri.

Elgitha, R (2019) penatalaksanaan yang diberikan kepada pasien seperti ini meliputi tindakan konservatif dan tindakan operatif. Tindakan konservatif yang dilakukan pada kasus ini adalah pemberian tablet zat besi, antibiotik, anti perdarahan dan transfusi PRC. Tidak sejalan dengan Erlindawati dan Sri (2015) memberikan dukungan moral kepada penderita mioma uteri terlebih ibu yang belum mempunyai anak dapat merasa kehilangan harga dirinya sebagai seorang wanita.

G. Langkah VII: Evaluasi

Mengevaluasi semua perencanaan dan pelaksanaan gangguan reproduksi dengan mioma uteri berdasarkan referensi yang telah didapatkan

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan
1.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Mioma Uteri Di Rumah Sakit Bengkulu	Erlindawati dan Sri Sumiari	2015	Dukungan moral dari keluarga terutama suami	Dukungan dari orang-orang terdekat sangat diperlukan untuk membantu proses penyembuhan kepada ibu	Kurang menjelaskan secara detail mengenai asuhan pada kasus mioma uteri sehingga angka kejadian mioma uteri tidak mengalami penurunan secara drastic	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif sederhana karena peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpul dengan lembar pengumpulan data peneliti

2.	Hubungan Usia Reproduksi Dengan Kejadian Mioma Uteri Di Ruang Tulip Rs TK. II dr Soepraoen Kesdam V Brawijaya	Zainal, A	2015	Pemberian antibiotic	Pemberian antibiotic dianggap perlu, dapat dilakukan laparotomi percobaan dan tindakan selanjutnya dapat disesuaikan dengan apa yang ditemukan waktu perut dibuka.	Penelitian bersifat non reaktif karena menggunakan data sekunder sehingga data yang diperoleh kurang akurat dibandingkan dengan penelitian lain	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan melakukan analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik.
3.	Hubungan Paritas Dengan Kejadian Mioma Uteri Di RSUD Dr. Goeteng Tarunadibrata Purbalingga	Mariah, U	2017	Pemeriksaan secara rutin	Melakukan pemeriksaan secara rutin untuk ibu yang sudah merasakan tanda dan gejala mioma uteri. Karena pertumbuhan mioma uteri dimana terjadinya peningkatan hormone estrogen yang tidak stabil karena adanya proses penyembuhan/involusi	Kurangnya kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lain sehingga sulit untuk memberikan penanganan secara tepat pada pasien	Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik <i>Purposive Sampling</i> yaitu penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah sehingga data yang

					uterus yang belum sempurna.		diperoleh lebih lengkap
4.	Evaluasi pasca Radiofrequency Thermal Ablation pada Mioma Uteri dan Adenomiosis	Dinata, dkk	2015	Melakukan terapi bedah	Melakukan tindakan operasi pada ibu yang mengalami mioma uteri karena mioma uteri yang besar dapat diangkat secara laparoskopik pada pasien yang menolak histerektomi.	Kurangnya data yang diperoleh dari rumah sakit sehingga perlu dilengkapi dan di perbaiki agar lebih jelas dan mudah dipahami	Pada penelitian pendahuluan ini, miolisis dengan radiofrequency thermal ablation telah berhasil mengurangi volume mioma uteri dan adenomiosis serta menghilangkan gejalanya.
5.	Optimisme Kebutuhan Pada Penderita Mioma Uteri	Setyana, M, Dkk	2015	Pengobatan mioma uteri	Tindakan pembedahan perlu dilakukan karena merupakan pengobatan utama mioma uteri. Miomektomi merupakan pengambilan sarang mioma tanpa pengangkatan uterus/rahim.	Penelitian ini hanya perfokus pada penanganan mioma uteri dan tidak melakukan tindakan pencegahan terjadinya mioma uteri	Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik total sampling karena sampel telah memenuhi kriteria penelitian yaitu ibu melahirkan bayi dengan diagnosis mioma uteri secara klinis

6.	Karakteristik Penderita Mioma Uteri Yang Di Rawat Di RSUD dr Pirngadi Medan Tahun 2016-2017	Linda, Y, dkk	2017	Perawatan mioma uteri	Penderita harus menjalani beberapa pemeriksaan, dan kemudian mendapat perawatan dari pihak rumah sakit sampai kondisi pasien benar-benar pulih.	Tidak melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian mioma uteri belum terjadi penurunan secara signifikan.	Menggunakan metode yang benar. Teknik sampling yang digunakan yaitu <i>Accidental sampling</i> sehingga data yang diperoleh lebih lengkap
7.	Karakteristik Penderita Mioma Uteri Rawat Inap Di Rumah Sakit Tentara TK-IV Pematangsiantar 2016	Sheyna, Z, dkk	2016	Histerektomi	Pengobatan operatif histerektomi cocok dilakukan pada wanita berumur 40 tahun keatas dan yang tidak menghendaki anak. Sementara miomektomi dilakukan pada tumordengan tangkai yang jelas dengan mudah dapat dijepit dan diikat, serta cocokbagi wanita yang masih menghendaki anak.	Penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana cara menekan angka kejadian mioma uteri sehingga angka kejadian mioma uteri tidak terjadi penurunan secara signifikan	Menggunakan metode yang sesuai yaitu <i>prospective study</i> yaitu penelitian analitik yang bersifat observasional.

8.	Karakteristik Penderita Mioma Uteri Rawat Inap Di RSUD Deli Sedang Lubuk Pakam Tahun 2013-2015	Yulianti, s. dkk	2015	Evaluasi asuhan yang diberikan	penatalaksanaan medis yang dilakukan ialah dengan histerektomi. Sebelum dilakukan tindakan operatif, pasien mendapatkan transfusi darah dan asupan makanan yang baik	Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan desain case series	Populasi penelitian ini adalah seluruh data penderita mioma uteri rawat inap di RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam
9.	Karakteristik Mioma Uteri Di RSUD Prof DR Margono Soekarjo Banyumas	Islimsyaf, A	2015	Melakukan terapi miomektomi	Tindakan histerektomi (pengangka tan rahim) dilakukan pada ibu yang melakukan operasi pengangkatan rahim dilakukan atas indikasi adanya mioma uteri	Penelitian ini tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistic dengan kehamilan pada remaja dengan kejadian mioma uteri	Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis deskriptif dan analisis inferensia. Teknik penelitian ini bertujuan untuk mengambil kesimpulan untuk populasi dengan menganalisis sampel yang digunakan.

10.	Mioma Geburt Dengan Anemia Laporan Kasus	Elgitha, R	2019	Transfusi darah	Tindakan konservatif yang dilakukan pada kasus ini adalah pemberian tablet zat besi, antibiotik, anti perdarahan dan transfusi PRC.	Tidak menerapkan upaya preventif dalam menekan angka kejadian mioma uteri sehingga angka kejadian mioma uteri tidak mengalami penurunan secara signifikan.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan retrospective study dengan tujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan social
-----	--	------------	------	-----------------	---	--	---

7. Perbandingan langkah 7

Erlindawati dan Sri (2015) dukungan dari orang-orang terdekat sangat diperlukan untuk membantu proses penyembuhan kepada ibu. Tidak sejalan dengan Zainal, A (2015) Pemberian antibiotic dianggap perlu, dapat dilakukan laparotomi percobaan dan tindakan selanjutnya dapat disesuaikan dengan apa yang ditemukan waktu perut dibuka.

Mariah, U (2017) melakukan pemeriksaan secara rutin untuk ibu yang sudah merasakan tanda dan gejala mioma uteri. Karena pertumbuhan mioma uteri dimana terjadinya peningkatan hormone estrogen yang tidak stabil karena adanya proses penyembuhan/involusi uterus yang belum sempurna. Tidak sejalan dengan Dinata, dkk (2015) melakukan tindakan operasi pada ibu yang mengalami mioma uteri karena mioma uteri yang besar dapat diangkat secara laparoskopik pada pasien yang menolak histerektomi.

Setyana, M, dkk (2015) tindakan pembedahan perlu dilakukan karena merupakan pengobatan utama mioma uteri. Miomektomi merupakan pengambilan sarang mioma tanpa pengangkatan uterus/rahim. Sejalan dengan Linda, Y, dkk (2017) penderita harus menjalani beberapa pemeriksaan, dan kemudian mendapat perawatan dari pihak rumah sakit sampai kondisi pasien benar-benar pulih.

Sheyna, Z, dkk (2016) pengobatan operatif histerektomi cocok dilakukan pada wanita berumur 40 tahun keatas dan yang tidak menghendaki anak. Sementara miomektomi dilakukan pada tumordengan tangkai yang jelas yang dengan mudah dapat dijepit dan diikat, serta cocokbagi wanita yang masih menghendaki anak. Sependapat dengan Yulianti, S dkk (2015) penatalaksanaan medis yang dilakukan ialah dengan histerektomi. Sebelum dilakukan tindakan

operatif, pasien mendapatkan transfusi darah dan asupan makanan yang baik.

Islimsyaf, A (2015) tindakan histerektomi (pengangkatan rahim) dilakukan pada ibu yang melakukan operasi pengangkatan rahim dilakukan atas indikasi adanya mioma uteri. Sependapat dengan Elgitha, R (2019) tindakan konservatif yang dilakukan pada kasus ini adalah pemberian tablet zat besi, antibiotik, anti perdarahan dan transfusi PRC.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Telaah *Evidence Based Learning* Asuhan 7 Langkah Varney Berdasarkan Hasil Penelusuran Referensi

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang asuhan kebidanan pada bayi berdasarkan referensi yang telah di temukan. Dalam hal ini pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan asuhan kebidanan dengan 7 langkah varney yaitu: pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potesial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

1. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan mengumpulkan semua referensi yang berkaitan dengan data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien, riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium. (Manguji, 2012: 5).

Dari hasil telaah literatur yang didapatkan pada kasus gangguan sistem dengan mioma uteri reproduksi dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi lengkap mengenai mioma uteri. Mioma uteri atau tumor jinak dari otot rahim adalah salah satu masalah kesehatan

reproduksi wanita yang sangat penting. Jumlah penderita mioma uteri ini sulit diketahui secara akurat karena banyak yang tidak menimbulkan keluhan sehingga penderita tidak memeriksakan dirinya ke dokter oleh sebab itu setiap tahun selalu terjadi peningkatan kejadian mioma uteri (Manuaba, Ida A.C, 2013). Mioma uteri merupakan tumor jinak otot rahim disertai jaringan ikatnya, sehingga dapat dalam bentuk padat karena jaringan ikatnya dominan dan lunak serta otot rahimnya dominan. (Ida Ayu Sri Kusuma, 2010:87).

Mioma adalah suatu tumor jinak pada rahim yang berasal dari otot Rahim. Tumor ini letaknya pada alat reproduksi wanita, asal mulanya penyakit mioma uteri. Beberapa teori menyebutkan pertumbuhan tumor ini disebabkan rangsangan hormon estrogen. Pada jaringan mioma jumlah reseptor estrogen lebih tinggi dibandingkan jaringan otot kandungan miomametrium sekitarnya, sehingga mioma uteri ini sering kali tumbuh lebih cepat pada kehamilan membesar pada usia reproduksi biasanya mengecil pada pasca menopause (Sarwono, 2014:274).

Adapun gejala dan tanda yang sering ditemukan pada ibu yang mengalami gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri yaitu adanya hormon estrogen dan progesterone dependen selama kehamilan, mioma sama-sama cenderung tumbuh menyusut atau tidak menunjukkan perubahan, mioma menurun setelah menopause karena berkurangnya hormon yang beredar, setiap mioma berasal dari monoclonal. Gejala dan hanya ditemukan pada pemeriksaan fisik atau USG. Gejala lebih terkait

dengan situs daripada ukuran, misalnya mioma submukosa berdiameter 2 cm sering akan menyebabkan perdarahan menstruasi yang tidak normal, sedangkan mioma subserosa berdiameter 2 cm biasanya akan bersifat tanpa gejala.

Masalah menstruasi, perdarahan menstruasi yang berat terjadi pada 30% meskipun waktu menstruasi biasanya tidak berubah. Kehilangan intermenstrual dapat terjadi jika mioma bersifat submukosa atau polypoid. Mioma umumnya terjadi pada wanita reproduksi dan mungkin incidental masalah menstruasi mungkin juga merupakan hasil dari ketidakaturan hormonal.

Nyeri mioma dapat menyebabkan dismenorhea, jarang menyebabkan rasa sakit kecuali torsion, degenerasi merah atau perubahan sarkomatosa. Gejala lain mioma dapat menekan kandung kemih dapat menyebabkan frekuensi retensi urin, yang menekan ureter dapat menyebabkan hidronefrosis, efek tekanan lainnya juga biasa dirasakan. Kesuburan bisa terganggu jika tuba atau mioma submukosa mencegah implantasi (Wiley Blackwell, 2017:23).

Ada beberapa faktor predisposisi terjadinya mioma uteri.

a. Estrogen

Mioma uteri dijumpai setelah menarche, sering kali pertumbuhan tumor yang cepat selama kehamilan terjadi dan dilakukan terapi estrogen eksogen. Mioma uteri akan mengecil pada saat menopause. Mioma uteri banyak ditemukan bersamaan dengan anovulasi ovarium

dan wanita dengan sterilitas. Enzim *hidroxydesidrogenase* mengubah estradiol (sebuah estrogen kuat) menjadi estrogen (estrogen lemah). Aktivitas enzim ini berkurang pada jaringan miomatous, yang juga mempunyai jumlah reseptor yang lebih banyak daripada *miometrium* normal.

b. Progesteron

Progesteron menghambat pertumbuhan tumor dengan dua cara, yaitu mengaktifkan *hidroxydesidrogenase* dan menurunkan jumlah reseptor estrogen pada tumor.

c. Hormon pertumbuhan (growth hormon)

Level hormon pertumbuhan menurun selama kehamilan, tetapi hormon yang mempunyai struktur dan aktivitas biologis serupa yaitu HPL, terlihat pada periode ini dan memberi kesan bahwa pertumbuhan yang cepat dari leiomioma selama kehamilan mungkin merupakan hasil dari aksi sinergistik antara HPL dan estrogen.

d. Umur

Mioma uteri ditemukan sekitar 20% pada wanita usia produktif dan sekitar 40 tahun. Mioma uteri jarang ditemukan sebelum menarche. (sebelum mendapatkan haid).

e. Hormon Endogen (endogenous hormonal)

Konsentrasi estrogen pada jaringan mioma uteri lebih tinggi daripada jaringan miometrium normal.

f. Riwayat keluarga

Wanita dengan garis keturunan dengan tingkat pertama dengan penderita mioma uteri mempunyai 2,5 kali kemungkinan untuk menderita mioma dibandingkan dengan wanita tanpa garis keturunan penderita mioma uteri.

g. Kehamilan

Kehamilan dapat mempengaruhi mioma uteri karena tingginya kadar estrogen dalam kehamilan jika ibu sedang hamil maka janin dan mioma akan bersaing makanan sedangkan vaskularisasi lebih banyak ke mioma sehingga dapat mempercepat pembesaran mioma uteri dibandingkan ke janin, sehingga janin kecil, karena kurangnya asupan makanan.

h. Paritas

Mioma uteri lebih sering terjadi pada wanita multipara dibandingkan dengan wanita yang mempunyai riwayat melahirkan 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali. Faktor terbentuknya tumor.

2. Langkah II: Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan semua referensi yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosa atau masalah (Mangkuji, 2012: 5).

Mioma uteri merupakan jenis tumor jinak yang paling umum ditemukan dari berbagai jenis tumor jinak lainnya. Mioma uteri adalah tumor jinak pada daerah rahim atau lebih tepatnya otot rahim dan jaringan ikat di

sekitarnya. Mioma uteri menempati urutan kedua setelah kanker serviks berdasarkan jumlah angka kejadian penyakit. Mioma uteri ialah neoplasma jinak yang berasal dari otot uterus dan jaringan ikat. Neoplasma ialah pertumbuhan jaringan baru yang tidak normal pada tubuh, dan dikenal juga dengan istilah tumor yang banyak terjadi pada organ reproduksi wanita (Ahmad, S, dkk, 2016: 153).

Penyebab kejadian mioma uteri belum diketahui secara pasti, diduga merupakan penyakit multifaktorial. Faktor penduga pertumbuhan mioma uteri antara lain umur, paritas, faktor ras dan genetik (riwayat keluarga), usiamenarche, obesitas, serta *hormone estrogen dan progesteron* (Fahrunniza et al, 2015).

3. Langkah III: Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini merupakan langkah ketika melakukan identifikasi diagnosis atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan harus waspada menghadapi diagnosis/masalah potensial yang benar-benar terjadi (Jannah, 2012: 206-207).

Sebagai hasil telaah literatur yang didapatkan bahwa masalah potensial yang bisa terjadi pada gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri yaitu perdarahan abnormal, gangguan miksi, dan menimbulkan infertilitas. Seperti dalam bentuk hal untuk mencegah terjadinya perdarahan bidan dan tenaga kesehatan yang terlibat harus memastikan bahwa rahim klien sudah dalam keadaan bersih dan jaringanjaringan mioma yang masih

menempel pada rahim (Frisca Tresnawati, 2013:192).

Dampak yang akan terjadi pada pasien gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri yaitu pertumbuhan limioma, torsi (putaran tungkai), nekrosis dan infeksi. Diagnosis potensial harus dipertimbangkan ketika ada pertumbuhan, mioma pada wanita pasca menopause atau mioma yang membesar dengan cepat atau timbulnya nyeri yang mendadak pada wanita dari segala usia (Manuaba, 2012).

4. Langkah IV: Identifikasi Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi

Pada langkah ini, yang dilakukan oleh bidan adalah mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk konsultasi atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi klien. (Manguji, 2012: 6).

Dari hasil telaah literature yang didapatkan pada gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri perlu dilakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Pada kasus mioma uteri perdarahan dapat terjadi apabila pertolongan tidak diberikan pada waktunya. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan segera seperti memasang infus dan mengecek Hb. Jika hb klien sudah terlalu rendah atau kurang dari 8 g/dl maka harus segera dilakukan transfusi darah untuk mencegah terjadinya anemia.

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera konsultasi, kolaborasi atau rujukan sesuai dengan kondisi pasien. Proses manajemen kebidanan dilakukan secara kontinu sehingga menghasilkan data baru yang segera harus dinilai. Jika data yang muncul menggambarkan suatu keadaan darurat maka bidan harus bertindak segera untuk menyelamatkan jiwa ibu. Pada kasus mioma uteri dibutuhkan kolaborasi dengan dokter obgyn sebelum dan sesudah dilakukan operasi untuk menilai kondisi ibu. Tindakan yang dilakukan yaitu pemeriksaan USG untuk melakukan selanjutnya.

Terjadinya mioma uteri disebabkan oleh berbagai macam faktor salah satunya itu faktor genetik, usia sehingga dapat menimbulkan masalah yang berat bagi ibu. Maka dari itu perlu dilakukan tindakan operasi dengan berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian asuhan yang tepat dan cepat.

Tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi pada memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit, nutrisi, istirahat, memonitor, hemodinamik, nilai laboratorium, dan jumlah perdarahan, integritas personal dan sosial yaitu memberikan dukungan kepada pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit serta persiapan untuk perawatan di rumah.

5. *Langkah V: Rencana Tindakan*

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh berdasarkan langkah sebelumnya. Semua perencanaan yang dibuatkan harus berdasarkan pertimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, teori *Up To Date*, perawatan berdasarkan bukti (*evidence based care*) (Jannah, 2012: 208-209).

Untuk menghindari perencanaan asuhan yang tidak terarah, maka perlu dilakukan penerapan hasil telaah literatur yang didapatkan bahwa rencana asuhan yang diberikan adalah mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital, memberi intake infuse, berkolaborasi dengan dokter spOG untuk melakukan pemeriksaan USG, untuk melihat jenis dan bentuk dari mioma uteri itu sendiri. Agar dapat dilakukan tindakan segera seperti melakukan histerektomi. Histerektomi adalah bedah pengangkatan rahim (uterus) yang sangat umum dilakukan. Biasanya histerektomi merupakan terapi pilihan pada wanita tua, wanita yang tidak ingin memiliki keturunan lagi dan pasien yang mengalami perdarahan haid berlebihan atau gejala penekanan oleh massa tumor

Melakukan pemeriksaan tanda KU, vital sign, pemeriksaan fisik, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, perkusi. Perlunya tindakan segera/kolaborasi oleh dokter SpOG untuk dikonsultasikan seperti pemasangan infus, pemberian obat:

- 1) Ringer Laktat (RL): Dextrose (Ds): 2:1/28 tetes/menit
- 2) Injeksi: Cefotaxime 1 gr / 12 jam / IV

- 3) Drips Metronidazole 0,5 gr / 8 jam / IV
- 4) Ketorolac 1 amp / 8 jam / IV
- 5) Ranitidine 1 amp / 8 jam / IV
- 6) Transamin 1 amp / 8 jam / IV

6. Langkah VI: Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang diuraikan pada langkah kelima di atas dilaksanakan secara efisien dan aman. Realisasi dari perencanaan dapat dilakukan oleh bidan, pasien, atau anggota keluarga lain. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab atas terlaksananya seluruh perencanaan (Jannah, Nurul, 2012: 209).

Implementasi yang diberikan pada ibu berdasarkan hasil telaah literatur yang didapatkan yaitu menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menyampaikan hal-hal yang dianggap penting, agar ibu dapat mengetahui perkembangan penyakit yang diderita serta merupakan tujuan utama pelayanan antenatal.

Jelaskan penyebab terjadinya mioma uteri agar ibu tahu cara mengatasi mioma uteri yang diderita. Dan anjuran ibu untuk melakukan pemeriksaan secara rutin disamping itu ibu harus menjaga pola nutrisi. Istirahat yang cukup serta kebersihan diri yang harus terjaga. Serta mengajurkan ibu untuk melakukan teknik relaksasi seperti melakukan massase, kompres bagian yang terasa nyeri dan mendengarkan murottal untuk mengurangi nyeri yang dirasakan.

7. Langkah VII: Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat di anggap efektif juga memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Adapun kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut efektif sedangkan sebagian belum efektif.

Pada prinsip tahapan evaluasi berdasarkan hasil telaah literature yang didapatkan adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai ke efektifan tindakan yang diberikan dan keberhasilan dapat dilihat dari dari kondisi ibu. Evaluasi yang dilakukan pada kasus mioma uteri yaitu antara lain keadaan umum, tanda-tanda vital, tanda-tanda syok, konstipasi dan kadung kemih, perdarahan, apakah terjadi anemia, dan tanda-tanda infeksi atau masalah potensial yang kemungkin akan terjadi.

B. Implantasi Kebidanan

Mioma uteri adalah neoplasma jinak yang berasal dari otot uterus dan jaringan ikat yang menopangnya. Mioma uteri dikenal juga dengan dengan istilah fibriomioma, leiomioma, ataupun fibroid¹. Mioma uteri merupakan salah satu masalah kesehatan utama dan merupakan tumor yang paling banyak diderita para wanita saat mendekati masa menopause. Mioma adalah

tumor jinak *miometrium* dengan ciri tersendiri, bulat keras, berwarna putih hingga merah muda pucat, sebagian besar terdiri otot polos dengan beberapa jaringan ikat (Ralph C. Benson, M.D, 2013:546).

Mioma uteri sebagai tumor monoklonal yang tumbuh dari jaringan otot halus di uterus yaitu pada lapisan miometrium. Tumor ini tergolong dalam tumor jinak yang terdiri dari miofibroblas-miofibroblas tidak beraturan yang terkubur dalam matriks ekstraseluler yang berjumlah besar. Matriks ekstraseluler ini sendiri berkontribusi cukup besar pada volume tumor. Kejadian yang mencetuskan tumor ini sendiri masih belum diketahui secara pasti (Vilos G, Allaire C, Laberge P, 2015;37(2):157-178)

Mioma uteri yang terjadi dapat menimbulkan komplikasi jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat seperti perdarahan abnormal, gangguan miksi, dan menimbulkan infertilitas. Pertumbuhan limioma, torsi (putaran tungkai), nekrosis dan infeksi. Diagnosis potensial harus dipertimbangkan ketika ada pertumbuhan, mioma pada wanita pasca menopause atau mioma yang membesar dengan cepat atau timbulnya nyeri yang mendadak pada wanita dari segala usia (Manuaba, 2012).

Pencegahan mioma uteri dari hasil telaah literature yang didapatkan yaitu menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan secara rutin untuk mendeteksi dini komplikasi yang akan terjadi. Mengajukan ibu untuk menjaga asupan nutrisi seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang antaranya buah-buahan, sayuran hijau, kacang-kacangan, daging dan telur. Mengajukan ibu untuk tetap berolahraga dan istirahat dengan cukup. Memberikan dukungan kepada ibu dan menganjurkan anggota keluarga untuk mendampingi ibu dan memberikan dukungan agar proses penyembuhan ibu lebih cepat.



BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penulisan literatur review dengan kehamilan disertai anemia sedang serta menghubungkan dengan teori dan Avidance Based maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu:

A. Kesimpulan

1. Telah dilakukan identifikasi data dasar pada ibu yang mengalami gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri berdasarkan referensi maka didapatkan bahwa Mioma uteri merupakan tumor jinak otot rahim disertai jaringan ikatnya, sehingga dapat dalam bentuk padat karena jaringan ikatnya dominan dan lunak serta otot rahimnya dominan
2. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa / masalah aktual pada ibu yang mengalami gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri berdasarkan referensi maka didapatkan diagnosa aktual dilihat dari data subjektif yang diperoleh dari hasil anamnesa dan data objektif didapatkan dari hasil pemeriksaan antenatal dan pemeriksaan ultrasonografi (USG) serta pemeriksaan laboratorium.
3. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa / masalah potensial pada ibu yang mengalami gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri berdasarkan referensi maka didapatkan diagnosa potensial diantisipasi terjadinya pendarahan, anemia dan infeksi.

4. Telah dilakukan pengidentifikasian tindakan segera dan kolaborasi pada ibu yang mengalami gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri berdasarkan referensi yang didapatkan maka tindakan segera dilakukan untuk melakukan histerektomi atau bedah pengangkatan Rahim (uterus) yang sangat umum dilakukan.
5. Telah dilakukan pengidentifikasian tindakan asuhan pada ibu yang mengalami gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri berdasarkan referensi maka didapatkan tindakan asuhan sesuai dengan intervensi yaitu melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Memberbaiki pola nutrisi ibu serta memberikan pengetahuan kepada ibu mengenai mioma uteri.
6. Telah dilakukan evaluasi asuhan kebidanan pada ibu yang mengalami gangguan sistem reproduksi dengan mioma uteri berdasarkan referensi maka didapatkan hal-hal yang harus di evaluasi yaitu penanganan mioma uteri agar tidak menimbulkan komplikasi pada ibu.

B. Saran

Melihat besarnya efek yang ditimbulkan dengan adanya masalah gangguan sistem reproduksi yang akan berdampak pada buruknya keadaan ibu maka perlu diberikan tindakan yang tepat dan segera untuk mengantisipasi masalah tersebut. Oleh karena itu, adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya masalah pada ibu yang mengalami mioma uteri maka perlu peningkatan kualitas pelayanan ANC dan pertolongan yang cepat dan tepat, sehingga dapat segera diantisipasi kemungkinan masalah lain yang dapat terjadi.
2. Seorang bidan harus dapat menilai dan mengetahui penyulit-penyulit yang dapat terjadi serta memberikan tindakan yang efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

- Apriani Yosi, Sumarni Sri. *:/jurnal Kebidanan. Faktor – faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Mioma Uteri Di RSUD dr. Adhyatma Semarang*. Diakses tanggal 17 Januari 2017.
- Aspiani, Y, R. *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Maternitas*. Jakarta: 2017
- Ahmad Syahlani, *Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Mioma Uteri*, *Dinamika Kesehatan*, Vol 7 No. 3 Juli 2016.
- Amrina Octaviana Pramajaya R.: *// Jurnal Keperawatan Usia Paritas dengan Kejadian Mioma Uteri*, Volume X, No.2 Oktober 2014.
- Anwar A, Baziad A, Prabowo P. *Ilmu Kandungan*. 3rd ed. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2011.
- Astuti, dkk. *Manajemen Asuhan Kebidanan Gangguan Sistem Reproduksi pada Ny “S” dengan Mioma Submukosa di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 04 Februari – 25 Februari Tahun 2019*. *Jurnal Midwifery* Vol 2 No 1 (2020).
- Devy, I. *Hubungan Faktor Risiko dan Kejadian Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang*. *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2015.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, *profil kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan* 2014.
- Dinata, dkk. *Evaluasi pasca Radiofrequency Thermal Ablation pada Mioma Uteri dan Adenomiosis*. Vol 31, No 2 | April 2015.
- Elgitha, R. *Mioma Geburt Dengan Anemia Laporan Kasus*. Vol. 1 | No. 1 | Februari 2019 | *Jurnal Medical Profession (MedPro)*.
- Erlindawati dan Sri Sumiari. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Mioma Uteri Di Rumah Sakit Bengkulu*. *Jurnal Kesehatan* 2015.
- Faisal Yatim, DTM&H. MPPH. 2008. *Penyakit Kandungan*. Jakarta: Pustaka Populer Obor.
- Fridasi Fir Pra operasi di Pekalongan, Vol 2 september 2012.
- Hadibroto, B. R. *Mioma Uteri*. *Majalah Kedokteran Nusantara. Jurnal E-Clinic*, 38. 2013.

- Hana, a, dkk. *Karakteristik Penderita Mioma Uteri Di RSUP Prof DE. R.D Kondou Manado*. Jurnal Medik dan Rehabilitasi (JMR), Volume 1, Nomor 3, Januari 2019.
- Hollingworth Tony. *Diagnosis Banding Dalam Obstetri & Ginekologi*. Jakarta: 2012.
- Ida Ayu. *Asuhan Kebidanan 11*. Jakarta: Trans Info Media, 2015
- Irianti Bayu, dkk. *Asuhan Kehamilan Berbasis Bukti*. Jakarta: C.V. Sagung Seto, 2014.
- Islimsyaf, A. *Karakteristik Mioma Uteri Di RSUD Prof DR Margono Soekarjo Banyumas*. Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Kesehatan, Vol 13 No 3, DESEMBER 2015.
- Jannah, Nurul. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012.
- Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak Akademik KEBIDANAN An-Nur, Volume 1, nomor 1, Desember, 2016
- Jurnal Nurul. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan-Kehamilan*. Yogyakarta: C.V OFFSET, 2012.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan tajwid*. Bandung: PT Sigma Examedia Arkanlema, 2015.
- Laurensia, L. *Asuhan kebidanan Gangguan Reproduksi pada Ny. N Post Histerektomi dengan indikasi Mioma Uteri di RSUD Moe*ardi Surakarta*, 2012.
- Lilis, dkk. *Hubungan Usia Reproduksi dengan Kejadian Mioma*. Jurnal e-CliniC (eCl), Volume 1, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 26-30.
- Lindah, Y, dkk. *Karakteristik Penderita Mioma Uteri Yang Di Rawat Di RSUD dr Pirngadi Medan Tahun 2016-2017*. Jurnal Kesehatan 2017.
- Manguji, Betty, dkk. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah Soap*. Jakarta: EGC, 2012.
- Marni, dkk, *Kesehatan Reproduksi*. Celeban Timur. Pustaka Pelajar, 2014.
- Manuaba IBG. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. EGC, 2013.
- Mariah, U. *Hubungan Paritas Denga Kejadian Mioma Uteri Di RSUD Dr. goteng Tarunadibrata Purbalingga*. Volumue 10/ Septermber 2017.
- Nugroho, *Keperawatan gerontik & geriatrik, edisi 3*. Jakarta: EGC, 2012.

- Nurita, N. *Perbedaan Resiko Terjadinya Mioma Uteri antara Faktor Usia Menikah dan Faktor Paritas pada Ibu di Poli Kandungan Rumah Sakit TK IV Kota Kediri*. Jurnal Bidan Pintar 2019.
- Novalia, W. *Hubungan Obesitas Dan Riwayat Keluarga Dengan Kejadian Mioma Uteri Di Ruang Poli Kandungan RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh banjarmasin Tahun 2016*. Dinamika Kesehatan, Vol 9 No. 1 Juli 2018.
- Pratiwi, L. *Hubungan Usia Reproduksi Dengan Kejadian Mioma Uteri Di Rsup. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado*. *E-Clinic*, 1(1), 26–30. <https://doi.org/10.35790/ecl.1.1.2013.3286>, 2013.
- Purwodadi:/Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak. Akademik Kebidanan An-Nur, Volume 1, Nomor 1 Desember 2016.
- Prawihardjo Sarwono, Doktor, dr.prof. Ilmu Kandungan. Jakarta: PT Bina Pustaka, 2014.
- Rajuddin dan Donny. *Kehamilan Denga Mioma Uteri Post Miomektomi*. Jurnal Averrous Vol.4 No.1 2018
- Sabrianti pasinggi. *Prevalensi Mioma Uteri Berdasarkan Umur Di RSUP Prof. Dr. R.D Kondou Manado Tahun 2013-2014*. Jurnal e-clinic (eCl), (Volume 3, Nomor 1 Januari-April 2015).
- Salim Anwar Islimsyaf :/ Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Kesehatan, Vol 13 No 3, Desember 2015.
- Setyana, dkk. *Optimisme Kebutuhan Pada Penderita Mioma Uteri*. Jurnal Psikologi Undip Vol.13 No.1 April 2015.
- Shihab Quraish Tafsir Al- Mishbah. Edited by L. S. Bahar. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sheyna, Z, dkk. *Karekateristik Penderita Mioma Uteri Rawat Inap Di Rumah Sakit Tentara TK-IV Pematangsiantar 2016*. Jurnal Kebidanan 2016
- Tresnawati Frisca. *Asuhan Kebidanan*. PT. Prestasi Pustakaraya Jakarta: 2013.
- Tony Hollingworth, *Diagnosis Banding Dalam Obstetri & Ginekologi*, Jakarta, 2012.
- Th Endang Purwoastuti. *Ilmu Obstetri dan Ginekologi Sosial untuk Kebidanan*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta: 2015
- Wisman, A, dkk. *Hubungan Usia dan Paritas dengan Kejadian Mioma Uteri di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Periode Januari 2016–Januari 2017*. Syifa'MEDIKA, Vol. 4 (No.1), September 2017.
- Yulianti, S, dkk. *Karakteristik Penderita Mioma Uteri Rawat Inap Di RSUD Deli Sedang Lubuk Pakam Tahun 2013-2015*. Jurnal Dunia Bidan 2015.

Zainal, A. *Hubungan Usia Reproduksi Dengan Kejadian Mioma Uteri Di Ruang Tulip Rs TK. II dr Soepraoen Kesdam V Brawijaya*. Jurnal Kebidanan 2015.



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama : ST HUSNAYENI

Nim : 70400117065

TTL : Makassar, 02 Oktober 1999

Suku : Makassar

Agama : Islam

Alamat : Jl. Bontobiraeng No.4

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006-2011 SDN INPRES MANGASA.
2. Tahun 2011-2014 SMP NEGERI 2 SUNGGUMINASA
3. Tahun 2014-2017 SMA NEGERI 1 SUNGGUMINASA
4. Tahun 2017-2021 Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.