

**UJI IN VITRO AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK
DAUN MAJAPAHIT (*Crescentia cujete* L.) DALAM
MENGHAMBAT PERTUMBUHAN *Salmonella typhi***



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NASRAHWATI
NIM. 60300117007

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrahwati
NIM : 60300117007
Tempat/Tgl. Lahir : Takalar, 08 November 1999
Jurusan/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : BTN Bonto Majannang Indah, Desa Bontoala, Kecamatan
Pallangga, Kabupaten Gowa
Judul Skripsi : Uji In Vitro Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Majapahit
(*Crescentia Cujete L.*) dalam Menghambat Pertumbuhan
Salmonella Typhi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 04 Oktober 2021
Penyusun,



Nasrahwati

NIM: 60300117007

UNIVERSITAS ISLAM NEGARA
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Nasrahwati, NIM: 60300117007, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi berjudul “Uji In Vitro Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Majapahit (*Crescentia Cujete* L.) dalam Menghambat Pertumbuhan *Salmonella Typhi*”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, 04 Oktober 2021



Dr. Mahsuri Masri, S.Si., M.Kes

Pembimbing I



Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd

Pembimbing II

UNIVERSITAS
ALAUDDIN
MAKASSAR


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji In Vitro Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Majapahit (*Crescentia Cujete* L.) dalam Menghambat Pertumbuhan *Salmonella Typhi*”, yang disusun oleh Nasrahwati, NIM: 60300117007, mahasiswa jurusan Biologi pada Fakultas sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 04 Oktober 2021 M bertepatan dengan 27 safar 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).


Gowa, 04 Oktober 2021

27 Safar 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. M. Halifah Mustami, M.Pd ()
Sekretaris : Devi Armita, S.Si., M.Si ()
Munaqisy I : Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd ()
Munaqisy II : Dr. Muhammad Suhufi, S.Ag., M.Ag ()
Pembimbing I: Dr. Mahsuri Masri, S.Si., M.Kes ()
Pembimbing II: Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd ()

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. M. Halifah Mustami, M.Pd
NIP. 497104122000031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Untaian kata yang mampu penulis ucapkan atas segala nikmat yang Allah swt. berikan yaitu ucapan alhamdulillah puji syukur atas segala karunia yang Allah swt. titipkan. Ada banyak sekali kenikmatan yang Allah swt. berikan kepada setiap hamba-Nya yang bernaung di muka bumi ini, terutama kepada manusia. Allah swt. menganugerahkan akal pikiran kepada manusia sehingga dengan akal dan pikiran tersebut manusia lebih sempurna wujud fisik dan pemikirannya dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Penulis mengucapkan rasa syukur karena Allah swt. telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Uji In Vitro Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Majapahit (*Crescentia Cujete* L.) dalam Menghambat Pertumbuhan *Salmonella Typhi*”.

Shalawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. beliau adalah manusia sempurna yang pernah ada di muka bumi dan membawa Al-qur'an sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Al-qur'an tersebut terjaga keutuhannya hingga akhir zaman, sehingga setiap umat yang berpedoman kepada Al-qur'an dan hadist akan mampu berjalan di jalan yang benar.

Ada banyak tantangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan skripsi ini, namun semua itu dapat penulis hadapi karena adanya motivasi, dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada keempat orang tua penulis, Bapak Ahmad, Ayahanda Sudirman S. Sos., M.M, Ibunda Ramlah dan Ibunda Syamsiah. Penulis menyadari bahwa meskipun penulis mengucapkan terima kasih setiap detiknya kepada beliau, tetap tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa dan pengorbanan yang telah beliau berikan untuk penulis. Orang tua penulis adalah orang-orang yang hebat dan menginspirasi. Semoga Allah swt. selalu melimpahkan keberkahan hidup dan mengumpulkan kita semua di surga.

Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak sehingga dengan segenap jiwa dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV atas segala motivasi dan masukan yang telah diberikan kepada penulis untuk selalu melakukan hal-hal yang produktif.

2. Bapak Prof. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi beserta Wakil Dekan I, II dan III atas segala arahan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Ibu Dr. Masriany, S.Si., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Biologi dan Bapak Hasyimuddin, S.Si., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Biologi yang telah memberikan banyak sekali asupan ilmu dan motivasi agar penulis mampu menjadi mahasiswa yang baik dan berprestasi.
4. Bapak Dr. Mahsuri Masri, S.Si., M.Kes. Selaku pembimbing I, Ibu Ulfa Triyani A. Latief, S.Si., M.Pd. selaku pembimbing II dan Ibu Devi Armita, S.Si., M.Si. selaku pembimbing III yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat, masukan dan saran yang membangun terkait penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd. Selaku penguji I dan Bapak Dr. Muhammad Suhufi, S.Ag., M.Ag sebagai penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran terkait penyusunan skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi.
6. Ibu St. Aisyah Sijid, S.pd., M.Kes. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah mengontrol, memberikan arahan dan masukan terkait mata kuliah serta strategi pemecahan masalah yang tengah dihadapi oleh penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah mengajari penulis dengan baik sehingga ilmu tersebut

dapat penulis aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan skripsi ini juga dapat terselesaikan.

8. Kepala Laboratorium Jurusan Biologi Fakultas sains dan Teknologi yaitu bapak Zulkarnain, S.Si., M.Kes. serta kepada Ibu Faridah Ahmad, S.Pd. selaku Pranata Laboratorium Pendidikan Genetika. Kakak Nurman, S.Si. selaku Laboran Ekologi, Kakak Rahmat Fajrin Alir, S.Si. selaku Laboran Zoologi, Ibu Kurniati, S.Si. selaku Pranata Laboratorium Pendidikan Mikrobiologi dan kepada Kakak Ariati A. Ridha, S.Si. selaku Pranata Laboratorium Botani yang telah memberikan bimbingan dalam melakukan praktikum di Laboratorium dan di lapangan, sehingga penulis mendapatkan ilmu terkait cara melakukan penelitian dan menyusun laporan hasil penelitian.
9. Kakak Sumiati, S.Pd.I. selaku operator jurusan yang selalu sigap dan senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam pengurusan berkas.
10. Kakak Nuraini, S.Si. selaku Laboran Laboratorium Organik Jurusan Kimia Fakultas sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah membimbing penulis selama melakukan penelitian di Laboratorium Organik.
11. Kakak Risya Amriana dan kakak Dede beserta seluruh staf Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar (BBIHP) yang sangat membantu dan ramah kepada penulis selama melakukan penelitian.

12. Kakak Heriadi selaku asisten di Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains FMIPA Universitas Hasanuddin yang telah mendampingi dan mengarahkan penulis selama melakukan penelitian.
13. Keluarga besar, kakek, nenek, paman, bunda, saudara dan sepupu yang selalu memberikan dukungan material dan moril selama menjalani masa pendidikan.
14. Sahabat-sahabat penulis Ratna sari, Andri Mulyani, Sulastri, Nurhayati, Risna Wahyuni Syam, Suryalita, Hariyanto, Muhammad Arfah Effendi dan Muslimin yang telah memberikan banyak sekali nasehat dan bantuan kepada penulis sekaligus sebagai saksi perjalanan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
15. Teman-teman Interneuron (Angkatan 2017) yang merupakan rekan seperjuangan penulis dalam belajar dan berkembang bersama dalam mencapai impian selama hampir 4 (empat) tahun ini. Terima kasih atas sejarah indah nya orang-orang baik.

Penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya diiringi permohonan maaf kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah swt. memberikan balasan surga kepada orang-orang baik yang telah membantu penulis.


Penulis juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak yang membaca dan berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun

terkait skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu Sains dan dijadikan referensi oleh berbagai pihak.


Aamiin Allahumma Aamiin.

Gowa, 2021

Penyusun,



Nasrahwati




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iiiiv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ILUSTRASI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	
xivv	
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Ayat dan hadist yang Relevan.....	12
B. Tinjauan Umum Tanaman Majapahit (<i>Crescentia cujete</i> L.)	18
C. Tinjauan Umum Demam Tifoid.....	22
D. Tinjauan Umum Bakteri <i>Salmonella typhi</i>	26
E. Tinjauan Umum Uji Aktivitas Antibakteri Secara In Vitro	28
F. Kerangka Pikir	31
G. Hipotesis	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
C. Variabel Penelitian.....	33
D. Definisi Operasional Variabel.....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Alat dan Bahan.....	34
1. Alat.....	34
2. Bahan	34
G. Prosedur Kerja	35
1. Sterilisasi Alat	35
2. Pengambilan Sampel Daun Majapahit (<i>C. cujete</i> L.).....	35
3. Ekstraksi Daun Majapahit (<i>C. cujete</i> L.).....	36
4. Skrining Fitokimia	36
5. Uji Efektivitas Ekstrak Daun Majapahit (<i>C. cujete</i> L.) terhadap <i>Salmonella typhi</i> Secara <i>In Vitro</i>	37
6. Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	74
RIWAYAT HIDUP.....	101

DAFTAR TABEL

- Tabel 4. 1 Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Majapahit (*C. cujete* L.). 42
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Data Diameter Zona Hambat Ekstrak Daun Majapahit..... 43
Tabel 4. 3 Hasil Pengamatan KHM Ekstrak Etanol Daun Majapahit (*C. cujete* L) ... 46
Tabel 4. 4 Hasil Pengamatan KBM Ekstrak Etanol Daun Majapahit (*C. cujete* L.)... 47



DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 4. 1 Grafik Persentase Penghambatan Ekstrak Daun Majapahit (<i>C. cujete</i> L.) terhadap bakteri <i>S.typhi</i>	45
Gambar 4.2. Struktur Alkaloid.....	50
Gambar 4.3. Reaksi Uji Wagner	50
Gambar 4.4 Reaksi Uji Mayer	51
Gambar 4.5 Struktur Senyawa Flavonoid	52
Gambar 4.6. Struktur Dasar Isporen	54
Gambar 4.7. Struktur Kimia Tanin Terhidrolisis	56
Gambar 4.8. Struktur Kimia Tanin Terkondensasi	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Alur Kerja.....	74
Lampiran 2 Preparasi Sampel Daun Majapahit (<i>Crescentia Cujete L.</i>).....	75
Lampiran 3 Ekstraksi Daun Majapahit (<i>Crescentia kujete L.</i>).....	76
Lampiran 4 Skrining Senyawa Fitokimia.....	77
Lampiran 5 Perhitungan Konsentrasi Ekstrak.....	79
Lampiran 6 Uji Penghambatan Bakteri dengan Metode Difusi.....	81
Lampiran 7 Peremajaan dan Pembuatan Suspensi Bakteri <i>S. typhi</i>	82
Lampiran 8 Uji Penghambatan Bakteri dengan Metode Dilusi.....	83
Lampiran 9 Analisis Data.....	84
Lampiran 10 Pembuatan Simplisia.....	86
Lampiran 11 Proses Ekstraksi Daun Majapahit (<i>Crescentia Cujete L.</i>).....	88
Lampiran 12 Uji Penghambatan Bakteri <i>Salmonella typhi</i> dengan Metode Difusi.....	89
Lampiran 13 Skrining Fitokimia.....	91
Lampiran 14 Uji Penghambatan Bakteri <i>Salmonella typhi</i> dengan Metode Dilusi.....	93
Lampiran 15 Hasil Uji Konsentrasi Hambat Minimum (KHM).....	94



ABSTRAK

Nama : Nasrahwati
NIM : 60300117007
Judul Skripsi : Uji In Vitro Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Majapahit (*Crescentia Cujete L.*) dalam Menghambat Pertumbuhan *Salmonella Typhi*

Demam tifoid merupakan penyakit yang terjadi karena adanya infeksi usus halus yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi* dan ditularkan melalui rute *fecal-oral*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam daun majapahit (*Crescentia Cujete L.*), serta untuk mengetahui efek antibakteri *C. kujete L.* dalam menghambat pertumbuhan bakteri *S. typhi*. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif eksperimental dengan rancangan acak lengkap (RAL). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode maserasi untuk skrining senyawa fitokimia, metode yang digunakan untuk melihat zona hambat ekstrak yaitu difusi agar dan untuk menentukan nilai KHM dan KBM ekstrak etanol daun majapahit digunakan metode dilusi cair dan padat. Analisis hasil penelitian dilakukan dengan uji *One Way ANOVA* yang dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa ekstrak daun majapahit (*C. kujete L.*) mengandung senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid dan terpenoid, ekstrak tanaman majapahit (*C. kujete L.*) memiliki aktivitas penghambatan sedang pada konsentrasi ekstrak 20% yang dapat dilihat pada zona hambat yang terbentuk, KHM yang diperoleh yaitu pada perlakuan ekstrak 10% sedangkan KBM belum bisa ditentukan. Hasil uji *One Way ANOVA* dengan nilai signifikansi (α 0.000 < 0.05) menunjukkan ekstrak daun majapahit memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan *S. typhi*.

Kata Kunci: Antibakteri, Majapahit, *Salmonella typhi*

ABSTRACT

Name : Nasrahwati
Student ID Number : 60300117007
Title : **In Vitro Test Antibacterial Activity of Majapahit**
(*Crescentia Cujete* L.) Leaf Extract in Inhibiting the
Growth of *Salmonella Typhi*

Typhoid fever is a disease that occurs due to infection of the small intestine caused by the bacterium *Salmonella typhi* and is transmitted by the fecal-oral route. This study aims to determine the secondary metabolites contained in majapahit leaves (*Crescentia Cujete* L.), and to determine the antibacterial effect of *C. kujete* L. in inhibiting the growth of *S. typhi* bacteria. This type of research is quantitative experimental with a completely randomized design (CRD). The method used in this study is the maceration method for screening phytochemical compounds, the method used to see the inhibition zone of the extract, namely agar diffusion and to determine the MIC and MBC values of the ethanol extract of majapahit leaves, liquid and solid dilution methods are used. Analysis of the results of the study was carried out with the One Way ANOVA test followed by Duncan's test. The results obtained showed that majapahit leaf extract (*C. kujete* L.) contained secondary metabolites such as alkaloids and terpenoids, majapahit plant extract (*C. kujete* L.) had moderate inhibitory activity at a concentration of 20% extract which could be seen in the inhibition zone. formed, the MIC obtained was in the 10% extract treatment while the MBC could not be determined. The results of the One Way ANOVA test with a significance value ($\alpha 0.000 < 0.05$) showed that majapahit leaf extract had an effect on the growth of *S. typhi*.

Keywords: Antibacterial, *Crescentia kujete* L, *Salmonella typhi*.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua yang ada di dunia ini tidak tercipta secara kebetulan, melainkan karena kekuasaan Allah swt. rancangan dan ciptaan dengan segala rupa serta manfaat telah Allah swt. hamparkan di seluruh alam semesta sesuai dengan kehendak-Nya. Dunia yang berisikan tumbuhan, hewan, gunung, batu dan sebagainya menjadi gambaran serta pembelajaran kepada manusia tentang eksistensi Allah swt. sebagai satu-satunya pencipta yang berhak untuk disembah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Shad /38:27 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka (Kementerian Agama RI, 2012).

Telah dijelaskan dalam tafsir Quraish Shihab bahwa Kami tidak menciptakan langit dan bumi beserta semua yang ada di antara keduanya dengan sia-sia yang demikian adalah sangkaan orang-orang kafir sehingga mereka semena-mena

memberikan keputusan sesuai hawa nafsunya. Dari hal itu, mereka akan memperoleh siksa yang amat pedih berupa api neraka (Shihab, 2015).

Berdasarkan penjelasan tafsir di atas, dapat diketahui bahwa semua yang Allah swt. ciptakan, pasti tidak ada yang sia-sia, terkait dengan hal ini kita sebagai manusia harus merenungkan keutamaan Allah swt. atas keseluruhan manifestasi-Nya di dunia ini. Begitu juga dengan penciptaan langit dan segala isinya yang Allah swt. ciptakan tidak ada kesia-siaan di dalamnya, melainkan dengan berbagai jenis penemuan yang dapat dipelajari hikmah dibalikinya, sebagaimana Allah swt. menurunkan penyakit serta menurunkan obat untuk menyembuhkannya, itu adalah gambaran bagaimana Allah swt. memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Perihal tersebut sesuai dengan firman-Nya yang tertulis dan di jelaskan dalam QS. as-Syu'araa/26: 79-80 yang berbunyi:

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

Dan Tuhanku, yang Dia memberi makan dan minum kepadaku (79), dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkan aku (80) (Kementerian Agama RI, 2012).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada ayat di atas Allah swt. menurunkan sebuah penyakit kepada makhluk-Nya, sekalipun itu merupakan suatu qadha, qadar dan ciptaan Allah tetapi Allah sandarkan hal itu kepada hamba-Nya sebagai sikap beradab. Hal ini berarti jika seorang hamba menderita sakit maka tidak seorang pun yang kuasa memberikannya kesembuhan selain dari Dia sesuai

takdir-Nya yang dikarenakan oleh sebab yang menyampaikannya (Ibnu Katsir, 2011)

Walladzi huwa yuth'imuni (dan Tuhanku, yang Dia memberi makan) apa saja yang dikehendaki-Nya untukku. *Wayasqini* (dan memberi minum kepadaku). Yakni Dialah pemberi rizki kepadaku. Jika Dialah yang memiliki makanan dan minumanku serta segala kebutuhanku, maka tiada pemberi nikmat dan rizki kecuali Dia dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku dari penyakit serta yang memberi kesembuhan (Shihab, 2015).

Penyakit ialah cobaan yang Allah swt. berikan kepada hamba-Nya untuk menggugurkan dosa maupun menguji besarnya tingkat kesabaran dari seorang hamba. Terdapat hikmah dibalik diberikannya suatu penyakit kepada seseorang. Sehingga ketika terkena ujian berupa diberikannya suatu penyakit, maka seorang hamba hendaklah bersabar dan tawakkal kepada Allah swt., tidak mengeluh dan berusaha untuk mencegah jika belum terkena penyakit ataupun berusaha menyembuhkannya dengan cara-cara yang diridhoi-Nya.

Suatu penyakit dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga pola hidup yang sehat, makan teratur agar nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh tercukupi, tidur dan olahraga yang cukup serta ibadah yang terjaga. Sedangkan untuk menyembuhkan penyakit dilakukan dengan tindakan medis, memeriksakan diri ke dokter, mengonsumsi obat-obatan kimia atau obat tradisional. Adanya berbagai macam jenis penyakit membuat cara pencegahan dan penyembuhannya juga berbeda-beda. Diantara banyaknya penyakit, umumnya masyarakat terkhususnya di Indonesia biasanya terkena penyakit demam

tifoid. Penyakit demam tifoid adalah infeksi akut pada usus halus yang disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang dan makanan yang dikonsumsi terkontaminasi oleh patogen berupa *Salmonella typhi* yang mengganggu sistem pencernaan.

Penyakit demam tifoid ialah penyakit yang sering diderita oleh penduduk di Indonesia. Penyebab munculnya penyakit ini karena adanya bakteri gram negatif *Salmonella typhi* yang menginfeksi usus halus (Nelwan, 2012). Penyakit demam tifoid termasuk salah satu penyakit menular yang penularannya melalui rute fekal-oral atau bakteri yang berasal dari tinja masuk ke dalam oral manusia. Infeksi dari bakteri tersebut dapat terjadi apabila mengonsumsi makanan yang didalamnya terdapat bakteri *S. typhi* (Sidabutar & Satari, 2010).

Berdasarkan data *Centers for Disease* (CDC) (2013), terjadi 5.700 kasus demam tifoid di negara maju pertahunnya. Namun, jumlah penderita demam tifoid di negara-negara yang berkembang diseluruh dunia lebih banyak yaitu 21,5 juta kasus yang terjadi pertahunnya. Sedangkan jika dihitung angka kematian yang terjadi secara mendunia yang disebabkan oleh demam tifoid sebanyak 128.000 hingga 161.000 kematian (WHO, 2018). Penyakit tersebut menjadi penyebab utama tingginya angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas) di negara-negara yang berkembang serta berpendapatan rendah (Ulfa & Handayani, 2018).

Sebesar 1,60% jumlah proporsi penyakit demam tifoid di negara Indonesia. Kasus penderita paling tinggi terjadi pada kelompok orang yang berumur 5-14 tahun, sebab pada umur tersebut anak masih belum mencermati kondisi kebersihan diri serta sesuatu yang masuk di mulutnya sehingga terjadi kasus penularan penyakit demam

tifoid (Ulfa & Handayani, 2018). Prevalensi demam tifoid yang terjadi berdasarkan tempat tinggal sangat banyak di daerah pedesaan apabila dibandingkan di perkotaan karena jumlah pendapatan masyarakat masih rendah dan masih ada masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya pola hidup sehat (Depkes, 2008).

Jumlah pendapatan dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi sarana dan prasana untuk mewujudkan kebersihan diri dan lingkungan. Biasanya kelompok masyarakat dengan ekonomi rendah tidak terlalu memperhatikan kebersihan diri dan lingkungannya sehingga dapat berpengaruh bagi kondisi kesehatan mereka. Sedangkan tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi wawasan masyarakat tentang pentingnya untuk menjaga kebersihan (Ulfa & Handayani, 2018). Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi timbulnya kasus demam tifoid ialah gender, umur, keterpenuhan gizi bagi tubuh, makanan yang dikonsumsi, kebersihan tangan dan sumber air (Soedomo dkk, 2010; Anonim. 2009; Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2008).

Umumnya penanganan demam tifoid bisa dilakukan secara medis maupun dengan menggunakan metode tradisional. Penanganan secara medis bisa dilakukan dengan mengonsumsi obat-obatan misalnya Amoksisilin, Kloramfenikol dan Azhitromisin. Obat-obatan tersebut dapat dikonsumsi secara oral atau injeksikan ke dalam otot dan vena (Juwita et al, 2013). Namun, angka mortalitas dan morbiditas akibat demam tifoid yang terus meningkat belum bisa diselesaikan dengan penanganan secara klinis. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan resistensi bakteri *S. typhi* terhadap antibiotik atau disebut juga *Multi Drug Resistant* (MDR) (Dzen,

2003).

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Badan Litbang Kesehatan RI, melaporkan bahwa di Jakarta bakteri *Salmonella typhi* mulai mengalami resistensi antibiotik. Bakteri tersebut mampu bertahan terhadap efek antibiotik seperti kloramfenikol konsentrasi 57%, ampicilin konsentrasi 42%, serta kotrimoksazol konsentrasi 71%. Kenaikan resistensi *S. typhi* menciptakan permasalahan dalam terapi sehingga harus digunakan antibiotik dengan konsentrasi yang lebih tinggi dan dengan sistem kerja yang berbeda. Tidak hanya memunculkan resistensi, sebagian obat memberikan efek yang ringan sampai berat, misalnya obat kloramfenikol yang memunculkan dampak respon alergi, respon saluran pencernaan serta *grey syndrome* (Syarif et al., 2008).

Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat-obatan merupakan metode turun temurun yang diwariskan oleh para pendahulu untuk mengobati berbagai penyakit. Penggunaan tanaman serta cara pengolahannya menjadi obat herbal tergantung pada jenis tanaman yang ada di setiap daerah. Kebanyakan cara pengolahannya masih menganut prinsip konvensional baik dari alat, bahan dan proses pembuatannya. Masyarakat mengolah tanaman menjadi obat herbal biasanya dengan cara merebus dan menumbuk bagian tanaman yang dipercaya berkhasiat menyembuhkan penyakit kemudian meminum ekstraknya. Selain itu ada juga metode menempelkan bagian tumbuhan ke organ tubuh yang terasa sakit (Mulyani et al., 2016). Penggunaan obat herbal merupakan suatu cara yang telah dilakukan oleh masyarakat dan terbukti bahwa tanaman dapat menjadi ramuan tradisional yang berkhasiat menyembuhkan

penyakit (Haryoto et al., 2014).

Salah satu tanaman yang memiliki manfaat yang sangat banyak bagi penduduk adalah majapahit (*Crescentia cujete* L.). Tanaman ini mempunyai aneka kegunaan yang sangat banyak. Daunnya dipercaya memiliki efek antimikroba yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. *C. cujete* L. memiliki senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, saponin, tanin, flavonoid dan steroid yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri (Hasanah dkk, 2017). Erwin dkk (2012) mengatakan bahwa di dalam daun majapahit juga terkandung senyawa terpenoid.

Meskipun memiliki manfaat yang sangat banyak namun banyak masyarakat yang belum mengetahui khasiat dari majapahit tersebut sehingga tumbuhan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, daun majapahit mengandung senyawa antibakteri sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai aktivitas antibakteri daun majapahit (*Crescentia cujete* L.) terhadap pertumbuhan bakteri *S. typhi* penyebab penyakit demam tifoid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai fokus penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja senyawa antibakteri yang terkandung di dalam daun majapahit (*C. cujete* L.)?

2. Bagaimana efektivitas antibakteri ekstrak daun majapahit (*C. cujete* L.) terhadap *S. typhi*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan daun majapahit (*C. cujete* L.). Pengambilan sampel daun majapahit dilakukan di Desa Rajaya baru, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Pembuatan ekstrak daun majapahit (*C. cujete* L.) dan skrining senyawa fitokimia dilakukan di Laboratorium Organik Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Evaporasi Sampel ekstrak daun majapahit dilakukan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar (BBIHP). Sedangkan uji penghambatan ekstrak daun majapahit (*C. cujete* L.) terhadap bakteri *S. typhi* dilakukan di Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.

D. Kajian Pustaka

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Parvin et al., (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *Evaluation of In vitro Anti-inflammatory and Antibacterial Potential of Crescentia cujete Leaves and Stem Bark*, ingin mengeksplorasi potensi antiinflamasi daun dan kulit batang majapahit (*Crescentia cujete* L.) secara *in vitro* dengan metode stabilisasi membran sel darah merah HRBC (*Human Red Blood Cell*). Sedangkan untuk mengevaluasi aktivitas antibakteri daun dan kulit batang

majapahit (*C. cujete* L.) menggunakan metode difusi cakram. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ekstrak etanol kasar (CEE) daun dan kulit batang (konsentrasi masing-masing 1,0 mg/ml) menunjukkan hasil yang kuat, aktivitas stabilisasi membran masing-masing 53,86 dan 61,85% perlindungan. Sedangkan untuk fraksi kloroformnya (CHF) menunjukkan aktivitas sedang dengan masing-masing $48,74 \pm 0,56$ dan $43,55 \pm 6,20\%$ apabila dibandingkan dengan aspirin standar konsentrasi 0,10 mg/ml yang menunjukkan perlindungan 75,81% dalam tes ini. Semua sampel menunjukkan aktivitas antiinflamasi tergantung dosis dalam uji stabilisasi membran HRBC. Total fenolik (TPC) dan kandungan flavonoid total (TFC) dari ekstrak kasar dan fraksi juga ditentukan. Sehingga berdasarkan uji *in vitro*, terbukti bahwa ekstrak tumbuhan daun dan kulit batang majapahit memiliki kemampuan terapeutik terhadap infeksi bakteri.

2. Dewi dkk, (2014) dengan judul penelitian aktivitas antibakteri ekstrak daun majapahit (*Crescentia cujete* L.) terhadap pertumbuhan bakteri *Ralstonia solanacearum* penyebab penyakit layu. Penelitian ini ingin melihat efek ekstrak daun majapahit dengan berbagai konsentrasi dalam menghambat pertumbuhan *Ralstonia solanacearum* dan untuk menentukan konsentrasi optimal ekstrak daun majapahit dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Ralstonia solanacearum* secara *in vitro*. Rancangan penelitian menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap) dengan variasi konsentrasi ekstrak yang digunakan, yaitu 55%, 65%, 75%, 85%, 95%, dan kontrol positif

(kloramfenikol 1%), serta kontrol negatif (akuades), masing-masing dengan 3 kali ulangan. Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi sumuran. Data yang diperoleh berupa diameter zona hambat yang dianalisis dengan ANOVA satu arah dan dilanjutkan uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun majapahit dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Ralstonia solanacearum*. Perlakuan dengan konsentrasi 85% dan 95% merupakan konsentrasi yang optimal dalam menghambat pertumbuhan *Ralstonia solanacearum* dengan diameter zona hambat sebesar $11,4 \pm 0,50$ mm dan $12,4 \pm 1,32$ mm.

3. Tri et al. (2019) dengan judul efektivitas ekstrak daun majapahit (*Crescentia cujete L.*) sebagai antibakteri pada bakteri *E.coli* dan *S. aureus*. Penelitian ini menjelaskan bahwa majapahit memiliki manfaat yang sangat banyak dan berkhasiat bagi kesehatan karena memiliki kandungan antibakteri. Kandungan antibakteri tersebut berasal dari senyawa metabolit sekunder seperti tanin, alkaloid, saponin dan flavonoid. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ekstrak daun majapahit paling efektif menghambat pertumbuhan *Eschericia coli* dan *Staphylococcus aureus* pada konsentrasi 25%.
4. Rinawati (2010) dengan judul daya antibakteri tumbuhan majapahit (*Crescentia cujete L.*) terhadap bakteri *Vibrio alginolyticus*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ekstrak daun segar dan kering

serta buah segar majapahit memiliki daya antibakteri terhadap *V. alginolyticus*. Zona bening terbesar adalah 19,8 mm dihasilkan dari ekstrak daun segar majapahit sedangkan yang terkecil sebesar 8,8 mm dihasilkan dari ekstrak buah majapahit.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam daun majapahit (*C. cujete* L.).
2. Mengetahui efek antibakteri daun majapahit (*C. cujete* L.) dalam menghambat pertumbuhan bakteri *S. typhi*.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Agar mampu membuktikan secara ilmiah bahwa ekstrak daun majapahit (*C. cujete* L.) memiliki efek antibakteri terhadap *S. typhi*.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan dalam penggunaan tanaman herbal dibidang farmasi dan kesehatan.
3. Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan rujukan terhadap penelitian yang sudah ada dan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat dan hadist yang Relevan

Nikmat penciptaan adalah nikmat yang paling utama dan terbesar yang telah diberikan Allah swt. kepada ciptaan-Nya. Nikmat ini menuntut ketaatan kepada seluruh perintah Ilahi. Allah swt. menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kehidupan manusia di bumi ini. Gunung dan saharanya, air dan tanahnya, mineral yang tersimpan di dalam tanah dan di bawah gunung-gunung, semuanya merupakan lingkungan yang cocok untuk kelestarian dan kehidupan manusia. Kerjasama antara langit dan bumi telah mendatangkan hujan dan menambahkan tanaman serta memenuhi rezeki dan makanan manusia. Sebagaimana firman-Nya yang tertulis dan dijelaskan dalam QS Qaf / 50 : 7-11 yang berbunyi:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾
تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا
بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾
رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتَةً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Dan bumi yang Kami hamparkan dan Kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan Kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah (7), untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali (tunduk

kepada Allah) (8), Dan dari langit Kami turunkan air yang memberi berkah, lalu Kami tumbuhkan dengan (air) itu dengan pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat di panen (9), dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun (10), (sebagai) rezeki bagi hamba-hamba (Kami) dan Kami hidupkan dengan (air) itu negeri yang mati (tandus), seperti itulah terjadinya kebangkitan (dari kubur) (11) (Kementerian Agama RI, 2012).

Telah dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah swt. berfirman seraya mengingatkan hamba-hamba-Nya tentang kekuasaan-Nya yang agung, lebih besar dari apa yang mereka herankan. Firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala* “*wal ardhah madadnha* artinya dan Kami hamparkan bumi itu” maksudnya, Kami luaskan dan bentangkan. “*walqayna fiiha rawasiya* artinya dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh.” Hal itu agar bumi beserta penduduknya tidak miring dan tidak terguncang. Gunung-gunung itu berdiri tegak di atas bumi dengan semua sisinya dikelilingi air. “*Waanbatnaa fiihaa minkullii zaujinbahij* artinya dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata” yakni, dari segala macam tanaman-tanaman, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Kata “*Bahijun*” berarti pemandangan indah. “*Tabshiratan wadzikralikulli ‘abdin munib* artinya untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah)” maksudnya, dengan menyaksikan penciptaan langit dan bumi serta tanda-tanda kekuasaan-Nya yang sangat menakjubkan yang telah Dia ciptakan di antara keduanya, sebagai saksi, bukti dan peringatan bagi setiap orang yang tunduk, takut dan kembali kepada Allah swt. dan firman Allah Ta’ala “*wanazzal minassama am mubaraka* artinya dan Kami turunkan dari langit air yang banyak berkahnya” yakni manfaatnya, “*fanbatnaa bihi jannati*

artinya *lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon*” yakni kebun, taman dan lain sebagainya, *“wahabbalhashyydi artinya dan biji-biji tanaman yang diketam”* yaitu tanaman yang diambil bijinya untuk kemudian disimpan. *“wannakhla ba siqati artinya dan pohon kurma yang tinggi-tinggi”* yakni panjang lagi itnggi. *“lahaa thul’uunnadhyydun artinya yang mempunyai mayang yang bersusun-susun”* yakni sebagian di atas dan sebagian lainnya, *“rizqon lil’ibadi artinya untuk menjadi rizki bagi hamba-hamba (Kami)”* yakni, bagi semua makhluk-Nya. *“waahyayna bihi baldatan mmaytaa artinya dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati”* yaitu tanah yang kering kerontang lagi tandus dan ketika air turun membasahinya, maka tanah itu kembali hidup, subur dan tumbuhlan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah, setelah sebelumnya tanah itu tidak ditumbuhi pepohonan (tumbuhan), maka berubahlah menjadi hijau. Ini adalah suatu contoh bagi (perumpamaan) kebangkitan setelah kematian dan kehancuran (yang telah mereka ingkari dan mereka anggap mustahil itu). Demikian pula Allah swt. akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Pemandangan seperti itu merupakan kebesaran kekuasaan-Nya dalam kenyataan, yang mana hal itu lebih agung dari apa yang diingkari oleh orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan (Ibnu Katsir, 2004).

Bumi adalah hamparan yang sangat luas, Allah swt. menciptakan gunung-gunung yang kokoh serta beragam makhluk hidup yang berpijak di atasnya dengan langit sebagai atap. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt. selalu sempurna, memberikan keindahan dan tidak memiliki kecacatan. Sehingga dengan segala kenikmatan itu sudah semestinya kita sebagai makhluk merenungkan dan bersyukur

atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah swt. Kemudian di turunkan air hujan untuk membasahi tanah yang mati dan gersang, menyuburkan tanah sehingga tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah dan bermanfaat. Air itu juga mampu menghilangkan dahaga manusia dan hewan sehingga makhluk hidup dapat bertahan hidup dan terjadi keseimbangan di dalam ekosistem. Makhluk hidup tidak bisa lepas dari kodratnya sebagai ciptaan. Alam semesta dan yang ada di dalamnya, Allah swt. yang telah menciptakannya, sehingga hanya Allah juga yang bisa mengaturnya. Contoh kecilnya, yang mampu menumbuhkan tanaman, memberikan warna dan khasiat serta menyuburkan tanah yang telah mati hanya Allah swt. yang mampu melakukannya dengan sangat mudah. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita tunduk kepada Allah swt. karena tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan-Nya.

Allah swt. telah menciptakan segala sesuatu dengan sangat luar biasa, semua yang ada dimuka bumi ini memiliki keterkaitan satu sama lain. tanah yang terhamparkan ditumbuhi berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Penyebaran dan ketersediaan tumbuhan yang beranekaragam dengan manfaat yang melimpah, dapat dijadikan sebagai obat-obatan herbal untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit (Hawa, 2017). Munculnya suatu penyakit dapat disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Penyakit tersebut dapat memberikan berbagai efek yang ringan ataupun berat bagi tubuh. Meskipun demikian, penyakit yang Allah swt. turunkan selalu dibarengi dengan obat untuk menyembuhkannya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. yang

diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Zubair, dari Jabir bin Abdillah, dari Nabi Muhammad SAW. beliau bersabda:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ
دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

Masing-masing penyakit ada obatnya. kalau sudah mengenai penyakit, penyakit itu pasti akan sembuh dengan seizin Allah (HR. Muslim).

Berdasarkan hadist tersebut, sudah sangat jelas bahwa setiap penyakit pasti ada obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Hanya Allah swt. saja yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan sekalipun melalui perantara obat atau seorang dokter. Manusia dapat terserang penyakit sebagian besar penyebabnya karena tidak mampu menjaga pola hidup sehat, terutama dari segi makan dan minumannya. Manusia terkadang terlupa dan berlebih-lebihan serta tidak hati-hati dalam mengonsumsi sesuatu. Padahal berlebih-lebihan dalam sesuatu adalah sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah swt.

Berlebih-lebihan dalam hal makan, minum dan berpakaian sangat dekat dengan sifat serakah. Jika seseorang berlebih-lebihan dalam memakan sesuatu, maka hal itu dapat berdampak negatif bagi dirinya sendiri karena tubuh memiliki batas toleransi terhadap sesuatu. Misalnya dalam mencerna makanan, tubuh memerlukan waktu untuk melakukan proses metabolisme hingga makanan tersebut dapat diubah menjadi energi yang dapat digunakan untuk beraktifitas. Jika berlebihan dalam

mengonsumsi makanan maka tubuh akan bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Sehingga Allah swt. memerintahkan hambanya untuk tidak berlebih-lebihan, hidup sederhana dan tidak menyikasa diri. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al A'raf/7:31.

﴿ يَبْنِيْءَ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾

Terjemahnya:

Hai anak adam pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Kementerian Agama RI, 2012).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. sangat melarang perbuatan yang berlebih-lebihan. Sikap berlebih ini dapat mendatangkan banyak mudharat dan menjauhkan diri dari rahmat Allah swt. Orang yang berfoya-foya dan menghamburkan uangnya adalah orang-orang yang memiliki tabiat seperti setan. Orang-orang tersebut masih memperturutkan hawa dan nafsu. Sama seperti berlebih dalam memakan sesuatu. Orang yang suka makan berlebih rentan mengalami obesitas dan memicu timbulnya berbagai penyakit seperti demam tifoid. Apabila seseorang mengonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri *S. typhi* dan jumlah bakteri didalam tubuhnya sudah berlebih, maka akan menimbulkan penyakit demam tifoid yang disebabkan oleh infeksi bakteri tersebut. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna mengatur seluruh kehidupan manusia, termasuk perintah bagi pemeluknya untuk tetap menjaga kebersihan,

penampilan dan tidak memelihara sifat berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu.

B. Tinjauan Umum Tanaman Majapahit (*Crescentia cujete* L.)

Indonesia ialah negeri yang memiliki peluang besar ditumbuhi tumbuhan majapahit (*Crescentia cujete* L.) sebab masih dalam kawasan Asia Tenggara serta Asia Selatan. Awalnya, tumbuhan ini berasal dari Amerika yang merupakan wilayah tropis serta subtropis. Sekarang tumbuhan ini sering ditanam di halaman rumah di beberapa negara. Penyebaran *C. cujete* L. di Kepulauan Karibia serta dari Meksiko sampai Amerika Tengah sampai Amerika Selatan bagian utara (Rismayani, 2013).

Buah majapahit atau bisa juga disebut berenuk, memiliki kemiripan dengan buah maja (*Aegle marmelos* L.) yang juga memiliki kulit buah berwarna hijau dan keras. Namun bedanya daging buah majapahit (*C. cujete* L.) akan terasa pahit ketika sudah tua sedangkan buah maja (*Aegle marmelos* L.) daging buahnya bisa dimakan (Fatmawati, 2015). Morfologi tanaman majapahit (*C. cujete* L.) dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1. Tanaman majapahit, (A) Morfologi tanaman majapahit. (B) Akar tanaman majapahit. (C) Batang tanaman majapahit. (D) Daun tanaman majapahit. (E) Bunga tanaman majapahit. (F) Buah tanaman majapahit. Sumber: Data pribadi (2021).

Tanaman Majapahit (*C. cujete* L.) berasal dari famili Bignoniaceae yang tumbuh di wilayah tropis. Majapahit merupakan tanaman pohon yang memiliki ketinggian berkisar antara 6-8 m, termasuk tanaman dikotil yang memiliki sistem

perakaran tunggang (*Radix primaria*), batangnya berkayu (*Lignoceus*) dan bercorak putih kehitaman serta beralur (*Sulcatus*). Tipe daun majapahit majemuk menyirip daun tiga dan berbentuk lonjong, bertepi rata, ujungnya membulat, tangkainya pendek berwarna hijau dan pertulangan daunnya menyirip. Bunga dari majapahit ini merupakan tipe bunga tunggal. Bunga muncul dibagian batang atau cabang dan ranting. Mahkota bunga berbentuk bibir, tabung mahkotanya membengkok, bentuknya seperti lonceng, memiliki lipatan melintang. Panjang putik 2 cm, kepala putik berbentuk corong, berwarna putih. Benang sari ada 4, panjang 2 cm (Steenis, 1974). Buah majapahit merupakan buah sejati tunggal, kulit buahnya keras dan licin apabila sudah tua (Dewi et al., 2014).

Majapahit (*C. cujete* L.) dan maja (*Aegle marmelos*) memiliki perbedaan yang nyata dari bentuk dan ukuran buah, daun dan batang pohon. Dari sisi taksonomi *C. cujete* L. termasuk suku Bignoniaceae bangsa lamiales, sedangkan maja (*Aegle marmelos* L.) termasuk suku Rutaceae, bangsa Rurales. *C. cujete* L. juga dikenal sebagai *Calabash* dalam bahasa Inggris.

Adapun klasifikasi dari tumbuhan majapahit (*C. cujete* L.), menurut Rismayani (2013) yaitu:

Regnum : Plantae
 Divisi : Tracheophyta
 Class : Magnoliopsida
 Sub Class : Asteranae
 Ordo : Scrophulariales

Family : Bignoniaceae
Genus : *Crescentia*
Species : *Crescentia cujete* L.

Majapahit (*C. cujete* L.) dipercaya memiliki kandungan senyawa kimia yang dapat digunakan sebagai antibakteri. Majapahit mengandung senyawa metabolit sekunder berupa flavonoid, fenol, saponin, steroid, tanin dan alkaloid (Ejelonu et al., 2011). Selain itu, daun majapahit juga mengandung senyawa terpenoid yang dapat merusak membran sel bakteri (Erwin dkk, 2012). Ogbuagu (2008) mengatakan senyawa saponin mampu menghancurkan materi genetik bakteri. Saponin termasuk salah satu antibiotik alami, sebagai antiinflamasi dan memiliki kemampuan merusak materi genetik bakteri (Ejelonu et al. 2011). Senyawa flavonoid berperan dalam melindungi sel-sel tubuh manusia dari radikal bebas (Saifuddin, 2014 & Sulistiyani dkk, 2004). Flavonoid juga memiliki kemampuan sebagai antibakteri karena dapat melisiskan dinding sel bakteri (Parvin et al. 2015).

Senyawa tanin yang terdapat pada *C. cujete* L. berpotensi menjadi antibakteri (Chukwuma et al., 2010). Tanin memiliki fungsi menyembuhkan luka, mencegah terjadinya infeksi akibat bakteri, mampu menonaktifkan adhesin menyebabkan bakteri tidak bisa menempel pada sel epitel hospes (Ogbuagu 2008). Sedangkan steroid, terutama pada senyawa α -spinasterol, berperan sebagai antinoniseptik, antiinflamasi, antiedematogenik (Freitas et al. 2009, Lee et al. 2012, Trevisan et al. 2012, Borges et al. 2014). Senyawa alkaloid bisa digunakan untuk mengobati permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri. Selain itu, flavonoid yang

terkandung didalam *C. cujete* L. merupakan antioksidan yang berperan dalam menjaga sel tubuh dari radikal bebas.

C. Tinjauan Umum Demam Tifoid

Demam tifoid adalah penyakit yang terjadi karena adanya penularan bakteri. Bakteri yang dapat menyebabkan demam tifoid adalah bakteri *Salmonella typhi* dan *Salmonella paratyphi* A, B dan C. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang meningkatkan mortalitas dan angka kesakitan penduduk global. Munculnya penyakit ini dipicu oleh kondisi lingkungan yang buruk seperti sanitasi yang tidak bagus, kualitas kesehatan dan kebersihan makanan yang kurang dan jumlah populasi yang sangat banyak. Menurut Crump & Mintz (2010) penyakit demam tifoid ini akan sangat berbahaya bagi wisatawan yang melakukan kunjungan ke daerah endemik.

Demam tifoid ialah infeksi akut pada usus halus karena serangan *S. typhi*. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui fekal-oral atau dari makanan maupun benda-benda yang sudah terkontaminasi *S. typhi* masuk ke dalam mulut. Demam tifoid termasuk ke dalam permasalahan masyarakat dengan jumlah kasus yang mengalami banyak peningkatan setiap tahun. Terhitung sebanyak 22 juta kasus per tahun di seluruh dunia dan mengakibatkan 216.000– 600.000 kematian. Riset yang dilakukan di kawasan perkotaan negara-negara di Asia pada manusia yang berumur 5–15 tahun memperlihatkan bahwa kasus dengan jumlah darah yang positif terkena demam tifoid mencapai 180–194 per 100.000 anak, di Asia Selatan pada usia 5–15 tahun sebesar 400–500 per 100.000 penduduk, di Asia Tenggara 100–200 per

100.000 penduduk dan di Asia Timur Laut kurang dari 100 kasus per 100.000 penduduk (Dong et al., 2010).

Hingga saat ini, demam tifoid masih menjadi masalah kesehatan serius yang muncul di negara-negara berkembang dan menyumbang angka morbiditas dan mortalitas yang tidak sedikit. Bentuk penularan umumnya melalui kontaminasi fekes-oral terhadap bahan pangan dan sumber air, serta diperparah dengan buruknya kualitas sanitasi di wilayah-wilayah padat penduduk. Angka insiden di seluruh dunia dapat mencapai lebih dari 20 juta kasus setiap tahunnya, 200.000 di antaranya berakhir dengan kematian (Kanj et al., 2015). Kasus demam tifoid terjadi di berbagai daerah di dunia seperti China (Dong et al., 2010), Belanda (Van Wolfswinkel et al., 2009), Inggris (Clark et al., 2010), Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika Tengah dan Afrika Timur (Michael & Widjaja, 2020).

Demam tifoid adalah penyakit yang menimbulkan tingginya angka penderita dan mortalitas di Amerika Serikat pada abad 19. Seiring dengan banyaknya temuan dan inovasi bidang medis, kasus demam tifoid mulai menurun di wilayah tersebut. Kasus demam tifoid di negara maju terjadi secara sporadis dan sering juga berupa kasus impor atau bila ditelusuri ternyata ada riwayat kontak dengangan *carrier* atau pembawa kronik (Parry et al., 2002).

Penderita demam tifoid di tahun 2007 berjumlah 358 sampai 810 per 100.000 penduduk, sebanyak 64% merupakan masyarakat yang berumur 3-19 tahun. Sedangkan jumlah kematian pasien yang terkena demam tifoid yang dirawat di rumah sakit sebanyak 3,1-10,4%. Menurut Hatta & Ratnawati (2008) kasus demam tifoid

terjadi setiap tahun, dan semakin bertambah ketika sudah musim kemarau. Demam tifoid ialah penyebab ketiga terbanyak permasalahan kesehatan yang diderita oleh pasien, terhitung sebanyak 41.081 kasus. Kebanyakan penyakit demam tifoid menyerang masyarakat yang tinggal di pedesaan atau pinggiran kota karena tingkat pendapatan dan kebersihan lebih rendah.

Tanda seseorang mengalami demam tifoid adalah jika suhu tubuh meningkat melebihi $37,5^{\circ}\text{C}$, sakit kepala, hati juga limfa mengalami pertambahan ukuran, kulit berwarna merah menonjol, selera makan menurun, dan terjadi masalah pada sistem pencernaan. Kasus demam tifoid kurang yang berakhir mematikan, presentase fatalitas 1- 4% jika ditangani dengan tepat dan diberikan antibiotik. Akan tetapi tidak jarang juga ada pasien yang mengalami komplikasi sehingga kondisi pasien memburuk. Sehingga presentase fatalitas pada pasien yang mengalami komplikasi sebesar 30-40% (Buckle et al., 2012). Pemeriksaan baku emas untuk demam tifoid yaitu kultur darah. Namun cara tersebut membutuhkan waktu setidaknya tujuh hari, serta memerlukan peralatan yang memadai dan staf yang handal, sehingga sulit dipenuhi di banyak negara-negara berkembang (Thriemer et al., 2012).

Interaksi antara manusia dengan bakteri *S. typhi* sangatlah unik karena baketri tersebut hanya dapat menyerang manusia saja. Bakteri *S. typhi* bisa hidup sehari-hari di tanah, air kolam, atau air laut dan selama berbulan-bulan dalam telur yang sudah terkontaminasi atau tiram yang dibekukan (Connor & Schwartz, 2005). Pada daerah endemik, infeksi paling banyak terjadi pada musim kemarau atau permulaan musim hujan. Menurut Bhutta (2006) jumlah bakteri yang tertelan oleh manusia sehingga

dapat dikatakan infeksi yaitu 103-106 organisme. Penularan penyakit dapat disebabkan oleh makanan serta air yang masuk ke dalam tubuh terkontaminasi oleh tinja (Connor & Schwartz, 2005). Kasus demam tifoid di negara Indonesia, banyak terlihat pada kelompok masyarakat yang berumur 3-19 tahun. Selain itu, keluarga orang yang terkena tifoid juga berpeluang mengalami penyakit yang sama jika kebersihan makanan dan air tidak terjaga (Vollaard et al., 2004).

Penularan *Salmonella typhi* ke dalam sistem pencernaan manusia diawali oleh masuknya makanan yang sudah tercemar bakteri *S. typhi* ke mulut. Sejumlah bakteri akan dihancurkan di organ lambung dan sebagiannya lagi berhasil lolos masuk ke usus. Ketika telah sampai di usus, *S. typhi* akan memperbanyak diri. Ketika respons imun mukosa (IgA) pada usus tidak optimal, maka bakteri akan menyerang sel-sel epitel menuju lapisan tipis jaringan ikat (*Lamina propria*). Di *Lamina propria* bakteri akan memperbanyak diri lagi dan menjadi makanan fagosit utamanya makrofag. Setelah ditelan oleh makrofag, bakteri tersebut akan dipindahkan ke plak peyeri (jaringan limfoid) setelah itu melalui saluran limfe masuk ke aliran darah sistemik yang mengakibatkan bakterimia I yang asimtomatik dan menyebar ke sel-sel retikuloendotelial di *hepar* dan limpa. Fase ini disebut fase inkubasi yang terjadi selama 7-14 hari. Selanjutnya dari jaringan tersebut bakteri dilepas kembali ke sirkulasi sistemik (bakterimia II) melintasi pembuluh limfatik dan mencapai organ-organ tubuh terutama limpa, *Intestinum* dan kantung empedu (Kemenkes RI, 2006).

Bakteri *S. typhi* menyerang kantung empedu, menginvasi area tersebut dan memperbanyak diri. Bersama cairan empedu, bakteri di keluarkan secara intermiten

melewati lumen bagian usus. Tidak semua bakteri di keluarkan bersama tinja karena ada juga yang akan kembali ke dalam sirkulasi setelah berhasil melewati usus. Proses tersebut terjadi seperti siklus, sebab makrofag sudah diaktifkan dan hiperaktif maka ketika fagositosis bakteri *S. typhi* dilepaskan sebagian mediator inflamasi menyebabkan timbulnya gejala seperti muntah-muntah, demam, sakit kepala, sakit perut, nyeri otot, sakit kepala, sakit perut, gangguan keseimbangan, gangguan jiwa dan penggumpalan darah (koagulasi) (Djoko W, 2009).

D. Tinjauan Umum Bakteri *Salmonella typhi*

Salmonella typhi ialah patogen yang dapat menjadi penyebab ternyadinya demam tifoid yaitu penyakit infeksi sistemik dengan gejala demam yang terjadi berhari-hari. Adanya kehadiran bakteri *S. typhi* di dalam darah (bakterimia) yang menyebabkan peradangan pada usus dan organ hati. *S. typhi* merupakan bakteri gram negatif, tidak memiliki spora, alat gerakanya berupa flagel peritrik. Ukuran *S. typhi* yaitu 0,7-1,5 x 2-5 μm , memiliki flagel dan antigen somatik (Cita, 2011).

Ukuran koloni rata-rata 2-4 mm, bakteri ini mampu memproduksi glukosa dengan cara fermentasi dan manosa tanpa membentuk gas tetapi tidak bisa memfermentasikan laktosa dan sukrosa. Kebanyakan bakteri *S. typhi* yang berasal dari spesimen klinik memproduksi H_2S . Isolat *S. typhi* pada media SSA (*Salmonella* dan *Shigella Agar*) ketika suhu 37°C maka koloni akan tampak cembung, tembus pandang dan punya noda hitam di bagian pusat. Ketika bakteri *S. typhi* berada dalam suhu 60°C

selama 15–20 menit, melalui pemanasan, pendidihan atau pemberian klorin di dalam air, maka bakteri *S.typhi* akan mati (Kemenkes RI, 2006).

Adapun taksonomi dari *Salmonella typhi* menurut Jawetz et al. (2010) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Filum : Proteobacteria
Ordo : Gamma Proteobacteria
Class : Enterobacteriales
Family : Enterobacteriaceae
Genus : Salmonella
Spesies : *Salmonella enteric*
Subspesies : *enteric I*
Serotipe : *typhi*

Bakteri *S. typhi* masuk ke dalam mulut bersama dengan makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Makanan tersebut dapat berupa sayuran dan buah-buahan yang sudah tercemar tinja (Pui et al., 2011). Makanan lain yang juga bisa membantu *S. typhi* masuk kedalam mulut yaitu mentega dan susu. Makanan bisa terkontaminasi bakteri *S. typhi* disebabkan oleh proses pengolahan dari makanan tersebut. Faktor kebersihan alat dan bahan yang digunakan serta orang yang mengolah sangat mempengaruhi kualitas kebersihan makanan (Zhu et al., 1996). *S. typhi* mampu hidup dan bereplikasi di dalam sel inang seperti makrofag. Menurut


Gunn et al. (2014) diperkirakan sebanyak 5% orang yang terinfeksi tidak akan berhasil untuk memberisihkan dirinya dari infeksi selama 12 bulan karena sudah menjadi pembawa kronik. Bakteri sudah berada di saluran hati dan kantong empedu.

E. Tinjauan Umum Uji Aktivitas Antibakteri Secara In Vitro

Uji *in vitro* ialah salah satu teknik uji media buatan yang cocok di lingkungan yang kondisinya optimal untuk pertumbuhan bakteri. Tujuan dari uji *in vitro* adalah untuk mengetahui kemampuan antimikroba dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Metode uji *in vitro* yang dapat digunakan dalam mengukur daya antibakteri suatu sampel adalah metode difusi dan dilusi (Lay, 1994).

1. Metode Difusi

Metode difusi adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Prinsip kerja dari metode difusi yaitu uji daya antibakteri dengan mengamati zona hambat pertumbuhan bakteri setelah diberikan kertas cakram yang berisi substansi antibakteri yang berdifusi di dalam media padat. Menurut Hugo & Russels (1998), uji difusi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan teknik *Kirby and Bauer*, *E-Test*, *Ditch-Plate Technique* dan *Cup-Plate Technique*. Metode yang biasa digunakan untuk melihat daya hambat antibakteri adalah metode *Kirby and Bauer*. Metode ini menggunakan kertas cakram yang dicelupkan atau diberi substansi antibakteri sebelumnya. Indikator keberhasilan zat antibakteri dapat dilihat pada ukuran zona hambat. Jika zona hambatnya luas maka daya antibakterinya juga kuat.



Gambar 2. 2. Diameter zona hambat (Sumampouw, 2013)

Metode difusi memiliki kelebihan yaitu mudah dilakukan. Keberhasilan metode ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, pH selain itu juga dipengaruhi oleh zat inhibitor, sifat media dan stabilitas dari antibakteri yang akan digunakan (Jawetz et al., 2001).


2. Metode Dilusi

Metode dilusi adalah metode yang dilakukan dengan mengencerkan antibakteri menjadi beberapa konsentrasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja dari berbagai konsentrasi antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Metode dilusi berfungsi untuk menentukan konsentrasi hambatan terkecil dari substransi antibakteri. Konsentrasi bakterisidal terkecil dari suatu senyawa antimikroba yang disebut Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) (Tortora et al., 2010).

Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) adalah konsentrasi paling rendah dari antimikroba yang masih memiliki kemampuan untuk menekan pertumbuhan bakteri.

KHM ditentukan dengan melihat konsentrasi antibakteri yang memiliki kekeruhan paling rendah diantara konsentrasi yang lainnya. Setelah menentukan KHM maka larutan dengan berbagai konsentrasi dituang kedalam media padat pertumbuhan. Media yang tidak menunjukkan pertumbuhan bakteri ditentukan sebagai Kadar Bunuh Minimum (KBM) (Harmita dan Radji, 2008).

F. Kerangka Pikir



G. Hipotesis

Ekstrak daun majapahit (*Crescentia cujete* L.) mengandung senyawa metabolit sekunder yang bersifat antibakteri, sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Salmonella typhi* penyebab penyakit demam tifoid.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan penelitian kuantitatif eksperimental yang bertujuan untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder daun tanaman majapahit (*C. cujete* L.) dan aktivitas antibakterinya terhadap *S.thypi*.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2021 di Laboratorium Organik Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains FMIPA Universitas Hasanuddin dan di Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar (BBIHP).

C. Variabel Penelitian

Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Ekstrak daun majapahit (*C. cujete* L.) merupakan variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah diameter zona hambat pertumbuhan bakteri *S. typhi*.

D. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu:

1. Ekstrak daun majapahit (*C. cujete*) adalah hasil ekstraksi dengan menggunakan pelarut etanol 96%.
2. Diameter zona hambat pertumbuhan bakteri *S.typhi* adalah daerah yang tidak ditumbuhi bakteri *S.typhi* di sekitar kertas cakram yang mengandung zat antibakteri.

E. Metode Pengumpulan Data

Rancangan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan masing-masing dengan 3 kali ulangan. Variabel manipulasi penelitian adalah konsentrasi ekstrak etanol daun majapahit (*C. cujete* L.) yaitu 7%, 8%, 9%, 10%, 20%, kontrol positif kloramfenikol 1% dan kontrol negatif akuades.

F. Alat dan Bahan

1. Alat

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu gelas ukur, gelas beker, *Erlenmeyer*, *magnetic stirrer*, *vortex*, tabung reaksi, spatula, *autoclave*, oven, cawan petri, *shaker*, *waterbath*, *Laminar Air Flow* (LAF), *rotary vacuum evaporator*, *incubator*, plat tetes, ose, neraca analitik, pisau, bunsen, corong, teko, botol wadah, alat tulis, kamera, baskom, penggaris dan gunting.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daun majapahit (*C. cujete* L.) sebanyak 6 kg, air, etanol 96%, media *Nutrient Agar* (NA), media *Nutrient*

Broth (NB), biakan bakteri *S. typhi* yang didapatkan dari koleksi Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains FMIPA UNHAS, kertas cakram steril, alkohol 70%, kloramfenikol 1%, dan akuades.

G. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja pada penelitian ini adalah:

1. Sterilisasi Alat

Seluruh alat dicuci bersih lalu disterilisasi menggunakan *autoclave*, durasi waktu 15 menit dengan tekanan 1,5 atm. Sterilisasi untuk alat *Laminar Air Flow* (LAF) dilakukan dengan menyalakan sinar UV selama 15 menit, setelah itu disemprotkan alkohol dan dilap dengan menggunakan *tissue*. Sterilisasi alat yang terbuat dari plastik yaitu dengan menggunakan alkohol 70%. Sedangkan untuk sterilisasi ose dengan cara dipijarkan di atas bunsen.

2. Pengambilan Sampel Daun Majapahit (*C. cujete* L.)

Sampel daun majapahit (*C. cujete* L.) diperoleh di Desa Rajaya Baru, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Adapun cara pengambilan sampel yaitu dengan mengambil daun majapahit segar, berwarna hijau tua pekat, tidak memiliki bercak, tidak terserang hama, dengan panjang daun minimal 8 cm (Tri dkk, 2019). Setelah itu sampel dibawa ke Laboratorium Biokimia untuk dibersihkan dan dibuat ekstraknya.

3. Ekstraksi Daun Majapahit (*C. cujete* L.)

Pembuatan ekstrak daun majapahit (*C. cujete* L.) dilakukan dengan metode maserasi. Sebanyak 6 kg berat basah daun majapahit (*C. cujete* L.) dicuci bersih, digunting-gunting kecil lalu dikeringanginkan selama 4 hari di dalam laboratorium (Dewi dkk, 2014). Setelah itu simplisia kering diblender hingga diperoleh 500 gr serbuk. Serbuk direndam dengan pelarut etanol 96% selama 72 jam. Pada 24 jam pertama 500 gr serbuk direndam dalam 3 liter etanol, sedangkan 24 jam ke-2 dan ke-3 direndam dengan 2 liter etanol, selanjutnya dilakukan penyaringan dan yang terakhir pemisahan filtrat dengan menggunakan *rotary vacuum evaporator* pada suhu 60°C, sehingga terbentuk ekstrak daun majapahit (Tri dkk, 2019).

4. Skrining Fitokimia

Uji fitokimia yang dilakukan yaitu uji alkaloid, flavonoid, terpenoid dan tanin.

a. Uji alkaloid

Uji alkaloid dilakukan dengan menggunakan 2 pereaksi yaitu pereaksi mayer dan wagner. Ekstrak etanol daun majapahit (*C. cujete*) sebanyak 1 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi, setelah itu larutan ekstrak ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer dan 2 tetes pereaksi Wagner. Indikator keberadaan senyawa alkaloid yaitu jika terbentuk endapan putih pada pereaksi Mayer dan terbentuk endapan coklat pada pereaksi Wagner (Harbone, 1987).

b. Uji Flavonoid

Uji flavonoid dilakukan dengan cara di masukkan 2 ml larutan ekstrak etanol daun majapahit (*C. cujete*) ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambah dengan

pereaksi FeCl_3 5%. Hasil positif adanya senyawa flavonoid ditunjukkan dengan terbentuknya warna jingga sampai merah (Harbone, 1987).

c. Uji Terpenoid

Uji ini dilakukan dengan cara dimasukkan 1 ml ekstrak etanol daun majapahit (*C. cujete*) ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan pereaksi Libermann Burchard. Jika terbentuk warna coklat kemerahan, menandakan positif mengandung senyawa terpenoid (Kalaiselvi, 2016).

d. Uji Tanin

Uji tanin dilakukan dengan cara 2 ml larutan ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan sebanyak 3 tetes FeCl_3 1% menggunakan pipet tetes. Hasil positif yang diperoleh yaitu jika terbentuk warna hijau kehitaman yang menandakan bahwa sampel mengandung senyawa tanin (Simaremare, 2014).

5. Uji Efektivitas Ekstrak Daun Majapahit (*C. cujete* L.) terhadap *Salmonella typhi* Secara *In Vitro*

Uji efektivitas antibakteri *C. cujete* L. dapat dilakukan dengan metode difusi dan metode dilusi.

a. Uji penghambatan pertumbuhan bakteri dengan metode difusi

Media *Nutrient Agar* (NA) pada cawan petri dicairkan, setelah itu dimasukkan ke dalam *waterbath* dengan suhu 50°C . Bakteri *S. typhi* sebanyak 1 ml dimasukkan ke cawan petri lalu diratakan. Kemudian media NA dituang di atasnya. Setelah media

memadat, kertas cakram dijenuhkan ke dalam ekstrak etanol daun majapahit konsentrasi 7%, 8%, 9%, 10% dan 20% selama 10 menit (Maftuch et al., 2018) . Setelah itu disimpan sesuai dengan pembagian penggaris. Kontrol positif kloramfenikol 1% dan kontrol negatif akuades juga diberikan kertas cakram. Selanjutnya diinkubasi dengan suhu 37°C jangka waktu 24 jam. Hari berikutnya diameter zona bening yang terbentuk diukur dengan menggunakan jangka sorong.

Respon penghambatan antibakteri terhadap *S. typhi* dapat diketahui dengan melihat diameter zona hambat yang terbentuk disekitar kertas cakram. Menurut Morales et al., (2003) mengkategorikan respon penghambatan terhadap bakteri menjadi empat, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Kategori Respon Penghambatan terhadap Bakteri

Diameter (mm)	Kategori
<5 mm	Lemah
5-10 mm	Sedang
>10- 20 mm	Kuat
>20- 30 mm	Sangat kuat

Menurut Kusumawati dkk, (2008) diameter zona hambat pertumbuhan bakteri yang terbentuk pada kertas cakram diukur dalam satuan mm.

b. Uji penghambatan pertumbuhan bakteri dengan metode dilusi

Uji penghambatan pertumbuhan bakteri dengan menggunakan metode dilusi terbagi menjadi dua yaitu dilusi cair dan padat. Uji dilusi bertujuan untuk mengukur

Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM). Penentuan KHM dilakukan dengan metode dilusi cair sedangkan untuk menentukan KBM menggunakan metode dilusi padat (Fitriana dkk, 2020).

Biakan murni *S. typhi* diinokulasikan ke dalam media agar miring *Nutrient Agar* (NA), hasil biakan diletakkan di inkubator dengan suhu 37°C. Setelah itu dilakukan pembuatan suspensi bakteri. Biakan bakteri *S. typhi* diambil dari media agar miring dan diinokulasikan ke media *Nutrient Broth* (NB), isolat kemudian diinkubasi. Setelah 24 jam, hasil diambil lalu dibuat suspensi bakteri *S. typhi* dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi NaCl fisiologi 0,9%, kemudian dihomogenkan dengan cara di vorteks. Kemudian dibandingkan dengan standar dengan kepadatan bakteri sebanyak 10^8 sel/ml. Kemudian diencerkan pada media NaCl fisiologis 0,9% dan media NB, didapatkan suspensi bakteri sebanyak 10^6 bakteri sel/ml, bakteri siap diujikan.

Setelah itu, sebanyak 1 ml *Nutrient Broth* (NB) cair di masukkan ke dalam setiap tabung reaksi steril yang diberi perlakuan ekstrak daun majapahit dengan konsentrasi 7%, 8%, 9%, 10%, 20%, kontrol positif menggunakan kloramfenikol 1% dan kontrol negatif menggunakan akuades. Semua tabung yang sudah diinkubasi, selanjutnya di vortex dan ditentukan konsentrasi hambat minimumnya.

Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) ditentukan dengan melihat tingkat kekeruhan pada setiap perlakuan. Perlakuan yang terlihat lebih jernih dengan konsentrasi lebih rendah ditentukan sebagai KHM. Setelah itu, diambil sebanyak 0,1 ml larutan ekstrak majapahit konsentrasi 7% menggunakan mikropipet, lalu

dimasukkan ke dalam media agar dan diratakan dengan menggunakan drigalski. Perlakuan yang sama dilakukan dengan konsentrasi ekstrak lainnya. Kemudian setiap cawan petri yang telah diberi perlakuan diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37°C. Penentuan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) dilakukan dengan menghitung jumlah koloni bakteri dari setiap perlakuan serial konsentrasi ekstrak. Jumlah koloni yang lebih kecil dari 0,1% jumlah bakteri awal ditentukan sebagai KBM (Jumaniah, 2018).

6. Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan uji *Analysis of Variance* (ANOVA) dengan program SPSS 16. *Analysis of Variance* adalah suatu cara untuk menguji hubungan antara satu variabel (skala metrik) dengan satu atau lebih variable (skala nonmetrik atau kategorikal dengan kategori lebih dari dua). Hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen *one way* ANOVA (Ghozali, 2006). Sebelum melakukan uji *One Way* ANOVA, harus dilakukan uji normalitas setelah itu dilakukan uji homogenitas. Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk melihat data yang kita peroleh terdistribusi normal atau tidak. Normalitas dipenuhi jika hasil uji signifikan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai signifikan lebih besar dari α , maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih kecil dari α , maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

Selanjutnya dilakukan uji homogenitas, bertujuan untuk mengetahui varian dari beberapa populasi menunjukkan sama atau tidak. Apabila nilai signifikan pada

uji homogenitasnya lebih kecil dari α , maka varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama. Kebalikannya, apabila nilai signifikan lebih besar dari α , maka varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama. kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan untuk mengetahui perlakuan paling baik.

Sedangkan untuk menghitung presentase aktivitas penghambatan bakteri *S. typhi* disetiap serial konsentrasi ekstrak daun majapahit (*C. cujete* L.) dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini (Egra dkk., 2019):

$$P = \frac{D1}{D2} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Presentase penghambatan (%)

D1: Diameter pertumbuhan bakteri pada konsentrasi ekstrak (mm)

D2: Diameter pertumbuhan bakteri pada kontrol positif (mm)

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Skrining Fitokimia

Skrining fitokimia merupakan uji awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam sampel ekstrak tanaman dengan cara mengamati perubahan yang terjadi setelah ditetesi pereaksi (Rafi, 2003).

Adapun hasil yang diperoleh dari skrining fitokimia ekstrak etanol daun majapahit (*C. cujete* L.) dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Majapahit (*C. cujete* L.)

Uji	Pereaksi	Reaksi
Alkaloid	Wagner	+
	Mayer	-
Flavonoid	FeCl ₃ 5%	-
Terpenoid	Liebermann Burchard	+
Tanin	FeCl ₃ 1%	-

Ket:

(-): tidak terjadi perubahan warna, artinya tidak mengandung flavonoid dan tanin

(+): terjadi perubahan warna, artinya mengandung alkaloid dan terpenoid

2. Uji Daya Hambat Ekstrak Etanol Daun Majapahit (*Crescentia cujete* L.) terhadap Bakteri *Salmonella typhi* dengan Metode Difusi

Uji penghambatan ekstrak etanol daun majapahit (*C. cujete* L.) terhadap bakteri *Salmonella typhi* dengan menggunakan metode difusi terlebih dahulu dilakukan dengan membuat ekstrak daun majapahit. Konsentrasi ekstrak daun *C. cujete* L. yang diujikan sebesar 7%, 8%, 9%, 10% dan 20%. Kontrol positif yang digunakan adalah kloramfenikol 1%, sedangkan kontrol negatifnya yaitu akuades.

Hasil pengamatan daya hambat ekstrak etanol daun majapahit (*C. cujete* L.) terhadap bakteri *S. typhi* dengan metode difusi dapat dilihat pada table 4.2 dan grafik 4.1 berikut.

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Data Diameter Zona Hambat Ekstrak Daun Majapahit (*C. cujete* L.) terhadap bakteri *S. Typhi*

Perlakuan	Rata-rata \pm SD (mm)	Kategori
Kontrol positif (Kloramfenikol 1%)	14,30 \pm 1,76 ^a	Kuat
Konsentrasi 20%	7,16 \pm 2,51 ^b	Sedang
Konsentrasi 10%	3,93 \pm 0,45 ^c	Lemah
Konsentrasi 9%	0	Tidak ada
Konsentrasi 8%	0	Tidak ada
Konsentrasi 7%	0	Tidak ada
Kontrol negatif (Akuades)	0	Tidak ada


Keterangan: Notasi ^{abc} merupakan hasil dari uji Duncan dengan taraf kepercayaan 5% notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata. Kategori respon hambatan berdasarkan Morales et., al (2003).

Hasil uji penghambatan ekstrak etanol daun majapahit (*C. cujete* L.) terhadap bakteri *S. typhi* dengan menggunakan metode difusi menunjukkan bahwa daya penghambatan terhadap bakteri pada kontrol positif kloramfenikol 1% nilai rata-rata diameter zona beningnya sebesar 14,30 mm, konsentrasi ekstrak 20% sebesar 7,16 mm, konsentrasi ekstrak 10% sebesar 3,93 mm. Sedangkan pada konsentrasi ekstrak etanol daun majapahit *C. cujete* L. 9%, 8%, 7% dan kontrol negatif dengan menggunakan akuades tidak menunjukkan adanya diameter zona bening yang terbentuk.

Kategori daya hambat antimikroba berdasarkan diameter zona bening yang terbentuk disekitar kertas cakram menunjukkan bahwa pada kontrol positif kloramfenikol 1% dikategorikan kuat, pada perlakuan konsentrasi ekstrak etanol daun majapahit *C. cujete* L. 20% dikategorikan sedang, konsentrasi ekstrak 10% dikategorikan lemah. Sedangkan pada konsentrasi 9%, 8%, 7% dan kontrol negatif akuades tidak menunjukkan adanya daya hambat terhadap bakteri *S. typhi* karena tidak terlihat adanya zona bening yang terbentuk disekitar kertas cakram.

Hasil uji *One Way* ANOVA didapatkan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ sehingga hasilnya signifikan. Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak daun majapahit 20% dan 10% serta kontrol positif kloramfenikol 1% saling berbeda nyata.

Sedangkan untuk mengetahui presentase penghambatan aktivitas antibakteri pada masing-masing konsentrasi ekstrak ditentukan berdasarkan perbandingan daya hambat terhadap kontrol positif yang hasilnya dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini.



Gambar 4. 1 Grafik Persentase Penghambatan Ekstrak Daun Majapahit (*C. cujete* L.) terhadap bakteri *S.typhi*.

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa presentase penghambatan ekstrak daun majapahit (*C. cujete* L.) terhadap bakteri *S.typhi* pada konsentrasi ekstrak 20% dan 10% masing-masing sebesar 50,06% dan 27,48%. Sedangkan pada konsentrasi 9%, 8%, 7% dan kontrol negatif akuades tidak menunjukkan adanya daya hambat.

3. Uji Daya Hambat Ekstrak Etanol Daun Majapahit (*Crescentia cujete* L.) terhadap Bakteri *Salmonella typhi* dengan Metode Dilusi

Metode dilusi merupakan metode yang digunakan untuk menentukan Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) dari suatu antimikroba. Uji dilusi untuk menentukan KHM menggunakan seri tabung reaksi yang diisi dengan media *Nutrient Broth* (NB) cair, berbagai konsentrasi ekstrak dan bakteri uji *S.typhi*. Penentuan KHM dilakukan dengan melihat tingkat kekeruhan pada masing-masing tabung reaksi. Perlakuan yang terlihat lebih jernih dengan konsentrasi lebih rendah ditentukan sebagai KHM. Adapun hasil penentuan Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) ekstrak ekstrak etanol daun majapahit (*C. cujete* L.) terhadap bakteri *S. typhi* dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Hasil Pengamatan KHM Ekstrak Etanol Daun Majapahit (*C. cujete* L) terhadap *S. typhi*

Tabung	Keterangan
Kontrol positif (Kloramfenikol 1%)	Jernih
Konsentrasi 20%	Jernih
Konsentrasi 10%	Jernih
Konsentrasi 9%	Keruh
Konsentrasi 8%	Keruh
Konsentrasi 7%	Keruh
Kontrol negatif (akuades)	Keruh

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa kontrol positif kloramfenikol 1%, konsentrasi ekstrak 20% dan 10% menunjukkan hasil yang jernih pada tabung reaksi. Konsentrasi ekstrak etanol daun *C. cujete* L. 9% dan 8% 7% dan kontrol negatif dengan menggunakan akuades menunjukkan kekeruhan.

Sedangkan untuk menentukan KBM dilakukan dengan cara melihat pertumbuhan koloni bakteri pada media di setiap konsentrasi ekstrak. Konsentrasi terendah ekstrak etanol daun majapahit (*C. cujete* L.) yang tidak menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri *S. typhi* ditentukan sebagai KBM. Hasil KBM ekstrak daun majapahit (*C. cujete* L.) terhadap bakteri *S. typhi* dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Hasil Pengamatan KBM Ekstrak Etanol Daun Majapahit (*C. cujete* L.) terhadap *S. typhi*

Tabung	Keterangan
Kontrol positif (Kloramfenikol 1%)	Tidak tumbuh mikroba
Konsentrasi 20%	Tumbuh mikroba
Konsentrasi 10%	Tumbuh mikroba
Konsentrasi 9%	Tumbuh mikroba
Konsentrasi 8%	Tumbuh mikroba
Konsentrasi 7%	Tumbuh mikroba
Kontrol negatif (akuades)	Tumbuh mikroba

Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengamatan KBM ekstrak etanol daun majapahit (*C. cujete* L.) terhadap *S. typhi*. Konsentrasi ekstrak 20%, 10%, 9%, 8%, 7%, kontrol

negatif dengan menggunakan akuades memperlihatkan adanya pertumbuhan *S.typhi*. Sedangkan kontrol positif kloramfenikol 1% tidak memperlihatkan adanya pertumbuhan *S.typhi*.

B. Pembahasan

1. Skrining Fitokimia


Skrining fitokimia bertujuan untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam ekstrak daun majapahit (*C. cujete* L.) seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid dan tanin. Hasil skrining fitokimia ekstrak etanol daun majapahit (*C. cujete* L.) yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu positif mengandung senyawa alkaloid dan terpenoid, sementara pada senyawa flavonoid dan tanin hasilnya negatif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dkk, (2014) yang menyatakan bahwa pada hasil skrining senyawa fitokimia daun majapahit dengan menggunakan pelarut etanol, positif mengandung senyawa alkaloid, sedangkan untuk senyawa flavonoid dan tanin hasilnya negatif. Hasil penelitian dari Erwin dkk, (2012) juga mengungkapkan bahwa didalam ekstrak etanol daun majapahit (*C. cujete* L.) terdapat senyawa terpenoid dan alkaloid.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Das et.al., (2014), melaporkan hasil yang berbeda bahwa skrining senyawa fitokimia daun majapahit (*C. cujete* L.) dengan menggunakan pelarut etanol, positif mengandung senyawa metabolit sekunder berupa tanin dan flavonoid. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Tri dkk, (2019) yang menyatakan bahwa ekstrak daun majapahit memiliki kandungan metabolit sekunder

berupa flavonoid dan tanin. Adanya perbedaan kandungan senyawa metabolit sekunder pada tanaman majapahit (*C. cujete* L.) kemungkinan diakibatkan oleh asal tanaman, kondisi geografis tempat tanaman tersebut tumbuh, usia tanaman dan proses ekstraksi sampel tanaman (Kusumaningtyas dkk, 2008). Selain itu juga dipengaruhi oleh perbedaan ukuran partikel serbuk yang dimaserasi. Perbedaan senyawa fitokimia yang terdeteksi juga dapat disebabkan oleh ukuran partikel serbuk simplisia yang diekstrak. Sembiring dan Suhirman (2014) melaporkan bahwa semakin kecil ukuran partikel simplisia yang diekstrak, maka akan memperbesar kandungan senyawa flavonoid yang terekstrak.


a. Golongan senyawa alkaloid

Alkaloid adalah turunan dari asam amino dan umumnya ada di dalam berbagai organisme sebagai garam asam organik. Alkaloid termasuk senyawa metabolit sekunder yang menunjukkan aktivitas fisiologi yang luas, seperti memiliki sifat basa. Hal ini dipengaruhi karena adanya unsur nitrogen dalam cincin heterosiklik yang terkandung dalam alkaloid. Apabila gugus fungsional yang berdekatan dengan nitrogen bersifat melepaskan elektron, misalnya sebagai gugus alkil, maka jumlah elektron pada nitrogen meningkat dan senyawa lebih bersifat basa. Struktur dasar alkaloid dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini.



Gambar 4.2. Struktur Alkaloid


Pengujian alkaloid dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pereaksi Wagner dan Mayer. Hasil uji positif pada uji Wagner ditandai dengan adanya endapan berwarna coklat hingga kuning yang terbentuk setelah ditambahkan tetes pereaksi Wagner (Harbone, 1987), endapan yang terbentuk diperkirakan adalah kalium-alkaloid. Pada saat pembuatan Wagner, iodine akan bereaksi dengan ion I^- yang berasal dari kalium iodida dan akan menghasilkan ion I_3^- dengan warna yang coklat. Ikatan kovalen koordinat dengan nitrogen yang terdapat pada alkaloid terbentuk pada saat uji ion logam K^+ yang akan membentuk kalium-alkaloid yang kompleks yang mengendap (Marliana et al., 2005). Adapun reaksi yang terjadi pada uji Wagner dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.3. Reaksi Uji Wagner

Uji alkaloid dengan menggunakan pereaksi Mayer dapat dilihat jika terbentuk endapan berwarna putih setelah ditetesi pereaksi Mayer. Marliana et al., (2005) mengatakan bahwa pada saat pereaksi Mayer dibuat, larutan merkuriem (II) klorida ditambahkan kalium iodida setelah itu akan bereaksi dan terbentuk endapan merah

merkuri (II) iodida. Pada saat penambahan kalium iodida berlebihan maka terbentuklah kalium tetraiodomerkurat (II). Alkaloid merupakan senyawa yang mengandung atom nitrogen dan mempunyai pasangan elektron bebas, sehingga dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen koordinat dengan ion logam (McMurry, 2004). Pada saat uji alkaloid dengan menggunakan pereaksi Mayer, diperkirakan nitrogen pada senyawa alkaloid akan bereaksi dengan ion logam K^+ yang berasal dari kalium tetraiodomerkurat (II) sehingga terbentuklah kompleks kalium-alkaloid yang mengendap. Reaksi uji Mayer ditunjukkan pada gambar 4.5 berikut.



Gambar 4.4 Reaksi Uji Mayer


Setiap tanaman memiliki daya antimikroba yang berbeda-beda tergantung dengan senyawa metabolit sekunder yang terkandung didalamnya, sehingga hal ini mempengaruhi aktivitas penghambatan senyawa tanaman terhadap bakteri (Wiyanto, 2010). Alkaloid merupakan senyawa antibakteri karena dapat merusak komponen penyusun membran sel bakteri berupa peptidoglikan sehingga bakteri dapat mengalami kematian. Menurut Nuraina (2015), senyawa alkaloid juga memiliki

kemampuan menghambat enzim DNA topoisomerase yang merupakan enzim yang mengatur terjadinya replikasi DNA. Jika kinerja dari enzim tersebut terhambat maka akan terjadi kendala pada tahapan replikasi DNA, sehingga pertumbuhan bakteri juga akan terhambat.

Mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri yaitu dengan cara melakukan penghambatan sintesis dinding sel dan merusak komponen peptidoglikan pada sel bakteri sehingga sel bakteri akan lisis dan lapisan dinding sel tidak terbentuk secara sempurna (Ambasari, 2013).

b. Golongan senyawa flavonoid

Flavonoid merupakan kelompok besar senyawa fenol tersebar luas di alam, baik di alam (Winarsi, 2007). Senyawa-senyawa tersebut dapat berupa zat warna merah, ungu dan biru dan sebagai zat warna kuning pada tumbuh-tumbuhan (Markham, 1988). Flavonoid memiliki cincin piran yang menghubungkan rantai tiga-karbon dengan salah satu cincin benzene (Harborne, 1987). Flavonoid termasuk ke dalam golongan senyawa phenolik yang memiliki struktur kimia $C_6-C_3-C_6$ (Maslarova, 2001). Heinrich, et al., (2010) mengatakan bahwa flavonoid bersumber dari hasil biosintesis gabungan dari asam sikimat dan jalur poliketida.



Gambar 4.5 Struktur Senyawa Flavonoid (Redha, 2010)


Keberadaan senyawa flavonoid dalam suatu tanaman dapat dilakukan dengan melakukan skrining fitokimia. Uji tersebut memiliki tujuan untuk melihat potensi dari tanaman tersebut untuk dijadikan obat herbal. Hasil positif adanya senyawa flavonoid ditunjukkan dengan munculnya warna jingga hingga merah pada tabung reaksi (Harbone, 1987). Senyawa flavonoid memiliki efek antibakteri sehingga senyawa flavonoid mampu menghambat pertumbuhan bakteri, termasuk bakteri gram negatif dengan melalui beberapa mekanisme. Menurut Nuraina (2015) cara penghambatan pertumbuhan bakteri oleh senyawa flavonoid yaitu dengan melakukan penghambatan pada tahapan sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sel dan mengganggu proses metabolisme sel.

Senyawa flavonoid menghambat sintesis asam nukleat yang terletak pada cincin B yang memiliki fungsi dalam proses interkalasi, sehingga pembentukan materi genetik berupa DNA dan RNA akan terhambat. Fungsi membran sel bakteri dapat terganggu karena senyawa flavonoid membentuk ikatan kompleks dengan dinding sel sehingga membran menjadi rusak. Senyawa flavonoid dapat mengganggu proses metabolisme sel bakteri dengan mengganggu proses respirasi sel bakteri, sehingga energi yang dibutuhkan oleh sel bakteri tidak dapat terpenuhi dengan baik dalam melakukan penyerapan aktif metabolit dan biosintesis makromolekul (Cushnie & Lamb, 2006).

c. Golongan senyawa terpenoid

Terpenoid ialah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh. Terdapat unit terkecil yang disebut isopren (C_5H_8) di dalam terpenoid. Setiap satuan isopren umumnya

terdiri dari urutan kepala ke ekor, yakni ujung yang bercabang dan saling menghubungkan antar sesama isopren. Struktur dasar isopren dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 4.6. Struktur Dasar Isopren

Terpenoid termasuk senyawa yang terkandung di dalam ekstrak daun majapahit (*C. cujete* L.) dan memiliki kemampuan antibakteri. Mekanisme kerja dari senyawa terpenoid yaitu dengan merusak membran sel bakteri (Rahman dkk, 2017). Membran sel bakteri dapat rusak apabila senyawa aktif dari antibakteri bereaksi dengan sisi aktif membran sel bakteri atau dengan melarutkan konstituen lipid dan meningkatkan permeabilitas membran. Membran sel bakteri tersusun atas fosfolipid dan molekul protein. Apabila permeabilitas membran meningkat, maka senyawa terpenoid dapat masuk ke dalam sel sehingga sel mengalami lisis (Maryanti dkk, 2011).


Uji senyawa terpenoid dapat dilakukan dengan menambahkan pereaksi Liebermann Burchard ke dalam ekstrak etanol daun majapahit (*C. cujete* L.). Hasil positif adanya kandungan senyawa terpenoid di dalam ekstrak ditandai dengan terbentuknya warna coklat kemerahan (Kalaiselvi, 2016).

d. Golongan senyawa tanin

Senyawa tanin merupakan senyawa metabolit sekunder polifenol yang terdapat pada tanaman (Araujo et al., 2018). Tanin termasuk molekul yang memiliki kemampuan berinteraksi dan mengendapkan protein antara lain molekul seperti polisakarida dan polifenol. Secara kimia, senyawa tanin ada dua jenis yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Senyawa tanin mudah dihidrolisis oleh asam, basa, air panas dan beberapa enzim. Dua kelompok tanin terhidrolisis yaitu galotanin dan ellagitanin. Kedua jenis tanin tersebut berasal dari unit asam galat atau asam ellagic yang diperoleh setelah proses hidrolisis. Sedangkan senyawa tanin terkondensasi atau proanthocyanidins merupakan oligomer dan polimer flavan-3-ol. Flavanol terdiri dari rantai karbon $C_6-C_3-C_6$, dan terdiri dari dua cincin aromatik A dan B dan cincin pyran, heterosiklik C (Kennedy et al., 2008). Senyawa tanin terkondensasi terjadi apabila terjadi reaksi polimerisasi antar senyawa flavonoid (Watrelet & Norton, 2020). Struktur kimia senyawa tanin terhidrolisis dan terkondensasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.7. Struktur Kimia Tanin Terhidrolisis (Heinrich et al., 2004)



Gambar 4.8. Struktur Kimia Tanin Terkondensasi (Heinrich et al., 2004)

Senyawa tanin memiliki sifat antibakteri karena dapat menonaktifkan adhesin bakteri, menghambat kinerja enzim, menghambat proses transport protein pada selubung sel (Faron et al., 2004). Menurut Akiyama et al., (2001) mengungkapkan bahwa dalam menghambat pertumbuhan bakteri, senyawa tanin melakukan perusakan

terhadap membran sel bakteri dan membentuk ikatan kompleks ion logam yang memiliki peran dalam toksisitas senyawa tanin. Adanya ikatan antara tanin dan zat besi akan mengganggu stabilitas fungsi bakteri. Bakteri yang hidup pada kondisi aerob memerlukan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi sel, salah satunya untuk proses reduksi prekursor ribonukleotida DNA (Chung, 2006).

2. Uji Daya Hambat Ekstrak Etanol Daun Majapahit (*Crescentia cujete* L.) terhadap Bakteri *Salmonella typhi* dengan Metode Difusi

Metode yang digunakan untuk menguji daya hambat ekstrak daun majapahit (*Crescentia cujete* L.) yaitu metode difusi agar dengan menggunakan kertas cakram. Metode ini digunakan karena lebih cepat, bahan yang digunakan juga mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Tujuan dilakukannya uji aktivitas antibakteri yaitu untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki ekstrak daun majapahit dalam menghambat pertumbuhan *Salmonella typhi* (Katrin dkk, 2015). Setelah dilakukan pengamatan zona hambat, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji *One Way ANOVA* dan dilanjutkan dengan uji Duncan.

Hasil analisa dengan ANOVA menunjukkan bahwa ekstrak daun majapahit (*C. cujete* L.) berpengaruh dalam menghambat pertumbuhan *S. typhi* dengan p-value 0,000 ($P < 0,05$). Berdasarkan hasil uji penghambatan ekstrak etanol daun majapahit (*Crescentia cujete* L.) pada kontrol positif kloramfenikol 1% terbentuk zona hambat dengan nilai rata-rata diameternya sebesar 14,30 mm, konsentrasi ekstrak 20% sebesar 7,16 mm dan konsentrasi ekstrak 10% sebesar 3,93 mm. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variasi konsentrasi ekstrak 20%, 10% dan kontrol positif

kloramfenikol 1% menunjukkan adanya aktivitas antibakteri karena terbentuk zona hambat. Sedangkan pada konsentrasi ekstrak etanol daun majapahit *C. cujete* L. 9%, 8%, 7% dan kontrol negatif dengan menggunakan akuades tidak menunjukkan adanya diameter zona hambat yang terbentuk. Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa ada perbedaan nyata antara kontrol positif kloramfenikol 1%, konsentrasi ekstrak 20% dan konsentrasi 10%.

Kategori daya hambat antimikroba berdasarkan diameter zona hambat yang terbentuk disekitar kertas cakram menunjukkan bahwa respon penghambatan kontrol positif kloramfenikol 1% terhadap bakteri *S. typhi* dikategorikan kuat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kemenkes RI (2011) bahwa kloramfenikol 1% merupakan antibiotik yang memiliki spektrum yang luas, aktif dan mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif. Sumardjo (2009) juga menyatakan bahwa kloramfenikol bersifat bakteristatik sehingga dapat menghambat terjadinya infeksi yang diakibatkan oleh bakteri gram negatif dan positif. Selain itu, kloramfenikol dapat menghalangi terjadinya proses sintesis protein dengan berikatan dengan subunit ribosom 50S yang menyebabkan terganggunya proses pembentukan ikatan peptida dan biosintesis protein (Susanti, 2009).

Penghambatan bakteri gram negatif pada perlakuan konsentrasi ekstrak etanol daun majapahit *C. cujete* L. 20% dikategorikan sedang, konsentrasi ekstrak 10% dikategorikan lemah, konsentrasi 9%, 8% dan 7% belum menunjukkan adanya zona hambat yang terbentuk disekitar kertas cakram. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak etanol daun majapahit yang diberikan maka diameter zona

hambat yang terbentuk juga semakin besar. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh hasil penelitian Lorain (2005) yang menyatakan bahwa jika konsentrasi antimikroba meningkat, maka proses difusi juga akan berlangsung cepat. Daya antibakteri akan semakin besar dan diameter zona hambat yang dihasilkan semakin luas.

Faktor lain yang menjadi penyebab terbentuknya zona hambat adalah jenis bakteri uji yang digunakan. Bakteri *Salmonella typhi* merupakan salah satu bakteri Gram negatif dengan peptidoglikan yang tipis (5-10 nm)³ (Pelczar dan Chan, 2008). Bakteri gram negatif memiliki 3 lapisan pada bagian membran luarnya, yakni lipopolisakarida (LPS), lipoprotein dan fosfolipid. Membran luar bakteri Gram negatif hanya mampu dilalui oleh zat-zat tertentu. Zona hambat dapat terbentuk karena senyawa metabolit sekunder mampu melewati lapisan lipopolisakarida. Mekanisme kerja dari senyawa metabolit sekunder dalam menghambat pertumbuhan bakteri umumnya dimulai dengan merusak integritas dari dinding sel bakteri (Tortora et al., 2007).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila dibandingkan presentase daya penghambatan ekstrak daun majapahit (*C. cujete* L.) dengan kontrol positif kloramfenikol 1%, daya hambat kontrol positif lebih tinggi dan belum mampu diimbangi oleh konsentrasi ekstrak tertinggi daun majapahit yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsentrasi 20%. Sedangkan kontrol negatif akuades tidak menunjukkan adanya pengaruh daya hambat terhadap bakteri *S. typhi* karena tidak terlihat adanya zona bening yang terbentuk disekitar kertas cakram. Hal ini sejalan

dengan hasil penelitian Dewi et al., (2014) yang menyatakan bahwa akuades yang digunakan sebagai pelarut ekstrak tidak berperan dalam pembentukan zona hambat, karena pada penghambatan bakteri *Ralstonia solanacearum* tidak terbentuk zona hambat.

3. Uji Daya Hambat Ekstrak Etanol Daun Majapahit (*Crescentia cujete* L.) terhadap Bakteri *Salmonella typhi* dengan Metode Dilusi

Hasil uji penghambatan ekstrak etanol daun majapahit (*Crescentia cujete* L.) terhadap bakteri *Salmonella typhi* dengan menggunakan metode dilusi, dapat diketahui bahwa ekstrak daun majapahit memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri *S.typhi*. Hal itu dapat terlihat dari hasil penentuan Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) yang disajikan pada tabel 4.3 dan hasil uji Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) pada tabel 4.4.

Berdasarkan hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa KHM dari ekstrak etanol daun majapahit yang diujikan ke bakteri *S. typhi* adalah konsentrasi ekstrak 10%, karena konsentrasi tersebut merupakan konsentrasi ekstrak terendah yang menunjukkan tingkat kejernihan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tortora et al., (2010) bahwa KHM merupakan konsentrasi minimum zat antimikroba yang dapat melakukan penghambatan pertumbuhan bakteri setelah dilakukan proses inkubasi selama 24 jam dengan cara melihat tingkat kekeruhan disetiap perlakuan.

Pada konsentrasi ekstrak majapahit 9%, 8%, 7% dan kontrol negatif akuades tidak menunjukkan perubahan kekeruhan menjadi jernih pada tabung uji sehingga tidak menunjukkan adanya daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri *S. typhi*.

Armyanti (2019) mengatakan bahwa kekeruhan yang terbentuk disebabkan oleh medium dan infusa atau proses pengerjaan dan alat yang digunakan sederhana. Hasil uji KHM pada penelitian ini sejalan dengan hasil uji difusi yang menunjukkan adanya zona hambat yang terbentuk pada konsentrasi ekstrak 20% dan 10%, sedangkan konsentrasi dibawahnya belum menunjukkan adanya zona hambat.

Hasil pada tabel 4.4 uji KBM menunjukkan bahwa pada konsentrasi ekstrak etanol 20%, 10%, 9%, 8% dan 7% masih menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri *S. typhi* pada cawan petri. Jumlah koloni bakteri *S. typhi* yang tumbuh sangat banyak dan padat memenuhi media, sehingga tidak dapat dihitung jumlahnya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Hogg (2005) bahwa pertumbuhan bakteri yang sangat padat tidak dapat dihitung karena akan menyebabkan hasil perhitungan menjadi tidak valid. Oleh karena itu, KBM pada penelitian ini tidak didapatkan nilainya karena pada konsentrasi ekstrak etanol daun majapahit (*C. cujete* L.) yang paling tertinggi yakni 20% masih menunjukkan pertumbuhan bakteri *S. typhi*. Banyaknya jumlah bakteri yang tumbuh kemungkinan disebabkan oleh proses pengerjaan, seperti proses penuangan kultur bakteri dan tabung reaksi yang digunakan (Maliana et al., 2013).

Nilai KBM juga dipengaruhi oleh sifat dari senyawa antibakteri yang digunakan. Setyaningsih (2004) mengatakan bahwa senyawa antibakteri dapat bersifat bakteristatik, bakteriosida dan bakteriolitik. Bakteristatik artinya senyawa antibakteri yang digunakan hanya dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan belum mampu membunuh bakteri. Mekanisme bakteristatik biasanya berlangsung pada ribosom yang dapat mengganggu proses sintesis protein (Madigan, 2003). KBM

dalam penelitian ini belum bisa ditentukan kemungkinan disebabkan karena ekstrak daun majapahit yang digunakan hanya bersifat bakteriostatik. Selain itu dapat diakibatkan karena konsentrasi ekstrak daun majapahit yang diaplikasikan pada bakteri *S. typhi* terlalu rendah, sehingga belum mampu membunuh pertumbuhan bakteri tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa efektivitas ekstrak daun majapahit dalam menghambat pertumbuhan *S. typhi* dipengaruhi oleh tingkat konsentrasi ekstrak. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak etanol daun majapahit yang digunakan, maka kemampuan penghambatan bakterinya juga semakin besar. Hal ini juga sesuai dengan yang hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tri et al., 2019) yaitu ekstrak daun majapahit (*C. cujete* L.) efektif menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* dengan konsentrasi ekstrak tertinggi yaitu 25% karena semakin banyak senyawa antibakteri yang terkandung didalamnya sehingga zona hambatnya semakin besar. Hal ini juga diperkuat oleh (Hasanah & Rosdiana, 2016) yang melaporkan hasil penelitian bahwa pada konsentrasi 100% ekstrak daun majapahit paling tinggi daya penghambatannya terhadap bakteri *E. coli* dan *S. aureus*.

Adanya perbedaan pengaruh penghambatan konsentrasi ekstrak daun majapahit dalam menghambat pertumbuhan *S. typhi* disebabkan oleh perbedaan senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak. Kandungan senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak dapat dipengaruhi oleh habitat tanaman, usia daun yang diekstrak dan unsur hara yang diperoleh tanaman. Hal ini

diperkuat (Febrianasari, 2018) yang mengatakan bahwa kadar metabolit sekunder yang terkandung dalam tanaman dipengaruhi oleh lingkungan tempat tanaman tersebut tumbuh. Salim et al., (2016) menyatakan bahwa unsur hara makro N, K, bahan organik dan C memiliki keterkaitan dengan sintesis senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan. Jika kadar unsur hara pada tanaman tercukupi dengan baik maka pembentukan senyawa metabolit sekunder pada tanaman juga optimal.

Usia tanaman juga mempengaruhi kuantitas senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam tanaman. Tanaman muda memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder yang lebih rendah dibanding dengan tanaman yang sudah tua, ini dikarenakan tanaman yang masih muda proses sintesis senyawa metabolit sekundernya belum optimal. Hal ini didukung oleh Erlyani (2012) yang mengatakan bahwa variasi kandungan metabolit sekunder yang terkandung dalam tumbuhan dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor internal tumbuhan itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Ekstrak daun majapahit (*C. cujete* L.) mengandung senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid dan terpenoid yang mampu menghambat pertumbuhan *S. typhi*.
2. Ekstrak tanaman majapahit (*C. cujete* L.) memiliki aktivitas penghambatan sedang pada konsentrasi ekstrak 20% yang dapat dilihat pada zona hambat yang terbentuk, KHM yang diperoleh yaitu pada perlakuan ekstrak 10% sedangkan KBM belum bisa ditentukan. Efektivitas penghambatan ekstrak *C. cujete* L. dalam menghambat pertumbuhan *S. typhi* dipengaruhi oleh konsentrasi ekstrak, semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan maka aktivitas penghambatan juga semakin besar.

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan konsentrasi ekstrak daun majapahit (*C. cujete* L.) yang lebih tinggi dan melakukan perhitungan kadar senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam setiap bagian akar, batang, daun dan buah *C. cujete* L. yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akiyama, H., Fujii, K., Yamasaki, O., Oono, T., & Iwatsuki, K. "Antibacterial action of several tannins against *Staphylococcus aureus*". *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*. 48 no. 8 (2001): p. 487-491.
- Al-Shekh Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2011.
- Ambasari, M. A. "Aktivitas Antibakteri Fraksi n-heksan Ekstrak Etanol Daging Buah Sirsak (*Annona muricata* L.) terhadap *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* *Shigella sonnei* dan serta Bioautografinya". *Naskah Publikasi*. 2013.
- Anonim. *Profil Kesehatan Indonesia*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. 2009.
- Armyanti, S. P. I. I. "Aktivitas Antibakteri Infusa Buah Langsung (*Lansium domesticum* Cor.) terhadap *Streptococcus pneumoniae*". *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53 no. 9 (2019): h. 1689-1699.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. *Riset Kesehatan Dasar*. Departemen Kesehatan RI, Jakarta. 2008.
- Bhutta, Z. A. "Typhoid fever: Current concepts". *Infectious Diseases in Clinical Practice*. 333 (2006): p. 78-82.
- Buckle, G. C., Walker, C. L. F., & Black, R. E. "Typhoid fever and paratyphoid fever: Systematic review to estimate global morbidity and mortality for 2010". *Journal of Global Health*. 2 no. 1 (2012): h. 1-9.
- Chukwuma, E. R., Obioma, N., & Christopher, O. I. "The phytochemical composition and some biochemical effects of nigerian tigernut (*Cyperus esculentus* L.) tuber". *Pakistan Journal of Nutrition*. 9 no. 7 (2010):p.709-715.
- Chung JY, Choo JH, Lee MH, Hwang JK. Anticariogenic activity of macelignan isolated from *Myristica fragans* (nutmeg) against *Streptococcus mutans*. *Phytomedicine*. 13 (2006): p. 261-266.
- Cita, Y. P. "Bakteri Salmonella typhi dan demam tifoid". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 6 no. 1 (2011): h. 42-45.
- Clark, T. W., Daneshvar, C., Pareek, M., Perera, N., & Stephenson, Ix. "Enteric fever in a UK regional infectious diseases unit: A 10 year

- retrospective review” *Journal of Infection*. 60 no. 2 (2010): p. 91-8.
- Connor, B. A., & Schwartz, E. "Typhoid and paratyphoid fever in travellers". *Lancet Infectious Diseases*. 5 no.10 (2005): p. 623-628.
- Crump, J. A., & Mintz, E. D. "Global trends in typhoid and paratyphoid fever". *Clinical Infectious Diseases*. 50 no. 2 (2010):p. 241-246.
- Cushnie, T. P. T., & Lamb, A. J. "Erratum: Antimicrobial activity of flavonoids". *International Journal of Antimicrobial Agents*. 27 no. 2 (2006): h. 343-356.
- Damin, Soemardjo. *Pengantar Kimia: Buku Panduan Kuliah Mahasiswa Kedokteran dan Program Strata I Fakultas Bioeksakta*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta. Hal 435.
- Depkes RI. *Laporan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008.
- Dewi, M. K., Ratnasari, E., & Trimulyono, G. "Aktivitas antibakteri ekstrak daun majapahit (*Crescentia cujete*) terhadap pertumbuhan bakteri *Ralstonia solanacearum* penyebab penyakit layu". *Jurnal LenteraBio*. 3 no. 1 (2014): h. 51-57.
- Dong, B.-Q., Yang, J., Wang, X.-Y., Gong, J., von Seidlein, L., Wang, M.-L., Lin, M., Liao, H.-Z., Ochiai, R. L., Xu, Z.-Y., Jodar, L., & Clemens, J. D. "Trends and disease burden of enteric fever in Guangxi province, China, 1994–2004". *Bull World Health Organ*. 88 (2010): p.689-698.
- Egra Saat., Mardhiana., Rofin Mut., Adiwena Muhammad., Jannah Nur., Kuspradini Harlinda & Mitsunaga Tohru. "Aktivitas Antimikroba Ekstrak Bakau (*Rhizophora mucronata*) dalam Menghambat Pertumbuhan *Ralstonia Solanacearum* Penyebab Penyakit Layu". *AGROVIGOR*. 12 no. 1: h. 26-31.
- Ejelonu, B. C., Lasisi, A. A., Olaremu, A. G., & Ejelonu, O. C. "The chemical constituents of calabash (*Crescentia cujete*)". *African Journal of Biotechnology*. 10 no.84 (2011):p.19631-19636.
- Erlyani, "Identifikasi Kandungan Metabolit Sekunder dan Uji Antioksidan Ekstrak Metanol Tandan Bunga Jantan Enau (*Arenga pinnata* Merr.)". *Jurnal Skripsi Jurusan PMIPA FKIP Universitas Unhalu Kendari*. 2012.
- Erwin, Saleh, C. dan Purwitasi, T. "Uji Hipoglikemik Ekstrak Metanol Daun Majapahit (*Crescentia cujete* L.) Terhadap Kadar Glukosa Darah Mencit Jantan". *Jurnal Kimia Mulawarman*. 9 no.2 (2012): h. 50-55.

- Faron, M. L. B., Perecin, M. B., Lago, A. A. do, Bovi, O. A., & Maia, N. B. "Temperatura, nitrato de potássio e fotoperíodo na germinação de sementes de *Hypericum perforatum* L. e H. Brasiliense Choisy. *Bragantia*. 63 no. 2 (2004): p. 193-199.
- Fatmawati, I. "Efektivitas Buah Maja (*Aegle Marmelos* (L.) Corr.) sebagai Bahan Pembersih Logam Besi". *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*. 9 no. 1 (2015): h. 81-87.
- Febrianasari. "Uji Antibakteri Ekstrak Daun Kirinyu (*Chromolaena odorata*) terhadap *Staphylococcus aureus*". Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Skripsi. 2018.
- Fitriana, Y. A. N., Fatimah, V. A. N., & Fitri, A. S. "Aktivitas Anti Bakteri Daun Sirih: Uji Ekstrak KHM (Kadar Hambat Minimum) dan KBM (Kadar Bakterisidal Minimum)". *Sainteks*, 16 no. 2 (2020): p. 101-108.
- Ghozali, Imam. "Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Gunn, J. S., Marshall, J. M., Baker, S., Dongol, S., Charles, R. C., & Ryan, E. T. "Salmonella chronic carriage: Epidemiology, diagnosis, and gallbladder persistence". In *Trends in Microbiology*. 22 no. 11 (2014): p. 648-655.
- Harborne, J.B. *Metode Fitokimia, Edisi ke dua*, ITB, Bandung. 1987.
- Harmita dan Radji, M. *Buku Ajar Analisis Hayati Edisi 3*. Jakarta : EGC. 2008.
- Haryoto Widodo., Gunawan Pamuji., ChalimahSiti., Suhendi A. "Pengembangan Obat Herbal Terstandar Ekstrak Tumbuhan Sala (*Cynometra Ramiflora* Linn.) Sebagai Obat Antikanker Ramuan Keraton Solo". *Thesis*. 2014.
- Hatta, M., & Ratnawati. "Enteric fever in endemic areas of Indonesia: An increasing problem of resistance". *Journal of Infection in Developing Countries*, 2 no.4 (2008):p.279-282.
- Heinrich et al. *Fundamental of pharmacognosy and phytotherapi*. Hungary. Elsevier. 2004.
- Heinrich, M., Barnes, J., Gibbons, S., Williamson, E., M. *Farmakognosi dan Fitoterapi*. Penerbit Buku Kedokteran: Jakarta, 2010.
- Hogg, S. *Essential Microbiology*. John Wiley dan Sons Ltd., Inggris. 2005.
- Hugo, W. B. dan Russel, A. D. *Pharmaceutical Microbiology, VI Edition*. 28, 132, Blackwell Science, Ltd. United States of America. 1998.

- Jawetz, E., Melnick, J. L., Adelberg, E. A. *Mikrobiologi Kedokteran, Edisi XXII*. Diterjemahkan oleh Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 205-209, Penerbit Salemba Medika, Jakarta. 2001.
- Jawetz, M. A. *Mikrobiologi Kedokteran (25 ed.)*. (G. F. Brooks, K. C. Carroll, J. S. Butel, S. A. Morse, T. A. Mietzner, Penyunt., A. W. Nugroho, D. Ramadhani, H. Santasa, N. Yasdelita, & K. W. Nimala, Penerj.) New York: Mc Graw Hill. 2010.
- Jumaniah. "Identifikasi Senyawa Tanaman Tambalepen dan Pengaruh Penghambatannya pada Bakteri *Salmonella enterica* serovar *Typhi*". Makassar: UIN Alauddin Makassar. *Skripsi*. 2018.
- Juwita, S., Hartoyo, E., & Budiarti, L. Y. "Pola Sensitivitas In Vitro Salmonella Typhi terhadap Antibiotik Kloramfenikol, Amoksisilin dan Kotrimoksazol: Di Bagian Anak RSUD Ulin Banjarmasin Periode Mei-September 2012". *Berkala Kedokteran Unlam*. (2013). <https://doi.org/10.20527/jbk.v9i1.915>
- Kalaiselvi, Venkitachalpathi, et al. "Preliminary Phytochemical Analysis of the Various Leaf Extracts of *Mimusops Elengi* L." *South Indian Journal of Biological Sciences*. 2 no. 1 (2016): p. 24.
- Kanj, S. S., Kanafani, Z. A., Shehab, M., Sidani, N., Baban, T., Baltajian, K., Dakdouki, G. K., Zaatari, M., Araj, G. F., Wakim, R. H., Dbaibo, G., & Matar, G. M. "Epidemiology, clinical manifestations, and molecular typing of salmonella typhi isolated from patients with typhoid fever in Lebanon". *Journal of Epidemiology and Global Health*. 5 no.2 (2015):p. 159165.
- Katrin, D., Idiawati, N., & Sitorus, B. "Uji Aktivitas Antibakteri dari Ekstrak Daun Malek (*Litsea graciae* Vidal) terhadap Bakteri *Stapylococcus aureus* dan *Escherichia coli*". *Jkk*, 4 no. 1 (2015): h. 7-12.
- Kemenkes RI. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pengendalian Demam Tifoid*. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 364/Menkes/SK/V/2006. In *KMK No. 364 tentang Pedoman Pengendalian Demam Tifoid*. (2006).
- Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 2406/Menkes/Per/XII/2011, tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2011.
- Kementerian Agama RI. *Al'quran Madina*. Bandung: PT. Madina Raihan makmur, 2012.
- Kennedy D. W. *Endoscopic Sinus Surgery*. In: Thaler, E. R. & Kennedy, D. W. (eds.) *Rhinosinusitis, A Guide for Diagnosis and Managment*. New York: Springer.

2008.

- Kusumaningtyas E, Widiati RR, Gholib D. “Uji daya hambat ekstrak dan krim ekstrak daun sirih (*Piper betle*) terhadap *Candida albicans* dan *Trichophyton mentagrophytes*. Dalam: Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Inovasi Teknologi Mendukung Pengembangan Agribisnis Peternakan Ramah Lingkungan”. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Balitbang Pertanian*, Bogor 11-12 November 2008.
- Kusumawati N, Bettysri LJ, Siswa S, Ratihdewanti, Hariadi. “Seleksi Bakteri Asam Laktat Indigenous sebagai Galur Probiotik dengan Kemampuan Menurunkan Kolesterol”. *Jurnal Mikrobiologi Indonesia*. 2 no. 1 (2008): h. 120-128.
- Lorain, V. *Antibiotic in Laboratory Medicine 5^{2nd} Edition*. Williams and Wilkins Co, London. 2005.
- Madigan, M. P. T.,P.J. Martinoko dan J. Parker. “*Brock Biologi of Microorganisms*”. New York: Prentice hall International Inc., Englewood Cliff.
- Maftuch, M., Setyawan, F. H., & Suprastyani, H. Uji Daya Hambat Ekstrak *Chaetoceros calcitrans* Terhadap Bakteri *Aeromonas salmonicida*. *JFMR- Journal of Fisheries and Marine Research*. 2 no. 1 (2018): p. 39-46.
- Maliana, Y., Khotimah, S., & Diba, F. “Aktifitas antibakteri kulit *Garcinia mangostana* Linn. terhadap pertumbuhan *Flavobacterium* dan *Enterobacter* dari *Captotermes curvignathus holmgren*”. *Jurnal Protobiont*. 2 no. 1 (2013): h. 7-11.
- Markham, K.,R. *Cara Mengidentifikasi Flavanoid*. Terjemahan Kosasih Padmawinata, Penerbit ITB: Bandung. 1988.
- Marliana, S. D., Suryanti, V., & Suyono. “Skrining Fitokimia dan Analisis Kromatografi Lapis Tipis Komponen Kimia Buah Labu Siam (*Sechium edule* Jacq . Swartz .) dalam Ekstrak Etanol”. *Biofarmasi*. 3 no.1 (2005): h. 26-31.
- Maryanti, T., Julaeha, E., & A, Y. P. *Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Antibakteri dari Fraksi Etil Asetat Kulit Batang Lansium Domesticum Corr CV Kokossan*. Penerbit UPAD, 2011.
- Maslarova, N.V. Yanishlieva. *Inhibiting oxidation dalam Jan Pokorny, Nedyalka Yanishlieva dan Michael Gordon: Antioxidants in food, Practical applications*. Woodhead Publishing Limited, Cambridge: 22-70 (2001).
- McMurry, J. and R.C. Fay. *McMurry Fay Chemistry*. 4th edition. Belmont, CA, Pearson Education International. 2004.

- Michael, K., & Widjaja, C. "Insiden Tubex Positif pada Pasien Anak-anak yang dicurigai Demam Tifoid di RSUP Sanglah Denpasar". *E-Jurnal Medika Udayana*. 9 no. 7 (2020): h. 60-63.
- Morales G, Sierra P, Mancilla, Parades A, Loyola LA, Gallardo O, Borquez J. "Secondary Metabolites from Four Medicinal Plants from Northern Chile, Antimicrobial Activity, and Biototoxicity against *Artemia salina*". *Journal Chile Chem*. 48 no. 2 (2003).
- Mulyani, H., Widyastuti, S. H., Ekowati, V. I. "Tumbuhan Herbal sebagai Jamu Pengobatan Tradisional terhadap Penyakit Dalam Serat Primbon Jampi Jawi Jilid I". *Jurnal Penelitian Humaniora*. 2016.
- Nelwan, R. "Tata Laksana Terkini Demam Tifoid". *Continuing Medical Education*. 39 (2012): h. 247-250.
- Nuraina. "Uji Aktivitas Antimikroba Ekstrak Daun *Garcinia benthami* Pierre dengan Metode Dilusi". *Skripsi*. Juli, 2015.
- Nurhasanah, Harlia, & Adhitiyawarman. "Uji Bioaktivitas Ekstrak Ekstrak Daun Maja (*Crescentia cujete* Linn) sebagai Anti rayap". 3 no. 3 (2014): h. 43-48.
- Parvin, M. S., Das, N., Jahan, N., Akhter, M. A., Nahar, L., & Islam, M. E. "Evaluation of in vitro anti-inflammatory and antibacterial potential of *Crescentia cujete* leaves and stem bark Pharmacology and Toxicology". *BMC Research Notes*. 8 no. 412 (2015):p.1-7.
- Pelczar et al. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Terjemahan oleh Hadioetomo, Ratna sari dkk. Jakarta: Universitas Indonesia. (2008): h. 49-68.
- Pui, C. F., Wong, W. C., Chai, L. C., Tunung, R., Jeyaletchumi, P., Noor Hidayah, M. N., Ubong, A., Farinazleen, M. G., Cheah, Y. K., & Son, R. *Salmonella*: A foodborne pathogen. *International Food Research Journal*. 18. (2011): p. 465-473.
- Rafi, M. *Identifikasi Fisik dan Senyawa Kimia Pada Tumbuhan Obat Fokus Untuk Tumbuhan Obat Diabetes Melitus. Dalam makalah Pelatihan Tanaman Tradisional (swamedikasi) Pengobatan Penyakit Diabetes Melitus*. Bogor. Pusat Studi Biofarmaka. IPB. 2003.
- Rahman, F. A., Haniastuti, T., & Utami, T. W. "Skrining fitokimia dan aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sirsak (*Annona muricata* L.) pada *Streptococcus mutans* ATCC 35668". *Majalah Kedokteran Gigi Indonesia*. 3 no. 1 (2017): h. 1-7.
- Redha, A. "Flavonoid: Struktur, Sifat Antioksidatif dan Peranannya Dalam Sistem

- Biologis". *Jurnal Berlin*. 9 no. 2 (2010): h. 196-202.
- Rismayani. Manfaat Buah Maja Sebagai Pestisida Nabati untuk Hama Pengerek Buah Kakao (*Conomorpha cramerella*). *Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri*. 19 no. 3 (2013).
- Saifuddin, A. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiharohardjo, 2014.
- Salim, M., Yahya, Sitorus, H., Marini, T.N. "Hubungan Kandungan Hara Tanah Dengan Produksi Senyawa Metabolit Sekunder pada Tanaman Duku (*Lansium domesticum* Corr var Duku) dan Potensinya Sebagai Larvasida". *Jurnal Vektor Penyakit Badan Litbang Kesehatan*. 10 no. 1 (2016): h. 11-18.
- Setyaningsih, I. "Resistensi dan Antibiotik Alami dari Laut", Makalah Pribadi Falsafah Sains. IPB. Bogor, 11 hlm.
- Shihab. Q. "TafsirQ.com". <https://tafsirq.com/38-sad/ayat-27#tafsir-quraishshihab>. 2015 (Diakses pada November 2018).
- Sidabutar, S. and Satari H. I. "Pilihan Terapi Empiris Demam Tifoid pada Anak: Kloramfenikol atau Seftriakson". *Jurnal Sari Pediatri*. 11 no. 6 (2010): h. 434-439.
- Simaremare, E. S. *Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Gatal (Laportea decumana (Roxb.) Wedd)*. Pharmacy. 2014.
- Sjoekoer M. Dzen. *Bakteriologi Medik*. Tim Mikrobiologi FK Universitas Brawijaya, 2003.
- Soedarmo, S.S.P., Garna H., Hadinegoro S.R., and Satari H.I. *Buku Ajar Infeksi Pediatri dan Tropis*. Jakarta: Badan Penerbit IDAI, 2010.
- Steenis, V. *Flora Malesina Vol 8*. Sijthoff and Noordhoff International Publisher: Netherland, 1974.
- Suhrman S, Sembiring BB. "Pengaruh Cara Pengeringan dan Teknik Ekstraksi Terhadap Kualitas Simplisia dan Ekstrak Meniran". *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung*, Lampung 24 Mei 2014.
- Sulistiyani, Erviza H, Zuhud EAM. "Uji Toksisitas dan Mekanisme Hepatoproteksi Ekstrak Buah Mahkota Dewa (*Phaleria macrocarpa* (Scheff.) Boerl.)". *Laporan Penelitian*. Pusat Studi Biofarmaka LPPM. 2004.
- Sumampouw, O. J. "Uji in Vitro Aktivitas Antibakteri Dari Daun Sirih". *Jurnal Biomedik (Jbm)*, 2 no.3 (2013):p. 187-193.


- Susanti M, Isnaeni, Poedjiarti S. “Validasi Metode Bioautografi untuk Determinasi Kloramfenikol”. *Jurnal Kedokteran Indonesia*. 1 no. 1 (2009): h. 15-24.
- Thriemer, K., Ley, B. B., Ame, S. S., Deen, J. L., de Pak, G., Chang, N. Y., Hashim, R., Schmied, W. H., Busch, C. J. L., Nixon, S., Morrissey, A., Puri, M. K., Ochiai, R. L., Wierzba, T., Clemens, J. D., Ali, M., Jiddawi, M. S., von Seidlein, L., & Ali, S. M. “Clinical and Epidemiological Features of Typhoid Fever in Pemba, Zanzibar: Assessment of the Performance of the WHO Case Definitions”. *PLoS ONE*. 7 no. 12 (2012).
- Tortora, G. J., Funke, B. R. & Case, C. L. *Microbiology an introduction 10th edition, Pearson edition, Inc.* Publishing as Pearson Benjamins Cummings, San Francisco, 1301 Sansome. 2010.
- Tortora, G.J.; Funke, B.R., and Case, C.L. *Microbiology*, Pearson Education, San Francisco. 2007.
- Tri, H., Ningrum, R., Hidayah, D. R., Larassati, F., & Selatan, A. “Efektivitas Ekstrak Daun Maja (*Crescentia Cujete* L.) Sebagai Antibakteri Pada Bakteri *E. Coli* dan *S. Aureus*”. *Proceeding Biology Education Conference*. 16 no. 111 (2019): h. 285-287.
- Ulfa, F., & Handayani, O. W. K. Kejadian Demam Tifoid di Wilayah Kerja Puskesmas Pagiyanten”. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*. 2 no.2 (2018): h. 227-238.
- Uswatun Hasanah., Desi Rosdiana., Syaefudin. “Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Kulit Batang dan Daun Berenuk (*Crescentia kujete* L.)”. *Current Biochemistry*. 4 no. 1 (2017): h. 1-14.
- Vollaard, A. M., Ali, S., Van Asten, H. A. G. H., Widjaja, S., Visser, L. G., Surjadi, C., & Van Dissel, J. T. “Risk factors for typhoid and paratyphoid fever in Jakarta, Indonesia”. *Journal of the American Medical Association*. 291 no. 21 (2004): p. 2607-2615.
- W. Lay, Bibiana. *Analisis Mikroba di Laboratorium*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- WatreLOT, A. A., & Norton, E. L. *Chemistry and Reactivity of Tannins in Vitis spp.: A Review*. (2020): p. 1-24.
- Winarsi, Hery. *Antioksidan Alami dan Radikal Bebas*. Kanisius, Yogyakarta. 2007.
- Wiyanto. D. B. “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Rumput Laut *Kappaphycus alvarezii* dan *Euclima denticullatum* terhadap Bakteri *Aeromonas*

hydrophila dan *Vibrio harveyi*”. *Jurnal Kelautan*. 3 no. 1 (2010): h. 1-17.


Zhu, Q., Um, C. K., & Chan, Y. N. “Detection of *Salmonella typhi* by polymerase chain reaction. *Journal of Applied Bacteriology*”. 80 no. 3 (1996): p. 244-251.

LAMPIRAN


1. Alur Kerja



2. Preparasi Sampel Daun Majapahit (*Crescentia Cujete L.*)



3. Ekstraksi Daun Majapahit (*Crescentia cujete* L.)



4. Skrining Senyawa Fitokimia

a. Uji Alkaloid

1 ml ekstrak sampel

- Ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer dan Wagner pada setiap tabung reaksi.
- Uji dengan pereaksi Mayer dan Wagner dipisah.

Hasil

b. Uji Flavonoid

2 ml ekstrak sampel

- Ditambahkan beberapa tetes FeCl_3 5%


Hasil

c. Uji Terpenoid

1 ml ekstrak sampel

- Ditambahkan pereaksi Libermann Burchard.

Hasil

d. Uji Tanin

5. Perhitungan Konsentrasi Ekstrak

Rumus yang digunakan dalam pembuatan ekstrak majapahit (*C. cujete* L.) adalah sebagai berikut:

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

Keterangan:

V1= Volume larutan ekstrak yang diambil (ml)

V2= Volume larutan ekstrak yang akan dibuat (ml)

C1= Konsentrasi ekstrak etanol yang diambil (mg/ml)

C2= Konsentrasi larutan yang akan dibuat (mg/ml)

Pembuatan konsentrasi ekstrak:

20% = 200 mg/ml atau 2 gr ekstrak dalam 10 ml etanol 96%

10% = 100 mg/ml atau 1 gr ekstrak dalam 10 ml etanol 96%

90 mg/ml (9%) : $V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$

$$10 \text{ ml} \times 90 \text{ mg/ml} = V_2 \times 100 \text{ mg/ml}$$

$$V_2 = 900 \text{ ml} / 100 \text{ mg/ml}$$

$$V_2 = 9 \text{ ml}$$


80 mg/ml (8%) : $V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$

$$10 \text{ ml} \times 80 \text{ mg/ml} = V_2 \times 90 \text{ mg/ml}$$


$$V_2 = 800 \text{ ml} / 90 \text{ mg/ml}$$

$$V_2 = 8,88 \text{ ml}$$

$$\begin{aligned}70 \text{ mg/ml (7\%)} & : V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2 \\10 \text{ ml} \times 70 \text{ mg/ml} & = V_2 \times 80 \text{ mg/ml} \\V_2 & = 700 \text{ ml} / 80 \text{ mg/ml} \\V_2 & = 8,75 \text{ ml}\end{aligned}$$




6. Uji Penghambatan Bakteri dengan Menggunakan Metode Difusi



7. Peremajaan dan Pembuatan Suspensi Bakteri *S. typhi*



8. Uji Penghambatan Pertumbuhan Bakteri *S. typhi* dengan Metode Dilusi



9. Analisis Data Dengan Menggunakan Program SPSS Versi 28

- a. Hasil Uji Normalitas *Kolmogrov-Smirnov* terhadap Diameter Zona Hambat Aktivitas Antibakteri

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Zona_Hambat
N		21
Normal Parameters ^a	Mean	3.6286
	Std. Deviation	5.27628
Most Extreme Differences	Absolute	.326
	Positive	.326
	Negative	-.246
Kolmogorov-Smirnov Z		1.492
Asymp. Sig. (2-tailed)		.023

a. Test distribution is Normal.

- b. Hasil Uji Homogenitas *Levene Test* terhadap Diameter Zona Hambat Aktivitas Antibakteri

Test of Homogeneity of Variances

Zona_Hambat			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.896	2	6	.132

- c. Hasil Uji *Descriptive* Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Majapahit (*Crecentia kujete* L.) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Salmonella typhi*

Descriptives

Zona Hambat

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
F1	3	14.3000	1.76918	1.02144	9.9051	18.6949	12.70	16.20
F2	3	7.1667	2.51462	1.45182	.9200	13.4133	5.20	10.00
F3	3	3.9333	.45092	.26034	2.8132	5.0535	3.50	4.40
F4	3	.0000	.00000	.00000	.0000	.0000	.00	.00
F5	3	.0000	.00000	.00000	.0000	.0000	.00	.00
F6	3	.0000	.00000	.00000	.0000	.0000	.00	.00
F7	3	.0000	.00000	.00000	.0000	.0000	.00	.00
Total	21	3.6286	5.27628	1.15138	1.2268	6.0303	.00	16.20

- d. Hasil Uji *One Way Anova* Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Majapahit (*Crecentia kujete* L.) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Salmonella typhi*

ANOVA

Zona Hambat

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	537.470	6	89.578	64.934	.000
Within Groups	19.313	14	1.380		
Total	556.783	20			

- e. Hasil Uji *Duncan* Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Majapahit (*Crecentia kujete* L.) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Salmonella typhi*

Homogeneous

Zona_Hambat

Duncan

Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
F4	3	.0000			
F5	3	.0000			
F6	3	.0000			
F7	3	.0000			
F3	3		3.9333		
F2	3			7.1667	
F1	3				14.3000
Sig.		1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

10. Lampiran Pembuatan Simplisia Daun Majapahit (*Crescentia cujete* L.)

No	Gambar	Keterangan
1		<p>Pemilihan daun yang segar, berwarna hijau tua pekat, tidak memiliki bercak dan tidak terserang hama.</p>
2		<p>Pengukuran panjang daun majapahit.</p>
3		<p>Pengguntingan daun majapahit menjadi bagian-bagian yang kecil.</p>
4		<p>Pengeringan daun majapahit.</p>


5		<p>Daun yang sudah kering dihaluskan dengan menggunakan blender hingga berbentuk serbuk, lalu ditimbang.</p>
---	---	--





11. Proses Ekstraksi Daun Majapahit (*Crescentia Cujete L.*)

No	Gambar	Keterangan
1		<p>Perendaman simplisia dengan menggunakan pelarut etanol 96%</p>
2		<p>Proses filtrasi</p>
3		<p>Proses evaporasi dengan menggunakan <i>Rotary Vacuum Evaporator</i></p>
4		<p>Ekstrak daun majapahit (<i>Crescentia kujete L.</i>)</p>


12. Lampiran Uji Penghambatan Bakteri *Salmonella typhi* dengan Metode Difusi

No	Gambar	Keterangan
1		<p>Kertas cakram dijenuhkan ke dalam ekstrak etanol daun majapahit konsentrasi 7%, 8%, 9%, 10%, 20% dan kontrol positif dan negatif.</p>
2		<p>Kertas cakram yang sudah dijenuhkan diletakkan pada media sesuai dengan pembagian penggaris.</p>
3		<p>Diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37°C.</p>
4.		<p>Pengukuran zona bening dengan menggunakan jangka sorong.</p>

5		Hasil uji zona hambat pengulangan I
6		Hasil uji zona hambat pengulangan II
7		Hasil uji zona hambat pengulangan III

13. Skrining Fitokimia


No	Gambar	Keterangan
1		Alkaloid (+)
2		Alkaloid (-)
3		Flavonoid (-)

4		Terpenoid (+)
5		Tanin (-)




14. Lampiran Uji Penghambatan Bakteri *Salmonella typhi* dengan Metode



Dilusi



a. Lampiran Hasil Uji Konsentrasi Hambat Minimum (KHM)



No	Gambar	Keterangan
1		Hasil pengulangan I
2		Hasil pengulangan II
3		Hasil pengulangan III



b. Lampiran Hasil Uji Konsentrasi Hambat Minimum (KHM)



No	Gambar	Keterangan
1		Pengulangan I Konsentrasi ekstrak 20%
2		Pengulangan I Konsentrasi ekstrak 10%
3		Pengulangan I Konsentrasi ekstrak 9%



4		Pengulangan I Konsentrasi ekstrak 8%
5		Pengulangan I Konsentrasi ekstrak 7%
6		Pengulangan I Kontrol positif kloramfenikol 1%

7		Pengulangan I Kontrol negatif akuades
8		Pengulangan II Konsentrasi ekstrak 20%
9		Pengulangan II Konsentrasi ekstrak 10%

10		Pengulangan II Konsentrasi ekstrak 9%
11		Pengulangan II Konsentrasi ekstrak 8%
12		Pengulangan II Konsentrasi ekstrak 7%

13	 A petri dish containing a clear, colorless agar medium. The surface of the agar is smooth and shows no signs of bacterial growth or turbidity.	Pengulangan II Kontrol positif kloramfenikol 1%
14	 A petri dish containing a clear, colorless agar medium. The surface of the agar is smooth and shows no signs of bacterial growth or turbidity.	Pengulangan II Kontrol negatif akuades
15	 A petri dish containing a clear, colorless agar medium. The surface of the agar is smooth and shows no signs of bacterial growth or turbidity.	Pengulangan III Konsentrasi ekstrak 20%

16		Pengulangan III Konsentrasi ekstrak 10%
17		Pengulangan III Konsentrasi ekstrak 9%
18		Pengulangan III Konsentrasi ekstrak 8%

19		Pengulangan III Konsentrasi ekstrak 7%
20		Pengulangan III Kontrol positif kloramfenikol 1%
21		Pengulangan III Kontrol negatif akuades

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Nasrahwati dan sering disapa Nasyah. Lahir di Takalar pada tanggal 8 November 1999. Orang tua penulis bernama Bapak Ahmad dan Ibu Ramlah. Penulis menempuh pendidikan Sekolah dasar (SD) di SDN INP 203 Barugaya, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Takalar dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Takalar. Setelah menyelesaikan pendidikan ditingkat SMA, penulis melanjutkan studi di UIN Alauddin Makassar pada prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar, penulis aktif di beberapa organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Bidikmisi UIN Alauddin Makassar (HIMABIM), FLP ranting UINAM, UKM RITMA dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Biologi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR