

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR
PADA BAYI NY “N“ DENGAN ASFIKZIA SEDANG
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR PADA
TANGGAL 10 AGUSTUS - 6 SEPTEMBER
TAHUN 2021**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**TITI TRI WULANDARI
NIM:70400118039**

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Titi Tri Wulandari
NIM : 70400118039
Tempat / Tanggal Lahir : Doridungga, 13 November 2000
Jurusan / Prodi : D3 Kebidanan
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny "N" Dengan Asfiksia Sedang Di RSUD Labuang Baji Makassar Pada Tanggal 10 Agustus – 6 September Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 30 September 2021

Penyusun

Titi Tri Wulandari

70400118039

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Titi Tri Wulandari

Nim : 70400118039

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny "N" Dengan Asfiksia Sedang Di RSUD Labuang Baji Makassar Pada Tanggal 10 Agustus – 6 September Tahun 2021

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 30 September 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb

NIP: 198901162019032009

A. Dian Diarfah, M.Psi, Psikolog

NIP: 199003032019032014

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “ **Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny ”N” Dengan Asfiksia Sedang Di RSUD Labuang Baji Makassar Pada Tanggal 10 Agustus – 6 September Tahun 2021**” yang disusun oleh **Titi Tri Wulandari Nim: 70400118039**, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 30 September 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 30 September 2021

23 Safar 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes** (.....)

Sekretaris : **Firdayanti, S.SiT, M.Keb** (.....)

Pembimbing I : **Anieq Mumthi’ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb** (.....)

Pembimbing II : **Andi Dian Diarfah, M.Psi,Psikolog** (.....)

Penguji I : **Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes** (.....)

Penguji II : **Dr. Rahmi Damis, M.Ag** (.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP: 198007012006042002

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah swt, tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dan diusahakan bernilai ibadah di sisi-Nya. Salam serta shalawat semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw. Berkat ridho dan inayah-Nya karya tulis yang berjudul yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny”N“ dengan Asfiksia Sedang Di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021”** karya tulis ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya Kebidanan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulis maupun dari penyajiannya. Oleh karena itu saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan oleh penulis guna memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada dalam Karya tulis ilmiah ini. Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya penulis sampaikan kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta, bapak Awahab, Ibu Marifah, Saudara laki-laki, Saudara Perempuan serta keluargaku yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa mendoakan saya, memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan karya tulis ini.
2. Pimpinan Universitas islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D.
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.kes beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa fakultas selama masa pendidikan.

4. Ibunda Firdayanti, S.ST., M.Keb selaku Ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Anieq Mumti'ah Alkautsar, S.ST., M.Keb selaku pembimbing I yang telah membimbing Karya Tulis Ilmiah dan telah menuntun, mendidik, mengajarkan, dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
6. Ibu A.Dian Diarfah, M.Psi, Psikolog selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang telah menuntun, mengajarkan dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengajarkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
7. Ibu Dr.dr.Syatirah, Sp,A,M.Kes. yang senantiasa memberikan saran dan masukan serta dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Ibu Dr.Rahmi Damis, M.Ag. selaku penguji agama yang senantiasa memberikan saran dan masukan serta dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
10. Direktur dan petugas kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta membantu menulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang dilakukan.
11. Kepada ruangan Perinatologi, bidan dan bidan-bidan di RSUD Labuang Baji Makassar yang banyak memberikan bantuan dan saran selama melakukan studi kasus ini.
12. Kepada sahabat saya Nurfadillah, Nurul Amalya, Mulyanti, Fera mirnawati, Nuryati Dewi, Mirnawati, Nila puspitasaki, Yunita sari, juga kk serta adik-adik saya sesama

rantauan yang selalu menyemangati dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

13. Kepada semua teman-teman Kebidanan khususnya angkatan 2018 terutama kelas Kebidanan A yang telah memberi dukungan, motivasi dan warna di bangku perkuliahan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah swt.

Akhirul Kalam, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikankontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya di bidang Kebidanan. Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. Terima Kasih Banyak.

Samata, 30 September 2021

Penulis

TITI TRI WULANDARI

Nim: 704001180039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	vi
HALAMAN PENGESAHAN	ix
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Ruang lingkup.....	7
C. Tujuan penulisan.....	8
D. Manfaat penulisan.....	9
E. Metode penelitian.....	10
F. Sistematika penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan umum tentang bayi baru lahir normal.....	14
1. Pengertian bayi baru lahir normal	14
2. Ciri-ciri bayi baru lahir normal	15
3. Perubahan fisiologis pada bayi baru lahir.....	16
4. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir.....	21
5. Pelaksanaan pada bayi baru lahir	24
6. Kegawatdaruratan pada bayi baru lahir	28

7. Pandangan islam pada bayi baru lahir	32
B. Tinjauan khusus tentang asfiksia bayi baru lahir	33
1. Pengertian asfiksia.....	33
2. Klasifikasi asfiksia	35
3. Etiologi asfiksia.....	36
4. Tanda dan gejala asfiksia pada bayi baru lahir	38
5. Patofisiologi	38
6. Dampak asfiksia pada bayi baru lahir.....	39
7. Diagnosa asfiksia pada bayi baru lahir	39
8. Penatalaksanaan asfiksia.....	40
9. Bagan manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia	46
C. Manajemen asuhan kebidanan	47
1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan	47
2. Tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan	47
3. Pendokumentasian asuhan kebidanan	52
BAB III STUDI KASUS.....	55
A. Manajemen asuhan kebidanan 7 langkah varney.....	55
B. Pendokumentasian hasil asuhan kebidanan tanggal 10 Agustus 2021..	70
C. Pendokumentasian hasil asuhan kebidanan tanggal 11 Agustus 2021..	77
D. Pendokumentasian hasil asuhan kebidanan tanggal 12 Agustus 2021..	82
E. Pendokumentasian hasil asuhan kebidanan tanggal 16 Agustus 2021..	88
F. Pendokumentasian hasil asuhan kebidanan tanggal 24 Agustus 2021..	89
G. Pendokumentasian hasil asuhan kebidanan tanggal 6September 2021.	92

BAB IV PEMBAHASAN	95
A. Langkah I : Pengumpulan data dasar	96
B. Langkah II : Identifikasi diagnosa/masalah aktual.....	100
C. Langkah III : Identifikasi diagnosa/masalah potensial.....	102
D. Langkah IV : Melakukan tindakan segera/kolaborasi.....	103
E. Langkah V : Intervensi	104
F. Langkah VI : Implementasi	106
G. Langkah VII : Evaluasi.....	109
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, MARET 2021

Nama : Titi Tri Wulandari
NIM : 70400118039
Pembimbing 1 : Anieq Mumti'ah Alkautzar
Pembimbing 2 : A. Dian Diarfah
Judul : **Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny "N" Dengan Asfiksia Sedang Di RSUD Labuang Baji Makassar Pada Tanggal 10 Agustus – 6 September Tahun 2021**

Asfiksia Neonatorum adalah keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Keadaan ini biasanya disertai dengan keadaan hipoksia dan hiperkapnia serta sering berakhir dengan asidosis, asfiksia akan bertambah buruk apabila penanganan bayi tak dilakukan secara sempurna, asfiksia dapat terjadi selama kehamilan atau persalinan.

Tujuan dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny "N" Dengan Asfiksia Sedang Di RSUD Labuang Baji Makassar Pada Tanggal 10 Agustus-6 September Tahun 2021 sesuai dengan 7 langkah Varney.

Hasil studi kasus yang dilakukan pada bayi Ny "N" dengan asfiksia sedang yaitu diberikan penanganan awal seperti menjaga bayi agar tetap hangat, atur posisi bayi dengan kepala sedikit ekstensi, isap lendir, keringkan dan lakukan rangsangan taktil serta posisikan kembali. Setelah usaha napas bayi mulai membaik dilanjutkan dengan tindakan asuhan pasca resusitasi.

Kesimpulan dari studi kasus dengan Manajemen Asuhan 7 langkah Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP pada kasus bayi Ny "N" dengan asfiksia sedang dilakukan asuhan 3 hari kunjungan rumah sakit dan 3 hari kunjungan di rumah pasien yaitu didapatkan hasil tanda-tanda vital bayi dalam batas normal, gerakan aktif, refleks isap dan refleks moro bayi sudah ada.

Kata kunci: Bayi baru lahir, Asfiksia sedang, 7 langkah Varney



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, MARCH 2021

Name : Titi Tri Wulandari
Reg. Number : 70400118039
Supervisor 1 : Anieq Mumti'ah Alkautzar
Supervisor 2 : A. Dian Diarfah
Title : Midwifery Care Management on the Newborn of Ms. "N" with the Case of Moderate Asphyxia in Labuang Baji Hospital of Makassar on August 10th - September 6th 2021

Asphyxia neonatorum is a condition that occurs when a baby cannot breathe normally as he doesn't get enough oxygen during the birth process. The situation can be fatal and commonly occur with hypoxia and hypercapnia. The problem of asphyxia could also end with another case of acidosis. Hypoxic-ischemic encephalopathy may be a result of severe asphyxia neonatorum. This problem should be handled appropriately as it will get worse if not treated in a well conduct. This problem mostly occurs during and after the process of delivery.

The major purpose of this research was to investigate the midwifery care management that should be taken in handling the case of newborn with a moderate asphyxia. The site of the research was at Labuang Baji Hospital of Makassar on August 10th to September 6th, 2021. The research was conducted based on 7-stages of Varney management approach.

The findings of this research indicated that the initial treatments that should be given to a newborn with the case of moderate asphyxia were by providing good and warm condition and managing the position of a newborn by extending the head of the baby. In addition, suction mucus could also be done followed by drying, tactile stimulation, and baby's repositioning. After the treatments, it was apparent that the baby's respiratory began to improve. At this stage, the post-resuscitation care could be given.

This study concludes that 7-stages of Varney management approach based on SOAP documentation procedure should be done in order to handle the problem related to moderate asphyxia and a newborn. In this research, the hospital and home visits were regularly conducted for three days respectively. During the visits, it was evident that the baby was generally in a good condition where the vital signs of the baby were normal shown by his active movement and normal sucking reflex and moro reflex

Key Words: Newborn, Moderate Asphyxia, 7-stages of Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bayi baru lahir normal ialah bayi yang lahir dalam presentasi belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat, pada usia kehamilan genap 37 minggu sampai dengan 42 minggu, dengan berat badan 2.500-4.000 gram, nilai *Appearance Pulse Grimace Activity Respiration* (APGAR) kurang lebih 7 dan tanpa cacat bawaan. Neonatus ialah bayi yang baru mengalami proses kelahiran, berusia 0-28 hari. Bayi tersebut memerlukan penyesuaian fisiologis berupa maturasi, adaptasi (menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterine ke kehidupan ekstrauterine) dan toleransi bagi bayi baru lahir untuk dapat hidup dengan baik (Irwan, 2019).

Penyebab kematian bayi baru lahir secara umum yaitu Asfiksia, Infeksi, dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Asfiksia merupakan penyebab kematian bayi baru lahir yang paling utama. Asfiksia merupakan kondisi saat bayi lahir kekurangan oksigen sebelum atau selama kelahiran. Kelainan infeksi, ada banyak hal yang memicu terjadinya infeksi pada bayi baru lahir diantaranya sepsis, pneumonia, tetanus dan diare. Selain itu, infeksi pada bayi baru lahir cukup sering terjadi di daerah-daerah yang fasilitas persalinannya belum optimal. Selanjutnya BBLR, bayi dikatakan berat badan lahir rendah apabila berat badannya kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kg. BBLR dapat terjadi ketika bayi lahir secara prematur dengan masa kehamilan kurang dari 37

minggu (belum cukup bulan) atau bayi mengalami gangguan perkembangan dalam kandungan (Ardyana & Sari 2019).

Asfiksia Neonatorum adalah keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Keadaan ini biasanya disertai dengan keadaan hipoksia dan hiperkapnia serta sering berakhir dengan asidosis asfiksia akan bertambah buruk apabila penanganan bayi tak dilakukan secara sempurna, sehingga tindakan perawatan dilaksanakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengatasi gejala lanjut yang mungkin timbul. Asfiksia dapat terjadi selama kehamilan atau persalinan (Nurarif & Hardhi, 2016).

Asfiksia bermula dari kondisi gawat janin, Kondisi ini dapat terjadi apabila aliran darah dari tubuh ibu ke plasenta mengalami gangguan, sehingga menyebabkan janin kekurangan pasokan oksigen (O_2) dan karbondioksida (CO_2) keadaan ini tetap berlanjut maka bayi beresiko lahir mengidap asfiksia saat lahir. Asfiksia pada bayi baru lahir dapat ditandai dengan bernapas megap-megap atau tidak bernapas, denyut jantung yang kurang dari 100x/menit, pucat, kulit sianosis, tonus otot menurun, tidak ada respon terhadap refleks rangsangan (Sembiring 2019:173).

Gejala asfiksia dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung setelah persalinan. Denyut jantung janin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, dapat digunakan sebagai acuan terjadinya asfiksia neonatorum atau tanda bayi kekurangan oksigen setelah lahir. Beberapa gejala

asfiksia neonatorum yang dapat diamati pada bayi baru lahir antara lain: kulit yang pucat atau kebiru-biruan (sianosis), kesulitan bernapas, denyut nadi yang rendah, detak jantung terlalu kuat atau lemah, anggota badan kaku atau lemas (hiotonia), respons yang buruk terhadap stimulasi. Semakin lama bayi tidak mendapatkan oksigen, gejala asfiksia akan semakin bertambah parah. Gejala yang parah dapat memicu kerusakan dari beberapa organ seperti paru-paru bayi, jantung, ginjal, dan otak. Kerusakan tersebut muncul secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut *World Health Organization* (WHO) setiap tahunnya kira-kira 3% (3,6 juta) dari 120 juta bayi baru lahir mengalami asfiksia, hampir 1 juta bayi ini meninggal. Di Indonesia, dari seluruh kematian bayi, sebanyak 57% meninggal. Penyebab kematian bayi baru lahir di Indonesia adalah bayi berat lahir rendah (29%), asfiksia (27%), trauma lahir, tetanus neonatorum, infeksi lain dan kelainan kongenital (Lisa, Ningsih, 2016)

Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih cukup tinggi berdasarkan data hasil survei demografi kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 didapatkan bahwa angka kematian bayi baru lahir di Indonesia 32 per 1.000 kelahiran hidup, dengan mayoritas kasus kematian bayi yang terjadi dalam periode neonatus. Menurut hasil Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016, mencatat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) menurun mencapai 25,5 kematian setiap 1.000 bayi yang lahir.

Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), angka kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan. Pada tahun 2017 angka kematian Bayi sebanyak 24 per 1000 kelahiran hidup. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding hasil SDKI tahun 2012, yaitu sebanyak 32 per 1000 kelahiran hidup. Menurut permenkes RI dalam program SDGs bahwa target sistem kesehatan nasional yaitu pada goals ke 3 menerangkan bahwa pada 2030 seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian bayi setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup (Permenkes RI, 2015).

Menurut data survei demografi dan kesehatan indonesia (SDKI), Angka kematian bayi sebanyak 47% yang meninggal pada masa neonatal. setiap lima menit terdapat satu neonatus yang meninggal. Penyebab kematian bayi baru lahir di indonesia, salah satunya asfiksia sebesar 27% yang merupakan penyebab ke-2 kematian bayi baru lahir, setelah bayi berat lahir rendah (BBLR). Adapun penyebab langsung kematian bayi baru lahir yaitu berat badan lahir rendah (29%), asfiksia (13%), tetanus (10%), masalah pemberian makan (10%), infeksi (6,7%), gangguan hematologik (5%), dan lain-lain (27%) (Permenkes RI, 2016).

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015, menyebutkan jumlah angka kematian bayi baru lahir yaitu 11,7 per 1.000 angka kelahiran. Angka kejadian asfiksia cukup tinggi, tercatat dari data kejadian asfiksia neonatorum pada tahun 2015 sebanyak 392 kasus. selanjutnya pada tahun 2016 terdapat 212 kasus asfiksia neonatorum (*Data Sekunder Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, 2015*).

Angka Kematian Bayi (AKB) diakui dari tahun 2013 hingga tahun 2016 mulai mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.041 kasus di tahun 2013, meningkat menjadi 1.113 kasus pada tahun 2014, meningkat menjadi 1.167 kasus di tahun 2015 kemudian kembali meningkat menjadi 1.183 kasus di tahun 2016. Tingginya jumlah kasus kematian bayi ini disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi baik dari sisi input awal perencanaan, implementasi maupun evaluasi. Selain itu penyelerasan konsep kebijakan dibagian top dan bottom agar dapat seirama dalam pelaksanaan sesuai dengan rencana. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah terutama dalam peningkatan kegiatan yang bersifat preventif dan promotif yang bertujuan memperdayakan masyarakat dalam menekan jumlah kasus kematian bayi (Dinkes Prov.sulsel 2018:36).

Upaya percepatan penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) terfokus pada meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, membangun kemitraan yang efektif dengan lintas program dan lintas sektor serta mitra lain seperti badan memperdayakan perempuan, keluarga dan masyarakat, meningkatkan sistem surveillance atau Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA, monitoring dan informasi kesehatan serta pembiayaan kesehatan secara berkesinambungan dilanjutkan dengan upaya-upaya kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Profil Kesehatan Kota Makassar tahun 2019).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar, Pada tahun 2016 jumlah bayi yang lahir adalah 780 bayi, bayi yang meninggal sebanyak 121 kasus, kejadian

asfiksia sekitar 85 bayi (11%). pada tahun 2017 jumlah bayi lahir 725, bayi yang meninggal sebanyak 119 kasus, kejadian asfiksia sekitar 72 bayi (9,93%). Pada tahun 2018 jumlah bayi lahir 820 bayi, bayi yang meninggal sebanyak 135 kasus dan kejadian asfiksia sekitar 82 bayi (10%). Pada tahun 2019 jumlah bayi baru lahir 180 bayi, bayi yang meninggal 42 kasus, dan kejadian asfiksia sekitar 42 bayi (23,3%). Pada tahun 2020, jumlah bayi lahir 520, bayi yang meninggal 51 kasus, dan kejadian asfiksia sekitar 54 bayi. Hal ini membuktikan bahwa masih tingginya angka kejadian asfiksia (Rekam Medik RSUD Labuang Baji Makassar , 2021).

Berdasarkan hasil penelitian Irwan,dkk pada tahun 2019 di RSUD Labuang Baji Makassar, Faktor yang dapat menyebabkan kejadian asfiksia adalah fakto ibu yaitu usia ibu kurang dari 20 atau lebih 35 tahun,paritas, faktor plasenta yaitu plasenta tipis, plasenta kecil, solusio plasenta, faktor janin yaitu *Premature, Intrauterine Growth Retardation (IUGR)*, tali pusat menumbung, lilitan tali pusat, faktor persalinan yaitu: partus lama, partus tindakan, persalinan dengan *sectio caesarea/SC* (Sari, 2013). Partus lama dapat mengakibatkan oksigen dalam darah turun dan aliran darah ke plasenta menurun sehingga oksigen yang tersedia untuk janin menurun, pada akibatnya dapat menimbulkan hipoksia janin sehingga dapat menyebabkan asfiksia pada bayi baru lahir.

Banyaknya kasus kematian bayi baru lahir tentu harus menjadi perhatian semua pihak. Bukan hanya dari kalangan dokter, tim medis, maupun pemerintah saja, tapi juga perlu dukungan dari masyarakat. Baik dari ibu sendiri, suami, hingga keluarganya. Karna penyebab kematian bayi baru lahir itu berbeda-beda, maka cara pencegahannya pun berbeda pula. Selain dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, upaya menjaga keselamatan bayi baru lahir juga ditentukan oleh kesehatan ibunya sendiri.

Melihat data angka kematian bayi yang cukup tinggi di Sulawesi Selatan khususnya di RSUD Labuang Baji Makassar terutama kematian bayi karena asfiksia, hal ini menunjukkan bahwa masalah ini membutuhkan penanganan yang tepat karena akan mempengaruhi perkembangan dan kualitas generasi di masa yang akan datang. Mengingat pentingnya masalah ini, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian tentang kasus bayi baru lahir dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar.

B. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup karya tulis ilmiah ini adalah meliputi: Manajemen asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan Asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar 2021.

C. Tujuan penulisan

1. Tujuan umum

Adapun tujuan umum pada kasus ini adalah untuk mengetahui manajemen asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan Asfiksia Sedang di RSUD Labuang Baji Makassar 2021.

2. Tujuan khusus

- a. Dilaksanakan pengkajian dan analisa bayi baru lahir pada bayi Ny "N" dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 10 Agustus – 6 September tahun 2021.
- b. Dirumuskanya diagnosa/masalah aktual yang terjadi bayi baru lahir pada bayi Ny "N" dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 10 Agustus – 6 September tahun 2021.
- c. Dirumuskanya diagnosa/masalah potensial bayi baru lahir pada bayi Ny "N" dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 10 Agustus – 6 September tahun 2021.
- d. Diidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi bayi baru lahir pada bayi Ny "N" dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 10 Agustus – 6 September tahun 2021.
- e. Direncanakan tindakan asuhan kebidanan bayi baru lahir pada bayi Ny "N" dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 10 Agustus – 6 September tahun 2021.

- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan kebidanan bayi baru lahir pada bayi Ny ” N “ dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 10 Agustus – 6 September tahun 2021.
- g. Dievaluasinya hasil tindakan yang telah dilakukan bayi baru lahir pada bayi Ny ” N “ dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 10 Agustus – 6 September tahun 2021.
- h. Didokumentasikannya tindakan yang telah diberikan bayi baru lahir pada bayi Ny ” N “ dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 10 Agustus – 6 September tahun 2021.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Manfaat untuk Rumah sakit

Yaitu sebagai pedoman atau petunjuk bagi pihak RSUD Labuang Baji Makassar untuk menangani atau mencegah dengan segera terjadinya Asfiksia sedang pada bayi.

2. Manfaat untuk penulis

Yaitu untuk menambah wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang komprehensif mengenai cara penanganan kasus asfiksia yang terjadi pada bayi dan merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis.

3. Manfaat ilmiah

Yaitu sebagai acuan untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis selanjutnya.

4. Manfaat untuk pembaca

Yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan asfiksia sedang.

E. Metode penulisan

Penulisan menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Yaitu dengan membaca serta mempelajari buku-buku dan sebagai literatur, mengambil media dari internet yang berkaitan dengan kasus manajemen asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan Asfiksia sedang.

2. Studi kasus

Dalam penulisan kasus ini, penulis menggunakan proses pendekatan manajemen asuhan kebidanan oleh Helen varney yaitu dengan 7 langkah sebagai berikut: identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan emergensi/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan, serta mendokumentasikan asuhan kebidanan, untuk menghimpun data dan informasi dalam pengkajian dilakukan dengan menggunakan tehnik:

a. Anamnesa

Mengadakan tanya jawab langsung dengan ibu dan petugas di ruang perinatologi yang berhubungan dengan masalah bayi.

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki meliputi pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi.

1. Inspeksi dilakukan untuk tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik misalnya untuk menentukan warna kulit bayi.
2. Palpasi dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau perabaan.
3. Perkusi adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengetuk.
4. Auskultasi adalah teknik yang digunakan untuk mendengar menggunakan stetoskop untuk memperjelas pendengaran. Auskultasi digunakan untuk mendengar frekuensi jantung pada bayi dan untuk mengukur tekanan darah.

c. Studi Dokumentasi

Dengan membaca dan mempelajari status serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan bayi, baik bersumber dari catatan dokter, bidan maupun sumber lain yang menunjang.

d. Diskusi

Diskusi dengan tenaga kesehatan yakni dokter, bidan maupun pembimbing.

E. Sistematik penulisan

Adapun sistematik yang digunakan untuk Karya Tulis Ilmiah ini terdiri dari: pada bab I yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Pada Bab II yaitu tinjauan pustaka, akan menguraikan mengenai tinjauan umum bayi baru lahir normal, tinjauan umum asfiksia, proses manajemen asuhan kebidanan, hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Pada BAB III adalah studi kasus akan menguraikan 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada BAB IV adalah pembahasan, dalam bab ini membahas kesenjangan atau perbandingan teori yang di praktekan di RSUD Labuang Baji Makassar dalam memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan asfiksia sedang.

Pada BAB V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang di dapat dari hasil asuhan.

Serta selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literature ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan umum tentang bayi baru lahir normal*

1. **Pengertian bayi baru lahir normal**

- a. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu, dengan berat badan lahir 2500 gram sampai dengan 4000 gram. Dengan ciri-ciri yaitu bunyi jantung dalam menit-menit pertama kira-kira 180x/menit, kemudian menurun 120-140x/menit (Saleha,2012:2).
- b. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat, pada usia kehamilan genap 37 minggu sampai dengan 42 minggu, dengan berat badan 2.500-4.000 gram tanpa cacat bawaan.

Bayi baru lahir normal ialah bayi yang lahir dalam presentasi belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat, pada usia kehamilan genap 37 minggu sampai dengan 42 minggu, dengan berat badan 2.500-4.000 gram, nilai *Appereance Pulse Grimace Activity Respiration* (APGAR) kurang lebih 7 dan tanpa cacat bawaan. Neonatus ialah bayi yang baru mengalami proses kelahiran, berusia 0-28 hari.

2. Ciri-ciri bayi lahir normal

- a. Berat badan 2500-4000 gr.
- b. Panjang badan lahir 48-52 cm
- c. Lingkar dada 30-38 cm
- d. Lingkar kepala 33-35 cm
- e. Frekuensi jantung 120-160 kali/menit
- f. Pernafasan 40-60 kali/menit
- g. Kulit kemerahan dan licin karena jaringan subkutan cukup
- h. Rambut lanugo tidak terlihat, rambut kepala biasanya telah sempurna
- i. Kuku telah agak panjang dan lemas
- j. Genetalia: labia mayora sudah menutupi labia minora (pada perempuan), testis sudah turun, skortum sudah ada (pada laki-laki)
- k. Reflek isap dan menelan sudah terbentuk dengan baik
- l. Reflek morrow atau gerak memeluk bila dikagetkan sudah baik
- m. Refleks graps atau menggenggam sudah baik
- n. Fefleks rooting mencari puting susu dengan rangsangan taktil pada pipi dan daerah mulut terbentuk dengan baik
- o. Eliminasi baik, mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama, mekonium berwarna hitam kecoklatan (Dwiendar,Octa,dkk 2014:5).

Bayi baru lahir normal mempunyai ciri-ciri berat badan lahir 2500-4000 gram. Umur kehamilan 37-40 minggu, bayi segera menangis, bergerak aktif, kulit kemerahan, menghisap ASI dengan baik, dan tidak ada cacat bawaan. Bayi baru lahir normal memiliki panjang badan 48-52cm, lingkar dada 30-38 cm, lingkar lengan 11-12 cm, frekuensi denyut jantung 120-160 x/menit, pernapasan 40-60 x/menit, lanugo tidak terlihat dan rambut kepala tumbuh sempurna, kuku agak panjang dan lemas, nilai APGAR>7, refleks-refleks sudah terbentuk dengan baik (rooting, sucking, moro, grasping), organ genitalia pada bayi laki-laki testis sudah berada pada scrotum dan penis berlubang, pada bayi perempuan vagina dan uretra berlubang serta adanya labia mayora, mekonium sudah keluar dalam 24 jam pertama berwarna hitam kecoklatan.

3. Perubahan-perubahan yang terjadi pada bayi baru lahir

a. Perubahan sistem pernapasan

Sistem pernapasan merupakan sistem yang paling tertantang ketika mengalami perubahan fase intrauterus menuju ekstrauterus. Bayi baru lahir harus mulai segera bernapas. Selama kehamilan, organ yang berperang dalam respirasi janin sampai janin lahir adalah plasenta.

b. Perubahan sirkulasi

Karakteristik sirkulasi janin merupakan sistem tekanan rendah karena paru-paru masih tertutup dan berisi cairan, organ tersebut memerlukan darah dalam jumlah minimal. pemasangan klem tali pusat

akan menutup sistem tekanan darah dari plasenta-janin. Aliran darah dari plasenta berhenti, sistem sirkulasi bayi baru lahir akan mandiri, tertutup, dan bertekanan tinggi. Efek yang muncul segera akibat tindakan pemasangan klem tali pusat adalah kenaikan resistensi vaskular sistemik ini bersamaan dengan pernapasan pertama bayi baru lahir.

c. Perubahan Termoregulasi

Bayi baru lahir memiliki cenderung cepat stres akibat perubahan suhu lingkungan karena belum dapat mengatur suhu tubuh sendiri. Pada saat bayi meninggalkan lingkungan rahim ibu yang bersuhu rata-rata 37°C , kemudian bayi masuk ke dalam lingkungan , suhu ruangan persalinan yang suhu 25°C sangat berbeda dengan suhu di dalam rahim. Bayi baru lahir dapat kehilangan panas melalui empat mekanisme yaitu:

- 1) Konveksi adalah kehilangan panas tubuh terjadi pada saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Bayi yang dilahirkan atau ditempatkan di dalam ruangan yang dingin akan cepat mengalami kehilangan panas.

Gambar 2.1: Konveksi



(Sumber: Damayanti Ika Putri, dkk, 2015:218)

- 2) Radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu tubuh lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Bayi bisa kehilangan panas dengan cara benda-benda tersebut menyerap radiasi panas tubuh bayi (walaupun tidak bersentuhan secara langsung).

Gambar 2.2: Radiasi



(Sumber: Damayanti Ika Putri, dkk, 2015:218)

- 3) Konduksi adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin,

meja tempat tidur atau timbangan yang temperaturnya lebih rendah dari tubuh bayi akan menyerap panas tubuh bayi melalui mekanisme konduksi apalagi bayi diletakan di atas benda-benda tersebut.

Gambar 2.3: Konduksi



(Sumber: Damayanti Ika Putri, dkk, 2015:219)

- 4) Evaporasi adalah jalan utama bayi kehilangan panas. Kehilangan panas dapat terjadi karena penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri karena setelah lahir, tubuh bayi tidak segerah dikeringkan. Kehilangan panas juga terjadi pada bayi yang terlalu cepat dimandikan dan tubuhnya tidak segerah dikeringkan dan diselimuti.

Gambar 2.4: Evaporasi



(Sumber: Damayanti Ika Putri, dkk, 2015:219)

Meminimalkan kehilangan panas bayi baru lahir, beberapa cara umum untuk mempertahankan panas adalah sebagai berikut:

- (a) Selimuti, topi atau pakaian yang hangat sebelum kelahiran.
- (b) Keringkan bayi baru lahir secepatnya
- (c) Atur suhu ruangan persalinan 25⁰C.
- (d) Jangan lakukan penghisapan bayi baru lahir jika alas tempat tidur basah.
- (e) Tunda memandikan bayi baru lahir sampai suhu stabil.
- (f) Tempatkan area perawatan bayi baru lahir dari jendela, dinding luar atau jalan ke pintu.
- (g) Selalu menutup kepala bayi baru lahir dan membungkus rapat tubuh bayi selama 48 jam.

Neonatus dapat menghasilkan panas dalam jumlah besar dengan cara menggigil, aktivitas otot, dan termogenesis (produksi panas tanpa menggigil). Sehingga dapat menyebabkan peningkatan metabolisme dan mengakibatkan peningkatan penggunaan oksigen oleh neonatus. Oleh karena itu, kehilangan panas pada neonatus berdampak pada hipoglikemi, hipoksia, dan asidosis (Mutmainnah,dkk, 2017:220-223).

d. Perubahan Glukosa

Sebelum dilahirkan, kadar darah janin berkisar 60-70% dari kadar darah ibu. Dalam persiapan untuk kehidupan luar rahim, seorang janin yang sehat mencadangkan glukosa sebagai glikogen terutama di dalam hati. Sebagian penyimpanan glikogen berlangsung pada trimester III (Mutmainnah,dkk, 2017:223).

4. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir

a. Kepala

- 1) Bentuknya (lonjong, bundar/ tidak)
- 2) Besarnya (normal, mikrocephalus, hydrocephalus/tidak)
- 3) Ubun-ubun besar/ kecil, sudah menutup/ belum
- 4) Bila belum menutup teraba cekung, datar, cembung, tegang/tidak
- 5) Sutura-sutura teraba/tidak

b. Rambut

- 1) Warnanya (hitam, merah jagung, putih)
- 2) Kesuburannya (lebat, tipis/tidak)
- 3) Mudah rontok/tidak, botak/tidak

c. Muka

- 1) Pucat, cemas, kuning, merah, biru/sianosis
- 2) Kulit wajah halus, kasar

d. Mata

- 1) Simetris/tidak, juling, buta
- 2) Selaput lender mata pucat/tidak

e. Hidung

- 1) Bersih/tidak
- 2) Pilek/tidak, polip/ tumor ada/ tidak.

f. Mulut

- 1) Bersih/ tidak, berbau/tidak
- 2) Bibir pucat/ tidak, stomatitis/ tidak
- 3) Gusi bersih
- 4) Lidah kotor, tenggorokan bersih/ tidak, pharynx membesar/tidak, tonsil membesar/ tidak

g. Telinga

- 1) Bersih / tidak
- 2) Pernah keluar cairan / tidak
- 3) Dapat mendengar dengan baik / tidak

h. Leher

- 1) Bentuknya: pendek, sedang, panjang
- 2) Pembesaran kelenjar thyroid ada/ tidak, pembesaran kelenjar lymphe ada/ tidak
- 3) Hiperpigmentasi pada kulit leher/tidak

i. ketiak

j. Dada

- 1) Bentuk normal / tidak
- 2) Kalau bayi perempuan (buah dada, puting susu, hiperpigmentasi ada/tidak)

k. Ekstremitas atas (lengan)

- 1) Simetris / tidak
- 2) Jari-jari lengkap/ tidak
- 3) Kuku: pucat, kotor, panjang, biru/tidak

l. Ekstremitas bawah (paha/kaki)

- 1) Simetris / tidak
- 2) Oedema ada/tidak, varises ada/ tidak
- 3) Jari-jari lengkap/ tidak
- 4) Telapa kaki cekung / datar

m. Punggung

- 1) Alur tulang punggung simetris/ tidak
- 2) Kifosis ada/tidak
- 3) Hiperlordosis ada/tidak

n. Genetalia (alat kelamin) dan anus

- 1) Genetalia laki-laki (saluran kencing lancar/ tidak, testis lengkap/tidak, testis sudah turun ke skrotum/belum, femosis ada/tidak
- 2) Genetalia perempuan (kebersihan, vagina bersih/ tidak, labia minor/mayor sudah menutup/ belum, klistoris, uretra, vagina lengkap/ tidak

o. Pemeriksaan neurologi

- 1) Reflek menghisap ada/tidak
- 2) Reflek menggenggam ada/ tidak
- 3) Reflek moro ada/tidak
- 4) Reflek babinski ada/ tidak
- 5) Reflek inkurvasi ada/ tidak.

5. Pelaksanaan pada bayi baru lahir

a. Membersihkan jalan napas dan sekaligus menilai APGAR menit I, membersihkan jalan napas dengan cara:

- 1) Penolong mencuci tangan dan memakai sarung tangan steril (kalau ada)
- 2) Bayi ditidurkan telentang kepala sedikit ekstensi, badan bayi dalam keadaan terbungkus
- 3) Pangkal pengisap lendir dibungkus dengan kain kasa steril, masukan ke mulut penolong

- 4) Tangan kanan penolong membuka mulut bayi kemudian jari telunjuk tangan kiri dimasukkan ke dalam mulut bayi sampai epiglothis (untuk menahan lidah bayi) jari tangan kanan memasukan pipa. Seajar dengan jari telunjuk tangan kiri, isap lendir sebanyak-banyaknya dengan arah memutar
 - 5) Masukkan berulang-ulang selang hidung, mulut, kemudian lendir diisap sebanyak-banyaknya.
 - 6) Lendir yang diisap ditampung di atas bengkok dan ujung pipa dibersihkan dengan kain kasa
 - 7) Lakukan penghisapan sampai bayi menangis dan sampai lendirnya bersih, kemudian bersihkan daerah telinga dan sekitarnya (Arief &Weni, 2016:5).
- b. Meringankan badan bayi dari cairan ketuban dengan menggunakan kain yang halus atau handuk
- c. Memotong dan mengikat tali pusat(Arief &Weni, 2016:6).
- d. Mempertahankan suhu tubuh bayi dengan cara:
- 1) Bayi dibungkus dengan kain hangat
 - 2) Jangan membiarkan bayi dalam keadaan basah
 - 3) Jangan memandikan bayi dengan air dingin
 - 4) Daerah kepala dibungkus, memakai topi yang terbuat dari plastik/kain

- e. Mendekatkan bayi ke ibu dan menetekkan secepat setelah lahir, hal ini bertujuan agar:
- 1) Ibu tenang melihat anaknya dalam keadaan normal
 - 2) Ada kontak batin antara ibu dan anak
 - 3) ASI/kolostrum cepat keluar, karena dengan rangsangan isapan bayi akan mempercepat keluar ASI.
- f. Membersihkan badan bayi dengan cara:
- 1) Siapkan tempat kapas, kapas dan minyak/baby oil
 - 2) Bersihkan daerah muka dengan menggunakan kapas lembab. Mulai dari bagian tubuh yang terlihat sampai ke bagian tubuh tidak terlihat.
 - 3) Lakukan perawatan tali pusat dan seputarnya (Arief & Weni, 2016:7).
- g. Perawatan mata
- 1) Membersihkan mata secepat setelah lahir (Armini, dkk, 2017:12).
- h. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan bayi. Maksud pemeriksaan adalah untuk menemukan kelainan yang perlu mendapatkan tindakan segera dan kelainan yang berhubungan kehamilan, persalinan dan kelahiran:
- 1) Mengukur berat badan (BB),lingkar kepala(LK),lingkar dada (LD), lingkar lengan atas (LILA).

- 2) Observasi tanda-tanda vital
 - 3) Observasi keadaan reflek
 - 4) Penampilan fisik dari kepala sampai kaki
- i. Memasang pakaian bayi
 - j. Mengajarkan ibu cara:
 - 1) Membersihkan jalan napas
 - 2) Membersihkan ASI dan manfaatnya
 - 3) Perawatan tali pusat dengan cara:
 - a) Mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah merawat tali pusat.
 - b) Menjaga agar tali pusat tetap kering dan terkena udarah atau dibungkus longgar dengan kain bersih.
 - 4) Bersihkan tali pusat dengan sabun dan air jika tercemar oleh urine dan kotoran
 - 5) Memandikan bayi (Armini, dkk, 2017:12).
 - 6) Pemberian ASI

Pemberian ASI sangat penting karena ASI adalah makanan utama bayi. Dengan ASI, bayi akan tumbuh sempurna sebagai manusia yang sehat, bersifat lemah lembut dan mempunyai IQ yang tinggi. Bayi yang diberi ASI secara bermakna akan mempunyai IQ yang lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang hanya diberi susu bubuk.

Selama menyusui, ibu dengan status gizi baik rata-rata memproduksi ASI sekitar 800cc yang mengandung sekitar 600 kkal, sedangkan pada ibu dengan status gizi kurang biasanya memproduksi kurang dari itu. walaupun demikian, status gizi tidak berpengaruh besar terhadap mutu ASI, kecuali volumenya (Setiawati Dewi, 2013:128-129).

6. Kegawatdaruratan pada bayi baru lahir

a. Tidak bernapas /sulit bernapas

Adapun penanganan umum yang diberikan adalah:

- 1) Keringkan bayi atau ganti kain yang basah dan bungkus dengan pakaian hangat dan kering.
- 2) Segera klem dan potong tali pusat
- 3) Letakan bayi pada tempat yang hangat
- 4) Lakukan pedoman pencegahan infeksi dalam setiap melakukan tindakan.
- 5) Lakukan resusitasi bila terdeteksi adanya kegagalan napas setelah bayi lahir
- 6) Jika resusitasi tidak berhasil, maka berikan ventilasi dan juga komprehensi dada.

b. Hipotermia

1) Adapun cara penanganannya adalah:

- a) Keringkan tubuh bayi dengan handuk yang kering, bersih dan hangat.

- b) Segera hangatkan tubuh dengan metode kanguru
- c) Ulangi sampai panas tubuh ibu menghangatkan tubuh bayi menjadi hangat
- d) Cegah bayi kehilangan panas
- e) Beri ASI sedini mungkin
- f) Setelah tubuh menjadi hangat, nasehati ibu cara merawat bayi di rumah
- g) Pencegahan hipotermia
- h) Menyusui secara eksklusif
- i) Anjurkan ibu untuk kontrol bayinya setelah 2 hari
(Dwiendar, Octa, dkk 2014:13).

c. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

- 1) Bayi lahir kecil akibat kurang bulan (prematuur)
- 2) Masa gestasi <37 minggu
- 3) Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - a) Ibu mengalami perdarahan antepartum, trauma fisik/psikologis atau usia ibu masih terlalu muda (<20 tahun) dan multigravida yang jarak kehamilannya dekat.
 - b) Keadaan sosial ekonomi rendah
Kehamilan ganda atau hidramnion
- 4) Ciri –ciri bayi prematur adalah sebagai berikut:
 - a) Berat kurang <2500 gram
 - b) Lingkar dada <30 cm

- c) Panjang badan <54 cm
- d) Lingkar kepala <33 cm
- e) Kepala lebih besar dari badanya
- f) Kulitnya tipis transparan dan banyak lanugo
- g) Lemak subkutan minimal

d. Dehidrasi

1) Tanda dan gejala sebagai berikut:

- a) Bayi mengantuk
- b) Tampak kehausan
- c) Kulit, bibir dan lidah kering
- d) Saliva menjadi kental
- e) Mata dan ubun-ubun menjadi cekung
- f) Warna kulit pucat atau sianosis
- g) Turgor kulit berkurang
- h) Ekstremitas dingin
- i) Air kemih berkurang
- j) Gelisah
- k) Kadang-kadang kenyang sampai syok (Dwiendar, Octa,dkk 2014:14).

e. Ikterus Neonatorum

f. Kejang

Beberapa hal yang mungkin merupakan faktor penyebab kejang adalah sebagai berikut:

- a) Ibu tidak imunisasi TT sehingga dapat menyebabkan infeksi
 - b) Perdarahan pada saat usia kehamilan < 28 minggu
 - c) Gawat janin pada masa kehamilan dan persalinan yang mengharuskan dilakukannya induksi persalinan
 - d) Alat-alat yang digunakan untuk proses persalinan tidak steril
 - e) Persalinan dengan tindakan dapat menyebabkan trauma susunan saraf pusat
 - f) Trauma pada janin selama dalam kandungan atau selama persalinan dapat menyebabkan perdarahan intrakranial
 - g) Ibu hamil yang menderita DM.
- g. Obstipasi
- h. Infeksi
- i. Sindrom kematian bayi mendadak (Dudden Infant Death Syndrome/SISD)
- j. Diare (Dwiendar, Octa, dkk 2014:1).

7. Pandangan Islam Pada Bayi Baru Lahir

Proses penciptaan manusia dan kelahirannya dijelaskan dalam

QS al-Hajj/16:5

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ
 ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْضِ مَا نَشَاءُ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
 نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلُوْا اَشَدَّكُمْ ۗ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ اِلَى الْاَرْضِ لِيُكَمَّلَ
 الْعُمْرُ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيَّهَا الْاَمْءَ
 اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْۢ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu; dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tetumbuhan) yang indah” (Kementerian Agama RI, 2019:332).

Ayat di atas menyatakan: Proses penciptaan manusia, yaitu manusia diciptakan dari tanah kemudian menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh yaitu rahim. Kemudian air mani itu dijadikan sesuatu yang melekat, lalu kami jadikan segumpal daging lalu dijadikan tulang belulang dan akhirnya kami bungkus dengan daging. Kemudian Allah menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Allah yang memulai penciptaan dapat mengembalikan ciptaan itu kepada asalnya, Maha suci Allah pencipta yang paling baik.

Begitu pula diuraikan tentang kejadian manusia sampai dilahirkan dijelaskan dalam QS al-Mu'minun ayat 12-14.

B. Tinjauan Khusus Tentang Asfiksia Bayi Baru Lahir

1. Pengertian Asfiksia

- a. Asfiksia neonatorum adalah keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Keadaan ini biasanya disertai dengan keadaan hipoksia dan hiperkapnia serta sering berakhir dengan asidosis asfiksiaakan bertambah buruk apabila penanganan bayi tak dilakukan secara sempurna, sehingga tindakan perawatan dilaksanakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengatasi gejala lanjut yang mungkin timbul.
- b. Asfiksia neonatorum adalah keadaan bayi yang tidak dapat bernafas spontan dan teratur, sehingga dapat menurunkan O₂ dan

makin meningkat CO₂ yang menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan lebih lanjut. Tujuan melakukan tindakan terhadap bayi asfiksia adalah melancarkan kelangsungan pernafasan bayi yang sebagian besar terjadi pada waktu persalinan (DWIENDAR, Octa,dkk:2014).

- c. Asfiksia merupakan kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah yang ditandai dengan keadaan O₂ di dalam darah rendah (hipoksemia), hiperkarbia (CO₂ meningkat), dan asidosis (Maternity Dainty,dkk:2018).
- d. Asfiksia adalah suatu keadaan bayi baru lahir tidak bisa bernapas secara spontan dan teratur. Asfiksia juga dapat diartikan sebagai depresi yang dialami bayi pada saat dilahirkan dengan menunjukkan gejala tonus otot yang menurun dan mengalami kesulitan mempertahankan pernapasan yang wajar. Kondisi ini menyebabkan kurangnya pengambilan oksigen dan pengeluaran CO₂ (Maternity Dainty,dkk:2018).

Asfiksia adalah suatu keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur yang ditandai dengan hipoksemia, hiperkarbia dan asidosis. Asfiksia ini dapat terjadi karena kurangnya kemampuan organ pernapasan bayi dalam menjalankan fungsinya, seperti pengembangan paru. Bayi dengan riwayat gawat janin sebelum lahir umumnya akan mengalami asfiksia pada saat dilahirkan. Masalah ini erat hubungannya dengan gangguan kesehatan

ibu hamil, kelainan tali pusat, atau masalah yang mempengaruhi kesejahteraan bayi selama atau sesudah persalinan.

2. Klasifikasi Asfiksia

a. Asfiksia Berat

- 1) Nilai APGAR 0-3
- 2) Frekuensi jantung kecil (<40x/menit)
- 3) Tidak ada usaha nafas
- 4) Tonus otot lemah, bahkan hampir tidak ada
- 5) Bayi tidak dapat memberikan reaksi jika diberikan rangsangan
- 6) Bayi tampak pucat bahkan sampai berwarna kelabu
- 7) Terjadi kekurangan O₂ yang bermakna selama proses persalinan.

b. Asfiksia Sedang

- 1) Nilai APGAR 4-6
- 2) Frekuensi jantung menurun (60-80x/menit)
- 3) Usaha nafas lambat
- 4) Tonus otot biasanya dalam keadaan baik
- 5) Bayi masih bisa bereaksi terhadap rangsangan yang diberikan
- 6) Bayi tampak sianosis
- 7) Tidak terjadi kekurangan O₂ yang bermakna selama proses persalinan.

c. Asfiksia Ringan

- 1) Nilai APGAR 7-10
- 2) Takipnea dengan nafas >60x/menit
- 3) Bayi tampak sianosis
- 4) Adanya retraksi sela iga
- 5) Bayi merintih (grunting)
- 6) Adanya pernafasan cuping hidung
- 7) Bayi kurang aktifitas
- 8) Dari pemeriksaan auskultasi diperoleh wheezing positif

(Dwendar,Octa,dkk,2014:17).

3. Etiologi asfiksia

Asfiksia neonatorum dapat terjadi selama kehamilan,pada proses persalinan dan melahirkanatau periode segera setelah lahir. Janin sangat bergantung pada pertukaran plasenta untuk oksigen, asupan nutrisi dan pembuangan produk sisa sehingga gangguan pada aliran darah umbilikal maupun plasenta hampir selalu akan menyebabkan asfiksia.

Faktor yang dapat menyebabkan gawat janin adalah :

a. Faktor ibu

- 1) Umur ibu, ideal untuk seorang ibu hamil adalah 20-30 tahun
- 2) Hipoksia ibu, akibat pemberian obat analgetik atau anestesis

- 3) Infeksi berat selama kehamilan (TB, malaria, sifilis, varisela, dll)
 - 4) Perdarahan antepartum
 - 5) Gangguan aliran darah uterus, seperti anemia dan riwayat hipertensi selama kehamilan
 - 6) Kehamilan postdate (usia gestasi lebih dari 42 minggu)
- b. Faktor plasenta.
- 1) Solusio plasenta
 - 2) pendarahan plasenta
 - 3) Tali pusat pendek
 - 4) Prolaps tali pusat.
- c. Faktor neonatus
- 1) Pemakaian obat anastesi/analgetik yang berlebihan pada ibu secara langsung dapat menimbulkan depresi pusat pernapasan janin.
 - 2) Trauma yang terjadi pada persalinan, misalnya pendarahan intra cranial.
 - 3) Kelainan kongenital
 - 4) Bayi prematur
 - 5) Berat badan lahir rendah (BBLR)
 - 6) Air ketuban bercampur mekonium

- d. faktor persalinan
 - 1) persalinan letak bokong, sungsang, dll
 - 2) partus macet dan partus lama
 - 3) ketuban pecah dini (Mutmainnah,dkk, 2017:233-234).

4. Tanda dan Gejala Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir

- a. Tidak bernafas atau nafas megap-megap atau pernafasan lambat (kurang dari 30 kali per menit)
- b. Pernafasan tidak teratur
- c. Tangisan lemah atau merintih
- d. Tonus otot lemah
- e. Warna kulit pucat atau biru
- f. Denyut jantung tidak ada atau lambat (bradikardia) (kurang dari 100 kali per menit)

Semua bayi yang menunjukkan tanda asfiksia memerlukan perawatan dan perhatian segera.

5. Patofisiologi

Asfiksia neonatorum terjadi karena gangguan pertukaran transpor O_2 dari ibu ke janin kurangnya kadar CO_2 bertambah, maka timbulah rangsangan terhadap nervus vagus sehingga denyut jantung janin menjadi lambat. Bila kekurangan O_2 ini terus berlangsung maka denyut jantung janin menjadi lebih cepat dan akhirnya ireguler menghilang. Di samping itu kekurangan O_2 juga merangsang usus sehingga mekonium keluar sebagai tanda janin dalam keadaan asfiksia.

6. Dampak Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir

Asfiksia jelas akan mempengaruhi proses tumbuh kembang bayi. Saat organ-organ tubuhnya tidak cukup mendapatkan pasokan oksigen maka kinerjanya pun akan menurun, hasil pertumbuhan dan perkembangan bayi akan ikut terlambat, contohnya saja pada otak.

7. Diagnosa Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir

Diagnosis hipoksia janin dapat dibuat dalam persalinan dengan ditemukannya tanda-tanda gawat janin. tiga hal yang perlu mendapat perhatian dijelaskan berikut:

a. Denyut jantung janin

Denyut jantung janin normal antara 120 sampai 160 kali per menit. Selama his berlangsung, frekuensi ini dapat turun, tetapi diluar his, frekuensi akan kembali lagi pada keadaan semula peningkatan kecepatan denyut jantung umumnya tidak terlalu berarti, tetapi apabila frekuensi turun sampai dibawah 100 kali permenit diluar His dan terlebih lagi jika tidak teratur, hal tersebut merupakan tanda bahaya.

b. Mekanisme dalam air ketuban

Mekonium pada presentasi-sungsang tidak ada artinya, tetapi pada presentasi kepala mungkin menunjukkan gangguan oksigenasi dan harus menimbulkan kewaspadaan. Adanya mekonium dalam air ketuban pada presentasi kepala dapat merupakan indikasi untuk

mengakhiri persalinan bila hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah.


c. Pemeriksaan pH darah janin

Dengan menggunakan amnioskopi yang dimasukkan lewat serviks, dibuat sayatan kecil pada kulit kepala janin dan diambil contoh darah janin. Darah ini diperiksa pH-nya. Adanya asidosis menandakan turunya pH. Apabila pH tersebut sampai turun dibawah 7,2 hal tersebut dianggap sebagai tanda bahaya oleh beberapa penulis (Jenny J.S.Sondakh,2016:179).

8. Penatalaksanaan Asfiksia

a. Langkah awal

Gambar 2.5: langkah awal




(Sumber: Sudarti & Afroh,2013:74)

- 1) Mencegah kehilangan panas, termasuk menyiapkan tempat yang kering dan hangat untuk melakukan pertolongan.

- 2) Memposisikan bayi dengan baik, (kepala bayi sedikit ekstensi atau mengganjal bahu bayi dengan kain).
- 3) Bersihkan jalan nafas dengan alat penghisap yang tersedia
- 4) Keringkan tubuh bayi dengan kayin yang kering dan hangat, setelah itu gunakan kain kering dan hangat yang baru untuk bayi sambil melakukan rangsangan taktil.

Gambar 2.6 rangsangan Taktil



(Sumber: Sudarti & Afroh, 2013:74).

- 5) Letakkan kembali bayi pada posisi yang benar, kemudian nilai: usaha bernafas, frekuensi jantung dan warna kulit.

Proses menghisap lendir, pengeringan, dan merangsang bayi tidak berlangsung lebih dari 30 sampai 60 detik dari sejak lahir hingga proses tersebut selesai. Jika bayi terus mengalami kesulitan bernafas, segerah mulai tindakan ventilasi aktif terhadap bayi.

b. Ventilasi Tekanan positif(VTP)

Gambar 2.7: Kecepatan melakukan ventilasi



(Sumber: Sudarti & Afroh,2013:78).

Pengertian: tindakan memasukan sejumlah udara ke dalam paru dengan tekanan positif, membuka alveoli untuk bernafas secara spontan dan teratur.

- 1) Bila bayi tidak menangis atau megap-megap, warna kulit bayi biru atau pucat, denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, lakukan langkah resusitasi dengan melakukan ventilasi tekanan positif.
- 2) Sebelumnya periksa dan pastikan bahwa alat resusitasi (balon resusitasi dan sungkup muka) telah tersedia dan berfungsi dengan baik.
- 3) Cuci tangan dan gunakan sarung tangan sebelum memegang memeriksa bayi.
- 4) Selimuti bayi dengan kain kering dan hangat, kecuali muka dan dada bagian atas, kemudian letakan dengan alas yang hangat.

- 5) Periksa ulang posisi bayi dan pastikan kepala telah dalam posisi setengah tengadah (sedikit ekstensi).
- 6) Tekan balon resusitasi dengan dua jari atau dengan seluruh jari tangan (bergantung pada ukuran balon resusitasi).
- 7) Lakukan pengujian pertautan dengan melakukan ventilasi sebanyak dua kali dan periksa gerakan dinding dada.
- 8) Bila pertautan baik(tidak bocor) dan dinding dada mengembang, melakukan ventilasi dengan menggunakan oksigen (bila tidak tersedia oksigen gunakan udarah ruangan).
- 9) Pertahankan kecepatan ventilasi sekitar 40 kali per60 detik dengan tekanan yang tepat sambil melihat gerakan dada (naik turun) selama ventilasi.
- 10) Bila dinding dada naik turun dengan baik berarti ventilasi berjalan secara adekuat.
- 11) Bila dinding dada tidak naik, periksa ulang dan betulkan posisi bayi, atau terjadikebocoran jika tekanan ventilasi kurang.
- 12) Lakukan ventilasi selama 2x30 detik atau 60 detik, kemudian lakukan penilaian upaya bernafas spontan dan warna kulit.
Ventilasi dengan balon dan sungkup dalam waktu yang cukup lama (beberapa menit)dan bila perut bayi kelihatan membuncit, maka harus dilakukan pemasangan pipa lambung dan pertahankan selama ventilasi karena udarah dariorofaringdapat

masuk ke dalam esofagus dan lambung yang kemudian menyebabkan:

- a) Lambung yang terisi udarah akan membesar dan menekan diafragma sehingga menghalangi paru-paru untuk berkembang
- b) Dalam lambung dapat menyebabkan terjadi aspirasi
- c) Udarah dalam lambung dapat masuk ke usus dan menyebabkan diafragma tertekan.

c. Kompresi dada

Gambar 2.8: melakukan kompresi dada




(Sumber: Sudarti & Afroh,2013:79).

Cara kompresi dada

- 1) Menekan dada antara sternum vertebr
- 2) Membantu jantung memompa darah
- 3) Perlu 2 orang: 1 melakukan VTP dan 1 orang melakukan kompresi
- 4) Harus terkoordinasi
- 5) Tempat penekanan: 1/3distal sternum
- 6) Kedalaman: 1/3 diameter antero-posterior
- 7) Tehnik ibu jari dan dua jari serta tehnik ibu jari lebih di sukai
- 8) Perbandingan: 3 kompresi-1 ventilasi

2.1 Bagan manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia



(Sumber: kemenkes RI 2018)

Bagan 2.1 merupakan manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia di mulai dengan melakukan penilaian sebelum bayi lahir dan setelah bayi lahir adalah hal yang paling utama dan paling penting untuk mengetahui keadaan ataupun kondisi bayi. Kompetensi bidan dalam penanganan kasus asfiksia, memberikan asuhan yang bermutu tinggi, kompherensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. Berbagai upaya yang aman dan efektif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang meliputi kemampuan dan keterampilan dalam menangani resusitasi pada neonatal untuk mencegah dan mengatasi penyebab kematian bayi.

C. Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan

Manajemen asuhan kebidanan adalah suatu proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian tahapan logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien.

2. Tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan

a. Langkah 1: Pengumpulan data dasar

Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dan pengumpulan data untuk mendapatkan semua informasi yang diperlukan untuk klien atau orang yang akan diberikan asuhan. Untuk memperoleh data peneliti dapat metode tanya jawab untuk memperoleh informasi dengan bertanya kepada kedua orang tua maupun keluarga.

serta pada saat pemeriksaan fisik pada bayi di temukan bayi bernapas tidak teratur serta megap-megap, pernapasan kurang dari 30 kali per menit, warna kulit pucat, frekuensi jantung kurang dari 100 kali permenit, tonus otot lemah. Pemeriksaan ini harus dilakukan dengan akurat dengan melakukan pendekatan yang komprehensif meliputi data objektif dan subjektif (Shondakh, 2013:176).

Adapun Manajemen Bayi baru lahir dengan asfiksia dapat dilakukan penilaian sebelum bayi lahir dan juga penilaian segera setelah bayi lahir.

Penilaian sebelum bayi lahir yaitu: Apakah kehamilan cukup bulan dan apakah air ketuban jernih dan tidak tercampur mekonium. Sedangkan Penilaian segera setelah bayi lahir yaitu: Apakah bayi menangis atau bernapas/tidak megap-megap dan apakah tonus otot bayi baik/bayi bergerak aktif.

b. Langkah II: Identifikasi diagnosa dan masalah aktual.

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang dikumpulkan diinterpretasi sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik. Rumusan masalah dan diagnosa keduanya digunakan karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosis tetapi tetap membutuhkan penanganan.

Penilaian sebelum bayi lahir yaitu: Apakah kehamilan cukup bulan dan apakah air ketuban jernih dan tidak tercampur mekonium. Sedangkan Penilaian segera setelah bayi lahir yaitu: Apakah bayi menangis atau bernapas/tidak megap-megap dan apakah tonus otot bayi baik/bayi bergerak aktif.

Pada bayi yang mengalami asfiksia umumnya dapat dilihat dengan napas yang lambat, frekuensi jantung menurun (60-80x/menit), bayi tampak sianosis, tonus otot biasanya dalam keadaan baik, bayi masih bereaksi terhadap rangsangan yang diberikan, dan tidak terjadi kekurangan O₂ yang bermakna selama persalinan.

c. Langkah III: Identifikasi diagnosa/masalah potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan. Bidan diharapkan waspada dan bersiap mencegah diagnosa/masalah potensial yang terjadi. Pada bayi dengan asfiksia maka perlu dilakukan antisipasi terjadinya kejang, kerusakan otak, metabolik asidosis (kenaikan kadar asam dalam tubuh), hipoksemia (tubuh kekurangan oksigen), gangguan paru-paru dan lemahnya denyut jantung.

d. Langkah IV: (Menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera dan kolaborasi

Merupakan tindakan segera terhadap kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan pasien. Tindakan ini harus dilakukan segera serta berkolaborasi dan rujuk sesuai dengan kondisi

yang dialami pasien. Pada bayi baru lahir dengan asfiksia dilakukan tindakan segera dan berkolaborasi dengan dokter untuk melakukan penatalaksanaan pemberian pertolongan pertama. Tindakan segera ini diantaranya yaitu menjaga bayi agar tetap hangat, mengatur posisi bayi, mengisap lendir bayi, keringkan dan rangsang taktil, reposisi, dan kemudian melakukan penilaian apakah bayi menangis atau bernapas spontan dan teratur.

e. Langkah V: Menyusun rencana asuhan menyeluruh

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau antisipasi, pada langkah ini informasi atau data dasar yang tidak lengkap. Rencana ini akan dilakukan dengan cara hati-hati. Adapun penatalaksanaan pada kasus ini yaitu dilakukannya langkah awal seperti:

- 1) Jaga bayi tetap hangat
- 2) Atur posisi bayi
- 3) Isap lendir
- 4) Keringkan dan rangsangan taktil
- 5) Reposisi

Setelah tindakan awal pada bayi telah dilakukan dan berhasil dan jika bayi bernapas normal maka lakukan asuhan pasca resusitasi

- a) Pemantauan tanda bahaya
 - b) Perawatan tali pusat
 - c) Inisiasi menyusui dini
 - d) Pencegahan hipotermi
 - e) Pemberian vit. K
 - f) Pemberian salep/tetes
 - g) Pemeriksaan fisik
 - h) Pencatatan dan pelaporan
- f. Langkah VI: Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan tindakan kebidanan hasil yang diharapkan adalah tercapainya tujuan, dalam pelaksanaan sesuai intervensi yang telah disusun sudah dapat dilaksanakan karena keluarga sangat kooperatif dalam proses kebidanan selain itu juga melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian tindakan. Bidan harus melakukan implementasi yang efisien terhadap waktu dan kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada pasien.

- g. Langkah VII: Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keefektifan asuhan yang diberikan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai data dasar untuk menegakan diagnosa dan rencana selanjutnya. Yang dievaluasi adalah apakah diagnosa sesuai, rencana asuhan efektif, masalah teratasi, masalah

berkurang, timbul masalah baru dan kebutuhan telah terpenuhi (Yeyeh dan Yulianti, 2012).

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Pendokumentasian dalam asuhan kebidanan adalah suatu pencatatan lengkap dan akurat terhadap keadaan atau kejadian yang dilihat dalam pelaksanaan asuhan (proses asuhan kebidanan).

Pendokumentasian asuhan yang telah diberikan harus di catat benar, jelas, singkat, dan logis dalam suatu metode pendokumentasian dalam bentuk SOAP, yaitu:

S (Subjektif)

Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien. Pada bayi yang mengalami asfiksia umumnya dapat dilihat dengan napas yang lambat, frekuensi jantung menurun (60-80x/menit), bayi tampak sianosis, tonus otot biasanya dalam keadaan baik, bayi masih bereaksi terhadap rangsangan yang diberikan, dan tidak terjadi kekurangan O₂ yang bermakna selama persalinan.

O (Objektif)

Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien yang meliputi: keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, hasil laboratorium dan uji diagnosis lain yang merumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan.

A (*Assesment*)

Menggambarkan Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan data objektif dalam suatu identifikasi:

- a. Diagnosa/masalah
- b. Antisipasi diagnosis/masalah potensial
- c. Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter/konsultasi/kolaborasi dan atau rujukan.

P (*Planning*)

Menggambarkan Pendokumentasian tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assesment.

Terdapat tiga kali kunjungan ulang pada bayi baru lahir yaitu:

- a. Kunjungan Neonatus ke satu (KN 1)
kunjungan neonatal pertama kali yaitu pada hari pertama sampai hari kedua, tujuannya yaitu: melakukan rangsangan taktil, mengobservasi pemberian oksigen 1 liter permenit menggunakan masa kanul, perawatan tali pusat, memberikan imunisasi hepatitis B setelah penyuntikan vitamin K, Memberikan salep mata, mengobservasi tanda-tanda vital.
- b. Kunjungan Neonatal ke dua (KN 2)
kunjungan neonatal yang kedua kalinya yaitu pada hari kedua sampai hari ke tujuh, tujuannya yaitu: mengobservasi keadaan umum bayi,

tanda-tanda vital, menjaga kehangatan bayi, menganjurkan ibu untuk memberikan bayi ASI dan melakukan perawatan tali pusat.

c. Kunjungan Neonatal ke tiga (KN 3)

kunjungan neonatal yang ketiga kalinya yaitu pada hari ke tujuh sampai hari ke dua puluh delapan yaitu: melakukan evaluasi keadaan umum bayi baik, mengobservasi tanda-tanda vital, memantau berat badan bayi, menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan bayi, menjelaskan tanda bahaya pada bayi dan menganjurkan ibu untuk membawa bayinya ke pusat pelayanan kesehatan pada usia bayi 1 bulan untuk di imunisasi.

Kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan/masalah kesehatan pada neonatus. Risiko terbesar kematian neonatus terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, minggu pertama dan bulan pertama kehidupannya. Sehingga jika bayi lahir di fasilitas kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam pertama.

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR PADA
BAYI NY "N" DENGAN ASFIKZIA SEDANG
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR
TANGGAL 10 AGUSTUS 2021

No. Register : 64 xx xx
Tanggal Lahir : 10 Agustus 2021, Pukul 10.00 wita
Tanggal Pengkajian : 10 Agustus 2021, Pukul 10.00 wita
Nama Pengkaji : Titi Tri Wulandari

A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas Bayi dan Orang Tua

a. Identitas Bayi

Nama : Bayi Ny"”N”

Tanggal Lahir : 10 Agustus 2021

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Anak ke : 1 (Pertama)

Alamat : Jl. Ratulangi

b. Identitas Orang Tua

Nama : Ny “N” / Tn” J”
Umur : 25 tahun / 31 tahun
Nikah/Lamanya : 1x /± 2 tahun
Suku : Bugis / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / S1
Pekerjaan : IRT / Guru
Alamat : Jl. Ratulangi

2. Data Biologis**a. Keluhan utama**

Bayi tidak segera menangis dan tidak bernapas secara spontan pada saat lahir.

b. Riwayat keluhan utama

- 1) Bayi lahir dengan kala II lama didiagnosis mengalami asfiksia sedang yang ditandai dengan tidak segerah menangis dan bernapas secara spontan / megap-megap dengan nilai APGAR score 5/8
- 2) Badan bayi kemerahan serta ekstremitas kebiru-biruan dan masi melakukan usaha napas megap-megap.

c. Riwayat kehamilan dan persalinan**1) Riwayat persalinan yang lalu**

Tidak ada riwayat persalinan yang lalu

2) Riwayat kehamilan dan persalinan

- a) Ibu mengatakan ini merupakan anak pertama dan tidak pernah keguguran
- b) Hari pertama haid terakhir ibu tanggal 16 November 2020
- c) Hari tafsiran persalinan pada tanggal 23 Agustus 2021
- d) Gestasi pada saat melahirkan 38 minggu 1 hari
- e) Ibu tidak pernah mengalami nyeri perut hebat selama kehamilan
- f) Ibu sering memeriksa kehamilannya, pada saat hamil yaitu sebanyak 6 kali dan sudah mendapatkan suntik TT sebanyak 2x
- g) Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit jantung, asma, diabetes mellitus, hipertensi serta penyakit serius lainnya selama dan setelah persalinan
- h) Ibu mengatakan keluarga tidak memiliki riwayat penyakit keturunan.

3) Riwayat persalinan sekarang

- a) Bayi lahir pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 10.00 wita
- b) Bayi lahir dengan jenis kelamin perempuan
- c) Penilaian segera bayi baru lahir
 - (1) Tidak segerah menangis dan tidak bernapas secara spontan serta melakukan usaha napas megap-megap
 - (2) Denyut jantung lemah dan tidak teratur yaitu 90x/menit
 - (3) Warna kulit badan kemerahan dan ekstremitas kebiru-biruan

3. Data psikologis, spritual, dan ekonomi

Suami dan keluarga senang akan kelahiran bayinya, orang tua bayi dapat menanyakan segala sesuatu tentang bayinya ke petugas kesehatan termasuk keadaan bayi serta pemberian ASI, kedua orang tua bayi serta keluarga sering melakukan ibadah sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Serta sering berdoa kepada Allah SWT agar bayinya segera mendapatkan kesehatan agar dapat berkumpul bersama kedua orang tua, keluarga, dan juga orang sekitarnya. Kedua orang tuanya ingin memberikan ASI eksklusif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya.

4. Pemeriksaan fisik

- a. Keadaan umum bayi kurang baik, bayi melakukan usahan napas dengan megap-megap
- b. Tanda-tanda vital bayi
 - 1) Frekuensi jantung : 90x/menit (Normalnya 120-160x/menit)
 - 2) Pernapasan : belum bernapas secara teratur dan masih melakukan usaha pernapasan megap-megap (Normalnya 40-60x/menit)
 - 3) Suhu 36,7 °C
- c. Penilaian APGAR score dinilai segera pada saat bayi lahir yaitu pada menit pertama kelahiran bayi dan pada menit ke-5 yaitu pada pukul 10.05 wita.

d. Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi

1) Kepala

Tidak ada *caput secedaneum*, ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil belum menutup, rambut tampak tebal dan berwarna hitam.

2) Wajah

Simetris kiri dan kanan tidak ada kelainan

3) Mata

Konjungtiva merah mudah, sklera tidak ikterus, tidak ada secret

4) Telinga

Simetris kiri dan kanan, daun telinga tampak normal, lunak dan mudah kembali ke bentuk semula saat ditekuk

5) Hidung

Simetris kiri dan kanan

6) Mulut dan bibir

Bibir berwarna pucat, refleks isap tidak ada, serta tidak ada kelainan

7) Leher

Tidak ada benjolan dan tidak ada kelainan

8) Dada dan perut

Simetris kiri kanan, tidak ada benjolan pada dada serta tali pusat masih basah dan dijepit dengan penjepit tali pusat

9) Genetalia dan anus

Tidak ada kelainan, tampak labia mayora telah menutupi labia minora dan ada lubang anus.

10) Ekstremitas

Ekstremitas simetris kiri kanan, jumlah jari-jari tangan dan jari kaki lengkap, kurangnya pergerakan yang aktif, serta warna kulit kebiru-biruan

11) Kulit

Kulit tampak kebiruan, tampak sedikit verniks dan adanya tanda lahir pada bagian tangan sebelah kanan

e. Penilaian neurologis

1) Refleks morro : (-)

2) Refleks hisap : (-)

3) Refleks rooting : (-)

B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa Aktual: BCB, PBK, SMK ,SPT, bayi dengan asfiksia sedang

1. BCB, PBK, SMK, SPT

Data dasar

DS : Ibu mengatakan HPHT tanggal 16 November 2020

Ibu melahirkan pada tanggal 10 Agustus 2021

DO : HTP : 23 Agustus 2021

BBL : 2700 gram

PBL : 47 cm

Analisa dan interpretasi data

- a. Hasil pengkajian HPHT tanggal 16 November 2020 sampai dengan bayi lahir pada tanggal 10 Agustus 2021 maka gestasi yang

didapatkan yaitu 38 minggu 1 hari yang menandakan bayi cukup bulan (BCB) diperkirakan durasi kehamilan selama 267 hari. Bayi cukup bulan adalah bayi yang dilahirkan setelah usia kehamilan genap mencapai 37 minggu dan sebelum usia genap mencapai 42 minggu. Bayi lewat waktu adalah bayi yang dilahirkan setelah usia kehamilan melewati 42 minggu (Williamson Amanda, 2013: 2-3).

- b. Bayi Ny “N” lahir pada usia gestasi kehamilan yaitu 38 minggu 1 hari dengan berat badan 2700 gram dan panjang badan lahir 47 cm. Berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterine berat badan bayi Ny “N” sesuai dengan masa kehamilan (SMK).

2. Asfiksia

Data dasar

DS : a. Ibu melahirkan pada tanggal 10 agustus 2021

b. Ibu mengatakan bayi lahir tidak segerah menangis

DO : a. Bayi lahir tidak segerah menangis

b. Bayi lahir dengan kala II lama

c. Frekuensi jantung pada saat bayi lahir yaitu 90x/menit

d. Badan bayi kemerahan ekstremitas biru

e. bayi tidak dapat memberikan reaksi pada saat diberi rangsangan

f. Tonus otot lemah

g. pernapasan ± 30 x/menit

Analisa dan interpretasi data

- a. Dampak lamanya kala II pada proses persalinan yaitu menimbulkan konsekuensi serius antara ibu maupu janinnya.
- b. Hubungan lama persalinan kala II dengan APGAR score bayi pada menit pertama karena adanya beberapa keadaan yang terjadi misalnya karna faktor-faktor 5P persalinan, keadaan yang terjadi pada ibu yang mengalami partusmacet atau partus lama bisa menyebabkan dehidrasi serta terjadi perdarahan post partum yang dapat menyebabkan nilai apgar bayi rendah dikarenakan aliran darah ibu melalui plasenta berkurang sehingga aliran oksigen ke janin berkurang (Zahara,dkk 2015)
- c. Bayi dengan asfiksia ditandai dengan bayi lahir tidak segerah menangis, bernapas megap-megap, eksterimitas biru, denyut jantung kurang dari 100-120x/menit serta gerakan bayi tidak aktif.

C. LANGKAH III :IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Diagnosa potensial : Potensial yang dapat terjadi yaitu kerusakan pada otak

DO : a. Bayi lahir tidak segerah menangis
b. Bayi bernapas megap-megap

Analisa dan interpretasi data

- a. Bayi yang mengalami asfiksia sedang dapat berlanjut menjadi asfiksia berat apabila tidak segera ditangani dengan tindakan yang benar.

Asfiksia bermula dari kondisi gawat janin. Kondisi ini dapat terjadi apabila aliran darah dari tubuh ibu ke plasenta mengalami gangguan sehingga menyebabkan janin kekurangan pasokan oksigen (O₂) dan karbondioksida (CO₂) keadaan ini tetap berlanjut maka bayi beresiko mengidap asfiksia saat lahir. Bila proses ini berlangsung terlalu jauh dapat mengakibatkan kerusakan otak atau kematian. Selain itu asfiksia juga dapat mempengaruhi kerusakan organ tubuh yang lain (Sembiring 2019:173).

D. LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA DAN KOLABORASI

Tanggal 10 Agustus 2021, pukul 10.00 wita

1. Mencegah kehilangan panas bayi, menyiapkan tempat yang hangat dan kering untuk melakukan pertolongan pada bayi.

Hasil : telah dilakukan pencegahan kehilangan panas bayi dengan cara dibedong dan bayi telah ditempatkan di *radiant warmer* dengan suhu 36,5°C

2. Memposisikan bayi dengan posisi kepala bayi sedikit ekstensi dan bahu dialas dengan kain

Hasil : kepala bayi telah diposisikan dengan sedikit ekstensi

3. Bersihkan jalan napas dengan penghisap lendir yaitu deele.

Hasil : jalan napas telah dibersihkan

4. Keringkan tubuh bayi dengan kayin yang kering, bersih dan hangat.

Bersihkan tubuh bayi sambil melakukan rangsangan taktil.

Hasil : badan bayi telah dikeringkan dan telah dilakukan rangsangan taktil.

5. Letakan kembali bayi pada posisi yang benar, nilai usaha kemudian nilai frekuensi jantung dan warna kulit

Hasil : frekuensi jantung 90x/menit dan warna kulit kemerahan ekstremitas biru

6. Melakukan penilaian terhadap napas bayi

Hasil : pernapasan ± 30 x/menit

7. Jika bayi telah bernapas secara spontan dan frekuensi jantung sudah normal akan tetapi bayi masih mengalami kebiruan maka dilakukan pemberian oksigen 1 liter/menit menggunakan nasa kanul.

Hasil : oksigen telah diberikan untuk memperbaiki keadaan umum bayi dan mencegah terjadinya asidosis yang berkelanjutan. oksigen dilepas setelah keadaan umum bayi baik dan warna kulit bayi sudah normal yaitu kemerah-merahan.

E. LANGKAH V : PERENCANAAN

Tanggal 10 Agustus 2021, pukul 10.00 wita

Tujuan :

1. Bayi dapat melakukan usaha napas tanpa megap-megap
2. Bayi segera melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan intrauterin ke lingkungan ektrauterin.

Kriteria

1. Keadaan umum bayi baik
2. Tanda-tanda vital dalam batas normal:
 - a. Frekuensi jantung : normalnya 120-160x/menit
 - b. Pernapasan : normalnya 40-60x/menit
 - c. Suhu : normalnya 36,5-37,5 °C
3. Refleks isap dan menelan bayi baik

Intervensi tanggal 10 Agustus 2021.pukul 10.00 wita

1. Mencuci tangan menggunakan tehnik 6 langkah sebelum dan sesudah menyentuh bayi
Rasional : mencegah terjadinya infeksi
2. Mencegah kehilangan panas, menyiapkan tempat yang hangat untuk melakukan pertolongan terhadap bayi
Rasional : suhu intrauterine berbeda dengan suhu ekstrauterin setelah bayi berada di ekstrauterine bayi harus beradaptasi di suhu luar rahim sehingga dibutuhkan pengawasan agar tidak terjadi kehilangan panas.
3. Membedong bayi menggunakan kain yang kering, hangat dan bersih
Rasional : untuk mencegah terjadinya kehilangan panas pada bayi
4. Melakukan perawatan tali pusat pada bayi baru lahir
Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi pada bayi

5. Memberikan injeksi vitamin K 0,5cc pada paha kiri secara intra muskular

Rasional : untuk mencegah terjadinya perdarahan ke otak

6. Memberikan salep mata pada bayi

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi

7. Melakukan pemeriksaan fisik

Rasional : untuk mendeteksi dini adanya kelainan

8. Melakukan pemberian imunisasi hepatitis B 0,5 ml pada paha kanan setelah 1 jam penyuntikan vitamin K

Rasional : untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis pada bayi dan menjaga kekebalan tubuh bayi

9. Melakukan observasi tanda-tanda vital pada bayi setiap 15 menit

Rasional : untuk mengetahui perkembangan keadaan umum bayi sehingga dapat segera ditindak lanjuti apabila terdapat tanda-tanda keadaan umum dibawah batas normal

F. LANGKAH VI : PENATALAKSANAAN

Tanggal 10 Agustus 2021, pukul 10.00 wita

1. Mencuci tangan dengan 6 langkah sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Hasil : cuci tangan menggunakan sabun, air mengalir dan telah menggunakan sarung tangan

2. Mencegah kehilangan panas, menyiapkan tempat kering dan hangat untuk melakukan pertolongan terhadap bayi

Hasil : telah dilakukan

3. Melakukan penilaian napas, frekuensi jantung dan juga warna kulit

Hasil : warna kulit bayi kemerahan ekstremitas biru, bayi belum bernapas secara spontan dan frekuensi jantung 90x/menit

4. Bedong bayi menggunakan kain yang kering, hangat dan bersih

Hasil : telah dilakukan

5. Mengatur posisi bayi dengan kepala sedikit ekstensi dan bahu di alas dengan kain

Hasil : telah dilakukan

6. Membersihkan jalan napas bayi menggunakan deele

Hasil : jalan napas bayi telah dibersihkan

7. Mengeringkan bayi dan melakukan rangsangan taktil

Hasil : tindakan telah dilakukan

8. Mengobservasi pemberian oksigen 1 liter/menit menggunakan nasa kanul

Hasil : telah dilakukan

9. Melakukan perawatan tali pusat

Hasil : telah dilakukan

10. Melakukan penyuntikan vitamin K pada paha kiri bayi secara intramuskular dan memberikan imunisasi hepatitis B 1 jam setelah pemberian vitamin K

Hasil : telah dilakukan

11. Memberikan salep mata

Hasil : tindakan telah dilakukan

12. Mengobservasi adanya tanda-tanda infeksi pada tali pusat bayi

Hasil : tidak ada tanda-tanda infeksi

13. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : Frekuensi jantung 90x/menit, pernapasan ± 30 x/menit dan suhu 36,7 °C.

14. Memberikan ucapan selamat kepada ibu, karna telah melahirkan putri pertamanya dengan penuh pengorbanan

Hasil : ibu sangat terharu

15. Memberikan support yang positif kepada ibu dan meyakinkan ibu bahwa bayinya insya Allah akan baik-baik saja dan akan dilindungi oleh yang maha kuasa atas segalanya

Hasil : ibu merasa senang

16. Menganjurkan ayah dari bayi atau keluarga bayi untuk mengadzankan bayi serta menganjurkan keluarga untuk senantiasa mendoakan agar bayi dilindungi dan dijauhkan dari marah bahaya

Hasil : telah dilakukan

G. LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 10 agustus 2021, pukul 10.00 wita

1. Asfiksia pada bayi baru lahir dapat teratasi dengan melakukan tindakan awal pada bayi baru lahir dengan asfiksia sedang
2. Tali pusat bayi masih basah dan tidak ada tanda-tanda infeksi
3. Bayi telah melakukan inisiasi menyusui dini (IMD)
4. Bayi sudah dapat beradaptasi dengan lingkungan luar dengan $36,7^{\circ}\text{C}$, bayi sudah BAB dan BAK
5. Bayi bernapas secara spontan ditandai dengan frekuensi 42x/menit
6. Bayi tampak bergerak.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU
LAHIR PADA BAYI NY "N" DENGAN ASFIKZIA SEDANG**

DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR

TANGGAL 10 AGUSTUS 2021

No. Register : 64 xx xx
Tanggal Lahir : 10 Agustus 2021, Pukul 10.00 wita
Tanggal Pengkajian : 10 Agustus 2021, Pukul 10.00 wita
Nama Pengkaji : Titi Tri Wulandari

IDENTITAS BAYI DAN ORANG TUA

a. Identitas Bayi

Nama : Bayi Ny"N"
Tanggal Lahir : 10 Agustus 2021
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak ke : 1 (Pertama)
Alamat : Jl. Ratulangi

b. Identitas Orang Tua

Nama : Ny "N" / Tn" J"
Umur : 25 tahun / 31 tahun
Nikah/Lamanya : 1x /± 2 tahun
Suku : Bugis / Makassar
Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / S1
Pekerjaan : IRT / Guru
Alamat : Jl. Ratulangi

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan ini anak pertama dan tidak pernah keguguran
2. Ibu mengatakan melahirkan dengan kala II lama
3. HPHT tanggal 16 November 2020
4. Ibu mengatakan usia kehamilannya saat melahirkan ± 9 bulan
5. Ibu memeriksa kehamilannya sebanyak 6 kali selama hamil
6. Ibu telah mendapatkan suntik TT 2x selama kehamilannya
7. Ibu tidak pernah mengalami nyeri perut hebat selama hamil
8. Ibu tidak mempunyai riwayat penyakit jantung, asma, diabetes mellitus, hipertensi serta penyakit serius lainnya selama dan setelah persalinan
9. Ibu mengatakan keluarganya tidak memiliki riwayat penyakit keturunan.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi kurang baik dan bayi belum bisa bernapas secara spontan dan teratur
2. Berat badan lahir yaitu 2700 gram
3. Panjang badan lahir yaitu 47 cm
4. Tanda-tanda vital

- a. Frekuensi jantung 90x/menit (normalnya 120-160x/menit)
 - b. Pernapasan: belum bernapas secara spontan dan teratur dan masih megap-megap (normalnya 40-60x/menit)
 - c. Suhu 36,7°C
5. Melakukan pemeriksaan fisik
- a. Kepala
Tidak ada *caput secedaneum*, ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil belum menutup, rambut tampak tebal dan berwarna hitam.
 - b. Wajah
Simetris kiri dan kanan tidak ada kelainan
 - c. Mata
Konjungtiva merah mudah, sklera tidak ikterus, tidak ada secret
 - d. Telinga
Simetris kiri dan kanan, daun telinga tampak normal, lunak dan mudah kembali ke bentuk semula saat ditebuk
 - e. Hidung
Simetris kiri dan kanan
 - f. Mulut dan bibir
Bibir berwarna pucat, refleks isap tidak ada, serta tidak ada kelainan
 - g. Leher
Tidak ada benjolan dan tidak ada kelainan

h. Dada dan perut

Simetris kiri kanan, tidak ada benjolan pada dada serta tali pusat masih basah dan dijepit dengan penjepit tali pusat

i. Genetalia dan anus

Tidak ada kelainan, tampak labia mayora telah menutupi labia minora dan ada lubang anus

j. Ekstremitas

Ekstremitas simetris kiri kanan, jumlah jari-jari tangan dan jari kaki lengkap, kurangnya pergerakan yang aktif, serta warna kulit kebiru-biruan

k. Kulit

Kulit tampak kebiruan, tampak sedikit verniks dan adanya tanda lahir pada bagian tangan sebelah kanan

6. Penilaian neurologis

a. Refleks morro : (-)

b. Refleks hisap : (-)

c. Refleks rooting : (-)

ASSESMENT (A)

Bayi baru lahir dengan asfiksia sedang,antisipasi terjadinya kerusakan otak dan kematian bayi secara langsung dengan melakukan langkah awal

PLANNING (P)

Tanggal 10 agustus 2021,pukul 10.00 wita

1. Mencuci tangan dengan 6 langkah sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Hasil : cuci tangan menggunakan sabun, air mengalir dan telah menggunakan sarung tangan

2. Tali pusat bayi dipotong segera setelah melahirkan

Hasil : tali pusat telah dipotong

3. Mencegah kehilangan panas, menyiapkan tempat kering dan hangat untuk melakukan pertolongan terhadap bayi

Hasil : telah dilakukan

4. Melakukan penilaian napas, frekuensi jantung dan juga warna kulit

Hasil : warna kulit bayi kemerahan ekstremitas biru, bayi belum bernapas secara spontan dan frekuensi jantung 90x/menit

5. Bedong bayi menggunakan kain yang kering, hangat dan bersih

Hasil : telah dilakukan

6. Mengatur posisi bayi dengan kepala sedikit ekstensi dan bahu di atas dengan kain

Hasil : telah dilakukan

7. Membersihkan jalan napas bayi menggunakan deele

Hasil : jalan napas bayi telah dibersihkan

8. Mengeringkan bayi dan melakukan rangsangan taktil

Hasil : tindakan telah dilakukan

9. Mengobservasi pemberian oksigen 1 liter/menit menggunakan nasa kanul

Hasil : telah dilakukan

10. Melakukan perawatan tali pusat

Hasil : telah dilakukan

11. Melakukan penyuntikan vitamin K pada paha kiri bayi secara intramuskular dan memberikan imunisasi hepatitis B 1 jam setelah pemberian vitamin K

Hasil : telah dilakukan

12. Memberikan salep mata

Hasil : tindakan telah dilakukan

13. Mengobservasi adanya tanda-tanda infeksi pada tali pusat bayi

Hasil : tidak ada tanda-tanda infeksi

14. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : telah dilakukan

17. Memberikan ucapan selamat kepada ibu, karna telah melahirkan putri pertamanya dengan penuh pengorbanan

Hasil : ibu sangat terharu

18. Memberikan support yang positif kepada ibu dan meyakinkan ibu bahwa bayinya insya Allah akan baik-baik saja dan akan dilindungi oleh yang maha kuasa atas segalanya

Hasil : ibu merasa senang

15. Menganjurkan kedua orang tua serta keluarga untuk senantiasa mendoakan agar bayi dilindungi dan dijauhkan dari marah bahaya

Hasil : telah dilakukan.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU
LAHIR PADA BAYI NY “N” PERAWATAN HARI KE II**

DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR

TANGGAL 11 AGUSTUS 2021

No. Register : 64 xx xx

Tanggal Lahir : 10 Agustus 2021, Pukul 10.00 wita

Tanggal Pengkajian : 11 Agustus 2021, Pukul 09.10 wita

Nama Pengkaji : Titi Tri Wulandari

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan melahirkan pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 10.00 wita
2. Ibu mengatakan saat lahir bayinya tidak langsung menangis dan pada saat sekarang Alhamdulillah bayinya sudah menangis
3. Ibu memberikan ASI secara eksklusif pada bayinya

DATA OBJEKTIF (O)

1. Bayi saat ini sedang menangis
2. Tonus otot bayi baik
3. Tali pusat masih tampak basah dan tidak ada tanda-tanda infeksi
4. Refleks isap dan morro baik

5. Tanda-tanda vital :
 - a. Frekuensi jantung 130x/menit
 - b. Pernapasan 42x/menit
 - c. Suhu 36,7°C
6. Pemantauan berat badan bayi
 - a. BBL : 2700 gram
 - b. BBS: 2700 gram

ASSESSMENT (A)

Bayi Ny “N” dengan bayi cukup bulan (BCB)/sesuai masa kehamilan (SMK)

PLANNING (P)

Tanggal 11 Agustus 2021, pukul: 09.10 wita

1. Mencuci tangan dengan 6 langkah sebelum dan sesudah menyentuh bayi
Hasil : telah dilakukan
2. Mengobservasi keadaan umum bayi
Hasil :
 - a. Keadaan umum bayi baik
 - b. Tanda-tanda vital
 - 1) Frekuensi jantung 130x/menit
 - 2) Pernapasan 42x/menit
 - 3) Suhu 36,7°C

3. Menjaga kehangatan bayi dengan cara menyelimuti bayi dengan kain bersih, kering dan hangat

Hasil : bayi telah dibedong

4. Memberitahu keluarga mengenai kondisi bayi yang saat ini mulai membaik

Hasil : keluarga telah diberitahu

5. Mengajarkan ibu untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah menyentuh bayinya

Hasil : ibu mengerti

6. Mengajarkan ibu untuk selalu menjaga personal hygiene

Hasil : ibu bersedia

7. Mengajarkan ibu untuk selalu memberikan ASI secara teratur kepada bayinya

Hasil : ibu bersedia

8. Mengajarkan ibu teknik menyusui

- a. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir kemudian keringkan

- b. Mengajarkan ibu duduk dan membantu membuka pakaian atas ibu, setelah itu anjurkan ibu untuk mengoles puting susu dan areola menggunakan sedikit ASI dikeluarkan

- c. Mengajari ibu untuk meletakkan bayi pada satu lengan, kepala bayi berada pada lengkung siku ibu dan bokong bayi berada pada lengan bawah ibu

- d. Mengajari ibu untuk menempelkan satu tangan bayi dibelakang badan ibu dan yang satu didepan, kepala bayi menghadap payudara
- e. Mengajari ibu untuk memposisikan bayi dengan telinga dan lengan pada garis yang lurus
- f. Mengajari ibu untuk memegang payudara dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawah serta jangan menekan puting susu dan areolanya
- g. Mengajari ibu untuk merangsang membuka mulut bayi dengan cara menyentuh pipi dengan puting susu atau menyentuh sudut mulut bayi
- h. Setelah bayi membuka mulut, anjurkan ibu untuk mendekatkan dengan cepat kepala bayi ke payudara ibu kemudian masukan puting susu serta sebagian areola ke mulut bayi
- i. Setelah bayi mulai menghisap, menganjurkan ibu untuk tidak memegang atau menyangga payudara lagi
- j. Menganjurkan ibu untuk memperhatikan bayi selama menyusui
- k. Mengajari ibu cara melepas isapan bayi
Jari kelingking dimasukan ke mulut bayi melalui sudut mulut atau dagu bayi di tekan ke bawah
- l. Setelah selesai menyusui, mengajarkan ibu mengoleskan sedikit ASI pada puting susu dan areola. Biarkan kering dengan sendirinya

m. Mengajarkan ibu untuk menyendawakan bayinya

Bayi digendong tegak dengan bersandar pada bahu ibu kemudian punggung ditepuk perlahan-lahan sampai bayi bersendawa (bila tidak bersendawa tunggu 10-15 menit)

Bayi ditengkurapkan di pangkuan ibu dengan menyangga dahi bayi kemudian punggung di tepuk perlahan-lahan sampai bayi bersendawa

n. Mengajari ibu untuk selalu menyusukan kedua payudaranya secara bergantian

Hasil : ibu mengerti tehnik menyusui yang benar yang di ajarkan oleh bidan

9. Melakukan pendokumentasian

Hasil : telah dilakukan



Kunjungan hari kedua bayi Ny”N”tanggal 11 Agustus 2021

di RSUD Labuang Baji Makassar

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU
LAHIR PADA BAYI NY “N” PERAWATAN HARI KE III
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR
TANGGAL 12 AGUSTUS 2021**

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu merasa senang dengan kelahiran buah hatinya yang pertama dengan jenis kelamin perempuan
2. Ibu mengatakan bayinya sering menangis dengan kuat
3. Ibu mengatakan ASI keluar dengan lancar
4. Ibu mengatakan memberikan ASI eksklusif pada bayinya

DATA OBJEKTIF (O)

1. Bayi menangis kuat
2. Tonus otot bayi baik
3. Tali pusat tampak basah dan tidak ada tanda-tanda infeksi
4. Refleks isap dan morro baik
5. Tanda-tanda vital
 - a. Frekuensi jantung 131x/menit
 - b. Pernapasan 49x/menit
 - c. Suhu 36,7°C

ASSESSMENT (A)

Bayi Ny "N" umur 3 hari

PLANNING (P)

Tanggal 12 Agustus 2021, pukul 09.15 wita

1. Mencuci tangan dengan 6 langkah sebelum dan sesudah kontak dengan bayi

Hasil : telah dilakukan

2. Mengobservasi keadaan umum bayi

Hasil :

- a. Keadaan umum bayi baik
- b. Tanda-tanda vital
 - 1) Frekuensi jantung 131x/menit
 - 2) Pernapasan 49x/menit
 - 3) Suhu 36,7°C

3. Memantau berat badan bayi

Hasil: berat badan bayi sekarang 2800 gram

4. Menganjurkan ibu untuk selalu memperhatikan dan menjaga kebersihan bayinya, terutama apabila pakaian bayi basa atau lembab agar segera menggantinya

Hasil : ibu bersedia melakukannya

5. Mengajarkan ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif pada bayinya sampai umur 6 bulan penuh tanpa memberikan makanan tambahan lainnya

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Mengajarkan ibu untuk melakukan perawatan tali pusat pada bayinya dan jangan taburkan pakai bedak, betadine ataupun sejenisnya

Hasil : ibu bersedia melakukannya

7. Mengajarkan ibu untuk selalu menjaga kehangatan bayinya

Hasil : ibu bersedia melakukannya

8. Memberitahu ibu bahwa bayinya dalam keadaan baik

Hasil : ibu merasa senang

9. Memberitahu ibu tanda bahaya pada bayi baru lahir

- a. Bayi malas menyusui dan bayi tidak mau menyusui
- b. Suhu bayi $<36,5$ atau $37,5^{\circ}\text{C}$
- c. Tali pusat kemerahan, bengkak, bernanah dan berbau
- d. Bayi diare dan muntah terus menerus
- e. Bayi tidak kencing selama 24 jam pertama
- f. Bayi tidak mau buang air besar dalam 3 hari
- g. Kejang
- h. Warna kulit bayi sianosi dan berwarna kuning

Hasil : ibu mengerti dan segerah bawa bayinya ke pelayanan kesehatan terdekat, jika menemukan salah satu tanda tersebut

10. Menganjurkan ibu untuk selalu mendoakan bayinya supaya menjadi anak yang solehan dan berbakti kepada kedua orang tuanya dengan membaca Qs. As-Saffat/37:100

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

“Ya tuhanmu, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang saleh” (Kementerian Agama RI,2019:449).

Hasil : ibu bersedia melakukannya.

11. Persiapan pulang

12. Melakukan pendokumentasian

Hasil : telah dilakukan



Kunjungan hari ketiga bayi Ny”N” tanggal 12 Agustus 2021

di RSUD Labuang Baji Makassar

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU
LAHIR PADA BAYI NY "N" DI RUMAH PASIEN**

JL. RATULANGI PADA TANGGAL

16 AGUSTUS 2021

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu merasa senang karna sudah pulang dari RSUD Labuang Baji Makassar dan dapat merawat bayinya di rumah
2. Ibu merasa senang dengan keadaan bayinya saat ini
3. Ibu mengatakan ASInya lancar
4. Ibu memberikan ASI eksklusif pada bayinya

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi ibu baik
2. Tonus otot sudah baik
3. Tali pusat bayi tampak kering
4. Tanda-tanda vital
 - a. Frekuensi jantung : 150x/menit
 - b. Pernapasan : 44x/menit
 - c. Suhu : 36,9°C

ASSESMENT (A)

Bayi Ny "N" umur 7 hari

PLANNING (P)

Tanggal 16 Agustus 2021, pukul 09.30 wita

1. Mencuci tangan dengan tehnik 6 langkah menggunakan sabun dan air mengalir lalu keringkan sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Hasil : telah dilakukan

2. Mengobservasi keadaan umum bayi

Hasil:

- a. Keadaan umum bayi baik
- b. Tanda-tanda vital
 - 1) Frekuensi jantung : 150x/menit
 - 2) Pernapasan : 44x/menit
 - 3) Suhu : 36,9°C

3. Memantau berat badan bayi

Hasil : BBS: 2900 gram

4. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan bayinya terutama apabila pakaian bayinya basah/lembab segera menggantinya

Hasil : ibu bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya secara teratur bayi berumur 6 bulan tanpa makanan tambahan lainnya

Hasil : ibu bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kehangatan bayinya

Hasil : ibu mengerti dan selalu menjaga kehangatan bayinya

7. Mengajukan ibu untuk sering mendoakan bayinya supaya menjadi anak yang sholeha dan baik dengan membaca QS.Al-Furqan/25.74

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

“Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa” (Kementerian Agama RI, 2019:366).

Hasil : ibu selalu mendoakan bayinya

8. Memberitahu ibu bahwa bayinya dalam keadaan baik

Hasil : ibu merasa senang

9. Melakukan pendokumentasian

Hasil : telah dilakukan



Kunjungan hari ke-7 bayi Ny”N”tanggal 16 Agustus 2021

Di Rumah Pasien JL.Ratulangi

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU
LAHIR PADA BAYI NY "N" DI RUMAH PASIEN**

JL. RATULANGI PADA TANGGAL

24 AGUSTUS 2021

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu merasa senang dengan keadaan bayinya saat ini
2. Ibu mengatakan ASInya sangat lancar
3. Ibu memberikan ASI eksklusif pada bayinya

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi baik
2. Tali pusat sudah pupus
3. Tonus otot baik
4. Tanda-tanda vital
 - a. Frekuensi jantung : 151x/menit
 - b. Pernapasan : 44x/menit
 - c. Suhu 36,9°C

ASSESSMENT (A)

Bayi Ny "N" umur 15 hari

PLANNING (P)

Tanggal 24 Agustus 2021, pukul 15.55 wita

1. Mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sabun, air mengalir lalu keringkan dengan handuk sebelum dan sesudah menyentuh bayi
Hasil : cuci tangan telah dilakukan
2. Mengobservasi tanda-tanda vital
Hasil :
 - a. Frekuensi jantung : 151x/menit
 - b. Pernapasan : 44x/menit
 - c. Suhu 36,9°C
3. Memantau berat badan bayi
Hasil : 3100 gram
4. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan bayinya
Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya
5. Menganjurkan ibu makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup agar kelancaran ASInya tetap terjaga
Hasil : ibu siap melakukannya
6. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya
Hasil : ibu telah melakukannya
7. Memberitahu ibu untuk selalu mencuci tangannya sebelum dan sesudah menyentuh dengan bayinya
Hasil : ibu mengerti dan akan melakukannya

8. Memberitahu ibu kondisi bayinya dalam keadaan baik

Hasil : ibu merasa senang

9. Melakukan pendokumentasia

Hasil : telah dilakukan



Kunjungan hari ke-15 bayi Ny”N”tanggal 24 Agustus 2021

Di Rumah Pasien JL.Ratulangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU
LAHIR PADA BAYI NY "N" DI RUMAH PASIEN**

JL.RATULANGI PADA TANGGAL

6 SEPTEMBER 2021

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan bayinya dalam kondisi baik
2. Ibu mengatakan sangat senang dengan keadaan bayi yang semakin hari semakin aktif
3. Ibu mengatakan ASInya sangat lancar
4. Ibu mengatakan bayinya kuat menyusui secara bergantian di payudara kiri/kanan.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi sangat baik
2. Tali pusat sudah puput
3. Bayi terlihat aktif bergerak
4. Tanda-tanda vital
 - a. Frekuensi jantung : 150x/menit
 - b. Pernapasan : 46x/menit
 - c. Suhu : 36,9°C

ASSESSMENT (A)

Bayi Ny "N" umur 28 hari

PLANNING (P)

Tanggal 6 September 2021, pukul 08.30 wita

1. Mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sabun, air mengalir dan keringkan dengan handuk sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Hasil : cuci tangan telah dilakukan

2. Mengobservasi keadaan umum bayi

Hasil :

- a. Keadaan umum bayi baik
- b. Tanda-tanda vital
 - 1) Frekuensi jantung : 150x/menit
 - 2) Pernapasan : 46x/menit
 - 3) Suhu : 36,9°C

3. Memantau berat badan bayi

Hasil : BBS 3600 gram

4. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan bayinya

Hasil : ibu bersedia

5. Menganjurkan ibu untuk memberi ASI secara teratur kepada bayinya

Hasil : ibu mengerti

6. Memberitahu ibu bayinya dalam keadaan baik

Hasil : ibu merasa senang

7. Menganjurkan ibu untuk membawa bayinya ke pelayanan kesehatan pada usia genap 1 bulan untuk di imunisasi

Hasil : ibu bersedia membawa bayinya ke pelayanan kesehatan untuk imunisasi bayinya

8. Melakukan pendokumentasian

Hasil : telah dilakukan



Kunjungan hari ke-28 bayi Ny”N”tanggal 6 September 2021

Di Rumah Pasien JL.Ratulang

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membandingkan tentang kejadian antara teori dengan hasil studi kasus yang dilakukan di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2021 yang dilakukan ± 1 bulan, yaitu dimulai pada tanggal 10 Agustus sampai tanggal 6 september pada bayi Ny”N” dengan asfiksia sedang .

Pada studi kasus ini kunjungan dilakukan sebanyak 6 kali kunjungan yaitu, kunjungan di rumah sakit sebanyak 3 kali dan kunjungan di rumah pasien sebanyak 3 kali. Kunjungan dirumah sakit mulai bayi lahir pada tanggal 10 Agustus sampai tanggal 12 Agustus. kunjungan rumah pasien pertama pada tanggal 16 agustus, kunjungan rumah kedua pada tanggal 24 agustus dan kunjugan ketiga pada tanggal 6 september.

Pada kunjungan pertama, kedua dan ketiga di rumah sakit labuang baji di lakukan di ruangan perinatologi yang dilakukan dengan bantuan bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya dengan menggunakan peralatan yang di rumah sakit, kemudian pada kunjungan di rumah pasien dilakukan sendiri dan menggunakan alat saya sendiri.

Pada bab ini penulis akan membahas berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan 7 langkah Varney yaitu: pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosa atau masalah aktual, merumuskan diagnosa atau masalah potensial, melakukan tindakan segera/emergensi dan kolaborasi, merencanakan tindakan

asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

Langkah I: Pengumpulan Data Dasar

Di dalam langkah ini, semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien dikumpulkan/disatukan. Pendekatan yang dipakai dalam mengumpulkan data harus komprehensif meliputi data subjektif, objektif dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi pasien yang sebenarnya.

Pada tahap ini pengumpulan data dasar merupakan langkah awal yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi yang akurat dari semua informasi yang dianggap bisa dijadikan sumber informasi pada kasus Ny "N". Pengumpulan data ini didapatkan melalui orang tua, keluarga, dokter, bidan atau perawat yang ada di ruangan dan dapat memberikan informasi secara terbuka sehingga dapat membantu dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Sesuai dengan kasus dengan permasalahan yang diangkat dari studi kasus Ny "N" dengan asfiksia sedang selama bayi dirawat di Rumah sakit Labuang Baji Makassar sampai dilakukan kunjungan rumah.

Tahap mengumpulkan data dasar yang dilakukan pada Ny "N" tidak ditemukan hambatan baik pada kedua orang tua, keluarga, dokter, bidan atau petugas kesehatan lainnya, yang ada di ruangan dapat memberikan informasi secara terbuka sehingga penulis dengan mudah memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan kasus yang diangkat.

Dari hasil pengkajian didapatkan ibu mengatakan hari pertama haid terakhir pada tanggal 16 November 2020, tafsiran persalinan pada tanggal 23 Agustus 2021, ibu mengatakan ini adalah anak pertama dan tidak pernah keguguran, ibu mengatakan selama hamil ia memeriksa kehamilannya sebanyak 6 kali yaitu 2 kali pada trimester pertama, 2 kali di trimester kedua dan 2 kali di trimester ketiga, ibu mendapatkan 2 kali sunti TT selama hamil, selama hamil ibu tidak pernah mengalami nyeri perut hebat, ibu tidak pernah menderita penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, asma, infeksi menular seksual (IMS), turunan dan juga penyakit lainnya.

Berdasarkan teori, kunjungan pemeriksaan ibu hamil dilakukan minimal 4 kali selama masa hamil. Trimester pertama sebanyak 1 kali pemeriksaan yaitu pada umur kehamilan 1-14 minggu atau 3 bulan. Trimester kedua sebanyak 1 kali pemeriksaan yaitu umur kehamilan 14-28 minggu atau 4-6 bulan dan pada trimester ke tiga sebanyak 2 kali yaitu umur kehamilan 28-38 minggu atau 7-9 bulan (Kemenkes RI, 2019).

Bayi lahir spontan, dengan presentase belakang kepala pada tanggal 10 Agustus 2021, berdasarkan dari HPHT sampai tanggal lahirnya bayi maka didapatkan usia kehamilan ibu pada saat bersalin adalah 38 minggu 1 hari. Bayi lahir pada pukul 10.00 wita dengan jenis kelamin perempuan, berat badan lahir 2700 gram, panjang badan 47 cm, APGAR score 5/8. Pada pengkajian didapatkan pada bayi Ny "N" menit pertama didapatkan badan kemerahan, ekstremitas biru, denyut jantung 90x/menit, meringis, pernapasan tidak teratur dan sedikit gerakan. Kemudian pada menit ke-5 ditemukan denyut jantung sudah dalam batas normal,

bayi sedikit menangis, badan kemerahan ekstremitas biru dan bayi sedikit ada gerakannya.

Adapun tanda dan gejala yang didapatkan pada kasus bayi Ny “N” yang mengalami asfiksia sedang adalah badan bayi kemerahan ekstremitas biru, bayi tampak meringis, menunjukkan sedikit gerakan, frekuensi jantung 90x/menit dan pernapasan bayi tidak teratur. Tanda dan gejala yang ditemukan pada kasus bayi Ny “N” menunjukkan bayi mengalami asfiksia sedang sesuai dengan teori yang menyatakan tanda dan gejala asfiksia sedang yaitu tidak bernafas atau nafas megap-megap, tangisan lemah atau merintih, warna kulit pucat atau biru, tonus otot lemah, serta denyut jantung lambat (kurang dari 100x/menit) (Jenny.J.S.Sondakh,2016:177).

Selama kehamilan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah sehingga pasokan oksigen ke bayi berkurang. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir adalah faktor ibu diantaranya preeklamsia dan eklamsia, perdarahan abnormal, partus lama macet, demam selama persalinan, infeksi berat, kehamilan postmatur sesudah 42 minggu dan juga ketuban pecah dini (KPD) (Dwiendar Octa,dkk,2014:16). Faktor tali pusat yaitu lilitan tali pusat, simpul tali pusat, prolaps tali pusat dan tali pusat pendek. Faktor bayi yaitu bayi prematur (sebelum 37 minggu kehamilan), kelainan kongenital, persalinan dengan tindakan dan air ketuban bercampur mekonium.

Pada kasus bayi Ny “N” yang mengalami asfiksia sedang disebabkan oleh faktor ibu yaitu partus lama pada kala II. Menurut teori kala II lama lebih dari 2 jam untuk primigravida atau 1 jam untuk multigravida. Dampak kala 2 lama pada janin seperti gawat janin yang menyebabkan angka kejadian asfiksia dan dapat berakhir pada kematian neonatal (Destariyani:2016).

Pada saat kala II lama pembukaan serviks telah lengkap dan berakhir dengan keluarnya janin. Adapun durasinya adalah 50 menit untuk primigravida dan 20 menit untuk multigravida. Kala II lama pada primigravida dibatasi 2 jam dan diperpanjang sampai 3 jam apabila digunakan analgesia regional. Dampak persalinan lama pada ibu dan janin yaitu dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi salah satu atau keduanya sekaligus.

Asfiksia neonatorum adalah keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Keadaan ini biasanya disertai dengan keadaan hipoksia dan hiperkapnia serta sering berakhir dengan asidosis, asfiksia akan bertambah buruk apabila penanganan bayi tak dilakukan secara sempurna, sehingga tindakan perawatan dilaksanakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengatasi gejala lanjut yang mungkin timbul, asfiksia dapat terjadi selama kehamilan atau persalinan (Nurarif & Hardhi, 2016). Asfiksia neonatorum menurut IDAI (ikatan dokter anak indonesia) adalah kegagalan napas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir ditandai dengan hiperkapnia, hipoksia, dan asidosis (Nasrawati, 2016).

Pada kasus bayi Ny "N" data yang diperoleh menunjukkan adanya persamaan gejala yang terdapat dalam tinjauan pustaka dengan kasus sehingga tidak menemukan adanya kesenjangan.

Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Data dasar sudah dikumpulkan, kemudian di interpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis atau masalah yang spesifik.

Pada langkah ini telah dilakukan interpretasi yang tepat dan benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan pasien sesuai dengan data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan selanjutnya akan di interpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik.

Dalam teori masa gestasi sangat penting untuk menentukan apakah kehamilan cukup bulan atau kelebihan bulan. Masa gestasi dibagi menjadi bayi kurang bulan yaitu kurang dari 37 minggu, bayi cukup bulan 37-42 minggu, bayi kelebihan bulan lebih dari 42 minggu. Untuk mengetahui bayi cukup bulan dapat dilihat dari pengkajian HPHT dihitung sampai bayi lahir. kemudian bayi dikatakan sesuai masa kehamilan (SMK) apabila berat badan lahir dengan usia kehamilan yang sesuai.

Pada kasus ini bayi lahir secara normal dengan gestasi 38 minggu 1 hari yaitu BCB, SMK, PBK, SPT dengan asfiksia sedang.

Bayi cukup bulan (BCB) adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37-42 minggu maka ini sesuai dengan data yang ada yaitu apabila dihitung dari hasil

HPHT tanggal 16 November 2021 sampai dengan bayi Ny “N” lahir pada tanggal 10 Agustus 2021 maka didapatkan masa gestasi adalah 38 minggu 1 hari yang menandakan bayi termasuk dalam kategori bayi cukup bulan (BCB). Bayi Ny “N” dilahirkan dengan gestasi 38 minggu 1 hari, berat badan 2700 gram. Berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterine berat badan bayi Ny “N” sesuai dengan masa kehamilan (SMK)

Dari hasil pengkajian didapatkan data bayi lahir tidak segerah menangis, frekuensi jantung 90x/menit, badan kemerahan ekstremitas biru, tonus otot lemah, sedikit gerakan, hal ini sesuai dengan tinjauan pustaka yang membahas tanda dan gejala yang muncul pada asfiksia dengan APGAR score 5/8. Dari hasil pengkajian ditemukan data bayi mengalami asfiksia dalam tinjauan pustaka ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya asfiksia antaranya yaitu faktor ibu, faktor tali pusat, faktor persalinan serta faktor bayi.

Berdasarkan hasil pengkajian data yang diperoleh dari data pertama maka diagnosa/masalah aktual pada bayi Ny “N” yaitu bayi dengan asfiksia sedang yang ditandai dengan APGAR score 5/8. Pada pengkajian yang didapatkan pada menit pertama didapatkan badan kemerahan, ekstremitas biru, meringis, tonus otot lemah, frekuensi jantung 90x/menit, gerakan sedikit dan pernapasan tidak teratur. Kemudian pada menit ke-5 ditemukan denyut jantung sudah dalam batas normal, seluruh tubuh kemerahan, masih sedikit gerakan dan bayi sudah mulai menangis. pada kasus bayi Ny “N” tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan kasus.

Langkah III: Mengidentifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Langkah ini merupakan langkah ketika bidan ataupun dokter melakukan identifikasi diagnosa atau masalah potensial serta mengantisipasi penanganannya. Pada langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, bidan harus waspada dalam menghadapi diagnosa potensial yang benar-benar akan terjadi, karna langkah ini penting sekali dalam melakukan asuhan yang aman.

Berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan pada kasus bayi Ny "N" masalah potensial yang dapat terjadi pada asfiksia sedang yaitu dapat menimbulkan asfiksia berat, kejang, kerusakan otak bahkan terjadinya kematian neonatus. Jadi asuhan yang diberikan sesuai kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya komplikasi pada bayi.

Pada awalnya frekuensi jantung dan tekanan darah meningkat dan bayi melakukan usaha napas megap-megap, bayi kemudian masuk ke dalam apnea primer bayi kemudian menerima stimulasi yang adekuat selama apnea. Selama apnea oksigen yang tersedia menyebabkan pembuluh darah diparu-paru mengalami konstriksi. Efek hipoksia terhadap otak sangat terlihat, pada hipoksia awal aliran darah ke otak meningkat, sebagai bagian mekanisme kompensasi. Kondisi tersebut hanya dapat memberikan penyesuaian sebagian, jika hipoksia berlanjut maka tidak akan terjadi penyesuaian pada sel-sel otak. Proses ini dapat mengakibatkan kerusakan neorologis yang mencolok atau samar-samar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan pada kasus bayi Ny “N” antara tinjauan pustaka dengan studi kasus.

Langkah IV: Melakukan Tindakan Segerah/Kolaborasi

Pada langkah ini bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien.

Pada kasus ini bidan, perawat segera melakukan tindakan atau konsultasi serta menangani bersama tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi yang dialami pasien. Manajemen asuhan kebidanan bukan hanya selama asuhan primer atau kunjungan neonatal saja, melainkan juga selama misalnya ketika wanita tersebut dalam proses persalinan. Data perlu dikumpulkan dan dievaluasi, beberapa data dapat mengidentifikasi situasi yang gawat, yakni bidan harus bertindak segera mungkin untuk keselamatan jiwa ibu dan bayinya.

Pada kasus ini tindakan segera yang akan dilakukan bidan bersama tim adalah menjaga kehangatan bayi agar tetap hangat, mengatur posisi bayi, menghisap lendir dengan deele, keringkan dan lakukan rangsangan taktil, reposisi dan kemudian melakukan penilaian apakah bayi sudah bernapas spontan atau teratur serta menangis atau tidak.

Asfiksia membutuhkan tindakan segera, pada kasus bayi Ny “N” yang ditandai dengan badan kemerahan ekstremitas biru, gerakan sedikit, meringis, denyut jantung 90x/menit dan juga pernapasan tidak teratur. Sehingga tindakan yang dilakukan adalah menyiapkan tempat yang kering dan hangat untuk

melakukan tindakan pertolongan, memposisikan bayi dengan kepala sedikit ekstensi bahu dialas dengan kain, lakukan pembersihan jalan napas menggunakan deeli, keringkan tubuh bayi menggunakan kain yang bersih dan kering untuk melakukan rangsangan taktil, letakan kembali bayi dengan posisi yang aman, kemudian berikan oksigen 1 liter/menit menggunakan nasa kanul.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur resusitasi yang dilakukan sesuai dengan yang dijelaskan dalam tinjauan pustaka serta tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus.

Langkah V: Intervensi

Langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh berdasarkan langkah sebelumnya. Semua perencanaan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan yang tepat, meliputi teori, perawatan berdasarkan bukti. Untuk menghindari perencanaan asuhan yang tidak terarah dibuat terlebih dahulu pola pikir menentukan rencana tindakan sesuai dengan masalah dan tujuan yang akan dicapai.

Tujuan asuhan kebidanan pada bayi Ny "N" yang meliputi kunjungan rumah sakit dan kunjungan rumah. Kunjungan di RSUD Labuang Baji Makassar yaitu 3 kali kunjungan dimulai tanggal 10-12 Agustus dan kunjungan dilakukan di rumah pasien Jl.Ratulangi sebanyak 3 kali kunjungan mulai tanggal 16 Agustus sampai tanggal 6 September 2021.

Pada saat berada di RSUD Labuang Baji Makassar adalah meliputi rencana asuhan yang diberikan diantaranya yaitu: sebelum melakukan tindakan

mengupayakan untuk mencuci tangan dengan teknik 6 langkah dengan sabun, air mengalir serta keringkan dengan handuk yang bersih sebelum dan sesudah menyentuh bayi, pencegahan kehilangan panas menyiapkan tempat yang hangat untuk melakukan pertolongan terhadap bayi, posisi bayi dengan kepala sedikit ekstensi yang dimana bahu dialas menggunakan kain, membersihkan jalan napas dengan deele, membedong bayi menggunakan kain bersih, kering dan hangat, lakukan rangsangan taktil dengan menepuk punggung dan kaki bayi. Lalu meletakkan bayi dengan posisi yang benar, melakukan perawatan tali pusat, menyuntik pahan kiri bayi secara intra muscular dengan vitamin K, setelah 1 jam pemberian vitamin K lalu berikan suntikan HB0, memberikan salep mata, memberikan O2 1 liter/menit serta melakukan pemeriksaan fisik dan juga melakukan pemantauan keadaan bayi setiap 15 menit.

Setelah melakukan tindakan awal pada kasus bayi baru lahir dengan asfiksia selanjutnya melakukan penilaian terhadap usaha bayi dalam melakukan pernapasan, apabila bayi bernapas dengan normal maka lakukan tindakan pasca resusitasi yaitu melakukan pemantauan tanda bahaya bayi baru lahir, melakukan perawatan tali pusat, melakukan IMD, melakukan pencegahan hipotermi pada bayi baru lahir. Jika bayi tidak bernapas atau usaha napasnya megap-megap maka lakukan tindakan ventilasi.

Menurut teori, adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penanganan asfiksia adalah sebelum melakukan tindakan memberitahu ibu/keluarga bahwa bayi memerlukan bantuan untuk memulai napas, minta keluarga untuk mendampingi. Langkah awal dilakukan selama 30 detik, yaitu

menjaga kehangatan bayi, mengatur posisi bayi, isap lendir menggunakan deele, penghisapan lendir mulai dari mulut dilanjut dengan hidung, masukan ujung deele lebih kurang 5 cm kedalam. Kemudian keringkan dan rangsangan taktil dengan mengeringkan bayi dari muka, kepala serta bagian tubuh lainnya cara ini dapat merangsang bayi bernapas dengan baik. Lakukan rangsangan taktil dengan menepuk telapak kaki, menggosok punggung, perut dada atau tungkai bayi dengan telapak tangan (Indrayani, 2013).

Dengan demikian pada langkah ini, penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dengan studi kasus yang didapatkan. Dimana rencana asuhan yang diberikan pada bayi Ny "N" berdasarkan teori memiliki kesamaan dengan kasus yang didapatkan.

Langkah VI: Implementasi

Langkah ini rencana asuhan yang menyeluruh seperti yang diuraikan pada langkah lima di atas dilaksanakan secara efisien dan aman. Manajemen yang efisien akan meningkatkan mutu asuhan.

Pada langkah ini penulis melakukan tindakan asuhan kebidanan yang dimulai dari rumah sakit sampai di rumah pasien dalam waktu 28 hari. Saat pelaksanaan asuhan kebidanan pada bayi Ny "N" tindakan yang telah direncanakan telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan suatu tindakan asuhan kebidanan tidak ditemukan kesulitan atau sesuatu hal yang menjadikan hambatan.

Pada saat melakukan tindakan asuhan kebidanan senantiasa untuk berdoa kepada Allah SWT supaya diberikan kemudahan dalam melakukan tindakan

asuhan kebidanan. Bayi Ny “N” dirawat selama 3 hari di rumah sakit khususnya diruangan perinatologi yang dimulai pada tanggal 10-12 Agustus 2021. Pada hari pertama bayi mengalami asfiksia yang ditandai dengan pernapasan tidak teratur, bayi tidak segerah menangis, frekuensi jantung 90x/menit, merintih, sedikit gerakan, badan kemerhan ekstremitas biru.

Di hari I dilakukan tindakan kolaborasi dengan bidan, perawat, dokter maupun tenaga kesehatan yang di rumah sakit labuang baji makassar. Adapun tindakan dilakukan yaitu : memposisikan bayi dengan kepala sedikit ekstensi dan bahu dialas menggunakan kain, mencegah kehilangan panas dan menyiapkan tempat yang hangat untuk melakukan pertolongan. Melakukan penilaian napas dan warna kulit, melakukan rangsangan taktil, mengobservasi pemberian oksigen 1litr/menit, pemberian vitamin K dan imunisasi HBO serta melakukan observasi setiap 15 menit.

Di hari-II tanggal 11 Agustus 2021, pukul 09.10 wita keadaan bayi sudah mulai membaik, sudah bisa menangis, pernapasan 42x/menit, frekuensi jantung 130x/menit, suhu 36,7°C, berat badan 2700 gram, menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan bayinya dengan menggantikan pakaian bayi jika basah atau lembab, menjaga kehangatan bayinya, menganjurkan ibu untuk memberikan ASI secara teratur pada bayinya serta mengajarkan ibu tehnik menyusui yang baik dan benar.

Pada tanggal 12 Agustus 2021, pukul 09.15 wita hari terakhir di rumah sakit Labuang Baji Makassar, dilakukan pemeriksaan frekuensi jantung

131x/menit, pernapasan 49x/menit, suhu 36,7°C, menganjurkan ibu untuk cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir serta mengeringkan dengan handuk sebelum dan setelah menyentuh bayinya, melakukan perawatan tali pusat, menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kehangatan bayinya, memberitahu ibu tanda-tanda bahaya bayi baru lahir dan menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya secara teratur.

Pada tanggal 16 Agustus 2021, pukul 09.30 wita asuhan dilanjutkan dirumah pasien Jl.Ratulangi. bayi dalam keadaan baik frekuensi jantung 150x/menit, pernapasan 44x/menit, suhu 36,9°C, berat badan bayi 2900 gram. Asuhan yang saya berikan yaitu menganjurkan ibu memberikan ASI eksklusif pada bayi mulai umur 0-6 bulan tanpa makanan tambahan lainnya, menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan bayinya terutama bila pakaian bayinya basah/lembab untuk segera menggantikannya serta menganjurkan ibu untuk selalu berdoa supaya bayinya dilindungi oleh Allah SWT.

Kunjungan rumah ke II pada tanggal 24 Agustus 2021,pukul 15.55 wita bayi sudah sangat membaik, frekuensi jantung 151x/menit, pernapasan 44x/menit, suhu 36,9°C, berat badan bayi 3100 gram. Asuhan yang diberikan yaitu menganjurkan ibu untuk mencuci tangan sebelum dan setelah menyentuh bayi,menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan bayinya, menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi agar kelancaran ASInya tetap terjaga serta menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya.

Kunjungan rumah ke III pada tanggal 6 September 2021, pukul 08.30 wita tepatnya bayi berumur 28 hari. Pemeriksaan frekuensi jantung 150x/menit, pernapasan 46x/menit, suhu 36,9°C, berat badan 3600 gram. Asuhan yang saya berikan yaitu menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan bayinya, menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif secara teratur selama 6 bulan tanpa makanan tambahan lainnya dan menganjurkan ibu membawa bayinya ke pelayanan kesehatan untuk di imunisasi.

Dalam hal ini tidak menemukan permasalahan, hal ini dikarenakan tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga pada kasus bayi Ny "N" tidak ditemukan adanya kesenjangan.

Langkah VII: Evaluasi

Langkah ini merupakan tahapan yang terakhir dalam manajemen asuhan kebidanan yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana asuhan yang diberikan itu berhasil. Pada langkah ini dilakukan secara efektif dari asuhan yang diberikan meliputi pemenuhan nutrisi bayi sesuai atau tidak sebagaimana telah diidentifikasi dalam diagnosa. Evaluasi dilakukan selama 3 hari di rumah sakit mulai tanggal 10-12 Agustus 2021 dan dilakukan juga evaluasi dirumah pasien sebanyak 3 kali kunjungan mulai tanggal 16 Agustus sampai tanggal 6 september 2021 pada bayi Ny "N" dengan asfiksia.

Pada kasus asfiksia sedang yang dialami bayi Ny "N" asuhan kebidanan yang dilakukan selama bayi berada di rumah sakit dan juga saat bayi berada di rumahnya. Keadaan bayi sudah membaik yaitu: ditandai dengan keadaan umum

bayi baik, kesadaran composmentis, bayi sudah menangis kuat, refleks pada bayi sudah membaik, tanda-tanda vital dalam keadaan normal meliputi frekuensi jantung, pernapasan, dan suhu dalam batas normal. Pada evaluasi ini tidak ditemukan tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa proses manajemen asuhan kebidanan yang dilakukan pada bayi Ny “N” dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar sudah berhasil dan sudah membaik. Dari hasil evaluasi melalui tinjauan teoritis dengan asuhan kebidanan yang dilakukan pada bayi Ny “N” tidak ditemukan adanya kesenjangan teori dengan studi kasus.

BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori dan pengalaman langsung dilahan melalui studi kasus mengenai asuhan kebidanan bayi baru lahir pada bayi Ny “N” dengan asfiksia sedang Di RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 10 Agustus- 6 september 2021 maka penulis akan menarik kesimpulan dan saran berikut ini:

A. KESIMPULAN

1. Telah dilakukan pengumpulan data dasar pada bayi Ny “N” dengan asfiksia Di RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 10 agustus-6 september 2021. Pengumpulan data dasar ini dilakukan dengan mengumpulkan data subjektif dan data objektif yang diambil dari wawancara ibu mengatakan bayinya tidak segerah menangis pada saat lahir. Selanjutnya data objektif bayi Ny “N” yaitu keadaan umum bayi tidak baik, bayi belum bisa bernapas dengan spontan dan teratur, denyut jantung 90x/menit, badan bayi kemerahan ekstremitas biru, sedikit gerakan dan meringis.
2. Telah dilakukan perumusan diagnosa masalah aktual pada bayi Ny “N” di RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 10 agustus-6 september 2021 dengan pengumpulan data secara teliti dan akurat sehingga di dapatkan diagnosa kebidanan pada bayi Ny “N” lahir dengan asfiksia yang disertai dengan kala II lama.

3. Telah melaksanakan perumusan diagnosa masalah potensial pada bayi Ny “N” dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 10 agustus-6 september 2021 hasil potensial terjadi kematian pada bayi sehingga perlunya tindakan penanganan yang cepat dan tepat.
4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera pada bayi Ny “N” dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 10 agustus-6 september 2021 yaitu dengan menghangatkan bayi, mengatur posisi bayi dengan kepala sedikit ekstensi, membersihkan jalan napas bayi menggunakan deele, mengeringkan tubuh bayi, melakukan rangsangan taktil untuk merangsang pernapasan bayi dan memasang O2.
5. Telah dilakukan rencana asuhan kebidanan bayi Ny “N” dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 10 agustus-6 september 2021 dengan hasil rencanan tindakan asuhan berdasarkan diagnosa aktual dan masalah potensial seperti bayi dikeringkan, kemudian dihangatkan denga radiant warmer, posisi kepala bayi sedikit ekstensi, hisap lendir dari mulut ke hidung bayi menggunakan deele, melakukan rangsangan taktil, setelah bayi bernapas spontan dan masih biru maka lakukan pemasangan O2 1 liter/menit lewat nasa kanul, serta memberikan dukungan psikologis dan spritual kepada ibu dan keluarga agar senantiasa berdoa kepada Allah SWT supaya selalu dilindungi.

6. Telah melaksanakan tindakan asuhan yang telah direncanakan pada bayi Ny “N” dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 10 agustus-6 september 2021 dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa ada hambatan.
7. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan pada bayi Ny “N” dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 10 agustus-6 september 2021 dengan hasil asuhan yang telah diberikan berhasil dengan ditandai bayi sudah mulai menangis, pernapasam sudah normal, sudah ada reaksi apabila dilakukan rangsangan pada bayi serta refleks baik.

B. SARAN

1. Bagi tenaga kesehatan
 - a. Tenaga kesehatan khususnya bidan sebaiknya selalu memperbaharui pengetahuannya serta menerapkan asuhan kebidanan terbaru untuk mengoptimalkan upaya penurunan AKI dan AKB
 - b. Tenaga kesehatan khususnya bidan agar senantiasa membina hubungan yang baik dengan keluarga sehingga tercapai tujuan yang di inginkan.
 - c. Bayi baru lahir yang mengalami asfiksia pada saat lahir sering kali mengalami kematian. Meskipun demikian sebagai tenaga kesehatan senantiasa dituntut untuk berusaha menyelamatkan bayi

dengan melakukan tindakan asuhan secara profesional serta serahkan semua kepada Allah swt yang maha kuasa atas segalanya.

2. Bagi RSUD Labuang Baji Makassar

- a. Pihak dari rumah sakit untuk selalu memeriksa kelengkapan alat agar selalu dalam keadaan siap pakai
- b. Selalu menjaga protokol kesehatan dengan jaga jarak, pakai masker dan sebagainya
- c. Penerapan APN terbaru dalam pemberian pelayanan.

3. Bagi institusi

- a. Membekali mahasiswa dengan keterampilan yang cukup sebelum turun ke lapangan khususnya dalam hal resusitasi, karena keterampilan ini merupakan bantuan dasar kehidupan yang wajib dimiliki setiap tenaga kesehatan.
- b. Dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan yang berhubungan dengan perkembangan ilmu kebidanan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga dapat menambah dan memperluas wawasan mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

4. Bagi pemerintah

- a. Menyediakan fasilitas penentu kebijakan dalam pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- b. Sering mengadakan pelatihan demi meningkatkan wawasan pengetahuan dan kemampuan para tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyana & Sari. “Hubungan Lilitan Tali Pusat, Partus Lama Dan Plasenta Previa Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum, 4 no.3 (2019).
- Arief & Weni. *Neonatus Dan Asuhan Keperawatan Anak*: Yogyakarta: Penerbit Nuha Medika, 2016.
- Armini Ni, dkk. *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, & Anak Prasekolah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017..
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Tahun 2018.
- Dwiendar Octa, dkk. *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi/Balita Dan Anak Prasekolah Untuk Para Bidan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2014.
- Damayanti Ika Putri, dkk. *Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ibu Bersalin Dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta: 2015.
- Hayati, Lia. *Asuhan Neonatus, Bayi, & Balita*. Cet.Pertama. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran ECG, 2011
- Irwan Hadriani, dkk. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2019” *Jurnal Kesehatan Delima Pelamonia* 3, no.1 (2019).
- Kementrian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: 2019.

Kementerian Kesehatan RI 2018.

Maternity Dainty,dkk. *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, & Anak Prasekolah*. Yogyakarta.Penerbit Andi, 2018.

Mutmainnah Annisa, dkk. *Asuhan Persalinan Normal & Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta. Penerbit Andi.2017

Maryunani Anik & Eka Puspita. *Asuhan Kegawatdaruratan Maternal & Neonatus*. Yogyakarta.2016.

Pemerintah Kesehatan RI 2016.

Provil Kesehatan Kota Makassar Tahun 2019. Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Tahun 2019.

Rahmawati Lisa, Ningsih Mahdalena Prihatin. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir Di Ruang Medical Record RSUD Pariaman” 30 Bidan Proda Jurnal Ilmiah, Kebidanan, vol.7 no.1 (2016).

Rekam Medik RSUD Labuang Baji Makassar. Kasus Asfiksia, 2021.

Rukiyah Ai Yeyeh & Yulianti Lia. *Asuhan Neonatus , Bayi dan Anak Balita* . CV. Trans Info Medika: Jakarta Timur, 2010.

Sembiring Julina. *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah*. Cet. Pertama: Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.

Saleha Sitti. *Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Dan Balita*, 2012

Shihab Quraish. *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran* volume 9. Lentera hati: Jakarta, 2009.

Shihab Quraish. *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran* volume 14. Lentera hati: Jakarta, 2009.

Setiawati Dewi. *Kehamilan Dan Pemeriksaan Kehamilan*, 2013.

Sondakh J.S Jenny. *Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Penerbit Erlangga.2016.

Williamson Amanda. *Buku Ajar Asuhan Neonatus*. Penerbit Buku Kedokteran ECG: Jakarta, 2013.

Zahara Editan, dkk. *Hubungan Lama Persalinan Kala II Primigravida Dengan Apgar Skor Bayi Menit Pertama Di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang*, 2014.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Titi Tri Wulandari
Nim : 70400118039
Tempat Tanggal Lahir : Doridungga, 13 November 2000
Suku : Bima
Agama : Islam
Alamat : Doridungga, Kec.Donggo Kab.Bima
Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat)

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Awahab
b. Ibu : Marifah

B. Riwayat Pendidikan

SDN Doridungga : 2006-2012
MTS Al-Ikhlas Donggo : 2012-2015
SMA N 1 Donggo : 2015-2018
UIN Alauddin Makassar : 2018-2021