

**FAKTOR-FAKTOR RISIKO KEJADIAN HIPERTENSI DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS SAPAYA KABUPATEN GOWA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
NURHAYATI
NIM 70300115013
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**JURUSAN KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur senantiasa kita hanturkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga peneliti dapat memiliki kekuatan. Kesabaran hati serta semangat sehingga saya dapat menyelesaikan Penelitian dengan judul “*Faktor-Fakto Risiko Kejadian Hiperensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Sapaya Kabupaten Gowa.*” Shawalat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, sebagai *sang rahmatan lil alamin* yang merupakan suri tauladan manusia dalam menyemournakan akhlak serta mendalami pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua Oranng Tua tercinta dan terkasih. Sumber inspirasi dan semangat. Ayahanda Lukman dan Ibunda Haslinda terimakasih atas kasih sayang, bimbingan, dukungan, motivasi serta do'a restu yang terus senantiasa mengiringi perjalanan hidup penulis hingga hari ini.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, serta rasa hormat dan penghargaan yang tak terhigga, kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof.Drs.Hamdan Juhannis,M.A.,
Ph.D beserta seluruh jajarannya

2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr.dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes, para wakil dekan dan seluruh civitas akademik yang memberikan bantuan yang begitu berarti kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
3. Bapak Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Ketua Jurusan Keperawatan dan Ibu Hasnah, S.SIT., S.Kep.,Ns.,M.Kes sebagai Sekretaris Jurusan Keperawatan dan dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Jurusan Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Pembimbing I dan Hj. Sysnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp., Kep.J selaku Pembimbing II yang dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun Skripsi ini.
5. Ibu Hasnah, S.SIT., S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku penguji bidang kompetensi keilmuan dan Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M. Pd selaku penguji integrasi keislaman, yang bersedia meluangkan waktu dan telah memberikan masukan kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini.

6. Saudara-saudaraku angkatan KRANIAL15 di UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dengan semangat dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penulis sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, besar harapan penulis pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Akhirnya kepada Allah swt jugalah penulis memohon doa dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan kepada penulis dapat bermanfaat bagi orang lain serta menjadi salah satu bentuk pengabdian di masyarakat nantinya, Aamiin.

Gowa, September, 2020



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR BAGAN vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Hipotesis 5

D. Definisi Operasional 5

E. Kajian Pustaka 6

F. Tujuan Penelitian 11

G. Manfaat penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hipertensi 13

1. Definisi Hipertensi 13

2. Etiologi Hipertensi..... 17

3. Patofisiologi..... 19

4. Gejala Klinis..... 21

5. Faktor Resiko Hipertensi..... 21

6. Komplikasi 33

7. Penatalaksanaan.....	35
8. Pengendalian.....	35
9. Teraapi Farmokologi	40
B. Kerangka Teori	43
C. Kerangka Konsep	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel	42
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Instrumen Penelitian	44
F. Pengolahan dan Analisa Data	44
G. Etika Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Hasil Penelitian.....	50
1. Karakteristik Responden	50
2. Hasil Distribusi Frekuensi dengan Hipertensi.....	42
C. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Definisi Operasional	5
Tabel 1. 2 Kajian Pustaka	6
Tabel 2. 1 Klasifikasi Tekanan Darah	14
Tabel 2.2 klasifikasi hipertensi berdasarkan American Society of Hypertension and International Society of Hypertension.....	14
Tabel 2.3 Kategori IMT untuk Indonesia	23
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Hipertensi, Konsumsi Garam, Obesitas dan Aktifitas Fisik	51
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan umur.....	52
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Konsumsi Garam.....	53
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Obesitas.....	54
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan aktivitas Fisik.....	54

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Teori	35
Bagan 2. 2 Kerangka Konsep	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Menjadi Responden

Lampiran 2 Lembar Persetujuan Menjadi Responden

Lampiran 3 Kuesioner Penelitian

Lampiran 4 Permohonan Pengambilan Data Awal

Lampiran 5 Rekomendasi Etik

Lampiran 6 Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Lampiran 7 Surat Pengantar

Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 9 Master Tabel

Lampiran 10 Uji SPSS

Lampiran 11 Dokumentasi



ABSTRAK

Nama : Nurhayati

Nim : 70300115013

**Judul : Faktor-faktor Resiko Kejadian Hipertensi di Wilayah Kerja
Puskesmas Sapaya Kabupaten Gowa**

Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi di masyarakat. Banyak orang yang mengalaminya tapi tidak menyadarinya. Penyakit ini berjalan terus menerus seusia hidup dan sering tanpa adanya keluhan yang khas selama belum ada komplikasi pada organ tubuh. Penyakit ini timbul akibat dari berbagai macam factor resiko yang dialami seseorang. Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor resiko apa yang paling dominan di wilayah kerja puskesmas Sapaya Kabupaten Gowa

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *cross-sectional*. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Sapaya pada bulan Januari 2020. Teknik pengambilan sampel dengan metode *Purpsive Sampling*, dengan jumlah sampel ialah keseluruhan dari jumlah populasi yaitu 70 populasi

Hasil pengolahan data dengan menggunakan uji *Chi-Square* pada hubungan usia dengan kejadian hipertensi didapatkan nilai *p-value* 0.004 atau < 0.05 yang artinya ada hubungan antara usia dengan kejadian hipertensi, sedangkan hubungan antara konsumsi garam dengan kejadian hipertensi didapatkan nilai *p-value* 0.588 yang artinya tidak ada hubungan antara konsumsi garam dengan kejadian hipertensi, dan untuk hubungan antara kejadian obesitas dengan hipertensi didapatkan nilai *p-value* 0.174 atau tidak terdapat hubungan antara obesitas dengan kejadian hipertensi, kemudian untuk hubungan antara aktifitas fisik dengan kejadian hipertensi didapatkan nilai *p-value* 0.368 yang artinya tidak terdapat hubungan antara aktifitas fisik dengan kejadian hipertensi

Kesimpulan, faktor resiko kejadian hipertensi di wilayah Puskesmas Sapaya Gowa yang lebih dominan atau yang memiliki hubungan dengan kejadian hipertensi ialah faktor usia. Jadi dari hasil yang didapatkan diharapkan adanya fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan seseorang seiring dengan bertambahnya usia untuk mengurangi resiko kejadian hipertensi

Kata Kunci : Hipertensi, Faktor usia, Faktor konsumsi garam, Faktor obesitas, faktor aktifitas fisik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, baik disadari maupun tidak, manusia cenderung menganut gaya hidup modern. Gaya hidup yang seperti ini membuat manusia sangat menyukai hal-hal instan. Akibatnya, mereka cenderung malas beraktivitas fisik dan gemar mengonsumsi makanan instan, yang memiliki kandungan lemak dan natrium yang tinggi. Makanan berlemak biasanya memiliki kalori yang tinggi. Makanan berlemak berhubungan dengan peningkatan berat badan dan peningkatan kadar lemak darah yang dapat memperburuk keadaan penderita hipertensi dan kelebihan asupan natrium dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan cairan dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan edema, asites, dan hipertensi (Medika, 2017).

Hipertensi sering dijumpai pada orang dewasa dan merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi di masyarakat. Banyak orang yang menderita penyakit tersebut, tetapi tidak menyadarinya. Penyakit ini berjalan terus menerus seusia hidup dan sering tanpa adanya keluhan yang khas selama belum ada komplikasi pada organ tubuh. Sehingga tidaklah mengherakan bila hipertensi dijuluki sebagai pembunuh diam-diam (*the silent killer*).

Menurut data *World Health Organization* (WHO) menunjukkan di seluruh dunia sekitar 972 juta orang atau 24,4% penduduk dunia mengidap penyakit hipertensi dengan perbandingan 26,6% pria dan 26,1% wanita. Angka ini kemungkinan meningkat menjadi 29,2% di tahun 2025. Dari 972

juta pengidap hipertensi, 333 berada di Negara maju dan 639 sisanya berada di Negara berkembang termasuk Indonesia. Data statistic terbaru menyatakan bahwa terdapat 24,7% penduduk Asia Tenggara dan 23,3% penduduk Indonesia berusia 18 tahun ke atas mengalami hipertensi pada tahun 2014 (WHO, 2015)

Hipertensi merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, dan hipertensi menjadi penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis, yaitu 6,7% kematian dari semua usia di Indonesia. Hipertensi diperkirakan menjadi penyebab kematian 7,1 juta orang di seluruh dunia yaitu sekitar 13 % dari total kematian dan prevalensinya hampir sama besar baik di negara berkembang maupun di negara maju. Di banyak negara saat ini, prevalensi hipertensi meningkat sejalan dengan perubahan gaya hidup, seperti merokok, obesitas, inaktivitas fisik, dan stres psikososial. Hipertensi sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat (public health problem) dan akan menjadi masalah yang lebih besar jika tidak ditanggulangi sejak dini (Kemenkes RI,2007). Hipertensi merupakan suatu kondisi peningkatan tekanan darah arterial abnormal yang berlangsung persisten. Seorang dewasa dikategorikan hipertensi apabila mempunyai tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg (JNC VII). Sekitar 1 milyar penduduk dunia diperkirakan menderita hipertensi.

Data riskesdas (2018), prevalensi penyakit tidak menular hipertensi pada usia ≥ 18 tahun di Indonesia yang didapat melalui jawaban pernah didiagnosis tenaga kesehatan sebesar 8,4%, sedangkan yang pernah

didiagnosis tenaga kesehatan atau sedang minum obat hipertensi sendiri sebesar 8,8%. Jadi, terdapat 0,1% penduduk yang minum obat sendiri, meskipun tidak pernah didiagnosis hipertensi oleh nakes. Prevalensi hipertensi di Indonesia berdasarkan hasil pengukuran pada usia ≥ 18 tahun sebesar 34,1%. Jadi cakupan nakes hanya 36,8%, sebagian besar (63,2%) kasus hipertensi di masyarakat tidak terdiagnosis (Kemenkes, 2018)

Di Indonesia terjadi peningkatan prevalensi hipertensi. Secara keseluruhan prevalensi hipertensi di Indonesia tahun 2013 sebesar 34,1% (Riskesdas, 2018). Data dari Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia (InaSH) menyebutkan, angka kematian di Indonesia mencapai 56 juta jiwa terhitung dari tahun 2000-2013. Diketahui bahwa faktor kematian paling tinggi adalah hipertensi, menyebabkan kematian pada sekitar 7 juta penduduk Indonesia (InaSH, 2014). Hal ini menunjukkan, 76% kasus hipertensi pada masyarakat belum terdiagnosis atau 76% masyarakat belum mengetahui bahwa mereka menderita hipertensi. Menurut data Profil Kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2016, prevalensi hipertensi di wilayah Sulawesi Selatan adalah 142,571 (13,68 %) tertinggi adalah Kabupaten gowa 27,514 (100,00) dan jeneponto 22,331 (10,17 %) serta pinrang 17,742 (0,00). (Dinkes Prov. Sulsel, 2016).

Hipertensi menimbulkan angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi karena hipertensi merupakan penyebab utama meningkatnya risiko penyakit stroke, jantung dan ginjal. Pada kebanyakan kasus, hipertensi terdeteksi saat pemeriksaan fisik karena alasan penyakit tertentu sehingga sering disebut

sebagai silent killer. Hipertensi merupakan penyakit yang mendapatkan perhatian dari semua kalangan masyarakat mengingat dampak yang ditimbulkan baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga membutuhkan penanggulangan jangka panjang yang menyeluruh dan terpadu.

Jumlah penderita hipertensi di Puskesmas Sapaya pada tahun 2018 sebanyak 1.079 orang yang terdiri dari 7 Desa. Pada bulan Januari 2019 terdapat 138 orang yang datang berobat, namun pada bulan Februari terjadi penurunan sebanyak 54 orang, lalu pada bulan Maret kembali meningkat menjadi 116 orang.

Hipertensi merupakan penyakit yang timbul akibat adanya interaksi berbagai faktor resiko yang dimiliki seseorang. Faktor pemicu hipertensi dibedakan menjadi yang tidak dapat dikontrol seperti riwayat keluarga, jenis kelamin, dan usia. Faktor yang dapat dikontrol seperti obesitas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor risiko kejadian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Sapaya Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Faktor-Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Di Wilayah Puskesmas Sapaya Kabupaten Gowa.”

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak ada faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian hipertensi.

2. Hipotesis alternative (Ha)

Ada faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian hipertensi.

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variable tersebut yang dapat diamati (Asward,2010)

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Variabel	Definisi Operasional	Kriteria Objektif	Skala Ukur
Usia	Lamanya waktu hidup subjek peneliti ketika pengambilan data	1=25-34 tahun 2=35-39 tahun 3=40-44 tahun 4=45-49 tahun 5=50-54 tahun 6=55-59 tahun 7= ≥60 tahun	Interval
Jenis kelamin	Perbedaan individu berdasarkan seks.	1= laki-laki 2=perempuan	Nominal
Riwayat keluarga	Riwayat keluarga genetik yang mempunyai hipertensi	1. Ada keluarga dengan riwayat hipertensi 2. Tidak ada keluarga dengan riwayat hipertensi	Ordinal

Obesitas	Kondisi berat badan yang menyebabkan Indeks Massa Tubuh (IMT) melebihi nilai normal, dimana IMT normal dewasa ialah 20-25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gemuk : jika $IMT > 27$ 2. Tidak gemuk : jika $IMT 18,5 - 24,9$ 3. Malnutrisi : jika $IMT < 17,0$ 	Nominal
Merokok	Riwayat reponden mengenai banyaknya rokok yang di hisap oleh responden yang diakumulasi dalam sehari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berat = ≥ 20 batang/hari 2. Sedang = (10-19 batang/hari) 3. Ringan = (< 10 batang/hari) 4. Tidak merokok 	Ordinal
Aktivitas fisik	Kegiatan rutin yang dilakukan responen yang terdiri dari : jenis kegiatan, durasi, dan frekuensi dalam satuan minggu.	<ol style="list-style-type: none"> 1= tidak ada aktivitas 2= aktivitas fisik rendah 3= aktivitas fisik sedang 4= aktivitas fisik berat I 	Ordinal
Konsumsi garam	Konsumsi atau kebiasaan makan makanan asin pada responden	<p>Sering (\geqkali perhari)</p> <p>Sedang (1-6 kali dalam seminggu)</p> <p>Jarang (≤ 3 kali dalam sebulan)</p>	

		Tidak pernah	
--	--	--------------	--

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi penulis. Disini penulis akan mengetengahkan beberapa hasil penelusuran dari beberapa penelitian maupun buku-buku pengobatan alternatif sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis (Sugiyanto, 2009).

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

Judul penelitian	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian
Analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi	Menganalisis faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi dengan menggunakan jenis penelitian analitik serta menggunakan teknik total sampling berjumlah 88 responden.	Teknik analisis data menggunakan uji statistic chisquare	Hasil dari uji chisquare penelitian ini variabel yang berhubungan dengan kejadian hipertensi adalah usia ($p=0,033$), jenis kelamin ($p=0,014$) dan obesitas ($p=0,001$). Sedangkan variabel yang tidak berhu	Penelitian ini ingin mengetahui faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap kejadian hipertensi sedangkan peneliti sebelumnya ingin menganalisis

			Bungan adalah riwayat keluarga ($p=0,568$), dan aktivitas fisik ($p=0,937$)	faktor yang berhubungan dengan hipertensi
Faktor risiko kejadian penyakit hipertensi pada dewasa muda di wilayah kerja puskesmas poasia tahun 2017	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko kejadian penyakit hipertensi pada dewasa muda di wilayah kerja puskesmas poasia tahun 2017	jenis penelitian yang di gunakan adalah analitik observasional menggunakan rancangan case control stady	Hasil penelitian pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan yang faktor risiko dengan kejadian penyakit hipertensi yakni paparan asap rokok di peroleh nilai $OR=2,453$ dengan LLower Limit= 1,053 dan Upperlimit=5,712 , sedanglan stress d peroleh nilai $OR=4,372$ dengan Lower Limit=1,813 dan Upperlimit= 10,540 dan untuk konsumsi garam rumah tangga di peroleh $OR=2,469$ dengan	Perbedaan penelitian ini terletak pada sampel di mana peneliti sebelumnya yang menggunakan sampel dewasa muda sedangkan penelityi selanjutnya menggunakan sampel dewasa sampai lansia.

			lower Limit=1,005, dan upperlimit=6,064.	
Faktor risiko kejadian hipertensi pada remaja di wilayah kerja puskesmas rawat inap sidomulyo kota pekanbaru	Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada remaja di wilayah kerja puskesmas rawat inap sidomulyo kota pekanbaru	Penelitian dengan desain case control study yang dilakukan pada 128 orang sampel, terdiri dari 64 kasus dan 64 kontrol.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara rawat keturunan (OR=7,68, 95%CI=3,5-16,82), obesitas (OR=12,32, 95%CI=5,27-28,75) dan aktivitas fisik (OR=7,86, 95%CI=3,33-18,58) dengan kejadian hipertensi sedangkan perilaku merokok dan asupan natrium tidak terdapat hubungan yang signifikan	Perbedaan penelitian ini terletak pada sampel di mana peneliti sebelumnya yang menggunakan sampel remaja sedangkan peneliti selanjutnya menggunakan sampel dewasa sampai lansia.
Faktor-faktor yang berhubungan	Penelitian ini bertujuan mengetahui	Penelitian ini adalah penelitian	Hasil penelitian menunjukkan tidak dapat	Perbedaan penelitian ini dengan

<p>dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia desa borimatangkas a dusun bontosunggu kecamatan bajeng barat.</p>	<p>Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia desa borimatangkas a dusun bontosunggu kecamatan bajeng barat.</p>	<p>deskriptif analitik dengan pendekatan cross secsional study untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya penyakit hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia desa borimatangkas a dusun bontosunggu kecamatan bajeng barat.</p>	<p>hubungan yang signifikan antara kebiasaan asupan garam ($p=,323$), kebiasaan konsumsi makanan berlemak ($p=0,515$), usia($p=0,101$), aktifitas fisik($p=0,567$), dengan kejadian hipetensi stadium 1 dan sadium 2 pada lansia.</p>	<p>peneliti sebelumnya terletak pada metodenya.</p>
<p>Analisis faktor risiko penyakit hipertensi dengan metode framigram risk skor for hipertensi di kampong bugis</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian</p>	<p>Metode yang di gunakan adalah studi korelasi pendekatan kuantitatif.</p>	<p>Hasil penelitian terdapat korelasi genetik ($r=0,021$), usia ($r=0,00$), merokok ($r=0,028$), diabetes mellitus ($r=0,011$), aktivitas fisik</p>	

	hipertensi.		($r=0,039$) dengan hipertensi.	
--	-------------	--	----------------------------------	--

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor resiko apa yang paling dominan di wilayah kerja puskesmas Sapaya Kabupaten Gowa.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis prevalensi faktor risiko kejadian hipertensi
- b. Menganalisis faktor risiko dominan pada hipertensi

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi

Tambahan referensi dan pengembangan penelitian di institusi pendidikan tentang faktor-faktor risiko kejadian hipertensi. Selain itu, sebagai bahan rujukan institusi atau instansi lainnya dalam kaitannya dengan kejadian hipertensi.

2. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengaplikasikan penelitian keperawatan, serta mengetahui secara ilmiah tentang faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya hipertensi sehingga kedepannya dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan asuhan keperawatan pada

klien yang mengalami hipertensi dapat dihindari dengan pola hidup sehat

3. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk menambah informasi bagi masyarakat tentang faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian hipertensi sehingga masyarakat mampu melakukan pencegahan hipertensi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi

1. Defenisi Hipertensi

Hipertensi merupakan istilah medis tekanan darah tinggi. Hipertensi merupakan suatu keadaan dimana seorang mengalami tekanan darah di atas normal yang mengakibatkan peningkatan angka morbiditas dan angka kematian (mortalitas) (A. J. Ramadhan, 2010).

Penyakit darah tinggi atau hipertensi (*hypertension*) merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang ditunjukkan oleh angka *systolic* (bagian atas) dan *diastolik* (angka bawah) pada pemeriksaan tensi darah menggunakan alat pengukur tekanan darah baik yang berupa alat *cuff* air raksa (*sphygmomanometer*) ataupun alat digital lainnya (Pudiastuti, 2013).

Organisasi kesehatan dunia (WHO), memberikan batasan tekanan darah normal adalah 140/90 mmHg dan tekanan darah sama atau di atas 160/95 mmHg dinyatakan sebagai hipertensi (Sofia Dewi & Digi Familia, 2010). Hipertensi merupakan penyakit degenerative yang banyak di derita bukan hanya oleh usia lanjut saja, bahkan saat ini sudah menyerang orang dewasa muda. Bahkan di ketahui bahwa 9 dari 10 orang yang menderita hipertensi tidak dapat diidentifikasi penyebab kematiannya. Itulah sebabnya hipertensi di juluki sebagai “Pembunuh Diam-Diam” (*silent killer*) (Zauhani, Zainal, 2012).

Hipertensi merupakan gejala peningkatan tekanan darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang di bawah oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Seseorang Di katakana tekanan darah tinggi jika tekanan sistolik mencapai 140 mmHg atau lebih. Atau tekanan diastolk mencapai 90 mmHg atau lebih atau keduanya (Khasanah, 2012). Semua hipertensi adalah tekanan darah tinggi, tetapi bukan semua tekanan darah tinggi adalah hipertensi. Tekanan darah tinggi mencakup semua tekanan darah di atas 120/80 mmHg, sedangkan hipertensi mencakup tekanan darah 140/90 mmHg dan di atasnya. Untuk orang yang menderita diabetes, tekanan darah tinggi adalah pada angka 130/80 mmHg. Lebih lanjut, hipertensi dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu prahipertensi, hipertensi tahap I, dan hipertensi thap II (Casey, Aggie dan Herbert Benson, 2012).

Organisasi kesehatan dunia (WHO), memberikan batasan tekanan darah normal adalah 140/90 mmHg dan tekanan darah sama atau di atas 160/95 mmHg dinyatakan sebagai hipertensi (Sofia Dewi & Digi Familia, 2010). Hipertensi merupakan penyakit degenerative yang banyak di derita bukan hanya oleh usia lanjut saja, bahkan saat ini sudah menyerang orang dewasa muda. Bahkan di ketahui bahwa 9 dari 10 orang yang menderita hipertensi tidak dapat diidentifikasi penyebab kematiannya. Itulah sebabnya hipertensi di juluki sebagai “Pembunuh Diam-Diam) (*silent killer*) (Zauhani, Zainal, 2012).

Penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, adalah salah satu jenis penyakit pembunuh paling dahsyat di dunia saat ini. Usia merupakan salah satu faktor resiko hipertensi. Lebih banyak dijumpai bahwa penderita penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi pada usia senja (Deni Damayanti, 2013) Nilai normal tekanan darah seseorang dengan ukuran tinggi badan, berat badan, tingkat aktivitas normal dan kesehatan secara umum adalah 120/80 mmHg. Dalam aktivitas sehari-hari, tekanan darah normalnya adalah dengan nilai angka kisaran stabil. Tetapi secara umum, angka pemeriksaan tekanan darah menurun saat tidur dan meningkat diwaktu beraktifitas atau olahraga (Pudiastuti, 2013).

Penyakit darah tinggi merupakan suatu gangguan pada pembuluh darah dan jantung yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang di bawah oleh darah terhambat sampai ke jaringan yang membutuhkannya (Pudiastuti, 2013). Tekanan darah tinggi berarti tekanan tinggi di dalam arteri-arteri. Arteri – arteri adalah pembuluh - pembuluh yang mengangkut darah dari jantung yang memompa keseluruhan jaringan dan organ-organ tubuh (Pudiastuti, 2013). Tekanan darah tinggi sering disebut sebagai pembunuh gelap/*silent killer* karena termasuk penyakit yang mematikan hipertensi dapat menyerang siapa saja baik muda maupun tua. Hipertensi merupakan salah satu penyakit paling mematikan di dunia (Pudiastuti, 2013). Hipertensi tidak secara langsung membunuh penderitanya, akan tetapi hipertensi memicu munculnya penyakit lain yang mematikan (Pudiastuti, 2013).

a. Klasifikasi Tekanan Darah

Klasifikasi hipertensi berdasarkan peningkatan tekanan darah sistol dan diastol. Klasifikasi hipertensi menurut *The Seventh Report of The Joint National*.

Tabel 2.1 Klasifikasi Tekanan Darah Menurut JNC VII,

Klasifikasi Tekanan Darah	Tekanan Darah Sistol (mmHg)	Tekanan Darah Diastol (mmHg)
Normal	≤120	≤80
Prahipertensi	120 - 139	80 – 89
Hipertensi Stage I	140 - 159	90 – 99
Hipertensi Stage II	160	100 -
Hipertensi Stage III	≥180	≥110

Sumber : Kemenkes RI. 2014

Tabel 2.2 klasifikasi hipertensi berdasarkan American Society of Hypertension and International Society of Hypertension 2013 yaitu sebagai berikut

Kalsifikasi	Sistolik		Diastolic
Optimal	<120	Dan	8589<80
Normal	120-129	Dan/atau	80-84
Normal tinggi	130-139	Dan/atau	85-89
Hipertensi derajat I	140-159	Dan/atau	90-99

Hipertensi derajat II	160-179	Dan/atau	100-109
Hipertensi derajat III	≥ 180	Dan/atau	≥ 110
Hipertensi sistolik terisolasi	≥ 140	Dan/atau	< 90

2. Etiologi Hipertensi

Berdasarkan etiologinya, hipertensi dibagi menjadi dua yaitu hipertensi esensial atau primer dan hipertensi sekunder.

a. Hipertensi Esensial (Primer)

Menurut National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), hipertensi primer atau esensial adalah jenis yang paling umum dari hipertensi. jenis hipertensi ini cenderung terjadi pada seseorang selama bertahun-tahun selama hidupnya (NHLBI, 2015). Hipertensi esensial didefinisikan sebagai hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Hipertensi esensial sendiri merupakan 95% dari seluruh kasus hipertensi (Yugiantaro, 2010).

Hipertensi esensial merupakan salah satu faktor risiko penting untuk terjadinya penyakit cerebrovaskuler dan penyakit jantung koroner. Hipertensi esensial merupakan etiologi kesakitan dan kematian yang cukup banyak dalam masyarakat (Masriadi, 2016).

Hipertensi esensial atau hipertensi primer atau idiopatik adalah hipertensi tanpa kelainan dasar patologi yang jelas, lebih dari 90% kasus

merupakan hipertensi esensial. Penyebabnya multifaktorial meliputi faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik mempengaruhi kepekaan terhadap natrium, kepekaan terhadap stres, reaktivitas pembuluh darah terhadap faktor vasokonstriktor, resistensi insulin, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk faktor lingkungan antara lain diet, kebiasaan merokok, stres emosi, obesitas, dan lain-lain (Gan, 2011).

Hipertensi primer ini tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikontrol. Penderita hipertensi esensial sering tidak menimbulkan gejala sampai penyakit menjadi parah, bahkan sepertiganya tidak menunjukkan gejala selama 10 atau 20 tahun. Penyakit hipertensi sering ditemukan sewaktu dilakukan pemeriksaan kesehatan lengkap dengan gejala sakit kepala, pandangan kabur, badan terasa lemah palpitasi atau jantung berdebar dan susah tidur (Masriadi, 2016).

b. Hipertensi sekunder

Hipertensi sekunder disebabkan oleh kondisi medis lain atau penggunaan obat-obatan tertentu. Jenis ini biasanya sembuh setelah penyebabnya diobati atau di hilangkan (NHLBI,2015). Jenis hipertensi sekunder sering sekali dapat diobati. Apapun penyebabnya tekanan arteri naik karena terjadi peningkatan curah jantung sering sekali di sertai penambahan volume darah dan aktivasi neurohumonal di jantung (Klabunde, 2015).

Hipertensi sekunder sudah di ketahui penyebabnya seperti di sebabkan oleh penyakit ginjal (parenkim ginjal), renovaskular, endoktrin (gangguan

aldosteronisme primer), kehamilan (preeclampsia), sleep apnea, dan obat-obatan (widyanto dan Triwibowo, 2013).

Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan/sebagai akibat dari adanya penyakit lain. Tipe ini lebih jarang terjadi, hanya sekitar 5% dari seluruh kasus tekanan darah tinggi. Beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya hipertensi sekunder adalah penyakit ginjal, kelainan hormonal, obat – obatan (Pudiastuti, 2013).

3. Patofisiologi hipertensi

Mekanisme yang mengontrol konstiksi dan relaksasi pembuluh darah terletak dipusat vasomotor, pada medulla diotak. Dari pusat vasomotor ini bermula jaras saraf simpatis, yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan keluar dari kolumna medulla spinalis ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui system saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion melepaskan asetilkolin, yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan dilepaskannya norepineprin mengakibatkan konstiksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokonstriksi. Individu dengan hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin, meskipun tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pada saat bersamaan dimana sistem saraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai respons rangsang emosi, kelenjar adrenal juga terangsang, mengakibatkan tambahan aktivitas

vasokonstriksi. Medulla adrenal mensekresi epinefrin, yang menyebabkan vasokonstriksi. Korteks adrenal mensekresi kortisol dan steroid lainnya, yang dapat memperkuat respons vasokonstriktor pembuluh darah. Vasokonstriksi yang mengakibatkan penurunan aliran ke ginjal, menyebabkan pelepasan rennin. Renin merangsang pembentukan angiotensin I yang kemudian diubah menjadi angiotensin II, suatu vasokonstriktor kuat, yang pada gilirannya merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume intra vaskuler. Semua faktor ini cenderung mencetuskan keadaan hipertensi.

Sebagai pertimbangan gerontologis dimana terjadi perubahan struktural dan fungsional pada system pembuluh perifer bertanggungjawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi pada usia lanjut. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat dan penurunan dalam relaksasi otot polos pembuluh darah, yang pada gilirannya menurunkan kemampuan distensi dan daya regang pembuluh darah. Konsekuensinya, aorta dan arteri besar berkurang kemampuannya dalam mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh jantung (volume sekuncup) mengakibatkan penurunan curang jantung dan peningkatan tahanan perifer (Rohaendi, 2008).

4. Gejala Klinis

Menurut Martha (2012), Hipertensi sulit disadari oleh seseorang karena hipertensi tidak memiliki gejala khusus. gejala-gejala yang mungkin diamati antara lain yaitu:

- a. Pusing atau sakit kepala
- b. Sering gelisah
- c. Wajah merah
- d. Tenguk terasa pegal
- e. Mudah marah
- f. Telinga berdengung
- g. Sukar tidur
- h. Sesak nafas
- i. Rasa berat di tengkuk
- j. Mudah lelah
- k. Mata berkunang-kunang
- l. Mimisan

5. Faktor-Faktor Risiko Hipertensi

Menurut (Yunita sari 2017) faktor-faktor yang memiliki potensi menimbulkan masalah atau kerugian kesehatan biasa disebut dengan faktor risiko. Faktor-faktor risiko kejadian hipertensi yaitu :

- a. Faktor risiko yang tidak dapat di ubah

Faktor risiko yang tidak dapat diubah, antara lain :

- 1) Usia

Usia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi yang tidak dapat diubah. Pada umumnya semakin bertambahnya usia semakin besar pula risiko terjadinya hipertensi. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan struktur pembuluh darah seperti penyempitan lumen, serta dinding pembuluh darah menjadi kaku dan elastisitasnya berkurang sehingga meningkatkan tekanan darah.

Usia cenderung menjadi faktor risiko yang sangat kuat. Angka kejadian (prevalensi) hipertensi pada orang usia muda masa kuliah berkisar 2-3 %. Sementara prevalensi hipertensi pada manula berkisar 65% atau lebih (Townsend, 2010). Tekanan darah akan cenderung naik seiring dengan bertambahnya usia, resiko untuk meningkatnya penyakit hipertensi akan lebih tinggi juga seiring bertambahnya usia (CDC, 2015).

Penelitian menunjukkan bahwa seraya usia seseorang bertambah, tekanan darah pun akan meningkat. Hipertensi pada orang dewasa berkembang mulai usia 18 tahun ke atas. Hipertensi meningkat seiring dengan pertambahan usia, semakin tua usia seseorang maka pengaturan metabolisme zat kapur (kalsium) terganggu. Hal ini menyebabkan banyaknya zat kapur yang beredar bersama aliran darah. Akibatnya darah menjadi lebih padat dan tekanan darah pun meningkat. Endapan kalsium di dinding pembuluh darah menyebabkan penyempitan pembuluh darah (arteriosklerosis). Aliran darah pun menjadi terganggu dan memacu peningkatan tekanan darah.

Hipertensi merupakan penyakit multifactorial yang muncul oleh Karen interaksi berbagai faktor. Dengan bertambahnya usia, maka tekanan darah juga akan meningkat. Setelah usia 45 tahun, dinding arteri akan mengalami penebalan oleh karena adanya penumpukan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku. Tekanan darah sistolik meningkat karena kelenturan pembuluh darah besar yang berkurang pada penambahan usia sampai decade ke tujuh sedangkan tekanan darah sistolik meningkat sampai decade kelima dan keenam kemudian menetap atau cenderung menurun. Peningkatan usia akan menyebabkan beberapa perubahan fisiologis, pada usia lanjut terjadi peningkatan resistensi perifer dan aktifitas simpatik. Pengaturan tekanan darah rifleks baroreseptor pada usia lanjut sensitivitasnya sudah berkurang. (Kumar et al, 2005).

2) Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Dalam hal ini, pria cenderung lebih banyak menderita hipertensi dibandingkan wanita. Hal tersebut terjadi karena adanya dugaan bahwa pria memiliki gaya hidup yang kurang sehat dibandingkan dengan wanita. Wanita dipengaruhi oleh beberapa hormon termasuk hormon estrogen yang melindungi wanita dari hipertensi dan komplikasinya termasuk penebalan dinding pembuluh darah atau aterosklerosis. Wanita usia produktif sekitar 30-40 tahun, kasus serangan jantung jarang terjadi, tetapi meningkat pada pria. Arif Mansjoer

mengemukakan bahwa pria dan wanita menopause memiliki pengaruh sama pada terjadinya hipertensi. Ahli lain berpendapat bahwa wanita menopause mengalami perubahan hormonal yang menyebabkan kenaikan berat badan dan tekanan darah menjadi lebih reaktif terhadap konsumsi garam, sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Terapi hormon yang digunakan oleh wanita menopause dapat pula menyebabkan peningkatan tekanan darah.

3) Riwayat keluarga

individu dengan riwayat keluarga memiliki penyakit tidak menular lebih sering menderita penyakit yang sama. Jika ada riwayat keluarga dekat yang memiliki faktor keturunan hipertensi, akan mempertinggi risiko terkena hipertensi pada keturunannya. Keluarga dengan riwayat hipertensi akan meningkatkan risiko hipertensi sebesar empat kali lipat. Data statistik membuktikan jika seseorang memiliki riwayat salah satu orang tuanya menderita penyakit tidak menular, maka dimungkinkan sepanjang hidup keturunannya memiliki peluang 25% terserang penyakit tersebut. Jika kedua orang tua memiliki penyakit tidak menular maka kemungkinan mendapatkan penyakit tersebut sebesar 60%.

b. Faktor risiko yang dapat di ubah

Faktor risiko yang dapat diubah yaitu :

1) Obesitas

Penelitian dan beberapa studi yang dilakukan dunia telah menemukan bahwa berat badan berhubungan dengan tekanan darah. Berdasarkan *Framingham Heart Study*, sebanyak 75% dan 65% kasus hipertensi yang terjadi pada pria dan wanita secara langsung berkaitan dengan kelebihan berat badan dan obesitas. Namun tidak semua jenis kegemukan berhubungan dengan hipertensi. Ada dua jenis kegemukan, yaitu kegemukan sentral dan kegemukan perifer. Pada kondisi kegemukan sentral lemak mengumpul disekitar perut atau dalam kata lain, buncit. Sedangkan kegemukan perifer adalah kegemukan yang merata diseluruh tubuh. artinya lemak menyebar rata diseluruh bagian tubuh. Meskipun demikian obesitas sentral merupakan faktor penentu yang lebih penting terhadap peningkatan tekanan darah. Dibandingkan dengan kelebihan berat badan perifer. Dan hipertensi lebih banyak ditemukan pada orang dengan kegemukan sentral dibandingkan perifer (Putu Yuda, 2011).

Berat badan dan indeks massa tubuh (IMT) berkorelasi langsung dengan tekanan darah sistolik. Obesitas bukan satu-satunya penyebab hipertensi namun prevalensi hipertensi pada orang dengan obesitas jauh lebih besar, resiko relative untuk menderita hipertensi pada orang gemuk 5 kali lebih tinggi disbanding dengan orang yang berat badannya normal (Buku Hipertensi, 2010).

Firman Allah dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah (5):87 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apaapa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”(QS. Al-Maidah (5): 87).

La ta'tadu maknanya jangan melampaui batas dengan bentuk kata yang menggunkan huruf ta' bermakna keterpaksaan, yakni di luar batas yang lumrah ini menunjukkan bahwa fitra manusia mengarah kepada moderasi dalam arti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar tidak berlebih dan tidak juga berkurang. Setiap pelampauan batas adalah semacam pemaksaan terhadap fitra dan pada dasarnya berat atau risih melakukannya inilah yang di nyatakan dalam kata ta'tadu.

Pada ayat di atas di jelaskan Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan Allah SWT melarang kita dalam memakan-makanan seperti saat memakan makanan enak terlebih lagi saat sangat lapar,kita sering kali makan yang berlebihan. Padahal biasanya makanan itu banyak mungandung lemak. bukan hanya itu karbohidrat dan protein dalam tubuh juga biasanya akan di ubah menjadi lemak yang akan di simpang sebagai cadangan energy dan dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan obesitas.

Penentuan obesitas pada orang dewasa dapat dilakukan dengan pengukuran IMT, berikut merupakan klasifikasi Indeks Massa Tubuh (IMT) orang Indonesia:

Tabel 2.3 Kategori IMT untuk Indonesia

IMT (Kg/cm ²)	Kategori	Keadaan
< 17	Kekurangan berat badan tingkat berat	Kurus
17,0 – 18,5	Kekurangan berat badan tingkat ringan	
18,5 – 25,0		Normal
>25,0 - >27,0	Kelebihan berat badan tingkat ringan	Gemuk
>27	Kelebihan berat badan tingkat berat	

(Sumber : Buku Pedoman Hipertensi, 2010).

2) Merokok

Merokok merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan hipertensi, sebab rokok mengandung nikotin. Merokok dapat menyebabkan denyut jantung dan kebutuhan oksigen untuk disuplai ke otot jantung mengalami peningkatan. Bagi penderita yang memiliki aterosklerosis atau penumpukan lemak pada pembuluh darah, merokok dapat memperparah kejadian hipertensi dan berpotensi pada penyakit degenerative e lain seperti stroke dan penyakit jantung.

Pada umumnya rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya seperti nikotin dan karbon monoksida. Zat tersebut akan terisap melalui

rokok sehingga masuk ke aliran darah dan menyebabkan kerusakan lapisan endotel pembuluh darah arteri, serta mempercepat terjadinya aterosklerosis.

Nikotin misalnya, zat ini dapat diserap oleh pembuluh darah kemudian diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh termasuk otak. Akibatnya otak akan bereaksi dengan memberikan sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepaskan epinefrin (adrenalin). Hormon inilah yang akan membuat pembuluh darah mengalami penyempitan. Penyempitan pembuluh darah otak tersebut memaksa jantung bekerja lebih berat. Keadaan memaksa jantung sangat berbahaya karena dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak sehingga terjadi stroke.

Selain itu karbon monoksida yang terdapat dalam rokok diketahui dapat mengikat hemoglobin dalam darah dan mengentalkan darah. Hemoglobin sendiri merupakan protein yang mengandung zat besi dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen. Karbon monoksida menggantikan ikatan oksigen dalam darah sehingga memaksa jantung memompa untuk memasukkan oksigen yang cukup dalam organ dan jaringan tubuh. Hal inilah yang dapat meningkatkan tekanan darah.

3) Aktifitas Fisik

Olahraga teratur adalah suatu kebiasaan yang memberikan banyak keuntungan seperti berkurangnya berat badan, tekanan darah, kolesteol, serta penyakit jantung. Dalam kaitannya dengan hipertensi, olahraga teratur dapat mengurangi kekakuan pembuluh darah dan meningkatkan

daya tahan jantung dan paru-paru sehingga dapat menurunkan tekanan darah (Widyanto dan Triwibowo, 2013).

Aktivitas fisik sangat mempengaruhi stabilitas tekanan darah. Pada orang yang tidak aktif melakukan kegiatan fisik cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi. Hal tersebut mengakibatkan otot jantung bekerja lebih keras pada setiap kontraksi. Makin keras usaha otot jantung dalam memompa darah, makin besar pula tekanan yang dibebankan pada dinding arteri sehingga meningkatkan tahanan perifer yang menyebabkan kenaikan tekanan darah. Kurangnya aktifitas fisik juga dapat meningkatkan risiko kelebihan berat badan yang akan menyebabkan risiko hipertensi meningkat.

4) Konsumsi garam

Garam dapur merupakan faktor yang sangat berperan dalam patogenesis hipertensi. Garam dapur mengandung 40% natrium dan 60% klorida. Konsumsi 37 gram natrium perhari, akan diabsorpsi terutama di usus halus. Pada orang sehat volume cairan ekstraseluler umumnya berubah-ubah sesuai sirkulasi efektifnya dan berbanding secara proporsional dengan natrium tubuh total. Volume sirkulasi efektif adalah bagian dari volume cairan ekstraseluler pada ruang vaskular yang melakukan perfusi aktif pada jaringan. Natrium diabsorpsi secara aktif, kemudian dibawa oleh aliran darah ke ginjal untuk disaring dan dikembalikan ke aliran darah dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan taraf natrium dalam darah. Kelebihan natrium yang

jumlahnya mencapai 90-99 % dari yang dikonsumsi, dikeluarkan melalui urin. Pengeluaran urin ini diatur oleh hormon aldosteron yang dikeluarkan kelenjar adrenal.

Sumber natrium yang juga perlu diwaspadai selain garam dapur adalah penyedap masakan atau monosodium glutamat (MSG). Pada saat ini budaya penggunaan MSG sudah sampai pada taraf sangat mengkhawatirkan, di mana

semakin mempertinggi risiko terjadinya hipertensi. Garam dapat meningkatkan tekanan darah dengan cepat pada beberapa orang, khususnya bagi penderita diabetes, penderita hipertensi ringan, orang dengan usia tua, dan mereka yang berkulit hitam (Manurung, 2016).

5) Stress

Stres dan kondisi emosi yang tidak stabil juga dapat memicu tekanan darah tinggi. Stres akan meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer dan curah jantung sehingga akan merangsang aktivitas saraf simpatetik. Stres ini dapat berhubungan dengan pekerjaan, kelas sosial, ekonomi, dan karakteristik personal (Nurrahmani,dkk, 2015).

Bahkan dalam Islam terdapat anjuran agar kita senantiasa berdzikir dan selalu bertawakal kepada Allah SWT karena dengan berdzikir dan bertawakal jiwa kita akan menjadi tenang, aman, dan tentram sehingga kita dapat terhindar dari berbagai faktor yang dapat menyebabkan hipertensi salah satunya stres. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Fajr/89: 27-30.

يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِي فِي

عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّاتِي ﴿٣٠﴾

Terjemahnya :

Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hambaKu. masuklah ke dalam syurga-Ku” (Kementerian Agama RI, 2010).

Ayat di atas menggambarkan keadaan manusia yang taat. Ayat di atas melukiskan sambutan Allah kepada yang taat. Allah berfirman menyerunya ketika ruhnya akan meninggalkan badannya atau ketika ia bangkit dari kuburnya: hai jiwa yang tenang lagi merasa aman dan tenang karena banyak berzikir dan mengingat Allah kembalilah, yakni wafat dan bangkitlah dihari kemudian, kepada Tuhan pemelihara dan pembimbing-mu dengan hati yang rela, yakni puas dengan ganjaran Ilahi, lagi diridhai oleh Allah bahkan seluruh makhluk, maka karena itu masuklah ke dalam kelompok hamba-hamba-Ku yang taat lagi memperoleh kehormatan dari-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku yang telah kupersiapkan bagi mereka yang taat (Shihab, 2002).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus selalu berzikir dan terus mengingat Allah dengan itu hati atau jiwa kita akan menjadi tenang

karena sesungguhnya jiwa yang tenang dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit salah satunya penyakit hipertensi.

6) Alkohol

Konsumsi alkohol secara berlebihan juga menyebabkan tekanan darah tinggi. Jika meminum minuman keras (alkohol) sedikitnya dua kali per hari, maka tekanan darah sistolik meningkat kira-kira 1,0 mmHg dan tekanan darah diastolik juga meningkat kira-kira 0,5 mmHg per satu kali minum. Peminum harian mempunyai tekanan darah sistolik dan diastolik lebih tinggi, berturut-turut 6,6 mmHg dan 4,6 mmHg dibandingkan dengan peminum sekali seminggu (Bustan,2015).

Hal ini di dukung penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang minum minuman lakohol sampai dengan lima kali perhari. Kemungkinan akan menderita hipertensi sangat tinggi di bandingkan dengan orang yang tidak minum sama sekali. Kemungkinan penyakit stroke juga meningkat sementara itu,ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang mengkomsumsi alcohol dalam batas tertentu,segelas anggur,stu atau dua kaleng bir, atau 0,3 liter wiski bahkan dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Hal ini di duga karena alcohol dalam jumlah yang sedikit akan merangsang ginjal untuk memperbaiki sebagian besar protein HDL (high density lipoprotein) atau kolestrol yang lain.

6. Komplikasi

a. Stroke

Hipertensi menjadi berbahaya bukan hanya karena tekanan darah yang berlebihan saja, tapi karena penyakit-penyakit lain yang ikut menyertainya. Penyakit-penyakit tersebut dapat muncul atau diperparah dengan meningkatnya tekanan darah dalam tubuh kita. Berikut adalah daftar penyakit yang terkait dengan hipertensi: Atherosclerosis. Darah mengalir dalam tubuh kita melalui pembuluh darah sehingga peningkatan pada tekanan darah dapat memengaruhi kondisi pembuluh darah itu sendiri, dan kekakuan pada pembuluh darah arteri sehingga memungkinkannya untuk menjadi rusak. Efek lanjutan dari kerusakan ini adalah gangguan sirkulasi darah yang mengarah pada serangan jantung dan stroke.

b. Gagal Jantung

Jantung berfungsi untuk memompa darah keseluruh tubuh. jika jantung memberikan tekanan yang terlalu tinggi untuk mengalirkan darah maka diperlukan kerja elstra dari otot jantung. Kondisi ini menyebabkan otot jantung menjadi lebih tebal, seperti halnya binaragawan yang sering berlatih maka ototnya menjadi besar. Tetapi jika jantung bekerja terlalu keras dalam jangka waktulama, maka lama-kelamaan otot jantung akan kelelahan dan tidak mampu bekerja memompa darah secara opimal. Hal ini disebut gagal jantung. Jantung yang seharusnya memompa darah untuk beredar berkeliling seluruh tubuh, akhirnya tidak mampu lagi dan

mengakibatkan darah menumpuk diberbagai organ. Jika menumpuk di paru-paru, maka mengakibatkan pare-paru tergenang dan menjdikan kesulitan/sesak napas, jika menumpuk di hati akan menyebabkan gangguan fungsi hati dalam menetralkan racun, jika menumpuk di tangan dan kaki akan menyebabkan pembengkakan.

c. Gangguan Ginjal

Kerusakan bagian dalam arteri atau pembekuan darah yang terjadi pada ginjal akibat hipertensi dapat menyebabkan penurunan bahkan kegagalan fungsi pada ginjal. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kerusakan progresif pada kapiler dan glomerulus ginjal. Kerusakan yang terjadi pada glomerulus mengakibatkan darah mengalir ke unit fungsional ginjal, hal tersebut menyebabkan terganggunya nefron dan hipoksia bahkan kematian ginjal.

Kelainan ginjal akibat hipertensi dibagi menjadi dua yaitu nefrosklerosis benigna dan nefrosklerosis maligna. Nefrosklerosis benigna terjadi pada hipertensi yang sudah berlangsung lama sehingga terjadi pengendapan pada pembuluh darah akibat proses penuaan dan menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang. Sementara itu, nefrosklerosis maligna merupakan kelainan ginjal berupa terganggunya fungsi ginjal yang ditandai dengan peningkatan tekanan diastole di atas 130 mmHg.

7. Penatalaksanaan Hipertensi

Tatalaksana hipertensi meliputi non farmakologis dan farmakologis. Tatalaksana non farmakologis meliputi modifikasi gaya hidup, upaya ini dapat menurunkan tekanan darah atau menurunkan ketergantungan penderita hipertensi terhadap penggunaan obat-obatan. Sedangkan tatalaksana farmakologis umumnya dilakukan dengan memberikan obat-obatan antihipertensi di puskesmas. Apabila upaya non farmakologis belum mampu mencapai hasil yang diharapkan. Puskesmas bias merujuk pasien ke pelayanan kesehatan sekunder yaitu rumah sakit (Depkes, 2013)

8. Pengendalian Tekanan Darah

Menjalani pola hidup sehat telah banyak terbukti dapat menurunkan tekanan darah. Pola hidup sehat yang dianjurkan untuk mencegah dan mengendalikan hipertensi adalah :

a. Makan gizi seimbang

Modifikasi diet terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Prinsip diet yang dianjurkan adalah gizi seimbang: membatasi gula, membatasi konsumsi garam, makan cukup buah, makan sayuran, makan kacang-kacangan, biji-bijian, makanan rendah lemak jenuh, menggantinya dengan unggas dan ikan.

b. Mengatasi obesitas

c. Hubungan erat antara obesitas dengan hipertensi telah banyak dilaporkan.

Upayakan untuk menurunkan berat badan sehingga mencapai IMT

normal 18,5 – 22,9 kg/m², lingkar pinggang ≤ 90 cm untuk laki-laki atau ≤ 80 cm untuk perempuan.

d. Melakukan olahraga secara teratur

Berolahraga seperti senam aerobik atau jalan cepat selama 30-45 menit (sejauh 3 kilometer) lima kali perminggu, dapat menurunkan TDS 4 mmHg dan TDD 2,5 mmHg. Berbagai cara relaksasi seperti meditasi, yoga dan hypnosis dapat mengontrol sistem syaraf sehingga dapat menurunkan tekanan darah.

e. Berhenti merokok

Merokok merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan hipertensi, sebab rokok mengandung nikotin. Menghisap rokok menyebabkan nikotin terserap oleh pembuluh darah kecil dalam paru-paru dan kemudian akan diedarkan hingga ke otak. Di otak, nikotin akan memberikan sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas epinefrin atau adrenalin yang akan menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat karena tekanan darah yang lebih tinggi. Karbon monoksida dalam asap rokok akan menggantikan ikatan oksigen dalam darah. Hal tersebut mengakibatkan tekanan darah meningkat karena jantung dipaksa memompa untuk memasukkan oksigen yang cukup ke dalam organ dan jaringan tubuh lainnya. Tidak ada cara yang benar-benar efektif untuk memberhentikan kebiasaan merokok. Berapa metode yang secara umum dicoba adalah sebagai berikut :

1. Inisiatif sendiri

Banyak peroko menghentikan kebiasaannya atas inisiatif sendiri, tanpa pertolongan pihak luar. Metode ini banyak menarik para peroko karena hal-hal berikut :

- a) Dapat dilakukan secara diam-diam
- b) Program diselesaikan dengan tingkat dan jadwal sesuai kemauan
- c) Tidak perlu menghadiri rapat-rapat penyuluhan

2. Menggunakan permen yang mengandung nikotin

Kecanduan nikotin membuat perokok sulit meninggalkan rokok. Permen nikotin dapat mengurangi penggunaan rokok. Ada jangka waktu tertentu untuk menggunakan permen ini, dan selama menggunakan permen, penderita dilarang merokok. Dengan demikian diharapkan perokok sudah berhenti merokok secara total.

3. Kelompok program

Beberapa orang mendapatkan manfaat dari dukungan kelompok berhenti merokok. Para anggota kelompok dapat saling member nasehat dan dukungan. Program ini banyak yang berhasil, tetapi memerlukan biaya dan waktu untuk menghadiri pertemuan-pertemuan sehingga menyebabkan keengganan untuk bergabung.

4. Mengurangi konsumsi alkohol

Satu studi meta-analisis menunjukkan bahwa kadar alkohol seberapapun akan meningkatkan tekanan darah. Mengurangi alkohol pada penderita hipertensi yang biasa minum alkohol, akan menurunkan TDS rata-rata 3,8 mmHg. Dalam memberikan edukasi

kepada pasien tentang alkohol, hendaknya dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pantang alkohol harus dipertahankan (jangan mulai minum alkohol)
- b) Jangan menganjurkan untuk mulai mengkonsumsi alkohol demi alasan kesehatan.
- c) Batasi konsumsi alkohol untuk laki-laki maksimal 2 unit perhari dan untuk perempuan 1 unit perhari, jangan lebih dari 5 hari minum perminggu. Satu unit = setengah gelas bir (5% alkohol), 100 ml anggur (10% alkohol), 25 ml minuman 40% alkohol. Dengan mengadopsi gaya hidup sehat, diharapkan terjadi penurunan tekanan darah.

f. Pengendalian Stres

Stress dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan timbul kapan saja. Untuk itu, penderita hipertensi harus dapat melakukan pengendalian terhadap stress untuk menenangkan pikiran dan jiwa mereka. Pengendalian stress dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut :

- a) Olahraga teratur dipercaya dapat memberikan kebahagiaan karena hormone endofrin dikeluarkan oleh system saraf pusat ketika berolahraga. Hormone endofri disebut juga sebagai hormone kebahagiaan karena memiliki efek mengurangi rasa sakit dan memicu rasa senang.

- b) Istirahat yang cukup dibutuhkan untuk mengembalikan kesegaran tubuh setelah beraktifitas. Istirahat yang cukup dilakukan dengan tidur sekitar 6-8 jam sehari.
- c) Menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan social, dan kepentingan pribadi. Retinas harian kadang membuat sebagian orang merasa jenuh dan stress. Untuk itu penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan social dan kepentingan pribadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, teman, dan orang-orang di sekitar.
- d) Menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat memicu kekacauan emosi dan stress.
- e) Cobalah untuk tidak khawatir, panik maupun terganggu dalam segala kondisi karena hal tersebut dapat memicu peningkatan tkanan darah.
- f) Belajar untuk menerima, bersyukur, dan berpikir positif akan segala kondisi.
- g) Menjaga diri agar tetap rileks dapat dilakukan dengan melakukan mediasi, latihan pernapasan, yoga dan mendengarkan music. Selain itu, bagi sebagian orang ibadah juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menenangkan diri dan mendekatkan diri kepada tuhan.
- g. Rutin periksa tekanan darah
- Pemeriksaan tekanan darah harus dilakukan secara rutin bagi penderita hipertensi atau orang dengan riwayat keluarga hipertensi untuk lebih

waspada. Pemeriksaan yang di anjurkan adalah pemeriksaan sebulan sekali atau pemeriksaan sewaktu-waktu jika terjadi gejala seperti pusing dan gejala lainnya. Hasil tes tersebut tentunya dapat menjadi dasar dan panduan dalam mengatur pola makan dan gaya hidup.

9. Terapi Farmakologis

Pengobatan hipertensi bertujuan untuk mengendalikan angka kesakitan, komplikasi dan kematian akibat hipertensi. Terapi farmakologis hipertensi dapat dilakukan di pelayanan strata primer atau puskesmas, sebagai penanganan awal. Berbagai penelitian klinik membuktikan, bahwa obat anti hipertensi yang diberikan tepat waktu, dapat menurunkan kejadian stroke hingga 35-40%, *infark miokard* 20-25%, dan gagal jantung lebih dari 50%.

Pengobatan hipertensi dimulai dengan obat tunggal yang mempunyai masa kerja panjang sehingga dapat diberikan sekali sehari dan dosisnya dititrasi. Obat berikutnya mungkin dapat ditambahkan selama beberapa bulan pertama perjalanan terapi.

Pemilihan atau kombinasi obat anti hipertensi yang cocok bergantung pada keparahan hipertensi dan respon penderita terhadap obat. Beberapa prinsip pemberian obat anti hipertensi perlu diingat, yaitu:


1. Pengobatan hipertensi sekunder lebih mengutamakan pengobatan penyebabnya.
2. Pengobatan hipertensi essensial ditujukan untuk menurunkan tekanan darah dengan harapan memperpanjang usia dan mengurangi timbulnya komplikasi.

3. Upaya menurunkan tekanan darah dicapai dengan menggunakan obat antihipertensi.
4. Pengobatan hipertensi adalah pengobatan jangka panjang, bahkan pengobatan seusia hidup.
5. Jika tekanan darah terkontrol maka pemberian obat hipertensi di puskesmas dapat diberikan disaat kontrol dengan catatan obat yang diberikan untuk pemakaian selama 30 hari bila tanpa keluhan baru.
6. Untuk penderita hipertensi yang baru didiagnosis (kunjungan pertama) maka diperlukan kontrol ulang disarankan 4 kali dalam sebulan atau seminggu sekali, apabila tekanan darah sistolik > 160 mmHg atau diastolik > 100 mmHg sebaiknya diberikan terapi kombinasi setelah kunjungan kedua (dalam dua minggu) tekanan darah tidak dapat dikontrol.
7. Pada kasus hipertensi emergensi atau urgensi tekanan darah tidak dapat terkontrol setelah pemberian obat pertama langsung diberikan terapi farmakologis kombinasi, bila tidak dapat dilakukan rujukan.

Kerangka Konsep

Variabel Independen

Variabel Dependen



Keterangan :



: Variabel Dependen



: variabel Independen




: variabel yang tidak di teliti



: variabel perancu

Kerangka Teori



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Sujarweni (2014), desain penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada proses penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan pendekatan *cross-sectional* untuk mengetahui Faktor-Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Sapaya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Sapaya.

2. Waktu Penelitian :

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2020

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang akan diteliti dan memiliki kesamaan karakteristik. Kesamaan karakteristik tersebut ditentukan berdasarkan pada sifat spesifik dari populasi yang ditentukan dengan kriteria inklusi atau tertentu (Sitiatava, 2012). Jumlah Populasi pada penelitian ini adalah 70 orang yaitu seluruh pasien hipertensi yang datang berobat ke Puskesmas Sapaya.

2. Sampel

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. Dalam penelitian keperawatan kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria itu menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan (Notoadmojo, 2012).

Dalam penelitian ini sampel diambil menggunakan teknik *Non probability sampling* dengan metode *Porpusive sampling* karena tidak semua pasien mewakili kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, terdapat kriteria-kriteria yang telah di tentukan peneliti sebelumnya (kriteria inklusi dan eksklusi).

Adapun yang akan menjadi sampel pada penelitian ini adalah keseluruhan pasien hipertensi yang datang berobat ke Puskesmas Sapaya dan memenuhi kriteria inklusi serta eksklusi.

a. Kriteria inklusi

- 1) Pasien yang bersedia di teliti
- 2) Pasien baik laki-laki maupun perempuan
- 3) Pasien yang berusia 35-65 tahun
- 4) Pasien dengan riwayat hipertensi dan non hipertensi

b. Kriteria eksklusi

- 1) Pasien yang tidak bersedia di teliti
- 2) Pasien dengan penyakit kronis/penyerta

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian

2. Data sekunder

Data yang pengumpulannya tidak dilakukan sendiri oleh peneliti

E. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan untuk peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Data karakteristik responden diperoleh dengan wawancara langsung dengan responden, yang isinya menekankan pada informasi karakteristik yaitu; nama, usia, jenis kelamin dan lain-lain.

2. Pengukuran Observasi

Pengukuran observasi dilakukan melalui lembar kuesioner.

F. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan data

Setelah data terkumpul dari hasil dokumentasi dari pengukuran maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan data tersebut dengan beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Editing

Setelah lembar observasi diisi kemudian dikumpulkan dalam bentuk data, data tersebut dilakukan pengecekan dengan maksud memeriksa kelengkapan data, kesinambungan data dan

keseragaman data dalam usaha melengkapi data yang masih kurang.

b. Koding

Dilakukan pengkodian dengan maksud agar data-data tersebut mudah diolah yaitu dengan cara semua jawaban atau data disederhanakan dengan memberikan simbol-simbol/kode dalam bentuk angka maupun alphabet pada nomor dan daftar pertanyaan.

c. Tabulasi data

Setelah selesai pembuatan kode, selanjutnya dilakukan pengelompokan data sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

2. Analisa data

Data yang telah di peroleh kemudian di masukkan kedalam tabel untuk kemudian diolah dengan menggunakan SPSS. Pengolahan di lakukan dengan uji kolerasi sperman karena kedua kelompok data yang di peroleh menggunakan skala ordinal (interpretasi) sehingga untuk menghubungkan keduanya di perlukan uji kolerasi dengan metode spearman.

G. Etika penelitian

Masalah etika dalam penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting, karena akan berhubungan dengan manusia secara langsung. Etika yang perlu dan harus diperhatikan menurut Yurisa (2008) adalah:

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*)

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*) yang terdiri dari:

- a. Penjelasan manfaat penelitian.
- b. Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan.
- c. Jelaskan manfaat yang akan didapatkan.
- d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek berkaitan dengan prosedur penelitian.
- e. Persetujuan subjek dapat mengundurkan diri kapan saja.
- f. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan.

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*)

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat

pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau *identification number*) sebagai pengganti identitas informan.


3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*)

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*).

Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficience*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Bungaya merupakan kecamatan dengan keadaan geografis pegunungan. Kecamatan Bungaya sendiri merupakan wilayah kerja puskesmas sapaya yang terletak dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Manuju

Sebelah Timur : Kecamatan Bontolempangan

Sebelah Barat : Kecamatan Takalar

Sebelah Selatan : Kecamatan Biringbulu

Luas wilayah Kecamatan Bungaya $\pm 175,53$ KM² dengan 7 desa/kelurahan yaitu Desa Bontomanai, Kelurahan Jenebatu, Kelurahan Sapaya, Desa Buakkang, Desa Rannaloe, Desa Bissoloro dan Desa Manggempang. Puskesmas sapaya terletak di Ibu Kota Kecamatan Bungaya tepatnya di Kelurahan Sapaya.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Tercapainya Bungaya yang sehat demi terwujudnya Indonesia sehat

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu

- 2) Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian hidup sehat bagi masyarakat
- 3) Melakukan upaya pergerakan pembangunan masyarakat.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini tentang hubungan faktor resiko terjadinya hipertensi stadium 1 dan 2 di lakasanakan pada 11-18 desember 2019. Responden dalam penelitian ini adalah warga yang bermukim di Kelurahan Sapaya berjumlah 70 responden. Penelitian ini merupakan jenis penelitian bersikap deskriptif analitik dengan pendekatan *cross-sectional*. Penelitian ini di lakukan selama 4 langkah, langkah penelitian memberikan lembaran persetujuan (informed consent) kepada responden sebagai bentuk persetujuan untuk menjadi responden dalam penelitian tersebut,selanjutnya peneliti membagikan sebanyak 3 kuesioner tentang faktor-faktor hipertensi kepada responden ,selanjutnya peneliti melakukan proses pengolahan data dengan menggunakan program SPSS dengan menggunakan uji statistik *Chi-Square*. Teknik pengambilan sampel yang di gunakan adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan adanya tujuan tertentu, dan bukan di dasarkan atas strata, random, atau geografi.

1. Karakteristik Responden

Adapun karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia,
Jenis Kelamin, Hipertensi, Konsumsi Garam, Obesitas dan Aktifitas
Fisik Di Wilayah Kerja Puskesmas Sapaya
Kabupaten Gowa
(n=70)

Karakteristik	Frekuensi	Persentase %
Usia		
Dewasa akhir	20	28.6
Lansia awal	22	31.4
Lansia akhir	28	40
Total	70	100
Jenis Kelamin		
Laki-laki	24	34.3
Perempuan	46	65.7
Total	70	100
Hipertensi		
Hipertensi Stadium 1	43	61.4
Hipertensi Stadium 2	27	38.6
Total	70	100
Konsumsi Garam		
Kurang	49	70
Lebih	21	30
Total	70	100
Obesitas		
Obesitas	13	18.6
Tidak Obesitas	57	81.4
Total	70	100
Aktifitas Fisik		
Baik	62	88.6
Buruk	8	11.4
Total	70	100

Sumber: Data primer 2019

Tabel 4.1 menunjukkan proporsi karakteristik responden berdasarkan usia, jumlah terbanyak adalah kelompok usia 26-35 tahun (dewasa akhir) dengan jumlah 22 responden (31.4%), sedangkan kelompok usia paling sedikit yaitu kelompok usia 46-55 tahun (lansia awal) dengan jumlah 1 responden (3.3%). Jenis kelamin perempuan memiliki jumlah terbanyak yaitu 26 responden (86.7%), sedangkan jumlah jenis laki-laki adalah 4 responden (13.3%).

Tabel 4.2
Hasil Distribusi Frekuensi Usia dengan Hipertensi Stadium 1 dan 2 pada Lansia (n=70)

	Hipertensi				Total	P Value	
	Stadium 1		Stadium 2				
	F	P	F	P	F	P	
Usia	Dewasa Akhir	17	85%	3	15%	20	100%
	Lansia Awal	15	68.2%	7	31.8%	22	100%
	Lansia Akhir	11	39.3%	17	60.7%	28	100%
Total		43	61.4%	27	38.6%	70	100%

Sumber: Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.2 hasil analisis hubungan antara usia dengan hipertensi pada lansia diketahui bahwa dari 70 responden yang berusia dewasa akhir terdapat 17 responden (85%) yang hipertensi stadium 1 dan 3 responden (15%) yang hipertensi stadium 2. Sedangkan pada lansia akhir

terdapat 11 responden (39.3%) yang hipertensi stadium 1 dan 17 responden (60.7%) yang hipertensi stadium 2.

Berdasarkan hasil uji chisquare diatas diperoleh bahwa pada usia dewasa akhir 17 responden (85%) lebih banyak yang mengalami hipertensi stadium 1 sedangkan hipertensi stadium 2 dialami pada rentan usia lansia akhir sebanyak 17 responden (60,7%)

Tabel 4.3
Hasil Distribusi Frekuensi Konsumsi Garam dengan Hipertensi Stadium
1 dan 2 pada Lansia
pada Desember 2019 (n=70)

		Hipertensi				Total		<i>P Value</i>
		Stadium 1		Stadium 2		F	P	
Konsumsi Garam		F	P	F	P	F	P	0,588
	Kurang		30	61,2%	19	38,8%	49	
Lebih		13	61,9%	8	38,1%	21	100%	
Total		43	61,4%	27	38,6%	70	100%	

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 4.3 hasil analisis hubungan antara konsumsi garam dengan hipertensi pada lansia diketahui bahwa dari 70 responden yang mengonsumsi garam kurang terdapat 30 responden (61,2%) mengalami hipertensi stadium 1 dan 19 responden (38,8%) yang hipertensi stadium 2. Sedangkan yang mengonsumsi garam berlebih terdapat 13 responden (61,9%) yang hipertensi stadium 1 dan 8 responden (38,1%) yang hipertensi stadium 2.

Tabel 4.4
Hasil Distribusi Frekuensi Obesitas dengan Hipertensi Stadium 1 dan
2 pada Lansia
pada Desember 2019 (n=70)

		Hipertensi				Total	P Value	
		Stadium 1		Stadium 2				
		F	P	F	P	F	P	
Obesitas	Obesitas	6	46,2%	7	53,8%	13	100%	0,174
	Tidak Obesitas	37	64,9%	20	35,1%	57	100%	
Total		43	61,4%	27	38,6%	70	100%	

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 4.4 hasil analisis hubungan antara obesitas dengan hipertensi pada lansia diketahui bahwa dari 70 responden yang obesitas terdapat 6 responden (46,2%) mengalami hipertensi stadium 1 dan 7 responden (53,8%) mengalami hipertensi stadium 2. Sedangkan yang tidak obesitas terdapat 37 responden (64,9%) yang hipertensi stadium 1 dan 20 responden (35,1%) yang hipertensi stadium 2.

Tabel 4.5
Hasil Distribusi Frekuensi Aktifitas Fisik dengan Hipertensi Stadium 1
dan 2 pada Lansia
pada Desember 2019 (n=70)

		Hipertensi				Total	P Value	
		Stadium 1		Stadium 2				
		F	P	F	P	F	P	
Aktifitas Fisik	Baik	39	62,9%	23	37,1%	62	100%	0,368
	Buruk	4	50%	4	50%	8	100%	

Total	43	61,4%	27	38,6%	70	100%
--------------	----	-------	----	-------	----	------

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 4.5 hasil analisis hubungan antara aktifitas fisik dengan hipertensi pada lansia diketahui bahwa dari 70 responden yang beraktifitas fisik baik terdapat 39 responden (62,9%) mengalami hipertensi stadium 1 dan 23 responden (37,1%) mengalami hipertensi stadium 2. Sedangkan yang beraktifitas buruk terdapat 4 responden (50%) yang hipertensi stadium 1 dan 4 responden (50%) yang hipertensi stadium 2.

C. Pembahasan

1. Gambaran Umum Demografi

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dan menggunakan kuisisioner. Pengumpulan data primer dengan menggunakan kuisisioner, sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari Kelurahan Sapaya. Dalam rancangan penelitian ini peneliti melakukan observasi pada lansia dalam hal ini lansia yang termasuk dalam kriteria inklusi.

Setelah itu peneliti kemudian membagikan kuesioner pada tiap lansia. Sebelum kuesioner diisi, peneliti menginformasikan tentang tujuan penelitian dan sifat keikutsertaan responden dalam penelitian, cara pengisian kuesioner, dan sebelum responden mengisi seluruh pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian, responden terlebih dahulu menandatangani lembar persetujuan penelitian (*informed consent*). Setelah data hasil penelitian terkumpul, kemudian dilakukan penyuntingan data, pengkodean data, dan

entri data ke dalam master tabel. Data kemudian diolah menggunakan program SPSS. Dari hasil pengolahan disajikan kedalam tabel frekuensi dan distribusi serta penjelasan dalam bentuk narasi.

2. Hubungan Usia dengan Kejadian Hipertensi Stadium 1 dan 2 pada Lansia

Berdasarkan tabel 4.2 hasil analisis hubungan antara usia dengan hipertensi pada lansia diketahui bahwa dari 70 responden yang berusia dewasa akhir terdapat 17 responden (85%) yang hipertensi stadium 1 dan 3 responden (15%) yang hipertensi stadium 2. Sedangkan pada lansia akhir terdapat 11 responden (39.3%) yang hipertensi stadium 1 dan 17 responden (60.7%) yang hipertensi stadium 2.

Berdasarkan hasil uji chisquare diatas diperoleh bahwa pada usia dewasa akhir 17 responden (85%) lebih banyak yang mengalami hipertensi stadium 1 sedangkan hipertensi stadium 2 dialami pada rentan usia lansia akhir sebanyak 17 responden (60,7%)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kiki,2016), bahwa tidak ada hubungannya antara usia dengan tingkat hipertensi pada lansia dengan nilai *p value* 0,342 ($>0,05$). Tidak adanya hubungan usia dengan hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia, pada penelitian ini bisa terjadi karena ada faktor lain yang secara langsung mempengaruhi tekanan darah pada lansia adalah stress. Faktor stres seperti kurang tidur dapat memicu masalah hipertensi dan dapat turun lagi pada saat tidur. Stres tidak menyebabkan hipertensi yang menetap, tetapi stress berat dapat menyebabkan

kenaikan tekanan darah yang bersifat sementara yang sangat tinggi. Jika periode stres sering terjadi maka akan mengalami kerusakan pada pembuluh darah dan menyebabkan hipertensi (Melissa, 2016).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herzina pada tahun 2017 tentang faktor risiko kejadian penyakit hipertensi di Puskesmas Basuki Rahmat Palembang, bahwa responden yang berumur ≥ 56 tahun lebih berisiko menderita hipertensi dibandingkan dengan responden < 56 tahun. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa setelah umur 55 tahun, dinding arteri akan mengalami penebalan karena adanya penumpukan zat kolagen pada lapisan otot sehingga pembuluh darah akan menyempit dan menjadi kaku (Yugiantoro & Muhammad, 2010).

Bertambahnya umur seseorang maka terjadi penurunan fungsi fisiologis dan daya tahan tubuh yang terjadi karena proses penuaan yang dapat menyebabkan seseorang rentan terhadap penyakit salah satunya yaitu hipertensi (Kemenkes RI, 2013). Semakin lanjut usia seorang, maka tekanan darah semakin tinggi karena beberapa faktor seperti elastisitas pembuluh darah yang berkurang, fungsi ginjal sebagai penyeimbang tekanan darah akan menurun.

Namun berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti berasumsi bahwa dari penelitian ini adanya hubungan antara usia dengan hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia. Hal ini terjadi karena jumlah responden pada hipertensi stadium 2 memiliki jumlah terbanyak yaitu 17 responden pada rentan usia lansia akhir.

Dan didukung telah diuji *Chi Square* didapatkan nilai *p value* = 0,004 yang artinya adanya hubungan antara usia dengan hipertensi.

3. Hubungan Konsumsi Garam dengan Hipertensi Stadium 1 dan 2 pada Lansia

Berdasarkan tabel 4.3 hasil analisis hubungan antara konsumsi garam dengan hipertensi pada lansia diketahui bahwa dari 70 responden yang mengonsumsi garam kurang terdapat 30 responden (61,2%) mengalami hipertensi stadium 1 dan 19 responden (38,8%) yang hipertensi stadium 2. Sedangkan yang mengonsumsi garam berlebih terdapat 13 responden (61,9%) yang hipertensi stadium 1 dan 8 responden (38,1%) yang hipertensi stadium 2.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Martati (2013) tidak terdapat hubungan antara konsumsi garam dengan hipertensi. Hal ini disebabkan karena hipertensi pada kelompok yang memiliki kebiasaan mengonsumsi garam ≤ 3 kali dalam seminggu dan ≥ 3 kali dalam seminggu adalah 1,240 ($p = 0,074$), artinya kebiasaan mengonsumsi garam bukan sebagai faktor resiko terjadinya hipertensi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Djauhar (2013) dengan nilai *p value* 0,324 ($p > 0,05$)., Tidak adanya hubungan asupan garam dengan hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia pada penelitian ini bisa terjadi karena ada faktor lain yang secara langsung mempengaruhi tekanan darah pada lansia adalah pola makanannya. Pola makan dapat diartikan suatu sitem, cara kerja atau usaha untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, pola

makan yang sehat dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan kegiatan makan secara sehat. Pola makan juga ikut menentukan kesehatan bagi tubuh. Penelitian yang dilakukan oleh Maria, dkk. (2012) hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan antara asupan natrium dengan hipertensi, hasilnya menunjukkan nilai $p = 0,625 (>0,05)$.

Menurut Gunawan (2006) pola konsumsi garam yang tinggi dapat menyebabkan hipertensi dan keadaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang mendukung. Konsumsi garam yang tinggi merupakan hal yang sangat penting dalam timbulnya hipertensi, pengaruh asupan garam terhadap hipertensi melalui peningkatan volume plasma (cairan tubuh) dan tekanan darah. Dimana keadaan ini akan diikuti oleh peningkatan ekskresi (pengeluaran) kelebihan garam sehingga akan kembali pada keadaan hemodinamik (sistem peredaran), jika tidak terjadi hemodinamik maka akan memperberat kerja jantung untuk memompa darah keseluruh tubuh karena terdapat tahanan akibat retensi oleh tingginya kadar garam tersebut (Ina SH, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti berasumsi bahwa dari penelitian ini, pada saat penelitian ini berlangsung di masyarakat Kelurahan Sapayabanyak yang mengkonsumsi asupan garam khususnya pada responden yang pada penelitian ini terdapat 30 responden yang termasuk kurang dalam mengkonsumsi asupan garam dan terdapat 13 responden yang lebih mengkonsumsi asupan garam. Dan pada saat diolah dengan menggunakan SPSS pada hasil analisis uji chi-square didapatkan persentase pada

mengonsumsi garam dengan hipertensi stadium 1 adalah 61,4%. Sedangkan terdapat 19 responden yang mengonsumsi garam kurang dan 8 responden yang termasuk mengonsumsi garam lebih mendapatkan hasil persentase sebanyak 38,6% untuk hipertensi stadium 2. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara konsumsi asupan garam dengan hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia. Tidak dapat di buktikan korelasi signifikan antara konsumsi garam dengan hipertensi, kemungkinan oleh karena faktor sensitifitas seseorang, dan juga disebabkan umumnya responden mengonsumsi garam dalam jumlah yang rendah, melalui pengurangan makanan secara berlebihan, dan hal ini akan memberikan dampak merugikan.

4. Hubungan Obesitas dengan Hipertensi Stadium 1 dan 2 pada Lansia

Berdasarkan tabel 4.4 hasil analisis hubungan antara obesitas dengan hipertensi pada lansia diketahui bahwa dari 70 responden yang obesitas terdapat 6 responden (46,2%) mengalami hipertensi stadium 1 dan 7 responden (53,8%) mengalami hipertensi stadium 2. Sedangkan yang tidak obesitas terdapat 37 responden (64,9%) yang hipertensi stadium 1 dan 20 responden (35,1%) yang hipertensi stadium 2.

Obesitas adalah akumulasi abnormal lemak tubuh yang dapat menyebabkan resiko bagi kesehatan. Dikatakan obesitas adalah jika berat badan seseorang melebihi batas normal yaitu ≥ 25 kg/m², berat badan tersebut diukur dengan satuan Indeks Massa Tubuh (WHO). Selain itu, dapat

dijelaskan pula bahwa obesitas akan meningkatkan reabsorpsi natrium di ginjal yang menyebabkan naiknya tekanan darah.

Berdasarkan hasil penelitian (Yogi, 2019) obesitas tidak menunjukkan hubungan dengan hipertensi yang didapatkan nilai p value $0,289 > \alpha 0,05$ ini menyatakan tidak ada hubungan obesitas dengan hipertensi di wilayah kerja palaran. Hasil ini didapat karena penyebab hipertensi multifaktoral dan obesitas merupakan penyebabnya. Hubungan antara obesitas dan hipertensi telah lama diketahui namun mekanisme bagaimana terjadinya hipertensi akibat obesitas hingga saat ini belum jelas.

Obesitas merupakan faktor risiko hipertensi yang dikaitkan dengan gaya hidup tidak sehat, obesitas merupakan salah satu faktor risiko akibat dari perubahan gaya hidup yang cenderung bermalas-malasan beraktivitas dan banyaknya restoran *junkfood* di Indonesia. Penyebab hipertensi multifactorial dan obesitas merupakan salah satu penyebabnya. Hubungan antara obesitas dan hipertensi telah lama diketahui namun mekanisme bagaimana terjadinya hipertensi akibat obesitas hingga saat ini belum jelas. Sebagian peneliti menitik beratkan patofisiologi tersebut pada tiga hal utama yaitu adanya gangguan sistem autonom, resistensi insulin serta abnormalitas struktur dan fungsi pembuluh darah. Pathogenesis obesitas sehingga mengakibatkan suatu hipertensi merupakan hal yang kompleks karena penyebabnya ada banyak faktor dan saling berhubungan. Leprin, asam lemak bebas dan insulin serta *obstructive sleep apnea* yang meningkat pada orang yang obesitas akan menyebabkan konstriksi dan aktivitas saraf simpatik ginjal, resistensi insulin

dan hiperaktivitas sistem renin angiotensin menjadikan reabsorpsi natrium pada ginjal meninggi. Semua faktor diatas akan mengakibatkan terjadinya hipertensi (Hadiputra Yogi, 2020).

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini didukung ketika peneliti melakukan wawancara dengan lansia mengenai status obesitas meliputi pola makan, aktivitas fisik sehari –hari. Karena kebanyakan responden yang beraktifitas fisik baik, sehingga kalori dan energi yang dikeluarkan sama banyak dengan asupan yang diterima oleh tubuh. Jika berat badan seseorang bertambah, volume darah akan bertambah pula, sehingga menyebabkan hipertensi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa obesitas tidak ada hubungan dengan hipertensi yang mendapatkan *p value* = 0,174.

5. Hubungan Aktifitas Fisik dengan Hipertensi Stadium 1 dan 2 pada Lansia

Berdasarkan tabel 4.5 hasil analisis hubungan antara aktifitas fisik dengan hipertensi pada lansia diketahui bahwa dari 70 responden yang beraktifitas fisik baik terdapat 39 responden (62,9%) mengalami hipertensi stadium 1 dan 23 responden (37,1%) mengalami hipertensi stadium 2. Sedangkan yang beraktifitas buruk terdapat 4 responden (50%) yang hipertensi stadium 1 dan 4 responden (50%) yang hipertensi stadium 2.

Aktivitas Fisik adalah rangkaian gerakan otot yang menghasilkan energi dari pembakaran kalori. Kurangnya aktivitas fisik menaikkan risiko tekanan darah tinggi karena bertambahnya risiko untuk menjadi gemuk.

Orang-orang yang tidak aktif cenderung mempunyai detak jantung lebih cepat dan otot jantung mereka harus bekerja lebih keras pada setiap kontraksi, semakin keras dan sering jantung harus memompa semakin besar pula kekuatan yang mendesak arteri. (Bianti Nuraini, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Anggara, 2013 juga menyebutkan ada hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik dengan hipertensi dengan nilai p value 0,000 dan berolahraga tidak teratur memiliki resiko hipertensi, dengan RP sebesar 44,1 kalo dibandingkan dengan orang yang memiliki aktivitas fisik cukup atau olahraga secara teratur.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudartinah (2012) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi. Namun walaupun tidak terdapat hubungan namun didapatkan hasil responden yang memiliki aktivitas ringan beresiko 1,843 untuk terkena hipertensi dibandingkan dengan responden yang memiliki aktivitas fisik yang tinggi. Hal ini sesuai yang penelitian yang dilakukan oleh Sarasaty (2011) yang mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi pada lansia. Berdasarkan pengukuran tekanan darah diastoliknyanya, lansia yang memiliki aktivitas fisik ringan juga cenderung mengalami hipertensi dari pada lansia yang memiliki aktifitas fisik sedang. Terdapat 43,2% subjek yang termasuk dalam kategori aktivitas fisik ringan yang menderita hipertensi. Lansia yang aktifitas fisiknya sedang tekanan darahnya cenderung dalam kategori normal, 100% subjek yang aktifitas fisiknya sedang tekanan darahnya termasuk dalam kategori

normal. Hasil uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan uji *Rank Spearman* diperoleh nilai p sebesar 0,321 ($p > 0,05$), maka H_0 diterima sehingga tidak terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan tekanan darah diastolik pada lansia di Kelurahan Makamhaji. Secara statistik hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah sistolik dan diastolik lansia pada penelitian ini tidak terdapat hubungan. Banyak faktor-faktor lain yang secara langsung dapat mempengaruhi tekanan darah pada lansia salah satunya yaitu status gizi lansia.

Aktivitas fisik secara teori mempengaruhi tekanan darah seseorang, semakin sering seseorang melakukan aktivitas fisik maka semakin kecil resiko terkena hipertensi. aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dan tepat dengan frekuensi dan lamanya waktu yang sesuai akan membantu seseorang dalam menurunkan tekanan darahnya. Aktivitas yang cukup dapat membantu menguatkan jantung sehingga dapat memompa darah lebih baik. Semakin ringan kerja jantung semakin sedikit tekanan pada pembuluh darah arteri sehingga mengakibatkan tekanan darah menurun (Suiraoaka, 2012). Kurangnya aktivitas fisik juga dapat meningkatkan risiko kelebihan berat badan yang akan menyebabkan risiko hipertensi meningkat (Triyanto, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti berasumsi bahwa dari hasil penelitian ini, kebiasaan olahraga tidak didapatkan hasil yang signifikan. Setelah dianalisis secara bersama-sama kebiasaan olahraga tidak terbukti sebagai faktor risiko hipertensi, Hal ini karena pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa responden yang melakukan aktivitas fisik pada

hipertensi stadium 1 adalah 39 responden dan yang tidak melakukan aktivitas fisik 4 responden. Sedangkan pada hipertensi stadium 2 yang melakukan aktivitas fisik 23 responden dan yang tidak melakukan aktivitas fisik 4 responden. Hal ini merupakan alasan mengapa tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia, dan setelah dilakukan *uji spss chi square* didapatkan nilai $p=0,702 (<0,05)$.

Seperti yang telah diriwayatkan HR. Bukhari mengenai kesehatan:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Yang artinya;

Dua nikmat, kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. (HR.Bukhari no. 6412)

Nikmat sering kali dilalaikan oleh manusia adalah nikmat sehat dan waktu senggang, hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, “ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang”. (HR. Bukhari no. 6412, dari Ibnu Abbas). Seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat, dan barang siapa yang memiliki dua hal tersebut yaitu waktu senggang dan sehat hendaknya ia bersemangat dan jangan sampai tertipu dengan meninggalkan rasa syukur pada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, namun ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan urusan dunianya. Terkadang, manusia memiliki waktu luang, namun ia tidak dalam keadaan sehat. Apabila terkumpul pada manusia waktu luang dan nikmat sehat,

sesungguhnya akan datang rasa malas dan melakukan amalan ketaatan. Dan mereka itulah manusia yang tertipu dan terpedaya.

Barang siapa yang memanfaatkan waktu luang dan nikmat sehat dalam rangka melakukan ketaatan, maka dialah yang akan bahagia. Dunia merupakan lading untuk beramal, hendaklah benar-benar dijadikan renungan untuk senantiasa meningkatkan amal untuk meraih lading pahala diakhirat kelak. Sesudah waktu luang akan datang waktu penuh kesibukan, sesudah sehat akan ada kondisi tidak menyenangkan, jadi gunakan waktu luang dan nikmat sehat dengan lebih baik.

D. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini hanya mengontrol beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya hipertensi yaitu usia, jenis kelamin, hipertensi, konsumsi garam obesitas dan aktivitas fisik. Adapun faktor yang tidak di kontrol yaitu riwayat keluarga dan merokok.
2. Sulitnya mengumpulkan responden dalam satu tempat, karena kesibukan sehingga peneliti harus menemui sebagian responden di rumah masing-masing.
3. Kurangnya pengetahuan responden dalam pengisian kuesioner karena kebanyakan responden tidak bisa menulis dan membaca

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat peneliti kemukakan adalah:

1. Usia merupakan faktor resiko kejadian Hipertensi pada lansia di Kelurahan Sapaya dengan nilai *p value* = 0,004. Dengan nilai *p value* kurang dari 0,005 berarti faktor usia merupakan faktor resiko kejadian hipertensi dengan prevalensi Dewasa Akhir 17 responden dengan hipertensi stadium 1 (85%) dan di lansia akhir dengan hipertensi stadium 2 (60.7%).
2. Tidak terdapat hubungan signifikan antara konsumsi garam dengan kejadian hipertensi pada lansia dengan *p value* 0,588 ($p > 0,05$)
3. Tidak terdapat hubungan signifikan antara obesitas dengan kejadian hipertensi pada lansia dengan *p value* 0,174 ($p > 0,05$)
4. Tidak terdapat hubungan signifikan antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi pada lansia dengan *p value* 0,368 ($p > 0,05$)

B. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti masih menemukan berbagai keterbatasan penelitian, diantaranya adalah jumlah buku-buku kepustakaan yang masih sedikit terkait judul penelitian dan jumlah sampel yang cenderung homogeny serta waktu yang terbatas. Oleh sebab itu peneliti menyarankan:

1. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, pembelajaran dan pemahaman di institusi pelayanan kesehatan tentang faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada lansia.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Bagi institusi pendidikan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan agar informasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk memperkaya pengetahuan dan keperluan referensi ilmu keperawatan tentang faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi.

3. Bagi Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sapaya Kab.Gowa.

Berdasarkan data-data yang didapatkan dari penelitian ini maka disarankan kepada masyarakat di Wilayah Kelurahan Sapaya perlunya pencegahan terjadinya hipertensi sedini mungkin terutama masyarakat yang memiliki faktor risiko untuk terjadinya penyakit hipertensi melalui perbaikan pola hidup, perlunya pemeriksaan tekanan darah, pengobatan secara rutin, dan menjalani pola hidup yang sehat. Penelitian seperti kohort, yang dapat mengetahui sebab akibat antara faktor yang diteliti dengan kejadian hipertensi pada lansia, dan untuk penelitian selanjutnya biasa menggunakan sampel yang lebih besar dan bisa meneliti faktor lain yang menyebabkan hipertensi diantaranya stress, pola makan, status gizinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- A. J. Ramadhan. (2010). *Mencermati Berbagai Gangguan pada Darah dan Pembuluh Darah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bustan. M.N. 2016. *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bustan. 2015. *Manajemen Pengendalian Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: Rineka Cipta
- Casey, Anggi, Benson, Herbert. 2012. *Menurunkan Tekanan Darah*. Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Damayanti, Deni. 2013. *Panduan Lengkap Menyusun Proposal, Skripsi, Disertasi*. Yogyakarta : Alaska.
- Depkes RI, 2013. *Gambaran Epidemiologi Penyakit Hipertensi* , Jakarta:Depkes RI
- Dinkes Prov. Sulsel. 2015. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2016*. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- Dewi, Sofia, dan Digi familia, 2010. *Hidup bahagia dengan Hipertensi*. Jakarta : A+Plus Book.
- Fitrina, 2014. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Usia Lanjut Di Wilayah Kerja Puskesmas Kebun Sikolos Kecamatan Padang Panjang Barat*.
- Gan, Sulistia Gunawan. 2011. *Farmakologi Dan Terapi, Edisi 5*. Badan Penerbit FKUI Jakarta.
- Hadiputra Yogi & Nugroho Purwo setiyo. 2020. *Hubungan Obesitas Umum dan Obesitas Sentral dengan Kejadian Hipertensi Di Puskesmas Palaran*. Vol.1 No.2. Borneo Student Research.
- InaSh, 2014. *Hipertensi Bukan Sekedar Tekanan Darah Tinggi*.
- Kemenkes RI. 2014. *Infodatin Hipertensi*. Jakarta : Kementrian Kesehatan RI.

- Khasanah. (2012). *Waspada Beragam Penyakit Gegeneratif Akibat Pola Makan*. Yogyakarta: Laksana.
- Manurung, Marnaek Irfan A. 2016. *Karakteristik Penderita Hipertensi Dengan Komplikasi Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014*. Medan : Skripsi
- Martha. 2012. *Panduan Cerdas Mengatasi Hipertensi*. Jogjakarta : Araska.
- Masriadi, H. 2016. *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*. Jakarta : CV. Trans Info Media, Hal. 359-370.
- Medika, T.B. 2017. *Berdamai dengan Hipertensi*. Jakarta: Bumi Medika Misnadiarly. *Obesitas Sebagai Faktor Resiko Beberapa Penyakit*. Jakarta: Pustaka Obor Populer; 2007:134-146.
- Nurrahmani, Ulfah, dan Helmanu Kurniadi. 2015. *Gejala Penyakit Jantung Koroner, Kolesterol Tinggi, Diabetes Mellitus, Hipertensi*. Yogyakarta : Istana Media.
- Notoadmodjo. (2010). *Promosi Kesehatan dan Teori Aplikasi. Edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pudiastuti, R.D. 2013. *Penyakit-Penyakit Mematikan*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Putra, Sitiatava Rizema. 2012. *Panduan Riset Keperawatan Dan Penulisan Ilmiah*. Jogjakarta: D-Medika
- Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). 2018. *Prevalensi Hipertensi di Indonesia*
- Sarasty (2011) *Hubungan karakteristik (Umur, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan) dan Aktivitas Fisik dengan Tekanan Darah Pada Lansia di Kelurahan Makamhaji Kecamatan kartasura Kabupaten Sukaharjo*.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Vol.5 Jakarta: Lentera Hati
- Suiraoaka. 2012. *Mengenal, Mencegah dan Mengurangi Faktor Risiko 9 Penyakit Degeneratif*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian : Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru

- Sugianto, 2009. *Model-model Pembelajaran inovatif*. Surakarta : panitia Sertifikasi Guru (PSG) Raayan 13 Surakarta
- Sumardiyono, dkk. 2018. *Hubungan Lingkar Pinggang dan Lingkar Panggul dengan Tekanan Darah pada Pasien dengan Pengelolaan Penyakit Kronis (Porlanis)*. Volume 1. Nomor 1. Smart Medical Journal
- Triyanto E. 2014. *Pelayanan Keperawatan Bagi Penderita Hipertensi Secara Terpadu*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Towsend, Mc. 2010. *Diagnosis Keperawatan Psikiatri Rencana Asuhan Dan Medikasi Psikotropik*. Jakarta : EGC
- World Health Organization (WHO). 2015 *World Health Statistic*. Geneva
- Yuda Putu, 2011. *Deteksi Dini dan Pencegahan Hipertensi dan Stroke*, Yogyakarta:Media Pressindo.
- Yugiantoro, Muhammad. 2010. *Hipertensi Esensial: Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. FKUI. Jakarta.
- Zauhani K, Zainal M. 2012. *Efek Pemberian Jus Mentimun Terhadap Penurunan tekanan darah*. Available From: Academia.edu.



LEMBAR PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN

Kepada :

Yth. Bapak dan Ibu calon responden

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhayati

Nim : 70300115013

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Sapaya”

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesedian dari Bapak Ibu, Saudara (i) untuk menjadi respon dalam penelitian ini dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. Selanjutnya saya mengharapkan Bapak Ibu, Saudara (i) untuk mengikuti prosedur tindakan yang kami berikan dan jawaban anda dijamin kerahasiaannya dan penelitian ini akan bermanfaat semaksimal mungkin untuk mendapatkan treatment tanpa ada kerugian. Jika Bapak Ibu, Saudara (i) tidak bersedia menjadi responden, tidak ada sanksi bagi Bapak Ibu, Saudara (i).

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Peneliti

(Nurhayati)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

(Informed Consent)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia dan tidak keberatan menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas nama Nurhayati, dengan judul “faktor – faktor risiko kejadian hipertensi di wilayah kerja puskesmas sapaya” Saya berharap penelitian ini tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga pertanyaan yang akan saya jawab benar-benar dirahasiakan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk diperlukan sebagaimana mestinya.



Gowa, , 2020

Responden

()

LEMBAR KUESIONER
FAKTOR – FAKTOR RISIKO KEJADIAN HIPERTENSI DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS SAPAYA

Isilah tanda silang (x) pada kotak yang telah disediakan !

A. Identitas

Petunjuk pengisian

Isilah data berikut ini dengan benar :

1. Tanggal pengisian kuesioner :
2. Nama :
3. Umur :
4. Jenis kelamin :
5. Alamat :
6. TD :
 - a. Sistol : mmHg
 - b. Diastol : mmHg

B. Komsumsi Garam

FOOD FREQUENSY QUESIONER

No	Bahan makanan yang dikonsumsi	4 – 5 x / hari	6 – 7 x / hari	4-6 x/ minggu	1-3x/minggu

	Garam				
--	-------	--	--	--	--

C. Obesitas

1. Berat Badan (BB) : kg
2. Tinggi Badan (TB) : cm

$$\begin{aligned}
 \text{IMT} &= \frac{\text{BB(kg)}}{\text{TB (m)} \times \text{TB (m)}} \\
 &=
 \end{aligned}$$

3. Status obesitas
 - a. Obesitasn (IMT \geq 25)
 - b. Tidak Obesitas (IMT $<$ 25)

D. Kurangnya Aktifitas Fisik

1. Apakah anda seorang atlet/olahragawan?
 - a. Ya(sebutkan pada bidang olahraga apa)
 - b. Tidak
2. Apakah anda suka berolahraga?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah anda berolahraga seminggu 3 kali ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah durasi anda berolahraga $<$ 30 menit ?
 - a. Ya
 - b. Tidak



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411)868720 Fax.(864923) Makassar
Kampus II : Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Telp 1500363, (0411)841879 Fax.(0411) 8221400 Gowa

Nomor : B-64/FKIK/PP.00.9/02/ 2019

Gowa, 18 Februari 2019

Lamp : -

Hal : Permohonan Pengambilan Data Awal

Yth.

Kepala Puskesmas Sapaya Kab. Gowa

di-

Tempat

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Penelitian mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nurhayati

NIM : 70300115013

Program Studi : Keperawatan

Judul Penelitian : Hubungan Lingkar Pinggang Dengan Kejadian Hipertensi Pada Pasien di Puskesmas Sapaya Kab. Gowa.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa tersebut dapat diberi izin untuk pengambilan data awal untuk penyelesaian proposal penelitian.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Nun Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.

NIP. 19810305 200604 2 003

Tembusan:

- Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Masjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 18 Februari 2020

K e p a d a

Nomor : 070/291 /BKB.P/2020
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Puskesmas Sapaya
Kab. Gowa
Di-

T e m p a t

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
Nomor: 851/S,01/PTSP/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NURHAYATI**
Tempat/Tanggal Lahir : Surokalling, 30 Agustus 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jln. Swadaya

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**FAKTOR-FAKTOR RISIKO KEJADIAN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAPAYA**"

Selama : 19 Februari s/d 19 Maret 2020
Pengikut : Tidak Ada

Schubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **KEPALA BADAN,
SEKRETARIS,**


DRS. ALWI ARIFIN. M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NTP : 19670808 198811 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmun Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No 63, Telp (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : C.007/KEPK/FKIK/I/2020
 Judul Penelitian : Faktor-Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Sapaya
 Nama Peneliti : Nurhayati
 No. Register : U I N A M 2 0 0 1 C 0 0 7

A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A

20 Januari 2020



Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
 198007012006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar Telp. (0411) 868720 fax (0411) 864923
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa Telp. 1500363 (0411) 841879 Fax (0411) 8221400
Email: fki@uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-006/FKIK/PP.00.9/02/2020
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Gowa, // Februari 2020

Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal Provinsi Sul-Sel

di-
Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nurhayati
NIM : 70300115013
Program Studi : Keperawatan
Judul Penelitian : Faktor-Faktor Risiko Kejadian Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Sapaya.
Tempat Penelitian : Puskesmas Sapaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes
2. Hj. Sysnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp., Kep.J

Demikian harapan kami, atas kesediaan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Administrasi Akademik



Handayani

Tembusan :

1. Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar (Sebagai Laporan)
2. Masing-masing Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan


1 2 0 2 0 1 9 1 4 2 0 9 4 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 851/S.01/PTSP/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-806/FKIK/PP.00.9/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURHAYATI**
Nomor Pokok : 70300115013
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" FAKTOR FAKTOR RISIKO KEJADIAN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAPAYA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **19 Februari s/d 19 Maret 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 14 Februari 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

SIMAP PTSP 14-02-2020

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Dewasa Akhir	20	28,6	28,6	28,6
Valid Lansia Awal	22	31,4	31,4	60,0
Valid Lansia Akhir	28	40,0	40,0	100,0
Total	70	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	24	34,3	34,3	34,3
Valid Perempuan	46	65,7	65,7	100,0
Total	70	100,0	100,0	

Hipertensi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Hipertensi Stadium 1	43	61,4	61,4	61,4
Valid Hipertensi Stadium 2	27	38,6	38,6	100,0
Total	70	100,0	100,0	

Konsumsi Garam

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang	49	70,0	70,0	70,0
Valid Lebih	21	30,0	30,0	100,0
Total	70	100,0	100,0	

Obesitas 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Obesitas	13	18,6	18,6	18,6
Valid Tidak Obesitas	57	81,4	81,4	100,0
Total	70	100,0	100,0	

Aktifitas Fisik 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Baik	62	88,6	88,6	88,6
Valid Buruk	8	11,4	11,4	100,0
Total	70	100,0	100,0	

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Umur	,258	70	,000	,784	70	,000
Jenis Kelamin	,420	70	,000	,600	70	,000
Hipertensi	,399	70	,000	,617	70	,000
Konsumsi Garam	,442	70	,000	,576	70	,000
Obesitas 1	,497	70	,000	,473	70	,000
Aktifitas Fisik 1	,525	70	,000	,369	70	,000

a. Lilliefors Significance Correction

UJI CHISQURE

Umur * Hipertensi Crosstabulation

		Hipertensi		Total	
		Hipertensi Stadium 1	Hipertensi Stadium 2		
Umur	Dewasa Akhir	Count	17	3	20
		% within Umur	85,0%	15,0%	100,0%
	Lansia Awal	Count	15	7	22
		% within Umur	68,2%	31,8%	100,0%
	Lansia Akhir	Count	11	17	28
		% within Umur	39,3%	60,7%	100,0%
Total	Count	43	27	70	
	% within Umur	61,4%	38,6%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,908 ^a	2	,004
Likelihood Ratio	11,400	2	,003
Linear-by-Linear Association	10,525	1	,001
N of Valid Cases	70		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,71.

Konsumsi Garam * Hipertensi Crosstabulation

		Hipertensi		Total	
		Hipertensi Stadium 1	Hipertensi Stadium 2		
Konsumsi Garam	Kurang	Count	30	19	49
		% within Konsumsi Garam	61,2%	38,8%	100,0%
	Lebih	Count	13	8	21
		% within Konsumsi Garam	61,9%	38,1%	100,0%
Total	Count	43	27	70	
	% within Konsumsi Garam	61,4%	38,6%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,003 ^a	1	,957		
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,003	1	,957		
Fisher's Exact Test				1,000	,588
Linear-by-Linear Association	,003	1	,958		
N of Valid Cases	70				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,10.

b. Computed only for a 2x2 table

Obesitas 1 * Hipertensi Crosstabulation

		Hipertensi		Total	
		Hipertensi Stadium 1	Hipertensi Stadium 2		
Obesitas 1	Obesitas	Count	6	7	13
		% within Obesitas 1	46,2%	53,8%	100,0%
Tidak Obesitas	Tidak Obesitas	Count	37	20	57
		% within Obesitas 1	64,9%	35,1%	100,0%
Total	Total	Count	43	27	70
		% within Obesitas 1	61,4%	38,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,572 ^a	1	,210		
Continuity Correction ^b	,880	1	,348		
Likelihood Ratio	1,535	1	,215		
Fisher's Exact Test				,226	,174
Linear-by-Linear Association	1,550	1	,213		
N of Valid Cases	70				

- a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,01.
 b. Computed only for a 2x2 table

Aktifitas Fisik 1 * Hipertensi Crosstabulation

		Hipertensi		Total	
		Hipertensi Stadium 1	Hipertensi Stadium 2		
Aktifitas Fisik 1	Baik	Count	39	23	62
		% within Aktifitas Fisik 1	62,9%	37,1%	100,0%
	Buruk	Count	4	4	8
		% within Aktifitas Fisik 1	50,0%	50,0%	100,0%
Total		Count	43	27	70
		% within Aktifitas Fisik 1	61,4%	38,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,498 ^a	1	,480		
Continuity Correction ^b	,102	1	,749		
Likelihood Ratio	,486	1	,486		
Fisher's Exact Test				,702	,368
Linear-by-Linear Association	,491	1	,484		
N of Valid Cases	70				

- a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,09.
 b. Computed only for a 2x2 table

DOKUMENTASI



