

**GAMBARAN HYGIENE PERORANGAN, SANITASI LINGKUNGAN  
SEKOLAH, DAN INFEKSI KECACINGAN PADA MURID  
SD INPRES CAMBAYA SUNGGUMINASA GOWA**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat (SKM) Jurusan Kesehatan Masyarakat  
pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
SITI AMIRAWATI AMRI  
M A 70200108080 A R

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Amirawati Amri  
Nim : 70200108080  
Jurusan : Kesehatan Masyarakat  
Alamat : Jl. Swadaya No. 33 Sungguminasa  
Judul : Gambaran Hygiene Perorangan, Sanitasi Lingkungan Sekolah, dan Infeksi Kecacangan pada Murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa.

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Desember 2012

Penyusun,

**Siti Amirawati Amri**  
**NIM: 70200108080**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Gambaran Hygiene Perorangan, Sanitasi Lingkungan Sekolah, dan Infeksi Kecacingan pada Murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa*” yang disusun oleh **Siti Amirawati Amri NIM : 70200108080** mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2012**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

### DEWAN PENGUJI



**Ketua** : **Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes** (.....)

**Sekretaris** : **Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes** (.....)

**Pembimbing I** : **Andi Susilawaty, S.Si, M.Kes** (.....)

**Pembimbing II**: **Emmy Bujawaty, SKM, M.Kes** (.....)

**Penguji I** : **Erlani, SKM, M.Kes** (.....)

**Penguji II** : **Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag** (.....)

Samata Gowa, 4 Januari 2013

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

**Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes**  
**NIP. 19530119 198110 1 001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salam dan shalawat atas junjungan Nabi Muhammad saw sebagai rahmatan lil al-amin yang telah mengantarkan umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program S1 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, M.Ph, M.Kes selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes selaku ketua prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Emmi Bujawati SKM.,M.Kes selaku pembimbing II telah memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Erlani SKM.,M.Kes dan Bapak Prof. Dr. Sabri Samin S.Ag selaku tim penguji sekaligus pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muh. Arfah S.Pd selaku kepala SD Inpres Cambaya beserta staf dan guru atas bantuan dan kerja samanya selama penelitian.
7. Teristimewa, sembah sujud dan hormatku kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Amri Samad dan Ibunda Hj. Mursilawati serta adik-adik ku tersayang Aqmal Reza, Azwar Ali, Zaenal Arief, dan Zaskia yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan baik moril maupun materil, do'a dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Sahabat-sahabatku Nurfaidah, Miftahun Nur, Nur Suci, Hasmiati, dan Fahnita, Megawati, dan Amal yang selalu setia memberi bantuan dan dukungan, serta atas canda tawa yang mengisi hari-hari penulis yang tak akan terlupakan.
9. Teman-teman seperjuangan, Adnan, Ichal, Vovy, Bu aji, Afrhy, Yuyun, atas semangat dan perjuangan yang telah dilalui.
10. Teman-teman jurusan Kesmas 08 dan Kesling 08 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan serta hari-hari penuh semangat yang telah dilalui bersama.

Penulisan skripsi ini telah dilakukan secara maksimal. Untuk itu perlu perbaikan penyusunan oleh pembaca bilamana di dalamnya terdapat kekeliruan.

Terima kasih atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan semoga mendapat balasan yang setimpal disisi Allah swt. Amin.

Makassar, Desember 2012

Penulis,

Siti Amirawati Amri



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>JUDUL</b> .....   | i   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                                    | ii  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....                   | iii |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                | iv  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                    | vii |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                  | ix  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                 | xi  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                       | xii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                             | 1   |
| A. Latar belakang masalah .....                            | 1   |
| B. Rumusan masalah .....                                   | 4   |
| C. Tujuan penelitian .....                                 | 5   |
| D. Manfaat penelitian .....                                | 6   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                       | 7   |
| A. Tinjauan umum tentang hygiene perorangan .....          | 7   |
| B. Tinjauan umum tentang sanitasi lingkungan sekolah ..... | 19  |
| C. Tinjauan umum tentang kecacingan .....                  | 42  |
| <b>BAB III KERANGKA TEORI</b> .....                        | 58  |
| A. Dasar pemikiran .....                                   | 58  |
| B. Kerangka konsep .....                                   | 59  |
| C. Definisi operasional dan kriteria objektif .....        | 60  |
| <b>BAB IV METODOLOGI PENELITIAN</b> .....                  | 65  |
| A. Jenis penelitian .....                                  | 65  |
| B. Lokasi dan waktu penelitian .....                       | 65  |
| C. Populasi dan sampel .....                               | 65  |
| D. Teknik pengambilan sampel .....                         | 66  |
| E. Teknik pengumpulan data .....                           | 66  |
| F. Pengolahan dan penyajian data .....                     | 68  |

|   |      |
|---|------|
| <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b> ..... | 69   |
| A. Gambaran lokasi penelitian.....      | 69   |
| B. Hasil Penelitian .....               | 69   |
| C. Pembahasan.....                      | 79   |
| D. Keterbatasan Penelitian.....         | 92   |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....              | 93   |
| A. Kesimpulan .....                     | 93   |
| B. Saran-saran.....                     | 94   |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....             | xiii |
| <b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b> .....        | xvi  |





## DAFTAR TABEL

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Tabel 1.1 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan membuang tinja murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa .....</b>                        | <b>70</b> |
| <b>Tabel 1.2 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan mencuci tangan setelah buang air besar murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa...</b>   | <b>70</b> |
| <b>Tabel 1.3 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan mencuci tangan setelah buang air kecil murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa ....</b> | <b>71</b> |
| <b>Tabel 1.4 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan mencuci tangan dengan air yang mengalir murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa</b>     | <b>71</b> |
| <b>Tabel 1.5 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa .....</b>      | <b>72</b> |
| <b>Tabel 1.6 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan mencuci tangan sebelum makan murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa ...</b>            | <b>72</b> |
| <b>Tabel 1.7 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan mencuci tangan sesudah makan murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa ...</b>            | <b>73</b> |
| <b>Tabel 1.8 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan mencuci tangan setelah bermain murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa .....</b>        | <b>73</b> |
| <b>Tabel 1.9 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan mencuci tangan murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa .....</b>                        | <b>74</b> |
| <b>Tabel 1.10 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan memakai alas kaki murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa.....</b>                     | <b>74</b> |
| <b>Tabel 1.11 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan memotong kuku murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa.....</b>                         | <b>75</b> |
| <b>Tabel 1.12 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan keberadaan telur cacing murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa.....</b>               | <b>75</b> |
| <b>Tabel 1.13 Hasil observasi keadaan sanitasi lingkungan sekolah SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa.....</b>                                    | <b>76</b> |

**Tabel 1.14 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan membuang tinja dan infeksi kecacingan murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa** ..... 76

**Tabel 1.15 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan mencuci tangan dan infeksi kecacingan murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa** ..... 77

**Tabel 1.16 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan memakai alas kaki dan infeksi kecacingan murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa** ..... 77

**Tabel 1.17 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan memotong kuku dan infeksi kecacingan murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa** ..... 78



## DAFTAR GAMBAR

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Gambar 1 : Contoh Jamban Cemplung .....</b>                    | <b>24</b> |
| <b>Gambar 2 : Contoh Jamban Tangki Septik/Leher Angsa .....</b>   | <b>25</b> |
| <b>Gambar 3 : Daur Hidup <i>Ascaris lumbricoides</i> .....</b>    | <b>47</b> |
| <b>Gambar 4 : Daur hidup <i>Ancylostoma duodenale</i> .....</b>   | <b>49</b> |
| <b>Gambar 5 : Daur hidup <i>Trichuris trichiura</i> .....</b>     | <b>51</b> |
| <b>Gambar 6 : Daur hidup <i>Enterobius vermicularis</i> .....</b> | <b>52</b> |
| <b>Gambar 7 : Daur hidup <i>Trichinella spiralis</i> .....</b>    | <b>54</b> |



## ABSTRAK

**NAMA** : SITI AMIRAWATI AMRI  
**NIM** : 70200108080  
**JUDUL** : GAMBARAN HYGIENE PERORANGAN, SANITASI LINGKUNGAN SEKOLAH, DAN INFEKSI KECACINGAN PADA MURID SD INPRES CAMBAYA SUNGGUMINASA GOWA

---

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dan tujuan nasional. infeksi kecacingan merupakan infeksi kronik yang paling banyak menyerang balita dan anak usia sekolah dasar dengan prevalensi tinggi. prevalensi penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit seperti cacing menyerang anak balita dan anak sekolah mencapai 70% sampai 90% di Indonesia. penyakit itu memang tidak mematikan, namun dapat menggerogoti kesehatan dan menurunkan mutu sumber daya manusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran hygiene perorangan, sanitasi lingkungan sekolah, dan infeksi kecacingan pada murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa. jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan observasional. analisis diarahkan untuk mendeskripsikan hygiene perorangan, sanitasi lingkungan sekolah, dan infeksi kecacingan. populasi dalam penelitian ini adalah semua murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa. teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sampel yang diambil sebanyak 40 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hygiene perorangan siswa belum baik serta sanitasi lingkungan disekolah tersebut belum memenuhi syarat. angka murid yang terinfeksi kecacingan sebesar 82,5% dan yang tidak terinfeksi kecacingan sebesar 17,5%.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa infeksi kecacingan pada murid dipengaruhi oleh hygiene perorangan dan sanitasi lingkungan. untuk itu dianggap perlunya penyuluhan kesehatan khususnya dalam bidang kesehatan lingkungan yaitu hygiene perorangan dan sanitasi lingkungan sekolah.

**Kata Kunci** : hygiene perorangan, sanitasi lingkungan sekolah , infeksi kecacingan.

**Daftar Pustaka** : 27 (1983-2010).

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dan tujuan nasional. Untuk mencapai hal tersebut di atas, diselenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah program pemberantasan penyakit menular yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, kecacatan, dan mencegah penyebaran penyakit (Depkes RI, 1999).

Sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, Indonesia masih menghadapi masalah tingginya prevalensi penyakit infeksi terutama yang berkaitan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang belum baik. Salah satu penyakit yang insidensinya masih tinggi adalah infeksi cacingan dimana penyakit tersebut merupakan salah satu penyakit yang berbasis lingkungan (Depkes RI, 2004). Hal ini dapat dimengerti mengingat bahwa Indonesia adalah negara agraris dengan tingkat sosial ekonomi, pengetahuan, keadaan sanitasi lingkungan dan hygiene masyarakat yang masih rendah dan sangat mendukung untuk terjadinya infeksi dan penularan cacing.

Infeksi kecacingan merupakan infeksi kronik yang paling banyak menyerang balita dan anak usia sekolah dasar dengan prevalensi tinggi.

Prevalensi penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit seperti cacing menyerang anak balita dan anak sekolah mencapai 70% sampai 90% di Indonesia. Penyakit itu memang tidak mematikan, namun dapat menggerogoti kesehatan dan menurunkan mutu sumber daya manusia. Ada 3 jenis cacing yang hidup dan berkembang biak sebagai parasit dalam tubuh manusia seperti cacing gelang hidup dengan mengisap sari makanan, cacing cambuk selain mengisap sari makanan juga mengisap darah, sedangkan cacing tambang hidup dengan mengisap darah saja, sehingga penderita akan kurus dan kurang gizi, pada gilirannya menjadi lebih mudah lelah, malas belajar, daya tangkap menurun, bahkan mengalami gangguan pencernaan (diare) yang berujung pada rendahnya mutu sumber daya manusia dan merosotnya produktivitas.

Sekitar 60 persen orang Indonesia mengalami infeksi cacing. Kelompok umur terbanyak adalah pada usia 5-14 tahun. Angka prevalensi 60 persen itu, 21 persen di antaranya menyerang anak usia SD dan rata-rata kandungan cacing per orang enam ekor. Data tersebut diperoleh melalui survei dan penelitian yang dilakukan di beberapa provinsi pada tahun 2006. Hasil penelitian sebelumnya (2002-2003), pada 40 SD di 10 provinsi menunjukkan prevalensi antara 2,2 persen hingga 96,3 persen. Sekitar 220 juta penduduk Indonesia cacangan, dengan kerugian lebih dari Rp 500 miliar atau setara dengan 20 juta liter darah per tahun. Penderita tersebar di seluruh daerah, baik di pedesaan maupun perkotaan.

Menurut Rosmini Day, penyakit kecacingan yang ditularkan melalui tanah masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Hal ini masih

terlihat tingginya angka prevalensi kecacingan yaitu berkisar 40%- 60% untuk golongan anak sekolah dasar. Begitu pula penelitian yang dilakukan Hadju dkk, di wilayah kota Makassar, Sulawesi Selatan memperlihatkan 90% anak sekolah menderita penyakit kecacingan. Angka prevalensi ini berbeda-beda dalam setiap penelitian yang dilaksanakan di Indonesia. Namun demikian, secara keseluruhan diperkirakan sebesar 60% anak sekolah dasar menderita infeksi kecacingan.

Anak usia sekolah merupakan golongan masyarakat yang diharapkan dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia yang potensial di masa yang akan datang sehingga perlu diperhatikan dan dipersiapkan untuk dapat tumbuh sempurna baik fisik dan maupun intelektualnya. Dalam hubungan dengan gejala infeksi cacingan, beberapa penelitian ternyata menunjukkan bahwa anak usia sekolah dasar merupakan golongan yang sering terkena gejala infeksi cacingan karena sering berhubungan dengan tanah (Depkes RI, 2004).

Keadaan sanitasi yang belum memadai, keadaan sosial ekonomi yang masih rendah, dan kebiasaan manusia mencemari lingkungan dengan tinjanya sendiri, didukung dengan iklim yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan cacing merupakan beberapa faktor penyebab tingginya prevalensi infeksi cacing usus yang ditularkan melalui tanah di Indonesia (Zit, 2000). Seperti yang dinyatakan oleh Meriyati (1994), masih tingginya angka kesakitan penyakit menular di Indonesia seperti cacingan antara lain

dipengaruhi oleh tidak tersedianya air bersih, tidak adanya sarana pembuangan air limbah, dan kurangnya kebersihan lingkungan perumahan.

Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) belum mencapai hasil yang optimal karena berbagai kendala. Hasil evaluasi pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) pada Dinas Kesehatan Dati 1 Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2006 didapatkan tim pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh kecamatan untuk sumber daya manusia baru mencapai 46,86%, SMP/MTS 38,69%, dan SMU/MA 38,89% (Dinkes Dati 1 SulSel, 2006).

Dari survey awal yang dilakukan penulis, Sekolah Dasar Inpres Cambaya, merupakan salah satu tempat pendidikan yang kondisi kesehatan lingkungannya cukup memprihatinkan, yang berisiko tinggi untuk terinfeksi penyakit kecacangan. Di lain pihak masih sering dijumpai murid yang kurang memperhatikan hygiene perorangan dan menunjukkan gejala terinfeksi cacangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti ingin mengetahui gambaran hygiene perorangan, sanitasi lingkungan sekolah, dan infeksi kecacangan pada murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran hygiene perorangan, sanitasi lingkungan sekolah, dan infeksi kecacangan pada murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa?



### C. Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran hygiene perorangan, sanitasi lingkungan sekolah, dan infeksi kecacingan pada murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa.

#### 2. Tujuan khusus

- a. Untuk memperoleh gambaran tentang kebiasaan membuang tinja dan infeksi kecacingan pada murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa.
- b. Untuk memperoleh gambaran tentang kebiasaan mencuci tangan dan infeksi kecacingan pada murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa.
- c. Untuk memperoleh gambaran tentang kebiasaan memakai alas kaki dan infeksi kecacingan pada murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa.
- d. Untuk memperoleh gambaran tentang kebiasaan memotong kuku dan infeksi kecacingan pada murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa.
- e. Untuk memperoleh gambaran tentang sanitasi lingkungan sekolah SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmiah, terkhusus pada pengetahuan tentang teori dan konsep penyakit kecacangan yang dapat dikembangkan bagi peneliti selanjutnya

2. Manfaat bagi institusi pemerintah

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka perencanaan, perbaikan, dan pengembangan

3. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat membuahkan pokok-pokok pikiran yang kemudian dapat dikembangkan dan disumbangkan untuk menurunkan angka kejadian kecacangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Hygiene Perorangan**

Hygiene adalah usaha kesehatan lingkungan masyarakat yang mempelajari pengertian pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia, upaya mencegah timbulnya penyakit karena pengaruh lingkungan kesehatan tersebut serta membuat kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga terjamin pemeliharaan kesehatan (Azwar, 1992). Sedangkan hygiene perorangan menurut Adam,1992, adalah suatu usaha pengetahuan tentang usaha-usaha kesehatan perorangan untuk:

1. Agar dapat memelihara kesehatan diri
2. Memperbaiki dan mempertinggi nilai kesehatan
3. Mencegah timbulnya penyakit.

Menurut Efendi,1998, kebersihan tubuh (Hygiene perorangan) adalah:

1. Mencuci tangan sesudah bangun tidur dengan sabun, tindakan yang sama harus dilakukan setiap selesai memegang benda-benda kotor termasuk sesudah buang air.
2. Menggosok gigi setiap selesai makan dan bila hendak dan setelah bangun tidur.
3. Memotong kuku sependek-pendeknya.
4. Mandi sedapat mungkin dua kali sehari karena mandi dapat melarutkan keringat, mencegah gatal-gatal dan berbagai penyakit lainnya.

5. Di daerah-daerah yang terbukti banyak terdapat cacing tambang sangat dianjurkan menggunakan alas kaki, cacing tambang dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan apabila kulit dapat ditembus maka masalah cacing tersebut ke dalam tubuh mengikuti aliran darah.

Hygiene dan kebersihan umum yang kurang baik merupakan faktor yang mempermudah penularan kecacingan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Abraham S. Benenson bahwa hygiene perorangan adalah tindakan-tindakan pencegahan terutama yang menyangkut tanggung jawab perorangan untuk memelihara kesehatan dan mencegah atau membatasi penyebaran penyakit infeksi utamanya penyakit-penyakit menular langsung, tindakan-tindakan tersebut meliputi:

1. Mencuci tangan dengan sabun dan air sesudah buang air dan juga setiap akan mengolah makanan dan minuman.
2. Menjauhkan tangan dari benda-benda yang telah digunakan atau yang tidak bersih untuk membersihkan dari mulut, hidung, mata, telinga, dan luka.
3. Menghindarkan penggunaan alat-alat makan, gelas, handuk, sapu tangan, sisir, sikat rambut dan pipa rokok secara bersama-sama yang tidak bersih.
4. Menghindarkan terpaparnya orang lain terhadap percikan dari hidung dan mulut seseorang seperti batuk, bersin, tertawa, atau berbicara.
5. Cuci tangan bersih-bersih sesudah menangani pasien atau benda-benda kepunyaan pasien.

6. Selalu membersihkan diri dengan mandi yang cukup dan menggunakan sabun.

Hygiene perorangan yang berhubungan dengan kejadian kecacingan dalam penelitian ini dibatasi pada pemakaian alas kaki, mencuci tangan sebelum makan, dan kebiasaan memotong kuku.

Dalam Islam, kebersihan dijadikan sebagai akidah dengan sistem yang kokoh bagi seorang muslim, bukan semata-mata takut pada penyakit. Dengan demikian maka kebersihan menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan dari ajaran ibadah dan puasa, bahkan Islam menjadikan dampak dari iman. Demikian hadis Rasulullah Saw dari riwayat Muslim:

النظافة من الإيمان

Artinya:

*“Kebersihan merupakan dampak dari keimanan.”*

Dari hadist tersebut, dikemukakan bahwa nilai iman setingkat lebih tinggi dari nilai Islam semata. Islam merupakan agama yang membawa manusia pada hakikat kesucian. Baik kesucian yang bersifat lahiriah seperti wudhu dan mandi, ataupun kesucian yang sifatnya bathiniah, seperti kesucian hati dan jiwa. Dengan demikian maka seorang muslim tidak diperbolehkan menghadap Allah dalam shalatnya melainkan setelah bersih dari najis dan bakteri yang melekat pada tubuhnya.

Islam merupakan akidah pertama, bahkan norma ilmiah pertama yang memperkenalkan dan memerintahkan prinsip steril yang diidentikkan dengan bersuci (thaharah). Yang dimaksud dengan istilah “bersuci”

(thaharah) adalah membersihkan atau membebaskan sesuatu dari bakteri atau benda yang mengandung bakteri, sedang sesuatu yang kotor, atau mengandung jamur diidentikkan dengan “najis” (Al-Fanjari, 1996:13)

Adapun cara bersuci (thaharah) diterangkan oleh Allah dalam al-Quran Surah al-Maidah/(5) : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya :

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Ayat tersebut mengajak dan menuntun seseorang untuk senantiasa bersuci (*Thaharah*) sebagai langkah untuk mendapatkan anugerah ilahi, yaitu mengantar manusia bertemu dan mengenal Allah swt. Untuk bertemu dan mengenal-Nya diperlukan aneka persiapan menyangkut jiwa, badan, tempat,

dan waktu. Persiapan badan dengan bersuci. Bersuci dalam Islam terbagi menjadi empat yaitu:

- 1) Wudhu ialah membersihkan anggota tubuh tertentu dari najis dan mensucikan diri dari hadats kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah swt. Berikut ini akan dikemukakan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan wudhu.

*Rukun – rukun wudhu*

- a) Niat
- b) Mencuci muka
- c) Mencuci kedua tangan sampai kedua siku
- d) Membasuh kepala
- e) Mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki
- f) Tertib

*Sunnah – sunnah wudhu*

- a) Membaca basmalah di awal wudhu
- b) Mencuci kedua tangan sampai pergelangan
- c) Berkumur-kumur dan mengisap-isap
- d) Menyela jari-jari tangan dan kaki
- e) Sikat gigi
- f) Mencukupkan tiga kali cucian
- g) Memulai dari yang kanan
- h) Memperpanjang gurrah (melebihkan basuhan ke atas siku)
- i) Menggosok-gosok bagian tubuh yang terkena air

- j) Hemat menggunakan air
- k) Membasuh kedua telinga
- l) Berdoa di akhir wudhu

*Makruh – makruh wudhu*

- a) Meninggalkan salah satu sunnah wudhu
- b) Berbicara di saat wudhu
- c) Berwudhu di tempat yang bernajis
- d) Berlebih-lebihan berkumur-kumur dan mengisap-isap bagi yang berpuasa
- e) Berwudhu dengan air yang terkena sinar matahari

*Hal-hal yang membatalkan wudhu*

- a) Keluarnya sesuatu melalui dua jalan
  - b) Hilangnya akal, misalnya mabuk atau gila
  - c) Tidur dalam posisi baring atau duduk dengan bersandar
  - d) Menyentuh kemaluan tanpa pelapis
  - e) Menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa pelapis
- 2) Mandi ialah menyiram air suci ke seluruh anggota tubuh secara merata. Mandi merupakan salah satu cara bersuci dalam islam. Para ulama fikih sepakat mengemukakan dua macam mandi, yaitu mandi wajib dan mandi sunnah.

Mandi wajib dilakukan ketika terjadi salah satu hal yang disebutkan di bawah ini:



- a) Keluarnya mani, baik karena bersetubuh atau karena mimpi
- b) Bertemuinya dua alat kelamin, walaupun tidak keluar mani
- c) Haid dan nifas
- d) Orang yang meninggal tanpa mati syahid
- e) Orang kafir masuk islam
- f) Melahirkan, baik anak yang dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak seperti keguguran.

Mandi sunnah dilakukan apabila seseorang bermaksud melakukan hal-hal yang disebutkan di bawah ini:

- a) Akan melaksanakan shalat Jumat
- b) Akan melaksanakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha
- c) Akan memasuki tanah suci Mekah dan melaksanakan beberapa manasik haji
- d) Akan memandikan mayat
- e) Sadar dari pingsan

*Rukun – rukun mandi*

- a) Niat
  - b) Menyiram tubuh dengan air secara merata
- 3) Tayammum ialah menyegaja atau menjadikan tanah sebagai penyapu muka dan kedua tangan, dengan maksud untuk dapat melakukan ibadah kepada Allah. Para ulama fikih sepakat bahwa tayammum disyariatkan sebagai pengganti wudhu dan mandi dalam hal-hal tertentu.

*Sebab-sebab dibolehkannya tayammum*

- a) Tidak ada air
- b) Tidak ada kemampuan menggunakan air, misalnya sedang sakit atau sedang dalam proses penyembuhan
- c) Kekurangan air, sementara air tersebut sangat dibutuhkan pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang
- d) Takut menggunakan air karena terlalu dingin

*Syarat tayammum*

- a) Sudah masuk waktu shalat
- b) Susah diusahakan mencari air, tetapi tidak menemukan air sedang sudah masuk waktu shalat
- c) Dengan tanah yang suci dan berdebu

*Rukun tayammum*

- a) Niat
- b) Membasuh muka dan kedua tangan dengan merata
- c) Tertib

*Sunnah tayammum*

- a) Membaca basmalah
- b) Mengucapkan dua kalimat syahadat
- c) Mengusap muka dari bagian atas
- d) Mendahulukan mengusap tangan kanan atas tangan kiri
- e) Menipiskan tanah di tangan dengan cara meniup
- f) Menghadap kiblat

*Yang membatalkan tayammum*

- a) Semua yang membatalkan wudhu
- b) Hilangnya sebab-sebab tayammum

*Benda yang dapat digunakan bertayammum*

- a) Tanah
  - b) Debu
- 4) Istinja. Istinja dalam bahasa Arab artinya mencari keselamatan dan dalam ilmu fiqh ialah menghilangkan najis yang keluar dari kedua aurat depan dan belakang dengan memakai air atau batu dan hukumnya wajib.

Beristinja' ada tiga cara, yaitu:

- a) Menggunakan air dan batu
- b) Menggunakan air
- c) Menggunakan batu

Adapun alat yang digunakan untuk bersuci adalah:

- 1) Air
- 2) Tanah
- 3) Batu
- 4) Penyamak

Persiapan waktu dengan ketentuan waktu-waktu shalat, sedangkan persiapan tempat dengan tempat suci dan arah kiblat.

### 1) Kebiasaan membuang tinja

Tinja atau kotoran manusia merupakan media sebagai tempat berkembang dan berinduknya bibit penyakit menular (misal kuman/bakteri, virus dan cacing).

Apabila tinja tersebut dibuang di sembarang tempat, misal di kebun, kolam, sungai, dll maka bibit penyakit tersebut akan menyebar luas ke lingkungan, dan akhirnya akan masuk dalam tubuh manusia, dan berisiko menimbulkan penyakit pada seseorang dan bahkan menjadi wabah penyakit pada masyarakat yang lebih luas.

Mengingat tinja merupakan bentuk kotoran yang sangat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat, maka tinja harus dikelola, dibuang dengan baik dan benar. Untuk itu tinja harus dibuang pada suatu “wadah” atau sebut saja jamban keluarga. Jamban yang digunakan masyarakat bisa dalam bentuk jamban yang paling sederhana, dan murah, misal jamban cemplung, atau jamban yang lebih baik, dan lebih mahal misal jamban leher angsa dari tanah liat, atau bahkan leher angsa dari bahan keramik. prinsip utama tempat pembuangan tinja adalah suatu wadah atau tempat yang mampu menjaga atau mencegah tinja tersebut tidak mencemari air terutama air untuk sumber air minum dan tidak mencemari tanah.

### 2) Kebiasaan mencuci tangan

Kebanyakan penyakit kecacingan ditularkan melalui tangan yang kotor. Kebersihan tangan sangat penting karena tidak ada bagian

tubuh lainnya yang paling sering kontak dengan mikroorganisme selain tangan.

Tangan hendaknya dibersihkan sebelum dan sesudah memasak atau menyiapkan makanan. Ini dapat mengurangi risiko terkena atau menyebarkan telur cacing yang menyebabkan makanan mengandung telur cacing. Sebelum dan sesudah makan, setelah buang air besar/kecil, juga setelah mengganti popok bayi dan sehabis memegang benda yang kotor.

Tangan dicuci dibawah air yang mengalir lebih baik lagi bila dengan air hangat dan menggunakan sabun. Disarankan sabun yang digunakan adalah sabun cair. Gosok tangan selama 1 menit. Bersihkan bagian pergelangan tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari dan kuku. Kemudian gunakan tissue atau handuk sebagai penghalang pada saat akan mematikan keran air karena bagian itu.

### 3) Kebiasaan memakai alas kaki

Kesehatan anak sangat penting karena kesehatan semasa kecil menentukan kesehatan pada masa dewasa. Anak yang sehat akan menjadi manusia dewasa yang sehat. Membina kesehatan semasa anak kecil berarti mempersiapkan terbentuknya generasi yang sehta yang kan memperkuat ketahanan bangsa.

Pembinaan kesehatan anak dapat dilakukan oleh petugas kesehatan, ayah, ibu, saudara, anggota keluarga serta anak itu sendiri.

Anak harus menjaga kesehatannya sendiri salah satunya dengan membiasakan memakai alas kaki.

Kulit merupakan tempat masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Tanah gembur (pasir, humus) merupakan tanah yang baik untuk pertumbuhan larva cacing. Jika seseorang menginjakkan kakinya di tanah tanpa menggunakan alas kaki dan jika kebersihan serta pemeliharaan kaki tidak diperhatikan maka dapat menjadi sasaran pintu masuknya kuman-kuman penyakit ke dalam tubuh, termasuk larva cacing.

Oleh karena itu, pemakaian alas kaki saat keluar rumah atau ke WC (*Water Closet*), serta perawatan dan pemeliharaan kaki sangat penting. Menyela-nyela jari-jari kedua telapak kaki adalah termasuk sunnah dalam bersuci, kemudian hendaknya seseorang tidak menginjakkan kakinya selain pada tempat yang suci.

Hindari berjalan tanpa memakai alas kaki karena dapat mencegah infeksi pada luka dan masuknya telur cacing pada kaki yang tidak beralas. Dengan memakai alas kaki, maka dapat memutuskan hubungan bibit penyakit ke dalam tubuh, sehingga infeksi kecacingan dapat dihindari.

#### 4) Kebersihan tangan dan kuku

Kuku tangan yang panjang dan kotor menyebabkan tertimbunnya kotoran dan kuman penyakit. Islam adalah perintis pertama yang berbicara tentang bakteri dan kotoran yang dimasukkan kategori dengan istilah *khabats*, atau *khataya*, atau *syaitan* (Al-Fanjari, 1996:11).

Telur cacing sering kali terselip pada kuku yang kotor. Kondisi ini sering terjadi pada anak yang sering bermain di tanah serta pada orang dewasa yang bekerja di kebun atau di sawah (Nurhaedah, 2006).

Telur cacing yang berada di tanah dapat pindah ke sela-sela jemari tangan atau terselip pada kuku. Sehingga saat memakan makanan, telur cacing yang melekat di bawah kuku yang panjang dan kotor akan ikut tertelan bersama makanan yang dimakan. Oleh karena itu, kuku sebaiknya selalu dipotong pendek dan dijaga kebersihannya dengan menggunakan pemotong kuku atau gunting tajam, jika ada jaringan yang kering disekitar kuku maka dioleskan lotion atau minyak mineral, kuku direndam jika tebal dan kasar untuk menghindari penularan infeksi cacing dari tangan ke mulut

## **B. Tinjauan Umum tentang Sanitasi Lingkungan Sekolah**

### **1. Pengertian sanitasi lingkungan**

Menurut H.L.Blum, lingkungan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan masyarakat disusul dengan perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Oleh karena itu, untuk mempertinggi derajat kesehatan maka dilakukan upaya pengendalian terhadap lingkungan dari semua faktor yang menimbulkan hal-hal yang merugikan yang dikenal dengan sanitasi lingkungan (Notoatmodjo, 2003).

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan

kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

Sanitasi lingkungan adalah usaha mengendalikan semua faktor fisik lingkungan manusia yang mungkin menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik kesehatan dan daya tahan hidup manusia (Daud, 2007).

Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2003).

Pengertian sanitasi adalah sesuatu cara untuk mencegah berjangkitnya suatu penyakit menular dengan jalan memutuskan mana rantai dari sumber. Sanitasi merupakan suatu usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada penguasaan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan (Azwar, 1990).

Menurut WHO sanitasi lingkungan adalah sebagai usaha pengendalian dari semua faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan sosial.

Prinsip dasar dalam islam yang harus dipegang yaitu, Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih. Kebersihan merupakan suatu sistem yang kokoh yang dijadikan sebagai akidah bagi seorang muslim, sehingga dapat terhindar dari satu penyakit. Demikian hadis dari riwayat Tirmizi:



إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ  
يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظِّفُوا أَرَاهُ قَالَ أَفْنَيْتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah swt itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Mahamulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu”.*

Kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah swt. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah swt, tentu mendapatkan nilai di hadapan-Nya, yakni berpahala. Dengan kata lain, Kotor, jorok, sampah berserakan, lingkungan yang semrawut dan tidak indah itu tidak disukai oleh Allah swt. Sebagai hamba yang taat, tentu kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah swt.

Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri, di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Bentuknya juga sangat bermacam-macam, mulai dari membersihkan diri setiap hari, membersihkan kelas, menata ruang kelas sehingga tampak indah dan nyaman. Bila kita dapat mewujudkan kebersihan dan keindahan, maka kehidupan kita pasti terasa lebih nyaman.

#### a. Penyediaan air bersih

Air bersih adalah air yang layak dikonsumsi oleh manusia setelah dilakukan pengolahan dan memiliki kualitas minimal sebagaimana yang dimaksud dalam Permenkes RI No. 416 tahun 1990, baik dari segi fisik, kimiawis, mikrobiologis, dan radioaktif.

Peraturan Menteri Kesehatan RI

No.416/Menkes/PER/IX/1990 bahwa air bersih yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Syarat kualitas

- a) Syarat fisik : bersih, jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna, suhu udara lebih dari  $3^{\circ}\text{C}$  dan dan TDS 500 mg/L
- b) Syarat kimia : tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan seperti racun, serta tidak mineral dan zat organik yang jumlahnya tinggi dari ketentuan
- c) Syarat biologis : tidak mengandung organisme patogen

2) Syarat kuantitas

Pada daerah pedesaan untuk hidup secara sehat cukup dengan memperoleh 60 liter/hari/orang, sedangkan daerah perkotaan 100-150 liter/hari/orang.

Air yang tidak memenuhi syarat kualitas dan kuantitas akan menimbulkan kemungkinan yang lebih besar untuk terjangkitnya suatu penyakit, baik penyakit infeksi maupun penyakit non infeksi.

Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia sehingga peranan air dalam kesehatan telah dikemukakan dalam al-Qur'an. Manusia diperintahkan agar memanfaatkan air bersih dan menekankan kebersihan dengan memanfaatkan air yang mengalir untuk kesehatan.

Allah Swt berfirman dalam QS.al-Jin/72:16

وَأَلْوَأَسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

*“Dan bahwasanya: Jikalau mereka tetap berjalan Lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak).”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk minum dengan air yang segar dalam hal ini yang bersih, tidak tercemar oleh bibit penyakit sehingga tidak membahayakan bagi kesehatan manusia.

Pada zaman dewasa ini, islam mengajarkan untuk membersihkan diri dengan cara yang benar dan dengan air yang mengalir sehingga tangan yang terkuka pun sudah cukup mensterilkan dan membersihkannya dari bakteri.

b. Ketersediaan jamban

Jamban adalah satu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya.

Jamban adalah tempat pembuangan tinja atau urine yang biasanya disebut lastrine/kakus/WC (*water closet*). Jamban digunakan sebagai tempat untuk pembuangan kotoran manusia.

Kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat-zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh berbentuk tinja (*faeces*), air seni (*urine*) dan CO<sub>2</sub> sebagai hasil dari proses pernapasan (Notoatmodjo, 2003).


### 1) Jenis-jenis jamban

Adapun jenis jamban yang banyak digunakan adalah sebagai berikut:

#### a) *Jamban cemplung*

Jamban yang penampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan dan meresapkan cairan kotoran/tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Untuk jamban cemplung diharuskan ada penutup agar tidak berbau. Jamban cemplung digunakan untuk daerah yang sulit air. Pada Gambar.1 di bawah ini adalah gambar percontohan jamban cemplung.


Gambar 1 : Contoh Jamban Cemplung



b) *Jamban tangki septik/leher angsa*

Jamban berbentuk leher angsa yang penampungannya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses penguraian/dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya. Jamban tangki septik/leher angsa digunakan untuk daerah yang cukup air dan daerah padat penduduk, karena dapat menggunakan multiple latrine yaitu satu lubang penampungan tinja, tangki septik digunakan untuk beberapa jamban (satu lubang dapat menampung kotoran/tinja dari 3-5 jamban). Daerah pasang surut, tempat penampungan kotoran/tinja hendaknya ditinggikan kurang lebih 60 cm dari permukaan air pasang. Gambar di bawah adalah contoh jamban tangki septik/leher angsa.

Gambar 2 : Contoh Jamban Tangki Septik/Leher Angsa



## 2) Syarat jamban yang sehat

Setiap anggota rumah tangga harus menggunakan jamban untuk membuang air besar dan air kecil. Hal ini bertujuan untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penularan penyakit diare, kolera, disentri, thypus, kecacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit dan keracunan.

Cara penularan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pembuangan tinja (jamban) bergantung dari kondisi suatu tempat. Secara umum, penyebaran penyakit dari tinja manusia dapat melalui air, tangan, makanan, minuman, serta tanah (Nurhaedah, 2006).

Jamban keluarga disebut sehat apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tidak mencemari sumber air minum. Untuk ini letak lubang penampungan kotoran paling sedikit berjarak 10 m dari sumber air minum
- b) Tidak berbau dan tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Untuk ini tinja harus tertutup rapat, misalnya dengan menggunakan leher angsa atau penutup lubang yang rapat.
- c) Air seni, air pembersih, dan penggelontor tidak mencemari tanah sekitarnya untuk ini lantai jamban harus cukup luas

paling sedikit berukuran 1x1 meter, dan dibuat cukup landai/miring ke arah lubang jongkok.

- d) Mudah dibersihkan, aman digunakan, untuk ini harus dibuat dari bahan-bahan yang kuat dan tahan lama dan agar tidak mahal hendaknya dipergunakan bahan-bahan yang ada di daerah setempat
- e) Dilengkapi dinding dan atap pelindung, dinding kedap air berwarna terang
- f) Cukup penerangan
- g) Lantai kedap air
- h) Luas ruangan cukup
- i) Ventilasi cukup baik
- j) Tersedia air dan alat pembersih (sabun, sikat, dan air bersih)

Dalam islam ada beberapa ada-adab apabila hendak masuk dan keluar dari jamban/wc, yaitu:

- 1) Tidak membawa sesuatu dari dzikir Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan hadist sesungguhnya Nabi saw jika memasuki WC beliau melepaskan cincinya (HR at-Tirmidzi). Cincin beliau tertulis ”Muhammad Rasulallah”
- 2) Membaca do’a sewaktu masuk. yaitu:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

Artinya:

*“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari godaan syetan laki- laki dan syetan perempuan”*

Rasulallah saw bersabda: penutup (dinding) antara Jin dan aurat manusia jika memasuki WC ia berkata: “bismillah” (HR at-Tirmidzi).

Hadist lainnya yang diriwalkan Anas bin Malik ra sesungguhnya Rasulallah saw jika memasuki WC beliau berkata ”Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari godaan syetan laki- laki dan syetan perempuan” (HR Bukhari Muslim)

- 3) Membaca do'a sewaktu keluar, yaitu:

عَفَاكَ الْحَمْدُ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَ عَافَانِي

Artinya:

*“PengampunanMu ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kotoran dariku dan memberikan kepadaku kesehatan”*

Sesuai dengan hadist yang diriwalkan dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulallah saw tidak keluar dari WC kecuali beliau berkata ”pengampunan-Mu ya Allah” (HR Abu Daud, Ibnu Majah, at-Tirmidzi).

Hadist lainnya sesungguhnya Rasulallah saw jika keluar dari WC beliau berkata: ”Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kotoran dariku dan memberikan kepadaku kesehatan ” (HR Ibnu Majah)

- 4) Mendahulukan kaki kiri sewaktu masuk dan kaki kanan sewaktu keluar. Karena kiri untuk keburukan dan kanan untuk kebaikan.
- 5) Membaca do'a dalam hati sewaktu beristinja (cebok)

اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي مِنَ الْفَوَاحِشِ وَطَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ



Artinya :

*“Ya Allah jagalah kemaluanku dari perbuatan keji dan bersihkanlah hatikau dari nifak”*

c. Pengelolaan sampah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sampah adalah barang sisa atau benda yang dibuang karena tidak digunakan lagi. Dan menurut definisi WHO sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Nurhaedah, 2006).

Para ahli kesehatan Amerika membuat batasan sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Sampah adalah sampah yang berasal dari benda-benda alam, benda-benda yang keluar dari bumi akibat gunung meletus, banjir, pohon-pohon tumbang di hutan akibat angin ribut dan sebagainya (Notoatmodjo, 2003).

Sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat.

Sampah (*waste*) adalah zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik yang berasal dari rumah maupun sisa-sisa proses industri.

Dari beberapa pengertian yang ada di atas maka dapat disimpulkan bahwa sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak digunakan lagi baik yang berasal dari kegiatan manusia atau yang tidak berasal dari kegiatan manusia yaitu terjadinya bencana alam yang menyebabkan banyak pohon yang tumbang akibatnya angin ribut, tanah longsor, dan lain-lain.

Adapun jenis-jenis sampah, adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya, sampah dibagi menjadi:
  - a) Sampah an-organik, adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya logam/besi, pecahan gelas, plastik, dan sebagainya.
  - b) Sampah organik, adalah sampah yang pada umumnya dapat membusuk, misalnya sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan, dan sebagainya.
- 2) Berdasarkan dapat dan tidaknya dibakar, sampah dibagi menjadi:
  - a) Sampah yang mudah terbakar, misalnya kertas, karet, kayu, plastik, kain bekas, dan sebagainya.
  - b) Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya kaleng-kaleng bekas, besi/logam bekas, pecahan gelas, kaca, dan sebagainya.

- 3) Berdasarkan karakteristik sampah, sampah dibagi menjadi:
- a) *Garbage*, yaitu jenis sampah hasil pengolahan atau pembuatan makanan, yang umumnya mudah membusuk, dan berasal dari rumah tangga, restoran, hotel, dan sebagainya.
  - b) *Rubbish*, yaitu sampah yang berasal dari perkantoran, perdagangan, baik yang mudah terbakar, seperti kertas, karton, plastik, dan sebagainya, maupun yang tidak mudah terbakar, seperti kaleng bekas, pecahan kaca, gelas, dan sebagainya.
  - c) *Ashes* (abu), yaitu sisa pembakaran dari bahan-bahan yang mudah terbakar, termasuk abu rokok.
  - d) Sampah jalanan (*street sweeping*), yaitu sampah yang berasal dari pembersihan jalan, terdiri dari campuran bermacam-macam sampah. Daun-daunan, kertas, plastik, pecahan kaca, besi, debu, dan sebagainya.
  - e) Sampah industri, yaitu sampah yang berasal dari industri atau pabrik-pabrik.
  - f) Bangkai binatang (*dead animal*), yaitu bangkai binatang yang mati karena alam, ditabrak kendaraan, atau dibuang oleh orang.
  - g) Bangkai kendaraan (*abandoned vehicle*), adalah bangkai mobil, sepeda, sepeda motor, dan sebagainya.
  - h) Sampah pembangunan (*construction waste*), yaitu sampah dari proses pembangunan gedung, rumah, dan sebagainya, yang

berupa puing-puing, potongan-potongan kayu, besi beton, bambu, dan sebagainya.

## 2. Pengertian sekolah

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa (atau “murid”) dibawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. Nama-nama untuk sekolah-sekolah ini bervariasi menurut negara, tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar.

Ada juga sekolah non-pemerintah, yang disebut sekolah swasta. Sekolah swasta mungkin untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ketika pemerintah tidak bisa memberi sekolah khusus bagi mereka, keagamaan, seperti sekolah Islam, sekolah Kristen, atau sekolah yang memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi atau berusaha untuk mengembangkan potensi pribadi lainnya. Sekolah untuk orang dewasa meliputi lembaga-lembaga pelatihan perusahaan dan pendidikan dan pelatihan militer.

Kata sekolah berasal dari bahasa latin: *skhole*, *scola*, *scolae*, atau *skhola* yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang, dimana ketika itu sekolah adalah kegiatan diwaktu luang bagi anak-anak ditengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam

waktu luang adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf, dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni).

### 3. Pengertian lingkungan sekolah

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Apa yang ada disekitar kita, baik di depan, di belakang, di atas maupun yang ada di bawah kita itulah lingkungan kita. Dalam arti yang lebih sempit lingkungan dapat diartikan lokasi tempat kita tinggal atau menjalani kehidupan dan penghidupan. Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Mulai dari segala apa yang ada dalam batas pagar sekeliling sekolah sampai apa yang ada di luar pagar sekolah tentunya de sekitar sekolah. Lingkungan sekolah meliputi gedung belajar, kantor, mushallah, kantin, gudang, WC, taman, lapangan upacara, ruang seba guna, tong sampah, tempat pembuangan sampah, halaman, jalan raya, dan masyarakat di sekitar sekolah.

Lingkungan kelas merupakan bahagian dari lingkungan sekolah. Karena sudah barang tentu setiap sekolah terdiri dari kelas-kelas. Lingkungan kelas adalah lingkungan sekolah yang merupakan ruangan-ruangan yang sengaja dikondisikan untuk proses belajar mengajar di sekolah. Guru menjelaskan pelajaran dan siswa menerima pelajaran. Lingkungan kelas merupakan komponen utama dari sebuah sekolah. Oleh sebab itu, perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak sekolah. Lingkungan kelas meliputi papan tulis, meja dan kursi guru, meja dan kursi siswa, dinding kelas, tempat cuci tangan, loteng, dan lantai.

Lingkungan fisik sekolah merupakan lingkungan sekolah padakenyataannya. Apa yang nampak di mata, itulah lingkungan fisik sekolah seperti sarana dan prasarana serta segala fasilitas yang ada di sekolah. Misalnya gedung sekolah, halaman, jalan raya, mushallah, kantin serta perabotan sekolah.

Lingkungan mental dan sosial berbeda dengan lingkungan fisik, maka lingkungan mental dan sosial bertumpu pada manusianya. Dalam lingkungan mental dan sosial dibina hubungan, komunikasi, dan interaksi yang baik, positif dan saling menguntungkan antara semua unsur-unsur manusia yang ada di sekolah. Mulai dari murid, guru, pegawai sekolah, kepala sekolah, komite, orang tua dan wali murid, serta tidak ketinggalan hubungan pihak sekolah dengan warga masyarakat di sekitar sekolah. Tentu saja hubungan yang diharapkan adalah hubungan yang sehat dan harmonis yang dapat mewujudkan sekolah yang berutu dan berdaya guna tinggi dalam mencetak anak didik penerus cita-cita bangsa.

Lingkungan kehidupan sekolah yang sehat sebagai penunjang proses belajar mengajar hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembinaan dan pengembangan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat antara lain:

- a. Lokasi/letak sekolah
  - 1) Mudah dicapai
  - 2) Luas memadai
  - 3) Lingkungan sehat dan segar
  - 4) Bebas dari banjir

- 5) Bebas dari sampah dan limbah industri
  - 6) Bebas dari kebisingan
  - 7) Bebas dari gangguan lalu lintas
- b. Bangunan/gedung sekolah
- 1) Bangunan harus permanen, kuat, dan kedap air
  - 2) Lantai bangunan terbuat dari bahan-bahan kedap air dan tidak mudah retak.
  - 3) Dinding bangunan hendaknya rata dan halus dan bila terbuat dari tembok minimal lapisan semen/cornya 2 cm
  - 4) Atap bangunan terbuat dari bahan yang cukup kuat terutama dari serangan lingkungan maupun faktor alam
  - 5) Bangunan hendaknya dilengkapi dengan ruang guru, ruang kelas, ruang kantor, ruang UKS, ruang shalat, ruang kantin, dan gudang.
  - 6) Bentuk bangunan tidak perlu mewah tetapi hendaknya sesuai dengan kebudayaan setempat, menarik, dan nyaman
- c. Ruang kelas
- 1) Ukuran kelas sebaiknya 8 x 6 m, tinggi 4 m
  - 2) Loteng terbuat dari bahan yang kuat dan tidak tembus debu dan air
  - 3) Setiap kelas hendaknya dilengkapi dengan 2 pintu dan daun pintu menghadap keluar.
  - 4) Luas jendela beserta lubang angin atau ventilasi minimal 20% dari luas lantai

- 5) Sinar matahari sebaiknya datang dari sbelah kiri dan kanan, tetapi kalau tidak mungkin sebaiknya dari sebelah kiri murid.
  - 6) Pengendalian akustik, komunikasi dalam ruangan harus dapat berlangsung secara baik dan lancar tanpa ada gangguan.
  - 7) Waktu istirahat pintu dan jendela harus dibuka dan seluruh murid harus keluar dari ruangan.
- d. Tempat cuci tangan
- 1) Tempat cuci tangan hendaknya cukup baik dan mudah digunakan
  - 2) Tempat cuci tangan sebaiknya dilengkapi dengan air yang mengalir sehingga air bekas dapat terus mengalir ke pembuangan air kotor atau air limbah
  - 3) Tempat cuci tanagn harus dilengkapi dengan sabun dan kain lap yang bersih dan kering
- e. WC dan kamar mandi
- 1) Sebaiknya dipisahkan antara WC laki-laki dan perempuan
  - 2) Untuk guru dan staf sekolah lainnya disediakan WC tersendiri
  - 3) Kakus sebaiknya berbentuk leher angsa dan memiliki pembuangan kotoran ke septic tank
  - 4) Semua WC mempunyai pintu yang dapat dikunci dari dalam maupun dari luar
  - 5) Bak air hendaknya terisi cukup penuh senantiasa sehingga bisa digunakan. Jangan sekali-kali bak dibiarkan samapi kosong



- 6) Di kamar mandi di luar WC tersedia tempat cuci tangan, sabun, dan lap kering.
- 7) WC sebaiknya tidak terhubung langsung dengan kelas
- 8) Kebersihan WC dan kamar mandi hendaknya selalu dijaga dan dipelihara

f. Sumber air bersih

Sumber air bersih bisa berasal dari sumur, air galian, sumur pompa maupun air PAM

g. Pembuangan air limbah dan air hujan

- 1) Saluran pembuangan air hujan dan air limbah sebaiknya harus lancar, jangan sampai tergenang. Karena itu kebersihan selokan harus diperhatikan, jangan ada sampah atau benda-benda lainnya yang tersangkut yang menghalangi aliran air

h. Tempat sampah dan pembuangan sampah

- 1) Tempat sampah yang tersedia harus memenuhi syarat kesehatan dan terbuat dari bahan yang kedap air
- 2) Tempat sampah hendaknya mudah dibersihkan, tidak cepat rusak dan tertutup
- 3) Jumlah tempat sampah harus memadai artinya sesuai dengan banyak murid dan banyak ruangan. Minimal 1 ruangan 1 tong sampah. Setiap hari tempat sampah dikosongkan, sampahnya dikumpulkan ke pembuangan sampah akhir, yang kemudian

diangkut oleh tim pengumpul sampah untuk dibuang ke tempat tertentu yang telah ditetapkan

- 4) Berbagai macam cara pembuangan sampah antara lain, dibakar, ditimbun (sampah yang bisa hancur), dibuat pupuk (sisa-sisa daun, ranting), dibuat makanan ternak, misalnya ampas tahu, tempe, dan sisa-sisa makanan lainnya

i. Peralatan dan perabotan sekolah

- 1) Meja dan kursi murid sebaiknya tidak digabungkan, tetapi terpisah antara kursi dan mejanya. Tujuannya adalah agar murid mendapat kebebasan dalam bergerak pada saat duduk
- 2) Ukuran meja cukup untuk membaca, menulis, dan menggambar. Ukuran meja rata-rata adalah panjang 70 cm, lebarnya 50 cm dan tingginya 70 cm
- 3) Ruang di bawah meja cukup luas untuk kaki pada saat anak duduk dalam sikap kerja, sikap istirahat, waktu kaki diselanjorkan dan pada saat anak mau berdiri.
- 4) Tinggi kursi hendaknya sesuai dengan usia murid agar tungkai tidak menggantung dan sebaliknya tidak menekuk.
- 5) Konstruksi meja dan kursi sederhana, memenuhi syarat kesehatan sehingga memungkinkan untuk bergerak bebas pada waktu melakukan kegiatan apapun maupun pada waktu istirahat

- 6) Papan tulis sebaiknya digantungkan sedemikian rupa sehingga murid dapat melihat dengan baik. Warna papan sebaiknya warna hitam, putih atau warna yang redup
  - 7) Penghapus papan tulis terbuat dari bahan yang daya ikatnya terhadap kapur cukup tinggi sehingga serbuk kapur tidak beterbangan kemana-mana
- j. Warung/kantin sekolah. Pengadaan warung atau kantin sekolah hendaknya memperhatikan syarat-syarat kesehatan antara lain:
- 1) Kuantitas dan kualitas pemeliharaan warung sekolah, perabot, alat-alat dan penyediaan makanan
  - 2) Kuantitas, kualitas dan pemeliharaan makanan dan minuman yang disediakan atau dijual
  - 3) Pengelolaan warung yang baik
4. Pengaruh sanitasi lingkungan terhadap kesehatan

Sanitasi atau kesehatan lingkungan pada hakekatnya adalah kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimum pula. Adapun yang dimaksud dengan usaha kesehatan lingkungan adalah suatu usaha untuk memperbaiki atau mengoptimalkan lingkungan hidup manusia agar merupakan media yang baik untuk terwujudnya kesehatan yang optimal bagi manusia yang hidup di dalamnya.

Menurut Riyadi (1984) sanitasi lingkungan adalah prinsip-prinsip usaha untuk meniadakan atau setidaknya menguasai faktor-faktor

lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit, melalui kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengendalikan:

- a. Sanitasi air
- b. Sanitasi makanan
- c. Pembuangan kotoran, air buangan, dan sampah
- d. Sanitasi udara
- e. Vektor dan binatang pengerat
- f. Hygiene perumahan dan halaman

Dalam penanggulangan cacingan, pengawasan sanitasi air dan makanan sangat penting, karena penularan cacing terjadi melalui air dan makanan yang terkontaminasi oleh telur dan larva cacing (Riyadi, 1984). Penelitian yang dilakukan oleh Ulukanligil *et al* tahun 2001 menemukan sekitar 14% sayuran (kol dan selada) di Sanliurfa Turkey mengandung telur cacing yang ditularkan melalui tanah.

Pembuangan kotoran, air buangan dan sampah serta pemeliharaan lingkungan rumah juga penting dalam penanggulangan penyebaran cacingan. Terjadinya infeksi baru dan infeksi ulang banyak disebabkan oleh tercemarnya tanah oleh tinja penderita. Hal ini dibuktikan oleh Pasaribu (2004) di kabupaten Karo yang menemukan 45,8% sampel tanah yang diperiksa mengandung telur cacing *Ascaris lumbricoides*.

Lingkungan sekolah secara tidak langsung mempunyai sumbangan terhadap terjadinya penularan penyakit infeksi cacingan. Sebagian besar waktu anak sekolah dasar dihabiskan dengan bermain baik di rumah maupun

di sekolah sehingga anak sekolah dasar mempunyai potensi untuk tejangkit penyakit infeksi cacangan (Watkins dan Pollit dalam Poepoprodjo dan Sadjimin, 2000).

Dalam buku Pedoman Penanggulangan Program Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS), indikator PHBS adalah salah satu alat ukur untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan di institusi pendidikan. Indikator institusi pendidikan adalah Sekolah Dasar Negeri maupun swasta (SD/MI). Indikator ini meliputi:

- a. Tersedia jamban yang bersih sesuai dengan jumlah siswa
- b. Tersedia air bersih atau air keran yang mengalir di setiap kelas
- c. Tidak ada sampah yang berserakan dan lingkungan sekolah yang bersih
- d. Ketersediaan UKS yang berfungsi dengan baik
- e. Siswa menjadi anggota dana sehat (JPKM)
- f. Siswa pada umumnya (60%) kukunya pendek dan bersih
- g. Siswa ada yang menjadi dokter kecil atau promosi kesehatan sekolah (minimal 10 orang) (Dinkes Prop.Sulsel, 2006)

Lingkungan fisik sekolah meliputi gedung sekolah dengan keadaan lantai kering, langit-langit bersih dan ventilasi baik. Ketersediaan jamban dan sumber air minum yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan halaman sekolah, ketersediaan warung atau tempat jajan, ketersediaan tempat pembuangan sampah dan limbah.

Sejalan dengan upaya hidup sehat di lingkungan sekolah aanya program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan kesehatan di sekolah. Salah satu program dari UKS ini adalah kegiatan penanggulangan cacingan. Program pemberantasan dan pencegahan penyakit infeksi cacingan secara otomatis telah dimasukkan dalam kegiata UKS tersebut (Depkes RI, 2004).

### C. Tinjauan Umum tentang Kecacingan

#### 1. Pengertian

Infeksi cacingan adalah penyakit yang ditularkan oleh makanan minuman atau melalui kulit dimana tanah menjadi media penularannya yang disebabkan oleh cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*), cacing cambuk (*Trichuris trichiura*), dan cacing tambang (*Ancylostoma duodenale* dan *Necator americanus*) (Jawetz et al, 1996). Infeksi cacingan banyak terdapat pada anak usia sekolah dasar yang di dalam usus anak terdapat satu atau beberapa jenis cacing yang merugikan pertumbuhan dan kecerdasan anak.

Kecacingan merupakan salah satu mikroorgisme penyebab penyakit dari kelompok helminth (cacing), membesar dan hidup dalam usus halus manusia, Cacing ini terutama tumbuh dan berkembang pada penduduk di daerah yang beriklim panas dan lembab dengan sanitasi yang buruk. Terutamanya pada anak-anak. Cacing-cacing tersebut adalah cacing gelang, cacing cambuk dan cacing tambang dan cacing pita.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan penyakit cacingan lebih banyak menyerang pada anak - anak sekolah dasar / MI dikarenakan aktifitas mereka yang lebih banyak berhubungan dengan tanah. Diantara cacing tersebut yang terpenting adalah cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*), cacing tambang (*Ancylostoma duodenale* dan *Necator americanus*) dan cacing cambuk / C.kremi (*Trichuris trichiura*). Cacing sebagai hewan parasit tidak saja mengambil zat-zat gizi dalam usus anak, tetapi juga merusak dinding usus sehingga mengganggu penyerapan zat-zat gizi tersebut. Anak –anak yang terinfeksi cacingan biasanya mengalami : lesu, pucat / anemia, berat badan menurun, tidak bergairah, konsentrasi belajar kurang, kadang disertai batuk – batuk.

Secara keseluruhan gejala-gejala kecacingan adalah:

- a. Berbadan kurus dan pertumbuhan terganggu (kurang gizi)
- b. Kurang darah (anemia)
- c. Daya tahan tubuh rendah, sering-sering sakit, lemah dan senang menjadi letih sehingga sering tidak hadir sekolah dan mengakibatkan nilai pelajaran turun.

Gejala-gejala ini terjadi karena cacing *Ascaris lumbricoides* hidup dalam rongga usus manusia dan mengambil makanan terutama karbohidrat dan protein, 1 ekor cacing akan mengambil karbohidrat 0,14 gram/hari dan protein 0,035 gram/hari.

Akibat adanya cacing *ascaris* dalam tubuh, maka anak yang mengkonsumsi makanan yang kurang gizi dapat dengan mudah akan

jatuh kedalam kekurangan gizi buruk, sedangkan cacing trichuris dan cacing tambang disamping mengambil makanan juga akan menghisap darah sehingga dapat menyebabkan anemia.

Penularan kecacingan secara umum melalui dua cara, yaitu:

- a. Anak buang air besar sembarangan – Tinja yang mengandung telur cacing mencemari tanah – Telur menempel di tangan atau kuku ketika mereka sedang bermain– Ketika makan atau minum, telur cacing masuk ke dalam mulut – tertelan – kemudian orang akan cacingan dan seterusnya terjadilah infestasi cacing.
  - b. Anak buang air besar sembarangan – tinja yang mengandung telur cacing mencemari tanah – dikerumuni lalat – lalat hinggap di makanan atau minuman – makanan atau minuman yang mengandung telur cacing masuk melalui mulut – tertelan – dan selanjutnya orang akan cacingan – infestasi cacing pun terjadi.
2. Cacing parasit di Indonesia

Setiap parasit pada umumnya mempunyai sifat yang tidak baik, sifat parasit tersebut adalah hidupnya menumpang dan bertempat diam di tempat-tempat yang ditumpangnya tetapi imbalannya malapetaka yang di timbulkannya bagi yang ditumpangi atau host. Cacing parasit manusia bertempat tinggal di dalam usus mengisap darah dan makanan yang diperlukan oleh manusia tempat cacing tersebut bertempat tinggal yang akhirnya host akan menderita sakit kekurangan darah.



Peranan cacing yang telah dewasa pada tubuh manusia dengan jalan:

- a. Mengisap darah tuan rumah
- b. Mengisap darah dan mengeluarkan (bisa) racun
- c. Di dalam tubuh (usus) mengisap zat-zat makanan tuan rumah (manusia) hingga kekurangan zat-zat makanan .
- d. Karena cacing di dalam usus dapat berkembang bik dengan banyak maka dapat menimbulkan sumbatan pada saluran pencernaan.
- e. Ada cacing yang terbentuk larva bersarang di dalam pembuluh limfe dan pembuluh darah sehingga peredaran darah dan limfe terganggu akibatnya anggota badan atau organ jadi bengkak-bengkak.

Berdasarkan atas tempat hidup cacing dewasa di dalam tubuh manusia maka nematoda digolongkan atas nematoda usus kecil dan usus besar. Di antara nematoda usus terdapat sejumlah spesies yang ditularkan melalui tanah dan disebut “soil transmitted helminths” yang terpenting bagi manusia adalah *Ascaris lumbricoides*, *Nector americanus*, *Ancylostoma duodenale*, *Trichuris trichiura*, *Strongyloides stercoralis*, dan beberapa spesies *Trichostrongylus*. Nematoda penting lainnya yang penting bagi manusia adalah *Oxyuris vermicularis* dan *Trichinella spiralis*.

1. Cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*).

Warna, bentuk, dan ukuran yang dimiliki cacing gelang sudah tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia. *Ascaris Lumbricoides*

yang disebut askaris saja berwarna putih kekuning-kuningan, sedikit merah atau coklat. Bentuknya bulat dan panjangnya 20-35 cm setelah tiba di usus kecil, larva berkembang menjadi cacing biasa matang (jantan berukuran 15-25 cm x 3 mm dan betina 25- 35 cm x 4 mm) masing-masing betina mempunyai usus hidup 1-2 tahun dan mampu menghasilkan 200.000 telur perhari.


Penularan penyakit ini dapat melalui kulit. Telur seringkali masih menempel pada jari-jari tangan atau yang sudah hinggap pada makanan, terbawa ke dalam perut melalui mulut. Sampai di usus dua belas jari, telur askaris menetas menjadi larva, yang kemudian menembus dindingnya selanjutnya oleh larva terbawa oleh aliran darah dan akhirnya akan sampai ke dalam jaringan paru-paru bila hal ini terjadi maka timbul kelainan yang dalam istilah kedokteran disebut *penominitis* atau *sindrom loef-fler*.

Larva yang ada dalam jaringan paru-paru kan dikeluarkan ke dalam rongga mulut, dan dari sini larva kembali lagi ke dalam saluran pencernaan. Di dalam saluran cerna, askaris akan mengalami pendewasaan dan hidup jangka waktu yang cukup panjang selama itu pul, askaris mencari tempat makanan yang seyogyanya disediakan untuk pertumbuhan badan. Penderita yang hanya dihuni oleh beberapa askaris, biasanya tidak mengetengahkan keluhan apa-apa. Tetap bila jumlahnya cukup banyak penderita mengemukakan

berbagai keluhan antara lain rasa mual, rasa tidak enak pada perut, kadang-kadang timbul rasa mulas yang istilah kedokterannya kolik.

Anak yang terlampau banyak dihuni cacing askaris dalam perutnya akan nampak kurus, pucat dan buncit pada perutnya, kalau jumlahnya cukup banyak sumbatan pada usus bisa terjadi. Biasanya penderita yang demikian memerlukan tindakan operasi, penyumbatan oleh askaris yang sudah dewasa juga dapat terjadi pada saluran empedu, saluran pankreas, atau usus buntu penderita.

Gambar 3. Daur hidup *Ascaris lumbricoides*



2. Cacing tambang (*Ancylostoma duodenale*).

Cacing tambang yang selanjutnya disebut *Ancylostoma duodenale* sering masuk ke dalam tubuh. Para petani dan karyawan perkebunan yang mempunyai kebiasaan berjalan tanpa alas kaki, kehilangan darah bervariasi dengan spesies cacing tambang pada waktu infeksi *Ancylostoma duodenale* 0,16 – 0,34 ml/cacing hilang/hari pada *Necator americanus* adalah 0,003-0,005 ml. Cacing berukuran lebih kurang 1 cm, warnanya merah darah, bagian depan cacing tambang (mulut) dilengkapi dengan alat-alat, sehingga cacing dapat melekat pada selaput lendir.


Telur-telur *Ancylostoma duodenale* keluar melalui dubur manusia bersama tinja, kemudian masuk ke dalam tanah, kalau tanah yang dimasukinya basah atau lembab telur akan berkembang menjadi larva yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan menembus kulit kaki, larva melakukan perjalanan ke seluruh tubuh hingga ke paru-paru.

Pada saat larva berada di paru-paru penderita biasanya mengalami batuk kering tetapi jarang sekali disertai darah dalam dahaknya. Dari paru-paru larva akan masuk ke dalam rongga mulut, diulang kembali. Jadi cara penularan cacing ini berbeda dengan askaris. Cacing tambang dapat berpindah dari seseorang kepada orang lain melalui kaki, tidak melalui mulut, cacing askaris hanya sekali melewati mulut manusia sedangkan cacing tambang dua kali.

Pertama ketika cacing masuk untuk pertama kalinya, kedua ketika terjadinya perputaran cacing di dalam tubuh manusia.

Dalam rongga usus, cacing tambang mengalami pematangan dan ketika berada di dalam rongga tersebut, mulut cacing menempel pada dinding-dinding usus dan menghisap darah secara kontinyu. Bila jumlah cacing cukup banyak, bisa terjadi kelainan yang dalam istilah kedokteran disebut anemia atau kurang darah.

Gambar 4. Daur hidup *Ancylostoma duodenale*



### 3. Cacing Cambuk (*Trichuris trichiura*).


Manusia merupakan hospes cacing ini. Penyakit yang disebabkan disebut trikuriasis. Cacing ini bersifat kosmopolik, terutama ditemukan di daerah panas dan lembab. Beberapa daerah di Indonesia, prevalensi masih tinggi, nama lain dari cacing ini adalah *Trichocephalus dispar*. *Trichuris* dewasa menghisap sekitar 0,005 ml

darah/cacing/hari. Warna cacing merah muda atau kelabu. Cacing betina panjangnya kira-kira 5 cm, sedangkan cacing jantan panjangnya kira-kira 4 cm. Bagian anterior langsing seperti cambuk. Seekor cacing betina diperkirakan menghasilkan telur setiap hari antara 3000-10000 butir.

Telur berukuran 50-54 mikron x 32 mikron, berbentuk seperti mpayan dengan semacam penonjolan yang jernih pada kedua kutub. Telur yang dibuahi dikeluarkan dari hospes bersama tinja. Telur tersebut menjadi matang dalam waktu 3-6 minggu dalam lingkungan yang sesuai, yaitu pada tanah yang lembab atau tempat yang teduh.

Penyebaran penyakit adalah kontaminasi dengan tinja. Telur tumbuh ditanah liat, tempat lembab dan teduh dengan suhu optimum kira-kira 30°C. Di berbagai negeri pemakaian tinja sebagai pupuk kebun merupakan sumber infeksi. Frekuensi di Indonesia tinggi. Di beberapa daerah pedesaan di Indonesia frekuensinya berkisar antara 30-90%.

Di daerah yang endemik infeksi dapat dicegah dengan pengobatan penderita trikuriasis, pembuangan jamban yang baik dan pendidikan tentang sanitasi dan kebersihan perorangan terutama anak. Mencuci tangan sebelum makan, mencuci dengan baik sayuran yang dimakan mentah.

Gambar 5. Daur hidup *Trichuris trichiura*

#### 4. Cacing Kremi (*Enterobius vermicularis*).


Hampir semua anak kecil mengenal cacing kremi yang semuanya dalam bahasa asing adalah *Enterobius vermicularis*. Warna cacing biasanya putih mengkilap, berukuran kecil pendek. Ukuran cacing betina berkisar sekitar 8 – 13 mm sedangkan yang jantan mempunyai ukuran sekitar 2 – 3 mm.

*Enterobius vermicularis* tidak hanya terdapat di negara-negar yang sedang berkembang, tetapi juga banyak terdapat di negara-negara maju. Penularan biasanya berlangsung dari jari-jari tangan, masuk ke dalam mulut lalu masuk ke dalam saluran cerna, sampai ke usus halus teru menetas menjadi cacing. Sebagian besar cacing dewasa terdapatdi usus besar dan sebagian lagi dibagian usus lainnya. pada waktu cacing betina hendak bertelur mereka pindah ke kawasan dubur. Gerakan-gerakan cacing ditempat tersebut

mengakibatkan rasa geli atau gatal, terutama dirasakan di malam hari. Rasa gatal ini mendorong untuk menggaruk-garuk dan biasanya jari menyentuh kawasan dubur, banyak telur yang menempel pada jari atau tangan lalu terbawa olehnya.

Tangan dan jari-jari tangan penuh dengan telur cacing kremi tanpa dicuci lebih dahulu untuk memegang dan memasukkan makanan ke dalam mulut, sehingga terjadilah penularan oleh diri sendiri. Telur juga dapat bersembunyi dibelakang kuku jari tangan yang tidak dipotong. Bila ada makanan yang tersentuh oleh kuku tersebut, maka terjadilah penularan dari orang penderita ke orang sehat melalui makanan.

Gambar 6. Daur hidup *Enterobius vermicularis*



##### 5. *Trichinella spiralis*.

Pertama kali ditemukan dalam bentuk larva yang terdapat dalam kista di dalam otot pasien-pasien yang di otopsi. Richard



Owen adalah orang yang pertama kali mendeskripsikan parasit ini dan di namakan encystelarvae.


Selain manusia, berbagai binatang seperti babi, tikus, beruang, kucing, anjing, babi hutan dan lain-lain dapat merupakan hospes. Penyakit yang disebabkan parasit ini disebut trikinosis, atau trikiniasis.

Cacing ini kosmopolik, tetapi di negeri-negeri beragama islam parasit ini jarang di temukan karena penduduk mempunyai kebiasaan makan daging babi yang di masak kurang matang (sosis).

Cacing dewasa bentuknya halus seperti rambut. Cacing betina berukuran 3 – 4 mm dan cacing jantan kira-kira 1,5 mm. seekor cacing betina dapat mengeluarkan kira-kira 1500 larva.

Dilihat dari daur hidupnya, ternyata babi dan tikus memelihara infeksi di alam. Infeksi pada babi terjadi karena babi makan tikus yang mengandung larva dalam ototnya, atau karena babi makan sampah dapur yang berisi sisa-sisa daging babi yang mengandung larva infeksi.

Sebaliknya, tikus mendapat infeksi karena makan sisa daging babi di pejalalan atau di rumah dan juga karena makan bangkai tikus. Frekuensi trikinosis pada manusia tinggi di daerah tempat orang banyak makan babi yang di beri makanan pejalalan, sedangkan babi yang diberi makanan gandum frekuensi trikinosis rendah.

Gambar 7. Daur hidup *Trichinella spiralis*

### 3. Dampak Infeksi Kecacingan Terhadap Anak Usia Sekolah Dasar

Cacingan mempengaruhi pemasukan (*intake*), pencernaan (*digestif*), penyerapan (*absorpsi*), dan metabolisme makanan. Secara kumulatif, infeksi cacingan dapat menimbulkan kerugian zat gizi berupa kalori dan protein serta kehilangan darah. Selain dapat menghambat perkembangan fisik, kecerdasan, dan produktivitas kerja, dapat menurunkan ketahanan tubuh sehingga mudah terkena penyakit lainnya.

Infeksi cacingan jarang sekali menyebabkan kematian secara langsung, namun sangat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Infeksi cacing gelang yang berat akan menyebabkan malnutrisi dan gangguan pertumbuhan pada anak. Berbagai penelitian membuktikan bahwa sebagian kalori yang dikonsumsi manusia tidak dimanfaatkan badan karena adanya parasit dalam tubuh. Pada infeksi ringan akan menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi lebih kurang 3% dari kalori yang dicerna, pada infeksi berat 25% dari kalori yang dicerna tidak

dimanfaatkan oleh badan. Infeksi *Ascharis* yang berkepanjangan dapat mengakibatkan kekurangan kalori protein dan diduga dapat mengakibatkan defisiensi vitamin A (Hidayat, 2002).

Pada infeksi *Trichuris* berat sering dijumpai diare darah, turunnya berat badan, dan anemia. Diare pada umumnya berat sedang eritrosit dibawah 2,5 jta dan hemoglobin 30% dibawah normal. Anemia berat ini dapat terjadi karena infeksi *Thricuris* mampu menghisap darah sekitar 0,005 mL perhari/cacing (Gandahusada dkk, 2004).

Infeksi cacing tambang umumnya berlangsung secara menahun, cacing tambang ini sudah dikenal sebagai penghisap darah. Seekor cacing tambang mampu menghisap darah 0,2 mL perhari. Apabila terjadi infeksi berat, maka penderita akan kehilangan darah secara perlahan dan dapat menyebabkan anemia berat.

Infeksi ketiga cacing ini dapat terjadi sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama (2 atau 3 jenis cacing sekaligus). Semakin banyak jenis cacing ataupun jumlahnya yang ada di dalam tubuh semakin berat gangguan kesehatan yang ditimbulkan.

#### 4. Pencegahan terjadinya Kecacingan

Cara terbaik untuk mengatasi infeksi kecacingan adalah dengan melakukan pencegahan, cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah:

- a. Pencegahan tingkat pertama (Primary Prevention) yang meliputi:
- 1) Membuang kotoran (tinja) di jamban
  - 2) Membuang sampah pada tempatnya
  - 3) Menjaga kebersihan rumah
  - 4) Cuci tangan dengan bersih sebelum makan/menjamah makanan sebelum memasak, sebelum menyuapi anak dan atau setelah buang air besar
  - 5) Memotong kuku secara teratur seminggu sekali
  - 6) Memasak air yang akan diminum
  - 7) Biasakan makan lalap mentah yang sudah dicuci bersih helai demi helai dengan air yang mengalir
  - 8) Hindari pemakaian bersama terhadap pakaian dalam
  - 9) Cuci sprei, menjemur secara berkala kasur, bantal dan guling.
- b. Pencegahan khusus (Specific Protection) yang meliputi:
- 1) Memberantas binatang yang dapat menyebabkan telur cacing misalnya lalat, kecoa, tikus, dan lain-lain
  - 2) Membiasakan diri memakai alas kaki bila berjalan kemana-mana
  - 3) Tidak membiasakan diri menggigit/menghisap jari tangan
  - 4) Tidak membiasakan bagi anak-anak bermain di tanah.
  - 5) Tidak jajan penganan yang tak tertutup saji atau atau yang terpegang-pegang oleh banyak tangan.

- c. Pencegahan tingkat kedua (Secondary Prevention) yang meliputi:
  - 1) Diagnosa dini, misalnya dengan melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap feces anak
  - 2) Pengobatan segera
- d. Pencegahan tingkat tiga (Tertiary Prevention) yang meliputi:
  - 1) Disability limitation (pembatasan kecacatan)
  - 2) Rehabilitasi misalnya perawatan rumah bagi orang/anak yang terinfeksi kecacingan.



### **BAB III**

## **KERANGKA TEORI**

#### **A. Dasar Pemikiran**

Ada 3 (tiga) jenis cacing yang hidup dan berkembang biak sebagai parasit di dalam tubuh manusia. Seperti, cacing gelang hidup dengan mengisap sari makanan, cacing cambuk selain mengisap makanan juga mengisap darah. Sedangkan cacing tambang hidup dengan mengisap darah saja, sehingga penderita cacingan akan kurus dan kurang gizi, pada gilirannya menjadikan mudah lelah, malas belajar, daya tangkap menurun bahkan mengalami gangguan pencernaan (diare) yang berujung pada mutu sumber daya manusia dan merosotnya produktivitas.


Infeksi kecacingan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor lingkungan merupakan faktor terbesar penyebab gejala cacingan. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh, mengingat hampir separuh waktu anak-anak digunakan di sekolah. Sekolah yang tidak mempunyai sarana sanitasi seperti jamban, dan tidak mempunyai sarana air bersih maupun air minum sangat potensial sebagai sumber infeksi cacingan. Lingkungan akan dapat tercemar atau menjadi tidak sehat apabila masyarakat sekitar lingkungan tersebut tidak menjaga, memelihara atau memperhatikan faktor kesehatan yaitu dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan dan juga kebiasaan buang air besar tidak pada tempatnya.

Infeksi cacingan pada anak sekolah sering terjadi karena perilaku sehari-hari yang kurang sehat. Perilaku bermain, tidak memakai alas kaki,

menggunakan tangan ketika bermain, tidak mencuci tangan setelah bermain, tidak mencuci tangan ketika akan makan dan setelah buang air besar, dan perilaku buang air besar sembarang tempat adalah contoh perilaku kurang sehat tersebut.

## B. Kerangka konsep


Berdasarkan dasar pemikiran di atas, maka dapat disusun kerangka konsep sebagai berikut:



Keterangan:



: variabel terikat (dependent)



: variabel bebas (independent)

Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Variabel terikat (dependent)

Gejala kecacingan

2. Variabel bebas (independent)

a. Hygiene perorangan

- 1) Kebiasaan membuang tinja
- 2) Kebiasaan mencuci tangan
- 3) Kebiasaan memakai alas kaki
- 4) Kebiasaan memotong kuku

b. Sanitasi lingkungan sekolah

- 1) Sarana air bersih
- 2) Jamban/WC
- 3) Sarana pembuangan sampah
- 4) SPAL (sarana pembuangan air limbah)

**C. Definisi Operasional dan Kriteria Obyektif**

1. Hygiene perorangan adalah usaha – usaha seseorang dalam memelihara kebersihan dirinya guna meningkatkan derajat kesehatannya dan mencegah dirinya terinfeksi kecacingan. Pada penelitian ini diukur berdasarkan empat faktor, yaitu kebiasaan membuang tinja, kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan memakai alas kaki, dan kebiasaan memotong kuku.
2. Kebiasaan membuang tinja adalah perilaku responden dalam membuang membuang tinja.



Kriteria Obyektif:

- a. **Baik** apabila responden membuang tinja di jamban.
  - b. **Tidak baik** apabila responden membuang tinja selain di jamban.
3. Kebiasaan mencuci tangan yang dimaksud adalah perilaku responden untuk membersihkan tangan dari tangan kotor (baik yang nampak maupun tidak nampak) dengan menggunakan air yang bersih dan mengalir serta menggunakan sabun yang dilakukan setiap sebelum dan sesudah makan, setelah bermain, serta setelah buang air besar dan air kecil.

Kriteria Obyektif

- a. **Baik** apabila responden memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - 1) Mencuci tangan menggunakan air bersih dan mengalir serta menggunakan sabun
    - 2) Mencuci tangan setiap sebelum dan sesudah makan
    - 3) Mencuci tangan setelah bermain
    - 4) Mencuci tangan setelah buang air besar dan air kecil
  - b. **Tidak baik** apabila responden tidak memenuhi semua kriteria di atas.
4. Kebiasaan memakai alas kaki adalah perilaku responden yang senantiasa menggunakan alas kaki bila bermain di luar rumah.

Kriteria Obyektif

- a. **Baik** apabila responden menggunakan alas kaki setiap bermain di luar rumah.
- b. **Tidak baik** apabila responden hanya sesekali menggunakan alas kaki atau tidak pernah menggunakan alas kaki bila bermain di luar rumah.

5. Kebiasaan memotong kuku yang adalah perilaku responden dalam memelihara kebersihan kuku.

Kriteria Obyektif

- a. **Baik** apabila responden memotong kuku sekali dalam seminggu secara teratur.
- b. **Tidak baik** apabila responden:
- 1) Memotong kuku dua minggu sekali
  - 2) Memotong kuku sebulan sekali
  - 3) Tidak pernah memotong kuku.
  - 4) Sesekali memotong kuku
6. Sanitasi lingkungan sekolah adalah usaha pengendalian semua faktor lingkungan di sekolah yang mungkin menimbulkan infeksi kecacangan. Pada penelitian ini diukur berdasarkan empat faktor, yaitu sarana air bersih, jamban/WC, sarana pembuangan sampah, dan sarana pembuangan air limbah.
7. Sarana air bersih adalah ketersediaan air bersih di lingkungan sekolah dengan kualitas dilihat dari parameter fisik yaitu sarana air bersih tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna, jarak dari sumber pencemar minimal 10 meter, tersedia air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Kepmenkes No.1429, 2006).

Kriteria Obyektif

- a. **Memenuhi syarat** : bila skor hasil observasi = 3
- b. **Tidak memenuhi syarat** : bila skor hasil observasi < 3

8. Jamban/WC adalah keadaan jamban/WC yang tersedia di lingkungan sekolah yaitu letak jamban terpisah dari ruang kelas, jamban terpisah antara laki-laki dan perempuan, proporsi jumlah jamban cukup, jamban dalam keadaan keadaan bersih, tidak ada genangan air pada lantai WC, ada lubang penghawaan yang langsung berhubungan dengan udara luar, bak penampungan air tidak menjadi tempat perindukan nyamuk (Kepmenkes No.1429, 2006).

Kriteria Obyektif

- a. **Memenuhi syarat** : bila skor hasil observasi = 7
- b. **Tidak memenuhi syarat** : bila skor hasil observasi < 7
9. Sarana pembuangan sampah adalah sarana untuk menampung sampah secara sementara di lingkungan sekolah agar sampah tidak berserakan. Yaitu di setiap ruangan harus tersedia tempat sampah yang dilengkapi dengan tutup, tersedia tempat pengumpulan sampah sementara, tempat pengumpulan sampah sementara berjarak 10 m dari ruang kelas (Kepmenkes No.1429, 2006).

Kriteria Obyektif

- a. **Memenuhi syarat** : bila skor hasil observasi = 3
- b. **Tidak memenuhi syarat** : bila skor hasil observasi < 3
10. Saluran pembuangan air limbah (SPAL) adalah ketersediaan saluran pembuangan air limbah di lingkungan sekolah yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu saluran tersebut terpisah dengan saluran penuntasan air hujan, terbuat dari bahan kedap air, tertutup, dan air dapat mengalir

dengan lancar, dibuang melalui tangki septik dan diresapkan melalui tanah, serta memiliki bak kontrol untuk memudahkan pembersihan bila terjadi penyumbatan (Kepmenkes No.1429, 2006).

Kriteria obyektif

- a. **Memenuhi syarat** : bila skor hasil observasi = 6
- b. **Tidak memenuhi syarat** : bila skor hasil observasi < 6

11. Infeksi kecacingan adalah terdapatnya telur cacing dalam tinja responden berdasarkan metode pemeriksaan flotasi dan diperiksa dengan menggunakan mikroskop.

Kriteria Obyektif

- a. **Ya** apabila terdapat telur cacing dalam tinja responden
- b. **Tidak** apabila tidak terdapat telur cacing dalam tinja responden

## **BAB IV METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran hygiene perorangan, sanitasi lingkungan sekolah, dan infeksi kecacinagan pada murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Sekolah Dasar Inpres Cambaya Sungguminasa kabupaten Gowa. Sekolah Dasar ini berada tepat di pinggir tanggul sungai Je'neberang. Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Juli 2012.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa sebanyak 200 anak.

#### 2. Sampel

Besar sampel diperoleh dari hasil perhitungan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

$$n = \frac{200}{1 + 200(0,1^2)}$$

$$n = 67 \text{ orang}$$

#### **D. Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel diambil secara *kriteria inklusi* dan *eksklusi*, yaitu sebagai berikut:

*Kriteria inklusi:*

- a. Murid yang bertempat tinggal di sekitar SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa
- b. Murid yang ibunya bersedia diwawancarai.
- c. Murid yang bersedia diambil tinjanya untuk diperiksa.

*Kriteria eksklusi*

- a. Murid yang bertempat tinggal jauh dari SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa.
- b. Murid yang ibunya tidak bersedia diwawancarai.
- c. Murid yang tidak bersedia diambil tinjanya untuk diperiksa.

Berdasarkan kriteria di atas, populasi yang memenuhi kriteria inklusi diambil sebagai sampel sedangkan yang memenuhi kriteria eksklusi dikeluarkan dari sampel. Berdasarkan teknik pengambilan diatas jumlah sampel yang terpilih hanya 40 orang.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Data Primer**

Untuk mengetahui murid yang terinfeksi kecacingan maka dilakukan pengambilan spesimen.

a. Cara pengambilan spesimen

Sebelum murid dibagikan pot tinja, terlebih dahulu dinerikan penjelasan maksud penelitian kepada guru maupun murid. Selanjutnya diberi penjelasan tentang cara pengambilan tinja segarnya. Disarankan mengambil tinjanya pada pagi hari sebelum berangkat ke sekolah. Setelah jelas semuanya baru kemudian murid dibagikan pot tinja yang telah diberi kode sesuai dengan kode yang tertulis pada kuisioner. Keesokan harinya pot-pot tinja tersebut dikumpulkan kemudian dibawa ke laboratorium dan langsung diperiksa dengan menggunakan metode pemeriksaan Flotasi.

b. Metode pemeriksaan Flotasi

Bahan dan alat yang dibutuhkan:

- 1) Feses/tinja
- 2) Sepotong bambu/lidi
- 3) Larutan NaCl jenuh
- 4) Tabung reaksi
- 5) Kaca benda
- 6) Kaca tutup
- 7) Mikroskop

Cara pemeriksaan:

- 1) Isilah tabung reaksi dengan larutan NaCl jenuh.
- 2) Letakkan tinja sebanyak 1 cc (1 gram), ke dalam gelas kimia.

- 3) Hancurkan tinja dengan lidi sambil ditambahkan larutan NaCl jenuh sedikit demi sedikit, sehingga homogen. Tuangkan semua larutan NaCl ke dalam gelas kimia dan campur baik-baik.
- 4) Tuangkan isi gelas kimia ke dalam tabung reaksi kembali sampai penuh. Buang bagian permukaan yang kasar yang terdapat pada permukaan dengan lidi.
- 5) Letakkan kaca tutup di antara tabung sehingga menyentuh permukaan larutan. Diamkan 45 menit,
- 6) Dengan hati-hati kaca tutup diambil dan diletakkan diantara kaca benda Periksa dibawah mikroskop dengan pembesaran 10 x 10.

Untuk data hygiene perorangan dan sanitasi lingkungan sekolah diperoleh dengan cara melakukan wawancara pada sampel terpilih dan pengamatan (observasi) di lokasi. Dalam wawancara instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan hygiene perorangan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dinas kesehatan kabupaten Gowa, Puskesmas Sungguminasa, dan SD Inpres Cambaya.

## F. Pengolahan dan penyajian data

Data yang diperoleh akan diolah dengan komputer melalui program SPSS 16.0.PC (windows). Data yang sudah diolah disajikan dalam bentuk tabel berupa tabel distribusi, frekuensi, dan dinarasikan secara deskriptif.



## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

Sekolah Dasar Inpres Cambaya adalah sebuah sekolah dasar yang berlokasi di Jl. Alternatif Cambaya Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Sekolah ini terletak di tepi Sungai Je'neberang. Luas sekolah ini berkisar 500 m<sup>2</sup>. Terdiri dari 6 ruang kelas, 1 ruang guru dan kepala sekolah, 1 perpustakaan, dan 2 toilet. Tenaga staf dan pengajar berjumlah 15 orang. Jumlah murid sebanyak 200 orang yang bertempat tinggal rata-rata di sekitar sekolah tersebut. Letak sekolah bersentuhan langsung dengan pemukiman penduduk. Tak terdapat pepohonan yang rindang di sekolah ini. Aliran pembuangan limbah mengalir begitu saja ke selokan depan sekolah tanpa ada saluran khusus, sehingga air limbah berceceran dan bercampur dengan air limbah dari pemukiman penduduk di sekitarnya.

#### **B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SD Inpres Cambaya Sungguminasa Kabupaten Gowa yang dimulai sejak tanggal 23 Juli – 27 Juli 2012. Responden adalah murid yang bersekolah di SD tersebut yang ibunya bersedia diwawancarai dan diambil feses anaknya untuk diteliti. Jumlah murid yang dijadikan sampel sebanyak 40 anak. Berikut ini hasil penelitian yang akan dipaparkan dalam bentuk tabel disertai dengan penjelasan dalam bentuk narasi.

## 1. Karakteristik Responden

### a. Hygiene Perorangan

#### 1) Kebiasaan membuang tinja.

**Tabel 1.1**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Kebiasaan Membuang Tinja Murid**  
**SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| <b>Kebiasaan Membuang Tinja</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Baik                            | 39               | 97,5                  |
| Tidak Baik                      | 1                | 2,5                   |
| Total                           | 40               | 100                   |

*Sumber : Data Primer Tahun 2012*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang diteliti ada 39 orang (97,5%) responden yang memiliki kebiasaan membuang tinja yang baik yaitu di jamban dan 1 orang (2,5%) responden yang memiliki kebiasaan membuang tinja yang tidak baik yaitu di sungai.

#### 2) Kebiasaan mencuci tangan.

**Tabel 1.2**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Kebiasaan Mencuci Tangan Setelah Buang Air Besar Murid**  
**SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| <b>Mencuci tangan setelah buang air besar</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|---|------------------|-----------------------|
| Ya  | 36               | 90                    |
| Tidak   | 4                | 10                    |
| Total   | 40               | 100                   |

*Sumber : Data Primer Tahun 2012*

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang diteliti ada 36 orang (90%) responden yang mencuci tangan setelah buang air besar dan 4 orang (10%) responden yang tidak mencuci tangan setelah buang air besar.

**Tabel 1.3**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Kebiasaan Mencuci Tangan Setelah Buang Air Kecil Murid**  
**SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| <b>Mencuci tangan setelah buang air kecil</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|---|------------------|-----------------------|
| Ya  | 0                | 0                     |
| Tidak   | 40               | 100                   |
| Total   | 40               | 100                   |

*Sumber : Data Primer Tahun 2012*

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang diteliti tidak ada responden yang mencuci tangan setelah buang air kecil. Jika dipersentasekan 100% responden tidak mencuci tangan setelah buang air kecil.

**Tabel 1.4**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Kebiasaan Mencuci Tangan dengan Air yang Mengalir Murid**  
**SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| <b>Mencuci tangan dengan Air yang Mengalir</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|--|------------------|-----------------------|
| Ya   | 11               | 27,5                  |
| Tidak  | 29               | 72,5                  |
| Total  | 40               | 100                   |

*Sumber : Data Primer Tahun 2012*

Berdasarkan tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang diteliti ada 11 orang (27,5%) responden yang mencuci tangan dengan air yang mengalir dan 29 orang

(72,5%) responden yang tidak mencuci tangan dengan air yang mengalir.

**Tabel 1.5**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Kebiasaan Mencuci Tangan Menggunakan Sabun Murid**  
**SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| <b>Mencuci tangan Menggunakan Sabun</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|---|------------------|-----------------------|
| Ya                                      | 33               | 82,5                  |
| Tidak                                   | 7                | 17,5                  |
| Total                                   | 40               | 100                   |

*Sumber : Data Primer Tahun 2012*

Berdasarkan tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang diteliti ada 33 orang (82,5%) responden yang mencuci tangan menggunakan sabun dan 7 orang (17,5%) responden yang tidak mencuci tangan menggunakan sabun.

**Tabel 1.6**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Kebiasaan Mencuci Tangan Sebelum Makan Murid**  
**SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| <b>Mencuci tangan Sebelum Makan</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Ya                                  | 34               | 85                    |
| Tidak                               | 6                | 15                    |
| Total                               | 40               | 100                   |

*Sumber : Data Primer Tahun 2012*

Berdasarkan tabel 1.6 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang diteliti ada 34 orang (85%) responden yang mencuci tangan sebelum makan dan 6 orang (15%) responden yang tidak mencuci tangan sebelum makan.

**Tabel 1.7**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Kebiasaan Mencuci Tangan Sesudah Makan Murid**  
**SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| Mencuci tangan Sesudah Makan | Frekuensi | Persentase (%) |
|------------------------------|-----------|----------------|
| Ya                           | 40        | 100            |
| Tidak                        | 0         | 0              |
| Total                        | 40        | 100            |

*Sumber : Data Primer Tahun 2012*

Berdasarkan tabel 1.7 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang diteliti tidak ada responden yang tidak mencuci tangan setelah makan. Jika dipersentasekan 100% responden mencuci tangan setelah makan.

**Tabel 1.8**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Kebiasaan Mencuci Tangan Setelah Bermain Murid**  
**SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| Mencuci tangan setelah Bermain | Frekuensi | Persentase (%) |
|--------------------------------|-----------|----------------|
| Ya                             | 0         | 0              |
| Tidak                          | 40        | 100            |
| Total                          | 40        | 100            |

*Sumber : Data Primer Tahun 2012*

Berdasarkan tabel 1.8 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang diteliti tidak ada responden yang mencuci tangan setelah bermain. Jika dipersentasekan 100% responden tidak mencuci tangan setelah bermain.

**Tabel 1.9**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Kebiasaan Mencuci Tangan Murid**  
**SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| <b>Kebiasaan Mencuci Tangan</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Baik                            | 0                | 0                     |
| Tidak Baik                      | 40               | 100                   |
| Total                           | 40               | 100                   |

*Sumber : Data Primer Tahun 2012*

Berdasarkan tabel 1.9 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang diteliti tidak ada responden yang memiliki kebiasaan mencuci tangan yang baik. Jika dipersentasekan 100% responden memiliki kebiasaan mencuci tangan yang tidak baik.

3) Kebiasaan memakai alas kaki.

**Tabel 1.10**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Kebiasaan Memakai Alas Kaki Murid**  
**SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| <b>Kebiasaan Memakai Alas Kaki</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Baik                               | 32               | 80                    |
| Tidak Baik                         | 8                | 20                    |
| Total                              | 40               | 100                   |

*Sumber : Data Primer Tahun 2012*

Berdasarkan tabel 1.10 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang diteliti ada 33 orang (80%) responden yang memiliki kebiasaan menggunakan alas kaki yang baik dan 8 orang (20%) responden yang memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang tidak baik.

## 4) Kebiasaan memotong kuku.

**Tabel 1.11**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Kebiasaan Memotong Kuku Murid**  
**SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| <b>Kebiasaan Memotong Kuku</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| Baik                           | 20               | 50                    |
| Tidak Baik                     | 20               | 50                    |
| Total                          | 40               | 100                   |

*Sumber : Data Primer Tahun 2012*

Berdasarkan tabel 1.11 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang diteliti ada 20 orang (50%) responden yang memiliki kebiasaan memotong kuku yang baik dan ada 20 orang (50%) responden yang memiliki kebiasaan memotong kuku yang tidak baik.

## b. Infeksi Kecacingan

**Tabel 1.12**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Keberadaan Telur Cacing pada Feses Murid**  
**SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| <b>Keberadaan telur cacing pada feses</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|---|------------------|-----------------------|
| Ada                                       | 33               | 82,5                  |
| Tidak ada                                 | 7                | 17,5                  |
| Total                                     | 40               | 100                   |

*Sumber : Data Primer Tahun 2012*

Berdasarkan tabel 1.12 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang diteliti ada 33 orang (82,5%) responden yang pada fesesnya terdapat telur cacing dan 7 orang (17,5%) responden yang pada fesesnya tidak terdapat telur cacing.

## 2. Sanitasi Lingkungan Sekolah

**Tabel 1.13**  
**Hasil observasi keadaan sanitasi lingkungan sekolah**  
**SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| No | Variabel yang diteliti       | Hasil observasi       |
|----|------------------------------|-----------------------|
| 1  | Sarana air bersih            | Memenuhi syarat       |
| 2  | Jamban/WC                    | Tidak memenuhi syarat |
| 3  | Sarana penampungan sampah    | Tidak memenuhi syarat |
| 4  | Sarana pembuangan air limbah | Tidak memenuhi syarat |

*Sumber : Data Primer Tahun 2012*

Berdasarkan tabel 1.13 di atas menunjukkan bahwa dari keempat variabel sanitasi lingkungan sekolah yang diteliti, hanya penyediaan sarana air bersih yang memenuhi syarat, ketiga variabel lainnya tidak memenuhi syarat.

## 3. Cross Tabulasi Variabel

## a. Kebiasaan membuang tinja dan infeksi kecacingan

**Tabel 1.14**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Kebiasaan Membuang Tinja dan Infeksi Kecacingan**  
**Murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| Kebiasaan membuang tinja | Infeksi kecacingan |      |       |      | Jumlah |      |
|--------------------------|--------------------|------|-------|------|--------|------|
|                          | Ya                 |      | Tidak |      | n      | %    |
|                          | n                  | %    | n     | %    |        |      |
| Tidak Baik               | 1                  | 2,5  | 0     | 0    | 1      | 2,5  |
| Baik                     | 32                 | 80   | 7     | 17,5 | 39     | 97,5 |
| Total                    | 33                 | 82,5 | 7     | 17,5 | 40     | 100  |

*Sumber : Data Primer Tahun 2012*

Dari 40 responden terdapat 1 orang (2,5%) yang mempunyai kebiasaan membuang tinja yang tidak baik dan terinfeksi kecacingan. 33 orang (80%) diantaranya memiliki



kebiasaan membuang tinja yang baik tetapi terinfeksi kecacingan. 7 orang (17,5%) memiliki kebiasaan membuang tinja yang baik dan tidak terinfeksi kecacingan.

- b. Kebiasaan mencuci tangan dan infeksi kecacingan

**Tabel 1.15**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Kebiasaan Mencuci Tangan dan Infeksi Kecacingan**  
**Murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| Kebiasaan mencuci tangan | Infeksi kecacingan |      |       |      | Jumlah |     |
|--------------------------|--------------------|------|-------|------|--------|-----|
|                          | Ya                 |      | Tidak |      | n      | %   |
|                          | n                  | %    | n     | %    |        |     |
| Tidak Baik               | 33                 | 82,5 | 7     | 17,5 | 40     | 100 |
| Baik                     | 0                  | 0    | 0     | 0    | 0      | 0   |
| Total                    | 33                 | 82,5 | 7     | 17,5 | 40     | 100 |

Sumber : Data Primer Tahun 2012

Dari 40 responden, 33 orang (82,5%) mempunyai kebiasaan mencuci tangan yang tidak baik dan terinfeksi kecacingan. 7 orang (17,5%) mempunyai kebiasaan mencuci tangan yang tidak baik tetapi tidak terinfeksi kecacingan.

- c. Kebiasaan memakai alas kaki dan infeksi kecacingan

**Tabel 1.16**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Kebiasaan Memakai Alas Kaki dan Infeksi Kecacingan**  
**Murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| Kebiasaan memakai alas kaki | Infeksi kecacingan |      |       |      | Jumlah |     |
|-----------------------------|--------------------|------|-------|------|--------|-----|
|                             | Ya                 |      | Tidak |      | n      | %   |
|                             | n                  | %    | n     | %    |        |     |
| Tidak Baik                  | 7                  | 17,5 | 1     | 2,5  | 8      | 20  |
| Baik                        | 26                 | 65   | 6     | 15   | 32     | 80  |
| Total                       | 33                 | 82,5 | 7     | 17,5 | 40     | 100 |

Sumber : Data Primer Tahun 2012

Dari 40 responden, 1 orang (2,5%) memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang tidak baik tetapi tidak terinfeksi kecacingan. 26 orang (65%) memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang baik tetapi terinfeksi kecacingan. 6 orang (15%) memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang baik dan tidak terinfeksi kecacingan. 7 orang (17,5%) memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang tidak baik dan terinfeksi kecacingan.

d. Kebiasaan memotong kuku dan infeksi kecacingan

**Tabel 1.17**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Kebiasaan Memotong Kuku dan Infeksi Kecacingan**  
**Murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa**

| Kebiasaan memotong kuku | Infeksi kecacingan |      |       |      | Jumlah |     |
|-------------------------|--------------------|------|-------|------|--------|-----|
|                         | Ya                 |      | Tidak |      | n      | %   |
|                         | n                  | %    | n     | %    |        |     |
| Tidak Baik              | 18                 | 45   | 2     | 5    | 20     | 20  |
| Baik                    | 15                 | 37,5 | 5     | 12,5 | 20     | 80  |
| Total                   | 33                 | 82,5 | 7     | 17,5 | 40     | 100 |

Sumber : Data Primer Tahun 2012

Dari 40 responden, 2 orang (5%) memiliki kebiasaan memotong kuku yang tidak baik tetapi tidak terinfeksi kecacingan. 15 orang (37,5%) memiliki kebiasaan memotong kuku yang baik tetapi terinfeksi kecacingan. 5 orang (12,5%) memiliki kebiasaan memotong kuku yang baik dan tidak terinfeksi kecacingan. 18 orang (45%) memiliki kebiasaan memotong kuku yang tidak baik dan terinfeksi kecacingan.

## C. Pembahasan

### 1. Hygiene perorangan

#### a. Kebiasaan membuang tinja

Tinja merupakan media tempat berkembang dan berinduknya bibit penyakit seperti kecacingan. Apabila tinja tersebut dibuang disembarang tempat selain di jamban maka bibit penyakit tersebut akan menyebar luas ke lingkungan dan akhirnya menginfeksi manusia.

Pembuangan tinja sembarang tempat dapat menyebabkan terjadinya infeksi kecacingan karena tinja yang dibuang sembarang tempat dapat mencemari tanah. Hal ini dibuktikan oleh Pasaribu (2004) yang melakukan penelitian di kabupaten Karo dan menemukan 45,8% dari sampel tanah yang tercemar oleh tinja manusia diperiksa mengandung telur cacing *Ascaris lumbricoides*.

Hasil penelitian pada murid di SD Inpres Cambaya menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang diteliti, 39 orang (97,5%) diantaranya yang memiliki kebiasaan membuang tinja yang baik dan terinfeksi kecacingan dan ada 1 orang (2,5%) responden yang memiliki kebiasaan membuang tinja yang tidak baik dan terinfeksi kecacingan.

Dari data hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa orang yang membuang tinja di jamban belum tentu tidak berisiko terinfeksi kecacingan apalagi orang yang membuang tinja di

sembarang tempat selain di jamban, risiko terinfeksi kecacingan jauh lebih besar.

Kebiasaan membuang tinja yang baik tidak menjamin seseorang dapat terhindar dari infeksi kecacingan. Masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang terinfeksi kecacingan, seperti kebiasaan mencuci tangan yang tidak baik, kebiasaan memotong kuku, kebiasaan memakai alas kaki, dan sanitasi lingkungan rumah dan sekolah yang tidak memenuhi syarat.

b. Kebiasaan mencuci tangan

Kebanyakan penyakit kecacingan ditularkan melalui tangan yang kotor. Kebersihan tangan sangat penting karena tidak ada bagian tubuh lainnya yang paling sering kontak dengan mikroorganisme selain tangan.

Jalur masuknya telur cacing ke dalam tubuh manusia secara umum melalui mulut dan kulit. Apabila telur cacing menempel pada tangan ketika mereka sedang bermain dan setelah itu makan atau minum tanpa mencuci tangan maka telur cacing masuk ke mulut dan tertelan bersama makanan dan minuman tadi. Selain itu apabila seorang anak tidak mencuci tangan dan kemudian menjamah makanan, maka telur cacing yang menempel pada tangan anak tersebut mengkontaminasi makanan dan orang-orang yang memakan makanan tersebut dapat terinfeksi kecacingan.

Oleh karena itu, tangan hendaknya dibersihkan sebelum dan sesudah makan, setelah buang air besar/kecil, serta setelah melakukan aktivitas. Tangan di cuci di bawah air yang mengalir dan menggunakan sabun. Hal ini dapat mengurangi risiko terkena atau menyebarkan telur cacing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden memiliki kebiasaan mencuci tangan yang tidak baik karena semua responden memiliki kebiasaan tidak mencuci tangan setelah bermain dan buang air kecil. Hal ini menjadi faktor risiko terbesar yang menyebabkan 33 orang (82,5%) responden terinfeksi kecacingan karena setelah bermain dan buang air kecil responden tidak mencuci tangan. Sehingga telur cacing dapat menempel di tangan dan pada saat anak jajan telur cacing masuk bersama makanan jajanan yang dimakan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salbiah (2008), yang menunjukkan bahwa sekitar 66,9 % siswa SD Medan Belawan memiliki kebiasaan mencuci tangan yang tidak baik dan terinfeksi kecacingan.

Mencuci tangan hendaknya dilakukan setiap selesai beraktivitas. Karena telur cacing dapat menempel di tangan kapanpun dan dimanapun. Seseorang yang mencuci tangan setelah buang air besar dan sebelum makan belum tentu terhindar dari infeksi kecacingan, karena telur cacing dapat menempel kapan

saja. Pada saat bermain kemungkinan telur cacing menempel pada tangan anak lebih besar. Mengingat pada saat bermain anak cenderung tidak memperhatikan apa yang mereka pegang karena keasyikan bermain tanpa menutup kemungkinan sesuatu yang mereka pegang itu terkontaminasi telur cacing.

c. Kebiasaan memakai alas kaki

Kulit merupakan tempat masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Tanah merupakan media yang baik untuk pertumbuhan larva cacing. Jika seseorang menginjakkan kakinya di tanah tanpa alas kaki maka telur cacing akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh.

Cacing tambang yang selanjutnya disebut *Ancylostoma duodenale* sering masuk ke dalam tubuh melalui kulit. Para petani dan karyawan perkebunan yang mempunyai kebiasaan berjalan tanpa memakai alas kaki kehilangan darah atau yang biasa disebut anemia karena disebabkan oleh cacing tambang.

Telur-telur cacing tambang keluar melalui dubur manusia bersama tinja, kemudian masuk ke dalam tanah, apabila tanah yang dimasukinya basah atau lembab, telur akan berkembang menjadi larva yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia dengan menembus kulit kaki, larva melakukan perjalanan ke seluruh tubuh hingga ke paru-paru. Cacing tambang dapat berpindah dari seseorang kepada orang lain melalui kaki, tidak melalui mulut.

Hasil penelitian menunjukkan dari 33 responden yang terinfeksi kecacingan, 26 orang (65%) responden menggunakan alas kaki bila berada di luar rumah dan 7 orang (17,5%) responden tidak menggunakan alas kaki.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salbiah (2008) dimana ada 80% siswa SD Medan Belawan memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang baik tetapi terinfeksi kecacingan.

Dari data di atas menggambarkan bahwa kebiasaan memakai alas kaki responden baik namun ada faktor lain yang menyebabkan banyaknya responden yang terinfeksi kecacingan. 26 orang (65%) responden yang memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang baik karena memakai alas kaki setiap berada di luar rumah terinfeksi kecacingan karena dipengaruhi faktor lain seperti kebiasaan mencuci tangan yang tidak baik dan kebiasaan memotong kuku yang tidak baik pula. Sedangkan 7 orang (17,5%) responden yang memang tidak memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang tidak baik sudah pasti terinfeksi kecacingan karena didukung dengan kebiasaan mencuci tangan yang tidak baik pula. Adapun dari 1 responden yang tidak memiliki kebiasaan memakai alas kaki yang baik namun tidak terinfeksi kecacingan dikarenakan responden tersebut rutin diberikan obat cacing oleh ibunya setiap enam bulan sekali.

d. Kebiasaan memotong kuku

Kuku tangan yang panjang dan kotor menyebabkan tertimbunnya kotoran dan kuman penyakit. Telur cacing sering kali terselip di kuku yang kotor. Telur cacing yang berada di tanah dapat pindah ke sela-sela jemari tangan atau terselip pada kuku. Sehingga saat memakan makanan, telur cacing yang melekat pada kuku yang panjang dan kotor akan ikut tertelan bersama makanan yang dimakan. Oleh karena itu, kuku sebaiknya di potong sekali seminggu untuk menjaga kebersihannya.

Penularan cacing kremi biasanya berlangsung dari jari-jari tangan, masuk ke dalam mulut lalu masuk ke dalam saluran cerna, sampai ke usus halus terus menetas menjadi cacing. Pada waktu cacing betina hendak bertelur mereka pindah ke kawasan dubur. Gerakan – gerakan cacing di tempat tersebut mengakibatkan rasa geli atau gatal. Rasa gatal ini mendorong anak untuk menggaruk-garuk dan biasanya jari menyentuh kawasan dubur, banyak telur cacing yang menempel pada tangan dan tersembunyi di belakang kuku jari tangan yang tidak dipotong. Bila ada makanan yang tersentuh oleh kuku tersebut maka terjadilah penularan dari orang penderita ke orang yang sehat melalui makanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 33 responden yang terinfeksi kecacingan, 15 orang (37,5%) responden yang memiliki kebiasaan memotong kuku yang baik dan terinfeksi



kecacingan dan ada 18 orang (45%) responden yang memiliki kebiasaan memotong kuku yang tidak baik dan terinfeksi kecacingan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salbiah (2008) yang menunjukkan bahwa 46% siswa SD Medan Belawan yang memiliki kebiasaan memotong kuku yang tidak baik terinfeksi kecacingan.

Jumlah responden yang menderita kecacingan dan memiliki kebiasaan memotong kuku yang tidak baik lebih banyak dari jumlah responden yang menderita kecacingan dan memiliki kebiasaan memotong kuku yang baik. Hal ini membuktikan bahwa, kuku yang tidak dijaga kebersihannya, dibiarkan kotor dan panjang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dapat terinfeksi kecacingan.

## 2. Sanitasi lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Mulai dari segala apa yang ada dalam batas pagar sekeliling sekolah sampai apa-apa yang ada di luar pagar sekolah tentunya di sekitar sekolah. Lingkungan sekolah yang sehat sebagai penunjang proses belajar mengajar perlu diperhatikan dalam pembinaan dan pengembangan guna menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat.

Kesehatan lingkungan sekolah sangat tergantung oleh semua pihak yang berkecimpung di dalam sekolah. Kesehatan lingkungan sekolah yang baik akan terwujud bila semua pihak yang terkait dalam hal ini guru dan siswa menyadari akan pentingnya kesehatan lingkungan sekolah sehingga mereka mau mewujudkannya dalam usaha yang nyata.

#### 1. Sarana air bersih

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia baik untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Air adalah kebutuhan mutlak bagi manusia karena air adalah zat pembentuk tubuh manusia yang mencapai 75% dari bagian tubuh manusia tanpa jaringan lemak.

Dengan memperhatikan kualitas maupun kuantitas yang cukup sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, berarti kita telah mencegah penyakit yang berbasis lingkungan berkaitan langsung dengan air sebagai kebutuhan vital manusia.

SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa memiliki sarana penyediaan air bersih yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1429/MENKES/SK/XII Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, yaitu tersedianya air bersih yang memenuhi kebutuhan di sekolah, kualitas air memenuhi syarat parameter fisik yaitu tidak berbau,

tidak berasa, dan tidak berwarna. Serta jarak air bersih dengan sumber pencemar minimal 10 meter.

Salah satu syarat sarana air bersih yang memenuhi syarat adalah apabila sumber air bersih berjarak minimal 10 meter dari septic tank. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pencemaran oleh tinja yang berada di septic tank. Tinja merupakan media penularan kecacingan selain tanah. Apabila jarak sumber air bersih kurang dari 10 meter dari septic tank maka risiko pencemaran telur cacing melalui tinja pada air jauh lebih besar.

Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia sehingga peranan air dalam kesehatan telah dikemukakan dalam al-qur'an. Manusia diperintahkan agar memanfaatkan air bersih dan menekankan kebersihan dengan memanfaatkan air yang mengalir untuk kesehatan.

Dijelaskan dalam potongan ayat Q.S.Al-Furqan (25): 48

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Terjemahnya :

*“Dan Kami turunkan dari langit air yang Amat bersih”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan air yang bersih. Pada dasarnya air yang diciptakan oleh Allah SWT itu adalah air bersih tapi karena kegiatan manusia tidak menjaga kebersihan air sehingga ada air yang kotor dan tidak memenuhi syarat kesehatan.

Ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat di lingkungan sekolah sangatlah penting sebagai salah satu upaya pencegahan infeksi kecacingan pada murid di sekolah. Penularan cacing dapat terjadi melalui air dan makanan yang terkontaminasi oleh telur dan larva cacing (Riyadi, 1984).

Selain itu tersedianya air bersih dan memenuhi syarat, memungkinkan semua murid menjaga hygiene perorangan. Misalnya dengan air bersih yang terus mengalir, murid dapat menggunakannya untuk mencuci tangan setelah bermain atau pada saat hendak makan makanan jajanan, sehingga kontaminasi telur cacing di tangan dapat di minimalisir.

Ketersediaan air bersih di lingkungan sekolah juga menjadi penunjang kebersihan lingkungan sekolah. Dengan adanya air bersih yang terus mengalir dapat digunakan untuk membersihkan setiap ruangan sekolah khususnya jamban/WC.

Dari hasil observasi ditemukan bahwa sarana air bersih di SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa memenuhi syarat namun dari hasil uji laboratorium pada tinja murid yang menjadi responden ditemukan masih banyak murid yang terinfeksi kecacingan. Hal ini disebabkan karena ada faktor hygiene perorangan dan sarana sanitasi lingkungan lainnya yang mempengaruhi.

## 2. Jamban/WC

SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa memiliki sarana pembuangan air besar dan kecil belum memenuhi standar yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1429/MENKES/SK/XII Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah.

Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan sekolah toilet harus terpisah dengan ruang kelas. Agar bau khas dari toilet tidak mengganggu konsentrasi belajar siswa. Apabila dekat dengan ruang kelas kuman-kuman dari toilet dapat dengan mudah berbau dengan siswa.

Di sekolah ini jumlah toiletnya belum sesuai proporsi yang ditentukan yaitu 1 WC untuk 40 murid laki-laki dan 1 WC untuk 25 murid perempuan. Sekolah ini hanya memiliki 2 WC dan tidak terpisah antara toilet pria dan toilet wanita.

Toilet di sekolah ini tidak dalam keadaan bersih, dan ada genangan air dalam toilet.

Jamban yang tidak memenuhi syarat memungkinkan kontaminasi telur cacing melalui tinja. Pada jamban yang tidak dipelihara kebersihannya, telur cacing dapat menempel pada dinding dan lantai jamban terbawa oleh murid yang terinfeksi kecacingan. Kemudian telur cacing tersebut menempel pada kulit atau tangan murid yang sehat, maka terinfeksilah murid tersebut.

### 3. Sarana pembuangan sampah

Sarana pembuangan sampah di sekolah sangatlah penting untuk menampung sampah agar tidak berserakan. Sampah yang berserakan dapat menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit.

Oleh karena itu diperlukan tempat penampungan sampah di setiap ruangan kelas yang dilengkapi dengan tutup agar aroma yang tidak sedap dari sampah tidak mengganggu kenyamanan belajar siswa.

SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa belum memiliki tempat penampungan sampah yang memenuhi standar yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1429/MENKES/SK/XII Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah. Karena sekolah ini tidak memiliki tempat sampah yang disertai tutup di setiap ruangan kelas dan tidak memiliki tempat penampungan sampah sementara.

Sampah – sampah yang berserakan menyatu dengan tanah yang terkontaminasi telur cacing. Murid sekolah dasar cenderung menghabiskan waktu bermainnya di sekolah dengan bermain-main di tanah. Apabila sampah – sampah yang berserakan tersebut dikumpulkan oleh murid, telur cacing dapat menempel pada tangan. Terutama pada murid yang biasa bermain di sekolah

dengan melepaskan sepatunya bisa tanpa sengaja menginjak sampah berserakan yang telah terkontaminasi telur cacing sehingga mereka terinfeksi melalui kulit telapak kaki.

#### 4. Sarana pembuangan air limbah

Air limbah adalah air sisa buangan dari semua aktivitas di sekolah. Baik itu yang berasal dari dapur maupun WC. Air limbah sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga perlu ada pengelolaan yang baik. Karena apabila air limbah tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan sekitar dan menjadi media penularan penyakit.

Sarana pembuangan air limbah yang baik harus memenuhi syarat kesehatan yaitu terbuat dari bahan kedap air, tertutup, dan terpisah dari saluran penuntasan air hujan.

SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa belum memiliki sarana pembuangan air limbah yang memenuhi standar yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1429/MENKES/SK/XII Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, karena sekolah tersebut tidak memiliki sarana pembuangan air limbah, sehingga limbah yang berasal dari toilet di alirkan begitu saja ke selokan.

Khususnya air limbah yang berasal dari toilet di sekolah perlu pengelelolaan yang baik. Air buangan dapat menyebabkan terjadinya infeksi baru dan infeksi ulang kecacangan apabila air

tersebut mencemari tanah. Air limbah yang berasal dari toilet kemungkinan besar mengandung banyak telur cacing mengingat aktivitas buang air besar, kecil dan mencuci tangan dilakukan di sana. Apabila air limbah dibiarkan mengalir begitu saja. Telur cacing yang terkandung dalam air limbah tersebut dapat mencemari air dan tanah.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Ada beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Beberapa sampel tidak bersedia menjadi responden karena merasa malu untuk di periksa fesesnya.
2. Pengumpulan feses dari anak sekolah dasar yang menjadi responden membutuhkan waktu yang lama, karena anak – anak tersebut tidak memiliki kebiasaan buang air besar setiap harinya.
3. Ketertutupan pihak sekolah dalam berbagi informasi tentang sanitasi lingkungan sekolah di sekolah tersebut menyulitkan peneliti dalam melakukan penelitian.
4. Hasil penelitian ini tidak menggambarkan spesifikasi jenis cacing tertentu, tetapi hanya digambarkan apakah terinfeksi atau tidak terinfeksi berdasarkan tujuan penelitian.
5. Kesalahpahaman peneliti pada metode penelitian sehingga sampel yang diperoleh lebih sedikit dari hasil perhitungan sampel.



## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa memiliki gambaran hygiene perorangan yang tidak baik.
2. Lingkungan sekolah SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa memiliki gambaran sanitasi lingkungan sekolah yang tidak memenuhi syarat kesehatan lingkungan sekolah yang baik.
3. Murid SD Inpres Cambaya Sungguminasa Gowa sebagian besar terinfeksi kecacingan.

### **B. Saran – saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dengan besarnya angka infeksi kecacingan pada sekolah tersebut yaitu 82,5%, maka perlu dilakukan program pencegahan dan pemberantasan kecacingan di sekolah tersebut. Salah satu caranya adalah dengan memberlakukan kembali pemeriksaan kuku murid setiap seminggu sekali. Hal ini juga dapat meningkatkan hygiene perorangan murid yaitu kebersihan kuku.

2. Pihak sekolah bekerja sama dengan tim puskesmas setempat memberlakukan pemberantasan kecacingan dengan cara pemberian obat cacing secara rutin 6 bulan sekali.
3. Karena keterbatasan variabel yang diteliti maka disarankan penelitian lain untuk dapat meneliti lebih mendalam dan luas dengan variabel-variabel lain yang belum tergali seperti pemeriksaan tanah di lingkungan rumah dan sekolah untuk mengetahui tingkat pencemaran tanah oleh telur cacing.



## DAFTAR PUSTAKA

Alquran

Al Fanjari, Ahmad Syauqi. 2006. *Nilai Kesehatan Dalam Syarikat Islam, Cet.II*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya

Adam, Syamsunir. 1992. *Hygiene Perorangan*. Jakarta: Bhratara Niaga Media.

Anwar, Azrul. 1996. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Cet Ke-8. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Azwar, S. 1990. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Benenson, Abram S. 1985. *Control Of Communicable Disease In Men*, 14 th ed Washington D.C., The American Public Health Association.

Brown WH. 1983. *Dasar Parasitologi Klinis*. Jakarta: Penerjemah Rukmono.

Daud, Anwar. 2007. *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*. Makassar: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin.

DepKes RI. 2004. *Pedoman Umum Program Nasional Pemberantasan Cacingan Di Era Desentralisasi*. Jakarta: DepKes RI.

DepKes RI. 1999. *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2012*. Jakarta: DepKes RI

Dinkes Prop. Sulawesi Selatan. 2006. *Pedoman Pengembangan Kabupaten Percontohan Program Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)*. Makassar: Dinkes Prop. Sulawesi Selatan.

Effendy, Nasrul. 1998. *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC

Gandahusada S, Ilahude H, Herry D dan Pribadi W. 2004. *Parasitologi Kedokteran*. Jakarta: FKUI.

- Hidayat T. 2002. *Kesehatan Lingkungan Higiene Perseorangan Dan Intensitas Penyakit Kecacangan Dengan Status Gizi Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Mataram*. Thesis. Program pasca sarjana. Yogyakarta: UGM.
- Jawetz E, Melnick LJ, Adelberg AE, Brooks FG, Butel SJ, and Ornston NL. 1996. *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: Penerjemah Nugroho E dan Maulany FR. Edisi 20 EGC.
- Meriyati S. 1994. *Kesehatan Keluarga dan Lingkungan*. Jakarta: Kanisius
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurhaedah. 2006. *Hubungan Antara Sanitasi Lingkungan Dan Hygiene Perorangan Dengan Kejadian Kecacangan Pada Murid Sekolah Dasar Al-Akhyar Di Pesantren Pondok Madinah Sudiang Makassar*. Skripsi. Makassar: FKM Unhas.
- Poespoprodjo JR dan Sadjimin T. 2000. *Hubungan Antara Tanda dan Gejala Penyakit Cacing dengan Kejadian Kecacangan pada Anak Usia Sekolah Dasar di Kecamatan Ampama Kota Kabupaten Poso Sulawesi tengah*. *Jurnal Epidemiologi Indonesia*. 4(1). 9-15.
- Riyadi S. 1984. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Surabaya: Usana Offset Printing.
- Salbiah. 2008. *Hubungan Karakteristik Siswa dan Sanitasi Lingkungan Dengan Infeksi Kecacangan Siswa Sekolah Dasar Kecamatan Medan Belawan*. Tesis. Medan: FK USU
- Stang. 2005. *"Biostatistik"*. Makassar: FKM Unhas
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan No:1429/MENKES/SK/XII. 2006. *Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah*. Jakarta: Departemen Kesehatan
- Ulukanligil M, Seyrek A, Aslan G, Ozbilge H, and Atay S. 2001. *Environmental Pollution With Soil-Transmitted Helminths in Sanliurfa Turkey*. *Rio de Jeneiro. Men inst Oswaldo Cruz*. Vol. 96(7):903-909.

Waqiah, Ummul. 2010. *Hubungan Hygiene Perorangan dengan Kejadian Infeksi Kecacingan Pada Pemulung Anak Usia Sekolah Dasar di TPA Antang Makassar. Skripsi.* Makassar: Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin.

Zit Z. 2000. *Pengobatan Infeksi Cacing Yang Ditularkan Melalui Tanah Dengan Kombinasi Mebendazol Dan Pirantel Pada Anak.* Majalah kedokteran Sriwijaya. 32.(1).46-50.

