

**HUBUNGAN TINGKAT KEPARAHAN GEJALA DENGAN KEJADIAN
PROLONG SIGN PASIEN POST COVID-19 : *LITERATUR REVIEW***



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

HIKMAH SARI

70300117082

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Hubungan Tingkat Keparahan Gejala Dengan Kejadian Prolong Sign Pasien Post Covid-19: Literature Review*" yang disusun oleh Hikmah Sari, NIM: 70300117082, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 15 Desember 2021, bertepatan dengan 11 Jumadil Awwal 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 15 Desember 2021
11 Jumadil Awwal 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hasnah, S.Sit., S.Kep.,Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Aisyah Arsyad., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Wahdaniah, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Ahmad J., S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.KMB	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tercurah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan pendekatan *Literatur Review* yang berjudul **“Hubungan Tingkat Keparahan Gejala dengan Kejadian *Prolong Sign* Pasien Post Covid-19”** guna memenuhi persyaratan Akademik dalam menyelesaikan pendidikan (S1) Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Tak lupa pula, shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak, berkat usaha dan perjuangannya sehingga dapat mengajarkan kita akan indahnnya rasa cinta dan kasih, iman dan islam, pembawa kebenaran dan sebagai sosok teladan bagi seluruh umat.

Penulis menyatakan bahwa sebagai hamba Allah, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, kata sempurna sangat jauh dari penyusunan skripsi ini. Berbagai hambatan, tantangan, keterbatasan dan kekurangan yang hadir dalam penyelesaian skripsi ini merupakan refleksi dari ketidaksempurnaan penulis sebagai manusia. Oleh karena itu, berbagai saran dan kritikan yang dapat membangun demi penyusunan karya tulis ilmiah selanjutnya sangat penulis harapkan.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan moril, saran-saran, bimbingan dan dorongan serta arahan dari berbagai pihak. Tidak ada

kata lain selain terima kasih sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan untuk segala dukungan, perhatian, apresiasi, senyuman, kehangatan, persahabatan, dan obrolan-obrolan yang menyenangkan sekaligus menenangkan, pesan-pesan dan harapan dari orang-orang yang selama ini turut andil membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terlebih karena atas izin Allah SWT dan kedua orang tua tercinta, terkasih dan tersayang, Ayahanda Drs Syarif dan ibu Hasriah Eluba S.Pd serta adinda Nur Hidayah Sari atas kasih sayang, bimbingan, serta motivasi dan doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai dititik ini. Untuk segenap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, arahan, serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama menyelesaikan studi. Penulis selalu merasa akan berhasil melakukan hal-hal yang tidak mungkin sekalipun, sehingga mengantarkan penulis untuk dapat menyelesaikan amanah akademik dan dapat meraih gelar Sarjana Keperawatan.

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa hormat, tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis MA. PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus peradaban ini.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, serta seluruh Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis

menempuh Pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Ketua Jurusan Keperawatan dan Dr. Hasnah S.Sit., S.Kep., Ns., M.,Kes selaku Sekretaris Jurusan Keperawatan beserta seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan seluruh Staf Jurusan Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi serta memberika bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Wahdaniah S.Kep., Ns., M.,Kes selaku pembimbing I dan Ahmad J,S.Kep., Ns., M.,Kep., Sp.KMB selaku pembimbing II yang ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada peneliti untuk mengarahkan dan memberikan bimbingan, saran, informasi dan motivasi selama proses bimbingan penyusunan skripsi ini selesai, sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
5. Dr Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes selaku penguji I dan Dr. Aisyah Arsyad, M.Ag selaku penguji II yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran, kritik, arahan dan tanggapan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Teman-teman se-angkatan program studi keperawatan angkatan 2017 dan khususnya grub lipstick atas kebersamaannya bergandengan tangan saling merangkul satu sama lain, baik suka maupun duka.
7. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan mulai dari mahasiswa baru sampai menjadi mahasiswa tingkat akhir (Mutmainnah dan Reski Amelia) yang selalu menjadi *best partner* selama kuliah sampai sekarang, memberikan motivasi,

menasehati, siap membantu penulis dalam keadaan apapun untuk menyelesaikan proses penelitian.

8. Kepada grup ADAKAH (Hartati Kasim, Suci Sry Rezki, Mursalin Dahlan dan Wahyudin) yang selalu menemani, memberi motivasi, memberi masukan sekaligus senantiasa menyemangati penulis dalam membuat skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun dalam kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, baik lisan maupun tulisan saat menempuh pendidikan di kampus peradaban yang tercinta dan membanggakan ini, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis berharap bahwa apa yang di sajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya dan menjadi salah satu bentuk pengabdian di masyarakat nantinya. Semoga hal ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum

Samata, 15 Desember 2021
Penyusun


Hikmah sari
70300117082

DAFTAR ISI

SAMPUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR BAGAN	XI
ABSTRAK	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Ilmiah	6
2. Manfaat Praktis	6
3. Manfaat Bagi Pelayanan Keperawatan	6
4. Manfaat Institusi	6
5. Manfaat Bagi Masyarakat	7
E. Kajian Pustaka	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Pustaka Tentang Covid-19	13
1. Pengertian	13
2. Etiologi	17
3. Gejala Covid-19	18
4. Manifestasi Klinis	18
5. Penegakan Diagnosa	20

6. Cara Penularan	21
7. Pencegahan Covid-19	25
8. Faktor Risiko Covid-19	26
9. Tatalaksana pasien Covid-19	27
B. Tinjauan Pustaka Tentang <i>Prolong Sign</i>	41
1. Definisi Prolong sign	41
2. Gejala <i>Prolong Sign</i>	42
3. Penyebab <i>Prolong Sign</i>	45
4. Faktor Risiko <i>Prolong Sign</i>	46
C. Tinjauan Pustaka Tentang Tingkat Keparahan	47
1. Tanpa Gejala (<i>Asintomatik</i>)	47
2. Gejala Ringan	47
3. Gejala Sedang	47
4. Gejala Berat	48
5. Kritis	48
D. Kerangka Teori	50
E. Kerangka Konsep	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Teknik Pengumpulan Data	52
C. Strategi Pencarian <i>Literatur</i>	53
1. Database Pencarian	53
2. Kata Kunci	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil	56
B. Pembahasan.....	70

C. Keterbatasan penelitian	76
D. Implikasi penelitian.....	77
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83
RIWAYAT HIDUP.....	99



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Kajian Pustaka	8
4.1 Strategi PICO	49
4.2 Kriteria Inklusi Ekslusi	49
4.3 Kata Kunci	50
4.1 Karakteristik Studi	54
4.2 <i>Sintesis Grid</i> Jurnal	56



DAFTAR BAGAN

Grafik	Halaman
2.1 Kerangka Teori	48
2.2 Kerangka Konsep	48
4.1 <i>Diagram Flow</i>	53



ABSTRAK

Nama : Hikmah Sari

Nim : 70300117082

Judul : Hubungan Tingkat Keparahan Gejala Dengan Kejadi Prolong Sign Pasien Post Covid-19

Covid-19 telah menginfeksi jutaan orang di dunia dan ditemukan adanya gejala jangka panjang setelah terinfeksi yang disebut *Prolong sign*. *Prolong sign* adalah suatu kondisi adanya gejala-gejala yang muncul pada pasien Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh berdasarkan hasil swab negatif. Tujuan studi ini adalah untuk menghubungkan antara tingkat keparahan gejala dengan kejadian *prolong sign* pasien post Covid-19. Penelitian ini menggunakan desain *deskriptif naratif* dengan metode *literature review*. Pengumpulan artikel menggunakan *electronic database* dari jurnal yang telah dipublikasi dengan menggunakan kata kunci “*Covid-19 OR Coronavirus OR SARS-CoV2, Prolong sign OR Long covid OR Syndrom post Covid-19 AND Tingkat keparahan Covid-19*”. Hasil penelitian ditemukan 7 jurnal terkait tingkat keparahan yang mempengaruhi *prolong sign* dan dianalisis yaitu gejala ringan dan berat. Gejala ringan seperti (nyeri dada, sesak napas, nyeri otot dan sendi, sakit kepala). Gejala berat seperti (nyeri, ketidaknyamanan & kecemasan atau depresi, kelelahan, penurunan kapasitas paru, mempengaruhi fungsi organ seperti fibrosis paru, gagal ginjal, miokarditis, aritmia dan stroke, sakit kepala, gangguan perhatian, anosmia, ketidakmampuan berkonsentrasi, dan neuropati). Tingkat keparahan gejala tersebut telah terbukti memiliki hubungan pada kejadian *prolong sign*. Dengan mengetahui gejala-gejala *prolong sign* dan tingkat keparahan Covid-19 sehingga perawat dapat memberikan edukasi bagi pasien yang telah sembuh dari Covid-19 seperti rencana pulang yang sesuai dengan kondisi pasien.

Kata Kunci: *Covid-19, Prolong sign, Tingkat keparahan Covid-19*

ABSTRACT

Nama : Hikmah Sari

Nim : 70300117082

Judul : *Relation Of Symptom Severity Level with Prolong Sign Post Covid-19 Pasien*

Covid-19 has infected millions of people in the world and found long term symptoms after infection called prolong sign. Prolong sign is a condition of the presence of symptoms that appear in the patient Covid-19 that has been declared cured based on negative swab results. The aim of this study was to link between severity symptoms with the incidence of prolong sign in post Covid-19 patients. This research used a descriptive narrative design with a literature review method. Article collection used an electronic database from journals that have been published with the keywords "Covid-19 OR Coronavirus OR SARS-CoV2, Prolong sign OR Long covid OR Post Covid-19 syndrome AND The severity of Covid-19". The results of the study found 7 related journals about the severity that affects the prolong sign is analysed, namely mild and severe symptoms. Mild symptoms such as (Chest pain, shortness of breath, muscles and joints, headaches). Severe symptoms such as (pain or discomfort and anxiety or depression, fatigue, decreased lung capacity, affect organ function such as pulmonary fibrosis, renal failure, myocarditis, arrhythmias and strokes, headache, attention deficit disorder, anosmia, brain fog, & neuropathy). The severity of these symptoms has been shown to have relationship to the incidence of prolong sign. By knowing the prolong sign symptoms and severity of Covid-19, the nurses can provide education for patients who have recovered from Covid-19 such as prepare discharge plans according to the patient's condition.

Keywords: Covid-19, Prolong sign, Severity of Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 atau disingkat (SARS-CoV-2) merupakan jenis virus corona terbaru yang kini sedang mewabah pada seluruh dunia. Pneumonia virus tersebut untuk pertama kali diperoleh di Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember tahun 2019 (Suharmanto, 2020). Adanya penyebaran virus Covid-19 dari kota Wuhan, Tiongkok hingga keseluruhan dunia, diperkirakan penyebabnya adalah melalui penularan aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dari satu negara ke negara yang lain tanpa adanya pengawasan secara ketat (Sirajuddin, 2020).

Terdapat peningkatan terhadap kasus penyebaran Covid-19 di seluruh dunia. Kasus Konfirmasi Covid-19 mencapai lebih dari 27,2 juta dengan angka kematian 890.000 jiwa berdasarkan laporan *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 8 September 2020 di 187 negara (WHO, 2020). Kemudian kasus konfirmasi yang dilaporkan oleh Negara Indonesia pada tanggal 30 Juli 2021 sebanyak 3.372.374 kasus positif dengan 92.311 angka kematian (KemenKes RI, 2021). Penyebaran virus Covid-19 yang terjadi secara cepat di seluruh wilayah Indonesia hingga akhirnya terdampak pada wilayah Sulawesi Selatan. Kasus konfirmasi yang dilaporkan pada tanggal 24 Juni 2021 terdapat 63,390 kasus dengan 965 meninggal dunia (DinKes Prov SulSel, 2021).

Berdasarkan pengamatan melalui mikroskop diperoleh bentuk dari virus berbentuk taji-taji seperti mahkota dengan diameter ukur yaitu 70-120 nm (Dani et al., 2021). Terminologi yang terkait dengan Covid-19 yang ada di

dalam Al-quran seperti lafadz **مَثَلًا** (perumpamaan ilmiah), jadi Covid-19 ini merupakan perumpamaan ilmiah dari Allah Walaupun bentuknya yang amat kecil tetapi virus corona ini tingkat penyebarannya sangat tinggi kemudian manusia-manusia di dalamnya harus banyak mengambil pelajaran. Seperti yang telah tertuang pada QS Al-Baqarah ayat 26 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا
 الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ
 مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ
 بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka kafir mengatakan:” apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?”. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang di sesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang di beri-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang di sesatkan Allah kecuali orang-orang fasik” (QS Al-baqarah ayat 26).

Corona virus adalah virus jenis baru telah menyebabkan banyaknya orang yang terdampak dan mengalami kematian sehingga terjadi kekacauan pada dunia saat ini. Tidak hanya tingkat penyebarannya yang sangat tinggi, namun Covid-19 juga memiliki efek yang berkepanjangan berupa gejala-gejala yang muncul setelah sembuh. Adapun gejala-gejala umum yang bisa muncul seperti kelelahan, sesak napas, nyeri dada, dan nyeri otot, gejala tersebut hadir sebagai efek dari Covid-19 yang biasanya disebut *prolong sign* atau gejala sisa yang berkepanjangan (Id & Paper, 2021).

Masing-masing individu memiliki gejala-gejala Covid-19 yang berbeda. Pasien dapat menderita gejala yang berbeda seperti demam, batuk kering dan kelelahan yang ringan pada sekitar 80% kasus, tingkat keparahan kasus dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan atau gangguan kegagalan pernapasan sehingga kebutuhan akan unit perawatan intensif (ICU) akan meningkat. Tingkat keparahan penyakit dapat terkait dengan usia dan komorbiditas. Tingkat keparahan gejala juga berhubungan dengan durasinya, untuk kasus ringan gejala dapat berlangsung selama 2 minggu sedangkan untuk kasus berat berkisar antara 3 hingga 6 minggu (Callard & Perego, 2021).

Pada awal-awal mewabahnya Covid-19 sebagian besar pasien mulanya memiliki Covid-19 ringan dan tidak di rawat di rumah sakit, pasien-pasien ini banyak yang mengalami gejala sisa jangka panjang dan banyak yang mengalami gejala-gejala baru yang mengancam jiwa serta peristiwa traumatis lainnya, sering kali tanpa dukungan layanan kesehatan. Kemudian pada 9 Juli terkonfirmasi tingginya insiden gejala jangka panjang pada orang yang di rawat di Rumah Sakit, menunjukkan setidaknya satu gejala 60 hari setelah *onset* (Callard & Perego, 2021).

Diperkirakan gejala Covid-19 masih dialami orang yang telah sembuh setelah pertama kali muncul 60 hari pasca *onset* (WHO, 2020). Berdasarkan artikel tentang gejala pasca Covid-19 mengatakan dari 294 partisipan (63,5%) memiliki gejala lanjut pasca Covid-19. Beberapa orang masih mempunyai gejala setelah sembuh. Beberapa gejala multisistem dapat terjadi seperti gangguan fisik dan psikologis. Adapun masalah pada fisik yang terjadi seperti kelelahan kronis, nyeri otot, diare dan gangguan

kardiovaskuler sedangkan untuk gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, gangguan konsentrasi dan gangguan tidur (Y Kurniawan, 2021).

Seiring berkembangnya Covid-19 ada beberapa pengakuan bahwa pasien memiliki efek jangka panjang, seperti yang telah di laporkan oleh tim peneliti dari italia bahwa hampir 9 dari 10 pasien (87%) yang keluar dari Rumah Sakit Roma 60 hari setelah pulih dari Covid-19 masih mengalami setidaknya satu gejala. Mereka menemukan bahwa hanya 13% dari 143 pasien benar-benar bebas dari gejala apapun, sementara 32% memiliki satu atau dua gejala, dan 55% memiliki 3 atau lebih. Meskipun tidak ada pasien yang mengalami demam atau gejala penyakit akut, tetapi didapatkan masih ada yang mengalami gejala seperti kelelahan (53%), sesak (43%), nyeri sendi (27%), nyeri dada (22%). Dan dua perlima pasien melaporkan mengalami kualitas hidup yang buruk. Sementara itu studi dari Inggris yang menggunakan aplikasi studi gejala Covid-19 untuk mengumpulkan informasi gejala dan melibatkan hampir 4 juta pengguna, tim tersebut menemukan ada lebih banyak orang yang telah sembuh dari Covid-19 masih mengalami berbagai gejala (Mahase, 2020).

Pada tanggal 9 September 2020, dilaporkan oleh WHO yang mengamati orang yang telah sembuh dari Covid-19 mengalami efek jangka panjang Covid-19. Kemudian ditemukan bahwa sebagian besar pasien Covid-19 yang telah sembuh mengalami kondisi kesehatan yang lebih buruk setelah terinfeksi Covid-19 (WHO). Ada beberapa bukti anekdot yang mengatakan orang yang memiliki gejala ringan memiliki gejala-gejala yang berkepanjangan dan terus menerus setelah terinfeksi Covid-19 bahkan berminggu-minggu (Goertz et al.,2020).

Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyuarakan pentingnya perhatian semua pihak terkait fenomena *prolong sign* pada sejumlah pasien corona yang dinyatakan sudah sembuh. Dengan memahami mengenai gejala-gejala *prolong sign* dan tingkat keparahan Covid-19 juga sangat membantu bagi para tenaga kesehatan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi bagi pasien yang sudah dinyatakan negatif Covid-19 seperti persiapan rencana pulang (*discard planning*) yang sesuai dengan kondisi pasien. Melihat bahwa yang dijadikan subjek penelitian berdasarkan paparan di atas adalah pasien Covid-19 ditambah kondisi pasien yang masih berkepanjangan sehingga dilakukan penelitian dengan pendekatan telaah literatur mengenai disiplin ilmu Keperawatan Medikal Bedah dengan Judul “Hubungan Tingkat Keparahan Gejala dengan Kejadian *Prolong Sign* Pasien Post Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Prolong sign merupakan adanya gejala yang dapat muncul sebagai efek infeksi Covid-19 bagi orang yang sudah sembuh berdasarkan hasil swab negatif. Gejala *prolong sign* sangat berpengaruh pada tingkat keparahan sehingga dapat berbeda gejala yang muncul pada masing-masing individu. Gejala-gejalanya seperti kelelahan, demam, sesak napas dan nyeri sendi, fenomena *prolong sign* membuat WHO menyuarakan kepada semua pihak tentang pentingnya untuk pasien yang telah sembuh dari Covid-19 tetapi masih memiliki gejala sehingga menemukan bahwa sebagian besar pasien Covid-19 yang telah sembuh mengalami kondisi kesehatan yang lebih buruk setelah terinfeksi Covid-19.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah penelitian yakni: “Bagaimana Hubungan Tingkat Keparahan Gejala Dengan Kejadian *Prolong Sign* Pasien Post Covid 19: *Literatur Review*?”.

C. Tujuan penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat keparahan gejala dengan kejadian *prolong sign* pasien post Covid-19.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Agar dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat.

2. Manfaat praktis

Untuk menambah koleksi bacaan, sebagai masukan atau informasi untuk penyusun intervensi terkait dengan tingkat keparahan gejala Covid-19 dan *prolong sign* serta sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan Mahasiswa (i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Bagi pelayanan keperawatan

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk perawat, konselor, pemerintah dan bagian pelayanan masyarakat agar masih tetap memantau dan mengevaluasi pasien yang telah dinyatakan negatif Covid-19. Selain itu, dapat pula digunakan sebagai informasi tambahan berupa pendidikan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan (Khususnya perawat) kepada pasien yang telah dinyatakan negatif Covid-19 untuk tetap memiliki rencana pemulihan.


4. Manfaat institusi

Dapat di jadikan sebagai tambahan literatur atau bahan pustaka bagi mahasiswa (i) program studi ilmu keperawatan mengenai hubungan

tingkat keparahan gejala dengan kejadian *prolong sign* pada pasien post Covid-19.

5. Manfaat masyarakat

Dapat dijadikan sebagai informasi untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai hubungan *prolong sign* dengan tingkat keparahan gejala pasien post Covid-19. Khususnya kepada pasien post Covid-19 untuk tetap menjaga kesehatan dan dianjurkan untuk segera ke pusat pelayanan kesehatan ketika gejala makin buruk.



E. Kajian pustaka

Tabel 1.1
Kajian Pustaka

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dengan riset
1.	Lebih dari 50 efek jangka panjang dari Covid-19.	Untuk mengidentifikasi studi yang menilai efek jangka panjang Covid-19 dan memperkirakan <i>prevalensi</i> setelah gejala, tanda atau parameter laboratorium pasien pada tahap pasca Covid-19.	Tinjauan <i>sistematik</i> dan <i>meta-analisis</i> .	Sebanyak 18,251 publikasi diidentifikasi, 15 di antaranya memenuhi kriteria inklusi, prevalensi 55 efek jangka panjang di perkirakan, 21 <i>meta-analisis</i> dilakukan, dan 49,910 pasien di libatkan. Waktu tindak lanjut berkisar antara 14 hingga 110 hari pasca infeksi virus. Usia peserta penelitian berkisar antara 17 dan 87 tahun. Diperkirakan bahwa 80% (95% CI 65-92) dari pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 mengembangkan 1 atau lebih gejala jangka panjang. 5 gejala yang paling umum adalah kelelahan (58%), sakit kepala (44%), gangguan perhatian (27%), rambut rontok (25%), dan dyspnea (24%), semua <i>meta-analisis</i> menunjukkan <i>heterogenitas</i> sedang (n2) hingga tinggi (n13).	Pebedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh Sandra Lopez-Leon, Talia Wegman-Ostrosky, Carol Perelman, Rosalinda Sepulved, Paulina Rebolledo, Angelica Cuapio, Sonia Villapol Untuk mengidentifikasi studi yang menilai efek jangka panjang Covid-19 dan memperkirakan prevalensi setelah gejala, tanda atau parameter laboratorium pasien pada tahap pasca Covid-19 sedangkan peneliti ingin meneliti tentang hubungan tingkat keparahan gejala dengan kejadian <i>prolong sign</i> pasien post Covid-19.
2.	<i>Assessmen</i> dan karakterisa	Untuk mengetahui dan	<i>Cross sectional</i>	Hanya 10,8% dari tidak memiliki manifestasi setelah	Pebedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh

si manifestasi i pasca Covid-19.	mengkarakterisasi manifestasi yang muncul setelah <i>eradikasi</i> infeksi virus corona dan hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit.	sembuh dari penyakit ini sementara persentase besar subyek menderita beberapa gejala dan penyakit. Gejala yang paling umum di laporkan adalah kelelahan (72,8%), manifestasi yang lebih kritis seperti stroke, gagal ginjal, miokarditis, dan fibrosis paru di laporkan oleh beberapa persen subjek. Ada hubungan antara adanya <i>komorbiditas</i> lain dan tingkat keparahan penyakit. Juga, tingkat keparahan Covid-19 terkait dengan tingkat keparahan manifestasi pasca-Covid-19 tindak lanjut.	Marwa Tolba, Ph.D., Marwa Abo Omirah, Ph.D., Amal Hussein, Ph.D., dan Haitham Saeed, Ph.D. untuk mengetahui dan mengkarakterisasi manifestasi yang muncul setelah <i>eradikasi</i> infeksi virus corona dan hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit sedangkan peneliti ingin meneliti tentang hubungan tingkat keparahan gejala dengan kejadian <i>prolong sign</i> pasien post Covid-19.
3. Menemukan <i>GP</i> yang tepat: pengalaman orang dengan Covid-19 yang berkepanjangan.	Untuk mengeksplorasi pengalaman orang dengan gejala yang menetap setelah infeksi Covid-19, dan pandangan mereka tentang dukungan perawatan primer yang di terima.	<i>Kualitatif</i> Studi eksplorasi ini menggambarkan rentan dan kompleksitas gejala yang dialami oleh orang-orang dengan gejala yang menetap setelah di duga atau di konfirmasi Covid-19, fenomena ini di sebut <i>long covid</i> atau <i>post acute Covid-19</i> , dan merupakan gangguan baru yang diperkirakan mempengaruhi 10% orang yang terinfeksi Covid-19. Peserta menggambarkan kerja keras mengalami, dan	Pebedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh Tom Kingstone, Anna K Taylor, Catherine A O'donnell, Helen Atherton, David N Blane, Carolyn A Chew-Graham mengeksplorasi pengalaman orang dengan gejala yang menetap setelah infeksi Covid-19, dan pandangan mereka tentang dukungan perawatan primer yang di terima sedangkan peneliti ingin meneliti

			mengelola gejala mereka dan berbagai sumber dukungan dan bantuan yang mereka cari.	tentang hubungan tingkat keparahan gejala dengan kejadian <i>prolong sign</i> pasien post Covid-19.	
4.	<i>Sekuel Covid-19: Lintas bagian evaluasi dari gejala pasca pemulihan dan perlunya rehabilitasi korban Covid-19.</i>	Untuk menilai prevalensi dan karakteristik manifestasi pasca-Covid-19 dan pengaruhnya terhadap kualitas hidup (QOL) individu yang pulih dari Covid-19.	Sebuah <i>studi deskriptif, cross-sectional, berbasis kuesioner.</i>	Sebagian besar (94,9%) mengalami setidaknya 1 gejala pasca Covid-19 dengan kelelahan (82,9%) menjadi manifestasi pasca-pemulangan yang paling umum. Kami mengamati korelasi yang signifikan dari gejala pasca Covid-19 dengan jenis kelamin, usia, dan waktu sejak pemulihan. Tingkat keparahan Covid-19 di temukan secara signifikan terkait dengan 5 dimensi kualitas hidup. Perbedaan yang signifikan antara 23% (367 dari 1617) pasien proporsi median jarak jalan kaki 6 menit kurang dari batas bawah rentan normal adalah 24% untuk skala keparahan 3, 22% untuk skala keparahan 4, dan 29% untuk skala keparahan 5-6. Proporsi pasien dengan gangguan difusi yang sesuai adalah 22% untuk skala keparahan 3, 29% untuk skala 4, dan 56% untuk skala 5-6, dan skor CT rata-rata adalah 3,0	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh Ayman Iqbal, Qinza Iqbal, Shajeea Arsyad Ali, Dua Azim, Eisha Farid, Mirza D, Baig, Tahah Bin Arif, Mohammad Raza menilai prevalensi dan karakteristik manifestasi pasca-Covid-19 dan pengaruhnya terhadap kualitas hidup (QOL) individu yang pulih dari Covid-19 sedangkan penelitian ini ingin meneliti tentang hubungan tingkat keparahan gejala dengan kejadian <i>prolong sign</i> pasien post Covid-19.

(IQR 2,0-5,0) untuk skala keparahan 3, 4-0 (3,0-5,0) untuk skala 4, dan 5,0 (4,0-6,0) untuk skala 5-6 setelah penyesuaian multivariabel, pasien menunjukkan rasio odds (OR) 1,61 (95% CI 0,80-3,25) untuk skala 4 versus skala 3 dan 4,60 (1,85-11,48) untuk skala 5-6 versus skala 3 untuk gangguan difusi; atau 0,88 (0,66-1,17) untuk skala 4 versus skala 3 dan atau 1,77 (1,05-2,79) untuk skala 5-6 versus skala 3 untuk kecemasan atau depresi, dan atau 0,74 (0,58-0,96) untuk skala 4 versus skala 3 dan 2,69 (1,46-4,96) untuk skala 5-6 versus skala 3 untuk kelelahan atau kelemahan otot. Dari 94 pasien dari antibody darah yang di uji pada follow-up, seropositive (96,2% vs 58,5%) dan titer median (19,0 vs 10,0) dari antibody penetral secara signifikan lebih rendah di bandingkan dengan pada fase akut. 107 dari 822 peserta tanpa cedera ginjal akut dan dengan perkiraan laju filtrasi glomerulus (eGFR) 90 mL/menit per 1,73 m kuadrat atau

			lebih pada fase akut memiliki eGFR kurang dari 90 mL/menit per 1,73 kuadrat.	
5.	Gejala persistem pasien <i>long covid</i> dan konsep prinsip kualitas layanan.	Untuk mengetahui Pengalaman hidup pasien dengan covid jangka panjang termasuk mengakses dan menerima perawatan kesehatan dan ide untuk meningkatkan pelayanan.	<i>Kualitatif</i> Dari 114 peserta berusia 27-73 tahun, 80 adalah perempuan. 84 berkulit putih inggris, 13 asia, 8 berkulit putih lainnya, 5 berkulit hitam dan 4 etnis campuran. 32 adalah dokter dan 19 profesional kesehatan lainnya. 31 orang telah di rawat di rumah sakit, 8 di antaranya telah di rawat. Analisis mengungkapkan kebingungan dengan gejala yang banyak, bervariasi dan sering kambuh dan prognosis yang tidak pasti, rasa kehilangan dan stigma yang berat, kesulitan mengakses dan <i>menavigasikan</i> layanan, <i>divisuality</i> di anggap serius dan mencapai diagnosis, perawat terputus-putus dan terkungkung (termasuk kemampuan untuk mengakses layanan khusus).	Pembedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh Emma Ludds, Alex Rushforth, Sietse Wieringa, Sharon Taylor, Clare Rayner, Laiba, Husain, Trisha Greenhalgh untuk mengetahui Pengalaman hidup pasien dengan covid jangka panjang termasuk mengakses dan menerima perawatan kesehatan dan ide untuk meningkatkan pelayanan sedangkan peneliti ingin meneliti tentang hubungan tingkat keparahan gejala dengan kejadian <i>prolong sign</i> pasien post Covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Covid-19

1. Pengertian

Covid-19 merupakan virus corona jenis baru yang mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan. Virus ini menjadi sangat berbahaya karena tingkat penularannya yang tinggi akibatnya jutaan orang di seluruh dunia telah terinfeksi oleh virus ini dan ratusan ribu diantaranya mengalami kematian (Jee et al., 2021).

Kasus Covid-19 tercatat pertama kali terjadi di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Virus ini dapat mengakibatkan berbagai gejala seperti demam di atas 38 derajat Celsius, batuk dan sesak nafas, lemas, nyeri otot dan diare. Dalam beberapa kasus terdapat penderita Covid-19 yang mengalami gejala berat seperti pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian (Pencegahan & Pengendalian, 2020).

Dalam kajian agama dapat dipahami bahwa Covid-19 sebagai musibah sehingga kita dapat mengambil pelajaran dalam bentuk fenomena atau gejala alam sehingga gejala alam tersebut dapat menjadi nasehat untuk kita semua. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada QS Yunus ayat 57 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِّمَا
فِي الصُّدُورِ ۗ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Alquran) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman (Q.S Yunus:57).

Allah berseruh kepada sekalian manusia bahwa kepada mereka kelak didatangkan Al-Quran melalui rasul-Nya. Didalamnya terkandung pedoman-pedoman hidup yang sangat berguna bagi kehidupan mereka. Didalam ayat ini disebutkan pedoman-pedoman hidup itu sebagai jawaban atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Ayat ini menyimpan fungsi Al-Quran Al-Karim dalam memperbaiki jiwa manusia diantaranya (Muhammad Nasir Ar-Rafi'i, 2011):

- a. Mau'izah, yaitu pelajaran dari Allah kepada seluruh manusia agar mereka mencari yang hak dan benar, serta menjauhi perbuatan yang batil dan jahat. Pelajaran ini harus benar-benar dapat terwujud dalam perbuatan mereka. Di era Covid-19 ini Allah swt menampakkan kekuasaannya dengan menciptakan virus SARS CoV-2 agar manusia dapat mengambil pelajaran dari fenomena-fenomena yang terjadi sehingga dapat menjadikan nasehat bagi kita semua.
- b. Syifa' yaitu penyembuh bagi penyakit yang bersarang di dada manusia seperti penyakit syirik, kufur dan munafik, termasuk pula penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman jiwa manusia seperti putus harapan, lemah pendirian, memperturutkan hawa nafsu, menyembunyikan rasa hasad dan dengki terhadap manusia, perasaan takut dan pengecut, mencintai kebatilan dan kejahatan, serta

membenci kebenaran dan keadilan. Pada ayat ini pula dijelaskan bahwa ada beberapa yang datang dari Allah swt itu berisi pembelajaran dan ada obatnya termasuk Covid-19. Allah swt menjelaskan bahwa semua yang ia ciptakan dan ia turunkan berupa penyakit atau apapun semua ada obatnya.

- c. Huda, yaitu petunjuk kejalan yang lurus yang menyelamatkan manusia dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaannya agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka agar giat beramal, dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari awal yang ikhlas serta menjalankan aturan hukum yang berlaku, mana perbuatan yang boleh dilakukan mana perbuatan yang harus dijaukan.
- d. Rahmah, yaitu karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang mukmin, yang dapat mereka petik dari petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam al-quran akan merasakan buahnya. Mereka akan hidup tolong menolong, sayang menyayangi, bekerja sama dalam menegakkan keadilan, menumpas kejahatan dan kekejaman, serta saling bantu membantu untuk memperoleh kesejahteraan.

Berdasarkan buku panduan tatalaksana pneumonia Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 31 Desember 2020, definisi infeksi Covid-19 ini diklasifikasikan sebagai berikut (Tatalaksana Edisi 3., 2020):

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengklasifikasi infeksi Covid-19 dalam buku panduan tatalaksana pneumonia Covid-19 pada tanggal 31 Desember 2020 (Tatalaksana Edisi 3., 2020):

a. Kasus Suspek

Seseorang yang memiliki satu dari kriteria berikut:

- 1) Seseorang yang memenuhi salah satu dari kriteria klinis dan salah satu kriteria epidemiologis:

Kriteria klinis:

- a) Demam akut ($\geq 38^\circ$)/riwayat demam dan batuk.
- b) Terdapat 3 atau lebih gejala/tanda akut berikut: demam/riwayat demam, batuk, kelelahan (fatigue), sakit kepala, myalgia, nyeri tenggorokan, pilek/hidung tersumbat, sesak nafas, anoreksia/mual/muntah, diare, penurunan kesadaran.

Kriteris Epidemiologis:

- a) Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat tinggal atau bekerja ditempat berisiko tinggi penularan.
- b) Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat tinggal atau bepergian di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
- c) Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala bekerja di fasilitas kesehatan, baik melakukan pelayanan medis, dan non medis, serta petugas yang melaksanakan kegiatan investigasi, pemantauan kasus dan kontak.

- 2) Seseorang dengan ISPA berat.

- 3) Seseorang tanpa gejala (*asimtomatik*) yang tidak memenuhi kriteria epidemiologis dengan hasil rapid antigen SARS-CoV-2 positif.

b. Kasus *Probable*

Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

- 1) Seseorang yang memenuhi kriteria klinis dan memiliki riwayat kontak erat dengan kasus *probable* atau terkonfirmasi atau berkaitan dengan Covid-19.
- 2) Kasus suspek dengan gambaran radiologis sugestif kearah Covid-19.
- 3) Seseorang dengan gejala akut anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) dengan tidak ada penyebab lain yang dapat diidentifikasi.
- 4) Orang dewasa yang meninggal dengan distress pernapasan dan memiliki riwayat kontak erat dengan kasus *probable* atau konfirmasi, atau terkait dengan Covid-19.

c. Kasus Konfirmasi: Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Seseorang dengan hasil RT-CPR positif.
- 2) Seseorang dengan hasil rapid antigen SARS-CoV-2 positif dan memenuhi kriteria definisi kasus *probable* atau kasus suspek.
- 3) Seseorang tanpa gejala (*asimtomatik*) dengan hasil rapid antigen SARS-CoV-2 positif dan memiliki riwayat kontak erat dengan kasus *probable* atau terkonfirmasi.

Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Kasus konfirmasi dengan gejala (*simtomatik*).
- 2) Kasus konfirmasi tanpa gejala (*asimtomatik*).

d. Kontak Erat: Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi Covid-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:

- 1) Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
- 2) Sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).
- 3) Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
- 4) Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.

2. Etiologi Covid-19

Penyebab virus ini terjadi karena kelompok *coronaviridae*. Disebut *coronavirus* sebab permukaannya terlihat menyerupai mahkota (*Crown/corona*). Ada beberapa virus lainnya yang sejenis dengan golongan virus ini seperti virus yang mengakibatkan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan ini adalah virus varian baru yang tidak pernah teridentifikasi oleh manusia sebelumnya. Karenanya, virus ini biasa juga disebut dengan *2019 Novel Coronavirus* (Moudy et al., 2020).

Virus corona biasanya didapati pada hewan contohnya ular, unta, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia bisa terjangkit jika

melakukan kontak dengan hewan-hewan tersebut, hal ini biasa terjadi pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun, adanya lonjakan jumlah kasus di Wuhan, China mengartikan bahwa coronavirus dapat ditularkan melalui *droplet* yaitu partikel air liur yang berukuran mikro, *Droplet* ini biasanya dikeluarkan ketika batuk atau bersin (Moudy et al., 2020).

3. Gejala Covid-19

Covid-19 diawali dengan gejala batuk kering yang diikuti oleh gangguan pernafasan. Hal tersebut dialami lebih dari satu jam atau bisa juga terjadi secara terus menerus sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 24 jam. Rata-rata orang menunjukkan gejala ini selama lima hari, namun untuk sebagian orang gejalanya bisa terjadi lebih lama. *World Health Organization* (WHO) mengatakan masa inkubasi terjadi selama 14 hari. Spesialis telinga, hidung, tenggorokan di Inggris mengatakan mereka mendengar ada gejala lain dari banyak pasien termasuk kehilangan indra penciuman dan perasa (Pencegahan & Pengendalian, 2020).

4. Manifestasi klinis

Infeksi Covid-19 dapat mengakibatkan 3 gejala yaitu gejala ringan, sedang dan berat. Gejala klinis utama yang terjadi adalah demam dengan suhu > 38 , batuk dan sesak napas. Gejala tersebut biasanya disertai dengan sesak, fatigue, myalgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setelah pasien mengalami sesak dalam satu minggu, pada kasus yang memburukan secara cepat dan progresif seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit di korelasikan dan pendarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Sebagian pengidap Covid-19 mengalami gejala ringan bahkan tidak di sertai dengan demam.

Sebagian besar pasien mengalami prognosis baik, dengan sebagian kecil mengalami kondisi kritis bahkan meninggal. Berikut sindrom klinis yang biasa muncul ketika mengalami infeksi (PDPI, 2020) (Lisiswati, 2020):

- a. *Suspek*: Gejala yang biasanya muncul adalah gejala yang tidak spesifik berupa demam, batuk, biasa juga disertai dengan nyeri tenggorokan, sakit kepala, dan nyeri otot. Tetapi pada beberapa pasien dengan lanjut usia gejala menjadi tidak khas, kondisi ini merupakan kondisi teringan. Selain itu juga, pada beberapa kondisi ditemukan gejala yang tidak disertai dengan demam sehingga gejala relatif ringan. Dalam kondisi ini pasien biasanya tidak mengalami gejala komplikasi berupa dehidrasi, sepsis atau napas pendek.
- b. *Pneumonia ringan*: Kondisi ini mengakibatkan pasien mengalami beberapa gejala seperti demam, batuk dan sesak. Namun pada kondisi ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda pneumonia berat. Pada anak-anak yang mengalami pneumonia ringan yang ditandai dengan terjadinya batuk atau susah bernafas.
- c. *Pneumonia berat*, pada kondisi ini pasien biasanya mengalami beberapa gejala seperti demam atau infeksi saluran napas, hal ini biasa ditandai dengan munculnya takipnea (frekuensi napas: > 30x/menit), distress pernapasan berat atau saturasi oksigen pasien <90% udara luar.

5. Penegakan diagnosa

Dari hasil anamnesis ditemukan tiga gejala utama yaitu demam, batuk kering (sebagian kecil berdahak) dan sulit bernapas atau sesak. Adapun gejala-gejala yang di alami pada pasien yang tidak komplikasi yaitu (Suharmanto, 2020):

- a. Pasien dalam pengawasan atau kasus *suspek/ possible*

- 1) Pasien yang mengalami demam $> 38^{\circ}\text{C}$ atau memiliki riwayat demam, batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan, pneumonia ringan sampai berat berdasarkan klinis dan gambaran radiologis. (pada pasien yang mengalami *immunocompromised* kemungkinan juga mengalami atipikal) hal ini kemungkinan bisa terjadi karena pasien memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala. Kondisi ini bisa juga terjadi pada petugas medis yang tertular oleh pasien setelah merawat pasien yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) berat yang tidak diketahui penyebab atau etiologi penyakitnya, tidak memperhatikan riwayat perjalanan dan tempat tinggal.
 - 2) Pasien yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut dengan tingkat keparahan ringan sampai berat serta sebelum 14 hari pasien memiliki salah satu dari aktivitas-aktivitas berikut seperti melakukan kontak erat dengan pasien yang terinfeksi Covid-19, mempunyai riwayat melakukan kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan (jika hewan sudah terinfeksi), bekerja atau mendatangi tempat-tempat layanan kesehatan yang terkonfirmasi menangani pasien Covid-19 baik itu di Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit, memiliki riwayat perjalanan di beberapa tempat yang merupakan zona merah seperti Wuhan dan beberapa tempat lainnya.
- b. Orang dalam pengawasan, yang mengalami gejala demam atau riwayat demam tanpa pneumonia biasanya memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok atau wilayah/negara yang terkonfirmasi, dan tidak memiliki

riwayat sebagai berikut: melakukan kontak dengan orang yang terjangkit Covid-19, bekerja atau mendatangi fasilitas kesehatan yang menangani pasien Covid-19, melakukan kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan Covid-19.

- c. Kasus *Probable*, Pasien dalam pemantauan di periksakan untuk mengetahui terinfeksi Covid-19 tetapi tidak bisa di simpulkan atau seseorang pasien yang terkonfirmasi positif *pan-coronavirus* atau *beta coronavirus*.
- d. Kasus terkonfirmasi, Seseorang dinyatakan positif Covid-19 jika telah terkonfirmasi dari hasil laboratorium.

6. Cara penularan Covid-19

Proses penularan virus corona (Covid-19) terjadi sangat cepat. Hal ini dapat di lihat berdasarkan update kasus setiap harinya seperti yang tercatat di halaman facebook Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 30 Juli 2021 jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia menjadi 3.372.374 kasus dengan 2.730.720 sembuh dan 92.311 meninggal (Kemenkes RI,2021).

Infeksi Covid-19 biasanya mengakibatkan gangguan pernapasan ringan hingga berat dan bahkan kematian, namun ada beberapa orang yang terkonfirmasi terinfeksi Covid-19 tetapi tidak menunjukkan adanya gejala. Kemungkinan-kemungkinan transmisi Covid-19 adalah sebagai berikut (Health et al., 2020):

- a. Transmisi kontak dan *droplet*

Transmisi Covid-19 bisa terjadi saat melakukan kontak secara langsung, kontak tak langsung, atau melakukan kontak erat dengan orang yang telah terinfeksi Covid-19 melalui sekresi seperti air liur

dan sekresi saluran pernapasan atau *droplet* saluran napas yang keluar saat terjadi batuk, bersin atau menyanyi dari orang yang telah terinfeksi Covid-19. Transmisi *droplet* saluran pernapasan dapat terjadi saat seseorang melakukan kontak erat (berada dalam jarak 1 meter) dari orang yang telah terinfeksi dan telah mengalami gejala-gejala seperti batuk, bersin atau yang sedang berbicara atau menyanyi. dalam keadaan ini, *droplet* saluran pernapasan yang mengandung virus dapat mencapai mulut, hidung, mata orang yang berpotensi menimbulkan infeksi. Perpindahan virus melalui kontak tidak langsung adalah kondisi di mana terjadi kontak antara orang yang rentan terinfeksi Covid-19 dengan benda atau permukaan sesuatu yang terkontaminasi oleh virus Covid-19.

b. Transmisi melalui udara

Transmisi ini diartikan sebagai penularan virus yang diakibatkan oleh *droplet* yang mengandung virus dan menetap serta bergerak di udara sehingga orang yang rentan dan menghirup udara yang terkontaminasi dapat terinfeksi.

c. Transmisi fomit

Sekresi saluran pernapasan atau *droplet* yang dikeluarkan oleh pengidap Covid-19 dapat mengontaminasi permukaan-permukaan pada benda, sehingga terbentuklah *fomit* (permukaan yang terkontaminasi). Virus yang hidup dan terdeteksi dapat ditemui pada permukaan-permukaan benda selama berjam-jam hingga berhari-hari, tergantung dari pengaruh lingkungan sekitarnya (termasuk suhu dan kelembapan) dan jenis permukaan. Biasanya penularan virus ini lebih sering terjadi pada tempat-tempat pelayanan kesehatan yang menangani pasien

Covid-19. Oleh karena itu, transmisi ini juga dapat terjadi secara tidak langsung karena lingkungan sekitar atau benda-benda yang disentuh telah terkontaminasi oleh orang yang terinfeksi Covid-19 (misalnya, *stetoskop* atau *termometer*), yang kemudian setelah menyentuh benda-benda tersebut tanpa melakukan cuci tangan langsung melakukan kontak pada mulut, hidung, atau mata.

Di langsir dari liputan6.com mengemukakan cara penularan virus corona yang biasa terjadi sebagai berikut (Kemenkes, 2020):

- a. Menyentuh benda yang telah terkena percikan air liur pasien Covid-19. Benda menjadi media yang bisa menjadi cara penularan yang pasif, sebab menurut peneliti virus corona (Covid-19) dapat bertahan hidup hingga tiga hari dengan menempel pada permukaan benda. Benda-benda tersebut sering tersentuh oleh anggota tubuh seperti tangan yang membawa Covid-19. Dengan menempelnya virus tersebut di permukaan benda yang sering tersentuh, otomatis virus tersebut berpindah apabila orang lain menyentuhnya.
- b. Tidak menjaga kebersihan tangan. Cara kedua yang terbukti efektif sebagai media penularan virus Covid-19 adalah tidak menjaga kebersihan tangan. Sebab, tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak melakukan aktivitas dan melakukan interaksi dengan orang lain atau benda yang ada di sekitarnya. Dengan tangan yang tidak terjaga kebersihannya, virus Covid-19 dapat mudah menyebar dengan cepat.
- c. Tidak menjaga kebersihan saat melakukan perjalanan. Beraktivitas merupakan hal yang wajar yang dilakukan manusia, namun

penularan Covid-19 secara tidak langsung sering dilakukan oleh orang yang melakukan aktivitas di tempat tertentu apabila tempat tersebut terdapat *droplet* virus Covid-19 dan menempel pada pakaian dan benda yang digunakan sehingga dapat menular pada orang-orang terdekat di rumah.

- d. Tidak mempraktikkan etika batuk dan bersin. Penyebaran Covid-19 sering disebabkan oleh *droplet* yang kemudian menempel pada benda-benda yang digunakan oleh orang lain sehingga virus corona mendapat *inang* baru pada orang lain. Etika batuk dan bersin dapat dilakukan dengan menutup mulut dan hidung menggunakan siku bagian dalam atau tisu bersih.
- e. Melakukan interaksi dengan banyak orang. Berkumpul atau beraktivitas di tengah kerumunan menjadi salah satu cara penularan virus corona sebab virus ini dapat menempel secara tak kasat mata pada pakaian dan benda yang di bawah oleh orang lain yang juga dapat terjadi melalui *droplet* orang lain ketika batuk dan bersin.
- f. Tidak melakukan isolasi mandiri saat kembali dari tempat terkonfirmasi tinggi penyebaran Covid-19. Cara lain yang dapat menularkan virus Covid-19 adalah tidak melakukan tindakan pencegahan setelah kembali dari wilayah atau negara pandemi. Cara ini di kabarkan banyak terjadi di Indonesia saat ini mengingat banyaknya warga yang kembali ke kampung halaman namun tidak melakukan isolasi mandiri.

Menurut *Center For Disease Control And Prevention* (CDC) Amerika Serikat, virus corona dapat ditularkan melalui kontak erat dengan orang

yang telah terinfeksi jika orang tersebut melakukan bersin atau batuk, *droplet* dari orang yang telah terjangkit dapat masuk ketubuh individu di sekitarnya lalu menularkannya. Virus ini juga dapat menular jika kita berjabat tangan dengan individu yang terkonfirmasi Covid-19, orang yang sehat juga dapat tertular apabila ia tidak senantiasa mencuci tangannya dengan bersih setelah melakukan kontak dengan orang lain ataupun benda sekitar (CDC, 2020).

7. Pencegahan Covid-19

Banyak tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus ini seperti yang telah dihimbau oleh pemerintah maupun dari pihak tertentu. Disampaikan beberapa langkah pencegahan berdasarkan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi *Coronavirus Disease* (Covid-19) sebagai berikut (Pedoman Tatalaksana Covid-19 Jilid II, 2020):

- a. Menjaga kebersihan tangan dengan selalu menggunakan *hand sanitizer* jika tangan tidak terlihat kotor dan cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor.
- b. Sebisa mungkin menghindari melakukan kontak langsung dengan mata, hidung, dan mulut.
- c. mempraktikkan etika batuk atau bersin dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah.
- d. Selalu menggunakan masker.
- e. Menjaga jarak aman (minimal 1 meter).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menghimbau langkah-langkah pencegahan bagi semua orang terhadap virus corona (Covid-19) sebagai berikut (WHO, 2020):

- a. Membersihkan tangan secara rutin dan menyeluruh dengan menggunakan cairan yang mengandung alkohol atau bisa juga mencuci tangan dengan sabun dan air.
- b. Menjaga jarak minimal 1 meter (3 kaki) antara anda dan orang lain.
- c. Hindari kontak langsung dengan mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan dan virus bisa dengan gampang menempel disana, setelah terkontaminasi tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut anda.
- d. Pastikan anda dan orang-orang di lingkungan sekitar anda selalu menggunakan masker baik didalam ruangan maupun diluar ruangan.
- e. Pastikan tetap berada dirumah jika anda merasa kurang sehat dan ketika mengalami gejala-gejala yang sama dengan gejala Covid-19, segera hubungi pihak medis dan ikuti arahan yang diberikan jika gejalanya makin parah.
- f. Baca perkembangan terbaru tentang Covid-19 dan ikuti himbauan yang disampaikan oleh pemerintah dan pihak kesehatan tentang cara menghindari penularan virus Covid-19.

8. Faktor Resiko Covid-19

Faktor risiko yang telah ditetapkan oleh *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) adalah melakukan kontak langsung, termasuk berada satu rumah dengan pengidap Covid-19, dan telah bepergian ke area terjangkit Covid-19. Dari beberapa kasus berada dalam satu lingkungan namun tidak melakukan kontak erat (dalam jarak 2 meter) memiliki risiko yang rendah untuk tertular. Sedangkan tenaga kesehatan memiliki risiko yang sangat tinggi untuk tertular karena selalu berhadapan dengan pasien terinfeksi virus. Di Italia, sekitar 9% kasus Covid-19 merupakan tenaga

kesehatan (Susilo et al., 2020). Di Cina tenaga medis yang tertular mencapai angka 3.300 dengan presentase sebesar 0,6% (WHO, 2020). Beberapa faktor risiko Covid-19 yaitu:

a. Diabetes Militus

Resiko tertularnya virus corona menjadi lebih tinggi pada kelompok yang memiliki riwayat diabetes militus. Diabetes melitus adalah salah satu penyakit kronis dengan angka morbiditas dan mortalitas yang sangat tinggi di seluruh dunia, baik itu di negara-negara maju, maupun di negara berkembang. Penyakit ini kemudian menjadi lebih berbahaya dan sangat penting untuk diperhatikan karena adanya Virus Covid-19. Dalam sebuah *meta-analisis* yang dilakukan oleh Kumar et al mendapati bahwa sebanyak 11,2% pasien Covid-19 menderita diabetes (Roeroe et al., 2021).

Dalam satu kajian yang dilakukan oleh Parveen et al mengemukakan bahwa diabetes mengakibatkan perburukan kondisi kesehatan pada pasien Covid-19. Hal ini searah dengan tiga kajian berbeda yang dilakukan oleh Hussain et al, Bouhanick et al, dan Erener. kesimpulan dari ketiganya menunjukkan bahwa diabetes merupakan salah satu penyakit yang sangat mempengaruhi tingkat keparahan dan kematian pasien Covid-19. Singh et al juga melaporkan dalam sebuah kajian yang menunjukkan bahwa penyakit diabetes dapat dikaitkan dengan peningkatan kejadian dan tingkat keparahan Covid-19 (Roeroe et al., 2021).

b. Perokok

Patanavanich and Glantz, 2021 melakukan *meta analisis* terkait dampak merokok dan keparahan Covid-19 menyatakan bahwa

kebiasaan merokok yang dilakukan sebelum seseorang menderita Covid-19 dapat menjadi faktor risiko berkembangnya keparahan gejala Covid-19 dua kali lipat dibandingkan seseorang yang tidak merokok dan menderita Covid-19 (Patanavanich and Glantz, 2021).

9. Tatalaksana Pasien Covid-19

Prinsip tatalaksana menurut arahan WHO yaitu: *Triase* : segera mengidentifikasi pasien lalu memisahkan pasien dengan *severe acute respiratory infection* (SARI) dan lakukan hal tersebut sembari memperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) yang tepat, terapi suportif dan monitor pasien, pengambilan sampel uji untuk diagnosis laboratorium, tata laksana pasien yang menderita hipoksemia atau gagal nafas dan *acute respiratory distress syndrome* (ARDS), syok sepsis dan kondisi keadaan lainnya (Widoretno., 2020).

Pada kasus dalam keadaan ringan terapi dapat dilakukan dengan isolasi mandiri dirumah namun tetap memperhatikan asupan cairan dan nutrisi, serta melakukan pelaporan terhadap gejala-gejala yang dialaminya. Berdasarkan protokol tata laksana Covid-19 di Indonesia bagi penderita yang telah terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa melibatkan gejala maka dapat melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah dan tetap dipantau oleh tenaga kesehatan. Selain itu juga, pasien perlu diberikan tatalaksanaan non farmakologis seperti edukasi (pengukuran suhu 2x sehari, menggunakan masker bila keluar rumah, mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan yang mengandung alkohol, *physical distancing*, tidur terpisah dengan anggota keluarga lain, menjaga etika saat batuk, memiliki alat makan dan minum sendiri, menjemur diri dibawah sinar matahari selama 10-15 menit/hari, mencuci pakaian secara

terpisah, memperbaiki ventilasi ruangan dan rutin bersihkan kamar dengan disinfektan). Bila pasien mengidap penyakit *comorbid* disarankan tetap melakukan pengobatan rutinnnya dan mengonsumsi vitamin C selama 14 hari (Widoretno, 2020).

Hal diatas berbeda dengan pernyataan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa semua yang memiliki kasus *suspek* dan terkonfirmasi Covid-19 harus melakukan isolasi secara efektif di rumah sakit. Masing-masing orang yang terkonfirmasi *suspek* harus dirawat ruangan terpisah, sedangkan penderita yang sudah terkonfirmasi Covid-19 dapat digabung dengan penderita lainnya yang sudah terkonfirmasi, dan bagi penderita yang mengalami kondisi kritis harus dirawat di ruangan ICU (Widoretno., 2020).

Bagi penderita tanpa gejala atau kelompok ringan menurut tatalaksana pengobatannya bisa menggunakan kloroquin fosfat 500 mg/12 jam oral (5 hari, azitromisin 500 mg dosis tunggal oral atau levofloksasi 750 mg dosis tunggal oral (5 hari), jika diperlukan dapat tambahan antivirus oseltamivir 75 mg/12 jam oral atau favipiravir 600 mg/12 jam oral (5 hari) (Levani et al., 2019).

Bagi kelompok sedang atau moderat menurut tatalaksana penanganannya harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan isolasi dan ditangani selama 14 hari dan dilakukan pemantauan oleh tenaga kesehatan. Perlu dilakukan uji laboratorium menggunakan darah perifer, CRP (C-Reactive Protein), fungsi ginjal, fungsi hati, dan foto rontgen thorak. Pengobatan farmakologis yang diberikan dapat sejenis dengan pengidap gejala ringan namun berbeda cara pemberian dan dosisnya. Vitamin C 200-400 mg/8jam dalam 100 cc NaCl 0.9% secara

drip iv (habis dalam 1 jam), kloroquin dosis sama per oral selama 5-7 hari. Azitromisin dosis sama dapat per oral atau iv selama 5-7 hari demikian pula jika diberi levofloksasin. Dosis oseltamivir sama namun bila diberikan favipiravir secara loading dose 1600 mg/12jam/oral hari ke-1 dan selanjutnya 2x600 mg (hari 2-5) (Levani et al., 2019).

Bagi kelompok berat atau pneumonia berat dan kritis menurut tata laksana penanganannya sesuai dengan kelompok sedang. Namun, pada pemeriksaan laboratorium darah ditambahkan hemostasis, LDH (Lactate dehydrogenase) dan D-Dimer (pemeriksaan fibrin degradation fragment). Monitoring pernafasan, saturasi oksigen, limfopenia, kadar CRP, asidosis, dan kondisi kritis lainnya. Diberikan tata laksana sesuai keadaan pasien. Tata laksana yang diberikan pada penderita infeksi berat harus sesuai dengan protokol dan terapi oksigen sebagai intervensi utama. Pada pasien dengan kegagalan pernapasan dapat diberikan ventilasi mekanik ketika tidak bereaksi terhadap terapi oksigen, Kemudian sangat dibutuhkan juga bantuan hemodinamik agar dapat menjaga syok yang diakibatkan oleh septik. Ketika ingin melakukan tindakan inkubasi untuk ventilasi mekanik mulai dari persiapan alat sampai dengan melakukan tindakan harus dilakukan oleh orang yang berwenang (tenaga medis) dan memakai alat pelindung diri seperti baju hazmat *disposable*, masker N95, kaus kaki 2 lapis *disposable*, sarung tangan dan kaca mata pelindung. (Levani et al., 2019).

Bagi kelompok yang rentan terkena Covid-19 yaitu orang dengan usia lebih dari 60 tahun dapat melakukan upaya pencegahan seperti melakukan *social and physical distancing*, dan memakai masker, serta mengetahui juga kesehatan mental menjadi hal yang perlu diperhatikan. Untuk orang

yang memiliki penyakit autoimun terdapat perburukan kondisi sehingga dianjurkan untuk tetap melanjutkan pengobatan yang sedang dijalani. Pada orang-orang yang menderita penyakit ginjal dapat dengan mudah ditularkan penyakit ini terutama pada pengidap penyakit ginjal kronis (PGK), akibatnya perlu melakukan tindakan pencegahan seperti mengurangi aktivitas di luar ruangan, mengurangi kontak langsung maupun tidak langsung, memakai masker, dan selalu mengonsumsi obat rutinnya. Seluruh pengidap dianjurkan untuk tetap melaksanakan terapinya (Levani et al., 2019).

Setelah kita telah melaksanakan protokol kesehatan yang di tetapkan oleh Kementerian Kesehatan tetapi kita tidak boleh lupa ada campur tangan Allah swt terhadap wabah ini. Segala sesuatu yang terjadi didunia ini seperti wabah yang bersifat internasional dan merata di seluruh dunia ini tentunya tidak terlepas dari campur tangan Allah swt. Sehingga kita tidak hanya mengandalkan prokes yang telah di buat oleh manusia tapi selebihnya kita kembalikan kepada sang maha pencipta. Seperti yang telah di gambarkan pada Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 117 sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ
لَهُكُنْ فَيَكُونُ

Terjemahnya:

Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah!" Lalu jadilah ia.

Hanya Allah yang mampu mengadakan segala sesuatu yang terdapat di langit serta di bumi dan ketika Allah ingin memutuskan menetapkan

أَمْرًا (musibah) maka Allah mengatakan كُنْ فَيَكُونُ (jadilah! Maka jadilah ia), sebagaimana Covid-19 yang saat ini dianggap sebagai musibah diseluruh dunia, artinya ketika kita telah mengikuti anjuran kesehatan (menggunakan masker, jaga jarak, membasuh tangan, mengurangi keramaian, mengurangi mobilisasi) kemudian kita jangan lupa dengan ketetapan Allah tetap kita masukkan sebagai bagian dari protokol kesehatan tersebut agar tidak ada kepanikan dalam menghadapi wabah Covid-19 ini sehingga imun yang kita miliki tidak menurun kita harus berserah diri pada Allah sebab Allah-Lah yang mengatur segala sesuatu (Muhammad Nasir Ar-Rafi'i, 2011).

Adapun protokol tata laksana Covid-19 sebagai berikut (Tatalaksana, 2020):

1. Protokol tatalaksana pasien positif Covid-19.

a. Tanpa Gejala

1) Isolasi dan pemantauan

- a) Selama 14 hari melakukan isolasi mandiri di rumah.
- b) Petugas medis memantau pasien menggunakan telepon.
- c) Kontrol pada petugas kesehatan setelah 14 hari karantina pemantauan klinis.

2) Non-Farmakologi

Memberikan edukasi tentang suatu tindakan yang perlu dikerjakan (leaflet untuk dibawah kerumah):

a) Pasien

- (1) Pagi dan malam hari pasien diukur suhu tubuh 2 kali sehari.

- (2) Senantiasa memakai masker bila keluar serta saat beraktivitas dengan anggota keluarga.
 - (3) Membasuh tangan menggunakan hand sanitizer atau sabun memakai air mengalir sesering mungkin.
 - (4) *Physical distancing* (jaga jarak dengan keluarga).
 - (5) Usahakan menggunakan kamar tidur terpisah.
 - (6) Mempraktikkan etika batuk yang dicontohkan oleh tenaga medis.
 - (7) Setelah menggunakan tempat makan-minum usahakan langsung dicuci menggunakan air/sabun.
 - (8) Setiap hari berjemur dimatahari kurang lebih 10-15 menit.
 - (9) Pakaian yang sudah digunakan usahakan masukkan didalam kantong plastik atau wadah tertutup yang terpisah dengan pakaian kotor keluarga yang lain sebelum dicuci.
 - (10) Melakukan pengukuran dan pencatatan suhu tubuh pada jam 7 pagi, 12 siang dan 19 malam.
 - (11) Jika terjadi peningkatan suhu tubuh $>38^{\circ}\text{C}$ segera menginformasikan ke petugas pemantauan.
- b) Lingkungan/kamar
- (1) memperhatikan cahaya, udara dan ventilasi.
 - (2) Sesekali membuka jendela kamar.
 - (3) Jika perlu menggunakan APD pada waktu membersihkan (setidaknya menggunakan masker, dan memakai sarung tangan (*handscon*)).

(4) Rajin membersihkan tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer sesering mungkin.

(5) Membersihkan dengan air sabun atau cairan desinfektan setiap hari.

c) Keluarga

(1) Dianjurkan untuk memeriksakan diri bagi setiap anggota keluarga yang berkontak erat dengan pasien.

(2) Dianjurkan seluruh keluarga untuk menggunakan masker.

(3) Menjaga jarak dengan pasien sekitar 1 meter.

(4) Pastikan tangan bersih ketika ingin menyentuh wajah.

(5) Membiasakan membuka jendela agar sirkulasi udara berganti.

(6) Pastikan gagang pintu dll yang tersentuh oleh pasien bersih.

d) Farmakologi

(1) Ketika memiliki penyakit penyerta / komorbid, dianjurkan untuk tetap mengonsumsi obat sesuai penyakit penyerta. Apabila pasien rutin meminum terapi obat antihipertensi dengan golongan obat *ACE-inhibitor* dan *Angiotensin Reseptor Blocker* perlu berkonsultasi ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau Dokter Spesialis Jantung.

(2) Vitamin C (selama 14 hari), menggunakan pilihan ;

(a) Tablet Vitamin C non acidic 500 mg/6-8 jam oral (untuk 14 hari).

(b) Tablet isap vitamin C 500 mg/12 jam oral (selama 30 hari).

(c) Multivitamin yang mengandung vitamin C 1-2 tablet /24 jam (selama 30 hari).

(d) disarankan multivitamin yang mengandung vitamin C,B, E, Zink.

b. Gejala ringan

1) Isolasi mandiri

a) Selama 14 hari isolasi mandiri di rumah.

b) Pasien rawat jalan di datangi oleh petugas kesehatan.

c) Setelah 14 hari dilakukan control oleh pemantauan klinik.

2) Non farmakologis

Melakukan edukasi tentang tindakan (perlakuan yang sama dengan edukasi tanpa gejala).

3) Farmakologis

a) Vitamin C menggunakan pilihan:

(1) Tablet Vitamin C non acidic 500 mg/6-8 jam oral (untuk 14 hari).

(2) Tablet isap vitamin C 500 mg/12 jam oral (selama 30 hari).

(3) Multivitamin yang mengandung vitamin C 1-2 tablet /24 jam (selama 30 hari).

(4) Disarankan mengonsumsi vitamin yang komposisi mengandung vitamin C,B, E, zink.

b) Hidroksiklorokuin (persediaan 200 mg) 400 mg/24 jam atau Klorokuin fosfat 500 mg/12 jam oral (selama 5 hari).

- c) Azitromisin 500 mg/24 jam/oral (untuk 5 hari) dengan alternatif Levofloxacin 750 mg/24 jam (5 hari).
- d) Pengobatan simtomatis seperti paracetamol jika demam.
- e) Jika diperlukan dapat diberikan Antivirus : Oseltamivir 75 mg/12 jam/oral atau Favipiravir (Avigan) 600mg/12 jam / oral (untuk 5 hari).

c. Gejala sedang

1) Isolasi dan pemantauan

- a) Rujukan di Rumah Sakit Darurat Covid-19/ rumah sakit ke ruang perawatan Covid-19.
- b) Melakukan Isolasi mandiri di Rumah Sakit atau Ruang Perawatan Covid-19/Rumah Sakit Darurat Covid-19 selama 14 hari.

2) Non Farmakologi

- a) Melakukan Istirahat total, intake kalori adekuat, control elektrolit, status hidrasi, saturasi oksigen.
- b) Pemantauan laboratorium Darah Perifer Lengkap berikut dengan hitung jenis, jika memungkinkan bisa ditambahkan dengan CRP, fungsi ginjal, fungsi hati dan ronsen dada secara berkala.

3) Farmakologis

- a) Memberikan Vitamin C 200 – 400 mg/8 jam dalam 100 cc NaCl 0,9% menggunakan drips intravena (IV) dihabiskan selama 1 jam.
- b) Mengonsumsi obat oral seperti Klorokuin fosfat 500 mg/12 jam oral (untuk 5-7 hari) atau Hidroksiklorokuin (sediaan

yg ada 200 mg) hari pertama 400 mg/12 jam/oral, selanjutnya 400 mg/24 jam (selama 5-7 hari).

c) Diberikan azitromisin 500 mg/24 jam menggunakan drips intravena atau per oral (selama 5-7 hari) menggunakan alternatif Levofloxacin 750 mg/24 jam per oral (selama 5-7 hari).

d) Pemberian obat simptomatis seperti parasetamol dan lain-lain.

e) Antivirus : Oseltamivir 75 mg/12 jam oral atau Favipiravir (Avigan sediaan 200 mg) *loading dose* 1600 mg/12 jam/oral hari ke-1 dan selanjutnya 2 x 600 mg (hari ke 2-5).

d. Gejala berat

1) Isolasi dan pemantauan

a) Rujukan atau rawat di ruang isolasi rumah sakit.

2) Non Farmakologi

a) Status hidrasi (terapi cairan). Oksigen kontrol elektrolit, dan istirahat total.

b) jika memungkinkan disarankan menggunakan CRP, fungsi ginjal, fungsi hati, Hemostasis, LDH, D-dimer dan pemantauan laboratorium darah perifer lengkap dengan hitung jenis.

c) foto toraks.

(1) memperhatikan tanda-tanda yaitu sebagai berikut:

(a) frekuensi napas ≥ 30 x/mnt Takipnea.

(b) Saturasi Oksigen menggunakan *pulse oximetry* $\leq 93\%$ (pada jari).

(c) $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300$ mmHg.

(d) Mengalami peningkatan sebanyak $>50\%$ pada area paru-paru di pencitraan thoraks selama 24-48 jam.

(e) Limfopenia progresif.

(f) meningkatnya CRP progresif.

(g) Asidosis laktat progresif.

(2) Monitor keadaan kritis

(a) Gagal napas yg memerlukan ventilasi mekanik, shock atau gagal Multiorgan yang membutuhkan perawatan ICU.

(b) ketika terjadi gagal napas disertai ARDS pertimbangkan memakai ventilator mekanik.

(c) 3 upaya yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi perburukan penyakit yaitu:

- Memakai *high flow nasal canulla* (HFNC) atau *non-invasive mechanical ventilation* (NIV) pada pasien dengan ARDS atau efusi paru luas. HFNC lebih disarankan dari pada NIV).

- Pada pasien yang mengalami edema paru, mengalami juga pembatasan resusitasi cairan.

- Pasien yang sadar diposisikan tengkurap (*awake prone position*).

d) Prinsip terapi oksigen

(1) NRM : 15 liter per menit.

(2) HFNC:

- (a) Bila dibutuhkan, tenaga medis perlu memakai *respirator* (PAPR, N95).
- (b) kurangi *flow* agar tidak lebih dari 30 liter/menit.
- (c) Melakukan pemberian HFNC selama 1 jam, dan melakukan evaluasi. Apabila pasien makin membaik dan mencapai syarat ventilasi aman (indeks ROX >4.88 pada jam ke-2, 6, dan 12 menunjukkan bahwa pasien tidak memerlukan lagi ventilasi invasif, sedangkan ROX <3.85 menunjukkan tingginya risiko untuk kebutuhan intubasi).

(3) Farmakologis

- (a) Klorokuin fosfat, 500 mg/12 jam/oral (diberikan pada hari ke 1-3) kemudian 250 mg/12 jam/oral (hari ke 4-10) atau Hidroksiklorokuin dosis 400 mg /24 jam/oral (untuk 5 hari), setiap 3 hari kontrol EKG.
- (b) Azitromisin 500 mg/24 jam (untuk 5 hari) atau levofloxacin 750 mg/24 jam/intravena (5 hari).
- (c) jika mengalami sepsis yang diperkirakan karena ko-infeksi bakteri, penentuan antibiotic dapat disesuaikan dengan kondisi klinis, berfokus pada infeksi dan faktor risiko yang terlihat pada pasien. Pemeriksaan kultur darah perlu dikerjakan dan pemeriksaan kultur sputum

(dengan kehati-hatian khusus) patut dipertimbangkan.

(d) Antivirus : Oseltamivir 75 mg/12 jam oral ATAU Favipiravir (Avigan sediaan 200 mg) *loading dose* 1600 mg/12 jam/oral hari ke-1 dan selanjutnya 2 x 600 mg (hari ke 2-5).

(e) Vitamin C 200 – 400 mg/8 jam dalam 100 cc NaCl 0,9% habis dalam 1 jam diberikan secara drips Intravena (IV) selama perawatan.

(f) Vitamin B1 1 ampul/24 jam/intravena.

(g) *Hydroxycortison* 100 mg/24 jam/ intravena (3 hari pertama).

(h) Tetap mengonsumsi obat yang memiliki penyakit komorbid.

(i) Disarankan mengonsumsi obat suportif lainnya.

2. Protokol tatalaksana pasien belum terkonfirmasi Covid-19

Berdasarkan hasil rapid test serologi negative, orang dalam pemantau (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) dapat mengelompokkan antara lain:

a. Tanpa gejala

- 1) Dalam kurun waktu 14 hari tetap berada di rumah.
- 2) Leaflet untuk dibawa ke rumah (Memberikan edukasi apa yang harus dikerjakan).
- 3) Tablet vitamin C 3x1.

- b. Gejala ringan
 - 1) Isolasi dan pemantauan
 - a) Kurun waktu 14 hari melakukan isolasi di rumah.
 - b) Pemeriksaan laboratorium RDT swab nasofaring dan PCR sesuai Pedoman Covid-19 Kemenkes.
 - 2) Non farmakologi
 - a) Melakukan Pemeriksaan hematologi lengkap di pelayanan kesehatan.
 - b) Rutin memeriksa dari hematologi, menghitung jenis leukosit, dan laju endapan darah.

B. Tinjauan Umum tentang *Prolong Sign*

1. Definisi *prolong sign*

Prolong sign dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat gejala-gejala yang timbul pada pasien Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh sesuai hasil swab negatif. *Prolong sign* ialah nama yang dibuat untuk mendeskripsikan suatu gejala yang masih dialami oleh mereka yang dites positif virus corona, beberapa bulan sesudah sembuh. *Inggris National Institute for Health and Care Excellence* (NICE) memilah Covid-19 jangka panjang menjadi 3 definisi klinis (NICE, 2019):

1. Covid-19 akut tanda dan gejala berdurasi 4 minggu setelah terkonfirmasi dengan sindrom pernapasan akut para coronavirus 2 (SARS CoV-2). Gejala yang baru dialami atau yang sedang dirasakan 4 minggu atau lebih dimulainya Covid-19 akut, yang terbagi menjadi:
 - a. Gejala Covid-19 yang sementara dialami memiliki efek 4 sampai 12 minggu setelah dinyatakan positif.

- b. Sindrom pasca Covid-19 untuk yang bertahan 12 minggu atau lebih.
2. NICE mendeskripsikan istilah covid jangka panjang yang di gunakannya “diluar definisi klinis”, yang biasanya di gunakan untuk berkembang setelah Covid-19 yang sementara dialami (dari 4 sampai 12 minggu) dan sindrom pasca Covid-19 (12 minggu atau lebih).
3. NICE mendefinisikan sindrom pasca Covid-19 yaitu tanda dan gejala yang meluas ketika sembuh dari infeksi yang konsisten dengan Covid-19 yang berlangsung sejak lebih dari 12 minggu dan tidak berlaku oleh diagnose alternatif. Biasanya muncul dengan kelompok gejala, sering kali tumpang tindih, yang dapat berfluktuasi dan berubah seiring waktu dan dapat memengaruhi system apa pun di tubuh. Sindrom pasca Covid-19 dapat di anggap sebelum 12 minggu setelah kemungkinan penyakit lain yang mendasari.

Prolong sign juga di kenal sebagai gejala sisa pasca infeksi SARS-CoV-2 (Covid-19), *sindrom covid kronis*, dan *long covid*, adalah kondisi yang memiliki jangka panjang gejala sisa tetap ada setelah periode pemulihan. Penyakit coronavirus 2019 (Covid-19). Gejala yang terus menerus termasuk sakit kepala, sesak napas, anosmia (kehilangan penciuman), kelemahan otot, demam rendah dan disfungsi kognitif (kabut otak). Penderita Covid lama kadang di sebut *Long haulers*. Jumlah pasti orang yang mengalami gejala jangka panjang tidak diketahui dan bervariasi. Siapapun yang terinfeksi Covid-19 dapat menderita covid lama setelah infeksi berakhir, termasuk orang muda yang sehat, bahkan jika penyakit awal mencapai puncaknya hanya menimbulkan gejala kecil. Pada february 2021, *National Institutes of Health* mengatakan gejala

gejala covid yang dapat berupa demam, gejala gastrointestinal dan depresi. Gejalanya mulai dari gejala ringan hingga tidak berdaya serta gejala-gejala baru yang muncul setelah infeksi (Ladds et al., 2020).

2. Gejala *prolong sign*

Beberapa orang yang mengalami infeksi Covid-19, bahkan yang digambarkan sebagai infeksi ringan, terus menderita gejala yang menetap atau siklis, seperti nyeri dada dan jantung berdebar, sesak napas, nyeri otot, sendi, dan sakit kepala, gangguan kognitif (kabut otak), neuropati dan paresthesia, dan kelelahan (Suki Newman, 2019).

Covid-19 pasca-akut (*long-Covid*) dilaporkan sebagai penyakit multi-sistem yang kadang-kadang muncul setelah penyakit akut yang relatif ringan, dan orang-orang yang berjuang dengan gejala yang terus-menerus ini menyebut diri mereka sendiri sebagai 'pengangkut jarak jauh'. Gejalanya tampak seperti siklus dan variabel. Orang mungkin mengalami kombinasi gejala, termasuk pernapasan, kardiovaskular, neurologis, dermatologis, dan gastrointestinal (Suki Newman et al, 2019).

Menurut Pusat Pengendalian Penyakit Korea Selatan, hingga April 2020, tercatat 292/8922 (3,3%) pasien yang telah di pulangkan setelah Covid-19 memiliki SARS CoV-2 yang terdeteksi kembali selama masa pemulihan. Waktu antara pemulangan dan tes re-positif pertama berkisar antara 1-35 hari, waktu antara timbulnya gejala awal dan pengujian positif setelah keluar berkisar antara 8-82 hari. Sebagian besar pasien berusia 20-29 tahun (24,0%), di ikuti oleh mereka yang berusia 50-59 tahun (16,8%), 30-39 tahun (14,0%) 60-69 tahun (10,6%), dan di atas 80 tahun (8,2%). Penyelidikan klinis dan epidemiologi menunjukkan bahwa 44,7% pasien re-positif memiliki gejala ringan, seperti demam, batuk, dan sakit

tenggorokan. Mei dkk melakukan survey terhadap 651 pasien Covid 19 yang sembuh di Wuhan China. Dari pasien ini 23 (3,5%) di temukan kembali positif dengan pengujian RT-PCR. Waktu rata-rata antara keluar dari rumah sakit dan tes re-positif antara 4-38 hari. Sebanyak 15/32 (65,2%) pasien kembali positif tidak menunjukkan gejala. 9 (34,8%) memiliki setidaknya 1 gejala yang terkait dengan Covid-19 aktif, dengan 6 (26,1%) demam, 2 (8,7%) melaporkan batuk, 1(4,3%) melaporkan dispnea dan sesak dada (Dao et al., 2021).

Di italia, sebagian besar pasien dengan penyakit coronavirus 2019 (Covid-19) menunjukkan gejala (71,4% dari 31,84 kasus yang di konfirmasi pada 3 jani 2020). Gejala umum antara lain batuk, demam, dispnea, gejala musculoskeletal (mialgi, nyeri sendi, kelelahan), gejala gastrointestinal dan anosmia atau disgeusia. Studi ini menemukan bahwa pasien yang sembuh dari Covid-19 87,4% melaporkan adanya setidaknya 1 gejala yang menetap, terutama kelelahan dan dyspnea. Pasien di tawarkan pemeriksaan medis yang komprehensif dengan riwayat rinci dan pemeriksaan fisik. Pasien dinilai rata-rata 60,3 (13,6%) hari setelah timbul gejala Covid-19. Pada saat evaluasi, hanya 18 (12,6%) yang benar-benar bebas dari gejala terkait Covid-19, sementara 32% memiliki 1 atau 2 gejala dan 55% memiliki 3 atau lebih. Tidak ada pasien yang mengalami demam atau tanda atau gejala penyakit akut. Kualitas hidup yang memburuk di amati dengan 44,1% pasien. Semua gejala memiliki risiko seperti yang ditunjukkan bahwa sebagian besar individu masih melaporkan kelelahan (53,1%), dispnea (43,4%), nyeri sendi (27,3%) dan nyeri dada (21,7%) (Carfi et.al, 2020).

Fenomena *prolong sign* dapat terjadi pada pasien Covid-19 baik gejala ringan, sedang maupun berat. Dalam studi terkontrol yang dilakukan *Journal of American Medical Association* (JAMA) dan sekelompok dokter dari Italia, Studi ini menemukan bahwa pada pasien yang sembuh dari gejala yang menetap, terutama kelelahan dan sesak napas yang bisa muncul selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan setelah sembuh (Carfi et al., 2020). Selain itu dalam penelitian yang dilakukan Goertzel et al (2020) tentang gejala persisten 3 bulan setelah infeksi SARS CoV-2 mengemukakan fenomena bahwa gejala masih bertahan berbulan-bulan setelah infeksi yang berarti menunjukkan adanya “sindrom pasca-Covid-19” (Goertzel et al.,2020). Penyebab gejala yang menetap tidak di ketahui, tetapi mungkin melibatkan beberapa mekanisme penyakit yang berbeda termasuk reaksi inflamasi dengan komponen vaskulitik (Ladds et al.,2020). Penelitian yang di lakukan oleh Ladds et al (2020) juga menjelaskan bahwa “*Long Covid*” adalah istilah yang di gunakan pasien untuk menggambarkan gejala Covid-19 yang berkelanjutan. Orang dengan gejala Covid-19 yang berkelanjutan mengalami gejala yang terus-menerus dan berfluktuasi yang membingungkan termasuk batuk, sesak napas, demam, sakit tenggorokan, nyeri dada, palpitasi, defisit kognitif, mialgia, gejala neurologis, ruam kulit, dan diare; beberapa juga memiliki saturasi oksigen rendah persisten atau intermiten (Ladds et al.,2020).

3. Penyebab *prolong sign*

Saat ini tidak di ketahui kebanyakan orang pulih dalam dua hingga tiga minggu dan yang lain mengalami gejala selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan lebih lama. Analisis awal pada oktober 2020 oleh

Institut Riset Kesehatan Nasional Inggris menunjukkan bahwa gejala covid yang berlangsung lama mungkin di sebabkan oleh empat sindrom yaitu (NIH, 2019):

- a. Kerusakan permanen pada paru-paru dan jantung.
- b. Sindrom perawatan pasca intensif.
- c. Kelelahan pasca virus, juga di kenal sebagai *Myalgic Encephalomyelitis/* sindrom kelelahan kronis (ME/ MFS).
- d. Lanjutan gejala Covid-19 Status lain yang mungkin menyebabkan gejala baru dan berkelanjutan meliputi:
 - 1) Yang virus hadir untuk waktu yang lebih lama dari biasanya, karena respon imun yang tidak efektif.
 - 2) Infeksi ulang (misalnya, dengan jenis virus lain).
 - 3) Kerusakan yang di sebabkan oleh peradangan respon yang kuat terhadap infeksi.
 - 4) Penurunan kondisi fisik karena kurang olahraga saat sakit.
 - 5) Stress pasca trauma atau gejala sisa mental lainnya, terutama pada orang yang sebelumnya mengalami masalah, depresi, insomnia, atau kesulitan kesehatan mental lainnya.

Pada artikel ulasan maret 2021 mengutip patofisiologi berikut sebagai penyebab utama covid panjang (NIH, 2019):

- a. Toksikitas langsung pada jaringan yang terinfeksi virus, terutama paru-paru.
- b. Peradangan yang sedang berlangsung karena disregulasi sistem kekebalan pasca-infeksi.
- c. Cedera vascular dan iskemia yang di sebabkan oleh hiperkoagulabilitas dan thrombosis yang diinduksi virus.

- d. Gangguan sistem regulasi renin-angiotensin terkait dengan efek SARS-CoV-2 pada bantalan jaringan.

4. Faktor risiko

Menurut studi *King's College London* yang di posting pada 21 oktober 2020 faktor risiko covid jangka panjang dapat mencakup (James Gallagher et al, 2019):

- a. Usia terutama yang berusia di atas 50 tahun.
- b. Kelebihan berat.
- c. Asma.
- d. Melaporkan lebih dari lima gejala (misalnya lebih dari batuk, demam, sakit kepala, diare, kehilangan indra penciuman).

C. Tinjauan Umum Tingkat Keparahan Gejala

Berdasarkan pada beratnya kasus, gejala Covid-19 dibagi menjadi 5 kelompok yaitu (Levani, Prastya and Mawaddatunnadila, 2021):

1. Asimtomatik (Tanpa gejala)

Kondisi ini adalah kondisi teringan, tanpa adanya gejala klinis apapun, disertai hasil pemeriksaan fisik dan radiologis yang normal, namun hasil pemeriksaan *nucleic acid test* (NAT) positif.

2. Ringan

Gejala tidak disertai dengan pneumonia virus atau tanpa hipoksia. Gejalanya dapat timbul seperti demam, batuk, *fatigue*, *anoreksia*, napas pendek, *mialgia*. Tidak memiliki gejala yang spesifik seperti sakit tenggorokan, kongestif hidung, sakit kepala, *diare*, mual dan muntah, hilang pembau (*anosmia*) atau hilang perasa (*ageusia*) yang timbul setelah *onset* gejala pernapasan juga selalus di laporkan. Pasien yang memiliki penyakit *immunocompromised* dan usia lebih dari 60 tahun

memiliki gejala atipikal seperti *fatigue*, penurunan kesadaran, mobilitas menurun, diare, hilang nafsu makan, *delirium*, dan tidak ada demam.

3. Sedang/ moderat

Untuk pasien remaja dan dewasa: Pasien memiliki gejala *pneumonia* tetapi masih dalam taraf yang sedang seperti demam, batuk, sesak dan napas cepat. Tidak memiliki gejala *pneumonia* berat seperti SpO₂ >93% menggunakan udara ruangan. Untuk anak-anak: pasien dengan gejala *pneumonia* ringan seperti batuk atau sulit bernapas, napas cepat dan tarikan dinding dada, tidak memiliki gejala *pneumonia* berat seperti napas cepat: usia <2 bulan, >60x/menit; usia 2-11 bulan, >50x/menit; usia 1-5 tahun, 40x/menit; usia >5 tahun, >30x/menit. Pada pemeriksaan paru dapat ditemukan bunyi slem. Pada beberapa kasus mungkin tidak ditemukan tanda dan gejala namun pada CT *scan* menunjukkan adanya lesi paru subklinis.

4. Berat

Bagi pasien remaja atau dewasa: memiliki gejala *pneumonia* yang berat seperti demam, batuk, sesak, napas cepat. Akan makin parah jika memiliki satu gejala berikut: frekuensi napas >30x/menit, distress pernapasan berat atau SpO₂ <93% menggunakan udara ruangan. Dan untuk pasien anak: memiliki gejala *pneumonia* seperti batuk atau kesulitan bernapas, dan mengalami satu dari gejala berikut:

- a. Sianosis sentral atau SpO₂ <93%.
- b. Distress pernapasan berat (seperti napas cepat, *grunting*, tarikan dinding dada yang sangat berat).
- c. Tanda bahaya umum: ketidak mampuan menyusui atau minum, *litergi* atau penurunan kesadaran, atau kejang.

- d. Napas cepat/tarikan dinding dada/*takibnea*: usia <2 bulan, >60x/menit; usia 2-11 bulan, >50x/menit; usia 1-5 tahun, >40x/menit; usia >5 tahun, >30x/menit.

5. Kritis


Gagal napas, syok sepsis, dan atau disfungsi atau gagal organ multiple.

- a. *Acute respiratory distress syndrome* (ARDS) kriteria ARDS pada dewasa:

- 1) ARDS ringan: $200 \text{ mmHg} < \text{PaO}_2\text{-FiOO} < 300 \text{ mmHg}$ (dengan PEEP atau *continuous positive airways ressure* CPAP) $> 5 \text{ cmH}_2\text{O}$ atau yang tidak diventilasi.
- 2) ARDS sedang: $100 \text{ mmHg} < \text{PaO}_2\text{-FiOO} < 200 \text{ mmHg}$ dengan PEEP $> 5 \text{ cmH}_2\text{O}$ atau yang tidak diventilasi.
- 3) ARDS berat: $\text{PaO}_2\text{-FiOO} < 100 \text{ mmHg}$ dengan PEEP $> 5 \text{ cmH}_2\text{O}$ atau yang tidak di ventilasi. Ketika PaO_2 tidak tersedia $\text{SpO}_2/\text{FiOO} < 315$ mengindikasikan ARDS (termasuk pasien yang tidak diventilasi).


- b. Sepsis merupakan pasien yang mengalami disfungsi organ mengancam jiwa yang diakibatkan oleh disregulasi respon tubuh terhadap dugaan atau terbukti infeksi. Indikasi disfungsi organ seperti berubahnya status mental/kesadaran, sesak napas, saturasi oksigen rendah, *urine out put* menurun, denyut jantung cepat, nadi lemah, ekstremitas dingin atau tekanan darah, *ptqe/purpura/motled skin* atau hasil laboratorium menunjukkan goagulopati, tromosiopenia, asidosis, laktat yang tinggi, hiperbiiruinemia.

- c. Syok sepsis yaitu hipotensi yang dapat mempengaruhi cairan walaupun telah dilakukan resusitasi cairan.



D. Kerangka Teori

Bagan 2.1
Kerangka Teori



E. Kerangka Konsep

Bagan 2.2
Kerangka Konsep



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Literatur review merupakan sebuah proses analisis artikel yang terintegrasi dan bukan hanya melakukan ringkasan secara acak dan sesuka hati penulis, akan tetapi *literatur review* merupakan tulisan ilmiah yang terkait langsung dengan pernyataan yang sudah di rumuskan sebelumnya. Pada saat proses pengumpulan artikel yang di jadikan *literatur*, maka bisa juga di temukan penjelasan latar belakang penelitian tentang suatu topik, alasan mengapa topik tersebut penting untuk di teliti, menemukan keterkaitan antara studi dan permasalahan penelitian, mengidentifikasi tema dan konsep, mengidentifikasi kesenjangan utama antara permasalahan dan hasil penelitian, serta melakukan peninjauan terhadap pertanyaan yang sudah dilakukan berdasarkan studi terdahulu yang sudah di lakukan (M, Nurs, 2020).

Penelitian ini menggunakan desain *deskriptif naratif* dengan pendekatan *literatur review*, untuk mengidentifikasi hubungan kejadian *prolong sign* dengan tingkat keparahan gejala Covid-19. Penelitian deskriptif, berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian di lakukan. Penelitian deskriptif tidak di maksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetap menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel gejala dan keadaan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan desain *deskriptif naratif* karena tingkat keparahan gejala Covid-19 mempengaruhi kejadian *prolong sign* berdasarkan literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya (Davies & Crombire, 2009).

B. Teknik Pengumpulan Data

Pencarian literatur melalui beberapa situs atau *database* yaitu: *PubMed*, *Science Direct*, *Google Scholar*, *Portal Garuda* dengan pertanyaan penelitian terstruktur menggunakan metode elektronik PICO (*Patient, Intervention, Comparison, and Outcome*) dengan keyword atau kata kunci: *Covid-19 OR Coronavirus OR SARS-CoV2, Prolong sign OR Long covid OR Syndrom post Covid-19 AND Tingkat keparahan Covid-19*, (Nining & Burhannudin, 2020). Adapun PICO dalam artikel ini sebagai berikut:

Tabel 3.1
Strategi PICO

P	Covid-19
I	<i>Prolong sign</i>
C	Ada pembandingan
O	Tingkat keparahan gejala Covid-19
S	<i>Cross sectional study, Study cohort, Literatur review and Kualitatif</i>
T	2020-2021
L	English, Indonesia

Pertanyaan penelitian dirumuskan melalui strategi PICO adalah sebagai berikut: ‘Bagaimana hubungan tingkat keparahan gejala dengan kejadian *prolong sign* pada pasien post Covid-19?’ dalam memilih literatur peneliti memiliki kriteria inklusi dan eksklusi :

Tabel 3.2
Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
1. Artikel yang terbit dalam kurun waktu 2020-2021.	1. Artikel yang <i>double publication</i> .
2. Artikel <i>full text</i> yang sesuai dengan tujuan penelitian.	2. Artikel dalam bentuk skripsi, tesis, dan tidak terpublikasi.
3. Jurnal berasal dari <i>database</i> bereputasi.	3. Artikel yang tidak <i>full text</i> .
4. Artikel yang menggunakan <i>Cross sectional study, study kohort, Literatur revie and kualitatif</i> .	
5. Kualitas penilaian artikel > 50% berdasarkan <i>Guideline Review</i> dari <i>Joanna Briggs Instute</i> .	
6. Menggunakan bahasa Inggris atau bahas Indonesia.	

C. Strategi pencarian literatur

1. Database pencarian

Literature review yang merupakan rangkuman menyeluruh beberapa studi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh bukan dari pengalaman langsung, akan tetapi di peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder di dapatkan berupa artikel jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional dengan tema yang sudah di tentukan. Pencarian literatur dalam *literatur review* ini menggunakan empat *database* yaitu *PubMed, Science Direct, Google Scholar, Portal Garuda* (Iv,2020).

2. Kata kunci

Pencarian artikel atau jurnal menggunakan *keyword* dan *boolean operator* (*AND, OR NOT or AND NOT*) yang digunakan untuk memperluas atau menspesifikkan pencarian, sehingga mempermudah dalam penentuan artikel atau jurnal yang di gunakan. Kata kunci dalam *literatur review* ini disesuaikan dengan *Medical Subject Heading* (MeSH) yang terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 3.3

Kata Kunci

Covid-19	<i>Prolong sign</i>	Tingkat keparahan Covid-19
Remaja, dewasa, lansia.	Batuk Kelelahan otot Nyeri sendi Demam Diare dan muntah-muntah Sakit tenggorokan Sesak napas Perubahan suasana hati Depresi Sakit kepala Kardiovaskuler	Tingkat keparahan gejala
<i>OR</i> Covid-19	<i>OR</i> <i>prolong sign</i>	<i>OR</i> tingkat keparahan gejala

3. Seleksi studi dan penilaian kualitas

Setelah di lakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan informasi tersebut diselesaikan kerelevanan menggunakan instrument *guideline review* dari *Joanna Briggs Instritute* dengan masalah yang di

kaji. Untuk menyajikan masalah yang akan dibahas maka data terkumpul di analisis dengan menggunakan tabel sintesis naratif. Membuat tabel sintesis artikel hasil pemikiran atau hasil penelitian diawali dengan menganalisis artikel-artikel yang relevan dengan topik yang akan di *review*. maksudnya adalah membahas atau mengkaji artikel dengan cara membuat indentifikasi dan klarifikasi berdasarkan elemen-elemen yang akan di *review* dari beberapa artikel yang membahas topik hampir sama. Menyintesis merupakan proses mengintegrasikan hasil analisis terhadap artikel-artikel berdasarkan kesamaan dan perbedaan masing-masing artikel dan membuat kesimpulan berdasarkan kesamaan dan perbedaan setiap artikel tersebut dalam bentuk simpulan kolektif dari beberapa artikel yang di analisis (Rhamdani et al., 2014).

4. Rekomendasi

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya penulis memberikan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif sebagai solusi permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini kemudian disusun menjadi suatu hasil pembahasan dan suatu kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah rekomendasi hasil pemecahan masalah menjadi sebuah adopsi pengetahuan dan sebagai landasan berpikir untuk mencegah masalah yang telah di rumuskan.


BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Hasil Pencarian

Pencarian artikel telah dilakukan melalui publikasi di empat *database* yaitu *PubMed*, *Science Direct*, *Google Scholar* dan *Portal Garuda* dengan menggunakan kata kunci "Covid-19 OR Coronavirus OR SARS-CoV2 OR Prolong sign OR Long covid OR Syndrom post Covid-19 OR Tingkat keparahan Covid-19". Hasil seleksi artikel studi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi peneliti dapat digambarkan dalam *Diagram Flow* dibawah ini:

Bagan 4.1
Diagram Flow



Pencarian artikel pada empat *database* tersebut menghasilkan 362.367 artikel yang teridentifikasi berdasarkan kata kunci yang sudah di tentukan. Peneliti kemudian melakukan *skrining* berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebanyak 221.212 artikel dieksklusi. 118.970 artikel di antaranya adalah artikel yang terbit dibawah tahun 2020, tidak full teks sebanyak 49.422 artikel, publikasi ganda sebanyak 35.446 artikel dan sebanyak 17.374 artikel berbentuk tesis, skripsi atau tidak terpublikasi. Selanjutnya 141.155 artikel yang diinklusi, kemudian dilakukan proses *assesment* berdasarkan kelayakan terhadap kesesuaian dengan pertanyaan penelitian dan kategori studi yang telah di tentukan pada kriteria inklusi yaitu menggunakan *scross sectional study*, *study cohort*, *study kualitatif*, *sistematis* dan *meta-analisis*. Adapun hasil pencarian dan seleksi studi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi didapatkan 7 artikel yang bisa digunakan dalam *review literatur* ini.

2. Penilaian kualitas

Dalam *skrining* terakhir berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan pada *The Joanna Critical Appraisal Tools*. 7 studi mencapai skor lebih tinggi dari 50% dan siap untuk melakukan sintesis data dalam *review literatur* ini. Karakteristik studi dari 4 *database* tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Karakteristik Studi

Kategori	Jumlah
	<i>Database</i>
<i>Google Scholar</i>	0
<i>Portal Garuda</i>	0
<i>PubMed</i>	7
<i>Science direct</i>	0
Total	7
	Tahun Penerbitan

2020	2
2021	5
Total	7
Desain Penelitian	
<i>Cross Sectrional Studies</i>	3
<i>Study Cohort</i>	1
<i>Sistematik riview dan metaanalisa</i>	1
<i>Kualitatif</i>	2
Total	7
Negara Penelitian	
<i>Inggris</i>	2
<i>Wuhan, china</i>	1
<i>Amerika Serikat</i>	1
<i>Pakistan</i>	1
<i>Mexico</i>	1
<i>Mesir</i>	1
Total	7

Tingkat keparahan gejala yang berkontribusi dalam kejadian *prolong sign*, berdasarkan tabel dilakukan dalam bentuk desain penelitian yang paling banyak digunakan adalah *Cross sectional study* (n=3), kemudian penelitian kualitatif (n=2), *literatur review dan meta-analisa* 1 dan 1 artikel dalam bentuk desain penelitian *study cohort*. Jumlah rata-rata kasus lebih dari seribu. Secara keseluruhan, setiap penelitian membahas tentang tingkat keparahan gejala yang mempengaruhi *prolong sign*. Penelitian tentang tingkat keparahan gejala yang mempengaruhi tingkat *prolong sign* dilakukan diberbagai negara. Studi yang sesuai dengan *review literatur* ini rata-rata dilakukan di *Inggris* dengan 2 studi, dan yang lainnya masing-masing 1 studi yang dilakukan di *Wuhan, China, Amerika Serikat, Pakistan, Mexico* dan *Mesir*. Tujuh studi tentang tingkat keparahan gejala dengan kejadian *prolong sign* gejala-gejalanya seperti sakit kepala, sesak napas, anosmia (kehilangan penciuman), kelelahan otot, demam rendah, nyeri dada, kelelahan, nyeri sendi dan lain-lain. berikut tujuh artikel yang telah memenuhi syarat untuk dimasukkan kedalam *review literatur*:

Tabel 4.2
Sintesis Grid Jurnal

No	Peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Database
1	Marwah Kamal, Ph,D, Marwah Abo Omirah, Ph,D, Haitham Saeed, Ph,D (2021)	<i>Assesment and characterization of post Covid-19 manifestations.</i>	Untuk mengetahui dan mengkarakterisasi manifestasi yang muncul setelah eradikasi infeksi virus corona dan hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit.	<p>Design: <i>Cross Sectional Studi</i></p> <p>Sampel: 287 penyintas Covid-19</p> <p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dependen: manifestasi post Covid-19 - Independen: tingkat keparahan penyakit <p>Instrumen:</p> <p>Pasien yang telah sembuh dari Covid-19 menerima kuasioner yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait manifestasi pasca Covid-19. Kuasioner ini dibagi menjadi beberapa bagian mulai dari data demografi subjek (umur, jenis kelamin, tinggi badan, merokok dan berat badan) kemudian data tentang status Covid-19 dan penyakit penyerta subjek lainnya (keparahan penyakit, penggunaan vitamin, dan adanya penyakit lain) akhir</p>	Tingkat keparahan gejala Covid-19 dibagi menjadi 3 kategori. Pertama adalah kasus ringan yang diisolasi dirumah dan dinyatakan 80%, kategori ke2 adalah kasus sedang yang mendapatkan terapi oksigen dan mewakili 14,9%, kategori ke3 ada kasus parah yang memerlukan perawatan ICU dan kategori ini mewakili sebagian kecil (4,9%). Analisis manifestasi pasca Covid-19 mengungkapkan bahwa 10,8% dari semua subjek yang tidak memiliki manifestasi setelah sembuh dari penyakit, sementara sebagian besar subjek menderita beberapa penyakit, sebagian besar subjek mengalami kelelahan (72,8%), kecemasan (38%), nyeri sendi (31,4%), sakit kepala terus menerus (28,9%), demensia (28,6%), depresi (28,6%) dan sesak (28,2%) beberapa persen dari subjek yang pulih baru di diagnosa dengan diabetes (2,4%). Sebagian	PubMed

data tentang manifestasi pasca Covid-19 (gejala, pemeriksaan obat untuk gejala pasca Covid-19 dan pemulihan gejala pasca Covid-19

Analysis:

Respon setiap item di analisis terlebih dahulu untuk menunjukkan tingkat kemunculan manifestasi pasca Covid-19. Plot permukaan respons diproduksi menggunakan perangkat lunak ahli desain versi 11 (Stat-Ease Inc, Minneapolis, MN, USA). Faktor yang di ekspresikan pada plat permukaan respon telah dikodekan sebagai berikut: usia (1=20-30 tahun, 2=31-40 tahun dan 3=40 tahun), penyakit penyerta (1= tidak ada penyakit penyerta dan 2= ada penyakit penyerta), keparahan manifestasi pasca Covid-19 (1= ringan dan 2= parah) dan tingkat keparahan Covid-19 (1= ringan, 2= sedang dan 3= parah).

besar manifestasi yang dilaporkan ringan. Gejala reversibel yang dapat di hilangkan tanpa intervensi medis seperti kelelahan dan sakit kepala yang mungkin terkait dengan Covid-19, gejala ringan lainnya seperti nyeri sendi dan otot juga di laporkan banyak subjek dan dapat diklasifikasikan sebagai manifestasi ringan. Tercatat bahwa banyak manifestasi terkait dengan sistem saraf pusat seperti sakit kepala terus menerus, migrain, depresi, kecemasan dan gangguan obsesif kompulsif. Beberapa persen subjek telah menderita stroke, miokarditis, gagal ginjal dan fibrosis paru yang dapat reversibel dan memerlukan pemeriksaan ekstra. Mengenai obesitas sebagian faktor yang memengaruhi keparahan penyakit atau gejala pasca penyakit, ditunjukkan bahwa sebagian besar subjek mengalami kelebihan berat badan atau obesitas tetapi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keparahan atau jenis gejala pasca Covid-19. Manifestasi pasca Covid-19 yang tercatat selama penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai ringan dan kritis,

					manifestasi kritis adalah yang mempengaruhi fungsi organ seperti fibrosis paru, gagal ginjal, miokarditis, aritmia dan stroke. Sehingga ada hubungan yang signifikan antara berat ringan manifestasi pasca Covid-19 dengan tingkat keparahan Covid-19. Kasus berat menunjukkan manifestasi keparahan yang tinggi dibandingkan dengan yang menderita kondisi ringan.	
2	Chaoling Huang, Lixue Huang, Yeming Wang et al (2021)	<i>6 months consequences of Covid-19 in patients discharged from hospital: a cohort study.</i>	Untuk menggambarkan konsekuensi kesehatan jangka panjang dari pasien dengan Covid-19 yang telah keluar dari Rumah Sakit dan menyelidiki faktor risiko terkait khususnya tingkat keparahan penyakit.	Design: Studi Cohort Sampel: pasien dengan konfirmasi Covid-19 yang telah keluar dari Rumah Sakit Jin Yin Tan (Wuhan,China) antara 7 Januari 2020 sampai 29 Mei 2020. Variabel: - Dependen: konsekuensi kesehatan jangka panjang dari pasien Covid-19 yang telah sembuh - Independen: keparahan penyakit Instrumen: semua pasien diwawancarai dengan serangkaian kuesioner untuk evaluasi gejala dan kualitas hidup terkait kesehatan,	Secara total 1,733 dari 2,469 pasien sembuh dengan Covid-19 terdaftar setelah 736 dikeluarkan dari rumah sakit, pasien memiliki usia rata-rata 57,0 (IQR 47,0-65,0) tahun dan 897 (52%) adalah laki-laki. Studi tindak lanjut dilakukan dari 16 Juni hingga 03 September 2020 dan waktu tindak lanjut rata-rata setelah timbul gejala adalah 186,0 (175,0-199,0) hari, kelelahan atau kelemahan otot (63,%, 1038 dari 1655) dan kesulitan tidur (26%, 437 dari 1655) adalah gejala yang paling umum. Kecemasan atau depresi dilaporkan diantara 23% (367 dari 1617) pasien. Proporsi median jarak jalan kaki enam menit kurang dari batas waktu rentan	PubMed

menjalani pemeriksaan fisik dan tes berjalan 6 menit dan menerima tes darah.

Analysis: proses pengambilan sampel pasien menurut skala tujuh kategori tertinggi selama mereka tinggal di rumah sakit sebagai 3,4 dan 5,6 untuk menerima tes fungsi paru, CT revolusi tinggi dada, dan ultrasonografi. Pasien terdaftar yang telah berpartisipasi dalam uji coba lapinovir untuk penindasan SARS-CoV-2 di china menerima tes anti bodi coronavirus2 sindrom pernapasan akut yang parah. Model regresi liner atau logistik multivariabel untuk mengevaluasi hubungan antara keparahan penyakit dan konsekuensi kesehatan jangka panjang.

normal adalah 24% untuk skala keparahan 3, 22% untuk skala keparahan 4 dan 29% untuk skala keparahan 5,6. Proporsi pasien dengan gangguan difusi yang sesuai adalah 22% untuk skala keparahan 3, 29% untuk skala 4, dan 56% untuk skala keparahn 5-6, dan median skor CT adalah 3,0 (IQR 2,0-5,0) untuk skala keparahan 3, 4,0 (3,0-5,0) untuk skala 4 dan 5,0 (4,0-6,0) untuk skala 5-6. Setelah menyelesaikan multivariabel, pasien menunjukkan risiko ODDS (OR) 1,61 (95% CI 0,80-3,25) untuk skala 4 versus skala 5-6 versus skala 3 untuk gangguan difusi atau 0,80 (0,66-1m17) untuk skala 4 versus skala 3 dan atau 1,77 (1,05-2,97) untuk skala 5-6 versus skala 3 untuk kecemasan atau depresi, dan atau 0,74 (0,58-0,96) untuk skala 4 versus skala 3 dan 2,69 (1,46-4,96) untuk skala 5-6 versus skala 3 untuk kekuatan atau kelemahan otot dari 94 pasien dengan antibodi darah yang di uji pada *follow up*, seropositif (96,2% VS 58,5%) dan titer median (19,0 vs 10,0) antibodi menetralkan secara signifikan lebih rendah

					dibandingkan dengan pada fase akut. 107 dari 822 peserta tanpa cedera ginjal akut dan dengan perkiraan laju filtrasi glomerulus (eGFR) 909 ml/menit per 1,73 m ² atau lebih pada fase akut memiliki eGFR kurang dari 90 ml/menit per 1,73 m ² pada <i>follow up</i> .	
3	Nitzan C Roth, MD, PhD, Angela Kim, MD, Taisia VitkovskI, DO et al (2021)	<i>Post Covid-19 cholangio pathy: A Novel Emntity.</i>	Untuk mengetahui 3 kasus kolangiopati berat baru yang timbul selama pemulihan dari Covid-19 kritis dengan potensi morbiditas hati jangka panjang.	<p>Design: <i>Cross sectional studies</i></p> <p>Sampel: mengidentifikasi 3 orang dewasa muda yang menjalani biopsi hati untuk evaluasi korelasi yang berkepanjangan dan parah selama masa pemulihan dari Covid-19.</p> <p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dependen: potensi morbiditas hati jangka panjang - Independen: kolangiopati berat <p>Instrumen: dikonfirmasi oleh pengujian reaksi berantai polimerase swab nasofaring</p> <p>Analysis: pasien-pasien yang memiliki gambaran klinis dan kolangitis sklerosis sekunder pada pasien yang mengalami covid 19 kritis, tetapi dengan fitur histologis yang unik</p>	Pada awal perawatan di Rumah Sakit, setiap pasien mengalami peningkatan aminotransferase yang parah tetapi singkat dan diyakini sebagai sekunder dari hepatitis iskemik, selanjutnya setiap pasien mengalami kolestatis yang ditandai dengan ikterus terkait dengan bertaham lama setelah pemulihan kardiopulmoner dan ginjal. Studi laboratorium untuk infeksi virus akut atau kronis non SARS CoV-2 dan serologi autoimun negatif. Pencitraan hati tidak menunjukkan bukti sirosis pada pasien manapun, kolangiografi resonansi magnetik tidak normal untuk 2 pasien, mendorong kolangiografi retrograde endoskopik dengan pembuangan lumpur empedu dan untuk 2 pasien ekstrasi batu saluran ekstrahepatik kecil.	PubMed

			termasuk cedera kolangiosit parah dan mikroangiopati intrahepatik yang menunjukkan cedera hati langsung akibat Covid-19.			
4	Ayman Iqbal, Kinza Iqbal, Shajeea Arshad Ali et al (2021)	<i>The Covid-19 sequelae: a cross sectional evaluation post recovery symptoms and the need for rehabilitation of Covid-19 survivors.</i>	Untuk mengetahui hubungan signifikan antara keparahan penyakit dan manifestasi pasca Covid-19.	<p>Design: <i>Cross sectional Studies</i></p> <p>Sampel: 158 pasien Covid-19 yang pulih</p> <p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dependen: manifestasi pasca Covid-19 - Independen: keparahan penyakit <p>Instrumen: dengan menggunakan kuesioner dilakukan dari September 2020 hingga Desember 2020 yang informasinya diperoleh dari Laboratorium Ojha, Karachi, Pakistan. Kuesioner terdiri dari 4 bagian yaitu data sosiodemografi, manifestasi pasca Covid-19, pertanyaan terkait stigma dan kualitas hidup pasien Covid-19 yang sembuh.</p> <p>Analysis: penelitian ini menggunakan lima tingkat dimensi EuroQol untuk menilai kualitas hidup,</p>	Sebagian besar (94,9%) mengalami setidaknya satu gejala pasca Covid-19, dengan kelelahan (82,9%) menjadi manifestasi pasca pemulihan yang paling umum. Artikel ini mengamati korelasi yang signifikan dari gejala pasca Covid-19 dengan jenis kelamin, usia dan waktu sejak pemulihan. Tingkat keparahan Covid-19 ditemukan secara signifikan terkait dengan lima dimensi kualitas hidup. Perbedaan yang signifikan dalam skor kesehatan skala analog visual EuroQol diamati antara peserta dengan infeksi Covid ringan, sedang dan berat ($p < 0,001$). Selain itu, stigma terkait infeksi SARS CoV-2 ditemukan lebih umum pada peserta kelas atas dibandingkan dengan kelas lain ($p < 0,05$). Meskipun demikian, literatur ini juga mengamati hubungan yang signifikan antara keparahan Covid-19 dengan manifestasi pasca Covid-19 dan komorbiditas yang sudah	PubMed

			sedangkan klasifikasi sosial ekonomi bagi prasad yang di perbaharui untuk 2019 digunakan untuk menentukan status sosial ekonomi para peserta. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 24,0 (IBM Corp., Armonk, NY,USA). Data disajikan dalam bentuk frekuensi dan persentase.	ada sebelumnya.	
5	Sandra lopez-Leon MD, PhD, Talia Wegman-Ostroksy MD, PhD, Carol Perelman, BSc et al (2021)	<i>More than 50 long-term effects of Covid-19: a sistematik review and meta-analisa.</i>	Untuk mengidentifikasi studi yang menilai efek jangka panjang Covid-19 dan memperkirakan prevalensi setiap gejala, tanda atau parameter laboratorium pada tahap pasca Covid-19.	<p>Design: Sistematik riview dan metaanalisa</p> <p>Sampel: semua artikel dengan data asli untuk mendeteksi Covid-19 jangka panjang yang di terbitkan sebelum 1 Januari 2021 dan dengan minimal 100 pasien dimasukkan.</p> <p>Instrumen: PubMed dan Medline</p> <p>Analisis: untuk efek yang di laporkan dalam dua atau lebih peneliti, metaanalisis menggunakan model acak dilakukan menggunakan perangkat lunak MetaXL untuk memperkirakan prevalensi gambaran dengan 95% CI. Heterogenitas dinilai menggunakan statistik 12.</p> <p>Usia peserta penelitian berkisar antara 17 dan 87 tahun. Diperkirakan bahwa 80% (95% CI 65-92) dari pasien yang terinfeksi SARS CoV-2 mengembangkan satu atau lebih gejala jangka panjang. Lima gejala yang paling umum adalah kelelahan (58%), sakit kepala (44%), gangguan perhatian (27%), rambut rontok (25%) dan dispnea (24%). Semua metaanalisa menunjukkan heterogen sedang (n=2) hingga tinggi (n=13).</p>	PubMed

				<p>Tinjauan sistematis ini mengikuti pedoman item pelaporan pilihan untuk meninjau sistematik dan Meta-analisis (PRIMA), meskipun protokol penelitian tidak terdaftar. Sebanyak 18.251 publikasi diidentifikasi, 15 di antaranya memenuhi kriteria inklusi. Prevalensi 55 efek jangka panjang diperkirakan, 21 meta-analisis dilakukan dan 47,910 pasien dilibatkan. Waktu tindak lanjut berkisar antara 14 hingga 110 hari pasca infeksi virus.</p>		
6	<p>Tom Kingstone, Anna K Taylor, Catherine A O'Donnell et al (2020)</p>	<p><i>Finding the 'right' GP: a qualitative study of the experiences of people with long-Covid-19.</i></p>	<p>Untuk mengeksplorasi pengalaman orang dengan gejala yang menetap setelah infeksi Covid-19, dan pandangan mereka tentang dukungan perawatan primer yang di terima.</p>	<p>Disign: metodologi Kualitatif Sampel: orang-orang yang terus mengalami gejala persisten Covid-19 Variabel: - Dependen: gejala jangka panjang Covid-19 - Independen: infeksi Covid-19 Instrumen: dengan wawancara semi-struktural Analysis: metode kualitatif cocok untuk penelitian ini karena sifat pertanyaan penelitian yang eksploratif, yang berusaha</p>	<p>Studi eksplorasi ini menggambarkan rentan dan kompleksitas gejala yang dialami oleh orang-orang dengan gejala yang menetap setelah di duga atau di konfirmasi Covid-19, fenomena ini di sebut long covid atau post acute Covid-19, dan merupakan gangguan baru yang diperkirakan mempengaruhi 10% orang yang terinfeksi Covid-19. Peserta menggambarkan kerja keras mengalami, memahami, dan mengelola gejala mereka dan berbagai sumber dukungan dan</p>	<p>PubMed</p>

				mengungkapkan perspektif dan pemahaman, dan menafsirkan pengalaman orang-orang dengan Covid yang lama. penelitian kualitatif dikatakan memiliki banyak kontribusi untuk layanan kesehatan dan penelitian kebijakan kesehatan dengan mengembangkan kedalaman pengetahuan dan dasar teori yang lebih komprehensif.	bantuan yang mereka cari.	
7	Emma Ladds, Alex Rushforth, Sietse Wieringa et al (2020)	<i>Persisten symptoms after Covid-19: qualitative study of 114 "long Covid-19" patients and draft quality principles for services.</i>	Untuk mendokumentasikan keparahan gejala dengan kualitas hidup pasien Covid gejala berkepanjangan dan kualitas layanan.	Design: study kualitatif Sampel: 114 pasien Covid-19 gejala berkepanjangan Variabel: - Dependen: kualitas hidup pasien Covid-19 gejala berkepanjangan - Independen: tingkat keparahan gejala Covid-19 Instrumen: dengan melakukan wawancara dimana peserta diundang untuk memilih antara wawancara naratif individu atau partisipasi dalam kelompok fokus. Awalnya berusaha untuk mewawancarai orang-orang yang melakukan telah konsultasi melalui telepon atau	Rincian demografi dan pekerjaan yang dipilih dari peserta ditunjukkan pada tabel 1 sampai akhir adalah 70% perempuan dan 75% putih. Sebagai perbandingan, kelompok pendukung Covid-19 yang lama terdiri dari 86% perempuan dan populasi Inggris adalah 80-85% Inggris kulit putih. Proporsi yang tinggi adalah proporsional kesehatan, banyak diantaranya menunjukkan bahwa keahlian dan pengalaman mereka tentang penyakit dan gagasan untuk perubahan layanan. 55 wawancara dari 8 kelompok fokus menghasilkan lebih banyak dari 1000 halaman transkrip dan catatan. Analisis ini memunculkan tema	PubMed

video untuk Covid-19 akut. Sebagai bagian dari studi yang lebih luas tentang layanan jarak jauh. Cara mengidentifikasi orang-orang tersebut melalui twiter dan tautan yang dibagikan di grub facebook. Tanggapan besar dari orang-orang yang telah di wawancarai yang melaporakn gejala beberapa minggu setelah penyakit akut.

Analisis: 10 wawancara individu pertama dan semua kelompok fokus ditranskripsikan secara penuh. Untuk alasan sumber daya dan kecepatan karena banyak tema yang di angkat telah di bahas, hanya bagian terpilih dari 45 wawancara lainnya yang ditranskripsi. Transkrip data catatan dihilangkan identitasnya dengan menghapus referensi kenama asli dan dimasukkan ke perangkat lunak NVIVO versi 12. Data fase pengenalan awal, teks dikelompokkan kedalam kategori menyeluruh (misalnya pengalaman sakit, mengakses

dalam lima kategori yang saling terkait yang kami diskusikan secara lebih rinci yaitu: pengalaman sakit, mengakses perawatan, hubungan (atau kurangnya) dengan dokter, titik sentuh emosional dalam pertemuan dengan layanan kesehatan dan ide untuk peningkatan layanan. Sebelum mempertimbangkan pengalaman Covid-19 yang panjang, perlu diperhatikan bahwa hanya sebagian kecil dari peserta (8 dari 114) yang dirawat dirumah sakit, dan 96 dari 114 bahkan belum diperiksa di departemen kecelakaan dan darurat (A&E). Penyakit tidak pasti dan membingungkan peserta dengan Covid yang lama menggambarkan gejala disetiap bagian tubuh yang terkadang parah atau berfluktuasi, diperparah oleh prognosis yang tidak pasti dan pemulihan yang berhenti yang semuanya digabung menjadi penyakit yang menakutkan.

layanan) dan subkategori secara luas dikodekan dalam ini. Sintesis sementara dihasilkan dari awal transkrip dan semakin disempurnakan menggunakan metode komperatif konstan (data dari setiap transkrip baru digunakan untuk menambahkan nuansa pemahaman hermeneutik tentang pengalaman pasien penyakit dan layanan).

Tujuh artikel yang diidentifikasi, sebagian besar membahas tingkat keparahan gejala memengaruhi *prolong sign* secara umum, meskipun ada 2 artikel yang membahas keparahan tertentu saja. Tingkat keparahan gejala yang mempengaruhi kejadian *prolong sign* sebagai berikut:

1. Gejala ringan

Berdasarkan hasil analisis diatas, 6 jurnal terintegrasi menjelaskan bahwa beberapa orang yang telah sembuh dari Covid-19 ringan masih memiliki setidaknya satu gejala yang berkepanjangan.

2. Gejala berat

Berdasarkan hasil analisis diatas, 6 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa orang yang telah sembuh dari Covid-19 berat memiliki setidaknya 3 efek jangka panjang.

B. Pembahasan

Tingkat keparahan gejala yang mempengaruhi kejadian *prolong sign* adalah sebagai berikut:

1. Tanpa Gejala

Tidak ditemukan.

2. Gejala ringan

Berdasarkan hasil analisis di atas, 6 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa tingkat keparahan gejala Covid-19 ringan memiliki *prolong sign* setidaknya satu gejala. Gejala-gejala yang kemungkinan terjadi seperti batuk, sesak napas, demam, sakit tenggorokan, kelelahan dan ruam kulit. Termasuk nyeri dada, sesak napas, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, gangguan kognitif (kabut otak, dan kelemahan). Beberapa orang mungkin mengalami kombinasi gejala termasuk pernapasan, neurologis, dan gastrointestinal. Meskipun demikian, gejala-gejala

tersebut tidak semua di alami oleh pasien dengan gejala ringan (Kingstone et al., 2020).

Cross sectional study yang di lakukan oleh (Iqbal et al., 2021) mengatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara tingkat keparahan gejala saat terinfeksi Covid-19 dengan kejadian *prolong sign*. Iqbal et al melaporkan gejala-gejala yang berkepanjangan seperti kabut otak, *tinitus*, kualitas tidur yang buruk, depresi dan kecemasan. Sekitar 56,3% dari subjek penelitian ini mengeluhkan kualitas tidur yang buruk dan 19% dari populasi penelitian ini mengeluhkan *tinnitus* (telinga berdenging). Oleh karena itu, laporan kasus dengan Covid-19 ringan mengalami *tinnitus* selama infeksi dan bahkan setelah pemulihan. (Iqbal et al., 2021).

Covid-19 yang disebabkan oleh SARS CoV-2 dapat melibatkan gejala sisa dan komplikasi medis lainnya yang berlangsung berminggu-minggu setelah pemulihan. Analisis gejala pasca Covid-19 mengungkapkan hanya 10% dari semua subjek tidak memiliki gejala setelah sembuh dari Covid-19, sementara sebagian besar subjek menderita gejala. Sebagian besar subjek menderita kelelahan (72,8%), kecemasan (38%), nyeri sendi (31,4%), sakit kepala terus menerus (28,9%). *Literatur* oleh Sandra et al (2021) mengungkapkan bahwa penyakit Covid-19 ringan dapat mengakibatkan gejala yang menetap seperti hiposmia, anosmia, hipogeusia, dan kelelahan. Didukung juga oleh *literatur* oleh (Perelman et al., 2021) mengatakan bahwa orang dengan penyintas Covid-19 ringan sangat umum mengalami kelelahan atau kelemahan otot, kesulitan tidur, dan kecemasan atau depresi.

Cross sectional study yang di lakukan oleh (Marwah Tolba et al, 2021) mengatakan bahwa Sebagian besar orang dengan penyintas Covid-19 dengan gejala ringan yang dapat dihilangkan tanpa intervensi medis. Gejala-gejala tersebut seperti kelelahan, sakit kepala, nyeri sendi, dan nyeri otot. Tercatat bahwa banyak manifestasi terkait dengan sistem saraf pusat seperti sakit kepala terus menerus, migraine, depresi, dan kecemasan. Sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh (Emma Ladds et al, 2020) mengatakan bahwa banyak subjek pasca Covid-19 dengan gejala ringan masih mengalami kelelahan, kecemasan, dan sakit kepala.

Fenomena *Prolong sign* dapat terjadi pada pasien Covid-19 gejala ringan. Dalam studi terkontrol yang di lakukan *Journal Of Americal Association* (JAMA) dan sekelompok dokter dari Italia, studi ini menemukan bahwa pasien yang sembuh dari gejala yang menetap, terutama kelelahan dan sesak napas yang bisa muncul selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan setelah sembuh (Carfi et al., 2020) selain itu dalam penelitian yang di lakukan oleh Goertz et al (2020) tentang gejala persisten 3 bulan setelah terinfeksi Covid-19 mengemukakan fenomena bahwa gejala masih bertahan berbulan-bulan setelah infeksi yang berarti menunjukkan adanya “*syndrome pasca Covid-19*” (Goertz et al., 2020). Orang dengan gejala Covid-19 yang berkelanjutan mengalami gejala yang terus menerus dan berfluktuasi yang membingungkan termasuk batuk, sesak napas, demam, sakit tenggorokan, nyeri dada, mialgi, ruam kulit, dan diare (Ladds et al., 2020). Dalam penelitian yang dilakukan Goertz et al (2020) juga terdapat bukti anekdot bahwa pasien dengan Covid-19 “gejala ringan” mungkin

mengeluahkan tentang gejala yang terus menerus, bahkan berminggu-minggu setelah mengalami infeksi (Goertz et al., 2020).

Orang dengan Covid-19 yang bergejala ringan tidak menuntut kemungkinan dapat menderita gejala yang berkepanjangan. Seperti yang telah di jelaskan oleh marwah bahwa 90% pasien Covid-19 yang pulih masih memiliki gejala jangka panjang. Gejala-gejala jangka panjang orang yang terinfeksi Covid-19 gejala ringan tidak hanya terbatas pada gejala ringan saja namun dapat juga komplikasi pada pernapasan, neurologis, dan gastrointestinal. Oleh karena itu, segera laporkan ketenaga kesehatan bila terjadi masalah-masalah yang tidak dapat diatasi sendiri. Adapun gejala-gejala umum yang di rasakan seperti batuk, sesak napas, demam, sakit tenggorokan, kelelahan dan ruam kulit. Termasuk nyeri dada, sesak napas, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, gangguan kognitif (kabut otak, dan kelemahan) dll.

3. Gejala Sedang

Tidak ditemukan.

4. Gejala Berat

Berdasarkan hasil analisis di atas, 6 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa orang yang menderita Covid-19 berat memiliki efek yang berkepanjangan lebih banyak masalah dalam mobilitas. Masalah-masalah tersebut dapat berupa nyeri atau ketidak nyamanan dan kecemasan atau depresi, kelelahan, dan penurunan kapasitas paru. Dalam penelitian yang dilakukan oleh marwah (Id & Paper, 2021) mengatakan bahwa tingkat keparahan gejala pasca Covid-19 terkait dengan tingkat keparahan Covid-19. Gejala berat adalah yang mempengaruhi fungsi organ seperti fibrosis paru, gagal ginjal, miokarditis, aritmia dan struk

yang memerlukan pemeriksaan ekstra. Gejala yang paling banyak di laporkan yaitu kelelahan.

Cross sectional study oleh (Iqbal et al., 2021) mengatakan adanya hubungan beratnya gejala yang signifikan secara statistik dengan adanya gejala pasca Covid-19. Gejala-gejala tersebut berupa dispnea, batuk terus-menerus, nyeri sendi, dan nyeri dada, kesulitan dalam melakukan aktifitas biasa, kesulitan dalam mencuci atau berpakaian, kesulitan berjalan, nyeri, ketidak nyamanan, kecemasan dan depresi. Dari subjek yang terkena dampak parah, 77% mengalami masalah berat atau tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa (Iqbal et al., 2021).

Tinjauan Sistematis dan meta-analisa oleh (Perelman et al., 2021) mengatakan adanya beberapa gejala neuropatik telah dilaporkan. Gejala-gejala yang di timbulkan seperti sakit kepala (44%), gangguan perhatian (27%) dan anosmia (21%). Etiologi gejala neuropsikiatri pada pasien Covid-19 sangat kompleks dan multifaktorial. Mereka mungkin terkait langsung dari efek langsung dari infeksi, penyakit serebrovaskular (termasuk hiperkoagulasi), kompromi fisiologis (hipoksia), efek samping obat, dan aspek sosial memiliki penyakit yang berpotensi fatal.

Gejala berat menimbulkan gejala-gejala pasca Covid-19 yang mengakibatkan kelainan pada sistem organ. Hal tersebut dapat terjadi pada paru-paru (batuk, rasa tidak nyaman didada, penurunan kapasitas difusi paru, sleep apnea, dan fibrosis paru), kardiovaskular (aritmia dan miokarditis), neurologis (demensia, depresi, kecemasan, gangguan perhatian, dan gangguan obsesif-kompulsif). Gejala lain tidak spesifik seperti rambut rontok, tinitus, dan keringat malam (Perelman et al., 2021). Hal di atas sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh (Iqbal

et al., 2021) mengatakan bahwa beberapa orang didapatkan mengalami kerusakan organ seperti fibrosis paru dan gagal ginjal.

Tinjauan Sistematis dan meta-analisa oleh (Perelman et al., 2021) mengatakan bahwa orang dewasa memiliki risiko ganda untuk didiagnosa dengan gangguan kejiwaan setelah sembuh dari Covid-19. Kondisi kejiwaan yang paling umum didapatkan adalah gangguan kecemasan, insomnia dan demensia. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Iqbal et al., 2021) yang mengatakan bahwa beberapa subjek yang telah sembuh dari Covid-19 menderita depresi dan kecemasan.

Cross sectional study oleh (Roth et al., 2021) mengidentifikasi bahwa ada beberapa penyakit baru yang dapat muncul setelah terinfeksi Covid-19. Hal ini terjadi seperti pada laporan 3 orang dewasa muda yang mengalami biopsi hati yang berkepanjangan dan parah selama pemulihan dari Covid-19. Tidak ada yang memiliki penyakit hati kronis yang sudah ada sebelumnya. 3 subjek penelitian ini menunjukkan cedera kolangiospati degeneratif yang luas, dengan vaskulisasi kolangiosit yang menonjol. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Emma Ladds et al., 2020) mengatakan bahwa orang yang telah sembuh dari Covid-19 memiliki penyakit multisistem dengan bukti kerusakan jantung yang sebelumnya tidak di miliki. Didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh (Id & Paper, 2021) yang melaporkan sebuah kasus dengan subjek perempuan umur 80 tahun yang telah sembuh dari Covid-19 dan tidak memiliki riwayat penyakit paru sebelumnya, namun menderita fibrosis paru bilateral akibat Covid-19 yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini juga menemukan keterlibatan jantung, dilaporkan beberapa

subjek Covid-19 menderita miokarditis sebagai komplikasi dari Covid-19.

Ada beberapa sikap yang dapat dilakukan dalam menghadapi sebuah penyakit seperti yang telah dicerminkan oleh kisah Nabi Ayyub setelah melalui periode sakit yang panjang, Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Allah bahkan memberikan Ayub nikmat yang lebih melimpah setelahnya dikarenakan Nabi Ayyub selalu mengingat Allah dan tidak pernah melupakannya, iapun selalu berdoa meminta pertolongan agar di sembuhkan dari penyakitnya seperti yang tertuang dalam Quran surah Al-Ambiya ayat 83 sebagai berikut:

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ٤

Terjemahannya:

Dan (Ingatlah kisah) Ayub, ketika dia kedoa kepada Tuhannya, (YA Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

5. Kritis

Tidak ditemukan

C. Keterbatasan penelitian

Keterbatasan dalam penelitian pustaka ini yaitu sumber *database* pencarian artikel hanya menggunakan 4 *database* dengan jumlah artikel yang digunakan sebagai referensi yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi masih terbatas. Ada batasan bahasa pada artikel yang diinklusi yaitu hanya mengambil artikel yang berbahasa inggris atau berbahasa indonesia. Tingkat keparahan gejala hanya di jelaskan dua tingkat yaitu gejala ringan dan berat.

Pelitian ini juga tidak mampu mengeluarkan usia dalam kriteria inklusi sehingga mempengaruhi *prolong sign*.

D. Implikasi Penelitian

1. Pelayanan Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi untuk tenaga kesehatan khususnya perawat agar memiliki pemahaman yang memadai bahwa terdapat gejala yang berkepanjangan setelah terinfeksi Covid-19. Sehingga perawat dapat menjadikan hasil temuan dalam penelitian ini sebagai landasan ilmiah yang nantinya digunakan saat membuat rencana pulang pasien (Discharge planning). Sehingga pasien tidak kaget lagi nantinya jika terjadi gejala-gejala yang telah disebutkan pada penelitian ini.

2. Bidang pendidikan

Hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi tambahan referensi dalam pengembangan ilmu baik secara nasional maupun internasional terkait tingkat keparahan gejala dengan kejadian *prolong sign*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tingkat keparahan gejala yang mempengaruhi kejadian *prolong sign* berdasarkan telaah literatur pada 7 artikel yang teridentifikasi dan dianalisis yaitu gejala ringan dan berat. Gejala ringan seperti (nyeri dada, sesak napas, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, gangguan kognitif (kabut otak, dan kelemahan) batuk, demam, sakit tenggorokan, kelelahan dan ruam kulit) dan gejala berat seperti (nyeri atau ketidak nyamanan dan kecemasan atau depresi, kelelahan, penurunan kapasitas paru, mempengaruhi fungsi organ seperti fibrosis paru, gagal ginjal, miokarditis, aritmia dan struk, sakit kepala, gangguan perhatian, anosmia, kabut otak, neuropati) risiko untuk baru di diagnosa dengan penyakit hati dan gangguan kejiwaan setelah sembuh dari Covid-19 dan kondisi kejiwaan yang paling umum disajikan adalah gangguan kecemasan, insomnia dan demensia. Gejala-gejala tersebut telah terbukti berpengaruh pada kejadian *prolong sign*. Penelitian ini juga tidak mampu mengeluarkan usia dalam kriteria inklusi sehingga mempengaruhi *prolong sign*.

B. Saran

Berdasarkan hasil review literatur mengenai tingkat keparahan gejala yang mempengaruhi kejadian *prolong sign*, terdapat beberapa saran sebagai upaya dalam mengembangkan hasil penelitian tersebut, yaitu:

1. Bagi penelitian

Bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai tingkat keparahan gejala Covid-19 dengan kejadian *prolong sign* sebaiknya melakukan penelitian dengan desain penelitian *restrospektif*,

baik itu *kualitatif study dan cross sectional study*. Hal tersebut sebagai upaya memperkaya jumlah penelitian dengan kasus yang nyata meskipun hanya melalui sumber data sekunder dan tidak melakukan penelitian langsung dengan subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memperkuat hasil penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pelayanan Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan rujukan, masukan/informasi untuk para tenaga kesehatan khususnya perawat dalam mengatur rencana pulang (*Discharge Planning*) bagi pasien Covid-19 yang telah pulih agar tidak adanya rasa khawatir atau kecemasan yang berlebihan saat gejala tersebut muncul. Selain itu, dapat pula digunakan sebagai informasi tambahan berupa pendidikan kesehatan yang di berikan petugas kesehatan (khususnya perawat) kepada masyarakat umum mengenai gejala-gejala Covid-19 yang menetap.

DAFTAR PUSTAKA

- WHO. (2020a). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. Retrieved from <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public> 2.
- CDC. (2020). Public Health Guidance for Potential COVID-19 Exposure Associated with International or Domestic Travel. Retrieved from <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-riskassessment-hcp.html>
- Callard, F., & Perego, E. (2021). Social Science & Medicine How and why patients made Long Covid. *Social Science & Medicine*, 268(October 2020), 113426. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113426>
- Carfi et.al. (2020). *Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19*. 0, 1–2. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1985>
- Covid-, D. M. T. (2021). *Dampak merokok terhadap covid-19*. 11(1), 169–176.
- Covid, P. (2019). *COVID panjang*. 2.
- Dani, A. M., Dirksen, A. A., Taraborrelli, B. P., Torocastro, B. M., Panagopoulos, D., E, D. R. S., & F, P. B. L. (2021). *Autonomic dysfunction in 'long COVID': rationale, physiology and management strategies*. 21(1). <https://doi.org/10.7861/clinmed.2020-0896>
- Dao, T. L., Hoang, V. T., & Gautret, P. (2021). *Recurrence of SARS-CoV-2 viral RNA in recovered COVID-19 patients: a narrative review*.
- Health, W. H. O., Programme, E., Panel, E. A., Preparedness, I. P. C., Guidance, I. P. C., Group, D., Gdg, I. P. C., Cov-, I. S.-, Sars-cov-, T., & Sars-cov-, T. (2020). *Transmisi SARS-CoV-2: implikasi terhadap kewaspadaan pencegahan infeksi*. 1–10.
- Id, O., & Paper, O. (2021). *Assessment and Characterization of Post-COVID-19 manifestations 1*. 0–2. <https://doi.org/10.1111/ijcp.13746>

- Iqbal, A., Iqbal, K., Ali, S. A., Azim, D., Farid, E., Baig, M. D., Bin, T., & Raza, M. (2021). *The COVID-19 Sequelae : A Cross-Sectional Evaluation of Post-recovery Symptoms and the Need for Rehabilitation of COVID-19 Survivors*. 2(2). <https://doi.org/10.7759/cureus.13080>
- Jee, H., Nwagwu, C., Anyim, O., Ekweremadu, C., & Kim, S. (2021). *International Immunopharmacology COVID-19 and cancer : From basic mechanisms to vaccine development using nanotechnology*. 90.
- Kedokteran, F., & Lampung, U. (2020). *Wellness and healthy magazine*. 2(February), 187–192.
- Kingstone, T., Taylor, A. K., Donnell, C. A. O., Atherton, H., Blane, D. N., & Chew-, C. A. (2020). *Finding the ' right ' GP : a qualitative study of the experiences of people with long- - COVID*. 1–12. <https://doi.org/10.3399/bjgpopen20X101143>
- Ladds, E., Rushforth, A., Wieringa, S., Taylor, S., Rayner, C., Husain, L., & Greenhalgh, T. (2020). *Persistent symptoms after Covid-19 : qualitative study of 114 “ long Covid ” patients and draft quality principles for services*. 1–13.
- Levani, Y., Prastya, A. D., Mawaddatunnadila, S., Wuhan, K., & Huebei, P. (2019). *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis , Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi*. 2019.
- Mahase, E. (2020). *Covid-19 : What do we know about “ long covid ”?* 19(July), 0–3. <https://doi.org/10.1136/bmj.m2815>
- Moudy, J., Syakurah, R. A., & Artikel, I. (2020). *HIGEIA JOURNAL OF PUBLIC HEALTH*. 4(3), 333–346.
- Muhammad nasir ar-rafi'i. (2011). *kemudahan dari allah ringkasan tafsir ibnu katsir jilid 1*.
- Paru, K. T., Malang, S., Pemberian, P., Terhadap, V. C., Foto, P., Pada, T., &

- Tuberkulosis, P. (2020). *Multi-Drug Resistance Tuberculosis* : 40(2).
- Pencegahan, P., & Pengendalian, D. A. N. (2020). *Halaman sampul*. 1–214.
- Perelman, C., Rebolledo, P. A., & Villapol, S. (2021). *More than 50 Long-term effects of COVID-19 : a systematic review and meta-analysis*. 1–22.
- Roeroe, P. A. L., Sedli, B. P., & Umboh, O. (2021). *Faktor Risiko Terjadinya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada Penyandang Diabetes Melitus Tipe 2*. 9(28), 154–160.
- Roth, N. C., Kim, A., Vitkovski, T., Xia, J., Ramirez, G., Bernstein, D., & Crawford, J. M. (2021). *Post – COVID-19 Cholangiopathy : A Novel Entity*. 1077–1082.
- Sirajuddin, N. (2020). *Pengaruh Kontak Erat terhadap Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kota Makassar Tahun 2020*. 100–110.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Khie, L., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, O. M., Yunihastuti, E., Penanganan, T., New, I., ... Cipto, R. (2020). *Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 : Review of Current Literatures*. 7(1), 45–67.
- Tatalaksana, P. (2020). *Agustus 2020 PEDOMAN TATALAKSANA COVID-19*.
- WHO. (2020). *Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic*.

LAMPIRAN

JBI Critical Appraisal Checklist For Analytical Cross Sectional Studies

Jurnal: *Assesment and characterization of post Covid-19 manifestations*

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK DAPAT DI JELASKAN
1.	Apakah kriteria untuk dimasukkan dalam sampel didefinisikan dengan jelas?		√		
2.	Apakah subyek penelitian dan pengaturan dijelaskan secara rinci?	√			
3.	Apakah paparan diukur dengan cara yang sah dan dapat diandalkan?	√			
4.	Apakah tujuan, kriteria standar yang di gunakan untuk pengukuran kondisi?	√			
5.	Apakah membingungkan faktor di identifikasi?	√			
6.	Apakah strategi untuk menghadapi pengganggu faktor menyatakan?	√			
7.	Apakah hasil diukur dengan cara yang sah dan dapat diandalkan?	√			
8.	Apakah analisis statistik yang sesuai digunakan?	√			

Hasil telaah keseluruhan: 87,5% (Include/Dimasukkan)

LAMPIRAN

JBI Critical Appraisal Checklist For Analytical Cross Sectional Studies

Jurnal: *The Covid-19 sequelae: a cross sectional evaluation post recovery symptoms and the need for rehabilitation of Covid-19 survivors*

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK DAPAT DI JELASKAN
1.	Apakah kriteria untuk dimasukkan dalam sampel didefinisikan dengan jelas?	√			
2.	Apakah subyek penelitian dan pengaturan dijelaskan secara rinci?			√	
3.	Apakah paparan diukur dengan cara yang sah dan dapat diandalkan?	√			
4.	Apakah tujuan, kriteria standar yang di gunakan untuk pengukuran kondisi?	√			
5.	Apakah membingungkan faktor di identifikasi?	√			
6.	Apakah strategi untuk menghadapi pengganggu faktor menyatakan?	√			
7.	Apakah hasil diukur dengan cara yang sah dan dapat diandalkan?	√			
8.	Apakah analisis statistik yang sesuai digunakan?	√			

Hasil telaah keseluruhan: 87,5% (Include/Dimasukkan)

LAMPIRAN

JBI Critical Appraisal Checklist For Analytical Cross Sectional Studies

Jurnal: *Post Covid-19 cholangiopathy: A Novel Entity*

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK DAPAT DI JELASKAN
1.	Apakah kriteria untuk dimasukkan dalam sampel didefinisikan dengan jelas?	√			
2.	Apakah subyek penelitian dan pengaturan dijelaskan secara rinci?	√			
3.	Apakah paparan diukur dengan cara yang sah dan dapat diandalkan?	√			
4.	Apakah tujuan, kriteria standar yang di gunakan untuk pengukuran kondisi?		√		
5.	Apakah membingungkan faktor di identifikasi?	√			
6.	Apakah strategi untuk menghadapi pengganggu faktor menyatakan?		√		
7.	Apakah hasil diukur dengan cara yang sah dan dapat diandalkan?	√			
8.	Apakah analisis statistik yang sesuai digunakan?	√			

Hasil telaah keseluruhan: 75% (Include/Dimasukkan)

LAMPIRAN


JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort

Jurnal: *6 month consequences of Covid-19 in patients discharged from hospital: a cohort study.*

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK DAPAT DI JELASKAN
1.	Apakah kedua kelompok serupa dan direkrut dari populasi yang sama?		√		
2.	Apakah eksposur diukur sama untuk menetapkan orang?	√			
3.	untuk kedua kelompok terpajan dan tidak terpajan?		√		
4.	Apakah paparan diukur dengan cara yang sah dan dapat diandalkan?	√			
5.	Apakah membingungkan faktor diidentifikasi?	√			
6.	Apakah strategi untuk menghadapi pengganggu faktor menyatakan?	√			
7.	Apakah kelompok / peserta membebaskan hasilnya pada awal penelitian (atau pada saat paparan)?	√			
8.	Apakah hasil diukur dengan cara yang sah dan dapat diandalkan?	√			
9.	Apakah tindak waktu dilaporkan dan cukup untuk menjadi cukup lama untuk hasil terjadi?	√			
10.	Apakah menindaklanjuti	√			

	lengkap, dan jika tidak, adalah alasan untuk mangkir dijelaskan dan dieksplorasi?				
11.	Apakah strategi ke alamat yang tidak lengkap menindaklanjuti dimanfaatkan?	√			
12.	Apakah analisis statistik yang sesuai digunakan?	√			

Hasil telaah keseluruhan: 83% (Include/Dimasukkan)



LAMPIRAN***JBI Critical Appraisal Checklist for Kualitatif study***

Jurnal: *Finding the 'right' GP: a qualitative study of the experiences of people with long Covid.*

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK DAPAT DI JELASKAN
1	Apakah ada kesesuaian antara perspektif filosofis yang dinyatakan dan metodologi penelitian?	√			
2	Apakah ada kesesuaian antara metodologi penelitian dan pernyataan atau tujuan penelitian?	√			
3	Apakah ada kesesuaian antara metodologi penelitian dengan metode yang digunakan untuk pengumpulan data?	√			
4	Apakah ada kesesuaian antara metodologi penelitian dengan representasi dan analisis data?	√			
5	Apakah ada kesesuaian antara metodologi penelitian dan interpretasi hasil?	√			
6	Apakah ada pernyataan yang menempatkan peneliti secara kultural atau teoritis?		√		

7	Apakah pengaruh peneliti pada penelitian, dan sebaliknya ditangani?	√			
8	Apakah peserta, dan suara mereka, cukup terwakili?	√			
9	Apakah penelitian etis menurut kriteria saat ini atau, untuk penelitian terbaru, dan apakah ada bukti persetujuan etis oleh badan yang sesuai?		√		
10	Apakah kesimpulan yang ditarik dalam laporan penelitian mengalir dari analisis atau interpretasi data?	√			

Hasil telaah keseluruhan: 80% (Include/Dimasukkan)

LAMPIRAN***JBI Critical Appraisal Checklist for Kualitatif study***

Jurnal: *Persistent symptoms after Covid-19: qualitative study of 114 “long Covid” patients and draft quality principles for services.*

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK DAPAT DI JELASKAN
1	Apakah ada kesesuaian antara perspektif filosofis yang dinyatakan dan metodologi penelitian?	√			
2	Apakah ada kesesuaian antara metodologi penelitian dan pernyataan atau tujuan penelitian?	√			
3	Apakah ada kesesuaian antara metodologi penelitian dengan metode yang digunakan untuk pengumpulan data?	√			
4	Apakah ada kesesuaian antara metodologi penelitian dengan representasi dan analisis data?	√			
5	Apakah ada kesesuaian antara metodologi penelitian dan interpretasi hasil?	√			
6	Apakah ada pernyataan yang menempatkan peneliti secara kultural atau teoritis?			√	

7	Apakah pengaruh peneliti pada penelitian, dan sebaliknya ditangani?	√			
8	Apakah peserta, dan suara mereka, cukup terwakili?	√			
9	Apakah penelitian etis menurut kriteria saat ini atau, untuk penelitian terbaru, dan apakah ada bukti persetujuan etis oleh badan yang sesuai?		√		
10	Apakah kesimpulan yang ditarik dalam laporan penelitian mengalir dari analisis atau interpretasi data?	√			

Hasil telaah keseluruhan: 80% (Include/Dimasukkan)


LAMPIRAN***JBI Critical Appraisal Checklist for Sistematic review and meta-analisis***

Jurnal: *More than 50 long-term effects of Covid-19: a systematic review and meta-analisis.*

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK DAPAT DIJELASKAN
1	Apakah pertanyaan review dinyatakan dengan jelas dan eksplisi?	√			
2	Apakah kriteria inklusi sesuai untuk peranyaan tinjauan?	√			
3	Apakah strategi pencarian sudah tepat?			√	
4	Apakah sumber dan sumber daya digunakan untuk mencari studi memadai?	√			
5	Apakah kriteria untuk menilai studi sesuai?	√			
6	Apakah penilaian kritis dilakukan oleh dua orang atau lebih reviewer secara independen?		√		
7	Apakah ada metode untuk meminimalkan kesalahan dalam ekstraksi data?	√			
8	Apakah metode yang di gunakan untuk menggabungkan studi sesuai?	√			
9	Apakah kemungkinan bias publikasi dinilai	√			
10	Apakah rekomendasi untuk kebijakan dan/atau praktik didukung oleh data yang dilaporkan?	√			

11	Apakah arahan khusus untuk penelitian baru sudah selesai?	√			
----	---	---	--	--	--

Hasil telaah keseluruhan: 81% (Include/Dimasukkan)



Hasil Cari Yahoo untuk google s... x Covid-19 OR Coronavirus OR SARS-... x

https://scholar.google.co.id/scholar?as_ylo=2020&q=Covid-19+OR+Coronavirus+OR+SARS-CoV2+OR+Prolong+sign+OR+Long+ovid+OR+Syndrom+post+Covid-19+AND+T...

Google Cendekia Covid-19 OR Coronavirus OR SARS-CoV2 OR Prolong sign OR Long covid

Sekitar 97 hasil (0,04 dtk) Profil saya Koleksiku

Artikel

Kapan saja Sejak 2021 Sejak 2020 Sejak 2017 Rentang khusus...

Urutkan menurut relevansi
Urutkan menurut tanggal

sertakan paten
 mencakup kutipan
 Buat lansiran

The PERSISTENT SYMPTOMS OF COVID-29 SURVIVOR: LITERATURE REVIEW [PDF] ppnijateng.org
AM Kholliah, AYS Hamid - Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa, 2021 - journal.ppnijateng.org
... risk factors of disability and anxiety in a retrospective cohort of 432 survivors of **Coronavirus Disease-2019** ... Mental health during the **COVID-19** pandemic and beyond: The importance of the vagus nerve for biopsychosocial ... **Long-Lasting Cognitive Abnormalities after COVID-19** ...
☆ 2 versi

PERBEDAAN JUMLAH LIMFOSIT PADA PASIEN POSITIF CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DERAJAT RINGAN, SEDANG DAN KIRIBERAT [PDF] usd.ac.id
DANKDIRS BERAT - repository.usd.ac.id
... 2020. PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) ... http://virological.org/initial-assessment-of-the-ability-of-published-coronavirus-primers-sets-to-detect-the-wuhan-coronavirus/321 ... **Long**, SS, Prober, CG, Fischer, M., 2018 ...
☆ Artikel terkait

COVID-19 containment measures of the Government of Kenya: Impact on food security and farmers' socio-economic life Kebijakan penanggulangan COVID-19 [PDF] unair.ac.id
KM Kinuthia, E Susanti - e-journal.unair.ac.id
... Macadamia farmers and avocado farmers witnessed significant losses; however, before **coronavirus's** unwarranted effects ... were not fairly compensated for their produce due to **long** supply chains ... Kinuthia & Susanti: **COVID-19** containment measures of the Government of Kenya ...
☆ Artikel terkait

Analisis Risiko Produk Alat Pelindung Diri (APD) Pencegah Penularan COVID-19 untuk Pekerja Informal di Indonesia [PDF] unpar.ac.id
Y Theophilus, I Yogiastara, C Theresia - Jurnal Rekayasa ... 2020 - journal.unpar.ac.id
... oleh virus corona yang bernama severe acute respiratory **syndrome coronavirus 2** atau ... FMEA

Type here to search

Garuda - Garba Rujukan Digital

garuda.ristekbrin.go.id/documents?q=Covid-19+OR+Coronavirus+OR+SARS-CoV2+OR+Prolong+sign+OR+Long+ovid+OR+Syndrom+post+Covid-19+OR+Tingkat+keparahan...

GARUDA Home Publisher Journal / Conference Subject Suggest

Search By Title Keywords Publisher
Covid-19 OR Coronavirus OR SARS-CoV2 OR Prolong sign OR Long covid OR Syndrom Publisher Name Search

Downloadable PDF Only

Filter By Year 0000

From To Filter Reset

Found 0 documents
Search Covid-19 OR Coronavirus OR SARS-CoV2 OR Prolong sign OR Long covid OR Syndrom post Covid-19 OR Tingkat keparahan Covid-19

Sinta Simlitabmas Arjuna PDDIKTI Risbang Scopus Rama

Ministry of Research and Technology / National Agency for Research and Innovation © 2018

ALA UDDIN
M A K A S S A R

The image shows two browser screenshots. The top screenshot is from PubMed.gov, displaying search results for the query "Covid-19 OR Coronavirus OR SARS-CoV2 OR Prolong sign OR Long covid Of". It shows 190,504 results and a "RESULTS BY YEAR" chart with data points for 1850 and 2022. A notification box suggests using COVID-19 filters from PubMed Clinical Queries. The bottom screenshot is from ScienceDirect, showing search results for the same query, with 171,748 results. It lists a review article and a research article, both related to SARS-CoV-2 therapeutics. A "Sign in" button is visible at the bottom of the ScienceDirect page.

PubMed.gov Search Results:

- Search Query: Covid-19 OR Coronavirus OR SARS-CoV2 OR Prolong sign OR Long covid Of
- Results: 190,504
- MY NCBI FILTERS
- RESULTS BY YEAR: 1850, 2022
- Notification: Use COVID-19 filters from PubMed Clinical Queries to refine your search. See more SARS-CoV-2 literature, sequence, and clinical content from NCBI.
- Message: The following term was not found in PubMed: keparahan

ScienceDirect Search Results:

- Search Query: Covid-19 OR Coronavirus OR SARS-CoV2 OR Prolong sign OR Long cc
- Results: 171,748
- sorted by relevance | date
- Refine by: Years (2023: 8, 2022: 453, 2021: 57,532), Article type (Review articles: 19,075, Research articles: 82,972, Encyclopedia: 1,465, Book chapters: 14,390)
- Articles:
 - Review article: SARS 2 human coronavirus (COVID -19, SARS CoV2)
 - Research article: Identification of multipotent drugs for COVID-19 therapeutics with the evaluation of their SARS-CoV2 inhibitory activity

ALAUDDIN
MAKASSAR

Search results for: covid-19 OR More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis

RESULTS BY YEAR

1850 2022

TEXT AVAILABILITY

- Abstract
- Free full text
- Full text

ARTICLE ATTRIBUTE

- Associated data

ARTICLE TYPE

- Books and Documents
- Clinical Trial
- Meta-Analysis
- Randomized Controlled Trial
- Review
- Systematic Review

PUBLICATION DATE

- 1 year
- 5 years
- 10 years
- Custom Range

Search Results:

- More than 50 Long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis.**
Lopez-Leon S, et al. medRxiv. 2021. PMID: 33532785 [Free PMC article](#). [Updated](#).
- More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis.**
Lopez-Leon S, et al. Sci Rep. 2021. PMID: 34373540 [Free PMC article](#).
- More Than 50 Long-Term Effects of COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis.**
Lopez-Leon S, et al. Res Sq. 2021. PMID: 33688642 [Free PMC article](#). [Updated](#).

Did you mean covid-19 for more than 50 long-term effects of Covid-19: a systematic review and meta analyses (15 results)?

- A systematic review and meta-analysis of children with coronavirus disease 2019 (COVID-19).**
1
Cui X, Zhao Z, Zhang T, Guo W, Guo W, Zheng J, Zhang J, Dong C, Na R, Zheng L, Li W, Liu Z, Ma J, Wang J, He S, Xu Y, Si P, Shen Y, Cai C.
Share
J Med Virol. 2021 Feb;93(2):1057-1069. doi: 10.1002/jmv.26398. Epub 2020 Sep 28.
PMID: 32761898 [Free PMC article](#).
To provide a comprehensive and systematic analysis of demographic characteristics, clinical symptoms, laboratory findings, and imaging features of **coronavirus disease 2019 (COVID-19)** in pediatric patients. A meta-analysis was carried out to identify st ...
- Should RT-PCR be considered a gold standard in the diagnosis of COVID-19?**
2
Drozd M, Tshun Tonia M, Sene E, Hauruf E, Hattoria M, Kozlovskaya L, Gotsch L.

Assessment and characterisation of post-COVID-19 manifestations.
1
Kamal M, Abo Omirah M, Hussein A, Saeed H.
Share
Int J Clin Pract. 2021 Mar;75(3):e13746. doi: 10.1111/ijcp.13746. Epub 2020 Nov 3.
PMID: 32991035 [Free PMC article](#).
BACKGROUND: **Post-COVID-19** symptoms and diseases appeared on many survivors from **COVID-19** which are similar to that of the **post-severe acute respiratory syndrome (SARS)** fatigue.
...CONCLUSION: The **post** ...- Perspectives on monoclonal antibody therapy as potential therapeutic intervention for Coronavirus disease-19 (COVID-19).**
2
Shanmugaraj B, Siri wattananon K, Wangkanont K, Phoolcharoen W.
Share
Asian Pac J Allergy Immunol. 2020 Mar;38(1):10-18. doi: 10.12932/AP-200220-0773.
PMID: 32134278 [Free article](#). [Review](#).
Last decade witnessed the outbreak of many life-threatening human pathogens including Nipah, Ebola, Chikungunya, Zika, Middle East **respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)**. **Severe Acute respiratory syndrome coronavirus** ...

Use COVID-19 filters from PubMed Clinical Queries to refine your search
[Treatment](#) [Mechanism](#) [Transmission](#) [More filters](#)
[See more SARS-CoV-2 literature, sequence, and clinical content from NCBI](#)

ALAUDDIN MAKASSAR

concern ... Page 1

6-month consequences of **COVID-19** in patients discharged from hospital: a cohort study.
5

Cite Huang C, Huang L, Wang Y, Li X, Ren L, Gu X, Kang L, Guo L, Liu M, Zhou X, Luo J, Huang Z, Tu S, Zhao Y, Chen L, Xu D, Li Y, Li C, Peng L, Li Y, Xie W, Cui D, Shang L, Fan G, Xu J, Wang G, Wang Y, Zhong J, Wang C, Wang J, Zhang D, Cao B.
Share Lancet. 2021 Jan 16;397(10270):220-232. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32656-8. Epub 2021 Jan 8. PMID: 33428867 [Free PMC article](#).

BACKGROUND: The **long-term** health consequences of **COVID-19** remain largely unclear. ...Enrolled patients who had participated in the Lopinavir Trial for Suppression of **SARS-CoV-2** in China received **severe acute respiratory ...**

Comparison of Rapid Antigen Tests for **COVID-19**.
6

Cite Yamayoshi S, Sakai-Tagawa Y, Koga M, Akasaka O, Nakachi I, Koh H, Maeda K, Adachi E, Saito M, Nagai H, Ikeuchi K, Ogura T, Baba R, Fujita K, Fukui T, Ito F, Hattori SI, Yamamoto K, Nakamoto T, Furusawa Y, Yasuhara A, Ujje M, Yamada S, Ito M, Mitsuya H, Omagari N, Yotsuyanagi H, Iwatsuki-Horimoto K, Imai M, Kawaoka Y.
Share Viruses. 2020 Dec 10;12(12):1420. doi: 10.3390/v12121420. PMID: 33322035 [Free PMC article](#).

However, their sensitivity compared with each other and with RT-qPCR and infectious virus isolation has not been examined. Here, we compared the sensitivity among four RATs by using **severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS ...**

Should RT-PCR be considered a gold standard in the diagnosis of **COVID-19**?
7

Cite Dramé M, Tabue Teguio M, Proye E, Hequet F, Hentzien M, Kanagaratnam L, Godaert L.
Share associated with **SARS-CoV-2** infection and raised the qu ... Page 2

Post-COVID-19** Cholangiopathy: A Novel Entity.**
14

Cite Roth NC, Kim A, Vitkovski T, Xia J, Ramirez G, Bernstein D, Crawford JM.
Share Am J Gastroenterol. 2021 May 1;116(5):1077-1082. doi: 10.14309/ajg.0000000000001154. PMID: 33464757

INTRODUCTION: Liver chemistry abnormalities are a frequent manifestation of **coronavirus disease 2019 (COVID-19)** but are usually transient and resolve with disease resolution. ...DISCUSSION: We believe that these cases constitute a novel **severe ...**

COVID-19: from an acute to chronic disease? Potential long-term health consequences.
15

Cite Higgins V, Sohaei D, Diamandis EP, Prassas I.
Share Crit Rev Clin Lab Sci. 2021 Aug;58(5):297-310. doi: 10.1080/10408363.2020.1860895. Epub 2020 Dec 21. PMID: 33347790 [Review](#).

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is caused by the **severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)**. ...In this review, we turn to previous similar **coronaviruses** (i.e. ...

Could there be a link between oral hygiene and the severity of SARS-CoV-2 infections?
16

Cite Sampson V, Kamona N, Sampson A.
Share Br Dent J. 2020 Jun;228(12):971-975. doi: 10.1038/s41415-020-1747-8. PMID: 32591714 [Free PMC article](#).

On 30 January 2020, the World Health Organisation identified **COVID-19** caused by the virus **SARS-CoV-2**, to be a global emergency. ...These risk factors, however, do not account for the other 52% of deaths arising from **COVID-19** in of ...

ALAUDDIN
M A K A S S A R

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=covid-19+or+The+Covid-19+sequelae%3A+a+cross+sectional+evaluation+post+recovery+symptoms+and+the+need+for+rehabilitati...

1981 2022

1 article found by citation matching

The COVID-19 Sequelae: A Cross-Sectional Evaluation of Post-recovery Symptoms and the Need for Rehabilitation of COVID-19 Survivors.
Iqbal A. et al. *Cureus*. 2021. PMID: 33680620 **Free PMC article**.

Filters applied: Free full text. Clear all

TEXT AVAILABILITY

- Abstract
- Free full text
- Full text

ARTICLE ATTRIBUTE

- Associated data

ARTICLE TYPE

- Books and Documents
- Clinical Trial
- Meta-Analysis
- Randomized Controlled Trial
- Review
- Systematic Review

PUBLICATION DATE

- 1 year
- 5 years

1 Mohamadian M, Chiti H, Shoghhi A, Biglari S, Parsamanesh N, Esmaeizadeh A. *J Gene Med*. 2021 Feb;23(2):e3303. doi: 10.1002/jgm.3303. Epub 2021 Jan 6. PMID: 33305456 **Free PMC article**. Review.

2 SARS-CoV-2 is an RNA virus that has become a major public health concern after the outbreak of the Middle East Respiratory Syndrome-CoV (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome-CoV (SAR ...

3 Should RT-PCR be considered a gold standard in the diagnosis of COVID-19? Dramé M, Tabue Teguo M, Proye E, Hequet F, Hentzien M, Kanagaratnam L, Godaert L. *J Med Virol*. 2020 Nov;92(11):2312-2313. doi: 10.1002/jmv.25996. Epub 2020 Jul 14. PMID: 32383182 **Free PMC article**.

To face the new **COVID-19** pandemic, the **need** for early and accurate **diagnosis** of the disease among suspected cases quickly became obvious for effective management, and for better control of the spread of the disease in the population. Since the beginnin ...

4 A systematic review and meta-analysis of children with **coronavirus disease 2019 (COVID-19)**.

PubMed.gov covid 19 or coronavirus or sars cov2 or prolong sign or long covid or syndroi Search

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Found 1 result for an alternative search.
Your search for covid 19 or coronavirus or sa... retrieved no results.

Save Email Send to Display options

> BMC Health Serv Res. 2020 Dec 20;20(1):1144. doi: 10.1186/s12913-020-06001-y.

Persistent symptoms after Covid-19: qualitative study of 114 "long Covid" patients and draft quality principles for services

Emma Ladds¹, Alex Rushforth¹, Sietse Wieringa¹, Sharon Taylor^{2,3}, Clare Rayner⁴, Laiba Husain¹, Trisha Greenhalgh⁵

Affiliations + expand
PMID: 33342437 PMID: PMC7750006 DOI: 10.1186/s12913-020-06001-y
Free PMC article

Abstract
Background: Approximately 10% of patients with Covid-19 experience symptoms beyond 3-4 weeks. Patients call this "long Covid". We sought to document such patients' lived experience, including accessing and receiving healthcare and ideas for improving services.

FULL TEXT LINKS
Read free Full text at BMC
PMC **FREE** Full text

ACTIONS
Cite
Favorites

SHARE
Twitter Facebook LinkedIn

PAGE NAVIGATION
< Title & authors



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Hubungan Tingkat Keparahan Gejala Dengan Kejadian *Prolong Sign* Pasien Post Covid-19: *Literature Review*” bernama lengkap Hikmah Sari, Nim: 70300117082, anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan bapak Drs Syarif dan ibunda Hasriah Eluba S.Pd yang lahir pada tanggal 06 Maret 2000 di GU.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyyah Negeri (MIN) 1 Lakudo yang bertempat di Jalan Gersamata Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Selanjutnya pada tahun 2011 sampai 2014 penulis menempuh pendidikan di MTsN 1 Lakudo, kemudian pada tahun 2014 sampai 2017 penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Lakudo, dan pada tahun 2017 itu juga penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan. Selama menyandang sebagai mahasiswa penulis memasuki beberapa organisasi, yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan.

ALAUDDIN
M A K A S S A R