

**ANALISIS FAKTOR RISIKO YANG MEMENGARUHI TINGKAT
KEPARAHAN COVID-19 : TELAHAH LITERATUR**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

NUR AINAH ABNI ABDULLAH

NIM: 70300117007



PROGRAM STUDI KEPERAWATAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Analisis Faktor Risiko yang Memengaruhi Tingkat Keparahan Covid-19: Telaah Literatur*" yang disusun oleh Nur Ainah Abni Abdullah, NIM: 70300117007, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 22 September 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 22 September 2021
15 Safar 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah Jalaludin Sp.A., M.Kes (.....)

Sekretaris : Dr. Muh. Anwar Hafid. S.Kep.,Ns., M.Kes (.....)

Munaqisy I : Nurul Khusnul Khotimah, S.Kep., Ns., M.Kep (.....)

Munaqisy II : Dr. Muhaemin, S.Ag., M.Th.I., M,Ed (.....)

Pembimbing I : Wahdaniah, S.Kep.,Ns.,M.Kes (.....)

Pembimbing II : Ani Auli Ilmi, S.Kep.,Ns.,M.Kep.Sp.Kep.Kom (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
IP: 19800701 200604 2 002


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ainah Abni Abdullah
NIM : 70300117007
Tempat/Tgl. Lahir : Manongkoki, 12 November 1999
Jur/Prodi : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jalan Makkasau, Lingk. Manongkoki II, Kel.
Manongkoki, Kec. Pol-Ut, Kab. Takalar, Prov. Sul-
Sel
Judul : Analisis Faktor Risiko yang Memengaruhi Tingkat
Keparahan Covid-19

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 22 September 2021
Penyusun,



Nur Ainah Abni Abdullah
NIM: 70300117007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas rahmat Allah swt. sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor Risiko yang Memengaruhi Tingkat Keparahan Covid-19: Telaah Literatur”** dapat diselesaikan. Tidak lupa peneliti persembahkan shalawat serta salam kepada Rasulullah saw. dan kepada para sahabat serta pengikutnya. Adapun tujuan dari penyusunan hasil penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan strata satu (S1) Jurusan Keperawatan Di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Peneliti menyadari banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak, semoga Allah swt. memberikan pahala yang setimpal atas bantuan yang diberikan. Ucapan terima kasih peneliti ucapkan kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaludin Sp.A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
3. Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes dan Hasnah, S.Kep.,Ns.,M.Kes, selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Keperawatan yang telah banyak

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, nasihat, serta pelayanan sampai peneliti dapat menyelesaikan kuliah.

4. Wahdaniah, S.Kep.,Ns.,M.Kes dan Ani Auli Ilmi, S.Kep., Ns.M.Kep.,Sp.Kep.Kom selaku pembimbing I dan II peneliti yang banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memotivasi peneliti.
5. Nurul Khusnul Khotimah, S.Kep.,Ns.,M.Kep dan Dr. Muhaemin, S.Ag., M.Th.I., M,Ed selaku penguji I dan II, yang telah memberikan kritikan dan masukkan yang positif demi kesempurnaan tulisan ini.
6. Seluruh Dosen, bagian Tata Usaha Umum dan Akademik bersama staf pegawai Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, arahan, motivasi, dan nasehat selama peneliti menempuh pendidikan di Jurusan Keperawatan. Kepala Perpustakaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan beserta staf pegawai yang telah banyak membantu peneliti dalam mengatasi kekurangan selama penyusunan skripsi.
7. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Abdullah dan Ibunda tercinta Rostigi yang telah memberikan doa, cinta, semangat dan motivasi kepada peneliti selama peneliti menjalani studi.
8. Kepada Fitriani Yusuf, sahabat terbaik yang selama ini tidak pernah meninggalkan dan selalu menemani dalam suka duka, memberi motivasi juga semangat.
9. Kepada teman seperjuangan ilmu keperawatan angkatan 2017, khususnya Fina Ekawati, Sri Windayanti, Arianti, Sri Astuti dan Nofianti Rahman juga teman

sekelompok bimbingan yang telah menemani, dan tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta motivasi kepada peneliti.


10. Kepada seseorang yang selalu peneliti panggil dengan nama iyu'. Semangat, doa, cinta dan dukungan yang selalu diberikan setiap saat.

11. Kepada seluruh keluarga besar dan orang-orang yang pernah atau selalu mendoakan diam-diam, memberi dukungan dan memotivasi melalui kekuatan doa yang dilangitkannya.

Penulis menyadari masih banyak pihak yang ikut andil dalam penyelesaian penelitian ini, namun peneliti tidak dapat ucapkan secara satu persatu. Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlimpah dan berlipat ganda dari Allah swt. semoga tulisan hasil penelitian ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Gowa, 25 Agustus 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDI
M A K A S S A R




Nur Ainah Abni Abdullah

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kajian Pustaka.....	7
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15
A. Tinjauan Umum Covid-19	15
B. Tinjauan Umum Faktor Risiko Keparahan Covid-19	27
C. Kerangka Teori.....	29
D. Kerangka Konsep.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	31
B. Teknik Pengumpulan Data.....	32
C. Analisa Data	34
D. Rekomendasi	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil	36
B. Pembahasan.....	53
C. Keterbatasan Penelitian.....	78
D. Implikasi Penelitian.....	78
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Kajian Pustaka.....	7
3.1 Kata Kunci.....	33
3.2 Strategi PICO	33
4.1 Hasil Pencarian berdasarkan Kata Kunci	36
4.2 Karakteristik Studi.....	39
4.3 <i>Sintesis Grid</i> Jurnal	41



DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
2.1 Kerangka Teori.....	29
2.3 Kerangka Konsep	30
4.1 <i>Diagram Flow</i>	38



ABSTRAK

Nama : Nur Ainah Abni Abdullah

Nim : 70300117007

Judul : Analisis Faktor Risiko yang Memengaruhi Tingkat Keparahan Covid-19: Telaah Literatur

Covid-19 telah menginfeksi jutaan orang dan muncul dengan berbagai gejala klinis yang ditimbulkan bahkan hingga mengakibatkan kematian. Perjalanan penyakit Covid-19 yang parah dan fatal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tujuan studi ini adalah teranalisisnya faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19. Penelitian ini dilakukan menggunakan desain *deskriptif naratif* dengan menggunakan metode *literature review*. Pengumpulan artikel menggunakan *elektronik database* dari jurnal yang telah dipublikasikan melalui Portal Garuda, *Google scholar*, *Pubmed*, dan *Science direct* dengan menggunakan kata kunci kunci “Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus OR Virus Korona AND Risk Factors OR Factor at Risk OR Predictor OR Faktor Risiko AND Severity OR Critical Illnes OR Severitas OR Tingkat Keparahan”. Seluruh artikel diseleksi menggunakan instrumen penilaian *Guideline review* dari *Joanna Briggs Institute*. Dari hasil telaah literatur, 12 jurnal terkait faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19 telah teridentifikasi dan dianalisis yaitu usia; komorbid (hipertensi, diabetes, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit kardiovaskular, penyakit serebrovaskular, penyakit ginjal kronis, dan keganasan); jenis kelamin laki-laki; temuan laboratorium; manifestasi klinis (*anosmia*, *dispnea*, durasi demam, *anoreksia*, kelelahan, peningkatan laju pernapasan, *hipoksia*, *takipnea* dan tekanan darah sistolik yang tinggi); obesitas, perilaku merokok; penghapusan NKG2C. Dari beberapa artikel yang telah direview dapat diketahui bahwa faktor-faktor tersebut berperan dalam memengaruhi tingkat keparahan Covid-19. Hasil Penelitian telaah literatur ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu terkait faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19

Kata Kunci: Virus Korona, Faktor Risiko, Tingkat Keparahan

ABSTRACT

Name : Nur Ainah Abni Abdullah

Nim : 70300117007

Title : *Analysis of Risk Factors Affecting the Severity of Covid-19: Literature Review*

Covid-19 has infected millions of people and appears with various clinical symptoms that can even lead to death. The severe and fatal course of Covid-19 can be influenced by various factors. The purpose of this study is to analyze the risk factors that affect the severity of Covid-19. This research was conducted using a descriptive narrative design using the literature review method. Article collection using electronic databases from journals that have been published through the Garuda Portal, Google scholar, Pubmed, and Science direct using the keywords "Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus OR Virus Korona AND Risk Factors OR Factor at Risk OR Predictor OR Faktor Risiko AND Severity OR Critical Illness OR Severity OR Tingkat Keparahan". All articles were selected using the Guideline review assessment instrument from the Joanna Briggs Institute. From the results of the literature review, 12 articles related to risk factors that affect the severity of Covid-19 have been identified and analyzed, namely age; comorbidities (hypertension, diabetes, chronic obstructive pulmonary disease, cardiovascular disease, cerebrovascular disease, chronic kidney disease, and malignancy); male gender; laboratory findings; clinical manifestations (anosmia, dyspnea, duration of fever, anorexia, fatigue, increased respiratory rate, hypoxia, tachypnea and high systolic blood pressure); obesity, smoking behavior; NKG2C deletion. From several articles that have been reviewed, it can be seen that these factors play a role in influencing the severity of Covid-19. The results of this literature review study can be a reference in the development of science related to risk factors that affect the severity of Covid-19

Keywords: Covid-19, Risk Factors, Severity

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia sedang mengalami salah satu masalah kesehatan global yang disebabkan oleh infeksi *corona virus* jenis baru yakni: *severe acute respiratory syndrome corona virus-2* (SARS-CoV-2) (Setiadi *et al.*, 2020). Virus yang muncul pertama kali pada akhir Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, kemudian oleh *World Health Organization* (WHO) ditetapkan sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 yang diberi nama atau identitas *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) (Etikasari *et al.*, 2020).

Covid-19 mengalami peningkatan tren kasus yang terus terjadi setiap hari akibat tingginya proses transmisi antarmanusia yang menyebabkan virus ini menyebar dengan cepat bahkan sampai ke berbagai negara (Setiadi *et al.*, 2020). Berdasarkan data dari WHO, tercatat kasus Covid-19 secara global hingga tanggal 18 Juni 2021 mencapai 177.108.695 kasus terkonfirmasi positif pada 222 Negara terjangkit dengan 3.840.223 kasus meninggal dunia (*World Health Organization*, 2020).

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak pandemi Covid-19 melaporkan pasien positif Covid-19 pertamakali pada 2 Maret 2020. Setelah kasus positif pertama, penyebaran kasus mengalami peningkatan yang sangat cepat di Indonesia (Etikasari *et al.*, 2020). Data WHO juga menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama kasus virus *corona* di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) (*World Health Organization*, 2020). Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia melaporkan bahwa hingga 18 Juni 2021 terdapat 1.963.266 kasus terkonfirmasi positif covid-19, 54.043 kasus meninggal dunia positif covid-19, dan 1.779.127 kasus berhasil sembuh dari covid-19 di Indonesia (Kemenkes RI, 2021).

Covid-19 telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia termasuk provinsi Sulawesi Selatan. Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Sulawesi Selatan hingga tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 62.815 kasus, 961 kasus meninggal dunia positif covid-19 dan 61.337 kasus berhasil sembuh dari Covid-19 (Kemenkes RI, 2021).

Covid-19 yang telah melanda dunia dan ditetapkan sebagai pandemi menjadi sebuah bukti bahwa penyebaran Covid-19 memang berlangsung sangat cepat. Transmisi atau penularan virus ini bisa terjadi melalui droplet yang berasal dari saluran pernapasan. Selain itu, transmisi juga dapat terjadi sebagai akibat dari kontak erat dengan penderita. Transmisi udara (*airbone*) juga dapat terjadi pada beberapa kondisi tertentu (Hairunisa and Amalia, 2020). Pemerintah melakukan beberapa langkah cepat dan tanggap untuk meminimalkan penularan virus korona yang sangat cepat. Langkah diantaranya ialah pemerintah menerapkan bekerja dari rumah, jaga jarak, memakai masker, karantina atau isolasi bagi ODP dan orang yang terinfeksi covid-19 dan lain-lain (Handayani *et al.*, 2020).

Wabah penyakit covid-19 yang terjadi saat ini, jika dirujuk pada sejarah Nabi merupakan wabah yang sudah pernah terjadi dan dengan kondisi yang hampir sama. Dikutip dalam buku berjudul 'Rahasia Sehat Ala Rasulullah saw. : Belajar Hidup Melalui *Hadist-hadist* Nabi oleh Nabil Thawil, di zaman

Rasulullah saw. apabila ada sebuah daerah yang terjangkit penyakit *Tha'un*, Rasulullah memerintahkan untuk melakukan isolasi atau mengkarantina para penderitanya di sebuah tempat isolasi yang disediakan khusus, jauh dari pemukiman penduduk. *Tha'un* sebagaimana disabdakan Rasulullah saw. adalah wabah penyakit menular yang mematikan dan berasal dari bakteri *Pasterella Pestis* yang menyerang tubuh manusia. Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadits disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. "Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim (yang meninggal karenanya) (HR Bukhari). Kala itu, Nabi Muhammad saw. juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Rasulullah saw. bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ
 نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا
 مِنْهُ

Artinya:

”At-Tha’un (penyakit menular) adalah na’jis yang dikirimkan kepada suatu golongan dari golongan orang israil dan kepada orang-orang sebelummu. Maka apabila kamu mendengar penyakit menular tersebut terjangkit disuatu tempat, janganlah kamu memasuki daerah tersebut dan apabila di suatu tempat berjangkit penyakit menular tersebut sedang kamu berada di dalamnya janganlah kamu keluar atau lari dari padanya.” (HR Bukhari Muslim).

Rasulullah kemudian membangun tembok di sekitar daerah wabah untuk memastikan perintah tersebut benar-benar dilaksanakan. Kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Selama isolasi, diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi. Sebagai seorang mu'min, maka sebaiknya selain melakukan ikhtiar karantina atau "*social distancing*" ini, maka diperlukan juga peningkatan spiritualitas sebagai bentuk pencegahan dari infeksi virus korona (Supriatna, 2020).

Covid-19 telah menginfeksi jutaan orang dan muncul dengan berbagai gejala klinis yang ditimbulkan bahkan hingga mengakibatkan kematian. Di Indonesia, gambaran gejala klinis Covid-19 bervariasi (Amalia, 2020). Covid-19 dibagi kedalam 5 kelompok berdasarkan pada beratnya kasus, yaitu: 1) tanpa gejala; 2) ringan atau tidak berkomplikasi; 3) sedang atau moderat; 4) berat atau pneumonia berat; dan 5) kritis (Hairunisa and Amalia, 2020). Kasus parah dan kritis mewakili 14% dan 5% dari pasien Covid-19 yang dikonfirmasi laboratorium masing-masing. Hal ini menjadi beban tinggi bagi sistem perawatan kesehatan karena menghabiskan sebagian besar sumber daya medis dan berkontribusi pada sebagian besar kematian. Penelitian yang dilakukan oleh Chadeau-Hyam *et al*, (2020) mengadopsi pendekatan yang hati-hati dan menyeluruh dalam populasi

kohort yang besar dan memungkinkan untuk melakukan triangulasi bukti yang menghubungkan jenis kelamin laki-laki, pendidikan yang lebih rendah dan etnis non-kulit putih dengan risiko Covid-19 (Chadeau-Hyam *et al.*, 2020). Tingkat keparahan Covid-19 dapat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh, usia dan beberapa penyakit komorbid diantaranya adalah diabetes militus, hipertensi, penyakit paru, penyakit jantung dan penyakit ginjal (Kemenkes, 2020). Sejalan dengan kajian sistematik yang dilakukan oleh Roeroe dkk (2021) yang menyatakan bahwa usia tua, diabetes dan penyakit penyerta lainnya dilaporkan sebagai prediktor bermakna dari morbiditas dan mortalitas pasien covid-19 (Roeroe, Sedli and Umboh, 2021). Selain itu menurut Fang L (2020), Penyakit komorbid hipertensi dan diabetes militus, jenis kelamin laki-laki dan perokok aktif merupakan faktor risiko dari penyakit Covid-19 (Fang L., 2020). Begitu juga dengan studi kajian literatur dengan meta analisis yang dilakukan oleh Mudatsir dkk (2021) menghasilkan tiga poin besar faktor risiko atau prediktor yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19 yaitu 8 komorbiditas, 19 manifestasi klinik dan 35 parameter laboratorium (Mudatsir *et al.*, 2021a). Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra *et.al* (2020) berdasarkan gejala klinis, keluhan sesak berhubungan dengan derajat keparahan penyakit. Pada pasien dengan kelompok gejala Covid-19 yang berat ditemukan kondisi hipoksemia secara signifikan dibandingkan dengan kelompok gejala Covid-19 ringan-sedang sehingga ada hubungan yang signifikan antara derajat oksigen dengan tingkat keparahan pasien Covid-19 (Putra, Listyoko and Christanto, 2020).

Pemahaman yang baik tentang faktor risiko yang mungkin dalam kombinasi dengan imunopatologi penyakit terkait dengan tingkat keparahan Covid-19 sangat membantu bagi para tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi dan membutuhkan perawatan yang diprioritaskan untuk mencegah perkembangan penyakit dan hasil yang merugikan (Gao *et al.*, 2021a). Melihat bahwa yang dijadikan subjek penelitian berdasarkan paparan di atas adalah pasien Covid-19 ditambah kondisi pandemi yang masih berkepanjangan sehingga telah dilakukan penelitian dengan pendekatan telaah literatur mengenai disiplin ilmu Keperawatan Medikal Bedah dengan judul “Analisis Faktor Risiko yang Memengaruhi Tingkat Keparahan Covid-19”

B. Rumusan Masalah

Covid-19 telah menginfeksi jutaan orang dan muncul dengan berbagai gejala klinis yang ditimbulkan bahkan hingga mengakibatkan kematian. Pemahaman yang baik tentang faktor risiko yang mungkin dalam kombinasi dengan imunopatologi penyakit terkait dengan tingkat keparahan covid-19 sangat membantu bagi para tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi dan membutuhkan perawatan yang diprioritaskan untuk mencegah perkembangan penyakit dan hasil yang. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah Faktor Risiko yang Memengaruhi Tingkat Keparahan Covid 19?”

C. Kajian Pustaka

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Riset
1	Ngakan Putu Parsama Putra, Aditya Sri Listyoko, Anthony Christanto	PaO ₂ , SaO ₂ , dan Rasio PaO ₂ /FiO ₂ Sebagai Prediktor Derajat Keparahan Pasien Covid-19 Rawat Inap	Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil analisis gas darah pasien-pasien Covid-19 yang dirawat inap dan membandingkan hasil analisis gas darah pada pasien yang mendapatkan ventilasi <i>invasif</i> dan <i>non-invasif</i> , serta menilai hubungan antara hasil analisis gas darah dengan derajat keparahan	Desain penelitian yang digunakan adalah <i>analitik observasional</i> dengan pendekatan potong lintang (<i>cross-sectional</i>), <i>single-center</i> , pada 71 pasien terkonfirmasi Covid-19 dilakukan antara bulan April-Juli 2020 pada pasien yang dirawat di Ruang Covid-19 RS Dr. Saiful Anwar Malang,	Subjek terdiri dari 71 pasien terkonfirmasi Covid-19 terbagi menjadi 2 kelompok, 25 pasien (35,21%) kelompok ringan sedang dan 46 pasien (64,79%) kelompok berat. Demografis dan karakteristik klinis menunjukkan bahwa usia, riwayat merokok, keluhan sesak dan penggunaan oksigen berhubungan dengan derajat keparahan penyakit	Pada penelitian yang dilakukan Putra <i>Et al.</i> Penelitiannya bertujuan untuk mengevaluasi hasil analisis gas darah sebagai prediktor keparahan pasien Covid-19. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti bertujuan melakukan penelitian untuk mengidentifikasi fakto-faktor risiko apa saja yang mempengaruhi tingkat keparahan Covid-19.

			penyakit pada Covid-19	Indonesia. Analisis statistik digunakan untuk menilai hasil analisis gas darah dengan derajat keparahan penyakit.	(masing masing dengan $p < 0,05$). Analisis gas darah menunjukkan hubungan antara derajat keparahan penyakit dan derajat oksigenasi yang dinilai dari PaO ₂ , SaO ₂ BGA, PaO ₂ /FiO ₂ dan original PaO ₂ (masing masing dengan $p < 0,05$).	
2	Chadeau-Hyam, <i>et. al</i>	<i>Risk factors for positive and negative COVID-19 tests: a cautious and in-depth analysis of UK biobank data</i>	Untuk mengidentifikasi faktor risiko yang dapat digunakan sebagai parameter ukur dalam penentuan tes positif Covid-19	Menggunakan data uji infeksi SARS-CoV2 dari kesehatan masyarakat Inggris, terkait dengan studi biobank UK penelitian ini mengeksplorasi kontribusi dari demografi, sosial, risiko kesehatan, medis, dan faktor lingkungan	Dalam model yang sepenuhnya disesuaikan, variabel independen terkait dengan risiko sedang diuji untuk Covid-19 dengan <i>odds ratio</i> >1,05 adalah: jenis kelamin laki-laki; etnis kulit hitam; sosial kerugian (yang diukur dengan pendidikan, perumahan dan	Pada penelitian yang dilakukan Hyam <i>Et al</i> . Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis faktor risiko yang nantinya akan digunakan sebagai parameter ukur dalam tes Covid-19. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien Covid-19.

				<p>terhadap risiko Covid-19, uji refresi logistik multivariabel untuk risiko menjadi hasil pengujian positif, pengujian positif atau negatif dalam populasi penelitian dan mengadopsi desain uji negatif, risiko pengujian positif dalam populasi yang diuji,</p>	<p>pendapatan); pekerjaan (kesehatan pekerja, pensiunan, pengangguran); pernah merokok; sangat gemuk; komorbiditas; dan lebih besar paparan partikulat (PM) 2.5 absorbansi. Dari jumlah tersebut, hanya jenis kelamin laki-laki, bukan kulit putih etnis dan pencapaian pendidikan yang lebih rendah, dan tidak ada komorbiditas atau risiko kesehatan faktor, dikaitkan dengan pengujian positif di antara individu yang diuji.</p>	
3	Wolff, et.al	<i>Risk factors for Covid-19 severity and fatality: a structured literature review</i>	<p>Covid-19 adalah ancaman global yang mendorong perawatan kesehatan hingga batasnya. Karena tidak ada vaksin atau obat untuk Covid-19, orang dengan</p>	<p>Peninjauan dilakukan di PubMed dan kumpulan data pracetak yang tersedia untuk umum. Untuk analisis, faktor risiko dikategorikan dan informasi mengenai</p>	<p>28 catatan termasuk, sebelas di antaranya adalah pracetak, menunjukkan bahwa kondisi dan komorbiditas terkait dengan kondisi kesehatan yang buruk seperti usia lanjut, obesitas,</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Woff et., al meneliti faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan dan kematian pasien covid-19 sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19 Selain itu,</p>

			<p>peningkatan risiko penyakit parah dan fatal sangat membutuhkan perlindungan. Selain itu, faktor-faktor yang meningkatkan risiko ini menarik dalam pencarian pengobatan potensial. Tinjauan literatur sistematis tentang faktor risiko Covid-19 yang parah dan fatal disajikan.</p>	<p>studi seperti ukuran studi dan lokasi diekstraksi. Hasilnya dibandingkan dengan faktor risiko yang terdaftar oleh empat otoritas publik dari negara yang berbeda.</p>	<p>diabetes dan hipertensi merupakan faktor risiko untuk perjalanan penyakit yang parah dan fatal. Selanjutnya, perjalanan yang parah dan fatal dikaitkan dengan kerusakan organ terutama yang mempengaruhi jantung, hati dan ginjal. Disfungsi koagulasi dapat memainkan peran penting dalam kerusakan organ. Waktu masuk rumah sakit, tuberkulosis, gangguan inflamasi dan disfungsi koagulasi diidentifikasi sebagai faktor risiko yang ditemukan dalam tinjauan tetapi tidak disebutkan oleh otoritas publik.</p>	<p>sumber pencarian literatur pada penelitian ini hanya pada Pubmed saja sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan 4 sumber pencarian.</p>
4	Grasselli, et.al	<i>Risk Factors Associated With Mortality Among Patients with COVID-19 in intensive</i>	<p>Untuk mengevaluasi faktor risiko independen yang terkait dengan kematian pasien</p>	<p>Studi kohort observasional retrospektif ini mencakup 3988 pasien sakit kritis berturut-turut dengan Covid-19</p>	<p>Dari 3988 pasien yang termasuk dalam studi kohort ini, usia median adalah 63 tahun; 3188 adalah laki-laki, dan 1998</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan. Grasselli. <i>Et al.</i> Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui faktor risiko independen yang terkait dengan kematian pasien dengan Covid-19</p>

		<p><i>care unit in Lombardy, Italy</i></p>	<p>dengan Covid-19 yang memerlukan perawatan di ICU di wilayah Lombardy, Italia</p>	<p>yang dikonfirmasi laboratorium yang dirujuk untuk masuk ICU ke pusat koordinasi (Fondazione IRCCS [Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico] Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milan, Italia) dari Covid-19 Lombardy ICU Jaringan dari 20 Februari hingga 22 April 2020. Infeksi dengan sindrom pernapasan akut yang parah <i>coronavirus 2</i> dikonfirmasi oleh uji reaksi berantai transkriptase-polimerase realtime dari usapan nasofaring. Tindakan lanjut selesai pada 30 Mei 2020.</p>	<p>dari 3300 memiliki setidaknya 1 komorbiditas. Saat masuk ICU, 2929 pasien membutuhkan ventilasi mekanis invasif (IMV). Tindakan bertema adalah 44 hari; waktu rata-rata dari onset gejala hingga masuk ICU adalah 10 hari; rata-rata lama perawatan di ICU adalah 12 hari; dan panjang median IMV adalah 10 hari. Waktu pengamatanku mulatif adalah 164.305 pasien-hari. Tingkat kematian di rumah sakit dan ICU masing-masing adalah 12 per 1000 pasien-hari. Dalam subkelompok dari 1715 pasien pertama, pada 30 Mei 2020, 865 telah keluar dari ICU, 836 meninggal di ICU, dan 14 masih di ICU; secara keseluruhan, 915 pasien meninggal di</p>	<p>sedangkan tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui faktor risiko yang mempengaruhi tingkat keparahan Covid-19</p>
--	--	--	---	---	---	--

					rumah sakit. Faktor risiko independen yang terkait dengan kematian termasuk usia yang lebih tua (rasio bahaya jenis kelamin laki-laki, fraksi oksigen inspirasi yang tinggi (FiHAI2) (SDM,tekanan akhir ekspirasi positif tinggi atau Pa . rendah HAI2:fiHAI2 rasio (SDM) saat masuk ICU, dan riwayat penyakit paru obstruktif kronik	
5	Xiaoyu Fang, <i>et. al</i>	<i>Epidemiological, comorbidity factors with severity and prognosis of COVID-19: a systematic review and meta-analysis</i>	Tujuan Tinjauan sistematis dan meta-analisis dilakukan dalam upaya untuk mengumpulkan dan mengevaluasi secara sistematis hubungan epidemiologis, faktor komorbiditas dengan tingkat keparahan dan prognosis penyakit corona virus 2019 (COVID-	Metode Tinjauan dan Meta-Analisis Sistematis (PRISMA)	Enam puluh sembilan publikasi memenuhi kriteria penelitian kami, dan 61 penelitian dengan lebih dari 10.000 kasus Covid-19 memenuhi syarat untuk sintesis kuantitatif. Kami menemukan bahwa laki-laki memiliki tingkat keparahan penyakit yang lebih tinggi secara signifikan (RR: 1,20, 95% CI: 1,13-	Penelitian yang dilakukan oleh Fang <i>et., al</i> . Bertujuan untuk hubungan epidemiologis, faktor komorbiditas dengan tingkat keparahan dan prognosis penyakit corona virus 2019 Sedangkan pada penelitian ini, peneliti bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan Covid-19

			19).		<p>1,27, P <0,001) dan titik akhir yang lebih prognostik. Usia yang lebih tua ditemukan secara signifikan terkait dengan tingkat keparahan penyakit dan enam titik akhir prognostik. Penyakit ginjal kronis menyumbang sebagian besar kematian (RR: 3.14-16.02), penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) untuk tingkat keparahan, masuk ke unit perawatan intensif, titik akhir komposit, ventilasi invasif, dan perkembangan penyakit, penyakit serebrovaskular untuk sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS), penyakit jantung koroner untuk kelainan jantung</p>	
--	--	--	------	--	---	--

D. Tujuan Penelitian

Tujuan studi ini adalah teranalisisnya faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pendidikan Keperawatan

Hasil dari studi literatur ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan pengembangan pengetahuan di institusi pendidikan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan keperawatan yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19.

2. Bagi Pelayanan Keperawatan

Hasil dari studi literatur ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan, masukan/informasi untuk perawat, konselor, pemerintah dan bagian pelayanan masyarakat khususnya dalam menyusun pemberian intervensi agar dapat mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi dan membutuhkan perawatan yang diprioritaskan untuk mencegah perkembangan penyakit. Selain itu, dapat pula digunakan sebagai informasi tambahan berupa pendidikan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan (khususnya Perawat) kepada pasien yang telah dinyatakan positif Covid-19 dan juga masyarakat umum mengenai faktor risiko yang memengaruhi keparahan Covid 19.

3. Bagi Penelitian

Hasil dari studi literatur ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti yang merupakan pemula dalam melakukan penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat memperkaya jumlah penelitian tentang faktor risiko yang mempengaruhi tingkat keparahan Covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Covid-19

1. Definisi Virus Corona

Virus corona awalnya diberi simbol dengan 2019-nCoV oleh WHO, dimana huruf n diartikan dengan *Novel* atau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan baru dan CoV berarti *corona virus*. Virus corona masuk kedalam *Ordo Nidovirales*, keluarga *Coronavirinae* dan *Genus Betacoronavirus (Beta-CoV)*. Virus *corona* merupakan keluarga *coronaviridae* dengan untaian tunggal, yang diselubungi dengan genom RNA *sense positif* dengan panjang sekitar 25,5-32 kb dan merupakan genom terbesar untuk virus RNA. Berdasarkan penampakan virion pada membran virus yang berbentuk taji-taji menyerupai mahkota atau dalam bahasa latinnya adalah *Corona* sehingga virus ini diberi istilah *Corona virus*. Diameter virus berbentuk menyerupai bola ini adalah 70-120 nm. Empat genera virus *corona* yaitu *Alphacoronavirus (α CoV)*, *Betacoronavirus (β CoV)*, *Deltacoronavirus (δ CoV)* dan *Gammacoronavirus (γ CoV)*. Analisis evolusi menyatakan sumber genetik sebagian besar α CoV dan β CoV merupakan kelelawar dan hewan pengerat sedangkan sebagian besar δ CoV dan γ CoV, unggas merupakan sumber gennya. Covid-19 adalah *Betacoronavirus* yang hampir sama dengan *corona virus* penyebab SARS. Virus *corona* memiliki genom terbesar dan banyak mutasi delesi dan sering terjadi rekombinasi sehingga muncul galur baru Virus. Virus ini adalah bagian dari keluarga besar virus yang dapat menyebabkan

infeksi pada saluran pernapasan bagian atas dengan tingkat ringan dan sedang (Fathiyah Isbaniah and Agus Dwi Susanto, 2020).

Virus *corona* memiliki bentuk yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan bantuan alat khusus. Namun sebagaimana diriwayatkan Abdur Razak dari Muammar dari Qotadah menceritakan, bahwa orang-orang musyrik memandang remeh dan menyepelkan penyebutan hewan-hewan kecil (binatang) yang dijadikan surat dalam al-Qur'an oleh Allah swt. seperti penyebutan lalat dalam QS al-Hajj/22:73. Orang-orang musyrik tersebut menganggap binatang tersebut sama sekali tidak penting dan hina. Bahkan mereka menjadikan hal tersebut sebagai olok-olokan terhadap al-Qur'an. Lalu Allah swt. menurunkan QS al-Baqarah/2:26 sebagai pemberitahuan kepada kaum musyrikin bahwa Allah swt. pun tidak segan menciptakan binatang seumpama nyamuk (*ba'ūdḥah*) bahkan Allah tidak segan menciptakan binatang yang lebih kecil dari nyamuk yaitu (*fauqa ba'ūdḥah*) (Wathoni and Nursyamsu, 2020). Sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۗ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang

diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik (QS al-Baqarah/2:26)

Quraish Shihab memberikan penjelasan tentang makna yang terkandung dari ayat di atas ialah Allah menjelaskan bahwa Allah tidak keberatan menyebut menyebut *ba'ūdḥah* (nyamuk) dalam kitab suci meskipun dianggap kecil, remeh, tidak berguna dan membawa virus penyakit. Konteksnya dengan Covid-19, maka binatang ini adalah bagian dari perumpamaan makhluk terkecil yang Allah maksudkan pada kata *fauqa ba'ūdḥah* dalam QS al-Baqarah/2:26. Diameter virus berbentuk menyerupai bola ini adalah 70-120 nm. Kecil sekali dan tak mungkin terlihat oleh mata telanjang. Meskipun sangat kecil, virus ini mampu bertahan lebih dari 10 menit dipermukaan, termasuk tangan. Bahkan WHO menyebut Covid-19 dapat bertahan selama beberapa jam, bahkan beberapa hari. Covid-19 bahkan dapat bertahan hidup disuhu 26-27 °C. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk selalu bertasbih, memuji dan membesarkan Allah swt. karena fakta-fakta dalam kehidupan ini jika dipelajari dengan sungguh-sungguh sangatlah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa (Wathoni and Nursyamsu, 2020).

Virus *Corona* mengandung empat jenis protein (Master PS, 2019) yakni:

- a. *Spike Protein* (Protein S) : adalah protein yang mengikat virus ke reseptor sel dan virus masuk ke dalam sel
- b. *Membrane Protein* (M) : menyebabkan pertumbuhan virus
- c. *Envelope Protein* (E) : menyebabkan virus berkembang atau tumbuh
- d. *Nukleoid Kapsid Protein* (N) : protein ini bersama dengan RNA Genom membentuk kapsid nukleat

2. Etiologi

Kasus awal yang dilaporkan di Wuhan, Cina, dianggap sebagai infeksi yang didapat dari sumber *zoonosis* dari pasar grosir makanan laut Huanan yang menjual unggas, ular, kelelawar, dan hewan ternak lainnya. Untuk mengisolasi kemungkinan *reservoir* virus, analisis urutan genetik yang komprehensif dilakukan di antara spesies hewan yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa 2019-nCov adalah virus rekombinan antara CoV kelelawar dan CoV asal yang tidak diketahui. Sebuah penelitian mengungkapkan, berdasarkan penggunaan kodon sinonim relatif (RSCU) pada berbagai spesies hewan menunjukkan bahwa kelelawar adalah *reservoir* satwa liar yang paling mungkin 2019-nCov. Rekombinasi homolog ini telah dibuktikan sebelumnya pada virus hepatitis B, virus hepatitis C, HIV dan virus *dengue* (Umakanthan *et al.*, 2020). Virus *corona* merupakan virus *zoonotik*, RNA virus bersirkulasi pada hewan, seperti unta, kucing dan kelelawar. Seperti pada kasus MERS dan SARS, hewan dengan virus *corona* dapat berkembang dan menginfeksi manusia (Morfi, 2020).

3. Manifestasi Klinis

Gambaran klinis bervariasi dari penyakit ringan hingga penyakit parah atau fatal. Gejala Covid-19 yang paling umum yang tidak spesifik termasuk demam, batuk, dan *mialgia*. Gejala ringan lainnya adalah sakit tenggorokan, sakit kepala, menggigil, mual atau muntah, *diare*, *ageusia* dan *kongesti konjungtiva* (Umakanthan *et al.*, 2020). Manifestasi klinis Covid-19 sangat beragam, mulai dari asimtomatik hingga gagal napas yang membutuhkan ventilasi mekanik dan perawatan ruang intensif (ICU) dan sepsis dengan kegagalan multi organ atau

syok sepsis (Rismala Dewi, 2020). Secara umum, rata-rata gejala infeksi Covid-19 muncul setelah periode inkubasi selama 5 hari. Lama waktu dari onset gejala hingga kematian berkisar antara 6 hingga 41 hari dengan median 14 hari. Periode bergantung pada usia dan status imunitas pasien. Rerata usia pasien adalah 47 tahun dengan rentang umur 35 sampai 58 tahun serta 0,9% adalah pasien yang lebih muda dari umur 15 tahun. Gejala umum di awal penyakit adalah demam, kelelahan atau *myalgia*, batuk kering. Beberapa organ yang terlibat seperti pernapasan (batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, *hemoptisis* atau batuk darah, nyeri dada), *gastrointestinal* (diare, mual, muntah), *neurologis* (kebingungan dan sakit kepala). Namun tanda dan gejala yang sering dijumpai adalah demam (83-98%), batuk (76-82%), dan sesak napas atau *dyspnea* (31-55%) (Levani, Prastyana and Mawaddatunnadila, 2021).

Berdasarkan pada beratnya kasus, gejala Covid-19 dibagi kedalam 5 kelompok yaitu (Levani, Prastyana and Mawaddatunnadila, 2021):

- a. **Asimtomatik:** Kondisi ini merupakan kondisi paling ringan. Tanpa gejala klinis apapun, disertai hasil pemeriksaan fisik dan radiologis yang normal, namun hasil pemeriksaan *nucleic acid test* (NAT) positif.
- b. **Ringan:** Gejala tanpa ada bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia. Gejala yang muncul seperti demam, batuk, *fatigue*, *anoreksia*, napas pendek, *mialgia*. Gejala tidak spesifik lainnya seperti sakit tenggorokan, kongesti hidung, sakit kepala, *diare*, mual dan muntah, hilang pembau (*anosmia*) atau hilang perasa (*ageusia*) yang muncul sebelum onset gejala pernapasan juga sering dilaporkan. Pasien usia tua dan *immunocompromised* gejala atipikal

seperti *fatigue*, penurunan kesadaran, mobilitas menurun, *diare*, hilang nafsu makan, *delirium*, dan tidak ada demam.

- c. **Sedang /Moderat** : Pada pasien remaja atau dewasa: pasien dengan tanda klinis *pneumonia* (demam, batuk, sesak, napas cepat) tetapi tidak ada tanda *pneumonia* berat termasuk $SpO_2 > 93\%$ dengan udara ruangan ATAU Anak-anak : pasien dengan tanda klinis *pneumonia* tidak berat (batuk atau sulit bernapas + napas cepat dan/atau tarikan dinding dada) dan tidak ada tanda *pneumonia* berat). Kriteria napas cepat : usia <2 bulan, ≥ 60 x/menit; usia 2–11 bulan, ≥ 50 x/menit ; usia 1-5 tahun, 40x/menit; usia >5 tahun, ≥ 30 x/menit.. Pada pemeriksaan paru dapat ditemukan bunyi slem. Pada beberapa kasus mungkin tidak ditemukan tanda dan gejala namun pada *CT scan* menunjukkan adanya lesi paru subklinis.
- d. **Berat** : Pada pasien remaja atau dewasa : pasien dengan tanda klinis *pneumonia* (demam, batuk, sesak, napas cepat) ditambah satu dari: frekuensi napas >30 x/menit, distres pernapasan berat, atau $SpO_2 < 93\%$ pada udara ruangan. ATAU Pada pasien anak : pasien dengan tanda klinis *pneumonia* (batuk atau kesulitan bernapas), ditambah setidaknya satu dari berikut ini:
- 1) *Sianosis sentral* atau $SpO_2 < 93\%$;
 - 2) Distres pernapasan berat (seperti napas cepat, *grunting*, tarikan dinding dada yang sangat berat);
 - 3) Tanda bahaya umum: ketidakmampuan menyusui atau minum, *letargi* atau penurunan kesadaran, atau kejang.

4) Napas cepat/ tarikan dinding dada/*takipnea*: usia <2 bulan, ≥ 60 x/menit; usia 2–11 bulan, ≥ 50 x/menit; usia 1–5 tahun, ≥ 40 x/menit; usia >5 tahun, ≥ 30 x/menit.

e. **Kritis**: gagal napas, syok sepsis, dan atau disfungsi atau gagal organ multipel.

1) *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS)

Kriteria ARDS pada dewasa:

- a) ARDS ringan: $200 \text{ mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300 \text{ mmHg}$ (dengan PEEP atau *continuous positive airways pressure* (CPAP) $\geq 5 \text{ cmH}_2\text{O}$ atau yang tidak diventilasi
 - b) ARDS sedang: $100 \text{ mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200 \text{ mmHg}$ dengan PEEP $\geq 5 \text{ cmH}_2\text{O}$ atau yang tidak diventilasi
 - c) ARDS berat $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 100 \text{ mmHg}$ dengan PEEP $\geq 5 \text{ cmH}_2\text{O}$ atau yang tidak diventilasi. Ketika PaO_2 tidak tersedia $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 315$ mengindikasikan ARDS (termasuk pasien yang tidak diventilasi)
- 2) Sepsis adalah pasien dengan disfungsi organ yang mengancam jiwa disebabkan oleh disregulasi respon tubuh terhadap dugaan atau terbukti infeksi. Tanda disfungsi organ yaitu perubahan status mental/kesadaran, sesak napas, saturasi oksigen rendah, *urin output* menurun, denyut jantung cepat, nadi lemah, ekstremitas dingin atau tekanan darah, petekie/*purpura/motled skin* atau hasil laboratorium memnunjukkan koagulopati, tromosiopenia, asidosis, laktat yang tinggi, hiperbilirubinemia

3) Syok sepsis adalah hipotensi yang menetap meskipun sudah dilakukan resusitasi cairan dan membutuhkan *vasopress*.

4. Transmisi

Penyebaran virus terjadi dengan sangat cepat. Penularan dari manusia ke manusia terjadi melalui rute umum seperti transmisi langsung, transmisi kontak dan transmisi udara melalui aerosol dan selama prosedur medis. Batuk, bersin, inhalasi tetesan, kontak dengan selaput lendir mulut, hidung dan mata adalah cara penyebaran yang umum. Penumpahan virus terjadi dari saluran pernapasan, air liur, feses dan urin yang mengakibatkan sumber penyebaran virus lainnya. *Viral load* lebih tinggi dan durasi lebih lama pada pasien dengan Covid-19 yang parah. Penyebaran Covid-19 dari pasien ke petugas kesehatan dan pramugari yang melakukan kontak dekat dengan pasien yang terinfeksi juga dilaporkan (Umakanthan *et al.*, 2020).

Sumber infeksi adalah penderita dengan pneumonia Covid-19. Transmisi atau penularan yang utama terjadi melalui droplet dari saluran nafas. Selain itu, transmisi terjadi akibat kontak erat dengan penderita. Pada beberapa kondisi dapat melalui transmisi udara (*airborne*). Pada penderita Covid-19 tidak ditemukan RNA di sampel urin maupun serum. Masa inkubasi dapat terjadi pada hari ke 0-5, dilaporkan rata-rata sekitar 3-9 hari dengan kisaran antara 0-24 hari. Periode seseorang dapat menularkan (periode infeksi) terjadi lebih dulu sebelum muncul gejala, yaitu sekitar 2-5 hari lebih awal dari gejala. Diperkirakan 44% penularan terjadi pada periode tersebut. Melakukan kontak erat dengan seseorang yang berada dalam periode infeksi akan berisiko tertular. Namun, belum dapat

diperkirakan faktor apa saja yang memastikan seseorang akan terinfeksi (Hairunisa and Amalia, 2020).

5. Patofisiologi

Covid-19 termasuk dalam genus *betacoronavirus*, hasil analisis menunjukkan adanya kemiripan dengan SARS. Pada kasus Covid-19, trenggiling diduga sebagai perantaranya karena genomnya mirip dengan *coronavirus* pada kelelawar (90,5%) dan SARS-CoV2 (91%). *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) atau yang sebelumnya disebut SARS-CoV2 pada manusia menyerang saluran pernapasan khususnya pada sel yang melapisi alveoli. Covid-19 mempunyai glikoprotein pada *enveloped spike* atau protein S. Untuk dapat menginfeksi “manusia” protein S virus akan berikatan dengan reseptor ACE₂ pada plasma *membrane* sel tubuh manusia. Di dalam sel, virus ini akan menduplikasi materi genetik dan protein yang dibutuhkan dan akan membentuk virion baru di permukaan sel. Sama halnya SARS-CoV setelah masuk ke dalam sel selanjutnya virus ini akan mengeluarkan genom RNA ke dalam sitoplasma dan golgi sel kemudian akan ditranslasikan membentuk dua lipoprotein dan protein struktural untuk dapat bereplikasi. Faktor virus dengan respon imun menentukan keparahan dari infeksi Covid-19 ini. Efek sitopatik virus dan kemampuannya dalam mengalahkan respon imun merupakan faktor keparahan infeksi virus. Sistem imun yang tidak adekuat dalam merespon infeksi juga menentukan tingkat keparahan, di sisi lain respon imun yang berlebihan juga ikut andil dalam kerusakan jaringan. Saat virus masuk ke dalam sel selanjutnya antigen virus akan dipresentasikan ke *Antigen Presentation Cell (APC)*. Presentasi sel ke APC akan merespon sistem

imun humoral dan seluler yang dimediasi oleh sel T dan sel B. IgM dan IgG terbentuk dari sistem imun *humoral*. Pada SARS-CoV IgM akan hilang pada hari ke 12 dan IgG akan bertahan lebih lama. Virus dapat menghindari dari sistem imun dengan cara menginduksi vesikel membran ganda yang tidak mempunyai *pattern recognition receptors* (PRRs) dan dapat bereplikasi di dalam vesikel tersebut sehingga tidak dapat dikenali oleh sel imun (Levani, Prastya and Mawaddatunnadila, 2021).

Analisis struktural yang luas mengungkapkan interaksi tingkat atom antara CoV dan inangnya. Penularan Covid-19 lintas spesies dari manusia ke manusia terutama bergantung pada domain pengikat reseptor protein lonjakan dan reseptor inangnya ACE2. Ekspresi tinggi ACE2 diidentifikasi di paru-paru (sel *alveolar* tipe II), kerongkongan, ileum, usus besar, ginjal (tubulus berbelit-belit proksimal), miokardium, kandung kemih (*sel urothelial*) dan juga baru-baru ini mukosa mulut. Reseptor ACE2 menyediakan masuknya virus ke dalam sel inang dan juga replikasi virus berikutnya. Faktor utama yang terlibat dalam patogenesis virus 2019-nCov adalah protein subunit *spike 1*, *priming* oleh *transmembran protease serine-2* (penting untuk masuk dan replikasi virus), reseptor ACE2-Interaksi 2019-nCov dan *downregulasi protein* ACE2. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap atrofi, fibrosis, peradangan dan *vasokonstriksi* yang mengakibatkan cedera jaringan inang (Umakanthan *et al.*, 2020).

Pasien konfirmasi positif Covid-19 dengan gejala klinis ringan menunjukkan respon imun didapatkan peningkatan sel T terutama CD8 pada hari ke 7-9, selain itu ditemukan T *helper* folikular dan *Antibody Secreting Cells*

(ASCs). Pada hari ke 7 hingga hari ke 20, ditemukan peningkatan IgM/IgG secara progresif. Jika dibandingkan dengan kontrol sehat, jumlah *monosit* CD14+ dan CD16+ mengalami penurunan. Namun pada orang konfirmasi positif Covid-19 dengan tanda dan gejala yang ringan tidak ditemukan peningkatan *kemokin* dan *sitokin proinflamasi*.

Pada pasien konfirmasi positif Covid-19 dengan gejala klinis berat memberikan hasil *profil imunologi* yang berbeda dengan klinis ringan. Pada kasus klinis berat ditemukan hitung *limfosit* yang rendah, serta hasil *monosit*, *basofil*, dan *eosinofil* lebih rendah pada pasien Covid-19 dengan klinis berat. Terdapat pula peningkatan *mediator proinflamasi* (TNF- α , IL 1, IL6 dan IL 8) namun pada *sel T helper*, *T supresor* dan *T regulator* mengalami penurunan pada kasus covid-19 klinis berat. Pasien covid-19 yang mengalami *Acute Distress Respiratory Syndrome* (ARDS) juga ditemukan sel T CD4 dan CD8 mengalami penurunan, limfosit CD4 dan CD8 mengalami hiperaktivasi. ARDS merupakan salah satu penyebab kematian pada kasus Covid-19 yang diakibatkan oleh peningkatan *mediator proinflamasi* (badai sitokin) yang tidak terkontrol. Hal itu akan mengakibatkan kerusakan paru terbentuknya jaringan *fibrosis* sehingga dapat terjadinya kegagalan fungsi (Levani, Prastya and Mawaddatunnadila, 2021).

6. Pemeriksaan Diagnostik

Temuan laboratorium yang paling konsisten dengan covid-19 adalah *limfositopenia*, peningkatan *protein reaktif C*, dan peningkatan laju sedimentasi *eritrosit*. *Limfositopenia* disebabkan oleh *nekrosis* atau *apoptosis limfosit*. Tingkat keparahan *limfositopenia* mencerminkan tingkat keparahan covid-19.

Prokalsitonin umumnya meningkat dan dikaitkan dengan koinfeksi pada sebagian besar kasus *pediatrik* yang dilaporkan. Deteksi covid-19 didasarkan pada deteksi *virologi* oleh RTPCR menggunakan *swab* (*nasofaring, orofaring*), *sputum* dan *feses*, *radiografi* dada dan pemantauan dinamis *mediator inflamasi* (misalnya *sitokin*). *Spesimen feses* yang terdeteksi untuk asam nukleat Covid-19 sama akuratnya dengan *spesimen* usap *faring*. Pasien dengan Covid-19 menunjukkan kadar *sitokin* dan *kemokin* dalam darah yang tinggi seperti interleukin (IL)-7, IL-8, IL-9, IL-10, *granulocytecolony stimulating factor*, *granulocyte-macrophage colonystimulating factor*, *tumor necrosis faktor alfa* dan *VEGFA* (Umakanthan *et al.*, 2020).

7. Penatalaksanaan

Buku diagnosis dan tatalaksana Covid-19 di Indonesia yang disusun oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) tahun 2020 menjelaskan bahwa tatalaksana untuk pasien *coronavirus disease* 2019 dibagi menjadi tatalaksana pemeriksaan *PCR Swab*, orang tanpa gejala (OTG), orang dengan gejala ringan, sedang, dan berat (Levani, Prastya and Mawaddatunnadila, 2021).

8. Prognostik

Secara umum seluruh populasi rentan terhadap infeksi virus ini. Terutama lanjut usia dan yang memiliki Komorbid akan mengalami kondisi yang serius bila terinfeksi. Hampir seluruh penderita memiliki prognosis yang baik, gejala pada anak-anak umumnya relatif ringan hanya sebagian kecil yang kritis. Kematian lebih sering ditemukan pada lanjut usia dan penderita dengan penyakit kronis yang mendasari (*comorbid*) (Hairunisa and Amalia, 2020).

B. Tinjauan Umum Faktor Risiko Keparahan Covid-19


Mortalitas Covid-19 hingga saat ini mencapai 2% tetapi jumlah kasus berat mencapai 10%. Tingkat Keparahan Covid-19 bergantung pada derajat penyakit, ada tidaknya komorbid dan faktor usia (Handayani *et al.*, 2020). Tingkat keparahan dan *mortalitas* pada pasien covid-19 utamanya disebabkan oleh Sindrom Distres Pernapasan Akut (*Acute Respiratory Distress Syndrome/ARDS*) yang diinduksi oleh *pneumonia viral* (Putra, Listyoko and Christanto, 2020). Orang-orang dengan peningkatan risiko penyakit parah dan fatal sangat membutuhkan perlindungan. Selain itu, pentingnya pemahaman lebih bahwa pada masa pandemi yang terjadi saat ini mengakibatkan banyak kekhawatiran pada masyarakat terlebih pada pasien yang terinfeksi Covid-19. Berdasarkan ilmu kesehatan, pasien dengan kondisi sikap mental yang optimis akan lebih cepat merespon pengobatan dibandingkan dengan pasien yang merasa takut atau cemas. Rasa takut secara signifikan dapat melemahkan imunitas atau kekebalan tubuh. Sehubungan dengan hal tersebut, Ibnu Sina menyampaikan kata mutiaranya: “*Delusi (serba Khawatir) adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh pengobatan, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan*” (Nashrullah, 2020). Kondisi kesehatan yang buruk seperti usia lanjut, obesitas, diabetes dan hipertensi merupakan faktor risiko perjalanan penyakit Covid-19 yang parah dan fatal. Selanjutnya, perjalanan yang parah dan fatal dikaitkan dengan kerusakan organ terutama yang mempengaruhi jantung, hati dan ginjal. *Disfungsi koagulasi* dapat memainkan peran penting dalam kerusakan organ. Waktu masuk rumah sakit,

TBC, peradangan gangguan dan disfungsi koagulasi diidentifikasi sebagai faktor risiko yang ditemukan sebagai faktor yang memperparah Covid-19 (Wolff, 2021).

Selain itu, penelitian lain oleh Handayani (2020) menyebutkan bahwa mekanisme ARDS pada SARS-CoV-2 dan bagaimana faktor host berperan dalam meningkatkan risiko tersebut masih belum jelas, tetapi salah satu faktor yang merupakan prediktor derajat keparahan penyakit serta risiko kematian adalah usia. Studi kohort Du, *et al* (2020) menyatakan bahwa pasien dengan usia lebih dari 60 tahun menunjukkan gejala yang lebih berat dibandingkan usia di bawah 60 tahun. Studi lain Xie, *et al* (2020) menyatakan bahwa pasien dengan saturasi $\leq 90\%$ cenderung didapatkan pada usia lebih tua, berjenis kelamin laki-laki, memiliki hipertensi dan lebih didapatkan adanya sesak secara klinis dibanding dengan nilai saturasi $\geq 90\%$. Studi yang dilakukan Tjahyadi, *et al* (2020) menyatakan CRP dan LDH dapat menjadi prediktor derajat keparahan dan *mortalitas* serta peningkatan LDH berkorelasi terbalik dengan derajat *hipoksemia* yang dinilai dari $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ (Putra, Listyoko and Christanto, 2020).


C. Kerangka Teori

Bagan 2.1 Kerangka Teori



D. Kerangka Konsep

Bagan 2.2 Kerangka Konsep



Dari gambar kerangka konsep di atas dapat dijelaskan bahwa faktor risiko yang diteliti sebagai variabel dependent dalam penelitian ini terhadap tingkat keparahan covid-19 sebagai variabel dependent.

BAB III

METODE

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Telaah literatur merupakan sebuah proses analisis artikel yang terintegrasi dan bukan hanya melakukan ringkasan secara acak dan sesuka hati penulis, akan tetapi telaah literatur merupakan tulisan ilmiah yang terkait langsung dengan pernyataan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Pada saat proses pengumpulan artikel yang dijadikan literatur, maka bisa juga ditemukan penjelasan latar belakang penelitian tentang suatu topik, alasan mengapa topik tersebut penting untuk diteliti, menemukan keterkaitan antara studi dan permasalahan penelitian, mengidentifikasi tema dan konsep, mengidentifikasi kesenjangan utama antara permasalahan dan hasil penelitian, serta melakukan peninjauan terhadap pertanyaan penelitian lebih lanjut berdasarkan studi terdahulu yang sudah dilakukan (M.Nurs, 2020).

Penelitian ini dilakukan menggunakan desain *deskriptif naratif* dengan menggunakan metode *Literature Review* yang berisi usulan, rangkuman dan pemikiran peneliti tentang beberapa sumber pustaka tentang topik yang dibahas dan diuraikan dalam bentuk deskriptif melalui beberapa literatur yang relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini yang dilakukan secara terstruktur dan terencana (Davies & Crombie, 2009).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Literature Review* untuk teridentifikasi dan teranalisis faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19 berdasarkan literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Database pencarian

Telaah literatur yang merupakan rangkuman menyeluruh beberapa studi penelitian yang ditentukan berdasarkan tema tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, akan tetapi diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang didapat berupa artikel jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional dengan tema yang sudah ditentukan. Pencarian Literatur dalam telaah literatur ini menggunakan empat *database* yaitu *PubMed*, *Science Direct*, *Google Scholar* dan Portal Garuda.

2. Kata Kunci

Pencarian artikel atau jurnal menggunakan *keyword* dan *Boolean operator* (*AND*, *OR*) yang digunakan untuk memperluas atau menspesifikkan pencarian sehingga mempermudah dalam penentuan artikel atau jurnal yang digunakan. Pertanyaan penelitian terstruktur menggunakan metode strategi *PICO* (*Population, Intervention, Comparasion and Outcome*) dengan *keyword* atau kata kunci dalam literatur ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kata Kunci

Faktor Risiko	Virus Korona	Tingkat Keparahan
<i>OR</i>	<i>OR</i>	<i>OR</i>
<i>Predictor</i>	<i>Covid-19</i>	Severitas
<i>OR</i>	<i>OR</i>	<i>OR</i>
<i>Factor at Risk</i>	<i>SARS-CoV2</i>	<i>Severity</i>
<i>OR</i>	<i>OR</i>	<i>OR</i>
<i>Risk Factors</i>	<i>Coronavirus</i>	<i>Critical Illness</i>

Pertanyaan penelitian dirumuskan melalui strategi PICO adalah sebagai berikut: Apakah Faktor-faktor Risiko yang Memengaruhi Tingkat Keparahan Covid-19?

Tabel 3.2 Strategi PICO

P	<i>Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus OR Virus Korona</i>
I	<i>Risk Factors OR Factor at Risk OR Predictor OR Faktor Risiko</i>
C	Ada pembandingan
O	<i>Severity OR Critical Illness OR Severitas OR Tingkat Keparahan</i>

Dalam memilih jurnal yang akan dianalisis peneliti memiliki kriteria inklusi dan eksklusi yaitu:

a. Kriteria Inklusi

- 1) Artikel yang terbit dalam kurun waktu 2020-2021
- 2) Artikel *full text* yang sesuai dengan tujuan penelitian

- 3) Jurnal berasal dari *database* bereputasi
 - 4) Artikel yang menggunakan *case control study, cross-sectional studies, cohort, qualitative research, quasy eksperimental studies* atau *systematic review with meta analisis*
 - 5) Kualitas penilaian artikel > 50% berdasarkan *Guideline review* dari *Joanna Briggs Institute*
 - 6) Menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia
- b. Kriteria Eksklusi
- 1) Artikel yang *double publication*
 - 2) Artikel dalam bentuk skripsi, tesis dan tidak terpublikasi

C. Analisa Data

Adapun cara penilaian kualitas artikel yaitu dengan cara menyaring masing-masing artikel penelitian yang masuk dalam kriteria inklusi setelah itu disesuaikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada instrumen penilaian kritis yang sesuai dengan desain penelitian lalu diberikan *checklist* pada kolom “ya” atau “tidak” atau “tidak jelas” atau “tidak tersedia”. Kemudian dilakukan perhitungan skor dari setiap pertanyaan, lalu dijumlahkan total skor setiap artikel. Adapun artikel yang akan di *review* harus memenuhi kriteria yang nilainya 100%-80% (kualitas baik) dan 79%-50% (kualitas cukup), sedangkan artikel yang nilainya di bawah 50% tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi kriteria (Adref, Syahrul and Saleh, 2019).

Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan informasi yang telah diseleksi kerelevanan menggunakan instrument *Guideline*

review dari *Joanna Briggs Institute* dengan masalah yang dikaji. Untuk menyajikan masalah yang akan dibahas maka data terkumpul di analisis dengan menggunakan tabel *sintesis grid*. Membuat tabel sintesis artikel hasil pemikiran atau hasil penelitian diawali dengan menganalisis artikel-artikel yang relevan dengan topik yang akan di *review* maksudnya adalah membahas/mengkaji artikel dengan cara membuat identifikasi dan klasifikasi berdasarkan elemen-elemen yang akan di *review* dari beberapa artikel yang membahas topik yang hampir sama. Menyintesis merupakan proses mengintegrasikan hasil analisis terhadap artikel-artikel berdasarkan kesamaan dan perbedaan masing-masing artikel dan membuat kesimpulan berdasarkan kesamaan dan perbedaan setiap artikel tersebut dalam bentuk simpulan kolektif dari beberapa artikel yang dianalisis (Rhamdani, Ali Ramdhani and Syakur Amin, 2014).

D. Rekomendasi

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya peneliti memberikan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif sebagai solusi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kemudian disusun menjadi suatu hasil pembahasan dan suatu kesimpulan. Rekomendasi diberikan sebagai sebuah hasil pemecahan masalah menjadi sebuah adopsi pengetahuan dan sebagai landasan berpikir untuk pencegahan masalah yang telah dirumuskan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Hasil Pencarian


Tabel 4.1 Hasil Pencarian berdasarkan Kata Kunci

No	Database	Kata Kunci	Total Artikel
1	Google Scholar	<i>Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus OR Virus Korona AND Risk Factors OR Factor at Risk OR Predictor OR Faktor Risiko AND Severity OR Critical Illnes OR Severitas OR Tingkat Keparahan</i>	68
2	Portal Garuda	<i>-Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus OR Virus Korona AND Risk Factors OR Factor at Risk OR Predictor OR Faktor Risiko AND Severity OR Critical Illnes OR Severitas OR Tingkat Keparahan</i> <i>- Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus AND Risk Factors OR Factor at Risk OR Predictor AND Severity OR Critical Illnes OR Severitas</i> <i>- Virus Korona AND Faktor Risiko AND Tingkat Keparahan</i>	0 0 0
3	Science Direct	<i>Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus AND Risk Factors OR Factor at Risk OR Predictor AND Severity OR Critical Illnes OR Severitas</i>	1.000.000
4	PubMed	<i>Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus OR Virus Korona AND Risk Factors OR Factor at Risk OR Predictor OR Faktor Risiko AND Severity OR Critical Illnes OR Severitas OR Tingkat Keparahan</i>	244.135
Total Keseluruhan			1.244.203

Pencarian artikel telah dilakukan melalui publikasi di empat *database* yaitu *PubMed*, *Science Direct*, *Google Scholar* dan Portal Garuda dengan menggunakan kata kunci tersebut sehingga dihasilkan total artikel secara keseluruhan berjumlah 1.244.203 artikel. Hasil seleksi artikel studi berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi peneliti dapat digambarkan dalam Diagram Flow di bawah ini:



Bagan 4.1 Diagram Flow



Pencarian artikel pada empat *database* menghasilkan 1.244.203 artikel teridentifikasi berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Peneliti kemudian melakukan skrining berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebanyak 1.212.081 artikel dieksklusikan. 762.291 Artikel diantaranya adalah artikel yang terbit dibawah tahun 2020, tidak full teks sebanyak 256.751 artikel,

publikasi ganda sebanyak 193.001 artikel dan sebanyak 98 artikel berbentuk tesis, skripsi atau tidak terpublikasi. Selanjutnya 32.122 artikel yang diinklusi, kemudian dilakukan proses *assesment* berdasarkan kelayakan terhadap kesesuaian dengan pertanyaan penelitian dan kategori studi yang telah ditentukan pada kriteria inklusi yaitu menggunakan *case control study*, *cross-sectional studies*, *cohort*, *qualitative research*, *quasy eksperimental studies* atau *systematic review with meta-analysis*. Adapun hasil pencarian dan seleksi studi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi didapatkan 12 artikel yang bisa dipergunakan dalam telaah literatur ini.

2. Penilaian Kualitas

Dalam skrining terakhir berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan pada *The Joanna Critical Appraisal Tools*, 12 studi mencapai skor lebih tinggi dari 50% dan siap untuk melakukan sintesis data dalam telaah literatur ini. Karakteristik studi dari 4 *database* tergambar dalam table berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Studi

Kategori	Jumlah
<i>Database</i>	
<i>Google scholar</i>	1
Portal garuda	0
<i>Pubmed</i>	10
<i>Science direct</i>	1
TOTAL	12
Tahun Penerbitan	
2020	7
2021	5

TOTAL	12
Desain Penelitian	
<i>Case control study</i>	1
<i>Cohort</i>	6
<i>Cross-sectional studies</i>	1
<i>Systematic review with meta analisis</i>	4
<i>Qualitative research</i>	0
<i>Quasy eksperimental studies</i>	0
TOTAL	12
Negara Penelitian	
Cina	4
Amerika Serikat	2
Indonesia	1
Austria	1
Germany	1
Tiongkok	1
Singapura	1
Hungaria	1
TOTAL	12

Faktor yang berkontribusi dalam tingkat keparahan covid-19 berdasarkan tabel 4.1 dilakukan dalam bentuk desain penelitian yang paling banyak digunakan adalah *Cohort* (n=6), kemudian *Systematic review with meta analisis* (n=4), *cross-sectional* (n=1) dan 1 artikel dalam bentuk desain penelitian *case control study*. Jumlah rata-rata kasus lebih dari seribu. Secara keseluruhan, setiap penelitian membahas tentang faktor risiko yang memengaruhi covid-19. Penelitian tentang faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan covid-19 dilakukan di

beberapa negara. Studi yang sesuai dengan telaah literatur ini rata-rata dilakukan di Cina dengan 4 studi, Amerika Serikat 2 studi dan yang lainnya adalah masing-masing satu studi yang dilakukan di Tiongkok, Jerman, Singapura, Hungaria, Austria dan Indonesia. Dua belas studi tentang faktor yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19 adalah usia, komorbid, jenis kelamin laki-laki, temuan laboratorium, manifestasi klinis, obesitas, perilaku merokok dan penghapusan alel NKG2C. Berikut dua belas artikel yang telah memenuhi syarat untuk dimasukkan kedalam telaah literatur:

Tabel 4.3 Sintesis Grid Journal

NO	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Database
1.	(Zheng <i>et al.</i> , 2021)	<i>Risk factors for the Covid-19 severity and its correlation with viral shedding: A retrospective cohort study</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor risiko tingkat keparahan pada tahap awal Covid-19 dan korelasi antara pelepasan virus dan keparahan	Design: <i>Retrospective cohort design</i> Sample: 80 pasien Variabel: -Dependen: keparahan Covid-19 -Independen: Faktor Risiko Instrument: Rekam medis pasien dan Data <i>epidemiologi, klinis, laboratorium, dan pengobatan serta hasil dikumpulkan dengan formulir pengumpulan data dari rekam medis elektronik.</i> Analysis: <i>Independent group t tests, uji Mann-Whitney</i>	- Usia pasien dengan Covid-19 yang parah secara nyata lebih tua dari pada pasien umum. - Komorbiditas hadir pada setengah dari pasien, dan hipertensi adalah komorbiditas yang paling umum, diikuti oleh diabetes, penyakit kardiovaskular dan karsinoma. - Gejala yang paling umum saat masuk adalah demam diikuti oleh batuk kering, dahak, dan sakit tenggorokan, Durasi demam adalah	<i>PubMed</i>

				<p>uji χ^2, atau uji <i>Fisher's exact</i>, Uji <i>univariable and multivariable logistic regression models</i> dan uji <i>log-rank</i>.</p>	<p>perbedaan yang signifikan antara pasien tipe umum dan berat Suhu saat masuk pada pasien yang parah secara nyata lebih tinggi dari pada pasien umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk temuan laboratorium menemukan bahwa jumlah <i>trombosit</i>, jumlah <i>eosinofil</i>, <i>albumin</i>, jumlah, persentase <i>limfosit</i>, dan jumlah <i>trombosit</i> lebih rendah pada pasien yang parah dibandingkan pada pasien normal, dan - Peningkatan bertahap suhu tubuh dan CRP dalam waktu 1 minggu onset penyakit, dan penurunan bertahap dan normal setelah intervensi pengobatan. - Pada tahap awal penyakit (sekitar 2 minggu), suhu tubuh dan CRP pasien pada pasien parah lebih tinggi daripada pasien biasa. - Peningkatan N-terminal <i>pro-peptida natriuretik</i> otak (NT-proBNP) - Selama masa 	
--	--	--	--	--	---	--

					rawat inap, beberapa pasien parah menunjukkan peningkatan sel darah putih dan neutrofil, anemia, peningkatan bilirubin, peningkatan CK, laktat dehidrogenase dan alfa hidrosil butirat. asam dehidrogenase dan peningkatan D-dimer.	
2.	(Yao et al., 2020)	A retrospective study of risk factors for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infections in hospitalized adult patients	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kasi karakteristik klinis dan faktor risiko yang terkait dengan insiden keparahan infeksi SARS-CoV-2	<p>Design: Retrospective cohort design</p> <p>Sample: 109 pasien</p> <p>Variable:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dependen: keparahan Covid-19 pada pasien dewasa -Independen: Faktor Risiko <p>Instrument: Demografi, klinis, laboratorium, pemeriksaan pencitraan, pengobatan, dan data hasil dikumpulkan menggunakan formulir laporan kasus standar.</p> <p>Analysis: Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, versi 22.0 (SPSS Inc. Chicago, Illinois, Amerika Serikat).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Usia 108 pasien dengan Covid-19 adalah 52 tahun. Dengna rata-rata usia pasien yang terinfeksi parah adalah pada usia 56 tahun - Proporsi pasien yang lebih tua dari 70 tahun adalah yang tertinggi pada pasien parah. - Komorbiditas hadir pada 25 pasien dengan hipertensi menjadi komorbiditas yang paling umum diikuti oleh diabetes - Adanya penyakit penyerta lebih umum di antara pasien dengan penyakit parah daripada di antara mereka dengan penyakit 	PubMed

					<p>tidak parah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah <i>leukosit</i> darah yang lebih tinggi, jumlah <i>neutrofil</i>, tingkat <i>protein C-reaktif</i> sensitif yang lebih tinggi, tingkat <i>D-dimer</i>, skor <i>APACHE II</i>, dan skor <i>SOFA</i> dikaitkan dengan perkembangan Covid-19 yang parah dan begitu juga jumlah <i>limfosit</i> dan kadar <i>albumin</i> yang lebih rendah. 	
3.	(Vietzen <i>et al.</i> , 2021)	<i>Deletion of the NKG2C receptor encoding KLRC2 gene and HLA-E variants are risk factors for severe Covid-19</i>	<p>Varian genetik inang dapat berkontribusi pada tingkat keparahan Covid-19. Sel NKG2C⁺ NK adalah sel efektor antivirus yang poten, berpotensi membatasi tingkat infeksi SARS-CoV-2. NKG2C adalah pengaktif reseptor sel NK yang dikodekan oleh gen KLRC2, yang mengikat HLA-E pada sel yang terinfeksi</p>	<p>Design: <i>Study cohort design</i></p> <p>Sample: 361 pasien Covid-19 Austria</p> <p>Variable:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dependen : Keparahan Covid-19 -Independen : penghapusan gene NKG2C <p>Instrument:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Analysis: Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 24. Dengan uji χ^2, analisis varians (ANOVA) dan post test Dunn</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit dengan dan tanpa memerlukan perawatan ICU secara signifikan lebih tua, lebih cenderung laki-laki, dan memiliki signifikansi penyakit penyerta seperti obesitas, hipertensi, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), dan penyakit arteri koroner (CAD) lebih banyak dibandingkan dengan pasien Covid-19 yang tidak dirawat di rumah sakit. - Penghapusan NKG2C serta 	<i>PubMed</i>

			menyebabkan aktivasi sel NK. Penelitian ini untuk mengetahui apakah tingkat keparahan Covid-19 dikaitkan dengan varian genetik ini.		varian HLA-E ditemukan sebagai faktor risiko independen untuk Covid-19.	
4.	(Wang et al., 2020)	<i>Epidemiologic Characteristics, Transmission Chain, and Risk Factors of Severe Infection of COVID-19 in Tianjin, a Representative Municipality City of China</i>	Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik epidemiologi penyakit coronavirus 2019 (Covid-19) dan mengeksplorasi faktor risiko infeksi berat	Design: <i>Case control study</i> Sample: 131 kasus terdiagnosis Covid-19 di Tianjin Variable: Data kasus Instrument: Data epidemi Covid-19 yang dirilis dari situs resmi pemerintah kota Tianjin (http://www.tj.gov.cn/) Analysis: Analisis <i>spatio-temporal</i> , Perangkat lunak ESRI ArcMap 10.4.1, uji <i>chisquared</i> , <i>independent T-test</i> , uji <i>Mann-Whitney</i> , Analisis regresi logistik univariat dan multivariat	Pasien dengan infeksi Covid-19 yang berat lebih cenderung laki-laki	<i>PubMed</i>
5.	(Fang et al., 2020)	<i>Epidemiological, comorbidity factors with severity and prognosis</i>	Tinjauan sistematis dan meta-analisis dilakukan dalam upaya untuk	Design: <i>Systematic review and meta-analysis</i> Sample: lebih dari sepuluh ribu	- Laki-laki memiliki tingkat keparahan penyakit yang lebih tinggi secara signifikan - Selain itu, penyakit	<i>PubMed</i>

		<i>of COVID-19: a systematic review and meta-analysis</i>	mengumpulkan dan mengevaluasi secara sistematis hubungan epidemiologi, faktor komorbiditas dengan tingkat keparahan dan prognosis Covid-19	Covid-19 kasus dari 69 publikasi Instrument: <i>PubMed, medRxiv</i> dan <i>bioRxiv</i> Analysis: Semua analisis statistik untuk penelitian ini dilakukan oleh STATA, versi 12.0 (Stata Corporation, College Station, Texas).	penyerta, termasuk penyakit penyerta, hipertensi, diabetes, keganasan, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung koroner, penyakit <i>serebrovaskular</i> , penyakit <i>kardiovaskular/serebrovaskular</i> , penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), penyakit sistem pernapasan, penyakit ginjal kronis, infeksi hepatitis B, dan penyakit penyerta. penyakit pencernaan secara signifikan terkait dengan keparahan penyakit	
6.	(Zhang <i>et al.</i> , 2020)	<i>Risk Factors for Severe Disease and Efficacy of Treatment in Patients Infected With COVID-19: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-Regression Analysis</i>	Untuk mengumpulkan keseluruhan faktor Risiko Penyakit Parah dan Kemanjuran Pengobatan pada Pasien Terinfeksi Covid-19	Design: <i>Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-Regression Analysis</i> Sample: Empat puluh lima studi melaporkan 4203 pasien Covid-19 dilibatkan Variable: Rincian penelitian, ukuran sampel penelitian, metode diagnosis, usia, jenis kelamin, kondisi medis yang menyertai,	Peningkatan jumlah <i>leukosit</i> , <i>alanin aminotransferase</i> , dan <i>aspartat transaminase</i> ; peningkatan laktat <i>dehidrogenase</i> (LDH); dan peningkatan <i>prokalsitonin</i> secara signifikan berpengaruh dalam tingkat keparahan penyakit Covid-19	<i>PubMed</i>

				<p>gejala klinis, pemeriksaan laboratorium, temuan radiologis, rincian pengobatan, dan hasil pasien.</p> <p>Instrument: Ovid MEDLINE, Embase, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), dan PubMed</p> <p>Analysis: Metode varians terbalik menggunakan transformasi <i>double arcsine Freeman-Tukey</i></p>	
7.	(Pandita <i>et al.</i> , 2021)	<i>Predictors of severity and mortality among patients hospitalized with COVID-19 in Rhode Island</i>	<p>Untuk mengidentifikasi (1) demografi pasien dan komorbiditas yang terkait dengan penyakit parah dan kematian, dan (2) menunjukkan gejala dan tanda vital yang memprediksi perkembangan penyakit dan kematian yang parah.</p>	<p>Design: <i>Retrospective cohort study</i></p> <p>Sample: 259 pasien yang dirawat di rumah sakit Rhode Island</p> <p>Variable: -Dependen : Tingkat keparahan dan kematian pasien di Rhode Island -Independen : Prediktor</p> <p>Instrumen: Data demografi dan laboratorium diambil dari EMR</p> <p>Analysis: Uji <i>Chi-square</i>, uji <i>Fisher</i>, uji-<i>t Student</i>, SAS 9.4 (SAS Institute, Cary, USA) dan R 3.6.3 (<i>R Computing</i>,</p>	Usia tua dan jenis kelamin laki-laki menjadi faktor dari perkembangan Covid-19 menjadi penyakit parah <i>PubMed</i>

				Vienna, Austria)		
8.	(Malik et al., 2020)	<i>Higher body mass index is an important risk factor in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis</i>	Studi ini secara sistematis memeriksa bukti yang muncul untuk mengidentifikasi kasi hubungan antara indeks massa tubuh (BMI) dan hasil penyakit Covid-19.	Design: <i>Systematic review and meta-analysis</i> Sample: Pasien covid-19 Variable: - Instrument: Analysis: Penilaian kualitas Skala Newcastle. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel (Neyeloff et al. 2012).	Penelitian ini menunjukkan bahwa BMI memainkan peran penting dalam tingkat keparahan Covid-19 di semua kelompok umur, terutama individu yang lebih tua.	PubMed
9.	(Puebla Neira et al., 2021)	<i>Smoking and risk of COVID-19 hospitalization</i>	Untuk menilai risiko rawat inap (sebagai penanda COVID-19 parah) pada pasien berdasarkan status merokok: mantan, saat ini, dan tidak pernah perokok, yang dites positif mengidap Sindrom Pernafasan Akut Parah Coronavirus 2 (SARS-COV2) di pusat medis akademik di Amerika Serikat	Design: <i>Retrospective cohort study</i> Sample: 10216 pasien positif SARS-CoV2 Variable: -risiko rawat inap pasien -Independen: Perilaku Merokok Instrument: Data dikumpul dari <i>Epic, the institution's electronic health records system (EHR)</i> . Analysis: Uji <i>Chi-square, Fisher's</i> , regresi logistik multivariabel, SAS versi 9.4 (SAS Inc., Cary, NC).	Secara signifikan lebih banyak mantan perokok dirawat di rumah sakit karena Covid-19 daripada perokok saat ini atau tidak pernah merokok	PubMed
10.	(Földi et al., 2020a)	<i>Obesity is a risk factor for developing critical</i>	Untuk memeriksa apakah obesitas merupakan faktor risiko	Design: <i>Systematic review and meta-analysis</i> Sample: 33.987 artikel	Obesitas merupakan faktor risiko yang signifikan untuk masuk unit perawatan intensif	PubMed

		<i>condition in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis</i>	untuk kondisi kritis pada pasien Covid-19 dengan melakukan meta-analisis	Variable: -Dependen Risiko kritis pasien -Independen: Obesitas Instrument: <i>Medline (via PubMed), Embase, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), Scopus and Web of Science—for studies</i> Analysis: Perangkat lunak statistik Meta-Analysis (Versi 3) (Biostat, Inc., Engelwood, MJ, AS).	(ICU). Obesitas dapat berfungsi sebagai prediktor klinis untuk hasil yang merugikan; oleh karena itu, dimasukkannya BMI dalam skor prognostik dan peningkatan pedoman untuk perawatan pasien dengan BMI tinggi sangat dianjurkan.	
11.	(Liu <i>et al.</i> , 2020)	<i>Risk factor for developing into critical COVI-19 patients in Wuhan, China: Amulticenter, retrospective, cohort study</i>	Untuk secara komprehensif menggambarkan fitur klinis COVID-19 dan mengeksplorasi faktor risiko pengembangan penyakit kritis	Design: <i>Retrospective cohort study</i> Sample: 2044 pasien Covid-19 Variable: -Dependen Risiko kritis pasien -Independen: faktor risiko Instrument: <i>Electronic medical record</i> menggunakan sebuah <i>designed data collection</i> dari <i>Experienced clinicians</i> dari <i>Tongji Hospita lanalyzed patients' medical records</i> . Analysis: <i>Kruskal-Wallis test, chi-square test, and Fis</i>	Tingkat keparahan Covid-19 naik lurus seiring bertambahnya usia. Kelompok kritis ditandai dengan proporsi <i>dispnea</i> yang lebih tinggi, kerusakan organ <i>sistemik</i> , dan badai inflamasi yang berlangsung lama.	<i>Science direct</i>

				<i>her'sexacttest</i>		
12.	(Hadi <i>et al.</i> , 2021)	<i>Anosmia</i> Sebagai Faktor Prediktor Derajat Keparahan Ringan pada Pasien Covid-19 Rawat Inap	Melalui penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan karakteristik pasien Covid-19 dengan gejala <i>anosmia</i> serta hubungannya dengan derajat keparahan.	<p>Design: <i>Studi deskriptif, cross-sectional, retrospektif</i></p> <p>Sample: 149 pasien terkonfirmasi Covid-19 di rumah sakit Primasatya Husada Citra Surabaya (RS PHC Surabaya).</p> <p>Variable: -Dependen: Derajat keparahan ringan -Independen: Anosmia</p> <p>Instrument: Data rekam medis elektronik (Identitas, keluhan, darah lengkap, diagnosis, dan uji rRT-PCR).</p> <p>Analysis: Analisa penelitian ini menggunakan program SPSS versi 23.00. Uji <i>chi square</i>, <i>odd ratio</i>, uji <i>independent T-test</i>, <i>Mann-Whitney U test</i>.</p>	Pasien dengan gejala <i>anosmia</i> lebih banyak ditemukan pada derajat keparahan ringan. Pasien dengan <i>anosmia</i> memiliki <i>odd ratio</i> 0,578 terjadinya tingkat keparahan yang berat yang menandakan bahwa gejala <i>anosmia</i> sebagai faktor <i>protektif</i> terhadap terjadinya tingkat keparahan yang berat pada pasien Covid-19.	<i>Google Scholar</i>

Dua belas artikel yang diidentifikasi, sebagian besar membahas faktor-faktor risiko yang memengaruhi Covid-19 secara umum. Meskipun, ada 3 artikel yang membahas satu faktor risiko tertentu saja. Faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Usia

Berdasarkan hasil analisis di atas, 6 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa usia lanjut menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat keparahan pasien Covid-19.

2. Komorbid

Berdasarkan hasil analisis di atas, 6 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa komorbid terutama hipertensi adalah faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien covid-19.

3. Jenis Kelamin Laki-laki

Berdasarkan hasil analisis di atas, 5 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa umumnya, laki-laki menunjukkan kerentanan yang lebih tinggi terhadap tingkat keparahan infeksi dibandingkan perempuan sehingga jenis kelamin laki-laki adalah salah satu faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien covid-19.

4. Temuan Laboratorium

Berdasarkan hasil analisis di atas, 3 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa temuan laboratorium seperti penurunan *persentase limfosit*, jumlah *trombosit*, jumlah *eosinofil*, *albumin*, tekanan *parsial oksigen (PO₂)*, tekanan *parsial karbon dioksida (PCO₂)* dan peningkatan *AST*, *LDH*, *Alpha-hidroksibutirat dehidrogenase*, *CRP*, *d-dimer*, *fibrinogen* secara signifikan terjadi pada pasien dengan covid-19 yang parah dibandingkan dengan pasien dengan kondisi ringan sehingga temuan laboratorium juga termasuk faktor risiko yang dapat memengaruhi tingkat keparahan pasien covid-19.

5. Manifestasi Klinis

Berdasarkan hasil analisis di atas, 3 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa manifestasi klinis adalah faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien covid-19. *Anosmia* merupakan tanda awal dari tingkat keparahan ringan yang dijadikan sebagai faktor proteksi menuju ketinggian keparahan berat, sedangkan durasi demam dan *dispnea* menjadi tanda semakin memburuknya kondisi pasien covid-19.

6. Obesitas

Berdasarkan hasil analisis di atas, 2 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa obesitas dikaitkan dengan peningkatan risiko infeksi bahkan kematian covid-19. Sehingga obesitas adalah faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien Covid-19.

7. Perilaku Merokok

Berdasarkan hasil analisis di atas, 1 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa pasien dengan riwayat rokok aktif maupun mantan perokok adalah faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien covid-19.

8. Penghapusan NKG2C

Berdasarkan hasil analisis di atas, 1 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa penghapusan NKG2C adalah faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien covid-19. NKG2C mungkin menjadi faktor utama yang membatasi infeksi virus dan tingkat keparahan covid-19 dan bahwa penghapusan reseptor NKG2C/CD94 yang diaktifkan dikaitkan dengan perkembangan covid-19 yang parah.

B. Pembahasan

Faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Usia

Usia lanjut menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat keparahan pasien Covid-19. Pasien yang mengembangkan penyakit parah adalah pasien dengan usia lebih tua (Pandita *et al.*, 2021). Usia menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab keparahan Covid-19. Penelitian yang dilakukan oleh Zheng *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa usia pasien covid-19 dengan kondisi yang parah lebih tua dari pada pasien dengan kondisi ringan yaitu usia rata-rata dari 80 pasien yang diteliti adalah 50 tahun. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa usia yang lebih tua sangat berkaitan dengan risiko lebih tinggi terjadinya komplikasi parah pada pasien dengan Covid-19 seperti terkena ARDS (Zheng *et al.*, 2021). Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yao *et al.*, (2020) bahwa rata-rata usia 108 pasien dengan Covid-19 adalah 52 tahun. Pasien yang meninggal dengan kondisi infeksi yang parah rata-rata berusia 65 tahun dan lebih tua dari pasien hidup yang terinfeksi parah yaitu rata-rata usia 56 tahun atau pasien tidak parah yang rata-rata usia pasien adalah 50 tahun. Proporsi pasien yang lebih tua dari 70 tahun adalah yang tertinggi pada kelompok pasien parah yang meninggal. Dalam penelitian ini, pasien dengan penyakit parah secara signifikan lebih tua dari pasien tidak parah. Hal ini menunjukkan bahwa pasien yang lebih tua berada pada risiko yang lebih tinggi dari penyakit Covid-19 yang parah (Yao *et al.*, 2020).

Studi *cohort* yang dilakukan oleh Vietzen *et al.*, (2021) juga menyatakan bahwa pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit dengan dan tanpa memerlukan perawatan ICU secara signifikan berusia lebih tua sehingga usia yang lebih tinggi merupakan faktor risiko untuk Covid-19 yang parah (Vietzen *et al.*, 2021). Penelitian ini juga sejalan dengan tinjauan sistematis yang dilakukan Fang *et al.*, (2020) bahwa usia yang lebih tua ditemukan secara signifikan terkait dengan tingkat keparahan penyakit dan prognosis akhir yang buruk sehingga menunjukkan bukti *epidemiologis* yang kuat tentang hubungan usia lebih tua dengan tingkat keparahan dan prognosis Covid-19 (Fang *et al.*, 2020). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al.*, bahwa pasien dengan usia lebih dari 60 tahun menunjukkan gejala yang lebih berat dibandingkan usia di bawah 60 tahun (Putra, Listyoko and Christanto, 2020).

Faktor usia lanjut mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas pasien Covid-19, tidak terlepas dari fakta bahwa mayoritas kelompok umur usia lanjut sangat rentan mempunyai penyakit degeneratif (Kristanto and Kosala, 2021). Usia sangat memengaruhi derajat keparahan penyakit dan mortalitas pada pasien Covid-19. Usia yang memiliki tingkat keparahan yang tinggi terjadi pada orang lanjut usia yaitu individu yang berumur 60 tahun ke atas. Hal tersebut diduga dikarenakan oleh kompetensi sistem imun seseorang akan semakin berkurang seiring bertambahnya usia (Haq *et al.*, 2021). Jika imunitas seseorang rendah atau menurun, barulah proses infeksi akan terjadi (Kristanto and Kosala, 2021) Penurunan kompetensi sistem imun ini disebabkan oleh terjadinya degenerasi pada seluruh komponen sistem imun

bawaan dan sistem imun adaptif. Degenerasi ini bermanifestasi dalam dua bentuk yaitu penurunan kuantitas seluler (sel *neutrofil*, sel *limfosit T* dan sel *dendritik*), penurunan jumlah reseptor yang terlibat dalam respon imun (*reseptor TLR* dan *reseptor* permukaan sel *monosit* dan *makrofag*), penurunan kemampuan untuk berdiferensiasi (sel *limfosit B*) (Haq *et al.*, 2021). Al-qur'an juga telah menjelaskan bahwa proses degenerasi itu merupakan proses alami sejalan dengan pertambahan umur, secara tegas Allah berfirman dalam QS ar-Rum/30: 54

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا
وَشَيْبَةً ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

Terjemahnya:

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa” (QS ar-Rum/30: 54)

Allah lah yang menciptakan kalian dari air mani, lalu kalian tumbuh dalam keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kalian kuat setelah keadaan lemah itu dengan pertumbuhan kalian sampai dewasa. Setelah itu menjadikan kalian lemah kembali setelah keadaan kuat itu, yaitu dengan sampainya kalian pada usia tua dan beruban. Dia menciptakan segala yang dikehendaki-Nya. Dia Maha Mengetahui untuk mengurus ciptaan-Nya dan Mahakuasa untuk menjadikan segala yang dikehendaki-Nya (Shihab, 2002).

Analisis telah dilakukan pada beberapa artikel yang ditelaah terkait usia sebagai faktor risiko tingkat keparahan Covid-19 sehingga peneliti berasumsi

bahwa usia menjadi salah satu faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien dengan Covid-19.

2. Komorbid

Komorbiditas seperti diabetes, hipertensi, obesitas, telah dikaitkan dengan hasil Covid-19 yang buruk. Dalam penelitian yang dilakukan Liu *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa komorbiditas juga ditemukan terkait dengan penyakit parah. Untuk sementara prevalensi diabetes, obesitas, dan PPOK lebih tinggi pada mereka dengan penyakit parah (Liu *et al.*, 2020).

Komorbiditas hadir sebagai faktor yang menyebabkan keparahan Covid-19 pada setengah dari keseluruhan pasien yang dijadikan sampel penelitian dalam penelitian Zheng *et al.*, (2021). Hipertensi adalah komorbiditas yang paling umum, diikuti oleh diabetes, penyakit kardiovaskular dan karsinoma (Zheng *et al.*, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Yao *et al.*, (2020) sejalan dengan hasil penelitian Zheng *et al.*, (2021) bahwa komorbiditas menjadi salah satu faktor risiko yang menyebabkan keparahan Covid-19. Pada penelitian ini, komorbiditas hadir pada 25 pasien dan hipertensi menjadi komorbiditas yang paling umum, diikuti oleh diabetes. Adanya penyakit penyerta lebih umum di antara pasien dengan penyakit parah daripada di antara mereka dengan penyakit tidak parah. Dalam penelitian ini, pasien dengan penyakit parah secara signifikan memiliki lebih banyak penyakit penyerta. Hal ini menunjukkan bahwa pasien yang memiliki penyakit yang mendasari berada pada risiko yang lebih tinggi dari penyakit parah (Yao *et al.*, 2020).

Studi kohort oleh Vietzen *et al.*, (2021) juga menjelaskan bahwa pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit memiliki signifikansi penyakit penyerta seperti obesitas, hipertensi, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), dan penyakit arteri koroner lebih banyak dibandingkan dengan pasien Covid-19 yang tidak dirawat di rumah sakit sehingga komorbiditas menjadi salah satu faktor risiko untuk Covid-19 yang parah (Vietzen *et al.*, 2021). Hal serupa juga dijelaskan dalam tinjauan sistematis dan meta-analisis Fang *et al.*, (2020) mengemukakan Selain faktor epidemiologi, penyakit penyerta juga berpotensi menjadi aspek penting yang dapat mempengaruhi tingkat keparahan penyakit dan prognosis Covid-19. Komorbiditas menunjukkan bukti epidemiologis yang kuat tentang hubungan dengan tingkat keparahan dan prognosis Covid-19. Penyakit penyerta, termasuk hipertensi, diabetes, penyakit *kardiovaskular*, penyakit *serebrovaskular*, PPOK, penyakit ginjal kronis, dan keganasan berkontribusi signifikan terhadap tingkat keparahan penyakit dan titik akhir prognostik Covid-19 (Fang *et al.*, 2020).

Data hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudatsir *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa komorbiditas, seperti penyakit pernapasan kronis, penyakit kardiovaskular, diabetes, dan hipertensi, dikaitkan dengan risiko Covid-19 parah yang lebih tinggi, di antaranya, hipertensi adalah faktor risiko terkuat. Respons imun mungkin menjadi faktor paling penting yang mendasari hubungan ini. Pasien dengan penyakit penyerta seperti penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan kronis, hipertensi, dan diabetes diamati memiliki status kekebalan yang lebih rendah daripada individu yang sehat. Karena covid-19 terutama

mempengaruhi saluran pernapasan, pasien dengan penyakit pernapasan kronis mungkin berisiko lebih tinggi tertular Covid-19 yang parah. Selain itu, disfungsi endotel mungkin juga memainkan peran penting (Mudatsir *et al.*, 2021b).

a. Hipertensi

Penelitian Zheng *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa pasien Covid-19 dengan penyakit penyerta hipertensi lebih berakibat pada kondisi infeksi yang parah. Pasien dengan Covid-19 memiliki tingkat enzim jantung dan penanda nekrosis miokard yang lebih tinggi. Konsisten dengan hasil ini, pasien dengan Covid-19 yang parah dengan mudah terjadi peningkatan NT-proBNP, CK, LDH dan α - hydroxybutyrate dehydrogenase, menunjukkan adanya disfungsi jantung dan cedera jantung. Berdasarkan invasi SARS-CoV-2 ke sel melalui pengikatan reseptor ACE2 dan jaringan jantung yang mengekspresikan ACE2, mekanisme cedera jantung terkait dengan Covid-19 secara teoritis hadir bahwa SARS-CoV-2 secara langsung dapat merusak jantung oleh reseptor ACE2. Oleh karena itu jalur pensinyalan terkait ACE2 dapat memainkan peran kunci dalam cedera miokard. Faktor lain seperti hipoksemia yang disebabkan oleh pneumonia berat, stres psikologis dan kecemasan pada pasien juga dapat menyebabkan hipoksia-kerusakan jantung iskemik (Zheng *et al.*, 2021). Rasa takut atau kecemasan secara signifikan dapat melemahkan imunitas atau kekebalan tubuh. Sehubungan dengan hal tersebut, perihal wabah penyakit, Ibnu Sina menyamakan kata mutiaranya:

أَلَوْهَمْ نِصْفُ الدَّاءِ، وَالْإِطْمِئْنَانُ نِصْفُ الدَّوَاءِ، وَالصَّبْرُ بَدَايَةُ الشِّفَاءِ

Artinya :

“Delusi (serba Khawatir) adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh pengobatan, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan”

Stres psikologis dan kecemasan pada pasien Covid-19 juga dapat menyebabkan hipoksia-kerusakan jantung iskemik (Zheng *et al.*, 2021). Selain itu, pasien dengan kondisi sikap mental yang optimis akan lebih cepat merespon pengobatan dibandingkan dengan pasien yang merasa takut atau cemas. Kecemasan adalah perasaan khawatir, gugup atau kegelisahan. Namun, sebagai orang yang beriman kita sudah diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama apabila kita ditimpa sebuah musibah maka segeralah mengingat dan mengagungkan Allah. Mengingat dan mengagungkan Allah secara terus-menerus disebut Zikir (Nashrullah, 2020). Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam dalam QS ar-Ra'd/13: 28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya :

“yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram” (QS ar-Ra'd/13: 28)

Orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dan menyambut kebenaran itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang ketika berzikir mengingat Allah dengan membaca al-Qur'an dan sebagainya, hati mereka menjadi tenang. Hati memang tidak akan dapat tenang tanpa mengingat dan

merenungkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah, dengan selalu mengharap keridaan-Nya (Shihab, 2002).

Tinjauan sistematis yang dilakukan (Fang *et al.*, 2020) mengemukakan Sebagai pengatur utama tekanan darah, *angiotensin-converting enzyme* (ACE) juga merupakan tempat pengikatan SARS-CoV, menjadikan hipertensi sebagai komorbiditas yang paling terfokus. Dalam meta-analisis ini, peneliti menemukan hipertensi dikaitkan dengan tingkat keparahan penyakit yang lebih tinggi dan semua titik akhir *prognostic* yang buruk. Sebagai catatan, penggunaan penghambat enzim pengubah *angiotensin* (ACEI) dan penghambat *reseptor tipe 1 angiotensin II* (ARB) dapat berkontribusi pada peningkatan hasil pasien Covid-19 dengan hipertensi (Fang *et al.*, 2020).

b. Diabetes

Diabetes merupakan salah satu faktor risiko utama yang meningkatkan tingkat keparahan Covid-19. Penderita diabetes rentan terhadap infeksi yang disebabkan oleh hiperglikemia, gangguan fungsi kekebalan, komplikasi vaskular dan beberapa penyakit penyerta seperti hipertensi, dislipidemia, dan penyakit kardiovaskular. Tingkat keparahan dan mortalitas dari Covid-19 secara bermakna lebih tinggi pada pasien dengan diabetes dibandingkan pasien non-diabetes. Penurunan fungsi kekebalan tubuh yang terjadi pada penderita diabetes menjadi salah satu faktor yang menyebabkan orang dengan penyakit bawaan diabetes melitus akan menjadi masalah yang serius di masa pandemik Covid-19 (Roeroe, Sedli and Umboh, 2021).

Studi Kohort yang dilakukan oleh Pandita *et al.*, (2021) mengemukakan bahwa diabetes ditemukan sebagai prediktor independen penyakit parah. Diabetes menciptakan keadaan hiperinflamasi dan merusak kekebalan bawaan dan yang diperantarai sel, yang dapat mempengaruhi pasien terhadap badai sitokin yang diketahui terjadi pada Covid-19 yang parah. Selanjutnya, peningkatan pelepasan sitokin seperti *interleukin-6* pada pasien dengan diabetes dan Covid-19, dalam menghadapi kemungkinan *respons interferon antivirus* yang tumpul dan aktivasi yang tertunda dari Th1/Th17, dapat berkontribusi pada hasil yang lebih buruk (Pandita *et al.*, 2021).

c. Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK)

Sebuah laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa PPOK bukan merupakan faktor predisposisi untuk infeksi SARS-CoV-2, tetapi begitu pasien mengembangkan penyakit, mereka memiliki peningkatan risiko rawat inap, masuk ICU dan menerima ventilasi mekanis invasif. Dalam studi multisenter yang melibatkan 476 pasien Covid-19, prevalensi PPOK ditemukan berbeda secara signifikan menurut tingkat keparahan penyakit: terendah pada kelompok sedang (2,3%), menengah pada kelompok berat (5,6 %) dan tertinggi pada kelompok sakit kritis (15,7%). Demikian pula, dalam kohort dari 289 pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, 6,1% pasien yang tidak bertahan diamati dengan komorbiditas PPOK, jauh lebih tinggi daripada prevalensi PPOK 0,6% dari pasien yang tidak parah. Fungsi paru yang terbatas merupakan faktor pengganggu yang penting dan beberapa mekanisme molekuler. Ekspresi ACE2 yang lebih tinggi di saluran napas pada PPOK subjek berkorelasi negatif dengan

volume ekspirasi paksa dalam detik pertama (FEV1)%. Molekul lain yang terkait dengan infeksi SARS-CoV-2 juga dicatat dengan peningkatan ekspresi pada subjek PPOK, seperti SLC2A1 dalam sel epitel bronkial manusia, SLC7A5(CD98), ITGA3, dan ITGA6 dalam biopsi bronkial. Untuk ARDS, Secara konsisten ekspresi ACE2 di saluran napas bawah meningkat pada pasien PPOK dan berkurang pada pasien asma. Selain itu, dibandingkan dengan penderita asma, pasien dengan PPOK koeksistensi ditandai dengan penurunan sel T CD4+ dan CD8+ dan sel B dan peningkatan kadar sitokin termasuk faktor nekrosis tumor- α (TNF- α), IL-10, IL-8, dan IL-6 (Gao *et al.*, 2021).

d. Dsfsfsf

fgtr

Sehingga Peneliti berasumsi bahwa komorbid menjadi salah satu faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien dengan covid-19.

3. Jenis Kelamin Laki-laki

laki-laki menunjukkan kerentanan yang lebih tinggi terhadap tingkat keparahan infeksi dibandingkan perempuan. Penelitian Wang *et al.*, (2020) menemukan bahwa laki-laki merupakan faktor risiko independen untuk infeksi berat Covid-19. Peneliti berspekulasi tentang penyebab hubungan antara pria dan infeksi Covid-19 yang parah. Laki-laki dan perempuan berbeda dalam respon imunologi mereka terhadap patogen. Laki-laki umumnya menunjukkan kerentanan yang lebih tinggi, prevalensi, dan tingkat keparahan infeksi dibandingkan perempuan, termasuk infeksi saluran pernapasan. Diamati pada tikus yang terinfeksi *Mycoplasma pulmonis*, penyakit parenkim paru mencit

jantan selalu lebih serius daripada mencit betina. Di sisi lain, merokok umumnya lebih umum di kalangan pria daripada wanita. Meskipun tidak ada kesimpulan pasti yang dapat ditarik tentang hubungan antara merokok dan tingkat keparahan Covid-19, beberapa bukti menunjukkan bahwa merokok aktif dan peningkatan *regulasi ekspresi ACE-2* (reseptor masuk SARSCoV-2) di saluran udara bagian bawah dapat berkontribusi pada peningkatan risiko Covid-19 yang parah (Wang *et al.*, 2020).

Studi kohort yang dilakukan Vietzen *et al.*, (2021) sejalan dengan penelitian Wang *et al.*, (2020). Studi ini menemukan bahwa pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit dengan dan tanpa memerlukan perawatan ICU secara signifikan lebih cenderung laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pasien Covid-19 yang tidak dirawat di rumah sakit sehingga jenis kelamin laki-laki merupakan salah satu faktor risiko untuk Covid-19 yang parah (Vietzen *et al.*, 2021). Dalam penelitian kohor oleh Pandita *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa 259 pasien yang dengan penyakit Covid-19 yang parah, didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 138 pasien laki-laki (Pandita *et al.*, 2021). Hasil tinjauan sistematis yang dilakukan oleh Fang *et al.*, (2020) juga mendukung bahwa jenis kelamin laki-laki menunjukkan bukti epidemiologis yang kuat tentang hubungan dengan tingkat keparahan dan prognosis Covid-19 (Fang *et al.*, 2020). Kesimpulan dalam penelitian Liu *et al.*, (2020) juga menyebutkan bahwa jenis kelamin laki-laki berpengaruh dalam tingkat keparahan covid-19 terutama menuju fase kritis (Liu *et al.*, 2021).

Hasil penelitian dari artikel-artikel tersebut menjadi dasar asumsi peneliti bahwa jenis kelamin laki-laki menjadi salah satu faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien dengan Covid-19.

4. Temuan Laboratorium

Penurunan persentase *limfosit*, jumlah *trombosit*, jumlah *eosinofil*, *albumin*, tekanan parsial oksigen (PO₂), tekanan parsial karbon dioksida (PCO₂) dan peningkatan AST, LDH, *Alpha-hidroksibutirat dehidrogenase*, CRP, *d-dimer*, *fibrinogen* secara signifikan terjadi pada pasien dengan covid-19 yang parah dibandingkan dengan pasien dengan kondisi ringan sehingga temuan laboratorium juga termasuk faktor risiko yang dapat memengaruhi tingkat keparahan pasien Covid-19.

Penelitian Zheng *et al.*, (2021) mengemukakan bahwa penurunan persentase *limfosit*, jumlah *trombosit*, jumlah *eosinofil*, *albumin*, tekanan parsial oksigen (PO₂), tekanan parsial karbon dioksida (PCO₂) dan peningkatan AST, LDH, *Alpha-hidroksibutirat dehidrogenase*, CRP, *d-dimer*, *fibrinogen* secara signifikan terjadi pada pasien dengan covid-19 yang parah dibandingkan dengan pasien dengan kondisi ringan. Analisis menunjukkan bahwa peningkatan CRP, tekanan parsial oksigen kurang dari 80mmHg berkaitan dengan tingkat keparahan Covid-19. Obat antibakteri dan agen antijamur digunakan lebih sering pada pasien yang parah dibandingkan dengan pasien umum. *Kortikosteroid* sistematis, *imunoglobulin intravena*, plasma beku segar dan penggunaan *albumin serum* manusia berbeda secara signifikan antara pasien umum dan pasien berat. 100%

pasien pada pasien parah dirawat dengan inhalasi oksigen (Zheng *et al.*, 2021). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yao *et al.*, (2020) bahwa jumlah *leukosit* darah yang lebih tinggi, jumlah *neutrofil*, tingkat *protein C-reaktif* sensitif yang lebih tinggi, tingkat *D-dimer*, skor APACHE II, dan skor SOFA lebih sering terlihat pada pasien dengan penyakit Covid-19 yang parah, begitu pula jumlah *limfosit* dan kadar *albumin* yang lebih rendah. Selain itu, penelitian Yao *et al.*, (2020) menyebutkan bahwa *limfositopenia* saat masuk adalah faktor risiko lain yang terkait dengan infeksi Covid-19 yang parah berdasarkan penelitiannya. Jumlah *limfosit* absolut menurun ke tingkat yang sama rendahnya pada pasien yang hidup dan mati yang parah pada awal Covid-19, sementara jumlah *limfosit* absolut pada pasien mati yang parah tetap rendah sementara pasien yang masih hidup dengan kondisi parah tetap rendah dan pasien mengalami pemulihan *limfosit*. Selain itu, jumlah WBC dan neutrofil secara signifikan lebih tinggi pada pasien yang tidak bertahan hidup dengan Covid-19. *Limfositopenia* mungkin berfungsi sebagai biomarker untuk *imunosupresi* yang diinduksi infeksi dan merupakan faktor penting yang terkait dengan beberapa tingkat keparahan dan kematian penyakit. Penelitian telah menunjukkan bahwa *topenia limfositik* persisten pada sepsis memprediksi kematian awal dan akhir (Yao *et al.*, 2020).

Hasil tinjauan sistematis yang dilakukan oleh Zhang *et al.*, (2020) juga menyimpulkan bahwa perlu adanya perhatian khusus pada pasien dengan peningkatan jumlah *leukosit*, *ALT*, *AST*, peningkatan *LDH*, dan peningkatan *prokalsitonin* karena faktor-faktor ini memprediksi masuk ICU, *mortalitas*, dan

ARDS. Peningkatan ALT dan AST pada Covid-19 yang parah mungkin merupakan akibat dari kerusakan hati yang disebabkan oleh pengikatan langsung SARS-CoV-2 ke *angiotensin-converting enzyme 2- positive cholangiocytes*. Dalam analisis ini, LDH adalah satu satunya penanda yang secara signifikan memprediksi semua hasil yang diukur: masuk ICU, ARDS, dan kematian. LDH dilepaskan dari sel saat terjadi kerusakan pada membran sitoplasma dan tidak hanya sebagai metabolik tetapi juga biomarker prognostik pengawasan imun. LDH meningkatkan produksi laktat, yang mengarah pada peningkatan sel penekan kekebalan dan penghambatan sel *sitolitik*. Perubahan ini dapat melemahkan respons imun yang dipasang terhadap infeksi virus, yang mengakibatkan penyakit yang lebih parah (Zhang *et al.*, 2020).

Tinjauan sistematis juga dilakukan oleh Mudatsir *et al.*, (2021) yang menjelaskan bahwa tingkat limfosit dan hemoglobin yang lebih rendah; peningkatan kadar *leukosit*, *aspartat aminotransferase*, *alanine aminotransferase*, *kreatinin darah*, *nitrogen urea darah*, *troponin sensitivitas tinggi*, *kreatin kinase*, *protein C-reaktif sensitivitas tinggi*, *interleukin 6*, *D-dimer*, *feritin*, *laktat dehidrogenase*, dan *prokalsitonin*; dan tingkat *sedimentasi eritrosit* yang tinggi juga dikaitkan dengan Covid-19 yang parah. Covid-19 adalah penyakit baru, dan respons imun dari penyakit ini tidak sepenuhnya dipahami. Data penelitiannya menunjukkan bahwa peningkatan kadar *leukosit* dan *neutrofil* serta penurunan kadar limfosit dikaitkan dengan Covid-19 yang parah. Pada infeksi virus lain, seperti *influenza*, peningkatan kadar *leukosit* dan *neutrofil* berfungsi sebagai prediktor penting keparahan penyakit. Peran leukosit dalam patogenesis covid-19

saling bertentangan. Dalam kebanyakan kasus, infeksi virus telah diamati menyebabkan *leukopenia*. Selain itu, sebuah penelitian juga melaporkan bahwa *leukopenia* diamati pada frekuensi yang jauh lebih tinggi di antara pasien Covid-19 daripada di antara pasien non-Covid-19. Faktor utama yang tampaknya mempengaruhi tinjauan sistematisnya adalah terjadinya badai sitokin pada pasien. Pada Covid-19, ada reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh, yang mengakibatkan badai sitokin. Dalam kondisi ini, *leukosit* mungkin terlalu aktif, yang dapat menyebabkan pelepasan sitokin tingkat tinggi. Penelitian ini telah mengkonfirmasi bahwa badai sitokin secara signifikan terkait dengan Covid-19 yang parah. Teori yang mendasari peran neutrofil dalam Covid-19, seperti yang dilaporkan dalam penelitian ini, masih belum jelas. Spekulasi mungkin dikaitkan dengan keterlibatan perangkat *ekstraseluler neutrofil* (NET). Meskipun tidak ada penelitian yang menilai peran tepat NET dalam patogenesis Covid-19, peneliti tertentu berspekulasi bahwa SARS-CoV-2 dapat merangsang neutrofil untuk menghasilkan NET, mirip dengan beberapa patogen virus lainnya. Selanjutnya, ini dapat menyebabkan infiltrasi neutrofil di kapiler paru, kerusakan organ, dan perkembangan sindrom gangguan pernapasan akut. Tingkat *limfosit* yang rendah diamati pada pasien dengan Covid-19 parah dibandingkan dengan pasien dengan Covid-19 ringan. Dalam konteks mekanisme imunologi, hasil penelitian ini mungkin bertentangan. Subset limfosit diketahui memainkan peran penting dalam aksi melawan infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit oleh karena itu, tingkat limfosit yang bersirkulasi harus meningkat. Respon imunologis pada Covid-19 unik dan masih belum jelas. Namun, proposisi tertentu mungkin membantu

menggambarkan temuan ini. Pertama, virus *corona* menginfeksi sel manusia melalui reseptor ACE2. Karena reseptor ACE2 juga diekspresikan oleh *limfosit*, virus *corona* dapat memasuki *limfosit* dan menginduksi *apoptosis*. Kedua, mekanisme umpan balik antara *sitokin pro-inflamasi* (seperti IL-6) dan *limfosit*. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa peningkatan kadar sitokin pro-inflamasi berkorelasi dengan penurunan kadar *limfosit*. Selain itu, temuan ini juga mengkonfirmasi peningkatan yang signifikan dalam tingkat IL-6. Ketiga, reseptor ACE2, kadar *dehidrogenase*, dan *prokalsitonin*, ditemukan meningkat terutama pada pasien dengan covid-19 yang parah. Temuan ini konsisten dengan menunjukkan bahwa tingkat tinggi CRP, *laktat dehidrogenase*, dan ESR dikaitkan dengan hasil yang merugikan pada Covid-19. Meta-analisis ini juga mengkonfirmasi bahwa peningkatan kadar IL-6 diamati pada pasien dengan Covid-19 yang menunjukkan hasil klinis yang buruk. Oleh karena itu, kadar CRP, ESR, IL-6, *ferritin*, *prokalsitonin*, dan *laktat dehidrogenase* dapat menjadi penanda potensial untuk *evaluasi prognosis* covid-19. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kadar urea dan *kreatinin*, dan bukan penyakit ginjal kronis, dikaitkan dengan covid-19 yang parah, yang menunjukkan bahwa peradangan akut mungkin disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2. Selain itu, studi anatomi telah melaporkan peradangan ginjal yang signifikan pada pasien dengan Covid-19 yang parah. Mungkin ada dua mekanisme di mana SARS-CoV-2 menginduksi peradangan ginjal. Pertama, SARS-CoV-2 mungkin secara langsung menginfeksi sel epitel tubulus ginjal dan *podosit* melalui reseptor ACE2, yang memfasilitasi infeksi target sel tertentu oleh virus. Akibatnya, nekrosis tubular akut, *podositopati*,

mikroangiopati, dan *glomerulopati kolaps* dapat terjadi karena peradangan masif pada sel epitel tubulus ginjal dan *podosit*. Kedua, pengikatan antara reseptor SARS-CoV-2 dan ACE2 dapat mengaktifkan *angiotensin II* dan menginduksi produksi sitokin yang dapat menyebabkan *hiperkoagulopati* dan mikroangiopati, dan akhirnya menyebabkan *hipoksia* ginjal. Sebaliknya, sehubungan dengan fungsi hati, menunjukkan kadar enzim hati lebih tinggi pada pasien dengan Covid-19 yang parah. Penelitian ini telah menjelaskan bahwa reseptor ACE2 sangat diekspresikan dalam sel saluran empedu; oleh karena itu, infeksi sel-sel ini oleh virus corona dapat menyebabkan kelainan pada tingkat enzim hati. Namun, studi anatomi pada *spesimen biopsi* hati dari pasien dengan Covid-19 yang parah mengungkapkan bahwa *steatosis mikrovaskular* sedang dan aktivitas lobular dan portal ringan diamati (Mudatsir *et al.*, 2021b).

Studi yang dilakukan oleh Putra *et al.*, (2020) menyatakan bahwa hasil analisis gas darah menunjukkan hubungan antara derajat keparahan penyakit dan derajat oksigenasi yang dinilai dari PaO_2 , SaO_2 BGA, PaO_2/FiO_2 dan *original* PaO_2 . Pasien dengan saturasi $\leq 90\%$ cenderung didapatkan pada usia lebih tua, berjenis kelamin laki-laki, memiliki hipertensi dan lebih didapatkan adanya sesak secara klinis dibanding dengan nilai saturasi ≥ 90 . pada pasien yang terpasang ventilator mekanis didapatkan kecenderungan asidosis dan hiperkarbia dengan SaO_2 , *original* PaO_2 dan PaO_2/FiO_2 lebih rendah bermakna dibanding pada pasien yang tidak terventilator. Peningkatan $PaCO_2$ didapatkan pada seting ventilator dengan tidal volume rendah. Pada pasien tersebut didapatkan rasio ventilasi yang tinggi, merefleksikan peningkatan *dead space* dan menunjukkan

ketidakcukupan ventilasi pada pasien Covid-19 dengan ARDS. Strategi dengan tidal volume menengah (7-8 ml/kg/BB) diterapkan pada sebagai pasien untuk meningkatkan efisiensi paru untuk memperbaiki PaCO₂ (Putra, Listyoko and Christanto, 2020). Peneliti kemudian berasumsi bahwa temuan laboratorium menjadi salah satu faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien dengan Covid-19.

5. Manifestasi Klinis

Tinjauan sistematis yang dilakukan oleh Mudatsir *et al.*, (2021) menemukan bahwa dibandingkan dengan bentuk ringan, Covid-19 berat dikaitkan dengan gejala seperti *dispnea*, *anoreksia*, kelelahan, peningkatan laju pernapasan, dan tekanan darah sistolik yang tinggi (Mudatsir *et al.*, 2021b). Kelompok kritis ditandai dengan proporsi *dispnea* yang lebih tinggi (Liu *et al.*, 2021). Durasi demam juga dapat menjadi faktor risiko untuk prognosis pasien yang buruk. Penelitian Zheng *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa demam tinggi dikaitkan dengan risiko lebih tinggi terkena ARDS pada pasien dengan Covid-19. Analisis durasi demam dikaitkan dengan tingkat keparahan penyakit Covid-19 (Zheng *et al.*, 2021). Demam lebih sering dilaporkan pada pasien yang parah daripada pasien yang tidak parah. Penelitian lain yang melibatkan 52 pasien Covid-19 yang sakit kritis menunjukkan bahwa 98% menunjukkan demam. Demam lebih tinggi dari 38,5 °C saat masuk berkorelasi positif dengan tingkat keparahan dan kematian Covid-19. Pada pasien Covid-19 pediatrik, demam juga lebih sering diamati pada pasien dengan pneumonia dibandingkan tanpa pneumonia (50% vs 27,8%). Kadar IL-6 serum lebih tinggi pada pasien Covid-19 dengan demam

dibandingkan dengan mereka yang tidak demam. Hal tersebut menunjukkan bahwa demam mungkin disebabkan oleh peningkatan IL-6, sitokin utama yang berkontribusi terhadap badai sitokin (Gao *et al.*, 2021b). Selain itu, studi *cross-sectional* yang dilakukan oleh Hadi *et al.*, (2020) menemukan *anosmia* sebagai prediktor tingkat keparahan Covid-19. Anosmia menjadi salah satu gejala utama pada pasien dengan Covid-19. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa gejala *anosmia* sebagai *faktor protektif* terhadap terjadinya tingkat keparahan yang berat pada pasien Covid-19. Pada beberapa laporan menunjukkan bahwa *anosmia* muncul sebagai gejala pertama tanpa adanya gejala lain. Patofisiologi terjadinya *anosmia* pada pasien Covid-19 masih belum diketahui secara jelas. Terdapat hipotesis yang menyatakan *anosmia* pada pasien Covid-19 disebabkan oleh virus SARS-COV-2 yang merusak secara langsung pada jalur olfaktori (Hadi *et al.*, 2021).

Dalam studi kohort yang dilakukan oleh Pandita *et al.*, (2021) menemukan bahwa hipoksia dalam 24 jam pertama merupakan prediktor independen perkembangan penyakit parah. Demikian juga, adanya *takipnea* juga merupakan indikator awal perburukan selanjutnya. Hipotensi memprediksi kematian selain perburukan klinis. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pemantauan dini yang sering dari tanda-tanda vital, yang dapat memberikan petunjuk awal dari dekompensasi atau kematian yang akan datang. Pasien dengan kelainan tanda vital ini memerlukan pemantauan ketat (Pandita *et al.*, 2021). Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian tersebut sehingga peneliti berasumsi bahwa manifestasi klinis

menjadi salah satu faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien dengan Covid-19.

6. Obesitas

Secara global, baik obesitas maupun kekurangan berat badan merupakan risiko kesehatan yang parah untuk berbagai penyakit. Studi yang dilakukan oleh Malik *et al.*, (2020) secara sistematis memeriksa bukti yang muncul untuk mengidentifikasi hubungan antara indeks massa tubuh (BMI) dan hasil penyakit covid-19. BMI memainkan peran penting dalam tingkat keparahan covid-19 di semua kelompok umur, terutama individu yang lebih tua. Pasien Covid-19 dengan IMT tinggi memiliki risiko komplikasi medis dengan infeksi sedang hingga tinggi. Oleh karena itu, status kesehatan berkala mereka dari penyakit penyerta, misalnya, hipertensi dan diabetes, harus dievaluasi. Pada pasien AS, <60 tahun dan dengan BMI 30-40 lebih mungkin dirawat di perawatan akut dan kritis untuk individu dengan BMI <30 yang telah dilaporkan untuk pertama kalinya. Penelitian ini kemudian menegaskan bahwa BMI memainkan peran penting dalam infeksi dan tingkat keparahan Covid-19 di segala usia, terutama populasi lanjut usia. Pasien Covid-19 dengan BMI lebih tinggi harus ditinjau oleh para tenaga kesehatan untuk faktor risiko (Malik *et al.*, 2020).

Obesitas merupakan salah satu kondisi yang sering dikaitkan dengan peningkatan risiko infeksi bahkan kematian Covid-19. Obesitas mampu menimbulkan efek buruk pada fungsi paru-paru terlepas dari konsekuensi kardiovaskular, metabolik, dan trombotik. Obesitas memberi efek negatif terhadap *forced expiratory volume* maupun *forced vital capacity* paru-paru. Pada kondisi

obesitas ekstrem ($IMT > 40 \text{ kg/m}^2$), sulit dilakukan tindakan *imaging*, ventilasi, maupun rehabilitasi pada pasien-pasien ICU. Literatur tinjauan sistematis yang dipublikasikan pada tahun 2020 mengonfirmasi bahwa obesitas atau peningkatan IMT mampu meningkatkan risiko seseorang yang terinfeksi Covid-19 untuk membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Sejalan dengan data tersebut, beberapa *meta-analysis* juga menunjukkan bahwa pasien obesitas dengan Covid-19 mengalami peningkatan risiko untuk menimbulkan manifestasi klinis yang lebih berat. Didapatkan terjadi peningkatan risiko sebesar 76% pada orang yang mengalami obesitas terhadap manifestasi berat dari infeksi covid-19 dengan peningkatan hingga lebih dari dua kali lipat pada tingkat admisi ICU. Meskipun mekanisme yang mendasari hubungan tersebut masih merupakan hipotesis potensial yang mengaitkan pengaruh obesitas terhadap Covid-19, secara keseluruhan obesitas menurunkan *reserve kardiorespirasi*, mengakibatkan *disregulasi metabolik-inflamasi sistemik*, serta meningkatkan risiko terjadinya *trombosis*. Semua hal itu berpotensi memperburuk luaran Covid-19 (Haq *et al.*, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Foldi (2021) mengaitkan antara obesitas dan usia pasien Covid-19. Penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan antara obesitas dan hasil klinis yang buruk adalah tentu *multifaktorial* karena obesitas itu sendiri secara luas dikaitkan dengan beberapa faktor prognostik. Pada pasien covid-19, hipertensi, diabetes dan masalah *kardiovaskular* adalah komorbiditas yang paling umum yang mungkin berbagi jalur yang sama dengan obesitas terkait dengan sistem *renin-angiotensin (RAS)*. Obesitas memodulasi RAS aktivitas,⁴²

yang dapat menyebabkan proses patologis pada Covid-19. Dalam hubungan ini, BMI 35 ke atas merupakan faktor risiko untuk ICU masuk pada pasien berusia kurang dari 60 tahun, tetapi tidak pada orang tua mempresentasikan temuan serupa pada persyaratan IMV. Obesitas tampaknya meningkatkan kematian umum risiko pada usia yang lebih tua, tetapi pada tingkat yang lebih rendah daripada pada usia yang lebih muda (Földi *et al.*, 2020b) sehingga peneliti berasumsi bahwa obesitas menjadi salah satu faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien dengan Covid-19.

7. Perilaku Merokok

Pada umumnya, penyakit yang terutama memengaruhi paru-paru akan berisiko meningkat menjadi penyakit parah jika disertai dengan perilaku merusak paru-paru, seperti merokok, atau penyakit paru-paru yang sudah ada sebelumnya. Merokok menunjukkan pengaruh yang signifikan hanya dalam satu publikasi serta penyakit paru-paru yang tidak secara umum terdaftar sebagai faktor risiko untuk perkembangan penyakit yang parah atau fatal (Wolff *et al.*, 2021).

Merokok menjadi suatu predisposisi untuk terjadinya berbagai infeksi pernapasan akut yang disebabkan *mikroba pathogen* dimana rokok dapat mensupresi efek protektif dari epitel saluran napas, *makrofag alveolar*, sel *dendritik*, sel NK dan mekanisme *imun adaptif*. Selain mengganggu epitel napas sebagai lini pertama pertahanan paru dari patogen luar, asap rokok juga menyebabkan gangguan pada endositosis yaitu fungsi sel untuk pengambilan *nutrient*, *cell signaling* dan penginderaan lingkungan ekstraseluler dimana asap rokok mengubah fungsi beberapa jalur endositik yang penting pada epitel saluran

napas kecil. Asap rokok mengganggu endositosis yang dimediasi *clathrin* dan *fluid phase macropinocytosis* dimana endositosis yang dimediasi caveolin meningkat. *Uptake* virus influenza meningkat oleh karena paparan asap rokok dan hal ini mendukung konsep bahwa disregulasi endositosis akibat asap rokok berkontribusi terhadap infeksi paru pada perokok. Seorang perokok rentan terhadap infeksi virus pernapasan. Merokok dapat meningkatkan reseptor *Angiotensin-Converting Enzyme-2* (ACE2) yang telah dikenal baik merupakan reseptor untuk *Severe Acute Respiratory Coronavirus*. Identifikasi terhadap reseksi jaringan paru *post mortem* didapatkan peningkatan ekspresi ACE2 pada *Chronic Obstructive Pulmonary Disease* (COPD) dan perokok dengan paru yang masih sehat, walaupun temuan nomer dua didapatkan peningkatan ekspresi yang lebih sedikit, sementara tidak didapatkan peningkatan ekspresi ACE2 pada individu yang tidak merokok. Studi ini menggunakan 77 subjek pasien yang dilakukan rawat inap di rumah sakit menyatakan bahwa pada pasien dengan kategori ringan-sedang didapatkan 87,09% subjek tidak merokok, 6,45% subjek mantan perokok dan 6,45% subjek tidak merokok dimana pada kategori berat termasuk disini adalah pasien *critically ill* didapatkan 58,69% tidak merokok, 15,21% mantan perokok dan 26,08% perokok aktif. Analisis statistik menyatakan bahwa status merokok berhubungan dengan derajat keparahan penyakit dan mortalitas masing-masing. Beberapa studi sebelumnya menyatakan status merokok berhubungan dengan derajat keparahan penyakit pada pasien yang dilakukan rawat inap di ruang intensif. Selain itu, status merokok berhubungan dengan derajat keparahan dan mortalitas Covid-19 pada analisis luaran klinis

pasien “*unfavorable*” yaitu pasien meninggal atau kondisi menjadi semakin berat. Merokok meningkatkan derajat tingkat keparahan sekitar dua kali lipat (Listyoko, Djajalaksana and Astuti, 2020).

Merokok dikaitkan dengan ekspresi ACE2 yang lebih tinggi dalam sel epitel saluran napas, yang membuat seseorang rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2 (Gao *et al.*, 2021b). Mekanisme yang mengawali SARS-CoV-2 dan sel *host* adalah masuknya virus ke epitel jalan napas dan paru melalui penempelan *glikoprotein S (spike)* pada reseptor ACE-220. Up-regulasi ekspresi *gene pulmonary ACE-2* terdapat pada perokok dibandingkan non- perokok. Temuan peningkatan ekspresi ACE-2 pada perokok ini diperkirakan terdapat peningkatan risiko untuk viral binding dan risiko masuknya SARS-CoV dan SARS-CoV-2 pada perokok. Menilai efek rokok terhadap ekspresi ACE-2 pada satu sel epitel bronkial dan menyatakan rokok menyebabkan remodeling sel epitel bronkial dengan hilangnya *club cells* dan hiperplasia yang berlebihan dari sel goblet. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perokok memiliki risiko komplikasi infeksi Covid-19 berdasarkan profil ekspresi ACE-2 dimana berkontribusi pada kerentanan infeksi, derajat keparahan dan luaran terapinya. WHO menyatakan bahwa merokok berkaitan dengan peningkatan derajat keparahan dan mortalitas akibat Covid-19 yang dilakukan perawatan di rumah sakit meskipun kemungkinan terkait dengan penilaian derajat keparahan penyakit saat ini masih belum ada bukti untuk menilai perokok dengan Covid-19 yang dirawat di rumah sakit ditemukan dalam literature *peer-review*. WHO juga merekomendasikan untuk berhenti

merokok mengingat bahaya penggunaan tembakau dan paparan dari *second hand smoke* (Listyoko, Djajalaksana and Astuti, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Puebla Neira *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa beberapa mekanisme telah diusulkan untuk menggambarkan hubungan antara penggunaan tembakau dan Covid-19 yang parah. Asap tembakau merusak pembersihan mukosiliar, melemahkan respon imun bawaan dan adaptif serta meningkatkan risiko infeksi paru virus dan bakteri. Penggunaan tembakau telah terbukti meningkatkan kadar enzim pengubah angiotensin 2 (ACE2), reseptor unik yang digunakan oleh SARS-COV2 untuk memasuki sel inang. Sebagai alternatif, peran penggunaan tembakau yang berpotensi protektif dalam infeksi Covid-19 telah diteorikan. *Nikotin, alkaloid* psikoaktif yang sangat adiktif yang terkandung dalam produk tembakau, telah menunjukkan efek imunomodulator dan antiinflamasi. Penggunaan tembakau juga dikaitkan dengan peningkatan produksi *oksida nitrat* di paru-paru, yang mengakibatkan berkurangnya replikasi virus dan gangguan masuknya virus ke dalam sel inang. Nikotin juga telah menunjukkan efek perlindungan untuk model hewan ARDS, dan diperkirakan berpotensi menghambat *Interleukin-6*. (Puebla Neira *et al.*, 2021) sehingga peneliti berasumsi bahwa perilaku merokok menjadi salah satu faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien dengan covid-19.

8. Penghapusan NKG2C

Respon imun antivirus membatasi infeksi virus dan mempengaruhi tingkat keparahan penyakit virus. Di antaranya, respons sel pembunuh alami atau *natural killer cell* (NK) sangat penting dan signifikan berkontribusi pada pertahanan awal

terhadap infeksi virus pada paru. Aktivasi sel NK tergantung pada panel aktivasi *germline-encoded* atau reseptor penghambat. Sel NKG2C⁺ NK dicirikan oleh peningkatan ekspresi reseptor CD94/NKG2C yang aktif dan sebagai respons terhadap infeksi virus pada paru, sebagian dari sel NKG2C⁺ NK yang sangat poten ini bermigrasi ke paru-paru. Studi ini menunjukkan bahwa sel NKG2C⁺ NK pasien Covid-19 sangat lazim pada pasien dengan penyakit parah. Interaksi CD94/NKG2C dan ligan selulernya HLA-E selanjutnya memediasi respon sel NK sitotoksik dan pelepasan *pro-inflmolekul efektor inflamasi* sel NKG2C⁺ melawan sel yang terinfeksi virus. Oleh karena itu variasi dari gen KLRC2, yang mengkode reseptor NKG2C, mungkin memiliki dampak besar pada aktivasi sel NKG2C⁺ dan dengan demikian pada tingkat keparahan Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa penghapusan homozigot dan heterozigot dari gen KLRC2 ada di sekitar 4% dan 32,4% dari populasi kulit putih. Penghapusan homozigot dan heterozigot dari KLRC2 terkait dengan penurunan atau tidak adanya ekspresi reseptor NKG2C dan dikaitkan dengan tingkat keparahan infeksi virus yang berbeda (Vietzen *et al.*, 2021).

Studi kohort yang dilakukan oleh Vietzen *et al.*, (2021) memberikan bukti bahwa respons sel NK yang digerakkan oleh NKG2C mungkin menjadi faktor utama yang membatasi infeksi virus dan tingkat keparahan Covid-19 dan bahwa penghapusan reseptor NKG2C/CD94 yang diaktifkan dikaitkan dengan perkembangan Covid-19 yang parah. Jumlah sel NK signifikan tidak dapat dikurangi pada pasien dengan parah dibandingkan dengan mereka dengan Covid-19 ringan. Selain itu, sel NK dari pasien dengan Covid-19 yang parah

menunjukkan peningkatan ekspresi reseptor penghambat NKG2A⁺ yang terkait dengan kelelahan fungsional sel NK. Karena penghapusan reseptor pengaktif NKG2C terkait dengan penurunan atau kurangnya ekspresi reseptor NKG2C, ada kemungkinan bahwa penghapusan ini lebih lanjut dikaitkan dengan Covid-19 yang parah. Penelitian ini menjelaskan peran penting dari respons sel antivirus NKG2C⁺ NK yang kuat terhadap SARS-CoV-2 dan menyoroti bahwa respons sel NK yang dimediasi NKG2C⁺ signifikan berkontribusi untuk mencegah Covid-19 yang parah (Vietzen *et al.*, 2021).

Sel epitel saluran pernapasan adalah target utama masuknya virus karena ekspresi reseptor ACE2 seluler tingkat tinggi. Sebuah penelitian yang baru-baru ini diterbitkan menunjukkan peningkatan regulasi HLA-E dalam sel epitel paru-paru pada pasien Covid-19 sedang dan berat. Dengan demikian benar adanya bahwa respons sel NK yang dimediasi NKG2C mewakili mekanisme pertahanan kekebalan yang penting terhadap sel yang terinfeksi SARSCoV-2 di saluran pernapasan. Hebatnya, NKG2C juga diekspresikan pada sebagian kecil sel CD8⁺ T yang terdiferensiasi yang mungkin lebih lanjut mempengaruhi pertahanan terhadap SARS-CoV-2. Dalam penelitian Vietzen *et al.*, (2021) juga menemukan bahwa secara keseluruhan, peneliti tidak menemukan korelasi antara varian genetik dan pasien usia atau jenis kelamin dalam kelompok studi individu alel NKG2C pada gen KLRC2 dan varian sebagai faktor risiko independen untuk Covid-19 (Vietzen *et al.*, 2021).

Sehingga, berdasarkan hasil analisis diatas peneliti berasumsi bahwa penghapusan NKG2C menjadi salah satu faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan pasien dengan Covid-19.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian pustaka yaitu ada batasan bahasa pada artikel yang diinklusi, peneliti hanya mengambil artikel yang berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia.

D. Implikasi Penelitian

1. Pelayanan Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk tenaga kesehatan khususnya perawat agar memiliki pemahaman yang memadai bahwa terdapat beberapa faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19. Perawat sebagai tenaga kesehatan dapat menjadikan hasil temuan dalam penelitian ini sebagai landasan ilmiah dalam memberikan intervensi keperawatan yang tepat dengan mempertimbangkan beberapa faktor risiko yang telah terbukti berpengaruh dalam penigkatan risiko keparahan penyakit Covid-19.

2. Bidang Pendidikan

Hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu baik secara nasional maupun internasional terkait faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19 berdasarkan telaah literatur pada 12 artikel yang teridentifikasi dan dianalisis yaitu usia, komorbiditas (hipertensi, diabetes, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit kardiovaskular, penyakit serebrovaskular, penyakit ginjal kronis, dan keganasan), jenis kelamin laki-laki, temuan laboratorium, manifestasi klinis (*anosmia*, *dispnea*, durasi demam, *anoreksia*, kelelahan, peningkatan laju pernapasan, *hipoksia*, *takipnea* dan tekanan darah sistolik yang tinggi), obesitas, perilaku merokok dan penghapusan NKG2C. Faktor-faktor tersebut telah terbukti berpengaruh pada tingkat keparahan Covid-19.

B. Saran

Berdasarkan hasil telaah literatur mengenai faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19, terdapat beberapa saran sebagai upaya dalam mengembangkan hasil penelitian tersebut, yaitu:

1. Bagi Penelitian

Bagi peneliti yang selanjutnya akan melakukan penelitian mengenai faktor risiko yang memengaruhi tingkat keparahan Covid-19 sebaiknya melakukan penelitian dalam bentuk desain penelitian *restrospective*, baik itu *cohort study*, *case control study* atau *cross sectional study*. Hal tersebut sebagai upaya memperkaya jumlah penelitian dengan kasus yang nyata meskipun hanya melalui

sumber data sekunder dan tidak melakukan penelitian langsung dengan subjek penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menambah *database* pencarian literatur karena mungkin saja ada artikel pada *database* lain yang tidak terinklusi dalam penelitian ini. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk memperkuat hasil penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pelayanan Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan, masukkan/informasi untuk para tenaga kesehatan khususnya perawat dalam menyusun pemberian intervensi sehingga dapat mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi dan membutuhkan perawatan yang diprioritaskan untuk mencegah perkembangan penyakit. Selain itu, dapat pula digunakan sebagai informasi tambahan berupa pendidikan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan (khususnya Perawat) kepada pasien yang telah dinyatakan positif Covid-19 dan juga masyarakat umum mengenai kewaspadaan bagi masyarakat yang memiliki salah satu dari beberapa faktor risiko yang memengaruhi keparahan Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Adref, F., Syahrul, S. and Saleh, A. (2019) 'Intervensi Untuk Meningkatkan Status Nutrisi Pasien Hemodialisa: Systematic Review', *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 4(2), pp. 40–46.
- Amalia, I. (2020) 'Manifestasi Klinis COVID-19 pada Kulit', 47(9), p. 4.
- Chadeau-Hyam, M. *et al.* (2020) 'Risk factors for positive and negative COVID 19 tests: a cautious and in-depth analysis of UK biobank data', *International Journal of Epidemiology*, 0(0), p. 14.
- Du RH, Liang LR, Yang CQ, Wang W, Cao TZ, Li M, et al. Predictors of mortality for patients with COVID-19 pneumonia caused by SARS CoV-2: a prospective cohort study. *European Respiratory Journal*. 2020 May 1;55(5).
- Etikasari, B. *et al.* (2020) 'Sistem Informasi Deteksi Dini Covid-19', p. 8.
- Fang, X. *et al.* (2020) 'Epidemiological, comorbidity factors with severity and prognosis of COVID-19: a systematic review and meta-analysis', *Aging*, 12(13), pp. 12493–12503. doi:10.18632/aging.103579.
- Fathiyah Isbaniah and Agus Dwi Susanto (2020) 'Pneumonia Corona Virus Infection Disease-19 (COVID-19)', *Journal Of The Indonesian Medical Association*, 70(4), pp. 87–94. doi:10.47830/jinma-vol.70.4-2020-235.
- Földi, M. *et al.* (2020a) 'Obesity is a risk factor for developing critical condition in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis', *Obesity Reviews*, 21(10). doi:10.1111/obr.13095.
- Földi, M. *et al.* (2020b) 'Obesity is a risk factor for developing critical condition in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis', *Obesity Reviews*, 21(10). doi:10.1111/obr.13095.
- Gao, Y. *et al.* (2021) 'Risk factors for severe and critically ill COVID-19 patients: A review', *Allergy*, 76(2), pp. 428–455. doi:10.1111/all.14657.
- Grasselli, G. *et al.* (2020) 'Risk Factors Associated With Mortality Among Patients With COVID-19 in Intensive Care Units in Lombardy, Italy', p. 11.
- Hadi, W. *et al.* (2021) 'Anosmia Sebagai Faktor Prediktor Derajat Keparahan Ringan pada Pasien COVID-19 Rawat Inap', p. 8.

- Hairunisa, N. and Amalia, H. (2020) 'Review: penyakit virus corona baru 2019 (COVID-19)', *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, 3(2), pp. 90–100. doi:10.18051/JBiomedKes.2020.v3.90-100.
- Handayani, D. *et al.* (2020) 'Penyakit Virus Corona 2019', Vol. 40 No.2.
- Haq, A.D. *et al.* (2021) 'Faktor – Faktor Terkait Tingkat Keparahan Infeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Sebuah Kajian Literatur', *JIMKI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia*, 9(1), pp. 48–55. doi:10.53366/jimki.v9i1.338.
- Kasim, F. (2014) 'Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya', 3(1), p. 10.
- Kristanto, B. and Kosala, S.P. (2021) 'FAKTOR COMORBID COVID-19 DI INDONESIA SCOPYNG REVIEW', 9, p. 9.
- Levani, Y., Prastya, A.D. and Mawaddatunnadila, S. (2021a) 'Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi', 17(1), p. 14.
- Levani, Y., Prastya, A.D. and Mawaddatunnadila, S. (2021b) 'Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi', 17(1), p. 14.
- Listyoko, A.S., Djajalaksana, S. and Astuti, T. (2020) 'Hubungan Merokok Dengan Derajat Keparahan Dan Mortalitas Pasien COVID-19 Rawat Inap di RS Saiful Anwar Malang', *Medica Hospitalia : Journal of Clinical Medicine*, 7(1A), pp. 137–143. doi:10.36408/mhjcm.v7i1A.464.
- Liu, D. *et al.* (2020) 'Risk factors for developing into critical COVID-19 patients in Wuhan, China: A multicenter, retrospective, cohort study', *EClinicalMedicine*, 25, p. 100471. doi:10.1016/j.eclinm.2020.100471.
- Malik, V.S. *et al.* (2020) 'Higher body mass index is an important risk factor in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis', *Environmental Science and Pollution Research*, 27(33), pp. 42115–42123. doi:10.1007/s11356-020-10132-4.
- M.Nurs, N. (2020) *Literature Systematic Review Pada Pendidikan Kesehatan*. Surabaya: Fakultas keperawatan Universitas Airlangga.
- Morfi, C.W. (2020) 'Kajian Terkini CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)', *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia*, 1(1). doi:10.25077/jikesi.v1i1.13.
- Mudatsir, M. *et al.* (2021a) 'Predictors of COVID-19 severity: a systematic review', p. 26.

- Mudatsir, M. *et al.* (2021b) 'Predictors of COVID-19 severity: a systematic review', p. 26.
- Pandita, A. *et al.* (2021) 'Predictors of severity and mortality among patients hospitalized with COVID-19 in Rhode Island', *PLOS ONE*. Edited by M. Camacho-Rivera, 16(6), p. e0252411. doi:10.1371/journal.pone.0252411.
- Puebla Neira, D. *et al.* (2021) 'Smoking and risk of COVID-19 hospitalization', *Respiratory Medicine*, 182, p. 106414. doi:10.1016/j.rmed.2021.106414.
- Putra, N.P.P., Listyoko, A.S. and Christanto, A. (2020) 'PaO₂, SaO₂, dan Rasio PaO₂/FiO₂ Sebagai Prediktor Derajat Keparahan Pasien COVID-19 Rawat Inap', p. 7.
- Rhamdani, A., Ali Ramdhani, M. and Syakur Amin, A. (2014) 'Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach'.
- Rismala Dewi (2020) 'Tinjauan COVID-19 pada Anak: Infeksi hingga Terapi', *Journal Of The Indonesian Medical Association*, 70(8), pp. 182–189. doi:10.47830/jinma-vol.70.8-2020-297.
- Roeroe, P.A.L., Sedli, B.P. and Umboh, O. (2021) 'Faktor Risiko Terjadinya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada Penyandang Diabetes Melitus Tipe 2', *e-CliniC*, 9(1). doi:10.35790/ecl.v9i1.32301.
- Setiadi, A.P. *et al.* (2020) 'Tata Laksana Terapi Pasien dengan COVID-19: Sebuah Kajian Naratif', *Indonesian Journal of Clinical Pharmacy*, 9(1), p. 70. doi:10.15416/ijcp.2020.9.1.70.
- Shihab, M. Q. (2002) *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Supriatna, E. (2020) 'WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19) DALAM PANDANGAN ISLAM', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(6). doi:10.15408/sjsbs.v7i6.15247.
- Tjahyadi RM, Astuti T, Listyoko AS. COVID-19: Correlation Between CRP and LDH to Disease Severity and Mortality In Hospitalized COVID-19 Patients. *Medica Hospitalia: Journal of Clinical Medicine*. 2020 Aug 28;7(1A):144-9.
- Umakanthan, S. *et al.* (2020) 'Origin, transmission, diagnosis and management of coronavirus disease 2019 (COVID-19)', p. 6.
- Vietzen, H. *et al.* (2021) 'Deletion of the NKG2C receptor encoding KLRC2 gene and HLA-E variants are risk factors for severe COVID-19', *Genetics in Medicine*, 23(5), pp. 963–967. doi:10.1038/s41436-020-01077-7.

- Wang, J. *et al.* (2020) 'Epidemiologic Characteristics, Transmission Chain, and Risk Factors of Severe Infection of COVID-19 in Tianjin, a Representative Municipality City of China', *Frontiers in Public Health*, 8, p. 198. doi:10.3389/fpubh.2020.00198.
- Wathoni, L.M. nurul and Nursyamsu, N. (2020) 'TAFSIR VIRUS (FAUQA BA'ŪDHAH): KORELASI COVID-19 DENGAN AYAT-AYAT ALLAH', *el-'Umdah*, 3(1), pp. 63–84. doi:10.20414/el-umdah.v3i1.2154.
- Wolff, D. (2021) 'Risk factors for Covid-19 severity and fatality: a structured literature review', p. 14.
- Wolff, D. *et al.* (2021) 'Risk factors for Covid-19 severity and fatality: a structured literature review', *Infection*, 49(1), pp. 15–28. doi:10.1007/s15010-020-01509-1.
- World Health Organization (2020) *Corona disaie (COVID-19) Pandemic*.
- Xie J, Covassin N, Fan Z, Singh P, Gao W, Li G, et al. Association between hypoxemia and mortality in patients with COVID-19. In Mayo Clinic Proceedings. USA:Elsevier; 2020
- Yao, Q. *et al.* (2020) 'Retrospective study of risk factors for severe SARS-Cov-2 infections in hospitalized adult patients', *Polish Archives of Internal Medicine* [Preprint]. doi:10.20452/pamw.15312.
- Zhang, J.J.Y. *et al.* (2020) 'Risk Factors for Severe Disease and Efficacy of Treatment in Patients Infected With COVID-19: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-Regression Analysis', *Clinical Infectious Diseases*, 71(16), pp. 2199–2206. doi:10.1093/cid/ciaa576.
- Zheng, X. *et al.* (2021) 'Risk factors for the COVID-19 severity and its correlation with viral shedding: A retrospective cohort study', *Journal of Medical Virology*, 93(2), pp. 952–961. doi:10.1002/jmv.26367.

Lampiran I

JBI Critical Appraisal Checklist for Case Control Study

Jurnal 4: *Epidemiologic Characteristics, Transmission Chain, and Risk Factors of Severe Infection of COVID-19 in Tianjin, a Representative Municipality City of China*

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK TERSEDIA
1.	Apakah kelompok-kelompok tersebut sebanding selain adanya penyakit dalam kasus atau tidak adanya penyakit dalam kelompok kontrol?	√			
2.	Apakah kasus dan kontrol dicocokkan dengan tepat?	√			
3.	Apakah kriteria yang sama digunakan untuk identifikasi kasus dan kontrol?		√		
4.	Apakah keterpaparan diukur dengan cara yang standar, valid dan dapat diandalkan?	√			
5.	Apakah keterpaparan diukur dengan cara yang sama untuk kasus dan kontrol?	√			
6.	Apakah faktor perancu diidentifikasi?	√			
7.	Apakah strategi untuk menangani faktor perancu dinyatakan?	√			
8.	Apakah hasil dinilai dengan cara yang standar, valid dan dapat diandalkan untuk kasus dan kontrol?	√			
9.	Apakah periode eksposur minat cukup lama untuk menjadi bermakna?			√	
10.	Apakah analisis statistik yang tepat digunakan?	√			

Hasil telaah Keseluruhan : 80 % (Include/Dimasukkan)

Lampiran II

JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Secional studies

Jurnal 12 : Anosmia Sebagai Faktor Prediktor Derajat Keparahan Ringan pada Pasien Covid-19 Rawat Inap

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK TERSEDIA
1.	Apakah kriteria inklusi dalam sampel didefinisikan dengan jelas?	√			
2.	Apakah subjek penelitian dan latarnya dijelaskan secara rinci?	√			
3.	Apakah eksposur diukur dengan cara yang valid dan andal?	√			
4.	Apakah kriteria standar yang obyektif digunakan untuk mengukur kondisi?		√		
5.	Apakah faktor perancu teridentifikasi?	√			
6.	Apakah strategi untuk menangani faktor perancu dinyatakan?		√		
7.	Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?	√			
8.	Apakah analisis statistik yang tepat digunakan?	√			

Hasil telaah Keseluruhan : 75 % (Include/Dimasukkan)

Lampiran III

JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort

Jurnal 1 : *Risk factors for the Covid-19 severity and its correlation with viral shedding: A retrospective cohort study*

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK TERSEDIA
1.	Apakah kedua kelompok serupa dan direkrut dari populasi yang sama?	√			
2.	Apakah keterpaparan diukur dengan cara yang sama untuk menetapkan orang ke kelompok terpapar dan tidak terpapar?	√			
3.	Apakah eksposur diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?	√			
4.	Apakah faktor perancu diidentifikasi?	√			
5.	Apakah strategi untuk menangani faktor perancu dinyatakan?	√			
6.	Apakah kelompok / peserta bebas dari hasil pada awal studi (atau pada saat pemaparan)?		√		
7.	Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?	√			
8.	Apakah waktu tindak lanjut dilaporkan dan cukup lama untuk menghasilkan hasil?	√			
9.	Apakah tindak lanjut selesai, dan jika tidak, apakah alasan mangkir dijelaskan dan dieksplorasi?	√			
10.	Apakah strategi untuk menangani tindak lanjut yang tidak lengkap digunakan?	√			

Hasil telaah Keseluruhan : 90,90 % (Include/Dimasukkan)

Lampiran IV

JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort

Jurnal 2 : *A retrospective study of risk factors for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infections in hospitalized adult patients*

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK TERSEDIA
1.	Apakah kedua kelompok serupa dan direkrut dari populasi yang sama?	√			
2.	Apakah keterpaparan diukur dengan cara yang sama untuk menetapkan orang ke kelompok terpapar dan tidak terpapar?	√			
3.	Apakah eksposur diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?	√			
4.	Apakah faktor perancu diidentifikasi?	√			
5.	Apakah strategi untuk menangani faktor perancu dinyatakan?	√			
6.	Apakah kelompok / peserta bebas dari hasil pada awal studi (atau pada saat pemaparan)?		√		
7.	Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?	√			
8.	Apakah waktu tindak lanjut dilaporkan dan cukup lama untuk menghasilkan hasil?	√			
9.	Apakah tindak lanjut selesai, dan jika tidak, apakah alasan mangkir dijelaskan dan dieksplorasi?	√			
10.	Apakah strategi untuk menangani tindak lanjut yang tidak lengkap digunakan?	√			
11.	Apakah analisis statistik yang tepat digunakan?	√			

Hasil telaah Keseluruhan : 90,90 % (Include/Dimasukkan)

Lampiran V

JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort

Jurnal 3 : *Deletion of the NKG2C receptor encoding KLRC2 gene and HLA-E variants are risk factors for severe Covid-19*

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK TERSEDIA
1.	Apakah kedua kelompok serupa dan direkrut dari populasi yang sama?	√			
2.	Apakah keterpaparan diukur dengan cara yang sama untuk menetapkan orang ke kelompok terpapar dan tidak terpapar?	√			
3.	Apakah eksposur diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?	√			
4.	Apakah faktor perancu diidentifikasi?				√
5.	Apakah strategi untuk menangani faktor perancu dinyatakan?				√
6.	Apakah kelompok / peserta bebas dari hasil pada awal studi (atau pada saat pemaparan)?	√			
7.	Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?	√			
8.	Apakah waktu tindak lanjut dilaporkan dan cukup lama untuk menghasilkan hasil?	√			
9.	Apakah tindak lanjut selesai, dan jika tidak, apakah alasan mangkir dijelaskan dan dieksplorasi?			√	
10.	Apakah strategi untuk menangani tindak lanjut yang tidak lengkap digunakan?				√
11.	Apakah analisis statistik yang tepat digunakan?	√			

Hasil telaah Keseluruhan : 63,63 % (Include/Dimasukkan)

Lampiran VI

JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort

Jurnal 7 : *Predictors of severity and mortality among patients hospitalized with COVID-19 in Rhode Island*

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK TERSEDIA
1.	Apakah kedua kelompok serupa dan direkrut dari populasi yang sama?	√			
2.	Apakah keterpaparan diukur dengan cara yang sama untuk menetapkan orang ke kelompok terpapar dan tidak terpapar?	√			
3.	Apakah eksposur diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?	√			
4.	Apakah faktor perancu diidentifikasi?	√			
5.	Apakah strategi untuk menangani faktor perancu dinyatakan?	√			
6.	Apakah kelompok / peserta bebas dari hasil pada awal studi (atau pada saat pemaparan)?	√			
7.	Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?	√			
8.	Apakah waktu tindak lanjut dilaporkan dan cukup lama untuk menghasilkan hasil?	√			
9.	Apakah tindak lanjut selesai, dan jika tidak, apakah alasan mangkir dijelaskan dan dieksplorasi?			√	
10.	Apakah strategi untuk menangani tindak lanjut yang tidak lengkap digunakan?				√
11.	Apakah analisis statistik yang tepat digunakan?	√			

Hasil telaah Keseluruhan : 81,81 % (Include/Dimasukkan)

Lampiran VII

JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort

Jurnal 9 : *Smoking and risk of COVID-19 hospitalization*

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK TERSE DIA
1.	Apakah kedua kelompok serupa dan direkrut dari populasi yang sama?	√			
2.	Apakah keterpaparan diukur dengan cara yang sama untuk menetapkan orang ke kelompok terpapar dan tidak terpapar?	√			
3.	Apakah eksposur diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?	√			
4.	Apakah faktor perancu diidentifikasi?	√			
5.	Apakah strategi untuk menangani faktor perancu dinyatakan?		√		
6.	Apakah kelompok / peserta bebas dari hasil pada awal studi (atau pada saat pemaparan)?	√			
7.	Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?	√			
8.	Apakah waktu tindak lanjut dilaporkan dan cukup lama untuk menghasilkan hasil?	√			
9.	Apakah tindak lanjut selesai, dan jika tidak, apakah alasan mangkir dijelaskan dan dieksplorasi?			√	
10.	Apakah strategi untuk menangani tindak lanjut yang tidak lengkap digunakan?	√			
11.	Apakah analisis statistik yang tepat digunakan?	√			

Hasil telaah Keseluruhan : 81,81 % (Include/Dimasukkan)

Lampiran VIII

JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort

Jurnal 11 : *Risk factors for developing into critical COVID-19 patients in Wuhan, China : Amulticenter, retrospective, cohortstudy*

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK TERSEDIA
1.	Apakah kedua kelompok serupa dan direkrut dari populasi yang sama?	√			
2.	Apakah keterpaparan diukur dengan cara yang sama untuk menetapkan orang ke kelompok terpapar dan tidak terpapar?	√			
3.	Apakah eksposur diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?	√			
4.	Apakah faktor perancu diidentifikasi?	√			
5.	Apakah strategi untuk menangani faktor perancu dinyatakan?	√			
6.	Apakah kelompok / peserta bebas dari hasil pada awal studi (atau pada saat pemaparan)?	√			
7.	Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?	√			
8.	Apakah waktu tindak lanjut dilaporkan dan cukup lama untuk menghasilkan hasil?	√			
9.	Apakah tindak lanjut selesai, dan jika tidak, apakah alasan mangkir dijelaskan dan dieksplorasi?			√	
10.	Apakah strategi untuk menangani tindak lanjut yang tidak lengkap digunakan?				√
11.	Apakah analisis statistik yang tepat digunakan?	√			

Hasil telaah Keseluruhan : 81,81 % (Include/Dimasukkan)

Lampiran IX

Checklist Telaah Kritis JBI Untuk systematic reviews and research syntheses (Systematic reviews)

Jurnal 5: *Epidemiological, comorbidity factors with severity and prognosis of COVID-19: a systematic review and meta-analysis*

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak jelas	Tidak tersedia
1	Apakah pertanyaan review dinyatakan dengan jelas eksplisit?			√	
2	Apakah kriteria inklusi sesuai untuk pertanyaan?	√			
3	Apakah strategis pencarian sudah jelas?	√			
4	Apakah sumber dan sumber daya yang digunakan untuk mencari studi memadai?	√			
5	Apakah kriteria untuk menilai studi sesuai?	√			
6	Apakah penilaian kritis dilakukan oleh dua atau lebih pengulas secara independen?	√			
7	Apakah metode untuk meminimalkan kesalahan dalam data?	√			
8	Apakah metode yang digunakan untuk menggabungkan studi sesuai?	√			
9	Apakah kemungkinan bias publikasi dinilai?	√			
10	Apakah rekomendasi untuk kebijakan dan/atau praktek didukung oleh data yang dilaporkan?	√			
11	Apakah arahan khusus untuk penelitian baru sudah sesuai?	√			

Hasil telaah Keseluruhan : 90,90 % (Include/Dimasukkan)

Lampiran X

Checklist Telaah Kritis JBI Untuk systematic reviews and research syntheses (Systematic reviews)

Jurnal 6: *Risk Factors for Severe Disease and Efficacy of Treatment in Patients Infected With COVID-19: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-Regression Analysis*

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak jelas	Tidak tersedia
1	Apakah pertanyaan review dinyatakan dengan jelas eksplisit?	√			
2	Apakah kriteria inklusi sesuai untuk pertanyaan?	√			
3	Apakah strategis pencarian sudah jelas?	√			
4	Apakah sumber dan sumber daya yang digunakan untuk mencari studi memadai?	√			
5	Apakah kriteria untuk menilai studi sesuai?	√			
6	Apakah penilaian kritis dilakukan oleh dua atau lebih pengulas secara independen?	√			
7	Apakah metode untuk meminimalkan kesalahan dalam data?	√			
8	Apakah metode yang digunakan untuk menggabungkan studi sesuai?	√			
9	Apakah kemungkinan bias publikasi dinilai?	√			
10	Apakah rekomendasi untuk kebijakan dan/atau praktek didukung oleh data yang dilaporkan?		√		
11	Apakah arahan khusus untuk penelitian baru sudah sesuai?	√			

Hasil telaah Keseluruhan : 90,90 % (Include/Dimasukkan)

Lampiran XI

Checklist Telaah Kritis JBI Untuk systematic reviews and research syntheses (Systematic reviews)

Jurnal 10: *Obesity is a risk factor for developing critical condition in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis*

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak jelas	Tidak tersedia
1	Apakah pertanyaan review dinyatakan dengan jelas eksplisit?	√			
2	Apakah kriteria inklusi sesuai untuk pertanyaan?	√			
3	Apakah strategis pencarian sudah jelas?	√			
4	Apakah sumber dan sumber daya yang digunakan untuk mencari studi memadai?	√			
5	Apakah kriteria untuk menilai studi sesuai?	√			
6	Apakah penilaian kritis dilakukan oleh dua atau lebih pengulas secara independen?			√	
7	Apakah metode untuk meminimalkan kesalahan dalam data?	√			
8	Apakah metode yang digunakan untuk menggabungkan studi sesuai?	√			
9	Apakah kemungkinan bias publikasi dinilai?	√			
10	Apakah rekomendasi untuk kebijakan dan/atau praktek didukung oleh data yang dilaporkan?	√			
11	Apakah arahan khusus untuk penelitian baru sudah sesuai?	√			

Hasil telaah Keseluruhan : 90,90 % (Include/Dimasukkan)

Lampiran XII

Checklist Telaah Kritis JBI Untuk systematic reviews and research syntheses (Systematic reviews)

Jurnal 8 : *Higher body mass index is an important risk factor in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis*

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak jelas	Tidak tersedia
1	Apakah pertanyaan review dinyatakan dengan jelas eksplisit?	√			
2	Apakah kriteria inklusi sesuai untuk pertanyaan?	√			
3	Apakah strategis pencarian sudah jelas?	√			
4	Apakah sumber dan sumber daya yang digunakan untuk mencari studi memadai?		√		
5	Apakah kriteria untuk menilai studi sesuai?	√			
6	Apakah penilaian kritis dilakukan oleh dua atau lebih pengulas secara independen?			√	
7	Apakah metode untuk meminimalkan kesalahan dalam data?	√			
8	Apakah metode yang digunakan untuk menggabungkan studi sesuai?	√			
9	Apakah kemungkinan bias publikasi dinilai?	√			
10	Apakah rekomendasi untuk kebijakan dan/atau praktek didukung oleh data yang dilaporkan?	√			
11	Apakah arahan khusus untuk penelitian baru sudah sesuai?				√

Hasil telaah Keseluruhan : 72,72 % (Include/Dimasukkan)

Lampiran XIII

1. Bukti pencarian literature pada 4 *database* berdasarkan kata kunci:

The screenshot shows the PubMed website interface. At the top, there is a navigation bar with links for COVID-19 Information, Public health information (CDC), Research information (NIH), SARS-CoV-2 data (NCBI), and Prevention and treatment information (HHS). Below this is the NIH National Library of Medicine logo and a search bar containing the query: "tor Risiko AND Severity OR Critical Illnes OR Severitas OR Tingkat Keparahan". The search results page displays 244,135 results. A graph shows the number of results by year from 1957 to 2022. A notification box suggests using COVID-19 filters from PubMed Clinical Queries. A message indicates that the term "Keparahan" was not found in PubMed, suggesting alternative terms like "Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus OR Virus Korona AND Risk Factors OR factors".

The screenshot shows the ScienceDirect website interface. The search bar contains the query: "factor at Risk OR Predictor AND Severity OR Critical Illnes OR Severitas". The search results page displays 1,000,000+ results, sorted by relevance. The results are refined by years (2022, 2021, 2020) and article types (Review articles, Research articles, Encyclopedia, Book chapters). The first result is a review article titled "SARS 2 human coronavirus (COVID -19, SARS CoV2)" by R. B. McFee. The second result is a short communication titled "The COVID-19 and Influenza 'Twindemic': Barriers to Influenza Vaccination and Potential Acceptance of SARS-CoV2 Vaccination in African Americans" by Keith C. Ferdinand, Saihanaran Nedunchezian, and Tina K. Reddy. A sign-in button is visible at the bottom of the search results.

Covid-19 OR SARS-CoV2

https://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2020&q=Covid-19+OR+SARS-CoV2+OR+Coronavirus+OR+Virus+Korona+AND+Risk+Factors+OR+Factor+at+Risk+OR+Predictor+OR+Factor+OR+Severity

This page is in Indonesian. Would you like to translate it? [Translate](#) [Nope](#) [Never translate Indonesian](#)

Google Scholar Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus OR Virus Korona

Articles About 59 results (0.04 sec) My profile My library

Any time
 Since 2021
 Since 2020
 Since 2017
 Custom range...

Sort by relevance
 Sort by date

include patents
 include citations

Create alert

Tip: Search for English results only. You can specify your search language in Scholar Settings.

Hubungan Merokok dengan Derajat Keparahan dan Mortalitas Pasien COVID-19 Rawat Inap di RS Saiful Anwar Malang [HTML] rskariadi.co.id
 AS Listyoko, S Dajalaksana... - Medica ... 2020 - medichospitalia rskariadi.co.id
 ... Prost K, Yip L, Williams V, Leis JA, Mubareka S. Severity of coronavirus respiratory tract ... The impact of COPD and smoking history on the severity of COVID-19: A systemic review ... Perrotta F, Matera MG, Cazzola M, Bianco A. Severe respiratory SARS-CoV2 infection Does ACE2 ...
 ☆ 99 Related articles All 2 versions 88

Faktor Risiko Terjadinya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada Penyandang Diabetes Mellitus Tipe 2 [PDF] unsrat.ac.id
 PAL Reoreo, BP Sedi, Q Umbob... - e-Clinic, 2021 - ejournal.unsrat.ac.id
 ... Respon Kesiapsiagaan Menghadapi Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV ... Pathophysiology, transmission, diagnosis, and treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19 ... H. Gunawardana B, Manatunge J. Transmission of COVID-19 virus by droplets ...
 ☆ 99 Related articles 88

Intervensi Penanganan Covid-19 di Indonesia Melalui Strategi Pengendalian Tembakau [PDF] osf.io
 ED Sihaloha - 2021 - osf.io
 ... komunal dan sosial [3] Penggunaan bersama akan meningkatkan risiko penularan virus COVID-19 di antara ... et al. Risk Factors of Fatal Outcome in Hospitalized Subjects With Coronavirus Disease 2019 From a ... [31] Kementerian Kesehatan RI. "Data Covid-19 Indonesia," ...
 ☆ 99 All 7 versions 88

Anosmia Sebagai Faktor Prediktor Derajat Keparahan Ringan Pada Penderita COVID-19 Rawat Inap di Rumah Sakit Dr. M. Djamil Husein, Cileks, Surabaya [PDF] idionline.org

Garuda - Garba Rujukan D

https://garuda.ristekbrin.go.id/documents?q=Covid-19+OR+SARS-CoV2+OR+Coronavirus+OR+Virus+Korona+AND+Risk+Factors+OR+Factor+at+Risk+OR+Predictor+OR+Factor+OR+Severity

Title Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus OR Virus Korona: Publisher Name

Downloadable PDF Only

Search

Filter By Year

0000

From To

Filter Reset

Found 0 documents

Search Covid-19 OR SARS-CoV2 OR Coronavirus OR Virus Korona AND Risk Factors OR Factor at Risk OR Predictor OR Faktor Risiko AND Severity OR

2. Bukti 12 artikel yang dianalisis:

Jurnal 1:

conducted am ... Page 17

Risk factors for the COVID-19 severity and its correlation with viral shedding: A retrospective cohort study.
166
Cite Zheng X, Chen J, Deng L, Fang Z, Chen G, Ye D, Xia J, Hong Z.
J Med Virol. 2021 Feb;93(2):952-961. doi: 10.1002/jmv.26367. Epub 2020 Sep 16.
Share PMID: 32725915 [Free PMC article.](#)
This study is aim to explore **risk factors for COVID-19 severity** in the early stage and the correlation between the viral shedding and **COVID-19 severity**. ...We found **severe acute respiratory syndrome** ...

Prediction of the Severity of the Coronavirus Disease and Its Adverse Clinical Outcomes.
167
Cite Liu X, Shi S, Xiao J, Wang H, Chen L, Li J, Han K.
Jpn J Infect Dis. 2020 Nov 24;73(6):404-410. doi: 10.7883/yokenJID.2020.194. Epub 2020 May 29.
Share PMID: 32475880 [Free article.](#)
This study aims to investigate blood and biochemical laboratory findings in patients with **severe coronavirus disease 2019 (COVID-19)** and to develop a joint **predictor** for predicting the likelihood of **severe COVID-19** an ...

Assessment and management of the risk of SARS-CoV-2 infection in an IVF laboratory.
168
Cite Maggiulli R, Giancani A, Fabbizi G, Dovere L, Tacconi L, Amendola MG, Cimadomo D, Ubaldi FM, Rienzi L.
Reprod Biomed Online. 2020 Sep;41(3):385-394. doi: 10.1016/j.rbmo.2020.06.017. Epub 2020 Jun 27.
Share PMID: 32693991 [Free PMC article.](#)
Some procedures were also revised, aiming to increase staffs awareness and caution. **CONCLUSIONS:** Standard laboratory protocols are insufficient to face a **virus** whose transmission is aerosol mediated. The measures outlined in this FMEA should thus be considered not ...

[Back to Top](#)

Jurnal 2

technologies to prevent the concerning rapid spread of **coronavirus disease (COVID-19)** and maximize safety during the pandemic. ...Thus, computer scientists ... Page 12

A retrospective study of risk factors for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infections in hospitalized adult patients.
115
Cite Yao Q, Wang P, Wang X, Qie G, Meng M, Tong X, Bai X, Ding M, Liu W, Liu K, Chu Y.
Pol Arch Intern Med. 2020 May 29;130(5):390-399. doi: 10.20452/pamw.15312. Epub 2020 Apr 24.
Share PMID: 32329978
INTRODUCTION: **Coronavirus disease 2019 (COVID-19)** caused by **severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)** infection spread worldwide. **OBJECTIVES:** The aim of the study was to ...

Risk factors for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection in pregnant women.
116
Cite Sakowicz A, Ayala AE, Ukeje CC, Witting CS, Grobman WA, Miller ES.
Am J Obstet Gynecol MFM. 2020 Nov;2(4):100198. doi: 10.1016/j.ajogmf.2020.100198. Epub 2020 Aug 17.
Share PMID: 32838274 [Free PMC article.](#)
BACKGROUND: **Risk factors for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2** infection in pregnancy remain poorly understood. ...**CONCLUSION:** Many **risk factors for severe acute respiratory** ...

Factors associated with the duration of hospitalisation among COVID-19 patients in Vietnam: A survival analysis.
117
Cite Thai PQ, Toan DTT, Son DT, Van HTH, Minh LN, Hung LX, Toan NV, Hoat LN, Luong DH, Khue LN, Khoa NT, Huong LT.
Epidemiol Infect. 2020 Jun 10;148:e114. doi: 10.1017/S0950268820001259.
Share PMID: 32517822 [Free PMC article.](#)
The goal of this paper is to identify **factors** associated with the median duration of hospital stays of **COVID-19** patients during the second **COVID-19** surge that hit Vietnam from 5 March to 8 April 2020

Jurnal 3

Page 38

381 **Deletion of the NKG2C receptor encoding KLRC2 gene and HLA-E variants are risk factors for severe COVID-19.**
Cite: Vietzen H, Zoufaly A, Traugott M, Aberle J, Aberle SW, Puchhammer-Stockl E. Genet Med. 2021 May;23(5):963-967. doi: 10.1038/s41436-020-01077-7. Epub 2021 Jan 26.
Share: PMID: 33500568 [Free PMC article.](#)
PURPOSE: Host genetic variants may contribute to **severity of COVID-19**. NKG2C(+) NK cells are potent antiviral effector cells, potentially limiting the extent of **SARS-CoV-2** infections. ...RESULTS: Especially the KLRC2(del), and at a lower ...

382 **Clinical and radiological findings of adult hospitalized patients with community-acquired pneumonia from SARS-CoV-2 and endemic human coronaviruses.**
Cite: Baek MS, Cha MJ, Kim MC, Chung JW, Kim WY, Choi H, Choi SH. PLoS One. 2021 Jan 14;16(1):e0245547. doi: 10.1371/journal.pone.0245547. eCollection 2021.
Share: PMID: 33444422 [Free PMC article.](#)
Endemic human **coronaviruses** (HCoVs) and **severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)** are members of the family Coronaviridae. Comparing the findings of the infections caused by these **viruses** ...

383 **A SARS-CoV-2 Cluster in an Acute Care Hospital.**
Cite: Klompas M, Baker MA, Rhee C, Tucker R, Fiumara K, Griesbach D, Bennett-Rizzo C, Salmasian H, Wang R, Wheeler N, Gallagher GR, Lang AS, Fink T, Baez S, Smole S, Madoff L, Goralnick E, Resnick A, Pearson M, Britton K, Sinclair J, Morris CA. Ann Intern Med. 2021 Jun;174(6):794-802. doi: 10.7326/M20-7567. Epub 2021 Feb 9.
Share: PMID: 33556277 [Free PMC article.](#)

Jurnal 4

Page 22

emerged in China during late **2019** and resulted in the **coronavirus disease 2019 (COVID-19)** ...

Page 23

221 **Epidemiologic Characteristics, Transmission Chain, and Risk Factors of Severe Infection of COVID-19 in Tianjin, a Representative Municipality City of China.**
Cite: Wang J, Li Z, Cheng X, Hu H, Liao C, Li P, Lu J, Chen Z. Front Public Health. 2020 May 20;8:198. doi: 10.3389/fpubh.2020.00198. eCollection 2020.
Share: PMID: 32671007 [Free PMC article.](#)
This study was performed to describe the epidemiologic characteristics of **coronavirus disease 2019 (COVID-19)** and explore **risk factors for severe** infection. ...Further investigation is needed to confirm the **risk factors** ...

222 **Development and validation of a risk stratification model for screening suspected cases of COVID-19 in China.**
Cite: Ma J, Shi X, Xu W, Lv F, Wu J, Pan Q, Yang J, Yu J, Cao H, Li L. Aging (Albany NY). 2020 Jul 29;12(14):13882-13894. doi: 10.18632/aging.103694. Epub 2020 Jul 29.
Share: PMID: 32727933 [Free PMC article.](#)
How to quickly identify high-**risk** populations is **critical** to epidemic control. We developed and validated a **risk** prediction model for screening **SARS-CoV-2** infection in suspected cases with an epidemiological history. ...This study provide ...

223 **Immunological alternation in COVID-19 patients with cancer and its implications on mortality.**
Cite: Cai G, Gao Y, Zeng S, Yu Y, Liu X, Liu D, Wang Y, Yu R, Desai A, Li C, Gao Q.

Jurnal 5

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Covid-19%20OR%20SARS-CoV2%20OR%20Coronavirus%20OR%20Virus%20Korona%20AND%20Risk%20Factors%20OR%20Facto...

Cite Lippi G, Plebani M.
Clin Chim Acta. 2020 Jun;505:190-191. doi: 10.1016/j.cca.2020.03.004. Epub 2020 Mar 4.
Share PMID: 32145275 Free PMC article. No abstract available.

Page 2

Page 3

Epidemiological, comorbidity factors with severity and prognosis of COVID-19: a systematic review and meta-analysis.
21
Cite Fang X, Li S, Yu H, Wang P, Zhang Y, Chen Z, Li Y, Cheng L, Li W, Jia H, Ma X.
Share Aging (Albany NY). 2020 Jul 13;12(13):12493-12503. doi: 10.18632/aging.103579. Epub 2020 Jul 13.
PMID: 32658868 Free PMC article.
A systematic review and meta-analysis was conducted in an attempt to systematically collect and evaluate the associations of epidemiological, comorbidity factors with the severity and prognosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19). ...O ...

Epidemiological, clinical and virological characteristics of 74 cases of coronavirus-infected disease 2019 (COVID-19) with gastrointestinal symptoms.
22
Cite Jin X, Lian JS, Hu JH, Gao J, Zheng L, Zhang YM, Hao SR, Jia HY, Cai H, Zhang XL, Yu GD, Xu KJ, Wang XY, Gu JQ, Zhang SY, Ye CY, Jin CL, Lu YF, Yu X, Yu XP, Huang JR, Xu XL, Ni Q, Yu CB, Zhu B, Li YT, Liu J, Zhao H, Zhang X, Yu L, Guo YZ, Su JW, Tao JJ, Lang GJ, Wu XX, Wu WR, Qu TT, Xiang DR, Yi P, Shi D, Chen Y, Ren Y, Qiu YQ, Li LJ, Sheng J, Yang Y.
Share Gut. 2020 Jun;69(6):1002-1009. doi: 10.1136/gutjnl-2020-320926. Epub 2020 Mar 24.
PMID: 32213556 Free PMC article.
OBJECTIVE: The SARS-CoV-2-infected disease (COVID-19) outbreak is a major threat to human beings. ...Sputum production and increased lactate dehydrogenase/glucose levels were risk factors for severe/critical type. Bio ...

Jurnal 6

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Covid-19%20OR%20SARS-CoV2%20OR%20Coronavirus%20OR%20Virus%20Korona%20AND%20Risk%20Factors%20OR%20Facto...

Asthma and COVID-19 in children: A systematic review and call for data.
30
Cite Castro-Rodriguez JA, Forno E.
Share Pediatr Pulmonol. 2020 Sep;55(9):2412-2418. doi: 10.1002/ppul.24909. Epub 2020 Jul 6.
PMID: 32558360 Free PMC article.
RATIONALE: Whether asthma constitutes a risk factor for coronavirus disease-2019 (COVID-19) is unclear. Here, we aimed to assess whether asthma, the most common chronic disease in children, is associated with higher COVID-19 ...

Page 3

Page 4

Risk Factors for Severe Disease and Efficacy of Treatment in Patients Infected With COVID-19: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-Regression Analysis.
31
Cite Zhang JY, Lee KS, Ang LW, Leo YS, Young BE.
Share Clin Infect Dis. 2020 Nov 19;71(16):2199-2206. doi: 10.1093/cid/ciaa576.
PMID: 32407459 Free PMC article.
The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic spread globally in the beginning of 2020. ...Pooled rates of intensive care unit (ICU) admission, mortality, and acute respiratory distress syndrome (ARDS) were 10.9%, 4.3%, and 18.4 ...

COVID-19 and the Heart.
32
Cite Rojulpote C, Gonuguntla K, Patil S, Bhattaru A, Bravo PE.
Share Colomb Med (Cal). 2020 Jun 30;51(2):e4320. doi: 10.25100/cm.v51i2.4320.
PMID: 33012891 Free PMC article. Review.
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) which causes coronavirus disease 2019 (COVID-19) has resulted in a global health crisis. ...In this article, we aimed to discuss ...

Jurnal 7

Case of MIS-C occurring 16 weeks ...

Page 88

Predictors of severity and mortality among patients hospitalized with COVID-19 in Rhode Island.

876

Cite Pandita A, Gillani FS, Shi Y, Hardesty A, McCarthy M, Aridi J, Farmakiotis D, Chiang SS, Beckwith CG. PLoS One. 2021 Jun 18;16(6):e0252411. doi: 10.1371/journal.pone.0252411. eCollection 2021. PMID: 34143791 [Free PMC article.](#)

Share

BACKGROUND: In order for healthcare systems to prepare for future waves of **COVID-19**, an in-depth understanding of clinical **predictors** is essential for efficient triage of hospitalized patients. ...In the first 24 hours, **respiratory** symptoms (aOR 7.0, 9 ...

Pulmonary fibrosis and COVID-19: the potential role for antifibrotic therapy.

877

Cite George PM, Wells AU, Jenkins RG. Lancet Respir Med. 2020 Aug;8(8):807-815. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30225-3. Epub 2020 May 15. PMID: 32422178 [Free PMC article.](#) [Review.](#)

Share

In December, **2019**, reports emerged from Wuhan, China, of a **severe acute respiratory** disease caused by **severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)**. ...Furthermore, several l ...

SARS-COV-2 infection and lung tumor microenvironment.

878

Cite Malkani N, Rashid MU. Mol Biol Rep. 2021 Feb;48(2):1925-1934. doi: 10.1007/s11033-021-06149-8. Epub 2021 Jan 23. PMID: 33486674 [Free PMC article.](#) [Review.](#)

Share

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is an **acute respiratory syndrome**, reported at the end of **2019**

Back to Top

Show all X

jurnal faktor kritis...pdf 1422-Article Text...pdf Failed - Network error

9:56 PM

Jurnal 8

Page 12

Page 11

Higher body mass index is an important risk factor in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis.

111

Cite Malik VS, Ravindra K, Attri SV, Bhadada SK, Singh M. Environ Sci Pollut Res Int. 2020 Nov;27(33):42115-42123. doi: 10.1007/s11356-020-10132-4. Epub 2020 Jul 24. PMID: 32710359 [Free PMC article.](#)

Share

Online literature databases (e.g., Google Scholar, PubMed, MEDLINE, EMBASE, Scopus, Medrxiv and BioRxiv) were screened following standard search strategy having the appropriate keyword such as "Obesity", "Underweight", "BMI", "Body Mass Index", "**2019-nCov**", "**COVI** ...

Ethnic and socioeconomic differences in SARS-CoV-2 infection: prospective cohort study using UK Biobank.

112

Cite Niedzwiedz CL, O'Donnell CA, Jani BD, Demou E, Ho FK, Celis-Morales C, Nicholl BJ, Mair FS, Welsh P, Sattar N, Pell JP, Katikireddi SV. BMC Med. 2020 May 29;18(1):160. doi: 10.1186/s12916-020-01640-8. PMID: 32466757 [Free PMC article.](#)

Share

BACKGROUND: Understanding of the role of ethnicity and socioeconomic position in the **risk** of developing **SARS-CoV-2** infection is limited. We investigated this in the UK Biobank study. ...CONCLUSIONS: Some minority ethnic groups have a higher **risk** ...

A Comprehensive Review of Coronavirus Disease 2019: Epidemiology, Transmission, Risk Factors, and International Responses.

113

Cite Li H, Burm SW, Hong SH, Ghayda RA, Kronbichler A, Smith L, Koyanagi A, Jacob L, Lee KH, Shin JI. Yonsei Med J. 2021 Jan;62(1):1-11. doi: 10.3349/yjmj.2021.62.1.1. PMID: 33381929 [Free PMC article.](#) [Review.](#)

Share

5:41 PM

Jurnal 9

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Covid-19%20OR%20SARS-CoV2%20OR%20Coronavirus%20OR%20Virus%20Korona%20AND%20Risk%20Factors%20OR%20... Update

Save Email Send to Clear selection Page 118

Risk factors for severe disease in patients admitted with COVID-19 to a hospital in London, England: a retrospective cohort study.
1,177
Cite Goodall JW, Reed TAN, Ardissino M, Bassett P, Whittington AM, Cohen DL, Vaid N. Epidemiol Infect. 2020 Oct 13;148:e251. doi: 10.1017/S0950268820002472.
Share PMID: 33046155 Free PMC article.
COVID-19 has caused a major global pandemic and necessitated unprecedented public health restrictions in almost every country. Understanding **risk factors for severe** disease in hospitalised patients is **critical** as the pandemic progresses. ...

COVID-19 and diabetes from IDF MENA region.
1,178
Cite Belkhadir J. Diabetes Res Clin Pract. 2020 Aug;166:108277. doi: 10.1016/j.diabres.2020.108277. Epub 2020 Jun 24.
Share PMID: 32592837 Free PMC article.
The whole world are facing the current **COVID-19** pandemic, the most serious health crisis in modern times. ...Even if it is admitted that diabetes with its comorbidity represents a high **risk factor for severe** forms and mortality, the health conse ...

A Physician's Guide for Workers' Return to Work During COVID-19 Pandemic.
1,179
Cite Baptista MC, Burton WN, Pawlecki B, Pransky G. J Occup Environ Med. 2021 Mar 1;63(3):199-220. doi: 10.1097/JOM.0000000000002118.
Share

obesitas jurnal ter...pdf jurnal faktor kritis...pdf 1422-Article Text-...pdf Failed - Network error Show all

10:34 PM

Jurnal 10

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Covid-19%20OR%20SARS-CoV2%20OR%20Coronavirus%20OR%20Virus%20Korona%20AND%20Risk%20Factors%20OR%20... Update

obesitas jurnal ter...pdf jurnal faktor kritis...pdf 1422-Article Text-...pdf Failed - Network error Show all

Obesity is a risk factor for developing critical condition in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis. Page 91
909
Cite Földi M, Farkas N, Kiss S, Zádori N, Vánca S, Szakó L, Dembrowsky F, Solymár M, Bartalis E, Szakács Z, Hartmann P, Pár G, Eröss B, Molnár Z, Hegyi P, Szentesi A; KETLAK Study Group. Obes Rev. 2020 Oct;21(10):e13095. doi: 10.1111/obr.13095. Epub 2020 Jul 19.
Share PMID: 32686331 Free PMC article.
The disease course of **COVID-19** varies from asymptomatic infection to **critical** condition leading to mortality. Identification of prognostic **factors** is important for prevention and early treatment. We aimed to examine whether obesity is a **risk** ...

Elevated interleukin-6 and adverse outcomes in COVID-19 patients: a meta-analysis based on adjusted effect estimates.
910
Cite Zhang P, Shi L, Xu J, Wang Y, Yang H. Immunogenetics. 2020 Oct;72(8):431-437. doi: 10.1007/s00251-020-01179-1. Epub 2020 Oct 17.
Share PMID: 33067641 Free PMC article.
This study aimed to evaluate the association of interleukin-6 (IL-6) level with the poor outcomes in **coronavirus** disease 2019 (**COVID-19**) patients by utilizing a meta-analysis based on adjusted effect estimates. ...Meta-regression indicated that study d ...

31,883 results Show more Jump to page

obesitas jurnal ter...pdf 335/972 KB, 7 mins left jurnal faktor kritis...pdf 1422-Article Text-...pdf Failed - Network error Show all

10:17 PM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Risiko yang Memengaruhi Tingkat Keparahan Covid-19: *Telaah Literatur*” bernama lengkap Nur Ainah Abni Abdullah, Nim: 70300117007, anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan bapak Abdullah dan Ibunda Rostigi yang lahir pada tanggal 12 November 1999 di Takalar.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di SD Negeri No.166 Inpres Bontorita yang bertempat di Kelurahan Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, selanjutnya pada tahun 2011 sampai 2014 penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Takalar, kemudian pada tahun 2014 sampai 2017 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Takalar, dan pada tahun 2017 itu juga penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan. Selama menyandang sebagai mahasiswa penulis memasuki beberapa organisasi, yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan.