

**STRATEGI INTERVENSI YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK  
MENGATASI MASALAH KESEHATAN MENTAL EMOSIONAL ANAK  
DI MASA PANDEMI COVID 19: *LITERATURE REVIEW***



**Diajukan kepada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar untuk memperoleh gelar  
Sarjana Keperawatan**

Oleh :  
**SITTI AISYAH A**  
**70300117042**

**PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2020/2021**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Strategi Intervensi dalam Menangani Masalah Kesehatan Mental Anak di Masa Pandemi Covid 19: *Literature Review*" yang disusun oleh Sitti Aisyah A, NIM: 70300117042, mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hariJ umat, tanggal 27 Agustus 2021 M, bertepatan dengan 18 Muharram 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 27 Agustus 2021 M  
18 Muharram 1443 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hasnah., S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Hj. Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Darussalam, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Muh. Anwar Hafid. S.Kep.,Ns., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:



Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP.198007012006042002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan hasil penelitian yang berjudul “*Strategi Intervensi dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Mental Emosional pada Anak di Masa Pandemi*”. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai sosok teladan bagi seluruh umat islam khususnya generasi muda islam yang kelak akan menjadi generasi muda islam yang cerdas dan berkompeten.

Penyusunan hasil penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana keperawatan (S.Kep) pada program studi keperawatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Bersamaan dengan ini, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan Wakil Dekan I Dr. Hj. Gemy Nastiny Handayany., S.Si., M.Si., Apt., Wakil Dekan II Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., Wakil Dekan III Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
3. Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns, M.Kes dan Dr. Hasnah, S.kep., Ns., M.Kes selaku ketua dan sekretaris program studi S1 keperawatan yang telah

banyak meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi selama penulis menempuh pendidikan baik itu berupa ilmu, nasehat serta pelayanan sampai penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

4. Dr. Arbianingsih, S.Kep, Ns, M.Kep dan Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns, M.Kes selaku pembimbing 1 dan 2 saya yang telah dengan sabar meluangkan begitu banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga mampu sampai pada tahap ini.
5. Hj. Sysnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J dan Prof. Darussalam, M.Ag selaku Munaqisy I dan II yang tanpa lelah memberikan saram, arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen program studi Keperawatan, bagian Tata Usaha dan Akademik beserta para staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah membantu dalam kelengkapan berkas, memberikan ilmu, arahan, motivasi dan nasehat selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan keperawatan.
7. Kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda H. Muh. Adam dan Ibunda Hj. Kasmawati yang telah membesarkan dengan penuh cinta tanpa pernah mengenal lelah untuk selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk saya.
8. Kepada teman-teman seperjuangan jurusan Keperawatan angkatan 2017, terkhusus untuk saudara-saudara Keperawatan A yang selalu memberi semangat dan memotivasi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya, karya tulis ini masih sebuah karya sederhana yang jauh dari kata sempurna. Mengingat penulis sebagai manusia biasa. Kritik serta saran penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan karya ini dimasa mendatang.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Samata, 16 Agustus 2021

Penulis

**Sitti Aisyah A**

**70300117042**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

**Nama : Sitti Aisyah A**

**NIM : 70300117042**

**Judul : Strategi Intervensi yang dapat Digunakan Untuk Mengatasi Masalah Kesehatan Mental Emosional Anak di Masa Pandemi: *Literature Review***

---

Hadirnya pandemi Covid-19 menyebabkan kekhawatiran dan kepanikan global, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam menekan penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan *lockdown* dimana semua kegiatan dilaiihkan secara daring dari rumah, termasuk kegiatan belajar mengajar. Meskipun sistem pembelajaran tetap berlangsung secara daring dari rumah, penerapan *lockdown* ini juga dapat menimbulkan masalah kesehatan emosional pada anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat strategi intervensi yang bisa dilakukan untuk menangani masalah kesehatan mental emosional anak di masa pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yang dilakukan pada bulan juni-juli melalui lima *database* dan kata kunci berdasarkan MeSH. Hasil penelusuran artikel ditemukan 834 artikel yang kemudian di enkusi dan diperiksa kelayakannya menggunakan *critical appraisal* dari JBI sehingga diperoleh sebelas artikel dengan delapan jenis intervensi yang efektif dan dapat digunakan untuk menangani masalah kesehatan mental emosional pada anak di masa pandemi.

**Keywords:** *Child, Adolescents, Intervention, Mental Disorder, Anxiety, Stress, Depression, Mood Disorder, COVID-19*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tinjauan Pustaka.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Kesehatan Mental .....	11
B. Tinjauan Umum Pandemi .....	16
C. Tinjauan Umum Covid 19.....	17

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	24
B. Pengumpulan Data .....	24
C. Pemetaan dan Seleksi Data .....	25
D. Teknik Analisa Data .....	27
E. Rekomendasi.....	29
<b>BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Karakteristik Studi .....	30
B. Karakteristik Responden.....	44
C. Hasil dan Analisis .....	46
D. Pembahasan.....	56
E. Keterbatasa Penelitian.....	73
F. Implikasi Penelitian .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	7
Tabel 3.1 Kata Kunci <i>Literature Review</i> .....	25
Tabel 3.2 Metode PICOS .....	25
Tabel 4.1 Hasil Pencarian Artikel Berdasarkan <i>Database</i> .....	30
Tabel 4.2 Sintesis Grid.....	311

## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Alur Penelusuran Artikel .....	27
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. <i>Checklist Critical Appraisal JBI</i> .....	76
---	----



## DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

COVID 19	: <i>Corona Virus Disease 19</i>
WHO	: <i>World Healt Organization</i>
CDC	: <i>Centre for Desease Control</i>
KSP	: Kantor Staf Presiden
KPPA	: Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Anak
HIMPSI	: Himpunan Psikologi Indonesia
CBT	: <i>Cognitive Behavioural Therapy</i>
EFT	: <i>Emotional Freedom Technique</i>
ADHD	: <i>Attention Deficit Hiperactivity Disorder</i>
ODD	: <i>Oppositional-Defiant Disorder</i>
ASD	: <i>Autistic Spectrum Disorder</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
MeSH	: <i>Medical Subject heading</i>
JBI	: <i>Joanna Brigs Institute</i>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Eksisnya virus yang mudah menyebar, *Corona Virus Disease* atau yang lebih dikenal sebagai Covid 19, menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan global, termasuk di Indonesia (Tabi'in, 2020). Pada Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa wabah penyakit virus corona baru yang terjadi di Provinsi Hubei, Cina sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat yang merupakan Keprihatinan Internasional. Dua bulan kemudian, pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan wabah virus Corona COVID-19 sebagai pandemic (ILO, 2020)

Kebijakan pemberlakuan *lock down* sebagai antisipasi penyebaran Covid 19, berakibat siswa dan sekolah di seluruh dunia harus beradaptasi dan beralih menggunakan metode belajar di rumah. Dampak negatif pada anak sekolah pada saat mereka kembali ke sekolah menimbulkan perasaan takut, cemas dan kecanggungan beradaptasi sosial dengan temannya. Dampak kecemasan berakibat anaknya menolak berintraksi sosial (Firdaus dkk, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan Giallonardo et al., (2020) tentang dampak karantina selama masa pandemi, kita harus mengantisipasi bahwa pandemi dan tindakan pembatasan kegiatan akan meningkatkan tingkat stres, kecemasan dan depresi, serta gejala terkait stres lainnya (Roziika dkk, 2020). Gangguan mental, emosi dan perilaku merupakan masalah yang serius dalam perkembangan intelektual anak serta dapat menurunkan produktivitas, kualitas hidup, dan tumbuh kembang anak (Wulandari & Dilfera, 2019).

Telah diindikasikan bahwa dibandingkan dengan orang dewasa, pandemi ini dapat terus meningkatkan konsekuensi kerugian jangka panjang pada anak-anak dan remaja (Shen dkk., 2020). Sifat dan tingkat dampak pada anak bergantung pada faktor kerentanan seperti usia, status pendidikan, kebutuhan khusus, kondisi kesehatan mental sebelumnya, kurang mampu secara ekonomi dan anak/orang tua dikarantina karena infeksi atau takut terinfeksi (Singh dkk, 2020).

Berdasarkan data epidemiologi global, sekitar 12-13% anak dan remaja menderita gangguan mental (Kyaga dkk, 2013), dan sekitar 14 juta anak usia 15 tahun ke atas atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia mengalami gejala-gejala depresi dan kecemasan (Kemenkes RI, 2016). Merujuk pada data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, didapatkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional pada remaja berumur 15 tahun ke atas sebesar 9,8%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 6% (Raudhati dkk, 2020).

Hasil studi yang dilakukan di Jerman oleh Ravens-Sieberer et al. (2021) pada anak dan remaja 7-17 tahun yang dilakukan dari bulan Mei-Juni 2021 melalui *online survey* yang kemudian hasilnya dibandingkan dengan data dari studi sebelum pandemic COVID-19 di Jerman. Dua pertiga dari anak-anak dan remaja dilaporkan sangat terbebani oleh pandemi COVID-19. Mereka mengalami lebih banyak masalah kesehatan mental ((17,8% vs 9,9%) dan tingkat kecemasan yang lebih tinggi (24,1% vs 14,9%) dibandingkan sebelum pandemi (Ravens-Sieberer et al., 2021).

Di Bangladesh sendiri telah dilakukan penelitian terhadap dampak COVID-19 pada kesehatan mental anak-anak selama *lockdown* di Bangladesh. Studi *online* ini melibatkan 384 orang tua yang memiliki

setidaknya satu anak berusia antara 5-15 tahun. Anak-anak diklasifikasikan ke dalam empat kelompok di mana 43% anak mengalami gangguan mental di bawah ambang batas (rerata *Major Depressive Disorder* (MDD)-10; 2,8), 30,5% mengalami gangguan mental ringan (rata-rata MDD-10; 8,9), 19,3% menderita sedang (rata-rata MDD- 10; 15,9), dan 7,2% anak menderita gangguan berat (rata-rata MDD-10; 25,2) (Yeasmin et al., 2020).

Penelitian di Italia yang dilakukan secara *online* pada kelompok usia 14-20 tahun menunjukkan peningkatan reaksi stress selama Pandemi COVID-19 di Puncak Wabah di Italia. Hasil penelitian menunjukkan 28,9% di antaranya menunjukkan reaksi stres sedang hingga tinggi selama puncak pandemi dan 5,8% remaja melaporkan lima atau enam reaksi stres dengan tingkat frekuensi yang sangat tinggi (Nocentini et al., 2021).

Studi dari Canada oleh Nwachukwu et al. (2020) yang juga dilakukan secara *online* yang melibatkan berbagai kategori usia menunjukkan pada kategori usia <20 tahun memiliki skor persentase tertinggi dari kategori usia lainnya. Pada kategori usia <20 tahun yang mengalami stres sedang atau tinggi 96,3%, gangguan kecemasan umum 65,5% dan gangguan depresi mayor 66,8% (Nwachukwu et al., 2020).

Studi dari China yang dilakukan secara *daring*, melaporkan peningkatan tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Studi yang dilakukan oleh Xie dkk (2020) menemukan bahwa 23% dari anak-anak kelas 2 sampai 6 memiliki gejala depresi dan 19% memiliki gejala kecemasan selama pandemic (Xie et al., 2020). Sementara studi lainnya dilakukan oleh Zhou dkk (2020) yang memperoleh data bahwa pada anak dengan rentang usia 12-18 tahun 44% menunjukkan gejala depresi, 37% menunjukkan kecemasan, dan 31% memiliki kedua jenis gejala tersebut (Zhou et al., 2020).

Dua studi dari India (2020) dengan anak-anak dan remaja berusia 5-18 tahun dan satu studi dari Brasil (2020) dengan anak-anak dan remaja dari 6 hingga 12 tahun, menggaris bawahi dampak negatif pandemi pada kesehatan mental anak-anak. Mereka menemukan bahwa anak-anak dan remaja mengalami tekanan psikologis yang parah seperti kekhawatiran, ketidakberdayaan, kecemasan dan ketakutan (Ravens-Sieberer et al., 2020).

Hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah Jepang juga menunjukkan hasil yang serupa, yaitu 72% anak-anak Jepang merasakan stres akibat Covid-19. Hal serupa juga terjadi di Amerika Serikat. Investigasi yang dilakukan oleh *Centre for Disease Control* (CDC) menunjukkan 7,1% anak-anak dalam kelompok usia 3 hingga 17 tahun telah didiagnosis dengan kecemasan, dan sekitar 3,2% pada kelompok usia yang sama menderita depresi (Sindonews.com, 2020).

Studi *multycountry* yang dilakukan di 3 negara Italia, Spanyol dan Portugis dengan rentang usia anak 3-18 tahun menunjukkan perbedaan tingkat kecemasan dan depresi berbeda-beda antar Negara. Persentase tingkat kecemasan anak di Spanyol lebih tinggi yaitu 56%, dibandingkan dengan Italia (34,1%) dan Portugal (26,5%). Persentase untuk tingkat depresi juga menunjukkan skor lebih tinggi di Spanyol yaitu 26,4%, dibandingkan dengan Italia (19,8%) dan Portugal (8,5%) (Orgilés et al., 2021).

Di Indonesia sendiri, berdasarkan survei penilaian cepat yang dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 (BNPB, 2020) menunjukkan bahwa 47% anak Indonesia merasa bosan di rumah, 35% merasa khawatir ketinggalan pelajaran, 15% anak merasa tidak aman, 34% anak merasa takut terkena penyakit termasuk Covid-19 meski sudah ada di rumah, 20% anak merindukan teman-temannya, dan 10% anak merasa khawatir tentang kondisi

ekonomi keluarga. Data lain menyebutkan 11% alami kekerasan fisik karena proses belajar yang tidak lazim, dan 62% anak alami kekerasan verbal (Sindonews.com, 2020).

Layaknya fenomena gunung es, masalah kesehatan mental sering kali dianggap sebagai mimik yang bersifat pribadi. Masih kurangnya rasa ketertarikan masyarakat kepada mereka yang mempunyai masalah kesehatan mental. Kesehatan mental yang tidak ditangani segera dapat menjadi beban dan masalah kesehatan baru yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak sebagai generasi penerus bangsa (Wulandari & Dilfera, 2019).

Dalam konteks khusus seperti masa pandemic, gangguan kesehatan mental berdampak pada tingkat emosi positif yang rendah, kepuasan hidup menurun, stigma negatif, diskriminasi sosial terhadap orang yang dianggap tertular Covid-19, melemahnya hubungan sosial, menyebabkan permusuhan, memicu timbulnya gangguan kesehatan lain atau bahkan penggunaan obat-obatan berbahaya (Ross dkk, 2020).

Melihat dampak negatif yang diakibatkan oleh tingginya tingkat kecemasan akibat pandemi yang dialami oleh anak, maka diperlukan adanya upaya-upaya yang dapat membantu siswa untuk mereduksi masalah kesehatan mental yang dialaminya (Suranata & Bimoe, 2020).

Pada penghujung bulan April 2020, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA), Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, PT Telkom, Infomedia, dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) menawarkan layanan bantuan konsultasi psikologi kesehatan jiwa atau Sejiwa. Layanan ini ditujukan untuk

membantu menangani potensi ancaman tekanan psikologi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 (Winurini, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Palmer et al. (2020) yang mengambil yoga sebagai intervensi alternatif dalam mengurangi gejala kecemasan dan depresi pada anak dengan teknik tinjauan sistematis (*systematic review*) menunjukkan hasil yang menunjukkan bahwa yoga mampu mengurangi kecemasan dan depresi pada anak (Palmer et al., 2020).

Metode intervensi *Cognitive Behavior Therapy Counseling* (CBT) yang telah diteliti oleh Fitria dkk (2020) dengan menggunakan metode studi literatur menyimpulkan bahwa konseling CBT merupakan intervensi yang tepat untuk mengatasi gangguan kecemasan. Dengan konseling CBT, membuat responden mampu mengubah cara berpikir dari yang awalnya maladaptive menjadi lebih adaptif (Fitria dkk, 2020).

Intervensi dengan menggunakan metode *Emotional Freedom Technique* (EFT) yang telah diteliti oleh Roziika (2020) menunjukkan bahwa penerapan metode EFT cukup efisien diterapkan sebagai alternatif untuk menurunkan stress di masa pandemi COVID-19, dapat mengurangi tingkat stres dan menghilangkan energi-energi negatif yang dapat menyebabkan kecemasan, takut, hingga stress (Roziika dkk, 2020).

Dari beberapa fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait "*Strategi Intervensi dalam Mengatasi Gangguan Mental dan Emosional pada Anak*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa statement yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut, maka peneliti ingin menganalisis "Apa strategi intervensi



yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah kesehatan mental emosional pada anak di masa pandemi Covid 19?"

### C. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Aurora James-Palmer, Ellen Z. Anderson, Lori Zucker, Yana Kofman dan Jean-Francois Daneault (2020).	<i>Yoga as an Intervention for the Reduction of Symptoms of Anxiety and Depression in Children and Adolescents: A Systematic Review</i>	Penelitian ini menggunakan metode <i>systematic review</i> dengan pencarian literatur melalui database ilmiah untuk studi eksperimental yang menilai perubahan gejala kecemasan dan /atau depresi pada remaja yang mengikuti intervensi yoga.	Hasil penelitian menunjukkan studi yang menilai kecemasan dan depresi, 58% menunjukkan penurunan pada kedua gejala, sementara 25% menunjukkan penurunan hanya pada kecemasan. Selain itu, 70% studi yang menilai kecemasan saja menunjukkan peningkatan dan 40% studi yang hanya menilai depresi menunjukkan peningkatan.
2	Firdaus, Andini Hardiningrum, Siti Nurjannah (2021).	Penurunan Kecemasan Pada Anak Sekolah dengan Membaca Alquran Selama Pandemic Covid 19	Penelitian ini menggunakan metode <i>pra-eksperimental</i> dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner.	Hasil penelitian ini menunjukkan hasil uji <i>Wilcoxon Sign Rank Test</i> diperoleh $\rho = 0,000$ , sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh membaca Alquran terhadap penurunan kecemasan pada anak sekolah saat pandemi covid 19.
3	Hanna Oktasya Ross, Megawatul Hasanah, Fitri	Implementasi Konsep <i>Sahdzan</i> (Sabar dan	Metode yang digunakan mengumpulkan data	Hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
	Ayu Kusumaningrum (2020)	<i>Huznudzan) Sebagai Upaya Perawatan Kesehatan Mental di Masa Pandemi Covid-19</i>	dalam penelitian ini adalah studi pustaka ( <i>library research</i> ).	implementasi konsep sabar dan <i>huznudzan</i> dapat menjadi salah satu upaya perawatan kesehatan mental selama masa pandemi Covid-19.
4	Sophie Soklaridis, Elizabeth Lin, Yasmin Lalani, Terri Rodak, Sanjeev Sockalingam (2020)	<i>Mental health interventions and supports during COVID-19 and other medical pandemics: A rapid systematic review of the evidence</i>	Penelitian ini menggunakan metode tinjauan sistematis cepat terhadap intervensi kesehatan mental selama pandemi medis, dengan memanfaatkan beberapa database sebagai sumber pencarian literatur.	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 2 intervensi dari total 16 studi kesehatan mental yang dapat mengatasi gejala sisa kesehatan mental, yaitu intervensi psikososial dan intervensi penerapan program pelatihan yang ada atau baru, pedoman, dan protokol tingkat sistem.
5	Veronica Lorentzen, Kenneth Fagermo, Bjørn Helge Handegård, Ingunn Skre & Simon-Peter Neumer (2020).	<i>A randomized controlled trial of a six-session cognitive behavioral treatment of emotional disorders in adolescents 14–17 years old in child and adolescent mental health services (CAMHS)</i>	Penelitian ini menggunakan metode <i>randomized controlled trial</i> dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan dan dapat diandalkan secara klinis pada kelompok perlakuan dan SMART dapat dianggap sebagai langkah pertama dalam model perawatan bertahap untuk perawatan kecemasan dan / atau depresi di CAMHS.
6	Aisyah Roziika, Meilanny Budiarti Santoso, Moch.	Penanganan Stress di Masa Pandemi COVID-19 dengan Metode	Penelitian deskriptif ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui buku-buku ilmiah,	Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan EFT yang cukup efisien sebagai alternatif di

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
	Zainuddin (2020).	Emotional Freedom Technique (EFT)	karangan-karangan ilmiah, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik atau masalah yang akan dibahas sebagai	masa pandemi COVID-19, dapat mengurangi tingkat stres dan menghilangkan energi negatif yang dapat menyebabkan kecemasan, takut, hingga stress.
7	Wiryo Nuryono & Evita Roesnilam Syafitri (2020).	<i>Dialectical Behavior Therapy</i> (DBT) Sebagai Upaya Mengatasi <i>Posttraumatic Stress Disorder</i> (PTSD) Selama Masa Pandemic Covid-19	Penelitian deskriptif ini menggunakan metode <i>library research</i> dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.	Berdasarkan hasil penelitian, DBT efektif untuk mengurangi emosi negatif yang dirasakan dan menangani permasalahan disregulasi emosi dan efektif pula digunakan bagi individu dengan PTSD.
8	Rizkiana Rasman, Yudha Nurdian (2020)	Inisiasi Pelatihan Tari Sebagai Terapi Pereda Depresi Anak Saat Pandemi Di Taddan Sampang	Penelitian ini menggunakan metode diskusi dengan orang tua dan anak terkait masalah psikososial anak, pendidikan kesehatan terkait depresi dan terapi tari, serta latihan tari secara langsung.	Hasil penenlitan menunjukkan bahwa tingkat depresi anak berkurang setelah dilakukan terapi tari. Anak-anak dapat mengeluarkan kreasi dan emosi yang tidak bisa diungkapkan dengan gerakan

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui strategi intervensi yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah kesehatan mental anak di masa pandemi Covid 19.

##### 2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menambah dan memperdalam keilmuan dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait masalah kesehatan mental pada anak.

b. Kegunaan praktis

1) Bagi anak dan orang tua

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan mampu menerapkan intervensi-intervensi tersebut dalam mengatasi masalah kesehatan mental anak.

2) Bagi instansi

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah keilmuan bagi mahasiswa terkhusus pada mahasiswa jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3) Bagi peneliti

Dari penelitian ini penulis bisa memperoleh serta memperdalam pengetahuan yang nyata terkait strategi intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan mental anak di pandemi.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Kesehatan Mental Emosional

##### 1. Definisi Kesehatan Mental

Menurut WHO (2001) memberikan pengertian tentang kesehatan mental sebagai:

*A state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community* (Yuliandari, 2018).

Kesehatan mental merupakan kondisi dimana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya (Yuliandari, 2018).

Menurut Pieper dan Uden (2006), kesehatan mental adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya (Prismandari, 2017).

##### 2. Jenis-jenis Masalah Kesehatan Mental

Ada berbagai masalah kesehatan mental pada anak dan remaja. Namun secara umum, gangguan mental bisa dibagi ke dalam 5 kategori (CNN Indonesia, 2020), yaitu :

a. Masalah perilaku

Masalah perilaku terbagi ke dalam beberapa jenis gangguan mental, seperti berikut ini :

- 1) ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) : gangguan pemusatan perhatian. Anak dapat berperilaku impulsive dan hiperaktif.
- 2) *Conduct disorder* (kenakalan anak dan remaja) : gangguan perilaku emosional serius pada anak dan remaja, anak dengan gangguan ini bisa menampilkan pola perilaku yang mengganggu, ada unsure kekerasan dan bermasalah dalam mengikuti aturan.
- 3) ODD (*oppositional-deviant disorder*) : gangguan perilaku yang menunjukkan perilaku melawan dan membangkang. Gangguan perilaku ini ditandai dengan suasana hati yang mudah marah, mudah tersinggung, sering membantah serta pendendam.
- 4) Penyalahgunaan NAPZA (narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya).

b. Gangguan emosional-sosial

- 1) Gangguan *mood* (alam perasaan) : gangguan yang ditandai dengan gejala utama perubahan perasaan dalam kurung waktu singkat. Yang cukup umum dikenal berupa depresi (sedih, murung, putus asa), dan mania (perasaan senang berlebihan).
- 2) Gangguan kecemasan (*anxiety disorder*). Bagi sebagian anak, cemas bisa mempengaruhi perilaku dan pemikirannya sehingga cukup mengganggu performa anak di sekolah, kehidupan rumah dan kehidupan sosial mereka.

- 3) Menarik diri dan keterasingan. Anak cenderung menarik diri misalnya karena tidak bisa beradaptasi dengan tuntutan dari lingkungan sosialnya.
  - 4) Stress akibat/terkait trauma.
- c. Gangguan relasi orangtua-anak-keluarga
- Relasi anak dan orangtua serta anggota keluarga lainnya turut membentuk resiliensi anak terhadap tantangan atau masalah yang dihadapi.
- d. Gangguan perkembangan belajar
- 1) *Autistic spectrum disorder* (ASD), disebut demikian karena istilah ini menaungi berbagai masalah terkait perkembangan otot dan saraf anak. Variasinya beragam antara lain autisme, sindrom asperger dan sindrom Heller.
  - 2) Skizofrenia masa kanak. Gangguan skizofrenia menimbulkan ciri halusinasi, gangguan bicara, delusi, perasaan datar dan tidak selaras, dan kehilangan kehendak.
  - 3) Disabilitas intelektual. Gangguan yang mengakibatkan anak lambat dalam mempelajari hal-hal baru karena kemampuan intelegensi di bawah rata-rata anak seusianya.
  - 4) Gangguan belajar spesifik, yang biasanya terkait faktor neurologis.
- e. Gangguan perilaku makan dan perilaku kesehatan.
- Gangguan ini bisa ditandai dengan anak yang tiba-tiba menolak makan. Hal ini bisa mengakibatkan stunting pada anak.

### **3. Faktor Penyebab Masalah Kesehatan Mental pada Anak**

Masalah kesehatan mental pada anak dan remaja disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor biologis, faktor psikologis dan faktor lingkungan (Fakhriyani, 2019).

- a. Faktor biologis : Anak memiliki silsilah keluarga yang memiliki gangguan kesehatan mental, seperti genetika, ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh, menderita penyakit kronis dan kerusakan sistem saraf pusat.
- b. Faktor psikologis : Kematangan pikiran dan konstitusi genetik, seperti frustrasi, konflik, terlalu pesimis menghadapi masa depan, kurang mendapat pengakuan dari kelompok, dan tidak mendapat kasih sayang dari orangtua.
- c. Faktor lingkungan : Anak menerima stimulus-stimulus dari lingkungan dan orang-orang di sekitarnya setiap hari. Hal tersebut memungkinkan membuat stress dan merasa tidak nyaman. Atau bahkan mengalami kesulitan beradaptasi.

#### **4. Penanganan Gangguan Kesehatan Mental pada Masa Pandemi**

Ada tiga 'aktor' besar yang berpengaruh terhadap kesehatan mental anak selama pandemi, yaitu: keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Semua aktor memiliki peran penting masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya (Himapsikologi, 2020).

##### **a. Orang Tua**

Keluarga, khususnya orang tua memiliki peranan penting untuk menjaga anak agar tetap memiliki kesehatan yang baik karena anak memiliki banyak waktu dengan orang tua apalagi setelah adanya pandemi. Ada banyak hal yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu anak agar tetap sehat secara mental di pandemi, yaitu:



- 1) Membantu anak agar memiliki mood yang bagus. Misalnya, pola makan dan tidur yang teratur, ajak anak untuk bermain agar anak merasa diperhatikan dan mendapat kasih sayang, berolahraga, berkebun, melakukan hobi, bersih-bersih rumah, dan berjemur di pagi hari.
- 2) Mengurangi menonton atau membaca berita tentang COVID-19 dari media agar anak tidak mudah cemas. Hal ini perlu dilakukan karena anak belum dapat menyaring berita dengan baik dan belum dapat menganalisis berita yang berdampak pada kecemasan
- 3) Membantu anak untuk menyelesaikan tugas sekolah dengan menyediakan fasilitas, membantu mengatur waktu anak, dan membantu mereka dalam memahami pelajaran.
- 4) Menjaga hubungan baik dengan keluarga jauh dan teman-teman dari anak dengan video call agar bisa mengurangi kecemasan dan mengobati rasa rindu anak.
- 5) Mengelola kecemasan, bisa dengan meditasi atau menggunakan cara lain. Ketika orang tua terlihat cemas di depan anak, ini akan memengaruhi kecemasan mereka.
- 6) Menjaga emosi. Hal ini bertujuan untuk mencegah kekerasan di dalam rumah, baik kekerasan verbal ataupun fisik. Ketika orang tua sulit mengontrol emosinya, mereka bisa meminta bantuan ke psikolog atau tenaga profesional yang lain.

b. Masyarakat

Masyarakat bisa berkontribusi dengan ikut mengkampanyekan Hari Anak Sedunia dan melaporkan ketika ada keluarga yang melakukan kekerasan kepada anak kepada pihak yang berwajib. Dalam masa

pandemi ini, masyarakat dapat berkontribusi dalam membantu menyebarkan dan menyaring informasi yang benar mengenai berita COVID-19, mengingat informasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan fisik dan mental, dan bila membutuhkan pertolongan, segera hubungi call center.

c. Pemerintah

Pemerintah bisa segera memberikan penanganan yang baik agar kasus COVID-19 bisa cepat selesai, memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat kurang mampu, memperbaiki sistem belajar online sehingga tidak terlalu membebani anak, dan memberi pengawasan lebih intensif untuk mencegah adanya kekerasan pada anak di lingkungan keluarga. Kementerian Kesehatan telah berupaya menangani isu kesehatan mental anak dan remaja selama masa pandemi dengan membuat regulasi yang berfokus pada terwujudnya masyarakat yang peduli pada kesehatan mental.

## **B. Tinjauan Umum Pandemi**

Pandemi adalah wabah yang menyebar ke seluruh dunia. Dengan kata lain, wabah ini menjadi masalah bersama warga dunia. Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Menurut WHO, pandemi ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi. Akan tetapi, pandemi berhubungan dengan penyebaran secara geografis (Ais, 2020).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pandemi diartikan sebagai wabah yang mengjangkit secara serempak di mana-mana meliputi daerah geografis yang luas (Kemendikbud, 2016).

Pada umumnya pandemi diklasifikasikan sebagai epidemi terlebih dahulu, yaitu wabah yang penyebaran penyakitnya cepat dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. Sebagai contoh wabah virus Zika yang dimulaidi Brasil pada 2014 dan menyebar ke Karibia dan Amerika Latin merupakan epidemi, seperti juga wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014-2016 (Ratu dkk, 2020).

Wabah penyakit sendiri telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam HR Bukhari dan Muslim :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ نَائِيَةُ الرَّجْزِ ابْتِلَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَا سَامِعِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ إِذَا وَقَعِبَارُ ضِوَانْتُمْ بِهَا فَلَا تَفْرُوا أَمْنَهُ

Terjemahnya :Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

## C. Tinjauan Umum Covid19

### 1. Definisi Covid 19

Corona virus disease 19 atau lebih dikenal sebagai Covid 19 penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah virus corona 2 (SARS-CoV-2) WHO pertama kali mengetahui virus ini pada Desember 2019, menyusul laporan sekelompok kasus 'virus pneumonia' di Wuhan, Republik Rakyat Cina (WHO, 2020).

Virus corona merupakan keluarga besar virus yang umum terdapat pada hewan dan dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Kadang-kadang, orang yang terinfeksi virus ini kemudian dapat menyebarkannya kepada orang lain. Pada manusia, beberapa virus corona diketahui telah menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa

hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Parah (SARS). Virus corona yang paling baru ditemukan telah menyebabkan penyakit virus corona COVID-19 (ILO, 2020).

## **2. Penyebaran Covid 19**

COVID-19 paling utama ditransmisikan oleh tetesan aerosol penderita dan melalui kontak langsung. Aerosol kemungkinan ditransmisikan ketika orang memiliki kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang terlalu lama. Konsentrasi aerosol di ruang yang relatif tertutup akan semakin tinggi sehingga penularan akan semakin mudah (Kementerian dalam Negeri, 2020).

Ketika seseorang yang menderita COVID-19 batuk atau menghembuskan napas, mereka melepaskan percikan cairan yang terinfeksi. Jika orang berdiri dalam jarak satu meter dari seseorang dengan COVID-19, mereka dapat terkena karena menghirup percikan-percikan yang keluar lewat batuk atau dihembuskan oleh mereka. Selain itu, sebagian besar percikan ini jatuh pada permukaan dan benda di dekatnya—seperti meja kerja, meja perabot atau telepon. Orang-orang dapat menangkap COVID-19 dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi- dan kemudian menyentuh mata, hidung atau mulut mereka (ILO, 2020).

## **3. Tanda dan Gejala Covid 19**

Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala ini biasanya ringan dan terjadi secara bertahap. Beberapa orang yang

terinfeksi tidak mengalami gejala apa pun dan tidak merasakan adanya masalah dengan tubuh mereka. Namun, menurut pengetahuan yang ada saat ini, sekitar 1 dari 6 kasus COVID-19 telah menyebabkan penyakit serius dan menyebabkan berkembangnya kesulitan bernapas (ILO, 2020).

Menurut WHO (2020) Gejala lain yang kurang umum dan dapat mempengaruhi beberapa pasien, termasuk :

- a. Kehilangan rasa atau bau
- b. Hidung tersumbat
- c. Konjungtivitis (mata merah)
- d. Sakit tenggorokan.
- e. Sakit kepala
- f. Nyeri otot atau sendi
- g. Berbagai jenis ruam kulit
- h. Mual atau muntah
- i. Diare
- j. Menggigil dan pusing.

WHO (2020) pun menjelaskan beberapa gejala penyakit Covid 19 yang parah meliputi : ssak napas, kehilangan nafsu makan, kebingungan, nyeri atau tekanan terus-menerus di dada, suhu tinggi (38°C). Gejala lain yang kurang umum adalah :

- a. Cepat marah
- b. Kebingungan
- c. Kesadaran berkurang (kadang-kadang berhubungan dengan kejang)
- d. Kecemasan, depresi
- e. Gangguan tidur

- f. Komplikasi neurologi yang lebih parah dan jarang seperti stroke, radang otak, delirium dan kerusakan saraf.

#### 4. Pencegahan Covid 19

Merujuk pada ketetapan WHO (2020), untuk mencegah penyebaran covid 19 yang perlu dilakukan yaitu dengan :

- a. Cuci tangan secara rutin. Gunakan sabun dan air, atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol
- b. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin
- c. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan.
- d. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut.
- e. Saat batuk atau bersin, tutup mulut atau hidung anda dengan lengan atau tisu.
- f. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan.
- g. Jika demam, batuk atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis.

Merujuk pada kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait pencegahan dan pengendalian Covid 19, diberlakukannya protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan penularan covid 19 yang dikenal sebagai protokol 3M yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun (Ais, 2020).

- a. Menjaga jarak (menghindari keramaian dan di rumah saja)

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, virus cSARS-CoV-2 menular melalui droplet yang dikeluarkan dari mulut atau hidung dari seseorang saat bersin batuk, batuk atau berbicara. Droplet ini diperkirakan akan terbang sejauh 2 meter, yang mana memiliki potensi untuk menginfeksi orang lain jika kita berada pada jarak kurang dari 2 meter.

b. Memakai masker

Penggunaan masker sangat efektif karena tujuan pemakaian masker adalah untuk memblokir penyebaran virus. Pemblokiran ini mencegah virus untuk masuk langsung ke tubuh.

c. Mencuci tangan dengan sabun

Mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer* diperuntukkan mencegah penularan covid 19 melalui droplet yang jatuh di permukaan benda dan tanpa disadari tangan kita telah menyentuh droplet tersebut.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan untuk menghindari penularan wabah Covid 19. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim untuk memisahkan orang-orang yang sakit dengan orang yang sehat.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورِ دَنَمُورِ ضَعْلَمُصِحِّ

Terjemahnya :Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat." (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

## 5. Komplikasi Covid 19

Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini (Astutik, 2020) :

- a. Pneumonia (infeksi paru-paru)
- b. Infeksi sekunder pada organ lain
- c. Gagal ginjal
- d. *Acute cardiac injury*
- e. *Acute respiratory distress syndrome*
- f. Kematian

Selain itu, pada beberapa kasus, seseorang juga bisa mengalami kondisi yang disebut *post-acute Covid 19 syndrome*, meski telah dinyatakan sembuh dari infeksi virus corona (Astutik, 2020).

Kita sebaiknya memandang pandemi Covid 19 ini sebagai musibah yang Allah Swt berikan sebagai sebuah teguran bagi kita semua. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pandemi ini memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, yang memperlihatkan betapa lemah dan kecilnya kita sebagai makhluk ciptaan Allah.

Meski dengan semua kekacauan dan kerusakan yang ditimbulkan wabah corona, sebaiknya dihadapi dengan tawakal dan tenang. Sebab ketenangan bisa menjadi sebagian obat. Sebagaimana firman Allah Swt pada QS. Al Baqarah : 155 yang berbunyi

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ  
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya : "Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit kesakitan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar". (QS. Al Baqarah : 155).

Berdasarkan tafsir Al-Misbah, ayat tersebut menjelaskan tentang akhlak dan adab yang seharusnya dimiliki manusia ketika menghadapi sebuah musibah. Sabar sebagai perisai dan senjata bagi orang-orang yang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Itulah ujian yang akan kalian hadapi bisa berupa perasaan takut pada musuh, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa dan buah-buahan. Tidak ada yang melindungi kalian dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran. Maka sampaikanlah, wahai Nabi, berita sukacita yang menggembirakan kepada mereka yang bersabar dengan hati dan ucapanmu (TafsirQ.com, 2020).



Pada kondisi pandemi yang seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah mempererat kebersamaan, meningkatkan ketaatan dan juga kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Karena sesungguhnya orang-orang yang selamat dan lulus dari ujian ini adalah orang-orang yang bersabar dan semakin dekat dengan Allah Swt (Miftahuddin, 2020).



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan desain deskriptif naratif dengan menggunakan metode *literature review* yang berisi usulan, rangkuman dan pemikiran peneliti tentang beberapa sumber pustaka tentang topik yang dibahas dan diuraikan dalam bentuk deskriptif melalui beberapa literatur yang relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini yang dilakukan secara terstruktur dan terencana (Davies & Crombie, 2009).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Literature Review* untuk mengetahui strategi intervensi dalam mengatasi masalah kesehatan mental emosional pada anak.

#### B. Metode Pengumpulan Data

##### 1. Database Pencarian

Pencarian literatur dilakukan pada bulan Juni-Juli 2021. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sumber data dapat berupa artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa situs web atau data base yaitu : *PubMed*, *Science Direct*, *ProQuest*, *Google Scholar*, dan *Portal Garuda*.

##### 2. Kata Kunci

*Keyword* atau kata kunci yang digunakan disesuaikan dengan *Medical Subject Heading (MeSH)* dengan menggunakan *Boolean operator (AND, OR)*

untuk mengspesifikkan pencarian dan mempermudah pencarian artikel yang akan digunakan. Adapun kata kunci yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kata kunci *literature review*

<i>Child</i>	<i>Intervention</i>	<i>Mental Disorder</i>	<b>COVID-19</b>
<i>Child</i>	<i>Intervention</i>	<i>Mental disorder</i>	<i>2019-nCOV</i>
<i>OR</i>	<i>OR</i>	<i>OR</i>	<i>OR</i>
<i>Children</i>	<i>Therapy</i>	<i>Anxiety</i>	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
<i>OR</i>		<i>OR</i>	<i>OR</i>
<i>Adolescent</i>		<i>Depression</i>	<i>Wuhan Corona Virus</i>
		<i>OR</i>	
		<i>Stress</i>	
		<i>OR</i>	
		<i>Mood disorder</i>	

### 3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Strategi yang digunakan untuk membatasi dalam pencarian artikel menggunakan metode PICOS (*Population, Intervention, Comparison, Outcome, Study Desain*) dengan kriteria inklusi dan eksklusi dalam pencarian artikel.

Tabel 3.2 Metode PICOS

<b><i>Population</i></b>	Anak dengan gangguan mental emosional
<b><i>Intervention</i></b>	Intervensi keperawatan yang mengatasi mental emosional
<b><i>Comparison</i></b>	Intervensi yang melibatkan kelompok kontrol ataupun tidak
<b><i>Outcome</i></b>	Penurunan kecemasan, depresi, stress dan gangguan mood emosional
<b><i>Study design</i></b>	Penelitian dengan studi desain kuantitatif

Dalam penyeleksian literatur, peneliti menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu sebagai berikut :

a. Kriteria Inklusi

- 1) Artikel yang terbit pada rentang tahun 2019-2021
- 2) Artikel berbahasa Inggris ataupun Indonesia
- 3) Artikel yang membahas intervensi keperawatan yang mengatasi gangguan mental emosional
- 4) Artikel yang menggunakan metode eksperimen.
- 5) Artikel yang memiliki ISSN atau ISBN atau DOI
- 6) Artikel *full text* yang sesuai dengan tujuan penelitian


b. Kriteria Eksklusi

- 1) Artikel yang terbit sebelum tahun 2019
- 2) Artikel yang *double* publikasi
- 3) Artikel yang tidak *full text*

**C. Pemetaan dan Seleksi Studi**

Dari hasil pencarian literature dengan menggunakan *database* dan *keywords* yang telah disesuaikan dengan MeSH, didapatkan 836 artikel yang sesuai dengan kata kunci yang digunakan. Artikel yang telah didapatkan kemudian diperiksa publikasinya dan terdapat artikel yang sama/*double* publikasi sehingga dieksklusi dan tersisa 595 artikel. Peneliti kemudian melakukan skrining berdasarkan judul (n=505), abstrak (n=79) dan *full text* (n=11). Assessment yang dilakukan berdasarkan kelayakan terhadap kriteria inklusi dan eksklusi didapatkan sebanyak 11 artikel yang bisa dipergunakan dalam *literature review*. Hasil seleksi artikel studi dapat digambarkan dalam *Diagram Flow* di bawah ini:

Science Direct	PubMed	ProQuest	Google Scholar	Portal Garuda
98	150	125	345	116



Bagan 3.1 : Alur Penelitian

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber lain terkumpul (Sugiyono, 2018). Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan informasi tersebut diseleksi

dan dinilai kelayakan studi dengan menggunakan *Guideline review* dari *Joanna Briggs Institutes* sesuai (JBI) dengan tema masalah yang diteliti.

*Guideline review* dari JBI sendiri berisi beberapa *checklist* pertanyaan dengan kriteria penilaian diberi nilai 'ya', 'tidak', 'tidak jelas' atau 'tidak berlaku' dengan kriteria 'ya' diberi satu poin dan yang lainnya bernilai nol, yang kemudian dijumlahkan. Jika skor penelitian setidaknya 50% memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh peneliti, studi dimasukkan ke dalam kriteria inklusi. Peneliti mengecualikan studi yang berkualitas rendah untuk menghindari bias dalam validitas hasil dan rekomendasi penelitian.

Adapun artikel-artikel yang telah di skrining dan diperiksa kelayakannya akan dijadikan sebagai sumber analisis dalam penelitian ini. Berikut adalah daftar dari judul artikelnya:

1. Terapi Musik dalam Menurunkan Kecemasan Remaja Di Masa Pandemi Covid-19 (Sumber: Portal Garuda)
2. Penurunan kecemasan pada anak sekolah dengan membaca Al Quran selama pandemic covid 19 (Sumber: Google Scholar)
3. Peran frekuensi latihan yoga terhadap tingkat kecemasan pada remaja di kabupaten tabanan (Sumber: Portal Garuda)
4. *Effects Of Modified Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) On The Psychological Health Of Adolescents With Subthreshold Depression: A Randomized Controlled Trial* (Sumber: ProQuest).
5. *A Peer-to-Peer Live Streaming Intervention for Children during COVID-19 Home Schooling to Promote Physical Activity and Reduce Anxiety and Eye Strain: Cluster Randomized Controlled Trial* (Sumber: Pubmed).

6. *Effectiveness and Moderators of Individual Cognitive Behavioral Therapy Versus Treatment As Usual In Clinically Depressed Adolescents: A Randomized Controlled Trial* (Sumber: ScienceDirect)
7. Pengaruh hipnosis lima jari terhadap kecemasan pada anak usia sekolah kelas V (lima) di SDN Melong Mandiri 4 Kota Cimahi (Sumber: Google Scholar)
8. Pengaruh terapi *hypnofivesic* terhadap depresi, cemas dan stress mahasiswa dalam menjalani proses belajar mengajar daring selama pandemic COVID 19 (Sumber: Google Scholar)
9. Pengaruh Pemberian Buah Terhadap Gejala Depresi, Suasana Hati (*Mood*) dan Vitalitas pada Remaja Putri di Pondok Pesantren Assiddiqiyah (Sumber: Portal Garuda)
10. *Peer education intervention on adolescents' anxiety, depression and sleep disorders during the Covid-19 pandemic.* (Sumber: ScienceDirect)
11. *Randomized controlled trial of a six session cognitive behavioral treatment of emotional disorders in adolescents 14-17 years old in child and adolescents mental health services (CAMHS)* (Sumber: Pubmed).

#### **E. Rekomendasi**

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya peneliti memberikan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif sebagai solusi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kemudian disusun menjadi suatu hasil pembahasan dan suatu kesimpulan. Rekomendasi diberikan sebagai sebuah hasil pemecahan masalah menjadi sebuah adopsi pengetahuan dan sebagai landasan berpikir untuk pencegahan masalah yang telah dirumuskan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Studi

Dari hasil skrining, didapatkan 834 artikel yang memenuhi kriteria dan terdiri dari 8 jenis intervensi yang sesuai dengan tema *literature review* yaitu artikel yang membahas intervensi terapi musik, membaca Al quran, yoga, MBSR, dan pemberian buah masing-masing 1 artikel serta intervensi *cognitive behavioral therapy* (CBT), hipnosis lima jari dan *peer education* masing-masing 2 artikel. Hasil penelusuran artikel dari 5 *database* dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4.1 Hasil pencarian artikel berdasarkan *database*

Sumber Bahasa	Tahun Terbit	Database	N	Jenis Studi Penelitian/Artikel	
				Randomized Controlled Trial	Quasy Experiment
Indonesia English	2019-2021	Pubmed	2	2	0
		Science Direct	2	1	1
		ProQuest	1	1	0
		Google Scholar	3	0	3
		Portal Garuda	3	0	3
<b>Hasil</b>			11	4	7

Jumlah rata-rata responden dari keseluruhan studi kurang lebih 1700 dimana responden usia sekolah  $\pm 1000$  dan remaja  $\pm 650$  yang dari keseluruhan studi tersebut membahas intervensi dalam penanganan masalah kesehatan mental emosional pada anak dengan intervensi *peer education*, hipnosis 5 jari dan pemberian buah mempunyai nilai kualitas paling tinggi dan kualitas yang terendah pada intervensi latihan yoga dan membaca Al Quran. Dari keseluruhan studi, 6 studi dilakukan di Indonesia, 1 di Norwegia, 3 di China dan 1 di Belanda.



Table 4.2 Sintesis Grid

No	Author and Years	Judul Penelitian	Study design, sample, Variable, Instrument, Analysis	Outcome of Analysis Factors	Summary of Result	Database
1	(Sulistiyori ni et al., 2021)	Terapi Musik dalam Menurunkan Kecemasan Remaja Di Masa Pandemi Covid-19	<p><b>Design:</b> Quasy Experimental</p> <p><b>Sample:</b> 68 remaja usia 10-19 tahun</p> <p><b>Variable:</b> Terapi music dan kecemasan</p> <p><b>Instrument:</b> Kuesioner data demografis dan kuesioner depresi, kecemasan dan Stres dari DASS-42</p> <p><b>Analysis:</b> Cronbach Alpha</p>	<p>Pemberian terapi musik pada remaja dilakukan selama 6 hari berturut-turut dengan durasi 20-30 menit. Pada kelompok intervensi diberikan kesempatan untuk memilih jenis musik yang disukai seperti klasik, pop (k-pop), dangdut, religi dan jazz. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberikan intervensi apapun. Sebelum dan setelah intervensi dilakukan pengisian kuesioner DASS-42 untuk mengetahui perbedaan skor setelah dilakukan terapi musik.</p> <p>Hasil uji <i>paired t-test</i> setelah dilakukan intervensi pada kelompok intervensi di dapatkan nilai mean <i>pre</i>:12,5 SD 1,82 dan nilai mean</p>	Pemberian intervensi terapi musik dapat memberikan efek yang baik dalam hal penurunan kecemasan pada remaja yang awalnya berada pada tingkat kecemasan sedang menjadi tingkat kecemasan normal.	Portal garuda

No	Author and Years	Judul Penelitian	Study design, sample, Variable, Instrument, Analysis	Outcome of Analysis Factors	Summary of Result	Database
				<p><i>post</i>:5,5 SD 2,53. Sedangkan pada kelompok kontrol nilai mean <i>pre</i>:12,3 SD 1,93 dan mean <i>post</i>:15,05 SD 2,37 dengan nilai <math>p=0,000</math> dari kedua kelompok, baik dari kelompok intervensi maupun kelompok kontrol.</p>		
2	(Firdaus et al., 2021)	Penurunan Kecemasan pada Anak Sekolah dengan Membaca Alquran Selama Pandemic Covid 19	<p><b>Design:</b> Pra-Eksperimental  <b>Sample:</b> 82 anak usia sekolah (SD dan SMP)  <b>Variable:</b> Membaca Al Qur'an dan Kecemasan  <b>Instrument:</b> <i>Anxiaety scale: Screen For Child Anxiety Related Disorders (SCARED)</i>  <b>Analysis:</b> <i>Wilcoxon Sign Rank Test</i></p>	<p>Intervensi membaca Al Quran dilakukan di TPQ pada anak usia sekolah baik SD dan SMP. Anak kemudian di bimbing mengaji oleh seorang ustadzah selama 7 hari berturut-turut. Pengisian kuesioner SCARED dilakukan sebagai perbandingan sebelum dan setelah dilakukannya intervensi.</p> <p>Hasil pengukuran pre intervensi menunjukkan bahwa 74 (90,2%) merasa cemas dan 8 (9,8) anak merasa cukup</p>	Pemberian intervensi membaca Al Qur'an mempunyai pengaruh terhadap penurunan kecemasan anak sekolah pada masa pandemi Covid 19	Google Scholar

No	Author and Years	Judul Penelitian	Study design, sample, Variable, Instrument, Analysis	Outcome of Analysis Factors	Summary of Result	Database
				cemas. Sedangkan post intervensi menunjukkan 78 (95,1%) anak mengalami penurunan menjadi tidak cemas dan 4 (4,9) yang merasa cukup cemas. Hasil analisis <i>Wilcoxon sign Rank Test</i> setelah dilakukannya intervensi membaca Al Qur'an diperoleh nilai <i>p</i> value $p=0,000$ .		
3	(Trikusuma dan Luh, 2019)	Peran Frekuensi Latihan Yoga Terhadap Tingkat Kecemasan pada Remaja di Kabupaten Tabanan	<b>Design:</b> Quasy Experimental <b>Sample:</b> 123 remaja usia 12-18 tahun yang pernah melakukan latihan yoga <b>Variable:</b> Tingkat kecemasan dan Frekuensi latihan yoga <b>Instrument:</b> Kuesioner frekuensi latihan yoga dan	Latihan yoga dilakukan selama 3 bulan dengan menilai frekuensi yoga dan kecemasan remaja setelah 3 bulan. Pengisian kuesioner frekuensi latihan yoga dan kecemasan dilakn untuk melihat bagaimana pengaruh frekuensi latihan yoga terhadap penurunan kecemasan pada remaja. Hasil uji linear antara variable kecemasan dan frekuensi yoga	Hasil penelitian menunjukkan frekuensi latihan yoga memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat kecemasan remaja dengan frekuensi latihan yoga yang dianjurkan minimal satu kali dalam seminggu.	Portal Garuda

No	Author and Years	Judul Penelitian	Study design, sample, Variable, Instrument, Analysis	Outcome of Analysis Factors	Summary of Result	Database
			Skala kecemasan. <b>Analysis:</b> <i>Kolmogorov-Smirnov, Test for Linearity dan Glejser</i>	0,197 atau >0,05. Hasil uji homoskedastisitas 0,576 atau >0,05. Hasil uji asumsi regresi sederhana diperoleh nilai signifikansi 0,000. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R-square) 0,109 yang menunjukkan frekuensi latihan yoga berperan sebesar 10,9% terhadap penurunan tingkat kecemasan; dan nilai koefisien parameter -0,883 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti bahwa frekuensi latihan yoga memiliki peran yang signifikan terhadap penurunan kecemasan.		
4	(Zhang et al., 2019)	<i>Effects Of Modified Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) On The Psychological</i>	<b>Design:</b> Randomized Controlled Trial <b>Sample:</b> 56 student <b>Variable:</b> <i>Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR),</i>	Terapi MBSR diberikan pada 56 siswa. Pada kelompok intervensi MBSR, dibagi menjadi 4 kelompok dengan jumlah 7 orang per kelompok. Setiap kelompok menerima sesi pelatihan selama 8	Intervensi modifikasi MBSR yang dilakukan selama 8 minggu memiliki efek positif pada kesehatan psikologi	ProQuest

No	Author and Years	Judul Penelitian	Study design, sample, Variable, Instrument, Analysis	Outcome of Analysis Factors	Summary of Result	Database
		<i>Health Of Adolescents With Subthreshold Depression: A Randomized Controlled Trial</i>	<p><i>Psychological health and Subthreshold Depression</i></p> <p><b>Instrument:</b> Kuesioner Beck depression inventory-II (BDI-II) dan <i>Mindful Attention And Awareness Scale (MAAS)</i> dan <i>Ruminative Response Scale (RRS)</i></p> <p><b>Analysis:</b> Chi-square</p>	<p>minggu, dan sesi terjadi seminggu sekali selama satu jam setiap kali. Setiap sesi termasuk 10 menit bicara bebas (merasa tentang pekerjaan rumah), 15 menit demonstrasi dan penjelasan, 20 menit latihan dan bimbingan, dan 15 menit pelatihan imitasi kelompok. Setiap sesi diikuti dengan pekerjaan rumah, yang tersedia bagi pelatih untuk memahami situasi latihan setiap orang. Sedangkan kelompok kontrol tidak mendapatkan intervensi apapun hanya melanjutkan kebiasaannya seperti biasa.</p> <p>Hasil uji statistik menunjukkan pada kelompok intervensi nilai mean untuk variable depresi <i>pre</i> 17,00 dengan SD 2,26 dan nilai mean <i>post</i> 13,43 dengan</p>	<p>di antara anak-anak dengan depresi ringan, termasuk mengurangi tingkat depresi dan perenungan, menumbuhkan kesadaran diri pada remaja.</p>	

No	Author and Years	Judul Penelitian	Study design, sample, Variable, Instrument, Analysis	Outcome of Analysis Factors	Summary of Result	Database
				SD 2,38. Sedangkan nilai F 17,721 dan nilai <i>p value</i> <0,001. Sehingga dikatakan terapi MBSR secara signifikan efektif berpengaruh terhadap penurunan depresi pada remaja.		
5	(Zheng et al., 2020)	<i>A Peer-to-Peer Live Streaming Intervention for Children during COVID-19 Home Schooling to Promote Physical Activity and Reduce Anxiety and Eye Strain: Cluster Randomized Controlled Trial</i>	<b>Design:</b> Cluster Randomized Controlled Trial <b>Sample:</b> 954 Anak kelas 7 (usia 12-13 tahun) <b>Variable:</b> Health education; Peer-to-peer live streaming; anxiety; eye strain. <b>Instrument:</b> Spence Children's Anxiety Scale (SCAS); Computer Vision Syndrome Questionnaire (CVS Q);	<i>Peer-to-peer education</i> dilakukan selama 2 minggu. Kelompok intervensi menerima informasi pendidikan kesehatan, iklan olahraga, relaksasi mata, dan akses ke intervensi perubahan perilaku digital, yang dilakukan via aplikasi <i>live streaming</i> (Recess and Exercise Advocacy Program, REAP) sedangkan pada kelompok kontrol hanya mendapatkan informasi pendidikan kesehatan saja. Pengisian kuesioner dilakukan sebagai perbandingan sebelum dan setelah dilakukannya	Pemberian intervensi <i>peer-to-peer live streaming</i> kepada anak-anak yang melakukan <i>home schooling</i> secara signifikan memberikan manfaat dalam mengurangi kecemasan dan tidak ada perubahan yang berarti pada kualitas tidur.	Pubmed

No	Author and Years	Judul Penelitian	Study design, sample, Variable, Instrument, Analysis	Outcome of Analysis Factors	Summary of Result	Database
			<b>Analysis:</b>	intervensi.  Hasil analisis pada variable kecemasan diperoleh nilai mean <i>pretest</i> 3,72 dan nilai mean <i>posttest</i> 3,49 dengan nilai <i>p</i> value 0,02 atau <0,05. Dapat dilihat terjadi penurunan skor kecemasan dengan selisih 0,23.		
6	(Stikkelbroek et al., 2020).	<i>Efectiveness and Moderators of Individual Cognitive Behavioral Therapy Versus Treatment As Usual In Clinically Depressed Adolescents: A Randomized Controlled Trial</i>	<b>Design:</b> <i>Randomized Controlled Trial</i> <b>Sample:</b> 88 remaja dengan depresi klinis usia 12-21 tahun <b>Variable:</b> <i>Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Treatment as Usual (TAU) and Clinically Depression</i> <b>Instrument:</b> <i>Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (K-</i>	Terapi CBT dilakukan 15 sesi mingguan selama 45 menit dengan remaja pada kelompok intervensi yang mengandung 8 komponen, yaitu: psikoedukasi, menetapkan tujuan yang dapat dicapai, pemantauan diri, aktivasi, meningkatkan keterampilan sosial dan keterampilan komunikasi, teknik relaksasi, restrukturisasi kognitif, permainan peran dan keterampilan solusi masalah, dan pencegahan kambuh.	Intervensi CBT dan TAU tidak memiliki perbedaan efek terhadap penurunan depresi remaja. Kedua intervensi tersebut efektif dalam menangani depresi pada remaja yang dirujuk secara klinis. CBT membutuhkan perbaikan lebih	Science Direct

No	Author and Years	Judul Penelitian	Study design, sample, Variable, Instrument, Analysis	Outcome of Analysis Factors	Summary of Result	Database
			SADS); Child Depression Inventory-II (CDI-2); Clinical Global Impression-severity scale (CGI-S); Suicide Criteria Assessment (SCA) <b>Analysis:</b> Chi-square	Sedangkan kelompok kontrol melanjutkan program perawatan seperti biasanya. Remaja diminta mengisi kuesioner sebelum dan setelah intervensi untuk melihat perubahan yang terjadi.  Dari hasil analisis pada variabel depresi <i>pre-post</i> diperoleh nilai $g$ 0,20 dan setelah <i>follow up</i> 6 bulan diperoleh nilai $g$ 0,09 dengan nilai $p$ value <0,001.	lanjut untuk mengurangi tingkat gejala di bawah batas klinis pada pasca perawatan.	
7	(Juhaeriah et al., 2020)	Pengaruh Terapi Hipnosis Lima Jari Terhadap Kecemasan pada Anak Usia Sekolah Kelas V (Lima) di SDN Melong Mandiri 4 Kota Cimahi	<b>Design:</b> Quasy Experimental <b>Sample:</b> 32 siswa kelas 5 yang mengalami kecemasan ringan dan sedang <b>Variable:</b> Hipnosis 5 jari dan kecemasan <b>Instrument:</b>	Terapi hipnosis lima jari dilakukan pada siswa kelas 5 yang mengalami kecemasan dengan dibantu oleh 3 orang partner. Intervensi dilakukan selama 6 hari, dimana siswa dikumpulkan dalam satu kelas kemudian diberikan terapi dengan durasi 10 menit setiap pagi sebelum dilaksanakan	Pemberian terapi hipnosis lima jari efektif dalam menurunkan kecemasan pada siswa dalam menghadapi UKK	Google Scholar



No	Author and Years	Judul Penelitian	Study design, sample, Variable, Instrument, Analysis	Outcome of Analysis Factors	Summary of Result	Database
			<p>Kuesioner kecemasan <i>Spence Children's Anxiety Scale (SCAS)</i></p> <p><b>Analysis:</b> <i>Parametric t independent</i></p>	<p>ujian. Pengisian kuesioner dilakukan sebelum dan setelah intervensi untuk mengetahui perbandingan perubahan yang terjadi pada siswa.</p> <p>Hasil analisis menunjukkan nilai mean <i>pre</i> pada siswa 38,56 dengan SD 8,350; dan nilai post menurun menjadi 23,19 dengan SD 6,047. Sedangkan nilai <i>p value</i> = 0,001 atau &lt;0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa hipnosis 5 jari secara signifikan efektif terhadap penurunan kecemasan siswa kelas V.</p>		
8	(Utami et al., 2021)	Pengaruh Terapi <i>Hypnofivesic</i> Terhadap Depresi, Cemas, Dan Stres Mahasiswa	<p><b>Design:</b> Quasy Experimental</p> <p><b>Sample:</b> 34 mahasiswa</p> <p><b>Variable:</b> Hipnosis 5 jari, terapi musik,</p>	Intervensi <i>hypnofivesic</i> dilakukan pada mahasiswa yang dipandu melalui aplikasi zoom. Kelompok intervensi diberikan terapi lima jari yang diiringi dengan terapi musik.	Pemberian terapi <i>hypnofivesic</i> mempunyai pengaruh terhadap penurunan depresi, stress dan cemas	Google Scholar

No	Author and Years	Judul Penelitian	Study design, sample, Variable, Instrument, Analysis	Outcome of Analysis Factors	Summary of Result	Database
		Dalam Menjalani Proses Belajar Mengajar Daring Selama Pandemi Covid-19	depresi, cemas dan stress <b>Instrument:</b> Kuesioner DASS 21 <b>Analysis:</b> Wilcoxon dan Mann whitney	Sedangkan pada kelompok kontrol hanya diberikan terapi relaksasi napas dalam. Pengisian kuesioner DASS 21 dilakukan sebelum dan setelah intervensi untuk melihat perbandingan tingkat perbedaan depresi, cemas dan stress mahasiswa setelah intervensi.  Hasil uji analisis pada variable stress diperoleh nilai mean <i>pre</i> 6,89 dengan SD 6,07 dan nilai <i>post</i> 1,88 dengan SD 4,35 serta nilai p=0,00; Variable cemas diperoleh nilai median <i>pre</i> 11 dan <i>post</i> 6 dengan nilai p=0,006; Variabel depresi pada diperoleh nilai mean <i>pre</i> 5,55 dengan SD 6,46 dan nilai p=0,002. Sehingga terapi <i>hypnofivesic</i>	pada mahasiswa selama masa pandemi.	

No	Author and Years	Judul Penelitian	Study design, sample, Variable, Instrument, Analysis	Outcome of Analysis Factors	Summary of Result	Database
				secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kecemasan, stress, dan depresi pada remaja.		
9	(Latifah et al., 2021)	Pengaruh Pemberian Buah Terhadap Gejala Depresi, Suasana Hati ( <i>Mood</i> ) dan Vitalitas pada Remaja Putri di Pondok Pesantren Assiddiqiyah	<b>Design:</b> Eksperimen <b>Sample:</b> 60 santriwati usia 15-18 tahun <b>Variable:</b> Pemberian buah, gejala depresi, suasana hati dan vitalitas <b>Instrument:</b> Kuesioner <i>Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire</i> , <i>Center for Epidemiologi Studies Depression (CSE-D)</i> , <i>Positive Affect and Negative Affect Scale</i> dan <i>Fatigue</i>	Intervensi pemberian buah pada 60 santriwati dilakukan selama 14 hari yang dibagi menjadi kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Kelompok intervensi diberikan buah 2 porsi/hari masing-masing 100gr/porsi, buah yang diberikan melon, semangka, papaya, pisang ambon, jeruk, pear, buah naga, duku, nanas, belimbing, rambutan, salak, manggis, apel dan jambu biji. Sedangkan pada kelompok kontrol dilakukan pemantauan konsumsi buah setiap hari selama 14 hari. Peserta diminta mengisi kuesioner pada hari 0 dan hari 14 untuk melihat perubahan yang terjadi.	Intervensi pemberian buah secara signifikan memberikan manfaat kepada remaja putrid dalam hal mengurangi gejala depresi, memperbaiki suasana hati dan vitalitas.	Portal Garuda

No	Author and Years	Judul Penelitian	Study design, sample, Variable, Instrument, Analysis	Outcome of Analysis Factors	Summary of Result	Database
			Scale. <b>Analysis:</b> Parametrik <i>t</i> -independent	Hasil analisis pada variabel gejala depresi diperoleh nilai mean <i>pretest</i> 24,07 (SD: 6,79) dan nilai mean <i>posttest</i> 20,54 (5,78) dengan nilai <i>p value</i> 0,006; Sedangkan pada variabel suasana hati diperoleh nilai mean <i>pretest</i> 1,50 (SD 0,25) dan nilai mean <i>posttest</i> 1,62 (SD 0,33) dengan nilai <i>p value</i> 0,046. Sehingga pemberian buah secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan gejala depresi dan peningkatan suasana hati santriwati.		
10	(Ding and Jiwei, 2020)	<i>Peer Education Intervention On Adolescents' Anxiety, Depression, and Sleep Disorder During</i>	<b>Design:</b> Eksperimen <b>Sample:</b> 60 remaja usia 12-18 tahun <b>Variable:</b> <i>Peer Education, Anxiety, Depression, Sleep Disorder.</i>	Intervensi <i>peer education</i> dilakukan selama 8 minggu pada 150 siswa yang dibagi menjadi kelompok intervensi dan kelompok kontrol selama. Kelompok intervensi diberikan <i>health education</i> dan senam	Pemberian intervensi <i>peer education</i> secara signifikan dapat diterapkan untuk mengurangi tingkat kecemasan dan	Science Direct

No	Author and Years	Judul Penelitian	Study design, sample, Variable, Instrument, Analysis	Outcome of Analysis Factors	Summary of Result	Database
		<i>The Covid-19 Pandemic</i>	<b>Instrument:</b> <b>Analysis:</b>	aerobik sesuai dengan model 328 dengan frekuensi 3 hari seminggu. Sedangkan pada kelompok kontrol hanya diberikan <i>health education</i> termasuk diet dan nutrisi, kebiasaan gaya hidup, latihan fisik, kesehatan mental, dan pengetahuan terkait pandemi. Siswa diminta mengisi kuesioner sebelum dan setelah intervensi untuk melihat perubahan yang terjadi.  Hasil analisis variable kecemasan diperoleh nilai mean <i>pretest</i> 62,49 (SD 9,33) dan nilai mean <i>posttest</i> 55,00 (SD 10,49) dengan nilai <i>p value</i> <0,001; Sedangkan Variabel depresi diperoleh nilai mean <i>pretest</i> 60,60 (SD 7,61) dan nilai mean <i>posttest</i> 53,83 (SD 9,52) dengan nilai <i>p</i>	depresi pada remaja dan juga meningkatkan kualitas tidur remaja.	

No	Author and Years	Judul Penelitian	Study design, sample, Variable, Instrument, Analysis	Outcome of Analysis Factors	Summary of Result	Database
11	(Lorentzen et al., 2020)	<i>A Randomized Controlled Trial Of A Six Session Cognitive Behavioral Treatment Of Emotional Disorders In Adolescents 14–17 Years Old In Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS)</i>	<b>Design:</b> Randomized Controlled Trial <b>Sample:</b> 145 remaja usia 14-17 tahun <b>Variable:</b> <i>Cognitive Behavioral Treatment; Emotional Disorder</i> <b>Instrument:</b> <i>Development and Well Being Assessment; The Children’s Global Assessment Scale (CGAS); Beck Depression Inventory, second edition (BDI-II); Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC)</i> <b>Analysis:</b> Chi-	value 0,001. Pemberian CBT dilakukan pada 145 remaja yang dibagi menjadi kelompok intervensi dan kelompok kontrol selama 6 minggu. Kelompok intervensi mendapatkan program berbasis SMART yang terdiri dari 5 materi (pengantar, depresi, kecemasan, pelatihan ketegasan dan ringkasan). Pengisian kuesioner dilakukan sebelum dan setelah intervensi untuk mengetahui perbandingan perubahan yang terjadi pada siswa. Hasil analisis variable kecemasan diperoleh nilai mean <i>pretest</i> 61,10 (SD 11,57) dan nilai mean <i>posttest</i> 54,09 (SD 13,26) dengan nilai <i>g</i> 0,34; Sedangkan varaiabel depresi diperoleh nilai mean <i>pretest</i> 28,98 (SD 12,48) dan nilai	Pemberian intervensi CBT berbasis SMART efektif dalam dalam mnengurangi kecemasan dan depresi serta dapat dianggap sebagai langkah pertama dalam model perawatan bertahap untuk pengobatan kecemasan dan depresi di CAMHS	Pubmed

<b>No</b>	<b><i>Author and Years</i></b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b><i>Study design, sample, Variable, Instrument, Analysis</i></b>	<b><i>Outcome of Analysis Factors</i></b>	<b><i>Summary of Result</i></b>	<b><i>Database</i></b>
			square	mean <i>posttest</i> diperoleh 20,52 (SD 14,37) dengan nilai g 0,30.		



## **B. Karakteristik Responden Studi**

Responden dalam penelitian adalah semua anak yang terdampak COVID 19 di masing-masing Negara, yang berdasarkan dari WHO rentang usia anak adalah sejak anak berada dalam kandungan hingga usia 19 tahun (Kemenkes, 2014). Responden dalam penelitian berasal dari berbagai Negara dan latar belakang yang berbeda dengan rata-rata usia antara 8-19 tahun. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin seimbang antara laki-laki dan perempuan yang juga kebanyakan pada usia remaja baik sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Responden sebagian besar tinggal di lingkungan perkotaan dengan kasus COVID yang cukup tinggi.

## **C. Hasil dan Analisis**

Dari 11 artikel yang ditelaah dan dianalisis terdapat delapan jenis intervensi yang bisa diterapkan untuk mengurangi ataupun menangani masalah kesehatan mental emosional pada anak. Dari keseluruhan artikel yang ditelaah mempunyai pembagian usia dan latar belakang peserta yang beragam, mulai dari usia 8-19 tahun. Perbedaan tingkat usia dapat berpengaruh terhadap efektifitas intervensi. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pemetaan intervensi berdasarkan pembagian usia pada anak dari kesebelas artikel yang telah ditelaah.

### **1. Anak Usia Sekolah**

Anak usia sekolah merupakan anak yang sedang berada pada periode usia pertengahan yaitu anak yang berusia 6-12 tahun, sedangkan menurut Yusuf (2011) anak usia sekolah merupakan anak usia 6-12 tahun yang sudah dapat mereaksikan rangsang intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif (seperti : membaca, menulis, dan menghitung) (Supariasa, 2019).



Berdasarkan hasil penelusuran artikel, diperoleh 3 artikel penelitian intervensi yang efektif dalam mengurangi masalah mental emosional pada anak usia sekolah.

a. Membaca Al Qur'an

Penelitian Firdaus (2021) yang menggunakan membaca Al Quran sebagai intervensi dilakukan pada 82 siswa sekolah di TPQ selama 7 hari berturut-turut menunjukkan adanya penurunan kecemasan secara signifikan. Sebelum dilakukan pembacaan Al Quran, 90,2% anak merasa cemas dan setelah dilakukan pembacaan menurun menjadi 0%. Hasil uji statistik menunjukkan nilai  $p=0,000$  yang berarti secara signifikan membaca Al Quran berpengaruh terhadap penurunan kecemasan anak (Firdaus, 2021).

b. *Peer-to-Peer Education*

Penelitian Zheng et al. (2020) yang menggunakan peserta usia 12-13 tahun dalam penerapan intervensi *peer-to-peer education* sebagai intervensi alternative dalam mengurangi tingkat kecemasan dan kelelahan mata. Penelitian dilakukan pada 80 siswa kelas 7 dengan memberikan intervensi berupa *peer-to-peer education via live streaming*, dimana kelompok intervensi mendapatkan edukasi kesehatan dan aplikasi *live streaming* yaitu *Recess and Exercise Advocacy Program (REAP)* untuk *peer-to-peer education* dimana anak mendapatkan SMS untuk *log in* di aplikasi untuk berpartisipasi dalam *live streaming* yang dilakukan. Sedangkan kelompok kontrol hanya mendapatkan edukasi kesehatan.

Hasil utama dari penelitian menunjukkan setelah dilakukan intervensi tingkat kecemasan siswa menurun yang sebelumnya 3,72 menjadi 3,49 sedangkan pada kelompok kontrol yang sebelumnya 3,69

menjadi 3,79 dengan nilai  $p=0,02$  atau  $p<0,05$ , artinya pemberian *peer-to-peer education via live streaming* secara signifikan mengurangi kecemasan pada anak yang belajar di rumah. (Zheng et al., 2020).

c. Hypnosis 5 jari

Penelitian Juhaeriah et al. (2020) memanfaatkan intervensi hypnosis lima jari sebagai intervensi alternative dalam menurunkan tingkat kecemasan siswa kelas V SD. Penelitian ini dilakukan sebelum pandemi, namun dapat pula dilakukan pada masa pandemi dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan. Penelitian ini menggunakan 32 siswa sekolah dasar yang mengalami kecemasan yang dibagi rata menjadi kelompok intervensi dan kontrol. Hasil uji statistik diperoleh nilai mean pada kelompok intervensi sebelum 38,56 kemudian menurun menjadi 23.19 sedangkan pada nilai mean kelompok kontrol menurun dari 37.50 menjadi 37,25. Nilai *p value* dari kedua mean kelompok 0,001 atau  $p\leq 0,05$  yang menunjukkan bahwa hypnosis lima jari yang dilakukan selama 6 hari secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kecemasan siswa kelas V (Juhaeriah et al, 2020).

Berdasarkan hasil dari ketiga intervensi yang dilakukan pada anak usia sekolah, intervensi hypnosis 5 jari merupakan intervensi yang paling efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan anak. Hal ini dapat dilihat dari selisih dari nilai *pretest* (38,56) dan nilai *posttest* (23,19) sebanyak 15,37 dengan nilai  $p=0,001$ . Hal ini berkaitan dengan bagaimana intervensi tersebut dilakukan. Mengingat karakteristik anak yang lebih senang untuk belajar dan bermain secara berkelompok membuat intervensi ini mudah diterima oleh anak.

Selain itu, intervensi ini dilakukan dalam kurung yang singkat, yaitu selama 10 menit. Hal ini tentu berpengaruh terhadap keefektifan intervensi karena tingkat perhatian dan fokus pada anak usia sekolah berlangsung secara singkat. Intervensi ini juga dilakukan pada pagi hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dimana anak masih berada pada kondisi yang *fresh* dan siap untuk menerima rangsangan yang diberikan. Sehingga, beberapa faktor tersebut membuat intervensi ini lebih diterima oleh anak dan membantu menurunkan tingkat kecemasannya.

## 2. Remaja

Usia remaja merupakan periode transisi perkembangan dari masa anak ke masa dewasa, usia diantara 10-24 tahun. Secara etologi, remaja berarti “tumbuh menjadi dewasa”. Definisi remaja (*adolescence*) menurut WHO adalah periode usia antara 10-19 tahun, sedangkan perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut kaum muda (*youth*) untuk usia 15-24 tahun. Berdasarkan sifat atau ciri perkembangannya, masa (rentang waktu) remaja ada 3 tahap. Yaitu : masa awal remaja (10-12 tahun), masa remaja tengah (13-15 tahun) dan masa remaja akhir (16-19 tahun). Definisi ini kemudian disatukan dalam terminologi kaum muda (*young people*) yang mencakup usia 10-24 tahun (García Reyes, 2018).

Berdasarkan hasil penelusuran artikel, diperoleh 8 artikel yang melakukan penelitian pada intervensi yang efektif terhadap penurunan masalah mental emosional remaja.

### a. Terapi Musik

Penelitian Sulistyorini et al. (2021) mengambil terapi musik sebagai intervensi untuk mengurangi tingkat kecemasan remaja yang dilakukan pada 68 peserta yang dibagi ke dalam kelompok intervensi dan

kontrol yang masing-masing berjumlah 34 peserta dimana kelompok intervensi diberikan intervensi mendengar musik jenis klasik, pop, dangdut, religi dan jazz sedangkan pada kelompok kontrol tidak dilakukan perlakuan. Uji statistik *paired t-test* pada kelompok intervensi sebelum intervensi menunjukkan nilai mean 12,5 (kecemasan sedang) dan setelah dilakukan intervensi menurun menjadi 5,5 (kecemasan normal) dengan nilai *p value*=0,000. Sedangkan pada kelompok kontrol nilai mean sebelum 12,3 (kecemasan sedang) dan setelah diperoleh nilai mean 15,05 (kecemasan parah) dengan nilai *p value*=0,000. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai  $p < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan secara signifikan ada perubahan pada tingkat kecemasan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi terapi musik baik kelompok intervensi maupun kelompok kontrol.

b. Frekuensi Latihan Yoga

Penelitian lain oleh Trikusuma & Luh (2020) meneliti frekuensi latihan yoga dalam penurunan tingkat kecemasan remaja. Penelitian dilakukan pada 123 siswa sekolah yang melakukan latihan yoga. Setelah dilakukan latihan yoga selama 3 bulan, hasil uji analisis menunjukkan bahwa koefisien parameter frekuensi yoga sebesar -0,883 dan nilai determinasi frekuensi latihan sebesar 0,109 sehingga dapat disimpulkan frekuensi latihan yoga secara signifikan berperan terhadap kecemasan remaja dan semakin tinggi frekuensi latihan yoga pada remaja maka semakin rendah pula tingkat kecemasannya (Trikusuma & Luh, 2019).

c. *Mindfulness-Based Stress Reduction* (MBSR)

Penelitian selanjutnya oleh Zhang et al. (2019) yang menggunakan intervensi MBSR untuk mengurangi dan menurunkan tingkat depresi pada

remaja. Zhang menerapkan MBSR pada 56 remaja yang dibagi menjadi kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Kelompok intervensi diberikan MBSR selama 8 minggu sedangkan kelompok kontrol terus melanjutkan kegiatan seperti biasanya. Setelah dilakukan analisis uji statisti pada kedua kelompok, pada kelompok intervensi untuk variable depresi, kesadaran dan respon diperoleh nilai  $p < 0,001$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian intervensi MBSR berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan gejala depresi pada remaja (Zhang et al., 2019).

d. *Cognitive Behavioral Therapy (CBT)*

Penelitian lain yang meneliti depresi pada remaja, Stikkelbroek et al. (2020) yang menggunakan intervensi CBT dalam penurunan tingkat depresi remaja. Penelitian Stikkelbroek dilakukan pada 88 remaja yang mengalami depresi. Penelitian ini, menyajikan hasil pasca perawatan dan enam bulan tindak lanjut. Kondisi *pre-post* remaja ( $t(96) = 5,9$ ,  $p < 0,001$ ) dan dilakukan tindak lanjut setelah 6 bulan dan diperoleh nilai ( $t(54) = 9,2$ ,  $p < 0,001$ ). Hal ini menunjukkan pemberian CBT pada remaja secara signifikan efektif dalam menurunkan depresi yang dialami oleh remaja (Stikkelbroek et al., 2020).

Penelitian oleh Lorentzen et al. (2021) yang dilakukan dengan menerapkan terapi CBT sebagai intervensi dalam menurunkan gangguan emosional seperti depresi dan kecemasan. Penelitian Lorentzen dilakukan pada 145 remaja dengan gangguan emosi yang dibagi ke dalam kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Terapi CBT ini dilakukan dengan program SMART yang berisi lima materi dimana dua diantaranya membahas kecemasan dan depresi. Pelatihan program SMART dilakukan

dengan kombinasi metode ceramah, pelatihan langsung dan *role play*. Hasil analisis uji statistik menunjukkan setelah pemberian terapi selama 6 minggu pada kelompok intervensi menunjukkan adanya penurunan pada tingkat kecemasan yang awalnya 61,10 menjadi 54,09 dengan nilai  $p=0,035$  dan pada tingkat depresi yang awalnya 28,98 menurun menjadi 20,52 dengan nilai  $p=0,066$ . Dari uji analisis dapat disimpulkan pemberian CBT selama 6 minggu pada remaja berpengaruh terhadap penurunan gangguan emosi remaja meskipun pada tidak signifikan pada variable depresi (Lorentzen et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan Stikkelbroek (2020) dilakukan pada remaja yang dirawat di klinik dengan depresi lalu dilakukan pemeriksaan awal (*pretest* dan *posttest*) kemudian di lakukan tindak lanjut (*follow up*) setelah 6 bulan lalu kemudian di ukur kembali tingkat depresinya. Hal ini berpengaruh karena pemberian terapi CBT hanya dilakukan pemantauan selama 6 bulan tersebut. Sedangkan penelitian Lorentzen et al. (2021) dilakukan selama 6 minggu pada remaja dengan depresi dan kecemasan yang dirawat di pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja dimana terapi CBT ini dilakukan selama 6 minggu yang berbasis program SMART yang terdiri dari 5 materi (pengantar, depresi, kecemasan, pelatihan ketangkasan dan ringkasan). Berdasarkan program SMART ini, remaja mendapatkan informasi terkait depresi dan kecemasan yang membantu remaja untuk memahami lebih dalam apa itu kecemasan dan depresi sehingga berpengaruh pula terhadap penurunan depresi dan kecemasan yang dialami oleh remaja.

e. *Peer Education*

Penelitian Ding & Jiwei (2020) memanfaatkan intervensi *peer education* sebagai upaya untuk menurunkan tingkat depresi dan kecemasan pada remaja. Ding & Jiwei memberikan *peer education* pada 150 remaja sekolah menengah yang dibagi menjadi 75 remaja pada masing-masing kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Setelah diberikannya *peer education* selama 8 minggu, tingkat stress remaja yang awalnya berada pada skor 62,49 menurun menjadi 55,00 dengan nilai  $p < 0,001$ ; sedangkan pada tingkat depresi remaja yang awalnya berada pada skor 60,60 menurun menjadi 53,83 dengan nilai  $p < 0,001$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa *peer education* secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat stress dan depresi pada remaja sekolah menengah (Ding & Jiwei, 2020).

f. Hypnosis 5 Jari dan Terapi Musik (*Hypnofivesic*)

Penelitian selanjutnya (Utami et al, 2021) memanfaatkan terapi hypnosis lima jari dan terapi musik (*hypnofivesic*) sebagai intervensi alternative untuk menurunkan tingkat depresi, kecemasan dan stress yang dialami oleh mahasiswa. Pemberian intervensi *hypnofivesic* ini dilakukan bersamaan dengan terapi musik yang berlangsung selama  $\pm 1$  bulan pada 34 mahasiswa yang mengalami gangguan psikologis (depresi, cemas, stress) yang dibagi menjadi 18 kelompok intervensi dan 16 kelompok kontrol. Kelompok intervensi diberikan terapi hypnosis lima jari yang diiringi dengan terapi musik sedangkan kelompok kontrol hanya diberikan terapi relaksasi napas dalam. Hasil uji statistik pada variable stress dan kecemasan setelah diberikan intervensi diperoleh nilai *p value* masing-masing 0,00 dan 0,006 yang berarti nilai  $p < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan terapi ini berpengaruh terhadap penurunan tingkat stress dan

kecemasan mahasiswa. Sedangkan pada variable depresi, diperoleh nilai  $p$  value=0,002 pada kelompok intervensi dan pada kelompok kontrol 0,02 yang berarti nilai  $p < 0,05$ . Terapi hypnosis 5 jari ini secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan depresi pada kelompok intervensi dan terapi relaksasi napas dalam juga berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan depresi pada mahasiswa (Utami et al., 2021).

#### g. Pemberian Buah

Penelitian lain (Latifah et al., 2021) yang meneliti tingkat depresi dan suasana hati (*mood*) pada 60 santriwati kelas XI dan XII setelah diberikan intervensi pemberian buah. Intervensi pemberian buah dilakukan selama 14 hari dengan melakukan pemantauan setiap harinya. Penelitian dilakukan pada 60 peserta yang dibagi menjadi kelompok intervensi dan kelompok kontrol dengan masing-masing kelompok 30 peserta untuk mengetahui pengaruh pemberian buah pada gejala depresi, suasana hati (*mood*) dan vitalitas pada remaja. Kelompok intervensi selama 14 hari mendapatkan penambahan porsi 2/hari buah segar dengan jenis buah yang bervariasi yaitu melon, semangka, papaya, pisang ambon, jeruk, pear, buah naga, duku, nanas, belimbing, rambutan, salak, manggis, apel dan jambu biji. Sedangkan pada kelompok kontrol tetap mempertahankan pola makan. Pada hari terakhir dilakukan pengukuran tingkat depresi dan suasana hati pada santriwati dan hasilnya menunjukkan secara signifikan pemberian buah berpengaruh terhadap penurunan tingkat depresi dan peningkatan suasana hati santriwati.

Hasil uji statistik untuk variable gejala depresi sebelum intervensi didapatkan nilai mean 24,36 dan menurun menjadi 20,53 dengan nilai  $p=0,006$ . Untuk variable suasana hati (*mood*) diperoleh nilai mean sebelum



dilakukan intervensi 1,50 dan meningkat menjadi 1,62 dengan nilai  $p=0,046$  sedangkan pada kelompok kontrol terjadi penurunan nilai mean yang awalnya 1,67 menurun menjadi 1,57. Pada variable vitalitas sendiri diperoleh nilai mean pada kelompok intervensi 49,23 meningkat menjadi 54,80 dengan nilai  $p<0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan pemberian buah dapat mempengaruhi gejala depresi, suasana hati (*mood*) dan vitalitas remaja.

Dari total tujuh jenis intervensi yang dapat dilakukan oleh remaja, intervensi terapi CBT untuk penurunan tingkat depresi merupakan intervensi yang paling efektif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai selisih *pretest* (28,98) dan nilai *posttest* (20,52) yang paling tinggi dibandingkan dengan intervensi lainnya, yaitu sebanyak 8,46. Keefektifan dari intervensi ini dipengaruhi oleh prosedur pemberian intervensi. Terapi CBT ini tidak hanya melakukan pemberian materi oleh terapis tetapi juga melibatkan remaja dalam intervensi dengan melakukan *role play* sehingga membuat remaja lebih merasakan secara emosional dan lebih mudah memahami konsep dari kecemasan dan juga depresi.

Sedangkan untuk penurunan tingkat kecemasan pada remaja, intervensi *peer education* yang menunjukkan nilai selisih *pretest* (62,49) dan *posttest* (55,00) yang paling tinggi, yaitu sebanyak 7,49. Intervensi *peer education* ini dikombinasikan dengan pemberian senam aerobik. Penerapan *peer education* ini efektif pada remaja karena pada karakteristik remaja yang cenderung meniru dan merasa sangat terikat dengan teman sebayanya. Apalagi pada *peer education*, pemateri juga berasal dari kelompok sebaya dari remaja itu sendiri, sehingga memungkinkan remaja untuk menuangkan isi pikiran dan perasaannya kepada teman sebayanya. Beda hal apabila

pemateri atau fasilitator bukan dari teman sebayanya. Pasti ada keengganan dan kecanggungan dalam penyampaian pendapat ataupun pikiran si remaja.

Selain pengaruh teman sebaya, pemberian *peer education* ini juga dikombinasikan dengan senam aerobik 3 hari dalam seminggu yang dilakukan 2 kali sehari dengan durasi 10 menit. Senam aerobik ini sendiri akan membentuk kebiasaan baik yang baru untuk terus berolahraga dan meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya menjaga kesehatan.

#### **D. Pembahasan**

Masalah psikologi akibat penularan Covid 19 setiap harinya meningkat sehingga membuat ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih, tidak terkecuali pada anak. Anak, baik usia sekolah ataupun remaja memerlukan lingkungan yang baik untuk menunjang pertumbuhannya. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, pandemik Covid 19 ini banyak menimbulkan masalah kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, stress, gangguan mood dan lain sebagainya. Untuk menangani masalah-masalah kesehatan mental tersebut diperlukan intervensi yang efektif agar masalah tersebut tidak menimbulkan efek yang lebih pada anak. Berdasarkan hasil dari berbagai penelitian terdahulu, didapatkan delapan jenis intervensi yang terbukti secara statistik efektif dalam mengurangi tingkat kecemasan, depresi, stress dan juga gangguan mood pada anak dan remaja.

##### **1. Anak Usia Sekolah**

Berdasarkan hasil penelusuran artikel, diperoleh 3 artikel penelitian intervensi yang efektif dalam mengurangi masalah mental emosional pada anak usia sekolah.

- a. Membaca Al Qur'an

Membaca dan mendengarkan Al Quran beserta terjemahannya sangat memengaruhi efek terapi keperawatan. Dalam penerapan EBN, membaca dan memahami Al Quran dapat menjadi sarana terapi untuk menghadirkan tumakninah yakni sebuah ketenangan dan ketentraman hati, yang akan menunjang konsentrasi seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan (Yudhani et al., 2017).

Al Quran disebut juga sebagai As Syifa yang berarti Penyembuh, yang mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan dan menangani tekanan jiwa pada diri manusia. Membaca Al quran juga dapat menimbulkan ketenangan pada jiwa dan hati bagi yang melakukannya. Sebagaimana

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya: "(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram" (Q.S. Ar Ra'd : 28)

Orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dan menyambut kebenaran itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang ketika berzikir mengingat Allah dengan membaca al-Qur'an dan sebagainya, hati mereka menjadi tenang. Hati memang tidak akan dapat tenang tanpa mengingat dan merenungkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah, dengan selalu mengharap keridaan-Nya (Tafsirq.com, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Yudhani et al. (2017) yang ingin mengetahui efek dari membaca dan mentadabburi al-Qur'an untuk mengurangi kecemasan yang dilakukan pada siswa SMA kelas XII yang diukur menggunakan skala kecemasan yang diadaptasi dari Fadlillah (2011) yang mengacu dari teori Spielberger. Hasil penelitian menunjukkan

membaca dan mentadabburi Al Quran efektif dalam menurunkan kecemasan siswa (Yudhani et al., 2017).

Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Musthapa et al (2016) bahwa irama Al Quran mendatangkan rangsangan alpha dan tetha lebih mudah di otak, sehingga memberi dampak kesadaran yang lebih rileks. Gelombang alpha merupakan gerbang antara otak sadar betha dan otak bawah sadar tetha yang memasuki fase meditasi yang menimbulkan suasana yang lebih tenang dan perasaan damai (Sandra et al., 2021).

Secara signifikan stimulasi Al Quran berpengaruh dalam menurunkan hormon stress, meningkatkan perasaan rileks, mengaktifkan hormone endorphin alami, mengalihkan perasaan dari rasa takut, cemas dan tegang serta dapat memperbaiki kimia tubuh yang membantu dalam penurunan tekanan darah serta membuat pernafasan, detak jantung, denyut nadi menjadi lebih stabil serta meningkatkan aktifitas gelombang otak (Sandra et al., 2021).

#### b. *Peer-to-Peer Education*

Menurut WHO *peer education* adalah upaya sistematis yang dilakukan para ahli untuk mempengaruhi dan menyebarkan pengalaman serta pengetahuan mereka kepada kaum muda melalui perwakilan kaum muda yang telah memperoleh pelatihan dan pendidikan. Kegiatan *peer education* adalah memberikan pendidikan kesehatan dan menjadi narasumber dari latar belakang dan usia yang sama dengan kelompok target untuk menyampaikan sebuah pesan yang bersifat mendidik (Fikkriyah et al., 2017).

Konsep pendidikan *peer education* ini adalah pemberian informasi menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami yang disampaikan teman

sebayanya sehingga informasi yang disampaikan lebih mudah untuk diterima. Selain itu, teman sebaya merupakan sumber sosialisasi yang penting bagi remaja, dan mereka cenderung membentuk perilaku kesehatan positif dan negatif melalui teman sebayanya, dan lebih mempercayai informasi yang diberikan oleh teman sebayanya daripada yang diberikan oleh guru dan profesional (Yoo & Lee, 2018).

Karena keuntungan komunikasi yang mudah, empati, dan keamanan, *peer education* adalah metode pendidikan kesehatan yang berguna yang bersedia diterima oleh remaja. Metode ini telah diakui oleh WHO sebagai cara yang efektif untuk mengubah perilaku masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, *peer education* telah banyak digunakan sebagai cara pendidikan kesehatan *peer-to-peer* dalam pencegahan dan pengobatan AIDS, kanker, dan penyakit kronis, dan telah mencapai hasil yang baik (Ding & Jiwei, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Ifdil (2020) ini bermanfaat untuk perumusan rencana kesehatan mental untuk remaja yang belajar di rumah. Peran teman sebaya dapat mengurangi kecemasan karena teman sebaya dapat mendampingi, memotivasi, memberikan informasi dan konseling.

*Peer education* ini efektif pada anak usia sekolah salah satunya dikarenakan karakteristik anak yang senang untuk belajar dan bermain secara berkelompok, suka berbicara dan mengeluarkan pendapat minat besar dalam belajar serta adanya rasa ingin tahu yang besar. Hal ini membuat anak mudah untuk menerima informasi yang diberikan oleh teman sebaya.

c. Hypnosis 5 jari

Teknik hypnosis lima jari adalah salah satu teknik relaksasi generalis dengan cara mengingat kembali pengalaman-pengalaman menyenangkan yang pernah dialami oleh seseorang. Dengan hypnosis lima jari, di alam bawah sadarnya seseorang digiring kembali pada pengalaman-pengalaman yang menyenangkan sehingga timbul perasaan nyaman dan rileks, tingkat kecemasan dan masalah emosi lainnya menjadi turun sehingga seseorang menjadi mudah untuk tertidur (Dewi, 2021).

Terapi hypnosis lima jari merupakan seni komunikasi verbal yang bertujuan membawa gelombang pikiran klien menuju trance (gelombang alpha/theta) dengan tujuan untuk mengendalikan dan menghilangkan kecemasan dengan melibatkan saraf parasimpatis yang nantinya akan menurunkan peningkatan kerja jantung, tekanan darah, pernapasan, kelenjer keringat dan lain-lain sehingga akan mengurangi stres dan ketegangan fisik seseorang (Simanjuntak et al., 2021).

Penelitian Ariana et al. (2020) yang dilakukan di masa pandemi pada wanita usia produktif (35-55 tahun) menunjukkan terapi hypnosis 5 jari yang dikombinasikan dengan musik pop secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan kecemasan. Terapi hypnosis ini memberikan efek relaksasi serta merangsang timbulnya emosi dan pikiran yang positif pada responden (Ariana et al., 2020).

Dalam Simanjuntak et al. (2021) juga menunjukkan bahwa hypnosis lima jari efektif dalam mengeloa stress dengan membuat para peserta menjadi lebih tenang dan rileks. Dalam penelitian Evangelista et al (2016) menunjukkan adanya pengaruh hypnosis lima jari terhadap tingkat kecemasan pasien sirkumsisi. Seperti pada studi Sumirta (2018) yang

menunjukkan bahwa terapi hypnosis lima jari secara signifikan mampu menurunkan depresi pada ODHA.

Metode teknik hypnosis lima jari dapat dilakukan  $\pm 10$  menit dengan konsentrasi dan rileks. Pertama dengan menyentuh ibu jari dengan telunjuk dan mengenang saat-saat kita berada dalam keadaan sehat, kedua menyentuh ibu jari dengan jari tengah dan mengenang saat pasien pertama kali mengalami bahagia, ketiga menyentuh ibu jari dengan jari manis dan mengenang saat pasien mendapat pujian dan terakhir menyentuh ibu jari dengan kelingking dan mengenang tempat yang paling indah yang pernah dikunjungi (Dewi, 2021).

Penurunan tingkat kecemasan pada anak usia sekolah setelah diberikan terapi hypnosis 5 jari salah satunya dipengaruhi oleh faktor dari diri anak itu sendiri. Selain karena senang untuk belajar atau bermain secara berkelompok, anak usia sekolah juga mempunyai tingkat perhatian atau fokus yang singkat. Intervensi ini dilakukan dengan mengajak anak untuk berimajinasi dan mengingat hal-hal yang membuatnya senang selama 10 menit. Durasi pemberian intervensi ini termasuk cukup singkat yang juga berpengaruh terhadap tingkat kefokusannya.

## **2. Remaja**

Berdasarkan hasil penelusuran artikel, diperoleh 8 artikel yang melakukan penelitian pada intervensi yang efektif terhadap penurunan masalah mental emosional remaja.

### **a. Terapi Musik**

Terapi musik merupakan terapi yang bersifat universal yang bisa diterima secara luas yang digunakan dalam konteks terapeutik untuk membantu meningkatkan kesehatan mental (Wang & Agius, 2018).

*“Music therapy is the professional use of music and its elements as an intervention in medical, educational, and everyday environments with individuals, groups, families, or communities who seek to optimize their quality of life and improve their physical, social, communicative, emotional, intellectual, and spiritual health and wellbeing. Research, practice, education, and clinical training in music therapy are based on professional standards according to cultural, social, and political contexts.” – World Federation for Music Therapy;*

Terapi musik terdiri dari kombinasi melodi, ritme, harmoni, timbre sehingga mampu menciptakan musik dan suasana yang nyaman dan bermanfaat bagi kesehatan mental dan juga fisik. Musik membuat seseorang terlarut dalam suasana sehingga mengalihkan pikiran dan perasaan dan menyebabkan emosi pada pendengarnya (Puspaningrum et al., 2015).

Penelitian yang dilakukan Jannah et al. (2021) bahwa mendengarkan musik 8-D memberikan pengaruh terhadap kecemasan mahasiswa. Mendengarkan musik juga telah dipelajari pada pasien depresi di atas usia 65 tahun. Studi yang dilakukan Chan (2012) dikatakan mendengarkan musik dapat mengurangi gejala depresi pada orang dewasa (di atas 65 tahun). Pada kelompok intervensi ada penurunan yang signifikan secara statistik dalam skor depresi ( $P < 0,001$ ) dan tekanan darah). Mendengarkan musik dapat membantu orang tua untuk mengurangi tingkat depresi mereka (Wang & Agius, 2018).

Dengan mendengar musik dapat meningkatkan produksi dopamine. Dopamine adalah neurotransmitter yang mampu memunculkan perasaan senang. Peningkatan dopamine dapat menimbulkan perasaan nyaman, senang serta kecemasan dapat dikelola (Jannah et al., 2021). Suasana yang ditimbulkan memberikan efek positif yang dapat membantu mendukung motivasi serta kompetensi emosional dan relasional dari orang-orang yang



terkena kecemasan dan depresi, baik dari remaja hingga orang dewasa yang lebih tua (Aalbers et al., 2017).

Terapi musik yang diberikan pada remaja disesuaikan dengan minat masing-masing. Hal ini membuat remaja yang berada pada tahap pencarian dan penentuan jati diri merasa pilihan yang diambilnya diharga dan mendapatkan dukungan. Selain itu, terapi musik ini juga dilakukan pada kelompok sebayanya, yang pada dasarnya remaja sedang berada pada tahap mencari afiliasi dan mendapatkan penerimaan dengan teman sebayanya.

#### b. Frekuensi Latihan Yoga

Yoga, praktik gerakan pikiran-tubuh berasal dari India yang juga disebut latihan gerakan meditatif karena melibatkan gerakan, keadaan pikiran meditatif, fokus napas, dan relaksasi napas dalam. Yoga saat sekarang ini sudah menjadi bentuk pengobatan alternatif. Yoga secara umum ditafsirkan sebagai praktik menyatukan pikiran, tubuh, dan napas untuk tujuan meningkatkan atau menyembuhkan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional (Nanthakumar, 2020).

Yoga didefinisikan sebagai berbagai praktik yang meliputi postur, latihan pernapasan, meditasi, mantra, perubahan gaya hidup, keyakinan spiritual, atau ritual. Bentuk yoga yang sering dipraktikkan adalah Hatha Yoga, yang mencakup asana (postur), pranayama (latihan pernapasan) dan meditasi, yang biasanya dilakukan secara bersamaan selama latihan (Breedvelt et al., 2019).

Melakukan latihan yoga secara rutin tidak hanya akan memberikan kesehatan secara fisik belaka. Kesehatan secara mental dan spiritual akan turut serta apabila latihan dilakukan dengan cara dan metode yang tepat.

Lahirnya pikiran yang positif akan memancarkan vibrasi positif pula pada alam semesta sehingga akan berpengaruh kembali kepada manusia sebagai penghuni alam semesta. Inilah perbedaan utama kesehatan yang diperoleh dari latihan yoga dibandingkan dengan latihan fisik lainnya (Sudarsana et al., 2020).

Penelitian Sofiyanti et al. (2020) yang dilakukan selama masa adaptasi kenormalan baru pada anak usia sekolah menggambarkan pemberian latihan yoga mampu meningkatkan kesehatan fisik dan mental anak. Pemberian latihan yoga ini dilakukan pada masa adaptasi kenormalan dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Dalam pelaksanaannya, latihan yoga dilakukan dengan menciptakan kondisi yang menyenangkan dimana anak diajak untuk bermain dan mengembangkan imajinasinya selama proses latihan yoga dilakukan. (Sofiyanti et al, 2020).

Penelitian yang dilakukan Davis et al. (2015) menunjukkan yoga juga efektif dalam menghilangkan depresi pada periode perinatal, tetapi hasilnya bervariasi berdasarkan gaya yoga. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian oleh Ayala et al. (2018) yaitu meningkatkan frekuensi latihan yoga akan meningkatkan efektivitas yoga bagi kesehatan. Hasil penelitian Permatananda et al. (2020) juga menunjukkan bahwa latihan yoga yang dilakukan selama 3 sesi efektif dalam menurunkan kecemasan lansia.

Yoga juga meningkatkan kesehatan emosional dan psikososial serta peningkatan kesadaran proprioseptif dan interoseptif (Woodyard, 2011). Ada saran bahwa yoga, jika dilakukan secara konsisten, dapat menginduksi neuroplastisitas yaitu perubahan jalur saraf otak, sehingga meningkatkan keterampilan psikologis. Ini merupakan hal yang baik

karena menyiratkan bahwa otak dapat disusun ulang seperti otot di tubuh fisik. Penelitian yang dilakukan Sengupta (2012) menunjukkan bahwa latihan teknik yoga tertentu dapat membawa efek positif pada kesehatan mental praktisi karena penurunan regulasi sumbu adrenal hipotalamus-hipofisis dan sistem saraf simpatik (Nanthakumar, 2020).

Faktor psikologis yang memengaruhi peran frekuensi latihan yoga terhadap tingkat kecemasan yaitu adanya unsur mindfulness pada latihan yoga yang mengacu pada kondisi mental yang ditandai dengan kesadaran akan pengalaman saat ini tanpa mengkhawatirkan masa depan maupun menyesali masa lalu secara berlebihan (Tri Kusuma & Luh, 2019).

Yoga tampaknya menjadi bentuk meditasi bergerak dengan manfaat yang sangat banyak. Karena gerakan meditatif tidak hanya melibatkan peregangan tetapi juga gerakan dinamis yang terkait dengan pernapasan, yoga meningkatkan stamina fisik, keseimbangan, fleksibilitas, dan menginduksi relaksasi (Nanthakumar, 2020).

### c. *Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)*

Penelitian selanjutnya oleh Zhang et al. (2019) yang menggunakan intervensi MBSR untuk mengurangi dan menurunkan tingkat depresi pada remaja. Zhang menerapkan MBSR pada 56 remaja yang dibagi menjadi kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Kelompok intervensi

Intervensi mindfulness adalah perawatan psikologis, yang mengacu pada serangkaian metode pelatihan psikologis berdasarkan "perhatian", yang dapat membantu individu menumbuhkan dan meningkatkan perhatian. MBSR adalah terapi sistematis psikologis non farmakologi yang mencakup empat keterampilan kesadaran dasar. Melalui meditasi mindfulness, kesadaran tubuh dan yoga, MBSR dapat membangkitkan

kesadaran batin dan meningkatkan pengaturan diri untuk membantu dalam menghilangkan stress (Zhang et al., 2019).

Terapi mindfulness mencakup teknik formal dan informal. Bentuk tradisional dari terapi pengurangan stres berbasis kesadaran adalah intervensi kelompok. Untuk remaja, cara terbaik untuk melakukan intervensi psikologis adalah dengan membiarkan remaja menerapkan teknik-teknik tersebut dalam kehidupan mereka dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu, sehingga meningkatkan kesehatan psikologis mereka (Zhang et al., 2019).

MBSR selain mampu menurunkan stress juga efektif dalam menurunkan gangguan psikologis lainnya. Seperti penelitian Zhang et al. (2017) yang menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan pada penurunan tingkat stress dan kecemasan pasien kanker payudara setelah dilakukan MBSR. Penelitian lain yang dilakukan oleh Norouzi et al. (2019) menemukan bahwa pemberian intervensi MBSR secara signifikan efektif dalam mengurangi gejala stres, kecemasan, dan depresi, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis pada pensiunan pemain sepak bola Iran. Selain itu penelitian yang dilakukan Marciniak et al. (2020) yang menemukan pemberian MBSR efektif dalam menurunkan gejala depresi pada pasien gangguan kognitif ringan.

Melalui mendengarkan, mengamati, makan dan mencium dengan penuh perhatian, individu dapat menangani emosi dengan damai dan menjaga sikap ramah terhadap diri mereka sendiri, menghargai kemampuan mereka sendiri tanpa penilaian atau persaingan. Dengan begitu, individu akan memahami keterampilan kesadaran dasar melalui

latihan secara bertahap akan menumbuhkan perhatian ke dalam kehidupan mereka (Aalderen et al., 2012).

Inti dari mindfulness adalah untuk fokus pada saat ini tanpa adanya penilaian apapun. Pelatihan mindfulness membantu individu untuk secara sadar memilih dan mengenali pikiran, emosi dan perasaan tetapi tidak menghasilkan reaksi kebiasaan, yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatur emosi, sehingga secara bertahap menghilangkan proses evaluasi otomatis terhadap emosi negatif, yang membantu menurunkan tingkat depresi (Zhang et al., 2019).

d. *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT)

*Cognitive behavioral therapy* (CBT) merupakan pendekatan terapi yang berpusat pada proses berfikir dan berkaitan dengan keadaan emosi, perilaku dan psikologi. CBT berpusat pada gagasan bahwa seseorang mampu mengubah kognisi mereka dan mengubah dampak pemikiran pada kesejahteraan emosi. CBT merupakan pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseling pada saat ini dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang (Fitria et al., 2020).

Tujuan dari dilakukannya konseling CBT adalah untuk membantu anggota kelompok dalam mengevaluasi bagaimana pemikiran mereka berpengaruh terhadap perilaku mereka. Untuk membantu anggota kelompok menghilangkan perilaku maladaptif dengan belajar hal yang baru agar pola perilaku lebih efektif. Hal tersebut berarti hal yang perlu dilakukan adalah membant individu untuk menstruktur kembali pikiran-pikiran negatif menjadi adaptif (Beck et al., 2015).

Penelitian Prabandari et al. (2015) yang menyebutkan bahwa pemberian CBT efektif dalam menurunkan gejala PTSD yang dialami oleh pasien kecelakaan lalu lintas. Sejalan dengan penelitian Afriyanti et al. (2018) mengenai pengaruh pemberian CBT terhadap kecemasan remaja di daerah rawan banjir efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan remaja. Pengaruh CBT juga telah diteliti pada kelompok lansia. Penelitian Ninapoli et al. (2017) dilakukan pada 134 lansia yang mempunyai gejala kecemasan menunjukkan adanya penurunan kecemasan dan kecemasan fobia setelah pemberian CBT pada lansia pedesaan.

Pemberian CBT dapat membuat respon meningkatkan toleransinya dalam menghadapi peristiwa trauma, memiliki strategi pemecahan masalah yang lebih efektif jika kedepannya mengalami permasalahan yang sama. Dengan pemberian CBT, dapat membantu individu dalam memutus hubungan negatif yang tercipta antara pikiran dan perilaku (Prabandari et al., 2015).

e. *Peer Education*

*Peer education* atau yang sering disebut dengan *peer group*, dapat diartikan pendidikan sebaya atau juga sering disebut dengan kelompok sebaya. Berdasarkan berbagai kajian disebutkan bahwa definisi pendidikan sebaya adalah berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan masalah kesehatan remaja. Pendidikan sebaya diimplementasikan pada antar kelompok sebaya yang diarahkan atau dipandu oleh seorang fasilitator yang juga berasal dari sebayanya atau kelompok itu sendiri (Nurmala, 2020).

Berbagai masalah remaja dipandang dapat diatasi secara efektif dengan adanya pendidikan sebaya, karena penjelasan yang disampaikan oleh seseorang yang berasal dari kelompoknya sendiri akan lebih mudah dipahami. Pendidikan lebih bermanfaat, karena alih pengetahuan dilaksanakan oleh antar kelompok sebaya mereka sehingga komunikasi menjadi lebih terbuka. Hal-hal yang tabu atau takut untuk didiskusikan bersama termasuk yang bersifat sensitive dapat dibahas secara terbuka di antara mereka dalam kelompok sebaya (Nurmala, 2020).

Penelitian yang dilakukan Ankhofiyya (2017) pada 27 remaja yang mengalami kecemasan pra menstruasi secara signifikan menurun setelah dilakukannya *peer education*. Penelitian Magfirotullah (2019) menyebutkan pengaruh *peer education* terhadap kecemasan pra menstruasi yang dilakukan pada 52 remaja secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kecemasan remaja. Penelitian lain oleh Akasyah et al. (2017) yang meneliti pengaruh *peer education* terhadap ketahanan psikologis remaja yang mengalami konflik menunjukkan secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap ketahanan psikologis remaja .

*Peer education* ini efektif diterapkan pada remaja karena pada dasarnya remaja sangat terikat dengan teman sebayanya. Remaja cenderung akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan teman sebayanya. Dengan begitu, pemberian *peer education* dengan fasilitator teman sebayanya sendiri, akan menarik remaja untuk melakukan hal yang sama dengan teman sebayanya. Selain itu, remaja akan merasa lebih terbuka untuk berdiskusi hal-hal yang bersifat pribadi dengan teman sebayanya.

f. Hypnosis 5 Jari dan Terapi Musik (*Hypnofivesic*)

Terapi hypnosis lima jari ini dapat pula dilakukan bersamaan dengan terapi lain, seperti terapi musik. Sebagaimana yang telah dijelaskan, terapi musik memberikan efek rileks dan nyaman bagi pendengarnya sehingga membantu dalam membuat suasana hati dan pikiran menjadi tenang. Perpaduan dari hypnosis lima jari dan terapi musik ini biasa dikenal sebagai *hypnofivesic*. Keefektifan terapi *hypnofivesic* juga diakibatkan karena penggunaan terapi musik. Musik yang digunakan berdurasi 15 menit yang memiliki background relaksasi. Terapi musik juga telah terbukti mampu menurunkan stress, cemas, dan depresi (Utami et al, 2021).

Penelitian yang dilakukan Padaka et al. (2019) menunjukkan mahasiswa tingkat akhir yang memiliki tingkat stress sedang mengalami penurunan menjadi ringan setelah diberikan terapi hypnosis lima jari. Selain dari stress, penelitian menunjukkan terapi ini juga efektif dalam menurunkan kecemasan. Hastuti & Arumsari (2015) menemukan bahwa setelah diberikan hypnosis lima jari mahasiswa yang memiliki tingkat kecemasan sedang menurun menjadi ringan (Utami et al., 2021).

Metode teknik hypnosis lima jari dapat dilakukan  $\pm 10$  menit dengan konsentrasi dan rileks. Pertama dengan menyentuh ibu jari dengan telunjuk dan mengenang saat-saat kita berada dalam keadaan sehat, kedua menyentuh ibu jari dengan jari tengah dan mengenang saat pasien pertama kali mengalami bahagia, ketiga menyentuh ibu jari dengan jari manis dan mengenang saat pasien mendapat pujian dan terakhir menyentuh ibu jari dengan kelingking dan mengenang tempat yang paling indah yang pernah dikunjungi (Dewi, 2021).



Penurunan tingkat depresi ataupun kecemasan pada seseorang terjadi karena terapi ini dapat mempengaruhi sistem limbik seseorang yang juga akan berpengaruh pada hormon-hormon yang memicu timbulnya cemas, stress dan nyeri, serta dapat berpengaruh pada pernafasan, tekanan darah, denyut nadi, denyut jantung, memperkuat ingatan, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan produktivitas suhu tubuh. Hal tersebut menstimulasi otak agar membuka bagian-bagian otak yang pada sebelumnya terhambat dan terbuka sehingga dapat membantu menurunkan cemas (Juhaeriah, 2019).

g. Pemberian Buah

Penelitian lain (Latifah et al., 2021) yang meneliti tingkat depresi dan suasana hati (*mood*) pada 60 santriwati kelas XI dan XII setelah diberikan intervensi pemberian buah. Intervensi pemberian buah dilakukan selama 14 hari dengan.

Peran buah dan sayuran telah mendapat perhatian yang lebih, mengingat efek perlindungannya terhadap berbagai jenis penyakit baik yang bersifat kronis atau akut seperti penyakit kardiovaskular dan kanker. Yang menarik, konsumsi sayur dan buah tidak hanya mengendalikan metabolisme dan kondisi fisik tetapi juga kondisi mental emosional seperti depresi, kecemasan, suasana hati (*mood*), kualitas hidup, dan kesehatan mental lainnya (Nguyen et al., 2017).

Defisiensi mikronutrien tertentu dapat mengakibatkan perubahan fungsi mental yang mendahului penyakit defisiensi yang nyata. Misalnya, gejala depresi, kelelahan, dan lekas marah diketahui mendahului gejala fisik yang jelas dari penyakit kudis akibat kekurangan vitamin C. Buah dan sayuran kaya akan berbagai vitamin dan mineral penting, terutama vitamin

C dan karotenoid. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi buah dan sayuran dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan psikologis dan penurunan depresi (Carr et al., 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Carr et al. (2013) pemberian 2 buah kiwi/hari kepada 134 mahasiswa laki yang tidak merokok cenderung signifikan berpengaruh terhadap suasana hati dan penurunan depresi pada mahasiswa. Smith & Rosannagh (2014) juga menyebutkan konsumsi buah sebagai makanan ringan yang diuji cobakan kepada 100 mahasiswa berpengaruh terhadap penurunan kelelahan, kecemasan, depresi dan tekanan emosional. Penelitian lain oleh Nguyen et al., (2017) menyebutkan bahwa kombinasi sayur dan buah yang dikonsumsi berpengaruh terhadap penurunan insiden depresi yang lebih rendah pada wanita paruh baya di Australia yang diawasi selama 6 tahun.

Gangguan mental emosional seperti depresi, suasana hati, dan vitalitas dapat dipengaruhi oleh neurotransmitter. Neurotransmitter yang berperan dalam mempengaruhi depresi dan suasana hati adalah noreadrenalin, dopamin dan serotonin. Perubahan dopamin menjadi noreadrenalin membutuhkan vitamin C yang banyak terdapat di buah-buahan. Vitamin B6, B12, dan B9 yang terdapat dalam buah segar merupakan prekursor yang menyebabkan penurunan homosistein yang akan mempengaruhi depresi dan suasana hati dan kesehatan mental lainnya (Latifah et al., 2021).

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi *literature review* pada artikel yang membahas intervensi yang efektif dalam menurunkan masalah kesehatan mental emosional anak

selama pandemi. Namun, kondisi pandemi ini tidak memungkinkan dilakukannya intervensi secara langsung kepada anak dan remaja dikarenakan pematuhan protocol kesehatan guna mencegah penularan virus satu sama lain. Jadi artikel yang membahas intervensi yang efektif untuk menurunkan masalah kesehatan mental emosional anak hanya sedikit sehingga dilakukan perluasan cakupan. Intervensi yang tidak dilakukan pada masa pandemi tetapi efektif dalam menurunkan masalah kesehatan mental emosional anak juga diinklusi ke dalam artikel yang di *review*.

Dalam penelitian ini juga sampel yang digunakan dari kesebelas artikel sangat bervariasi. Pada anak usia sekolah sampelnya berada pada rentang usia 11-13 tahun, sedangkan pada remaja 13-20 tahun. Pengkategorian usia remaja untuk remaja awal, tengah dan akhir sulit untuk dibedakan karena masing-masing artikel mempunyai rentang waktu yang cukup jauh. Sehingga hanya dikategorikan remaja secara umum.

#### **F. Implikasi Penelitian**

Implikasi dari hasil penelitian ini telah diperoleh dapat memanfaatkan dalam berbagai bidang, diantaranya :

##### 1. Pelayanan keperawatan

Hasil penelitian ini memberikan gambaran strategi intervensi yang dapat digunakan dalam untuk menangani masalah kesehatan mental emosional anak di masa pandemi. Oleh karena itu, dalam pelayanan beberapa startegi intervensi dapat diterapkan karena telah terbukti mampu menurunkan masalah kesehatan mental emosional baik pada anak usia sekolah atau remaja.

##### 2. Bagi Pendidikan

Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk dilakukannya penelitian yang lebih lanjut terkait intervensi yang paling efektif dalam menangani masalah kesehatan mental emosional pada anak usia sekolah dan remaja.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Strategi intervensi yang dapat digunakan untuk mengurangi ataupun menangani masalah kesehatan mental emosional pada anak selama masa pandemi Covid 19 baik itu kecemasan, depresi, stress atau gangguan mood bisa dilakukan dengan terapi musik, membaca Al Quran, latihan yoga, MBSR, *peer education*, CBT, hypnosis 5 jari, dan pemberian buah. Intervensi-intervensi tersebut telah terbukti secara statistik berpengaruh terhadap penurunan gejala ataupun tingkat gangguan mental emosional pada anak selama masa pandemi Covid 19. Dari kesebelas artikel tersebut kemudian dibagi menjadi intervensi yang efektif diterapkan pada usia pertumbuhan anak.

1. Pada anak usia sekolah terdapat tiga intervensi yang dapat diterapkan untuk mengurangi gangguan mental emosional, yang pertama membaca Al Quran, *peer-to-peer education* dan intervensi hypnosis lima jari.
2. Pada usia remaja terdapat 7 intervensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi gangguan mental emosional remaja. Intervensi *Minfulness-Based Stress Reduction* (MBSR), *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT), *peer education*, terapi musik, latihan yoga, pemberian buah dan hypnosis lima jari yang dikombinasikan dengan terapi musik.

#### **B. Saran**

1. Bagi institusi, penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian untuk melakukan penelitian selanjutnya seperti penelitian intervensi pada anak yang mengalami masalah mental emosional

2. Bagi pelayanan keperawatan, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dapat diterapkan baik di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya.
3. Bagi Masyarakat, Orang tua atau Guru diharapkan mampu memberikan intervensi mandiri pada anak dan remaja yang mengalami masalah kesehatan mental emosional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aalbers, S., Fusar-Poli, L., Freeman, R. E., Spreen, M., Ket, J. C., Vink, A. C., ... & Gold, C. (2017). *Music therapy for depression*. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (11).
- Ais, Rohadatul. (2020). *Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid 19 Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Era 4.0 (KKN\_DR)*. Banten: Makmood Publishing
- Ariana, P. A., Dewi, P. I. S., & Rismayanti, I. D. A. (2020). *Hipnosis Lima Jari Kombinasi Instrumen Musik Pop Menurunkan Kecemasan Wanita Produktif Dimasa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 4(1), 231-238.
- Berly Arnoval, B. A. (2020). *Penerapan Terapi Hipnosis Lima Jari Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sapiran Kota Bukittinggi Tahun 2020* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA).
- Breedvelt, J. J., Amanvermez, Y., Harrer, M., Karyotaki, E., Gilbody, S., Bockting, C. L., ... & Ebert, D. D. (2019). *The effects of meditation, yoga, and mindfulness on depression, anxiety, and stress in tertiary education students: a meta-analysis*. *Frontiers in psychiatry*, 10, 193.
- Carr, A. C., Bozonet, S. M., Pullar, J. M., & Vissers, M. C. (2013). *Mood improvement in young adult males following supplementation with gold kiwifruit, a high-vitamin C food*. *Journal of Nutritional Science*, 2.
- CNNIndonesia. (2020). *Hari Anak Nasional Mengenal Masalah Kesehatan Mental Pada Anak*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200723200411-255-528345/mengenal-masalah-kesehatan-mental-pada-anak> pada tanggal 24 Februari 2021
- Dewi, Rosliana. (2021). *Teknik Relaksasi Lima Jari Terhadap Kualitas Tidur, Fatigue Dan Nyeri Pada Pasien Kanker Payudara*. Yogyakarta: Deepublish
- Ding, X., & Yao, J. (2020). *Peer Education Intervention on Adolescents' Anxiety, Depression, and Sleep Disorder during the COVID-19 Pandemic*. *Psychiatria Danubina*, 32(3-4), 527-535. <https://doi.org/10.24869/psyd.2020.527>
- Fakhriyani, Diana Vidya. (2019). *Kesehatan Mental*. Pamekasa: Duta Media Publishing
- Firdaus, F., Hardiningrum, A., & Nurjannah, S. (2021). *Penurunan Kecemasan pada Anak Sekolah dengan Membaca Alquran Selama Pandemi Covid 19*. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 209-214.
- Gunatirin, E. Y. (2018). *Kesehatan Mental Anak dan Remaja*.
- Hidayati, R. W., Susilowati, L., & Utami, K. D. (2021). *Pengaruh Terapi Hypnofivesic Terhadap Depresi, Cemas, Dan Stres Mahasiswa Dalam Menjalani Proses Belajar Mengajar Daring Selama Pandemi Covid-19*. *Jurnal Kesehatan Mesencephalon*, 7(1).

- Himapsikologi. (2020). *Hari Anak Sedunia : Peduli Mental Anak Di Masa Pandemi*. Diakses dari <http://himapsikologi.student.uny.ac.id/hari-anak-sedunia-peduli-mental-anak-di-masa-pandemi/> diakses pada 23 Februari 2021
- ILO. (2020). *Dalam menghadapi pandemi: Memastikan Kes elamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja*. Ashkan Forouzani on Unsplash
- James-Palmer, A., Anderson, E. Z., Zucker, L., Kofman, Y., & Daneault, J. F. (2020). Yoga as an intervention for the reduction of symptoms of anxiety and depression in children and adolescents: a systematic review. *Frontiers in pediatrics*, 8, 78.
- Jannah, M., Laksmiwati, H., Dewi, D. K., & Darmawanti, I. (2021). *Intervensi Musik 8-D Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Mahasiswa Unesa Saat Pandemi Covid-19*. Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021, 1(1), 870-876.
- Juhaeriah, J., Tajulfikri, M., & Apriany, D. (2020). *Pengaruh Terapi Hipnosis Lima Jari Terhadap Kecemasan pada Anak Usia Sekolah Kelas V (Lima) di SDN Melong Mandiri 4 Kota Cimahi*. PIN-LITAMAS, 2(1), 124-134.
- Kemendikbud.Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pandemi> pada 24 Februari 2021
- Kumparan.com. (2020).*Ayat Alquran yang Mengajarkan Cara Hadapi Wabah*. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/lentera-ramadhan/ayat-alquran-yang-mengajarkan-cara-hadapi-wabah-1tGryfenomn> pada 25 Februari 2021
- Latifah, A. N., Palupi, K. C., & Sapang, M. (2021). *Pengaruh Pemberian Buah Terhadap Gejala Depresi, Suasana Hati (Mood) dan Vitalitas Pada Remaja Putri di Pondok Pesantren Assiddiqiyah*. *Gizi Indonesia*, 44(1), 11-20.
- Lorentzen, V., Fagermo, K., Handegård, B. H., Skre, I., & Neumer, S. P. (2020). *A randomized controlled trial of a six-session cognitive behavioral treatment of emotional disorders in adolescents 14-17 years old in child and adolescent mental health services (CAMHS)*. *BMC psychology*, 8(1), 25. <https://doi.org/10.1186/s40359-020-0393-x>
- Nanthakumar, C. (2020). Yoga for anxiety and depression—a literature review. *The Journal of Mental Health Training, Education and Practice*.
- Nguyen, B., Ding, D., & Mihrshahi, S. (2017). Fruit and vegetable consumption and psychological distress: cross-sectional and longitudinal analyses based on a large Australian sample. *BMJ open*, 7(3), e014201.
- Nurmala, Ira et al. (2020). *Mewujudkan Remaja Sehat Fisik, Mental dan Sosial (Model Intervensi Health Educator for Youth)*. Surabaya:Airlangga University Press
- Nuryono, W., & Syafitri, E. R. (2020).*Dialectical Behavior Therapy (DBT) sebagai Upaya Mengatasi Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) Selama Masa Pandemi COVID-19*. PD ABKIN JATIM Open Journal System, 1(1), 467-476.



- Nwachukwu, I., Nkire, N., Shalaby, R., Hrabok, M., Vuong, W., Gusnowski, A., ... & Agyapong, V. I. (2020). COVID-19 pandemic: age-related differences in measures of stress, anxiety and depression in Canada. *International journal of environmental research and public health*, 17(17), 6366.
- Permatananda, P. A. N. K., Aryastuti, A. A. S. A., & Cahyawati, P. N. *Pelatihan Yoga Pada Kelompok Lansia Komunitas Sadar Sehat Dalam Rangka Menurunkan Kecemasan*.
- Prabandari, D., Sukarja, M., & Maryati, G. (2018). Pengaruh Cognitive Behavioral Therapy (CBT) terhadap Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Pada Pasien Post Kecelakaan Lalu Lintas di RSUP Sanglah Denpasar. *Coping: Community of Publishing in Nursing*, 3(2), 22-26.
- Prismandari, L. N. (2017). *Gambaran Status Kesehatan Jiwa Masyarakat Pegunungan Kabupaten Batang* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Semarang).
- Rasman, R., & Nurdian, Y. (2020). *Inisiasi Pelatihan Tari Sebagai Terapi Pereda Depresi Anak Saat Pandemi Di Taddan Sampang*. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 3(2), 474-479.
- Raudhati, S. (2020). *Determinan Kesehatan Mental Anak Yatim Dan Piatu Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kabupaten Bireuen*. *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(3), 120-132.
- Ravens-Sieberer, U., Kaman, A., Otto, C., Erhart, M., Devine, J., & Schlack, R. (2020). *Impact of the COVID-19 Pandemic on Quality of Life and Mental Health in Children and Adolescents*. Available at SSRN 3721508.
- Ross, H. O., & Hasanah, M. (2020). *Implementasi Konsep Sahdzan (Sabar Danhuznudzan) Sebagai Upaya Perawatan Kesehatan Mental Di Masapandemi Covid-19*. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 12(1).
- Roziika, A., Santoso, M. B., & Zainudiin, M. (2020). *Penanganan Stres Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Metode Emotional Freedom Technique (EFT)*. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 121-130.
- Sandra, D. D., Arista, L., & Gultom, Y. (2021). Penerapan Mendengarkan Al-Qur'an Surat Al Waqi'ah Dan Terjemahannya Untuk Menurunkan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Elektif Bedah Digestif. *Jurnal Ners Indonesia*, 11(2), 181-191.
- Simanjuntak, G. V., Pardede, J. A., Sinaga, J., & Simamora, M. (2021). Mengelola Stres di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Hipnotis Lima Jari. *Journal of Community Engagement in Health*, 4(1), 54-57.
- Soklaridis, S., Lin, E., Lalani, Y., Rodak, T., & Sockalingam, S. (2020). *Mental health interventions and supports during COVID-19 and other medical pandemics: A rapid systematic review of the evidence*. *General hospital psychiatry*, 66, 133-146.
- Stikkelbroek, Y., Vink, G., Nauta, M. H., Bottelier, M. A., Vet, L., Lont, C. M., van Baar, A. L., & Bodden, D. (2020). *Effectiveness and moderators of individual cognitive behavioral therapy versus treatment as usual in clinically depressed adolescents: a randomized controlled trial*. *Scientific reports*, 10(1), 14815. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-71160-1>

- Sudarsana, I Ketut et al. (2020). *Covid-19 Perspektif Agama dan Kesehatan*. Bali:Yayasan Kita Menulis
- Sulistyorini, S., Hasina, S. N., Millah, I., & Faishol, F. (2021). Music Therapy to Reducing Adolescent Anxiety During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 4(2), 289-296.
- Tabi'in, A. (2020). *Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada anak usia dini sebagai upaya pencegahan Covid 19*. JEA (Jurnal Edukasi AUD), 6(1), 58-73.
- Trikusuma, G. A. A. C., & Suarya, L. M. K. (2020). *S. Peran Frekuensi Latihan Yoga Terhadap Tingkat Kecemasan pada Remaja di Kabupaten Tabanan*. Jurnal Psikologi Udayana Edisi Khusus Kesehatan Mental dan Budaya I, 187-195.
- Wang, S., & Agius, M. (2018). The use of music therapy in the treatment of mental illness and the enhancement of societal wellbeing. *Psychiatria Danubina*, 30(Suppl 7), 595-600.
- Warmansyah, J. (2020). Program Intervensi Kembali Bersekolah Anak Usia Dini Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 743-754.
- WHO. (2020). Diakses dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19#:~:text=symptoms> pada tanggal 23 Februari 2021
- Winurini, S. (2020). 'Permasalahan Kesehatan Mental Akibat Pandemi Covid-19. *Info Singkat, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 13-18.
- Wulandari, D., & Hermiati, D. (2019). Deteksi Dini Gangguan Mental dan Emosional pada Anak yang Mengalami Kecanduan Gadget. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 3(1), 382-392.
- Yudhani, E., Suharti, V., Adya, A., & Utami, E. S. (2017). Efektivitas Membaca Dan Mentadabburi Al-Qur'an Dalam Menurunkan Kecemasan Siswa Yang Akan Menghadapi Ujian Sekolah. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 2(1), 23-31.
- Zhang, J. Y., Ji, X. Z., Meng, L. N., & Cai, Y. J. (2019). *Effects Of Modified Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) On The Psychological Health Of Adolescents With Subthreshold Depression: A Randomized Controlled Trial*. *Neuropsychiatric Disease And Treatment*, 15, 2695–2704. <https://doi.org/10.2147/NDT.S216401>
- Zheng, Y., Wang, W., Zhong, Y., Wu, F., Zhu, Z., Tham, Y. C., Lamoureux, E., Xiao, L., Zhu, E., Liu, H., Jin, L., Liang, L., Luo, L., He, M., Morgan, I., Congdon, N., & Liu, Y. (2021). *A Peer-to-Peer Live-Streaming Intervention for Children During COVID-19 Homeschooling to Promote Physical Activity and Reduce Anxiety and Eye Strain: Cluster Randomized Controlled Trial*. *Journal of medical Internet research*, 23(4), e24316. <https://doi.org/10.2196/24316>



# LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Lampiran I JBI Checklist**

***Checklist Critical Apraisal JBI Untuk Studi Quasy Eksperiment***  
**(Studi Eksperimental)**

Peninjau : Sitti Aisyah A

Tanggal: 9 Agustus 2021

No	Pertanyaan	Nomor Dokumen						
		1	2	3	7	8	9	10
1	Apakah jelas dalam penelitian ini apa “ penyebab” dan apa “efek” (yaitu tidak ada kebingungan tentang variabel mana yang lebih dulu)?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Apakah para peserta termasuk dalam perbandingan yang serupa ?	Ya	Tidak berlaku	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Apakah para peserta termasuk dalam perbandingan yang menerima perawatan atau tindakan serupa, selain paparan atau intervensi yang diinginkan?	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
4	Apakah ada kelompok kontrol ?	Ya	Tidak berlaku	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Apakah ada beberapa pengukuran dari hasil <i>pre-post</i> dan memposting intervensi/paparan ?	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya

6	Apakah tindak lanjutnya lengkap dan jika tidak ada perbedaan diantara keduanya kelompok dalam hal tindak lanjut mereka dijelaskan dan dianalisis ?	Tidak jelas	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Iya	Tidak jelas	Iya	Iya
7	Apakah hasil dari peserta termasuk dalam perbandingan diukur dengan cara yang sama ?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Apakah hasil diukur dengan cara yang reliabel atau dapat diandalkan ?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Apakah analisis statistik yang sesuai digunakan ?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

*Checklist Critical Appraisal JBI Untuk Studi Randomized Controlled Trial*

**(Uji Acak Terkontrol)**

Peninjau : Sitti Aisyah A

Tanggal: 9 Agustus 2021

No	Pertanyaan	Nomor Dokumen			
		4	5	6	11
1	Apakah pengacakan benar digunakan untuk penugasan peserta ke kelompok perlakuan?	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Apakah alokasi untuk kelompok perlakuan dirahasiakan?	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Apakah kelompok perlakuan serupa pada awal?	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Apakah peserta tidak mengetahui pengelompokan intervensi?	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Apakah mereka yang memberikan intervensi tidak mengetahui pengelompokan intervensi?	Ya	Tidak	Ya	Ya
6	Apakah penilai hasil tidak mengetahui pengelompokan intervensi?	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Apakah kelompok perlakuan diperlakukan sama dengan kelompok intervensi lain?	Ya	Ya	Tidak	Ya
8	Apakah perbedaan antar kelompok dideskripsikan secara adekuat dan dianalisis secara memadai?	Ya	Ya	Ya	Tidak jelas
9	Apakah analisis partisipan dilakukan dalam kelompok dimana mereka diacak?	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Apakah hasil diukur dengan cara yang sama untuk kelompok perlakuan?	Ya	Ya	Ya	Ya

11	Apakah hasil diukur dengan cara yang reliabel?	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Apakah analisis statistik yang sesuai digunakan?	Ya	Ya	Ya	Ya
13	Apakah desain uji sesuai, dan apakah penyimpangan dari standar desain RCT (partisipan acak, kelompok setara) diperhitungkan dalam desain dan dianalisis?	Ya	Ya	Ya	Ya





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R