

**PENGARUH TERAPI RELAKSASI OTOT PROGRESIF TERHADAP
KUALITAS TIDUR PENDERITA HIPERTENSI
DI PUSKESMAS PATTOPAKANG**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan

Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh

SRI WAHYUNINGSIH

70300117076

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

**PENGARUH TERAPI RELAKSASI OTOT PROGRESIF TERHADAP
KUALITAS TIDUR PENDERITA HIPERTENSI
DI PUSKESMAS PATTOPAKANG**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan

Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh

SRI WAHYUNINGSIH

70300117076

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuningsih
Nim : 70300117076
Tempat/Tanggal Lahir : Takalar, 11 Oktober 1999
Jurusan : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Dusun Batunapara Desa Panyangkalang
Judul : Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap
Kualitas Tidur Penderita Hipertensi Di Puskesmas
Pattopakang

Menyatakan dengan sungguh dan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 12 November 2021

Penyusun

Sri Wahyuningsih
70300117076

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kualitas Tidur Penderita Hipertensi Di Puskesmas Pattopakang*" yang disusun oleh Sri Wahyuningsih, NIM: 70300117076, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 12 November 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 12 November 2021 M
7 Rabbi'ul Tsani 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid. S.Kep.,Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muhammad Irham, S.Thi., M.Thi	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Wahdaniah, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

MOTTO

“don’t want to be controlled by time, but you have to control time”



KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan atas ke hadirat Allah swt., karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang masih ter limpahkan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kualitas Tidur Penderita Hipertensi di Puskesmas Patopakang”** alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik, dan tak lupa pula penulis kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad saw. yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti saat sekarang ini.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat penyelesaian pendidikan pada program studi Strata Satu (SI) Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2021..

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak hambatan, kekurangan pengalaman dan ilmu pengetahuan penulis selama penyusunan yang pada akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan, adapun beberapa pihak yang terlibat turut andil dalam skripsi ini. Karena hal demikian, dengan rasa hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih, serta penghargaan yang setinggi-tingginya untuk orangtua saya tercinta, Ayahanda tercinta Bapak Dahlan, S.E dan Ibunda Tercinta Hj. Fatmawati, Terimakasih atas segala kasih sayang yang sangat besar kepada saya, terimakasih untuk doa, dukungan dan semangat yang tak pernah putus kepada saya serta bantuan moril dan materinya, sehingga saya bisa sampai ditahap ini.

Ucapan terima kasih yang tak henti-hentinya kepada Pembimbing, , yang selalu memberikan petunjuk dan arahan nya serta dukungan dan motivasinya untuk terus semangat dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini. Kemudian penghargaan dan rasa hormat saya yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya dan seluruh staf karena telah memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga pada saat menimba ilmu di kampus peradaban ini.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag. wakil rektor I bidang Akademik Pengempungan Lembaga
3. Dr. Wahyuddin, M.Hum, wakil rektor II bidang Akademik Umum dan Perencanaan Keuangan
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag wakil rektor III bidang Kemahasiswaan
5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag wakil rektor IV bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga
6. Dr. dr., Syatirah Jalaludin, Sp., A.,M.Kes., Selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta para wakil dekan dan Staf akademik yang telah membantu penulis dalam mengurus dan mengatur proses administrasi selama menjalani pendidikan.
7. Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Keperawatan dan Dr. Hasnah S.SIT., S.Kep., Ns., M.Kes., selaku sekretaris jurusan keperawatan beserta dosen dan staf pengajar yang selalu membantu penulis, memberikan motivasi dan ilmu selama proses penyusunan skripsi.
8. Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes selaku pembimbing I serta Wahdania, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku pembimbing II saya. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga yang sudah dengan sabar dan

ikhlas untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran, serta arahan nya yang begitu membangun dan berharga bagi saya.

9. Dr. Hasnah S.SIT.,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku penguji I dan Dr. H. Muhammad Irham S.Th.i., M.Th.i selaku penguji agama. Terimakasih telah memberikan masukan, kritik dan saran yang sangat mendukung dan membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Pimpinan, perawat, beserta staf Puskesmas Pattopakang kabupaten Takalar yang telah membantu penulis dari awal penelitian membantu memenuhi segala sesuatu yang penulis butuhkan, membantu dalam melakukan penelitian hingga akhirnya sampai pada tahap ini.
11. Untuk keluarga besar saya. Sepupu, om, dan tante serta terkhusus kepada kakak saya satu satunya Muhammad Ruslan, S.H yang terus memberikan motivasi dan dukungan nya dan dukungan materi yang lebih dari cukup kepada saya dalam menjalani pendidikan.
12. Kepada Arianto Arif, yang selalu memberikan dukungan, do'a dan motivasinya kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman Leukos17 dan sahabat-sahabat saya terimakasih atas segala bantuannya, serta selalu meluangkan waktunya untuk selalu terus bersama dalam bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja selama penulis menjalani pendidikan di kampus peradaban. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih jauh dari kata sempurna, untuk hal tersebut besar harapan penulis kepada pembaca untuk ikut andil dalam memberikan kontribusi

nya baik itu berupa masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan dari skripsi ini, karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Sekian dan Terima Kasih,

Samata, Agustus 2021

Penulis

Sri Wahyuningsih

70300117076



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Hipotesis.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Kajian Pustaka.....	11
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Hipertensi.....	17
1. Definisi Hipertensi	17
2. Etiologi Hipertensi	19
3. Hipertensi sekunder.....	20
4. Klasifikasi Hipertensi	22
5. Patofisiologi Hipertensi.....	23
6. Manifestasi Klinis Hipertensi.....	24
7. Penatalaksanaan Medis.....	24
8. Komplikasi Hipertensi.....	26
9. Faktor Resiko Hipertensi	28
B. Konsep Dasar Kualitas Tidur	32
1. Defenisi Kualitas Tidur	32
2. Tujuan Tidur.....	35
3. Waktu dan Batasan dalam Tidur	37
4. Jenis-jenis Tidur.....	39
5. Fisiologi Tidur	40
6. Faktor yang mempengaruhi kualitas tidur	43
7. Hubungan kualitas tidur dengan Hipertensi.....	46

8. Kuisioner dalam menentukan Kualitas tidur.....	47
C. Konsep Dasar Terapi Relaksasi Otot Progresif	48
1. Definisi Relaksasi Otot Progresif	48
2. Tujuan Relaksasi Otot Progresif	49
3. Indikasi Terapi Relaksasi Otot Progresif	50
4. Fisiologi Kontraksi dan Relaksasi Otot Progresif.....	50
5. Mekanisme kerja Relaksasi Otot Progresif terhadap peningkatan Kualitas Tidur.....	52
6. Mekanisme kerja Relaksasi Otot Progresif terhadap tekanan darah.....	53
7. Teknik Relaksasi Otot Progresif.....	55
8. Prosedur kerja Relaksasi Otot Progresif	55
D. Kerangka teori	62
E. Kerangka Konsep.....	63
BAB III.....	64
METODE PENELITIAN.....	64
A. Desain Penelitian.....	64
B. Tempat dan waktu penelitian	64
C. Populasi dan sampel penelitian.....	65
D. Teknik Pengambilan Sampel	66
E. Pengumpulan data	67
F. Instrumen Penelitian	67
G. Pengolahan data.....	69
H. Analisa Data	71
I. Etika penelitian	71
BAB IV.....	73
HASIL DAN PEMBAHASAN	73
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	73
B. Pengumpulan Data.....	74
C. Hasil Penelitian.....	74
D. Pembahasan Penelitian.....	78
BAB V	92
PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	1

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Definisi Operasional	9
Table 2.1 Kajian pustaka.....	11
Table 2.2 Klasifikasi Hipertensi.....	22
Table 3.1 Rumus Kategorisasi Batas.....	69
Table 4.1 Distribusi Frekuensi Responden	74
Table 4.2 Gambaran Kualitas Tidur Penderita Hipertensi Di Puskesmas Pattopakang Sebelum Intervensi Terapi Relaksasi Otot Progresif	76
Table 4.3 Gambaran Kualitas Tidur Penderita Hipertensi Di Puskesmas Pattopakang Sesudah Intervensi Terapi Relaksasi Otot Progresif.....	76
Table 4.4 Hasil Uji Statistik Paired Sample T Test pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang	77



Pedoman Transliterasi Arab-Latin Dan Singkatan

Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf

Latin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

huruf arab	nama	huruf latin	Nama
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba	b	Be
	ta	t	Te
	sa	s (dengan titi diatas)	es (dengan titi diatas)
	jim	j	Je
	ha	h(dengan titi dibawah)	ha(dengan titi dibawah)
	kha	kh	ka dan ha
	dal	d	De
	zal	z(dengan titi diatas)	zet(dengan titi diatas)
	ra	r	Er
	zai	z	Zet
	sin	s	Es
	syin	sy	es dan ye
	sad	s(dengan titi dibawah)	es(dengan titi dibawah)
	dad	d(dengan titi dibawah)	de(dengan titi dibawah)
	ta	t(dengan titi dibawah)	te(dengan titi dibawah)
	za	z(dengan titi dibawah)	zet(dengan titi dibawah)
	ain	‘	apostrof terbalik
	gain	g	Ge
	fa	f	Ef
	qaf	q	Qi
	kaf	k	Ka
	lam	l	El
	mim	m	Em
	nun	n	En
	wau	w	We
	ha	h	Ha
	hamzah	‘	Apostrof
	ya	y	Ye

ABSTRAK

Nama : Sri Wahyuningsih
Nim : 70300117076
Judul : Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kualitas Tidur Penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang

Hipertensi merupakan salah satu penyakit penyebab kematian seluruh dunia khususnya di negara berkembang. Diperkirakan jumlah penderita hipertensi setiap tahunnya meningkat sebanyak 10,44 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasi nya. Bisa dikatakan hipertensi, apabila terjadi peningkatan tekanan darah sistol dan diastol lebih dari 140/90 mmHg. Sebagian besar penderita hipertensi tidak rutin dalam minum obat anti hipertensi yang telah diresepkan oleh dokter sehingga menimbulkan kekambuhan gejala hipertensi setiap saat seperti pada malam hari yang dapat menyebabkan gangguan kualitas tidur. Apabila kualitas tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan terjadinya ketegangan fisik sehingga mempengaruhi kenaikan tekanan darah karena kerja jantung yang meningkat. Terapi ROP ini adalah salah satu dari banyaknya terapi non farmakologi yang bisa meningkatkan kualitas tidur karena dapat membuat perasaan yang nyaman dan rileks. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh terapi Relaksasi Otot Progresif terhadap kualitas tidur penderita hipertensi di puskesmas Pattopakang. Desain penelitian yang digunakan adalah *pre-eksperimental*, menggunakan pendekatan *pre-tes* dan *post-test design*, dan metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan jumlah responden 18 orang. Hasil penelitian di uji dengan uji hipotesis *Paired Sample T Test* dan didapatkan nilai *p-value* sebesar 0,000 (*p-value* <0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terapi relaksasi otot progresif memiliki pengaruh terhadap penurunan tekanan darah dan peningkatan kualitas tidur pada pasien hipertensi di Puskesmas Pattopakang.

Kata Kunci: Hipertensi, Kualitas tidur, Relaksasi Otot Progresif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization menunjukkan prevalensi penyebab kematian diseluruh dunia mencapai sekitar 17 juta jiwa yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. Salah satu penyakit yang dapat menyebabkan komplikasi sekitar 9,4 juta jiwa per tahunnya yaitu penyakit hipertensi. Peningkatan tekanan darah pada klien dengan penyakit hipertensi menunjukkan hasil diatas 140/90 mmHg atau lebih dalam keadaan istirahat pada dua hari berturut-turut. (Sari, 2017)

Badan penelitian kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) menunjukkan kejadian hipertensi di seluruh dunia mencapai lebih dari 1,3 milyar orang. Jumlah penderita hipertensi terus meningkat setiap tahunnya, diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 milyar orang terkena hipertensi, dan diperkirakan setiap tahunnya 10,44 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasi nya. Kejadian hipertensi ini lebih tinggi dibandingkan negara maju bahkan nyaris sebanyak 75% penderita hipertensi tinggal di negara berkembang, dan terjadi peningkatan sebanyak 8,1%. Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup berbahaya di seluruh dunia karena hipertensi merupakan faktor risiko utama yang mengarah kepada penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung, gagal jantung, stroke, dan penyakit ginjal. (WHO,2018).

Wilayah Afrika menduduki urutan pertama kejadian hipertensi dengan prevalensi sebanyak 46%, sedangkan di wilayah Amerika sekitar 35%. Sedangkan untuk di wilayah Asia Tenggara kejadian hipertensi mencapai 36%.

Presentasi kejadian hipertensi lebih banyak di negara berkembang dibandingkan negara maju. Hal ini dikarenakan wilayah asia tenggara adalah wilayah yang penduduknya kebanyakan mengonsumsi makanan yang memiliki kadar garam yang tinggi, sehingga ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. (Putra Apriadi Siregar, Saidah Fatimah Sari Simanjuntak, Feby Harianti B Ginting, Sutari Tarigan, Shafira Hanum, 2020).

Prevalensi kejadian hipertensi pada tahun 2018 menurut Riskesdas mencapai angka 34,1% penderita hipertensi, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan data pada tahun 2013 yang terdapat 25,8% penderita. Hasil yang didapatkan berdasarkan dari data yang diperoleh melalui pengukuran tekanan darah pada masyarakat Indonesia yang berusia >18 tahun. Terjadi peningkatan hipertensi selama 5 tahun terakhir. (Kemenkes RI, 2019). Prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui diagnosis dokter pada penduduk usia 18 tahun ke atas sebesar 8,4%. (Riskesdas, 2018) dalam (Hariawan & Tatisina, 2020)

Pada umumnya, kejadian hipertensi banyak terjadi pada penduduk berusia lanjut namun tidak menutup kemungkinan penduduk usia remaja hingga dewasa juga dapat mengalami penyakit hipertensi tersebut. Pada usia 18 tahun kejadian hipertensi sebesar 34,1%, pada penduduk yang berusia 31-34 tahun sebanyak 31,6%, pada penduduk yang berusia 45-54 tahun sebesar 45,3% sedangkan pada penduduk yang berusia 55-64 tahun sebesar 55,2%. (Melizza & Hikmah, 2020)

Pada tahun 2016, data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa jumlah penderita hipertensi sebanyak 142.571 kasus, terdiri dari 54.749 jenis kelamin laki-laki dan 87.882 jenis kelamin perempuan. Dilihat dari profil kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 tekanan darah

atau hipertensi dengan kasus tertinggi di Sulawesi Selatan yaitu 32,49% di wilayah kabupaten Selayar, 24,92% di Kabupaten Soppeng, dan 14,82% di Kabupaten Takalar. Menurut data tertinggi 10 penyakit teratas di Kabupaten Takalar, Hipertensi menduduki penyakit tertinggi pertama. (Wijaya *et al.*, 2019)

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar pada tahun 2016 kasus penderita hipertensi dari jumlah 15 puskesmas terdapat 757 orang dengan rincian yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 105 orang serta yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 652 penderita. Kasus paling tinggi dialami oleh perempuan. (Wijaya *et al.*, 2019). Sedangkan pada tahun 2017 kejadian hipertensi di Kabupaten Takalar meningkat dibuktikan dari data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dari 15 puskesmas dengan jumlah penderita sebanyak 2.886 orang, dengan rincian yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 408 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.478 penderita. (Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, 2018).

Hipertensi termasuk masalah yang besar dan serius karena sering tidak terdeteksi meskipun bertahun-tahun. Ketika gejala timbul, hipertensi sudah menjadi penyakit yang harus diterapi seumur hidup, pengobatan yang harus dikeluarkan cukup mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Bila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah lain berupa komplikasi berbagai organ jantung, ginjal, otak, mata. Hipertensi juga dapat menyebabkan kecacatan permanen dan kematian mendadak. (Sumartini & Bachtiar, 2016)

Berdasarkan proporsi riwayat minum obat dan alasan tidak minum obat pada penduduk hipertensi berdasarkan diagnosis dokter atau minum obat pada tahun 2018 adalah sebesar 54,4% rutin minum obat, 32,3% tidak rutin minum obat, dan 13,3% yang tidak minum obat anti hipertensi. (Riskesdas, 2018).

Pada penderita hipertensi sebagian besar tidak rutin dalam minum obat yang telah diresepkan oleh dokter sehingga dapat menyebabkan kualitas tidur terganggu, ketika kualitas tidur terganggu maka akan menimbulkan gejala, seperti pusing, cemas dll. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas tidur adalah adanya suatu penyakit lain yang bisa berpengaruh terhadap kebutuhan tidur. Penyakit tersebut dapat membuat kebutuhan tidur seseorang menjadi lebih besar, seperti seseorang yang mempunyai penyakit yang disebabkan karena adanya suatu infeksi (infeksi limpa), yang membutuhkan waktu yang lebih untuk mengatasi rasa letih yang dialami. Penyakit yang menimbulkan rasa nyeri, perasaan tidak karuan, gelisah, rasa tidak nyaman, cemas berlebih, dan stress dapat menimbulkan gangguan pada tidur seseorang.

Adapun penelitian Anggarwal (2018) mengatakan bahwa tidur yang kurang dari ≥ 7 jam/malam pada seseorang merupakan kualitas tidur yang buruk yang dapat berpotensi terhadap kenaikan tekanan darah. Penelitian yang dilakukan oleh Liu (2016) juga menjelaskan kejadian hipertensi yang mengalami kualitas tidur yang buruk yaitu sebanyak (69,74%). (Melizza & Hikmah, 2020).

Berdasarkan data dari Puskesmas Pattopakang Kabupaten Takalar terkait kejadian Hipertensi menunjukan jumlah penderita hipertensi setiap tahunnya meningkat. Seperti pada tahun 2017 sebanyak 247 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 262 kasus, pada tahun 2019 sebanyak kurang lebih 300 kasus. Sebagian besar penyebab dari kekambuhan hipertensi disebabkan karena kurang terkontrol nya minum obat yang telah diresepkan oleh dokter dan ketakutan masyarakat tentang mengonsumsi obat yang terlalu sering karena mengingat usianya sudah memasuki lansia. Kemudian tidak mau untuk datang memeriksa kembali ke Puskesmas akibat jarak rumah yang cukup jauh.

Menurut hasil wawancara staf Puskesmas Pattopakang dan beberapa penderita tentang kualitas tidurnya, terdapat sebanyak 59,1% mengatakan jika tidur ia mengeluhkan sering kali merasakan gejala yang ditimbulkan penyakit hipertensi nya, seperti pusing pada malam hari, mengalami kecemasan, mengalami kesulitan untuk memulai tidur atau insomnia, sehingga mengakibatkan terjadinya kualitas tidur terganggu. Selain itu, terdapat sebanyak 40,9% penderita hipertensi mengatakan durasi tidur telah cukup sebanyak 7 jam dan bahkan lebih dari 7 jam, kesimpulan yang dapat ditarik adalah penderita hipertensi tidak hanya mempunyai kualitas tidur yang kurang baik, namun terdapat sebagian dari penderita memiliki kualitas tidur yang tercukupi atau sudah baik, akan tetapi dilihat dari data tersebut pasien penderita kualitas tidur buruk akibat hipertensi lebih banyak dibandingkan dengan pasien yang kualitas tidurnya baik..

Seperti firman Allah swt. dalam surah Al-Furqan/25;47 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

Terjemahannya :

“Dan Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagaimana (pakaian), dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit dan berusaha” (Kementrian Agama RI, 2021)

Penjelasan dari ayat tersebut adalah menggambarkan salah satu dari sekian banyaknya kebesaran Allah swt. kepada manusia dengan memberikan waktu agar dapat mengistirahatkan tubuhnya dan melepaskan lelah yang dirasakan. Di dalam aspek medis yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup adalah pada saat tidur, dimana ketika tidur tubuh kita akan mengeluarkan zat-zat yang beracun yang merupakan salah satu aktifitas di dalam tubuh yang sangat bermanfaat. Pada saat tidur terjadi proses pembuangan zat-zat yang disebut detoksifikasi. Justru ketika tubuh kita dapat mengistirahatkan tubuh kita baik itu jasmani maupun rohani serta proses

detoksifikasi dengan intensif ketika terbangun dari tidur seseorang akan merasakan perasaan yang segar.

Akan tetapi jika terjadi gangguan-gangguan ketika tidur maka akan mempengaruhi kualitas tidur seseorang, ketika kualitas tidur tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan terjadinya ketegangan fisik, sehingga dapat mempengaruhi kenaikan tekanan darah karena kerja jantung yang meningkat. Hipertensi menyebabkan dampak yang dapat menimbulkan penyakit lain seperti gagal ginjal, stroke, gagal jantung, dan kerusakan pada mata. Oleh karena itu, maka dibutuhkan penanganan atau penatalaksanaan khusus untuk bisa mengatasi hal tersebut. (Sunaringtyas *et al.*, 2018)

Menurut (Mardius, 2017) kualitas tidur adalah ukuran dimana seseorang mendapatkan kemudahan untuk memulai tidur, mampu mempertahankan tidur, dan merasa rileks setelah bangun dari tidur. Menurut Daud dan Marjiman (2016) cara yang dapat digunakan untuk menanggulangi masalah tidur untuk meminimalisir adanya efek samping adalah dengan pengobatan non farmakologi, salah satunya dengan terapi relaksasi yaitu relaksasi otot progresif. (Tangah *et al.*, 2018).

Relaksasi otot progresif merupakan terapi yang dapat membuat perasaan seseorang menjadi relaks dan tenang dengan memutuskan perhatian pada suatu aktifitas otot yang tegang kemudian menurunkan ketegangan otot tersebut ketika melakukan relaksasi. Cara kerja dari relaksasi otot progresif ini yaitu berlawanan dengan sistem saraf simpatis sehingga dapat mencapai keadaan yang relaks dan tenang, perasaan tersebut akan diteruskan ke hipotalamus agar mendapatkan *corticotrophin realizing factor*. Yang akan menstimulus kelenjar pituitari untuk meningkatkan hormon *endorphine enkephalin* dan *serotonin*

sehingga dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. (Sunaringtyas *et al.*, 2018)

Menurut (Setyoadi & Kushariyadi, 2011) terapi relaksasi otot progresif dapat meningkatkan kualitas tidur karena terapi ini bertujuan untuk merilekskan otot, memproduksi hormon endorfin untuk membuat perasaan nyaman, serta dapat mengurangi nyeri, kecemasan, perasaan tegang, gelisah, ketegangan otot, mengatasi insomnia, menurunkan tekanan darah tinggi, memperbaiki frekuensi jantung dan laju metabolik. (Trisnowiyanto, 2015)

Adapun fenomena yang terjadi dilokasi penelitian masyarakat di wilayah desa Pattopakang kabupaten Takalar, ketika mengalami gangguan tidur akibat tekanan darah tinggi, pengobatan yang dilakukan adalah penanganan farmakologi dengan meminum obat anti hipertensi, tanpa menerapkan penanganan non-farmakologi seperti terapi relaksasi otot progresif yang dapat dijadikan intervensi untuk meningkatkan kualitas tidur dan menurunkan tekanan darah. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui terapi ini dan di wilayah kerja puskesmas Pattopakang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya sehingga ini dapat menjadi alasan peneliti tertarik meneliti dilokasi penelitian tersebut tentang pemberian intervensi relaksasi otot progresif untuk meningkatkan kualitas tidur dan menurunkan tekanan darah untuk masyarakat umum dengan rentan usia 45-59 tahun, seperti diketahui bahwa penderita hipertensi saat ini sudah terjadi pada usia dewasa.

Oleh karena itu bertolak dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Teknik Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kualitas Tidur Penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang” yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan, masyarakat dan khususnya untuk peneliti sendiri dalam pengembangan pelayanan kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Apakah Ada Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kualitas Tidur Penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang ? “

C. Hipotesis

1. Hipotesis Alternatif (Ha)

Ada Pengaruh Relaksasi Otot Progresif Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi

2. Hipotesis Nol (H0)

Tidak ada Pengaruh Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kualitas Tidur Pada Penderita Hipertensi.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kualitas Tidur Pada Penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang Takalar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kualitas tidur penderita hipertensi sebelum diberi perlakuan
- b. Untuk menganalisis kualitas tidur penderita hipertensi setelah diberi perlakuan
- c. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap peningkatan kualitas tidur sebelum dan setelah dilakukan perlakuan

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah wawasan serta pengalaman bagi peneliti yang merupakan pemula dalam melakukan penelitian, dan tentang pengaruh terapi Teknik Relaksasi Otot Progresif ini dapat dijadikan sumber informasi dan sumber rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Bagi institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi institusi dan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan tentang intervensi yang dapat dilakukan untuk pasien Hipertensi yang mengalami kualitas tidur buruk selain menggunakan teknik farmakologi juga dapat dilakukan teknik non-farmakologi yaitu terapi teknik Relaksasi Otot Progresif

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi kepada masyarakat untuk mengenal teknik non-farmakologi yang dapat digunakan untuk mengatur kualitas tidurnya ketika mengalami hipertensi.

F. Definisi Operasional

Table 0.1.1 Definisi Operasional

No	Variable	Definisi operasional	Kriteria objektif	Alat ukur	Skala
1.	Variable Independen : Terapi Relaksasi Otot Progresif	Relaksasi otot progresif merupakan terapi yang bisa merilekskan atau melemaskan otot-otot pada bagian anggota tubuh tertentu yang	-	SOP dan VIDEO	-

		bertujuan untuk mengurangi ketegangan otot, kecemasan, stress, menurunkan tekanan darah dan gangguan tidur seseorang yang dilakukan sesuai SOP relaksasi otot progresif dengan cara duduk dikursi dengan kepala ditopang menggunakan bantal. Pelaksanaan terapi ini dilakukan 6 hari berturut-turut dengan durasi waktu selama 20 menit setiap pertemuan, dilakukan setiap hari sebelum tidur pada pukul 15:30-16:30 WITA.			
2.	Variable Independen : Kualitas tidur	Kualitas tidur adalah kepuasan seseorang terhadap tidurnya, dimana seseorang dapat memulai tidurnya selama kurang dari 30 menit, tidak merasa terganggu pada malam hari seperti terbangun atau	- Kualitas tidur membaik ≤ 5 - Kualitas tidur buruk > 5		

		bangun terlalu pagi, tidak mengalami mimpi buruk, tidak merasakan kecemasan, ketegangan otot, dan dapat bernapas dengan nyaman. Untuk mencapai hal tersebut maka seseorang dapat membantu memperbaiki kualitas tidurnya dengan cara melakukan gerakan terapi relaksasi otot progresif adalah terapi alternatif yang bisa memberikan perasaan rileks seseorang bisa memulai tidurnya dengan nyaman tanpa gangguan.			
--	--	---	--	--	--

G. Kajian Pustaka

Table 0.2.1. Kajian pustaka

Judul penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dengan riset
Perbandingan Antara <i>Progressive Muscle</i>	Untuk Mengetahui Perbandingan PMR Dan	Metode Penelitian <i>Quasi-Eksperiment</i>	Penelitian Ini Menyimpulkan Ada Pengaruh	Perbedaan Dengan Penelitian Ini Adalah

<i>Relaxation Dan Spiritual Emotional Freedom Technique Terhadap Kualitas Tidur Pasien Hipertensi</i>	SEFT Terhadap Tingkat Kualitas Tidur Pasien Hipertensi	<i>Dengan Two Group PrePost Design, Dengan Jumlah Sampel 32 Responden Yang Ditentukan Menggunakan Teknik Total Sampling. Analisis Data Menggunakan Wilcoxon Sigred Rank Test Dan Mann-U Withney</i>	PMR Dan SEFT Terhadap Tingkat Kualitas Tidur Pasien Hipertensi, Ada Perbedaan Tingkat Kualitas Tidur Sesudah Diberikan Perlakuan Pada Kelompok PMR Dan SEFT	Terletak Pada Fokus Penelitian Yaitu Penelitian Sebelumnya bertujuan Untuk Mengetahui Perbedaan Pemberian Intervensi PMR Dan SEFT Sedangkan Penelitian Ini Hanya Berfokus Pada Intervensi PMR.
Gambaran kualitas tidur pada penderita hipertensi <i>Quality Of Sleep Among Hypertension Patients</i>	Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu melihat gambaran kualitas tidur pada penderita hipertensi di Puskesmas Rancaekek.	Metoden dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode pengambilan sample menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> yang didapat jumlah responden sebanyak 79 orang.	Hasil yang didapatkan responden yang memiliki kualitas tidur buruk sebanyak 94,6%.	Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Sebelumnya Terletak Pada Fokus Penelitian Dimana Penelitian Sebelumnya Berfokus Pada Gambaran Kualitas Tidur Penderita Hipertensi Sedangkan Pada Penelitian Ini Peneliti Berfokus Pada Pengaruh Intervensi Prm Terhadap Kualitas

				Tidur Penderita Hipertensi.
Pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur pada lansia hipertensi di Puskesmas Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar	Untuk Menganalisis Pengaruh Pelaksanaan Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kualitas Tidur.	Desain penelitian yang digunakan adanya pre eksperimenta l dengan menggunakan pendekatan <i>One Grup Pre-Test Dan Post-Tes Desain</i> . Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> dan didapatkan jumlah responden sebanyak 20 orang. Pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner dan wawancara dan data diuji menggunakan uji <i>Statistic Wilcoxon Sign Rank Test</i> .	Hasil penelitian sebelum dilakukan perlakuan menunjukan angka (60%) responden mengalami kualitas tidur yang buruk, kemudian untuk setelah perlakuan menunjukan akan (85%) responden mengalami peningkatan kualitas tidur yang baik. Uji statistik menunjukan angka nilai <i>p value</i> = 0,0001	Perbedaan Penelitian Ini Terletak Pada Jumlah Responden, Penelitian Sebelumnya Jumlah Responden Hanya Terdapat 20 Sampel Sedangkan Penelitian Yang Akan Dilakukan Peneliti Sebanyak 30 Responden, Perbedaan Yang Lainnya Terletak Pada Respon nya Penelitian Sebelumnya Berfokus Pada Lansia Sedangkan Penelitian Ini Berfokus Pada Usia 18 th >.
Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kualitas Tidur Pada Lansia di panti jompo	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian terapi relaksasi otot progresif	Penelitian ini menggunakan desain penelitian <i>Quasi Experiment</i> dengan menggunakan pendekatan <i>Pre-test</i> dan	Didapatkan hasil uji <i>statistic Mc.Nemar</i> dengan nilai <i>p-value</i> = 0,003.	Perbedaan Penelitian Ini Terletak Pada Fokus Penelitian Dimana Penelitian Sebelumnya Hanya Berfokus

Yayasan Guna Budi Bakti Medan Tahun 2017	terhadap kualitas tidur penderita hipertensi	<i>Post-test one group only design.</i> Sampel dalam penelitian menggunakan <i>purposive sampling</i> yaitu sebanyak 30 orang responden yang mengalami gangguan tidur.		Pada Kualitas Tidur Lansia Sedangkan Penelitian Ini Berfokus Pada Penderita Pengaruh Pmr Terhadap Kualitas Tidur Penderita Hipertensi.
Relaksasi Otot progresif dapat meningkatkan kualitas tidur pada lansia wanita.	Penelitian ini bertujuan efektifitas terapi ROP untuk peningkatan kualitas tidur yang dialami lansia wanita.	Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif menggunakan desain <i>pre-eksperimen</i> dengan pendekatan <i>pre-post tes one group design</i> .	Hasil Penelitian Menunjukkan Secara Statistik, Relaksasi Otot Progresif Efektif Untuk Meningkatkan Kualitas Tidur Pada Lansia Wanita Dengan Nilai $P = 0,000$ Atau P	Yang membedakan penelitian ini adalah Fokus Penelitian dimana penelitian sebelumnya berfokus pada efektifitas Pmr terhadap lansia wanita sedangkan untuk penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh terapi rop terhadap kualitas tidur penderita hipertensi pada umumnya.
Pengaruh <i>Progressive Muscle Relaxation</i> Terhadap Kualitas Tidur	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi ROP terhadap	Penelitian ini menggunakan metode <i>quasi eksperimen</i> dengan menggunakan	Hasil didapatkan kualitas tidur baik menunjukan	Perbedaan terletak Pada Jumlah Responden, Penelitian Akan Menggunakan

Penderita Hipertensi Di Cilacap Selatan	kualitas tidur penderita hipertensi	n pendekatan <i>one group pre-post test design</i> . Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> didapatkan sebanyak 16 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner psqi selama 7 hari perlakuan. Uji yang digunakan adalah uji <i>Wilcoxon test</i> .	peningkatan dengan presentasi angka sebanyak (81,3%) dibandingkan dari sebelum perlakuan dimana responden mengalami kualitas tidur buruk sebanyak (55,3%) dan kurang baik sebanyak (43,8%). Hasil uji hipotesis didapatkan hasil nilai <i>p-value</i> <0,001.	n Responden Sebanyak 30 Sampel Penelitian
<i>Progressive Muscle Relaxation</i> Dan <i>Slow Deep Breathing</i> Pada Penderita Hipertensi	Untuk Mengetahui Efektivitas Teknik <i>Progressive Muscle Relaxation</i> Dan <i>Slow Deep Breathing</i> Terhadap Peningkatan Kualitas Tidur Dan Penurunan Tingkat Stres	Penelitian Ini Menggunakan <i>Quasi Experimental Design With Comparison Group</i> . Pengambilan Sampel Penelitian Menggunakan <i>Purposive Sampling</i> . Besar Sampel Dalam Penelitian Ini	Terdapat Perbedaan Yang Signifikan Antara Kelompok Intervensi, Kelompok Kontrol 1, Dan Kelompok Kontrol 2 Terhadap Peningkatan Kualitas Tidur ($P = 0,025$).	Perbedaan Penelitian Ini Adalah Fokus Penelitian Sebelumnya Untuk Mengetahui Perbedaan Intervensi Pmr Dan Sdb Pada Penderita Hipertensi Sedangkan Penelitian Ini

		Sebanyak 60 Responden Dengan Pembagian Sampel Masing-Masing 20 Responden Pada Kelompok Intervensi, Kelompok Kontrol 1, Dan Kelompok Kontrol 2. Pengambilan Data Dilakukan Pada Bulan April Sampai Juni 2015. Instrumen Penelitian Ini Menggunakan Psqi (<i>Pittsburgh Sleep Quality Index</i>) Untuk Mengukur Kualitas Tidur	Terdapat Perbedaan Yang Signifikan Antara Kelompok Intervensi, Kelompok Kontrol 1 Dan Kelompok Kontrol 2 Terhadap Penurunan Tingkat Stres ($P = 0,009$).	Hanya Berfokus Pada Intervensi Pmr Saja.
--	--	---	--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hipertensi

1. Definisi Hipertensi

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular (PTM) yang sering disebut penyakit darah tinggi merupakan keadaan dimana tekanan darah seseorang mengalami peningkatan diatas normal yang ditandai dengan angka *diastolic* (bawah) dan *systolic* (atas) pada saat pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan alat pengukur tekanan darah seperti cuff air raksa atau alat pengukur tekanan darah digital lainnya. (Cahyanti & Febriyanto, 2019)

Hipertensi atau penyakit darah tinggi adalah suatu keadaan kronis yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah pada dinding pembuluh darah arteri. Keadaan tersebut mengakibatkan jantung bekerja lebih keras untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Hal ini dapat mengganggu aliran darah, merusak pembuluh darah, bahkan menyebabkan penyakit degenerative, hingga kemudian kematian. (Sari, 2017)

Menurut WHO batas normal tekanan darah adalah 120-140 mmHg tekanan darah sistolik dan 80-90 mmHg tekanan darah diastolik. Seorang dinyatakan mengidap hipertensi bila tekanan darahnya $>140/90$ mmHg. Sedangkan menurut JNC VII 2003 tekanan darah pada orang dewasa dengan usia diatas 18 tahun diklasifikasikan menderita hipertensi stadium I apabila tekanan darah sistolik nya 140-159 mmHg dan tekanan darah diastolik nya 90-99 mmHg. Diklasifikasikan

menderita hipertensi stadium II apabila tekanan sistolik nya lebih 160 mmHg dan diastolik nya lebih dari 100 mmHg. Sedangkan hipertensi III apabila tekanan sistolik nya lebih dari 180 mmHg dan tekanan diastolik nya lebih dari 116 mmHg. (Smeltzer.2001)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: *“Ingatlah bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka rusaklah tubuh seluruhnya, ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung)”*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Kata yang terjemah dalam Hadits tersebut sebagai “hati” adalah “qulub” atau “qalb”, secara harfiah, “qulub” atau “qalb” didefinisikan sebagai jantung. Secara biologi, jantung (hati) merupakan organ tubuh yang sangat penting karena berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Beberapa masalah kesehatan dapat menyerang organ ini, salah satunya adalah Hipertensi (tekanan darah tinggi).

Jantung (hati) adalah organ yang sangat vital keberadaannya, tak ada satu orang pun yang bisa bertahan hidup tanpa jantung dan merupakan penyebab kematian secara tiba-tiba. Fungsi jantung secara umum adalah mengambil/ mengumpulkan darah dari seluruh tubuh kemudian dibawa ke paru-paru untuk diisi dengan oksigen kemudian dikembalikan lagi ke seluruh tubuh. Tak ada satu tetes pun darah yang mengalir dalam tubuh kita yang tidak melewati jantung, apabila ada bagian tubuh yang tidak mendapatkan jatah atau pembagian darah maka akan menyebabkan kerusakan atau kematian jaringan.

2. Etiologi Hipertensi

Penyebab hipertensi dibagi menjadi 2 yaitu Hipertensi esensial/primer dan Hipertensi sekunder.

a. Hipertensi Esensial/primer

Kurang lebih terdapat 90% penderita hipertensi termasuk dalam kategori hipertensi primer, dan 10% yang lainnya tergolong hipertensi sekunder. Penyebab hipertensi esensial/primer belum dapat diketahui dengan pasti, akan tetapi terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab hipertensi primer, yaitu stress psikologis, bertambahnya usia dan faktor keturunan (hereditas).

Menurut penelitian yang dilakukan (Situmorang, 2015) didapatkan beberapa penyebab terjadinya hipertensi :

- 1) Ada hubungan antara faktor keturunan dengan kejadian hipertensi
- 2) Ada hubungan antara faktor pola makan dengan kejadian hipertensi
- 3) Ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi
- 4) Ada hubungan antara konsumsi alkohol dengan kejadian hipertensi

Menurut (Irianto, 2014) beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya hipertensi esensial/primer yaitu:

- 1) Genetik: Faktor genetik tidak bisa dikendalikan, jika seseorang yang memiliki riwayat keluarga yang memiliki tekanan darah tinggi, kemungkinan besar seseorang tersebut akan beresiko mendapatkan penyakit hipertensi juga.

- 2) Usia dan Jenis Kelamin: Perempuan yang sudah mengalami menopause dapat beresiko tinggi terkena hipertensi. Sama halnya dengan laki-laki ketika sudah berusia 35-40 tahun akan mudah terkena hipertensi dimana faktor tersebut tidak dapat dikendalikan.
- 3) Diet: Seseorang yang mengonsumsi garam atau lemak merupakan salah satu konsumsi diet yang tinggi secara langsung berhubungan dengan meningkatnya hipertensi.
- 4) Berat badan : Berat badan dapat dikendalikan untuk tetap dalam keadaan normal ataupun ideal dengan cara tetap mempertahankan berat badan yang ideal. Obesitas >25% dapat melampaui batas BB yang ideal. Hal ini berkaitan dengan adanya peningkatan tekanan darah.
- 5) Gaya Hidup: merupakan salah satu faktor terjadinya hipertensi yang dapat dikendalikan dengan cara pasien mampu menerapkan pola hidup sehat dengan tidak melakukan hal-hal seperti merokok dan mengonsumsi alkohol. Hal ini karena seseorang yang merokok dalam waktu yang cukup lama dalam sehari akan menghabiskan jumlah rokok yang tidak sedikit yang akan berpengaruh terhadap tekanan darah seseorang. Dengan mengonsumsi alkohol yang berlebihan akan mempengaruhi tekanan darah. Apabila terdapat pasien yang memiliki gangguan tekanan darah maka diharapkan untuk bisa menghindari hal tersebut.

3. Hipertensi sekunder

Menurut Sugiharto (2007) mengemukakan bahwa hipertensi sekunder adalah hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui sering

berhubungan dengan beberapa penyakit seperti kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid (*hipertiroid*), penyakit kelenjar adrenalin (*hiperaldosteronisme*), gagal ginjal koroner, diabetes, dan lain-lain. Karena golongan terbesar dari penderita hipertensi adalah hipertensi esensial, maka penyelidikan dan pengobatan lebih banyak ditujukan ke penderita hipertensi esensial. (Masriadi, 2016). Adapun beberapa penyebab terjadinya hipertensi sekunder, yaitu:

1) Penggunaan kontrasepsi hormonal (ekstrogen)

Oral kontrasepsi yang berisi estrogen dapat menyebabkan hipertensi melalui mekanisme *renin-aldosteron-mediated volume expansion*. Dengan penghentian oral kontrasepsi, tekanan darah normal kembali setelah beberapa bulan.

2) Penyakit parenkim dan vaskular ginjal

Merupakan penyebab utama hipertensi sekunder. Hipertensi renovascular berhubungan dengan penyempitan satu atau lebih arteri besar yang secara langsung membawa darah ke ginjal. Sekitar 90% lesi arteri renal pada klien dengan hipertensi disebabkan oleh *aterosklerosis* atau *fibrous dispasia* (pertumbuhan abnormal jaringan fibrous). Penyakit parenkim ginjal terkait dengan infeksi, inflamasi, dan perubahan struktur, serta fungsi ginjal.

3) Gangguan endokrin

Disfungsi medula adrenal atau korteks adrenal dapat menyebabkan hipertensi sekunder. *Adrenal-mediated hypertension* disebabkan kelebihan primer *aldosterone*, *kortisol*, dan *katekolamin*. Pada *aldosteronisme* primer biasanya timbul dari benign adenoma

korteks adrenal. *Pheochromocytomas* pada medula adrenal yang paling umum dan meningkatkan sekresi *katekolamin* yang berlebihan. Pada sindrom *cushing*, kelebihan *glukokortikoid* yang dieksresi dan korteks adrenal. Sindrom *cushing's* 12 mungkin disebabkan oleh *hiperplasi adrenakortikal* atau adenoma *adrenakortikal*.

4) Coarctation aorta

Merupakan penyempitan aorta kongenital yang mungkin terjadi beberapa tingkat pada *aorta torasik* atau aorta *abdominall*. Penyempitan menghambat aliran darah melalui lengkung aorta dan mengakibatkan peningkatan tekanan darah di atas area konstriksi. 1) *Neurogenik* : tumor otak, encephalitis, dan gangguan psikiatrik. 2) kehamilan, 3) Luka bakar, 4) Peningkatan volume intravascular, 5) Merokok nikotin dalam rokok merangsang pelepasan *katekolamin*. Peningkatan *katekolamin* menyebabkan *iritabilitas miokardial*, peningkatan denyut jantung, dan menyebabkan *vasokonstriksi*, yang mana pada akhirnya meningkatkan tekanan darah.

4. Klasifikasi Hipertensi

Adapun klasifikasi *Joint national committee on prevention detection evaluation, and treatment of high blood pressure VII/JNC-VV,2003* dalam (Kemenkes 2018).

Table 2.2 Klasifikasi Hipertensi

Kategori	Tekanan darah systole		Tekanan darah diastole
Normal	<120	Dan	<80
Pre-Hipertensi	120-139	Atau	80-90
Hipertensi stage 1	140-159	Atau	90-99
Hipertensi stage 2	>160	Atau	≥100

Hipertensi Terisolasi	Sistolik	>140	Dan	<90
--------------------------	----------	------	-----	-----

5. Patofisiologi Hipertensi

Menurut (Pikir *et al.*, 2015) adapun rumus yang mempengaruhi hipertensi yaitu curah jantung x resistensi perifer. Tekanan darah dibutuhkan untuk mengalirkan darah melalui sistem sirkulasi yang merupakan hasil dari aksi pompa jantung atau sering disebut curah jantung (cardiac output) dan tekanan darah arteri perifer atau sering disebut *resistensi perifer*.

Berdasarkan rumus tersebut, maka peningkatan tekanan darah secara logis dapat terjadi karena peningkatan *curah jantung* dan atau peningkatan *resistensi perifer*. Rangsangan neural jantung dapat menyebabkan peningkatan cairan atau melalui peningkatan kontaktilitas. Meskipun faktor-faktor peningkatan curah jantung terlibat dalam permulaan timbulnya hipertensi, namun temuan-temuan pada penderita hipertensi kronis menunjukkan adanya hemodinamik yang khas yaitu adanya peningkatan resistensi perifer dengan curah jantung yang normal.

Adanya pola peningkatan curah jantung yang dapat menyebabkan peningkatan resistensi perifer secara persisten, proses tersebut disebut sebagai *autoregulasi* yaitu proses dimana dengan adanya peningkatan curah jantung maka jumlah darah yang mengalir menuju jaringan akan meningkat pula, dan peningkatan aliran darah ini meningkatkan pula aliran nutrisi yang berlebihan, melebihi kebutuhan jaringan dan juga meningkatkan pembersihan produk-produk metabolik tambahan yang dihasilkan, maka sebagai respon terhadap perubahan

tersebut pembuluh darah akan mengalami vasokonstriksi untuk menurunkan aliran darah dan mengembalikan keseimbangan antara suplai dan kebutuhan nutrisi kembali ke normal, namun resistensi perifer akan tetap tinggi yang dipicu dengan adanya penebalan struktur dari sel-sel pembuluh darah .(Pikir *et al.*, 2015)

6. Manifestasi Klinis Hipertensi

Manifestasi klinis yang dapat muncul akibat hipertensi menurut Elizabeth J. Corwin adalah butuh waktu yang lama untuk mengetahui gejala klinis dari hipertensi. Gejala klinis yang dirasakan berupa rasa nyeri kepala saat terjaga yang biasanya disertai dengan mual dan muntah akibat dari peningkatan tekanan darah *intrakranium*, penglihatan kabur akibat kerusakan retina, langkah kaki yang terganggu akibat dari kerusakan susunan saraf, *nocturia*, (peningkatan urinasi pada malam hari) karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi *glomerulus*, edema dependen akibat peningkatan tekanan kapiler. Keterlibatan pembuluh darah otak dapat menimbulkan stroke atau serangan iskemik *transien* yang bermanifestasi sebagai paralisis sementara pada satu sisi atau hemiplegia atau gangguan tajam penglihatan. Gejala lain yang sering ditemukan adalah epistaksis, mudah merah, telinga berdengung, rasa berat di tengkuk, sukar tidur dan mata berkunang-kunang.

7. Penatalaksanaan Medis

Menurut (Nuraini, 2015) Penanganan hipertensi menurut JNC VII bertujuan untuk mengurangi angka morbiditas dan mortalitas penyakit kardiovaskuler dan ginjal. Fokus utama dalam penatalaksanaan hipertensi adalah pencapaian tekanan sistolik target.

a) Non Farmakologis

Terapi non farmakologis terdiri dari menghentikan kebiasaan merokok, menurunkan berat badan berlebih, konsumsi alkohol berlebih, asupan garam dan asupan lemak, latihan fisik serta meningkatkan konsumsi buah dan sayur.

- 1) Menurunkan berat badan dilakukan apabila seseorang memiliki status gizi yang berlebihan. Terjadinya peningkatan berat badan pada usia dewasa dapat berpengaruh terhadap kenaikan tekanan darah. Oleh sebab itu, menjaga berat badan sangat perlu dalam pengontrolan hipertensi.
- 2) Seseorang yang memiliki aktifitas rendah dapat beresiko terkena hipertensi sekitar 30-50% daripada orang yang memiliki aktifitas aktif. Oleh sebab itu aktifitas fisik dapat dilakukan selama 30-45 menit >3x/hari sebagai bentuk pencegahan primer dari penyakit hipertensi.
- 3) Seseorang dapat mengurangi asupan natrium.
- 4) Kafein yang dikonsumsi dapat memacu jantung untuk bekerja lebih cepat sehingga dapat mengalirkan cairan lebih banyak di setiap detiknya. Sementara untuk konsumsi alkohol terlalu sering lebih dari 2-3 gelas/hari dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan hipertensi.

b) Terapi Farmakologi

Terapi farmakologis yaitu obat anti hipertensi yang dianjurkan oleh JNC VII yaitu diuretika, terutama jenis thiazide (Thiaz) atau *aldosteron antagonis*, *beta blocker*, *calcium channel blocker* atau *calcium antagonist*, *Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI)*, *Angiotensin II Receptor Blocker* atau *AT1*

receptor antagonist/ blocker (ARB) diuretik tiazid (misalnya bendroflumetiazid). Adapu contoh terapi farmakologi yaitu :

- 1) Beta-bloker, (misalnya propranolol, atenolol)
- 2) Penghambat angiotensin converting enzymes (misalnya captopril, enalapril)
- 3) Antagonis angiotensin II (misalnya candesartan, losartan)
- 4) alcium channel blocker (misalnya amlodipin, nifedipin) dan
- 5) Alpha-bloker (misalnya doksasozin) (Nuraini, 2015)

8. Komplikasi Hipertensi

Penderita hipertensi beresiko terkena penyakit lain, berikut terdapat beberapa komplikasi penyakit yang dapat timbul, menurut (Wulandari, 2009) yaitu :

- 1) Stroke: dapat terjadi karena tekanan darah yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan pembuluh darah otak pecah. Stoke adalah kematian jaringan otak yang disebabkan karena berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otak yang terjadi secara mendadak sehingga dapat menyebabkan kerusakan otak dalam beberapa menit (complete stroke).
- 2) Gagal jantung: Tekanan darah yang terlalu tinggi dapat memaksa otot jantung untuk bekerja lebih berat dalam memompa darah yang dapat menyebabkan pembesaran otot jantung kiri sehingga jantung akan mengalami gagal fungsi.
- 3) Gagal ginjal, pembuluh darah dalam ginjal akan tertekan jika tekanan darah tinggi sehingga mengakibatkan pembuluh darah menjadi rusak dan fungsi ginjal menurun. Hal ini yang dapat menyebabkan gagal ginjal. *Nefrosklerosis begigna* dan *nefrosklerosis maligna* merupakan kelainan ginjal yang diakibatkan oleh hipertensi.

Nefrosklerosis benigna dapat terjadi yang diakibatkan oleh penderita hipertensi yang sudah berlangsung lama sehingga menimbulkan terjadinya pengendapan pada pembuluh darah yang diakibatkan oleh proses menua. Sedangkan untuk *Nefrosklerosis maligna* adalah salah satu kelainan ginjal yang terjadi karena naiknya tekanan diastole diatas 130 mmHg.

- 4) Kerusakan pada mata, kerusakan pembuluh darah dan saraf pada mata dapat diakibatkan oleh tekanan darah yang terlalu tinggi. (Sylvestri, 2014) mengemukakan di dalam penelitiannya bahwa hipertensi pada mata memiliki komplikasi sebagai berikut :
 - a) *Oklusi Vena Retina*, adanya pergeseran pembuluh darah dapat menyebabkan penyumbatan suplai darah dalam vena ke retina
 - b) *Oklusi Arteri Retina*, merupakan penyumbatan suplai darah dalam arteri ke retina. Karena adanya gumpalan darah atau zat-zat (seperti lemak) yang terjebak dalam arteri dapat menyebabkan arteri retina tersumbat.
 - c) *Makroaneurisma arteri retina*, merupakan gejala yang diakibatkan oleh tekanan darah di sekitar mata.
 - d) *Iskemik neuropati optik anterior*, merupakan defisiensi aliran darah pada daerah bagian saraf optik anterior yang menimbulkan terjadinya neuropati pada saraf tersebut.
 - e) *Ocular motor nerve palsy*, merupakan kelumpuhan yang dapat mengakibatkan gangguan pada bola mata.
 - f) Renopati hipertensi, merupakan bagian dari hipertensi esensial/maligna. Perubahan-perubahan yang dapat muncul berupa perdarahan pada lapisan saraf dan lapisan *pleksiform* luar, *lipid star*

dalam makula, penyempitan arteriola retina yang tidak teratur, sekudat dan bercak *cotton-wool*, dan perubahan *arteriosklerotik*. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan retinopati hipertensi.

9. Faktor Resiko Hipertensi

Adapun beberapa faktor resiko terjadinya hipertensi yaitu:

a) Umur

Tingginya hipertensi sejalan dengan bertambahnya umur, disebabkan oleh perubahan struktur pada pembuluh darah besar, sehingga lumen menjadi sempit dan dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku, sebagai akibat adalah meningkatnya tekanan darah sistolik. Dengan meningkatnya umur didapatkan kenaikan tekanan darah diastol rata-rata walaupun tidak begitu nyata juga terjadi kenaikan angka prevalensi hipertensi tiap kenaikan kelompok dekade umur. (Sartik *et al.*, 2017)

Menurut (Sutanto, 2010) Pada umur >40 tahun elastisitas arteri mulai berkurang, sehingga menjadi lebih mudah *arteriosklerosis* dan rentan terkena hipertensi. Sedangkan pada umur 18-40 tahun, semangat, kegiatan dan aktifitas fisik tinggi, sehingga kondisi kesehatan masih baik. (Artiyaningrum *et al.*, 2016)

Menurut Nisak (2015), Dalam teori setelah umur 45 tahun, dinding arteri akan mengalami penebalan oleh karenanya ada penumpukan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku. Tekanan darah meningkat karena kelenturan pembuluh darah besar berkurang pada penambahan usia (Priyanto, *et all* 2020).

b) Keturunan

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Tamungku *et al.*, 2020) Riwayat keluarga merupakan faktor resiko terjadinya hipertensi. Keturunan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya hipertensi. Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa potensi terkena hipertensi sebanyak 20-60% akan lebih mudah terkena hipertensi ketika di dalam keluarga ada yang menderita hipertensi.

c) Obesitas

Obesitas merupakan salah satu gangguan kesehatan yang melibatkan lemak tubuh secara berlebihan. Obesitas ini terjadi sebab kalori yang ada di dalam tubuh lebih banyak masuk daripada yang di bakar oleh kegiatan seperti olahraga dan lain sebagainya.. (Tamungku *et al.*, 2020)

d) Stress

Hasil wawancara dalam penelitian yang dilakukan oleh (Artiyaningrum *et al.*, 2016) seseorang Stress akibat banyaknya tekanan pikiran yang dirasakan responden seperti khawatir dan takut sering menjadikan seseorang merasa murung dan sedih, sehingga tidur tidak pulas dan sering terbangun tengah malam.

Di dalam Islam sudah terdapat anjuran untuk kita selalu senantiasa berzikir dan bertawakal kepada Allah swt. karena dengan melakukan hal tersebut maka akan membuat perasaan lebih tenang, aman dan tentram. Dengan itu, kita dapat terhindari dari hal-hal yang dapat mengganggu pikiran atau stress yang dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan tekanan darah. Seperti Firman Allah swt. dalam QS. Al-Fajr/89;27-30 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتٍ

Terjemahannya: “ Hai Jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya, Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaKu. Masuklah ke dalam surga-Ku ” (Kementrian Agama RI, 2021)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keadaan manusia yang taat. Ayat di atas menggambarkan sambutan Allah swt. kepada hambanya yang taat, Allah swt. berfirman menyeru nya ketika ruh nya akan meninggalkan badannya atau ketika ia bangkit dari kuburnya: hai jiwa yang tenang lagi merasa aman dan tentram karena banyak berzikir dan mengingat Allah swt. kembalilah, yakni wafat dan bangkitlah di hari kemudian, kepada Tuhan pemelihara dan pembimbing mu dengan hati yang rela, yakni puas dengan ganjaran Ilahi, lagi di ridhoi oleh Allah swt. bahkan seluruh makhluk, maka karena itu masuklah ke dalam kelompok hamba-hamba-Ku yang taat lagi memperoleh kehormatan dariKu dan masuklah ke dalam surga-Ku yang telah ku persiapkan bagi mereka yang taat (Shihab, 2002). Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus selalu berzikir dan terus mengingat Allah swt. dengan itu hati atau jiwa kita akan menjadi tenang karena sesungguhnya jiwa yang tenang dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit salah satunya penyakit hipertensi.

Menurut Sumanto (2010), Stres diduga melalui aktivitas syaraf simpatis (syaraf yang bekerja saat beraktivitas). Peningkatan aktivitas syaraf simpatis mengakibatkan tekanan darah secara

intermitten (tidak menentu). Gangguan kepribadian yang bersifat sementara dapat terjadi pada orang yang menghadapi keadaan yang menimbulkan stres. Apabila stres berlangsung lama dapat mengakibatkan peninggian tekanan darah yang menetap. (Artiyaningrum *et al.*, 2016).

e) Perilaku merokok

Perilaku merokok merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki nilai positif dalam semua hal terutama pada kesehatan. Dalam tembakau terdapat kandungan yang disebut sebagai nikotin dimana isapan pertama dari nikotin ini dapat menjadi penyebab peningkatan tekanan darah. Nikotin ini diserap oleh pembuluh darah yang sangat kecil di dalam paru-paru untuk disebarkan ke aliran darah. Hanya butuh beberapa detik nikotin ini untuk sampai ke otak. Reaksi otak terhadap nikotin dengan cara memberi sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepaskan epinefrin (adrenalin). Hal ini yang memaksa jantung bekerja lebih berat akibat dari tekanan darah yang tinggi. Asap rokok mengandung lebih dari 4000 bahan kimia yang dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya bisa mengakibatkan penyakit kanker dalam tubuh. Karena hal ini, menghisap sebatang rokok dapat memberi pengaruh besar terhadap kenaikan tekanan darah. (Sartik *et al.*, 2017)

f) Aktifitas fisik dan Olahraga

Aktifitas fisik merupakan kegiatan yang dilakukan dalam durasi waktu tertentu yang membutuhkan pergerakan dari otot-otot rangka dan membutuhkan energi yang lebih. (Tamungku *et al.*, 2020)

Tekanan darah berkurang bukan hanya karena berat badan yang menurun akibat melakukan olahraga, akan tetapi disebabkan tentang bagaimana tekanan darah itu dihasilkan. Tekanan darah dapat dilihat dari dua hal, diantaranya yaitu adanya hambatan yang dihadapi darah dalam melakukan tugasnya melalui arteri dan jumlah darah yang dipompa jantung per detik nya. Ketika melakukan olahraga, maka dapat menyebabkan pertumbuhan pembuluh darah kapiler yang baru dan jalan darah yang baru. Walaupun kerja jantung bertambah akibat melakukan olahraga, hal ini dapat menghasilkan pengaruh berkurangnya hambatan yang mampu memberikan penurunan tekanan darah yang sangat berarti. (Sartik *et al.*, 2017).

g) Konsumsi garam

Menurut Depkes (2006) garam dapat menyebabkan penumpukan cairan di dalam tubuh, hal ini dikarenakan menarik cairan yang ada di luar sel untuk tidak keluar, sehingga terjadi peningkatan volume dan tekanan darah. Seseorang yang mengonsumsi garam kurang lebih 3g tekanan darahnya rendah, sedangkan untuk seseorang yang konsumsi garam lebih dari 7-8g ditentukan tekanan darahnya tinggi. (Artiyaningrum *et al.*, 2016)

B. Konsep Dasar Kualitas Tidur

1. Defenisi Kualitas Tidur

Menurut (Potter & Perry, 2010) kualitas tidur merupakan keadaan dimana seseorang mendapat kemudahan untuk tidur serta dapat mempertahankan tidur. Kualitas tidur bisa dikatakan baik ketika seseorang tidak mengalami masalah keluhan yang dialami saat tidur,

seperti merasa pusing, badan pegal-pegal, rasa mengantuk berlebih pada siang hari dan merasa letih.

Ketika tidur, kesadaran terhadap alam akan terhenti dan kita memasuki keadaan istirahat yang sebut periodik, sehingga tubuh bisa beristirahat. Otak memiliki beberapa fungsi dan pusat-pusat tidur dalam mengatur siklus tidur dan terjaga. Pada waktu bersamaan, tubuh bisa menghasilkan substansi yang saat dilepaskan ke aliran darah dapat membuat perasaan mengantuk. Apabila proses ini diubah yang disebabkan karena faktor stress, gangguan, kecemasan dan sakit fisik, maka hal itu dapat menjadi alasan terjadinya gangguan pola tidur terhadap seseorang. (Potter & Perry, 2010)

Rasulullah saw. telah memberikan beberapa contoh perkataan ataupun perbuatan yang baik dalam menjalani kehidupan sehari hari yang dapat diintervensi kan dalam nilai-nilai kesehatan. Misalnya contoh fisik dalam kehidupan Rasulullah berupa nikmat kesehatan dalam pandangan islam, pola hidup sehat dan bersih, ibadah yang bisa menyehatkan, dimensi gerak dalam ibadah, serta istirahat dan tidur. Untuk itu, istirahat dan tidur yang cukup merupakan salah satu ajaran yang dicontohkan rasulullah yang dapat berdampak positif bagi kesehatan.

Sama halnya dengan firman Allah swt. dalam surah Ar-Rum/30:23 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Terjemahannya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian

dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan ” . (Kementrian Agama RI, 2021)

Ayat diatas menggambarkan bahwa tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah swt. alam semesta dan hubungannya dengan keadaan manusia, dengan adanya pergantian siang dan malam, serta tidur manusia di malam hari dan bangunnya mencari rezeki di siang hari.

Tidur di malam hari dapat memberikan dampak positif terhadap seseorang karena dapat memberikan perasaan yang nyaman, ketenangan serta istirahat, untuk memulihkan tenaga-tenaga yang akan digunakan pada waktu bangunnya. Di waktu tidur manusia akan mengistirahatkan tubuhnya dan akan mendapatkan pergerakan anggota tubuhnya dengan leluasa di waktu bangun. Akan tetapi bukan hanya tidur malam, tidur siang juga bermanfaat bagi kesehatan karena terdapat beberapa efek yang berkualitas dari tidur siang yang walaupun durasi tidurnya hanya sebentar, yaitu:

- a) Meningkatkan daya ingat, peningkatan ini terjadi dalam fase slow-wave sleep atau tidur gelombang pendek sebagaimana biasa terjadi saat tidur siang.
- b) Meningkatkan produktivitas, dimana tidur siang dapat menangkap informasi baru dengan baik.
- c) Membantu mengobati insomnia, karena akibat dari kurangnya tidur di malam hari dapat membuat seseorang akan merasa lebih sering mengantuk pada siang hari, sehingga ketika tidur di siang hari walaupun durasi nya hanya 15 menit dapat memberikan

perasaan segar, atau bugar karena mendapat waktu istirahat yang lebih.

- d) Mencegah penyakit jantung atau hipertensi, tidur siang dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi, akan tetapi tidur siang yang dibutuhkan hanya sekitar 20-40 menit saja karena jika durasi tidur siang terlalu panjang akan mengakibatkan sakit kepala berat ketika terbangun. (Mayuri *et al.*, 2017)

2. Tujuan Tidur

Menurut (Potter & Perry, 2010) Tidur bertujuan untuk memperbaiki proses biologis secara rutin. Selama tidur, gelombang rendah dalam NREM (*Nonrapid eye movement* tahap IV), tubuh melepaskan hormon pertumbuhan manusia untuk memperbaiki dan memperbaharui sel epitel dan sel khusus seperti sel otak. Selain itu, selama tidur dan istirahat, sintesa protein dan pembagian sel akan mengalami pembaharuan jaringan seperti pada kulit, mukosa lambung dan sumsum tulang belakang. Tidur juga dibutuhkan untuk tetap menjaga keseimbangan emosional, dan dapat menyimpan energi di dalam tubuh sehingga ketika terbangun tubuh akan merasakan perasaan yang nyaman dan segar untuk melakukan aktifitas sehari-hari/

Seperti halnya firman Allah swt. dalam surah Al-Anfall ayat/8:11 yang berbunyi:

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ
مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى
قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

Terjemahannya: “ Ketika Allah swt. membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman dari-Nya, dan Allah swt. menurunkan air (hujan) dari langit kepadaMu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) ini dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh kakimu (teguh pendirian). (Kementrian Agama RI, 2021).

Makna dari surah diatas adalah karunia Allah swt. yang diberikan kepada pejuang-pejuang Mukmin saat mereka mendapatkan ketengan jiwa berupa rasa kantuk yang bertujuan bagi mereka dapat beristirahat dengan baik dan tenang serta diturunkannya hujan sehingga mereka dapat bersuci dan mandi. Selain daripada itu, kualitas tidur dikatakan baik ketika organ di dalam tubuh dapat mempertahankan tubuh dalam keadaan relaks, sehingga dapat membantu mengurangi gangguan-gangguan atau masalah dari penyakit yang dialami.

Kemudian untuk tidur REM (*Rapid Eye Movement*) merupakan terjadinya perubahan di dalam aliran darah serebral, pelepasan epinefrin, peningkatan konsumsi oksigen, serta peningkatan aktifitas kortikal, yang dapat menyimpan memori dan pembelajaran, sehingga tidur REM ini sangat penting bagi tubuh untuk pemulihan kognitif. Adapun asumsi menurut (Mustika & Sustrami, 2014) tidur sangat penting untuk jaringan otak dan fungsi organ-organ di dalam tubuh manusia karena bisa mengembalikan tenaga dan berperan penting dalam metabolisme tubuh. Selain itu, tidur terlalu lama juga tidak bagus bagi kesehatan karena tubuh akan menyerap atau mengasimilasi sisa metabolisme yang dapat mengakibatkan perasaan loyo, dan hilang semangat ketika bangun tidur.

3. Waktu dan Batasan dalam Tidur

Waktu yang dilarang untuk tidur :

a. Tidur sebelum melaksanakan sholat isya'

Larangan tidur sebelum isya' karena pada waktu sebelum melakukan sholat isya' ditakutkan akan keterusan lalu tidak melaksanakan sholat isya' sehingga bisa menjadi dosa yang besar. Melainkan juga terdapat anjuran untuk tidur setelah sholat isya' karena tidur terlalu larut dapat menyebabkan kesehatan terganggu, daya tahan tubuh melemah, dan menimbulkan masalah baru terhadap sel-sel di dalam tubuh.

Al-Hafiz Ibun Hajar menjelaskan bahwa, “dibencinya tidur sebelum Isya' karena dapat melalaikan pelakunya dari sholat isya' hingga keluar waktunya, adapun bercakap-cakap setelahnya yang tidak ada gunanya dapat mengakibatkan tidur hingga shalat subuh dan lupa dari shalat malam. Akan tetapi, apabila percakapan mengandung manfaat tentu saja tidak ada larangan untuk melakukannya”. (Syamsinar, 2016)

b. Tidur sesudah subuh

Pada waktu subuh merupakan waktu dimana udara masih sejuk dan bersih, ketika bangun tidur dan langsung melakukan sholat subuh maka perasaan, batin dan jiwa serta pikiran terasa sangat segar, bugar setelah merasakan tidur disepanjang malam. Waktu ini lah yang tepat untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas yang baik, bermanfaat, bekerja, ataupun lainnya. Akan tetapi sebagai manusia tidur di waktu setelah subuh sering kali dilakukan, sebagaimana firman Allah swt. yang berbunyi:

QS.Al-Falaq/133:1:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

Terjemahannya : “katakanlah : aku berlindung kepada-Mu yang menguasai subuh” (Kementrian Agama RI, 2021)

Dari ayat tersebut dijelaskan Allah swt. bersumpah demi waktu subuh, karena subuh merupakan waktu dimana keadaan langit masih dalam keadaan yang gelap, sehingga seseorang akan lebih sulit untuk dibangunkan.

Padahal ketika kita melakukan aktifitas di waktu subuh akan mendatangkan manfaat bagi kesehatan karena seseorang yang sering bangun subuh dapat menghirup udara yang bersih dan segar sehingga membuat paru-paru dalam kondisi yang sehat. Apalagi jika melakukan olahraga di waktu subuh akan membuat jantung dalam kondisi stabil dan memberikan energi yang dapat membuat suasana hati menjadi baik sepanjang hari. Dampak dari tidur setelah subuh adalah dapat membuat perasaan menjadi lesu, kurang bersemangat, sakit kepala berat sepanjang hari. (Reefani, 2014)

c. Tidur di Waktu Sore

Tidur di sore hari dapat membuat perasaan seseorang menjadi lelah, pusing kepala, gelisah, tidak enak badan serta dapat seseorang ketika bangun tidur menjelang maghrib akan merasakan kebingungan, hal itu dikarenakan adanya perubahan suasana yang berhubungan dengan persoalan pencahayaan. Untuk itu waktu ashar baiknya digunakan untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Rasulullah saw. sudah memberikan contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu

Rasulullah saw. sering kali melakukan dzikir dan bertafakur pada waktu setelah ashar atau menjelang maghrib. (Syamsinar, 2016)

4. Jenis-jenis Tidur

Tidur dapat di klasifikasi kan menjadi dua jenis yaitu pertama tidur REM (*Rapid Eye Movement*) atau tidur dengan gerakan kedua mata cepat. Dan yang kedua tidur NREM (*Non-Rapid Eye Movement*) atau tidur dengan keadaan bola mata bergerak lambat. (Asmadi. 2008).

a) Tidur REM (*Rapid Eye Movement*) yaitu kondisi tidur yang aktif atau paradoksial. Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat tidur dengan sangat nyenyak, tetapi secara fisik yaitu gerakan kedua bola mata masih bergerak aktif. Tidur REM ini ditandai dengan otot kendur, tekanan darah meningkat, sekresi lambung meningkat, terjadi peningkatan suhu dan metabolisme, ereksi penis tidak teratur yang sering kali lebih cepat, serta gerakan bola mata cepat (mata cenderung bergerak maju mundur). Tanda-tanda seseorang mengalami REM seperti cenderung terlalu aktif, sulit mengontrol emosi, nafsu makan meningkat, dan bingung maupun curiga. (Asmadi. 2008).

b) Tidur NREM (*Nonrapid Eye Movement*), menurut Asmadi (2008) tidur NREM adalah tidur yang dalam dengan keadaan yang nyaman. Pada tidur NREM, gelombang otak lebih lambat dibandingkan pada orang yang terjaga atau insomnia. Adapun tanda-tanda tidur NREM ini yaitu tekanan darah turun, gerakan kedua bola mata melambat, keadaan istirahat dan mimpi yang berkurang. Terdapat empat tahap dalam tidur NREM ini yang masing-masing ditandai dengan pola perubahan aktivitas gelombang otak. Diantaranya:

- 1) Tahap 1 yaitu, tahap transisi, keadaan seseorang yang berpindah dari sadar ke tidur. Ditandai dengan keadaan seseorang yang merasakan sensasi nyaman dan rileks, kelopak mata menutup, detak jantung dan pernapasan menurun secara signifikan, kedua kelopak mata bergerak dari kiri ke kanan, serta otot melemah. Seseorang yang tidur pada tahap ini dapat dibangunkan dengan mudah.
- 2) Tahap II adalah tahap tidur ringan, gelombang otak melambat dan sistem saraf menutup kemampuan untuk membaca informasi sensorik untuk membantu tertidur lebih mudah. Jenis tidur ini dapat membantu tubuh mengembalikan energi dalam tubuh kita akan tetapi tidak mendapatkan istirahat yang cukup sepenuhnya. Fase ini berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit.
- 3) Tahap III adalah tahap fisik melemah karena hilangnya otot tonus secara menyeluruh. Peningkatan denyut jantung, pernapasan, serta proses tubuh berlanjut terus menurun karena dominasi sistem saraf parasimpatis. Seseorang yang tidur pada tahap III ini bisa jadi akan lebih sulit untuk dibangunkan.
- 4) Tahap IV adalah tahap seseorang tidur dengan keadaan yang rileks, jarang bergerak karena kondisi fisik yang melemah, dan pada tahap ini seseorang akan sulit untuk dibangunkan. Tahap IV merupakan menstabilkan keadaan tubuh seperti semula.

5. Fisiologi Tidur

Rata-rata orang dewasa yang sehat membutuhkan waktu sekitar 7 jam untuk tidur setiap malam. Namun, terdapat beberapa orang yang kadang membutuhkan waktu tidur lebih banyak atau kurang. Tidur

normal dapat dipengaruhi oleh faktor seperti usia. Seseorang dengan usia muda cenderung tidur lebih banyak daripada lansia. Waktu tidur pada lansia berkurang karena berkaitan dengan faktor penuaan. Fisiologi tidur dapat dilihat dari gambaran elektrofisiologi sel-sel otak selama tidur. *Polysomnography* adalah alat yang dapat mendeteksi aktivitas saat tidur. Pemeriksaan *polysomnography* sering dilakukan pada malam hari saat tidur. Hal ini karena alat tersebut dapat merekam aktivitas elektrookulografi dan elektromiografik (EEG). (Potter & Perry, 2010)

- a) Stadium 0 yaitu fase dalam keadaan masih terjaga dengan mata tertutup. Fase ini ditandai dengan gelombang voltase rendah dan cepat dari 8 hingga 12 siklus per detik. Terjadi peningkatan tonus otot. Sedangkan aktivitas alfa menurun ditandai dengan meningkatnya rasa kantuk. Pada saat terdapat gelombang alfa campuran pada saat mengantuk.
- b) Stadium 1 disebut sebagai tahap awal tidur. Tidur dimulai dengan fase NREM. Tahap 1 NREM merupakan perpindahan dari keadaan terjaga ke waktu tidur. Membutuhkan sekitar 5% dari total waktu tidur. Pada fase ini terjadi penurunan aktivitas gelombang alfa (gelombang alfa menurun kurang dari 50%), amplitudo rendah, sinyal campuran, predominan beta dan teta, tegangan rendah, frekuensi 4 hingga 7 siklus per detik, aktivitas bola melambat, mengalami penurunan tonus otot, yang terjadi sekitar 3 sampai 5

menit. Pada tahap ini seseorang akan mudah terbangun dan apabila terbangun maka akan merasa seperti setengah tidur.

- c) Stadium 2 yaitu ditandai dengan gelombang EEG spesifik yang didominasi oleh aktivitas theta, tegangan voltasi rendah ke sengan, kumparan tidur dan kompleks K. Kumparan tidur adalah gelombang berirama pendek dengan frekuensi 12 hingga 14 siklus per detik. Kompleks K adalah gelombang tegangan yang tajam, negatif dan voltasi tinggi yang diikuti oleh gelombang lebih lambat dengan frekuensi 2 hingga 3 siklus per menit, aktivitas positif yang berlangsung selama 500 detik.
- d) Stadium 3 ditandai dengan aktivitas delta 20%-50%, dengan frekuensi 1 hingga 2 siklus per detik, amplitudo tinggi, dan disebut juga tidur delta. Terjadi peningkatan tonus otot tetapi tidak ada gerakan pada kedua bola mata.
- e) Stadium 4 yaitu terjadi ketika gelombang delta lebih besar dari 50%. Stadium 3 dan 4 ini sulit untuk dibedakan. Stadium 4 lebih lambat. Stadium 3 dan 4 ini disebut juga sebagai gelombang tidur lambat atau tidur dalam. Pada tahap ini bisa menghabiskan sekitar 10% hingga 20% dari total waktu tidur. Tidur ini terjadi antara sepertiga malam dengan setengah waktu malam.

6. Faktor yang mempengaruhi kualitas tidur

Menurut (Kozier, 2011) Faktor yang mempengaruhi kualitas tidur yaitu penyakit, kelelahan, stres psikologis, obat, nutrisi, lingkungan, usia dan gaya hidup (Amanda *et al.*, 2017)

a) Usia

Menurut Nugroho (2014) menjelaskan semakin meningkatnya umur seseorang maka permasalahan yang dihadapi juga semakin banyak, berupa perubahan fisik seperti penurunan fungsi sel, sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem kardiovaskuler, sistem pengaturan temperatur (suhu tubuh), sistem respirasi, sistem *gastrointestinal*, sistem endokrin, sistem kulit serta sistem muskuloskeletal. Sehingga dapat dipahami bahwa peningkatan usia akan menyebabkan perubahan fisik dan mental yang diikuti oleh perubahan pola tidur seperti lansia sering mengalami terbangun pada tengah malam dan susah untuk tidur kembali. (Amanda *et al.*, 2017).

b) Stress

Aspiani (2014) yang menyatakan bahwa stress psikologis akan memungkinkan memunculkan kecemasan yang bisa mengakibatkan gangguan-gangguan pada saat tidur, hal tersebut karena ketika mengalami cemas terjadi peningkatan *neropineprin*. Selain itu, pada penderita hipertensi keadaan stres yang terus menerus akan mempengaruhi kualitas tidurnya, karena pada saat stres tubuh menghasilkan hormon yang disebut kortisol, hormon ini diproduksi oleh kelenjar adrenal. Kadar kortisol yang tinggi akan menyebabkan gangguan tidur pada seseorang karena menghambat produksi melatonin,

yaitu suatu hormon yang mengatur ritme circadian dan berakibat pada kualitas tidur yang buruk pada penderita hipertensi. Kualitas tidur yang buruk pada penderita hipertensi akan memperburuk penyakitnya karena beban kerja jantung meningkat, sehingga menyebabkan tekanan darah yang tinggi pada penderita hipertensi saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah. (Nur Melizza *et al.*, 2020)

c) Status kesehatan atau Penyakit lain

Terdapat beberapa penyakit yang dapat memperbesar masalah kebutuhan tidur, seperti keberadaan penyakit lain yang disebabkan oleh suatu infeksi. Seseorang yang keadaan tubuhnya lebih sehat kemungkinan akan memperoleh tidur yang nyenyak, sedangkan berbeda dengan orang yang memiliki kondisi fisik yang sakit seperti adanya rasa nyeri, dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada saat tidur dan membuat tidur tidak nyenak. (Asmadi. 2008).

d) Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor penentu terhadap kualitas tidur seseorang. Apabila lingkungan kotor, suasana bising, penerangan terlalu terang, bersuhu panas, dapat mempengaruhi kualitas tidurnya. Sedangkan jika lingkungan bersih, bersuhu dingin, serta tenang dan penerangan tidak terlalu terang maka akan membuat seseorang mudah tertidur dan mendapatkan tidur yang nyenyak serta terhindar dari gangguan-gangguan tidur yang mungkin terjadi di sepanjang malam. (Asmadi. 2008).

Kozier (2010) mengatakan ketidak nyaman akibat suhu lingkungan dan kurang ventilasi dapat mempengaruhi tidur. Kadar

cahaya dapat menjadi faktor lain yang berpengaruh. Seseorang yang terbiasa tidur dalam gelap mungkin sulit pada keadaan terang. Menurut peneliti, masing-masing orang mempunyai kebiasaan sendiri dalam tidur baik suhu, pencahayaan dalam tidur, maupun terbiasa tidur sendiri atau mempunyai teman sekamar waktu tidur. Bila lansia tidur dalam keadaan yang tidak biasanya, kemungkinan lansia dapat merasa tidak nyaman dalam tidurnya dan itu membuat lansia mengalami gangguan untuk dapat tidur. (Mustika & Sustrami, 2014)

e) Kelelahan atau Keletihan

Menurut Asmadi (2008), salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang yaitu kelelahan. Apabila kelelahan yang dirasakan berada ditingkat menengah maka akan membuat tidur seseorang lebih nyenyak, akan tetapi jika kelelahan berada di tingkat berlebih justru hal tersebut bisa menyebabkan proses tidur REM lebih pendek. Ketika seseorang melakukan aktifitas yang berlebih maka dapat memunculkan keletihan dan rasa lelah sehingga membutuhkan durasi tidur lebih banyak untuk memulihkan energi yang telah digunakan selama seharian penuh. Hal ini bisa membuat seseorang akan lebih mudah tertidur akibat dari tahapan tidur pada gelombang lambatnya akan diperpendek. Akan tetapi rasa lelah yang didapatkan setelah ber aktifitas seharian penuh bisa membuat perasaan letih yang berlebihan sehingga dapat membuat seseorang mengalami kesulitan untuk memulai tidur. (Alfi & Yuliwar, 2018a)

f) Obat-obatan

Orang yang mempunyai penyakit cenderung akan minum obat tertentu, sehingga membuat kaitan yang erat antara keduanya. adapun obat-obatan tertentu yang dapat membuat tidur lebih lama, ada juga jenis obat yang membuat waktu tidur jadi lebih pendek dari biasanya. Orang yang memakai diuretik seringkali mengalami gangguan tertentu sehingga akan mengalami insomnia dan hal ini bisa menjadi sesuatu yang memicu insomnia karena obat golongan ini mengharuskan seseorang untuk sering buang air kecil. Menurut (Mubarak, 2008) obat antidepresan juga dapat menekan keadaan tidur REM seseorang, kafein meningkatkan saraf simpatis yang membuat orang sulit tidur, golongan lain seperti beta-blocker berdampak pada munculnya insomnia, kecuali seseorang yang menggunakan golongan narkotik ini yang dari fase insomnia akan mudah menjadi sangat mengantuk karena obat ini menekan REM (Alfi & Yuliwar, 2018a).

7. Hubungan kualitas tidur dengan Hipertensi

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa seseorang yang menderita gangguan tidur tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi oleh beberapa faktor, misalnya seseorang yang memiliki penyakit yang menyebabkan rasa sakit, akan mengalami ketidaknyamanan saat tidur karena merasa tidak nyaman secara fisik maka dapat mengakibatkan jumlah jam tidur berkurang. (Alsaadi *et al.*, 2014). Liu *et al* (2016) menyatakan bahwa penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi lebih banyak mengalami gangguan tidur dibandingkan orang dengan tekanan darah normal bila diidentifikasi menggunakan kuesioner PSQI. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas tidur

adalah hipertensi. Kecemasan dan ketidaknyamanan yang dialami pasien hipertensi dapat mempengaruhi proses tidur penderita. (Perry dan Potter, 2009). Gejala akibat hipertensi dapat mengganggu tidur, yang akan berdampak dalam penurunan kualitas tidur. Oleh karena itu, keluhan terkait masalah tidur yang mempengaruhi kualitas tidur yang buruk pada pasien hipertensi akan berdampak serius seperti mempengaruhi tekanan darah, memperburuk perkembangan hipertensi, mengganggu kontrol tekanan darah, yang dapat menyebabkan risiko komplikasi stroke dan jantung.. (Alfi & Yuliwar, 2018b)

8. Kuisisioner dalam menentukan Kualitas tidur

Menurut (Indrawati 2012) Kualitas tidur dapat diukur dengan menggunakan *The Pittsburgh Sleep Quality Index* (PSQI). PSQI adalah instrumen efektif yang digunakan untuk mengukur kualitas tidur dan pola tidur pada orang dewasa. PSQI dikembangkan untuk mengukur dan membedakan individu dengan kualitas tidur baik dan kualitas tidur buruk. PSQI terdiri dari 7 dimensi antara lain kualitas tidur subyektif, sleep latensi, durasi tidur, gangguan tidur, efisiensi kebiasaan tidur, penggunaan obat tidur, dan disfungsi tidur pada siang hari, dinilai dalam bentuk pertanyaan dan memiliki bobot penilaian masing-masing sesuai dengan standar baku. PSQI terdiri dari 19 pertanyaan kuesioner yang dikelompokkan ke dalam 7 komponen skor, yang tiap itemnya dibobokkan dengan bobot seimbang dalam rentang skala 0-3. Penentuan kualitas tidur yang baik atau buruk dilakukan dengan mengukur tujuh komponen tersebut, yang akhirnya dijumlahkan untuk mendapatkan skor global PSQI yang memiliki rentang skor 0-21.

Pengukuran kualitas dan pola tidur dibedakan menjadi kategori tidur yang baik dan tidur yang buruk dengan pemeriksaan 7 komponen yaitu sebagai berikut :

- a) Kualitas tidur subyektif, Kualitas tidur yang baik adalah tidur yang tenang dengan rasa segar di saat bangun.
- b) Latensi tidur, Waktu yang diperlukan oleh seseorang dari mulai ada keinginan untuk tidur (mengantuk) sampai dia tertidur.
- c) Durasi tidur, Lamanya tidur yang didapat pada malam hari.
- d) Efisiensi kebiasaan tidur, Efisiensi kebiasaan tidur adalah rasio antara waktu sebelumnya yang digunakan untuk tidur dengan waktu yang dihabiskan di tempat tidur.
- e) Gangguan-gangguan tidur, Gangguan gangguan tidur seperti sulit memulai tidur, mempertahankan tidur atau terbangun dini hari.
- f) Penggunaan obat tidur, Penggunaan obat tidur bagi penderita insomnia ini bisa menyebabkan ketergantungan,
- g) Kelainan fungsi tubuh di siang hari, Akibat dari kualitas tidur yang buruk, seseorang akan merasa bangun dengan perasaan tidak segar, frekuensi mengantuk yang sering di siang hari, sulit berkonsentrasi, dan mudah lelah

C. Konsep Dasar Terapi Relaksasi Otot Progresif

1. Definisi Relaksasi Otot Progresif

Menurut (Keliat dan Pasaribu, 2016) Progressive Muscle Relaxation (PMR) merupakan salah satu bentuk terapi relaksasi dengan gerakan mengencangkan dan merelaksasi kan otot-otot satu bagian tubuh pada satu waktu untuk mendapatkan kontrol atas kecemasan yang merangsang pikiran dan ketegangan otot. (Rahmawati *et al.*, 2018).

Menurut (Ramdhani dan Putra, 2009) *Progressive muscle relaxation* adalah terapi relaksasi dengan gerakan mengencangkan dan melemaskan otot – otot pada beberapa bagian tubuh tertentu yang diberikan pada klien dengan gangguan fisik karena penyakit maupun secara fungsional berupa penurunan aktivitas sehari-hari serta mengalami insomnia. Dalam melakukan terapi ini, klien membedakan sensasi saat otot dalam kondisi tegang dan rileks serta merasakan kenyamanan dan relaksasi saat otot dalam kondisi lemas. (Thahir, 2015)

2. Tujuan Relaksasi Otot Progresif

Menurut (Setyoadi dan Kushariyadi, 2011) Tujuan *Progressive muscle relaxation* diantaranya adalah :

- a. Menurunkan ketegangan otot, kecemasan, nyeri leher dan punggung, tekanan darah tinggi, frekuensi jantung, laju metabolik.
- b. Mengurangi distritmia jantung, kebutuhan oksigen.
- c. Meningkatkan gelombang alfa otak yang terjadi ketika klien sadar dan tidak memfokus perhatian seperti relaks.
- d. Meningkatkan rasa kebugaran, konsentrasi.
- e. Memperbaiki kemampuan untuk mengatasi stres.
- f. Mengatasi insomnia, depresi, kelelahan, iritabilitas, spasme otot, fobia ringan, gagap ringan, dan
- g. Membangun emosi positif dari emosi negatif.
- h. Membantu mengurangi tanda dan gejala insomnia seperti menurunkan konsumsi oksigen tubuh, laju metabolisme tubuh, laju pernapasan, ketegangan otot, dan tekanan darah sistolik serta gelombang alpha otak.

Relaksasi otot progresif merupakan salah satu teknik relaksasi otot yang telah dibuktikan dalam program terapi terhadap ketegangan otot mampu mengatasi penyakit pada penderita gangguan tidur (insomnia) untuk meningkatkan kualitas tidur, mengatasi ansitas, kecemasan, kelelahan, kram otot, nyeri leher dan pinggang, serta hipertensi. Selain itu, relaksasi otot progresif merupakan cara yang efektif untuk merasakan relaksasi dan mengurangi kecemasan karena kita mengistirahatkan otot dengan benar, hal ini akan diikuti oleh relaksasi mental dan pikiran. (Kanender *et al.*, 2015)

3. Indikasi Terapi Relaksasi Otot Progresif

Indikasi dari terapi relaksasi otot progresif menurut (Setyoadi & Kushariyadi, 2011):

- a. Responden dengan gangguan insomnia.
- b. Responden sering mengeluh stress.
- c. Responden yang sering mengalami kecemasan.
- d. Responden yang menderita depresi.

Kontra indikasi

- a. Klien yang mengalami keterbatasan gerak, misalnya sulit menggerakkan badannya.
- b. Klien yang menjalani perawatan tirah baring (bedrest)

4. Fisiologi Kontraksi dan Relaksasi Otot Progresif

Latihan otot progresif ini melibatkan sembilan kelompok otot yang ditegangkan dan dirileks kan. Yaitu kelompok otot mata, dahi, otot bibir, lidah, rahang, dada, leher, otot tangan, dan otot kaki. Menurut Wibowo (2008) berpendapat pada ekstremitas atas terdapat sekumpulan

otot yang terlibat dalam kontraksi dan relaksasi yaitu *musculus latissimus dorsi*, *musculus deltoideus*, *musculus trapezius*, *musculus biceps brachii*, *musculus triceps brachii*, *musculus extensor carpi radialis*, *musculus extensor carpi ulnaris*, *musculus pronator teres*, *musculus palmaris ulnaris*, dan *musculus flexor digitorum profundus*.

Pada ekstremitas bawah, jenis otot yang terlibat dalam kontraksi dan relaksasi meliputi *musculus iliopsoas*, *musculus tensor fasciae latae*, *musculus rectus femoris*, *musculus vastus*, *musculus peroneus*, *musculus tibialis*, *musculus ekstensor digitorum communis*, *musculus peroneus*, *musculus gracilis*, *musculus soleus*, *musculus adductor magnus*, *musculus gluteus maximus*, *musculus biceps femoris*, dan *musculus plantaris*.

Pada bagian kepala, wajah, dan mulut otot-otot yang terlibat pada saat kontraksi dan relaksasi meliputi *musculus frontalis*, *musculus occipitalis*, *musculus orbicularis oculi*, *musculus orbicularis oculi*, *musculus levator palpebrae*, *musculus triangularis*, *musculus orbicularis oris*, *musculus quadratus labii*, *musculus buccinator*, *musculus zygomaticus*, *masseter*, *musculus temporalis*, *musculus pterigoid*, *musculus genioglossus*, dan *musculus styloglossus*.

Pada bagian leher dan bahu, jenis otot yang terlibat meliputi *musculus platysma*, *musculus sternohyoid*, *musculus longus capitis*, *musculus deltoid*, *musculus subscapularis*, *musculus supraspinatus*, *musculus supra spinatus*, dan *musculus teres*. Sedangkan pada bagian dada otot yang terlibat adalah *musculus pectoralis major*, *musculus pectoralis minor*, *musculus subclavius*, dan *musculus serratus anterior*. Selain itu pada saat melakukan

pemafasan dalam, juga melibatkan otot-otot bagian perut yang meliputi *musculus abdominalis internal*, *musculus abdominalis eksternal*, *musculus obliquus abdominalis*, dan *musculus transversus abdominalis*.

Kontraksi dan relaksasi otot dikendalikan oleh sistem saraf pusat melalui serabut saraf motorik yang melekat pada cabang-cabangnya. Saraf motorik adalah koneksi neuromuskular yang merupakan konduktor kimia (neurotransmitter) asetilkolin dan adrenalin untuk merangsang serat otot. Impuls saraf yang mencapai sistem neuromuskular ditransmisikan langsung ke setiap sarkomer melalui sistem tubulus transversal yang mengelilingi miofibril. Semua sarkomer otot menerima sinyal untuk berkontraksi, sehingga otot dapat berkontraksi secara keseluruhan. Sinyal elektrik ditransmisikan ke retikulum sarkoplasma. Sarkoplasma merupakan suatu sistem dari vesicles yang bersifat membran dan berasal dari retikulum endoplasma yang mengelilingi miofibril. (Kuntarti dan Setiadi, 2007).

5. Mekanisme kerja Relaksasi Otot Progresif terhadap peningkatan Kualitas Tidur

Mekanisme kerja relaksasi otot progresif dalam mempengaruhi kebutuhan tidur disebabkan karena adanya gerakan kontraksi dan relaksasi otot yang dapat merangsang respon relaksasi baik fisik maupun psikologis. Ketika gerakan dilakukan, sel saraf juga mengeluarkan peptida opiate dan dialirkan ke seluruh tubuh. Sehingga merasakan sensasi nikmat dan relaksasi. Adanya respon relaksasi trofotropik akan merangsang sistem saraf. Dimana fungsi dari sistem saraf ini berlawanan dengan fungsi sistem saraf simpatis sehingga tercapai keadaan rileks dan tenang. Perasaan rileks ini akan diteruskan ke hipotalamus untuk hipotalamus menghasilkan *corticotropin releasing*

faktor (CFR). CFR ini akan merangsang kelenjar pituitari sehingga akan meningkatkan produksi beberapa hormon, seperti endorfin, enkefalin, dan serotonin. Secara fisiologis, kebutuhan tidur akan terpenuhi akibat dari penurunan aktivitas *Reticular Activation System* (RAS) dan *Norepineprine* sebagai akibat penurunan aktivitas sistem batang otak. Respon relaksasi akan terjadi karena adanya aktifitas sistem saraf otonom parasimpatis *nuclei rafe*. Hal ini akan menyebabkan perubahan yang dapat mengontrol aktivitas sistem saraf otonom berupa penurunan fungsi oksigen, frekuensi napas, denyut nadi, ketegangan otot, tekanan darah, serta gelombang alfa dalam otak sehingga mudah untuk tertidur. (Brunelli *et al.*, 2015).

Menurut (Feldman, Greenson, dan Senville, 2010) Relaksasi otot progresif dapat mempengaruhi tidur karena pada saat dilakukan ROP dapat menimbulkan respon relaksasi (trofotropik) yang menstimulasi semua fungsi yang di dimana cara kerjanya berlawanan dengan sistem saraf simpatis untuk mencapai keadaan relaks dan tenang. Perasaan rileks akan menghasilkan *corticotropin releasing factor* (CRF) sehingga meningkatkan produksi berbagai hormon, seperti endorphen, enkephalins dan serotonin (Ramdhani, 2008). Secara fisiologis, pemenuhan kebutuhan tidur terjadi karena menurunnya aktivitas *Reticular Activation System* dan *norepineprine* akan menimbulkan rasa nyaman yang dapat merangsang timbulnya rasa kantuk. (Kasron dan Susilawati, 2017).

6. Mekanisme kerja Relaksasi Otot Progresif terhadap tekanan darah

Relaksasi otot progresif dapat mempengaruhi tidur karena ketika ketika ROP dilakukan, maka akan memunculkan kontraksi dan relaksasi

secara berulang dari kelompok otot yang berbeda. Dengan meregangkan dan mengendurkan otot, maka dapat mengurangi input dan output neuron motorik, yaitu pada pre sinap, kontrol refleks H (proprioseptif) akan menurun pada post sinap, yang akan menurunkan kontrol refleks E (eksteroseptif). Penurunan proprioception dan exteroception akan mengakibatkan penurunan motor evoked potential (MEP) yang selanjutnya akan menurunkan aktivitas sistem motorik skeletal, sistem saraf otonom (simpatis dan parasimpatis) dan jaras kortikal. (Guissard, Duchateau, dan Hainaut, 2001). Penurunan aktifitas skeletal-motor system dapat merileksasikan sistem fisik seperti otot-otot tubuh. Pada sistem saraf otonom akan melibatkan sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Terdapat beberapa organ dipengaruhi oleh kedua sistem saraf ini, aktivitas sistem saraf simpatis disebut juga erotropic atau respon *fight or flight* dimana efek dari saraf simpatis yaitu peningkatan denyut jantung, tekanan darah, hiperglikemia dan dilatasi pupil, peningkatan pernapasan dan terjadi ketegangan otot. Aktivitas sistem saraf parasimpatis disebut juga trofotropik, yang akan memanipulasi hipotalamus sehingga menimbulkan perasaan rileks dan lebih nyaman secara fisiologis dan emosional, serta dapat menimbulkan perasaan ingin istirahat dan perbaikan fisik dalam tubuh. Aktivitas ini merupakan dasar respon relaksasi dimana respon parasimpatis meliputi penurunan denyut jantung dan tekanan darah, perubahan fungsi neuroendokrin, dan peningkatan aliran darah. Oleh karena itu, melalui latihan relaksasi memunculkan respon relaksasi untuk mencapai keadaan tenang. Penurunan jalur kortikal dan hipotalamus dapat

menyebabkan perasaan relaksasi dan ketenangan psikologis emosional (Conrad dan Roth, 2007) (Kasron & Susilawati, 2017).

7. Teknik Relaksasi Otot Progresif

Adapun Teknik Relaksasi Otot Progresif menurut (Setyoadi & Kushariyadi, 2011) yaitu :

a. Persiapan

Persiapan alat dan lingkungan: kursi, bantal, serta lingkungan yang tenang dan sunyi.

- 1) Melakukan informkonsen terhadap responden untuk menciptakan BHSP seperti Jelaskan tujuan, manfaat, prosedur, dan pengisian lembar persetujuan terapi padalansia.
- 2) Posisikan tubuh lansia secara nyaman yaitu berbaring dengan mata tertutup menggunakan bantal dibawah kepala dan lutut atau duduk dikursi dengan kepala ditopang, hindari posisiberdiri.
- 3) Lepaskan asesoris yang digunakan seperti kacamata, jam, dansepatu.
- 4) Longgarkan ikatan dasi, ikat pinggang atau hal lain yang sifatnya mengikat ketat

8. Prosedur kerja Relaksasi Otot Progresif

- 1) Gerakan 1 : Ditunjukan untuk melatih otot tangan.
 - a) Genggam tangan kiri sambil membuat suatu kepalan.
 - b) Buat kepalan semakin kuat sambil merasakan sensasi ketegangan yang terjadi.
 - c) Pada saat kepalan dilepaskan, rasakan relaksasi selama 10 detik.


- d) Gerakan pada tangan kiri ini dilakukan dua kali sehingga dapat membedakan perbedaan antara ketegangan otot dan keadaan relaks yang dialami.
 - e) Lakukan gerakan yang sama pada tangan kanan.
- 2) Gerakan 2 : Ditunjukkan untuk melatih otot tangan bagian belakang.
- a) Tekuk kedua lengan ke belakang pada peregalangan tangan sehingga otot di tangan bagian belakang dan lengan bawah menegang.
 - b) Jari-jari menghadap ke langit-langit.



Gambar gerakan 1 dan 2 Sumber (Rochmawati, 2015)

- 3) Gerakan 3 : Ditunjukkan untuk melatih otot biceps (otot besar pada bagian atas pangkal lengan).
- a) Genggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan.

- b) Kemudian membawa kedua kapalan ke pundak sehingga otot biseps akan menjadi tegang



Gambar 3. gerakan 3 otot-otot biceps

Gambar gerakan 3 Sumber (Rochmawati, 2015)


- 4) Gerakan 4 : diindikasikan untuk melatih otot bahu agar mengendur.
- Angkat kedua bahu setinggi mungkin seolah-olah menyentuh kedua telinga.
 - fokuskan perhatian pengangkat pada kontrak ketegangan yang terjadi di bahu, pinggung atas dan leher.



Gambar 4. Gerakan 4 untuk melatih otot bahu

Gambar gerakan 4 Sumber (Rochmawati, 2015)

- 5) Gerakan 5 dan 6: Ditunjukkan untuk mengendurkan otot-otot wajah (seperti dahi, mata, rahang dan mulut).
- Gerakan otot-otot dahi dengan mengerutkan kening dan mengerutkan kening sampai otot-otot tersebut merasa kulitnya berkerut.
 - Tutup mata Anda dengan erat sehingga Anda dapat merasakan ketegangan di sekitar mata dan otot-otot yang mengontrol gerakan mata.
- 6) Gerakan 7 : Dimaksudkan untuk mengendurkan ketegangan yang dialami oleh otot-otot rahang. Mengencangkan rahang, diikuti dengan menggigit gigi sehingga terjadi ketegangan di sekitar otot rahang.
- 7) Gerakan 8 : Bertujuan untuk mengendurkan otot-otot di sekitar mulut. Bibir dikencangkan sebanyak mungkin sehingga Anda merasakan ketegangan di sekitar mulut.



Gambar 5. Gerakan-gerakan untuk otot-otot wajah

Gambar gerakan 5, 6,7,8 Sumber (Rochmawati, 2015)

- 8) Gerakan 9 : Dimaksudkan untuk merilekskan otot bagian leher depan dan belakang.
- a) Diawali dengan gerakan otot leher belakang kemudian ke otot leher bagian depan.
 - b) Meletakkan kepala hingga posisi beristirahat.
 - c) Menekan kepala di permukaan bantalan kursi sehingga mampu merasakan ketegangan pada leher belakang dan punggung bagian atas.
- 9) Gerakan 10 : Dimaksudkan untuk melatih otot leher bagian depan
- a) Mengarahkan kepala ke arah depan
 - b) Rapatkan dagu ke dada, hingga mampu merasakan ketegangan di bagian leher depan.
- 10) Gerakan 11 : Dimaksudkan untuk melatih otot punggung
- a) Mengangkat tubuh dari bantalan kursi
 - b) Melengkukkan punggung
 - c) Membusungkan dada, kemudian menahan kondisi tegang dalam 10 detik, lalu rilekskan
 - d) Selama rileks, tubuh diletakkan kembali ke bantalan kursi dan membiarkan otot menjadi lurus.
- 11) Gerakan 12 : dimaksudkan untuk pelepasan otot dada
- a) Melakukan tarikan nafas panjang agar paru-paru dapat terisi banyak udara
 - b) Menahan selama beberapa detik, hingga bagian dada merasakan ketegangan sampai ke bagian perut, kemudian dirilekskan.

- c) Lepaskan tegangan, kemudian lakukan pernafasan secara normal. Lalu ulangi sekali lagi hingga mampu merasakan adanya perbedaan antara keadaan rileks dan tegang.



gambar gerakan 9,10,11,12 Sumber (Rochmawati, 2015)

- 12) Gerakan 13 : dimaksudkan untuk melatih otot perut
- Melakukan tarikan perut dengan kuat ke arah dalam
 - Menahan hingga perut terasa keras dan kencang selama 10 detik, kemudian lepaskan.
 - Kemudian melakukan gerakan awal
- 13) Gerakan 14-15 : dimaksudkan untuk melatih otot kaki misalnya betis dan paha
- Kedua telapak kaki diluruskan hingga merasakan ketegangan pada otot paha
 - Lakukan gerakan mengunci pada bagian lutut hingga ketegangan beralih ke bagian otot betis


- c) Menahan posisi tegang selama 10 detik yang kemudian dirilekskan.
- d) mengulang sebanyak 2 kali di tiap gerakan



Gambar gerakan 13,14 Sumber (Rochmawati, 2015)

D. Kerangka teori


Bagan 3.1 Kerangka teori



E. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan kerangka hubungan antara konsep – konsep yang akan diukur atau diamati melalui penelitian yang akan dilakukan. Diagram dalam kerangka konsep harus menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. (Masturoh, 2018)

Bagan 3.2 Kerangka Konsep




BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *pre-eksperimental*, dimana jenis penelitian ini digunakan karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya *variable dependen* serta tidak ada variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random dengan pendekatan *One Group Pretest-Posttest Design* (Masturoh & Anggita, 2018). Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengukuran kualitas tidur menggunakan lembar kuesioner *Pittsburgh Sleep Quality Index* (PSQI) untuk mengukur tingkat kualitas tidur, 15 menit pada kelompok sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Kemudian dilakukan perbandingan keadaan sebelum dan sesudah dilakukan penelitian. (Musturoh, 2018).



Keterangan :

- O₁ = Pengukuran kualitas tidur sebelum dilakukan perlakuan
X = Intervensi Terapi Relaksasi Otot Progresif
O₂ = Pengukuran kualitas tidur setelah dilakukan perlakuan

B. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pattopakang kabupaten Takalar

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 01-07 Agustus 2021. Dan pemberian perlakuan dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Intervensi dilakukan sebelum tidur pada pukul 15:30-16:30 WITA.

C. Populasi dan sampel penelitian

1. Populasi penelitian

Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan nya merupakan pengertian dari populasi. Jadi kesimpulan nya adalah populasi bukan hanya tentang orang tetapi benda atau objek lainnya juga termasuk dalam populasi. (Masturoh & Anggita, 2018).

Populasi pada penelitian ini adalah penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang Takalar.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan jumlah fisik dan karakteristik yang secara nyata dimiliki oleh populasi yang dapat diteliti dan ditarik kesimpulan nya. (Masturoh & Anggita, 2018).

Pada penelitian ini jumlah sampel yaitu Penderita Hipertensi yang mengalami kualitas tidur buruk selama 4 minggu terakhir sesuai dengan kriteria Inklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini terdapat 18 responden yang masuk dalam kriteria inklusi yang ditetapkan peneliti.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampling yang digunakan yaitu *Non-Probability Sampling* dengan *Sampling Purposif* yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti dengan memilih subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi. (Masturoh & Anggita, 2018). Adapun kriteria Inklusi dan Eksklusi yang ditentukan peneliti adalah :

a. Kriteria inklusi

Kriteria inklusi merupakan ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel (Masturoh & Anggita, 2018). Dalam penelitian ini kriteria inklusi sebagai berikut.

- 1) Penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang grade I
- 2) Usia penderita Hipertensi 45-55 tahun
- 3) Responden yang memiliki tekanan darah sistolik 140-159 mmHg dan tekanan darah diastole 80-99 mmHg.
- 4) Penderita hipertensi yang sedang mengalami kualitas tidur buruk
- 5) Responden yang tidak rutin dalam mengonsumsi obat

b. Kriteria eksklusi

Kriteria eksklusi merupakan standar yang telah ditentukan peneliti yang bisa digunakan untuk mengeluarkan sampel yang tidak termasuk dalam kriteria inklusi, atau sampel yang tidak termasuk dalam ciri-ciri anggota populasi. (Masturoh & Anggita, 2018). Dalam penelitian ini kriteria eksklusi sebagai berikut:

- 1) Responden penderita Hipertensi dengan penyakit Komplikasi
- 2) Keadaan umum pasien yang semakin memburuk

- 3) Klien yang mengalami bedrest

E. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pendekatan kepada subjek dan proses pengumpulan karakteristik subjek yang di perlukan dalam suatu penelitian. (Nursalam.2015).

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya dimana peneliti akan mendapatkan data asli dan data baru dari responden (Masturoh & Anggita, 2018). Pada penelitian ini menggunakan pengumpulan data berupa kuesioner untuk mengetahui karakteristik dari responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari jurnal, lembaga, laporan ataupun yang lainnya (Masturoh & Anggita, 2018). Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa jurnal dan ebook.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengukur, mengobservasi atau melakukan pengamatan dan pengumpulan data yang baik sehingga data yang didapatkan merupakan data yang valid, andal dan aktual. (Nursalam.2015).

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan Lembar observasi atau wawancara. Kemudian untuk mengukur tingkat kualitas tidur responden, penelitian ini menggunakan lembar kuesioner *Pittsburgh Sleep Quality Index* (PSQI). Dimana kuesioner ini telah diuji reliabilitas oleh Agustin

(2012) dengan nilai reliabilitas 0,766 artinya kuesioner ini reliabel untuk digunakan. Terdapat 7 komponen yang bisa menggambarkan kualitas tidur seseorang dalam pengukuran kuesioner PSQI, yaitu kualitas tidur secara subjektif, Latensi tidur, durasi tidur, efisiensi tidur, gangguan tidur, kebiasaan penggunaan obat-obatan serta aktifitas sehari-hari yang dapat menjadi gangguan dalam tidur.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian selama 6 hari berturut-turut, dilakukan secara langsung di wilayah kerja puskesmas Pattopakang dengan cara mengumpulkan semua responden dalam satu tempat dengan bantuan dari staff Puskesmas Pattopakang, kemudian peneliti disini menjadi instruktur atau memberikan pengarahan gerakan kepada responden untuk di ikuti. Sebelum melakukan gerakan peneliti terlebih dahulu membagikan kuesioner PSQI untuk mengetahui kualitas tidur responden sebelum diberikan perlakuan, kemudian kuesioner setelah perlakuan dibagikan keesokan harinya atau setelah tidur untuk mengetahui efektifitas terapi relaksasi otot progresif ini. Untuk hasil data kualitas tidur sebelum dan sesudah teknik relaksasi otot progresif dicatat dalam bentuk *master table*. Kemudian untuk hasil penelitian, peneliti mengukur untuk keseluruhan kuesioner selama 6 hari berturut-turut dengan cara mentotalkan hasil penelitian baik itu *pre-test* maupun *post-test* untuk membandingkan hasil pengukuran dari hari pertama sampai dengan hari terakhir.

Selain itu, untuk menentukan kategorisasi kuesioner kualitas tidur penelitian ini menggunakan rumus panduan batasan menurut Saifuddin Azwar (2012) dapat dilihat pada Table berikut :

Table 3.0.1. Rumus Kategorisasi Batas

Rumus	Kategori
$<M-0,5.SD$	Sangat Baik
$M-0,5.SD - M+0,5.SD$	Baik
$M+0,5.SD - M+1,5.SD$	Buruk
$M+1,5.SD$	Sangat Buruk

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan rumus menggunakan mean ideal dan standar deviasi sebagai berikut :

1. Menghitung mean ideal

$$\text{Meal ideal} = \frac{1}{2} (\text{skor tertinggi} + \text{skor terendah})$$

$$\text{Kualitas tidur} = \left(\frac{1}{2} (432-108=162) \right)$$

2. Menghitung jumlah skor tertinggi dan skor terendah

$$\text{Skor tertinggi} = 4 \times \text{jumlah item pertanyaan}$$

$$\text{Skor terendah} = 1 \times \text{jumlah item pertanyaan}$$

3. Menghitung standar deviasi (SD)

$$SD = \frac{1}{6} (\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah})$$

$$\text{Kualitas tidur} = \left(\frac{1}{6} (432-108=54) \right)$$

Maka didapatkan batasan kategori kualitas tidur yaitu untuk kategori cukup baik <81 , Baik $81 - 188$, Buruk $189-243$, Sangat buruk >243 .

G. Pengolahan data

Pengolahan data menurut (Masturoh & Anggita, 2018) yaitu, *editing, coding, data entry, cleaning data*.

1. *Editing*

Editing atau *penyuntingan data* merupakan salah satu tahapan dimana data yang telah dikumpulkan dari hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden kemudian disunting untuk mengetahui kelengkapan jawabannya. Dalam penelitian ini proses editing dengan cara mengumpulkan data hasil pengukuran kualitas tidur menggunakan kuesioner PSQI sebelum dan sesudah pemberian terapi relaksasi otot progresif kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan data dalam master table.

2. *Coding*

Coding adalah memberi kode atau simbol tertentu untuk setiap jawaban. Pada penelitian ini pemberian kode misalnya usia diberi kode 1 untuk rentan usia (35th-45th), kode 2 untuk usia (46th-55th). Kemudian untuk jenis kelamin diberi kode 1 untuk laki laki dan kode 2 untuk perempuan, kemudian untuk pekerjaan kode 1 untuk IRT, kode 2 untuk Petani, kode 3 untuk pedagang, dan untuk keadaan lingkungan, kode 1 untuk lingkungan baik dan kode 2 untuk lingkungan buruk.

3. *Data Entry*

Kemudian setelah semua data dikumpulkan dan dikelompokkan dalam bentuk table dan sudah dilakukan pengkodean maka selanjutnya adalah proses entry untuk kemudian data dianalisis secara statistik.

4. *Cleaning*

Pada proses *cleaning*, peneliti akan melakukan pengecekan kembali pada saat di *entry* untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kesalahan pada saat proses memasukan data.

H. Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melalui *sintesa*, menyusun ke dalam pola, memilih yang mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono,2017).

a) Analisis Univariat

Menurut Notoatmodjo 2005 penelitian analisis univariat adalah analisa yang dilakukan untuk menganalisa tiap variabel dari hasil penelitian. Analisis univariat ini dilakukan untuk mengukur karakteristik responden.

b) Analisa bivariat

Analisa bivariat adalah analisa yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh atau untuk menentukan hipotesis pengaruh. Variabel ini dianalisis dengan menggunakan uji *Paired Sample T test* atau biasa disebut uji statistik T berpasangan alternatif *man whitney* dengan tingkat kemaknaan $\alpha \leq 0,05$ yang dilakukan dengan bantuan SPSS.

I. Etika penelitian

Menurut (Suprajitno,2016) Etika penelitian adalah masalah etika harus dihindari selama melakukan riset keperawatan. Adapun upaya dalam menghindari masalah riset yaitu :

- a) *Informed consent*, adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh responden setelah mendapat informasi yang jelas dan benar tentang penelitian. Pemberian informasi harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh responden.
- b) *Confidentiality*, adalah suatu kegiatan merahasiakan identitas responden pada saat melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan menulis laporan riset sampai dengan publikasi hasil penelitian.
- c) *Right to withdraw*, yaitu selama penelitian dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai dengan penulisan laporan, responden berhak menarik diri. Yang dimaksud dengan menarik diri yaitu responden bisa mengundurkan diri setelah diberikan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada peneliti.
- d) *Potential Benefits*, adalah suatu manfaat yang diberikan oleh responden untuk pengembangan teori selanjutnya. Sehingga kegiatan peneliti menjelaskan bahwa responden merupakan kontributor dalam pengembangan teori yang dapat digunakan orang lain pada masa yang akan datang.
- e) *Potential harms* adalah suatu kemungkinan risiko yang diperoleh responden. Peneliti harus menjelaskan kemungkinan risiko yang akan didapat oleh responden dan upaya apa saja yang dilakukan peneliti untuk mengurangi risiko tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Puskesmas Pattopakang merupakan salah satu Puskesmas yang ada di Kabupaten Takalar Kecamatan Pattopakang. Puskesmas Pattopakang berada pada wilayah administrasi Kecamatan Pattopakang dengan jarak kurang lebih 27 Km dari wilayah ibukota Kabupaten Takalar. Wilayah kerja Puskesmas Pattopakang terdiri dari 6 desa, 25 Dusun, dengan luas wilayah kurang lebih 39,79 Km bujur sangkar dengan waktu tempuh rata-rata dari desa ke Puskesmas Pattopakang yaitu 30 menit. Adapun batas-batas wilayah kerja Puskesmas Pattopakang yaitu :

Sebelah utara berbatasan dengan desa Pabundukang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Panyangkalang, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mappakasunggu

Adapun Visi dan Misi Puskesmas Pattopakang yaitu :

Visi : Mewujudkan pelayanan kesehatan yang unggul, Sejahtera dan Bermartabat

Misi :

- 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan profesional,
- 2) Menyelenggarakan pembangunan berwawasan kesehatan,
- 3) Mendorong kepribadian perilaku hidup bersih (PBHS) bagi masyarakat dengan memelihara kesehatan perorangan,
- 4) Menjamin terjangkau nya pelayanan kesehatan masyarakat secara merata dan berkesinambungan.

B. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh berasal dari hasil pengisian kuesioner yang telah diberikan kepada responden yang terdiri dari informan consent dan kuesioner PSQI (*Pittsburgh Sleep Quality Index*) yang berguna untuk mengukur kualitas tidur. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Pattopakang kabupaten Takalar. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli- 7 Juli 2021. Analisis yang digunakan yaitu analisis univariat untuk mengetahui data karakteristik responden yang meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan gambaran kategori kualitas tidur. Sedangkan, analisis Bivariat digunakan untuk mengetahui pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur penderita hipertensi dengan menggunakan uji *Paired sample t test* atau disebut uji statistik T berpasangan.

C. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari lembar kuesioner yang telah dibagikan kepada responden di Wilayah kerja Puskesmas Pattopakang kabupaten Takalar, dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini yang dapat menggambarkan karakteristik responden yang memiliki data kategorik, seperti Jenis Kelamin, Usia, Pekerjaan, dan keadaan lingkungan.

Table 4.0.1

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Pekerjaan, di Puskesmas Pattopakang Kabupaten Takalar (n:18)

Variable	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Perempuan	18	100%
Umur		
35-45 (Dewasa Akhir)	3	16%
46-55 (Lansia Awal)	15	84%
Total	18	100%
Pekerjaan		
IRT	9	51%
Petani	6	33%

Pedagang	3	16%
Total	18	100%
Keadaan Lingkungan		
Baik	4	22,2%
Buruk	14	77,8%
Total	18	100%

Sumber : Data Primer 2021

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang diteliti adalah 18 orang. Responden Yang terdiri dari semua sampel berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 18 orang (100%) yang mengalami Hipertensi dan Kualitas tidur yang buruk. Sedangkan untuk usia, responden yang mengalami kualitas tidur buruk memiliki rentan usia 35-45 tahun terdapat 3 orang (16%), usia 46-55 tahun terdapat 15 orang (84%), sedangkan untuk pekerjaan dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa rata-rata responden memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dengan nilai persentase sebanyak (51%), kemudian untuk keadaan lingkungan dengan kategori lingkungan baik dan lingkungan buruk didapatkan sebanyak 4 orang (22%) yang memiliki lingkungan baik dan sebanyak 14 orang (77,8%) yang memiliki lingkungan yang buruk.

2. Gambaran kualitas tidur sebelum diberi intervensi Terapi Relaksasi Otot Progresif

Penelitian ini menggunakan analisis Univariat secara deskriptif untuk menggambarkan tabel distribusi frekuensi tentang tingkat Kualitas tidur di Puskesmas Pattopakang sebelum diberi intervensi relaksasi otot progresif. Hasil pengolahan data kuesioner kualitas tidur dengan menggunakan uji univariat pada uji statistic dan pengkategorian nya menggunakan rumus scoring penilaian skala likert. Pengkategorian kualitas tidur penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang sebelum diberi intervensi relaksasi otot progresif dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Table 4.2
Gambaran Kualitas Tidur Penderita Hipertensi Di Puskesmas
Pattopakang Sebelum Intervensi Terapi Relaksasi Otot Progresif

Kualitas tidur	Frekuensi (n)	Persentase
Sangat Baik	0	0%
Baik	3	16,3%
Buruk	15	83,3%
Sangat Buruk	0	0%

Sumber : Data Primer, 2021

Dari hasil tabel 4.2 diatas terkait gambaran kualitas tidur penderita hipertensi di Puskesmas Pattopakang sebelum diberi intervensi relaksasi otot progresif yaitu didapatkan hasil distribusi kualitas tidur dengan kategori kualitas tidur Baik sebanyak 3 orang (16,3%) sedangkan kategori Buruk sebanyak 15 orang (83,3%). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang mengalami kualitas tidur buruk.

3. Gambaran Kualitas Tidur Setelah diberi Intervensi Relaksasi Otot Progresif

Penelitian ini menggunakan analisis Univariat secara deskriptif untuk menggambarkan tabel distribusi frekuensi tentang tingkat Kualitas tidur di Puskesmas Pattopakang setelah diberi intervensi relaksasi otot progresif. Hasil pengolahan data kuesioner kualitas tidur dengan menggunakan uji univariat pada uji statistic dan pengkategorian nya menggunakan rumus scoring penilaian skala likert. Pengkategorian kualitas tidur penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang setelah diberi intervensi relaksasi otot progresif dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Table 4.3
Gambaran Kualitas Tidur Penderita Hipertensi Di Puskesmas
Pattopakang Sesudah Intervensi Terapi Relaksasi Otot Progresif

Kualitas tidur	Frekuensi (n)	Persentase
Sangat Baik	0	0%
Baik	17	94.4%
Buruk	1	5.6%
Sangat Buruk	0	0%

Sumber : Data Primer, 2021

Pada tabel 4.3 merupakan distribusi kualitas tidur setelah diberi intervensi relaksasi otot progresif pada penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang. Kualitas tidur secara umum memiliki distribusi kategori Baik sebanyak 17 orang (94,4%) dan terdapat kategori buruk sebanyak 1 orang (5,6). Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas tidur penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang setelah diberi terapi relaksasi Otot Progresif berada pada kategori Baik.

4. Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kualitas Tidur Penderita Hipertensi sebelum dan sesudah diberi Intervensi

Sebelum melakukan uji ada tidaknya pengaruh perlakuan terhadap kualitas tidur, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data dengan melihat nilai *shapiro-wilk*. Hasil uji normalitas data dengan nilai signifikansi pada kualitas tidur penderita hipertensi sebelum dan sesudah diberi perlakuan relaksasi otot progresif didapatkan hasil nilai $>0,05$ yang artinya ketentuan dari uji normalitas shapiro-wilk harus $>0,05$. Artinya dalam penelitian ini data dari responden berdistribusi normal. Sehingga uji hipotesis yang digunakan untuk menganalisis apakah ada pengaruh atau perbedaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan adalah menggunakan statistik parametrik yaitu *Paired Sampel T test* atau biasa disebut dengan uji berpasangan.

Tabel hasil uji *Paired Sampel T test* dapat dilihat dibawah ini :

Table 4.4
Hasil Uji Statistik Paired Sample T Test pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang

Indikator	N		SD	SE	
-----------	---	--	----	----	--

Kualitas tidur	Mean Pre test	Mean Post tes		Selisih Mean			P-Value
Kualitas tidur pre dan post	191,33	150,06	18	41,33	21,3	0,52	0.000

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel diatas dari 18 responden yang telah diteliti, dapat diketahui bahwa terjadi perubahan kualitas tidur penderita Hipertensi dari kategori kualitas tidur buruk menjadi kualitas tidur baik, dengan rata-rata nilai total keseluruhan kuesioner sebelum perlakuan yang dibagikan dari hari pertama sampai hari ke enam didapatkan hasil 191,3 yang termasuk dalam kategori buruk menjadi 150,0 yang termasuk dalam kategori kualitas tidur Baik.

Hasil uji statistik sebelum dan sesudah intervensi didapatkan nilai p-value = 0,000 ($<0,05$) sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. artinya ada pengaruh pemberian terapi relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur penderita hipertensi di Puskesmas Pattopakang.

D. Pembahasan Penelitian

1. Karakteristik Responden yang diberikan terapi relaksasi otot progresif

a. Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin

Hasil penelitian menunjukan distribusi perbedaan jenis kelamin pada responden didapatkan yaitu (100%) perempuan dengan jumlah responden sebanyak 18 orang yang mengalami hipertensi sehingga menyebabkan kualitas tidur buruk akibat gejala hipertensi yang dialami. Penelitian yang dilakukan oleh (Sakinah et

al., 2018) mendapatkan hasil (82,3%) perempuan, dan responden laki-laki sebanyak (17,7%) yang menderita hipertensi. Menurut (Sakinah *et al.*, 2018) perempuan lebih beresiko terkena hipertensi dibandingkan laki-laki, hal ini dikarenakan semakin bertambahnya usia pada perempuan maka akan semakin beresiko mengalami penurunan hormon estrogen yang dimana hormon estrogen ini berfungsi untuk meningkatkan *High Density Lipoprotein* (HDL) untuk mencegah penebalan pembuluh darah sehingga semakin tua hormon tersebut tidak bekerja yang beresiko terjadi *arterosklerosis* lebih tinggi yang dapat meningkatkan tekanan darah.

Selain itu, dalam penelitian ini untuk responden semuanya berjenis kelamin perempuan, hal ini dikarenakan populasi laki-laki di lokasi penelitian sangat minim disebabkan sibuk dengan pekerjaannya dan ada beberapa yang tidak bersedia menjadi responden.

b. Karakteristik Responden menurut Usia

Hasil penelitian menggambarkan perbedaan usia pada penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang dengan jumlah responden 18 orang menggambarkan distribusi yaitu umur 35-45 tahun terdapat responden 3 orang (16%) dan umur 46-60 tahun yang merupakan responden terbanyak dalam penelitian ini yaitu 15 orang (84%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rentan usia 46-60 tahun rata-rata mengalami tekanan darah tidak normal sehingga mengakibatkan kualitas tidur terganggu akibat dari gejala hipertensi yang dialami. Kategori usia tersebut merupakan usia yang memasuki lansia awal. Faktor usia merupakan faktor resiko yang

tidak dapat dikendalikan, semakin bertambahnya usia seseorang maka akan semakin tinggi pula resiko terjadinya hipertensi. (Rahmat *et al.*, 2018) Hal ini didukung oleh Hasil penelitian (Alfi & Yuliwar, 2018b) yang dilakukan di Puskesmas Mojolangu terhadap 30 responden penderita hipertensi yang mengalami kualitas tidur buruk menunjukan bahwa didapatkan hubungan antara usia dan tekanan darah yang lemah, hasil tersebut sebagian besar menunjukan responden mengalami tekanan darah tidak normal berada dalam kelompok usia 41-60 tahun (59,10%). Salah satu perubahan yang mengganggu usia lanjut adalah perubahan fisiologi, dengan adanya gangguan terhadap tidur pada lansia. Dengan bertambahnya usia seseorang kemungkinan besar akan mengalami permasalahan fisik, jiwa, spiritual, ekonomi dan sosial. Salah satu permasalahan pada lanjut usia adalah masalah kesehatan yang diakibatkan proses degeneratif. Menurut (Rafiudin 2004) pada orang yang lebih tua umumnya mengalami pengurangan sekret dari beberapa zat kimia yang mengatur siklus tidur / siklus bangun dari mulai melatonin (substansi yang diproduksi kelenjar pineal yang memicu keinginan tidur) sampai produksi hormon pertumbuhan. Faktor tersebut yang dapat menyebabkan masalah-masalah kualitas tidur pada lansia seperti terbangun terlalu pagi, sering terbangun pada malam hari, sulit memulai tidur, dan lain-lain. (Mustika & Sustrami, 2014)

c. Karakteristik Responden menurut Pekerjaan

Pada penelitian ini responden memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, distribusi menggambarkan jenis pekerjaan karakteristik responden yaitu untuk kelompok ibu rumah tangga

terdapat sebanyak 9 orang (51%), kelompok petani sebanyak 6 orang (33%), sedangkan untuk pedagang terdapat sebanyak 3 orang (16%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pekerjaan responden lebih banyak ibu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspita sari *et al.*, 2020) yang mengatakan bahwa besar responden bekerja sebagai IRT perempuan yang tidak bekerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga beresiko lebih tinggi menderita hipertensi dibandingkan dengan perempuan yang bekerja. Kemungkinan disebabkan karena kurangnya aktifitas yang dilakukan oleh IRT. Selain itu, beban kerja yang dialami oleh IRT merupakan salah satu faktor terjadinya peningkatan tekanan darah, hal tersebut disebabkan karena beban kerja berlebih akan menambah beban tambahan bagi jantung untuk memompa lebih banyak lagi darah ke seluruh tubuh.

d. Keadaan lingkungan responden

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas tidur seseorang adalah lingkungan yang buruk. Dimana kita ketahui bahwa lingkungan yang bersih, nyaman dan damai dapat menciptakan ketenangan, serta kedamaian dalam hati seseorang. Menurut asumsi peneliti setelah melakukan penelitian didapatkan bahwa daerah tempat tinggal responden memiliki lingkungan yang kurang nyaman, dimana daerah masih terdapat rongsokan sampah yang dibuang disepanjang jalan dan banyak menimbulkan bau sampai kerumah warga, dan padatnya penduduk disana juga mempengaruhi karena banyaknya kebisingan yang berasal dari warga sekitar. Hasil penelitian dari (Brewater, et. Al 2019)

menunjukkan bahwa lingkungan yang bising, kotor dan sempit dapat berdampak negatif pada fisiologis, perilaku dan fungsi kognitif, hal ini dapat mengganggu tidur yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Pada penelitian (Li & Jiang, 2020) hampir 70% orang yang berusia 45-60 tahun mengeluh tidak bisa tidur karena lingkungan tempat tinggal yang berbising, kotor, dan berbau yang mengganggu tidur mereka. Pada umumnya masyarakat di daerah tersebut memiliki beraneka ragam sifat dan kebiasaan. Nah perbedaan inilah yang mampu memicu kebisingan, mempengaruhi kebersihan, dan ikut serta dalam menciptakan suasana yang nyaman. (Utami *et al.*, 2021)

2. Gambaran Tingkat Kualitas Tidur Penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang sebelum diberikan intervensi Relaksasi Otot Progresif

Berdasarkan hasil pengkategorian kualitas tidur penderita hipertensi di Puskesmas Pattopakang didapatkan distribusi hasil kategori kualitas tidur buruk paling banyak ditemukan yaitu sebanyak 15 orang (83,3%) dan kategori kualitas tidur baik terdapat 3 orang (16,7%). Hal ini menggambarkan bahwa kualitas tidur pada Penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang termasuk dalam kategori buruk artinya sebelum diberikan intervensi, dalam pertanyaan kuesioner rata-rata responden memilih jawaban 3 (>3x seminggu) dan jawaban 2 (>2x seminggu). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kasron & Susilawati, 2017) hasil penelitiannya menunjukkan kualitas tidur penderita hipertensi sebelum diberi perlakuan sebanyak (56,3%) responden dengan kualitas tidur sangat buruk. Pasien dengan Hipertensi

dapat mengalami beberapa tanda dan gejala seperti perubahan pada retina, sakit kepala, pusing, dan kesulitan bernafas. Hal inilah yang dapat menyebabkan gangguan tidur, nah dari gangguan tidur yang dialami seseorang dapat mempengaruhi kualitas tidur yang buruk.

Pasien dengan hipertensi yang mengalami gangguan terhadap tidurnya sering kali terbangun terlalu pagi karena merasa pusing atau sakit kepala, akan merasa mudah lelah di siang hari, mengalami kondisi seperti merasa cemas, gelisah, konsentrasi menurun, mudah tersinggung dan dapat menimbulkan penyakit baru pada penderitanya, seperti penyakit pembuluh darah koroner atau otak, obesitas dan depresi. Hasil kualitas tidur buruk sama halnya dengan penelitian yang dilakukan (Sakinah *et al.*, 2018) penelitiannya menunjukkan hasil kualitas tidur pada penderita hipertensi di Puskesmas Rancaekek mayoritas mengalami kualitas tidur buruk dengan jumlah responden 75 orang (94,9%) dan hanya 4 orang (5,1%) yang mengalami kualitas tidur baik. Kondisi tersebut menunjukkan hasil bahwa responden lebih banyak memiliki kualitas tidur buruk dibandingkan kualitas tidur baik dikarenakan faktor usia, jenis kelamin, derajat hipertensi, gejala hipertensi yang dialami, dan lama menderita hipertensi. Selain itu menurut (Hanus *et al.*, 2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas tidur pada penderita hipertensi buruk sebanyak 156 dari 280 orang. Penderita hipertensi mengalami kecemasan yang berlebih sehingga mengalami gangguan emosional dan akan memperburuk gangguan tidurnya sehingga akan mengalami kualitas tidur buruk.

Permasalahan penderita hipertensi di Puskesmas Pattopakang mengalami kekambuhan hipertensi dan kualitas tidur buruk karena

sebagian besar penderita tidak rutin dalam meminum obat anti hipertensi yang diresepkan oleh dokter. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rohmawati, 2021) kekambuhan hipertensi dapat terjadi pada seseorang jikalau dalam satu tahun tanpa minum obat dapat pula karena tidak teratur kontrol dalam minum obat.

Selain itu, penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang yang merupakan responden dalam penelitian ini setelah dilakukan pembagian kuesioner maka didapatkan hasil bahwa rata-rata responden menjawab pertanyaan point 8, pertanyaan 5a, 5b dan 5h dengan skor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penderita hipertensi sangat antusias dalam menyelesaikan permasalahan gangguan-gangguan kualitas tidur yang dialami. Seringnya mengalami gangguan tidur seperti penderita hipertensi tidak mampu memulai tidurnya selama lebih dari 30 menit berbaring, seringnya terbangun ke kamar mandi, hal ini dikarenakan penderita hipertensi mengalami gejala hipertensi seperti pusing, jantung berdebar-debar, dan mengalami sakit kepala.

Dengan adanya keluhan masalah tidur yang mempengaruhi kualitas tidurnya menjadi buruk akan memperparah perkembangan penyakit hipertensi yang dialaminya, mengganggu pengendalian tekanan darahnya yang dapat menimbulkan resiko komplikasi stroke dan jantung. (Sakinah *et al.*, 2018)

3. Gambaran kualitas tidur penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang sesudah diberikan intervensi Relaksasi Otot Progresif

Gambaran Kualitas tidur penderita Hipertensi di Puskesmas Pattopakang setelah diberi intervensi relaksasi otot progresif didapatkan hasil bahwa rata-rata Kualitas tidur berada dalam kategori Baik dengan

rentan skor distribusi sebanyak 17 orang (94,6%) dan 1 orang dengan kategori masih dalam kualitas tidur buruk (5,4%). Artinya kualitas tidur penderita hipertensi sesudah diberi perlakuan mengalami peningkatan kualitas tidur dengan kategori baik.

Relaksasi otot progresif merupakan salah satu penanganan non-farmakologi yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas tidur serta dapat menurunkan tekanan darah. Hal ini karena cara kerja relaksasi otot progresif yaitu dengan memusatkan perhatian pada suatu aktivitas otot, dengan mengidentifikasi otot yang tegang kemudian menurunkan ketegangan dengan melakukan teknik relaksasi untuk mendapatkan perasaan yang rileks. Terapi ini juga dapat meningkatkan kualitas tidur karena bekerja berlawanan dengan saraf simpatis untuk mencapai keadaan relaks dan tenang, sehingga sensasi ini diteruskan ke hipotalamus untuk menghasilkan corticotropin-releasing factor yang selanjutnya dapat merangsang kelenjar pituitari, dimana kelenjar ini bertujuan untuk meningkatkan hormon endorfin enkephalin dan serotonin serta dapat meningkatkan kualitas tidur pada pasien hipertensi.

Hasil penelitian yang dilakukan (Sunaringtyas *et al.*, 2018) menunjukkan hasil bahwa ada perubahan kualitas tidur setelah diberi perlakuan dengan rata-rata kualitas tidur sebelum diberi perlakuan pada 20 responden lansia yang mengalami kualitas tidur buruk sebanyak 12 orang (60%) dan setelah diberikan perlakuan berubah menjadi kualitas tidur kategori baik sebanyak 17 orang (85%), karena penderita merasa lebih tenang, semua otot tubuh menjadi lebih rileks, maka hormon melatonin terstimulasi, yang berfungsi sebagai regulasi siklus tidur.

Pada penelitian ini responden sangat antusias dalam menjalankan gerakan terapi yang dicontohkan, sehingga peneliti mudah untuk memberikan intervensi, dan responden mengatakan dengan adanya terapi ini sangat membantu memperbaiki gangguan-gangguan tidurnya yang sering kali terjadi pada malam hari. Sehingga didapatkan hasil bahwa rata-rata kualitas tidur responden pada penderita hipertensi setelah diberi perlakuan mengalami peningkatan dari kategori buruk menjadi kategori baik.

Sesuai dengan Firman Allah swt. dalam QS. Ar-Ra'd/13:11 yang berbunyi :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahannya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (Kementrian Agama RI, 2021)

Ayat tersebut berkaitan dengan penelitian ini yang dimana dijelaskan bahwa seseorang tidak akan bisa mandiri apabila dia tidak mempunyai keinginan untuk melakukan latihan secara mandiri. Salah satunya adalah untuk mengobati dirinya sendiri, seperti intervensi relaksasi otot progresif yang dilakukan secara mandiri oleh responden dengan bantuan peneliti berupa pengarahan untuk memberikan contoh gerakan yang akan dilakukan.

Penelitian ini dilakukan selama enam hari berturut-turun, dimana enam hari tersebut dilakukan pembagian kuesioner PSQI *pre-post test design* untuk membandingkan hasil penelitian dari hari pertama sampai

hari terakhir. Setelah dilakukan olah data, hasil yang didapatkan yaitu kualitas tidur penderita hipertensi di puskesmas Pattopakang setelah diberi perlakuan mengalami peningkatan kualitas tidurnya pada hari ke lima. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sunaringtyas *et al.*, 2018) yang dimana penelitiannya dilakukan selama 1 bulan dengan metode pre-post test design untuk membuktikan adanya pengaruh terapi Relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur penderita hipertensi, padahal untuk membuktikan hal tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama seperti yang dilakukan penelitian ini bahwa hari ke lima perlakuan sudah menunjukkan hasil yang signifikan untuk perbandingan hasil pengukuran *pre-post test* intervensi relaksasi otot progresif terhadap peningkatan kualitas tidur penderita hipertensi.

4. Pengaruh Pemberian Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kualitas Tidur Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pattopakang

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.4 menunjukkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Paired sampel t test* atau uji berpasangan yang diperoleh nilai $p\text{-value}=0,000$, karena nilai $p\text{-value} < 0,05$, maka dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah pemberian intervensi. Dengan rata-rata dari 18 orang responden terdapat 17 orang yang kualitas tidurnya meningkat dari kategori buruk menjadi baik. Dengan demikian penelitian ini membuktikan bahwa terapi relaksasi otot progresif efektif digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas tidur pada penderita hipertensi. karena terapi relaksasi otot progresif melatih otot-otot kepala,

leher, lengan dan punggung secara terkendali, bekerja melawan sistem saraf simpatis untuk mencapai keadaan relaks dan tenang. Perasaan relaksasi ini diteruskan ke hipotalamus untuk menghasilkan *corticotropin releasing factor* (CRF) yang akan merangsang kelenjar pituitari untuk meningkatkan hormon endorfin, enkefalin dan serotonin. Secara fisiologis, kebutuhan tidur terpenuhi merupakan hasil dari penurunan aktivitas RAS (*Reticular Activation System*) dan norepinefrin sebagai penurunan aktivitas sistem batang otak. Respon relaksasi terjadi karena aktivitas sistem saraf otonom parasimpatis dirangsang sehingga menimbulkan perubahan yang dapat mengontrol aktivitas sistem saraf otonom berupa penurunan fungsi oksigen, frekuensi pernapasan, denyut nadi, ketegangan otot, tekanan darah, dan gelombang alfa di otak sehingga terjadi respon relaksasi. seseorang dapat tertidur dengan mudah. (Sunaringtyas *et al.*, 2018).

Seperti dalam hadis riwayat Abu Dawud :

Terjemahannya: “*Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, demikian pula Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram*”. (HR. Abu Dawud).

Dalam hadis riwayat Abu Dawud diatas dapat dikaitkan dengan penelitian ini bahwa Allah swt. tidak semata-merta hanya menurunkan penyakit saja melainkan Allah swt. menurunkan penyakit dengan obat nya. Maka dari itu seorang muslim diperbolehkan untuk mencari obat agar bisa menyembuhkan penyakitnya yang dialaminya. Hal tersebut didukung oleh teori keperawatan yang dipaparkan oleh Orem, yang mengatakan bahwa untuk melakukan proses asuhan keperawatan harus

di iringi dengan keyakinan seseorang bahwa setiap orang mampu dalam memberikan perawatan untuk dirinya sendiri, sehingga hal tersebut membantu untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan hidupnya, memelihara kesehatannya, dan mencapai kesejahteraan, serta dapat mengubah pola hidupnya untuk mempertahankan stabilitas tekanan darahnya agar tidak menimbulkan gejala hipertensi yang dapat mempengaruhi kualitas tidurnya. Salah satu teori dari Orem yang berkaitan dengan penelitian ini adalah *Therapeutic self-care demand* yang merupakan aktifitas perawatan diri sendiri yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang memiliki prinsip perawatan, dimana perawatan ini dilaksanakan karena adanya masalah pada kesehatan dengan tujuan mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan.

Relaksasi otot progresif merupakan salah satu terapi dengan gerakan yang sangat mudah sehingga dapat dilakukan dengan mandiri yang dimana berfungsi untuk membantu meningkatkan kualitas tidur dan menurunkan tekanan darah apabila dilakukan secara rutin dengan serangkaian seri kontraksi dan relaksasi otot tertentu membuat peredaran darah lancar sehingga menyebabkan otot menjadi relaks dan mengurangi nyeri leher. Rasa nyeri leher ini yang berkurang dapat menimbulkan perasaan nyaman karena adanya peningkatan hormon endorphin dan dengan adanya peningkatan hormon tersebut menimbulkan perasaan relaks sehingga menyebabkan pembuluh darah melebar, aliran darah lancar dan tekanan darah menurun. Akibat terjadinya penurunan tekanan darah yaitu terpenuhinya kebutuhan O_2 sehingga kondisi tubuh menjadi segar dan meningkatkan kualitas tidur. (Romadhani T.P, Mayanti Amastuti, 2018)

Relaksasi otot progresif merupakan terapi alternatif yang berfungsi untuk mengurangi ketegangan otot yang kemudian dapat merilekskan otot mulai dari otot wajah sampai dengan otot kaki. Pemberian tindakan intervensi relaksasi otot progresif dilakukan setelah mendapat persetujuan dari responden kemudian dilakukan pembagian kuesioner psqi pre perlakuan, setelah itu pemberian terapi dilaksanakan sehari setiap sore hari dalam waktu kurang lebih 20 menit dengan cara menginstruksikan untuk mengarahkan responden memperhatikan gerakan otot yang direalisasikan. Efektifitas terapi ini yaitu dapat mengurangi rasa nyeri akibat ketegangan, kondisi psikologis, mengurangi kecemasan, gelisah, dapat meningkatkan sistem saraf simpatis, sehingga dapat memperbaiki kualitas tidur dari gangguan-gangguan tidur yang dialami.

Menurut asumsi peneliti yang dilakukan selama penelitian, dengan melakukan relaksasi otot progresif secara teratur selama 6 hari berturut-turut dapat meningkatkan kualitas tidur pada penderita hipertensi. Hal ini dikarenakan terapi relaksasi otot progresif melibatkan kontraksi otot dan gerakan relaksasi yang dapat merangsang respon relaksasi baik secara fisik maupun psikis. Selama gerakan relaksasi otot, sel saraf juga mengeluarkan peptida opioid dan beredar ke seluruh tubuh untuk rasa nyaman dan relaksasi. Kemudian relaksasi otot yang progresif ini juga menimbulkan respon relaksasi trofotropik yang merangsang semua fungsi dimana berlawanan dengan sistem saraf simpatis sehingga tercapai rasa relaks dan tenang. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh (Kasron & Susilawati, 2017) hasil penelitiannya menunjukkan terdapat pengaruh pemberian terapi relaksasi

otot progresif dengan kualitas tidur penderita hipertensi di Cilacap Selatan dengan hasil analisis yang didapatkan nilai *p-value* 0,001 ($<0,05$) , sehingga terapi ROP ini dapat diberikan kepada penderita hipertensi yang bertujuan untuk peningkatan kualitas tidurnya.

Setelah penjelasan diatas maka terbukti bahwa Terapi relaksasi otot progresif mempunyai pengaruh dalam peningkatan kualitas tidur penderita hipertensi apabila dilakukan secara rutin dan benar. Untuk itu semua responden dapat memanfaatkan terapi ini sebagai terapi alternatif yang dapat meningkatkan kualitas tidur serta membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi.

5. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jarak yang cukup jauh dari rumah peneliti ke lokasi penelitian, kemudian ada beberapa responden yang tidak mempunyai ponsel sehingga menghambat peneliti menghubungi responden untuk bertanya tentang post-test intervensi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa data di wilayah kerja Puskesmas Pattopakang terkait dengan pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur penderita hipertensi dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan data karakteristik responden, didapatkan bahwa semua responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan (100%) yang berjumlah 18 orang. Untuk kategori usia, responden terbanyak dalam penelitian ini memiliki rentan usia 46-55 tahun, sedangkan untuk pekerjaan rata-rata pekerjaan responden adalah sebagai ibu rumah tangga.
2. Rata-rata kualitas tidur pada penderita hipertensi sebelum dilakukan perlakuan berada dalam kategori buruk yaitu (83,3%).
3. Kualitas tidur penderita hipertensi setelah diberi perlakuan terapi relaksasi otot progresif mengalami peningkatan dengan jumlah responden sebanyak (94,4%).
4. Ada pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur penderita hipertensi di Wilayah kerja Puskesmas Pattopakang yang dilihat dari nilai signifikan yang diperoleh dengan nilai $p\text{-value} = 0,000$ ($p < 0,05$).

B. Saran

1. Bagi tenaga perawat dan masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat diterapkan sebagai terapi alternatif untuk mengurangi efek samping dari pemberian obat Hipertensi dalam membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kualitas tidur penderitanya.

2. Bagi Institusi pendidikan

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan informasi dari hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di cabang ilmu keperawatan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penerapan terapi non farmakologi yang sangat mudah dilakukan oleh semua orang akan tetapi memberikan manfaat yang efektif khususnya bagi orang yang penderita hipertensi dan mengalami penurunan kualitas tidur. Terapi ini mempunyai pengaruh untuk meningkatkan kualitas tidur pada penderita hipertensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, W. N., & Yuliwar, R. (2018a). *HUBUNGAN KUALITAS TIDUR DENGAN TEKANAN DARAH PASIEN HIPERTENSI*. 6, 18–26.
<https://doi.org/10.20473/jbe.v6i12018.18-26>
- Alfi, W. N., & Yuliwar, R. (2018b). *HUBUNGAN KUALITAS TIDUR DENGAN TEKANAN DARAH PASIEN HIPERTENSI*. 6 nomor 1.
<https://doi.org/10.20473/jbe.v6i12018.18-26>
- Amanda, H., Prastiwi, S., & Sutriningsih, A. (2017). *HUBUNGAN KUALITAS TIDUR DENGAN TINGKAT KEKAMBUHAN HIPERTENSI PADA LANSIA DI KELURAHAN TLOGOMAS KOTA MALANG*. 2, 437–447.
- Artiyaningrum, B., Azam, M., & Artikel, I. (2016). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI TIDAK TERKENDALI PADA PENDERITA YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN RUTIN*. 1(1), 12–20.
- Brunelli, S., Morone, G., Iosa, M., Ciotti, C., De Giorgi, R., Foti, C., & Trallesi, M. (2015). Efficacy of progressive muscle relaxation, mental imagery, and phantom exercise training on phantom limb: A randomized controlled trial. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 96(2), 181–187.
<https://doi.org/10.1016/j.apmr.2014.09.035>
- Cahyanti, L., & Febriyanto. (2019). Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas dalam Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Rsud Dr. Soeratto Gemolong Tahun 2018. *Prosiding HEFA*, 6(1), 1–21.
- Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. (2018). Profile Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*, 53(9), 1689–1699.
- Hanus, J. S., Amboni, G., da Rosa, M. I., Ceretta, L. B., & Tuon, L. (2015). The quality and characteristics of sleep of hypertensive patients. *Revista Da Escola de Enfermagem*, 49(4), 594–599. <https://doi.org/10.1590/S0080-623420150000400009>
- Hariawan, H., & Tatisina, C. M. (2020). Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Dan Senam Hipertensi Sebagai Upaya Manajemen Diri Penderita Hipertensi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo*, 1(2), 75.
<https://doi.org/10.32807/jpms.v1i2.478>
- Irianto, K. (2014). *Epidemiologi penyakit menular dan tidak menular* (cetakan 1). Bandung : Alfabeta, 2014.
- Kanender, Y. R., Palandeng, H., & Kallo, V. D. (2015). *PENGARUH TERAPI RELAKSASI OTOT PROGRESIF TERHADAP PERUBAHAN TINGKAT INSOMNIA MANADO*. 3.
- Kasron, & Susilawati. (2017). *PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION TERHADAP KUALITAS TIDUR Program Studi S-1 Keperawatan Stikes Al-Irsyad-Al-Islamiyyah Cilacap Corresponding Author :*
- Kemendes RI. (2019). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019. In *Kemendes Kesehatan Republik Indonesia* (Vol. 42, Issue 4).
- Kemendagri Agama RI. (2021). *Kemendagri Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Li, Y., & Jiang, S. (2020). Multi-Focus Image Fusion Using Geometric Algebra

- Based Discrete Fourier Transform. *IEEE Access*, 8, 60019–60028.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2981814>
- Masriadi. (2016). *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*. CV. Trans Info Media.
- Masturoh, I., & Anggita, N. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN KESEHATAN*. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pemberdayaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan.
- Mayuri, N. S., Ghifrani, S., Ardinia, H. N., & Setyaningsih, R. D. (2017). Strategi Tidur Sehat. *Inkofar*, 1(2), 74–80. <http://www.politeknikmeta.ac.id/meta/ojs/>
- Melizza, N., & Hikmah, N. (2020). Hubungan Kualitas Tidur Dengan Tekanan Darah Pada. *Chmk Nursing Secientific Journal*, 4(April), 0–6.
- Mustika, E. R., & Sustrami, D. (2014). *PENGARUH MEMBACA AL-QUR'AN TERHADAP KUALITAS TIDUR LANSIA DI POSYANDU LANSIA MATAHARI SENJA KELURAHAN KEDUNG DORO SURABAYA*. 000.
- Nur Melizza, Prasetyo, Y. B., Masruroh, N., & Anggraini DwiKurnia. (2020). *Analisis faktor yang mempengaruhi kualitas tidur penderita hipertensi*. 15.
- Nuraini, B. (2015). *Risk factors of hypertension*. 4, 10–19.
- Pikir, B. S., Aminuddin, M., Subagjo, A., Dharmadjati, B. B., Suryawan, I. G. R., & P. Johannes Nugroho Eko. (2015). *Hipertensi Manajemen Komprehensif* (B. S. Pikir, M. Aminuddin, A. Subagjo, B. B. Dharmadjati, I. G. R. Suryawan, & P. J. N. Eko (eds.); CETAKAN 1). Airlangga University Press (AUP).
- Potter, P. ., & Perry, A. G. (2010). *Fundamental Keperawatan Konsep, Proses, dan Praktik* (edisi 4 No). EGC.
- Puspita sari, N. I., Safitri, K. H., & Suwanto. (2020). KORELASI TINGKAT KECEMASAN DENGAN KUALITAS TIDUR PADA PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS. *Keperawatan Wiyata*, 340(7743).
<https://doi.org/10.1136/bmj.c846>
- Putra Apriadi Siregar, Saidah Fatimah Sari Simanjuntak, Feby Harianti B Ginting, Sutari Tarigan, Shafira Hanum, F. S. U. (2020). Aktivitas Fisik , Konsumsi Makanan Asin dan Kejadian Hipertensi Masyarakat Pesisir Kota Medan Physical Activity , Consumption of Salty Foods and the Occurrence of. *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*, 2(1), 1–8.
- Rahmat, D., Pranowo, S., & Sutarno. (2018). *Perbandingan Antara Progressive Muscle Relaxation dan Spiritual Emotional Freedom Technique Terhadap Kualitas Tidur Pasien Hipertensi The Comparison Between Progressive Muscle Relaxation and Spiritual Emotional Freedom Technique on The Sleep of Hypertensi*. 16(1), 7–11.
- Rahmawati, P. M., Musviro, & Fitrio, D. (2018). *EFEKTIFITAS PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION (PMR) TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI*. September.
- Reefani, N. K. (2014). *Pola Hidup dan Tidur Sehat ala Rasulullah Saw* (M. S. Aminah & I. Hanifa (eds.); edisi 1). PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta.
- Rochmawati, D. H. (2015). *TEKNIK RELAKSASI OTOT PROGRESSIF UNTUK MENURUNKAN KECEMASAN*. Universitas Islam Sultan Agung.

- Rohmawati, D. L. (2021). *KEBIASAAN MEROKOK DAN KUALITAS TIDUR BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT KEKAMBUHAN HIPERTENSI*. 13(September), 661–674.
- Romadhani T.P, Mayanti Amastuti, D. (2018). *PENGARUH RELAKSASI PROGRESIF TERHADAP KUALITAS TIDUR PADA LANSIA PENDERITA HIPERTENSI DI DESA JAMBAKAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN*. 13(September 2018).
- Sakinah, P. R., Kosasih, C. E., Sari, E. A., Keperawatan, F., & Padjadjaran, U. (2018). *GAMBARAN KUALITAS TIDUR PADA PENDERITA HIPERTENSI QUALITY OF SLEEP AMONG HYPERTENSION PATIENTS*. XIII(2), 46–52. <https://doi.org/2549-0567>
- Sari, Y. N. I. (2017). *Berdamai dengan hipertensi* (Y. N. I. Sari (ed.); Cetakan pe). Jakarta Bumi Medika.
- Sartik, S., Tjekyan, R. S., & Zulkarnain, M. (2017). Risk Factors and the Incidence of Hipertension in Palembang. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 8(3), 180–191. <https://doi.org/10.26553/jikm.2017.8.3.180-191>
- Setyoadi, & Kushariyadi. (2011). *Terapi Modalitas Keperawatan Pada klien Psikogeriatrik*. Salemba Medika.
- Situmorang, P. R. (2015). FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA PENDERITA RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM SARI MUTIARA MEDAN TAHUN 2014 Paskah. *Keperawatan*, 1(1), 71–74.
- Sumartini, S., & Bachtiar, H. H. (2016). *PERBEDAAN TEKANAN DARAH SEBELUM DAN SESUDAH*. 2(1), 1–9.
- Sunaringtyas, W., Fuadah, D. Z., & Kusdiantoro, L. (2018). *PENGARUH PELAKSANAAN RELAKSASI OTOT PROGRESIF TERHADAP KUALITAS TIDUR PADA LANSIA HIPERTENSI DI PUSKESMAS TUMPANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN BLITAR*. 5(September), 434–437.
- Syamsinar. (2016). Pola Tidur Dalam Al-Quran (Kajian Tahlili terhadap Q.S Al-Furqon:47. *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin*, 1.
- Tamungku, M. E., Alim, A., & Rusnita. (2020). KEJADIAN HIPERTENSI (Studi Analitik Pada Pasien Dewasa di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kota Makassar). *Alami Journal (Alauddin Islamic Medical) Journal*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.24252/alami.v4i1.10290>
- Tangah, K., Padang, K., Mardius, A., & Astuti, Y. (2018). *Pengaruh Senam Lansia Terhadap Kebugaran Jasmani Warga Perumahan Pondok Pinang Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang*. August 2017. <https://doi.org/10.23887/jere.v1i3.10381>
- Thahir, A. (2015). *Pengaruh PMR (Progressive Muscle Relaxation) Terhadap Insomnia Pada Lansia Di Panti Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Natar Provinsi Lampung Tahun 2012*. 02(1), 1–14.
- Trisnowiyanto, B. (2015). Pengaruh Immediet Instrumental Music Hearing Therapy dengan Progressive Muscle Relaxation Exercise terhadap Rest Heart Reat. *Penjaskesrek FKIP UNS Journal Of Phedheral*, 11(2), 71–78.
- Utami, R. J., Indarwati, R., & Pradanie, R. (2021). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Tidur Lansia Di Panti. *Jurnal Health Sains*, 2(3),

362–380. <https://doi.org/10.46799/jhs.v2i3.135>

Wijaya, I., K, K. R. N., & Haris, H. (2019). Hubungan Gaya Hidup dan Pola Makan terhadap Kejadian Hipertensi diwilayah Kerja Puskesmas Towata Kabupaten Takalar. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 2(2), 165. htt

Wulandari, N. (2009). *Solusi sehat mengatasi hipertensi* (R. AgroMedia (ed.)). Redaksi AgroMedia.



L

A

M


P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran I

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth:

Ibu/calon Responden

Di wilayah kerja Puskesmas Pattopakang

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar :

Nama : Sri Wahyuningsih

NIM : 70300117076

Alamat : Dusun Batunapara Desa Panyangkalang

Akan mengadakan penelitian dengan Judul “Pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur penderita hipertensi di Puskesmas Pattopakang”

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk kepentingan pendidikan saya dan segala bentuk informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaan nya dan saya yang bertanggung jawab apabila informasi yang diberikan akan merugikan responden.

Atas perhatiannya dan kesediaan bagi responden, saya ucapkan terima kasih.

Takalar, Agustus, 2021

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Sri Wahyuningsih

Lampiran II

FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (inisial) :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian “Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kualitas Tidur Penderita Hipertensi ”, maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Takalar, Agustus
2021

Responden

()

Lampiran III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TERAPI RELAKSASI OTOT PROGRESIF

Tema : Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kualitas Tidur

Sasaran : Penderita Hipertensi

Waktu : 20 menit

Tujuan :

1. Tujuan umum

Setelah dilakukan Terapi Relaksasi Otot Progresif diharapkan kualitas tidur meningkat

2. Tujuan khusus

Setelah dilakukan Terapi Relaksasi Otot Progresif diharapkan pasien mampu:

- a. Mengikuti instruksi Terapi Relaksasi Otot Progresif
- b. Melakukan terapi relaksasi otot progresif secara mandiri

Indikasi :

1. Klien mengalami insomnia
2. Klien mengalami kualitas tidur buruk
3. Klien mengalami stress
4. Klien mengalami kecemasan
5. Klien mengalami depresi

NO	LANGKAH-LANGKAH
A.	TAHAP PRA INTERAKSI
1.	Salam Terapeutik a) Jelaskan tujuan, manfaat, prosedur dan pengisian lembar persetujuan b) Posisikan tubuh klien se nyaman mungkin c) Hindari melakukan relaksasi dengan posisi berdiri d) Longgar kan ikatan dasi, ikat pinggang atau hal lain yang sifatnya mengikat
2.	Persiapan Alat dan Bahan a) Kursi b) Bantal c) Lingkungan yang nyaman
B.	TAHAP ORIENTASI

1.	Lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
2.	Lakukan pembagian kuesioner kualitas tidur kemudian instruksi kan klien untuk melakukan pengisian
C.	TAHAP KERJA
1.	Pasien duduk di kursi yang telah disiapkan kemudian dengan posisi bersandar
2.	Gerakan pertama, menganggap tangan kiri dan kanan sambil membuat kepalan (dilakukan bergantian, setiap gerakan dihitung 10 hitungan). Pada saat akhir gerakan maka klien dipandu untuk merilekskan.
3.	Gerakan kedua, Menekuk kedua lengan ke belakang pada pergelangan tangan, sehingga otot-otot ditangan bagian belakang dan lengan belakang menegang, jari-jari menghadap ke langit-langit
4.	Gerakan ketiga, menggenggam kedua tangan sehingga menjadi sebuah kepalan kemudian membawa kedua kepalan ke pundak sehingga otot bisep akan menjadi tegang.
5.	Gerakan keempat, Mengangkat kedua bahu setinggi-tingginya seakan-akan bahu akan dibawah hingga tegang
6.	Gerakan kelima, mengerutkan dahi dan alis sampai otot-otot mengendalikan otot mata
7.	Gerakan keenam, menutup keras-keras mata sehingga dapat dirasakan ketegangan di sekitar mata dan otot-otot mengendalikan gerakan mata.
8.	Gerakan ketujuh, mengatupkan rahang diikuti dengan menggigit gigi-gigi sehingga dapat dirasakan ketegangan otot di sekitar rahang
9.	Gerakan kedelapan, memoncongkan bibir sekuat-kuatnya sehingga akan dirasakan ketegangan di sekitar mulut

10.	Gerakan kesembilan, menekan kepala pada permukaan bantalan kursi sedemikian sehingga kita dapat merasakan ketegangan dibagian leher dan punggung atas
11.	Gerakan kesepuluh, gerakan ini dilakukan dengan mengikat tubuh dari sandaran, kemudian punggung di lenggungkan lalu dibusungkan dada. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik
12.	Gerakan kesebelas, klien diminta untuk menarik napas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara sebanyak-banyaknya. Posisi ini ditahan selama beberapa saat, sambil merasakan ketegangan dibagian dada kemudian turun ke perut.
13.	Gerakan keduabelas, gerakan ini dilakukan dengan cara menarik kuat-kuat perut ke dalam, kemudian menahannya sampai perut menjadi kencang dan keras. Setelah 10 detik dilepaskan bebas kemudian diulang kembali seperti gerakan awal
14.	Gerakan ketigabelas, dilakukan dengan cara meluruskan kedua belah telapak kaki sehingga otot paha terasa tegang. Gerakan ini dilanjutkan dengan mengunci lutut, sedemikian sehingga ketegangan pindah ke otot-otot belis.
D.	TAHAP TERMINASI
	a) Mengidentifikasi perasaan klien b) Berdiskusi dengan umpan balik bersama klien c) Melakukan kontrak waktu dan tempat untuk kegiatan selanjutnya.

Lampiran IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KUALITAS TIDUR

No	LANGKAH-LANGKAH
----	-----------------

1.	Pengertian Merupakan tata cara pengukuran kualitas tidur. Kualitas tidur merupakan fenomena yang sangat kompleks yang melibatkan berbagai domain, antara lain, penilaian terhadap lama waktu tidur, gangguan tidur, masa laten tidur, disfungsi tidur pada siang hari, efisiensi tidur, kualitas tidur, dan penggunaan obat tidur.
2.	Tujuan Untuk menilai kualitas tidur seseorang.
3.	Persiapan Alat : 1. Kuesioner <i>Pittsburgh Sleep Quality Index</i> (PSQI). 2. Alat tulis
4.	Prosedur : a. Jelaskan prosedur pada responden b. Responden mengisi kuesioner kualitas tidur sesuai dengan instruksi yang tertera pada lembar kuesioner c. Catat hasil pengukuran kualitas tidur pada lembar kuesioner

Lampiran V

KUISIONER KUALITAS TIDUR

PETUNJUK UMUM :

1. Isilah pertanyaan dengan jelas dan lengkap
2. Untuk setiap pertanyaan, untuk pertanyaan isian jawaban ditulis ditempat yang disediakan, sedangkan untuk pertanyaan pilihan berilah tanda centang (✓) pada tempat yang telah disediakan
3. Jika ada jawaban yang ingin diganti, maka coret jawaban awal

4. Jika ada hal lain yang kurang dimengerti, maka bisa ditanyakan kepada peneliti.

DATA UMUM :

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Hari/Tanggal :

INSTRUKSI PENGISIAN KUISIONER

Pertanyaan dibawah ini berhubungan dengan kebiasaan tidur anda selama lebih dari 1 minggu terakhir. Jawaban yang anda berikan adalah jawaban yang mayoritas anda alami dan anda lakukan selama lebih dari 1 minggu terakhir. Saya berharap anda menjawab semua pertanyaan dengan petunjuk yang telah dilampirkan. Seperti semua pertanyaan anda hanya menjawab dengan tanda centang (✓) di kolom yang telah disediakan.

1. Selama satu minggu terakhir, pada jam berapa anda biasanya memulai tidur malam ?

Jam 20:00-21:00	
Jam 22:00-23:00	
Jam 24:00-01:00	
Jam >01:00	

2. Selama satu minggu terakhir, berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk akhirnya bisa tertidur ?

<15 menit	
16-30 menit	

31-60 menit	
>60 menit	

3. Selama satu minggu terakhir, berapa lama (dalam hitungan jam) anda habiskan untuk tidur di malam hari ?

>7 jam	
6-7 jam	
5-6 jam	
< 5 jam	

4. Selama satu minggu terakhir seberapa sering masalah-masalah dibawah mengganggu tidur anda ?

No	Pertanyaan	Tidak pernah (0)	1x seminggu (1)	2x seminggu (2)	≥ 3x seminggu (3)
a.	Tidak bisa tidur selama 30 menit selama berbaring				
b.	Terbangun tengah malam atau bangun terlalu pagi				
c.	Terbangun ke kamar mandi				
d.	Mengalami kesulitan untuk bernapas lebih leluasa				
e.	Mengalami pusing atau jantung berdebar-debar?				
f.	Mengalami kedinginan di malam hari ?				
g.	Atau kepanasan di malam hari ?				
h.	Mengalami sakit kepala?				

i.	Mengalami nyeri ?				
j.	Atau hal-hal lain yang mengganggu ? jelaskan :				

6. Apakah anda mengonsumsi obat-obat untuk membantu anda tertidur ?

Tidak pernah (0)	
1x seminggu (1)	
2x seminggu (2)	
≥ 3x seminggu (3)	

7. Selama satu minggu terakhir, seberapa sering anda mengantuk ketika melakukan aktifitas di siang hari ?

Tidak pernah (0)	
1x seminggu (1)	
2x seminggu (2)	
≥ 3x seminggu (3)	

8. Selama satu minggu terakhir, seberapa antusias anda ingin menyelesaikan masalah yang anda hadapi ?

Tidak antusias (0)	
Kecil (1)	
Sedang (2)	
Besar (3)	

9. Selama satu minggu terakhir, bagaimana kualitas tidur anda ?

Sangat baik (0)	
Baik (1)	
kurang (2)	
Sangat kurang(3)	

Lampiran VI

Kisi-kisi Kuisioner PSQI

No	Komponen	No. item pertanyaan	Sistem penilaian	
			Jawaban	Nilai skor
1	Kualitas tidur subjektif	9	Sangat baik Baik Kurang Kurang baik	0 1 2 3
2	Latensi tidur	2	<15 menit 16-30 menit 31-60 menit >60 menit	0 1 2 3
		5a	Tidak pernah 1x seminggu 2x seminggu 3x seminggu	0 1 2 3
3	Durasi tidur	4	>7 jam 6-7 jam 5-6 jam <5 jam	0 1 2 3
4	Efesiensi tidur Rumus : Durasi tidir : lama di tempat tidur X 100% Note : Durasi tidur no.4, dan Lama tidur no 1 dan 3	1,3 dan 4	>85% 75-84% 65-74% <65%	0 1 2 3

5	Gangguan tidur	5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j,	0 1-9 10-18 19-27	0 1 2 3
6	Penggunaan obat	6	Tidak pernah 1x seminggu 2x seminggu >3x seminggu	0 1 2 3
7	Disfungsi disiang hari	7	Tidak pernah 1x seminggu 2x seminggu >3x seminggu	0 1 2 3
		8	Tidak antusias Kecil Sedang Besar	0 1 2 3
		7+8	0 1-2 3-4 5-6	0 1 2 3

Keterangan :

- 0 : Sangat baik
- 1 : Cukup baik
- 2 : Buruk
- 3 : Sangat buruk

Untuk menentukan skor akhir yang menyimpulkan kualitas tidur jumlahkan semua hasil skor mulai dari komponen 1 sampai 7

Dengan hasil skor

Baik : <5

Buruk : >5

Lampiran VII

Hasil uji analisis data pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur penderita hipertensi di Puskesmas Pattopakang

1. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	18	100.0	100.0	100.0

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	35-45	3	16.7	16.7	16.7
	46-60	15	83.3	83.3	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	9	50.0	50.0	50.0
	Petani	6	33.3	33.3	83.3
	Pedagang	3	16.7	16.7	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

keadaan lingkungan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	baik	4	22.2	22.2	22.2
	buruk	14	77.8	77.8	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

2. Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
pre tes kualitas tidur	.239	18	.008	.914	18	.101
pos tes kualitas tidur	.081	18	.200 [*]	.973	18	.856

3. Uji Paired Sample T Test

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 pre tes kualitas tidur	191.39	18	10.001	2.357
post test kualitas tidur	150.06	18	22.414	5.283

UNIVERSITAS ISI AM NEGERI
Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 pre tes kualitas tidur dan post test kualitas tidur	18	.329	.182

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 pre tes kualitas tidur - post test kualitas tidur	41.333	21.327	5.027	30.728	51.939	8.223	17	.000

4. Uji Reliabilitas dan Validitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.795	18

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
pert1	40.87	15.651	.547	.774
pert2	41.15	15.156	.633	.766
pert3	40.82	15.533	.667	.767
pert4	40.95	16.356	.414	.783
pert5a	40.77	16.435	.440	.782
pert5b	40.75	16.449	.451	.782
pert5c	40.75	18.346	-.063	.811
pert5d	40.92	16.328	.424	.783
perte	40.72	17.846	.073	.803
pert5f	41.22	17.204	.250	.793
pert5g	41.50	16.051	.235	.807
pert5h	40.75	16.141	.418	.783
pert5i	40.72	16.666	.405	.784
pert5j	41.07	15.763	.519	.776
pert6	43.45	18.510	-.168	.803
pert7	41.32	15.969	.392	.785
pert8	40.55	17.382	.384	.789
pert9	40.75	15.679	.677	.768

Lampiran VIII

Surat Keterangan Layak Etik



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXPEDITED
"ETHICAL EXPEDITED"

No. C.56/KEPK/FKIK/VII/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Sri Wahyuningsih
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif terhadap Kualitas tidur Penderita Hipertensi
di Puskesmas Pattopakang"**

*"Effect of Progressive Muscle Relaxation Therapy on Sleep Quality of Patients with
Hypertension at Pattopakang Healtatakalai"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
This declaration of ethics applies during the period July 28 2021 until July 28 2022



28, 2021
Chairperson and Chairperson,

DR. Dr. Syatrah, Sp.A., M.Kes

Lampiran IX



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN
Kampus II : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax.8221400

Lamp : -
Hal : Permohonan Pengajuan Kode Etik

Gowa, 15 Juni 2021

Yth.

Komite Etik Penelitian Kesehatan
FKIK UIN Alauddin Makassar

Di -
Makassar

Assalamualaikum warahmatullahir wabarakatuh

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa program studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar maka kami mohon kesediaan Bapak /Ibu memberikan persetujuan atau izin kode etik kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuningsih
NIM : 70300117076
Program studi : Keperawatan
Judul Riset : Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap kualitas Tidur Penderita Hipertensi.
Dosen Pembimbing : Dr. Anwar Hafid., S.Kep.,Ns.,M.Kes
Wahdaniah., S.Kep.,Ns.,M.Kes

Demikian harapan kami atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,
Ketua Prodi Keperawatan FKIK
UIN Alauddin Makassar


Muh. Anwar Hafid

Tembusan:
- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (Sebagai Laporan)

Lampiran X



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar Telepon (0411) 868720 Faksimili (0411) 864923
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa Telepon (0411) 841879 Faksimili (0411) 8221400
Email: fakultas@uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 2837/ Un.06/FKIK/PP.00.9/08/ 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Gowa, 16 Agustus 2021

Kepada Yth :
Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala UPT, P2T, BKPM, Prov. Sul-Sel

Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sri Wahyuningsih
N I M : 70300117076
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Keperawatan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Batunapara, Desa Payangkalang, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kualitas Tidur Penderita Hipertensi Di Puskesmas Pattopakang".

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes
2. Wahdaniah, S.Kep., Ns., M.Kes

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Puskesmas Pattopakang Kab. Takalar, waktu penelitian 1 Juli – 7 Juli 2021

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam



Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Syafirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa

Lampiran XI



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 20428/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Takalar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2837/FKIK/PP.00.9/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SRI WAHYUNINGSIH**
Nomor Pokok : 70300117076
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGARUH TERAPI RELAKSASI OTOT PROGRESIF TERHADAP KUALITAS TIDUR PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS PATTOPAKANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **30 Agustus s/d 30 September 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*.

Lampiran XII

Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sri Wahyuningsih, lahir di Takalar pada tanggal 11 Oktober 1999.

Penulis merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara dari pasangan bapak Dahlan S.E dan Ibu Fatmawati. Penulis dengan yang akrab dipanggil Ningsih ini mulai menggeluti bangku pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2005 di SD 123 Inpres Garonggong dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mangarabombang dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Takalar dan selesai pada tahun 2017. Setelah menempuh pendidikan SMA di tahun yang sama penulis memasuki bangku perkuliahan yang merupakan salah satu Universitas Negeri yang ada di Kota Makassar, yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan. Tak henti-hentinya penulis mengucapkan syukur karena sampai saat ini masih diberi kesehatan sehingga bisa melewati segala rintangan yang disertai dengan perjuangan dan doa dari kedua orang tua penulis, seluruh keluarga, serta rekan-rekan seperjuangan yang selalu siap untuk bertukar pikiran dan dapat membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kualitas Tidur Penderita Hipertensi Di Puskesmas Pattopakang”.