

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA WANITA USIA SUBUR**  
**DENGAN KEPUTIHAN**  
*(Literature Review)*



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Meraih Gelar**  
**Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan**  
**Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**  
**UIN Alauddin Makassar**

**Oleh :**  
**NUR AINUN BASRY**  
**NIM : 70400117032**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA KEBIDANAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ainun Basry  
NIM : 70400117032  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 5 Maret 1999  
Jurusan/ Prodi : D3 Kebidanan  
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Abd Dg Sirua No. 42 A Kamp Alla Alla  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita Usia  
Subur dengan Keputihan

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh keyakinan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini adalah benar adanya dan hasil karya kerangka pikiran sendiri. Jika kemudian hari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan duplikasi, tiruan, bahkan plagiat baik sebagian maupun seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diterima batal demi hukum.

Makassar, Oktober 2021

Penyusun



**NUR AINUN BASRY**

**70400117032**

## HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nur Ainun Basry  
Nim : 70400117032  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita Usia Subur dengan  
Keputihan (*Literature Review*)

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Makassar, 20 Oktober 2021

Pembimbing I



Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb  
NIP: 19760126 200604 2 001

Pembimbing II



Nurfaizah Alza, S.ST., M.Keb  
NIP:

## PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita Usia Subur dengan Keputusan (*Literature Review*)**”. Yang disusun oleh **Nur Ainun Basry Nim : 70400117032**, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 20 Oktober 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).


Makassar, 20 Oktober 2021  
13 Rabiul Awal 1443 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: <b>Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes</b>	(.....)
Sekretaris	: <b>Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb</b>	(.....)
Pembimbing I	: <b>Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb</b>	(.....)
Pembimbing II	: <b>Nurfaizah Alza, S.ST., M.Keb</b>	(.....)
Penguji I	: <b>Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb</b>	(.....)
Penguji II	: <b>Dr. Hj. Sohrah, M.Ag</b>	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



**Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes**  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pertama, segala puji dan syukur Kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Pengasih yang selalu mengasihi dan mengiringi jalan kita dalam semangat menuntut ilmu. Salam dan taslim semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menuntun keislaman bagi umat manusia di muka bumi ini. Semoga rasa semangat ini menjadi abadi.

Karya tulis ilmiah ini yang berjudul "**Manajemen Asuhan Kebidanan pada Wanita Usia Subur dengan Keputihan**" adalah buah hasil kemampuan penulis sebagai bakti terhadap semangat menuntut ilmu. Kritik dan saran dalam nuansa akademis menjadi pemicu agar karya yang Saya hasilkan mampu dikembangkan dan tentunya semoga menjadi benih yang bermanfaat bagi kebaikan orang banyak.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Normah dan Ayahanda Basry Umar yang berkat doa, dukungan, serta nasehatnya penulis semangat menjalani perkuliahan selama ini.
2. Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. dr. Syatirah, Sp(A), M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Firdayanti, S.ST., M.Keb selaku Ketua Jurusan Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

5. Anieq Mumthi'ah Al-Kautsar, S.ST., M.Keb selaku Sekretaris Prodi Kebidanan sekaligus Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mendukung, mendoakan, membantu, membimbing, dan memberikan saran yang membuat penulis kuat dan tegar di posisi sekarang ini.
6. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., M.Keb., M.Kes selaku pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing selama penulisan dan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Nurfaizah Alza, S.ST., M.Keb selaku pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu, membimbing, serta memberikan saran yang sangat membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb selaku penguji pertama yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu dan memberikan banyak saran yang membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Hj. Sohrah, M.Ag selaku penguji Agama yang senantiasa memberikan ilmu agama serta memberi banyak masukan dan saran yang bersifat islamiyah dalam Karya Tulis Ilmiah sehingga penulis dapat mengetahui
10. Andi Dian Diarfah, M.Psi, selaku Psikolog Prodi Kebidanan dan dr. Jimmy Sebastian Ollich, Sp.KJ selaku Psikiater yang selalu mendampingi, memotivasi, dan memberikan solusi sehingga kondisi psikis penulis dapat lebih stabil dan terjaga.
11. Segenap civitas akademik terkhususnya para dosen Prodi Kebidanan dan para staf akademik Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dan



membimbing penulis dalam penyusunan dan pembuatan surat menyurat Karya Tulis Ilmiah ini berlangsung.

12. Kepada kakak dan adikku, Muh. Hamdy Basry, Nurhidayanty Basry, Muh. Ridwan Basry, dan Nur Hafizhah Basry yang selalu memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional.
13. Kepada sahabatku, Kharida Dahinadhira, Arini Kusuma Wardani, Andi Batari Noviasari, dan Deby Nur Azizah Hasanuddin yang selalu mendukung, menghibur, dan membuat penulis merasa nyaman dan tenang.
14. Kepada Nadya Hamidah W.P, Safira Salsabilla, Syarifah Fathimah A., Vita Fadhillah N.N. yang senantiasa mengajak penulis ke pantai dan membuat penulis merasa senang dan terhibur.
15. Kepada Afifah Maghfirah, Andi Fahrul Rozi, Nurfidhea Dwidelia, dan Dian Anugerah Sari selaku teman bercerita baik senang maupun duka.
16. Teman-teman Aviditas 2017 yang telah menjadi keluarga di kampus tercinta
17. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang senantiasa kuat dalam situasi apapun.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 19 Oktober 2021

Penulis



Nur Ainun Basry

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. <i>Latar Belakang</i> .....	1
B. <i>Ruang Lingkup Penulisan</i> .....	3
C. <i>Tujuan Penulisan</i> .....	3
1. Tujuan Umum .....	3
2. Tujuan Khusus .....	3
D. <i>Manfaat Penulisan</i> .....	4
1. Manfaat Akademik.....	4
2. Manfaat Instansi.....	4
3. Manfaat Bagi Peneliti.....	5
4. Manfaat Bagi Institusi.....	5
E. <i>Metode Penelitian</i> .....	5
1. Studi Kepustakaan .....	5
2. Studi Kasus .....	5
3. Studi Dokumenter .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. <i>Tinjauan Umum tentang Wanita Usia Subur</i> .....	9
1. Pengertian Wanita Usia Subur .....	9
2. Tujuan Wanita Usia Subur Prakonsepsi.....	9
3. Asuhan Wanita Usia Subur Prakonsepsi.....	10



B.	<i>Tinjauan Khusus Tentang Keputihan</i> .....	12
1.	Pengertian Keputihan.....	12
2.	Patofisiologi Keputihan.....	13
3.	Jenis Keputihan.....	14
4.	Gejala Keputihan .....	17
5.	Faktor Penyebab Keputihan.....	18
6.	Faktor Risiko Keputihan .....	33
7.	Dampak Keputihan .....	34
8.	Pencegahan Keputihan.....	35
9.	Penatalaksanaan Keputihan.....	39
C.	<i>Proses Manajemen Asuhan Kebidanan</i> .....	42
1.	Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan .....	42
2.	Langkah-Langkah Manajemen Asuhan Kebidanan .....	43
<b>BAB III TELUSURAN EVIDENCE BASED LEARNING</b> .....		52
A.	Matriks Langkah 1 .....	52
B.	Matriks Langkah 2 .....	65
C.	Matriks Langkah 3 .....	78
D.	Matriks Langkah 4 .....	91
E.	Matriks Langkah 5 .....	104
F.	Matriks Langkah 6 .....	117
G.	Matriks Langkah 7.....	130
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....		146
A.	Pembahasan Hasil Telaah Evidence Based Asuhan 7 Langkah Varney.....	146
1.	Langkah I : Identifikasi Data Dasar .....	146
2.	Langkah II: Masalah aktual.....	149
3.	Langkah III: Masalah Potensial .....	152
4.	Langkah IV: Tindakan Segera dan Kolaborasi .....	155
5.	Langkah V : Perencanaan .....	157
6.	Langkah VI : Implementasi.....	160

7. Langkah VII : Evaluasi .....	164
B. Implikasi Kebidanan .....	168
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	172
A. Kesimpulan .....	172
B. Saran .....	174
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	176
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	185

## ABSTRAK



**Nama** : Nur Ainun Basry  
**NIM** : 70400117032  
**Judul** : **Manajemen Asuhan Kebidanan pada Wanita Usia Subur dengan Keputihan**

---

Wanita Usia Subur (WUS) atau yang dikenal sebagai wanita prakonsepsi adalah wanita yang berada pada masa peralihan masa remaja akhir hingga dewasa awal, yakni di rentang usia 15 sampai 49 tahun. Banyak masalah yang menyerang organ reproduksi wanita usia subur, salah satunya adalah keputihan. Keputihan menyerang sekitar 50% populasi wanita usia subur di dunia dan berisiko tinggi mengakibatkan terjadinya kanker serviks, kemandulan, bahkan kematian.

Karya tulis ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan pada Wanita Usia Subur dengan Keputihan Tahun 2021 menggunakan metode penelitian studi kepustakaan *literature review* dengan mengumpulkan beberapa sumber baik dari buku, jurnal nasional, maupun jurnal internasional melalui pendekatan 7 langkah Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Dari hasil yang telah didapatkan, keputihan fisiologis adalah keluarnya cairan normal dari liang vagina, sedangkan keputihan patologis ditandai dengan perubahan warna, berbau busuk atau amis, serta nyeri pada perut bagian bawah. Hal tersebut terjadi akibat masalah hormonal, infeksi, jamur, bakteri, maupun kuman karena personal hygiene yang kurang baik. Tindakan yang dilakukan pada keputihan adalah menjaga personal hygiene, pemberian obat farmakologi dan obat herbal.

Kesimpulan dari studi kasus ini yaitu komplikasi tidak akan terjadi apabila asuhan yang diberikan kepada wanita usia subur dengan keputihan dapat diatasi sesuai dengan standar asuhan kebidanan.

**Kata Kunci : Wanita Usia Subur, Prakonsepsi, Keputihan, 7 Langkah Varney**

## ABSTRACT



**Name** : Nur Ainun Basry

**Reg. Number** : 70400117032

**Title** : **Midwifery Care Management in Women during Childbearing Age with the Case of Vaginal Discharge**

---

Women of Childbearing Age or known as women of reproductive age are those who are in the transitional period of late adolescence to early adulthood. Women of reproductive age have been considered to be in the range of 15 to 49 years. Many problems could probably be experienced by women during their childbearing age, one of which is a vaginal discharge. About 50% of women have been evident to suffer from a vaginal discharge during their childbearing age, and it should be noted that women with vaginal discharge are prone to suffer from cervical cancer, infertility, and even death.

This research aims to carry out research and obtain material resources related to women of childbearing age with the case of vaginal discharge in 2021. The methodological approach taken in this study was literature review where related references such as books and journals were used as the primary research data. This study was conducted by utilizing the 7-stages of Varney midwifery care management approach and SOAP documentation procedure.

The findings of this research indicated that normal physiological vaginal discharge is a white or clear, non-offensive discharge that can vary over time, while pathological vaginal discharge is characterized by the infections that may cause changes in vaginal discharge include vaginal yeast infections, bacterial vaginitis, and sexually transmitted infections. It is also often that women experience pain in the lower abdomen. The treatments that could be taken with the case of vaginal discharge are maintaining personal hygiene as well as administering pharmacological drugs and herbal medicines.

This research concludes that complications and infections on vaginal discharge could be solved by providing proper treatments for women during their reproductive age. The treatments should be given based on appropriate midwifery standards.

**Key Words:** Women of reproductive age, Childbearing age, Vaginal discharge, 7-stages of Varney

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Wanita usia subur (WUS) merupakan wanita yang berumur 15-49 tahun baik yang berstatus kawin maupun yang belum kawin atau janda (BKKBN, 2011). Wanita usia subur berada dalam masa peralihan masa remaja akhir hingga usia dewasa awal. Karakteristik WUS yang paling utama adalah ditandai dengan peristiwa fisiologis, seperti menstruasi dan tercapainya puncak kesuburan dengan fungsi organ reproduksi yang sudah berkembang dengan baik (Dieny dkk, 2019: 1).

Diar (2009) mengatakan, pada kalangan wanita, kesehatan reproduksi harus memperoleh perhatian yang serius. Salah satu gejala dan tanda-tanda penyakit infeksi organ reproduksi wanita adalah terjadinya keputihan. Keputihan merupakan salah satu masalah yang sejak lama menjadi persoalan bagi kaum wanita. Masalah ini merupakan masalah kedua sesudah gangguan haid. Hampir seluruh perempuan pernah mengalami keputihan. Perlu kita ketahui selain merupakan salah satu tanda gejala adanya suatu penyakit, keputihan juga dapat menjadi indikasi adanya penyakit (Purnamasari & Hidayanti, 2019).

Sesuai data *World Health Organization* (WHO) dalam Mansyur (2012), keputihan (*Fluor Albus*) menyerang sekitar 50% populasi wanita di dunia dan beresiko tinggi terhadap wanita yang berusia reproduksi atau wanita usia subur (Marlina, 2017). Menurut WHO dalam Zubier. F (2002), masalah

kesehatan mengenai reproduksi wanita yang buruk telah mencapai 33% dari jumlah total beban penyakit yang menyerang pada wanita di seluruh dunia dan jumlah wanita di dunia yang pernah mengalami keputihan 75%, sedangkan wanita Eropa yang mengalami keputihan sebesar 25% (Indah Setiani dkk, 2016).

Menurut BKKBN dalam jurnal S.Winna (2013), di Indonesia sebanyak 75% wanita pernah mengalami keputihan minimal satu kali dalam hidupnya dan 45% di antaranya bisa mengalami keputihan sebanyak dua kali atau lebih. Hasil data riset kesehatan dasar (2013), banyak wanita Indonesia yang tidak tahu tentang keputihan (*Fluor Albus*), sehingga mereka menganggap sebagai yang umum dan kurang penting. Padahal keputihan patologis yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan kemandulan 15% pada usia 30-34 tahun, meningkat 30% pada usia 35-39 tahun, dan 64% pada usia 40-44 tahun.

Keputihan juga merupakan gejala awal dari kanker leher rahim yaitu setiap tahunnya ada sekitar 15 ribu kasus baru kanker serviks di Indonesia yang dapat berakhir dengan kematian (Trisnawati, 2018).

Dari penelitian (Rahayu et al., 2015), hasil penelitian menunjukkan vulva hygiene sangat mempengaruhi untuk terjadinya keputihan. Hal ini menunjukkan bahwa perawatan organ reproduksi dengan melakukan tindakan higienis termasuk mencuci organ intim dengan air bersih, menjaga kelembaban organ intim dan tidak menggunakan pembalut yang wangi yang merupakan tindakan vulva hygiene sangat mempengaruhi terjadinya keputihan pada wanita usia subur.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018) estimasi jumlah wanita usia subur (15-49 tahun) di Indonesia sebanyak 70.715.592 jiwa, di Sulawesi Selatan sebanyak 2.378.097 jiwa, dan data dari Puskesmas Antang Perumnas Makassar pada tahun 2019 wanita usia subur yang terdata yaitu 5766 jiwa. Dari 13 responden wanita usia subur di wilayah Abd. Dg. Sirua, didapatkan 11 responden yang mengalami keputihan dan 2 responden yang mengaku tidak mengalami keputihan.

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengambil studi kasus dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita Usia Subur Dengan Keputihan Tahun 2020”.

## **B. Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Ilmiah ini Adalah Manajemen kasus dengan Judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita Usia Subur Dengan Keputihan Tahun 2021”.

## **C. Tujuan Penulisan**

### **1. Tujuan Umum**

Dilaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita Usia Subur Dengan Keputihan Tahun 2021.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Dilaksanakannya pengkajian dan analisis data dasar pada wanita usia subur dengan keputihan
- b. Dirumuskan nya diagnosa/masalah aktual pada wanita usia subur dengan keputihan



- c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial yang terjadi pada wanita usia subur dengan keputihan
- d. Dilaksanakannya tindakan segera pada wanita usia subur dengan keputihan
- e. Direncanakannya tindakan dalam asuhan kebidanan pada wanita usia subur dengan keputihan
- f. Dilaksanakannya tindakan dalam asuhan kebidanan pada wanita usia subur dengan keputihan
- g. Dievaluasinya hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan pada wanita usia subur dengan keputihan
- h. Dilakukannya pendokumentasian hasil temuan asuhan kebidanan yang dilaksanakan pada wanita usia subur dengan keputihan
- i. Dilakukannya penerapan nilai-nilai keislaman dalam manajemen asuhan kebidanan pada wanita usia subur dengan keputihan

#### ***D. Manfaat Penulisan***

##### **1. Manfaat Akademik**

Memberikan Informasi dan masukan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

##### **2. Manfaat Instansi**

Memberikan Informasi dan masukan Instansi yang terkait dalam meningkatkan Kualitas pelayanan.

### **3. Manfaat Bagi Peneliti**

Merupakan pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang faktor yang berhubungan dengan kasus keputihan.

### **4. Manfaat Bagi Institusi**

Diharapkan dapat berguna sebagai salah satu hasil penemuan dan kajian serta bahan acuan atau pedoman bagi institusi jurusan Kebidanan untuk penulisan karya tulis Ilmiah Selanjutnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Studi Kepustakaan**

Penulis mempelajari berbagai literatur dan mengambil data dari jurnal nasional dan internasional yang ada referensinya dengan *Fluor Albus* kronik termasuk karya tulis ilmiah.

### **2. Studi Kasus**

Melakukan studi kasus yang ada dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah melalui asuhan kebidanan yang meliputi; pengkajian, merumuskan diagnosa/masalah aktual maupun potensial, kolaborasi, perencanaan, implementasi, melakukan evaluasi terhadap asuhan kebidanan pada klien dengan kurang energi kronis pada masa prakonsepsi serta mendokumentasikan. Untuk memperoleh data/informasi dalam pengkajian, penulisan menggunakan teknik:

a. Anamnesa

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien dan keluarganya dan dapat membantu memberikan keterangan/informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis untuk menjamin diperolehnya data yang lengkap mulai dari kepala sampai kaki (head to toe) meliputi:

- 1) Inspeksi merupakan proses observasi menggunakan mata. Inspeksi dilakukan dengan mendeteksi tanda-tanda fisik normal ataupun tidak normal untuk melengkapi pemeriksaan fisik.
- 2) Palpasi dilakukan dengan sentuhan atau rabaan pada tubuh klien. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi kelainan pada organ atau jaringan pada tubuh.
- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara peng ketukan yang hanya dilakukan pada tungkai bawah pada pemeriksaan fisik.
- 4) Auskultasi adalah metode pengkajian dengan menggunakan pendengaran.

c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

### 3. Studi Dokumenter

Studi dokumenter dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan dokter, bidan, perawat, petugas laboratorium, dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

#### F. *Sistematika Penulisan*

Sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu: pada bab I pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Pada bab II penulis membahas tentang tinjauan pustaka yang akan menguraikan tentang tinjauan umum pada wanita usia subur, tinjauan umum keputihan menurut pandangan islam dan tinjauan khusus tentang keputihan pada wanita usia subur.

Bab III menguraikan 7 langkah *Varney* yaitu: Langkah I: Identifikasi data dasar, Langkah II: Identifikasi diagnosa/masalah aktual, Langkah III: Identifikasi diagnosa/masalah potensial, Langkah IV: Tindakan *emergency* atau kolaborasi, Langkah V: Intervensi atau rencana tindakan, Langkah VI: Implementasi atau pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan, dan Langkah VII: Evaluasi hasil asuhan kebidanan serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV menjelaskan makna hasil penelitian yang membahas ada tidaknya kesenjangan antara teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bab V, yaitu penutup akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang

didapatkan dari hasil asuhan. Selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Tinjauan Umum tentang Wanita Usia Subur***

##### **1. Pengertian Wanita Usia Subur**

Wanita Usia Subur (WUS) adalah wanita yang berada dalam peralihan masa remaja akhir hingga usia dewasa awal. Wanita usia subur juga dikenal sebagai wanita prakonsepsi yang akan menjadi seorang ibu, dimana kebutuhan gizi pada masa ini berbeda dengan masa anak-anak, remaja ataupun lanjut usia (Dieny dkk, 2019: 1-20).

Menurut data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, wanita usia subur adalah perempuan yang ada di rentang usia 15 sampai 49 tahun. Perempuan yang ada di rentang usia ini masuk ke dalam kategori usia reproduktif dengan status yang beragam seperti yang belum menikah, sudah menikah, atau janda. Wanita usia subur merupakan wanita yang berada di rentang usia 15 sampai 49 tahun yang dikenal sebagai wanita prakonsepsi, yaitu wanita yang akan menjadi seorang ibu dengan keadaan organ reproduksi yang berfungsi dengan baik.

##### **2. Tujuan Wanita Usia Subur Prakonsepsi**

Menurut (CDC, 2006) dalam jurnal Yulizawati dkk, (2016) tujuan pemberian perawatan pada masa prakonsepsi antara lain:

- a. Mengurangi angka kematian ibu dan anak
- b. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan
- c. Mencegah komplikasi selama kehamilan dan persalinan

- d. Mencegah bayi lahir mati, lahir prematur, dan berat bayi lahir rendah
- e. Mencegah bayi lahir cacat
- f. Mencegah infeksi neonatal
- g. Mencegah berat badan rendah dan stunting
- h. Mencegah penularan vertikal HIV/ IMS
- i. Menurunkan risiko beberapa bentuk kanker pada anak
- j. Menurunkan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular di kemudian hari.

### 3. Asuhan Wanita Usia Subur Prakonsepsi

Menurut laporan WHO pada tahun 2014, asuhan kesehatan prakonsepsi merupakan asuhan kesehatan bagi laki-laki dan perempuan yang diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan profesional lainnya yang fokusnya pada upaya untuk memiliki anak yang sehat dimana dengan asuhan tersebut dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi (Anggraeny & Arisetiningsih, 2017: 8).

Delapan puluh lima persen wanita mengalami gangguan *mood* atau suasana hati setelah melahirkan dimana hal ini dapat mempengaruhi banyak hal, termasuk respons atau penerimaan terhadap bayi baru lahir. Para ibu yang belum siap atau tidak merencanakan kehamilan terlebih dahulu (prakonsepsi) sebagian besar ibu akan mengalami *baby blues*, sedangkan kurang lebih 10-15% mengalami depresi pasca persalinan atau dikenal sebagai *postpartum depression* (Saleha, 2009).

Terdapat beberapa pemeriksaan sebelum kawin dan sebelum hamil, yaitu dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan



laboratorium. Pada anamnesis akan diperoleh data mengenai nama, umur, alamat, status perkawinan (lamanya), kesiapan untuk hamil dan mempunyai keturunan (berapa jumlah anak yang diinginkan), pengetahuan tentang KB, hubungan seksual pranikah, permainan pendahuluan, dan pencapaian kepuasan hubungan seks, teknik hubungan seks dan berapa kali melakukan hubungan seks dalam seminggu). Pemeriksaan fisik umum (paru-jantung, abdomen, tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu) dapat dilakukan dengan alur bantu seperti ronsen dan ultrasonografi.

Pemeriksaan fisik khusus yang dilakukan antara lain pemeriksaan terhadap alat reproduksi wanita, melalui pemeriksaan dalam dengan melakukan pap smear. Pemeriksaan laboratorium juga penting dilakukan untuk mengetahui penyakit yang dapat mempengaruhi perkawinan dan kehamilan. Pada pemeriksaan laboratorium dilakukan pemeriksaan dasar dengan darah lengkap, pemeriksaan tinja, fungsi organ vital (hati dan ginjal), gula darah, dan terhadap virus hepatitis B/ C. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui adanya penyakit hubungan seksual dengan VDRL, preparat gonore, TORCH (toksoplasmosis, rubella, chlamydia trachomatis, virus herpes cytomegalovirus), dan HIV/AIDS (Manuaba, 2009).

Menurut CDC (2006) dalam buku Anggraeny & Arisetiningsih (2017: 9-11) mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan prakonsepsi, yaitu:

a. Kunjungan ke tempat pelayanan kesehatan secara teratur (terjadwal)

- b. Pemberian edukasi terkait kesehatan prakonsepsi dan kehamilan seperti skrining berat badan, vaksinasi, status zat besi dan asam folat, pengkajian konsumsi alkohol, dan riwayat penyakit
- c. Pemberian konseling terkait modifikasi kebiasaan individu

Skrining kesehatan prakonsepsi dapat dilakukan dengan menggunakan formulir untuk mempermudah mendapatkan data. Poin-poin yang dapat dicantumkan dalam formulir tersebut antara lain riwayat diet, aktivitas fisik, pola hidup, riwayat kesehatan individu dan keluarga, obat-obatan yang dikonsumsi, riwayat kesehatan seperti pola menstruasi, faktor genetik, dan lingkungan.

Terdapat dua bentuk konseling prakonsepsi, yaitu dokter umum yang mengundang perempuan atau pasangan untuk melakukan kunjungan sebelum masa kehamilan dan kelompok komunitas yang memberikan pendidikan kepada perempuan tentang kesiapan kehamilan dan melahirkan. Konseling prakonsepsi dapat menurunkan mortalitas neonatus yang diduga karena meningkatnya *antenatal care* dan suplementasi zat besi maupun asam folat (Bhutta dan Lassi, 2015).

## **B. Tinjauan Khusus Tentang Keputihan**

### **1. Pengertian Keputihan**

*Leukorea* berasal dari kata *Leuco* yang berarti benda putih yang disertai dengan akhiran *-rrhea* yang berarti aliran atau cairan yang mengalir. *Leukorea* atau *fluor albus* atau keputihan atau *vaginal discharge* merupakan semua pengeluaran dari kemaluan yang bukan darah. Keputihan merupakan salah satu tanda dari proses ovulasi yang terjadi di

dalam tubuh. Selain itu, keputihan juga merupakan salah satu tanda dari suatu penyakit.

Dalam Islam, keputihan adalah *ruthubah* yang berarti cairan yang keluar dari kemaluan wanita. Secara bahasa, الرطْبُ (*basah*) adalah lawan الأَيْسُ (*kering*). Jadi, الرُّطُوبَةُ adalah keadaan basah/lembab. Secara istilah, dijelaskan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al Muhadzdzab* (2/536), *Ruthubatu farji al mar'ah* adalah cairan putih yang wujudnya antara *madzi* dan keringat (Al-Muharib, 2014).

Keputihan (*fluor albus*) atau leukorea yaitu cairan putih yang keluar dari liang senggama secara berlebihan. Keputihan dapat dibedakan dalam beberapa jenis diantaranya keputihan normal (fisiologis) dan keputihan abnormal (patologis). Keputihan normal dapat terjadi pada masa menjelang dan sesudah menstruasi, pada sekitar fase sekresi antara hari ke 10 sampai 16 menstruasi, juga terjadi melalui rangsangan seksual (Manuaba, 2009: 61). Keputihan patologis ditandai dengan jumlah cairan yang dikeluarkan banyak, berwarna kuning, hijau, merah kecoklatan (karena bercampur darah), putih seperti susu basi, berbau amis/busuk (Citrawathi, 2014).

## 2. Patofisiologi Keputihan

Menurut Kasdu (2008), keputihan merupakan salah satu tanda dan gejala dari penyakit organ reproduksi wanita. Di daerah alat genitalia eksternal bermuara saluran kencing dan saluran pembuangan sisa-sisa pencernaan yang disebut anus. Apabila tidak dibersihkan secara sempurna akan ditemukan berbagai bakteri, jamur, dan parasit akan menjalar ke

sekitar organ genitalia. Hal ini dapat menyebabkan infeksi dengan gejala keputihan. Selain itu, dalam hal melakukan hubungan seksual terjadi pelecetan, dengan adanya pelecetan merupakan pintu masuk mikroorganisme penyebab infeksi penyakit hubungan seksual yang kontak dengan air mani dan mukosa (Yulfitria & Primasari, 2015).

Kemaluan wanita merupakan tempat yang paling sensitif dan merupakan tempat yang terbuka, dimana secara anatomi alat kelamin wanita berdekatan dengan anus dan uretra sehingga kuman yang berasal dari anus dan uretra tersebut sangat mudah masuk. Kuman yang masuk ke alat kelamin wanita akan menyebabkan infeksi sehingga dapat menyebabkan keputihan patologis yang ditandai dengan gatal, berbau, dan berwarna kuning kehijauan (Marhaeni, 2016).

### **3. Jenis Keputihan**

Menurut Marhaeni (2016), Keputihan dapat dibedakan menjadi dua jenis keputihan, yaitu: keputihan normal (fisiologis) dan keputihan abnormal (patologis).

#### **a. Keputihan Normal**

Keputihan normal dapat terjadi pada masa menjelang menstruasi, pada sekitar fase sekresi antara hari ke 10-16 menstruasi. Keputihan yang fisiologis terjadi akibat pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan selama proses ovulasi. Setelah ovulasi, terjadi peningkatan vaskularisasi dari endometrium yang menyebabkan endometrium menjadi sembab. Kelenjar endometrium menjadi berkelok-kelok dipengaruhi oleh hormon estrogen dan

progesteron dari korpus luteum sehingga mensekresikan cairan jernih yang dikenal dengan keputihan (Benson RC, 2009).

Hormon estrogen dan progesteron juga menyebabkan lendir servik menjadi lebih encer sehingga timbul keputihan selama proses ovulasi. Pada servik estrogen menyebabkan mukus menipis dan basa sehingga dapat meningkatkan hidup serta gerak sperma, sedangkan progesteron menyebabkan mukus menjadi tebal, kental, dan pada saat ovulasi menjadi elastis.

Keputihan fisiologis terdiri atas cairan yang kadang-kadang berupa mukus yang mengandung banyak epitel dengan leukosit yang jarang. Ciri-ciri dari keputihan fisiologis adalah cairan berwarna bening, kadang-kadang putih kental, tidak berbau, dan tanpa disertai dengan keluhan, seperti rasa gatal, nyeri, dan terbakar serta jumlahnya sedikit (Hanifa Wiknjastro, 2007).

b. Keputihan Abnormal (Patologis)

Keputihan abnormal dapat terjadi pada semua infeksi alat kelamin (infeksi bibir kemaluan, liang senggama, mulut rahim, jaringan penyangga, dan pada infeksi karena penyakit menular seksual). Ciri-ciri keputihan patologis adalah terdapat banyak leukosit, jumlahnya banyak, timbul terus menerus, warnanya berubah seperti kuning, hijau, abu-abu, dan menyerupai susu, disertai dengan keluhan gatal, panas, dan nyeri serta berbau apek, amis, dan busuk (Daili, Fahmi S dkk, 2009).

Perempuan yang mengalami keputihan patologis umumnya mempunyai keluhan-keluhan seperti gatal, nyeri, bengkak pada organ kelamin, panas dan perih ketika buang air kecil, dan nyeri pada perut bagian bawah. Keputihan patologis kemungkinan disebabkan oleh infeksi atau peradangan yang mungkin disebabkan oleh penyakit menular seksual, gejala keganasan pada organ reproduksi, adanya benda asing dalam uterus atau vagina (Citrawathi, 2014 : 9).

Kandidiasis vulvovaginal adalah penyebab infeksi umum keputihan yang mempengaruhi sekitar 75% wanita pada suatu waktu selama masa reproduksinya, dengan 40-50% memiliki dua atau lebih episode. *Bacterial vaginosis* adalah salah satu diagnosis paling umum pada wanita yang mengunjungi klinik kedokteran genitourinari. Karena 50% kasus vaginosis bakteri tidak menunjukkan gejala, prevalensi sebenarnya dari kondisi ini di masyarakat tidak pasti. Vaginosis bakteri dikaitkan dengan pasangan seksual baru dan sering berganti pasangan seksual. Penurunan tingkat vaginosis bakteri terlihat di antara wanita dalam hubungan seksual monogami, tetapi itu bisa terjadi pada wanita perawan (Mitchell, 2004).

Kekambuhan vaginosis bakteri setelah perawatan adalah umum dan dapat ditingkatkan dengan praktik kebersihan pribadi, seperti douching vagina, yang mengganggu flora normal vagina. Vaginosis bakteri juga dapat dikaitkan dengan IMS bersamaan, umumnya *Trichomonas vaginalis*. Vaginosis bakteri dikaitkan dengan infeksi panggul setelah aborsi yang diinduksi dan pada kehamilan dengan

persalinan prematur dan bayi berat lahir rendah. Trikomoniasis kurang umum di negara-negara kaya tetapi mencapai tingkat tinggi (sering 10-20%) di antara perempuan miskin di negara-negara berkembang serta di antara perempuan kurang beruntung di negara-negara kaya.

Meskipun kandidiasis vulvovaginal dan vaginosis bakteri sering berkembang secara independen dari aktivitas seksual, trikomoniasis terutama ditularkan secara seksual dan telah diberi peringkat oleh WHO sebagai IMS non-virus yang paling umum di dunia dengan sekitar 172 juta kasus baru per tahun (Mitchell, 2004).

#### **4. Gejala Keputihan**

Menurut Wira & Kusumawardani (2011), pada keadaan normal cairan yang keluar dari vagina merupakan gabungan dari cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar yang ada di sekitar vagina seperti kelenjar sebacea, kelenjar keringat, kelenjar bartholin, kelenjar pada serviks atau mulut rahim.

##### **a. Keputihan Fisiologis**

Terdapat beberapa gejala keputihan fisiologis, yaitu:

- 1) Cairan vagina akan tampak jernih, kadang tampak putih keruh sampai kekuningan ketika mengering di pakaian dalam
- 2) Sifat cairan yang dikeluarkan tidak iritatif sehingga tidak menyebabkan gatal, tidak terdapat darah, tidak berbau, dan memiliki pH 3,5 sampai 4,5 sifat asam ini yang merupakan salah satu mekanisme pertahanan terhadap kuman yang menyebabkan penyakit



- 3) Keputihan normal akan tampak seperti cairan putih jernih, sedikit lengket, tidak gatal dan dan tidak berbau
- b. Keputihan Abnormal (Patologis)
- Adapun gejala keputihan abnormal yaitu:
- 1) Keluarnya cairan berwarna putih pekat, putih kekuningan, putih kehijauan atau putih kelabu dari saluran vagina. Cairan ini dapat encer atau kental, lengket dan kadang-kadang berbusa
  - 2) Mengeluarkan bau yang menyengat
  - 3) Pada penderita tertentu, terdapat rasa gatal yang menyertainya serta dapat mengakibatkan iritasi pada vagina
  - 4) Merupakan salah satu ciri-ciri penyakit infeksi vagina yang berbahaya seperti HIV, Herpes, Candyoma

## **5. Faktor Penyebab Keputihan**

Menurut Dinata (2018), faktor penyebab keputihan secara umum meliputi:

- a. Hormon tubuh sedang tidak seimbang
- b. Rusaknya keseimbangan biologis dan keasaman vagina
- c. Gejala dari suatu penyakit tertentu
- d. Kelelahan
- e. Mengalami stress
- f. Kurang menjaga kebersihan vagina
- g. Sering memakai tissue saat membasuh bagian kewanitaan, sehabis buang air kecil dan buang air besar

- h. Memakai pakaian dalam yang ketat dari bahan sintetis, sehingga berkeringat dan memudahkan timbulnya jamur
- i. Sering menggunakan toilet umum yang kotor
- j. Jarang mengganti pembalut
- k. Kebiasaan membilas vagina dari arah yang salah, yaitu dari arah anus ke arah atas menuju vagina
- l. Sering membasuh vagina bagian dalam
- m. Sering menggaruk vagina
- n. Sering bertukar celana dalam/handuk dengan orang lain
- o. Tidak segera mengganti pembalut saat menstruasi
- p. Tidak menjalani pola hidup sehat (makan tidak teratur, tidak pernah olah raga, tidur kurang)
- q. Lingkungan sanitasi yang kotor
- r. Kadar gula darah tinggi (penyakit kencing manis)
- s. Sering mandi berendam dengan air hangat dan panas. Jamur yang menyebabkan keputihan lebih mungkin tumbuh di kondisi hangat
- t. Sering berganti pasangan dalam berhubungan intim

Menurut Marhaeni (2016), terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan keputihan fisiologis dan patologis, yaitu:

- a. Keputihan Fisiologis
  - 1) Bayi yang baru lahir kira-kira 10 hari, keputihan ini disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen dari ibunya
  - 2) Masa sekitar *menarche* atau pertama kalinya haid datang, keadaan ini ditunjang oleh hormon estrogen

- 3) Masa di sekitar ovulasi karena produksi kelenjar rahim dan pengaruh dari hormon estrogen serta progesterone
  - 4) Seorang wanita yang terangsang secara seksual. Rangsangan seksual ini berkaitan dengan kesiapan vagina untuk menerima penetrasi senggama, vagina mengeluarkan cairan yang digunakan sebagai pelumas dalam senggama
  - 5) Kehamilan yang mengakibatkan meningkatnya suplai darah ke vagina dan mulut rahim, serta penebalan dan melunaknya selaput lendir vagina
  - 6) Akseptor kontrasepsi pil yang mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dapat meningkatkan lendir servik menjadi lebih encer
  - 7) Pengeluaran lendir yang bertambah pada wanita yang sedang menderita penyakit kronik
- b. Keputihan Patologis

Adapun faktor penyebab keputihan abnormal, yaitu:

1) Kelelahan fisik

Kelelahan fisik merupakan kondisi yang dialami oleh seseorang akibat meningkatnya pengeluaran energi karena terlalu memaksakan tubuh untuk bekerja berlebihan dan menguras fisik. Meningkatnya pengeluaran energi menekan sekresi hormon estrogen. Menurunnya sekresi hormon estrogen menyebabkan penurunan kadar glikogen. Glikogen digunakan oleh *Lactobacillus doederlein* untuk metabolisme. Sisa dari metabolisme ini adalah

asam laktat yang digunakan untuk menjaga keasaman vagina. Jika asam laktat yang dihasilkan sedikit, bakteri, jamur, dan parasit mudah berkembang.

## 2) Pola Makan

Pola makan adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai macam dan jumlah makanan yang dimakan setiap hari oleh satu orang dan mempunyai ciri khas untuk suatu kelompok masyarakat. Konsumsi makanan adalah jumlah total dari makanan yang tersedia untuk dikonsumsi. Pola makan yang dimaksud disini adalah konsumsi makanan yang dapat memicu kejadian infeksi flour albus meliputi makanan yang proses pengolahannya menggunakan tepung, jenis buah tertentu yang mengandung gula, dan makanan olahan kemasan dengan kadar gula tinggi, serta minuman bersoda.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Darma dkk, (2017), terdapat hubungan antara pola makan dengan terjadinya keputihan seperti seringnya mengkonsumsi makanan dan minuman mengandung gula yang tinggi dapat menyebabkan bakteri lactobacillus tidak dapat meragikan semua gula kedalam asam laktat dan tidak dapat menahan pertumbuhan penyakit, maka jumlah gula menjadi meningkat dan jamur atau bakteri perusak akan bertambah banyak, sehingga dapat memungkinkan terjadinya infeksi flour albus.

Dalam QS. Al-Maidah : 88 berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

" Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya" (QS. Al-Maidah : 88).

Menurut Tafsir As-Sa'di/ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H, kemudian Dia memerintahkan kebalikan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah,"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu," maksudnya, makanlah rezeki yang dikirimkanNya kepadamu dengan berbagai jalan yang dimudahkan, jika itu halal bukan pencurian, bukan merampas hak orang dan bukan pula harta-harta yang lain yang diambil dengan cara tidak benar. Dan makanan itu juga baik, yaitu yang tidak ada keburukan padanya, maka tidak termasuk ke dalamnya binatang buas yang keji dan hewan-hewan yang menjijikkan.

"Dan bertakwalah kepada Allah," dengan menjalankan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya. "Yang kamu berikan kepadaNya," karena imanmu kepada Allah mengharuskanmu bertaqwa kepadaNya dan menjaga hakNya, karena ia tidak sempurna kecuali dengan itu.

Ayat ini menunjukkan bahwa jika seseorang mengharamkan yang halal untuknya, baik itu makanan atau minuman atau hamba sahaya wanita dan lain-lain, maka ia tidak menjadi haram dengan pengharamannya, akan tetapi seandainya dia melakukannya, maka wajib atasnya membayar kafarat sumpah, sebagaimana firman Allah "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (At-Tahrim : 1).

Hanya saja pengharaman istri di dalamnya mewajibkan kafarat zhihar. Termasuk dalam ayat ini adalah hendaknya seseorang menjauhi dan mengharamkan apa-apa yang baik untuk dirinya, akan tetapi dia memakannya untuk membantunya taat kepada Rabbnya.

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-Nya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan-Nya kepada mereka. "*Halal*" di sini mengandung pengertian, halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan "*baik*" adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan sebagainya. Makanan tidak baik, selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan.

Prinsip "halal dan baik" ini hendaknya senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan untuk diri sendiri dan untuk keluarga, karena makanan

dan minuman itu tidak hanya berpengaruh terhadap jasmani, melainkan juga terhadap rohani. "*Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih baik baginya*" (Riwayat at-Tirmidzi).

Dalam ayat lain Allah berfirman: makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahnya:

"*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*" (QS. Al-A'raf : 31).

Menurut Tafsir As-Sa'di/ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H, setelah Allah menurunkan kepada bani Adam pakaian untuk menutupi auratnya dan pakaian indah untuk perhiasan Allah berfirman "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid", yakni tutuplah auratmu ketika shalat, baik yang wajib atau yang sunnah karena menutupnya adalah perhiasan bagi tubuh sebagaimana membukanya berarti membiarkan tubuh dalam keadaan buruk dan tidak pantas.

Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan disini adalah lebih dari sekedar berpakaian yaitu pakaian yang

bersih dan baik, ini mengandung perintah menutup aurat dalam shalat memperindah diri di dalamnya serta kebersihan pakaian tersebut dari kotoran dan najis. Kemudian Ia berfirman "makan dan minumlah" yakni dari yang baik-baik yang Allah rezekikan kepadamu", dan janganlah berlebih-lebihan" dalam hal itu berlebih-lebihan bisa dengan melampaui batas yang halal kepada yang haram.

"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" karena sikap berlebih-lebihan itu dibenci Allah membahayakan tubuh dan kehidupan manusia, bahkan bisa menyebabkan ketidakmampuan untuk memberi nafkah. Jadi ayat ini mengandung perintah makan dan minum larangan meninggalkannya serta larangan berlebih-lebihan padanya.

Agama Islam sangat mengutamakan kesederhanaan. Ia tidak membenarkan umatnya berlebih-lebihan dalam makan, minum, berpakaian dan sebagainya, bahkan dalam beribadah. Sebaliknya, juga tidak dibenarkannya seseorang terlalu menahan diri dari menikmati sesuatu, padahal ia mampu untuk memperolehnya. Apalagi bila sifat menahan diri itu sampai mendorongnya untuk mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan syara'. Setiap orang beriman diperintahkan Allah swt. untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (mengandung gizi dan vitamin yang cukup).



Jadi bagian ayat yang berbunyi halal dan baik (arab: halalan thayyiban) tersebut di atas mengandung makna dua aspek yang akan melekat pada setiap rezeki makanan yang dikonsumsi manusia. Aspek pertama, hendaklah makanan didapatkan dengan cara yang halal yang sesuai dengan syariat Islam yang dicontohkan Rasul. Dalam hal ini mengandung makna perintah untuk bermuamalah yang benar. Jangan dengan cara paksa, tipu, curi, atau dengan cara-cara yang diharamkan dalam syariat Islam.

Sementara dalam aspek baik atau thayyib adalah dari sisi kandungan zat makanan yang dikonsumsi. Makanan hendaknya mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik mutu maupun jumlah. Makanan gizi seimbang adalah yang dianjurkan. Ada makanan yang halal tapi tidak thayyib, misalnya Rasul mencontohkan kepala, kulit dan jeroan binatang sembelihan dibuang. Bahkan beliau bersabda jangan makan tulang karena tulang adalah makanan untuk saudaramu dari bangsa jin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian-bagian tersebut ternyata banyak mengandung zat penyebab kadar kolesterol darah dalam tubuh manusia cepat meningkat.

Rasulullah telah memberikan suri teladan tentang kesederhanaan ini. Dalam segala segi kehidupannya, beliau senantiasa bersifat sederhana, padahal jika beliau mau niscaya beliau dapat saja menikmati segala macam kenikmatan itu sepuas hati. Akan tetapi beliau tidak berbuat demikian, karena sebagai

seorang pemimpin, beliau memimpin dan memberi teladan kepada umatnya, pola hidup sederhana, tetapi tidak menyiksa diri (Quran Kementerian Agama RI ).

### 3) Ketegangan psikis

Ketegangan psikis merupakan kondisi yang dialami seseorang akibat dari meningkatnya beban pikiran akibat dari kondisi yang tidak menyenangkan atau sulit diatasi. Meningkatnya beban pikiran memicu peningkatan sekresi hormon adrenalin. Meningkatnya sekresi hormon adrenalin menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan mengurangi elastisitas pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan aliran hormon estrogen ke organ-organ tertentu termasuk vagina terhambat sehingga asam laktat yang dihasilkan berkurang. Berkurangnya asam laktat menyebabkan keasaman vagina berkurang sehingga bakteri, jamur, dan parasit penyebab keputihan mudah berkembang.

Raqhib Isfahany dalam tafsiran al-Makhtut mengatakan bahwa pada dasarnya penyakit itu ada 2 macam; *hissy* (yang dapat dirasakan lewat indera) dan *nafsi* (yang berkaitan dengan kejiwaan). Kedua-duanya adalah keluar dari keadaan normal. Setiap permasalahan kehidupan yang menimpa diri seseorang dapat mengakibatkan gangguan fungsi orang tubuh. Reaksi tubuh inilah disebut dengan *stress* (Jauhari Iman, 2011).

#### 4) Kebersihan diri

Kebersihan diri merupakan suatu tindakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan untuk kesejahteraan fisik dan psikis, keputihan yang abnormal banyak dipicu oleh cara wanita dalam menjaga kebersihan dirinya, terutama alat kelamin. Kegiatan kebersihan diri yang dapat memicu keputihan adalah penggunaan pakaian dalam yang ketat dan berbahan nilon, cara membersihkan alat kelamin (cebok) yang tidak benar, penggunaan sabun vagina dan pewangi vagina, penggunaan pembalut kecil yang terus menerus di luar siklus menstruasi.

Menurut Hasanah (2016), menjaga kebersihan fisik merupakan hal mendasar bagi seorang Muslim karena berdasarkan pada kaidah yang menyebutkan bahwa di dalam hidup yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Imam muslim menyebutkan bahwa kesucian adalah setengah dari iman. Perintah menjaga kesucian mencakup perintah untuk selalu menjaga kebersihan, dan kebersihan adalah tanda keimanan seseorang.

Penelitian Riza dkk, (2019) merekomendasikan perlu meningkatkan kebersihan organ kewanitaan seperti menggunakan sabun yang lembut untuk membersihkan area vagina, mencukur bulu kemaluan agar terhindar dari kuman, jamur dan bakteri penyebab keputihan, mengganti pembalut 4 jam sekali, mengganti celana dalam jika sudah lembab, selalu membersihkan vagina

dengan air bersih, memilih kontrasepsi yang baik dan hindari organ kewanitaan kontak langsung dengan air sungai.

Kesehatan reproduksi dalam islam berkaitan dengan kebersihan. Kebersihan jasmani lainnya berkaitan dengan perintah untuk menjaga kebersihan hati dengan menikah. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa kebersihan itu harus mendapatkan perhatian yang lebih, hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan penting.

Kebersihan merupakan hal yang disukai Allah. Allah berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {222}

Terjemahnya:

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakan lah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri" (Q.S. al-Baqarah: 222).

Mereka bertanya kepadamu tentang haid, maksudnya haid atau tempatnya dan bagaimana memperlakukan wanita padanya. Katakanlah,"Haid adalah suatu kotoran atau tempatnya kotoran, maka jauhilah bersetubuh dengan mereka (di waktu haid) atau pada

tempatnyanya (dan janganlah kamu dekati mereka) dengan maksud untuk bersetubuh (sampai mereka suci).

'Yathurna' dengan *tha* baris mati atau pakai tasydid lalu *ha'*, kemudian pada *ta'* asalnya di idghamkan kepada *ta'* dengan arti mandi setelah terhentinya. (Apabila mereka telah suci maka datangilah mereka (ditempat yang diperintahkan Allah kepadaMu), jauhilah di waktu haid, dan datangilah di bagian kemaluannya dan jangan diselewengkan kepada bagian lainnya. Sesungguhnya Allah menyukai serta memuliakan dan memberi (orang-orang yang bertaubat) dari dosa (dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri) dari kotoran.

Dalam ayat ini diterangkan para kaum Yahudi memberi larangan yang amat keras untuk mendekati perempuan yang sedang haid itu sampai dia harus menyisihkan diri dan terasingkan. Segala barang yang didudukinya maupun tempat tidurnya najis. Orang bertanya tentang perempuan yang sedang haid, bagaimana hukumnya, apakah sekeras hukum Yahudi itu pula? Maka disuruh Tuhanlah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu: "*Katakanlah: Dia itu adalah gangguan!*" Artinya, di hari-hari perempuan itu sedang berhaid, terganggu keadaannya yang biasa. Atau kotorlah keadaannya pada waktu itu. "*Sebab itu hendaklah kamu menjauhi perempuan-perempuan seketika di berhaid, dan jangan mereka didekati, sehingga mereka telah bersih*".

Menjauhi dan jangan mendekati yang dimaksud bukanlah supaya laki-laki benar-benar menjauh, sehingga sampai berpisah tempat. Janganlah sampai terjadi sebab-sebab yang akan membawa bersetubuh pada waktu dia dalam berhaid itu: "*Maka apabila telah bersuci, maka bolehlah kamu menghampiri mereka sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepada kamu*". Disebut baru boleh didekati, setelah dia bersih. Artinya darah haid tidak keluar lagi, yaitu setelah berlaku enam sampai tujuh hari pada umumnya (Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrultah, 1989).

Mereka bertanya kepadamu tentang haid,  
Juga terdapat dalam surah Al-Muddassir : 4

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ {4}

Terjemahnya:

"...dan bersihkanlah pakaianmu". (QS. Al-Muddassir : 4)

Menurut Tafsir As-Sa'di/ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H, "Dan pakaianmu bersihkanlah". Kemungkinan yang dimaksud dengan pakaian adalah seluruh perbuatan Rasulullah dan maksud membersihkannya adalah memurnikannya, tulus melaksanakannya, dilakukan secara sempurna dan menafikannya dari berbagai hal yang bisa membatalkan, merusak, dan mengurangi pahalanya, seperti syirik, riyah, nifaq, ujub, takabur, lalai dan lain sebagainya yang diperintahkan untuk ditinggalkan dalam beribadah menyembah Allah.

Perintah ini juga mencakup perintah untuk menyucikan baju dari najis karena hal itu adalah termasuk salah satu penyempurna kebersihan amal, khususnya dalam shalat sebagaimana yang dinyatakan oleh kebanyakan ulama bahwa menghilangkan najis merupakan salah satu syarat shalat. Bisa juga yang dimaksud dengan baju adalah baju yang kita kenal. Artinya, Rasulullah diperintahkan untuk mensucikannya dari seluruh najis di seluruh waktu, khususnya ketika masuk waktu shalat.

Kebersihan adalah satu pokok yang penting bagi menarik perhatian orang. Kebersihan pakaian besar pengaruhnya kepada sikap hidup sendiri. Kebersihan menimbulkan harga diri, yaitu hal yang amat penting dijaga oleh orang-orang yang hendak tegak menyampaikan dakwah ke tengah-tengah masyarakat. Pakaian yang kotor menyebabkan jiwa sendiri pun turut kusut masai. Tiap-tiap manusia yang beriman akan merasakan sendiri betapa besar pengaruh pakaian yang bersih itu kepada hati sendiri dan kepada manusia yang di keliling kita.

Itu sebabnya maka setelah syariat Islam berdiri, Rasulullah pun selalu menganjurkan kebersihan. Dan beliau pun selalu membersihkan giginya, menggosok dan menyikat dengan semacam urat kayu, yang terkenal dengan nama kayu irak, yang harum baunya. Dan beliau pun suka pula memakai yang harum-harum, terutama ketika akan pergi mengerjakan sembahyang Jum'at. Kebersihan sangat membuka bagi pikiran dan kekotoran atau bau

busuk tidak layak di tengah majelis, sehingga beliau pandang makruh (tidak memakan makanan yang baunya kurang enak jika akan pergi ke masjid berjamaah, apalagi berjumat).

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat para ulama tentang rathubah (lendir/cairan) farji, yaitu air putih yang seperti madzi dan keringat, bahwasanya jika keluar dari balik daerah yang wajib dicucinya dalam mandi janabah secara yakin hingga batas zahir walaupun tidak sampai keluar (dari libang kemaluan), maka membatalkan wudhu. Atau keluar dari batasan luar yaitu daerah yang wajib dicucinya ketika mandu janaabah, yaitu daerah yang bisa terlihat ketika wanita jongkok saat akan kencing, maka tidak membatalkan wudhu. Begitu pula jika wanita itu ragu darimana keluarnya, menurut pendapat ashhab yang lebih diakui.

Dan adapun hukumnya, yaitu lendir yang keluar dari batas luar itu yakin suci, dan yang keluar dari area yang bisa dicapai oleh zakar lelaki yang bersetubuh itu pun suci menurut pendapat yang ashah. Dan yang keluar dari area yang lebih maka itu yakin najis. Inilah pendapat yang dipegang teguh oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tufrah dan lainnya. Sedangkan dalam fatwa dari pendapat Muhammad Ramli, maka cairan yang keluar dari batin itu mutlak najis (Arifin & Wahidah, 2018).

## **6. Faktor Risiko Keputihan**

*Fluor albus (leukorea, keputihan, white discharge)* adalah nama gejala yang diberikan pada cairan yang keluar dari vagina selain darah. *Fluor*



*albus* bukan merupakan penyakit melainkan salah satu tanda gejala dari suatu penyakit organ reproduksi wanita. Gejala ini diketahui karena adanya sekret yang mengotori celana dalam. *Fluor albus* atau *leukorea* merupakan pengeluaran cairan pervagina yang bukan darah. *Leukorea* merupakan manifestasi klinis berbagai infeksi, keganasan, atau tumor jinak reproduksi gejala ini tidak menimbulkan mortalitas, tetapi morbiditas karena selalu membasahi bagian dalam wanita dan dapat menimbulkan iritasi, terasa gatal sehingga mengganggu, dan mengurangi kenyamanan dalam berhubungan seks (Khuzaiyah dkk, 2015).

## **7. Dampak Keputihan**

Keputihan tidak normal yang dibiarkan begitu saja akan menyebabkan terjadinya penyebaran infeksi meluas ke bagian atas dari saluran genetalia dan reproduksi wanita serta penyebaran ke saluran kencing. Hal tersebut menyebabkan infeksi yang disebut penyakit radang panggul. Penyakit radang panggul meliputi infeksi pada bagian uterus atau rahim wanita baik pada jaringan ikatnya ataupun bagian otot dari uterus tersebut. Infeksi juga dapat mengenai saluran telur atau bagian tuba wanita yang kemudian bisa menjalar menjadi infeksi pada indung telur atau ovarium.

Pada penyakit radang panggul seorang wanita akan mengalami demam tinggi, sakit kepala, lemas seluruh badan, nyeri pada bagian perut bawah, dan keputihan yang banyak disertai nanah. Pada infeksi radang panggul yang sering berulang atau berlangsung lama lebih dari 6 bulan dapat dikatakan telah menjadi kronis. Gejala dan tanda akan dialami oleh seorang wanita dengan radang panggul yang bersifat kronis antara lain

adanya perdarahan, nyeri haid yang hebat, demam yang tak kunjung hilang, terasa nyeri dan keras pada perut bagian bawah, serta bertambah nyeri jika ditekan, kemungkinan terjadi infertilitas atau kemandulan akan cenderung meningkat (Wira & Kusumawardani, 2011).

Menurut Sugi (2009), keputihan yang sudah kronis dan berlangsung lama akan lebih susah diobati. Selain itu bila keputihan yang dibiarkan bisa merembet ke rongga rahim kemudian ke saluran indung telur dan sampai ke indung telur dan akhirnya ke dalam rongga panggul. Tidak jarang wanita yang menderita keputihan yang kronis (bertahun-tahun) bisa menjadi mandul bahkan bisa berakibat kematian. Berakibat kematian karena bisa mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar kandungan. Kehamilan di luar kandungan, terjadi pendarahan, sehingga mengakibatkan kematian pada wanita. Selain itu yang harus diwaspadai, keputihan adalah gejala awal dari kanker mulut rahim.

Dampak keputihan dapat terjadi perlengketan pada rahim, saluran telur atau tuba falopi sampai pembusukan indung telur oleh infeksi yang berat bisa terjadi tuba-ovarium abses atau kantung nanah yang menekan saluran telur dan indung telur, apabila kedua sisi kanan dan kiri dari tuba ovarium yang tertekan abses maka dapat dikatakan bahwa wanita tidak akan bisa mendapatkan keturunan atau mandul (Khuzaiyah dkk, 2015).

## **8. Pencegahan Keputihan**

Menurut Kusumanityas (2017), karena banyaknya ragam penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi, maka pengetahuan terkait cara menjaga

kesehatan organ reproduksi dengan baik dan benar sangat penting. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi, yaitu:

a. Memakai celana dalam dari bahan katun

Celana katun dapat menyerap keringat sehingga dapat terhindar dari keputihan.

b. Mengeringkan organ reproduksi

Setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar, sebaiknya mengeringkan organ reproduksi menggunakan handuk. Tidak disarankan untuk menggunakan tisu karena terdapat zat pemutih yang menempel di organ reproduksi.

c. Jangan menggunakan obat pembersih wanita

Sebaiknya tidak memakai obat pembersih wanita karena zat dalam obat pembersih dapat merangsang pertumbuhan bakteri dan jamur penyebab keputihan. Alasannya adalah pH yang tidak seimbang justru mematikan bakteri baik yang ada di vagina. Kadar keasaman yang tidak sesuai menjadi penyebab timbulnya bakteri jahat di dalam organ reproduksi.

d. Rajin mencuci tangan

Jika tangan kita belum dibersihkan dari kuman, kemudian menyentuh organ reproduksi maka kuman dan bakteri yang menempel di tangan berpindah ke tempat organ reproduksi sehingga masalah kesehatan akan muncul.

e. Membasuh organ reproduksi dengan benar

Cara yang salah dapat menyebabkan berbagai macam gangguan masalah kesehatan kelamin muncul. Cara membasuh yang benar adalah dari arah depan ke belakang. Jika membasuh dari belakang ke depan akibatnya akan memasukkan bakteri yang ada di dubur menuju kemaluan. Hal itu berbahaya sebab kuman akan menyebabkan berbagai macam infeksi.

f. Jangan menggaruk kemaluan

Ketika jamur, kuman, dan bakteri berkembang biak di kulit kemaluan akan menyebabkan rasa gatal. Menggaruk dapat menyebabkan iritasi yang akan terasa perih dan menyebabkan kemaluan menjadi luka.

g. Rajin mengganti *panty liner*

Bagi wanita yang suka menggunakan *panty liner* ketika sedang keputihan atau sehabis menstruasi sebaiknya rajin mengganti *panty liner* agar tidak terlalu lembab karena jika *panty liner* lembab akibatnya adalah bakteri dan kuman berkembang biak dan menjadi penyebab gangguan organ reproduksi.

h. Menjaga kebersihan organ reproduksi saat menstruasi

Saat menstruasi kuman dan bakteri akan mudah berkembang biak sehingga wanita akan mudah terserang gatal-gatal. Organ reproduksi yang gatal menjadi tanda bahwa ada perkembangan dan pertumbuhan bakteri di dalam organ reproduksi. Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah rajin mengganti pembalut dan membersihkan badan,

sebab saat menstruasi kelenjar keringat akan memproduksi banyak keringat.

i. Hindari gula dan kafein

Untuk menjaga organ reproduksi sebaiknya hindari mengonsumsi terlalu banyak gula dan kafein. Bahaya kafein bagi tubuh dapat menyebabkan insomnia dan ketergantungan, dan apabila di konsumsi pada saat menstruasi akan menyebabkan kram pada perut. Kopi dan gula tidak boleh di konsumsi oleh wanita pada hari-hari biasa sebab vagina akan mengeluarkan cairan yang berlebihan sehingga timbul keputihan dan vagina akan terasa lebih lembab.

j. Hindari konsumsi alkohol

Sebaiknya menghindari mengonsumsi alkohol karena didalam kandungan alkohol tinggi akan gula dan tinggi akan zat-zat yang tidak baik bagi organ reproduksi terutama sel telur yang berpengaruh terhadap kesuburan.

k. Membersihkan kelamin sebelum berhubungan badan

Bagi pasangan suami istri yang ingin berhubungan badan sebaiknya membersihkan kelamin terlebih dahulu yang bertujuan untuk membersihkan kuman dan bakteri yang menempel di alat kelamin.

l. Menjaga berat badan ideal

Untuk menjaga kesehatan reproduksi harus menjaga berat badan ideal. Pada wanita yang memiliki berat badan yang ideal akan terhindar dari cairan vagina yang berlebihan.

Menurut Marhaeni (2016), terdapat beberapa cara untuk mencegah keputihan, yaitu:

- a. Menjaga kebersihan kemaluan
- b. Menjaga kebersihan pakaian dalam
- c. Tidak bertukar handuk
- d. Menghindari celana ketat
- e. Menghindari produk pembersih kemaluan
- f. Mencuci tangan sebelum dan sesudah mencuci kemaluan
- g. Sering mengganti pembalut
- h. Mengelola stres

Adapun menurut Arthanasia (2011), cara yang dapat dilakukan untuk mencegah keputihan adalah makan menggunakan metode gizi seimbang yang rendah gula dan menjaga kesehatan secara umum dengan cukup tidur, berolahraga, dan melepaskan tekanan emosi.

## **9. Penatalaksanaan Keputihan**

Dalam artikel yang ditulis oleh dr.Sutisna (2019), penatalaksanaan keputihan harus disesuaikan dengan etiologi penyakitnya dan mencakup tidak hanya medikamentosa, tetapi juga edukasi untuk efektivitas dari pengobatan dan pencegahan *recurrence*. Pada keputihan fisiologis, pasien harus di edukasi dan diyakinkan bahwa cairan yang keluar merupakan cairan normal, dan pasien tidak perlu melakukan douche vagina. Pada kasus tanpa komplikasi, keputihan dapat ditangani di fasilitas kesehatan primer. Rujukan ke spesialis dipertimbangkan bila terdapat kondisi keputihan berulang, kehamilan, dan komplikasi.

Dalam melakukan pengobatan, perlu dilakukan pemeriksaan, yaitu anamnesis dengan menanyakan usia dan karakteristik keputihan seperti warna, kekentalan, gatal, dan penyakit penyerta yang timbul seperti sakit saat buang air kecil. Selain itu, perlu menanyakan riwayat tingkah laku dan kebiasaan, riwayat kesehatan seperti diabetes mellitus dan penyakit yang menyebabkan penurunan imunitas, riwayat hubungan seksual, riwayat penggunaan antibiotik, dan riwayat penggunaan douche vagina.

Pada pemeriksaan fisik, khususnya pemeriksaan ginekologi, inspeksi dilakukan pada daerah genital dan dapat dilakukan inspekulo pada wanita yang sudah menikah. Warna dan bentuk duh dapat terlihat pada inspekulo. Gambaran dari pemeriksaan fisik dengan inspekulo yang khas dapat ditemukan pada *candidiasis* dan *trichomoniasis*. Pada *candidiasis*, tampak plak keputihan pada mukosa atau seperti keju yang bergumpal. Pada *trichomoniasis*, tanda yang khas yang dapat ditemukan pada inspekulo adalah *colpitis macularis* atau *strawberry cervix*. Pada pemeriksaan penunjang, dapat dilakukan swab vagina dengan uji pH dan tes Whiff serta pemeriksaan mikroskopis untuk menentukan organisme penyebab keputihan (Sutisna, 2019).

Antimikroba untuk keputihan dipilih berdasarkan penyebab yang mendasari, yaitu:

a. Bakterial Vaginosis

Pilihan pengobatan untuk bakterial vaginosis adalah metronidazole 2 x 500 mg selama 7 hari. Pilihan pengobatan lain antara lain dengan gel metronidazole 0.75% sehari sekali selama 5

hari (intravagina) atau krim klindamisin 2% sehari sekali di malam hari selama 7 hari. Klindamisin oral 2 x 300 mg dapat diberikan selama 7 hari sebagai alternatif dari metronidazol.

b. *Candidiasis*

*Candidiasis* tanpa komplikasi dapat diberikan antifungi golongan azol lokal (intra vaginal) seperti klotrimazol, butokonazol dan mikonazol dalam 2 – 3 hari, atau pemberian fluconazole oral dosis tunggal 150 mg. Pada kasus yang berat dan akut dapat diberikan fluconazole 150 mg setiap 72 jam dengan total 2 – 3 dosis.

Penggunaan golongan azol tidak efektif pada infeksi *Candida* yang bukan *Candida albicans*. Pilihan obat yang dapat digunakan pada infeksi akibat *Candidiasis glabrata* adalah *nystatin suppositoria* intravena dengan dosis 100.000 unit per hari selama 14 hari.

Pada kondisi *candidiasis vulvovaginitis* yang berulang, setelah dilakukan induksi dengan fluconazole topikal atau oral, dapat diteruskan dengan fluconazole 150 mg setiap minggu selama 6 bulan. Perlu diingat bahwa fluconazole oral dikontraindikasikan pada kehamilan. Hubungan seksual sebaiknya dihindari dalam masa pengobatan hingga 7 hari pasca selesai regimen.

c. *Chlamydia*

Pengobatan yang direkomendasikan oleh CDC untuk infeksi *chlamydia* adalah azithromycin 1 gram dosis tunggal atau doxycycline 2 x 100 mg selama 7 hari. Alternatif yang lain adalah eritromisin 4 x 500 mg selama 7 hari, atau levofloxacin 1 x 500 mg



selama 7 hari. Perlu diperhatikan juga bahwa sebagai infeksi menular seksual, pada kasus *clamidiasis* pasangan seksual dari pasien juga direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi dan pemeriksaan.

d. Gonorrhea

Pengobatan yang direkomendasikan oleh CDC untuk infeksi gonorrhea adalah ceftriaxone 250 mg IM dosis tunggal atau cefixime 400 mg per oral dosis tunggal. Alternatif yang lain adalah doxycycline 1 x 100 mg selama 7 hari. Pasangan seksual juga disarankan untuk dilakukan evaluasi dan pemeriksaan.

e. Trikomoniasis

Pengobatan yang direkomendasikan CDC untuk trikomoniasis adalah metronidazole 2 gram dosis tunggal atau 2 x 500 mg selama 7 hari. Perlu diingat bahwa pada penggunaan metronidazole, konsumsi alkohol harus dihindari selama 24 jam setelah selesai dosis terakhir. Pasangan seksual juga perlu dilakukan evaluasi seperti pada penyakit infeksi menular seksual lainnya.

### ***C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan***

#### **1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan**

Dalam bukunya, Varney (1997) menjelaskan bahwa proses penyelesaian masalah dapat digunakan dalam manajemen kebidanan. Dalam buku kebidanan yang ditulisnya tahun 1981, proses manajemen kebidanan diselesaikan melalui lima langkah. Namun, setelah menggunakannya, Varney (1997) melihat ada beberapa hal penting yang harus disempurnakan. Ia menambahkan dua langkah untuk

menyempurnakan teori lima langkah yang dijelaskan sebelumnya (Saminem, 2009: 14).

Manajemen kebidanan dapat digunakan oleh bidan di dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan kesehatan ibu dan anak dalam lingkup dan tanggung jawabnya (Mamik, 2017: 272).

## **2. Langkah-Langkah Manajemen Asuhan Kebidanan**

Adapun 7 tahapan manajemen asuhan kebidanan, yaitu:

### **a. Langkah I. Identifikasi data dasar**

Pada langkah pertama, dilakukan pengkajian melalui proses pengumpulan data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan, peninjauan catatan terbaru atau catatan sebelumnya, data laboratorium dan membandingkannya dengan hasil studi. Semua data dikumpulkan dari semua sumber yang berhubungan dengan kondisi klien.

Pertama, pada anamnesis akan diperoleh data mengenai nama, umur, alamat, status perkawinan (lamanya), kesiapan untuk hamil dan mempunyai keturunan (berapa jumlah anak yang diinginkan), pengetahuan tentang KB, hubungan seksual pranikah, permainan pendahuluan, dan pencapaian kepuasan hubungan seks, teknik hubungan seks dan berapa kali melakukan hubungan seks dalam seminggu (Manuaba, 2009).

Perlu juga ditanyakan apakah memiliki riwayat keputihan dengan melihat dari karakteristik keputihan seperti warna, kekentalan, gatal, dan penyakit penyerta yang timbul seperti sakit saat buang air kecil. Selain itu, perlu menanyakan riwayat tingkah laku dan kebiasaan, riwayat kesehatan seperti diabetes mellitus dan penyakit yang menyebabkan penurunan imunitas, riwayat hubungan seksual, riwayat penggunaan antibiotik, dan riwayat penggunaan douche vagina (Sutisna, 2019).

Kedua, yaitu akan didapatkan data objektif dengan melakukan pemeriksaan fisik umum (paru-jantung, abdomen, tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu) dapat dilakukan dengan alur bantu seperti ronsen dan ultrasonografi. Pemeriksaan fisik khusus yang dilakukan antara lain pemeriksaan terhadap alat reproduksi wanita, melalui pemeriksaan dalam dengan melakukan pap smear. Inspeksi dilakukan pada daerah genital dan dapat dilakukan inspekulo pada wanita yang sudah menikah. Warna dan bentuk duh dapat terlihat pada inspekulo. Pada pemeriksaan penunjang, dapat dilakukan swab vagina dengan uji pH dan tes Whiff serta pemeriksaan mikroskopis untuk menentukan organisme penyebab keputihan (Sutisna, 2019).

Ketiga, pemeriksaan laboratorium juga penting dilakukan untuk mengetahui penyakit yang dapat mempengaruhi perkawinan dan kehamilan. Pada pemeriksaan laboratorium dilakukan pemeriksaan dasar dengan darah lengkap, pemeriksaan tinja, fungsi organ vital (hati dan ginjal), gula darah, dan terhadap virus hepatitis B/ C. Selain itu,

pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui adanya penyakit hubungan seksual dengan VDRL, preparat gonore, TORCH (toksoplasmosis, rubella, chlamydia trachomatis, virus herpes cytomegalovirus), dan HIV/AIDS (Manuaba, 2009).

b. Langkah II. Interpretasi Data Dasar

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan, sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik.

Diagnosis keputihan ditegakkan berdasarkan data subjektif dan data objektif yang didapatkan dari pasien dan pada pemeriksaan fisik serta pemeriksaan laboratorium. Pada keputihan normal (fisiologis) memiliki karakteristik seperti cairan berwarna bening, kadang-kadang putih kental, tidak berbau, dan tanpa disertai dengan keluhan, seperti rasa gatal, nyeri, dan terbakar serta jumlahnya sedikit (Hanifa Wiknjastro, 2007).

Pada keputihan abnormal (patologis) memiliki karakteristik seperti terdapat banyak leukosit, jumlahnya banyak, timbul terus menerus, warnanya berubah seperti kuning, hijau, abu-abu, dan menyerupai susu, disertai dengan keluhan gatal, panas, dan nyeri serta berbau apek, amis, dan busuk (Daili, Fahmi S dkk, 2009). Keputihan patologis ditandai dengan jumlah cairan yang dikeluarkan banyak,

berwarna kuning, hijau, merah kecoklatan (karena bercampur darah), putih seperti susu basi, berbau amis/busuk (Citrawathi, 2014).

Gambaran dari pemeriksaan fisik dengan inspekulo yang khas dapat ditemukan pada *candidiasis* dan *trichomoniasis*. Pada kandidiasis, tampak plak keputihan pada mukosa atau seperti keju yang bergumpal. Pada *trichomoniasis*, tanda yang khas yang dapat ditemukan pada inspekulo adalah *colpitis macularis* atau *strawberry cervix*.

c. Langkah III: Mengidentifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Langkah ini sangat penting dalam melakukan asuhan yang aman.

Menurut Sugi (2009), keputihan yang sudah kronis dan berlangsung lama akan lebih susah diobati. Selain itu bila keputihan yang dibiarkan bisa merembet ke rongga rahim kemudian ke saluran indung telur dan sampai ke indung telur dan akhirnya ke dalam rongga panggul. Tidak jarang wanita yang menderita keputihan yang kronis (bertahun-tahun) bisa menjadi mandul bahkan bisa berakibat kematian. Berakibat kematian karena bisa mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar kandungan. Kehamilan di luar kandungan, terjadi pendarahan,

sehingga mengakibatkan kematian pada wanita. Selain itu yang harus diwaspadai, keputihan adalah gejala awal dari kanker mulut rahim.

Dampak keputihan dapat terjadi perlengketan pada rahim, saluran telur atau tuba falopi sampai pembusukan indung telur oleh infeksi yang berat bisa terjadi tuba-ovarium abses atau kantung nanah yang menekan saluran telur dan indung telur, apabila kedua sisi kanan dan kiri dari tuba ovarium yang tertekan abses maka dapat dikatakan bahwa wanita tidak akan bisa mendapatkan keturunan atau mandul (Khuzaiyah dkk, 2015).

d. Langkah IV: Melakukan Tindakan Segera Atau Kolaborasi

Pada langkah ini dilakukan oleh bidan dengan melakukan identifikasi dan menetapkan beberapa kebutuhan setelah diagnosis dan masalah ditegakkan. Kegiatan bidan pada tahap ini adalah dengan konsultasi, kolaborasi dan melakukan rujukan (Wildan & Hidayat, 2009: 38). Petugas kesehatan yang ikut berperan dalam perencanaan kehamilan diantaranya dokter, ahli gizi, bidan dan dokter spesialis kandungan (Anggraeny & Arisetiningsih, 2017: 9-10).

e. Langkah V: Perencanaan Tindakan/ Intervensi

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya dan merupakan lanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diadaptasi. Setiap rencana asuhan harus disertai oleh klien dan bidan agar dapat melaksanakan dengan efektif.

Rencana asuhan kesehatan prakonsepsi asuhan yang dilakukan yaitu:

- 1) Melakukan kunjungan ke tempat pelayanan kesehatan secara teratur
- 2) Pemberian edukasi terkait kesehatan prakonsepsi dan kehamilan seperti skrining berat badan, vaksinasi, status zat besi dan asam folat, pengkajian konsumsi alkohol, dan riwayat penyakit
- 3) Pemberian konseling terkait modifikasi kebiasaan individu.

Adapun yang perlu dilakukan adalah konseling prakonsepsi, yaitu dokter umum yang mengundang perempuan atau pasangan untuk melakukan kunjungan sebelum masa kehamilan dan kelompok komunitas yang memberikan pendidikan kepada perempuan tentang kesiapan kehamilan dan melahirkan. Konseling prakonsepsi dapat menurunkan mortalitas neonatus yang diduga karena meningkatnya *antenatal care* dan suplementasi zat besi maupun asam folat (Bhutta dan Lassi, 2015).

Penatalaksanaan keputihan harus disesuaikan dengan etiologi penyakitnya dan mencakup tidak hanya medikamentosa, tetapi juga edukasi untuk efektivitas dari pengobatan dan pencegahan rekurensi. Pada keputihan fisiologis, pasien harus di edukasi dan diyakinkan bahwa cairan yang keluar merupakan cairan normal, dan pasien tidak perlu melakukan *douche* vagina (Sutisna, 2019).

Pasien dengan keputihan perlu melakukan beberapa tindakan pemeliharaan organ reproduksi, seperti memakai celana dalam dari

bahan katun, rajin mengganti celana dalam, mengeringkan organ reproduksi, jangan menggunakan obat pembersih wanita, rajin cuci tangan, membasuh organ reproduksi dengan benar, jangan menggaruk kemaluan, rajin mengganti pantyliner, menjaga organ reproduksi saat menstruasi, hindari konsumsi gula dan kafein, hindari konsumsi alkohol, membersihkan kelamin sebelum berhubungan badan, dan menjaga berat badan ideal (Kusumanityas, 2017).

Cara lain yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan kemaluan, menjaga kebersihan pakaian dalam, tidak bertukar handuk, menghindari celana ketat, menghindari produk pembersih kemaluan, mencuci tangan sebelum dan sesudah mencuci kemaluan, sering mengganti pembalut, dan mengelola stress (Marhaeni, 2016). Pada kasus tanpa komplikasi, keputihan dapat ditangani di fasilitas kesehatan primer. Rujukan ke dokter spesialis dipertimbangkan bila terdapat kondisi keputihan berulang, kehamilan, dan komplikasi.

f. Langkah VI: Pelaksanaan Tindakan

Pada langkah keenam ini merupakan tahap pelaksanaan dari semua rencana yang telah diuraikan pada langkah V sebelumnya, baik terhadap masalah pasien ataupun diagnosis yang ditegakkan. Perencanaan ini bisa dilakukan oleh bidan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya (Wildan & Hidayat, 2009: 39).



g. Langkah VII: Evaluasi

Pada langkah ketujuh ini merupakan tahap akhir dalam manajemen kebidanan, yakni dengan melakukan evaluasi dari perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan bidan (Wildan & Hidayat, 2009: 39). Yang dilakukan oleh bidan adalah mengevaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar –benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaan. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedang sebagian belum efektif (Mamik, 2017: 279).

### 3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Metode empat langkah yang dinamakan SOAP (Subjektif, Objektif, *Assessment, Planning*) disarikan dari proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan, dipakai untuk mendokumentasikan asuhan pasien dalam rekam medis sebagai catatan kemajuan pasien (Purwandari, 2008: 83).

- a. S (Subjektif) adalah segala bentuk pernyataan atau keluhan dari pasien sebagai langkah I Varney
- b. O (Objektif) adalah data yang diobservasi dari hasil pemeriksaan oleh bidan/tenaga kesehatan lain sebagai langkah I Varney
- c. A (*Assessment*) adalah kesimpulan dari objektif dan subjektif sebagai langkah II, III, IV Varney

- d. P (*Planning*) adalah rencana tindakan yang dilakukan berdasarkan analisis sebagai langkah V, VI, VII Varney (Wildan & Hidayat, 2009:24).

### BAB III

#### TELUSURAN *EVIDENCE BASED LEARNING*

##### A. Matriks Langkah 1

###### Matriks Pengertian Keputihan

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Manajemen Terkini Keputihan ( <i>Fluor Albus</i> ) dan Discar Uretra	Wiraguna A.	2010	Definisi Keputihan	<i>Fluor Albus</i> atau keputihan adalah keadaan keluarnya cairan dari vagina atau leher rahim pada wanita. Keputihan ditentukan sebagai keputihan patologis jika disertai dengan perubahan bau dan warna serta jumlah yang tidak normal. Keluhan dapat disertai dengan edema genital,	Tidak didapatkan kelemahan dari definisi terkait.	Menggunakan referensi yang banyak sehingga dapat dijadikan sebagai perbandingan dari jurnal yang lain.	Definisi pada sumber ini serupa dengan Kusmiran, E. (2011) yaitu keputihan merupakan keluarnya cairan dari vagina tergantung dari jenis cairan yang keluar.

					disuria, nyeri perut bagian bawah, atau nyeri punggung bawah			
2	Kesehatan Wanita "Keputihan All About Miss V Series 1"	Dr. Gede Wira Buanayuda & Ni Wayan Suanita Kusumawardani, S.Ked	2011	Pengertian Keputihan	Dari sudut pandang kedokteran, keputihan disebut dengan istilah " <i>fluor albus</i> " ataupun " <i>leukorea</i> " yang berarti cairan yang keluar dari alat genetalia serta bukan merupakan darah. Keputihan bisa bersifat normal maupun tidak normal yang menggambarkan bagian gejala dari suatu penyakit.	Tidak didapatkan kelemahan dalam referensi terkait.	Penjelasan pengertian keputihan mudah dimengerti.	Pengertian dari sumber ini sama dengan pernyataan Ida Bagus Surya Manuaba (2009) mengenai terjadinya keputihan merupakan bagian dari suatu gejala dari penyakit.

3	Solusi Problem Wanita Dewasa	Dini Kasdu	2010	Definisi Keputihan	Keputihan merupakan gejala yang sering dialami oleh sebagian besar wanita sepanjang siklus kehidupannya mulai dari masa remaja, masa reproduksi maupun masa menopause.	Tidak didapatkan kelemahan pada sumber ini	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menggunakan banyak referensi sehingga didapatkan perbandingan dari sumber lain.	Pengertian pada sumber ini serupa dengan pengertian dari Murtiastutik (2008) yaitu keputihan merupakan gejala dari suatu penyakit.
4	Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita	Eny Kusmiran	2011	Pengertian Keputihan	Keputihan merupakan keluarnya cairan tidak hanya darah dari liang vagina di luar kebiasaan, baik berbau maupun tidak, dan diikuti rasa gatal setempat.	Tidak didapatkan kelemahan pada referensi ini	Sumber ini menggunakan referensi yang banyak	Definisi pada sumber ini serupa dengan Wiraguana A. (2010) yaitu keputihan merupakan keluarnya cairan dari vagina tergantung dari jenis cairan yang keluar.

5	Memahami Kesehatan Wanita Reproduksi	Ida Ayu Chandranita Manuaba	2009	Pengertian Keputihan	<p><i>Leukorea</i> berasal dari kata <i>Leuco</i> yang berarti benda putih yang disertai dengan akhiran <i>-rrhea</i> yang berarti aliran atau cairan yang mengalir.</p> <p><i>Leukorea</i> atau <i>fluor albus</i> atau keputihan atau <i>vaginal discharge</i> merupakan semua pengeluaran dari kemaluan yang bukan darah. Keputihan merupakan salah satu tanda dari proses ovulasi yang terjadi di dalam tubuh. Selain itu, keputihan juga</p>	Tidak didapatkan kelemahan dalam referensi terkait	Penjelasan pengertian keputihan mudah dipahami	Pengertian oleh Dr. Gede Wira Buanayuda & Ni Wayan Suanita Kusumawardani, S.Ked (2011) sama dengan pernyataan Ida Bagus Surya Manuaba (2009) mengenai terjadinya keputihan merupakan bagian dari suatu gejala dari penyakit.
---	--------------------------------------	-----------------------------	------	----------------------	---	--	--	--

					merupakan salah satu tanda dari suatu penyakit.			
6	Buku Ajar Infeksi Menular Seksual	Dwi Murtiastutik	2008	Definisi Keputihan	<i>Fluor Albus</i> atau keputihan bukan merupakan penyakit melainkan salah satu tanda gejala dari suatu penyakit organ reproduksi wanita, akan tetapi masalah keputihan ini jika tidak ditangani akan menyebabkan masalah yang serius.	Tidak didapatkan kelemahan pada sumber ini	Menggunakan referensi yang banyak dan bahasa mudah dipahami	Pengertian ini sama dengan pernyataan oleh Kasdu (2010) yaitu keputihan merupakan gejala dari suatu penyakit

### Matriks Tanda Gejala dan Etiologi

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Keputihan Patologis Siswi SMAN 1 Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara	Abrori, Andri Dwi Hernawan, dan Ermulyadi	2017	Faktor penyebab terjadinya keputihan	Faktor penyebab terjadinya keputihan antara lain pengetahuan vulva hygiene yang kurang baik dengan tidak mengeringkan genital setelah buang air kecil (BAK), menggunakan pakaian dalam berulang, menggunakan pakaian dalam yang ketat, tidak menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun,	Tidak didapatkan kelemahan dalam penelitian ini.	Pengambilan sampel menggunakan teknik <i>proportional simple random sampling</i> terhadap populasi dengan 59 responden. Teknik analisa data menggunakan analisa univariat dengan menampilkan variabel-variabel yang di teliti dengan menghitung frekuensi dan	Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Umi Salamah, Djati Wulan Kusumo, Desi Nurlela Mulyana (2020) yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya keputihan adalah kebiasaan menggunakan iritan atau sabun pembersih genetalia, kebiasaan berkemih



					membasuh organ kewanitaan ke arah yang salah, tidak segera mengganti pembalut ketika menstruasi, menggunakan sabun pembersih vagina, penggunaan antibiotic, dan penggunaan toilet umum.		presentase.	yang kurang baik dengan tidak mengeringkan alat genetalia setelah BAK atau BAB, dan tidak menggunakan pakaian dalam dari bahan katun.
2	Hubungan Pekerjaan Dan Vulva Hygiene Dengan Kejadian Keputihan Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Sungai Bilu Banjarmasin	Anita Herawati, Dede Mahdiyah, dan Husnul Khatimah	2016	Tanda dan Gejala Keputihan	Keputihan yang fisiologis berwarna jernih, tidak berbau, tidak gatal dan tidak pedih, sedangkan keputihan yang patologis jumlahnya banyak, warnanya	Referensi yang digunakan pada penelitian tampak sedikit.	Menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional.	Terdapat persamaan pendapat dengan Diding Akuaria Dewi Erma dan Yuli Irnawati terkait tanda dan gejala dari keputihan patologis yaitu berwarna kuning sampai

					kuning atau kehijauan, warna putih seperti susu basi, disertai rasa gatal, pedih terkadang disertai bau amis atau busuk.			kehijauan, berbau, disertai rasa gatal.
3	Hubungan Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Keputihan Dengan Kunjungan Saat Mengalami Keputihan Ke BPS Sri Wahyuni Desa Babalan Kecamatan Gabus Kabupaten	Diding Akuarita Dewi Erma dan Yuli Irnawati	2011	Tanda dan Gejala Keputihan	Keputihan patologis ditandai dengan jumlahnya yang amat banyak, berwarna, berbau, dan disertai dengan keluhan-keluhan seperti gatal, nyeri, terjadi pembengkakan, panas dan pedih ketika buang air kecil, serta nyeri di perut	Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi korelasi dengan metode pendekatan analitik dengan menggunakan metode <i>survey cross sectional</i> .	Menggunakan sampel yang banyak, yaitu 445 orang namun dibulatkan menjadi 45 orang dengan menggunakan teknik sampling secara acak atau <i>random sampling</i> .	Terdapat persamaan pendapat dengan Anita Herawati, Dede Mahdiyah, dan Husnul Khatimah terkait tanda dan gejala dari keputihan patologis yaitu berwarna kuning sampai kehijauan, berbau, disertai rasa

	Pati				bagian bawah.			gatal.
4	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keputihan Pada Wanita Usia Subur (WUS) di RT 04 RW 03 Kelurahan Rowosari Semarang	Rika Puji Rahayu, Fitriani Nur Damayanti, & Indri Astuti Purwanti	2015	Faktor fisiologis keputihan yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor hormonal yang normal seperti saat ovulasi, sebelum dan sesudah haid, rangsangan seksual, serta emosi. Faktor patologis yang sering mengakibatkan keputihan adalah infeksi bakteri dan virus.	Hasil penelitian menunjukkan vulva hygiene sangat mempengaruhi terjadinya keputihan. Hal ini menunjukkan bahwa perawatan organ reproduksi dengan melakukan tindakan higienis termasuk mencuci organ intim dengan air bersih, menjaga kelembaban organ intim dan tidak menggunakan pembalut yang	Referensi yang digunakan terlihat sedikit	Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i> . Populasi dalam penelitian ini adalah wanita Usia Subur di RT 04 RW 03 Rowosari dengan jumlah 46, menggunakan teknik <i>sampling jenuh</i> .	Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhardini (2012) tentang hubungan personal hygiene dengan keputihan pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas lingkaran Timur dengan hasil penelitian menunjukkan dari 29 wanita usia subur terdapat 22 orang (75,9%) wanita usia subur

					wangi yang merupakan tindakan vulva hygiene sangat mempengaruhi terjadinya keputihan pada wanita usia subur.			<i>personal hygiene</i> tidak baik mengalami keputihan sedangkan dari 56 wanita usia subur terdapat 30 orang (53,4%) wanita usia subur dengan <i>personal hygiene</i> yang baik tidak mengalami keputihan.
5	Faktor Perilaku Meningkatkan Resiko Keputihan	Umi Salamah, Djati Wulan Kusumo, Desi Nurlela Mulyana	2020	Faktor perilaku (kebiasaan berkemih, penggunaan iritan, kebiasaan pada saat menstruasi, penggunaan pakaian dalam), dan faktor	Pada penelitian ini, penggunaan iritan, kebiasaan berkemih yang kurang baik seperti tidak membersihkan alat genitalia dengan tisu atau handuk kering, dan	Menggunakan metode riset tipe analitik dengan pendekatan cross sectional yaitu riset yang bersifat fenomena sosial. Sampel yang digunakan	Sampel riset ini merupakan mahasiswa Akademi Kebidanan Prestasi Agung sebanyak 340 mahasiswa dan analisis bivariat menggunakan	Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Abrori, Andri Dwi Hernawan, dan Ermulyadi (2017) yaitu faktor yang menyebabkan

				lingkungan (kebersihan toilet) dengan kejadian keputihan.	penggunaan pakaian dalam yang kurang baik seperti tidak menggunakan pakaian dalam dengan bahan katun merupakan faktor resiko terjadinya keputihan.	berjumlah 190 orang dengan menggunakan teknik <i>simple random sampling</i> .	chi square.	terjadinya keputihan adalah kebiasaan menggunakan iritan atau sabun pembersih genitalia, kebiasaan berkemih yang kurang baik dengan tidak mengeringkan alat genitalia setelah BAK atau BAB, dan tidak menggunakan pakaian dalam dari bahan katun.
6	Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan	Ika Ayu Purnamasari, Amelia Nur	2019	Keputihan dapat merupakan gejala dari	Hubungan personal hygiene terhadap	Penelitian ini menggunakan metode <i>cross sectional</i> ,	Menggunakan sampel sebanyak 56 dan analisis	Hasil penelitian ini sama dengan penelitian

	Kejadian Keputihan Pada Wanita Usia Subur (WUS) di Kecamatan Banjarejo Kota Madiun	Hidayanti		penyakit lain, apabila keputihan yang berlangsung terus menerus dalam waktu yang cukup lama dan menimbulkan keluhan	keputihan yaitu karena kesalahan pada saat membersihkan daerah vagina sehabis buang air kecil dan besar (tidak dari arah vagina ke anus).	artinya tiap subjek penelitian hanya di observasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan.	menggunakan teknik uji statistik korelasi dengan uji chi square.	yang dilakukan oleh Siti Khuzaiyah, Rini Krisiyanti, Intan Cristi Mayasari (2015) yaitu keputihan yang berlangsung lama dan tidak segera diobati dapat menyebabkan masalah serius seperti timbulnya kanker serviks bahkan dapat menyebabkan kematian.
7	Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Perilaku Personal	Susanti Handayani, Kusyogo Cahyo, & Ratih	2017	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian	Keputihan menyebabkan timbulnya kanker serviks yang mengancam	Kurangnya sampel yang digunakan pada penelitian ini	Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian	Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh

	Hygiene Remaja Putri dalam Penanganan dan Pencegahan Keputihan	Indraswari		keputihan	wanita sampai kematian. Faktor lain yang menjadi pendukung terjadinya keputihan adalah anemia, gizi rendah, kelelahan, dan obesitas.		analitik deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional study. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan instrumen tambahan berupa kuisisioner.	Ika Ayu Purnamasari, Amelia Nur Hidayanti (2019) dan Siti Khuzaiyah, Rini Krisiyanti, Intan Cristi Mayasari (2015) yaitu keputihan yang berlangsung lama dan tidak segera diobati dapat menyebabkan masalah serius seperti timbulnya kanker serviks bahkan dapat menyebabkan kematian.
--	--	------------	--	-----------	--	--	---	--

## B. Matriks Langkah 2

**Matriks identifikasi masalah aktual (Diagnosis dan patofisiologi, mekanisme, pemeriksaan, pengertian, penunjang)**

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Ilmu Kandungan	Hanifa Wiknjosastro	2007	Diagnosis Keputihan	Pada keputihan fisiologis terdiri atas cairan yang kadang-kadang berbentuk mukus yang memiliki banyak epitel dengan leukosit yang tidak sering. Identitas dari keputihan fisiologis merupakan cairan berwarna bening, kadang-kadang putih kental, tidak	Tidak didapatkan kelemahan.	Bahasa mudah dipahami dan tampak jelas.	Sumber ini sejalan dengan literatur dari Gusti Ayu Marhaeni (2016) yaitu dengan menjelaskan secara umum terjadinya keputihan fisiologi dan patologi



					berbau, serta tanpa diiringi dengan keluhan, seperti rasa gatal, perih, serta dibakar dan jumlahnya sedikit.			
2	Keputihan Pada Wanita	Gusti Ayu Marhaeni	2016	Patofisiologi terjadinya keputihan	Keputihan secara fisiologi terjalin saat sebelum haid sebab pengaruh dari proses haid yang mengaitkan hormon estrogen serta progesteron oleh ovarium yang menimbulkan pengeluaran sekret yang terbentuk seperti benang, tipis, dan	Referensi yang digunakan sedikit.	Menggunakan bahasa yang mudah dipahami.	Sumber ini sejalan dengan buku yang diterbitkan oleh Hanifa Wiknjosastro (2007) dengan menjelaskan secara umum keputihan fisiologi dan patologi

					elastis. Bakteri yang masuk ke alat kelamin perempuan akan menimbulkan infeksi sehingga dapat menyebabkan keputihan patologis yang ditandai dengan gatal, berbau, dan bercorak kuning kehijauan.			
3.	Faktor Perilaku yang Mempengaruhi Terjadinya Keputihan Pada Remaja Putri	Egi Yunia Rahmi, Arneliwati, & H.Erwin	2015	Kejadian keputihan	Keputihan ditandai dengan keluarnya cairan berlebihan dari liang senggama (vagina) yang terkadang disertai rasa gatal, nyeri,	Responden dalam penelitian ini hendaknya dapat melibatkan diri dalam berbagi kegiatan yang dapat menambah wawasan	Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara <i>total sampling</i> yaitu seluruh populasi dijadikan sampel dengan jumlah	Penelitian ini sejalan dengan penelitian Eko Sri Wulaningtyas dan Evita Widyawati (2018), yaitu menjelaskan kejadian keputihan

					sensasi terbakar di bibir kemaluan yang biasanya disertai bau busuk dan menimbulkan rasa nyeri saat buang air kecil atau bersenggama.	dalam bidang kesehatan, dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan jika terjadi masalah kesehatan yang tidak diketahui.	responden sebanyak 82 orang.	secara rinci
4.	Hubungan Kejadian Fluor Albus Dengan Tingkat Kecemasan Terhadap Infeksi Maternal Pada WUS	Eko Sri Wulaningtyas dan Evita Widyawati	2018	Diagnosis keputihan	Fluor albus fisiologis merupakan cairan dari vagina setelah mendapat haid yang pertama, dari kelenjar yang terdapat pada serviks yang menimbulkan lendir karena pengaruh hormon estrogen serta jumlah yang keluar	Pendekatan yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan <i>cross sectional</i> dimana kedua variabel diobservasi sekali pada waktu yang sama.	Menggunakan rancangan <i>correlation</i> antara <i>fluor albus</i> dengan kecemasan terhadap terjadinya infeksi maternal.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Egi Yunia Rahmi, Arneliwati, & H.Erwin (2015) yaitu dengan menjelaskan keputihan secara rinci.

					<p>berubah-ubah sesuai dengan siklus haid. Fluor albus patologis menimbulkan rasa gatal, perih didalam vagina ataupun sekitar saluran pembuka vulva. Biasanya dipicu oleh bakteri penyakit (patogen)serta menimbulkan peradangan. Akibat munculnya gejala yang sangat mengganggu, tampaknya berganti warna cairan menjadi kekuningan sampai</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					kehijauan, jumlah berlebih, serta berbau dan menimbulkan rasa gatal disekitar vagina.			
5.	Kesehtaan Reproduksi Remaja dan Wanita	Eny Kusmiran	2011	Penyebab terjadinya keputihan	Pemicu keputihan dapat secara wajar (fisiologis) dipengaruhi oleh hormon tertentu. Keputihan yang abnormal dapat diakibatkan oleh infeksi atau peradangan yang berlangsung karena mencuci vagina dengan air kotor,	Tidak didapatkan kelemahan pada sumber ini.	Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang rinci.	Sumber ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eko Sri Wulaningtyas dan Evita Widyawati (2018) yaitu keputihan dapat dipengaruhi oleh hormon tertentu.

					pemeriksaan dalam yang tidak benar, penggunaan pembilas vagina yang berlebihan, pemeriksaan yang tidak higienis, dan adanya benda asing dalam vagina. Tidak hanya karena peradangan, keputihan bisa pula diakibatkan oleh masalah hormonal, celana yang tidak menyerap keringat, serta penyakit menular seksual			
6.	Faktor-faktor Yang	Irna Trisnawati	2018	Penyebab	Pemicu keputihan yang	Penelitian ini mengambil	Desain penelitian yang	Tidak didapatkan

	<p>Berhubungan Dengan Keputihan Patologis Pada wanita Usia Subur Yang Bekerja di PT Unilever Cikarang Bekasi</p>			<p>Keputihan</p>	<p>sangat umum di derita oleh seseorang dengan berat badan yang berlebihan merupakan akibat infeksi jamur. Hal ini disebabkan oleh daerah kewanitaan yang cenderung lembab pada seorang dengan berat badan berlebihan. Salah satu ciri keputihan yang diakibatkan oleh infeksi jamur yaitu keputihan bercorak putih susu dan sangat gatal.</p>	<p>besar sampel 100 wanita usia subur yang dipilih dengan teknik simple random sampling.</p>	<p>digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i>. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita usia subur di PT Unilever Cikarang Bekasi dengan mengambil sampel sebanyak 220 orang</p>	<p>perbandingan pada penelitian ini.</p>
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

7.	Kebersihan Organ Kewanitaan dan Kejadian Keputihan Patologi pada Santriwati di Pondok Pesantren Al Munawwir Yogyakarta	Tri Indah Setiani, Tri Prabowo, dan Dyah Pradnya Paramita	2015	Diagnosis Keputihan	Keputihan adalah cairan yang keluar dari kemaluan selain darah dan bukan sebuah penyakit, akan tetapi merupakan gejala dari suatu penyakit. Keputihan fisiologi ditandai dengan cairan yang keluar dari vagina, tidak berbau busuk, tidak terasa nyeri, gatal maupun panas. Sedangkan keputihan patologi ditandai dengan cairan keputihan yang	Penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive Sampling</i> dengan alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner	Penelitian ini menggunakan metode survey analitik untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel	Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wandha Paramitha Dhuangga dan Misrawati (2020) yaitu dengan menjelaskan keputihan fisiologi dan patologi secara umum.
----	--	---	------	---------------------	--	--	--	--



					berubah warna, terasa gatal, nyeri, dan terasa panas.			
8.	Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Putri Tentang Rebusan Daun Sirih Dalam Mengatasi Keputihan di SMA 11 Pekanbaru	Ravika Oktova	2016	Patofisiologi Keputihan	Keputihan fisiologis umumnya berupa lendir encer, bening, serta tidak busuk. Hal ini sangat berbeda dengan keputihan yang diakibatkan oleh serbuan bakteri ataupun jamur, lendir yang keluar warna kekuningan terlebih lagi berwarna kecoklatan dan bahkan terkadang bercampur darah.	Sampel pada penelitian ini adalah seluruh siswi di SMAN 11 Pekanbaru yang berjumlah 432 orang. Terdapat 82 orang yang diambil menggunakan <i>purpose sampling</i>	Jenis penelitian ini yaitu analitik dengan desain <i>cross sectional corelative</i>	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wandha Paramitha (2012) namun terdapat perbedaan dalam menjelaskan patofisiologi keputihan yaitu dengan menjelaskan secara umum perbedaan keputihan fisiologi dan patologi.

9.	Aplikasi Teori Health Belief Model Dalam Pencegahan Keputihan Patologis	Cici Kurniawati dan Muji Sulistyowati	2014	Diagnosa Keputihan Patologis	Keputihan patologis bisa terjadi karena penggunaan cairan antiseptik yang bisa menimbulkan keputihan, karena antiseptik mengganti Ph vagina yang normal( 4- 4, 5) jadi bertambah serta jadi basa sehingga daerah kewanitaan rentan terhadap serangan bakteri yang bisa menyebabkan keputihan patologis, serta Terdapat	Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh siswi kelas XI dan XII dan dihitung menggunakan rumus <i>simple random sampling</i> .	Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis perilaku dalam mencegah keputihan patologis.	Tidak didapatkan perbandingan pada penelitian ini.
----	---	---------------------------------------	------	------------------------------	--	---	--	--

					<p>ikatan antara pengetahuan dengan anggapan kerentanan, anggapan keseriusan, anggapan khasiat, anggapan hambatan, serta anggapan keahlian diri. Terdapat jalinan antara anggapan kerentanan, anggapan hambatan, anggapan keahlian diri, isyarat untuk bertindak dengan aksi dalam menghindari keputihan patologis.</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

10	Efektifitas Pendidikan Kesehatan Tentang <i>Hygiene</i> Kewanitaan Terhadap Pengetahuan dan sikap Remaja Putri Dalam Menangani Keputihan	Wandha Paramitha Dhuangga dan Misrawati	2012	Mekanisme terjadinya keputihan	Proses terjadinya keputihan merupakan keluarnya secret/ cairan yang bening, tidak berbau, tidak menimbulkan perih serta pula tidak gatal, sebaliknya bila secret yang keluar itu berbau, berwarna, timbul perih serta gatal maka dapat dikatakan itu adalah keputihan yang abnormal, serta pemicu munculnya keputihan yang abnormal, seperti jamur,	Peneliti mrnggunakan desain penelitian " <i>Quasi eksperiment with control group</i> " yang melibatkan kelompok pembanding (kontrol) disamping kelompok ekperimental.	Populasi yang dijadikan sampel merupakan seluruh siswa yang berjumlah 683 orang dan menggunakan teknik pengambilan sampel <i>stratified random sampling</i> dengan mengisi kuisisioner.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Indah Setiani, Tri Prabowo, dan Dyah Pradnya Paramita (2015) yaitu dengan menjelaskan keputihan fisiologi dan patologi secara umum
----	--	---	------	--------------------------------	---	---	---	---

					bakteri, maupun kuman dan jamur yang paling sering menyerang yaitu candida albicans.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

### C. Matriks Langkah 3

#### Matriks Komplikasi

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Karakteristik wanita Dengan Fluor Albus	Siti Khuzaiyah, Rini Krisiyanti, dan Intan Cristi Mayasari	2015	Dampak Keputihan	Dampak keputihan dapat terjadi perlengketan pada rahim, saluran telur atau tuba falopi sampai pembusukan indung telur oleh infeksi yang berat bisa terjadi tuba ovarium abses	Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 49 responden yaitu hanya wanita yang periksa dengan keluhan keputihan di Rumah Sakit Wilayah	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan teknik sampling	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Maharani (2016) yaitu akibat dari terjadinya keputihan yaitu dapat terjadi infeksi pada

					atau kantung nanah yang menekan saluran telur dan indung telur, apabila kedua sisi kanan dan kiri tuba ovarium yang tertekan abses maka dapat dikatakan bahwa wanita tidak akan bisa mendapatkan keturunan atau mandul.	Kabupaten Pekalongan Tahun 2014.		rahim.
2.	Keputihan Pada Wanita	Gusti Ayu Marhaeni	2016	Akibat terjadinya keputihan abnormal	Keputihan abnormal bisa terjalin pada seluruh infeksi alat kelamin (infeksi bibir kemaluan, liang senggama, mulut rahim, jaringan	Referensi yang digunakan sedikit.	Menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami	Literatur yang dibuat sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Khuzaiyah, Rini Krisiyanti, dan Intan Cristi Mayasari

					penyangga, serta pada infeksi karena penyakit menular seksual).			(2015) yaitu akibat dari terjadinya keputihan yaitu dapat terjadi infeksi pada rahim
3.	Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Keputihan Pada Remaja Putri di SMA Darussalam Medan	Novalita Oriza dan Roslina Yulianty	2018	Komplikasi Keputihan Patologis	Keputihan bila tidak ditangani dengan baik maka akan berdampak fatal yaitu terjadinya kemandulan serta kehamilan ektopik (hamil diluar kandungan). keputihan juga merupakan indikasi dini kanker rahim. Masalah ini dapat berdampak negatif jika	Kurangnya sikap remaja dalam menjaga personal hygiene sehingga mengakibatkan terjadinya keputihan patologis.	Analisis data menggunakan program SPSS, analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan distribusi dan frekuensi variable, analisis bivariate untuk melihat hubungan variable dependen dengan	Penelitian ini sejalan dengan literatur yang dibuat oleh Dr. Gede Wira Buanayuda & Ni Wayan Suanita Kusumawardani, S.Ked (2011) yaitu keputihan yang tidak ditangani segera akan mengakibatkan terjadinya kemandulan dan infeksi

					tidak ditangani sejak dini.		variable independent dengan uji <i>Chi Square</i> , hasil kemudian dilanjutkan dengan analisis multivariate dengan model <i>logistic regression</i> .	maternal lainnya.
4.	Hubungan Kejadian Fluor Albus Dengan Tingkat Kecemasan Terhadap Infeksi Maternal Pada WUS	Eko Sri Wulaningtyas dan Evita Widyawati	2018	Dampak Keputihsn	Salah satu permasalahan kesehatan yang penting untuk WUS yaitu mengenai penyakit kandungan, dimana salah satu ciri indikasi dari penyakit kandungan tersebut adalah terjadinya keputihan.	Pendekatan yang digunakan <i>cross sectional</i> , dimana kedua variabel diobservasi sekali pada waktu yang sama.	Penelitian ini menggunakan rancangan <i>correlation</i> antara kejadian <i>fluor albus</i> dengan kecemasan terhadap terjadinya infeksi maternal. Populasi dalam penelitian ini	Penelitian ini sejalan dengan Novalita Oriza dan Roslina Yulianty (2018), yaitu keputihan sangat berdampak pada penyakit kandungan.



					Fungsi genitalia sebagai alat reproduksi dapat terganggu atau bahkan tidak dapat difungsikan.		adalah wanita usia subur di desa Campyurejo sejumlah 227 orang dengan sampel penelitian adalah sebagian WUS di desa Campurejo sebanyak 143 orang dengan teknik <i>puspositive sampling</i> pada wanita usia 20 sampai dengan 49 tahun yang bersedia menjadi responden.	
5.	Kesehatan Wanita	Dr. Gede Wira Buanayuda & Ni	2011	Bahaya	Jika keputihan yang tidak	Referensi yang	Bahasa mudah dipahami dan	Sumber ini sejalan dengan

	"Keputihan All About Miss V Series 1	Wayan Suanita Kusumawardani, S.Ked		Keputihan	normal dibiarkan begitu saja ada kemungkinan penyebaran infeksi meluas ke bagian atas dari saluran genetalia dan reproduksi wanita serta penyebaran ke saluran kencing. Penyebaran infeksi ke saluran genetalia dan reproduksi yang lebih atas biasanua menyebabkan infeksi yang disebut penyakit radang panggul yang meliputi infeksi pada	digunakan sedikit	penjelasan dibuat dengan rinci.	penelitian yang dilakukan oleh Novalita Oriza dan Roslina Yulianty (2018) yaitu keputihan yang tidak ditangani segera akan mengakibatkan terjadinya kemandulan dan infeksi maternal lainnya.
--	--------------------------------------	------------------------------------	--	-----------	---	-------------------	---------------------------------	--

					bagian uterus atau rahim wanita baik jaringan ikatnya maupun bagian otot dari uterus sehingga infeksi juga dapat mengenai saluran telur atau bagian tuba dan menjalar pada indung telur atau ovarium. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya infertilitas atau kemandulan.			
6.	Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Wanita Usia Subur (WUS) Tentang Keputihan	Rizkia Sulistianingsih, Herry Suswanti Djarot, dan Dwi Wahyuni	2013	Wanita yang tidak dapat membedakan keputihan fisiologis dan keputihan patologis	Wanita yang berpikiran keputihan fisiologis merupakan keputihan patologis	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik, yaitu survey yang mencoba	Dalam penelitian ini menggunakan populasi yaitu seluruh penghuni lapas	Tidak didapatkan perbandingan pada penelitian ini.

	<p>Fisiologis dan Patologis di Lapas Wanita Kelas IIA Kota Semarang Tahun 2011</p>			<p>hendak tahu bahwa dirinya menderita penyakit ataupun tidak.</p>	<p>membuat wanita tersebut merasa tidak nyaman serta takut dirinya mengidap penyakit kelamin. Sebaliknya justru wanita yang mengalami keputihan patologis tetapi berpikiran keputihan fisiologis mengabaikan keputihan yang dideritanya sehingga penyakit bisa semakin parah yaitu terjadinya infeksi dari bakteri, virus, jamur, atau</p>	<p>menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi dan sesuai dengan tujuannya menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i> yaitu suatu penelitian dimana variabel-variabel termasuk faktor risiko dan variabel-variabel yang termasuk efek diobservasi sekaligus pada waktu yang sama.</p>	<p>wanita kelas IIA Kota Semarang yang berumur 15-49 tahun sebanyak 80 wanita usia subur. Menggunakan teknik <i>sampling jenuh</i> yaitu teknik penentuan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					parasit yang bisa menyebabkan terjadinya kasus Infeksi Menular Seksual (IMS).			
7.	Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Keputihan Fisiologis dan Patologis di Puskesmas Sumbang II Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2010	Afri Julianingsih, Maya Safitri, dan Indri Heri S	2010	Dampak Keputihan Patologis	Keputihan patologis membuat ibu merasa tidak nyaman karena menunjukkan keluhan berbau busuk, gatal, dan vulva terasa gatal. Apabila keputihan tidak diobati maka infeksi dapat menjalar ke rongga rahim kemudian sampai ke indung telur dan akhirnya sampai ke	Pengambilan sampel dilakukan dengan <i>accidental</i> yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, dimana siapapun yang secara kebetulan ditemui peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui	Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu jenis penelitian untuk menggambarkan suatu fenomena sosial yang terdapat pada masyarakat dengan melihat kejadian dari fenomena tersebut yang	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Helmy Ilmiawati dan Kuntoro (2017) tentang dampak keputihan patologis yang tidak ditangani dengan segera.

					rongga panggul. Hal itu membuat wanita yang mengalami keputihan kronik menjadi mandul.	cocok sebagai sumber data	dimana hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk angka-angka dan persen.	
8.	Pengetahuan Personal Hygiene Remaja Putri Pada Kasus Keputihan	Helmy Ilmiawati & Kuntoro	2017	Keputihan patologis yang tidak ditangani segera	Banyak wanita di Indonesia yang menyepelkan keputihan dan menganggap hal itu seperti itu sudah biasa, disamping itu rasa malu ketika wanita atau remaja yang mengalami keputihan enggan untuk berkonsultasi ke dokter. Keputihan yang dibiarkan	Perlu meningkatkan penyuluhan dan pemberian informasi terkait pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi terutama organ genitalia eksterna agar terhindar dari keputihan	Mendeskripsikan tentang pengetahuan yang didapatkan santri remaja putri tentang personal hygiene pada kasus keputihan.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afri Julianingsih, Maya Safitri, dan Indri Heri S (2010) tentang dampak keputihan patologis yang tidak ditangani dengan segera.

					sangat fatal apabila terlambat ditangani akan mengakibatkan kemandulan dan hamil diluar kandungan dan juga keputihan merupakan gejala awal dari kanker serviks yang bisa berujung pada kematian.			
9	Health Behaviour Pada Perempuan Usia Subur Dalam menjaga Kesehatan Reproduksi	Restuning Widiasih dan Anita Setyawati	2018	Perilaku wanita terhadap keputihan yang dialami	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui tanda dan gejala keputihan (69%), namun	Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait upaya pencegahan keputihan	Penelitian ini menjadi informasi dasar yang signifikan bagi pelayanan kesehatan maupun peneliti dan diharapkan dapat menjadi	Tidak didapatkan perbandingan pada penelitian ini.

					perilaku lain yang masih berisiko tinggi terhadap infeksi sistem reproduksi, penggunaan sabun saat membersihkan daerah kewanitaan dilakukan oleh 47% responden dan yang tidak paham mengenai cara membersihkan vagina dengan tepat (76%).		dasar pengembangan program dalam upaya meningkatkan aktifitas menjaga kesehatanm mencegah penyakit, dan mendeteksi secara dini keganasan.	
10	Analisis Perilaku Pencegahan Keputihan Pada Remaja Putri Berdasarkan Teori Health Promotion	Frida Rachmadiani, Ni Ketut Alit Armini, dan Aria Aulia Nastiti	2019	Risiko Keputihan	Bagi wanita sangat penting merawat genetalia sejak dini secara tepat untuk mengurangi risiko terjadinya	Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan <i>cross</i>	Sampel yang digunakan memilih siswi kelas XI SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo yang sesuai dengan	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Gede Wira Buanayuda & Ni Wayan



	Model (HPM)				keputihan. Keputihan akan memberi dampak berbahaya bagi wanita seperti infeksi, penyakit radang panggul, infertilitas, dan gangguan psikologis.	<i>sectional</i> yaitu peneliti mengukur atau mengobservasi data variabel independen dan dependen hanya sekali pada satu waktu. Diharapkan peneliti menggunakan rentang waktu yang lebih lama yaitu kurang lebih satu minggu dan melakukan observasi kepada responden untuk mengetahui perilaku kearah yang	kriteria yaitu remaja berusia 15-18 tahun dan telah mendapatkan menstruasi sebanyak 216 orang.	Suanita Kusumawardani, S.Ked (2011) yaitu risiko keputihan adalah terjadinya infertilitas atau kemandulan.
--	-------------	--	--	--	---	---	--	--

						lebih positif.		
--	--	--	--	--	--	----------------	--	--

#### D. Matriks Langkah 4

##### Tindakan Kolaborasi dan Emergency

##### Matriks penanganan , kolaborasi, tindakan segera, efektifitas pengobatan

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Persepsi dan Upaya Pencegahan Keputihan Pada Remaja Putri Di SMA Muhammadiyah 1 Semarang	Wiwin Embo Johar, Sri Rejeki, & Nikmatul Khayati	2013	Upaya pencegahan keputihan	Hal yang perlu dilakukan dalam mencegah keputihan adalah menjaga kebersihan daerah vagina dengan mencuci bagian vulva dan menjaga agar tetap kering, sebaiknya menggunakan sabun non parfum saat	Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan observasi secara langsung tentang upaya pencegaham keputihan agar data yang diperoleh lebih akurat dan menggunakan metode	Pada penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 141 orang dengan sampel sebanyak 73 responden dengan teknik sampling menggunakan <i>stratified proportionate random sampling</i> .	Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Darma, Sartiah Yusran, & Andi Faizal Fachlevy (2017) tentang tindakan pencegahan yang dilakukan pada kasus keputihan.

					<p>mandi untuk mencegah timbulnya iritasi pada vagina, menghindari penggunaan cairan pembersih kewanitaan yang mengandung bahan kimia karena hal itu dapat mengganggu pH cairan vagina yang dapat merangsang munculnya jamur atau bakteri, menggunakan celana dalam yang tidak ketat dan menjaga kuku agar tetap</p>	<p>penelitian kuantitatif dengan wawancara secara mendalam untuk mengetahui penyebab terjadinya keputihan. Perlu juga mengadakan penyuluhan secara rutin tentang kesehatan reproduksi.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					bersih dan pendek.			
2	Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita	Ida Bagus Surya Manuaba	2009	Pemeriksaan leukorea	Perlu dilakukan pemeriksaan fisik secara umum dan khusus, pemeriksaan laboratorium rutin yang mencakup pewarnaan Gram (untuk infeksi bakteri), preparat basah (infeksi trikomonas), preparat KOH (infeksi jamur), kultur/ pembiakan (menentukan jenis bakteri penyebab), dan Pap smear	Pemeriksaan harus dilakukan di laboratorium dengan fasilitas lengkap	Bahasa yang digunakan mudah dipahami	Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Novianti (2016) yaitu tentang pemeriksaan penunjang yang dilakukan di laboratorium

					(untuk menentukan adanya sel ganas).			
3	Kemampuan Antifungi Ekstrak Rimpang Temulawak (Curcuma Xanthorrhiza) Terhadap Candidia Albicans	Dewi Novianti	2016	Ekstrak rimpang temulawak sebagai antifungi terhadap penyebab candidia albicans	Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah autoclaf, <i>beker glass</i> , <i>blemder</i> , cawan petri, Erlenmeyer, inkubator, jangka sorong, jarum ose, mikro pipet, pemanas air dan <i>magnetic stirrer</i> , <i>shaker</i> , <i>soxhlet</i> , rotavavor, tabung reaksi, timbangan analitik, dan pipet tetes. Untuk bahan, yang diperlukan adalah alkohol	Cara kerja penelitian ini sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama	Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak lengkap (RAL) dengan menggunakan 6 perlakuan konsentrasi ekstrak rimpang temulawak dan dilakukan 4 kali ulangan pada tiap perlakuan.	Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ida Bagus Surya Manuaba (2009) yaitu tentang pemeriksaan penunjang yang dilakukan di laboratorium.

					70%, aquadest, DMSO, rimpang temulawak, PDA ( <i>Potato Dextrose Agar</i> , kertas cakram, kertas saring, pelarut n-heksana, etilasetat dan metanol.			
4	Vaginal Discharge : Women's Health Seeking Behaviours And Cultural Practices	Ilankoon Mudiyansele Prasanthi Sumudrika Ilankoon, Christine Sampantha Evangeline Goonewardena, Poruthotage Pradeep Rasika Perera dan Rukshan Fernandopulle	2015	Perilaku pencarian kesehatan pada wanita terhadap keputihan	Penyedia layanan kesehatan primer memainkan peran utama dalam pendidikan kesehatan bagi wanita dalam kelompok usia reproduksi terkait keputihan fisiologis dan patologis dengan	Karena heterogenitas studi yang disertakan, studi tersebut tidak cukup sebanding satu sama lain. Oleh karena itu, penilaian kualitas metodologis setiap studi tampak tidak sesuai pada	Banyaknya sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Desain penelitian yang dipilih untuk tinjauan adalah deskriptif cross sectional, penelitian kualitatif dan tinjauan.	Dalam penelitian ini, sebagian besar menemukan bahwa wanita dalam kelompok usia reproduksi tidak mencari nasihat kesehatan untuk keputihan dan menganggap sebagai kondisi normal karena banyak faktor budaya.

					membedakan dan mencari nasihat medis. Memberikan rasa hormat, privasi, dan kerahasiaan pasien menggunakan konsultasi telepon, menyediakan janji temu yang mudah dan dapat diakses ke fasilitas pada waktu yang tepat, dan merancang lingkungan perawatan yang nyaman dan rahasia yang akan berguna untuk meningkatkan perilaku mencari	penelitian ini.		Pengetahuan tentang penyebab keputihan masih rendah dan masih sulit membedakan antara keputihan fisiologis dan patologis.
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	---

					kesehatan terhadap keputihan.			
5	The Etiology of Vaginal Discharge Syndrom In Zimbabwe	Z. Mike Chirenje, MD, FRCOG, Nicholas Dhibi, BS, MSc, H. Hunter Handsfield, MD, Elizabeth Gonese, MPH, Beth Tippett Barr, DrPH, Lovemore Gwanzura, BS, PhD, Ahmed S. Latif, MBChB, MD, FAFPHM, Dumisili Venessa Maseko, BTech, Ranmini S. Kularatne, MBChB, MSc, Mufuta Tshimanga,	2018	Pemeriksaan Keputihan	Pasien yang memenuhi kriteria menjalani proses pemeriksaan genital termasuk pemasangan speculum dan menerima tes pH keputihan dengan metode strip. Empat swab vagina dikumpulkan dan satu swab digunakan untuk membuat apusan pewarnaan gram.	Cara kerja penelitian ini sangat rumit dan memiliki beberapa keterbatasan untuk mendiagnosis	Tujuan sub-penelitian ini untuk menetapkan etiologi sindrom keputihan di antara wanita yang datang ke klinik IMS Zimbabwe untuk menilai kecukupan pedoman pengobatan terhadap penyebab umum keputihan.	Tidak didapatkan perbandingan pada penelitian ini.



		MD, MPH, Peter H. Kilmarx, MD, Anna Machiha, SRN, Owen Mugurungi, MD, Cornelis A. Rietmeijer, MD, PhD, MSPH,						
6	Abnormal Vaginal Discharge	Liesl Brown	2018	Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat anti jamur	Pengobatan keputihan yang direkomendasi kan adalah obat triazol teoral, seperti flukonazol (150 mg sebagai dosis tunggal) untuk pengobatan sistemik atau obat anti jamur yang bekerja secara lokal seperti itraconazole (200 mg 2x1). Pessarium	Pengobatan harus diberikan oleh dokter	Penggunaan obat dituliskan secara rinci	Tidak didapatkan perbandingan pada sumber ini.

					imidazole intravaginal atau krim seperti klotrimazol (500 mg sebagai dosis tunggal), miconazole (ovula vagina 1,2 g sebagai dosis tunggal) atau econazole (pessarium 150 mg pada malam hari selama 1 sampai 3 malam).			
7	Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi Pada Ny. S P <sub>1</sub> A <sub>0</sub> Umur 37 Tahun Dengan Fluor Albus Patologis Di	Merna Ulfa Mustakimah	2017	Tindakan yang dilakukan dalam menangani keputihan	Melakukan pemeriksaan IVA Test dan mengoleskan albotyl pada porsio yang terdapat erosi dan didapatkan ibu mengalami keputihan yang	Terdapat perbedaan teori dengan yang dilakukan saat praktek di lapangan.	Studi kasus ini merupakan penelitian <i>observasional deskriptif</i> yang bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa penting yang	Terdapat kesenjangan antara teori dengan praktek di lapangan yaitu pada pemberian terapi obat di teori diberikan Metronidazol

	BPM Soto Soeharjani Mojosongo Jebres Surakarta				tidak normal. Diberikan terapi obat herbal 550mg 3x1, Metronidazol 500 mg 3x1, dan Vit.C 500 mg 3x1.		terjadi masa kini	sedangkan dilahan diberikan obat herbal 550 mg, Metronidazol 500mg, Vit. C 500 mg karena untuk mengurangi lendir yang berlebihan dan bau menusuk dari vagina.
8	Vaginal Discharge : Women's Health Seeking Behaviours And Cultural Practices	Ilankoon Mudiyansele Prasanthi Sumudrika Ilankoon, Christine Sampantha Evangeline Goonewardena, Poruthotage Pradeep Rasika Perera dan Rukshan Fernandopulle	2015	Perilaku pencarian kesehatan pada wanita terhadap keputihan	Penyedia layanan kesehatan primer memainkan peran utama dalam pendidikan kesehatan bagi wanita dalam kelompok usia reproduksi terkait keputihan fisiologis dan patologis	Karena heterogenitas studi yang disertakan, studi tersebut tidak cukup sebanding satu sama lain. Oleh karena itu, penilaian kualitas metodologis setiap studi tampak tidak sesuai pada	Banyaknya sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Desain penelitian yang dipilih untuk tinjauan adalah deskriptif cross sectional, penelitian kualitatif dan tinjauan.	Dalam penelitian ini, sebagian besar menemukan bahwa wanita dalam kelompok usia reproduksi tidak mencari nasihat kesehatan untuk keputihan dan menganggap sebagai kondisi normal karena banyak faktor

					<p>dengan membedakan dan mencari nasihat medis. Memberikan rasa hormat, privasi, dan kerahasiaan pasien menggunakan konsultasi telepon, menyediakan janji temu yang mudah dan dapat diakses ke fasilitas pada waktu yang tepat, dan merancang lingkungan perawatan yang nyaman dan rahasia yang akan berguna untuk meningkatkan perilaku</p>	<p>penelitian ini.</p>	<p>budaya. Pengetahuan tentang penyebab keputihan masih rendah dan masih sulit membedakan antara keputihan fisiologis dan patologis.</p>
--	--	--	--	--	--	------------------------	--

					mencari kesehatan terhadap keputihan.			
9	Asuhan Kebidanan Pada Nn. N Umur 17 Candidiasis Vulvogenetis Dengan Terapi Pemberian Komsumsi Yoghurt dan Vitamin C Di SMA Tunas Patria, Ngablak, Ungaran Timur	Juniar Narita Kartika Dewi	2019	Pada pengkajian asuhan kebidanan pada Nn. N dengan candidiasis vulvogenetis dilaksanakan pengumpulan data dengan gejala sering mengeluh sedikit gatal dan rasa tidak nyaman di daerah genetalia, dan terdapat secret putih pada celana	Dilakukan tindakan kolaborasi dengan bidan, dengan pemberian asuhan dengan penyuluhan tentang kebersihan vagina dan dianjurkan untuk mengkomsumsi yoghurt dan vitamin C dengan teratur dan tepat waktu.	Dalam kasus Nn. N tidak ditemukan terjadinya diagnosa potensial	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dalam bentuk laporan kasus menggunakan format wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.	Dalam kasus ini perlu diingat bahwa candidiasis vulvogenetis merupakan gejala awal dari kanker serviks.
10	Persepsi dan Perilaku Remaja Putri	Sri Maryanti dan Murti	2019	Perilaku remaja sebagai	Remaja putri yang mengalami	Penelitian menggunakan metode	Total sampling dalam penelitian ini	Mengerti atau memahami tentang

	Dalam mencegah keputihan Di SMK 1 Lambuuya Kabupaten Konawe	Muryani		upaya pencegahan keputihan	keputihan agar segera memeriksakan diri kepada petugas kesehatan (dokter, bidan, atau perawat) agar dapat memperoleh informasi atau penyuluhan serta mendapatkan pengobatan ketika mengalami keputihan	survey analitik dengan oendekatan waktu <i>cross sectional</i> .	adalah siswa perempuan SMK 1 Lambuya berjumlah 36 siswi	keputihan ditentukan oleh perilaku yang mendukung perilaku
--	---	---------	--	----------------------------	--	--	---	--

### E. Matriks Langkah 5

#### Rencana Tindakan

Matriks intervensi, perencanaan, penatalaksanaan, pemberian edukasi, KIE, tindakan pertama, efektifitas,

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Keputihan Pada Wanita Usia Subur Menggunakan Ekstrak Daun Sirsak	Suwanti dan Yonferizal MR Koto	2016	Penggunaan daun sirsak untuk mencegah keputihan	Menggunakan ekstrak daun sirsak dapat mengurangi gejala keputihan dengan cara penggunaan yang benar dan rutin karena mengandung zat antiseptik yang dapat membunuh kuman, yaitu <i>fenol</i> dimana kandungan <i>fenol</i> dalam daun sirsak memiliki sifat antiseptik 5 kali lebih efektif	Tidak semua pasien melakukan swab vagina untuk mengetahui penyebab keputihan sehingga pemilihan yang diberikan berdasarkan pengobatan empiris tanda diketahui penyebab pasti dari keputihan.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non-eksperimental, pengambilan data dilakukan secara retrospektif dan dilakukan analisis secara deskriptif.	Pengobatan keputihan perlu diketahui agar mendapatkan perawatan yang baik untuk mempercepat penyembuhan.

					daripada <i>fenol</i> biasa.			
2	Pengaruh pemberian <i>Ocimum Basilicum</i> (Daun Kemangi) Terhadap Kejadian Keputihan Patologis Pada Wanita Usia Subur Di Puskesmas Kraksaan Kabupaten Probolinggo	Fifin Maulidatul Azizah & Novrida Ratna Dewi	2020	Pemberian daun kemangi untuk mengatasi keputihan	Penelitian ini membuktikan bahwa pemberian rebusan daun kemangi dapat berpengaruh terhadap pengurangan keputihan patologis yang lebih efektif daripada obat anti keputihan yang beredar dipasaran, jika dilakukan secara teratur dua kali sehari selama tujuh hari berturut-turut.	Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan observasi secara langsung tentang upaya pencegahan keputihan agar data yang diperoleh lebih akurat dan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan wawancara	Pada penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 141 orang dengan sampel sebanyak 73 responden dengan teknik sampling menggunakan <i>stratified proportionate random sampling</i> .	Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Darma, Sartiah Yusran, & Andi Faizal Fachlevy (2017) tentang tindakan pencegahan yang dilakukan pada kasus keputihan.



						secara mendalam untuk mengetahui penyebab terjadinya keputihan. Perlu juga mengadakan penyuluhan secara rutin tentang kesehatan reproduksi.		
3	Efektifitas Jus Nanas terhadap Keputihan (Fluor Albus) Pada Wanita Usia Subur	Sofia Mawaddah	2019	Efektifitas Jus Nanas terhadap keputihan	Hasil penelitian menyatakan bahwa jus nanas terbukti mampu mengurangi keputihan pada wanita usia subur karena pada buah nanas memiliki senyawa	Penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan pendekatan <i>cross sectional study</i> yaitu pendekatan	Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 526 orang, dimana jumlah siswi kelas X sebanyak 212 orang, kelas XI sebanyak 175 orang, dan	Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Embo Johar, Sri Rejeki, & Nikmatul Khayati (2013) tentang

					<p><i>flavonoid</i> yang bersifat desinfektan dan sangat efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri gram positif.</p> <p><i>Flavonoid</i> bekerja menghancurkan bakteri dengan cara mendenaturasi protein yang dapat menyebabkan aktifitas metabolisme yang mengakibatkan kematian pada sel bakteri</p>	dengan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat.	kelas XII sebanyak 139 orang.	tindakan pencegahan yang dilakukan pada kasus keputihan.
4	Hubungan Pekejaan Dan Vulva Hygiene Dengan	Anita Herawati	2016	Menjaga kebersihan organ kewanitaan	Vulva hygiene merupakan suatu tindakan untuk memelihara	Jenis penelitian ini menggunakan metode	Jumlah sampel yang digunakan dalam	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

	Kejadian Keputihan Pada Ibu Hamil Di Pukskesmas Sungai Bilu Banjarmasin				kebersihan organ kewanitaan bagian luar (vulva) yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah infeksi	analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional.	penelitian ini adalah sebanyak 110 sampel dengan menggunakan instrumen berupa lembar kuisisioner kemudian di analisis secara univariat, bivariat dan multivariat.	Umi Sa'adatun Nikmah & Hesty Widyasih (2018) tentang pentingnya personal hygiene terhadap kejadian keputihan.
5	Personal Hygiene Habits dan Kejadian Fluor Albus Patologis pada Santriwati PP AL-Munawwir, Yogyakarta	Umi Sa'adatun Nikmah & Hesty Widyasih	2018	Personal hygiene untuk mencegah keputihan	Dalam penelitian ini disarankan untuk membiasakan mencuci tangan terlebih dahulu dan memotong kuku ketika mulai panjang untuk mencegah berpindahannya	Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mendeteksi penyebab terjadinya keputihan secara spesifik seperti pemeriksaan	Jenis penelitian menggunakan survei analitik dengan rancangan penelitian studi <i>cross sectional</i> dengan jumlah sampel sebanyak 385	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Virga Azzania Ashari (2018) tentang pentingnya personal hygiene terhadap kejadian

					<p>bakteri dari tangan ke organ genitalia yang bersifat sensitif. Cara membersihkan organ genitalia yang benar yaitu dari arah depan ke belakang. Perlu juga untuk menjaga vagina agar tidak lembab dengan menggunakan handuk yang kering dan bersih ataupun menggunakan tisu kembang. Menggunakan bahan celana dalam katun yang tidak ketat dan mengganti celana dalam</p>	<p>laboratorium sehingga diagnosis didapatkan lebih objektif dan pemberian terapi yang efektif dapat diberikan.</p>	santri.	keputihan.
--	--	--	--	--	---	---	---------	------------

					minimal 2 kali sehari atau ketika terasa lembab/basah. Selain itu perlu meningkatkan kebersihan WC agar terhindar dari bakteri atau jamur.			
6	Vaginal Discharge : Women's Health Seeking Behaviours And Cultural Practices	Ilankoon Mudiyansele Prasanthi Sumudrika Ilankoon, Christine Sampantha Evangeline Goonewardena, Poruthotage Pradeep Rasika Perera dan Rukshan Fernandopulle	2015	Perilaku pencarian kesehatan pada wanita terhadap keputihan	Penyedia layanan kesehatan primer memainkan peran utama dalam pendidikan kesehatan bagi wanita dalam kelompok usia reproduksi terkait keputihan fisiologis dan patologis dengan membedakan	Pemeriksaan harus dilakukan di laboratorium dengan fasilitas lengkap	Bahasa yang digunakan mudah dipahami	Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Novianti (2016) yaitu tentang pemeriksaan penunjang yang dilakukan di laboratorium

					dan mencari nasihat medis. Memberikan rasa hormat, privasi, dan kerahasiaan pasien menggunakan konsultasi telepon, menyediakan janji temu yang mudah dan dapat diakses ke fasilitas pada waktu yang tepat, dan merancang lingkungan perawatan yang nyaman dan rahasia yang akan berguna untuk meningkatkan perilaku mencari kesehatan			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					terhadap keputihan.			
7	Kemampuan Antifungi Ekstrak Rimpang Temulawak (Curcuma Xanthorrhiza) Terhadap Candidia Albicans	Dewi Novianti	2016	Ekstrak rimpang temulawak sebagai antifungi terhadap penyebab candidia albicans	Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah autoclaf, <i>beker glass</i> , blender, cawan petri, Erlenmeyer, inkubator, jangka sorong, jarum ose, mikro pipet, pemanas air dan <i>magnetic stirrer</i> , <i>shaker</i> , <i>soxhlet</i> , rotavapor, tabung reaksi, timbangan analitik, dan pipet tetes. Untuk bahan, yang diperlukan adalah alkohol 70%, aquadest, DMSO,	Cara kerja penelitian ini sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama	Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak lengkap (RAL) dengan menggunakan 6 perlakuan konsentrasi ekstrak rimpang temulawak dan dilakukan 4 kali ulangan pada tiap perlakuan.	Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ida Bagus Surya Manuaba (2009) yaitu tentang pemeriksaan penunjang yang dilakukan di laboratorium.

					rim pang temulawak, PDA ( <i>Potato Dextrose Agar</i> ), kertas cakram, kertas saring, pelarut n- heksana, etilasetat dan metanol			
8	Keputihan Pada Wanita	Gusti Ayu Marhaeni	2016	Upaya pencegahan Keputihan dengan personal hygiene	Cara mencegah keputihan yaitu menjaga kebersihan alat genetalia, menjaga kebersihan pakaian dalam, tidak bertukar handuk, menghindari celana ketat, menghindari vaginal douching, mencuci tangan sebelum dan	Referensi yang digunakan sedikit	Bahasa mudah dimengerti	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winna Kurnia Sari. AZ (2018) terkait pengaruh personal hygiene dalam menangani keputihan.



					sesudah membersihkan alat genitalia, serta dapat mengelola stress			
9	Pengaruh Pendidikan Kesehatan dalam Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pencegahan Keputihan Patologis	Fauziah Yulfitria	2017	Upaya pencegahan keputihan patologis	Memberikan KIE tentang penggunaan pakaian ketat sebaiknya dihindari karena akan menghalangi udara yang masuk, menghambat aliran darah, serta menyebabkan keringat dimana jika kondisi ini terjadi maka jamur penyebab keputihan akan lebih mudah berkembang	Diharapkan masyarakat mampu bekerja sama dengan tenaga kesehatan dilapangan dengan membuat penyuluhan agar pengetahuan meningkat sehingga diharapkan sikap dan perilakunya tentang keputihan	Metode penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan menggunakan desain penelitian pre-test dan post – test group design.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Marhaeni (2016) terkait personal hygiene dengan pengelolaan stress dalam upaya pencegahan keputihan.

					baik. Kejadian keputihan dapat pula disebabkan karena kelelahan atau stres yang saat itu akan menyebabkan perubahan sistem endoktrin tubuh yang berpengaruh terhadap hormonal tubuh.	menjadi lebih baik.		
10	Identifikasi Faktor Penyebab Keputihan	Winna Kurnia Sari. AZ	2018	Personal hygiene dalam mencegah keputihan	Memberikan edukasi terkait vulva hygiene. Perilaku yang buruk dalam menjaga kebersihan organ genitalia seperti mencuci dengan air kotor,	peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian kembali terkait keputihan dengan mengangkat	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survey analitik dan pendekatan dengan metode <i>cross</i>	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Marhaeni (2016) terkait pengaruh personal hygiene dalam

					<p>memakai pembilas secara berlebihan atau menggunakan sabun mandi, menggunakan celana dalam yang tidak menyerap keringat, jarang mengganti celana dalam, dan tidak sering mengganti pembalut pada saat menstruasi maka akan menimbulkan keputihan.</p>	<p>variabel dan lingkungan yang berbeda</p>	<p><i>sectional</i>. Menggunakan total sampling dengan populasi sebanyak 86 orang sebagai sampel.</p>	<p>menangani keputihan.</p>
--	--	--	--	--	---	---	---	-----------------------------

## F. Matriks Langkah 6

### Implementasi

#### Matriks Penatalaksanaan, penanganan , tata laksana, penerapan, pemberian edukasi

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Hubungan Penggunaan Sabun Pembersih Kewanitaan dengan Kejadian Keputihan Pada Wanita Usia Subur Di RW 06 desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo	Ardiyanti Hidayah, Wahyu Anjas Sari, & Yulita Ardiana Peu	2021	Pemberian edukasi terkait keputihan.	Menjaga agar organ genetalia bersih atau mencegah keputihan tidak harus menggunakan sabun kewanitaan secara rutin. Keputihan dapat dicegah dengan menjaga kebersihan organ genetalia, yaitu dengan mengganti pakaian dalam dua kali sehari, cara cebok atau membilas	Lebih banyak wanita usia subur yang menggunakan sabun pembersih alat genetalia yang mungkin dipengaruhi oleh pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh di berbagai iklan.	Menggunakan populasi sebanyak 70 wanita usia subur dengan metode yang digunakan adalah <i>simple random sampling</i> . Pengumpulan data menggunakan kuisisioner dengan analisa uji <i>chi square</i> . Pengolahan data menggunakan editing, coding, scoring, dan	Penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhinny Novryanthi (2021) tentang cara pencegahan keputihan.

					dari depan ke belakang, tidak menggunakan celana dalam yang ketat atau menggunakan celana dalam dari bahan nilon, serta tidak memakai celana yang berlapis-lapis atau celana yang terlalu tebal karena akan menyebabkan kondisi genetalia lembab yang akan menyuburkan pertumbuhan jamur dan mengakibatkan keputihan.		tabulating.	
2	Hubungan Antara Pengetahuan	Dhinny Novryanthi	2021	Pencegahan keputihan	Memberikan edukasi terkait pencegahan	Peneliti tidak menjelaskan secara rinci	Penelitian ini menggunakan <i>cross sectional</i>	Penelitian ini sejalan dengan dengan

	<p>dan Perilaku Remaja putri dalam Menjaga Kebersihan Genetalia dengan Kejadian Keputihan</p>				<p>keputihan yaitu menjaga kebersihan genetalia dengan cara membersihkan genetalia, pemakaian dan kebersihan celana dalam, penggunaan antiseptik dan obat cebok, pemakaian pembalut saat menstruasi, mencukurp rambut kemaluan, penggunaan pantyliner dan bedak, juga kebersihan kamar mandi.</p>	<p>terkait pencegahan keputihan seperti pada penggunaan antiseptik dan obat cebok, penggunaan pantyliner, dan pemakaian bedak diperbolehkan atau tidak.</p>	<p>dengan mengukur variabel dependen secara serentak pada periode dan waktu tertentu, dengan penelitian ini maka akan diperoleh efek suatu fenomena (variabel dependen) yang dihubungkan dengan penyebab (variabel independem). Sampel yang digunakan adalah populasi siswi SMK Darmawangsa Cianjur</p>	<p>penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti Hidayah, Wahyu Anjas Sari, &amp; Yulita Ardiana Peu (2021) tentang cara pencegahan keputihan</p>
--	---	--	--	--	---	---	---	--

							berjumlah 64 responden.	
3	Perilaku Remaja Putri Tentang Penatalaksanaan dan Pencegahan Keputihan di Pondok Pesantren Putri Ummu Sulaim Pekanbaru Tahun 2018	Rina Sari	2018	Pengetahuan, sikap dan tindakan yang dilakukan remaja putri dengan mencegah keputihan	Tindakan yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya keputihan adalah dengan olahraga untuk mengilangkan stress karena terdapat perubahan dan keseimbangan hormon-hormon dalam tubuh yang dapat mengakibatkan keputihan. Dianjurkan untuk mengganti pembalut 3-4 kali dalam sehari, dan membasuh alat genetalian dari	Mayoritas remaja berpengetahuan rendah dengan sikap positif dan tidak melakukan tindakan pencegahan keputihan	Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Mrncakup populasi sebanyak 158 orang dengan jumlah sampel 113 orang yang diambil secara <i>proposional stratifikasi random sampling</i> .	Peneltian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wina Tresnawati (2015) yaitu tentang upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah keputihan

					arah depan ke belakang.			
4	Hubungan Personal Hygiene Dengan Terjadinya Keputihan Pada Remaja Putri	Wina Tresnawati	2015	Perilaku pencegahan keputihan	Untuk mencegah terjadinya keputihan berulang, maka harus selalu menjaga personal hygiene seperti menggunakan pakaian dalam yang bersih dan tidak ketat, sering mengganti pembalut pada saat datang bulan, tidak menggunakan pantyliner, rajin berolahraga, serta cara cebok yang benar dari arah depan (vagina) ke arah	Agar menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis baik dalam materi maupun dalam melakukan penelitian	Jenis penelitian ini yaitu survey analitik dengan menggunakan rancangan <i>cross sectional</i>	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rina Sari (2018) yaitu tentang upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah keputihan



					belakang (anus) dan menggunakan air bersih.			
5	Hubungan Personal Hygiene dan Penggunaan Kontrasepsi dengan Kejadian Keputihan Pada wanita Usia Subur (WUS)	Yeni riza, Nurul Indah Qariati, & Asrinawaty	2019	Tindakan personal hygiene dalam mencegah keputihan	Menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang sehat untuk merawat organ kewanitaan seperti membasuh daerah kewanitaan dengan air bersih, menggunakan sabun yang lembut untuj membersihkan area vagina, membasuh daerah kewanitaan dari depan ke belakang saat buang air kecil/air besar, dan mencukur	Masih terdapat perilaku buruk yang dilakukan oleh wanita usia subur	Penelitian ini menggunakan metode survey analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i> . Dari populasi sebanyak 2726 orang dihitung dengan menggunakan rumus slovin sehingga hasil sampel sebanyak 97 responden	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frida Rachmadiani (2019) yaitu menerapkan kebiasaan sehat sangat penting untuk mencegah terjadinya keputihan.

					bulu kemaluan di area vagina.			
6	Analisis Perilaku Pencegahan Keputihan Pada Remaja Putri Berdasarkan Teori Health Promotion Model (HPM)	Frida Rachmadiani	2019	Motivasi diri, manfaat yang dirasakan, pengaruh interpersonal, dan komitmen tindakan yang dilakukan dalam pencegahan keputihan	Perlu meningkatkan penggantian pembalut ketika sedang haid, menggali pengetahuan tentang pencegahan keputihan, dukungan keluarga atau teman sebaya dalam tindakan pencegahan keputihan, dan menggunakan celana longgar serta memilih celana dalam yang mudah menyerap keringat seperti katun untuk mencegah terjadinya	Perlu edukasi yang lebih dengan mengadakan penyuluhan kesehatan reproduksi	Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i> . Populasi yang dijadikan sampel sebanyak 216 siswi.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni riza, Nurul Indah Qariati, & Asrinawaty (2019) yaitu menerapkan kebiasaan sehat sangat penting untuk mencegah terjadinya keputihan.

					keputihan. Personal hygiene juga perlu ditingkatkan sehingga mencegah adanya kuman, virus, dan parasit yang berkembang biak di daerah sekitar genetalia			
7	Hubungan Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Keputihan Dengan Kunjungan Saat Mengalami Keputihan Ke BPS Sri Wahyuni Desa Babalan	Diding Akuaria Dwi Erma & Yuli Irnawati	2011	Tindakan penanganan keputihan	Penanganan bagi WUS yang menderita keputihan yaitu menjaga kebersihan daerah organ reproduksi dengan cara mengganti celana dalam 3 kali sehari, tidak menggunakan	Masih kurangnya hubungan tentang pengetahuan dengan keputihan.	Jenis penelitian yang digunakan adalah studi korelasi ( <i>Correlational study</i> ) dengan metode pendekatan yang digunakan adalah analitik dengan metode <i>survey cross sectional</i> .	Penelitian ini sejalan dengan dr.Supriyatini, M.Kes., SpOG (2015) yaitu tentang tindakan penanganan keputihan

	Kecamatan Gabus Kabupaten Pati				obat-obatan pembilas vagina berlebihan, menghindari pemakaian celana dalam yang lembab dan pemakaian celana jeans dalam jangka waktu yang lama, serta membasuh vagina dengan cara yang benar dari arah depan ke belakang dengan air bersih dan mengeringkan dengan handuk dan tisu.		Populasi penelitian ini sebanyak 445 orang dengan hasil akhir menggunakan sampel sebanyak 45 orang.	
8	Penggunaan Vaginal Douching Terhadap Kejadian	dr.Supriyatining sih, M.Kes., SpOG	2015	Tindakan pencegahan keputihan berulang	Dianjurkan untuk selalu menjaga pola hidup sehat dengan	Besarnya sampel pada penelitian ini kurang dalam memenuhi	Sumber yang digunakan banyak sehingga banyak	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diding Akuaria

	Candidiasis Pada Kasus Leukorea				makanan seimbang, istirahat yang cukup, hindari rokok, alkohol, dan stres berkepanjangan serta selalu menjaga kebersihan daerah genitalia tetap kering dengan menggunakan celana bahan yang menyerap keringat, tidak menggunakan celana yang terlalu ketat, biasakan mengganti pembalut atau pantyliner pada waktunya agar terhindar dari bakteri yang berkembang	jumlah populasi.	perbandingan yang dapat dilakukan	Dwi Erma & Yuli Irnawati (2011) yaitu tentang tindakan penanganan keputihan.
--	---------------------------------	--	--	--	---	------------------	-----------------------------------	--

					<p>biak. Biasakan juga membasuh genetalia dengan cara yang benar tiap kali buang air dari arah depan ke belakang. Penggunaan cairan vagina juga tidak disarankan untuk digunakan secara berlebihan karena dapat membunuh flora normal vagina.</p>			
9	<p>Pengetahuan Personal Hygiene Remaja Putri pada Kasus Keputihan</p>	<p>Helmy Ilmiawaty &amp; Kuntoro</p>	2017	<p>Pengetahuan remaja putri terkait personal hygiene</p>	<p>Dalam penelitian ini disarankan memiliki pengetahuan tentang personal hygiene, yaitu</p>	<p>Tidak terdapat sampel pada penelitian yang dilakukan</p>	<p>Dalam penelitian ini menggunakan rancangan <i>cross sectional</i> dan menggunakan pendekatan</p>	<p>Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risa Pitriani (2020), yaitu pentingnya pemeliharaan</p>

					sebelum membasuh alat genital perlu mencuci tangan, membasuh vagina dengan benar, menggunakan celana dalam yang tidak ketat dan berbahan katun, serta pengetahuan tentang penggunaan pantyliner.		deskriptif.	daerah genital untuk mencegah terjadinya keputihan.
10	Asuhan Kebidanan Pada Remaja Putri dengan Keputihan	Risa Pitriani	2020	Pendidikan kesehatan tentang keputihan	Memberikan pendidikan kesehatan tentang keputihan untuk meningkatkan pengetahuan sehingga mampu memelihara	Perlu memperbanyak referensi terkait penanganan keputihan.	Pada kasus ini tidak terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dilapangan.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Helmy Ilmiawaty & Kuntoro (2017), yaitu pentingnya pemeliharaan daerah genital

					serta meningkatkan kesehatannya sendiri, dalam mengubah, menumbuhkan dan mengembangkan perilaku positif dengan cara mencuci bagian vulva setiap hari dan menjaga agar tetap kering, menggunakan sabun non parfum saat mandi, menghindari penggunaan cairan pembersih kewanitaan yang mengandung deodorant dan bahan kimia yang			untuk mencegah terjadinya keputihan.
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------



					berlebihan, serta menjaga agar kuku tetap bersih dan pendek.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

### G. Matriks Langkah 7

#### Evaluasi

**Matriks terkait dari implementasi (evaluasi, penilaian dari hasil tatalaksana, evaluasi penanganan, lamanya perawatan, edukasi langkah preventif, penilaian, evaluasi, rasioanalitas**

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Keputihan Pada Wanita Usia Subur (WUS) DI RT 04 RW 03 Kelurahan Rowosari Semarang	Rika Puji Rahayu, Fitriani Nur Damayanti, & Indri Astuti Purwanti	2013	Pentingnya merawat personal hygiene	Hasil penelitian menunjukkan bahwa vulva hygiene sangat berpengaruh terjadinya keputihan. Hal ini menunjukkan bahwa perawatan organ reproduksi	Kurangnya referensi yang digunakan pada penelitian ini	Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i> . Populasi dalam penelitian ini adalah wanita Usia Subur di	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Dwi Pamulatsih & Tin Utami (2014) tentang personal hygiene .

					dengan melakukan tindakan higienis termasuk mencuci organ intim dengan air bersih, menjaga kelembaban organ intim dan tidak menggunakan pembalut yang wangi yang merupakan tindakan vulva hygiene sangat berpengaruh akan terjadinya keputihan pada wanita usia subur.		RT 04 RW 03 Rowosari dengan jumlah 46, menggunakan teknik <i>sampling jenuh</i> .	
2	Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Keputihan Di Poliklinik	Sartje Ellen Dagasou, Linnie Pondaag, & Jill Lolong	2014	Perilaku dan pengetahuan ibu terhadap keputihan	Dari 10 orang ibu yang melakukan wawancara singkat dari jumlah	Kurang pembahasan tentang keputihan pada	Penelitian ini menggunakan metode penelitian	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Dwi

	<p>Obstetri/Ginekologi RSU. Pancaran Kasih GMIM Manado Tahun 2014</p>				<p>kunjungan ibu perbulan, 5 orang ibu mengatakan bahwa mereka baru mengetahui keputihan saat melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik, 3 orang mengatakan bahwa sudah mengetahui adanya keputihan sebelum datang ke klinik karena adanya informasi dari petugas kesehatan di tempat lain dan membaca berita kesehatan, sedangkan 2</p>	<p>penelitian ini</p>	<p>deskriptif</p>	<p>Pamulatsih &amp; Tin Utami (2014), yaitu tentang pengetahuan yang diterima terkait dengan keputihan.</p>
--	---	--	--	--	--	-----------------------	-------------------	---

					orang mengatakan bahwa sudah mengetahui keputihan dan seing mendapat saran dari petugas kesehatan untuk memeriksakan kesehatan organ genetalia di RS.			
3	Pengaruh Konseling Tentang Keputihan Terhadap Tingkat Pengetahuan Keputihan Pada Perempuan Di Wilayah Kerja Puskesmas II Baturaden	Anggraeni Dwi Pamulatsih & Tin Utami	2014	Pengetahuan terkait keputihan yang dialami	Pengetahuan responden terhadap kejadian keputihan serta informasi konseling tentang keputihan yang didapatkan akan sangat mempengaruhi pengetahuan responden	Penelitian ini menggunakan kuisisioner sebagai instrumen yang dimana pengambilan data bersifat subjektif.	Populasi dalam penelitian ini menggunakan semua perempuan yang terkena keputihan fisiologis dan patologis di wilayah puskesmas II Baturaden	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartje Ellen Dagasou, Linnie Pndaah, & Jill Lolong (2014), yaitu tentang pengetahuan yang diterima

	Tahun 2014				karena semakin banyak yang mendapatkan informasi konseling tentang kejadian keputihan maka semakin baik juga pengetahuan responden, sebaliknya semakin responden tidak memperoleh informasi maka semakin kurang pula pengetahuan tentang kejadian keputihan.		tahun 2013 sebanyak 953 orang.	terkait dengan keputihan.
4	Penggunaan Vaginal Douching Terhadap	dr.Supriyatining sih, M.Kes., SpOG	2015	Tindakan vaginal douching terhadap	Apabila <i>douching</i> vagian hanya dilakukan	Keterbatasan waktu dan responden	Sumber yang digunakan banyak	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

	Kejadian Candidiasis Pada Kasus Leukorea			keputihan	dengan menggunakan air dan sabun mandi akan meningkatkan risiko untuk terjadi candidiasis 2.486 kali dibandingkan jika <i>douching</i> vagina dilakukan dengan air sirih atau cairan khusus untuk membersihkan vagina. Semua kelainan yang mengganggu flora normal vagina dapat menjadikan vagina sebagai tempat untuk berkembang biak. Jika cara membilas	yang kurang terbuka pada penelitian ini	sehingga banyak perbandingan yang dapat dilakukan	dilakukan oleh Rika Puji Rahayu, Fitriani Nur Damayanti, & Indri Astuti Purwanti (2013) tentang personal hygiene
--	--	--	--	-----------	--	---	---	--

					vagina yang dilakukan salah maka risiko kejadian kandidiasis akan meningkat 2.472 kali dibandingkan dengan membilas vagina yang dilakukan dengan benar.			
5	Pengaruh Pemberian Agar-agar Lidah Buaya Terhadap Kejadian Keputihan	Cecilya Kustanti	2016	Efektifitas pemberian agar-agar lidah buaya terhadap kejadian keputihan	Pada kelompok perlakuan, pemberian agar-agar lidah buaya hasil pre-test adalah $25,32 \pm 5,89$ dan pemberian agar-agar lidah buaya post-test pada perempuan terjadi penurunan	Penelitian ini perlu menambah informasi serta memperkuat teori terkait manfaat agar-agar lidah buaya.	Terdapat perubahan yang signifikan setelah pemberian agar-agar lidah buaya	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nur Baety, Eka Riyanti, & Diah Astutiningrum (2019) bahwa penggunaan terapi herbal dapat menangani

					<p>yang signifikan secara statistik, yaitu <math>11,69 \pm 2,77</math>. Penurunan keputihan yang terjadi pada kelompok perlakuan - 11,6211 dari pre test ke post test. Penurunan ini disebabkan oleh pemberian agar-agar lidah buaya yang artinya agar-agar lidah buaya mempunyai pengaruh terhadap penurunan angka keputihan yang dialami remaja putri, dimana</p>			kejadian keputihan
--	--	--	--	--	---	--	--	--------------------



					mereka mengatakan bahwa merasa lenih nyaman setelah pemberian agar-agar lidah buaya.			
6	Efektifitas Air Rebusan Daun Sirih Hijau dalam Mengatasi Keputihan Kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Gombang	Dwi Nur Baety, Eka Riyanti, & Diah Astutiningrum	2019	Efektifitas daun sirih hijau terhadap penanganan keputihan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil sebelum dan sesudah diberikan air rebusan daun sirih hijau dengan cara dibilas ke vagina selama 6 hari berturut-turut pagi dan malam hari terdapat pengaruh secara signifikan dalam mengatasi	Perlu adanya penyeragaman ukuran dan kualitas yang sama pada penelitian ini	Tercapainya tujuan pemberian rebusan daun sirih hijau yang bermanfaat untuk menangani keputihan.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cecilya Kustanti (2016) bahwa penggunaan terapi herbal dapat menangani kejadian keputihan

					keputihan, dari 24 siswi yang sudah tidak mengalami keputihan sebanyak 21 responden, dan yang mengalami keputihan ringan sebanyak 3 siswi. 21 responden mengaku setelah menggunakan air rebusan daun sirih hijau keputihan yang dialami tidak keluar lagim setelah bilas dengan air rebusan daun sirih hijau terdapat sensasi			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					semriwing dan merasa nyaman.			
7	Efektifitas Jus Nanas terhadap Keputihan (Fluor Albus) Pada Wanita Usia Subur	Sofia Mawaddah	2019	Efektifitas jus nanas terhadap keputihan	Pada penelitian ini didapatkan hasil pada wanita usia subur yang mengkonsumsi jus nanas selama 1 minggu secara teratur dapat mengurangi keputihan, sedangkan pada pagi hari sebelum makan dan mengkonsumsi obat 2 jam setelah makan secara teratur setiap hari akan mengurangi keputihan selama kurang	Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Dilakukan pula pemeriksaan inspekulo untuk mengetahui sifat keputihan normal atau tidak normal.	Penelitian ini telah di uji etik dan disetujui oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Palangka Raya dengan Nomor:089 B/II/KE.PE/2019.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurqalbi Sampara, Jumrah Sudirman, Fadrijah Ohorella, & Gusmayanti (2021), Wayan Mustika, Putu Susy Natha Astini, & Ni Putu Yunianti SC (2014), dan Fifi Maulidatul Azizah & Novrida Ratna Dewi (2020),

					lebih 3 hari.			yaitu tentang terapi non farmakologis untuk menangani keputihan
8	Daun Sirsak ( <i>Annona Muricata. L</i> ) Sebagai Penanganan Keputihan Pada Wanita Usia Subur	Nurqalbi Sampara, Jumrah Sudirman, Fadjriah Ohorella, & Gusmayanti	2021	Penggunaan daun sirsak terhadap kejadian keputihan patologis	Sebelum pemberian daun sirsak, terdapat 30 orang responden yang mengalami keputihan patologi dan setelah diberikan intervensi rebusan daun sirsak yang mengalami perubahan hanya 26 orang (86,7%) dari patologi menjadi fisiologi,	Penanganan pemberian daun sirsak masih belum efektif karena masih ada wanita yang mengalami keputihan meskipun terdapat pengurangan jumlah keputihan patologis menjadi fisiologis.	Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> sebanyak 30 orang dengan menggunakan lembar observasi dan data primer dimana peneliti berhadapan langsung dengan responden dan menganalisis	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofia Mawaddah (2019), Wayan Mustika, Putu Susy Natha Astini, & Ni Putu Yunianti SC (2014), dan Fifin Maulidatul Azizah & Novrida Ratna Dewi (2020), yaitu tentang terapi non

					sedangkan 4 orang (13,3%) masih mengalami keputihan patologi karena ibu bekerja sehingga kondisi fisik wanita yang berkerja energi dan psikis nya kurang karena pekerjaan berat atau aktifitas ekstra yang mengakibatkan keletihan sehingga gejala keputihan tetap muncul.		data menggunakan Uji Mc-Nemar	farmakologis untuk menangani keputihan
9	Penggunaan Air Rebusan Daun sirih Terhadap Keputihan Fisiologis Di	Wayan Mustika, Putu Susy Natha Astini, & Ni Putu Yunianti SC	2014	Penanganan keputihan dengan air rebusan daun sirih	Berdasarkan hasil penelitian, setelah pemberian rebusan air	Penelitian ini masih belum efektif karena masih ada 1 responden	Penelitian ini merupakan jenis eksperimen yang bertujuan	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurqalbi

	Kalangan Remaja Putri Mahasiswa Poltekkes Denpasar				daun sirih selama 5 hari dengan penggunaan 2 kali sehari dapat diperoleh responden yang tidak mengalami keputihan sebanyak 19 orang (95%) dan 1 orang (5%) masih mengalami keputihan pada periode menstruasi 1 bulan berikutnya. Kandungan dalam daun sirih seperti eugenol dapat mematikan jamur candida albicans sebagai	yang mengalami keputihan	untuk mengetahui suatu gejala atau efek yang timbul. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang didapatkan langsung dari lembar kuisioner yang diisi oleh responden	Sampara, Jumrah Sudirman, Fadriah Ohorella, & Gusmayanti (2021), Sofia Mawaddah (2019), dan Fifin Maulidatul Azizah & Novrida Ratna Dewi (2020), yaitu tentang terapi non farmakologis untuk menangani keputihan.
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	---

					penyebab keputihan dan tannin, berupa astringen yang dapat mengurangi sekresi cairan pada liang vagina.			
10	Pengaruh pemberian <i>Ocimum Basilicum</i> (Daun Kemangi) Terhadap Kejadian Keputihan Patologis Pada Wanita Usia Subur Di Puskesmas Kraksaan Kabupaten Probolinggo	Fifin Maulidatul Azizah & Novrida Ratna Dewi	2020	Penanganan keputihan menggunakan <i>Ocimum Basilicum</i> (Daun Kemangi)	Pada penelitian ini, setelah pemberian rebusan daun kemangi selama 7 hari berturut-turut sebagian besar responden yang mengalami keputihan patologis berkurang yaitu sebanyak 11 responden (73%) yang mengalami keputihan fisiologis dan	Masih terdapat responden yang mengalami keputihan patologis, meskipun pemberian rebusan daun kemangi sudah cukup efektif mengurangi keputihan patologis menjadi	Pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan wawancara	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurqalbi Sampara, Jumrah Sudirman, Fadjriah Ohorella, & Gusmayanti (2021), Wayan Mustika, Putu Susy Natha Astini, & Ni Putu Yuniarti SC (2014), dan

					<p>sisanya sebanyak 4 responden (27%) masih mengalami keputihan patologis. Terdapat beberapa faktor yang mendukung perubahan responden dari keputihan patologis menjadi fisiologis, yaitu umur, paritas, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan, termasuk personal hygiene masing-masing responden.</p>	<p>fisiologis.</p>		<p>Sofia Mawaddah (2019), yaitu tentang terapi non farmakologis untuk menangani keputihan</p>
--	--	--	--	--	---	--------------------	--	---



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pembahasan Hasil Telaah Evidence Based Asuhan 7 Langkah Varney

##### 1. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Keputihan merupakan gejala yang sering dialami oleh sebagian besar wanita sepanjang siklus kehidupannya mulai dari masa remaja, masa reproduksi maupun masa menopause (Kasdu, 2010). Menurut Murtiastutik (2008), *Fluor Albus* atau keputihan bukan merupakan penyakit melainkan salah satu tanda gejala dari suatu penyakit organ reproduksi wanita, akan tetapi masalah keputihan ini jika tidak ditangani akan menyebabkan masalah yang serius.

Menurut Wiraguna A. (2010), *fluor Albus* atau keputihan adalah keadaan keluarnya cairan dari vagina atau leher rahim pada wanita. Keputihan ditentukan sebagai keputihan patologis jika disertai dengan perubahan bau dan warna serta jumlah yang tidak normal. Keluhan dapat disertai dengan edema genital, disuria, nyeri perut bagian bawah, atau nyeri punggung bawah. Hal ini sejalan dengan Kusmiran (2011), yaitu keputihan merupakan keluarnya cairan tidak hanya darah dari liang vagina di luar kebiasaan, baik berbau maupun tidak, dan diikuti rasa gatal setempat.

Dari sudut pandang kedokteran, keputihan disebut dengan istilah "*fluor albus*" ataupun "*leukorea*" yang berarti cairan yang keluar dari alat

genitalia serta bukan merupakan darah. Keputihan bisa bersifat normal maupun tidak normal yang menggambarkan bagian gejala dari suatu penyakit (Wira & Kusumawardani, 2011). Pengertian ini sejalan dengan pernyataan Manuaba (2009), yaitu *Leukorea* berasal dari kata *Leuco* yang berarti benda putih yang disertai dengan akhiran *-rrhea* yang berarti aliran atau cairan yang mengalir. *Leukorea* atau *fluor albus* atau keputihan atau *vaginal discharge* merupakan semua pengeluaran dari kemaluan yang bukan darah. Keputihan merupakan salah satu tanda dari proses ovulasi yang terjadi di dalam tubuh. Selain itu, keputihan juga merupakan salah satu tanda dari suatu penyakit.

Tanda dan gejala dari keputihan yang fisiologis berwarna jernih, tidak berbau, tidak gatal dan tidak pedih. Sedangkan keputihan yang patologis jumlahnya banyak, warnanya kuning atau kehijauan, warna putih seperti susu basi, disertai rasa gatal, pedih terkadang disertai bau amis atau busuk (Anita Herawati, Dede Mahdiyah, 2016). Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh Diding Akuaria Dewi Erma (2011), Wanita usia subur di Desa Babalan Kecamatan Gabus, keputihan patologis ditandai dengan jumlahnya yang amat banyak, berwarna, berbau, dan disertai dengan keluhan-keluhan seperti gatal, nyeri, terjadi pembengkakan, panas dan pedih ketika buang air kecil, serta nyeri di perut bagian bawah.

Hasil penelitian Rahayu dkk (2015) menunjukkan vulva hygiene sangat mempengaruhi untuk terjadinya keputihan. Hal ini menunjukkan bahwa perawatan organ reproduksi dengan melakukan tindakan higienis termasuk mencuci organ intim dengan air bersih, menjaga kelembaban

organ intim dan tidak menggunakan pembalut yang wangi yang merupakan tindakan vulva hygiene sangat mempengaruhi terjadinya keputihan pada wanita usia subur.

Pada penelitian ini, penggunaan iritan, kebiasaan berkemih yang kurang baik seperti tidak membersihkan alat genitalia dengan tisu atau handuk kering, dan penggunaan pakaian dalam yang kurang baik seperti tidak menggunakan pakaian dalam dengan bahan katun merupakan faktor resiko terjadinya keputihan (Salamah dkk, 2020). Keputihan dapat merupakan gejala dari penyakit lain, apabila keputihan yang berlangsung terus menerus dalam waktu yang cukup lama dan menimbulkan keluhan, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk diketahui penyebabnya, dan apabila keputihan tidak diobati secara benar akan berakibat kemandulan, infeksi saluran telur, awal munculnya pertumbuhan kanker mulut rahim bahkan dapat menyebabkan kematian (Purnamasari & Hidayanti, 2019).

Menurut Susanti Handayani, Kusyogo Cahyo (2017), keputihan menyebabkan timbulnya kanker serviks yang mengancam wanita sampai kematian. Faktor lain yang menjadi pendukung terjadinya keputihan adalah anemia, gizi rendah, kelelahan, dan obesitas. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Khuzaiyah dkk (2015), bahwasanya keputihan yang tidak ditangani dengan segera akan menimbulkan masalah yang serius.

## 2. Langkah II: Masalah aktual

Menurut Hanifa Wiknjosastro (2007), pada keputihan fisiologis terdiri atas cairan yang kadang- kadang berbentuk mukus yang memiliki banyak epitel dengan leukosit yang tidak sering. Identitas dari keputihan fisiologis merupakan cairan berwarna bening, kadang- kadang putih kental, tidak berbau, serta tanpa diiringi dengan keluhan, seperti rasa gatal, perih, serta dibakar dan jumlahnya sedikit. Diagnosis ini sejalan dengan Marhaeni (2016), bahwa keputihan secara fisiologi terjalin saat sebelum haid sebab pengaruh dari proses haid yang mengaitkan hormon estrogen serta progesteron oleh ovarium yang menimbulkan pengeluaran sekret yang berbentuk seperti benang, tipis, dan elastis. Bakteri yang masuk ke alat kelamin perempuan akan menimbulkan infeksi sehingga dapat menyebabkan keputihan patologis yang ditandai dengan gatal, berbau, dan bercorak kuning kehijauan.

Keputihan ditandai dengan keluarnya cairan berlebihan dari liang senggama (vagina) yang terkadang disertai rasa gatal, nyeri, sensasi terbakar di bibir kemaluan yang biasanya disertai bau busuk dan menimbulkan rasa nyeri saat buang air kecil atau bersenggama (Egi Yunia Rahmi, Arneliwati, 2015).

*Fluor albus* fisiologis merupakan cairan dari vagina setelah mendapat haid yang pertama, dari kelenjar yang terdapat pada serviks yang menimbulkan lendir karena pengaruh hormon estrogen serta jumlah yang keluar berubah-ubah sesuai dengan siklus haid. Fluor albus patologis menimbulkan rasa gatal, perih didalam vagina ataupun sekitar saluran

pembuka vulva. Biasanya dipicu oleh bakteri penyakit (patogen) serta menimbulkan peradangan. Akibat munculnya gejala yang sangat mengganggu, tampaknya berganti warna cairan menjadi kekuningan sampai kehijauan, jumlah berlebih, serta berbau dan menimbulkan rasa gatal disekitar vagina (Wulaningtyas & Widyawati, 2018).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Kusmiran (2011), yaitu pemicu keputihan dapat secara wajar (fisiologis) dipengaruhi oleh hormon tertentu. Keputihan yang abnormal dapat diakibatkan oleh infeksi atau peradangan yang berlangsung karena mencuci vagina dengan air kotor, pemeriksaan dalam yang tidak benar, penggunaan pembilas vagina yang berlebihan, pemeriksaan yang tidak higienis, dan adanya benda asing dalam vagina. Tidak hanya karena peradangan, keputihan bisa pula diakibatkan oleh masalah hormonal, celana yang tidak menyerap keringat, serta penyakit menular seksual.

Pendapat yang berbeda didapatkan oleh Trisnawati (2018), dimana beliau mengatakan pemicu keputihan yang sangat umum diderita oleh seseorang dengan berat badan yang berlebihan merupakan akibat infeksi jamur. Hal ini disebabkan oleh daerah kewanitaan yang cenderung lembab pada seorang dengan berat badan berlebihan. Salah satu ciri keputihan yang diakibatkan oleh infeksi jamur yaitu keputihan bercorak putih susu dan sangat gatal.

Keputihan adalah cairan yang keluar dari kemaluan selain darah dan bukan sebuah penyakit, akan tetapi merupakan gejala dari suatu penyakit. Keputihan fisiologi ditandai dengan cairan yang keluar dari vagina, tidak

berbau busuk, tidak terasa nyeri, gatal maupun panas. Sedangkan keputihan patologi ditandai dengan cairan keputihan yang berubah warna, terasa gatal, nyeri, dan terasa panas (Indah Setiani et al., 2016).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Dhuangga (2012), bahwa proses terjadinya keputihan merupakan keluarnya sekret/ cairan yang bening, tidak berbau, tidak menimbulkan perih serta pula tidak gatal, sebaliknya bila sekret yang keluar itu berbau, berwarna, timbul perih serta gatal maka dapat dikatakan itu adalah keputihan yang abnormal, serta pemicu munculnya keputihan yang abnormal, seperti jamur, bakteri, maupun kuman dan jamur yang paling sering menyerang yaitu candida albicans.

Keputihan fisiologis umumnya berupa lendir encer, bening, serta tidak busuk. Hal ini sangat berbeda dengan keputihan yang diakibatkan oleh serbuan bakteri ataupun jamur, lendir yang keluar warna kekuningan terlebih lagi berwarna kecoklatan dan bahkan terkadang bercampur darah (Oktova, 2016).

Keputihan patologis bisa terjadi karena penggunaan cairan antiseptik yang bisa menimbulkan keputihan, karena antiseptik mengganti Ph vagina yang normal (4, -4, 5) jadi bertambah serta jadi basa sehingga daerah kewanitaan rentan terhadap serangan bakteri yang bisa menyebabkan keputihan patologis, serta Terdapat ikatan antara pengetahuan dengan anggapan kerentanan, anggapan keseriusan, anggapan khasiat, anggapan hambatan, serta anggapan keahlian diri. Terdapat jalinan antara anggapan kerentanan, anggapan hambatan, anggapan keahlian diri, isyarat untuk

bertindak dengan aksi dalam menghindari keputihan patologis (Kurniawati & Sulistyowati, 2014).

### **3. Langkah III: Masalah Potensial**

Dampak keputihan dapat terjadi perlengketan pada rahim, saluran telur atau tuba falopi sampai pembusukan indung telur oleh infeksi yang berat bisa terjadi tuba ovarium abses atau kantung nanah yang menekan saluran telur dan indung telur, apabila kedua sisi kanan dan kiri tuba ovarium yang tertekan abses maka dapat dikatakan bahwa wanita tidak akan bisa mendapatkan keturunan atau mandul (Khuzaiyah et al., 2015). Keputihan abnormal bisa terjalin pada seluruh infeksi alat kelamin (infeksi bibir kemaluan, liang senggama, mulut rahim, jaringan penyangga, serta pada infeksi karena penyakit menular seksual) (Marhaeni, 2016).

Keputihan bila tidak ditangani dengan baik maka akan berdampak fatal yaitu terjadinya kemandulan serta kehamilan ektopik (hamil diluar kandungan). keputihan juga merupakan indikasi dini kanker rahim. Masalah ini dapat berdampak negatif jika tidak ditangani sejak dini (Oriza & Yulianty, 2018). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wulaningtyas & Widyawati (2018), yaitu salah satu permasalahan kesehatan yang penting untuk WUS yaitu mengenai penyakit kandungan, dimana salah satu ciri indikasi dari penyakit kandungan tersebut adalah terjadinya keputihan. Fungsi genitalia sebagai alat reproduksi dapat terganggu atau bahkan tidak dapat difungsikan.

Begitupun Wira & Kusumawardani (2011), beliau mengemukakan jika keputihan yang tidak normal dibiarkan begitu saja ada kemungkinan penyebaran infeksi meluas ke bagian atas dari saluran genetalia dan reproduksi wanita serta penyebaran ke saluran kencing. Penyebaran infeksi ke saluran genetalia dan reproduksi yang lebih atas biasanya menyebabkan infeksi yang disebut penyakit radang panggul yang meliputi infeksi pada bagian uterus atau rahim wanita baik jaringan ikatnya maupun bagian otot dari uterus sehingga infeksi juga dapat mengenai saluran telur atau bagian tuba dan menjalar pada indung telur atau ovarium. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya infertilitas atau kemandulan.

Wanita yang berpikiran keputihan fisiologis merupakan keputihan patologis membuat wanita tersebut merasa tidak nyaman serta takut dirinya mengidap penyakit kelamin. Sebaliknya justru wanita yang mengalami keputihan patologis tetapi berpikiran keputihan fisiologis mengabaikan keputihan yang dideritanya sehingga penyakit bisa semakin parah yaitu terjadinya infeksi dari bakteri, virus, jamur, atau parasit yang bisa menyebabkan terjadinya kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) (Sulistianingsih dkk, 2013).

Keputihan patologis membuat ibu merasa tidak nyaman karena menunjukkan keluhan berbau busuk, gatal, dan vulva terasa gatal. Apabila keputihan tidak diobati maka infeksi dapat menjalar ke rongga rahim kemudian sampai ke indung telur dan akhirnya sampai ke rongga panggul.



Hal itu membuat wanita yang mengalami keputihan kronik menjadi mandul (Afri Julianingsih, Maya Safitri, 2010).

Banyak wanita di Indonesia yang menyepelekan keputihan dan menganggap hal itu seperti itu sudah biasa, disamping itu rasa malu ketika wanita atau remaja yang mengalami keputihan enggan untuk berkonsultasi ke dokter. Keputihan yang dibiarkan sangat fatal apabila terlambat ditangani akan mengakibatkan kemandulan dan hamil diluar kandungan dan juga keputihan merupakan gejala awal dari kanker serviks yang bisa berujung pada kematian (Ilmiawati & Kuntoro, 2017). Bagi wanita sangat penting merawat genetalia sejak dini secara tepat untuk mengurangi risiko terjadinya keputihan. Keputihan akan memberi dampak berbahaya bagi wanita seperti infeksi, penyakit radang panggul, infertilitas, dan gangguan psikologis (Rachmadiani et al., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Widiasih & Setyawati (2018), menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui tanda dan gejala keputihan (69%), namun perilaku lain yang masih berisiko tinggi terhadap infeksi sistem reproduksi, penggunaan sabun saat membersihkan daerah kewanitaan dilakukan oleh 47% responden dan yang tidak paham mengenai cara membersihkan vagina dengan tepat (76%). Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait upaya pencegahan keputihan tersebut.

#### 4. Langkah IV: Tindakan Segera dan Kolaborasi

Hal yang perlu dilakukan dalam mencegah keputihan adalah menjaga kebersihan daerah vagina dengan mencuci bagian vulva dan menjaga agar tetap kering, sebaiknya menggunakan sabun non parfum saat mandi untuk mencegah timbulnya iritasi pada vaginam menghindari penggunaan cairan pembersih kewanitaan yang mengandung bahan kimia karena hal itu dapat mengganggu pH cairan vagina yang dapat merangsang munculnya jamur atau bakteri, menggunakan celana dalam yang tidak ketat dan menjaga kuku agar tetap bersih dan pendek (Wiwin Embo Johar, Sri Rejeki, 2013). Perlu dilakukan pemeriksaan fisik secara umum dan khusus, pemeriksaan laboratorium rutin yang mencakup pewarnaan Gram (untuk infeksi bakteri), preparat basah (infeksi trikomonas), preparat KOH (infeksi jamur), kultur/ pembiakan (menentukan jenis bakteri penyebab), dan Pap smear (untuk menentukan adanya sel ganas) (Manuaba, 2009).

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah autoklaf, *beaker glass*, blender, cawan petri, Erlenmeyer, inkubator, jangka sorong, jarum ose, mikro pipet, pemanas air dan *magnetic stirrer*, *shaker*, *soxhlet*, rotavapor, tabung reaksi, timbangan analitik, dan pipet tetes. Untuk bahan, yang diperlukan adalah alkohol 70%, aquadest, DMSO, rimpang temulawak, PDA (*Potato Dextrose Agar*, kertas cakram, kertas saring, pelarut n-heksana, etil asetat dan methanol (Dewi Novianti, 2016)

Penyedia layanan kesehatan primer memainkan peran utama dalam pendidikan kesehatan bagi wanita dalam kelompok usia reproduksi terkait

keputihan fisiologis dan patologis dengan membedakan dan mencari nasihat medis. Memberikan rasa hormat, privasi, dan kerahasiaan pasien menggunakan konsultasi telepon, menyediakan janji temu yang mudah dan dapat diakses ke fasilitas pada waktu yang tepat, dan merancang lingkungan perawatan yang nyaman dan rahasia yang akan berguna untuk meningkatkan perilaku mencari kesehatan terhadap keputihan (Mudiyanselage dkk, 2015).

Pasien yang memenuhi kriteria menjalani proses pemeriksaan genital termasuk pemasangan speculum dan menerima tes pH keputihan dengan metode strip. Empat swab vagina dikumpulkan dan satu swab digunakan untuk membuat apusan pewarnaan gram (Chirenje dkk, 2018). Pengobatan keputihan yang direkomendasikan adalah obat triazol teorol, seperti flukonazol (150 mg sebagai dosis tunggal) untuk pengobatan sistemik atau obat anti jamur yang bekerja secara lokal seperti itraconazole (200 mg 2x1). Pessarium imidazole intravaginal atau krim seperti klotrimazol (500 mg sebagai dosis tunggal), miconazole (ovula vagina 1,2 g sebagai dosis tunggal) atau econazole (pessarium 150 mg pada malam hari selama 1 sampai 3 malam) (Brown, 2018).

Melakukan pemeriksaan IVA Test dan mengoleskan albothyl pada porsi yang terdapat erosi dan didapatkan ibu mengalami keputihan yang tidak normal. Diberikan terapi obat herbal 550 mg 3x1, Metronidazole 500 mg 3x1, dan Vit.C 500 mg 3x1 (Mustakimah, 2017). Tidak sependapat dengan Penyedia layanan kesehatan primer memainkan peran utama

dalam pendidikan kesehatan bagi wanita dalam kelompok usia reproduksi terkait keputihan fisiologis dan patologis dengan membedakan dan mencari nasihat medis. Memberikan rasa hormat, privasi, dan kerahasiaan pasien menggunakan konsultasi telepon, menyediakan janji temu yang mudah dan dapat diakses ke fasilitas pada waktu yang tepat, dan merancang lingkungan perawatan yang nyaman dan rahasia yang akan berguna untuk meningkatkan perilaku mencari kesehatan terhadap keputihan (Mudiyanselage dkk, 2015).

Dewi (2019) berpendapat bahwa dilakukan tindakan kolaborasi dengan bidan, dengan pemberian asuhan dengan penyuluhan tentang kebersihan vagina dan dianjurkan untuk mengonsumsi yoghurt dan vitamin C dengan teratur dan tepat waktu. Tidak sependapat dengan Maryanti & Wuryani (2019), yaitu remaja putri yang mengalami keputihan agar segera memeriksakan diri kepada petugas kesehatan (dokter, bidan, atau perawat) agar dapat memperoleh informasi atau penyuluhan serta mendapatkan pengobatan ketika mengalami keputihan.

## **5. Langkah V : Perencanaan**

Penatalaksanaan yang dilakukan kepada pasien dengan diagnosis Kandidiasis Vulvo Vaginalis (KVV) akibat keputihan mendapatkan Menggunakan ekstrak daun sirsak dapat mengurangi gejala keputihan dengan cara penggunaan yang benar dan rutin karena mengandung zat antiseptik yang dapat membunuh kuman, yaitu *fenol* dimana kandungan *fenol* dalam daun sirsak memiliki sifat antiseptik 5 kali lebih efektif

daripada *fenol* biasa (Suwanti & Koto, 2016). Tidak sependapat dengan Azizah dkk (2020), bahwa Penelitian ini membuktikan bahwa pemberian rebusan daun kemangi dapat berpengaruh terhadap pengurangan keputihan patologis yang lebih efektif daripada obat anti keputihan yang beredar dipasaran, jika dilakukan secara teratur dua kali sehari selama tujuh hari berturut-turut.

Mawaddah (2019) berpendapat penelitian ini membuktikan bahwa pemberian rebusan daun kemangi dapat berpengaruh terhadap pengurangan keputihan patologis yang lebih efektif daripada obat anti keputihan yang beredar dipasaran, jika dilakukan secara teratur dua kali sehari selama tujuh hari berturut-turut. Tidak sependapat dengan Anita Herawati, Dede Mahdiyah (2016), bahwa vulva hygiene merupakan suatu tindakan untuk memelihara kebersihan organewanitaan bagian luar (vulva) yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah infeksi.

Nikmah & Widyasih (2018) berpendapat bahwa dalam penelitian ini disarankan untuk membiasakan mencuci tangan terlebih dahulu dan memotong kuku ketika mulai panjang untuk mencegah berpindahnya bakteri dari tangan ke organ genitalia yang bersifat sensitif. Cara membersihkan organ genitalia yang benar yaitu dari arah depan ke belakang. Perlu juga untuk menjaga vagina agar tidak lembab dengan menggunakan handuk yang kering dan bersih ataupun menggunakan tisu kembang. Menggunakan bahan celana dalam katun yang tidak ketat dan

mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari atau ketika terasa lembab/basah. Selain itu perlu meningkatkan kebersihan WC agar terhindar dari bakteri atau jamur.

Tidak sependapat dengan Mudiyansele dkk, (2015), bahwa penyedia layanan kesehatan primer memainkan peran utama dalam pendidikan kesehatan bagi wanita dalam kelompok usia reproduksi terkait keputihan fisiologis dan patologis dengan membedakan dan mencari nasihat medis. Memberikan rasa hormat, privasi, dan kerahasiaan pasien menggunakan konsultasi telepon, menyediakan janji temu yang mudah dan dapat diakses ke fasilitas pada waktu yang tepat, dan merancang lingkungan perawatan yang nyaman dan rahasia yang akan berguna untuk meningkatkan perilaku mencari kesehatan terhadap keputihan.

Dewi Novianti (2016) menjelaskan bahwa alat yang digunakan pada penelitian ini adalah autoclaf, *beaker glass*, blender, cawan petri, Erlenmeyer, inkubator, jangka sorong, jarum ose, mikro pipet, pemanas air dan *magnetic stirrer*, *shaker*, *soxhlet*, rotavapor, tabung reaksi, timbangan analitik, dan pipet tetes. Untuk bahan, yang diperlukan adalah alkohol 70%, aquadest, DMSO, rimpang temulawak, PDA (*Potato Dextrose Agar*), kertas cakram, kertas saring, pelarut n-heksana, etil asetat dan metanol.

Tidak sependapat dengan Marhaeni (2016), bahwa cara mencegah keputihan yaitu menjaga kebersihan alat genitalia, menjaga kebersihan pakaian dalam, tidak bertukar handuk, menghindari celana ketat,

menghindari vaginal douching, mencuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan alat genitalia, serta dapat mengelola stres.

Yulfitria & Primasari (2015) berpendapat bahwa beliau memberikan KIE tentang penggunaan pakaian ketat sebaiknya dihindari karena akan menghalangi udara yang masuk, menghambat aliran darah, serta menyebabkan keringat dimana jika kondisi ini terjadi maka jamur penyebab keputihan akan lebih mudah berkembang biak. Kejadian keputihan dapat pula disebabkan karena kelelahan atau stres yang saat itu akan menyebabkan perubahan sistem endokrin tubuh yang berpengaruh terhadap hormonal tubuh.

Sesependapat dengan Sari (2013), bahwa beliau memberikan edukasi terkait vulva hygiene. Perilaku yang buruk dalam menjaga kebersihan organ genitalia seperti mencuci dengan air kotor, memakai pembilas secara berlebihan atau menggunakan sabun mandi, menggunakan celana dalam yang tidak menyerap keringat, jarang mengganti celana dalam, dan tidak sering mengganti pembalut pada saat menstruasi maka akan menimbulkan keputihan.

## **6. Langkah VI : Implementasi**

Menjaga agar organ genitalia bersih atau mencegah keputihan tidak harus menggunakan sabun kewanitaan secara rutin. Keputihan dapat dicegah dengan menjaga kebersihan organ genitalia, yaitu dengan mengganti pakaian dalam dua kali sehari, cara cebok atau membilas dari

depan ke belakang, tidak menggunakan celana dalam yang ketat atau menggunakan celana dalam dari bahan nilon, serta tidak memakai celana yang berlapis-lapis atau celana yang terlalu tebal karena akan menyebabkan kondisi genetalia lembab yang akan menyuburkan pertumbuhan jamur dan mengakibatkan keputihan (Ardiyanti Hidayah, Wahyu Anjas Sari, 2021).

Penelitian yang sejalan dilakukan oleh Novryanthi (2021), yaitu memberikan edukasi terkait pencegahan keputihan yaitu menjaga kebersihan genetalia dengan cara membersihkan genetalia, pemakaian dan kebersihan celana dalam, penggunaan antiseptik dan obat cebok, pemakaian pembalut saat menstruasi, mencukur rambut kemaluan, penggunaan pantyliner dan bedak, juga kebersihan kamar mandi.

Tindakan yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya keputihan adalah dengan olahraga untuk menghilangkan stress karena terdapat perubahan dan keseimbangan hormon-hormon dalam tubuh yang dapat mengakibatkan keputihan. Dianjurkan untuk mengganti pembalut 3-4 kali dalam sehari, dan membasuh alat genetalia dari arah depan ke belakang. Namun kelemahan dari penelitian ini adalah mayoritas remaja berpengetahuan rendah dengan sikap positif dan tidak melakukan tindakan pencegahan keputihan (R. Sari, 2018). Penelitian ini sejalan dengan Tresnawati & Rachmatullah (2014), yaitu untuk mencegah terjadinya keputihan berulang, maka harus selalu menjaga personal hygiene seperti menggunakan pakaian dalam yang bersih dan tidak ketat, sering mengganti pembalut pada saat datang bulan, tidak menggunakan



pantyliner, rajin berolahraga, serta cara cebok yang benar dari arah depan (vagina) ke arah belakang (anus) dan menggunakan air bersih.

Menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang sehat untuk merawat organewanitaan seperti membasuh daerah kewanitaan dengan air bersih, menggunakan sabun yang lembut untuk membersihkan area vagina, membasuh daerah kewanitaan dari depan ke belakang saat buang air kecil/air besar, dan mencukur bulu kemaluan di area vagina. Kelemahan pada penelitian ini adalah Masih terdapat perilaku buruk yang dilakukan oleh wanita usia subur. Dibalik kelemahannya, terdapat pula kelebihanannya karena penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 2726 dengan hasil akhir yang menjadi sampel sebanyak 97 orang (Riza dkk, 2019).

Menurut Rachmadiani (2019), perlu meningkatkan penggantian pembalut ketika sedang haid, menggali pengetahuan tentang pencegahan keputihan, dukungan keluarga atau teman sebaya dalam tindakan pencegahan keputihan, dan menggunakan celana longgar serta memilih celana dalam yang mudah menyerap keringat seperti katun untuk mencegah terjadinya keputihan. Personal hygiene juga perlu ditingkatkan sehingga mencegah adanya kuman, virus, dan parasit yang berkembang biak di daerah sekitar genetalia.

Penanganan bagi WUS yang menderita keputihan yaitu menjaga kebersihan daerah organ reproduksi dengan cara mengganti celana dalam 3 kali sehari, tidak menggunakan obat-obatan pembilas vagina berlebihan, menghindari pemakaian celana dalam yang lembab dan pemakaian celana jeans dalam jangka waktu yang lama, serta membasuh vagina dengan cara

yang benar dari arah depan ke belakang dengan air bersih dan mengeringkan dengan handuk dan tisu (Diding Akuaria Dewi Erma, 2011).

Penelitian ini sejalan dengan Supriyatiningasih (2015), yaitu dianjurkan untuk selalu menjaga pola hidup sehat dengan makanan seimbang, istirahat yang cukup, hindari rokok, alkohol, dan stres berkepanjangan serta selalu menjaga kebersihan daerah genetalia tetap kering dengan menggunakan celana bahan yang menyerap keringat, tidak menggunakan celana yang terlalu ketat, biasakan mengganti pembalut atau pantyliner pada waktunya agar terhindar dari bakteri yang berkembang biak. Biasakan juga membasuh genetalia dengan cara yang benar tiap kali buang air dari arah depan ke belakang. Penggunaan cairan vagina juga tidak disarankan untuk digunakan secara berlebihan karena dapat membunuh flora normal vagina.

Penelitian yang lain tentang personal hygiene juga dilakukan oleh Ilmiawati & Kuntoro (2017), dimana dalam penelitian ini disarankan memiliki pengetahuan tentang personal hygiene, yaitu sebelum membasuh alat genital perlu mencuci tangan, membasuh vagina dengan benar, menggunakan celana dalam yang tidak ketat dan berbahan katun, serta pengetahuan tentang penggunaan pantyliner.

Selain itu, memberikan pendidikan kesehatan tentang keputihan untuk meningkatkan pengetahuan sehingga mampu memelihara serta meningkatkan kesehatannya sendiri, dalam mengubah, menumbuhkan dan mengembangkan perilaku positif dengan cara mencuci bagian vulva setiap

hari dan menjaga agar tetap kering, menggunakan sabun non parfum saat mandi, menghindari penggunaan cairan pembersih kewanitaan yang mengandung deodorant dan bahan kimia yang berlebihan, serta menjaga agar kuku tetap bersih dan pendek (Pitriani, 2020).

## **7. Langkah VII : Evaluasi**

Menurut Rahayu dkk (2015), dari hasil penelitian menunjukkan bahwa vulva hygiene sangat berpengaruh terjadinya keputihan. Hal ini menunjukkan bahwa perawatan organ reproduksi dengan melakukan tindakan higienis termasuk mencuci organ intim dengan air bersih, menjaga kelembaban organ intim dan tidak menggunakan pembalut yang wangi yang merupakan tindakan vulva hygiene sangat berpengaruh akan terjadinya keputihan pada wanita usia subur.

Dari 10 orang ibu yang melakukan wawancara singkat dari jumlah kunjungan ibu perbulan, 5 orang ibu mengatakan bahwa mereka baru mengetahui keputihan saat melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik, 3 orang mengatakan bahwa sudah mengetahui adanya keputihan sebelum datang ke klinik karena adanya informasi dari petugas kesehatan di tempat lain dan membaca berita kesehatan, sedangkan 2 orang mengatakan bahwa sudah mengetahui keputihan dan sering mendapat saran dari petugas kesehatan untuk memeriksakan kesehatan organ genitalia di RS (Sartje Ellen Dagasou, Linnie Pondaag, 2014).

Menurut Anggraeni Dwi Pamulatsih (2014), pengetahuan responden terhadap kejadian keputihan serta informasi konseling tentang keputihan

yang didapatkan akan sangat mempengaruhi pengetahuan responden karena semakin banyak yang mendapatkan informasi konseling tentang kejadian keputihan maka semakin baik juga pengetahuan responden, sebaliknya semakin responden tidak memperoleh informasi maka semakin kurang pula pengetahuan tentang kejadian keputihan.

Dalam tindakan terhadap keputihan, Apabila *douching* vagina hanya dilakukan dengan menggunakan air dan sabun mandi akan meningkatkan risiko untuk terjadi candidiasis 2.486 kali dibandingkan jika *douching* vagina dilakukan dengan air sirih atau cairan khusus untuk membersihkan vagina. Semua kelainan yang mengganggu flora normal vagina dapat menjadikan vagina sebagai tempat untuk berkembang biak. Jika cara membilas vagina yang dilakukan salah maka risiko kejadian kandidiasis akan meningkat 2.472 kali dibandingkan dengan membilas vagina yang dilakukan dengan benar (Supriyatningsih, 2015).

Pada kelompok perlakuan, pemberian agar-agar lidah buaya hasil pre-test adalah  $25,32 \pm 5,89$  dan pemberian agar-agar lidah buaya post-test pada perempuan terjadi penurunan yang signifikan secara statistik, yaitu  $11,69 \pm 2,77$ . Penurunan keputihan yang terjadi pada kelompok perlakuan -11,6211 dari pre test ke post test. Penurunan ini disebabkan oleh pemberian agar-agar lidah buaya yang artinya agar-agar lidah buaya mempunyai pengaruh terhadap penurunan angka keputihan yang dialami remaja putri, dimana mereka mengatakan bahwa merasa lebih nyaman setelah pemberian agar-agar lidah buaya (Kustanti, 2016).

Pada efektifitas air rebusan daun sirih terhadap penanganan keputihan oleh Dwi Nur Baety, Eka Riyanti (2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil sebelum dan sesudah diberikan air rebusan daun sirih hijau dengan cara dibilas ke vagina selama 6 hari berturut-turut pagi dan malam hari terdapat pengaruh secara signifikan dalam mengatasi keputihan, dari 24 siswi yang sudah tidak mengalami keputihan sebanyak 21 responden, dan yang mengalami keputihan ringan sebanyak 3 siswi. 21 responden mengaku setelah menggunakan air rebusan daun sirih hijau keputihan yang dialami tidak keluar lagi setelah bilas dengan air rebusan daun sirih hijau terdapat sensasi semriwing dan merasa nyaman.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika dkk (2014) yaitu berdasarkan hasil penelitian, setelah pemberian rebusan air daun sirih selama 5 hari dengan penggunaan 2 kali sehari dapat diperoleh responden yang tidak mengalami keputihan sebanyak 19 orang (95%) dan 1 orang (5%) masih mengalami keputihan pada periode menstruasi 1 bulan berikutnya. Kandungan dalam daun sirih seperti eugenol dapat mematikan jamur candida albicans sebagai penyebab keputihan dan tanin, berupa astringen yang dapat mengurangi sekresi cairan pada liang vagina.

Penelitian menggunakan terapi herbal juga dilakukan oleh Mawaddah (2019), yaitu pada penelitian ini didapatkan hasil pada wanita usia subur yang mengkonsumsi jus nanas selama 1 minggu secara teratur dapat mengurangi keputihan, sedangkan pada pagi hari sebelum makan dan

mengonsumsi obat 2 jam setelah makan secara teratur setiap hari akan mengurangi keputihan selama kurang lebih 3 hari.

Penelitian yang lain terkait penggunaan terapi herbal/ non farmakologis dilakukan oleh Sampara dkk (2021), yaitu dengan pemberian daun sirsak. Sebelum pemberian daun sirsak, terdapat 30 orang responden yang mengalami keputihan patologi dan setelah diberikan intervensi rebusan daun sirsak yang mengalami perubahan hanya 26 orang (86,7%) dari patologi menjadi fisiologi, sedangkan 4 orang (13,3%) masih mengalami keputihan patologi karena ibu bekerja sehingga kondisi fisik wanita yang bekerja energi dan psikisnya kurang karena pekerjaan berat atau aktivitas ekstra yang mengakibatkan kelelahan sehingga gejala keputihan tetap muncul.

Sama halnya pada penelitian yang dilakukan oleh Azizah dkk (2020) dalam pemberian terapi non farmakologis. Setelah pemberian rebusan daun kemangi selama 7 hari berturut-turut sebagian besar responden yang mengalami keputihan patologis berkurang yaitu sebanyak 11 responden (73%) yang mengalami keputihan fisiologis dan sisanya sebanyak 4 responden (27%) masih mengalami keputihan patologis. Terdapat beberapa faktor yang mendukung perubahan responden dari keputihan patologis menjadi fisiologis, yaitu umur, paritas, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan, termasuk personal hygiene masing-masing responden. Meskipun dengan menggunakan metode terapi herbal masih menimbulkan keputihan, namun tetap bisa diasumsikan bahwa efektif dalam mengurangi kejadian keputihan baik patologis maupun fisiologis.

## **B. Implikasi Kebidanan**

*Fluor Albus* atau keputihan merupakan keadaan keluarnya cairan dari vagina atau leher rahim pada wanita gejala yang sering dialami oleh sebagian besar wanita sepanjang siklus kehidupannya mulai dari masa remaja, masa reproduksi maupun masa menopause. Keputihan ditentukan sebagai keputihan patologis jika disertai dengan perubahan bau dan warna serta jumlah yang tidak normal. Keputihan bukan merupakan penyakit melainkan salah satu tanda gejala dari suatu penyakit organ reproduksi wanita, akan tetapi masalah keputihan ini jika tidak ditangani akan menyebabkan masalah yang serius seperti keluhan yang dapat disertai dengan edema genital, disuria, nyeri perut bagian bawah, atau nyeri punggung bawah.

Tanda dan gejala keputihan fisiologis berwarna jernih, tidak berbau, tidak gatal dan tidak pedih, namun keputihan juga merupakan salah satu tanda dari suatu penyakit jika yang dialami adalah keputihan patologis (abnormal) yaitu dengan tanda dan gejala seperti keputihan berjumlah banyak, warna kuning atau kehijauan, warna putih seperti susu basi disertai rasa gatal, nyeri, terjadi pembengkakan, berbau busuk atau amis, serta terasa nyeri di perut bagian bawah. Keputihan patologis dapat terjadi akibat masalah hormonal, infeksi atau peradangan, adanya jamur, bakteri, maupun kuman yang berlangsung karena personal hygiene yang buruk, menggunakan celana yang tidak menyerap keringat dan ketat, menggunakan pembilas vagina yang berlebihan, atau adanya benda asing di dalam vagina, serta penyakit menular seksual.

Salah satu permasalahan kesehatan yang penting untuk wanita usia subur yaitu mengenai penyakit kandungan dimana salah satu ciri indikasi dari penyakit kandungan tersebut adalah terjadinya keputihan. Dampak keputihan yang dapat terjadi adalah fungsi genetalia sebagai alat reproduksi dapat terganggu atau bahkan tidak dapat difungsikan. Selain itu, dapat terjadi gangguan psikologis, perlengketan pada rahim, saluran telur atau tuba falopi sampai pembusukan indung telur oleh infeksi yang berat bisa terjadi tuba ovarium abses atau kantung nanah yang menekan saluran telur dan indung telur, penyakit radang panggul, terjadinya kehamilan ektopik, infertilitas atau kemandulan. Keputihan juga merupakan gejala awal dari kanker serviks yang bahkan berujung pada kematian.

Keputihan yang dialami oleh wanita usia subur akan mengalami masalah yang serius apabila tidak diobati dengan segera, sehingga perlu dilakukan tindakan kolaborasi sesuai kondisi pada wanita usia subur. Penyedia layanan kesehatan primer memainkan peran utama dalam pendidikan kesehatan bagi wanita dalam kelompok usia reproduksi terkait keputihan fisiologis dan patologis dengan membedakan dan mencari nasihat medis. Memberikan rasa hormat, privasi, dan kerahasiaan pasien menggunakan konsultasi telepon, menyediakan janji temu yang mudah dan dapat diakses ke fasilitas pada waktu yang tepat, dan merancang lingkungan perawatan yang nyaman dan rahasia yang akan berguna untuk meningkatkan perilaku mencari kesehatan terhadap keputihan.

Untuk mendiagnosis keputihan, perlu dilakukan pemeriksaan dengan pemasangan spekulum dan menerima tes pH keputihan dengan metode strip,



adapun pemeriksaan IV A Test dan mengoleskan albothyl pada porsio yang terdapat erosi dan didapatkan ibu mengalami keputihan yang tidak normal (patologis). Untuk pengobatan pada keputihan patologis, diberikan obat farmakologis seperti flukonazol (150 mg sebagai dosis tunggal) untuk pengobatan sistemik atau obat anti jamur yang bekerja secara lokal seperti itraconazole (200 mg 2x1). Pessarium imidazole intravaginal atau krim seperti klotrimazol (500 mg sebagai dosis tunggal), miconazole (ovula vagina 1,2 g sebagai dosis tunggal) atau econazole (pessarium 150 mg pada malam hari selama 1 sampai 3 malam).

Penatalaksanaan asuhan wanita usia subur dengan keputihan patologis diberikan terapi obat herbal 550 mg 3x1, Metronidazole 500 mg 3x1, dan vit. C 500mg 3x1. Pada kondisi Kandidiasis Vulvo Vaginalis akibat keputihan mendapatkan terapi obat anti jamur flukonazol, terapi antibiotik yaitu metronidazole, dan terapi antibiotik yaitu doksisisiklin. Pemberian obat ini disesuaikan dengan diagnosis dokter dan gejala pasien. Penggunaan obat herbal juga cukup efektif untuk mengurangi keputihan, seperti penggunaan air rebusan daun sirih selama 5 hari berturut-turut dengan penggunaan 2 kali sehari untuk membersihkan vagina, pemberian agar-agar lidah budaya, pemberian rebusan daun sirsak, mengkonsumsi yoghurt dan vitamin C dengan teratur dan tepat waktu, serta mengkonsumsi jus nanas selama 1 minggu secara teratur.

Adapun hal yang perlu dilakukan untuk mencegah keputihan adalah dengan membersihkan tangan sebelum dan sesudah membasuh genetalia, membasuh genetalia dari arah depan ke belakang, mengeringkan genetalia

menggunakan handuk kering dan bersih, mencukur rambut kemaluan, menggunakan celana dalam yang tidak ketat dan berbahan katun atau dengan bahan yang menyerap keringat, mengganti celana dalam ketika terasa basah atau lembab, sering mengganti pembalut ketika menstruasi, tidak menggunakan pantyliner, serta tidak menggunakan antiseptik, sabun mandi atau hindari melakukan vaginal douching. Adapun cara lain, yaitu menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup, hindari rokok dan alkohol, hindari stres berkepanjangan, dan rutin berolahraga.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Keputihan merupakan ancaman dan menjadi masalah bagi wanita usia subur yang kurang memperhatikan personal hygienenya. Berdasarkan pembahasan *Literatur Review* maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Data objektif keputihan pada wanita usia subur ditandai dengan keluarnya cairan dari vagina atau leher rahim pada wanita dan merupakan gejala yang sering dialami oleh sebagian besar wanita sepanjang siklus kehidupannya mulai dari masa remaja, masa reproduksi maupun masa menopause. Adapun keputihan patologi yang muncul dengan tanda dan gejala seperti keputihan berjumlah banyak, warna kuning atau kehijauan, warna putih seperti susu basi disertai rasa gatal, nyeri, terjadi pembengkakan, berbau busuk atau amis, serta terasa nyeri di perut bagian bawah. Keputihan patologis dapat terjadi akibat masalah hormonal, infeksi atau peradangan, adanya jamur, bakteri, maupun kuman yang berlangsung karena personal hygiene yang buruk.
2. Proses terjadinya keputihan secara wajar karena dipengaruhi oleh hormon tertentu, seperti hormon estrogen dan progesteron oleh ovarium yang menimbulkan pengeluaran sekret yang berbentuk seperti benang, tipis, dan elastis serta jumlah keluar yang berubah-ubah sesuai dengan siklus haid.

3. Komplikasi dari keputihan fungsi genetalia sebagai alat reproduksi dapat terganggu atau bahkan tidak dapat difungsikan. Selain itu, dapat terjadi gangguan psikologis, perlengketan pada rahim, saluran telur atau tuba falopi sampai pembusukan indung telur oleh infeksi yang berat bisa terjadi tuba ovarium abses atau kantung nanah yang menekan saluran telur dan indung telur, penyakit radang panggul, terjadinya kehamilan ektopik, infertilitas atau kemandulan. Keputihan juga merupakan gejala awal dari kanker serviks yang bahkan berujung pada kematian.
4. Dilakukan pemberian terapi farmakologis seperti flukonazol (150 mg sebagai dosis tunggal) untuk pengobatan sistemik atau obat anti jamur yang bekerja secara lokal seperti itraconazole (200 mg 2x1). Pessarium imidazole intravaginal atau krim seperti klotrimazole (500 mg sebagai dosis tunggal), miconazole (ovula vagina 1,2 g sebagai dosis tunggal) atau econazole (pessarium 150 mg pada malam hari selama 1 sampai 3 malam). Terapi obat herbal 550 mg 3x1, Metronidazole 500 mg 3x1, dan vit. C 500 mg 3x1. Pada kondisi Kandidiasis Vulvo Vaginalis akibat keputihan mendapatkan terapi obat anti jamur flukonazol, terapi antibiotik yaitu metronidazole, dan terapi antibiotik yaitu doksisisiklin.
5. Untuk perencanaan tindakan pada keputihan adalah dengan menjaga personal hygiene membersihkan tangan sebelum dan sesudah membasuh genetalia, membasuh genetalia dari arah depan ke belakang, mengeringkan genetalia menggunakan handuk kering dan bersih, mencukur rambut kemaluan, menggunakan celana dalam yang tidak ketat dan berbahan katun atau dengan bahan yang menyerap keringat,

mengganti celana dalam ketika terasa basah atau lembab, sering mengganti pembalut ketika menstruasi, tidak menggunakan pantyliner, serta tidak menggunakan anti septik, sabun mandi atau hindari melakukan vaginal douching.

6. Selain dari penatalaksanaan medis, didapatkan referensi baru mengenai pemberian obat herbal seperti penggunaan air rebusan daun sirih selama 5 hari berturut-turut dengan penggunaan 2 kali sehari untuk membersihkan vagina, pemberian agar-agar lidah budaya, pemberian rebusan daun sirsak, mengkonsumsi yoghurt dan vitamin C dengan teratur dan tepat waktu, serta mengkonsumsi jus nanas selama 1 minggu secara teratur.
7. Pemberian terapi farmakologis maupun non farmakologis oleh bidan, perawat, ataupun kolaborasi dengan dokter sesuai anjuran efektif untuk mengurangi kejadian keputihan baik fisiologis maupun patologis.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Peneliti**

Dalam penyusunan *Literatur Review* ini masih banyak kekurangan serta diharapkan adanya kritik dan masukan yang membangun agar dapat lebih baik kedepannya.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan dengan adanya *Literature Review* ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya tentang Keputihan pada Wanita Usia Subur dengan menggunakan pendekatan 7 langkah varney. Dengan uraian yang didapatkan dari beberapa sumber, maka peneliti menyarankan untuk

mengadakan pemberian asuhan yang diberikan langsung kepada pasien untuk menghindari komplikasi- komplikasi yang dapat timbul kedepannya.

### 3. Bagi Pembaca

- a. Diharapkan bagi pembaca untuk dapat menambah wawasan dari *Literature Review* ini.
- b. Mengenai asuhan terkait pentingnya upaya langkah preventif keputihan, maka perlu adanya informasi yang jelas bagi pembaca tentang pencegahan, penanganan, dan pengobatan pada wanita usia subur sehingga dapat memberikan gambaran dan panduan terkait keputihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afri Julianingsih, Maya Safitri, I. H. S. (2010). Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Keputihan Fisiologis dan Patologis di Puskesmas Sumbang II Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tahun 2010. *Viva Medika*, 3(5), 1–9.
- Al-Muharib, D. R. bintu M. (2014). Fiqih Wanita (Hukum Ar-Ruthubah). In *Forum Salafy Indonesia*.
- Anggraeni Dwi Pamulatsih, T. U. (2014). *Pengaruh Konseling Tentang Keputihan Terhadap Tingkat Pengetahuan Keputihan pada Perempuan di Wilayah Kerja Puskesmas II Baturaden Tahun 2014*. 8(15).
- Anggraeny, O., & Arisetiningsih, A. D. (2017). *Gizi Prakonsepsi, Ibu Hamil dan Menyusui*. UB Press.
- Anita Herawati, Dede Mahdiyah, H. K. (2016). Hubungan Pekerjaan Dan Vulva Hygiene Dengan Kejadian Keputihan Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Sungai Bilu Banjarmasin. *Dinamika Kesehatan*, 7(2), 279–287.
- Ardiyanti Hidayah, Wahyu Anjas Sari, Y. A. P. (2021). Hubungan Penggunaan Sabun Pembersih Kewanitaan dengan Kejadian Keputihan pada Wanita Usia Subur di RW 06 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Hospital Majapahit*, 13(1), 11–20.
- Arifin, G., & Wahidah, S. (2018). *Ensiklopedia Fikih Wanita : Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mahzab*. PT Elex Media Komputindo.
- Azizah, F. M., Dewi, N. R., Hafshawaty, S., Zanul, P., Kunci, K., & Kemangi, D. (2020). Pengaruh Pemberian *Ocimum Basilicum* (Daun kemangi) Terhadap Kejadian Keputihan Patologis Pada Wanita Usia Subur di Puskesmas Kraksaan

- Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 6(2), 125–134.
- BKKBN. (2011). *Batasan dan Pengertian MDK*.
- Brown, L. (2018). Abnormal vaginal discharge: In *Pharmacy Magazine* (Issue May).  
<https://www.researchgate.net/publication/326033347>
- Chirenje, Z. M., Dhibi, N., Handsfield, H. H., Gonese, E., Tippet Barr, B., Gwanzura, L., Latif, A. S., Maseko, D. V., Kularatne, R. S., Tshimanga, M., Kilmarx, P. H., Machiha, A., Mugurungi, O., & Rietmeijer, C. A. (2018). The Etiology of Vaginal Discharge Syndrome in Zimbabwe. *Sexually Transmitted Diseases*, 45(6), 422–428.
- Citrawathi, D. M. (2014). *Sistem Reproduksi Manusia*. Graha Ilmu.
- Darma, M., Yusran, S., & Fachlevy, A. (2017). Hubungan Pengetahuan, Vulva Hygiene, Stres, Dan Pola Makan Dengan Kejadian Infeksi Flour Albus (Keputihan) Pada Remaja Siswi Sma Negeri 6 Kendari 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unsyiah*, 2(6), 198314.
- Dewi, J. N. K. (2019). Asuhan Kebidanan Pada Nn. N Umur 17 Tahun Candidiasis Vulvogenesis dengan Terapi Pemberian Komsumsi Yoghurt dan Vitamin C di SMA Tunas Patria Ngablak Ungaran Timur. *Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo Ungaran*.
- Dewi Novianti. (2016). KEMAMPUAN ANTIFUNGI EKSTRAK RIMPANG TEMULAWAK (Curcuma xanthorrhiza) TERHADAP Candida albicans. *Jurnal Ilmiah Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 13(2), 69–79.
- Dhuangga, W. P. (2012). Efektifitas pendidikan kesehatan tentang. *Jurnal Ners Indonesia*, 2(2).
- Diding Akuaria Dewi Erma, Y. I. (2011). Hubungan Tingkat Pengetahuan Wanita



- Usia Subur Tentang Keputihan Dengan Kunjungan Saat Mengalami Keputihan Ke BPS Sri Wahyuni Desa Babalan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. *Ilmu Kesehatan Motorik*, 6 Nomor 13, 58–63.
- Dieny, F. F., Rahadiyanti, A., & Kurniati, D. M. (2019). *Gizi Prakonsepsi*. Bumi Medika.
- Dinata, F. (2018). Keputihan. In *RSUD Ciawi*.
- Dwi Nur Baety, Eka Riyanti, D. A. (2019). Efektifitas Air Rebusan Daun Sirih Hijau dalam Mengatasi Keputihan Kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Gombang. *Efektifitas Air Rebusan Daun Sirih Hijau Dalam Mengatasi Keputihan Kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Gombang*, 10(2012), 48–58.
- Egi Yunia Rahmi, Arneliwati, H. E. (2015). Faktor Perilaku yang Mempengaruhi Terjadinya Keputihan Pada remaja Putri. *Ilmu Keperawatan Universitas Riau*, 2(1).
- Hanifa Wiknjastro. (2007). *Ilmu Kandungan*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Hasanah, H. (2016). Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan : Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja. *Sawwa*, 11(2), 229–252.
- Ilmiawati, H., & Kuntoro, K. (2017). Pengetahuan Personal Hygiene Remaja Putri pada Kasus Keputihan. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 5(1), 43.
- Indah Setiani, T., Prabowo, T., & Paramita, D. P. (2016). Kebersihan Organ Kewanitaan dan Kejadian Keputihan Patologi pada Santriwati di Pondok Pesantren Al Munawwir Yogyakarta. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*,
- Jauhari Iman. (2011). Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam Health Views in

- Islamic Law. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, 33–57.
- Kasdu, D. (2010). *Solusi Problem wanita Dewasa*. Puspa Swara.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia*.
- Khuzaiyah, S., Krisiyanti, R., & Mayasari, I. (2015). Karakteristik Wanita Dengan Fluor Albus. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 7(1).
- Kurniawati, C., & Sulistyowati, M. (2014). Aplikasi Teori Health Belief Model Dalam Pencegahan Keputihan Patologis. *Jurnal Promkes*, 2(2), 117–127.
- Kusmiran, E. (2011). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Salemba Medika.
- Kustanti, C. (2016). Pengaruh Pemberian Agar-Agar Lidah Buaya. *Jurnal Keperawatan Notokusumo*, IV(1), 69–76.
- Kusumanityas, L. (2017). *Sistem Reproduksi Makhluk Hidup*. Istana Media.
- Mamik. (2017). *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kebidanan*. Zifatama Jawa.
- Manuaba, I. A. C. (2009). *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita Edisi 2* (2nd ed.). EGC.
- Marhaeni, G. A. (2016). Keputihan Pada Wanita. *Politeknik Kesehatan Denpasar*, 13 Nomor 1, 30–38.
- Marlina. (2017). Karakteristik Wanita Usia Subur Dengan Kejadian Flour Albus Di Puskesmas Beru Maumere Tahun 2016. *Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia Timur*, 2(1), 1–10.
- Maryanti, S., & Wuryani, M. (2019). Persepsi dan Perilaku Remaja Putri dalam Mencegah Keputihan di SMK 1 Lambuya Kabupaten Konawe. *Jurnal SMART Kebidanan*, 6(2), 65.

- Mawaddah, S. (2019). Efektifitas Jus Nanas terhadap Keputihan (Fluor albus) pada Wanita Usia Subur (WUS). *Jurnal Kesehatan*, 10(3), 367.
- Mitchell, H. (2004). ABC of Sexually Transmitted Infections Vaginal Discharge- Causes, Diagnosis, and Treatment. *Bmj*, 328(7451), 1306.
- Mudiyansele, I., Sumudrika, P., Evangeline, C. S., Pradeep, P., Perera, R., & Fernandopulle, R. (2015). VAGINAL DISCHARGE : WOMEN'S HEALTH SEEKING BEHAVIOURS AND CULTURAL PRACTICES RESEARCH ARTICLE VAGINAL DISCHARGE : WOMEN ' S HEALTH SEEKING BEHAVIOURS AND CULTURAL PRACTICES. *International Journal of Current Research*, 7(6).
- Murtiastutik, D. (2008). *Buku Ajar Infeksi Menular Seksual*. Airlangga University Press.
- Mustakimah, M. U. (2017). Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi Pada Ny. S P1A0 Umur 37 Tahun dengan Fluor Albus Patologis di BPM Soto Soeharjani Mojosongo Jebres Surakarta. *STIKes Kusuma Husada Surakarta*.
- Mustika, W., Astini, putu susy, & Yunianti, ni putu. (2014). Penggunaan Air Rebusan Daun Sirih Terhadap Keputihan Fisiologis Di Kalangan Remaja Putri Mahasiswa Poltekes Denpasar Wayan Mustika 1 , Putu Susy Natha Astini 2 , Ni Putu Yunianti Sc 3. *Jurnal Skala Husada*, 11(1), 101–106.
- Nikmah, U. S., & Widyasih, H. (2018). Personal Hygiene Habits dan Kejadian Flour Albus Patologis pada Santriwati PP AL-Munawwir Yogyakarta. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 14(1), 36.
- Novryanthi, D. (2021). Hubungan Antara Pengetahuan dan Perilaku Remaja Putri dalam Menjaga Kebersihan Genetalia dengan Kejadian Keputihan. *Jurnal*

- Keperawatan, 13*, 173–182.
- Oktova, R. (2016). Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Remaja Putri tentang Rebusan Daun Sirih dalam Mengatasi Keputihan di SMAN 11 Pekanbaru. *Jurnal Kesehatan, 7*(3), 488.
- Oriza, N., & Yulianty, R. (2018). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Keputihan Pada Remaja Putri di SMA Darussalam Medan. *Jurnal Bidan Komunitas, 1*(3), 142.
- Pitriani, R. (2020). Asuhan Kebidanan Pada Remaja Putri dengan Keputihan. *Jurnal Komunikasi Kesehatan, XI*(1), 78–84.
- Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrultah. (1989). Tafsir Al-Azhar. In *Jilid 1*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Purnamasari, I. A., & Hidayanti, A. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Keputihan Pada Wanita Usia Subur (WUS) di Kecamatan Banjarejo Kota Madiun. *STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun*, 31–43.
- Purwandari, A. (2008). *Konsep Kebidanan: Sejarah & Profesionalisme*. EGC.
- Quran Kementerian Agama RI. (n.d.). *Quran Kementerian Agama RI*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Rachmadiani, F. (2019). *Analisis Perilaku Pencegahan Keputihan pada Remaja Putri Berdasarkan Teori HPM*.
- Rachmadiani, F., Armini, N. K. A., & Nastiti, A. A. (2019). Analisis Perilaku Pencegahan Keputihan pada Remaja Putri berdasarkan Teori Health Promotion Model (HPM). *Pedimaternal Nursing Journal, 5*(1), 137.
- Rahayu, R. P., Damayanti, F. N., & Purwanti, I. A. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keputihan pada Wanita Usia Subur (WUS) di RT 04 RW

- 03 Kelurahan Rowosari Semarang. *IPI Jurnal Kebidanan*, 4(1), 11–16.
- Riza, Y., Qariati, N. I., & Asrinawaty, A. (2019). Hubungan Personal Hygiene Dan Penggunaan Kontrasepsi dengan Kejadian Keputihan Pada Wanita Usia Subur (WUS). *MPPKI (Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia): The Indonesian Journal of Health Promotion*, 2(2), 69–74.
- Salamah, U., Kusumo, D. W., & Mulyana, D. N. (2020). Faktor perilaku meningkatkan resiko keputihan. *Jurnal Kebidanan*, 9(1), 7.
- Saleha, S. (2009). *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas*. Salemba Medika.
- Saminem, H. (2009). *Kehamilan Normal*. EGC.
- Sampara, N., Sudirman, J., & Ohorella, F. (2021). Daun Sirsak (*Annona Muricata* . L) Sebagai Penanganan Keputihan pada Wanita Usia Subur. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat*, 1(2).
- Sari, R. (2018). Perilaku Remaja Putri Tentang Penatalaksanaan Dan Pencegahan Keputihan Di Pondok Pesantren Putri Ummu Sulaim Pekanbaru Tahun 2018. *Menara Ilmu*, XII(10), 131–137.
- Sari, W. K. (2013). IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB KEPUTIHAN PADA REMAJA PUTRI. *Fakultas Kesehatan Dan Farmasi, Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia*, 53(9), 1689–1699.
- Sartje Ellen Dagasou, Linnie Pondaag, J. L. (2014). Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Keputihan di Poliklinik Obstetri/ Ginekologi RSUD. Pancaran Kasih GMIM Manado Tahun 2014. *Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi*, 36.
- Sulistianingsih, R., Djarot, H. S., & Wahyuni, D. (2013). Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Wanita Usia Subur (WUS) Tentang Keputihan Fisiologis dan

- Patologis di Lapas Wanita Kelas IIA Kota Semarang Tahun 2011. *Jurnal Kebidanan*, 1(1), 1–10.
- Supriyatiningih. (2015). Penggunaan Vaginal Douching Terhadap Kejadian Candidiasis pada Kasus Leukorea. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Susanti Handayani, Kusyogo Cahyo, R. I. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Personal Hygiene Remaja Putri dalam Penanganan dan Pencegahan Keputihan Pada Siswi SMK Negeri 11 Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5, 629–636.
- Sutisna, N. S. (2019). Leukorrhea. In *Alomedika*.
- Suwanti, S., & Koto, Y. M. (2016). Keputihan Pada Wanita Usia Subur Menggunakan Ekstrak Daun Sirsak. *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan Tradisional*, 1(1).
- Tresnawati, W., & Rachmatullah, F. (2014). *HUBUNGAN PERSONAL HYGIENE DENGAN TERJADINYA KEPUTIHAN PADA REMAJA PUTRI Wina Tresnawati Firman Rachmatullah*. 14.
- Trisnawati, I. (2018). Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Keputihan Patologis Pada Wanita Usia Subur yang Bekerja di PT Unilever Cikarang Bejasi. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 9(1), 45–50.
- Widiasih, R., & Setyawati, A. (2018). Health Behaviour Pada Perempuan Usia Subur Dalam Menjaga Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Perawat Indonesia*, 2(1), 1.
- Wildan, M., & Hidayat, A. A. A. (2009). *Dokumentasi Kebidanan*. Salemba Medika.
- Wira, B. G., & Kusumawardani, N. W. S. (2011). *Kesehatan Wanita “Keputihan” All About Miss V Series 1*. CV Garuda Mas Sejahtera.

- Wiraguna A. (2010). *Manajemen Terkini Keputihan (Fluor Albus) dan Discar Uretra* (Annual Sci). Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada.
- Wiwin embo Johar, Sri Rejeki, N. K. (2013). Persepsi dan Upaya Pencegahan Keputihan Pada Remaja Putri di SMA Muhammadiyah 1 Semarang. *Jurnal Keperawatan Maternitas*, 1(1), 37–45.
- Wulaningtyas, E. S., & Widyawati, E. (2018). Hubungan Kejadian Fluor Albus dengan Tingkat Kecemasan Terhadap Infeksi Maternal pada WUS. *Jurnal Ners Dan Kebidanan*, 5(2), 123–128.
- Yulfitria, F., & Primasari, N. (2015). Hubungan Faktor Predisposisi Perilaku Pencegahan Keputihan Patologis Pada Mahasiswa Kebidanan Jakarta. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan*, 3(1), 1–3.
- Yulizawati, El Sinta, L., Nurdiyan, A., & Insani, A. A. (2016). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode Peer Education Mengenai Skrining Prakonsepsi terhadap Pengetahuan dan Sikap Wanita Usia Subur di Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2016. *Journal of Midwifery*, 1(2), 11–20.

## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas

Nama : Nur Ainun Basry  
Nim : 70400117032  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 5 Maret 1999  
Suku : Makassar  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Abd. Dg Sirua No. 42 A Kamp Alla Alla

### B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006 – 2011 : SD Negeri Paccinang I Makassar
2. Tahun 2011 – 2014 : SMP Negeri 8 Makassar
3. Tahun 2014 – 2017 : SMA Negeri 12 Makassar
4. Tahun 2017 – 2021 : UIN Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan