

**Pengaruh Pemberian Pakan Padat Gizi Terhadap Penyusutan Berat Badan dan Kualitas Otot *Gluteus Medius* Sapi Bali Yang Ditransportasikan**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana  
Pernakan (S1) Pada Jurusan Ilmu Peternakan  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar*

**Oleh:**

**ISRAFIL  
Nim: 60700106005**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Agustus 2010  
Penyusun

**ISRAFIL**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberian Pakan Padat Gizi Terhadap Penyusutan Berat Badan dan Kualitas Otot *Gluteus medius* Sapi Bali yang Ditransportasikan” yang disusun oleh ISRAFIL, NIM : 60700106005, Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 16 Agustus 2010 M bertepatan dengan 6 Ramadhan 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan dalam Ilmu Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 16 Agustus 2010 M  
6 Ramadhan 1431 H



Ketua : Ir. Syarif Beddu, M.T (.....)

Sekretaris : Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P (.....)

Munaqisy I : Prof. Dr. Ir. H. Efendi Abustam, M. Sc (.....)

Munaqisy II : Irmawati, S.Pt., M.P (.....)

Munaqisy III : Drs. M. Arif Alim, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Syarifuddin, S.Pt., M.P (.....)

Pembimbing II : Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P (.....)

Diketahui oleh :  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

**Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M. S**  
**NIP. 19 520 709 1981 03 1001**

## ABSTRAK

**NAMA : ISRAFIL**  
**NIM : 60700106005**  
**JUDUL SKRIPSI : “Pengaruh Pemberian Pakan Padat Gizi Terhadap Penyusutan Berat Badan Kualitas Otot *Gluteus Medius* Sapi Bali Yang Ditransportasikan”**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan padat gizi terhadap penyusutan berat badan, pH otot dan keempukan daging Sapi Bali yang ditransportasikan. Ternak yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 ekor sapi Bali dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan yang diberikan pakan padat gizi selama 20 hari sebelum pengangkutan, adapun ternak yang ditransportasikan sebanyak 9 ekor dari Bulukumba, Sulawesi Selatan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk analisis sampelnya akan dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak dan Laboratorium Kimia Nutrisi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pakan padat gizi berupa Urea Molasses Multinutrient Block (UMMB) dan Urea Molasses Multinutrient Block<sup>+</sup> (UMMB<sup>+</sup>) dapat meminimalisir penyusutan berat badan sapi Bali yang ditransportasikan. Tingkat penyusutan berat badan Sapi Bali yang tertinggi ditunjukkan pada ternak yang diberi hijauan tanpa UMMB yaitu 7,47%, sedangkan yang diberi UMMB dan UMMB<sup>+</sup> yaitu 3,58% dan 5,13%. Tetapi, pada parameter kualitas daging yaitu pH otot dan keempukan daging Sapi Bali tidak memberikan pengaruh.

## ABSTRACT

**NAME** : ISRAFIL  
**NIM** : 60700106005  
**LITTLE SKRIPSI** : " Feed Gift Influence of Solid Gizi to decrease of body weight quality of muscle *Gluteus Medius* Bali Ox Transportation "

---

This research aim to know feed gift influence of solid gizi to decrease of body weight, muscle hydrogen ion exponent and soft of Bali beef transportation. Livestock applied in this research 12 Bali ox tails with 4 treatment and 3 restating that is given feed of solid gizi during 20 days before transportation, as for livestock transportation counted 9 tail from Bulukumba, South Sulawesi to Banjarmasin, South Kalimantan. To analyse its the sample will be done in Technology Laboratory Result of Livestock and Nutrition Chemistry Laboratory of Livestock Faculty of Veterinary Hasanuddin Uiversity.

Result of this research indicates that feed gift of solid gizi in the form of Urea Molasses Multinutrient Block ( UMMB) and Urea Molasses Multinutrient Block+ ( UMMB+) earns meminimalisir decrease of Bali ox body weight transportation. Level of decrease of body weight Bali ox which is highest shown to livestock given forage without UMMB that is 7,47%, while given UMMB and UMMB+ that is 3,58% and 5,13%. But, at parameter quality of flesh that is muscle hydrogen ion exponent and soft of Bali beef doesn't give influence.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan menuju kesempurnaannya sangat kami harapkan. Dalam penyusunan skripsi ini, sejak awal melakukan penelitian sampai penyusunan skripsi ini, penulis mengalami banyak hambatan, namun berkat dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikannya.

Atas terwujudnya skripsi ini maka sewajarnya jika penulis menyampaikan terima kasih dan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Syarifuddin, S.Pt., M.P sebagai pembimbing I dan Ibu Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P sebagai pembimbing II sekaligus sebagai Ketua Jurusan Ilmu Peternakan yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan bimbingan hingga terwujudnya skripsi ini.

Teristimewa buat Almarhum Ayahanda Sakaruddin dan Ummiku tercinta Aisyah atas curahan kasih sayang yang sangat tulus dan ikhlas dengan segala pengorbanan yang tak terhingga dalam mendidik dan membesarkan penulis.

Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Hidayat, S.Pt., M.P selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Efendi Abustam, M.Sc selaku Penguji I, Ibu Irmawati, S.Pt., M.P selaku Penguji II dan Bapak Drs. M. Arif Alim, M.Ag selaku Penguji III yang selalu memberikan saran dan kritik yang sifatnya membangun.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kakak-kakakku tercinta: Nur Ikhsan, S.Si.,S.Pd, Israwati dan Tarman, A.Ma yang telah memberikan kasih sayang, bantuan moril dan materil demi kesuksesan penulis. Untuk semua keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan perhatiannya.

Buat teman-temanku “Angkatan 06” (Arga, Andry, Wadi, One-Ted, Rojali, Jufri, Naimah, Saldi, Ancu’, Wahidin dan Harisah) atas dorongan dan cerita indah yang tak terlupakan. Buat semua adik-adikku di jurusan Ilmu Peternakan dan

semua teman-temanku yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi terima kasih atas semua bantuannya. Buat teman-temanku yang ada di “Tarsul Residence” (Raul Lemos, Puang Tube’, Etta Agil, Andi Ibaz, Singa CAI, Orix, Andi Bahri dan Ismail) terima kasih atas dorongannya selama ini.

Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang meridhoi dan menilai semua usaha yang kita lakukan bernilai ibadah. Amin.

Gowa, Agustus 2010

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Hipotesis .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Gambaran Umum Sapi Bali.....</b>	<b>8</b>
<b>B. Sejarah Transportasi Ternak .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Stress atau Cekaman .....</b>	<b>12</b>
<b>D. Aspek Hormonal Stres Pada Ternak .....</b>	<b>15</b>
<b>E. Berat Badan, Komsumsi Pakan dan Air Minum Pada Transportasi Ternak .....</b>	<b>17</b>
<b>F. Kualitas Daging .....</b>	<b>19</b>
<b>G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Daging.....</b>	<b>25</b>
<b>H. pH Otot.....</b>	<b>30</b>
<b>I. Epistemologi Proses Pelayuan dan Keempukan Otot .....</b>	<b>32</b>
<b>J. Pakan dan Suplementasi Pakan.....</b>	<b>35</b>
<b>K. Kualitas Daging Akibat Transportasi Ternak .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Waktu dan Tempat .....</b>	<b>43</b>
<b>B. Materi penelitian .....</b>	<b>43</b>
<b>C. Prosedur Penelitian.....</b>	<b>45</b>

<b>D. Parameter Penelitian .....</b>	<b>46</b>
<b>E. Analisis Data .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Hasil .....</b>	<b>50</b>
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>57</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
1.	Jalur jarak transportasi ternak sapi penelitian dari Desa Anrang Kab. Bulukumba ke RPH Banjarmasin	43
2.	Komposisi bahan baku pakan Urea Molases Multinutrient Block	45
3.	Data persentase penyusutan berat badan ternak	49
4.	Data hasil pengukuran ph otot <i>gluteus medius</i>	49
5.	Data hasil pengukuran keempukan daging pada otot <i>Gluteus medius</i>	50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Pengolahan Data**

**Lampiran 2: Hasil analisis proksimat UMMB, UMMB<sup>+</sup> dan Hijauan**

**Lampiran 3: Fisualisai pembuatan pakan suplemen**

**Lampiran 4: Pembiasaan sebelum ditransportasikan, pemberian pakan suplemen dan pakan hijauan**

**Lampiran 5: Penimbangan ternak sapi yang ditransportasikan**

**Lampiran 6: Sebelum, selama dan setelah transportasi**

**Lampiran 7: Pemotongan, pengkarkasan dan pengambilan sampel**

**Lampiran 8: Penanganan dan analisis sampel di laboratorium**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya gizi untuk hidup sehat merupakan faktor pendorong laju permintaan komoditas peternakan yang tergolong komoditas superior, seperti daging, telur dan susu. Ternak sapi merupakan ternak yang banyak manfaatnya, selain dagingnya bisa dikonsumsi produksi lain berupa susu dapat diminum dan bernilai gizi tinggi, dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 66 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ۚ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ  
لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. (Q.S An-Nahl ayat 66)<sup>1</sup>

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah sentra pengembangan ternak sapi di Indonesia, hal ini disebabkan beternak sapi masih ideal untuk dijadikan sektor usaha, serta masih tersedianya lahan strategis untuk pemeliharaannya, baik itu dikelola untuk usaha pembibitan (*breeding*), maupun untuk penggemukan, yang hasilnya dapat dipasarkan bukan hanya dalam lingkup Sulawesi Selatan tetapi

---

<sup>1</sup> Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2000).

dapat diantarpulaukan.

Faktor yang perlu diperhatikan untuk memelihara ternak sapi antara lain ketersediaan lahan untuk perkebunan rumput dan tempat pemeliharaan ternak, strategis untuk pemasaran dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitarnya, serta ketersediaan sumber air, dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 10 dan surah Yunus ayat 24 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ  
فِيهِ تُسِيمُونَ

Terjemahnya:

Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. (Q.S An-Nahl ayat 10).<sup>2</sup>

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ  
نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ  
زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتْنَهَا أَمْرُنَا  
لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ

<sup>2</sup> Departemen Agama. 2000. *op-cit*

## نُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-permilikannya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (kami) kepada orang-orang berfikir”.(Q.S. Yunus ayat 24)<sup>3</sup>

Ketersediaan pakan yang cukup bagi ternak baik kualitas maupun kuantitas, merupakan dasar utama keberhasilan usaha ternak dalam rangka ketersediaan pangan bagi manusia, dalam Al-Qur'an surah Al Mu`minun ayat 21 dan surah An-Nahl ayat 5 Allah SWT berfirman yang berbunyi :

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan (Q.S Al mu`minun ayat 21).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Departemen Agama. 2000. *op.cit*

<sup>4</sup> Departemen Agama. 2000. *op.cit*

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. (Q.S An-Nahl ayat 5)<sup>5</sup>

Kebutuhan masyarakat akan daging asal ternak dewasa ini meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya memenuhi kebutuhan ini diperlukan pengembangan dan perbaikan mutu serta peningkatan populasi ternak sapi, selain itu ternak sapi juga merupakan salah satu komoditas peternakan yang bernilai strategis dalam bidang perdagangan, sehingga komoditas ini banyak diperdagangkan antar pulau.

Upaya mengatasi kerugian akibat transportasi dapat dilakukan dengan pengaturan ransum dan penambahan pakan suplemen berupa Urea- Mollases Multinutrient Block (UMMB) dalam ransum dan diikuti pengaturan air minum mulai saat penampungan sementara hingga saat ditransportasikan. Cara ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya perombakan protein tubuh menjadi energi sehingga dapat mengatasi turunnya kualitas daging.

Transportasi atau pengiriman hewan ternak dari habitatnya ke tempat lain akan menyebabkan hewan menjadi sangat stres, sehingga berisiko terjadinya gangguan fisik. Apabila ternak dalam keadaan stress akan menurunkan kualitas daging, terlebih lagi bila dibarengi pertarungan dengan

<sup>5</sup> Departemen Agama. 2000. *op.cit*



sesamanya, akan menimbulkan luka memar atau bahkan lebih parah. Keadaan ini akan membuat hewan itu menjadi sangat menderita, akibatnya menurunkan kualitas daging, yang disebabkan terjadinya pengurasan glikogen otot yang berlebihan tanpa diimbangi *intake* pakan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan ternak akan menguras protein tubuh akibat adanya perlakuan yang menyebabkan cekaman/stress pada ternak sehingga berat badan ternak akan menurun.

Pengangkutan ternak ke rumah potong hewan (RPH) mengakibatkan sejumlah agresi psikik dan fisik: luka-luka akibat pukulan tongkat atau tendangan kaki diantara mereka, luka yang diakibatkan gesekan pada lantai kendaraan, perkelahian antara mereka pada umur dan jenis kelamin yang berbeda, kesulitan metabolisme sirkulasi, terutama bila mereka memperoleh pakan yang berarti sebelum pengangkutan. Sejumlah agresi ini akan memberikan konsekuensi terhadap kualitas saniter pada daging. Akibatnya sifat-sifat bakteriside pada darah hanya terjadi pada ternak-ternak yang dipotong dalam kondisi kesehatan yang sempurna selama beberapa jam setelah ternak mati, namun ternak yang disembelih dalam keadaan darurat, karena luka atau kecapaian, mengakibatkan pengeluaran darah yang sangat sering tidak sempurna.<sup>6</sup>

Transportasi ternak dengan jarak 1.075,8 km selama 3 hari dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Selatan menyebabkan penyusutan berat badan sebesar 9,90% -

---

<sup>6</sup> Swatland, H.J. *Structure and Development of Meat Animals*. (New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1984)

12,59%. Selain efek berupa penyusutan berat badan efek lain adalah bahwa akibat transportasi terhadap ternak sapi dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas daging yang disebabkan oleh pengurasan glikogen otot yang berlebihan tanpa diimbangi input yang memadai, sehingga hal ini menyebabkan munculnya *dark cutting meat* dan terganggunya sistem imun.<sup>7</sup>

Upaya untuk mengatasi kerugian petani, pedagang dan konsumen akibat transportasi dapat dilakukan dengan pengaturan ransum dan menambahkan pakan suplemen berupa *Urea Mollases Multinutrient Block* (UMMB). Oleh karena itu dalam penelitian ini telah diteliti dan dikaji pengaruh pakan padat gizi terhadap kualitas otot *Gluteus medius* Sapi Bali yang ditransportasikan dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Kegiatan memindahkan ternak dari habitatnya ke tempat lain untuk kebutuhan manusia dengan mempergunakan alat transportasi, berdampak negatif terhadap kondisi fisik pada ternak. Stress atau cekaman psikologis mengawali stress fisiologis efeknya terhadap kualitas karkas, dan kualitas daging, yang bermuara pada rendahnya nilai ekonomi ternak tersebut, sehingga produsen dan konsumen mengalami kerugian.

---

<sup>7</sup> Syarifuddin, *Stress Akibat Transportasi dan Upaya Penanggulangannya*. (Tesis Magister, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, 2004)

Kualitas daging akibat transportasi pada ternak sapi, telah dikaji dalam penelitian ini, untuk mencari solusi guna meminimalkan efek stress akibat transportasi dengan pakan padat gizi.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini diharapkan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan padat gizi terhadap kualitas otot *Gluteus medius* sapi Bali yang ditransportasikan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi peneliti, mahasiswa, peternak dan pedagang ternak antar pulau serta instansi terkait.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan, rujukan aplikasi bagi instansi terkait produsen dan konsumen.

### **E. Hipotesis**

Pemberian pakan padat gizi berupa UMMB dan UMMB<sup>+</sup> dapat meminimalisir penyusutan berat badan dan kualitas daging Sapi Bali yang ditransportasikan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Gambaran Umum Ternak Sapi Bali

Sapi Bali adalah sapi domestik yang berasal dari Bali. Sapi ini murni merupakan keturunan langsung dari sapi liar (banteng) yang telah mengalami domestikasi (penjinakan) sejak berabad-abad lalu. Penyebarannya meliputi daerah Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Lampung. Keaslian sapi domestik ini masih dipertahankan secara murni di Bali, Sulawesi dan Pulau-pulau lain, sapi Bali banyak disilangkan dengan sapi Ongol dan populasi sapi Bali sekitar 2,6 juta ekor atau sekitar 26 % dari populasi sapi potong di Indonesia<sup>8</sup>.

Ciri-ciri sapi Bali pada umumnya adalah bentuk tubuh menyerupai Banteng, tetapi ukuran tubuh lebih kecil akibat domestikasi, dadanya dalam, badannya padat. Warna bulu pada waktu masih pedet sawo matang atau merah bata pada jantan dan betina, akan tetapi jantan setelah dewasa kelamin warna bulunya berangsur-angsur berubah menjadi hitam dan pada tempat-tempat tertentu, baik jantan dan betina terdapat warna putih di bagian keempat kakinya dari sendi kaki sampai kuku dan bagian pantatnya, tepi dalam daun telinga dan pada bagian bawah bibir, kepala agak pendek, dahi datar, tanduk pada jantan tumbuh agak ke bagian luar kepala, sedangkan pada betina agak ke bagian dalam<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> . Sarwono, B. *Penggemukan Sapi Potong Secara Cepat* . (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2002)

<sup>9</sup> . Sugeng, Y. Bambang . *Sapi Potong*. (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2001)

Taksonomi Sapi Bali adalah :

Kerajaan : *Animalia*

Filum : *Chordata*

Kelas : *Mamalia*

Ordo : *Artiodactyla*

Famili : *Bovidae*

Subfamily : *Bovinae*

Genus : *Bos*

Spesies : *Bos sondaicus*



## B. Sejarah Transportasi Ternak

Catatan pertama transportasi hewan ternak terjadi pada tahun 1607, yaitu kapal Inggris bernama Susan Constant, yang pernah digunakan untuk mengangkut para kolonis dari Jamestown, ketika itu kapal digunakan untuk mengangkut hewan ternak dan daging ke Plymouth dan Philadelphia. Pada tahun 1700, ekspor sapi mulai biasa terjadi dari Philadelphia ke wilayah lain.<sup>10</sup>

Sebelum perhubungan dikelola dengan teknologi canggih seperti saat sekarang, masyarakat Bugis Makassar telah berhubungan dengan dunia luar melalui jasa transportasi laut. Sejarah mencatat, bahwa pada abad ke-XVI kerajaan Gowa dibawah pemerintahan raja Gowa ke-IX Karaeng Tumapakrisi Kallonna telah

<sup>10</sup> Anonymous, 2009. *Transportasi Hewan Ternak*. [http://id.wiki/transportasi\\_hewan\\_ternak](http://id.wiki/transportasi_hewan_ternak). diakses 21 Januari 2010.

memiliki pelabuhan niaga dan Daeng Pamatte merupakan kepala Syahbandar pertama kerajaan Gowa.<sup>11</sup>

Dari bukti sejarah tersebut di atas, jelas bahwa Bugis Makassar (masyarakat dominan Sulawesi Selatan) telah maju dalam hal perdagangan dan transportasi sejak abad ke-XVI, meskipun hanya didukung oleh pasilitas, teknologi, dan transportasi yang sangat sederhana.

Sebelum tahun 1800, alat pengangkutan yang dipakai adalah tenaga manusia, hewan, dan sumber tenaga dari alam. Dan antara tahun 1800 – 1860 transportasi sudah mulai berkembang dengan mulai dimanfaatkannya sumber tenaga mekanis seperti kapal uap dan kereta api, kemudian kurun waktu 1860 – 1920 telah diketemukan kendaraan bermotor pesawat terbang, di tahun 1920 transportasi telah mencapai tingkat perkembangan pada puncaknya (mature), perkembangan transportasi selanjutnya berkembang pesat sejalan dengan kemajuan teknologi mutakhir.<sup>12</sup>

Kematian hewan ternak ketika pengiriman terjadi dengan persentase mencapai 50% dari total pengiriman, disebabkan oleh suplai pakan ternak yang tidak baik dalam hal kualitas dan kuantitas, terlalu sesak, dan kondisi laut.<sup>13</sup>

Tahun 1800an, Texas mengawali ekspor hewan ternaknya dengan menggunakan angkutan darat, yaitu memanfaatkan kereta rel jalur Kansas Pacific

---

<sup>11</sup> Moeing. M.G.A. *Menggali nilai- Manajemen transportasi nilai budaya Bugis Makassar.*, (Ujung pandang. Makassar Press. 1994)

<sup>12</sup> Abbas Halim. *Manajemen transportasi.* (Jakarta. Raja Grafiika Persada. 1993)

<sup>13</sup> Anonymous, 2009. *Op Cit.* Hal 2.

Railway menuju Chicago. Sapi-sapi tersebut dikirimkan kepada pemelihara, industri pemrosesan dan pengepakan daging. Gerbong yang mengangkut sapi-sapi tersebut dipilih secara khusus untuk mempertahankan atau meningkatkan berat sapi selama perjalanan dan mengurangi resiko kematian sapi, hal ini juga didukung oleh peningkatan panjang lintasan rel kereta api dan pengembangan teknologi pendingin. Kebutuhan akan pengiriman hewan ternak melalui rel, perlahan menghilang hingga akhirnya benar-benar berhenti di tahun 1889, namun pengembangan transportasi berpendingin memberikan peluang bagi industri daging dalam melakukan pengiriman jarak jauh, hal ini menjadikan pengiriman hewan hidup menjadi tidak lagi ekonomis dibandingkan pengiriman daging.<sup>14</sup>

Awal abad ke 20, jalur rel kereta mendominasi pengiriman daging dan pengiriman menggunakan truk baru saja dimulai. Di pertengahan abad ke 20, trailer yang menggunakan pendingin dikembangkan untuk memudahkan pengiriman melalui jalur non-rel, hal ini menambah kemunduran bagi pengiriman hewan ternak. Pengiriman hewan ternak hanya dilakukan untuk keperluan khusus, misalnya untuk digemukkan di tempat lain, pelelangan, atau yang lainnya.<sup>15</sup>

Pengiriman hewan ternak tentu saja merupakan hal yang cukup membahayakan bagi hewan ternak dan industri hewan ternak yang dapat mengakibatkan *loss* dari produksi total. Efek buruk dari pengiriman hewan ternak diantaranya stress, hilangnya pengendalian diri dari hewan ternak, sesak nafas,

---

<sup>14</sup>Anonymous, 2009. *op-cit*. Hal 3.

<sup>15</sup> Anonymous, 2009. *Op Cit*. Hal 3.

dehidrasi, keracunan, kelelahan, luka akibat kondisi transportasi yang kurang baik atau perkelahian antar sesama hewan ternak, hingga gagal jantung.<sup>16</sup>

Teknik transportasi pada saat ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu bidang tunggal tertentu dengan metode pendekatan tertentu pula, teknik transportasi bahkan menggabungkan banyak disiplin ilmu dimana setiap disiplin tersebut punya masing-masing karakteristik dan pendekatan yang berlainan walaupun keseluruhannya tergabung menjadi satu dengan pemakaian metode ilmiah dan aturan-aturan tertentu. Teknik transportasi merupakan penerapan dari sains dan matematika dimana sifat-sifat zat dan sumber-sumber energi alami dipakai untuk mengangkut penumpang dan barang dengan suatu cara yang berguna bagi manusia, sedangkan transportasi itu sendiri adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain.<sup>17</sup>

### C. Stress Atau Cekaman

Stress adalah ketidakmampuan dari suatu hewan untuk mengatasi lingkungannya, yang dampaknya adalah suatu kegagalan terhadap potensi yang dimiliki ternak tersebut. Merupakan bentuk ketegangan mental atau fisik yang dapat mempengaruhi keseimbangan fungsi alat-alat tubuh.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Anonymous, 2009. *op-cit* Hal 3.

<sup>17</sup> Edward.K., Morlok. *Pengantar teknik dan perencanaan transportasi*. Jakarta . Erlangga. 2000

<sup>18</sup> Hosen, S. *Menanggulangi Stress Pada Ayam*. (Indonesia: Poltry 1996). h. 63



Cekaman atau stress adalah penyimpangan fisiologis dari keadaan normal, cekaman yang dialami dapat bersifat psikologis dan fisis-fisiologis, dan secara kolektif menunjukkan ketidak mampuan individu mengatasi stressor.<sup>19</sup>

Stress bukanlah penyakit baru bagi makhluk hidup, sejak dahulu kala semua orang dan juga semua binatang menderita tiga macam stress pokok yang merupakan warisan dari permulaan jaman yang terbagi atas tiga macam stress pokok yaitu: 1) Ancaman perkelahian mati-matian (mortal combat), 2) Mencari makanan yang mencukupi untuk dapat hidup, 3) Ancaman bagi kelangsungan hidup.<sup>20</sup>

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan stress yaitu; suhu yang tinggi, ventilasi yang jelek, kualitas air, kelembaban, sinar mata hari dan transportasi. Ternak, stress (cekaman) psikologis mengawali stress fisis-fisiologis efeknya terhadap penyusutan berat badan, kualitas karkas, dan kualitas daging, yang bermuara pada rendahnya nilai ekonomi ternak tersebut, sehingga produsen dan konsumen mengalami kerugian.<sup>21</sup>

Stress lingkungan sangat merugikan kehidupan ternak yang berakibat menurunnya produktivitas ternak. Aspek iklim terutama suhu, dapat mengubah suhu tubuh. Mengakibatkan keseimbangan panas, energi, konsumsi dan metabolisme

---

<sup>19</sup> Dobson, .H, and Smith, R.F. *What is stress, and how does it affect reproduction*. (Australia: J.Anim Reprod.Sci). h. 61

<sup>20</sup> Walter Mc. Quade and Ann Aikman. *Stress*. (Jakarta: Erlangga 1991). h. 72

<sup>21</sup> Risch, A. *Mengatasi Stress Akibat Kepanasan*. (Indonesia: Poltry. 2001). h. 249

menurun, selain itu keseimbangan hormonal dan air tidak normal akibatnya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan penambahan berat badan.<sup>22</sup>

Cekaman psikologis seperti ketakutan dan kegelisahan merupakan gambaran perilaku ternak sebagai respon terhadap perlakuan yang dialami, seperti mencoba melarikan diri, vokalisasi dan menendang. Tingkat cekaman berhubungan dengan tingkat hormon kortisol dalam sirkulasi darah, transport dan handling menyebabkan level hormon kortisol dalam sirkulasi darah meningkat. Stress sangat merugikan kehidupan ternak, sehingga untuk mengatasinya diperlukan suatu management yang baik guna mengurangi efek yang ditimbulkan.<sup>23</sup>

Dunia hewan terutama pada kegiatan transportasi ternak stress dapat dikonseptualisasikan dari titik pandang sebagai interaksi individu terhadap lingkungan.<sup>24</sup>

1. Stress sebagai stimulus; pandangan ini menggambarkan, bahwa stress sebagai stimulus (pemicu) bagi ternak baik secara fisiologis maupun psikologi untuk berusaha mengimbangi keadaan tidak normal yang dihadapinya.
2. Stress sebagai respon; pandangan ini menggambarkan reaksi individu terhadap stressor yang diterima dari lingkungannya, misalnya pada ternak adanya upaya untuk melompat, vokalisasi dan pernapasan yang cepat.

---

<sup>22</sup> Linder Mc. *Nutritional Biochemistry and Metabolism*. (Australia: Elsevier Science Publishing Company, Inc California. 1985). h. 83

<sup>23</sup> Linder Mc. *Nutritional Biochemistry and Metabolism*. 1985. *Op-cit* ., h. 50

<sup>24</sup> Crrokshank., W.R, Glissade., M.N, White., R.G, Clanton., D.C, and Smelley, H.E. *Effect of transportation and handling calves upon blood serum composition*. (Australia: Can. J. Anim. 1979) h. 64.

### 3. Stress sebagai interaksi individu dengan lingkungan

Respon ternak terhadap stressor tersebut akan mengganggu ketenangan ternak, baik secara psikologis maupun fisiologis yang menyebabkan penyusutan berat badan, kualitas karkas dan daging jelek.<sup>25</sup>

#### D. Aspek Hormonal Stress Pada Ternak

Hormon adalah suatu unsur kimia yang diproduksi di dalam bagian organ tertentu dalam tubuh yang diangkut ke target organ tertentu yang mempengaruhi aktivitas dan cenderung untuk mengintegrasikan bagian komponen organisme, hormon adalah molekul yang dihasilkan oleh kelenjar tertentu yang langsung dialirkan ke dalam darah. Melalui darah dibawah ke tujuan tertentu dan akan mengubah kegiatan jaringan yang menerimanya. Hormon terdiri atas berbagai macam senyawa yang dapat digolongkan dalam tiga bagian yaitu:

1. Steroid yaitu androgen, estrogen, dan andrenokortikoid.
2. Derivat asam amino yaitu epinefrin dan tiroksin.
3. Peptida-protein yaitu insulin, glukogen, parathormon, oksitosin, vasopresin, hormon yang dikeluarkan oleh mukosa usus.<sup>26</sup>

Hormon merupakan senyawa organik yang kompleks dan terdapat dalam sitoplasma, peranannya untuk mengatur fungsi organ tubuh agar serasi, seperti;

---

<sup>25</sup> Crockshank., W.R, Glissade., M.N, White., R.G, Clanton., D.C, and Smelley, H.E. *Effect of transportation and handling calves upon blood serum composition.* (Australia: Can. J. Anim. 1979) h. 74

<sup>26</sup> Donald Mc. *Veterinary endocrinology and Reproduction.* (Philadelphia: Lea & febiger. 1980. h 55

pertumbuhan, regenerasi, reproduksi, kimiawi darah, pergantian bulu, laju metabolisme, pigmentasi.<sup>27</sup>

Stress pada mamalia dapat dideteksi melalui kadar kortisol di dalam darah, urine, dan feses. Hormon kortisol yang merupakan indikator dari "short term stress" berdasarkan levelnya dalam sirkulasi darah dalam tubuh sapi dapat dibagi atas tiga tingkatan:

1. < 10 ng per ml ; tingkat normal, variasinya tergantung bangsa sapi , jenis kelamin, status fisiologis dan suhu.
2. 10 - 90 ng per ml; tingkat cekaman ringan sampai dengan berat.
3. > 90 ng per ml; tingkat cekaman ekstrim berat.<sup>28</sup>

Metode RIA sangat sensitive dan dapat mendeteksi dengan baik hormon protein maupun hormon steroid meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Semakin tinggi konsentrasi kortisol dalam darah menunjukkan tingkat cekaman semakin berat dialami oleh ternak yang bersangkutan. Bila individu mendapat stressor, maka kelenjar pituitary mengeluarkan *adrenocorticotrophin hormon* (ACTH) yang memberi sinyal bagi kelenjar adrenal untuk meningkatkan produksi dan mensekresi hormon kortisol. Stress full bagi ternak, maka kelenjar hypothalamus mensekresikan corticotropin releasing hormon (CRH) yang berfungsi memberi sinyal kepada kelenjar pituitary untuk mensekresi ACTH dan selanjutnya mempengaruhi target

---

<sup>27</sup> Turner, G.D and Joseph, T. *Endokrinologi Umum*. (Yogyakarta: University Press. 1988). h. 31

<sup>28</sup> Broom,D.M., Johnson. *Stress and Animal welfare*. (Philipina: Chapman and Hall London. 1993). h. 85

organ (adrenal) untuk mensekresi kortisol, level normal kortisol dalam darah yaitu sekitar 6 - 23 ng per ml.<sup>29</sup>

### **E. Berat Badan, Konsumsi Pakan dan Air Minum pada Transportasi Ternak**

Berat badan merupakan hal utama dalam menentukan nilai ekonomi seekor ternak sapi, sehingga hal ini harus mendapatkan perhatian serius oleh produsen dan pelaku pasar, namun kenyataan berdasarkan pengalaman pihak yang terlibat dalam transportasi ternak mengungkapkan, bahwa akibat transportasi, ternak mengalami penyusutan berat badan sebesar 7% - 10% (tidak membedakan jarak dan waktu perjalanan). Penyusutan berat badan pada ternak sapi yang ditransportasikan dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Selatan dengan jarak tempuh perjalanan sejauh 1.075,8 km, dengan lama perjalanan 57,6 jam (3 hari) mengalami penyusutan berat badan sebesar 26,5kg - 43,5kg (9,90%-12,59%) dari berat badan sebelum pemberangkatan.<sup>30</sup>

Perjalanan ternak dari Nusa Tenggara Timur ke Jakarta (melalui truk - kapal laut - truk) rata-rata penyusutan berat badannya sebanyak 26,8 kg/ekor, dan dari Jawa Timur ke Jakarta (melalui truk) rata-rata penyusutan berat badannya 31,20 kg/ekor.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Donald Mc. *Veterinary endocrinology and Reproduction*. (Philadelphia: Lea & febiger. 1980).h. 51

<sup>30</sup> Syarifuddin, 2004. *Op-cit*

<sup>31</sup> Sudjana, dkk, 1995. *Studi transportasi ternak potong dari Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur ke Jakarta*. J. Penelitian Peternakan Indonesia Vol. 2 No. 2 Feb 1995.

Tingkat penyusutan berat badan per hari mencapai 0,75 %, dan nampaknya akan meningkat beberapa kali dengan bertambahnya waktu dan jarak perjalanan.<sup>32</sup>

Penyusutan berat badan pada ternak yang ditransportasikan tersebut terutama karena penyusutan komponen karkas, dan bukan semata pengurangan "isi saluran pencernaan".<sup>33</sup>

Stress panas pada sapi yang ditransportasikan dicirikan dengan; air liur keluar, ritme pernapasan cepat, bernapas melalui mulut (terengah-engah) hilang keseimbangan, dan gemetaran. Upaya mempertahankan berat badan pada ternak, yang ditransportasikan, maka ketersediaan pakan dan air minum dengan kuantitas dan kualitas yang baik merupakan faktor yang sangat penting.<sup>34</sup>

Keistimewaan Sapi Bali adalah tidak selektif terhadap pakan, Sapi Bali dapat hidup hanya dengan mengkomsumsi pakan yang bergizi rendah, akan tetapi untuk mendapatkan pertumbuhan dan kesehatan ternak yang tinggi kita perlu memperhatikan pemberian pakan yang cukup bergizi pakan yang baik akan memberikan kesempatan sapi mengembangkan kemampuan genetiknya semaksimal mungkin. Pakan ternak sapi umumnya berupa hijauan dan konsentrat. Hijauan maupun konsentrat merupakan komponen ransum yang terdiri dari satu jenis atau pakan. Hijauan dapat berupa jerami padi, pucuk daun tebu, lamtoro, rumput gajah,

---

<sup>32</sup> Eldrige, G.A, 1988. *Road transport factors that may influence stress in cattle*. In : Proc. Of 34<sup>th</sup> Int. Cong. Meat Sci. And Technol. Brisbane Australia. Hal 148.

<sup>33</sup> Jones, dkk, 1988. *The effect of fasting and transportation on beef cattle*. 2. *Body component change, carcass composition and meat quality*. Livest. Prod. Sci, Hal 20. Warris,dkk, 1995. *Effect on cattle of transport by road for up to 15 hours*. Vet. Rec. Hal 136.

<sup>34</sup> *Ibid*, Hal 25:319.

rumpun benggala, rumput raja dan sebagainya. Adapun konsentrat dapat berupa bungkil kelapa, ampas tahu, bungkil kedelai dan lain-lain.<sup>35</sup>

## F. Kualitas Daging

Daging adalah bahan pangan yang bernilai gizi tinggi karena kaya akan protein, lemak, mineral serta zat lainnyayang sangat dibutuhkan tubuh. Usaha untuk meningkatkan kualitas daging dilakukan melalui pengolahan atau penanganan yang lebih baik sehingga dapat mengurangi kerusakan atau kebusukan selama penyimpanan dan pemasaran.

Daging didefinisikan sebagai serabut otot yang dilekatkan bersama jaringan ikat dan diselingi dengan serabut syaraf dan pembuluh darah yang sesuai untuk di konsumsi serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Berdasarkan keadaan fisik daging dapat dikelompokkan menjadi:

- Daging segar yang dilayukan atau tanpa pelayuan
- Daging segar yang dilayukan kemudian didinginkan (daging dingin)
- Daging segar yang dilayukan, didinginkan kemudian dibekukan (daging beku)
- Daging masak
- Daging asap
- Daging olahan.

Daging yang dikonsumsi dapat berasal dari sapi, kerbau, babi, kuda,

---

<sup>35</sup> Bandini, 1997. *Sapi Bali*. Penebar Swadaya, Jakarta. Hal 17.

domba, kambing, unggas, ikan dan organisme yang hidup di air, di darat, serta daging dari hewan-hewan liar dan aneka ternak, di Indonesia, daging yang banyak di konsumsi adalah daging sapi, daging domba, daging babi, daging kambing, daging kuda dan daging kerbau. Daging–daging tersebut adalah digolongkan dalam jenis daging merah.<sup>36</sup>

Usaha penyediaan daging memerlukan perhatian khusus karena daging mudah dan cepat tercemar oleh pertumbuhan mikroorganisme. Daging sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme sehingga dapat menurunkan kualitas daging. Penurunan kualitas daging diindikasikan melalui perubahan warna, rasa, aroma bahkan pembusukan. Sebagian besar kerusakan daging disebabkan oleh penanganan yang kurang baik sehingga memberikan peluang hidup bagi pertumbuhan dan perkembangan mikroba perusak yang berdampak pada menurunnya daya simpan dan nilai gizi daging.<sup>37</sup>

Kualitas daging sangat menentukan mutu produk daging olahan. Daging yang ada di pasaran terbagi dalam 3 kelas. Kelas 1 adalah daging yang tebal dengan sedikit jaringan ikat dan lemak. Kelas 2 adalah daging tipis, banyak mengandung lemak dan dengan jaringan ikat yang agak banyak, dan kelas 3 adalah daging tetelan, daging yang mengandung banyak jaringan ikat dan atau lemak. Klasifikasi daging ini secara tidak langsung berhubungan dengan kandungan zat gizi dan karakteristik

---

<sup>36</sup> Aurand , L.W. AW, Woods dan M.R, Wells. *Food Composition and Analysis*. (New York: An. A.VI Book, Pub. Van Nostrand Reinhold co. 1987).

<sup>37</sup> Hafri Yanti, *ed all*, eds. *Kualitas daging sapi dengan kemasan Plastik PE (Polyethylen) dan Plastik PP (Polypropylen) Di Pasar Arengka Kota Pekanbaru*. Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim. Riau. 2008.



organoleptik daging. Daging sapi yang berkualitas atau kategori kelas 1 biasanya mempunyai kandungan protein miofibrilar yang tinggi (protein miosin dan aktin). Protein tersebut mudah dicerna dan mempunyai asam amino yang lengkap. Protein daging biasanya sekitar 20%, sedangkan lemaknya sangat bervariasi antara lain tergantung umur, pakan, spesies dan lokasi otot dan berkisar 3-13%. Daging yang berkualitas dan masih baru mempunyai bau dan aroma yang khas sesuai dengan spesies ternaknya, keset (tidak nampak kering dan juga tidak berair), sedikit susut masaknya dan tinggi daya ikat airnya.<sup>38</sup>

Daging yang jelek cenderung berair atau mengeluarkan cairan yang berlebihan seperti daging yang berasal dari ternak yang diglonggong atau kelelahan. Daging beku yang disegarkan kembali (thawing) juga mengeluarkan cairan yang banyak. Daging dengan sifat demikian apabila dibuat bakso akan menghasilkan bakso yang sangat lembek, sedangkan apabila dibuat abon akan menghasilkan abon dengan rendemen yang rendah.<sup>39</sup>

Kualitas daging dapat ditentukan baik secara subyektif maupun obyektif. Pengujian kualitas daging ada bermacam-macam yaitu pengujian organoleptik atau secara inderawi (rasa, bau, warna, keempukan, tekstur), pengujian fisik (keempukan, susut masak, daya ikat air, pH), pengujian mikrobiologis (jumlah bakteri, jenis bakteri), pengujian kimia untuk mengetahui kandungan zat gizi, logam-logam berat

---

<sup>38</sup> Anonymous. 2010. *Kualitas daging*.  
<http://laboratoryresearch.blogspot.com/2008/06/memilih-daging-berkualitas.html>. hal.1. diakses pada tanggal 18 Juli 2010.

<sup>39</sup> Anonymous. 2010. *op-cit*

atau residu bahan berbahaya lainnya.<sup>40</sup>

Daging untuk industri pangan harus memenuhi persyaratan mutu pangan yang telah ditetapkan. Persyaratan mutu ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu 1) persyaratan mutu fisik daging meliputi kandungan zat gizi, karakteristik fisik, kandungan bahan berbahaya, penyakit hewan yang ada, dan jumlah mikroba, 2) persyaratan mutu non fisik daging biasanya mengacu pada kehalalan dan palatabilitas daging. Pemenuhan persyaratan mutu daging sangat diperlukan dalam rangka menyatakan apakah daging yang digunakan itu aman (tidak mengandung residu bahan yang berbahaya), sehat (daging berasal dari ternak yang sehat dan dagingnya tidak membahayakan apabila dikonsumsi manusia), utuh (mengandung zat gizi yang lengkap), dan halal (ternak disembelih secara Islam dan daging tidak dicampuri dengan bahan haram: bangkai, darah dan daging babi) atau disingkat ASUH. UU No 7 tahun 1996 tentang pangan dijelaskan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, apabila persyaratan ASUH ini telah terpenuhi maka daging olahan yang dihasilkan pun akan Bergizi, Aman, Sehat, Utuh dan Halal (BASUH).<sup>41</sup> Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173, surah Al-An'am ayat 145 dan surah An-Nahl ayat 115 yang berbunyi:

---

<sup>40</sup> Anonymous. 2010. *op-cit*

<sup>41</sup> Anonymous. 2010. *op-cit*

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ  
 اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al-Baqarah ayat 173)<sup>42</sup>

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ  
 يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ  
 فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun

<sup>42</sup> Departemen Agama. 2000 *op.cit*

lagi Maha penyayang".(Q.S Al-An'am 145)<sup>43</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ  
بِهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nahl ayat 115)<sup>44</sup>

Komposisi kimia daging terdiri dari Air 56-72 %, Protein 15-22 %, Lemak 534 % dan substansi bukan protein terlarut 3,5 % yang meliputi Karbohidrat, Garam Organik, substansi nitrogen yang terlarut, Mineral dan Vitamin. Protein daging di bagi dalam 3 kelompok yaitu Miofibrilar 9,5 %, Sarkoplasma 6 % dan Stroma 3 %. Lemak terdiri atas Fosfolipida, Kolesterol dan Asam-asam lemak esensial. Karbohidrat terdapat dalam bentuk Glikogen 0,8 %, Glukosa 0,1 % dan dalam intermedier dari metabolisme sel 0,1 % dari berat daging. Protein daging dibagi dalam tiga kelompok yaitu miofibrilar 9,5 %, sarkoplasma 6 % dan stroma 3 %. Lemak terdiri dari fosfolipida, kolesterol, dan asam-asam lemak esensial. Karbohidrat terdapat dalam bentuk glikogen 0.8 %, glukosa 0,1 % dan dalam intermedier dari metabolisme sel 0,1 % dari berat daging.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Departemen Agama. 2000 *op.cit*

<sup>44</sup> Departemen Agama. 2000 *op.cit*

<sup>45</sup> Aurand , L.W. AW, Woods dan M.R, Wells. *Food Composition and Analysis*. (New

### G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Daging

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas daging yaitu faktor sebelum dan setelah pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas daging antara lain genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan termasuk bahan additive (hormon, antibiotik atau mineral) dan stress. Faktor setelah pemotongan yang mempengaruhi kualitas daging antara lain meliputi metode pelayuan, stimulus listrik, metode pemasakan, pH karkas dan daging, bahan tambahan termasuk enzim pengempuk daging, hormon dan antibiotik, lemak intramuscular atau marbling, metode penyimpanan dan preservasi, macam otot daging dan lokasi pada suatu otot daging. Faktor penentu kualitas daging pada waktu hewan hidup adalah cara pemeliharaan, yang meliputi pemberian pakan, tata laksana pemeliharaan dan perawatan kesehatan. Kualitas daging juga dipengaruhi oleh pengeluaran darah pada hewan yang di potong dan kontaminasi sesudah hewan di potong.<sup>46</sup>

Menurut Cickaholic (2009) kriteria yang dipakai sebagai pedoman untuk menentukan kualitas daging yang layak di konsumsi adalah:

1. Keempukan daging di tentukan oleh kandungan jaringan ikat. Semakin tua usia hewan susunan jaringan ikat semakin banyak sehingga daging yang di hasilkan semakin liat (kenyal).

---

York: An. A.VI Book, Pub. Van Nostrand Reinhold co. 1987).

<sup>46</sup> Tabrani, H. *Pengaruh proses Pelayuan Terhadap Keempukan Daging* . (Downloaded E-mail :herman\_ [tabrany@yahoo.co.nz](mailto:tabrany@yahoo.co.nz) . Di akses pada tanggal 16/4/2009. 9:29 Pm. 2001)

2. Kandungan lemak atau marbling adalah lemak yang terdapat di antara serabut otot (*intramuscular*). Lemak berfungsi sebagai pembungkus otot dan mempertahankan keutuhan daging pada waktu di panaskan. Marbling berpengaruh terhadap cita rasa.
3. Warna daging bervariasi tergantung dari jenis hewan secara genetik dan usia. Misalkan daging sapi potong lebih gelap dibandingkan daging sapi perch, daging sapi muda lebih pucat dari pada daging dewasa.
4. Aroma dan rasa dipengaruhi oleh jenis pakan. Daging berkualitas baik mempunyai rasa gurih dan aroma yang sedap.
5. Kelembaban secara normal daging mempunyai permukaan relatif kering sehingga dapat menahan pertumbuhan mikroorganisme dari luar.<sup>47</sup>

Menurut drh. Nindita Setia R (2009), kriteria daging yang tidak baik adalah:

1. Bau dan rasa tidak normal akan segera tercium sesudah hewan dipotong. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya kelainan sebagai berikut :
  - a. Hewan sakit terutama yang menderita radang bersifat akut pada organ dalam yang akan menghasilkan daging berbau seperti mentega tengik.
  - b. Hewan dalam pengobatan terutama dengan pengobatan antibiotik akan menghasilkan daging yang berbau obat – obatan.
2. Warna daging tidak normal tidak selalu membahayakan kesehatan, namun akan mengurangi selera konsumen.

---

<sup>47</sup> Chickaholik, *Kualitas Daging*. (Downloaded [http: herman\\_ tabranydyahooxo.nz](http://herman_tabranydyahooxo.nz) . Diakses 2009/April/5. 16:50. 2009)

3. Konsistensi daging tidak normal yang ditandai kekenyalan daging rendah ( jika ditekan dengan jari akan terasa lunak ) dapat mengindikasikan daging tidak sehat, apabila disertai dengan perubahan warna yang tidak normal maka daging tersebut tidak layak dikonsumsi.
4. Daging busuk dapat mengganggu kesehatan konsumen karena menyebabkan gangguan saluran pencernaan. Pembusukan dapat terjadi karena penanganan yang kurang baik pada waktu pendinginan, sehingga aktivitas bakteri pembusuk meningkat, atau karena terlalu lama dibiarkan ditempat terbuka dalam waktu relatif lama pada suhu kamar, sehingga terjadi proses pemecahan protein oleh enzim – enzim dalam daging yang menghasilkan amoniak dan asam sulfida.<sup>48</sup>

Warna daging dapat menjadi indikasi keadaan kualitas daging. Daging sapi yang berkualitas, berwarna merah segar. Warna ini berasal dari pigmen daging sapi yaitu mioglobin. Ternak yang stres, sakit dan perlakuan yang kasar dapat menghasilkan daging yang berwarna sangat gelap atau sebaliknya sangat pucat. Apabila diukur pH-nya maka daging yang gelap biasanya mempunyai pH tinggi. Sebaliknya daging yang ber-pH rendah cenderung berwarna pucat. Pemukulan atau pencambukan dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di jaringan otot tertentu, sehingga proses pengeluaran darah tidak sempurna, mengakibatkan warna daging yang gelap di area tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Nindita Setia R, drh. *Cara Mengenal Daging Sehat*.

<http://salahketik.com/situs/kesehatan/Mengenal%20daging%20sehat.htm>. (Diakses pada tanggal 19 Juli 2010. 2009)

<sup>49</sup>Anonymous. 2010. *op-cit*

Daging yang berasal dari ternak yang stress, sakit, dan apalagi sudah menjadi bangkai mengandung berbagai bahan berbahaya atau racun. Bahan-bahan berbahaya atau racun tersebut akan terus terbawa dalam daging olahan, sehingga masuk ke dalam tubuh manusia ketika dikonsumsi.<sup>50</sup>

Kualitas daging yang digunakan sebagai bahan baku harus dijaga dengan ketat untuk menjamin mutu produk yang dihasilkan. Daging yang berkualitas berasal dari ternak yang sehat dan segar bugar, dan diperlakukan dengan baik ketika akan disembelih. Ternak yang layak disembelih adalah ternak yang *clean, healthy, fasted, free from blemishes, unstressed, easy to handle, well muscled and not overfat*. Ternak dengan kondisi demikian akan mempunyai cadangan tenaga atau glikogen yang tinggi, sedikit sekali atau bahkan tidak ada memar atau luka sehingga ketika disembelih darah dapat keluar dengan sempurna atau tuntas dan ternak cepat mati. Karkas atau dagingnya mempunyai kualitas yang tinggi karena darah yang tertinggal di dalam daging sedikit (minimal) dan pH yang rendah (sekitar 5,6), sebagai akibat proses metabolisme glikogen menjadi asam laktat. Daging menjadi lebih awet dan terjadi peningkatan palatabilitas. Sebaliknya, ternak yang lelah dan/atau stres karena perjalanan atau perlakuan yang kasar (dicambuki, terjatuh, atau terbanting ketika proses penyembelihan), sebelum disembelih akan menghasilkan daging yang berkualitas jelek.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Anonymous. 2010. *op-cit*

<sup>51</sup> Anonymous. 2010. *op-cit*



Sumber-sumber stress pada ternak bisa terjadi lama sebelum ternak di potong dan bersifat kronis, menjelang hewan di potong atau sesaat sebelum pemotongan nutrisi, iklim, cuaca, kelembaban, ketakutan, transportasi, pemuaan, pemaksaan perlakuan dan lain-lain merupakan faktor penyebab stress pada ternak yang di potong. Respon jaringan terhadap stress tergantung kemampuan ternak mengatasi stress dan mekanisme mempertahankan homeostatic. Perbedaan respon ini dapat di ketahui dari kondisi daging. Daging PSE (*pale, soft, exudative*) atau (pucat, lembek dan berair) adalah kondisi akibat system peredaran tidak mampu mentransportasikan timbunan asam laktat otot, sehingga ternak tidak mampu mempertahankan kondisi fisiologinya akibat lainnya adalah pH daging menurun. Daging PSE berhubungan dengan peningkatan susut masak dan penurunan jus daging. Sementara bila hewan dapat mengatasi kondisi stress, bila di potong akan menghasilkan daging yang gelap (merah), keras dan kering atau DFD (*dark, firm, dry*). Daging DFD di sebabkan oleh defisiensi glikogen otot dan penurunan pH otot menjadi sangat minimal. Oleh sebab itu pada hewan-hewan yang di potong maka sebelum di potong dilakukan istirahat. Hal ini dalam upaya untuk membuat sapi atau hewan potong lainnya nyaman, terbebas dari lelah dan tidak stress. Perlakuan ini juga akan menurunkan kadar asam laktat otot sehingga daging PSE dapat diminimalkan.<sup>52</sup>

Proses kontraksi menyebabkan otot menjadi keras dan kaku sedangkan proses

---

<sup>52</sup> Triakoso. *Stress dan Kualitas Daging*. (Downloaded from <http://triakoso.Blog.Unair.ac.id>. Di akses pd 5/4/2009, 2008)

relaksasi menyebabkan jaringan otot menjadi lunak dan empuk. Fase-fase yang di alami jaringan otot hewan setelah di potong fase pre rigor mortis, rigor mortis, pasca rigor mortis. Keempukan daging dapat terjadi karena ternak menyimpan glikogen di dalam otot sebagai sumber persediaan energi, untuk itu mengistirahatkan ternak yang akan di potong selama 24 jam dapat meningkatkan jumlah glikogen yang pada akhirnya dapat menyebabkan jaringan otot menjadi lunak dan empuk.

## H. pH Daging

Glukosa adalah gula yang penting untuk mengontrol metabolisme energi (semua) ternak pedaging, termasuk dalam pembentukan glikogen. Secara persentase urat daging tidak banyak mengandung glikogen (hanya 1 persen) dibandingkan dengan hati (2-8 persen). Namun total massa daging dalam tubuh cukup besar sehingga jumlah absolute glikogen yang disimpan dalam urat daging cukup besar.<sup>53</sup>

Pengaruh stress sebelum pemotongan terhadap bermacam-macam otot sapi sangat bervariasi. Misalnya, sejumlah otot mengalami peningkatan cairan daging, sementara otot lain dapat menjadi kering. Stress sebelum pemotongan seperti iklim, tingkah laku yang agresif diantara ternak sapi atau gerakan yang berlebihan, juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap penurunan atau habisnya glikogen otot dan akan menghasilkan daging yang gelap dengan pH yang tinggi.<sup>54</sup>

Setelah pH menurun pasca pemotongan, kemudian pH akan mencapai konstan

<sup>53</sup> Parakkasi, A. *Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak*. Jakarta: UI Press. 1995

<sup>54</sup> Smith, G.L. et all. *Post Mortem Aging of Carcasses*. Jurnal Food Science. 430:823. 1978

pada beberapa waktu dan waktu ini bertambah meskipun daging dalam keadaan dingin dan akan naik lagi pH-nya pada kontaminasi dan kondisi membusuk. Bila pH mencapai 6,7 atau lebih, secara objektif pembusukan telah terjadi dan akan terbentuk perubahan bau, warna dan susunan komposisinya.<sup>55</sup>

Lama transportasi menyebabkan kelelahan pada ternak sehingga mempengaruhi pH akhir daging pasca potong. Dimana, nilai pasca mati ditentukan oleh jumlah laktat yang dihasilkan dari glikogen selama proses glikolisis anaerob dan hal ini akan terbatas bila glikogen terdepleksi karena lelah, kelaparan atau takut pada hewan sebelum dipotong, sehingga nilai pH daging sangat berhubungan dengan kondisi yang menyebabkan cekaman stress pada ternak termasuk perlakuan transportasi saat pemasaran atau pemeliharaan.<sup>56</sup>

Nilai pH pasca mati akan ditentukan oleh jumlah laktat yang dihasilkan dari glikogen selama proses glikolisis anaerob dan hal ini akan terbatas bila glikogen terdepleksi karena lelah, kelaparan atau takut pada hewan sebelum dipotong. Berhubung pH adalah penentu pertumbuhan bakteri yang penting, maka jelas bahwa pH akhir daging memang penting untuk ketahanannya terhadap pembusukan. Hampir semua bakteri tumbuh secara optimal pada pH akhir sekitar 7 dan tidak akan tumbuh persis pada pH kurang dari 4 atau diatas 9. Tetapi pH untuk pertumbuhan optimal ditentukan oleh kerja simultan dari berbagai variable lain diluar faktor keasaman itu

---

<sup>55</sup> Forrest, et all. *Principles of Meat Science*. San Fransisco, C.A; Freeman and company. 1975

<sup>56</sup> Lawrie, R.A. *Meat Scince*. 2 "d . Edit. Oxford: Pergamon Press. 1979

sendiri.<sup>57</sup>

Bila pH akhir daging tinggi, maka aktivitas (bertahan) enzim-enzim sitokrom akan lebih besar. Selanjutnya, berhubung protein urat daging cukup jauh diatas titik isoelektriknya, maka banyak air didalam urat daging berasosiasi dengan protein-protei tersebut dan serat-serat secara kuat akan dibungkus bersama, sehingga merupakan halangan untuk proses difusi. Sebagai akibat dari dua faktor tersebut, lapisan oksimoglobin yang merah cerah secara perlahan menjadi sedikit dan tidak menyenangkan sehingga warna merah *purple* dari mioglobin sendiri akan menonjol sedemikian rupa dan daging akan terlihat gelap (*dark cutting beef*). Selanjutnya, pH akhir tinggi mengubah sifat-sifat penyerapan mioglobin permukaan daging menjadi lebih merah gelap.<sup>58</sup>

## I. Epistemologi Proses Pelayuan dan Keempukan Otot

Pelayuan sangat dianjurkan agar proses rigor mortis berlangsung dengan sempurna. Proses pelayuan biasanya dilakukan di Rumah Potong hewan (RPH) dengan cara penggantungan atau penyimpanan selama waktu tertentu pada temperatur tertentu diatas titik beku karkas atau daging ( $-1,5^0$  C). Pelayuan yang lebih lama dari 24 jam atau sejak terjadinya kekakuan daging atau rigor mortis dapat disebut pematangan. Pelayuan biasanya dilakukan pada temperatur  $32 - 38^0$  F ( $0 - 3^0$  C), setelah pendinginan selama kira-kira 24 jam pada temperatur  $-4^0$  C sampai  $1^0$  C

---

<sup>57</sup> Lawrie, R.A. 1979. *Op-cit.*

<sup>58</sup> Soeparno. 1992. *Op-cit*

atau disebut *chilling*. Pada temperatur tersebut aktifitas enzim terhambat dan proses pengempukan daging berlangsung antara sepuluh sampai empat puluh hari. Rasa daging yang khas dapat terbentuk setelah satu minggu pelayuan, namun demikian daging yang berkualitas rendah jarang mencapai keempukan yang baik pada proses pelayuan. Pelayuan terjadi akibat proses kontraksi dan relaksasi pada otot sesaat setelah ternak dipotong yang menyebabkan perubahan biokimia dalam jaringan.<sup>59</sup>

Proses kontraksi menyebabkan otot menjadi keras dan kaku sedangkan proses relaksasi menyebabkan jaringan otot menjadi lunak dan empuk. Fase-fase yang dialami jaringan otot hewan setelah dipotong adalah fase pra rigor mortis, rigor mortis, dan pasca rigor mortis. Pada fase pra rigor mortis daging masih lunak karena daya ikat air dari jaringan otot masih tinggi, lama fase pra rigor mortis berkisar antara 5-8 jam, tergantung dari jenis hewan. Penemuan baru menunjukkan bahwa ada penyusutan otot pada fase pre rigor mortis, oleh karena itu bertambah kerasnya otot dapat dikurangi dengan menyimpan daging pada temperatur 20<sup>0</sup> C pada fase pre rigor mortis. Pada fase rigor mortis jaringan otot menjadi keras dan kaku. Fase ini sangat tergantung pada kondisi penyimpanan. Penyimpanan pada suhu rendah dapat menyebabkan fase rigor mortis berlangsung cukup lama. Sedangkan fase pasca rigor mortis adalah fase pembentukan aroma, pada fase ini daging kembali menjadi lunak dan empuk karena daya ikat air dalam otot kembali meningkat. Lama pelayuan daging berhubungan dengan selesainya proses rigor mortis (proses kekakuan daging),

---

<sup>59</sup> Afianti F. 1997. *Pelayuan Sebagai Salah Satu Cara Pengempukan Daging*. Buletin PPSKI. No. 8 Th. X : 3 - 4

dalam hal ini apabila proses rigor mortis belum selesai dan daging terlanjur dibekukan maka akan menurunkan kualitas daging atau daging mengalami proses *cold-shortening* (pengkerutan dingin) ataupun *thaw rigor* (kekakuan akibat pencairan daging) pada saat *thawing* sehingga akan menghasilkan daging yang tidak empuk (alot).<sup>60</sup>

Pelayuan dapat meningkatkan daya ikat air pada berbagai macam pH karena terjadinya perubahan hubungan air - protein, yaitu peningkatan muatan melalui absorpsi ion K dan pembebasan ion Ca, tetapi penyimpanan yang terlalu lama akan menurunkan daya ikat air dan terjadinya perubahan struktur otot. Walaupun pelayuan dapat meningkatkan daya ikat air tetapi sangat dipengaruhi oleh pH dan pada akhirnya daging kehilangan cairannya. Pelayuan pada temperatur  $(0 - 1)^{\circ}\text{C}$  selama 21 hari dapat meningkatkan daya ikat air dan keempukan daging sapi serta menurunkan susut masak (*cooking loss*) dan penyusutan daging.<sup>61</sup>

Pelayuan perlu dilakukan pada karkas sapi karena kekakuan (rigor mortis) berlangsung dalam waktu relatif lama, juga daging sapi relatif kurang empuk pada umur pematangan yang sudah tua. Pada pelayuan daging terjadi denaturasi protein yang mengakibatkan keempukan daging meningkat tetapi sebaliknya daya ikat air dari daging menurun yang mengakibatkan susut masak meningkat.

---

<sup>60</sup> Tabrani, H. *Epistemologi Proses Pelayuan dan Keempukan Otot*. ([http://rudycr.com/PPS702-ipb/03112/herman\\_t.htm](http://rudycr.com/PPS702-ipb/03112/herman_t.htm) . diakses pada tanggal 2 Agustus 2010. 2001)

<sup>61</sup> Tabrani, H. 2001. *Op-cit.* hal 13

## J. Pakan dan Suplementasi Pakan

Peningkatan produksi ternak khususnya ternak ruminansia akan berhasil dengan baik jika ketersediaan pakan hijauan sebagai sumber pakan dapat dipenuhi secara kualitas dan kuantitas, dan tersedia secara kontinyu. Hijauan makanan ternak bersumber dari padang rumput alam atau dengan melakukan penanaman hijauan makanan ternak. Jenis dan kualitas hijauan dipengaruhi oleh kondisi ekologi dan iklim di suatu wilayah.<sup>62</sup>

Kualitas produksi ternak sangat erat hubungannya dengan kualitas pakan lokal yang tersedia. Sehingga pemanfaatan sumber pakan lokal secara optimal dapat menentukan tercapainya produktivitas secara maksimal pula. Makanan pokok ternak pada umumnya berasal dari hijauan dalam jumlah besar (90%) dari berbagai jenis rumput dan dedaunan.<sup>63</sup>

Kebutuhan pakan bagi ternak diproyeksikan untuk memenuhi dua kebutuhan hidup pokok dan untuk kebutuhan produksi. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan pakan hijauan segar (pakan utama), konsentrat (pakan penguat) dan suplemen. Jumlah pemberiannya disesuaikan dengan berat badan ternak dan menjamin terpenuhinya unsur-unsur mikro berupa mineral, vitamin serta asam amino tertentu yang tidak diperoleh ternak saat seperti di alam bebas.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> A.S, Jasmal. *Padang Pengembalaan Sebagai Penyedia Hijauan Makanan Ternak Ruminansia*. (Downloaded <http://Jasmal.blogspotcom> diakses pada 23/4/2009. 16:02. 2008)

<sup>63</sup> Oskov, E.R. 1982. *Protein Nutritional in Ruminants*. Academic Press. London.

<sup>64</sup> Hatmoko, H and Harstoro, I. 1997. *Urea Molasses Block*. Trubus. Agriwidya. Ungaran.

Pakan sebagai salah satu faktor dalam usaha peternakan, pemberian pakan bagi ternak dapat berupa hijauan segar atau jika tidak terdapat hijauan dapat diganti dengan jerami. Hijauan segar diperoleh dari lokasi peternakan yang sengaja ditanam untuk diberikan kepada ternak, sedangkan jerami padi diperoleh dari petani padi. Pemberian pakan seperti ini terutama dilakukan pada ternak yang dipelihara dalam kandang.<sup>65</sup>

Kekurangan pakan merupakan kendala besar dalam proses pertumbuhan, terlebih apabila dalam pakan tersebut, zat – zat pakan untuk pertumbuhan, tersedia sangat kurang seperti protein, mineral dan vitamin.<sup>66</sup>

Pakan yang tidak mengandung protein yang cukup, akan mengakibatkan tubuh ternak tidak akan mampu membentuk dan memelihara jaringan – jaringan yang harus digantikan, akibatnya pertumbuhannya terganggu. Sapi dewasa membutuhkan protein untuk menggantikan jaringan yang telah usang dan untuk memproduksi atau membentuk daging.<sup>67</sup>

Mineral bagi sapi yang sedang tumbuh berguna untuk pertumbuhan tulang dan jaringan sedangkan pada sapi dewasa mineral berguna untuk menggantikan zat-zat mineral yang hilang karena sekresi, vitamin A sangat penting untuk pertumbuhan, jika didalam pakan kekurangan Vitamin A maka pertumbuhannya akan terganggu.<sup>68</sup>

Kebutuhan pakan bagi ternak diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>65</sup>Santoso. U, 2006. *Manajemen Ternak Potong*. Penebar Swadaya. Jakarta Hal 37.

<sup>66</sup> Sudarmono dan Sugeng, 2008. *Sapi potong dalam pemeliharaan, perbaikan produksi, prospek bisnis dan analisis penggemukan*. Penebar Swadaya. Hal 22.

<sup>67</sup> Sudarmono dan Sugeng, 2008. *Op-cit* Hal 23.

<sup>68</sup> Sudarmono dan Sugeng, 2008. *Op-cit*. Hal 24.



hidup pokok dan untuk kebutuhan produksi. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan pakan hijauan segar (pakan utama), konsentrat (pakan penguat) dan suplemen. Jumlah pemberiannya disesuaikan dengan berat badan ternak dan menjamin terpenuhinya unsur-unsur mikro berupa mineral, vitamin serta asam amino tertentu yang tidak diperoleh ternak saat seperti di alam bebas.<sup>69</sup>

Pakan suplemen untuk sapi terbukti menguntungkan karena menaikkan pertambahan bobot badan harian, produksi susu, dan kualitas susu. Pemberian pakan suplemen dapat meningkatkan pertambahan bobot badan harian (*average daily gain-ADG*) sampai 0,4 kg pada sapi potong. Maka dari itu pemberian suplemen sangat diperlukan guna menyiasati masalah kualitas pakan di lapangan yang fluktuatif dan cenderung sangat rendah, termasuk pakan konsentratnya.<sup>70</sup>

Asam amino merupakan bahan dasar pembentukan protein. Karbohidrat untuk pembentukan energi dan lemak tubuh, sedangkan lemak yang merupakan bahan pembentuk dan penyimpan energi dalam tubuh hewan. Manfaat fisiologis dengan pemberian suplemen UMMB, diharapkan berperan dalam proses pencernaan bahan pakan yang dikonsumsi ternak.<sup>71</sup>

Pakan Suplemen dengan komposisi yang optimal akan meningkatkan produktivitas ternak melalui peningkatan sintesis protein mikroba dalam rumen, daya cerna pakan dan konsumsi pakan akan memberikan keseimbangan antara suplai

---

<sup>69</sup> Hatmoko, H and Harstoro, I. *Urea Molasses Block*. (Unggaran: Trubus. Agriwidya, 1997).

<sup>70</sup> Fais Faza. *Sapi "Super" Berkat Suplemen*, Tabloid Agrina. (Downloaded <http://sapi-super-berkat-suplemen>. Diakses 2009/4/25. 03:43 PM. Yogyakarta: Tabloid Agrina, 2009).

<sup>71</sup> Ibit.

asam amino dan energi untuk tumbuh, berproduksi dan reproduksi.

Strategi untuk meningkatkan konsumsi akan oleh ternak pada kondisi pemeliharaan tradisional ialah dengan memberikan suplemen yang tersusun dari kombinasi bahan limbah sumber protein dengan tingkatan jumlah yang secara efisien dapat mendukung pertumbuhan, perkembangan dan kegiatan mikroba secara efisien di dalam rumen. Selanjutnya produktivitas hewan dapat ditingkatkan dengan memberikan sumber N protein atau non protein serta mineral tertentu. Suplementasi secara keseluruhan diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik melalui peningkatan protein mikrobial, peningkatan daya cerna dan peningkatan konsumsi pakan sampai diperoleh keseimbangan yang lebih baik antara asam amino dan energi di dalam zat-zat makanan yang terserap.<sup>72</sup>

N urea dapat meningkatkan aktivitas mikroba rumen sehingga dapat meningkatkan daya cerna pakan yang dikonsumsi ternak, sehingga pakan pemacu dalam bentuk UMMB selain mengandung bahan lain seperti semen dan kapur sebagai sumber mineral, sehingga palatabilitas, ternak terhadap pakan yang diberikan tinggi, UMMB sebagai suplemen yang diberikan pada ternak sapi yang ditransportasikan, secara fisiologis adalah menyuplai protein, vitamin, dan mineral, sehingga protein dan lemak tubuh yang terurai menjadi energi dapat tersubstitusi, sedangkan secara psikologi ternak sapi tenang mengkonsumsi pakan

---

<sup>72</sup> Yudhi. *Urea Molasses Multinutrient Block (UMMB)*. (Di Akses pada 25/4/2009. 04:33. 2008).

yang di berikan.<sup>73</sup>

Manfaat pakan suplemen adalah mengurangi defisiensi unsur mikro baik mineral, vitamin, asam amino maupun protein, meningkatkan efisiensi pencernaan pakan dalam lambung ternak ruminansia, meningkatkan produksi dan perbaikan kinerja reproduksi serta dapat memperbaiki nilai gizi pada ternak sapi tersebut.<sup>74</sup>

Memperbaiki pakan ternak dengan penambahan pakan padat gizi berupa UMMB selama transportasi ternak mungkin dapat memberi solusi untuk meminimalis penyusutan berat badan, karena pakan padat gizi ini telah banyak memperlihatkan kontribusi positif pada ternak sebagaimana telah dilaporkan bahwa, urea Molases Multinutrient Block (UMMB) sebagai sumber protein, mineral dan trace element lainnya dilaporkan cukup baik untuk memperbaiki kinerja ternak.<sup>75</sup>

UMMB<sup>+</sup> adalah UMMB yang diberikan pada ternak perlakuan yang ditambahkan dengan Chromium Picolinat yang berfungsi sebagai GTF (*Glucose Tolerance Factor*), zat ini merupakan mineral esensial yang dapat berperan dalam metabolisme tubuh, membantu tubuh untuk mengontrol konsentrasi gula dalam darah, mampu meningkatkan insulin yang berperan penting dalam pertambahan berat

---

<sup>73</sup> Mc Sweeney, *et all*, eds. *Microbial Interactions With tannins : Nutritional Consequences for Ruminants*. (Anim. Feed.Sci. Technol. 91, 83:93. Downloaded from: by on January, 2009. 2001)

<sup>74</sup> Hatmoko, H and Harstoro, I. *Urea Molasses Block*. (Unggaran, Trubus. Agriwidya. 1997)

<sup>75</sup> Agus, *et all*, eds. *Penggunaan Urea Moleses Block UMB) dan Jagung Kuning Rebus pada Ransum Basal Jerami Padi Fermentasi Terhadap Kinerja Produksi Susu Sapi Perah*. (Disampaikan di Yogyakarta pada Loka karya IPTEKDA BATAN, 2000)

badan, hati dan kesehatan otot dalam tubuh.<sup>76</sup>

Sejumlah penelitian di Amerika memperlihatkan pemberian suplemen kromium dengan dosis 5 mg per hari dapat menurunkan kadar kolesterol 15 persen, selain itu juga menunjukkan bahwa kromium dapat memperbaiki kadar kolesterol dalam darah, mengurangi pengapuran (pembentukan plak) dalam pembuluh darah, dengan adanya kromium ini pemanfaatan insulin tubuh lebih efisien dan keseimbangan kadar gula darah, kromium juga membantu proses pencernaan protein dan lemak. Penelitian membuktikan bahwa kromium dapat menurunkan kadar trigliserid dan kelebihan total kolesterol darah, sekaligus memperbaiki rasio LDL (kolesterol 'jahat') dan HDL (kolesterol 'baik').<sup>77</sup>

### **K. Kualitas Daging akibat Transportasi Ternak**

Produsen ternak sapi potong di Kawasan Timur Indonesia (KTI) kebanyakan memasarkan produknya ke Pulau Jawa dan Kalimantan, akan tetapi ternak yang di transportasikan akan mengalami cekaman (stress), yaitu cekaman psikologis dan fisis-fisiologis.<sup>78</sup>

Cekaman psikologis seperti ketakutan dan kegelisahan merupakan gambaran perilaku ternak sebagai respon terhadap perlakuan yang dialaminya, seperti mencoba

---

<sup>76</sup> Kaats, et al., eds. . *Effect of Chromium Picolinat Supplementation on Body Composition : a randomized, double-masked, Placebo-Controlled Study.* ( [http: H Prohealth. Com/Chromium.gtf.htm](http://HProhealth.Com/Chromium.gtf.htm)).

<sup>77</sup> Kaats, et all, eds. *Effect of chromium picolinate supplementation on body composition : a randomized. Double-masked, placebo-controlled studi.* ([http://prohealth.com/chromium\\_gtf.htm](http://prohealth.com/chromium_gtf.htm) diakses jum`at 27 Maret 2009. 2009)

<sup>78</sup> Dobson, H and Smith, R.F. *What is Stress and How Does it Effect eproduction.* ( J Anim. Reprod. Sci. 61 : 743. 2000).

melarikan diri, vokalisasi, dan menendang. Upaya untuk meminimalkan cekaman psikologis dapat dilakukan diantaranya pembiasaan ternak mengalami penanganan.<sup>79</sup>

Faktor selama perjalanan yang dapat berpengaruh terhadap penyusutan berat badan pengaruhnya dapat dilihat dengan melihat nilai penyusutan. Semakin tinggi tingkat penyusutan menunjukkan faktor-faktor tersebut semakin besar dan cekaman yang dialami ternak semakin tinggi. Cekaman yang dialami tersebut dapat bersifat psikologi dan fisis-fisiologis dan secara kolektif menunjukkan ketidakmampuan individu mengatasi stres.<sup>80</sup>

Secara umum diketahui bahwa selama transportasi konsumsi air minum menurun sehingga menyebabkan dehidrasi, oleh karena itu pada saat transportasi persediaan air sangat penting untuk mencegah dan mengurangi dehidrasi pada ternak, dan efek lain transportasi dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas karkas dan daging yang dihasilkan sebagai akibat pengurasan glikogen otot yang berlebihan tanpa diimbangi *intake* pakan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan ternak akan menguras protein tubuh akibat adanya perlakuan yang akan menyebabkan cekaman/stress pada ternak sehingga berat badan ternak akan menurun.<sup>81</sup>

Perubahan metabolik lain yang di sebabkan akibat transportasi adalah peningkatan enzim-enzim dan creatine-phosphokinase (CPK) dalam darah. Penelitian

---

<sup>79</sup> Arthington, *et al.*, eds. *Supplemental Dietary Chromium Does Influence ACTH, Kortisol oar Ommune Responses in Young Calves Inoculated with Bovine Herpesviro. I. J. Anim.Sci.*217. 1997.

<sup>80</sup> Mitchell, G. Hattingh, J and Ganhao, M. 2000. *Stress in Cattle Assessed After Handing, After Transport and After Slaughter.* Ver. Rec. 123:201

<sup>81</sup> Lofgreen, G. P. *Nutrition and Management of Stressed Beef.* Large Anim. Proc. 5:87. 1983.

Kriesten (1976) menunjukkan total creatine-phosphokinase dalam darah sapi jantan menurun setelah transportasi berbagai metabolik di atas menyebabkan berlangsungnya rangkaian reaksi kataboliksi dalam jaringan organ tubuh baik lemak, protein maupun karbohidrat.<sup>82</sup> Perubahan yang terjadi dalam *Cardio vaskuler* terutama dengan peningkatan frekuensi denyut jantung.<sup>83</sup>

Kebanyakan penelitian menunjukkan bahwa selama perjalanan konsumsi pakan dan air minum menurun dan sebagai konsekuensinya penyusutan berat badan. Terdapat indikasi bahwa pengaruh faktor-faktor lainnya seperti tingkat kepadatan, suhu dan cuaca selama perjalanan bersama-sama dengan konsumsi pakan dan air minum yang menurun dapat menyebabkan kerusakan fisik dan kimiawi daging (pH, warna, tekstur, daya ikat air dan kelembaban) dan di kenal sebagai *dark firm dry* atau *dark cutting*.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Kriesten, K. Schmidtman, W. Fischer, W and Sommer, H. *Influence of Transport and Sale Stress on the concentration of Total Protein, Total Lipids, Glucose, Creatinine and Electrolytes in The Serum of Stock Bulls Sentral Veterinarmed* 23:804. 1976.

<sup>83</sup> Eldridge, G.A. *Road Transport Factors. That May Influence stressing cattle*, in : Proc of 34<sup>th</sup> Int. Cong. Meat. Sci and Technol. Brisbane. Australia. Pp. 1148. 1988.

<sup>84</sup> Lacourt, A and Tarrant, P.V. *Glycogen Depletion Patterns Myofibers of Cattle During Stress*. Meat Sci. 15:85. 1985.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2010 di Bulukumba Sulawesi Selatan, Banjarmasin Kalimantan Selatan dan untuk analisis sampel dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Laboratorium Kimia Nutrisi Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin.

#### **B. Materi Penelitian**

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sapi Bali sebanyak 9 (sembilan) ekor yang ditransportasi antar pulau dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Selatan (untuk data penyusutan berat badan dan kualitas daging ditambahkan 3 ekor yang tidak ditransportasikan), jadi untuk persentase karkas dan kualitas daging digunakan sebanyak 12 ekor sapi

Alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kandang, timbangan, alat pembuatan UMMB, tempat pakan, tempat minum, sarana transportasi darat dan laut, sarana pemotongan ternak, sarana pengkarkasan, alat pemisahan komponen otot dan tempat penyimpanan, pH meter, shear force, plastik creb dan label.

Tabel 1. Jalur dan Jarak Transportasi Ternak Sapi penelitian dari Desa Anrang Kabupaten Bulukumba (Sulsel) ke RPH Banjarmasin (Kalsel)

No	Jalur Transportasi	Jenis Transportasi	Jarak (Km)	Waktu (Jam)
1	Anrang – Bulukumba (Sulsel)	Darat	320	11
2	Parepare – Balikpapan (Sulsel – Kaltim)	Laut	529,4	22
3	Pel.Semayam – Pel. Kariango Balikpapan (Kaltim)	Darat	20	1,5
4	Pel. Kariango – Pel. Penajam (Kaltim)	Laut	6,43	1
5	Penajam – RPH Banjarmasin (Kaltim – Kalsel)	Darat	475	17
	TOTAL	-	1350,83	52,5



### C. Prosedur Penelitian

Ternak penelitian untuk data penyusutan berat badan atau ternak yang ditransportasikan ditimbang terlebih dahulu (data awal) kemudian ditempatkan dalam petak kandang sesuai perlakuan yang dirancang sebelumnya dalam bak truk dengan komposisi sebagai berikut :

A ( 3 ekor ) = Hijauan (kontrol)

B ( 3 ekor ) = Hijauan + UMMB (perlakuan)

C ( 3 ekor ) = Hijauan + UMMB<sup>+</sup> (perlakuan).

Desain untuk data kualitas daging adalah sebagai berikut :

A ( 3 ekor ) = Hijauan tanpa transportasi (kontrol)

B ( 3 ekor ) = Hijauan dan ditransportasikan (kontrol)

C ( 3 ekor ) = Hijauan + UMMB (perlakuan)

D ( 3 ekor ) = Hijauan + UMMB<sup>+</sup> (perlakuan).

Strategi pembiasaan pakan suplemen terhadap ternak penelitian diberikan selama 20 hari sebelum pengangkutan.

Komposisi UMMB yang diberikan pada ternak sapi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Bahan Baku Pakan Urea Molasses Multinutrient Block (UMMB)

No	Bahan-Bahan	Formula (Kg)
1	Urea	6
2	Molasses	35
3	Dedak	25
4	Bungkil Kelapa	12
5	Tepung Batu	6
6	Garam	8
7	Semen	5
8	Lakta Mineral	3
Total		100

Untuk UMMB<sup>+</sup> komposisi bahan tersebut diatas ditambahkan kromium fikolinat sebanyak 2 mg/kg UMMB.

#### D. Parameter Penelitian

Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Penyusutan berat badan

Penyusutan berat badan = berat badan sebelum ditransportasikan dikurangi berat badan setelah sampai tujuan

##### 2. Kualitas Daging

Pada otot bagian *Gluteus medius* dengan melihat:

- a. Keempukan: Pengujian secara objektif dapat dilakukan secara mekanik dengan uji daya putus dengan alat Shear Force. Dimana besar kecilnya

skala pembacaan alat tersebut. Pembacaan skala yang besar menunjukkan bahwa daging tersebut tidak empuk sebaliknya apabila skala pembacaan yang kecil menunjukkan bahwa daging tersebut empuk. Menghitung daya putus serat daging pada metode shear force menggunakan rumus :

$$A = A' / \pi r^2$$

Dimana:

A = Nilai daya putus daging (kg/cm<sup>2</sup>)

A' = Tenaga yang digunakan untuk memotong daging (kg)

r = Jari-jari Shear Force

$\pi = 3,14$ .

- b. pH daging: pH daging diukur dengan menggunakan pH meter dan dilakukan sebanyak tiga kali kemudian hasilnya dirata-ratakan. Besarnya harga pH adalah pembacaan jarum penunjuk pH yang telah bergerak selama 1 menit.

## E. Analisis Data

1. Data Persentase Penyusutan yang diperoleh dari hasil penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis t- Student dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan dengan rumus :

$$t_1 = \frac{x_1 - x_2}{Sx_1/\sqrt{n}} \text{ Di mana :}$$

t = Hasil pengamatan

$x_1$  = Rata-rata perlakuan I

$x_2$  = Rata-rata perlakuan II

$s_x$  = Simpangan Baku Gabungan

n = Jumlah pengamatan.<sup>85</sup>

Data persentase karkas, keempukan daging dan pH otot yang di peroleh dari penelitian ini di analisis dengan menggunakan Rancangan Acak lengkap (RAL) dengan model matematik sebagai berikut:

$$Y_{ij} : \mu + T_{ij} + E_{ij}$$

Dimana:

$Y_{ij}$  : Nilai pengamatan perlakuan ke-j

$\mu$  : Nilai rata-rata umum

$T_{ij}$  : Pengaruh perlakuan ke-i

---

<sup>85</sup> Sudjana. *Metode Perancangan Percobaan*. ( Yokyakarta: CV. Armico 2005) h. 8

Eij : Pengaruh galat perlakuan ke-I dan ulangan ke-j

Jika perlakuan memberikan pengaruh terhadap kualitas daging sapi Bali maka dilanjutkan dengan melakukan uji BNJ (Beda Nyata Jujur) untuk melihat perbedaan antara perlakuan.<sup>86</sup>



---

<sup>86</sup> Gaspersz. *Metode Perancangan Percobaan*. (Bandung: CV. Armico 1991) h. 3

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

#### 1. Persentase Penyusutan Berat Badan

Data persentase penyusutan (%) dapat dilihat dari tabel di bawah ini yaitu :

Tabel 4. Data Persentase Penyusutan Berat Badan Ternak.

Ulangan	Perlakuan		
	Hijauan (B)	Hijauan + UMMB (C)	Hijauan + UMMB <sup>+</sup> (D)
1	6,6	3,6	5,1
2	8,3	6,04	7,6
3	7,5	1,1	2,7
<b>Total</b>	<b>22,4</b>	<b>10,74</b>	<b>15,4</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>7,47<sup>a</sup></b>	<b>3,58<sup>b</sup></b>	<b>5,13<sup>b</sup></b>

Ket : Huruf yang berbeda pada baris yang sama memperlihatkan ada perbedaan ( $P < 0,05$ ).

#### 2. pH Otot Sapi Bali

Data hasil pengukuran pH otot dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 4. Data Hasil Pengukuran pH Otot Pada *Gluteus medius*:

Ulangan	Perlakuan			
	A	B	C	D
1	7,54	7,05	7,44	7,99
2	6,62	7,70	7,33	7,51
3	8,31	7,59	7,22	7,95
<b>Total</b>	<b>22,47</b>	<b>22,34</b>	<b>21,99</b>	<b>23,45</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>7,49<sup>a</sup></b>	<b>7,44<sup>a</sup></b>	<b>7,33<sup>a</sup></b>	<b>7,81<sup>a</sup></b>

### 3. Keempukan Daging *Gluteus medius*

Data hasil pengukuran Keempukan daging pada otot longissimus dorsi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5. Data Hasil Pengukuran Keempukan Daging pada Otot *Gluteus medius*

Ulangan (n)	Perlakuan			
	A	B	C	D
1	4,9	6,73	7,5	7,6
2	9,53	6,6	5,3	4,56
3	5	7,2	8,6	8,4
Total	19,43	20,53	21,4	20,56
Rata-rata	6,47 <sup>a</sup>	6,84 <sup>a</sup>	7,13 <sup>a</sup>	6,85 <sup>a</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Persentase Penyusutan Berat Badan

Dari tabel menunjukkan bahwa pemberian pakan padat gizi yaitu UMMB dan UMMB<sup>+</sup> memperlihatkan tingkat penyusutan ternak yang lebih rendah. Sedangkan ternak yang diberi pakan basal saja tanpa suplemen tingkat penyusutannya lebih tinggi.

Hasil analisis dengan uji t-Student memperlihatkan adanya perbedaan yang sangat nyata ( $P < 0,01$ ) tingkat penyusutan ternak antara perlakuan B dengan perlakuan C sedangkan antara perlakuan B dengan D berbeda nyata ( $p < 0,05$ ), tetapi antara perlakuan C dan D sendiri tidak berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian UMMB dan UMMB<sup>+</sup> mampu meminimalisir tingkat penyusutan berat badan pada ternak sapi yang ditransportasikan. Hal ini disebabkan karena

kandungan UMMB yang mengandung protein, karbohidrat dan lemak yang mana mampu terurai menjadi sumber energi yang dapat membantu ternak mengurangi stress ketika ditransportasikan, sedangkan UMMB<sup>+</sup> tetap sama dengan UMMB namun yang membedakan adanya penambahan Cromium picolinat sebanyak 2 mg.<sup>87</sup>

Penyebab utama penurunan bobot badan ternak adalah faktor stress yang salah satunya adalah kelelahan atau gerakan yang berlebihan dimana semakin lama perjalanan atau transportasi ternak maka secara otomatis jumlah gerakan akan lebih besar dan tingkat kelelahan akan semakin besar juga. Selain itu, penyusutan bobot badan dapat diakibatkan oleh adanya kehilangan pada tubuh dan otot ternak.<sup>88</sup>

Kondisi tidak tenang yang dialami ternak yang ditransportasikan merupakan keadaan yang menguras energi, dan munculnya hormon kortisol akan merombak protein dan lemak tubuh menjadi energi, sehingga dampak negatif yang terjadi berupa; penyusutan komponen tubuh (lemak dan protein), menyebabkan terjadinya penyusutan berat badan ternak sapi, persentase karkas dan kualitas daging rendah. Fenomena tersebut berdampak secara langsung terhadap nilai ekonomi ternak sapi.<sup>89</sup>

Berat badan merupakan faktor penentu nilai ekonomi seekor ternak sapi, sehingga hal ini harus mendapatkan perhatian serius oleh produsen dan pelaku pasar,

---

<sup>87</sup> Mc Sweeney *ed all.* 2001. *Microbial Interactions With tannins : Nutritional Consequences for Ruminants.* Anim. Feed.Sci. Technol. 91, 83:93. Downloaded from: by on January, 2009.

<sup>88</sup> Karina Mia Berutu. *Dampak Lama Transportasi Terhadap Penyusutan Bobot Badan, pH Daging Pasca Potong dan Analisis Biaya Transportasi Sapi PO dan Shortom.* Medan; Departemen Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. 2007.

<sup>89</sup> Agus, A. *ed all.* *Penggunaan Urea Moleses Block UMB) dan Jagung Kuning Rebus pada Ransum Basal Jerami Padi Fermentasi Terhadap Kinerja Produksi Susu Sapi Perah.* Yogyakarta: Disampaikan pada Loka karya IPTEKDA BATAN. 2000



namun kenyataan berdasarkan pengalaman pihak yang terlibat dalam transportasi ternak mengungkapkan, bahwa akibat transportasi, ternak mengalami penyusutan berat badan sebesar 7% - 10% (tidak membedakan jarak dan waktu perjalanan). Penyusutan berat badan pada ternak sapi yang ditransportasikan dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Selatan dengan jarak tempuh perjalanan sejauh 1.350,83 km, dengan lama perjalanan 52,5 jam (3 hari) mengalami penyusutan berat badan sebesar 1,39 kg – 15,26 kg (1,1 % - 7,6 %) dari berat badan sebelum pemberangkatan.<sup>90</sup>

## 2. pH Otot Sapi Bali

Dari tabel 4 diperoleh hasil pengukuran pH Otot pada otot *Gluteus medius* menunjukkan bahwa pH yang diukur pada masing-masing perlakuan menunjukkan hasil yang relatif sama dan berdasarkan analisis ragamnya menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan tidak memberikan pengaruh terhadap pH otot. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh transportasi dan perlakuan makanan tidak mempunyai pengaruh terhadap pH daging. Kemungkinan yang menyebabkan tingginya rata-rata hasil pengukuran pH otot adalah teknik mengukur yang kurang bagus serta jarak antara pengkarkasan dan pengukuran pH yang rentangnya jauh sehingga otot yang diukur bukanlah otot segar.

Perubahan metabolisme pasca pembedahan dapat memunculkan keadaan atau kondisi daging yang berbeda. Terdapat dua keadaan ekstrim daging yaitu 1) keadaan

---

<sup>90</sup> Syarifuddin, 2004. *Op-cit*

daging yang pucat, sangat lembek dan berair atau *pale, soft and exudative (PSE)* dan 2) keadaan daging yang gelap, alot dan kering atau *dark, firm and dry (DFD)*. Daging PSE disebabkan oleh produksi asam laktat pasca pemotongan yang sangat cepat dan tidak terkendali, sehingga menyebabkan pH daging yang rendah sesaat setelah pemotongan, sementara temperatur otot atau tubuh ternak masih relatif tinggi.

Nilai pH merupakan salah satu kriteria dalam penentuan kualitas daging, khususnya di Rumah Potong Hewan (RPH). Setelah pemotongan hewan (hewan telah mati), maka terjadilah proses biokimiawi yang sangat kompleks di dalam jaringan otot dan jaringan lainnya sebagai konsekuensi tidak adanya aliran darah ke jaringan tersebut, karena terhentinya pompa jantung. Salah satu proses yang terjadi dan merupakan proses yang dominan dalam jaringan otot setelah kematian (36 jam pertama setelah kematian atau postmortem) adalah proses glikolisis anaerob atau glikolisis postmortem. Dalam glikolisis anaerob ini, selain dihasilkan energi (ATP) maka dihasilkan juga asam laktat. Asam laktat tersebut akan terakumulasi di dalam jaringan dan mengakibatkan penurunan nilai pH jaringan otot.<sup>91</sup>

Nilai pH otot (otot bergaris melintang atau otot skeletal atau yang disebut daging) saat hewan hidup sekitar 7,0-7,2 (pH netral). Setelah hewan disembelih (mati), nilai pH dalam otot (pH daging) akan menurun akibat adanya akumulasi asam laktat. Penurunan nilai pH pada otot hewan yang sehat dan ditangani dengan baik sebelum pemotongan akan berjalan secara bertahap, yaitu dari nilai pH sekitar 7,0-

---

<sup>91</sup> Lukman W. Denny. *Nilai pH Daging*. Bogor. Bagian Kesehatan Masyarakat Veterinir Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. 2010

7,2 akan mencapai nilai pH menurun secara bertahap dari 7,0 sampai 5,6 – 5,7 dalam waktu 6-8 jam postmortem dan akan mencapai nilai pH akhir sekitar 5,5-5,6. Nilai pH akhir (ultimate pH value) adalah nilai pH terendah yang dicapai pada otot setelah pemotongan (kematian). Nilai pH daging tidak akan pernah mencapai nilai di bawah 5,3. Hal ini disebabkan karena pada nilai pH di bawah 5,3 enzim-enzim yang terlibat dalam glikolisis anaerob tidak aktif berkerja. Sebagai pedoman dapat dikatakan bahwa jika pada pengukuran nilai pH sudah di bawah 6,5 maka dapat dinyatakan sebagai daging PSE, namun jika di atas 6,5 maka belum dapat dipastikan apakah penurunan nilai pH yang normal atau DFD. Nilai pH DFD baru dapat dipastikan pada pengukuran nilai pH akhir, yaitu jika nilai pH akhir tetap di atas 6,2 maka dikategorikan daging DFD.<sup>92</sup>

Nilai pH juga berpengaruh terhadap keempukan daging. Daging dengan pH tinggi mempunyai keempukan yang lebih tinggi daripada daging dengan pH rendah. Kealotan atau keempukan serabut otot pada kisaran pH 5,4 sampai 6,0 lebih banyak ditentukan oleh status kontraksi serabut otot dari pada oleh status fisik serabut otot.<sup>93</sup>

### 3. Keempukan Daging *Gluteus medius*

Dari tabel tersebut diatas maka diperoleh hasil pengukuran keempukan (*Gluteus medius*) daging dengan rata-rata yang relatif sama. Dari masing-masing data ternak perlakuan yang berdasarkan hasil analisis sidik ragam tidak memberikan

---

<sup>92</sup> Lawrie, R.A. *Meat Science*. 2 "d". Edit. Pergamon Press. 1979

<sup>93</sup> Bouton, P.E. *et all*. 1986. Factor Influencing Cooking Losses from Meat. *J.Food Sci*

pengaruh terhadap kualitas daging Sapi Bali yang ditransportasikan. Hasil ini memperlihatkan bahwa pada transportasi dan jenis makanan yang diberikan tidak memengaruhi keempukan daging.

Keempukan daging dapat terjadi karena ternak menyimpan glikogen di dalam otot sebagai sumber persediaan energi, untuk itu mengistirahatkan ternak yang akan dipotong selama 24 jam dapat meningkatkan jumlah glikogen yang pada akhirnya akan menyebabkan jaringan otot menjadi lunak dan empuk. Pendapat lain menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keempukan daging adalah faktor sebelum pemotongan (*ante mortem*) dan sesudah pemotongan (*post mortem*). Yang termasuk *ante mortem* adalah latar belakang genetik, cara-cara pemotongan, lama penyimpanan, temperatur penyimpanan dan penambahan zat pelunak, selain faktor-faktor tersebut jumlah lemak yang terdapat diantara jaringan pengikat otot ikut berpengaruh terhadap keempukan daging.<sup>94</sup>

Daging akan berubah menjadi empuk apabila dilayukan hal ini karena selama proses pelayuan terjadi perubahan-perubahan pada protein intra dan ekstra seluler sehingga proses autolisis pada daging menghasilkan daging yg lebih empuk, lebih basah dan flavour lebih baik. Fungsi pengempukan daging dengan pelayuan merupakan fungsi dari waktu dan temperatur. Pada temperatur yang tinggi akan menghasilkan tingkat keempukan tertentu dalam waktu yang lebih cepat

---

<sup>94</sup> Tabrani, H. 2001. *op-cit* Hal 12

dibandingkan pada temperatur rendah. Keempukan juga dapat ditingkatkan dengan perlakuan pendinginan, perlakuan enzim dan perebusan.<sup>95</sup>

Kualitas daging dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik pada waktu hewan masih hidup maupun setelah dipotong. Faktor penentu kualitas daging pada waktu hewan hidup adalah cara pemeliharaan, yang meliputi pemberian pakan, tata laksana pemeliharaan, dan perawatan kesehatan. Kualitas daging juga dipengaruhi oleh pengeluaran darah pada waktu hewan dipotong dan kontaminasi sesudah hewan dipotong.

Daging yang berkualitas mempunyai keempukan yang tinggi karena jaringan ikat yang sedikit. Keempukan ini akan meningkat apabila daging telah mengalami pelayuan atau didiamkan pada periode waktu tertentu untuk memberikan kesempatan terjadinya proses rigormortis dan glikolisis. Di samping keempukan, pelayuan juga akan mengembangkan flavor daging.

Bagi konsumen, daging dari berbagai spesies dan bangsa ternak mempunyai akseptansi yang berbeda. Di antara individu konsumen, kriteria daging juga berbeda, tergantung pada faktor fisiologis dan sensasi organoleptik. Salah satu faktor yang ikut menentukan kelezatan dan daya terima daging adalah tekstur dan keempukan. Keempukan bervariasi di antara spesies, bangsa, ternak dalam spesies yang sama, potongan karkas, dan di antara otot, serta pada otot yang sama.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Tabrani, H. 2001. *op-cit.* hal 13

<sup>96</sup> Soeparno. *Ilmu dan teknologi Daging.* Cetakan Ke-3. Yogyakarta: Gadjahmada university Press. 1995

Keempukan daging dapat ditentukan secara subjektif dan objektif. Penentuan keempukan dengan metode subjektif dilakukan dengan cara struktur atau non struktur dan uji panel cita rasa atau *panel taste*. Pengujian secara objektif dapat dilakukan secara mekanik dengan uji daya putus *Warner-Bratzler*.<sup>97</sup>



---

<sup>97</sup> Amerine, M.A. *et al.* *Principles of Sensory Evaluation of Food*. Academic Press. New York. 1965

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian yang diperoleh maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat penyusutan berat badan pada Sapi Bali yang tertinggi adalah pada sapi yang diberikan hijauan saja, hal ini menunjukkan bahwa pemberian UMMB dan UMMB<sup>+</sup> mampu meminimalisir penyusutan berat badan sapi Bali yang ditransportasikan.
2. Pemberian UMMB dan UMMB<sup>+</sup> tidak memberikan pengaruh terhadap parameter kualitas daging Sapi Bali yaitu pada keempukan dan pH otot.

### **B. Saran**

1. Kepada semua pihak yang bergelut di dunia peternakan, khususnya pengusaha sapi dalam menggemukkan sapi agar memberikan pakan suplemen (UMMB dan UMMB<sup>+</sup>) untuk mengurangi penyusutan berat badan sapi pada saat ditransportasikan antar pulau.
2. Penelitian dengan pakan suplemen lain dapat dilakukan untuk melihat pengaruh terhadap kualitas daging

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Halim. 1993. *Manajemen Transportasi*. Raja Grafindra Persada. Jakarta.
- Afianti F. 1997. *Pelayuan Sebagai Salah Satu Cara Pengempukan Daging*. Buletin PPSKI. No. 8 Th. X : 3 - 4
- Agus, A. Astuti, A. Priyono dan Soejono, M. 2000. *Penggunaan Urea Moleses Block (UMB) dan Jagung Kuning Rebus pada Ransum Basal Jerami Padi Fermentasi Terhadap Kinerja Produksi Susu Sapi Perah*. Disampaikan pada Loka karya IPTEKDA BATAN. Yogyakarta.
- Amerine, M.A., R.M. Pangborn, dan E.B. Roessler. 1965. *Principles of Sensory Evaluation of Food*. Academic Press. New York
- Anonymous, 2009. *Transportasi Hewan Ternak*. [http://id.wiki/transportasi hewan ternak](http://id.wiki/transportasi_hewan_ternak). diakses 21 Januari 2010.
- Arthington, J.D. Corah, L.R. Minton, J.E. Elsasser, T.H and Blecha, S.F. 1997. *Supplemental Dietary Chromium Does Influence ACTH, Kortisol oar Ommune Responses in Young Calves Inoculated with Bovine Herpesviro. 1*. J. Anim.Sci.217.
- A.S, Jasmal. 2008. *Padang Pengembalaan Sebagai Penyedia Hijauan Makanan Ternak Ruminansia*. Downloaded <http://Jasmal.blogspotcom> diakses pada 23/4/2009. 16:02
- Aurand , L.W. AW, Woods dan M.R, Wells. 1987. *Food Composition and Analysis*. An. A.VI Book, Pub. Van Nostrand Reinhold co. New York
- Bandini, 1997. *Sapi Bali*. Penebar Swadaya, Jakarta
- Broom,D.M., Johnson. 1993. *Stress and Animal welfare*. Chapman and Hall London. Philipina.
- Chickaholik, 2009. *Kualitas Daging*. Downloaded [http:// herman\\_ tabranydyahooxo.nz](http://herman_tabranydyahooxo.nz) . Diakses 2009/April/5. 16:50.
- Crrokshank., W.R, Glissade., M.N, White., R.G, Clanton., D.C, and Smelley, H.E. 1979. *Effect of Transportation and Handling Calves Upon Blood Serum*



*Composition*. Can. J. Anim. Australia.

Departemen Agama. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yayasan Penterjemah/Pentafsir. Jakarta.

Dobson, H and Smith, R.F. 2000. *What is Stress and How Does it Effect eproduction*. *J Anim. Reprod. Sci.* 61 : 743.

Donald Mc.1980 *Veterinary Endocrinology and Reproduction*. Lea & febiger. Philadelphia.

Edward.K., Morlok. 2000. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi* . Erlangga. Jakarta

Eldridge, G.A. 1988. *Road Transfort Factors. That May Influence stressing cattle, in* : Proc of 34<sup>h</sup> Int. Cong. Meat. Sci and Technol. Brisbane. Australia. Pp. 1148.

Efendi Abustam. 2007. *Penuntun Praktikum Teknologi Hasil Ternak*. Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin. Makassar.

Fais Faza. 2009. *Sapi "Super" Berkat Suplemen*. Tabloid Agrina. Downloaded <http://sapi-super-berkat-suplemen>. Diakses 2009/4/25. 03:43 PM. Yogyakarta.

Forrest, et all.1975. *Principles of Meat Science*. Freeman and Company. San Fransisco, C.A

Gaspersz. 1991. *Metode Perancangan Percobaan*. CV. Armico. Bandung.

Hafri Yanti, et all, eds. 2008. *Kualitas Daging Sapi dengan Kemasan Plastik PE (Polyethylen) dan Plastik PP (Polypropylen) Di Pasar Arengka Kota Pekanbaru*. Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim. Riau.[http://www.uinsuska.info/faperta/attachments/092\\_Jurnal\\_%20hafriyanti.pdf](http://www.uinsuska.info/faperta/attachments/092_Jurnal_%20hafriyanti.pdf)

Hatmoko, H and Harstoro, I. 1997. *Urea Molasses Block*. Trubus. Agriwidya. Ungaran.

Hosen, S. 1996. *Menanggulangi Stress Pada Ayam*. Poultry Indonesia.

- Jones, dkk, 1988. *The Effect of Fasting and Transportation on Beef Cattle. 2. Body Component Change, Carcass Composition and Meat Quality*. Livest. Prod. Sci, Hal 20. Warris, dkk, 1995. *Effect on Cattle of Transport by Road for Up to 15 Hours*. Vet. Rec.
- Kaast, G.R. Blum, K. Fisher, J.A. Adelman, J.A. 2009. *Effect of Chromium Picolinate Supplementation on Body Composition : a randomized, double-masked, Placebo-Controlled Study*. [http: H Prohealth. Com/Chromium.gtf.htm](http://HProhealth.Com/Chromium.gtf.htm).
- Karina Mia Berutu. 2007 *Dampak Lama Transportasi Terhadap Penyusutan Bobot Badan, pH Daging Pasca Potong dan Analisis Biaya Transportasi Sapi PO dan Shortom*. Departemen Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Medan
- Kriesten, K. Schmidtman, W. Fischer, W and Sommer, H. 1976. *Influence of Transport and Sale Stress on The Concentration of Total Protein, Total Lipids, Glucose, Creatinine and Electrolytes in The Serum of Stock Bulls Sentral Veterinarmed* 23:804.
- Lacourt, A and Tarrant, P.V. 1985. *Glycogen Depletion Patterns Myofibers of Cattle During Stress*. Meat Sci. 15:85.
- Linder Mc. 1985. *Nutritional Biochemistry and Metabolism*. Elsevier Science Publishing Company, Inc California. Australia.
- Lukman W. Denny. 2010. *Nilai pH Daging*. Bagian Kesehatan Masyarakat Veterinir Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Lofgreen, G. P. 1983. *Nutrition and Management of Stressed Beef*. Large Anim. Proc. 5:87.
- Lawrie, R.A. 1979. *Meat Science. 2 "d* . Edit. Pergamon Press. Oxford
- Mc Sweeney. CS Palmer. B. McNeill, D.M. Kruause, D.O. 2001. *Microbial Interactions With tannins : Nutritional Consequences for Ruminants*. Anim. Feed.Sci. Technol. 91, 83:93. Downloaded from: by on January, 2009.
- Mitchell, G. Hattingh, J and Ganhao, M. 2000. *Stress in Cattle Assessed After Handing, After Transport and After Slaughter*. Ver. Rec. 123:201

- Moeing, M.G.A. 1994. *Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis Makassar.*, Makassar Press. Ujung Pandang.
- Nindita R, .2009. *Cara Mengenal Daging Sehat.*  
<http://salahketik.com/situs/kesehatan/Mengenal%20daging%20sehat.htm>
- Oskov, E.R. 1982. *Protein Nutritional in Ruminants.* Academic Press. London.
- Priyanto, R., E. R. Johnson, & D. G. Taylor. 1993. *Prediction of carcass composition in heavy weight grass fed and grain fed beef cattle.* Animal Production. 57: 65-72
- Risch, A. 2001. *Mengatasi Stress Akibat Kepanasan.* Poultry. Indonesia.
- Santoso. U, 2006. *Manajemen Ternak Potong.* Penebar Swadaya. Jakarta
- Sarwono, B. 2002. *Penggemukan Sapi Potong Secara Cepat . PT.* Penebar Swadaya. Jakarta.
- Smith, G.L. et all. 1978. *Post Mortem Aging of Carcasses.* Jurnal Food Science. 430;823.
- Soeparno.1995.*Ilmu dan Teknologi Daging.* Cetakan Ke-3. Gadjahmada university Press. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991. *Pertambahan Berat Badan karkas dan Komposisi Kimia Daging Sapi dan Kaitannya dengan bangsa dan Macam Pakan Peggemukan.* Jurnal Ilmiah Penelitian Ternak. Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sri Rachma, A.B. 2001. *Studies on Selecting Superior Breeding Stock of the Japanese Beef Cattle. Disertation.* The United Graduate School of Agricultural Sciences. Kagoshima, Japan.
- Sudarmono.A.S dan Sugeng.Y.B, 2008. *Sapi Potong dalam Pemeliharaan, Perbaikan Produksi, Prospek Bisnis, dan Analisis Peggemukan.* Penebar Swadaya. Jakarta.
- Sugeng, Y. Bambang . 2001. *Sapi Potong. PT.* Penebar swadaya. Jakarta.

- Sudjana, dkk, 1995. *Studi Transportasi Ternak Potong dari Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur ke Jakarta*. J. Penelitian Peternakan Indonesia Vol. 2 No. 2 Feb 1995.
- Syarifuddin. 2004. *Stress Akibat Transportasi dan Upaya Penanggulangannya*. Donald Mc. *Veterinary endocrinology and Reproduction*. (Philadelphia: Lea & febiger. 1980. Tesis Magister, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Swatland, H.J. 1984. *Structure and Development of Meat Animals*. Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
- Tabrani, H. 2001. *Pengaruh Noses Pelayuan Terhadap Keempukan Daging* . Downloaded E-mail :herman\_ tabrany@yahooxoz . Di akses pada tanggal 16/4/2009. 9:29 Pm.
- Tabrani, H. 2001. *Epistemologi Proses Pelayuan dan Keempukan Otot*. [http://rudycr.com/PPS702 ipb/03112/herman\\_t.htm](http://rudycr.com/PPS702 ipb/03112/herman_t.htm) . diakses pada tanggal 2 Agustus 2010.
- Triakoso. 2008. *Stress dan Kualitas Daging*. Downloaded from <http://triakoso.Blog.Unair.ac.id>. Di akses pd 5/4/2009.
- Turner, G.D and Joseph, T. 1998. *Endokrinologi Umum*. University Press. Yogyakarta.
- Walter Mc. Quade and Ann Aikman. 1991. *Stress*. Erlangga. Jakarta.
- Yudhi. 2008. *Urea Molasses Multinutrient Block (UMMB)*. Di Akses pada 25/4/2009. 04:33.

## Lampiran: 1 Pengolahan data

### 1. Penyusutan

#### Uji t- Student

Ulangan	Hijauan + transportasi	Hijauan + UMMB + Transportasi	Hijauan + UMMB <sup>+</sup> + transportasi
1	6,6	3,6	5,1
2	8,3	6,04	7,6
3	7,5	1,1	2,7
Total ( $\Sigma X$ )	22,4	10,74	15,4
Rata-rata ( $\bar{X}$ )	7,47	3,58	5,13
$\Sigma X^2$	168,7	50,65	91,06
$(\Sigma X)^2$	501,76	115,35	237,77

$$S_1^2 = \frac{n \cdot \Sigma x_1^2 - (\Sigma x_1)^2}{n(n-1)}$$

$$= \frac{(3)(168,7) - 501,76}{3(3-1)}$$

$$= \frac{506,1 - 501,76}{6}$$

$$= 0,723$$

$$S_2^2 = \frac{n \cdot \Sigma x_2^2 - (\Sigma x_2)^2}{n(n-1)}$$

$$= \frac{(3) \cdot 50,65 - 115,35}{3(3-1)}$$

$$S_3^2 = \frac{n \cdot \Sigma x_3^2 - (\Sigma x_3)^2}{n(n-1)}$$

$$= \frac{(3)(91,06) - (237,77)}{3(3-1)}$$

$$= \frac{(273,18 - 237,77)}{6}$$

$$= 5,9$$

$$= \frac{50,65 - 115,35}{6} = 6,1$$

- $$S_{X_1}^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2} \quad S_{X_2}^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (n_2-1)S_3^2}{n_1+n_2-2}$$

$$= \frac{(3-1) \cdot (0,723) + (3-1) \cdot 6,1}{3+3-2} = \frac{(3-1) \cdot (0,723) + (3-1) \cdot 5,9}{3+2-2}$$

$$= \frac{1,446 + 12,2}{4} = \frac{1,446 + 11,8}{4}$$

$$= \frac{13,646}{4} = \frac{13,246}{4}$$

$$S_{X_1} = \sqrt{3,4115} \quad S_{X_2} = \sqrt{3,31}$$

$$= 1,847 \quad = 1,819$$
- $$S_{X_3}^2 = \frac{(n-1)S_2^2 + (n_2-1)S_3^2}{n_1+n_2-2}$$

$$= \frac{(3-1) \cdot 6,1 + (3-1) \cdot 5,9}{3+3-2}$$

$$= \frac{12,2 + 11,8}{4}$$

$$= \frac{24}{4}$$

$$S_{X_3}^2 = \sqrt{6}$$

$$= 2,449$$
- $$t_1 = \frac{x_1 - x_2}{S_{X_1} / \sqrt{n}} \quad t_2 = \frac{x_3 - x_2}{S_{X_2} / \sqrt{n}} \quad t_3 = \frac{x_2 - x_3}{S_{X_3} / \sqrt{n}}$$

$$= \frac{7,47 - 3,58}{1,847 / \sqrt{9}} = \frac{5,13 - 3,58}{2,449 / \sqrt{9}} = \frac{7,47 - 5,13}{1,819 / \sqrt{9}}$$

$$= \frac{3,89}{0,616} = \frac{1,55}{0,815} = \frac{2,34}{0,606}$$

$$= 6,3149 \quad = 1,8995 \quad = 3,8614$$

$$dk = (3+3-2) = 4$$

$$t\text{-Student} = 2,78 \quad (2,78 \sim -2,78)$$

## 2. pH Otot *Gluteus medius*

Ulangan (n)	Perlakuan				Total
	A	B	C	D	
1	7,54	7,05	7,44	7,99	
2	6,62	7,70	7,33	7,51	
3	8,31	7,59	7,22	7,95	
Total	22,47	22,34	21,99	23,45	90,25
Rata-rata	7,49	7,44	7,33	7,81	

Ket : A = Hijauan (Kontrol tanpa transportasi)  
 B = Hijauan (Kontrol + Transportasi)  
 C = Hijauan + UMMB + Transportasi  
 D = Hijauan + UMMB<sup>+</sup> + Transportasi

### Rancangan Percobaan

$$\diamond \text{ Dbt} = 12 - 1 = 11$$

$$\diamond \text{ Dbp} = 4 - 1 = 3$$

$$\diamond \text{ Dbg} = 11 - 3 = 8$$

$$\diamond \text{ FK} = \frac{Y^2}{\sum ijri} = \frac{90,25^2}{12} = \frac{8145,0625}{12} = 678,7552$$

$$\diamond \text{ JKT} = \sum ijYij^2 - \text{FK}$$

$$= (7,54^2 + 6,62^2 + 8,31^2 + 7,05^2 + 7,70^2 + 7,59^2 + 7,44^2 + 7,33^2 + 7,22^2 + 7,99^2 + 7,51^2 + 7,92^2) - 678,7552$$

$$= 680,9863 - 678,7552$$

$$= 2,2311$$

$$\diamond \text{ JKP} = \frac{y1^2 + y2^2 + \dots + yt^2}{r} - \text{FK} = \frac{22,47^2 + 22,34^2 + 21,99^2 + 23,45^2}{3} - 678,7552$$

$$= \frac{2037,4391}{3} - 678,7552 = 0,3911$$

$$\diamond \text{ JKG} = \text{JKT} - \text{JKP} = 2,2311 - 0,3911 = 1,84$$

$$\diamond \text{KTP} = \frac{JKP}{(t-1)} = \frac{0,3911}{3} = 0,1303$$

$$\diamond \text{KTG} = \frac{JKG}{t(r-1)} = \frac{2,2311}{8} = 0,2788$$

$$\diamond \text{F.Hit} = \frac{\text{KTP}}{\text{KTG}} = \frac{0,1303}{0,2788} = 0,4673$$

### Analisis Sidik Ragam

Sumber keragaman	DB	JK	KT	F. Hitung	F. Tabel	
					5 %	1 %
Perlakuan	3	0,3911	0,1303	0,4673 <sup>ns</sup>	4,07	7,59
Acak/Galat	8	1,84	0,2788			
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>1,8793</b>				

Cat : ns = non signifikan



### 3. Keempukan Daging

Ulangan (n)	Perlakuan				Total
	A	B	C	D	
1	4,9	6,73	7,5	7,6	
2	9,53	6,6	5,3	4,56	
3	5,00	7,2	8,6	8,4	
Total	19,43	20,53	21,4	20,56	81,92
Rata-rata	6,47	6,84	7,13	6,85	

Ket : A = Hijauan (Kontrol tanpa transportasi)  
 B = Hijauan (Kontrol + Transportasi)  
 C = Hijauan + UMMB + Transportasi  
 D = Hijauan + UMMB<sup>+</sup> + Transportasi

$$\diamond \text{ Dbt} = 12 - 1 = 11$$

$$\diamond \text{ Dbp} = 4 - 1 = 3$$

$$\diamond \text{ Dbg} = 11 - 3 = 8$$

$$\diamond \text{ FK} = \frac{Y^2}{\sum_{ij} ri} = \frac{81,92^2}{12} = \frac{6710,8864}{12} = 559,2405$$

$$\diamond \text{ JKT} =$$

$$\sum_{ij} Y_{ij}^2 - \text{FK} = (4,9^2 + 9,53^2 + 5,00^2 + 6,73^2 + 6,6^2 + 7,2^2 + 7,5^2 + 5,3^2 + 8,6^2 + 7,6^2 + 4,56^2 + 8,4^2) - 559,2405$$

$$= 587,9374 - 559,2405$$

$$= 28,6969$$

$$\diamond \text{ JKP} = \frac{y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_t^2}{r} - \text{FK} = \frac{19,43^2 + 20,53^2 + 21,4^2 + 20,56^2}{3} - 559,2405$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1679,6794}{3} - 559,2405 \\
 &= 559,8931 - 559,2405 \\
 &= 0,6526 \\
 \diamond & \text{JKG} = \text{JKT} - \text{JKP} \\
 &= 28,6969 - 0,6526 = 28,0443 \\
 \diamond & \text{KTP} = \frac{\text{JKP}}{(t-1)} = \frac{0,6526}{3} = 0,2175 \\
 \diamond & \text{KTG} = \frac{\text{JKG}}{t(r-1)} = \frac{28,6969}{8} = 3,5871 \\
 \diamond & \text{F. Hit} = \frac{\text{KTP}}{\text{KTG}} = \frac{0,2175}{3,5871} = 6,0633
 \end{aligned}$$

#### Analisis sidik Ragam

Sumber keragaman	DB	JK	KT	F. Hitung	F. Tabel	
					5 %	1 %
Perlakuan	3	0,6526	0,2175	6,0633 <sup>ns</sup>	4,07	7,59
Acak/Galat	8	28,0443	3,5871			

Cat : ns = non signifikan

**Lampiran 2: Hasil analisis proksimat UMMB, UMMB<sup>+</sup> dan Hijauan**

Hasil Analisis Proksimat Nilai Nutrisi Pakan yang Diberikan Pada Ternak  
Penelitian

No	Pakan	KOMPOSISI								
		Air	Prot. Kasar	Lemak Kasar	SK	BETN	Abu	Ca	P	Eng
1	UMMB	14,14	19,63	2,85	12,09	38,64	26,79	6,29	0,75	3576
2	UMMB <sup>+</sup>	14,31	16,89	2,52	11,23	42,76	26,60	7,12	0,70	3215
3	R. Gaja	92,31	12,40	6,77	18,71	45,62	16,51	1,00	0,65	2846
4	R.Cetaria	92,57	12,64	5,25	23,99	38,03	20,10	2,44	0,88	1380
5	R. Australia	87,08	12,96	3,68	27,01	43,47	12,88	0,58	0,42	2804
6	R.Lapangan	75,88	11,21	2,87	27,32	39,30	19,30	0,60	0,34	2699

Laboratorium Kimia Makanan Ternak Fak. Peternakan Universitas  
Hasanuddin 2009

Ket :

1. Kecuali Air, Semua Fraksi Dinyatakan Dalam Bahan Kering
2. BETN = Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen

**Lampiran 3: Fisualisai pembuatan pakan suplemen**





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
M A K A S S A R



**Lampiran 4: Pembiasaan sebelum ditransportasikan, pemberian pakan suplemen dan pakan hijauan**





MAKASSAR



**Lampiran 5: Penimbangan ternak sapi yang ditransportasikan**





**Lampiran 6: Sebelum, selama dan setelah transportasi**







**Lampiran 7: Pemotongan, pengkarkasan dan pengambilan sampel**





**Lampiran 8: Penanganan dan analisis sampel di laboratorium**



## RIWAYAT HIDUP



**ISRAFIL**, lahir di Bulukumba tanggal 6 Oktober 1988, anak bungsu dari empat bersaudara, buah cinta pasangan Sakaruddin dan Aisyah. Pada tahun 1992 memasuki jenjang pendidikan formal di TK Jaatiluhur dan pada tahun 1994 melanjutkan pendidikan SDN 152 Jatia. Pada tahun 2000 penulis melanjutkan pendidikan di SMP 2 BONTOTIRO dan tamat tahun 2003. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMU Negeri 1 BONTOLAHARI dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun 2006 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Program Strata satu (S1). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris HMJ Ilmu Peternakan periode 2007 dan periode 2009. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan ISMAPETI (Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia). Penulis juga bergabung dalam organisasi pencinta alam CAICA (Cagar Alam Indonesia Cinta Alam).

Penulis mampu mempertahankan skripsi dengan judul "Pengaruh Pemberian Pakan Padat Gizi Terhadap Penyusutan Berat Badan dan Kualitas Otot *Gluteus medius* Sapi Bali Yang Ditransportasikan" di hadapan penguji pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010.