

**Pengaruh Penambahan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak
(*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dalam Ransum Terhadap Persentase
Karkas dan Lemak Abdominal Ayam Broiler**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana (S1) Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan
pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh:

MUTTAHIDA

60700117052

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muttahida
NIM : 60700117052
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 29 Juni 1999
Jurusan : Ilmu Peternakan
Fakultas : Sains dan Teknologi
Judul : Pengaruh Penambahan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dalam Ransum Terhadap Persentase Karkas dan Lemak Abdominal Ayam Broiler

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya Skripsi yang saya tulis adalah asli. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya Skripsi ini, terutama dalam Bab Hasil dan Pembahasan, tidak asli atau *plagiasi* maka bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Samata, Agustus 2021

Penulis



MUTTAHIDA
60700117052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R






PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Penambahan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dalam Ransum Terhadap Persentase Karkas dan Lemak Abdominal Ayam Broiler" yang disusun oleh **MUTTAHIDA**, NIM: 60700117052, Mahasiswa pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 29 November 2021 M
24 Rabiul akhir 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Fatmawati Nur, S. Si., M. Si
Sekretaris : Dr. Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si.
Munaqisy I : Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.
Munaqisy II : Dr. Muhammad Sabir Maidin, M.Ag.
Pembimbing I : Khaerani Kiramang, S. Pt., M.P.
Pembimbing II : drh. Aminah Hajah Thaha., M. Si.

()
()
()
()
()
()

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN
Alauddin Makassar



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas segala limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Pengaruh Penambahan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dalam Ransum Terhadap Persentase Karkas dan Lemak Abdominal Ayam Broiler**” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Limpahan rasa hormat, kasih sayang, cinta dan terima kasih tiada tara kepada Ayahanda tercinta **Iskandar** Ibunda **Herlina** yang telah melahirkan, mendoakan, mendidik dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis sampai saat ini dan senantiasa memanjatkan do'a dalam kehidupannya untuk keberhasilan penulis. Saudara saya **Muqaffi** yang selama ini sudah banyak membantu, selalu memberi dorongan dan semangat. Serta keluarga besar yang selama

ini banyak memberikan do'a, kasih sayang, semangat dan saran. Semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan dan ketaatan kepada-Nya.

Terima kasih tak terhingga kepada Ibunda **Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.** selaku Pembimbing I dan Ibunda **drh. Aminah Hajah Thaha M.Si.** selaku Pembimbing II atas didikan, bimbingan serta waktu yang telah diluangkan untuk memberikan petunjuk dan menyumbangkan pikirannya dalam membimbing penulis mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.** selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ibu **Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.** selaku wakil dekan 1 bidang akademik Fakultas Sains dan Teknologi, ibu **Dr. Fatmawati Nur Khalik, S.Si., M.Si.** selaku wakil dekan 2 bidang administrasi Fakultas Sains dan Teknologi, dan Bapak **Muhammad Anshar, S.Pt. M. Si.** selaku wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Bapak **Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.** sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar dan dan ibu **Dr. Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si.** selaku sekretaris jurusan Ilmu Peternakan.

4. Bapak **Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.** dan Bapak **Dr. Muhammad Sabir Maidin, M.Ag.** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
6. Kak **Andi Afriana, S.E** selaku Staf Jurusan Ilmu Peternakan yang telah membantu segala persuratan dari proposal hingga skripsi.
7. Buat Saudari dan Saudara **Ilmu Peternakan Angkatan 2017 “K17ANG”** terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan canda tawa yang selama ini terjalin.
8. Teman penelitian saya yang tergolong dalam team “Broiler Squad” **M. Irvan Alfawzi, Siti Nurjannah, Linda Ramadhani** dan **Khusnul Khotimah** telah membantu kelancaran kegiatan penelitian di kandang kita berjuang bersama, sama-sama lelah dan sama-sama memberi semangat.
9. Sahabat saya **Nurfaizah, Linda Ramadhani, Muttahida, Siti Nurjannah, Kurnia Ramadhani, Asmira Awaliyah Simollah, St. Khadijah, Andi. Anisa nisda, Miftahuljannah Sukma dan Tenri Sa’na** yang selama ini telah hadir dalam suka dan duka mulai dari awal perkuliahan sampai proses selesainya skripsi ini.
10. Teman rumah saya selama di perantauan, sekaligus sepupu saya **Nur Azizah** dan **Rezki Amalaia** terima kasih juga atas kebersamaan dan semangatnya selama ini.


11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Samata, Augustus 2021



Muttahida



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Hipotesis.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Integrasi	6
B. Ayam Broiler	14
C. Pakan Ayam Broiler	17
D. Susu Bubuk Afkir.....	21
E. Temulawak.....	22
F. Persentase Karkas.....	27
G. Persentase Lemak Abdominal	29
H. Kajian Terdahulu.....	32
I. Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	37
B. Alat dan Bahan	37
C. Jenis Penelitian	37
D. Prosedur Penelitian.....	38
E. Variabel yang Diamati	42
F. Analisis Data.....	43
G. Definisi Operasional.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	46
B. Pembahasan	47


BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
1.	Ayam Broiler.....	15
2.	Temulawak (<i>Curcuma xanthorrhiza</i> Roxb).....	23
3.	Kerangka Berfikir.....	36



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1.	Kandungan Nutrisi Ransum Ayam Broiler	19
2.	Kandungan Kimia Rimpang Temulawak.....	25
3.	Kombinasi Pemberian Ransum Faktor A dan B	38
4.	Kandungan Nutrisi Pakan Komersial.....	40
5.	Kandungan Nutrisi Susu Bubuk Afkir	41
6.	Analisis Kimia Temulawak (<i>Curcuma xanthorrhiza</i> Roxb)	41
7.	Rataan Persentase Karkas Ayam Broiler	46
8.	Rataan Persentase Lemak Abdominal Ayam Broiler.....	46
9.	Hasil Analisis Sidik Ragam Penambahan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak (<i>Curcuma xanthorrhiza</i> Roxb) Terhadap Persentase Karkas Ayam Broiler	47
10.	Hasil Analisis Sidik Ragam Penambahan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak (<i>Curcuma xanthorrhiza</i> Roxb) Terhadap Persentase Lemak Abdominal Ayam Broiler.....	52



ABSTRAK

Nama : Muttahida
Nim : 60700117052
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : **Pengaruh Penambahan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak (*Curcuma zanthorrhiza* Roxb) dalam Ransum Terhadap Persentase Karkas dan Lemak Abdominal Ayam Broiler**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma zanthorrhiza* Roxb) dalam ransum terhadap persentase karkas dan lemak abdominal ayam broiler. Penelitian ini menggunakan DOC ayam broiler yang berjumlah 48 ekor. Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 3x4 yaitu 3 perlakuan pada faktor A dan 4 perlakuan pada faktor B dengan 2 ulangan setiap ulangan terdiri dari 2 ekor ayam. Faktor A terdiri dari T0 pakan Komersial (Kontrol), T1 dengan penambahan temulawak (*Curcuma zanthorrhiza* Roxb) 1 %, dan T2 dengan penambahan temulawak (*Curcuma zanthorrhiza* Roxb) 2 % pada faktor B terdiri dari S0 pakan Komersil (Kontrol), S1 dengan penambahan susu bubuk Afkir 2,5 %, S2 dengan penambahan susu bubuk Afkir 5 % dan S3 dengan penambahan susu bubuk Afkir 7,5 %. Analisis data menggunakan *Analysis of Variance* (ANOVA) dan uji BNT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma zanthorrhiza* Roxb) dalam ransum tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$) terhadap persentase karkas dan lemak abdominal ayam broiler. Tetapi pada penambahan temulawak (*Curcuma zanthorrhiza* Roxb) dalam ransum berpengaruh nyata ($P<0,05$) terhadap persentase lemak abdominal ayam broiler. Penambahan temulawak dalam ransum yang paling baik terhadap penurunan persentase lemak abdominal yaitu pada perlakuan T2 (2% Temulawak) dengan nilai persentase karkas sebesar 1,47%.

Kata kunci : Ayam Broiler, Temulawak, Susu bubuk afkir.

ABSTRACT

Name : Muttahida
Number : 60700117052
Department : Animal Science
Title : **The Effect of Addition of Milk Powder and Temulawak (*Curcuma zanthorrhiza* Roxb) in the Ration on the Percentage of Carcass and Abdominal Fat of Broiler Chickens.**

The Effect of Addition of Milk Powder and Temulawak (*Curcuma zanthorrhiza* Roxb) in the Ration on the Percentage of Carcass and Abdominal Fat of Broiler Chickens The aim of this study was to determine the effect of adding rejected milk powder and temulawak (*Curcuma zanthorrhiza* Roxb) in the ration on the percentage of carcass and abdominal fat of broiler chickens. This study used a total of 48 DOC broiler chickens. The research method used a completely randomized design (CRD) with a 3x4 factorial pattern, namely 3 treatments on factor A and 4 treatments on factor B with 2 replications, each replication consisting of 2 chickens. Factor A consisted of T0 Commercial feed (Control), T1 with the addition of temulawak (*Curcuma zanthorrhiza* Roxb) 1%, and T2 with the addition of temulawak (*Curcuma zanthorrhiza* Roxb) 2%. Factor B consisted of S0 Commercial feed (Control), S1 with the addition of 2.5% reject milk powder, S2 with the addition of 5% reject milk powder and S3 with the addition of 7.5% reject milk powder. Data analysis used Analysis of Variance (ANOVA) and BNT test. The results showed that the addition of rejected milk powder and temulawak (*Curcuma zanthorrhiza* Roxb) in the ration had no significant effect ($P>0.05$) on the percentage of carcass and abdominal fat of broiler chickens. However, the addition of temulawak (*Curcuma zanthorrhiza* Roxb) in the ration had a significant effect ($P<0.05$) on the percentage of of abdominal fat broiler chickens. The best addition of ginger in the ration for reducing the percentage of abdominal fat was in treatment T2 (2% Temulawak) with a carcass percentage value of 1.47%.

Keywords : *Broiler Chicken, Temulawak, Milk powder rejected.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman di Indonesia, peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat serta laju perkembangan media teknologi menuntut penyediaan dan peningkatan produktivitas ternak dalam pemenuhan protein yang dikonsumsi berasal dari daging. Sumber pangan berdasarkan data BPS (2020), tingkat konsumsi daging ayam ras pada dari tahun ketahun yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2020 berturut-turut sebanyak 5,56, 6,16 dan 6,61 kg/kapita/tahun pada tahun. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa permintaan daging ayam ras atau broiler mengalami peningkatan.

Daging ayam broiler banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki sumber nutrisi tinggi seperti mengandung nilai protein yang tinggi, memiliki tekstur daging empuk, harga yang relatif murah serta sistem pemeliharaannya dapat meminimalisir dalam penghematan waktu sehingga tidak lama dipanen, sehingga usaha ini baik untuk dilakukan. Permasalahan dihadapi oleh peternak ayam broiler saat sekarang mengenai harga pakan hari kehari semakin mahal ini disebabkan karena bahan digunakan untuk pakan unggas kebanyakan diperoleh dari bahan pakan impor. Untuk itu perlu dicari bahan alternatif pengganti dari bahan-bahan impor tersebut agar biaya ransum untuk pakan broiler dapat ditekan. Pakan alternatif yang dapat digunakan untuk pakan unggas salah satunya adalah susu bubuk afkir yang merupakan hasil limbah industri.

Pemanfaat limbah susu bubuk afkir merupakan salah satu alternatif untuk menekan biaya pakan pada ternak. Susu bubuk afkir memenuhi syarat sebagai pakan tambahan untuk ayam karena mudah didapatkan, harga relatif terjangkau, dan memiliki komposisi gizi yang memadai maka dari itu sangat penting ditambahkan kedalam ransum untuk memperbaiki performa ayam broiler, meningkatkan kualitas karkas dan menurunkan kadar lemak abdominal ayam broiler.

Tidaklah Allah menciptakan langit, bumi serta segala isinya dengan sia-sia. Salah satunya ciptaannya yaitu susu bubuk afkir yang merupakan susu yang sudah tidak dipakai atau tidak dikonsumsi lagi oleh manusia. Susu bubuk afkir ini tidak akan sia-sia jika diberikan kepada ternak karena susu bubuk afkir dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif yang memiliki banyak manfaat untuk ternak. Allah swt. berfirman dalam QS. Ali-Imran/ 3 : 191 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya :

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (Kementerian Agama RI, 2018).

Pakan juga umumnya ditambahkan *feed additive* yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ayam broiler dan menghasilkan produksi daging yang tinggi serta kualitas karkas jadi lebih baik. Pada pakan diharapkan dengan penambahan *feed additive* mampu mengurangi penimbunan lemak pada tubuh. Namun penggunaan

feed additive berupa antibiotik menuai kecemasan karena adanya pelarangan penggunaan antibiotik, ini disebabkan karena residu dalam antibiotik dalam daging yang dihasilkan oleh ayam broiler akan menurunkan resistensi bagi konsumen. Maka dari itu diperlukan penggunaan bahan alami atau pemanfaatan tanaman herbal sebagai alternatif pengganti penggunaan *feed additive* sintetis. *Feed additive* alami bisa dipakai menjadi pengganti *feed additive* sintetis yang berasal dari tumbuhan yang mengandung zat bioaktif seperti temulawak.

Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) adalah salah satu tumbuhan alami ke dalam antibiotik yang mengandung zat senyawa bioaktif berupa *Xanthorrhizol* dan *Kurkuminoid* yang berfungsi sebagai antimikroba dan diduga mampu menurunkan kadar lemak ayam broiler. Menurut Dian dkk. (2014), tanaman temulawak dimanfaatkan karena memiliki kandungan senyawa aktif yang mampu meningkatkan metabolisme, mengurangi kadar lemak dan meningkatkan performa ternak.

Beberapa hasil penelitian memperlihatkan hasil yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan terhadap persentase karkas dan penurunan lemak abdominal pada ayam pedaging yang diberi susu bubuk afkir. Sementara penambahan temulawak dalam pakan mampu meningkatkan bobot potong dan menurunkan persentase lemak abdominal. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam terkait penambahan susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dalam ransum terhadap persentase karkas dan lemak abdominal ayam broiler.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penambahan susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dalam ransum dengan level yang berbeda terhadap persentase karkas ayam broiler ?
2. Bagaimana pengaruh penambahan susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dalam ransum dengan level yang berbeda terhadap lemak abdominal ayam broiler ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh penambahan susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dalam ransum dengan level yang berbeda terhadap persentase karkas ayam broiler.
2. Mengetahui pengaruh penambahan susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dalam ransum dengan level yang berbeda terhadap lemak abdominal ayam broiler.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai bahan dasar atau referensi bagi mahasiswa dan pihak lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh penambahan susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dalam ransum terhadap persentase karkas dan lemak abdominal ayam broiler.

2. Sebagai bahan informasi tambahan bagi masyarakat tentang penambahan susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dalam ransum terhadap persentase karkas dan lemak abdominal ayam broiler.

E. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini dengan pemberian susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb.) adalah sebagai berikut:

H_0 = Penambahan Susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) tidak berpengaruh terhadap persentase karkas dan lemak abdominal ayam broiler.

H_1 = Penambahan Susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dalam ransum minimal terdapat satu perlakuan berpengaruh terhadap persentase karkas dan lemak abdominal ayam broiler.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Integrasi

Allah swt. dengan kebesaran dan kekuasaannya menjadikan semesta beserta isinya dengan segala kesempurnaan yang dimiliki-Nya. Allah swt. menciptakan hewan ternak seperti unggas dengan tujuan berguna bagi kemaslahatan umat karena dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup umat manusia dimuka bumi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber industri dan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S An-Nahl/16:5:

وَاللَّائِمَةَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

”Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”. (Kementerian Agama RI, 2018).

Menurut Tafsir Jalalain, menyebutkan bahwa Dia sudah menciptakannya buat kita sebagian menurut insan padanya terdapat kehangatan bulu dan kulitnya bisa dibentuk sandang buat penghangat tubuh kita dan aneka macam manfaat. Ayat ini menyatakan begitu banyak bisa kita ambil untuk kesejahteraan manusia gizi yang tinggi dalam makanan yang kita konsumsi. Kita ketahui bersama bahwa daging merupakan sumber gizi protein daging yang mampu memperbaiki sel-sel tubuh. Allah swt. Sang Pencipta menciptakan keseluruhan yang ada di bumi ini untuk memenuhi

keinginan hidup manusia. Manusia harus tetap berusaha melalui cara-cara memberikan nutrisi dan memberikan pakan dengan nutrisi terbaik kepada ternak, agar berkah dari ternak tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam Tafsir Al-Azhar, pada ayat ini menjelaskan bahwa Binatang-binatang ternak itu Dia jadikan Itu buat kamu. Ada kerbau, ada sapi, kambing, biri-biri dan unta. Semuanya dijadikan atau dijinakkan buat kamu. Padanya ada kehangatan dan banyak manfaat dan dari padanya kamu makan. Kehangatan kamu dapat dari bulunya, yang dapat kamu tenun menjadi pakaian kamu, dan berbagai manfaat yang lain, misalnya kulitnya untuk sepatu dan lain-lain, dan darinya yaitu dari dagingnya kamu makan. Daging menjadi sangat penting sebagai gizi penguat badan.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir ayat tersebut menjelaskan bahwa, Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan beraneka ragam manfaat (kegunaan), dan sebagiannya kamu makan. Dan kalian memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kalian membawanya kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang mematahkan) diri. Sesungguhnya Tuhan kalian benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah swt. menyebutkan nikmat yang Dilimpahkan kepada hamba-hamba-Nya, antara lain Dia menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu unta, sapi, dan kambing. Allah pun telah menjadikan pada binatang-binatang ternak itu berbagai manfaat dan kegunaan

buat mereka, yaitu bulunya mereka jadikan pakaian dan hamparan, air susunya mereka minum, dan anak-anaknya mereka makan, serta pandangan yang indah pada ternak mereka sebagai perhiasan buat mereka.

Ayat dari bacaan diatas menjelaskan bahwa begitu banyak manfaat yang dapat kita ambil dari hewan ternak untuk kesejahteraan manusia seperti daging, susu dan telur yang merupakan sumber gizi yang tinggi dalam makanan yang kita konsumsi. Bulu dari hewan ternak dapat dimanfaatkan menjadi kain yang dapat menghangatkan tubuh, mengambil dagingnya untuk dikonsumsi, susu untuk diminum, kekuatan hewan ternak untuk dijadikan alat transportasi dan lain sebagainya. Allah swt. menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia harus terus berusaha dengan memberi nutrisi dan gizi yang baik pada hewan ternak agar manfaat dari hewan ternak tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Allah swt. juga menciptakan tumbuh-tumbuhan yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup di muka bumi ini. Fungsi dan manfaat tumbuhan yaitu sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl/16:10-11:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْزِلُ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dia-lah, yang Telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada

tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (Kementerian Agama RI, 2018).

Menurut Tafsir Al-Azhar, ayat ini menjelaskan bahwa, Dan Dialah yang menurunkan air dari langit untuk kamu dengan menyebutkan air hujan yang turun, manusia diajak menengadah ke atasnya untuk mengetahui betapa rapat hidupnya dengan alam di sekelilingnya. Padahal dari air itulah bergantung segenap kehidupan. Darinyalah minuman kamu. Sehingga kamu tidak mati kehausan. Dan darinya pohon-pohon. Sejak dari biji atau berih yang tertanam ke bumi, sampai tumbuh dan sampai berurat berakar, berdahan bercabang, beranting berpucuk, semua bergantung pada air yang padanya kamu menggembala. Air hujan yang turun menimbulkan rumput hijau makanan ternak atau mata air akan diminum ternak itu. Ditumbuhkan-Nya untuk kamu dengan dia Yaitu dengan sebab air itu. Tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur-anggur dan dari tiap-tiap macam buah-buahan. Sama sekali sangat bergantung kepada air. Dan aneka ragam buah-buahan itu sangat diperlukan oleh manusia. Sebab itu sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda bagi kaum yang berpikir. Buah-buahan yang berbagai aneka ragam, di barat dan di timur, semuanya tumbuh di atas bumi dan disiram oleh hanya sejenis air, namun dia jadi berbagai ragam dan rasa. Memikirkan kekuasaan Allah, ialah dari sudut ini. Dan melihat bekas ciptaan-Nya, kita meyakini akan kekuasaan-Nya, bahwasanya segala sesuatu tidaklah terjadi dengan kebetulan. Setelah disebutkan hubungan air hujan dengan segala yang hidup di bumi, manusia, kayu dan pohon, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, kita disuruh berpikir lebih mendalam lagi.

Menurut Tafsir Jalalain ayat tersebut menjelaskan bahwa, (Dialah Yang telah menurunkan air hujan itu dari langit untuk kalian, sebagiannya menjadi minuman) untuk kalian minum (dan sebagiannya menjadi tumbuh-tumbuhan) maksudnya oleh sebab air itu menjadi suburlah tumbuh-tumbuhan (yang pada tempat tumbuhnya kalian menggembalakan ternak kalian) kalian jadikan sebagai tempat menggembalakan ternak. (Dia menumbuhkan bagi kalian dengan air itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar ada tanda) yang menunjukkan akan keesaan Allah swt. (bagi kaum yang memikirkan) mengenai ciptaan-Nya sehingga mereka mau beriman karenanya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa nikmatnya karunia tuhan atas berkat dan rahmatnyalah menjadikannya bumi yang tandus menjadi lahan sangat subur. Olehnya itu diciptakan-Nyalah berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan memiliki berbagai macam manfaat baik itu bagi manusia maupun bagi hewan-hewan ternak. Sungguh besar karunia tuhan atas segala yang diciptakan semoga kita termasuk didalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah swt.

Selain pada manusia hewan ternak juga berhak untuk mendapat perlakuan baik seperti manusia sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Sesungguhnya binatang ternak diciptakan oleh Allah swt. Sebagai pembuktian kekuasaan bagi-Nya dan Menjadi pembelajaran bagi Umat yang berakal (Manusia yang berpengetahuan). Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis :

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ
 بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى فَنِيَانًا أَوْ غِلْمَانًا قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Ath Thayalisi, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Hisyam bin Zaid, ia berkata; aku bersama Anas menemui Al Hakam bin Ayyub, kemudian ia melihat beberapa pemuda atau anak-anak yang memasang ayam dan mereka melemparinya. Kemudian Anas berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari menjadikan hewan sebagai sasaran (HR. Abu Dawud).

Di dalam hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasulullah saw. Melarang kita untuk melakukan kekerasan terhadap hewan. Kita diperintahkan untuk selalu berperilaku santun dan menyayangi hewan atau binatang. Karena hewan juga merupakan makhluk hidup yang diciptakan Allah swt. yang tentunya mempunyai manfaat. Maka dari itu kita kita umat yang berakal (Beriman) hendaknya berperilaku adil bagi ternak. Sangat dianjurkan sebagai umat muslim untuk selalu memberikan makanan dan minuman kepada binatang. Apalagi jika binatang itu dalam situasi atau kondisi yang sedang kelaparan atau kehausan, berdosa jika binatang tersebut harus sengsara.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang baik, mengandung nilai gizi dan halal. Salah satunya yaitu daging ayam broiler yang dikonsumsi harus halal, baik dari segi pakan maupun cara pemotongan dan pengolahannya. Anjuran untuk memakan makanan yang halal dan baik sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/ 2:168 yang berbunyi :

يٰۤ-اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Kementerian Agama RI, 2018).

Menurut Tafsir Jalalain Ayat berikut ini turun tentang orang-orang yang mengharamkan sebagian jenis unta/sawaib yang dihalkan, (Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa-apa yang terdapat di muka bumi) halal menjadi 'hal' (lagi baik) sifat yang memperkuat, yang berarti enak atau lezat, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah) atau jalan-jalan (setan) dan ramuannya (sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu) artinya jelas dan terang permusuhannya itu. Dalam Tafsir Al azhar ayat tersebut menjelaskan bahwa, Wahai, manusia Makanlah dari apa yang ada di bumi ini barang yang halal lagi baik dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian." Penting sekali peringatan ini dan ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Kecurangan-kecurangan, penipuan dan mengelabui mata yang bodoh, banyak ataupun sedikit, adalah hubungannya dengan perut asal berisi. Berapa perbuatan yang curang terjadi di atas dunia ini oleh karena mempertahankan syahwat perut. Maka, apabila manusia telah mengatur makan minumannya, mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari apa yang di zaman modern ini dinamai korupsi, jiwa akan terpelihara dari kekasarannya. Dalam ayat ini tersebut yang halal lagi baik. Makanan yang halal ialah lawan dari yang haram; yang haram telah pula disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu yang tidak disembelih, daging babi, darah, dan yang disembelih untuk berhala. Kalau tidak

ada pantang yang demikian, halal dia dimakan. Akan tetapi, hendaklah pula yang baik meskipun halal.

Anjuran untuk memakan makanan dengan cara yang baik juga dikatakan oleh Rasulullah saw. Yang bersabda

اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً

Artinya:

Bertakwalah kalian kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang tak bisa berbicara ini. Tunggailah ia dengan baik-baik, makanlah pula dengan cara yang baik”. (HR. Abu Daud no. 2548. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Imam Nawawi mengatakan dalam Riyadhus Shalihin bahwa hadits ini shahih.

Alam semesta dengan segala isinya diciptakan Allah swt. semuanya tercipta dengan teratur dan seimbang. Segala sesuatu yang diciptakan pasti mengandung banyak manfaat untuk kepentingan makhluk hidup. Penjelasan pada dalil sebelumnya menjelaskan keterkaitan terhadap penelitian yang saya lakukan bahwa orang yang mau berfikir maka tidak ada yang mustahil untuk dikembangkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas maupun pengembangbiakannya, termasuk dalam hal peningkatan kualitas ayam broiler yang dapat memanfaatkan susu bubuk afkir dan temulawak yang ditambahkan kedalam ransum untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap performa dan kualitas produksi ayam broiler.

B. Ayam Broiler

Ayam ras pedaging masuk ke Indonesia sekitar tahun 1960-an, tetapi baru mulai dibudidayakan pada tahun 1980-an. Seiring dengan berjalannya waktu, ayam broiler semakin dikenal dikalangan masyarakat Indonesia. Ayam ras pedaging memiliki keunggulan antara lain 5-6 minggu telah sanggup dipanen. Ayam pedaging adalah jenis ayam dibudidayakan untuk dimanfaatkan dagingnya. Ayam broiler adalah kata yang biasa digunakan untuk menyebut ayam dari output budidaya teknologi peternakan mempunyai ciri ekonomi dengan karakteristik berupa pertumbuhan cepat, mampu menghasilkan daging dan konversi pakan rendah, dan siap dipotong dalam umur lebih mudah (Dimas, 2017).

Ayam broiler adalah jenis ayam liar yang didapatkan dari hasil perkawinan *Cornish* dan *Plymouth Rock*, dijadikan sebagai ayam yang dibudidayakan saat sekarang ini untuk memproduksi daging, dengan adanya teknologi yang begitu canggih sehingga mampu menciptakan ayam broiler yang menghasilkan produksi daging dalam jangka waktu yang cepat dan mengandung sumber protein yang tinggi sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat pada saat sekarang ini (Rahmanto, 2012).



Gambar 1. Ayam Broiler.

Adapun taksonomi zoologi ayam ras pedaging menurut Khalid (2011), sebagai berikut:

Filum : Chordata
 Subfilum : Vertebrata
 Kelas : Aves
 Ordo : Galliformes
 Keluarga : Phasianidae
 Genus : *Gallus*
 Spesies : *Gallus domesticus*

Ayam broiler adalah jenis yang berasal dari hasil persilangan. Ayam broiler merupakan ternak yang hemat dan unggul dibandingkan dengan jenis ternak yang lainnya lantaran ayam broiler adalah jenis unggas mempunyai pertumbuhan yang singkat kurang lebih 4 hingga 5 minggu telah bisa dipanen dan produksi serta

dagingnya dapat dipasarkan atau dikonsumsi. Ayam broiler memiliki keunggulan menurut proses seleksi sifat genetik unggul. Pada pemeliharaan ayam broiler menggunakan syarat pemeliharaan yang terkontrol mencakup konsumsi pakan, temperatur lingkungan dan manajemen pemeliharannya, memilih bibit yang unggul, pakan berkualitas, perkandangan yang terkontrol serta sanitasi dan kesehatan harus terjaga dengan baik (Umam dkk., 2015).

Ayam broiler mempunyai beberapa jenis strain diantaranya, strain *Cobb* sudah dapat dipanen pada umur 21-39 hari dengan 1-2,2 kg. Sedangkan ayam broiler strain *New Lohman MB* dapat dipanen pada umur 30 hari dengan bobot badan akhir mencapai 1,4 kg. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, kinetiknya menjadi cepat ayam broiler dapat dipotong pada umur relatif lebih muda yaitu dapat dipotong pada umur 29 hari. Pertumbuhan ayam pedaging cepat akan diikuti dengan kekuatan tubuh menurun sehingga diperlukannya pakan tambahan ke dalam pakan (Kiramang dan Jufri, 2013).

Ayam broiler memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang dimiliki oleh ayam broiler jika dibandingkan dengan jenis unggas yang lain diantaranya adalah daging broiler mempunyai kandungan protein tinggi, harganya lebih murah sehingga banyak diminati oleh masyarakat, tidak membutuhkan lahan yang luas, sebagai akibatnya lahan yang tersedia bisa dimanfaatkan secara efisien dan mempunyai daur produksi yang pendek yaitu pada jangka waktu 4-6 minggu telah bisa dipanen dengan bobot badan 1,5 kg sampai 2 kg. Akibatnya masyarakat tertarik untuk menggeluti usaha

peternakan ayam broiler karena konsumsi daging ayam broiler dari tahun ketahun mengalami peningkatan, serta ayam broiler memiliki daur produksi yang pendek yaitu pada jangka ketika 4-6 minggu telah bisa dipanen (Yemima, 2014). Namun menurut Santoso dkk., (2011), ayam broiler memiliki kelemahan karena harus dipelihara secara intensif yang memerlukan tenaga kerja dan biaya serta ayam broiler sangat sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan.

C. Pakan Ayam Broiler

Pakan adalah salah satu komponen yang penting dan wajib dipenuhi dalam pengembangan usaha peternakan khususnya pada bidang perunggasan. Pakan merupakan sekumpulan bahan makanan yang layak untuk dimakan oleh ternak yang mengandung nilai nutrisi serta tidak membahayakan ternak apabila dikonsumsi serta telah disusun berdasarkan aturan tertentu. Aturan tersebut mencakup nilai kebutuhan nutrisi dikonsumsi oleh ternak unggas dan nilai kandungan nutrisi yang terkandung dalam bahan makanan itu sendiri. Pemberian pakan untuk ayam pedaging diberikan secara *ad-libitum* (Kirmanan dan Jufri, 2013).

Pakan merupakan salah satu unsur yang berpengaruh penting terhadap performans produksi ayam broiler. Pakan mempunyai peran terbesar dalam biaya produksi ayam broiler sekitar 70%. Untuk itu, tolak ukur pertama dalam menentukan keberhasilan bisnis ayam broiler adalah Feed Conversion Ratio (FCR) atau konversi pakan. Konversi pakan adalah pakan yang dikonsumsi untuk menghasilkan satu kilogram daging (Tamalludin, 2014). Pakan broiler harus mengandung nutrisi yang

merupakan komponen utama dalam penyusunan pakan ternak. Hal yang paling pertama diperhatikan dalam penyusunan komponen ransum ternak adalah kandungan protein dan energi bahan pakan (Wati, 2018). Pakan ternak terdiri berdasarkan kombinasi jenis bahan pakan yang beragam yang mempunyai nilai nutrisi tinggi yang mampu memperbaiki produksi ternak disusun untuk memenuhi kebutuhan ternak. Imbangan nutrisi pada pakan terutama protein akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan tulang, kandungan zat nutrisi sangat penting, diharapkan dapat menunjang kegiatan ayam pedaging tersebut. Protein merupakan unsur utama dalam tubuh dan jaringan lunak ternak unggas. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan, pengelolaan dan bagian seluruh enzim pada tubuh. Protein pakan umumnya bersumber dari protein nabati dan hewani. Adanya kombinasi dari sumber protein yang berasal dari protein hewani dan nabati diharapkan keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan dapat dipenuhi karena adanya saling melengkapi di antara kekurangan tersebut (Tampubolon dan Bintang, 2012).

Pada fase pertumbuhan ayam broiler memiliki perbedaan kebutuhan nutrisi karena menyesuaikan kebutuhan tubuh untuk mendapatkan performa yang optimal. Proses pemberian pakan pada broiler dalam 2 fase, fase awal dan fase akhir. Pada kedua fase ini memiliki kebutuhan pakan yang berbeda (Achmanu dan Muharlieni, 2011).

Kebutuhan nutrisi ayam broiler pada fase awal dan fase akhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Ransum Ayam Broiler

No	Kandungan Gizi	Ransum	
		Starter	Finisher
1	Energi metabolis (Kkal/kg)	3000	3100
2	Protein kasar (%)	18-23	18-22
3	Kalsium (%)	0,80-1.10	0,80-1.10
4	Lisin (%)	1,20	1,05
5	Metionin (%)	0,45	0,40
6	Treonin (%)	0,75	0,65
7	Triptofan (%)	0,19	0,18
8	Lemak kasar (%)	2,5-7	2-7
9	Serat kasar (%)	5	6
10	Abu (%)	8	8
11	Phospor (%)	0,50	0,45

Sumber : Standar Nasional Indonesia (SNI) (2015).

Pengembangan bisnis peternakan ayam broiler pada saat ini mempunyai beberapa kendala yang relatif berpengaruh terhadap performa dan kualitas ayam broiler, salah satunya adalah faktor ketersediaan pakan. Ketersediaan pakan wajib sangat diperhatikan terutama pada hal efisiensi penggunaan pakan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh peternak yaitu membuat pakan unggas dengan harga yang terjangkau dengan menggunakan bahan herbal sebagai imbuhan pakan yang diharapkan sebagai solusi yang bisa dikembangkan sebagai akibatnya tercipta produk output ternak yang kondusif dikonsumsi lantaran jika pakan unggas diberikan

antibiotik menjadi imbuhan pakan yang mampu mengontrol dan mengatur proses pencernaan menggunakan takaran yang kurang sempurna dapat berdampak buruk bagi kesehatan, timbulnya resisten dalam tubuh ternak terhadap mikroorganisme dan adanya sisa dalam produk output ternak yang bersifat toksik dalam bahan yang dapat mengakibatkan penyakit kanker bagi konsumen (Razak, 2016).

Pakan yang ditambahkan *feed additive* dalam pakan diharapkan dapat mampu mengurangi penimbunan lemak pada tubuh. Namun penggunaan *feed additive* berupa antibiotik menuai kecemasan karena adanya pelarangan penggunaan antibiotik, ini disebabkan karena residu dalam antibiotik dalam daging yang dihasilkan oleh ayam broiler akan menurunkan resistensi bagi konsumen. Maka dari itu diperlukan penggunaan bahan alami atau pemanfaatan tanaman herbal sebagai alternatif pengganti penggunaan *feed additive*. Menurut Kiramang dan Jufri, 2013, bahwa munculnya kecemasan penggunaan antibiotik adalah suatu perkara yang perlu buat dicari solusinya. Salah satu cara lain yang bisa dilakukan buat mengurangi pemakaian antibiotik merupakan penggunaan bahan alami yang memiliki potensi memperbaiki sistem pencernaan lantaran bau dan rasa yang dihasilkannya. Menurut Iman (2017), bahwa penggunaan antibiotik dapat dikurangi dengan menggunakan alternatif penggunaan bahan alami sebagai bahan pengganti. Salah satu alternatif penggunaan *feed additive* komersial yaitu dengan memanfaatkan tumbuhan herbal yang memiliki zat bioaktif seperti minyak atsiri, *Fenol*, *Tanin*, *Kurkumin*, *Flavonoid*, *Saponin*, dan

Alkaloid yang biasanya terdapat pada tanaman-tanaman herbal seperti jahe, temulawak, kunyit, kencur, dan lempuyang.

D. Susu Bubuk Afkir

Susu bubuk afkir atau susu kadaluarsa merupakan susu yang telah melewati masa kadaluarsa. Susu bubuk yang sudah kadaluarsa namun belum terlalu lama melewati masa kadaluarsa atau kandungan nutrisinya belum terlalu menurun masih mampu untuk dikonsumsi oleh ternak (Irianto, 2011).

Pemanfaatan limbah susu bubuk adalah salah satu cara lain yang baik untuk dimanfaatkan yang berfungsi untuk menekan dana pakan dalam proses pemeliharaan ternak. Limbah susu bubuk afkir memenuhi kondisi menjadi pakan tambahan dalam pakan ternak, lantaran bahannya gampang didapatkan, harga lebih terjangkau. Susu bubuk afkir hampir sama dengan dedak yang merupakan hasil limbah dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia, dimana susu bubuk kadaluarsa juga dapat digolongkan menjadi bahan pakan alternatif dalam ransum ternak karena tidak menimbulkan residu buat ternak serta mengandung nilai nutrisi yang tinggi (Nanda dkk., 2012).

Susu bubuk afkir dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak karena memiliki kandungan nutrisi yang baik. Susu bubuk afkir memiliki komponen zat nutrisi makro dan zat nutrisi mikro, zat nutrisi makro rata-rata meliputi protein 25,8 %, lemak 0,9 % dan laktosa 4,6 % sedangkan zat nutrisi mikro pada susu bubuk afkir sangat komplit meliputi asam amino, vitamin dan mineral. Vitamin yang terdapat didalam lemak susu

yaitu vitamin A, D, E, K, sedangkan vitamin yang larut didalam susu adalah vitamin B kompleks, vitamin A, vitamin C dan vitamin D (Alim dkk., 2012). Penggunaan susu bubuk afkir pada berbagai produk pakan memiliki kelebihan karena mengandung nilai gizi yang tinggi, protein susu mengandung asam amino esensial, mudah dicerna, dapat disimpan lebih lama dari pada Whole milk karena kandungan lemaknya yang tidak terlalu tinggi (Rusmin, 2014).

Dari hasil penelitian Alim dkk., (2012), Pemberian ransum tanpa penambahan susu bubuk afkir menghasilkan bobot badan ayam lebih rendah jika dibandingkan dengan penambahan susu bubuk afkir 5%, 7,5%, dan 10% dari total ransum. Susu bubuk afkir bisa menaikkan konsumsi pakan dan mempunyai taraf palatabilitas tinggi sebagai akibatnya pakan diberikan menggunakan susu bubuk afkir mampu tercerna dengan baik dan berdampak baik dalam meningkatkan bobot ayam pedaging dan meningkatkan kualitas karkas ayam pedaging.

E. Temulawak

Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) merupakan tumbuhan herbal pada family *Zingiberaceae* dan merupakan tumbuhan merumpun. Jenis akar dalam tumbuhan temulawak berbentuk serabut bercabang dan berwarna hijau gelap. Akar keluar pada bagian rimpang induk mempunyai 3-4 helai anakan. Tanaman temulawak memiliki batang semu mempunyai panjang sekitar 1m. Panjang daun tumbuhan temulawak kurang lebih 31-84 cm dengan lebar 10-18 cm, dan tangkai daun terdapat helain kurang lebih 43-80 cm. Tanaman temulawak mempunyai bunga yang berwarna

kuning tua dan pangkal bunganya berwarna ungu kurang lebih 3 cm dan mempunyai kelopak 3-4 buah (Farida, 2020). Pada tumbuhan temulawak yang sering kali dimanfaatkan adalah bagian rimpangnya. Rimpang temulawak berbentuk bundar seperti bundar telur, luarnya kuning tua, sedangkan sisi dalamnya berwarna jingga. Rimpang mini, ronanya belia dan mempunyai bentuk beraneka ragam. Rimpang temulawak mempunyai aroma harum, tajam dan mempunyai rasa getir dan relatif pedas (Prasetyorini dkk., 2011).



Gambar 2. Temulawak

Menurut Anggoro dkk., (2015), klasifikasi tanaman temulawak:

Kingdom : Plantae
 Subkingdom : Tracheobionta
 Super divisi : Spermatophyta
 Divisi : Magnoliophyta
 Kelas : Liliopsida
 Sub kelas : Commelinidae
 Ordo : Zingiberales

Famili : Zingiberaceae
Genus : *Curcuma*
Spesies : *Curcuma xanthorrhiza* Roxb.

Temulawak tumbuh di Asia Tenggara sehingga mudah didapatkan di Indonesia serta tanaman ini mudah tumbuh di berbagai lingkungan, baik cuaca panas maupun cuaca dingin serta berbagai jenis kondisi tanah. Temulawak memiliki komponen utama senyawa zat bioaktif seperti minyak atsiri dan kurkumin, diantaranya senyawa minyak atsiri yang mampu merangsang getah pankreas sehingga memperlancar metabolisme tubuh serta kandungan kurkumin pada temulawak mempunyai khasiat sebagai antibakteri dan mampu membunuh bakteri (Sariati, 2017).

Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) berguna meningkatkan kesehatan. Komponen primer pada rimpang temulawak terbagi atas pati, minyak atsiri dan *Kurkuminoid* (Hatmi dan Febrianty, 2014). Kandungan terbesar dalam rimpang temulawak merupakan kandungan fraksi pati (Kawiji dkk., 2011). Dian dkk., (2014), menyebutkan bahwa di dalam rimpang temulawak terkandung zat bioaktif diantaranya minyak atsiri, kurkumin dan *Xanthorrhizol*. Menurut Farida (2020), yang menyatakan bahwa komposisi kimiawi yang terkandung dalam rimpang temulawak mencakup pati 20-30%, kurkumin 1-2%, kurkuminoid 0,0742%, minyak atsiri 6-10 %.

Menurut Laili (2013), kandungan kimia rimpang temulawak dapat dibedakan atas beberapa komponen, yaitu pati yang merupakan kandungan terbesar dalam temulawak, jumlahnya bervariasi antara 48-54%. Kandungan *Kurkuminoid* dalam

temulawak sebesar 1-2%. *Kurkuminoid* berkhasiat menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, menurunkan kadar kolesterol, antibakteri, mencegah terjadinya perlemakan dalam sel-sel hati dan sebagai antioksidan dan penangkal senyawa-senyawa radikal bebas yang berbahaya. Kandungan minyak atsiri pada rimpang temulawak sebesar 3-12%. Minyak atsiri temulawak terdiri atas 32 komponen yang secara umum bersifat meningkatkan produksi getah empedu dan mampu menekan pembengkakan jaringan.

Tabel 2. Kandungan kimia rimpang temulawak kering

Kandungan	Kadar (%)
Air	9,80
Abu	3,29
Lemak	2,84
Protein	3,30
Pati	48,59
Kurkumin	2,02

Sumber: (Rosidi dkk., 2016).

Kurkuminoid merupakan senyawa kimia yang terdiri atas kurkumin atau zat warna kuning yang terkandung dalam rimpang temulawak berfungsi sebagai antibakteri, antikanker, anti tumor, anti radang dan penambah nafsu makan. kurkumin dapat menambah nafsu makan karena kandungan senyawa kurkumin temulawak dapat mempercepat kerja usus halus sehingga dapat mempercepat pengosongan lambung, dengan demikian akan timbul rasa lapar dan menambah nafsu makan. Sehingga tingkat konsumsi pakan akan tinggi dan akan berdampak pada penambahan bobot badan dan peningkatan persentase karkas (Farida dan Nani, 2020). Senyawa *Kurkuminoid* juga

merupakan senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri karena dapat membunuh bakteri yang merugikan atau bakteri yang bersifat patogen seperti bakteri *Haemophilus paragallinarum* biasa dikenal dengan *Infectios coryza* (snot), *Pasteurella multocida* (*Fowl cholera*). *Kurkuminoid* juga berfungsi untuk memperbaiki kelainan pada kantong empedu dengan memperlancar pengeluaran cairan empedu dan pankreas, sehingga terjadi peningkatan aktivitas pencernaan dan dapat meningkatkan metabolisme lemak (Sri dkk., 2017).

Minyak atsiri dari rimpang temulawak mempunyai sifat kimiawi dan efek farmakologis yang berfungsi sebagai anestetik, antimikrobal, antiseptik, antioksidan dan imunomodulator (Nurhidayati dan Sulistiowati, 2013). Minyak atsiri juga mempunyai khasiat merangsang sel hati untuk meningkatkan produksi empedu serta memperlancar sekresi empedu sehingga dapat mengurangi partikel-partikel padat yang terdapat dalam kantong empedu. Empedu berfungsi untuk melarutkan lemak, dengan lancarnya sekresi empedu dan kadar kolestrol menurun maka sistem pencernaan dan penyerapan lemak dapat berjalan lancar (Trisno dkk., 2020). Zat bioaktif berupa minyak atsiri dan kurkumin dapat merangsang keluarnya getah pankreas. Getah pankreas dalam tubuh mampu mengeluarkan enzim lipase yang dapat memecah asam lemak gliserol sehingga lemak yang terbentuk berkurang (Kiramang dkk., 2019).

F. Persentase Karkas Ayam Broiler

Karkas ayam broiler adalah bagian tubuh pada ternak yang telah dicabuti bulunya, ayam broiler yang diperoleh dengan cara disembelih secara halal dan benar, jeroan dan abdominalnya dikeluarkan, kepala, leher dan kedua kakinya dipotong sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi (Sri dkk., 2017). Karkas merupakan bagian tubuh yang menentukan produksi ayam pedaging. Produksi karkas ayam pedaging erat kaitannya dengan persentase karkas yang didapatkan, persentase karkas ayam pedaging pada berbagai penelitian cukup bervariasi yaitu sekitar 65-75% dan dianggap baik dalam produksi karkas pada ayam pedaging. Persentase karkas berbanding lurus dengan bobot badan, jadi semakin meningkat berat bobot badan maka persentase berat karkas yang didapatkan juga semakin meningkat (Dwi dkk., 2019).

Karkas ayam broiler dibedakan menjadi dua yaitu karkas kosong dan karkas segar. Karkas kosong yaitu ayam yang telah disembelih yang dikurangi darah, organ tubuh bagian dalam atau jeroan, kepala, dan kaki sedangkan karkas segar adalah ayam yang telah disembelih namun masih terisi dengan hati, jantung, dan empela yang telah dibersihkan (Massolo, 2016). Karkas merupakan bagian yang sangat menentukan tingginya produksi daging ayam. Kualitas karkas yang baik merupakan hal yang paling utama diperhatikan oleh peternak ayam broiler karena konsumen saat sekarang ini sangat selektif dalam memilih produk peternakan khususnya daging (Tumiran dkk., 2019).

Produksi karkas ayam broiler erat kaitanya dengan bobot badan dan besarnya karkas ayam broiler. Besar karkas ayam broiler cukup bervariasi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi kesehatan ayam broiler, keadaan bulu, komposisi fisik, dan perbedaan kecepatan pertumbuhan ayam broiler. Kecepatan pertumbuhan akan mempengaruhi distribusi bobot bagian-bagian tubuh atau komponen karkas ayam broiler. Komponen karkas atau potongan komersial karkas ayam broiler dibagi menjadi beberapa bagian yaitu dada, paha, punggung, dan sayap. Pada bagian dada dan paha ayam broiler memiliki produksi daging yang lebih banyak ini disebabkan karena pada masa pertumbuhan pada bagian dada dan paha memiliki perkembangan yang lebih dominan dibandingkan dengan sayap dan punggung. Hal tersebut disebabkan karena pada bagian sayap dan punggung didominasi oleh komponen tulang dan kurang berpotensi menghasilkan daging (Sosiawan dkk., 2018).

Bobot karkas berhubungan erat dengan pertumbuhan dan bobot akhir. Bobot karkas adalah berat ayam sudah mengalami pemotongan kemudian dikurangi berat darah, bulu, kaki, kepala, leher, dan seluruh isi organ dalam kecuali paru-paru dan ginjal (Subekti dkk., 2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi berat karkas ayam pedaging antara lain strain, umur, jenis kelamin, dan kondisi fisik ternak. Bobot karkas juga dipengaruhi oleh bobot hidup apabila bobot hidup ayam pedaging besar maka bobot karkasnya juga akan besar begitu pula sebaliknya. Semakin besar bobot hidup ayam pedaging maka semakin besar pula berat dan persentase karkas ayam yang dihasilkan. Umumnya persentase karkas sekitar 55-60% (Dewanti dkk., 2012).

Persentase karkas erat kaitannya umur, jenis kelamin dan bobot badan, apabila umur ayam broiler semakin meningkat maka berat badan juga akan meningkat. Persentase karkas juga berhubungan dengan bobot hidup ayam, apabila bobot hidup ayam broiler meningkat maka persentasi karkas juga akan meningkat tetapi apabila bobot karkas yang dihasilkan tidak mengalami kenaikan akan tetapi persentase karkas yang dihasilkan meningkat dapat dikatakan bahwa persentase karkas berpengaruh terhadap berat organ dalam pada ayam pedaging. Kenaikan persentase karkas ini menunjukkan bahwa nilai berat organ dalam rendah dikarenakan penyerapan nutrisi yang baik dari ayam pedaging (Dwi dkk., 2019).

G. Persentase Lemak Abdominal Ayam Broiler

Lemak pada tubuh ayam broiler terbagi atas sub kutan (bawah kulit), rongga perut (abdomen), dalam otot (intramuskuler) dan menempel pada bagian saluran pencernaan (Melindasari dkk., 2013). Lemak abdomen adalah lemak yang terdapat di rongga perut yang terbentuk karena ayam broiler memiliki nafsu makan yang tinggi sementara sifat gerakan broiler lambat sehingga energi yang dikonsumsi dari pakan diubah menjadi lemak (Pratikno, 2011).

Lemak abdomen merupakan limbah yang terdapat pada karkas ayam pedaging dan keberadaannya dianggap dapat menurunkan kualitas karkas ayam pedaging. Lemak abdomen merupakan salah satu komponen lemak tubuh yang terdapat dalam rongga perut. Timbunan lemak yang terdapat dalam perut ayam broiler termasuk dalam lemak abdomen. Lemak abdomen dapat terjadi karena energi yang merupakan

hasil dari proses metabolisme zat gizi yang masuk kedalam tubuh ayam melebihi tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh ternak, baik untuk hidup pokok maupun untuk memproduksi. Timbunan lemak abdomen dapat dijadikan indikasi bahwa telah terjadi pemborosan pakan karena lemak abdomen merupakan bagian yang tidak termanfaatkan (Hidayat, 2015). Menurut Pratikno (2011), mekanisme pembentukan lemak dalam tubuh ayam pedaging melalui proses *Lipogenesis*. *Lipogenesis* adalah proses deposisi lemak dan meliputi proses sintesis asam lemak dan kemudian sintesis trigliserida yang terjadi dihati pada daerah sitoplasma dan mitokondria serta jaringan adiposa.

Pengukuran bobot lemak abdomen dilakukan dengan cara menimbang lemak yang didapat dari lemak yang berada pada sekeliling *Gizzard* dan lapisan yang menempel antara otot abdomen serta usus kemudia ditimbang. Persentase lemak abdomen diperoleh dengan cara membandingkan bobot lemak abdomen dengan bobot hidup kemudian dikalikan dengan 100 (Witantra, 2011).

Pengukuran lemak abdominal merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menghitung lemak total tubuh ayam broiler. Bobot lemak abdominal cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya umur ternak. Pada periode awal, lemak yang disimpan dalam tubuh jumlahnya sedikit, namun pada pertumbuhan akhir proses pertumbuhan lemak akan berlangsung cepat dan lemak akan disimpan di bawah kulit, pada bagian sekitar organ dalam, antara lain empedu, usus, dan otot. Penimbunan lemak abdominal di dalam rongga perut akan berpengaruh terhadap bobot karkas.

Persentase lemak abdominal pada ayam broiler berkisar antara 0,73 % samapai 3,78 %. Lemak abdominal mempunyai hubungan korelasi dengan total lemak karkas, apabila kandungan lemak abdominal tinggi maka kandungan lemak karkas ayam broiler juga seamkin tinggi (Salam dkk., 2013).

Penimbunan lemak abdominal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain suhu, lingkungan, tingkat energi dalam ransum, umur, jenis kelamin, serta kandungan lemak abdominal akan meningkat sejalan dengan penambahan bobot badan dan umur ternak (Wahyono, 2012). Pemeberian energi pada ransum yang sesuai dengan kebutuhan ternak akan menghasilkan persentase lemak abdominal yang rendah energi karena energi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persentase karkas lemak abdominal (Ahdanisa dkk., 2014). Berdasarkan pendekatan aspek pakan, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah lemak abdomen pada ayam pedaging dapat dilakukan dengan cara mengatur konsumsi zat gizi ayam pedaging untuk menghindari konsumsi zat gizi yang berlebih yang dicerna dan dimetabolis dalam tubuh menjadi endapan lemak abdomen. Proses pengaturan dapat dilakukan dengan cara mengatur kandungan zat gizi dan jumlah pemberian pakan pada ayam pedaging (Hidayat, 2015).

H. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang juga meneliti yang hampir sama apa yang saya teliti yaitu sebagai berikut:

1. Nanda Griga Kolaka, Sunaryo Hadi Warsito, Herman Setyano, dan Imam Mustofa (2012), penelitian tentang Pemanfaatan Limbah Susu Bubuk Afkir Sebagai Pakan Tambahan Pada Pakan Komersial Terhadap Persentase Berat Karkas dan Lemak Abdominal Ayam Pedaging Jantan. Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah berat karkas, persentase karkas dan lemak abdominal. Pada penelitian ini menggunakan ayam pedaging jantan umur 2 minggu sebanyak 35 ekor dengan menggunakan 5 perlakuan pada perlakuan P0 menggunakan pakan Kontrol, P1 (pakan komersial + pemberian 2,5% susu afkir), P2 (pakan komersial + pemberian 5% susu afkir), P3 (pakan komersial + pemberian 7,5% susu afkir) dan P4 (pakan komersial + pemberian 10% susu afkir). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan limbah susu bubuk afkir sebagai pakan tambahan ayam pedaging jantan sampai persentase 10% tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap persentase karkas ayam pedaging jantan, tetapi berbeda nyata pada berat karkas ayam pedaging jantan. Penggunaan limbah susu bubuk afkir sebagai pakan tambahan ayam pedaging jantan sampai persentase 10% tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap persentase dan berat lemak abdominal ayam pedaging jantan.

2. Yustin Golla, M. E. R. Montong, Jacqueline T. Laihad dan Godlief D.G Rembet (2014), penelitian tentang Penambahan Tepung Rimpang Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dan Tepung Rimpang Temu Putih (*Curcuma zedoaria* Rosc) dalam Ransum Komersial Terhadap Persentase Karkas, Lemak Abdomen, dan Persentase Hati Pada Ayam Pedaging. Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah persentase karkas, persentase hati dan persentase lemak abdominal. Penelitian ini menggunakan ayam broiler yang berumur 3 minggu sebanyak 53 ekor ayam broiler dan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 6 ulangan. Masing-masing ulangan terdiri dari 3 ekor ayam broiler. Susunan perlakuan yang diberikan yaitu R0 (pakan komersial tanpa temulawak dan temu putih), R1 (pakan komersial + tepung rimpang temulawak 2%) dan R2 (pakan komersial + tepung rimpang temu putih 2%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung rimpang temulawak dan tepung rimpang temu putih dalam ransum tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata ($P>0,05$) terhadap persentase karkas, lemak abdomen, persentase hati. Dapat disimpulkan penambahan tepung rimpang temulawak dan tepung rimpang temu putih sebanyak 2% dalam ransum komersial masih memberikan respon yang sama terhadap persentase karkas, lemak abdomen, dan persentase hati ayam pedaging.
3. Sri Jumiati, Nuraini, dan Rahim Aka (2017), penelitian tentang Produksi Karkas, Giblet dan Lemak Abdominal Ayam Broiler yang diberi *Feed Additive*

Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dalam Pakan. Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah bobot potong, persentase karkas, persentase ampela, persentase hati, persentase jantung dan persentase lemak abdominal. Penelitian ini menggunakan 80 ekor ayam broiler strain CP 707 dan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Masing-masing ulangan terdiri dari 5 ekor ayam broiler. Susunan perlakuan yang diberikan yaitu, P0 (pakan komersial tanpa temulawak), P1 (pakan komersial + temulawak 1%), P2 (pakan komersial + temulawak 2%), P3 (pakan komersial + temulawak 3%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tepung temulawak dalam pakan pada semua perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap bobot potong dan persentase lemak abdominal, namun tidak menunjukkan pengaruh nyata terhadap persentase karkas dan persentase giblet.

I. Kerangka Pemikiran


Seiring perkembangan zaman, tingkat konsumsi masyarakat akan kebutuhan protein hewani semakin meningkat terutama yang berasal dari daging ayam broiler, karena ayam broiler memiliki kandungan protein yang sangat tinggi serta memiliki manfaat bagi manusia untuk meningkatkan pertumbuhan tubuh. Daging ayam broiler merupakan salah satu sumber pangan yang banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki tekstur daging yang lembut serta memiliki harga yang relatif murah dibandingkan ternak penghasil daging yang lainnya. Usaha peternakan ayam broiler

juga saat sekarang ini banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki sistem pemeliharaan yang relatif mudah serta memiliki pertumbuhan yang cepat.

Saat sekarang ini masalah yang dihadapi oleh peternak adalah harga pakan dari hari kehari semakin mahal ini disebabkan karena adanya penggunaan bahan pakan impor seperti penggunaan jagung, bungkil kedelai, dan tepung ikan yang berasal dari luar sehingga harga pakan di Indonesia mahal. Untuk itu diperlukan bahan pakan alternatif untuk mengganti bahan pakan impor. Bahan pakan alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam ransum untuk menekan harga pakan ayam broiler adalah susu bubuk afkir yang memiliki kandungan nutrisi yang kompleks. Susu bubuk afkir mengandung zat nutrisi makro diantaranya protein, lemak, dan laktosa serta juga mengandung zat nutrisi mikro diantaranya yaitu vitamin, mineral atau asam amino.

Dalam pakan juga perlu ditambahkan imbuhan pakan atau *feed additive* yang berupa AGP (*Antibiotic Growth Promoter*) yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas ayam dan menambah laju pertumbuhan ayam. Namun saat ini pemerintah melarang penggunaan antibiotik komersial. Langkah pelarangan AGP untuk menghindari kemungkinan potensi semakin meluasnya resistensi untuk generasi mendatang terhadap antibiotik. Dengan adanya pelarangan tersebut maka dibutuhkanlah bahan pengganti alternatif AGP pada pakan dengan menggunakan bioaktif tanaman herbal dengan pemberian tepung temulawak karena temulawak

mengandung kurkumin dan minyak atsiri yang diharapkan mampu meningkatkan persentase karkas ayam broiler dan menurunkan kadar lemak pada ayam broiler.



Gambar. 3 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Tanggal 10 April sampai 10 Mei 2021 bertempat di Desa Tanah Karaeng Kec. Manuju Kab. Gowa.

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah ember, *Fitting* lampu, gasolec, kabel, kandang *Litter* yang memiliki sekat, lampu 15 watt, meteran, *Spray gun*, tabung gas 3 kg, tempat minum 1 liter, tempat pakan 3 kg, timbangan digital.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah air, *Day old chick* (DOC), desinfektan (Destan), kantong plastik, kertas roll, pakan komersial BP-11, sekam padi, susu bubuk afkir (*Chil-school*) dengan formula isolat protein kedelai (Soya), tepung temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dan vaksin *Newcastle disease* (ND-Lasota).

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen, yaitu metode yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

D. Prosedur Penelitian

1. Rancangan penelitian

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial 3x4, dimana 3 perlakuan (Faktor A) dan 4 perlakuan (faktor B) dengan menggunakan 2 ulangan setiap ulangan atau unit percobaan berisi 2 ekor ayam. Ada 2 faktor pada perlakuan ini yaitu sebagai berikut:

Faktor A:

T0 = Pakan Komersial (Kontrol)

T1 = Temulawak 1 %

T2 = Temulawak 2 %

Faktor B:

S0 = Pakan Komersil (Kontrol)

S1 = Susu bubuk Afkir 2,5 %

S2 = Susu bubuk Afkir 5 %

S3 = Susu bubuk Afkir 7,5 %

Adapun kombinasi pemberian ransum faktor A dan B pada tabel 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kombinasi pemberian ransum faktor A dan B.

	S0	S1	S2	S3
T	0%	2,5%	5%	7,5%
0%	T ₀₁ S ₀₁ T ₀₂ S ₀₂	T ₀₁ S ₁₁ T ₀₂ S ₁₂	T ₀₁ S ₂₁ T ₀₂ S ₂₂	T ₀₁ S ₃₁ T ₀₂ S ₃₂
1%	T ₁₁ S ₀₁ T ₁₂ S ₀₂	T ₁₁ S ₁₁ T ₁₂ S ₁₂	T ₁₁ S ₂₁ T ₁₂ S ₂₂	T ₁₁ S ₃₁ T ₁₂ S ₃₂
2%	T ₂₁ S ₀₁ T ₂₂ S ₀₂	T ₂₁ S ₁₁ T ₂₂ S ₁₂	T ₂₁ S ₂₁ T ₂₂ S ₂₂	T ₂₁ S ₃₁ T ₂₂ S ₃₂

2. Tahap persiapan

a. Pembuatan Tepung Temulawak

Dalam pembuatan tepung temulawak terlebih dahulu melakukan pembersihan rimpang temulawak dari tanah, kerikil, dan bagian tanaman lain selain akar. Setelah bersih rimpang temulawak dipotong kecil-kecil agar mempermudah dalam proses penggilingan. Setelah itu dilakukan pengeringan dengan cara dijemur dibawah sinar matahari selama 1-2 hari dan setelah rimpang temulawak kering selanjutnya dilakukan penggilingan untuk menghasilkan tepung temulawak.

b. Kandang

Pemeliharaan ayam dilakukan selama 30 hari, mula-mula kandang didesinfeksi menggunakan destan. Sebelum *Day old chick* (DOC) dimasukkan ke dalam unit percobaan, terlebih dahulu *Day old chick* (DOC) dimasukkan ke dalam kandang *Brooding* selama tujuh hari. Kandang *Brooding* ini dirancang senyaman mungkin yang terdiri dari tirai yang dibuat menggunakan terpal, gasolek serta lampu 40 Watt sebanyak 2 buah. Hal itu dilakukan agar suhu pada kandang dapat terjaga sehingga *Day old chick* (DOC) tetap merasa hangat walaupun terpisah dari induknya. Litter atau alas kandang menggunakan sekam padi dengan ketebalan 8-12 cm yang kemudian lapisinya menggunakan kertas roll di permukaan sekam padi agar *Day old chick* (DOC) tidak memakannya.

Setelah masa *Brooding*, tirai yang berada di bagian atas mulai dilepas agar ayam broiler mulai beradaptasi dengan suhu lingkungan, pada masa ini juga ketika

siang hari tirai mulai dibuka agar ayam broiler mendapatkan cahaya matahari serta sirkulasi udara didalam kandang dapat terganti. Pada masa ini, sebanyak 48 ekor ayam broiler dimasukkan ke dalam kandang yang memiliki 24 unit percobaan dengan ukuran Panjang 80 cm, tinggi 60 cm dan lebar 60 cm. Masing-masing unit percobaan berisi 2 ekor ayam broiler, terdapat tempat pakan kapasitas 3 Kg dan tempat minum kapasitas 1 L.

c. Pakan dan Air Minum

Pemberian pakan pada penelitian ini merupakan pakan komersial ditambahkan susu bubuk afkir yang merek *Chil-school* yang merupakan susu formula nabati dari isolat protein kedelai (Soya) dan tepung temulawak, yang diberikan sesuai dengan kebutuhan ayam per hari. Pakan diberikan sebanyak tiga kali sehari, yaitu pada pagi, siang dan sore hari serta pemberian air minum diberikan secara *ad-libitum*. Pakan yang diberikan adalah pakan komersial BP-11 Bravo kemudian akan diformulasikan dengan tepung temulawak dan susu bubuk afkir

Tabel 4. Kandungan Nutrisi Pakan Komersial

Jenis Kandungan	Jumlah Kandungan
Protein Kasar (%)	21,0-23,0
Serat Kasar (%)	Min. 5
Kalsium (%)	0,8-1,1
Fosfor (%)	Min. 0,50
Aflatoxin ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	Max 50
Kadar Air (%)	Maks. 12
Lemak (%)	Min. 5
Abu (%)	Maks. 7
ME (Kkal/kg)	Min.3000

Sumber: PT. Japfa Comfeed Indonesia tbk, 2021.

Tabel 5. Kandungan Nutrisi Susu Bubuk Afkir (*Chil-school*)

Jenis kandungan	Jumlah Kandungan
Kalsium (%)	25
Fosfor (%)	25
Protein kasar (%)	12
Serat kasar (%)	0,49
Lemak kasar (%)	9

Sumber: PT. Kalbe Morinaga Indonesia, 2020.

Tabel 6. Analisis Kimia Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb)

Jenis Analisis	Jumlah Kandungan
Bahan kering (%)	94, 4
Minyak atsiri (%)	5, 97
Pati (%)	53, 00
Lemak (%)	9, 04
Protein	9, 88
Serat (%)	2, 26
Kurkumin (%)	2, 00
Xanthorrhizol (%)	1, 58

Sumber : Hasil Analisis Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik , 2018).

3. Tahap Pelaksanaan

Pemeliharaan ayam broiler dilaksanakan selama 30 hari. Pada umur 1-7 hari *day old chick* (DOC) berada pada fase *Brooding*, pada fase ini *Day old chick* (DOC) masih membutuhkan indukan atau penghangat buatan (gasolec dan lampu) untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Gasolec akan dinyalakan pada malam hari, akan dinyalakan pada siang hari apabila cuaca dingin (hujan), sedangkan pencahayaan pada fase *Brooding* dilakukan selama 23 jam, pada malam hari pukul 23.00-24.00 WITA penerangan atau lampu dimatikan bertujuan untuk merangsang hormon pertumbuhan. Pada fase *Brooding*, *Day old chick* (DOC) ini diberikan pakan komersial (BP-11), pemberian pakan dan air minum pada fase ini secara *ad libitum*.

Setelah masa *Brooding*, ayam broiler diberikan ransum perlakuan pada umur 8-30 hari (hingga panen). Pada fase ini, pemberian pakan dilakukan tiga kali sehari yaitu setiap pagi pukul 06.00 WITA, siang hari pada pukul 12.00 WITA dan sore hari pukul 17.00 WITA, untuk air minum diberikan secara *ad libitum*. Pada fase ini juga tidak menggunakan lagi gasolec sebagai pemanas, tetapi menggunakan lampu agar ayam dapat beradaptasi. Pencahayaan pada fase ini dilakukan selama 16 jam, pada malam hari pukul 22.00-05.00 WITA penerangan atau lampu dimatikan. Pemberian vitamin melalui air minum dilaksanakan pada pagi hari, guna mengurangi tingkat stress dan menambah nafsu makan ayam broiler.

E. Parameter yang Diukur

1. Persentase Karkas

Persentase berat karkas merupakan berat yang diperoleh dengan cara melakukan penimbangan berat badan akhir pada akhir penelitian dengan mengambil sampel dari tiap ulangan. Bobot karkas didapatkan dengan cara menimbang bobot ayam yang telah dipotong dan dikurangi darah, bulu, kepala, kaki dan organ dalam kecuali paru-paru dan limpa (Pajri dkk., 2019).

Menurut Mastika dkk., (2016), Persentase karkas diperoleh dengan cara membandingkan berat karkas dengan berat hidup dikalikan 100%, dihitung dengan rumus sebagai berikut ini :

$$\text{Persentase Berat Karkas (\%)} = \frac{\text{Berat karkas (g)}}{\text{Berat hidup (g)}} \times 100 \%$$

2. Persentase Lemak Abdominal

Lemak abdominal dapat diperoleh pada bagian rongga perut, alat pencernaan, organ reproduksi dan terdapat di sekeliling *Gizzard*, setelah proses pemisahan lemak abdominal pada bagian karkak ayam kemudian selanjutnya dilakukan penimbang pada setiap sampel yang akan di uji (Salam dkk., 2013).

Menurut Salam dkk., (2013), perhitungan Persentase lemak abdominal dapat dihitung yaitu dengan cara bobot lemak abdomen yang telah dipisahkan dari karkas kemudian dibagi bobot hidup setelah itu dikali 100%.

$$\text{Persentase lemak abdominal (\%)} = \frac{\text{Berat lemak abdomen (g)}}{\text{BB hidup ayam (g)}} \times 100 \%$$

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara sidik ragam sesuai dengan rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial 3 x 4 yaitu 3 perlakuan pada faktor A dan 4 perlakuan pada faktor B dengan menggunakan 2 ulangan. Apabila ditemukan perbedaan yang nyata, maka dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT) (Sawadi, 2016). Model matematikanya adalah sebagai berikut:

$$Y_{ijk} = \mu + A_i + B_j + AB_{ij} + \epsilon_{ijk}$$

Keterangan :

Y_{ijk} = Pengamatan faktor A taraf ke-i, faktor B taraf ke-j dan ulangan ke-k pada penggunaan susu bubuk afkir dan tepung tepung temulawak

μ = Rata-rata pengamatan

A_i = Pengaruh faktor A pada taraf ke-i

B_j = Pengaruh faktor B pada taraf ke-j

AB_{ij} = Interaksi antara Faktor A dengan Faktor B

ϵ_{ijk} = Pengaruh galat pada faktor A taraf ke-i, faktor B taraf ke-j dan ulangan k

G. Definisi Operasional

1. Ayam broiler merupakan ayam ras pedaging yang berasal dari budidaya teknologi yang memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri yaitu memiliki pertumbuhan yang cepat, dapat dipotong dalam umur yang relatif muda.
2. Susu bubuk afkir adalah susu bubuk yang telah mendekati masa kadaluarsa atau yang sudah kadaluarsa namun kandungan gizinya tidak jauh berbeda dengan susu yang tidak afkir dalam artian kandungan zat nutrisinya sudah menurun namun masih bisa dikonsumsi oleh ternak.
3. Temulawak adalah tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan sebagai antibiotik alami yang tidak mengakibatkan residu apabila dikonsumsi oleh ternak atau manusia. Di dalam rimpang temulawak terdapat zat bioaktif berupa kurkumin dan minyak atsiri yang mampu meningkatkan performa dan memperbaiki kualitas karkas ayam broiler.
4. Persentase karkas merupakan perbandingan antara bobot karkas dengan bobot hidup yang sering digunakan sebagai pendugaan jumlah daging pada unggas.
5. Lemak abdominal adalah lemak yang terdapat disekitar usus dan rongga perut. Lemak abdominal merupakan bagian yang biasa diamati untuk menilai kandungan lemak pada ayam broiler.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase karkas dan persentase lemak abdominal ayam broiler dengan penambahan susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Rataan Persentase Karkas Ayam Broiler.

	S0	S1	S2	S3	
T	0%	2,5%	5%	7,5%	Rata-Rata
0%	68.03±1.111	69.33±1.72	68.76±0.52	68.80±2.85	68.73±1.42
1%	67.30±4.07	68.77±1.07	71.66±0.12	68.91±2.07	69.16±2.43
2%	68.90±0.95	67.73±2.56	69.06±0.91	68.555±0.54	68.56±1.18
Rata-Rata	68.08±2.019	68.60±1.62	69.83±1.50	68.75±1.54	

Keterangan: T (Temulawak), 0% (0% temulawak) 1% (1% Temulawak), 2% (2% Temulawak), S0 (0% Susu bubuk afkir), S1 (2,5% Susu bubuk afkir), S2 (5% Susu bubuk afkir), S3 (7,5% Susu bubuk afkir).

Tabel 8. Rataan Persentase Lemak Abdominal Ayam Broiler.

	S0	S1	S2	S3	
T	0%	2,5%	5%	7,5%	Rata-Rata
0%	1.89±0.12	2.25±0.09	1.74±0.004	1.95±0.14	1.96±0.21 ^b
1%	1.73±0.001	1.71±0.14	1.69±0.25	1.68±0.095	1.70±0.11 ^a
2%	1.29±0.24	1.46±0.50	1.59±0.93	1.57±0.27	1,47±0.27 ^a
Rata-Rata	1.63±0.30	1.80±0.43	1.67±0.14	1,73±0.23	

Keterangan: T (Temulawak), 0% (0% temulawak) 1% (1% Temulawak), 2% (2% Temulawak), S0 (0% Susu bubuk afkir), S1 (2,5% Susu bubuk afkir), S2 (5% Susu bubuk afkir), S3 (7,5% Susu bubuk afkir).

B. Pembahasan

1. Persentase Karkas Ayam Broiler

Hasil sidik ragam pada penambahan susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) bahwa pada masing-masing perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap persentase karkas ayam broiler dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 9. Hasil Analisis Sidik Ragam Penambahan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) Terhadap Persentase Karkas Ayam Broiler

Perlakuan	Nilai P
T	0.80
S	0.45
T*S	0.67

Keterangan: T (Temulawak), S (Susu bubuk afkir), T*S (Temulawak dan susu bubuk afkir).

a. Pengaruh Penambahan Temulawak

Tabel 9 menunjukkan bahwa pada perlakuan dengan penambahan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap persentase karkas ayam broiler. Hasil nilai rata-rata persentase karkas ayam broiler yang diberikan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) yaitu T0 (68,73%), T1 (69,16%) dan T2 (68,56%). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pemberian temulawak pada perlakuan T1 sebesar 69,16% memberikan kecenderungan peningkatan persentase karkas ayam broiler jika dibandingkan dengan perlakuan T0 dan T2.

Perlakuan T1 berupa penambahan 1% atau sebanyak 10 gram temulawak dalam ransum lebih efisien dibandingkan pada perlakuan T0 tanpa penambahan temulawak dan T2 dengan penambahan 2% temulawak. Penambahan 2% atau sebanyak 20 gram temulawak dalam ransum dianggap kurang efisien karena dengan penambahan

temulawak menimbulkan rasa yang pahit dan tajam pada pakan sehingga kurang disukai oleh ayam broiler atau tingkat palatabilitasnya berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yustin dkk., (2014), bahwa penggunaan rimpang temulawak sebanyak 2% tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap persentase karkas ayam pedaging. Penggunaan rimpang temulawak dalam ransum harus dibatasi karena di dalam rimpang temulawak terkandung zat bioaktif berupa minyak atsiri yang mempunyai rasa yang tajam dan bau yang khas sehingga berpengaruh terhadap palatabilitas ayam broiler.

Penambahan temulawak pada level 1% memberikan kecenderungan peningkatan persentase karkas karena temulawak mengandung zat bioaktif berupa minyak atsiri dan kurkumin yang dapat menambah nafsu makan dan meningkatkan kapasitas metabolisme sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan daging dan meningkatkan persentase karkas ayam broiler. Hal ini sesuai dengan pendapat Farida dan Nani (2020), bahwa kandungan senyawa kurkumin dalam rimpang temulawak dapat menambah nafsu makan karena dapat mempercepat kerja usus halus sehingga dapat mempercepat pengosongan lambung dengan demikian akan timbul rasa lapar sehingga nafsu makan akan meningkat dan berdampak terhadap penambahan bobot badan dan peningkatan persentase karkas. Menurut Madhupriya dkk., (2018) bahwa dalam meningkatkan produksi unggas aktivitas fito imbuhan pakan atau *feed additive* herbal diduga mampu meningkatkan pencernaan nutrisi, meningkatkan penambahan

bobot badan, meningkatkan konsumsi pakan, meningkatkan bobot karkas dan juga sebagai antioksidan.

b. Pengaruh Penambahan Susu Bubuk Afkir

Berdasarkan hasil nilai rata-rata persentase karkas ayam broiler yang diberikan susu bubuk afkir nilai persentase karkas yang tertinggi diperoleh pada perlakuan S2 (5%) dengan nilai persentase karkas (69,83%) dan yang terendah yaitu pada perlakuan S0 (0%) sebesar 68,08%.

Perlakuan S3 dengan penambahan susu bubuk afkir sebanyak 7,5% atau 75 gram kedalam ransum menghasilkan persentase karkas 68,75% hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan S2 namun cenderung meningkat jika dibandingkan dengan S0 dan S1. Hal ini disebabkan karena dengan penambahan 7,5% atau 75 gram susu bubuk afkir dalam ransum, pakan akan berbentuk seperti tepung sehingga sulit dipatuk oleh ayam menyebabkan konsumsi pakan rendah dan berdampak terhadap pertambahan bobot badan dan persentase karkas ayam broiler. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2017), bahwa penambahan susu bubuk afkir terlalu banyak dalam pakan mengakibatkan penurunan konsumsi ransum pada ayam hal ini disebabkan karena ransum akan berbentuk seperti tepung sehingga sulit dipatuk oleh ayam dan menyebabkan konsumsi ransum rendah dan pertambahan bobot badan kurang maksimal.

Pada penelitian ini walaupun hasil sidik ragam tidak berpengaruh nyata, namun menunjukkan kecenderungan peningkatan persentase karkas pada perlakuan perlakuan S2 dengan penambahan susu bubuk afkir sebanyak 5%. Hal ini disebabkan karena susu bubuk afkir memiliki kandungan zat nutrisi makro berupa protein dan lemak dan zat nutrisi mikro berupa asam amino, vitamin dan mineral yang dapat meningkatkan pertumbuhan bobot badan ayam broiler sehingga berdampak terhadap peningkatan persentase karkas ayam broiler. Hal ini sesuai dengan pendapat Dwi dkk., (2019), bahwa persentase karkas berbanding lurus dengan bobot badan, jadi semakin meningkat bobot badan ternak maka persentase berat karkas yang didapatkan juga semakin meningkat. Menurut Ulfa dkk., (2019), bahwa peningkatan pertumbuhan bobot badan dipengaruhi oleh jenis pakan yang diberikan pada ayam pedaging. Kandungan energi metabolisme dan protein pada pakan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bobot badan dan pembentukan karkas. Kandungan protein kasar dalam ransum penelitian sebesar 21-23% dan kandungan energi sebesar 3.000 Kkal/kg. Hal ini sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI 2015), bahwa standar kadar protein kasar dalam ransum ayam broiler yaitu sebesar 18-23% dan kandungan energi sebesar 3.000-3.100 Kkal/kg.

c. Interaksi Temulawak dan Susu Bubuk Afkir

Berdasarkan hasil sidik ragam (Tabel 9) pada penambahan susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) menunjukkan bahwa pada masing-masing perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap persentase karkas ayam

broiler. Tetapi berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai rata-rata tertinggi pada perlakuan T1S2 dengan persentase karkas (71,66%) cenderung lebih baik pertumbuhannya jika dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Sedangkan persentase karkas terendah yaitu pada perlakuan T1S0 (67,30%).

Perlakuan T1S2 merupakan perlakuan yang ditambahkan 1% atau 10 gram temulawak dan 5% atau 50 gram susu bubuk afkir dalam pakan sedangkan perlakuan T1S0 merupakan perlakuan yang tidak ditambahkan susu bubuk afkir hanya ada pemberian 1% atau 10 gram temulawak dalam ransum. Perlakuan T1S2 dengan penambahan susu bubuk afkir dan temulawak diduga memberikan kecenderungan peningkatan persentase karkas hal ini disebabkan karena susu bubuk afkir mengandung zat nutrisi seperti protein, kalsium, fosfor, dan mineral yang dapat menambah persentase karkas ayam broiler dan temulawak mengandung zat bioaktif berupa minyak atsiri dan kurkumin yang mampu menambah nafsu makan ayam broiler sehingga mampu meningkatkan persentase karkas ayam broiler. Hal ini sesuai dengan pendapat Pertiwi (2017), bahwa Susu bubuk afkir mengandung zat nutrisi yang sangat lengkap, seperti vitamin, mineral dan asam amino. Vitamin dalam lemak susu adalah vitamin A, D, E dan K sedangkan vitamin yang terlarut dalam susu adalah vitamin B kompleks. Menurut Dicky dan Apriliana (2016), bahwa temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dapat dimanfaatkan sebagai penambah nafsu makan alami karena mengandung senyawa kurkumin, minyak atsiri dan *Flavonoid* yang bersifat antimikroba terhadap beberapa mikroorganisme. Diketahui minyak atsiri mampu

meningkatkan nafsu makan dan kemampuan metabolisme ayam broiler sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan daging ayam broiler (Anas, 2016).

2. Persentase Lemak Abdominal Ayam Broiler

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pada perlakuan pemberian susu bubuk afkir dan interaksi penambahan susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$) terhadap persentase lemak abdominal ayam broiler. Tetapi pada penambahan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) memberikan pengaruh yang berbeda nyata ($P<0,05$) terhadap persentase lemak abdominal ayam broiler dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 10. Hasil Analisis Sidik Ragam Penambahan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) Terhadap Persentase Lemak Abdominal Ayam Broiler

Perlakuan	Nilai P
T	0.02
S	0.54
T*S	0.41

Keterangan: T (Temulawak), S (Susu bubuk afkir) , T*S (Temulawak dan susu bubuk afkir).

a. Pengaruh Penambahan Temulawak

Tabel 10 menunjukkan pada perlakuan penambahan temulawak dalam ransum berpengaruh nyata ($P<0,05$) terhadap persentase lemak abdominal ayam broiler. Hasil nilai rata-rata persentase lemak abdominal ayam broiler yang diberikan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) yaitu T0 (1,96%), T1 (1,70%), T2 (1,47%). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa nilai persentase lemak abdominal terendah pada perlakuan T2 dengan penambahan 2% atau 20 gram temulawak dalam

ransum dan yang tertinggi yaitu T0 perlakuan tanpa penambahan temulawak. Untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan penambahan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) terhadap persentase lemak abdominal ayam broiler dapat dilanjutkan dengan uji BNT (beda nyata terkecil).

Hasil uji lanjut BNT (Lampiran 4) menunjukkan bahwa, perlakuan T0 (0%) memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap perlakuan T1 dan T2. Namun pada perlakuan T1 (1%) dan T2 (2%) tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap persentase lemak abdominal ayam broiler. Pemberian temulawak dalam ransum diduga mampu menurunkan persentase lemak abdominal ayam broiler hal ini disebabkan karena temulawak mengandung zat bioaktif berupa minyak atsiri dan kurkumin yang diduga mampu menurunkan persentase lemak abdominal ayam broiler. Hal ini sesuai dengan pendapat Afriastini (2011), bahwa minyak atsiri dan kurkumin yang terdapat dalam tanaman herbal seperti pada temulawak dapat merangsang keluarnya getah pankreas dimana getah pankreas mengeluarkan enzim lipase yang dapat memecah asam lemak gliserol sehingga lemak yang terbentuk berkurang. Apabila kadar lemak berkurang maka kadar lemak abdominal juga akan berkurang.

b. Pengaruh Penambahan Susu Bubuk Afkir

Berdasarkan hasil sidik ragam (Tabel 10) menunjukkan pada masing-masing perlakuan dengan penambahan susu bubuk afkir tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap persentase lemak abdominal ayam broiler. Hasil nilai rata-rata lemak abdominal ayam broiler yang diberikan susu bubuk afkir yaitu S0 (1.63%), S1

(1,80%), S2 (1,67%) dan S3 (1,73%).

Penambahan susu bubuk afkir dalam ransum tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada masing-masing perlakuan. Persentase lemak abdominal yang didapatkan dalam penelitian ini berada dalam kisaran normal (1,63-1,80%). Hal ini sesuai dengan pendapat Salam dkk., (2013), bahwa nilai persentase lemak abdominal ayam broiler yang normal berkisar antara 0,73- 3,78 %. Persentase lemak abdominal ayam broiler yang didapatkan dalam penelitian ini menghasilkan persentase lemak abdominal dalam kisaran normal artinya ransum yang diberikan memberikan pengaruh yang normal terhadap pertumbuhan ayam broiler. Jika dilihat dari nilai rata-ran persentase lemak abdominal ayam broiler dengan penambahan susu bubuk afkir dalam ransum diduga belum mampu menurunkan persentase lemak abdominal ayam broiler karena susu bubuk afkir mengandung lemak sehingga kurang mampu dalam mengurangi persentase lemak abdominal ayam broiler.


c. Interaksi Temulawak dan Susu Bubuk Afkir

Berdasarkan hasil sidik ragam (Tabel 10) pada penambahan susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) menunjukkan bahwa pada masing-masing perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$). Tetapi berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai rata-rata terendah pada perlakuan T2S0 dengan persentase lemak abdominal sebesar (1,29%) sedangkan persentase lemak abdominal tertinggi yaitu pada perlakuan T0S3 sebesar (1,95 %).

Perlakuan T2S0 merupakan perlakuan yang ditambahkan 2% atau 20 gram temulawak dan tanpa ditambahkan susu bubuk afkir. Pada perlakuan ini cenderung menurunkan persentase lemak abdominal ayam broiler hal ini disebabkan karena adanya temulawak mengandung zat bioaktif berupa minyak atsiri dan kurkumin yang mampu menurunkan kadar lemak abdominal ayam broiler. Hal ini sesuai dengan pendapat Kiramang dkk., (2019), bahwa zat bioaktif berupa minyak atsiri dan kurkumin dapat merangsang keluarnya getah pankreas. Getah pankreas dalam tubuh mampu mengeluarkan enzim lipase yang dapat memecah asam lemak gliserol sehingga lemak yang terbentuk berkurang. Diduga bahwa minyak atsiri dan kurkumin mempunyai khasiat merangsang sel hati untuk meningkatkan produksi empedu serta memperlancar sekresi empedu sehingga dapat mengurangi partikel-partikel padat yang terdapat dalam kantong empedu. Empedu berfungsi untuk melarutkan lemak, dengan lancarnya sekresi empedu dan kadar kolesterol menurun maka sistem pencernaan dan penyerapan lemak dapat berjalan lancar (Trisno dkk., 2020).

Pada penelitian ini walaupun pemberian susu bubuk afkir dan temulawak pada hasil sidik ragam tidak berpengaruh nyata, namun jika dilihat dari nilai rata-rata lemak abdominal bahwa penambahan susu bubuk afkir dan temulawak memberikan kecenderungan penurunan persentase lemak abdominal jika dibandingkan dengan penambahan susu bubuk afkir secara tunggal. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penambahan temulawak dalam ransum mampu menurunkan kadar lemak abdominal ayam broiler. Rendahnya persentase lemak abdominal yang dihasilkan menunjukkan

bahwa kondisi perlemakan yang dihasilkan cenderung lebih baik. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa lemak abdominal merupakan hasil ikutan yang dapat mempengaruhi kualitas karkas. Oleh karena itu apabila persentase lemak abdominal rendah maka semakin baik produksi karkas yang diperoleh.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini pemberian susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) ke dalam ransum dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor tunggal pemberian temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb), faktor tunggal pemberian susu bubuk afkir dan interaksi pemberian susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dianggap kurang mampu dalam meningkatkan persentase karkas ayam broiler. Tetapi walaupun hasilnya tidak berbeda nyata namun pada perlakuan T1S2 (1% Temulawak dan 2% Susu Bubuk Afkir) memberikan kecenderungan peningkatan persentase karkas ayam broiler.
2. Faktor tunggal pemberian susu bubuk afkir dan interaksi pemberian susu bubuk afkir dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dianggap kurang mampu dalam menurunkan persentase lemak abdominal ayam broiler. Namun pada faktor tunggal pemberian temulawak memberikan dampak yang baik terhadap penurunan persentase lemak abdominal ayam broiler.

B. Saran

Sebaiknya perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai penambahan susu bubuk afkir dan temulawak dengan perlakuan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- A.D. Razak, K. Kiramng, M.N. Hidayat. 2016. Pertambahan bobot badan, konsumsi ransum, dan konversi ransum ayam ras pedaging yang diberikan tepung daun sirih (*Piper betle linn*) sebagai imbuhan pakan. *Jurnal ilmu dan industri peternakan* Vol 3 No.1 Hal.135-147.
- Achmanu dan Muharliem. 2011. *Ilmu Ternak Unggas*. UB Press, Malang.
- Afriastini, J. J. 2011. *Bertanam Kencur*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Ahdanisa.S.D, Sujana. E dan Wahyuni. S. 2014. Pengaruh tingkat protein ransum terhadap bobot potong, persentase karkas dan lemak abdominal puyuh jantan. *Jurnal Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Bandung*.
- Alim, M.N., H.D. Sunaryo dan Wurlina. 2012. Pengaruh pemberian susu afkir terhadap performa ayam pedaging jantan. *Skripsi Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Airlangga, Surabaya*.
- Anas. A. 2016. Efektivitas penggunaan ramuan herbal cair terhadap persentase karkas dan lemak abdominal broiler. *Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar*.
- Anastasia, Rica Silvi. 2018. pengaruh penambahan susu bubuk afkir dalam pakan terhadap berat karkas, lemak abdominal dan income over feed cost ayam pedaging. *Skripsi. Fakultas Peternakan. Universitas Brawijaya, Malang*.
- Anggoro, D., R. S. Rezki dan Siswarni. 2015. Ekstraksi multi tahap kurkumin dari temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb.) menggunakan pelarut etanol. *J. Teknik Kimia USU*. Vol. 4. No. 2.
- Badan Ketahanan Pangan (BKP). 2020. Neraca Bahan Makanan. Kerjasama Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta.
- Dian L. Bayoa, C.L.K Surayar, Marie Najoan dan W Utiah. 2014. Efektivitas penambahan tepung temulawak (*Curcuma Xanthorrhiza* Roxb) dan tepung temu putih (*Curcuma Zedoaria* Roxb) dalam ransum komersial terhadap performa ayam pedaging. *Jurnal Zootek* Vo. 134 No. 85-94. Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi, Manado.

- Dicky, A., dan Apriliana, E. 2016. Efek ekstrak temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) terhadap daya hambat pertumbuhan *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* secara *In Vitro*. *Jurnal Unila*, 1 (2).
- Dimas Dwi Dityas. 2017. Analisis pendapatan peternak ayam broiler dengan sistem mandiri dan sistem kemitraan studi kasus: desa sangala kec. dodok masihul kab. serdang bedagai. *Skripsi* Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Dewanti, R., Irham, M., dan Sudiyono. 2013. Pengaruh penggunaan eceng gondok (*eichornia crassipes*) terfermentasi dalam ransum terhadap persentase karkas, non-karkas dan lemak abdominal itik lokal jantan umur delapan minggu. *Buletin Peternakan*. Vol. 37 (1): 19-25.
- Dwi Kiat Puspitasari, Osfar Sjojfan, Eko Widodo. 2019. Pengaruh penambahan tepung bonggol pisang pada pakan terhadap berat karkas, persentase karkas, dan lemak abdominal ayam pedaging. *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang.
- Farida dan Nuni Rohaeni. 2020. Uji pertumbuhan dan hasil tanaman temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dengan berbagai media tanaman. Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur.
- Hatmi, R. U dan Febrianty. 2014. Kandungan kurkumin rimpang temulawak pada tingkat umur panen dan sistem pemupukan berbeda. *Prosiding Seminar Nasional Pertanian Organik*. 439-442, Yogyakarta.
- Hidayat, Cecep. 2015. Penurunan Deposit Lemak Abdominal pada Ayam Pedaging melalui Manajemen Pakan. Balai Penelitian Ternak. *Jurnal Wardoza* Vol 23. No.3:125-134.
- Iman Rahayu HS dan Cahyo Budiman. 2017. Pemanfaatan tanaman tradisional sebagai feed additive dalam upaya menciptakan budidaya ayam lokal ramah lingkungan. *Lokakarya Nasional Inovasi Teknologi Pengembangan Ayam Lokal*. IPB, Bandung.
- I M. Mastika, Astuti, I, dan G.A.M.K. Dewi. 2016. Performa broiler yang diberi ransum mengandung tepung kulit buah naga tanpa dengan dan *Aspergillusniger* terfermentasi. *Majalah Ilmiah Peternakan* 19(2): 65-70.


- Irianto, A. 2011. Pengaruh Pemberian Yoghurt Susu Afkir yang Diperkaya Nata de Coco dalam Mengendalikan Kolesterol Darah Tikus Putih. *Jurnal Penelitian. Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.*
- Kawiji, W. Atmaka. dan P. R. Oktaviana. 2011. Kajian kadar kurkuminoid, total fenol dan aktivitas antioksidan ekstrak temulawak (*Curcuma xanthorrhiza Roxb*) pada berbagai teknik pengeringan dan proporsi pelarutan. *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian*, 4(1): 32-40.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. <https://kemenag.go.id/> (Diakses Tanggal 26 Juni 2020).
- Kementrian Agama, 2018. <https://quran.kemenag.go.id/> (Diakses 26 November 2018)
- Khalid, K. 2011. An Overview of Lactic Acid Bacteria. *International Journal of Biosciences* Vol 1 (3): 1-13.
- Kiramang, K., dan Jufri, M. 2013. Pengaruh pemberian serbuk cengkeh (*Syzygium aromaticum*) pada ransum terhadap performan ayam ras pedaging (broiler). *Teknosains*, 7(2) : 219-230.
- Kiramang, K., Hidayat, M.N., Anas, A. Thaha A, H., Hafsan., Mappangangro, R. 2019. Efektivitas jamu cair dan frekuensi suplemen terhadap persentase bobot badan, persentase karkas dan lemak abdomen ayam pedaging. *Konferensi IOP. Ilmu Bumi dan Lingkungan* 247.
- Laili, Ulfiatul. 2013. Pengaruh pemberian temulawak (*Curcuma xanthorrhiza Roxb*) dalam bentuk kapsul terhadap kadar SGPT (*Serum Glutamat Piruvat Transaminase*) pada orang sehat. *Skripsi FMIPA. Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Madhupriya V, Shamsudeen P. Raj Manohar G, Senthilkumar S, Soundarapandian V, Moorthy M. 2018. *Int.J.Sci., Lingkungan dan Teknologi*. 7(3) 815-822.
- Massolo, R., A. 2017. Persentase karkas dan lemak abdominal broiler yang diberi prebiotik inulin umbi bunga dahlia (*Dahlia variabilis*). *Skripsi Fakultas Peternakan. Universitas Hasanuddin, Makassar.*
- Melindasari, D., B. Dwiloka. Suprijatna. 2015. Optimasi daun kayambang (*Salvinia molesta*) untuk penurunan kolesterol daging dan peningkatan kualitas asam lemak esensial. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan* 4 (1): 22-28.


- Nanda, G.K., H.D. Sunaryo, S.Herman, dan M. Imam. 2012. Pemanfaatan limbah susu afkir sebagai pakan tambahan pada pakan komersial terhadap persentase berat karkas dan lemak abdominal ayam pedaging jantan. *Jurnal Penelitian* Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Nurhidayati, L. dan Sulistiowati. 2013. Penetapan kadar eugenol dalam minyak atsiri dari tiga varietas bunga cengkeh (*Syzygium aromaticum*(L).Merr. & L.M. Perry) secara kromatografi gas. *Seminar Nasional dalam Rangka Lustrum X* Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.
- Pajri A, Jiyanto, Melia A.S. 2019. Persentase karkas, bagian karkas dan lemak abdominal broiler dengan suplementasi andaliman (*Zanthoxylum acanthopodium* DC) di dalam ransum. *J. Ternak Tropika* Vol 20, No. 2: 172-178.
- Pertiwi, M. E. D., I M. Mastika, dan I M. Nuriyasa. 2017. Pengaruh penggantian tepung ikan dengan susu afkir dalam ransum terhadap performa produksi dan pencernaan nutrien ayam buras jantan. *Jurnal Program Studi Magister Ilmu Peternakan* Fakultas Peternakan, Universitas Udayana. Denpasar.
- Prasetyorini, I. Y. Wiendarlina dan A. B. Peron. 2011. Toksisitas beberapa ekstrak rimpang cabang temulawak (*curcuma xanthorrhiza* roxb.) pada larva udang (*artemia salina* leach). *J. Fitofarmaka*. Vol 1. No. 2. Hal 14-21.
- Pratikno, H. 2011. Lemak Abdominal Ayam Broiler (*Gallus* sp.) Karena Pengaruh Ekstrak Kunyit (*Curcuma Domestica* Val). *Bioma*. Berkala Ilmiah Biologi. Vol. 13, No. 1. 17-24.
- Rahmanto. 2012. Struktur histologi usus halus dan efisiensi pakan ayam kampung dan ayam broiler. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rani Fatmaningsih, Riyanti dan Khaira Nova. 2016. Performa ayam pedaging pada sistem brooding konvensional dan thermos. *Jurnal Penelitian*. Department of Animal Husbandry, Faculty of Agriculture Lampung University Soemantri Brojonegoro, Lampung.
- Rasyaf. 2011. Panduan Beternak Ayam Pedaging. Edisi ke-15. Kanisius. Jakarta.
- Rosidi. 2016. Antioksidan potential of temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb). *Pakistan Journal of Nutrition*. 16(6): 556-560.

- Rusmin, R.A. 2014. Pemanfaatan susu skim sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk olahan makanan tradisional dangke dengan bantuan bakteri asam laktat. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Kesehatan. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Salam, S., Fatahillah, A., Sunarti, D dan Isroli. 2013. Bobot karkas dan lemak abdominal ayam broiler yang diberi tepung jintan hitam (*nigella sativa*) dalam ransum selama musim panas. *Jurnal Sains Peternakan*. 11(2): 84-89. Fakultas peternakan Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Santosa, H., Sudaryani, T., Rahayu, I. 2011. *Panduan Lengkap Ayam*. Penebar Swadaya. Hal: 103-120. Jakarta.
- Setiadi, D., N. Khaira dan T. Syahrio. 2011. Perbandingan bobot hidup, karkas, giblet, dan lemak abdominal ayam jantan tipe medium dengan strain berbeda yang diberi ransum komersial broiler. *Skripsi*. Jurusan Peternakan. Fakultas Pertanian. Universitas Lampung, Lampung.
- Sosiwan B., I Gusti A.S.R., Ni Ketu M. 2018. Pemakaian sorghum (*Sorghum bicolor l.*) sebagai bahan substitusi jagung (*Zea mays l.*) pada ransum terhadap berat bagian karkas ayam broiler umur 6 minggu. *Jurnal warmadewa* Vol. 23 NO. 2. Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan. Universitas Warmadewa Denpasar, Bali.
- Sri Jumiaty, Nuraini dan Aka. Rahim. 2017. Produksi Karkas, Giblet dan Lemak Abdominal Ayam Broiler yang diberi Feed Additive Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) Dalam Pakan. *Jurnal Penelitian*. Jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan. UHO, Kendari.
- Standarisasi Nasional Indonesia. 2006. *Pakan Ayam Ras Pedaging (Broiler Starter dan Finisher)*. SNI 01-3930-2006.
- Subekti K., H. Abbas., K.A. Zura. 2012. Kualitas Karkas (Berat Karkas, Persentase Karkas Dan Lemak Abdomen) Ayam Broiler yang Diberi Kombinasi CPO (Crude Palm Oil) dan Vitamin C (Ascorbic Acid) dalam Ransum sebagai Anti Stress. *Jurnal Peternakan Indonesia*. 14 (3): 447-453.
- Tampubolon dan Bintang. 2012. Pengaruh imbalanced energi dan protein ransum terhadap energi metabolis dan retensi nitrogen ayam broiler. *Jurnal Jip Biol*. 1(2) : 1-5.

- Trisno A. W., Wati, Suhadi M. 2020. Pengaruh penambahan tepung temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*) dalam ransum terhadap performa produksi ayam kampung unggul balitnak. *Jurnal Wahana Peternakan* Vol. 4 No.1. Universitas Tulang Bawang Lampung, Lampung.
- Tumiran M. John E.G.R., Jet S.M., Fredy J, Nangoy, Jola M.R.L. Potongan komersial karkas ayam broiler strain *Cobb* yang mengalami pembatasan pakan dan pemberian sumber serat kasar berbeda pada periode *Grower*. *Jurnal zootec* Vol. 39 No.1: 122-133. Fakultas Peternakan. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Ulfa, M. L., dan Djunaidi, I. H. 2019. Substitusi tepung bonggol pisang dan *indigofera sp* sebagai pengganti bekatul dalam ransum untuk meningkatkan performa ayam broiler. *Jurnal. Nutrisi Ternak Tropis* , 2 (2), 65-72.
- Umam, M. K., Prayogi, S. H., dan Nurgi Artiningsih, V. M. A. 2015. Penampilan produksi ayam pedaging yang dipelihara pada sistem pemeliharaan lantai kandang panggung dan kandang bertingkat. *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan*. 24(3): 79-87.
- Umiarti, T.A. *Manajemen Pemeliharaan Broiler*. Pustaka Larasan. 2020.
- Wahyono, F. 2012. Pemberian orok orok (*Crotalaria usaramoensis*) pada ransum burung puyuh periode layer terhadap lemak abdominal dan lemak telur. *Jurnal*. Vol. 1. No. 1.
- Wati. A.K, Zuprizal, Kustantinah, E. Indarto, N.D. Dono, Wi Handoyo. 2018. Performa ayam broiler dengan penambahan tepung daun calliandra calothyrsus dalam pakan. *Jurnal Sains dan Teknologi* Vol. 16 (2): 74-79. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Witantra. 2011. Pengaruh pemberian lisin dan metionin terhadap persentase karkas dan lemak abdominal pada ayam pedaging asal induk bibit muda dan induk bibit tua. *Artikel Ilmiah*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Yemima. 2014. Analisis usaha peternakan ayam broiler pada peternakan rakyat di desa karya bakti, kecamatan ruangan, kabupaten gunung mas, provinsi Kalimantan tengah. *Jurnal Ilmu Hewani Tropika* 3(1): 27-32.
- Yuli Frita Ayuningtyas. 2014. Pengaruh penambahan tepung bawang putih (*Allium sativum*) sebagai aditif terhadap penampilan produksi ayam pedaging. *Jurnal Ternak Tropika* Vol. 15. No.1: 21-30. Universitas Brawijaya, Malang.

Yustin Golla, M.E.R Montong, Jacqueline T. Laihand, Godlief D.G Rembet. 2014.
Jurnal Zootek Vol. 34 No. 115-123. Fakultas Peternakan Universitas Sam
Ratulangi, Manado.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
N

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Descriptive Analisis Ragam Penambahan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak (*Curcuma xantorrhiza* Roxb) dalam Pakan Terhadap Persentase Karkas Ayam Broiler.

Descriptives Statistics				
Perlakuan T	Perlakuan S	Mean	Std. Deviation	N
T0	S0	68.0318	1.11356	2
	S1	69.3319	1.71887	2
	S2	68.7604	.52236	2
	S3	68.8085	2.84568	2
	Total	68.7331	1.42822	8
T1	S0	67.3036	4.06790	2
	S1	68.7663	1.00735	2
	S2	71.6645	.12240	2
	S3	68.9103	2.00781	2
	Total	69.1612	2.43431	8
T2	S0	68.9063	.19466	2
	S1	67.7290	2.55787	2
	S2	69.0621	.90941	2
	S3	68.5466	.53732	2
	Total	68.5610	1.18454	8
Total	S0	68.0806	2.01998	6
	S1	68.6091	1.62206	6
	S2	69.8290	1.50420	6
	S3	68.7551	1.58485	6
	Total	68.8184	1.70816	24

ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 2. Hasil Analisis Ragam Penambahan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak (*Curcuma xantorrhiza* Roxb) dalam Pakan Terhadap Persentase Karkas Ayam Broiler.

ANOVA

Source	Type III Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	25.239 ^a	11	2.294	.658	.752
Intercept	113663.471	1	113663.471	32575.757	<.001
T	1.528	2	.764	.219	.806
S	9.681	3	3.227	.925	.458
T * S	14.030	6	2.338	.670	.676
Error	41.870	12	3.489		
Total	113730.581	24			
Corrected Total	67.110	23			

a. R Squared = .376 (Adjusted R Squared = -.196)

Lampiran 3. Hasil Descriptive Analisis Ragam Penambahan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak (*Curcuma xantorrhiza* Roxb) dalam Pakan Terhadap Persentase Lemak Abdominal Ayam Broiler.

Descriptive Statistics

Perlakuan T	Perlakuan S	Mean	Std. Deviation	N
T0	S0	1.8926	.12483	2
	S1	2.2489	.09343	2
	S2	1.7436	.00436	2
	S3	1.9591	.14366	2
	Total	1.9611	.21200	8
T1	S0	1.7338	.00155	2
	S1	1.7084	.14415	2
	S2	1.6925	.25018	2
	S3	1.6813	.09597	2
	Total	1.7040	.11692	8
T2	S0	1.2866	.23848	2
	S1	1.4650	.50440	2
	S2	1.5946	.09316	2
	S3	1.5719	.27545	2
	Total	1.4795	.27104	8

Total	S0	1.6377	.30576	6
	S1	1.8074	.43080	6
	S2	1.6769	.13729	6
	S3	1.7374	.23025	6
	Total	1.7149	.28388	24

Lampiran 4. Hasil Analisis Ragam dan Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) Penambahan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak (*Curcuma xantorrhiza* Roxb) dalam Pakan Terhadap Persentase Lemak Abdominal Ayam Broiler.

ANOVA

Dependent Variable: Persentase Lemak Abdominal

Source	Type III Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	1.320 ^a	11	.120	2.700	.051
Intercept	70.578	1	70.578	1587.798	<.001
T	.929	2	.465	10.450	.002
S	.099	3	.033	.741	.548
T * S	.292	6	.049	1.096	.418
Error	.533	12	.044		
Total	72.431	24			
Corrected Total	1.854	23			

a. R Squared = .712 (Adjusted R Squared = .448)

Uji BNT atau LSD

Dependent Variable: Persentase Lemak Abdominal

	(I) Perlakuan T	(J) Perlakuan T	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	T0	T1	.2571*	.10542	.031	.0274	.4867
		T2	.4816*	.10542	<.001	.2519	.7112
	T1	T0	-.2571*	.10542	.031	-.4867	-.0274
		T2	.2245	.10542	.055	-.0052	.4542
	T2	T0	-.4816*	.10542	<.001	-.7112	-.2519
		T1	-.2245	.10542	.055	-.4542	.0052

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .044.

*, The mean difference is significant at the .05 level.

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: Pembuatan Sekat dan Pemasangan Sekat



Gambar 2: Pemeliharaan Pad Masa *Brooding*



Gambar 3: Pencampuran Pakan dengan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak Serta Penimbangan Pakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar 4: Pengisian Tempat Air Minum, Pemberian Air Minum dan Pemberian Pakan



Gambar 5: Penimbangan Sisa Pakan dan Penimbangan Ayam Broiler



Gambar 6: Proses Penyembelihan dan Pematangan Karkas Ayam Broiler



Gambar 7: Penimbangan Karkas dan Lemak Abdominal Ayam Broiler



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN (UIN) MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN ILMU PETERNAKAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II : Jl. H.M.Yasin Limpo No. 36, Romang polog-Gowa, (0411) 882862

SURAT KETERANGAN UJI PLAGIARISME

Nomor Paper: 1685424440/XII/2021

Pengelola Jurnal/karya tulis ilmiah Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:


Nama	: Muttahida
NIM	: 60700117052
Program	: Strata I (S1)
Jurusan	: Ilmu Peternakan
Pembimbing	: 1. Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P 2. drh. Aminah Hajah Thaha., M.Si

Judul Skripsi:

Pengaruh Penambahan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak (*Cucurma Xanthorrhiza Roxb*) dalam Ransum Terhadap Persentase Karkas dan Lemak Abdominal Ayam Broiler


Dinyatakan telah diperiksa/dicek dengan menggunakan Aplikasi pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dengan hasil uji Plagiasi sebesar **21%**. Demikian Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian Skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan


Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P
NIP. 19750909 200912 1 001

Gowa, 1 Desember 2021

Tim Uji Plagiasi


Muh. Arsan Jamili, S.Pt., M.Si.
NIP. 19891217 201903 1 012

Catatan:	
1-24%	: "Tidak Terindikasi Plagiat"
25-49%	: "Revisi Minor, Konsultasikan dengan Pembimbing"
50-74%	: "Revisi Mayor, Konsultasikan dengan pembimbing"
75-100%	: "Revisi Total"

Pengaruh_Penambahan_Susu_Bubuk_Afkir_dan_Temulawak...

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

21 %
INTERNET SOURCES

11 %
PUBLICATIONS

7 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
2	ojs.uho.ac.id Internet Source	1%
3	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	core.ac.uk Internet Source	1%
7	id.123dok.com Internet Source	1%
8	Yustin Golla, M E.R Montong, Jacqueline T Laihad, Godlief D.G Rembet. "Penambahan Tepung Rimpang Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) dan Tepung Rimpang Temu Putih (Curcuma zedoaria Rosc) dalam Ransum	1%

Komersial Terhadap persentase Karkas, Lemak Abdomen, Dan Persentase Hati Pada Ayam Pedaging.", ZOOTEK, 2014

Publication

9	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
10	M. P. Alhadi, E. Erwan, Elviriadi Elviriadi, M. Rodiallah. "Efek pemberian Air rebusan Kunyit (Curcuma Domestica) dan Daun Sirih di dalam air minum (Piper betle linn) dan kombinasi keduanya terhadap bobot karkas dan lemak abdominal ayam Broiler", Jurnal Sain Peternakan Indonesia, 2021 Publication	1 %
11	eprints.mercubuana-yogya.ac.id Internet Source	1 %
12	journal.unhas.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1 %
15	www.neliti.com Internet Source	<1 %
16	repo.unand.ac.id Internet Source	

<1 %

17 docplayer.info
Internet Source

<1 %

18 aguskrisnoblog.wordpress.com
Internet Source

<1 %

19 jurnal.unpad.ac.id
Internet Source

<1 %

20 hodomatamuali.blogspot.com
Internet Source

<1 %

21 intannursiam.wordpress.com
Internet Source

<1 %

22 jurnalpolitanipyk.ac.id
Internet Source

<1 %

23 Yolanda S. Mait, J.E.G. Rompis, B. Tulung, J. Laihad, J.J.M.R. Londok. "PENGARUH PEMBATASAN PAKAN DAN SUMBER SERAT KASAR BERBEDA TERHADAP BOBOT HIDUP, BOBOT KARKAS DAN POTONGAN KOMERSIAL KARKAS AYAM BROILER STRAIN LOHMAN", ZOOTEK, 2019
Publication

<1 %

24 Submitted to Politeknik Negeri Banyuwangi
Student Paper

<1 %

25 savana-cendana.id
Internet Source

<1 %

26

ternaktropika.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

27

seminar.fpp.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

28

jurnal.untad.ac.id

Internet Source

<1 %

29

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

30

Veny Joanet Salombre, Marie Najoan,
Florenca N. Sompie, Meity R. Imbar.
"PENGARUH PENGGUNAAN SILASE KULIT
PISANG KEPOK (*Musa paradisiaca*
formatypica) SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN
JAGUNG TERHADAP KARKAS DAN VISCERA
BROILER", ZOOTEK, 2017

Publication

<1 %

31

ojs.unida.ac.id

Internet Source

<1 %

32

www.pelitabrunei.gov.bn

Internet Source

<1 %

33

adoc.pub

Internet Source

<1 %

34

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

		<1 %
35	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
36	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %
37	hozir.org Internet Source	<1 %
38	silviapharmacy.wordpress.com Internet Source	<1 %
39	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
40	ar.scribd.com Internet Source	<1 %
41	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
42	www.biogas-energi.biz Internet Source	<1 %
43	www.epetani.com Internet Source	<1 %
44	abunali84.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	ejournal.uhn.ac.id Internet Source	<1 %

46	Martha Ludigadris Amleni, Charles V. Lisnahan, Gerson F. Bira. "The pengaruh Suplementasi DL-Methionine terhadap Berat Hidup, Berat Karkas dan Konversi Pakan Ayam Broiler", JAS, 2020 Publication	<1 %
47	Sulastri G. Pontoh, J. Mandey, F.R. Wolayan, Y. Kowel. "PENGARUH PEMANFAATAN BONGGOL PISANG SEPATU (Musa paradisiaca L) DALAM RANSUM TERHADAP PERSENTASE KARKAS DAN LEMAK ABDOMINAL AYAM BROILER", ZOOTEK, 2019 Publication	<1 %
48	data.lipi.go.id Internet Source	<1 %
49	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
50	es.scribd.com Internet Source	<1 %
51	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
52	media.neliti.com Internet Source	<1 %
53	ngabuburitan.blogspot.com Internet Source	<1 %
	ojs.unud.ac.id	

54

Internet Source

<1 %

55

smartlib.umri.ac.id

Internet Source

<1 %

56

Mursye N. Regar, Youdhie H.S. Kowel, Merci R. Waani. "PERSENTASE KARKAS DAN LEMAK ABDOMEN BROILER YANG DIBERI PAKAN KOMBINASI HERBAL DENGAN MINERAL ZINK", ZOOTEK, 2019

Publication

<1 %

57

Anwar Efendi Harahap. "PENAMBAHAN TEPUNG LIMBAH UDANG DALAM RANSUM BASAL TERHADAP KARKAS AYAM PEDAGING", JURNAL PETERNAKAN NUSANTARA, 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Pembimbing I



Khaerani Kiramang S. Pt. M.P.
NIP. 19730828 200604 2001























Pembimbing II



drh. Aminah Hajah Thaha. M. Si.
NIP. 19820913 200804 2002


KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muttahida
 NIM : 60700117052
 Jurusan : Ilmu Peternakan
 Judul Skripsi : Pengaruh Penambahan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dalam Ransum Terhadap Persentase Karkas dan Lemak Abdominal Ayam Broiler
 Pembimbing I : Khaerani Kiramang, S.Pt.,M.P.

No	Hari/Tanggal	Uraian	Paraf	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Rabu, 23 Desember 2021	Konsultasi judul		
2	Senin, 26 Januari 2021	Konsultasi 1 : Bab 1, 2 dan 3		
3	Kamis, 11 Februari 2021	Konsultasi 2 : Bab 1, 2 dan 3		
4	Rabu, 24 Februari 2021	Konsultasi 3 : Bab 1, 2 dan 3		
5	Selasa, 09 Maret 2021	Seminar proposal		
6	Sabtu, 20 Maret 2021	Konsultasi revisi proposal berdasarkan saran-saran dari penguji		
7	Minggu, 20 Juni 2021	Analisis data penelitian dan interpresentasinya		
8	Jumat, 02 Juli 2021	Konsultasi 1 : Hasil, Pembahasan dan Kesimpulan		
9	Minggu, 04 Juli 2021	Konsultasi 2 : Hasil, Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar pustaka		
10	Selasa, 06 Juli 2021	Konsultasi 3 : Skripsi Lengkap		
11	Kamis, 15 Juli 2021	Seminar Hasil Penelitian		
12	Selasa, 03 Agustus 2021	Konsultasi revisi hasil penelitian berdasarkan saran-saran penguji		
13	Kamis, 12 Agustus 2021	Ujian Munaqasyah		














Samata, 29 November 2021

Mengetahui
Ketuan Jurusan Ilmu Peternakan


Dr. Muhammad Nur Hidavat, S.Pt., M.P.
 NIP. 19750909 200912 1 001


KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muttahida
NIM : 60700117052
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul Skripsi : Pengaruh Penambahan Susu Bubuk Afkir dan Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dalam Ransum Terhadap Persentase Karkas dan Lemak Abdominal Ayam Broiler
Pembimbing II : drh. Aminah Hajah Thaha, M.Si

No	Hari/Tanggal	Uraian	Paraf	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Rabu, 30 Desember 2021	Konsultasi judul		
2	Selasa, 26 Januari 2021	Konsultasi 1 : Bab 1, 2 dan 3		
3	Senin, 15 Februari 2021	Konsultasi 2 : Bab 1, 2 dan 3		
4	Rabu, 24 Februari 2021	Konsultasi 3 : Bab 1, 2 dan 3		
5	Selasa, 09 Maret 2021	Seminar proposal		
6	Sabtu, 20 Maret 2021	Konsultasi revisi proposal berdasarkan saran-saran dari penguji		
7	Jumat, 25 Juni 2021	Analisis data penelitian dan interpresentasinya		
8	Jumat, 02 Juli 2021	Konsultasi 1 : Hasil, Pembahasan dan Kesimpulan		
9	Senin, 05 Juli 2021	Konsultasi 2 : Hasil, Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar pustaka		
10	Rabu, 07 Juli 2021	Konsultasi 3 : Skripsi Lengkap		
11	Kamis, 15 Juli 2021	Seminar Hasil Penelitian		
12	Rabu, 04 Agustus 2021	Konsultasi revisi hasil penelitian berdasarkan saran-saran penguji		
13	Kamis, 12 Agustus 2021	Ujian Munaqasyah		

Samata, 29 November 2021

Mengetahui
Ketuan Jurusan Ilmu Peternakan


Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.
NIP. 19750909 200912 1 001



UIN ALAUDDIN
MAKASSAR

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2215 TAHUN 2020

TENTANG


PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA MUTTAHIDA JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar tanggal 27 November 2020 tentang Penerbitan SK Pembimbing mahasiswa atas nama Muttahida NIM 60700117052, Untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : "Pengaruh Penambahan Susu Bukbuk Afkir Dalam Ransum Terhadap Berat Karkas Ayam Broiler"
 - Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Dekan.
 - Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 - Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 226.D tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

Pemrakarsa	Kasubag. Akademik
Paraf : 	Paraf: 

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI ATAS NAMA **MUTTAHIDA** JURUSAN **ILMU PETERNAKAN** FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk saudara :
1. Khaerani Kiramang, S. Pt., M.P. sebagai Pembimbing Pertama,
 2. drh. Aminah Hajah Thaha, M.Si. sebagai Pembimbing Kedua,
- KEDUA : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Gowa
Pada Tanggal 2 Desember 2020

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI

RIWAYAT HIDUP



Muttahida 60700117052, lahir di Bulukumba 29 Juni 1999. Lahir dari pasangan suami istri Ayahanda bernama Iskandar dan Ibunda bernama Herlina, merupakan anak kedua dari dua bersaudara, Kakaknya bernama Muqaffi. Pendidikan awal di SD Negeri 265 Bintarore tamat tahun 2011, selanjutnya sekolah di SMP Negeri 4 Bulukumba tamat tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA

Negeri 8 Bulukumba tamat tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi di tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ke jenjang S1 pada jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi melalui jalur UMM. Berkat kerja keras dan ketekunannya peneliti akan menyelesaikan kuliah Srata satu (S1) pada tahun 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R