

**PENGARUH TERAPI BERMAIN TERHADAP RESPON KECEMASAN  
ANAK USIA PRA SEKOLAH DI RUANG PERAWATAN ANAK RSUD  
SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Prodi Keperawatan  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**YUSNITA PRATIWI**  
**NIM. 703 001 080 95**

**JURUSAN KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2012**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya penyusun ini sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 8 Agustus 2012

Penyusun,

**Yusnita Pratiwi**  
**NIM. 70300108095**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Pengaruh Terapi Bermain Terhadap Respon Kecemasan Anak Usia Pra Sekolah di Ruang Perawatan Anak RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa**” yang disusun oleh **Yusnita pratiwi, NIM : 70300108095**, Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian skripsi yang diselenggarakan pada hari **Kamis 09 Agustus 2012 M**, bertepatan dengan **20 Ramadhan 1433 H** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 09 Agustus 2012 M  
20 Ramadhan 1433 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr.dr.H.Rasjidin Abdullah,MPH,MH.Kes  
(.....)

Sekretaris : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si, Apt (.....)

Pembimbing I : Kasse Taddaga, S.Kep, Ns, M.Kes (.....)

Pembimbing II: Arbianingsih, S.Kep, Ns, M.Kes (.....)

Penguji I : Hj. Patmawati, S.Kp, M.Kes (.....)

Penguji II : Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si (.....)

**Diketahui:**  
**Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan**  
**UIN Alauddin Makassar**

**Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes**  
**NIP. 19530119 1981 101001**

**ABSTRAK**

**NAMA : YUSNITA PRATIWI**  
**NIM : 703 001 08095**  
**JUDUL : PENGARUH TERAPI BERMAIN TERHADAP RESPON  
KECEMASAN ANAK USIA PRA SEKOLAH DI RSUD  
SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA 2012**  
**(dibimbing oleh Kasse Taddaga dan Arbiansih)**

---

Kecemasan merupakan respon yang paling sering muncul pada anak dengan hospitalisasi. Setiap anak yang dirawat di rumah sakit akan memperlihatkan kecemasan tergantung dari karakter anak pra sekolah, karena itu untuk menurunkan respon kecemasan anak maka diperlukan perawatan dengan memberikan permainan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi bermain terhadap respon kecemasan anak usia pra sekolah.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pra experiment* dengan *one-group pre-post test design*. Dengan terlebih dahulu melakukan pengukuran *pre test* terhadap respon kecemasan anak, lalu memberikan intervensi berupa permainan kemudian dilakukan lagi pengukuran *post test*. Adapun uji statistik yang digunakan adalah uji *wilcoxon test* dengan pengelolaan data program SPSS versi 17. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak yang dirawat di ruang perawatan anak RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Sampel adalah semua anak usia prasekolah yang sesuai dengan kriteria inklusi/eksklusi dipilih dengan menggunakan *teknik consecutive sampling* sebanyak 20 orang.

Berdasarkan analisis Uji *Wilcoxon Test* didapatkan hasil  $p = 0,008 < 0,05$  berarti ada pengaruh terapi bermain terhadap respon kecemasan pada anak usia pra sekolah ini disebabkan adanya perlakuan terapi bermain sehingga anak dengan mudah mengkomunikasikan perasaan cemasnya selama di rumah sakit yang dapat menurunkan respon kecemasan pada anak.

Terapi bermain dapat menurunkan respon kecemasan pada anak usia pra sekolah. Oleh karena itu disarankan pada pihak rumah sakit dan tenaga perawat agar dapat menerapkan terapi bermain dan sebagai bahan dan sumber data penelitian berikutnya dan mendorong bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

**Kata kunci : Terapi bermain, respon kecemasan**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul *Pengaruh Terapi Bermain terhadap Respon Kecemasan Anak Usia Pra Sekolah di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2012*, dapat diselesaikan dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan Universitas Islam Negeri Makassar. Tidak lupa pula kami haturkan salam dan taslim kepada baginda besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya yang telah membawa ajaran islam kepada kita semua.

Kupersembahkan skripsi ini terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Mursaling, S.Pd dan Ibunda Erling. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, kasih sayang, dukungan, semangat, dan do'a restu disetiap langkah ini, yang tidak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar, kiranya amanah yang diberikan pada penulis tidak sia-sia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat hambatan mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penelitian. Namun Alhamdulillah atas bimbingan, arahan, kerja sama, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Bapak Dr. Dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH., Kes selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan dukungan berupa kemudahan izin dalam hal penyusunan skripsi ini.
3. Ibunda Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M. Kes dan Bapak Muh. Anwar Hafid, S. Kep, Ns, M. Kes selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan, arahan, motivasi, dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
4. Penghargaan penulis yang setinggi-tingginya dengan hati yang tulus kepada Bapak Kasse Taddaga, S. Kep, Ns, M. Kes sebagai pembimbing satu dan Ibu Arbiansih, S. Kep, Ns, M. Kes selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan nasehatnya untuk membimbing penulis sejak awal rencana penelitian hingga terselesainya skripsi ini.
5. Kepada Ibunda Patmawati, S. Kep, Ns, M. Kes dan Bapak Drs. Syamsul Bahri, M. Si selaku tim penguji yang telah meluangkan waktu dan memberi saran serta kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu staf Administrasi Tata Usaha yang senantiasa sabar membantu segala kebutuhan perkuliahan.
7. Bapak kepala KESBANG Kab. Gowa yang telah memberikan izin penelitian.

8. Ibu kepala Dinas Kesehatan Kab. Gowa yang telah memberikan izin memperoleh data.
9. Direktur RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa yang telah memberikan izin untuk memperoleh data dan melakukan penelitian di institusinya.
10. Bapak/Ibu Kepala ruangan serta seluruh perawat di ruang perawatan anak RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon do'a dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian dimasyarakat nantinya. Insya Allah, Amin.

Makassar, Juli 2012

Yusnita Pratiwi

## DAFTAR ISI

|                        |  |           |
|------------------------|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....     |  | i         |
| ABSTRAK .....          |  | ii        |
| KATA PENGANTAR .....   |  | iii       |
| DAFTAR ISI.....        |  | vi        |
| DAFTAR TABEL.....      |  | viii      |
| DAFTAR SINGKATAN ..... |  | ix        |
| <b>BAB I</b>           | <b>PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
|                        | A. Latar Belakang .....  | 1         |
|                        | B. Rumusan Masalah .....   | 4         |
|                        | C. Tujuan Penelitian.....  | 4         |
|                        | D. Manfaat Penelitian.....                                       | 5         |
| <b>BAB II</b>          | <b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                     | <b>7</b>  |
|                        | A. Tinjauan Umum Tentang Kecemasan Anak Usia<br>Pra Sekolah..... | 7         |
|                        | B. Tinjauan Umum Tentang Terapi Bermain .....                    | 19        |
|                        | C. Tinjauan Umum Tentang Anak Usia Pra Sekolah .....             | 21        |
|                        | D. Tinjauan Umum Tentang Hospitalisasi .....                     | 29        |
| <b>BAB III</b>         | <b>KERANGKA KONSEP PENELITIAN .....</b>                          | <b>32</b> |
|                        | A. Kerangka Konsep .....   | 32        |
|                        | B. Defenisi Operasional .....                                    | 34        |
|                        | C. Hipotesis Penelitian.....                                     | 34        |

|        |                                      |    |
|--------|--------------------------------------|----|
| BAB IV | METODE PENELITIAN .....              | 35 |
|        | A. Desain Penelitian .....           | 35 |
|        | B. Tempat dan Waktu Penelitian ..... | 35 |
|        | C. Populasi dan Sampel.....          | 35 |
|        | D. Cara Pengumpulan Data .....       | 37 |
|        | E. Proses Pengambilan Data .....     | 37 |
|        | F. Instrumen Pengumpulan Data .....  | 38 |
|        | G. Pengolahan Data.....              | 38 |
|        | H. Analisa Data .....                | 39 |
|        | I. Etika Penelitian.....             | 39 |
| BAB V  | HASIL DAN PEMBAHASAN.....            | 41 |
|        | A. Hasil Penelitian .....            | 41 |
|        | B. Pembahasan.....                   | 45 |
| BAB VI | KESIMPULAN DAN SARAN.....            | 56 |
|        | A. Kesimpulan .....                  | 56 |
|        | B. Saran.....                        | 56 |
|        | DAFTAR PUSTAKA .....                 | 58 |
|        | LAMPIRAN                             |    |

**DAFTAR TABEL**

- TABEL.5.1 Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan umur
- TABEL.5.2 Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
- TABEL.5.3 Distibusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan respon kecemasan pre test dan post test
- TABEL.5.4 Distribusi pengaruh terapi bermain terhadap respon kecemasan pre test dan post test



## SINGKATAN

| Singkatan | Lambang                                |
|-----------|--|
| <         | Kurang Dari                            |
| >         | Lebih Dari                             |
| $\leq$    | Kurang dari sama dengan                |
| $\geq$    | Lebih dari sama dengan                 |
| A         | Alpa                                   |
| %         | Persen                                 |
| P         | Nilai Statistik                        |
| df        | Derajat Kebebasan                      |
| n         | Sampel                                 |
| HARS      | Hamilton Anxiety Rating Scale          |
| SPSS      | Statistical Package for Social Science |
| No        | Nomor                                  |
| GABA      | Gamma Aminobutirat                     |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan individu yang unik dan bukan orang dewasa mini. Anak juga bukan merupakan harta atau kekayaan orang tua yang dapat dinilai secara sosial ekonomi, melainkan masa depan bangsa yang berhak atas pelayanan kesehatan secara individual dan masih bergantung pada orang dewasa dan lingkungannya, artinya membutuhkan lingkungan yang dapat memfasilitasi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk belajar mandiri (Supartini, 2004).

Seperti kita ketahui bahwa anak adalah potensi dan penerus cita-cita bangsa, yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Melalui proses pertumbuhan dan perkembangan sistem susunan saraf pusat pada anak, maka anak mempunyai peningkatan keterampilan. Kemampuan untuk menggunakan keterampilan ini dapat menciptakan interaksi dengan lingkungan (Suherman, 2000).

Usia prasekolah merupakan masa kritis dalam tahap perkembangan. Pada tahap ini anak telah mampu menggunakan simbol-simbol yaitu menggunakan kata-kata, mengingat masa lalu, sekarang dan yang akan terjadi, termasuk kemampuan anak dalam belajar mengendalikan, memanipulasi lingkungan seperti kemampuan adaptasi terhadap hospitalisasi yang dipengaruhi oleh lamanya dirawat di rumah sakit, dukungan dan fasilitas

dari keluarga, pengalaman hospitalisasi sebelumnya, rekreasi dan aktivitas bermain anak (Rudolp, 2002)

Hospitalisasi merupakan suatu proses yang karena suatu alasan yang berencana atau darurat, mengharuskan anak untuk tinggal di Rumah Sakit, menjalani terapi dan perawatan sampai pemulangannya kembali ke rumah. Selama proses hospitalisasi diartikan adanya beberapa penelitian dengan pengalaman yang sangat traumatik dan penuh dengan kecemasan, namun tidak setiap anak mengalami kecemasan akibat hospitalisasi. Kecemasan yang dialami oleh masing-masing anak sangat bervariasi dan membawa dampak yang berbeda-beda sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak, terlebih anak usia prasekolah. (Potter dan Perry, 2006)

Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al Yusuf/12:86

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

Terjemahnya:

Ya'qub menjawab: "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya."

Ayat di atas menjelaskan bahwa kecemasan yang timbul sering dihubungkan dengan adanya kekhawatiran dalam menghadapi situasi yang sebelumnya tidak perlu dikhawatirkan. Gangguan kecemasan dianggap berasal dari suatu mekanisme perubahan diri yang di pilih secara alamiah oleh makhluk hidup bila menghadapi sesuatu yang mengancam dan berbahaya. Kecemasan yang dialami dalam situasi semacam ini memberi syarat kepada makhluk hidup

agar memberikan tindakan mempertahankan diri untuk menghindari atau mengurangi bahaya dan ancaman, menjadi cemas pada tingkat tertentu dapat dianggap sebagai bagian dari respon normal untuk mengatasi masalah sehari-hari.

Bermain merupakan metode bagaimana anak mengenal dunia. Bermain tidak sekedar mengisi waktu tetapi merupakan kebutuhan anak seperti halnya makanan, perawatan dan cinta kasih. Anak memerlukan berbagai variasi permainan untuk kesehatan fisik, mental dan perkembangan emosinya. Anak tidak sekedar melompat, melempar atau berlari tetapi mereka bermain menggunakan seluruh emosi, perasaan dan pikirannya (Supartini, 2004).

Permainan yang terapeutik didasari oleh pandangan bahwa bagi anak merupakan aktivitas yang sehat dan diperlukan untuk kelangsungan tumbuh kembang anak dan memungkinkan untuk dapat mengalihkan dan mengekspresikan perasaan dan pikiran anak, mengalihkan perasaan nyeri dan relaksasi (Supartini, 2004).

Terapi bermain memungkinkan klien mengembangkan mekanisme penyelesaian masalah dan adaptasi dan diharapkan dapat menyediakan lingkungan yang aman dan penerimaan sehingga klien anak bebas mengekspresikan ketakutan dan kecemasannya (Landert, 2001).

Agar hal tersebut bisa dihindari anak perlu mendapatkan suatu media yang dapat mengekspresikan perasaan tersebut, media yang paling efektif adalah melalui terapi bermain (Supartini, 2004).

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa, bahwa jumlah anak yang dirawat di ruang perawatan anak selama dua tahun terakhir yaitu, tahun 2010 pasien anak yang dirawat berjumlah 2807 dan pada tahun 2011 pasien anak yang dirawat berjumlah 2816. Berdasarkan hasil observasi saat pengambilan data awal diketahui bahwa rata-rata anak yang di rawat mengalami dampak Hospitalisasi dengan reaksi seperti menangis, takut, cemas dan tidak kooperatif dengan petugas kesehatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian adalah

“Apakah ada Pengaruh Terapi Bermain Terhadap Respon Kecemasan Anak Usia Prasekolah Di Ruang Perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Diketuinya pengaruh terapi bermain terhadap tingkat kecemasan anak usia prasekolah di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Diketuinya tingkat kecemasan anak usia pra sekolah yang mengalami hospitalisasi sebelum dilakukan terapi bermain
- b. Diketuinya tingkat kecemasan anak usia pra sekolah yang mengalami hospitalisasi setelah dilakukan terapi bermain

- c. Diketuainya pengaruh terapi bermain terhadap tingkat kecemasan anak usia pra sekolah yang mengalami hospitalisasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian tentang pengaruh terapi bermain terhadap respon kecemasan anak usia prasekolah di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2012, maka hasil penelitian akan bermanfaat bagi:

##### **1. Manfaat Teoritis**


- a. Sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai dokumen bahan bacaan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait untuk menentukan langkah yang tepat dalam rangka pelaksanaan program terapi bermain sebagai upaya meningkatkan kemampuan adaptasi anak.
- c. Sebagai masukan bagi profesi keperawatan pada lahan penelitian terkait menentukan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- d. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya bagi orang tua yang memiliki anak yang di rawat di Rumah Sakit agar dapat meningkatkan kemampuan adaptasi dengan adanya terapi bermain.
- e. Sebagai pengalaman yang berharga dalam memperluas wawasan dan pengetahuan melalui penelitian lapangan.

## 2. Manfaat Praktisi

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar mengetahui bahwa terapi bermain dapat mengurangi respon kecemasan pada anak yang dirawat di rumah sakit.

## 3. Manfaat Ilmiah

Sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya untuk menentukan langkah yang tepat dalam rangka pelaksanaan program terapi bermain sebagai upaya untuk menurunkan respon kecemasan anak selama dirawat di rumah sakit.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kecemasan Anak Pra Sekolah**

##### 1. Definisi Kecemasan

Kecemasan adalah gangguan alam perasaan (*affective*) yang ditandai dengan perasaan ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas (*Reality Testing Ability/RTA*, masih baik), kepribadian masih tetap utuh (tidak mengalami keretakan kepribadian/*splitting of personality*), perilaku dapat terganggu tapi masih dalam batas-batas normal. (Hawari, 2001)

Kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan person tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik dan alami secara subjektif serta dikomunikasikan secara interpersonal. (Stuart, 2006)

Kecemasan dalam diri anak dapat diduga dan tahap-tahap perkembangan tertentu. Menurut Wong & Whale (1991), kecemasan yang terjadi pada anak selama hospitalisasi dapat disebabkan karena:

##### a. Perpisahan

Respon terhadap perpisahan yang ditunjukkan anak usia prasekolah adalah dengan menolak makan, sering bertanya, menangis walaupun secara perlahan, dan tidak kooperatif terhadap petugas kesehatan. Manifestasi cemas karena perpisahan terdiri dari 3 fase, yaitu:

1) Fase protes (*Protest Phase*)

Pada fase ini anak menangis, menjerit/berteriak, mencari orang tua dengan pandangan mata, meminta selalu bersama dengan orang tua, menghindari dan menolak bertamu dengan orang yang tidak kenal. Sikap protes, seperti menangis akan berlanjut dan akhirnya akan berhenti karena kelelahan fisik. Pendekatan orang yang tidak dikenal akan meningkatkan sikap protes.

2) Fase Putus Asa (*Despair Phase*)

Perilaku yang dapat diamati pada fase ini, yaitu anak tidak aktif, menarik diri dari orang lain, tertekan dan sedih, tidak tertarik terhadap lingkungan sekitar, pendiam, menolak untuk makan dan minum, menolak untuk bergerak.

3) Fase Penerimaan (*Detachment Phase*)

Pada fase ini anak akan mulai menunjukkan ketertarikan terhadap lingkungan sekitar, berinteraksi secara dangkal dengan orang yang tidak dikenal atau perawat dan mulai tampak gembira. Fase penerimaan biasanya terjadi setelah berpisah dengan orang tua dalam jangka waktu yang cukup lama, tetapi hal ini jarang dilihat pada anak-anak yang dirawat di rumah sakit.

b. Kehilangan Kontrol

Perawatan di rumah sakit mengharuskan adanya pembatasan aktivitas anak, sehingga anak merasa kehilangan kekuatan diri. Ketergantungan merupakan karakteristik dari peran sakit. Anak akan

bereaksi terhadap ketergantungan dengan negativistic, terutama anak akan menjadi cepat marah dan agresif. Jika terjadi ketergantungan dalam jangka waktu lama (karena penyakit kronis), maka anak akan menarik diri dari hubungan interpersonal (Nursalam, 2005)

c. Luka pada Tubuh dan rasa sakit atau nyeri

Kecemasan terhadap luka pada tubuh dan rasa sakit atau nyeri bisanya terjadi pada anak-anak. Konsep tentang citra tubuh, khususnya pengertian mengenai perlindungan tubuh, sedikit sekali berkembang pada anak usia prasekolah. Apabila dilakukan pemeriksaan telinga, mulut atau suhu pada anus akan membuat anak menjadi sangat cemas. Respon anak terhadap tindakan yang tidak menyakitkan sama seperti respon terhadap tindakan yang sangat menyakitkan. Anak akan berespon terhadap nyeri dengan menyeringkan wajah, menangis, mangatup gigi, menggigit bibir, membuka mata dengan lebar, atau melakukan tindakan yang agresif seperti menggigit, menendang, memukul, atau berlari keluar. (Nursalam, 2005)

Reaksi kecemasan yang diperlihatkan oleh anak yang dirawat di rumah sakit bersifat individual, dan hal itu sangat bergantung pada tahapan usia perkembangan anak, pengalaman sebelumnya terhadap penyakit yang diseritanya, status anak dalam keluarga, system pendukung yang tersedia, dan kemampuan coping yang dimiliki anak.

Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ar'Rad/13:28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

Ayat diatas memberikan petunjuk kepada kita agar selalu mengingat Allah sehingga hati kita selalu tenang, tentram dan damai terhadap setiap persoalan yang menimpa manusia dalam kehidupan duniawai. Selain itu ayat diatas menjelaskan juga kepada manusia bahwa siapa saja yang memiliki perasaan cemas supaya jangan sampai lupa kepada Allah SWT untuk selalu beribadah agar hati menjadi tentram.

## 2. Tingkat Kecemasan

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecemasan anak diperlukan alat ukur (instrument). Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan adalah yang dikenal HARS (*Hamilton Anxiety Rating Scale*) yang unsur-unsurnya:

### 1). Perasaan Cemas

- a) Cemas
- b) Firasat buruk
- c) Takut akan pikiran sendiri
- d) Mudah tersinggung

### 2). Ketegangan

- a) Merasa tegang
- b) Lesu
- c) Tidak bias istirahat dengan tenang
- d) Mudah terkejut

- e) Mudah menangis
- f) Gemetar
- g) Gelisah

3). Ketakutan

- a) Padangan gelap
- b) Pada orang asing
- c) Ditinggal sendiri
- d) Pada binatang besar
- e) Pada keramaian lalu lintas
- f) Pada kerumunan orang banyak

4). Gangguan tidur

- a) Sukar masuk tidur
- b) Terbangun malam hari
- c) Tidur tidak nyenyak
- d) Bangun dengan lesu
- e) Banyak mimpi-mimpi
- f) Mimpi buruk
- g) Mimpi menakutkan

5). Gangguan kecerdasan

- a) Sukar konsentrasi
- b) Daya ingat buruk
- c) Daya ingat menurun
- d) Sering bingung

## 6). Perasaan depresi

- a) Hilangnya minat
- b) Berkurangnya kesenangan pada hobi
- c) Sedih
- d) Bangun dini hari
- e) Perasaan berubah-ubah sepanjang hari

## 7). Gejala somatic/fisik (otot)

- a) Sakit dan nyeri di otot
- b) Kaku
- c) Kedutan otot
- d) Gigi gemerutuk
- e) Suara tidak stabil

## 8). Gejala somatic/fisik (sensori)

- a) Tinitus (telinga berdenging)
- b) Penglihatan kabur
- c) Muka merah atau pucat
- d) Merasa lemas
- e) Perasaan ditusuk-tusuk

## 9). Gejala Kardiovaskuler

- a) Takikardi (denyut jantung cepat)
- b) Berdebar-debar
- c) Nyeri di dada
- d) Denyut nadi mengeras

- e) Rasa lesu/lemas seperti mau pingsan
  - f) Detak jantung menghilang sekejap
- 10). Gejala respiratori (pernafasan)
- a) Rasa tertekan didada
  - b) Persaan tercekik
  - c) Merasa napas pendek atau sesak
  - d) Sering menarik napas panjang
- 11). Gejala Gastrointestinal (pencernaan)
- a) Sulit menelan
  - b) Perut melilit
  - c) Gangguan pencernaan
  - d) Nyeri sebelum dan sesudah makan
  - e) Persaan terbakar diperut
  - f) Rasa penuh atau kembung
  - g) Mual
  - h) Muntah
  - i) Buang air besar lembek
  - j) Sukar buang air besar (konstipasi)
  - k) Kehilangan berat badan
- 12). Gejala Urogenital (perkemihan dan kelamin)
- a) Sering buang air kecil
  - b) Tidak dapat menahan air seni
  - c) Amenor/menstruasi yang tidak teratur

d) Menjadi dingin (frigid)

e) Ejakulasi dini

13). Gejala Autonom

a) Mulut kering

b) Muka merah

c) Mudah berkeringat

d) Pusing/sakit kepala

e) Bulu roma berdiri

14). Tingkah laku/sikap

a) Gelisah

b) Tidak tenang

c) Jari gemetar

d) Kerut kening

e) Muka tegang

f) Otot tegang/mengeras

g) Napas pendek dan cepat

h) Muka merah (Hawari,2001)

3. Reaksi Anak terhadap Kecemasan

Reaksi tersebut bersifat individual dan sangat tergantung pada usia perkembangan anak, pengalaman sebelumnya terhadap sakit, sistem pendukung yang tersedia dan kemampuan coping yang dimilikinya, pada umumnya, reaksi anak terhadap sakit adalah kecemasan karena perpisahan, kehilangan, perlukaan tubuh, dan rasa nyeri.

Reaksi anak pada hospitalisasi :

1. Masa bayi ( 0 - 1 tahun ) dampak perpisahan

Pembentukan rasa P.D dan kasih sayang Usia anak > 6 bln terjadi stanger anxiety /cemas.

- a) Menangis keras
- b) Pergerakan tubuh yang banyak
- c) Ekspresi wajah yang tak menyenangkan

2. Masa toddler ( 2 - 3 tahun )

Sumber utama adalah cemas akibat perpisahan .Disini respon perilaku anak dengan tahapnya.

- a) Tahap protes menangis, menjerit, menolak perhatian orang lain
- b) Putus asa, menangis berkurang, anak tidak aktif, kurang menunjukkan minat bermain, sedih, apatis.
- c) Peningkaran/ denial
- d) Mulai menerima perpisahan
- e) Membina hubungan secara dangkal
- f) Anak mulai menyukai lingkungannya

3. Masa prasekolah ( 3 - 6 tahun )

- a) Menolak makan
- b) Sering bertanya
- c) Menangis perlahan
- d) Tidak kooperatif terhadap petugas kesehatan

Perawatan di rumah sakit :

- a) Kehilangan kontrol
- b) Pembatasan aktivitas

Sering kali dipersepsikan anak sekolah sebagai hukuman. Sehingga ada perasaan malu, takut sehingga menimbulkan reaksi agresif, marah, berontak, tidak mau bekerja sama dengan perawat.

#### 4. Masa sekolah ( 6 - 12 tahun )

Perawatan di rumah sakit memaksakan meninggalkan lingkungan yang dicintai , keluarga, kelompok sosial sehingga menimbulkan kecemasan Kehilangan kontrol berdampak pada perubahan peran dalam keluarga, kehilangan kelompok sosial, perasaan takut mati, kelemahan fisik.

Reaksi nyeri bisa digambarkan dgn verbal dan non verbal

#### 5. Masa remaja (12 sampai 18 tahun )

Anak remaja begitu percaya dan terpengaruh kelompok sebayanya Saat masuk rumah sakit merasa cemas karena perpisahan tersebut. Pembatasan aktifitas kehilangan kontrol.

Reaksi yang muncul :

- a) Menolak perawatan / tindakan yang dilakukan
- b) Tidak kooperatif dengan petugas

Perasaan sakit akibat perlukaan menimbulkan respon :

- a) Bertanya-tanya
- b) Menarik diri
- c) Menolak kehadiran orang lain

Menurut Peplau dalam Stuart & Laria (2001) mengidentifikasi tingkat kecemasan, yaitu:

a. Kecemasan ringan

Kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan lahan persepsinya. Kecemasan dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan serta kreativitas. Contoh anak akan mudah menangis, takut pada gelap dan rewel.

b. Kecemasan sedang

Memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada masalah yang penting dan mengesampingkan yang lain sehingga anak mengalami perhatian yang selektif, namun dapat melakukan sesuatu yang terarah. Contohnya mencoba untuk membuat orang tuanya tetap tinggal dan menolak perhatian orang lain secara verbal anak menyerang dan rasa marah, seperti mengatakan “pergi” pada saat akan diberi tindakan.

c. Kecemasan berat

Sangat mengurangi lahan persepsi anak. Anak cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik, serta tidak dapat berfikir tentang hal lain. Anak memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada suatu area yang lain. Contohnya anak tampak tegang, tidak aktif, kurang berminat untuk bermain, tidak ada nafsu makan, menarik diri, sedih, apatis. (Gail W. Stuart, 2006)

#### 4. Teori-teori kecemasan

Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan asal ansietas, yaitu sebagai berikut:

##### a. Teori Psikoanalitis

Dalam pandangan psikoanalitis, cemas adalah konflik emosional yang terjadi antara dua elemen kepribadian yaitu Id dan Superego. Id mewakili dorongan *insting* dan *implus primitive*, sedangkan superego mencerminkan hati nurani dan dikendalikan oleh norma budaya. Ego atau aku berfungsi menengahi tuntutan dari dua elemen yang bertentangan tersebut dan fungsi ansietas adalah mengingatkan ego bahwa ada bahaya.

##### b. Teori Interpersonal

Menurut pandangan Interpersonal, cemas timbul dari perasaan takut terhadap ketidaksetujuan dan penolakan interpersonal. Cemas juga berhubungan dengan perkembangan trauma, seperti perpisahan dan kehilangan, yang menimbulkan kerentangan tertentu. Individu dengan harga diri rendah terutama rentan mengalami cemas berat.

##### c. Teori Perilaku

Menurut pandangan perilaku, cemas merupakan produk frustrasi yaitu segala sesuatu yang mengganggu kemampuan individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ahli teori perilaku lain menganggap ansietas sebagai suatu dorongan yang dipelajari berdasarkan keinginan dari dalam diri untuk menghindari kepedihan. Ahli teori pembelajaran

meyakini bahwa individu yang terbiasa sejak kecil dihadapkan pada ketakutan yang lebih berlebihan lebih sering menunjukkan cemas pada kehidupan, selanjutnya ahli teori konflik memandang cemas sebagai pertentangan antara dua kepentingan yang berlawanan. Mereka meyakini adanya hubungan timbale balik antara konflik dan cemas.

d. Kajian Keluarga

Kajian keluarga menunjukkan bahwa gangguan ansietas biasanya terjadi dalam keluarga. Gangguan ansietas juga tumpang tindih antara gangguan ansietas dengan persepsi.

e. Kajian Biologis

Kajian biologis menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor khusus untuk benzodiazepin. Obat-obat yang meningkatkan neuregulator inhibisi asam gamma-aminobutirat (GABA) yang berperan penting dalam mekanisme biologis yang berhubungan dengan ansietas. Selain itu kesehatan umum individu dan riwayat ansietas pada keluarga memiliki efek nyata sebagai predisposisi ansietas. (Stuart, 2006)

## **B. Tinjauan Umum Tentang Terapi Bermain**

1. Defenisi Bermain

Ada beberapa defenisi bermain menurut para ahli, antara lain sebagai berikut :

a. Landert, (2001)

Bermain adalah bagian integral dari masa kanak-kanak, media yang unik untuk memfasilitasi perkembangan ekspresi bahasa,

keterampilan komunikasi, perkembangan emosi, keterampilan social, keterampilan pengambilan keputusan dan perkembangan kognitif anak (Irwandy, 2010)

b. Wong, (2000)

Bermain merupakan cermin kemampuan fisik, intelektual, emosional dan social; dan bermain merupakan media yang baik untuk belajar karena dengan bermain anak-anak akan berkata-kata (berkomunikasi), belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan apa yang dapat dilakukannya dan mengenal waktu, jarak serta suara (Supartini, 2004).

c. Probel

Lebih menekankan pentingnya bermain dalam belajar karena berdasarkan pengalamannya sebagai guru, dia menyadari bahwa kegiatan bermain maupun mainan yang dinikmati anak dapat digunakan untuk menarik perhatian serta mengembangkan pengetahuan mereka. Sebagai kegiatan yang mempunyai nilai-nilai praktis, artinya bermain digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan bagi anak.

## 2. Fungsi Bermain

Fungsi bermain adalah merangsang perkembangan sensorik-motorik, perkembangan intelektual, perkembangan social, perkembangan kreativitas serta untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemberian stimulasi akan lebih efektif apabila memperhatikan

kebutuhan-kebutuhan anak sesuai dengan tahap perkembangan antara lain melalui alat permainan (Supartini, 2004).

### 3. Tujuan Bermain

Melalui fungsi permainan yang disebutkan di atas, pada prinsipnya bermain mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan yang normal karena pada saat sakit anak mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangannya.
- b. Mengekspresikan perasaan, keinginan, fantasi, serta ide-idenya seperti telah diuraikan di atas, pada saat sakit dan di rawat di rumah sakit, anak mengalami berbagai perasaan yang sangat tidak menyenangkan.
- c. Mengembangkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Permainan akan menstimulasi daya pikir, imajinasi dan fantasinya untuk menciptakan sesuatu seperti yang ada dalam pikirannya.
- d. Dapat beradaptasi secara efektif terhadap stress karena sakit dan di rawat di rumah sakit. Stress yang dialami anak saat di rawat dirumah sakit tidak dapat dihindarkan sebagaimana juga yang dialami orang tuanya.

### 4. Bermain Untuk Anak Yang Dirawat di Rumah Sakit

Perawatan anak di rumah sakit merupakan pengalaman yang penuh dengan stress baik bagi anak maupun orang tua. Lingkungan rumah sakit itu sendiri juga merupakan penyebab stress bagi anak maupun orang tuanya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Perasaan seperti

takut, cemas, nyeri dan perasaan tidak menyenangkan lainnya sering kali dialami oleh anak.

Untuk itu, anak memerlukan media yang dapat mengekspresikan perasaan tersebut dan mampu bekerja sama dengan petugas kesehatan selama dalam perawatan. Salah satu media yang paling efektif adalah melalui kegiatan permainan. Permainan yang terapeutik didasarkan oleh pandangan bahwa permainan bagi anak merupakan aktivitas yang sehat dan diperlukan untuk kelangsungan tumbuh kembang anak dan memungkinkan untuk dapat menggali dan mengekspresikan perasaan dan pikiran anak.

Aktivitas bermain yang diberikan perawat pada anak di rumah sakit akan memberi keuntungan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan hubungan antara klien (anak dan keluarga) dan perawat.  
Dengan melaksanakan kegiatan bermain, perawat mempunyai kesempatan untuk membina hubungan yang baik dan menyenangkan anak dan keluarga
- b. Perawat di rumah sakit akan meningkatkan kemampuan anak untuk mandiri. Aktivitas bermain yang terprogram akan memulihkan perasaan mandiri pada anak
- c. Permainan pada anak di rumah sakit akan membantu anak mengekspresikan perasaan dan pikiran cemas, takut, sedih, tegang dan nyeri

- d. Permainan yang terapeutik akan dapat meningkatkan kemampuan anak untuk mempunyai tingkah laku positif
- e. Permainan dapat memberikan kesempatan pada anak untuk berkompetisi secara sehat, serta dapat menurunkan ketegangan pada anak dan keluarga.

#### 5. Prinsip Permainan Anak di Rumah Sakit

- a. Permainan tidak boleh bertentangan dengan pengobatan yang sedang dijalankan pada anak
- b. Permainan yang tidak membutuhkan banyak energi, singkat dan sederhana
- c. Permainan yang harus mempertimbangkan keamanan anak
- d. Permainan harus melibatkan kelompok umur yang sama
- e. Melibatkan orang tua (Supartini, 2004)

#### 6. Jenis Permainan Berdasarkan Usia

Pada usia pra sekolah anak sudah mulai mampu mengembangkan kreativitasnya dan sosialisasi sehingga sangat diperlukan permainan yang dapat mengembangkan kemampuan menyamakan dan membedakan, kemampuan berbahasa, mengembangkan kecerdasan, mengembangkan koordinasi motorik, mengembangkan dalam mengontrol emosi. Sehingga jenis permainan yang dapat digunakan adalah benda-benda sekitar rumah seperti : buku gambar, alat-alat gambar, boneka, robot dan mobil-mobilan.

## 7. Klasifikasi Bermain

Ada beberapa jenis permainan, baik ditinjau dari isi permainan maupun karakter sosialnya. Berdasarkan isi permainan, ada *social affective play*, *sense-pleasure play*, *skill play*, *games*, *unoccupied behavior*, dan *dramatic play*. Apabila ditinjau dari karakter, ada *social onlooker play*, *solitary play*, dan *parallel play*. Berikut ini diuraikan satu persatu:

### a. Berdasarkan Isi Permainan

#### 1) *Social Affective Play*

Inti permainan ini adalah adanya hubungan interpersonal yang menyenangkan antara anak dan orang lain. Misalnya, bayi akan mendapatkan kesenangan dan kepuasan dari hubungan yang menyenangkan dengan orang tuanya dan/atau orang lain.

#### 2) *Sense of Pleasure Play*

Permainan ini menggunakan alat yang dapat menimbulkan rasa senang pada anak dan biasanya mengasyikkan. Misalnya, dengan menggunakan pasir, anak akan membuat gunung-gunungan atau benda-benda apa saja yang dapat dibentuknya dengan pasir. Bisa juga dengan menggunakan air anak akan melakukan macam-macam permainan, misalnya memindah-mindahkan air ke botol, bak, atau tempat lain. Ciri khas permainan ini adalah anak akan semakin lama semakin asyik bersentuhan dengan alat permainan ini dan dengan permainan yang dilakukannya sehingga susah dihentikan.

### 3) *Skill Play*

Sesuai dengan sebutannya, permainan ini akan meningkatkan keterampilan anak, khususnya motorik kasar dan motorik halus. Misalnya, bayi akan terampil memegang benda-benda kecil, memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain, dan anak akan terampil naik sepeda. Jadi, keterampilan tersebut diperoleh melalui pengulangan kegiatan permainan yang dilakukan. Semakin sering melakukan latihan, anak akan semakin terampil.

### 4) *Games atau Permainan*

*Games* atau permainan adalah jenis permainan yang menggunakan alat tertentu yang menggunakan perhitungan dan/atau skor. Permainan ini bisa dilakukan oleh anak sendiri dan/atau dengan temannya. Banyak sekali jenis permainan ini mulai dari yang sifatnya tradisional maupun yang modern. Misalnya, ular tangga, congklak, *puzzle*, dan lain-lain.

### 5) *Unoccupied Behaviour*

Pada saat tertentu, anak sering terlihat mondar-mandir, tersenyum, tertawa, jinjit-jinjit, bungkuk-bungkuk, memainkan kursi, meja, atau apa saja yang ada di sekelilingnya. Jadi, sebenarnya anak tidak memainkan alat permainan tertentu, dan situasi atau objek yang ada di sekelilingnya yang digunakan sebagai alat permainan. Anak tampak senang, gembira, dan asyik dengan situasi serta lingkungannya tersebut.

### 6) *Dramatic Play*

Sesuai dengan sebutannya, pada permainan ini anak memainkan peran sebagai orang lain melalui permainannya. Anak berceletoh sambil berpakaian meniru orang dewasa, misalnya ibu guru, ibunya, ayahnya, kakaknya, dan sebagainya yang ingin ia tiru. Apabila anak bermain dengan temannya, akan terjadi percakapan di antara mereka tentang peran orang yang mereka tiru. Permainan ini penting untuk proses identifikasi anak terhadap peran tertentu.

#### b. Berdasarkan Karakter Sosial

##### 1). *Onkooker Play*

Pada jenis permainan ini, anak hanya mengamati temannya yang sedang bermain, tanpa ada inisiatif untuk ikut berpartisipasi dalam permainan. Jadi, anak tersebut bersifat pasif, tetapi ada proses pengamatan terhadap permainan yang sedang dilakukan temannya.

##### 2). *Solitary Play*

Pada permainan ini, anak tampak berada dalam kelompok permainan, tetapi anak bermain sendiri dengan alat permainan yang dimilikinya, dan alat permainan tersebut berbeda dengan alat permainan yang digunakan temannya, tidak ada kerja sama, ataupun komunikasi dengan teman sepermainannya.

##### 3). *Parallel Play*

Pada permainan ini, anak dapat menggunakan alat permainan yang sama, tetapi antara satu anak dengan anak lain tidak terjadi kontak

satu sama lain sehingga antara anak satu dengan anak lain tidak ada sosialisasi satu sama lain. Biasanya permainan ini dilakukan oleh anak usia toddler.

#### 4). *Associative Play*

Pada permainan ini sudah terjadi komunikasi antara satu anak dengan anak lain, tetapi tidak terorganisasi, tidak ada pemimpin atau yang memimpin permainan, dan tujuan permainan ini tidak jelas. Contoh, permainan jenis ini adalah bermain boneka, bermain hujan-hujan, dan bermain masak-masakan.

#### 5). *Cooperative Play*

Aturan permainan dalam kelompok tampak lebih jelas pada permainan jenis ini, juga tujuan dan pemimpin permainan. Anak yang memimpin permainan mengatur dan mengarahkan anggotanya untuk bertindak dalam permainan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam permainan tersebut. Misalnya, pada permainan sepak bola, ada anak yang memimpin permainan, aturan main harus dijalankan oleh anak dan mereka harus dapat mencapai tujuan bersama, yaitu memenangkan permainan dengan memasukkan bola ke gawang lawan mainnya. (Supartini, 2004)

### **C. Tinjauan Umum Tentang Anak Usia Prasekolah**

Anak adalah individu yang bergantung pada orang dewasa dan lingkungannya, dimana dapat memfasilitasi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk belajar mandiri (Supartini, 2004). Anak merupakan

individu yang berada dalam suatu rentang perubahan perkembangan yang mulai dari bayi sampai remaja. (Hidayat, 2005)

Anak memiliki suatu ciri yang khas yaitu yang selalu tumbuh dan berkembang sejak saat konsepsi sampai berakhirnya masa remaja. Hal inilah yang membedakan anak dari orang dewasa. Jadi anak tidak biasa diidentikkan dengan dewasa dalam bentuk kecil. Ilmu pertumbuhan dan perkembangan merupakan dasar ilmu kesehatan anak dan kedua istilah itu disatukan menjadi Ilmu Tumbuh Kembang, oleh karena meskipun merupakan proses yang berbeda, keduanya tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama lain. (Moersintowart, 2002)

Anak usia pra sekolah adalah anak yang berusia 3-6 tahun (Supartini, 2004). Anak usia pra sekolah ini menunjukkan perkembangan motorik, verbal dan keterampilan social secara progresif. Pada masa ini adalah meningkatnya antisias dan energi untuk belajar dan menggali banyak hal. Dalam upaya mempermudah melakukan tindakan medis, petugas kesehatan dapat menggunakan teknik *Role-Playing* dari pada menjelaskan kepada anak secara verbal dalam perincian, misalnya ketika anak harus disuntik, untuk memperagakan prosedurnya dengan boneka sehingga anak bersedia untuk disuntik (Kaplan & Sadock, 1997)

Anak perlu diasuh karena mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan pada usia prasekolah yakni: pada usia ini anak lebih egosentris, berkembang perasaan harga diri yang menuntut pengakuan dari lingkungan yang menonjol pada anak prasekolah adalah (Karen, 2004):

- 1) Takut, perasaan terancam oleh suatu objek dianggap membahayakan.
- 2) Cemas, perasaan takut yang bersifat khayalan yang tidak ada objeknya.  
Berdasarkan pengalaman yang diperoleh baik perlakuan orang tua, buku-bacaan dan komik.
- 3) Marah, perasaan tidak senang atau benci terhadap orang.
- 4) Cemburu, anak menjadi cemburu bila ia mengira bahwa minat dan perhatian orang tua beralih pada orang lain di dalam keluarganya.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Hospitalisasi**

Hospitalisasi diartikan adanya perubahan psikis yang dapat menjadi sebab anak dirawat di rumah sakit (Stevans, et al, 2000). Hospitalisasi (rawat inap) pada pasien anak dapat menyebabkan kecemasan dan stres pada semua tingkat usia. Penyebab dari kecemasan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dari petugas (perawat, dokter dan tenaga kesehatan lainnya), lingkungan baru maupun keluarga yang mendampingi selama perawatan. Keluarga sering merasa cemas dengan perkembangan anaknya, pengobatan, peraturan dan keadaan di rumah sakit, serta biaya perawatan. Meskipun dampak tersebut tidak berlangsung pada anak, secara psikologis anak akan merasakan perubahan perilaku dari orang tua yang mendampingi selama perawatan. Anak akan semakin stres dan hal ini berpengaruh terhadap proses penyembuhan, yaitu menurunnya respon imun. Hal ini telah dibuktikan bahwa pasien yang mengalami kegoncangan jiwa akan mudah terserang penyakit, karena pada kondisi stres terjadi penekanan sistem imun. Pasien anak yang

terapeutik dan sikap perawat yang penuh perhatian akan mempercepat proses penyembuhan (Nursalam, 2005)

Hospitalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses karena suatu alasan darurat atau berencana mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit menjalani terapi dan perawatan sampai pemulangan kembali kerumah. Selama proses tersebut bukan saja anak tetapi orang tua juga mengalami kebiasaan yang asing, lingkungannya yang asing, orang tua yang kurang mendapat dukungan emosi akan menunjukkan rasa cemas. Rasa cemas pada orang tua akan membuat stress anak meningkat. Dengan demikian asuhan keperawatan tidak hanya terfokus pada anak terapi juga pada orang tuanya.

Pendekatan yang digunakan dalam hospitalisasi yaitu:

1. Pendekatan Empirik

Dalam menanamkan kesadaran diri terhadap para personil yang terlibat dalam hospitalisasi, metode pendekatan empirik menggunakan strategi, yaitu ;

- a. Melalui dunia pendidikan yang ditanamkan secara dini kepada peserta didik.
- b. Melalui penyuluhan atau sosialisasi yang diharapkan kesadaran diri mereka sendiri dan peka terhadap lingkungan sekitarnya.

2. Pendekatan melalui metode permainan

Metode permainan merupakan cara alamiah bagi anak untuk mengungkapkan konflik dalam dirinya yang tidak disadari. Kegiatan yang dilakukan sesuai keinginan sendiri untuk memperoleh kesenangan.

Hospitalisasi menimbulkan krisis pada kehidupan anak. Di rumah sakit, anak harus menghadapi lingkungan yang asing, pemberian asuhan yang tidak dikenal, dan gangguan terhadap gaya hidup mereka, sehingga anak dapat mengalami kecemasan akibat perubahan, baik pada status kesehatan maupun lingkungan dalam sehari-hari (Wong, 2004)

Menurut Supartini (2004) hospitalisasi anak dapat menjadi suatu pengalaman yang menimbulkan trauma baik pada anak maupun orang tua sehingga menimbulkan reaksi tertentu yang akan sangat berdampak pada kerja sama anak dan orang tua dalam perawatan anak selama di rumah sakit. Oleh Karena itu, betapa pentingnya perawat memahami konsep hospitalisasi dan dampaknya pada anak dan orang tua sebagai dasar dalam pemberian asuhan keperawatan. Supartini juga mengatakan bahwa orang tua mengalami kecemasan yang tinggi saat perawatan anaknya di rumah sakit, walaupun beberapa orang tua juga dilaporkan tidak mengalaminya karena perawatan anak dirasakan dapat mengatasi permasalahannya. Terutama pada mereka yang baru pertama kali mengalami perawatan anak di rumah sakit, dan orang tua yang kurang mendapat dukungan emosi dan sosial keluarga, kerabat bahkan petugas kesehatan akan menunjukkan perasaan cemasnya.

### BAB III


#### KERANGKA KONSEP PENELITIAN

##### A. Kerangka Konsep

Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk memperoleh kesenangan/kepuasan. Bermain merupakan cerminan kemampuan fisik, intelektual, emosional dan social. Bermain merupakan media yang baik untuk belajar karena dengan bermain anak-anak (berkomunikasi), belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan apa yang dapat dilakukannya dan mengenal jarak, waktu serta suara (Wong, 2000).

Bermain merupakan aspek terpenting dalam kehidupan anak serta merupakan suatu cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan adaptasi karena perkembangan kemampuan adaptasi anak usia prasekolah yaitu bermain dengan permainan sederhana (Aziz, 2008).

Adapun gambaran kerangka konsep dari penelitian ini adalah:




Keterangan:

 : Variabel independen

 : Variabel dependen

## Kerangka Kerja

Kerangka kerja penelitian ini dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:



## B. Defenisi Operasional

| No. | Variabel   | Definis Operasional   | Cara Ukur  | Hasil Ukur  | Skala    |
|-----|--|---|--|---|----------|
| 1   | Variabel independen (variabel bebas) adalah terapi bermain   | Suatu kegiatan bermain untuk menghilangkan ketegangan dan memperoleh kesenangan dengan cara memberikan mainan seperti boneka, mobil-mobilan dan robot-robotan | Memberikan mainan kepada anak yang mengalami hospitalisasi   | Anak dinyatakan telah menyelesaikan permainan boneka, mobil-mobilan, robot-robotan, minimal 75 % jenis mainan yang disediakan.                          |          |
| 2   | Variable dependen (variabel terikat) adalah tingkat kecemasan anak usia pra sekolah yang mengalami hospitalisasi | Respon cemas yang muncul akibat dirawat di rumah sakit yang terjadi pada anak usia prasekolah   | Lembar observasi yang digunakan adalah respon kecemasan berdasarkan usia yang terdiri dari cemas ringan, cemas sedang, dan cemas berat | 1 = Ringan bila skala berada pada interval 1 - 3<br>2 = Sedang bila skala berada pada interval 4 - 6<br>3 = Berat bila skala berada pada interval 7 - 9 | Kategori |

## C. Hipotesis Penelitian

Ada pengaruh terapi bermain terhadap respon kecemasan anak usia pra sekolah yang di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kab. Gowa.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pra experiment* dengan *one-group pre-post test design* dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh terapi bermain terhadap dampak hospitalisasi anak di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di ruang perawatan anak Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan alasan cukup tersedia sampel dan terdapat masalah dampak hospitalisasi pada anak seperti : menangis, takut, gelisah, tidak mau diajak bicara dan berdasarkan studi awal yang dilakukan peneliti.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 10-17 Juli 2012

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu variabel yang menyangkut masalah yang diteliti (Nursalam, 2001:64). Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak yang dirawat di ruang perawatan anak Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang berjumlah 42 orang

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu sehingga dianggap mewakili populasi (Nursalam, 2001:64). Sampel dalam penelitian ini adalah anak usia prasekolah yang dirawat di ruang perawatan anak Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf yang berjumlah 20 orang.

## 3. Teknik sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *teknik consecutive sampling*. Dimana kita ketahui teknik sampling consecutive yaitu suatu teknik mengambil sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi dalam jangka waktu tertentu. Ditetapkan oleh peneliti waktu penelitian yaitu 10-17 Juli 2012.

Dengan kriteria:

### a. Kriteria inklusi

- 1) Anak usia 3-6 tahun yang mendapat perawatan di Rumah sakit
- 2) Anak yang dirawat 1-2 hari.
- 3) Anak dapat diajak berkomunikasi

### b. Kriteria eksklusi

- 1) Mengalami gangguan kesadaran
- 2) Pasien pasca operasi 24 jam
- 3) Pasien yang dirawat di kelas utama

## **D. Cara Pengumpulan Data**

### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi. Data diambil dengan prosedur sebagai berikut :

- a) Peneliti mengajukan permohonan izin penelitian dari institusi yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar untuk ditujukan kepada kepala Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf agar bersedia dan memberikan izin penelitian menjadi lokasi/tempat diadakan penelitian.
- b) Setelah mendapat izin dari instansi tersebut, maka peneliti mengadakan pendekatan dengan calon responden, kemudian memberikan penjelasan tentang penelitian ini. Dan jika calon responden bersedia, maka peneliti akan mempersilahkan menandatangani lembar persetujuan responden.
- c) Setelah responden menandatangani lembar persetujuan, maka lembaran kuesioner mulai dilaksanakan.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder, berupa data yang diperoleh dengan cara menelusuri dan memilih literatur, serta data yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

## **E. Proses Pengambilan Data**

Dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *teknik consecutive sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara

memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

#### **F. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi dengan menggunakan skala *guttman*, dengan teknik penilaian untuk respon kecemasan pre intervensi dan post intervensi terapi bermain diukur dengan menggunakan lembar observasi. Secara umum lembar observasi berisi tentang perubahan tingkat kecemasan yang muncul pada anak saat perawat memberikan tindakan bermain. Instrument observasi yg digunakan merupakan instrument yang dikembangkan dari HARS yang dapat mengobservasi apakah anak mudah menangis, suka marah, merasa tegang, mudah terkejut, gelisah, suka menjerit, tidak bisa istirahat dengan tenang, menolak bertemu dengan orang asing, takut pada gelap, selalu ingin ditemani orang tua, dan mencari orang tua dengan pandangan mata, mengingat anak usia prasekolah belum mampu untuk mengungkapkan dengan jelas hal yang dirasakan.

#### **G. Pengolahan Data**

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian telah diolah melalui prosedur pengolahan data secara manual dengan melakukan :

##### **1. Editing**

Setelah lembar observasi diisi kemudian dikumpulkan dalam bentuk data, data tersebut dilakukan pengecekan dengan maksud memeriksa

kelengkapan data, kesinambungan data, dan keseragaman data dalam usaha melengkapi data yang masih kurang.

## 2. Koding

Dilakukan pengkodian dengan maksud agar data-data tersebut mudah di olah yaitu dengan cara semua jawaban atau data disederhanakan dengan memberikan symbol-simbol/kode dalam bentuk angka maupun alphabet pada nomor dan daftar pertanyaan.

## 3. Tabulasi Data

Setelah pemberian kode, selanjutnya dengan pengolahan data ke dalam table menurut sifat yang dimiliki.

## H. Analisa Data

### a. Analisa Univariat

Analisa ini dilakukan untuk tiap-tiap variabel yang diteliti dari hasil penelitian, yang kemudian akan mendapatkan hasil dari pengaruh terapi bermain terhadap respon kecemasan.

### b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen dengan dependen dalam bentuk tabulasi silang antara kedua variable tersebut. Menggunakan uji statistic dengan tingkat kebermaknaan 0,05 dengan menggunakan *Wilcoxon Test*.

## I. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memandang perlu adanya rekomendasi dari pihak institusi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan dengan mengajukan

permohonan izin kepada instansi tempat penelitian yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kab. Gowa. Setelah mendapat persetujuan barulah diadakan penelitian dengan menekankan masalah etika yang meliputi :

1. Lembar Persetujuan (*Informed Consent*)

Merupakan cara persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian memberikan lembar persetujuan (*Informed Consent*). *Informed Consent* tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan *Informed Consent* agar responden mengerti maksud dan tujuan peneliti, mengetahui dampaknya, jika responden bersedia maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan dan jika responden tidak bersedia maka peneliti tidak memaksa dan tetap menghormati hak-hak pasien.

2. Tanpa Nama (*Anonymity*)

Merupakan masalah etika dalam penelitian keperawatan dengan cara tidak memberikan nama responden pada lembar alat ukur melainkan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Merupakan masalah etika dalam menjamin kerahasiaan dari hasil penelitian baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkandijamin kerahasiaannyaoleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset (penelitian).

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *preeksperiment* dengan jenis *pretest-posttest design*. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Sungguminasa Kabupaten Gowa dari tanggal 10-17 Juli tahun 2012 di Ruang Perawatan Anak. Anak usia pra sekolah pada saat penelitian berjumlah 28 orang namun anak yang memenuhi kriteria inklusi hanya 20 orang. Jadi responden pada penelitian ini adalah anak usia prasekolah yang berjumlah 20 orang, dimana terdiri dari 12 orang laki-laki dan 8 orang perempuan dengan teknik pengambilan sampel *consecutive sampling*. Data pre test dan post test diambil melalui observasi yang langsung dilakukan pada responden dan terlebih dahulu diberikan pre test kemudian diberikan post test dalam bentuk terapi bermain. Setelah data terkumpul, maka data tersebut disusun dalam materi tabel data dan diolah dengan menggunakan komputer program SPSS versi 17.00. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisa data Univariat dan Bivariat menggunakan uji statistik dengan tingkat kebermaknaan  $\alpha < 0,05$  dengan menggunakan *wilcoxon test*. Berdasarkan hasil pengelolaan data tersebut, disusunlah hasil-hasil yang diperoleh dan dapat dilihat dari hasil analisa Univariat dan Bivariat sebagai berikut:

## 1. Hasil Analisa Univariat

Analisa univariat dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat distribusi frekuensi dari karakteristik subjek penelitian yaitu variabel dependen dan variabel independen. Adapun hasil analisis univariat tersebut dapat dilihat pada tabel 1 sampai 4 berikut ini:

### a) Distribusi Umur

**Tabel 5.1**

**Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Umur di Ruang Perawatan Anak RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa  
10-17 Juli 2012**

| Umur Anak (Tahun) | Frekuensi (n) | Persen % |
|-------------------|---------------|----------|
| 3 – 4 tahun       | 16            | 80,0     |
| 5 – 6 tahun       | 4             | 20,0     |
| Total             | 20            | 100,0    |

Berdasarkan tabel 5.1 bahwa usia responden yang berumur 3-4 tahun sebanyak 16 orang (80 %) dan responden yang berumur 5-6 tahun sebanyak 4 orang (20 %).

### b) Distribusi Jenis Kelamin

**Tabel 5.2**

**Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Jenis Kelamin di Ruang Perawatan Anak RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa  
10-17 Juli 2012**

| Jenis Kelamin Anak | Frekuensi (n) | Persen % |
|--------------------|---------------|----------|
| Laki-laki          | 12            | 60,0     |
| Perempuan          | 8             | 40,0     |
| Total              | 20            | 100,0    |

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa responden yang jenis kelamin laki-laki sebanyak 12 orang (60 %) dan responden yang jenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang (40 %).

c) Distribusi Respon Kecemasan Anak Pre Test dan Post Test

**Tabel 5.3**

**Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Respon Kecemasan Pre Test dan Post Test di Ruang Perawatan Anak RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa 10-17 Juli 2012**

| Respon<br>Kecemasan | Pre Test |       | Post Test |       |
|---------------------|----------|-------|-----------|-------|
|                     | n        | %     | n         | %     |
| Cemas Ringan        | 12       | 60,0  | 15        | 75,0  |
| Cemas Sedang        | 6        | 30,0  | 5         | 25,0  |
| Cemas Berat         | 2        | 10,0  | 0         | 0     |
| Total               | 20       | 100,0 | 20        | 100,0 |

Berdasarkan tabel 5.3 responden yang mengalami kecemasan pre test dan post test, pada pre test jumlah responden yang cemas ringan 12 orang (60 %), cemas sedang 6 orang (30 %) dan cemas berat 2 orang (20 %). Sedangkan responden yang mengalami kecemasan pada post test, jumlah responden yang cemas ringan 15 orang (75 %), cemas sedang 5 orang (25 %) dan cemas berat tidak ada atau 0 %.

2. Analisa Bivariat

Analisa bivariat bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Untuk itu digunakan uji *wilcoxon test* dengan nilai  $p < 0,008$  lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4

**Distribusi Pengaruh Terapi Bermain terhadap Respon Kecemasan  
Pre Test dan Post Test di Ruang Perawatan Anak RSUD  
Syekh Yusuf Kab. Gowa 10-17 Juli 2012**

| Pre test     | Post Test    |    |              |    |             |   | Total | Persen (%) |
|--------------|--------------|----|--------------|----|-------------|---|-------|------------|
|              | Cemas Ringan |    | Cemas Sedang |    | Cemas Berat |   |       |            |
|              | n            | %  | n            | %  | n           | % |       |            |
| Cemas Ringan | 12           | 60 | 0            | 0  | 0           | 0 | 12    | 60 %       |
| Cemas Sedang | 3            | 15 | 3            | 15 | 0           | 0 | 6     | 30 %       |
| Cemas Berat  | 0            | 0  | 2            | 10 | 0           | 0 | 2     | 10 %       |
|              | 15           | 75 | 5            | 25 | 0           | 0 | 20    | 100 %      |

*p: 0,008*

Berdasarkan tabel 5.4 diperoleh hasil pada pre test terdapat 12 orang yang dengan cemas ringan pada pre test dan tetap cemas ringan saat post test tetapi gejalanya menurun dimana pada saat pre test terdapat tiga atau dua gejala kemudian pada saat post test menurun menjadi dua atau satu gejala. Terdapat 6 orang anak yang mengalami cemas sedang pada saat pre test kemudian pada saat post ada 3 orang anak yang menurun menjadi cemas ringan dan ada 3 orang anak yang tetap mengalami cemas sedang sedangkan anak yang mengalami cemas berat pada saat pre test ada 2 orang kemudian pada saat post test menurun menjadi cemas ringan. Dari hasil uji *wilcoxon test* yang dilakukan dengan nilai  $p = 0,008$ , berarti nilai  $p$  lebih kecil dari  $\alpha (0,05)$  yang menunjukkan ada perubahan respon kecemasan anak sebelum diberi terapi bermain dan setelah diberi terapi

bermain, dimana Mean pada pre eksperimen 1,50 kemudian pada post eksperimen menurun menjadi 1,15 dan nilai maximum pada pre eksperimen 3,0 kemudian pada post eksperimen menurun menjadi 2,0.

## **B. Pembahasan**

### **1. Respon Kecemasan Sebelum diberi Terapi Bermain**

Hospitalisasi diartikan adanya beberapa perubahan psikis yang dapat menjadi sebab anak dirawat di rumah sakit (Stevens, et al, 2000). Hospitalisasi (rawat inap) pada pasien anak dapat menyebabkan kecemasan dan stres pada semua tingkat usia. Penyebab dari kecemasan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dari petugas (perawat, dokter dan tenaga kesehatan lainnya), lingkungan baru maupun keluarga yang mendampingi selama perawatan. Keluarga sering merasa cemas dengan perkembangan anaknya, pengobatan, peraturan dan keadaan di rumah sakit, serta biaya perawatan. Meskipun dampak tersebut tidak berlangsung pada anak, secara psikologis anak akan merasakan perubahan perilaku dari orang tua yang mendampingi selama perawatan. Anak akan semakin stres dan hal ini berpengaruh terhadap proses penyembuhan, yaitu menurunnya respon imun. Hal ini telah dibuktikan bahwa pasien yang mengalami kegoncangan jiwa akan mudah terserang penyakit, karena pada kondisi stres terjadi penekanan sistem imun. Pasien anak yang teraпетik dan sikap perawat yang penuh perhatian akan mempercepat proses penyembuhan (Nursalam, 2005)

Hospitalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses karena suatu alasan darurat atau berencana mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit menjalani terapi dan perawatan sampai pemulihan kembali kerumah. Selama proses tersebut bukan saja anak tetapi orang tua juga mengalami kebiasaan yang asing, lingkungannya yang asing, orang tua yang kurang mendapat dukungan emosi akan menunjukkan rasa cemas. Rasa cemas pada orang tua akan membuat stress anak meningkat. Dengan demikian asuhan keperawatan tidak hanya terfokus pada anak tetapi juga pada orang tuanya.

Anak sangat rentan terhadap penyakit, oleh karena itu sangat diperlukan preventif, akan tetapi apabila anak mengalami sakit dan keluarga tidak dapat mengatasi karena kondisi anak selalu parah, maka perawatan di rumah sakit sangat dibutuhkan. Perawatan anak di rumah sakit berfungsi untuk melengkapi suatu lingkungan dimana anak yang sakit dapat dibantu untuk mengatasi atau meringankan penyakitnya. (Sacharin, 2001)

Anak perlu diasuh karena mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan pada usia pra sekolah yakni: pada usia ini anak lebih egoisentris, berkembang perasaan harga diri yang menuntut pengakuan dari lingkungan yang meninjol pada anak pra sekolah. (Karen, 2004)

Pada anak usia pra sekolah, kecemasan yang paling besar dialami adalah ketika pertama kali masuk rumah sakit. Anak akan mengalami

kecemasan tinggi saat dirawat di rumah sakit maka besar sekali kemungkinan anak akan mengalami disfungsi perkembangan. Anak akan mengalami gangguan, seperti gangguan somatik, emosional dan psikomotor. (Nelson cit Isranil Laili 2006)

Kecemasan terhadap luka pada tubuh dan rasa sakit atau nyeri biasanya terjadi pada anak-anak. Konsep tentang citra tubuh, khususnya pengertian mengenai perlindungan tubuh, sedikit sekali berkembang pada anak usia pra sekolah (Nursalam, dkk, 2005) apabila dilakukan pemeriksaan telinga, mulut atau suhu pada anus akan membuat anak menjadi sangat cemas. Respon anak terhadap tindakan yang tidak menyakitkan sama seperti respon terhadap tindakan yang sangat menyakitkan. Anak akan berespon terhadap nyeri dengan mengerutkan wajah, menangis, mengatup gigi, menggigit bibir, membuka mata dengan lebar, atau melakukan tindakan yang agresif seperti menggigit, menendang, memukul atau berlari keluar.

Kecemasan pada anak sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan, yaitu dapat menyebabkan menurunnya respon imun. Berdasarkan konsep psikoneuroimunologi, yaitu proses hipotalamus hipofisis adrenal, dikatakan bahwa cemas psikologis akan berpengaruh pada hipotalamus, kemudian hipotalamus akan mempengaruhi hipofisis, sehingga hipofisis akan mengekspresikan *ACTH (Adrenal Cortico Tropic Hormon)* yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kelenjar adrenal yang menghasilkan kortisol. Apabila cemas yang dialami pasien sangat berat,

maka kelenjar adrenal akan menghasilkan kortisol dalam jumlah banyak sehingga dapat menekan sistem imun (Clanci, 1998). Adanya penekanan sistem imun inilah yang akan berakibat pada hambatan proses penyembuhan. Hal tersebut menyebabkan waktu perawatan yang lebih lama membutuhkan biaya perawatan yang lebih banyak, bahkan dengan penekanan sistem imun akan mempercepat terjadinya komplikasi-komplikasi selama perawatan. Orang tua di tuntut agar lebih memberikan perhatian kepada anaknya khususnya anak usia pra sekolah demi kesejahteraan anaknya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An Nisa/4:9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S:4:9)

Ayat di atas mengisyaratkan agar orang tua memenuhi kebutuhan anaknya, baik fisik maupun mental mereka. Berdosalah bagi orang tua yang menelantarkan anak-anak mereka, karena anak adalah harta/perhiasan dunia yang diamanahkan Allah.

Anak sehat adalah anak dambaan dan harapan setiap orang tua serta harapan penerus bangsa, jika anak diasuh dengan baik, maka anak dapat

tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang sehat fisik, mental dan sosial. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, orang tua sebaiknya memperhatikan kebutuhan anak termasuk kebutuhan bersosialisasi melalui permainan. (Suherman, 2000)

Setiap anak khususnya anak usia pra sekolah memerlukan penjelasan dengan kasih sayang sebelum prosedur perawatan dilakukan agar anak lebih bersosialisasi sehingga persiapan paling efektif dilakukan pada anggota tim kesehatan misalnya dengan memberi terapi bermain. Dengan pemberian terapi bermain maka, diharapkan anak bisa bersosialisasi dalam menjalani prosedur perawatan sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai. (Supartini, 2004)

## 2. Respon Kecemasan sesudah diberi Terapi Bermain

Anak yang dirawat di rumah sakit mengalami respon kecemasan, tetapi setelah diberi terapi bermain respon kecemasan tersebut menurun dari cemas berat menurun menjadi cemas sedang dan dari cemas sedang menurun menjadi cemas ringan kemudian pada cemas ringan yang semula terdapat tiga atau dua gejala menurun menjadi dua atau satu gejala. Hal ini menunjukkan penurunan kecemasan yang sangat signifikan. Terbukti bahwa permainan mampu menurunkan kecemasan, sebagaimana penelitian Subardiah (2009) yang menunjukkan bahwa permainan mampu menurunkan kecemasan. Menurut Stuart dan Sundeen (1998), pada tingkat kecemasan sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada satu hal penting dan mengesampingkan hal lain dan pada cemas ringan

berhubungan dengan ketegangan biasa dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan seseorang tetap waspada. Anak yang dirawat tersebut semula berada pada fokus keadaan sakitnya dan lingkungan asing, namun setelah dilakukan intervensi anak mulai terbiasa dengan lingkungannya dan mau bermain dengan teman sebayanya. Pemahaman terhadap keadaan dirinya saat ini menjadi lebih mudah dikuasai.

Berbeda halnya dengan responden yang masih mengalami cemas, ini disebabkan banyak faktor, baik faktor dari petugas (perawat, dokter dan tenaga kesehatan lainnya), lingkungan baru, maupun keluarga yang mendampingi selama perawatan. Keluarga juga sering merasa cemas dengan perkembangan keadaan anaknya, pengobatan dan biaya perawatan. Meskipun dampak tersebut tidak bersifat langsung terhadap anak, secara psikologis anak akan merasakan perubahan perilaku dari orang tua yang mendampinginya selama perawatan (Johan, 2008).

Sebagai perawat, dalam memberikan pelayanan keperawatan, harus mampu memfasilitasi keluarga dalam berbagai bentuk pelayanan kesehatan baik berupa pemberian tindakan keperawatan langsung, maupun pendidikan kesehatan bagi anak. Selain itu, perawat harus memperhatikan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi keluarga yang dapat menentukan pola kehidupan anak selanjutnya. Faktor-faktor tersebut sangat menentukan perkembangan anak dalam kehidupan. (Alimul, 2005)

Kehidupan anak juga sangat ditentukan keberadaannya bentuk dukungan dari keluarga, hal ini dapat terlihat bila dukungan keluarga yang

sangat baik maka pertumbuhan dan perkembangan anak relatif stabil, tetapi apabila dukungan keluarga anak kurang baik, maka anak akan mengalami hambatan pada dirinya yang dapat mengganggu psikologis anak. (Alimul, 2005)

Perawatan anak di rumah sakit merupakan pengalaman yang penuh dengan cemas, baik bagi anak maupun orang tua. Lingkungan rumah sakit itu sendiri merupakan penyebab kecemasan pada anak. Pada anak yang dirawat di rumah sakit akan muncul tantangan-tantangan yang harus dihadapinya seperti mengatasi suatu perpisahan, penyesuaian dengan lingkungan yang asing baginya, penyesuaian dengan banyak orang mengurusinya, dan kerap kali harus berhubungan dan bergaul dengan anak-anak yang sakit serta pengalaman mengikuti terapi yang menyakitkan. (Supartini, 2004).

Bermain pada masa pra sekolah merupakan aspek terpenting dalam kehidupan anak dan merupakan cara efektif untuk menurunkan cemas dan meningkatkan hubungan sosial. Pada hakekatnya semua anak dapat melalui masa anan-anaknya dengan mulus dan gembira, ada sebagian yang dalam proses tumbuh kembangnya mengalami gangguan kesehatan sehingga mengharuskan anak untuk dirawat di rumah sakit atau mengalami hospitalisasi. Gorofoli (2006) menyatakan bahwa keuntungan terapi bermain diantaranya adalah menurunkan kecemasan terhadap trauma selama masa kehidupan, sarana untuk mengekspresikan perasaan, promosi rasa percaya diri, mampu berhubungan dengan orang lain dan

kreatif. Penelitian Martins, et al. (2001), melaporkan anak-anak yang mendapatkan terapi bermain akan lebih kooperatif pada saat dilakukan tindakan pemasangan infus. Anak-anak memahami mengapa tindakan tersebut perlu dilakukan, dapat mengekspresikan perasaannya, lebih kreatif dengan keluarga dan memiliki hubungan baik dengan anak-anak lain yang sedang menjalani perawatan.

### 3. Pengaruh Terapi Bermain terhadap Respon Kecemasan Pada Anak Usia Pra Sekolah

Berdasarkan analisis Uji *Wilcoxon Test* didapatkan respon kecemasan pre test dan post test memberikan hasil yang bermakna dimana pengaruh terapi bermain terhadap respon kecemasan pada anak usia pra sekolah yang ditunjukkan dengan nilai nilai  $p = 0,008$  lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05).

Hasil yang berbeda sesudah diberikan terapi bermain, anak akan mudah bermain, mengungkapkan perasaan melalui bermain, menghilangkan rasa takut di rumah sakit. Maka dari itu untuk mengatasi respon kecemasan pada anak sangat diperlukan peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara maksimal yaitu salah satunya dengan memberikan permainan *solitary play* untuk meningkatkan kesejahteraan pasien, karena bagi pasien anak yang dirawat di ruang perawatan anak sangatlah penting diberi permainan berupa mobil-mobilan, boneka, bola, robot-robotan dan permainan yang bernuansa

islami sehingga pasien anak, selain senang dengan permainannya, jiwanya menjadi tentram.

Kita dianjurkan agar senantiasa menjaga jiwa tetap bersih sehingga kehidupan kita tentram.

Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Asy-syam/91: 9-10

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

Berdasarkan ayat di atas, Allah menganjurkan kita agar selalu menjaga kesucian jiwa kita dan jangan mengotorinya dengan hal-hal yang dibenci Allah SWT.

Pada usia pra sekolah, kejiwaan anak tampak tenang, seakan-akan bersiap menghadapi perubahan yang akan datang. Jadi terapi bermain terhadap anak usia pra sekolah untuk menurunkan tingkat kecemasan sangat diperlukan karena pada masa ini anak mulai memberikan kritik terhadap diri sendiri, kesadaran akan kemauan, penuh pertimbangan yang timbul dari lingkungan. Perasaan tersebut merupakan dampak dari hospitalisasi yang dialami anak karena menghadapi munculnya gangguan kecemasan lingkungan rumah sakit. Untuk itu dengan melakukan permainan anak akan terlepas dari perasaan cemas yang dialaminya karena dengan melakukan permainan, anak akan dapat mengalihkan rasa sakitnya pada permainannya dan relaksasi melalui kesenangannya

melakukan permainan. Hal tersebut terutama terjadi pada anak yang belum mampu mengekspresikan secara verbal. Dengan demikian, permainan adalah media komunikasi antara anak dengan orang lain, termasuk dengan perawat atau petugas kesehatan di rumah sakit, perawat dapat mengkaji perasaan dan pikiran anak melalui ekspresi non verbal yang ditunjukkan selama melakukan permainan atau melalui interaksi yang ditujukan anak dengan orang tua dan teman kelompok bermainannya. (Supartini, 2004)

Sigmund Freud berdasarkan *Teori Psychoanalytic* mengatakan bahwa bermain berfungsi untuk mengekspresikan dorongan implusif sebagai cara untuk mengurangi kecemasan yang berlebihan pada anak. Bentuk kegiatan bermain yang ditunjukkan berupa bermain fantasi dan imajinasi dalam sosio drama atau pada saat bermain sendiri. Menurut Freud, melalui bermain dan berfantasi anak dapat mengemukakan harapan-harapan dan konflik serta pengalaman yang tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata, contoh anak yang bermain boneka dan berpura-pura bertarung untuk menunjukkan kekesalannya.

Menurut asumsi penelitian bahwa ada perbedaan sebelum diberi terapi bermain dan setelah diberi terapi bermain dapat dilihat bahwa sebelum diberi terapi bermain ada anak yang mengalami cemas sedang dan berat tetapi setelah diberi terapi bermain anak yang cemas sedang menurun menjadi cemas ringan dan cemas berat menjadi cemas sedang hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh terapi bermain terhadap respon

kecemasan anak usia pra sekolah di ruang perawatan anak RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa.

Keterbatasan penelitian yaitu tidak melihat variabel lain yang mempengaruhi dan terdapat anak yang tetap cemas ringan, tidak tampak perubahan saat skala ukur ordinal.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Anak yang dirawat di rumah sakit mengalami respon kecemasan sebelum diberi terapi bermain.
2. Anak yang dirawat di rumah sakit mengalami penurunan respon kecemasan setelah diberi terapi bermain.
3. Ada pengaruh terapi bermain terhadap respon kecemasan anak usia pra sekolah di ruang perawatan anak RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa yaitu respon kecemasan anak menurun setelah diberi terapi bermain, hal ini disebabkan karena anak dapat bersosialisasi dan beradaptasi di ruang perawatan anak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran bagi pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak rumah sakit agar menerapkan terapi bermain untuk menurunkan tingkat kecemasan pada anak.
2. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi responden khususnya orang tua bahwa terapi bermain sangat penting untuk mengurangi tingkat kecemasan anak usia prasekolah selama masa perawatan.

3. Sebagai bahan dan sumber data penelitian berikutnya dan mendorong bagi pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahtisaari, 2008. *Terapi Bermain*. <http://sman4-ambon.sch.id/artikel/107-liyna-k-lamaloang-spt.html>/diakses 9 Juni 2012
- Chandra Budiman, 2008. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Cetakan Pertama EGC : Jakarta.
- Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. PT. Syaamil Cipta Media 2005
- Gorofolo, S. 2006. *Play Therapy for Children*. <Http://www.playtherapyforchildren.com/indeks.html>/diakses 21 Juni 2012
- Gunawan, 2010. *Kecemasan*. <http://teorikecemasan.blogspot.com/2011/03/apa-itu-ecemasan.html>/diakses 12 Juni 2012
- Harrel, S.N. (2003). *Managing slightly uncooperative pediatric patients*. *The Journal of The American Dental Association*, 134, 1613–1614.
- Hawari, Dadang. 2006. *Manajemen Stress, Cemas, dan Depresi*. Balai Penerbit FKUI : Jakarta
- Hidayat, A. Aziz Alimul. 2003. *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data* Salemba Medika : Jakarta
- Hidayat, 2008. *Terapi Bermain*. <http://bogelnurse.blogspot.com/2008/12/terapi-bermain-untuk-mengurangi-tingkat.html>/diakses 12 Juni 2012
- Indahyani, 2012. *Permainan Anak* <http://leterimpian.wordpress.com/2012/07/14/permainan-anak>.diakses 14 Juni 2012).
- Karen. 2004. *Diagnosa Keperawatan Sejahtera*. EGC : Jakarta
- Mahon, L.M. (2009). *The handbook of play therapy and therapeutic play* (2nd ed). London: Wiley Inter Science.
- Martins, et al. 2001. *Protocol for the preparation of preschool children to venous puncture using therapeutic play*. [Http:// Protocol for the preparation of preschool children to venous puncture using therapeutic play.com./indeks.html](Http://Protocolforthe-preparation-of-preschool-children-to-venous-puncture-using-therapeutic-play.com/indeks.html)/diakses 21 Juni 2012
- Mutiah, Diana. 2010. *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*. Kencana : Jakarta

- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan; Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Medika Salemba : Jakarta
- Ngastiyah, 2005. *Perawatan Anak Sakit*. EGC : Jakarta
- Rachmani Immanuella F., dkk., 2005. *60 Plus Permainan yang Mencerdaskan Anak Usia 2 – 5 Tahun*. Kalbe Farma Health Foods Division.
- Subardiyah, I.P. (2009). *Pengaruh permainan terapeutik terhadap kecemasan, Kehilangan kontrol, dan ketakutan anak prasekolah selama dirawat di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung*. Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
- Supartini, Yupi, 2004. *Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak*. EGC : Jakarta
- Soetjningsih, 1995. *Tumbuh Kembang Anak*. EGC : Jakarta
- Sunaryo, 2002. *Psikologi Untuk Keperawatan*. EGC : Jakarta
- Stuart, Gail W.2006. *Buku Saku Keperawatan Jiwa*. Edisi 5. Penerbit Buku Kedokteran : EGC
- Wijaya, 2010. *Pengaruh Penyuluhan Kesehatan terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan*. <http://ml.scribd.com/doc/70328400/Pengaruh-Penyuluhan-Kesehatan-Terhadap-Penurunan-Tingkat-Kecemasan-Keluarga-Pasien>.Diakses 12 Juni 2012
- Wong, 2004. *Pedoman Perawatan Psikiatrik*. EGC : Jakarta



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

Lampiran :

### TERAPI BERMAIN

| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>PENGERTIAN</b>                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cara alamiah bagi anak untuk mengungkapkan konflik dirinya yang tidak disadari (Wong: 1991)</li><li>2. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan hasil akhirnya (Hurlock: 1978)</li><li>3. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan keinginan dalam mengatasi konflik dari dalam dirinya yang tidak disadari serta dengan keinginan sendiri untuk memperoleh kesenangan (Roster: 1987)</li></ol> |
| <b>TUJUAN</b>                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meminimalisir tindakan perawatan yang traumatis</li><li>2. Mengurangi kecemasan</li><li>3. Membantu mempercepat penyembuhan</li><li>4. Sebagai fasilitas komunikasi</li><li>5. Persiapan untuk hospitalisasi atau surgery</li><li>6. Sarana untuk mengekspresikan perasaan</li></ol>  |
| <b>KEBIJAKAN</b>                    | Dilakukan di Ruang rawat inap, Poli tumbuh kembang, Poli rawat jalan dan Tempat penitipan anak   |
| <b>PETUGAS</b>                      | Perawat  |

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>KUIS<br/>PERMAINAN</b></p>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Laki-laki</li> <li>5. Perempuan</li> </ol>  |
| <p style="text-align: center;"><b>PERSIAPAN<br/>PASIEN</b></p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dan keluarga diberitahu tujuan bermain</li> <li>2. Melakukan kontrak waktu</li> <li>3. Tidak mengantuk</li> <li>4. Tidak rewel</li> <li>5. Keadaan umum mulai membaik</li> <li>6. Pasien bias dengan tiduran atau duduk, sesuai kondisi klien</li> </ol>   |
| <p style="text-align: center;"><b>PERALATAN</b></p>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan program bermain yang lengkap dan sistematis</li> <li>2. Alat bermain sesuai dengan umur / jenis kelamin dan tujuan</li> </ol>   |
| <p style="text-align: center;"><b>PROSEDUR<br/>PELAKSANAAN</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Tahap Pra Interaksi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kontrak waktu</li> <li>2. Mengecek kesiapan anak (tidak mengantuk, tidak rewel, keadaan umum membaik/kondisi yang memungkinkan)</li> <li>3. Menyiapkan alat</li> </ol> </li> <li>2. <b>Tahap Orientasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan salam kepada pasien dan menyapa nama pasien</li> <li>2. Menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan</li> <li>3. Menanyakan persetujuan dan kesiapan klien</li> </ol> </li> </ol> |

sebelum kegiatan dilakukan

### 3. Tahap Kerja

1. Memberi petunjuk pada anak cara bermain
2. Mempersilahkan anak untuk melakukan permainan sendiri atau dibantu
3. Memotivasi keterlibatan klien dan keluarga
4. Memberi pujian pada anak bila dapat melakukan
5. Mengobservasi emosi, hubungan inter-personal, psikomotor anak saat bermain
6. Meminta anak menceritakan apa yang dilakukan/dibuatnya
7. Menanyakan perasaan anak setelah bermain
8. Menanyakan perasaan dan pendapat keluarga

UNIVERSITAS ALAUDDIN MAKASSAR tentang permainan

UNIVERSITAS  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

#### 4. Tahap Terminasi

li>Melakukan evaluasi sesuai dengan tujuan

1. Berpamitan dengan pasien
2. Membereskan dan kembalikan alat ke tempat semula
3. Mencuci tangan
4. Mencatat jenis permainan dan respon pasien serta keluarga kegiatan dalam lembar catatan keperawatan dan kesimpulan hasil bermain meliputi emosional, hubungan inter-personal, psikomotor dan anjuran untuk anak dan keluarga

Topik : Terapi bermain  
Sub Topik : Solitary Play  
Sasaran : Anak Pra Sekolah  
Tempat : Di ruang perawatan anak RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa  
Waktu : 35 menit

## 1. TUJUAN

### 1. TIU (Tujuan Instruksional Umum)

Setelah diajak bermain, diharapkan anak dapat menurunkan emosi atau ketegangan selama hospitalisasi sehingga ,  
mengembangkan aktifitas dan kreatifitas melalui pengalaman bermain dan beradaptasi efektif terhadap stress karena penyakit dan dirawat

### 2. TIK (Tujuan Instruksional Khusus)

Setelah diajak bermain selama 35 menit, anak diharapkan :

1. Gerakan motorik halusnya lebih terarah
2. Berkembang kognitifnya
3. dapat bermain sesuai yang sukainya
4. Dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman sebaya yang dirawat di ruang yang sama
5. Kejenuhan selama dirawat di RS berkurang

## 2. PERENCANAAN

### 1. Jenis Program Bermain

Solitary Play

2. Karakteristik bermain

1. Melatih motorik halus
2. Melatih kesabaran dan ketelitian

3. Karakteristik peserta

1. Usia 3 – 6 tahun
2. Jumlah peserta: 2 – 4 anak dan didampingi orang tua
3. Keadaan umum mulai membaik
4. Klien dapat duduk
5. Peserta kooperatif

4. Metode: Demonstrasi

5. Alat-alat yang digunakan (Media)

1. Boneka
2. Mobil-mobilan
3. Robot-robotan
4. Bola

3. STRATEGI PELAKSANAAN A S S A R

1. Persiapan: 5 Menit

1. Menyiapkan ruangan
2. Menyiapkan alat
3. Menyiapkan peserta

2. Pembukaan: 5 Menit

1. Perkenalan dengan anak dan keluarga
2. Anak yang akan bermain saling berkenalan

3. Menjelaskan maksud dan tujuan

3. Kegiatan: 20 Menit

1. Anak diminta untuk memilih jenis mainan yang sudah tersedia (ditentukan jenis mainan sesuai tingkat umur)
2. Kemudian anak dianjurkan untuk bermain,
3. Setelah selesai bermain, anak dibantu membereskan mainan

4. Penutup: 5 Menit

Memberikan reward pada anak atas hasil karyanya

4. EVALUASI YANG DIHARAPKAN

1. Anak dapat mengembangkan motorik halus dengan menghasilkan satu gambar yang diwarnai, kemudian digantung
2. Anak dapat mengikuti kegiatan dengan baik
3. Anak merasa senang
4. Anak tidak takut lagi dengan perawat
5. Orang tua dapat mendampingi kegiatan anak sampai selesai
6. Orang tua mengungkapkan manfaat yang dirasakan dengan aktifitas bermain

## LEMBAR OBSERVASI PRE DAN POST INTERVENSI

### IDENTITAS ANAK

Nama :

Umur :

Agama :

Jenis kelamin :

### TERAPI BERMAIN

Jenis permainan :

### RESPON KECEMASAN

1 = Ringan, bila skala berada pada interval 1 – 3

2 = Sedang, bila skala berada pada interval 4 - 6

3 = Berat, bila skala berada pada interval 7 - 9

| NO            | Kategori Respon Kecemasan                                    | Penilaian |
|---------------|--|-----------|
|               | <b>Ringan</b>  |           |
| 1             | Mudah menangis   |           |
| 2             | Gelisah  |           |
| 3             | Takut pada gelap   |           |
|               | <b>Sedang</b>  |           |
| 4             | Mencoba untuk membuat orang tuanya tetap tinggal             |           |
| 5             | Rasa marah   |           |
| 6             | Menolak perhatian orang lain secara verbal<br>anak menyerang |           |
|               | <b>Berat</b>   |           |
| 7             | Anak tampak tegang   |           |
| 8             | Kurang berminat untuk bermain                                |           |
| 9             | Menarik diri, sedih, apatis                                  |           |
| <b>JUMLAH</b> |  |           |

## **GEJALA RESPON KECEMASAN**

### **Cemas Ringan**

1. Mudah menangis
2. Gelisah
3. Takut pada gelap

### **Cemas Sedang**

1. Mencoba untuk membuat orang tuanya tetap tinggal
2. Rasa marah
3. Menolak perhatian orang lain secara verbal anak menyerang

### **Cemas Berat**

1. Anak tampak tegang
2. Kurang berminat untuk bermain
3. Menarik diri, sedih, dan apatis

MASTER TABEL

| No | Inisial | Umur(Thn) | Jenis Kelamin | Observasi Respon Kecemasan |   |   |              |   |   |             |   |   | Kategori | Observasi Respon Kecemasan |   |   |              |   |   |             |   |   | Kategori |
|----|---------|-----------|---------------|----------------------------|---|---|--------------|---|---|-------------|---|---|----------|----------------------------|---|---|--------------|---|---|-------------|---|---|----------|
|    |         |           |               | Pre Test                   |   |   |              |   |   |             |   |   |          | Post Test                  |   |   |              |   |   |             |   |   |          |
|    |         |           |               | Cemas Ringan               |   |   | Cemas Sedang |   |   | Cemas Berat |   |   |          | Cemas Ringan               |   |   | Cemas Sedang |   |   | Cemas Berat |   |   |          |
| 1  | 2       | 3         | 4             | 5                          | 6 | 7 | 8            | 9 | 1 | 2           | 3 | 4 | 5        | 6                          | 7 | 8 | 9            |   |   |             |   |   |          |
| 1  | AN      | 4         | L             | √                          | √ | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        | √                          | - | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        |
| 2  | AK      | 3         | L             | -                          | - | - | √            | √ | - | -           | - | - | 2        | √                          | √ | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        |
| 3  | IA      | 5         | P             | -                          | - | - | √            | √ | √ | -           | - | - | 2        | -                          | √ | √ | -            | - | - | -           | - | - | 1        |
| 4  | SG      | 3         | P             | √                          | √ | √ | -            | - | - | -           | - | - | 1        | -                          | √ | √ | -            | - | - | -           | - | - | 1        |
| 5  | NJ      | 3         | P             | -                          | - | - | -            | - | - | √           | √ | - | 3        | -                          | - | - | √            | - | - | -           | - | - | 2        |
| 6  | MA      | 4         | L             | √                          | √ | √ | -            | - | - | -           | - | - | 1        | √                          | - | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        |
| 7  | WY      | 3         | L             | √                          | √ | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        | √                          | - | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        |
| 8  | SB      | 5         | P             | √                          | √ | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        | -                          | √ | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        |
| 9  | NN      | 3         | P             | √                          | √ | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        | √                          | - | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        |
| 10 | WA      | 4         | L             | √                          | √ | √ | -            | - | - | -           | - | - | 1        | √                          | √ | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        |
| 11 | RL      | 4         | L             | -                          | √ | √ | -            | - | - | -           | - | - | 1        | -                          | - | √ | -            | - | - | -           | - | - | 1        |
| 12 | FH      | 5         | P             | √                          | √ | √ | -            | - | - | -           | - | - | 1        | √                          | - | √ | -            | - | - | -           | - | - | 1        |
| 13 | MF      | 3         | L             | √                          | √ | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        | √                          | - | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        |
| 14 | WS      | 3         | L             | √                          | √ | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        | √                          | - | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        |
| 15 | HN      | 3         | P             | -                          | - | - | -            | - | - | √           | √ | - | 3        | -                          | - | - | -            | - | √ | -           | - | - | 2        |
| 16 | NW      | 3         | P             | √                          | √ | √ | -            | - | - | -           | - | - | 1        | √                          | - | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        |
| 17 | RN      | 3         | L             | -                          | - | - | -            | √ | √ | -           | - | - | 2        | √                          | - | - | -            | - | - | -           | - | - | 1        |
| 18 | EK      | 3         | L             | -                          | - | - | -            | √ | √ | -           | - | - | 2        | -                          | - | - | -            | √ | - | -           | - | - | 2        |

|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | AA | 3 | P | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | 2 | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - | 2 |
| 20 | MS | 5 | L | - | - | - | - | √ | √ | - | - | - | 2 | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | 2 |

KETERANGAN:

Observasi Respon Kecemasan

1 = Cemas Ringan (1-3)

2 = Cemas Sedang (4-6)

3 = Cemas Berat (7-9)

Jenis Kelamin

L = Laki-laki

P = Perempuan



## RIWAYAT HIDUP



**YUSNITA PRATIWI**, lahir pada tanggal 1 Agustus 1990 di Benteng Jampea Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Anak sulung dari 3 bersaudara yang merupakan buah hati dari pasangan Mursaling, S. Pd dengan Erling. Pada tahun 1996 tamat di TK Pertiwi

Pasi'masunggu, pada tahun 2002 tamat di SD Inpres Pasi'masunggu, pada tahun 2005 tamat di SMP Negeri 1 Pasi'masunggu, pada tahun 2008 tamat di SMA Negeri 1 Benteng Selayar. Pada tahun 2008 penulis mengikuti jalur UML dan diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan dan menyelesaikan studinya pada tahun 2012 dengan diterimanya skripsi yang berjudul "*Pengaruh Terapi Bermain Terhadap Respon Kecemasan Anak Usia Pra Sekolah di Ruang Perawatan Anak RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa*".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R