

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN BERAT
BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
TANRALILI KABUPATEN MAROS**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Muhammad Irsyad Sabili

NIM: 7020011596

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irsyad Sabili
NIM : 70200115096
Tempat/Tgl Lahir : Bontoramba, 23 September 1997
Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/AKK
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jalan Poros Malino, Mawang
Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Tanralili Kabupaten Maros Tahun 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 13 November 2019

Penyusun,



Muhammad Irsyad Sabili
NIM: 70200115096

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Di Wilayah kerja Puskesmas Tanralili Kabupaten Maros” yang disusun oleh **Muhammad Irsyad Sabili**, NIM: 70200115096, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari jumat, 08 November 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 08 November 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM.,M.Kes	(.....)
PembimbingI	: Dr. Sitti Raodhah, SKM., M.Kes	(.....)
PembimbingII	: Sukfitrianty Syahrir, SKM, M.Kes	(.....)
Penguji I	: Surahmawati, SKM.M.Adm.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr.Wahyudin G M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, segala puji hanya milik Allah SWT dan kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya kami sebagai penyusun mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Tanralili Kabupaten Maros”. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kekurangan dalam skripsi ini merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia dan hamba Allah. Dimana, kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah Swt. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan dan berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Basir Ali Dg Rumpa dan Ibunda Hj. Roslawati Dg Peroso, serta saudaraku yang dengan tulus mendoakan, memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil dan semangat sehingga penulis merasa kuat menjalani kehidupan ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, MA.,Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, M.Kes., Sp.A, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II dan III.
3. Bapak Abd. Majid Hr. Lagu, SKM., M. Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Ibu Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes, selaku sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Sitti Raodhah, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes selaku dosen Pembimbing II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Surahmawati SKM, M. Adm. Kes selaku Dosen Penguji Kompetensi dan Bapak Dr. Wahyuddin G, M.Ag selaku Dosen penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi. Serta segenap staf Tata Usaha di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang banyak berjasa dalam proses penyelesaian administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Kepala Puskesmas Tanralili Kabupaten Maros, Para pegawai serta staf dan para responden yang telah memberikan izin serta kemudahan kepada penulis selama melakukan penelitian.
8. Saudara-saudariku COVIVERA, teman kelas Kesmas B 2015, peminatan AKK 2015, yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan sehingga penulis merasa kuat dan tidak pernah lupa untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada keluarga Remaja Kreatif Mawang (RKM) yang selalu memberi dukungan, mengingatkan, membantu serta menyemangati.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas semuanya yang telah memberi warna dalam setiap langkah dan tindakan yang penulis lalui.

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan ini, penulis menghaturkan doa kepada Allah swt. semoga diberikan balasan oleh-Nya dengan pahala yang berlipat ganda.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amin

Gowa, Oktober 2019

Penulis

Muhammad Irsyad Sabili

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Hipotesis.....	5
D. Definisi Operasional.....	6
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Tentang Bayi Baru Lahir.....	21
B. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).....	21
C. Faktor Risiko Kejadian BBLR.....	24
D. Kerangka Teori.....	34
E. Kerangka Konsep.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Data.....	36

D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Instrumen Penelitian	38
F. Pengolahan Data	38
G. Tahap Analisis Data Penelitian	39
H. Penyajian Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan Penelitian	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN	xiv



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	9
Tabel 3.1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Responden	42
Tabel 3.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Umur Bayi.....	42
Tabel 3.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Bayi.....	43
Tabel 3.4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Ibu	44
Tabel 3.5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Ibu	44
Tabel 3.6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Ibu Melahirkan	45
Tabel 3.7 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Gestasi	45
Tabel 3.8 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tablet Fe	46
Tabel 3.9 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Paritas.....	46
Tabel 3.10 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Komplikasi Kehamilan	47
Tabel 3.11 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pelayanan ANC.....	47
Tabel 3.12 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Riwayat BBLR.....	48
Tabel 3.13 Pengaruh Pekerjaan Ibu dengan Riwayat BBLR	49
Tabel 3.14 Pengaruh Pendidikan Ibu dengan Riwayat BBLR	50
Tabel 3.15 Pengaruh Usia Ibu Melahirkan dengan Riwayat BBLR	51
Tabel 3.16 Pengaruh Usia Gestasi dengan Riwayat BBLR	52
Tabel 3.17 Pengaruh Tablet Fe dengan Riwayat BBLR	53
Tabel 3.18 Pengaruh Paritas dengan Riwayat BBLR.....	54
Tabel 3.19 Pengaruh Komplikasi Kehamilan dengan Riwayat BBLR	55
Tabel 3.20 Pengaruh Pelayanan ANC dengan Riwayat BBLR.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	34
Gambar 2.2 Kerangka Konsep.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Persetujuan Menjadi Responden	
Lampiran 2 Kuesioner	
Lampiran 3 Lembar Rekomendasi Etik	
Lampiran 4 Permohonan Izin Penelitian	
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Ke PTSP	
Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Penelitian	
Lampiran 7 Master Tabel	
Lampiran 8 <i>Output Analisis Data Statistic Product And Service Solution (SPSS)</i>	
Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian	
Lampiran 10 Riwayat Hidup	
Lampiran 11 Hasil Turnitin	

ABSTRAK

Nama : Muhammad Irsyad Sabili

NIM : 70200115096

Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Tanralili Kabupaten Maros

Berat badan lahir rendah terus menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Angka kematian bayi (AKB) sebagian besar disebabkan oleh BBLR *World Health Rankings* tahun 2017 melaporkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke 72 dari 172 negara di dunia yang mengalami angka kematian bayi akibat BBLR dengan presentase sebesar 9,92%. Bayi yang lahir dengan kejadian BBLR memiliki resiko lebih besar mengalami gangguan kesehatan, kecatatan, bahkan kematian. Rendahnya perhatian Ibu hamil terhadap kejadian BBLR dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya informasi yang didapatkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi angka kejadian BBLR di Wilayah Puskesmas Tanralili Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pendekatan *cross sectional*. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *random sampling* dengan jumlah sampel 169 responden. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan uji *chi square* melalui program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara pekerjaan Ibu terhadap kejadian BBLR dimana $p=0.78$, tidak ada pengaruh antara pendidikan Ibu terhadap kejadian BBLR dimana $p=0.21$, ada pengaruh antara usia Ibu melahirkan terhadap kejadian BBLR dimana $p=0.000$, ada pengaruh antara usia gestasi terhadap kejadian BBLR dimana $p=0.000$, ada pengaruh antara tablet Fe terhadap kejadian BBLR dimana $p=0.000$, tidak ada pengaruh antara paritas terhadap kejadian BBLR dimana $p=1.000$, ada pengaruh antara komplikasi kehamilan terhadap kejadian BBLR dimana $p=0.000$, ada pengaruh antara pelayanan ANC terhadap kejadian BBLR dimana $p=0.000$. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR dan dapat mencegah seorang Ibu mengalami kejadian BBLR.

Kata Kunci : Pengaruh, BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Berat badan lahir rendah (BBLR) didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai berat badan saat lahir kurang dari 2500 gram. Berat badan lahir rendah terus menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan secara global dan dikaitkan dengan serangkaian konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Secara keseluruhan, diperkirakan bahwa 15% hingga 20% dari semua kelahiran di seluruh dunia adalah berat badan lahir rendah, mewakili lebih dari 20 juta kelahiran per tahun (WHO, 2014). Berat badan lahir rendah (BBLR) menurut WHO juga mengakibatkan terjadinya Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 60-80%. Bayi yang lahir dengan BBLR memiliki resiko lebih besar untuk mengalami morbiditas dan mortalitas dari pada bayi yang lahir dengan berat badan yang normal (WHO, 2014).

World Health Rankings tahun 2017 melaporkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke 72 dari 172 negara di dunia yang mengalami angka kematian bayi akibat BBLR dengan presentase sebesar 9,92% (World Health Rankings, 2017).

Kementerian Kesehatan RI dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019 melaporkan bahwa dalam 5 tahun terakhir di Indonesia mengalami angka kematian bayi pada kelompok perinatal akibat Bayi berat Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 11,2% (Renstra Kemenkes-RI, 2015). Hal ini kemudian belum sesuai dengan target yang akan dicapai oleh Kementerian Kesehatan RI dalam hal upaya mengatasi angka kematian Bayi dan Balita yang di akibatkan oleh BBLR yaitu, sebanyak 8% (Renstra Kemenkes-RI, 2015).

Di Sulawesi Selatan data Profil Dinas kesehatan Provinsi melaporkan bahwa pada tahun 2015 angka kejadian BBLR sebanyak 5.789 kejadian BBLR dari 150.032 jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 3,89% (Profil Kesehatan Prov.Sul-Sel, 2015). Tahun 2016 mencapai 5.327 kejadian BBLR dari 149.658 jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 3,59% (Profil Kesehatan Prov.Sul-Sul, 2016). Tahun 2017 mencapai angka kejadian BBLR sebanyak 4.933. Kejadian BBLR dari 134.245 jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 3,70% (Profil Kesehatan Prov. Sul-Sel, 2017).

Kabupaten yang mengalami peningkatan angka kejadian BBLR setiap tahunnya di Sulawesi selatan yaitu Kabupaten Maros, Pada tahun 2015 mencapai 171 Kejadian BBLR dari 5.661 jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 3,04% (Profil Kesehatan Prov.Sul-Sel, 2015). Tahun 2016 mencapai 202 Kejadian BBLR dari 5.685 jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 3,58% (Profil Kesehatan Prov.Sul-Sel, 2016). Tahun 2017 mencapai 238 Kejadian BBLR dari 5.680 Jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 4,22% (Profil Kesehatan Prov.Sul-Sel, 2017). Berdasarkan Data Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Maros pada tahun 2017 di Puskesmas Tanralili tercatat dengan angka kejadian tertinggi dari 14 Puskesmas Di Kabupaten Maros yaitu, 31 kejadian dari 510 jumlah lahir hidup (Profil Kesehatan Prov.Sul-Sel, 2017).

Penelitian Sutan, *et.al.*, (2014) mengatakan bahwa BBLR dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ibu (status gizi, umur, paritas, status ekonomi), riwayat kehamilan buruk (Pernah melahirkan BBLR, aborsi), asuhan *antenatal care* yang buruk, keadaan janin. Dan faktor yang paling berpengaruh yaitu status ekonomi karena wanita yang mempunyai status ekonomi rendah lebih cenderung memiliki asupan makanan yang tidak memadai, sanitasi tempat tinggal yang buruk dan kemampuan untuk mencari perawatan selama kehamilan otomatis

kurang hal ini kemudian dapat mempengaruhi berat lahir bayi (Perere & Manzur, 2014). Usia ibu kurang dari 15 tahun memiliki risiko tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat rendah.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR Di RSUD Panembahan Senopati Bantul Pada Tahun 2014 adalah umur ibu, umur kehamilan dan Paritas (Fitri Windari, 2015). Penelitian Dhenok Tri Rahajeng dan Sri Ratna Dwiningsih, 2013 mengatakan tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dan pendapatan keluarga terhadap kejadian BBLR. Karakteristik yang berhubungan dengan kejadian BBLR adalah Paritas ibu dan masa gestasi sedangkan faktor umur tidak berhubungan dengan kejadian BBLR (Friasha P Filla, dkk 2015). Menurut Muzilatul Nisama, 2016 terdapat hubungan umur ibu, paritas ibu, penyakit ibu dengan kejadian BBLR Sedangkan pendidikan ibu tidak ada hubungan dengan kejadian BBLR. Adapun usia melahirkan, tingkat pendidikan ibu, jumlah kunjungan ANC, Usia gestasi, konsumsi tablet Fe, paritas, dan riwayat melahirkan BBLR berhubungan signifikan dengan kejadian BBLR (Rini Septiani, 2015). Selanjutnya, penelitian Annisa yuri ekaningrum, (2014) mengatakan bahwa ada hubungan antara pendidikan ibu, status sosial ekonomi, jarak kelahiran, jenis kelamin bayi, tenaga pemeriksaan kehamilan, dan kualitas pelayanan antenatal dengan BBLR. Ibu yang mengalami komplikasi kehamilan 1,78 kali lebih tinggi berisiko untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami komplikasi kehamilan.

Penelitian Mahdalena, dkk. (2017: 1) berpendapat bahwa paritas merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kejadian BBLR di RSUD Wonosari, Gunungkidul. Setiap ibu yang melahirkan BBLR memiliki median paritas primipara dan ibu yang melahirkan tidak BBLR memiliki median paritas

multipara. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu yang melahirkan BBLR merupakan kelompok ibu yang

Mempunyai pengalaman melahirkan pertama kali. Sedangkan ibu yang melahirkan tidak BBLR merupakan ibu yang memiliki pengalaman melahirkan 2-4 kali. Berbeda halnya dengan penelitian Jayanti, dkk (2016) yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan pendidikan dan pekerjaan dengan kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu serta pendidikan dan pekerjaan bukan faktor risiko. Sejalan dengan penelitian Hasriani, dkk. (2018) studi di beberapa puskesmas Kota Makassar, berpendapat bahwa usia ibu < 20 tahun atau > 35 tahun bukan sebagai faktor kejadian BBLR. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa usia ibu <20 tahun (OR=0.964;95%CI=0.361-2.578) terbukti bukan merupakan faktor risiko terhadap kejadian BBLR.

Pada penelitian agtini, dkk. (1994), menemukan bahwa resiko kejadian bayi lahir dengan BBLR antara ibu hamil yang tidak minum tablet Fe dan ibu hamil yang minum 90 tablet Fe dan lebih adalah 1,9 kali. Resiko kejadian BBLR antara ibu yang tidak minum tablet Fe dan ibu hamil yang minum 90 tablet atau lebih adalah 3,5 kali di Jawa Bali. Resio kejadian BBLR berdasarkan jumlah tablet Fe yang dikonsumsi ibu hamil dipedesaan dan perkotaan dapat dikatakan sama.

Merujuk pada penelitian Mumbare dalam Septiani (2015) mengatakan bahwa usia kehamilan kurang dari 36 minggu menjadi salah satu faktor terhadap kejadian BBLR. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Jammeh dalam Septiani (2015) menyimpulkan bahwa bayi yang dilahirkan pada usia kurg dri 37 minggu tidak berkaitan dengan kejadian BBLR.

Berdasarkan data dan penjelasan di atas maka peneliti akan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi angka kejadian BBLR di Puskesmas Tanralili Kabupaten Maros.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah apakah ada pengaruh pekerjaan ibu, usia ibu, pendidikan ibu, usia gestasi, konsumsi tablet Fe, paritas, komplikasi kehamilan, dan pelayanan ANC terhadap kejadian Bayi berat lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja puskesmas Tanralili, Kab. Maros?

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ho :

1. Tidak ada pengaruh pekerjaan ibu terhadap kejadian BBLR
2. Tidak ada pengaruh usia ibu melahirkan terhadap kejadian BBLR
3. Tidak ada pengaruh pengetahuan ibu terhadap kejadian BBLR
4. Tidak ada pengaruh usia gestasi terhadap kejadian BBLR
5. Tidak ada pengaruh konsumsi tablet Fe terhadap kejadian BBLR
6. Tidak ada pengaruh paritas terhadap kejadian BBLR
7. Tidak ada pengaruh komplikasi kehamilan terhadap kejadian BBLR
8. Tidak ada pengaruh pelayanan ANC terhadap kejadian BBLR

Ha :

1. Ada pengaruh pekerjaan ibu terhadap kejadian BBLR
2. Ada pengaruh usia ibu melahirkan terhadap kejadian BBLR
3. Ada pengaruh pengetahuan ibu terhadap kejadian BBLR
4. Ada pengaruh usia gestasi terhadap kejadian BBLR
5. Ada pengaruh konsumsi tablet Fe terhadap kejadian BBLR

6. Ada pengaruh paritas terhadap kejadian BBLR
7. Ada pengaruh komplikasi kehamilan terhadap kejadian BBLR
8. Ada pengaruh pelayanan ANC terhadap kejadian BBLR

D. Definisi Operasional

Berikut ini adalah definisi konsep dari variabel yang diteliti :

1. Variabel Dependen

a. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

BBLR yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2500 gram. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :

- 1) Ya : apabila berat badan lahir bayi < 2500 gram
- 2) Tidak : apabila berat badan lahir bayi ≥ 2500 gram

(Sumber : Kemenkes, 2010)

2. Variabel Independen

a. Status Ibu

Status bekerja pada ibu, yang dilakukan baik di rumah maupun di luar rumah dan memperoleh penghasilan /imbalan. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :

- 1) Bekerja adalah aktifitas fisik maupun pikian dalam menyelesaikan sesuatu baik secara bersama-sama maupun sendirian.
- 2) Tidak bekerja adalah tidak melakukan suatu pekerjaan atau tidak berbuat sesuatu (Yuliva, dkk., 2009)

b. Usia Ibu melahirkan

Lama hidup responden dalam hitungan tahun pada saat melahirkan anak terakhir dalam rumah tangga. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :

- 1) Resiko rendah, <20 tahun dan atau > 35 tahun
- 2) Resiko tinggi, 20-35 tahun (Pramono dan putro, 2009)

c. Pendidikan Ibu

Tingkatan pendidikan akhir yang pernah ditamatkan oleh Ibu. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :

- 1) Tinggi : bila ibu pernah menempuh pendidikan dari SMP/ SMA/ perguruan tinggi
- 2) Rendah : bila ibu hanya menempuh pendidikan SD atau tidak sekolah (Arikunto, 2013)

d. Usia Gestasi

Usia kandungan saat kehamilan berakhir. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :

- 1) Bayi lahir <37 minggu (Prematur)
- 2) Bayi yang lahir \geq 37 minggu (Normal) (Muslihatun, 2011)

e. Konsumsi Tablet Fe

Kebiasaan Ibu mengkonsumsi tablet besi (Fe) selama masa kehamilan. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :

- 1) Kurang : apabila konsumsi tablet Fe < 90 hari
- 2) Cukup : apabila konsumsi tablet Fe \geq 90 hari (Kementerian Kesehatan RI, 2010)

f. Paritas

Jumlah persalinan yang pernah dialami Ibu. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :

- 1) Banyak : apabila ibu yang telah melahirkan lebih dari 5 kali dan jarak melahirkan terlalu dekat.
- 2) Sedikit : apabila ibu yang telah melahirkan 1-4 orang anak dan jarak melahirkan tidak terlalu dekat. (Depkes RI, 2001)

g. Komplikasi kehamilan

Komplikasi yang terjadi selama kehamilan terakhir, dapat berupa pendarahan preeklamsia/eklamsia, infeksi, ketuban pecah dini. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :

- 1) Ya : apabila terdapat komplikasi yang terjadi selama kehamilan terakhir.
- 2) Tidak : apabila tidak terdapat komplikasi yang terjadi selama kehamilan terakhir. (Prawirohardjo dalam Ekaningrum, 2014)

h. Pelayanan ANC

Antenatal care merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan profesional kepada ibu hamil selama masa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan *antenatal care* yang ditetapkan dalam buku pedoman pelayanan antenatal bagi petugas puskesmas (Herlina, 2011). Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :

- 1) Lengkap : apabila ibu mendapatkan ANC sesuai standar pelayanan dengan rumus 14 T dan melakukan kunjungan minimal 4 kali selama hamil.
- 2) Tidak lengkap : apabila ibu tidak mendapatkan ANC sesuai standar pelayanan dengan rumus 14 T dan tidak melakukan kunjungan minimal 4 kali selama hamil.

E. Kajian Pustaka

No	Penulis/tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil penelitian
1	Puspita Sukmawaty Rasyid, dkk/2012	Faktor Risiko Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo	a. Variable Dependen : kejadian BBLR b. Variable Independen : stres kehamilan, keterpaparan asap rokok, riwayat penyakit infeksi, status gizi kehamilan dan pemanfaatan ANC terhadap kejadian BBLR.	- Desain penelitian : kasus kontrol - Lokasi : RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo - Populasi : semua ibu melahirkan di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selama tahun 2012 - Sampel : 300 ibu	Hasil penelitian menemukan dari lima variabel yang diduga berisiko terhadap kejadian BBLR, variabel (Paparan asap rokok OR=4,2; Status gizi kehamilan OR=2,7 dan stres kehamilan OR=1,7 dengan tingkat signifikansi masing-masing: $p < 0,05$) terbukti memberi risiko terhadap kelahiran BBLR. Kesimpulan: ditemukan 3 variabel (paparan asap rokok selama hamil, status gizi kehamilan dan stress kehamilan) adalah determinan penting yang memberi risiko kelahiran BBLR.
2	Dhenok Tri Rahajeng dan Sri Ratna Dwiningsih/2013	Factor yang Mempengaruhi Kejadian BBLR di RSUD Dr. Soedomo Trenggalek	a. Variable Dependen : Bayi Berat Lahir Rendah. b. Variable Independen : Pendidikan ibu, pendapatan keluarga, anemia dalam kehamilan dan hipertensi dalam kehamilan.	- Metode penelitian : analitik - Desain: <i>case control</i> - Lokasi: di RSUD Dr. Soedomo Trenggalek - Populasi : kasus dan kontrol	Hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dan pendapatan keluarga terhadap kejadian BBLR. Namun, ada hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dan anemia dalam kehamilan terhadap kejadian BBLR. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa apabila variabel dihitung secara bersamaan maka tidak memiliki pengaruh terhadap kejadian BBLR di RSUD Dr. Soedomo Trenggalek.
3	Eka Mustika Yanti/2014	Hubungan Usia dan Jarak Kehamilan	a. Variable Dependen : Kejadian BBLR	- Metode penelitian : <i>survey</i>	Hasil analisis <i>chi square</i> menunjukkan usia dan jarak kehamilan tidak memiliki

		dengan Kejadian Berat Badan Lahir (BBLR) di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta Tahun 2012-2013	b. Variable Independen : Tingkat pendapatan, pendidikan ibu, pekerjaan, usia, jarak kehamilan, anemia (Hb), status gizi (Lila), plasenta previa, plasenta, paritas, riwayat penyakit, KPD.	- Desain : case control - Sampel : 246 data bayi	hubungan yang signifikan dengan BBLR (OR = 1,105 dan p value 0,699) sedangkan jarak kehamilan (OR = 1,414 dan p value 0,407). Berarti ibu dengan reproduksi tidak sehat memiliki resiko 1,105 lebih besar terjadinya BBLR dibandingkan dengan ibu reproduksi sehat dan jarak kehamilan < 2 tahun memiliki resiko 1,414 lebih besar dibandingkan dengan jarak kehamilan > 2 tahun. Tidak ada hubungan usia dan jarak kehamilan dengan kejadian BBLR. Hendaknya lebih menekankan pengawasan dalam ANC, meningkatkan penyuluhan tentang faktor-faktor resiko terjadinya BBLR.
4	Annisa Yuri Ekaningrum, 2014	Hubungan Komplikasi Kehamilan dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di Indonesia Tahun 2012: Analisis SDKI 2012	a. Variabel dependen : BBRL (Berat badan lahir rendah) b. Variabel Independen : komplikasi, kehamilan, antenatal	Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang dengan pendekatan observasional analitik. Penelitian ini menggunakan data sekunder SDKI 2012 dengan teknik penarikan sampel <i>cluster sampling</i> tiga tahap. Sampel yang diambil berjumlah 13.143 responden dengan 1.611 responden memiliki BBLR dan 11.532 bayi BBLN.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan ibu, status sosial ekonomi, jarak kelahiran, jenis kelamin bayi, tenaga pemeriksaan kehamilan, dan kualitas pelayanan antenatal dengan BBLR. Ibu yang mengalami komplikasi kehamilan 1,78 kali lebih tinggi berisiko untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami komplikasi kehamilan

5	Suryati, 2014. p-ISSN 1978-38338 (2)72-78@2014 JKMA	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Bblr Di Wilayah Kerja Puskesmas Air Dingin Tahun 2013	<p>a. Variabel Dependen Berat Badan Lahir Rendah</p> <p>b. Variabel Independen Anemia, jarak kehamilan</p>	<p>Penelitian dilakukan dari April Agustus 2013, dengan desain case control study. Penelitian menggunakan total sampel yaitu 39 ibu yang mempunyai bayi BBLR dan 39 ibu yang mempunyai bayi berat lahir normal untuk kontrol. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan buku KIA. Data dianalisis secara univariat dan bivariat.</p>	<p>Hasil penelitian : usia berisiko untuk hamil pada kasus 15,4% dan pada kontrol 23,1%; penambahan berat badan berisiko pada kasus 64,1% pada kontrol 15,4%; Anemia waktu hamil pada kasus 82,9% pada kontrol 37,1%; KEK pada kasus 64,1% pada kontrol 10,3%; jarak kehamilan berisiko pada kasus 45,6% pada kontrol 23,1%; punya riwayat penyakit berisiko pada kasus 12,8% dan pada kontrol 17,9%. Hasil analisis bivariat ada hubungan penambahan berat badan ($p=0,000$), anemia ($p=0,000$), KEK ($p=0,000$) dan jarak kehamilan ($p=0,005$) dengan BBLR.</p>
6	Fitri Windari/2015	Hubungan Karakteristik Ibu Hamil dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta	<p>a. Variable Dependen : Kejadian BBLR</p> <p>b. Variable Independen : umur ibu, umur kehamilan, paritas, pendidikan, pekerjaan, dan riwayat kelahiran</p>	<p>Desain penelitian ini menggunakan rancangan penelitian <i>case control</i> (kasus kontrol) yaitu suatu penelitian survei analitik yang menyangkut berbagai faktor risiko di pelajari dengan menggunakan pendekatan <i>retrospektif</i> dengan kata lain, efek (penyakit/ status kesehatan) diidentifikasi pada saat ini kemudian</p>	<p>Hasil uji <i>chi square</i> menunjukkan karakteristik yang berhubungan dengan kejadian BBLR di RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah umur ibu ($p-v=0,001$), umur kehamilan ($p-v=0,000$) dan paritas ($p-v=0,001$). Karakteristik yang berhubungan dengan kejadian BBLR di RSUD Panembahan Senopati Bantul pada tahun 2014 adalah umur ibu, umur kehamilan dan paritas.</p>

				faktor risiko diidentifikasi ada atau terjadinya pada waktu lalu (Notoadmodjo, 2012).	
7	Friasha P Filla, dkk/2015	Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kasih Ibu Kota Manado	<p>a. Variable Dependen : kejadian BBLR</p> <p>b. Variable Independen : umur ibu, paritas ibu dan masa gestasi</p>	<p>- Jenis penelitian: observasional analitik</p> <p>- Desain: <i>case control study</i></p> <p>- Populasi: masyarakat Kota Cirebon</p> <p>- Sampel: 76 bayi</p>	Secara statistik nilai yang diperoleh berdasarkan hasil uji <i>chi square</i> yaitu hubungan antara umur ibu dengan kejadian BBLR ($p=1,00$; $OR=1,00$; $CI95\%=0,23-4,32$), hubungan antara paritas ibu dengan kejadian BBLR ($p=0,02$; $OR=5,34$; $CI95\%=1,71-16,62$), dan hubungan antara masa gestasi dengan kejadian BBLR ($p=0,00$; $OR=9,14$; $CI95\%=3,06-27,28$). Umur ibu tidak berhubungan dengan kejadian BBLR. Paritas ibu berhubungan dengan kejadian BBLR, dan masa gestasi berhubungan dengan kejadian BBLR.
8	Rini septiani/2015	Faktor Maternal pada kejadian Berat badan lahir rendah (BBLR) Di Indonesia (Analisis Data RISKESDAS 2013)	<p>a. Variable Dependen : Berat Badan Lahir Rendah</p> <p>b. Variable Independen : usia ibu melahirkan, tingkat pendidikan ibu, jumlah kunjungan ANC, usia gestasi, konsumsi</p>	<p>Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni Riskesdas 2013.</p> <p>Sampel penelitian ini sebanyak 25.186 anak yang lahir pada tahun 2010-2013 yang telah memenuhi kriteria</p>	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa prevalensi BBLR pada anak yang lahir tahun 2010-2013 mencapai 5,2%. Adapun usia ibu melahirkan, tingkat pendidikan ibu, jumlah kunjungan ANC, usia gestasi, konsumsi tablet Fe, paritas, dan riwayat melahirkan BBLR berhubungan signifikan dengan kejadian BBLR. Oleh karena itu disarankan pada Kementerian Kesehatan agar

			tablet Fe, paritas, dan riwayat melahirkan BBLR	penelitian. Kemaknaan hubungan dilihat menggunakan tingkat kepercayaan 95% Confidence Interval (CI) yang diperoleh dari uji chi square	menginstruksikan terkait penyediaan anggaran dana sebagai sumber daya yang dapat digunakan oleh Dinas Kesehatan untuk membuat kegiatan penyuluhan pada ibu hamil saat pelaksanaan kelas ibu hamil dengan menggunakan sarana yang memadai seperti pamflet ataupun alat peraga lain yang dapat membantu mempermudah penyerapan informasi pada ibu hamil.
9	Andi Nursyamsi/2016	Gambaran Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Makassar	a. Variable Dependen: Kejadian BBLR b. Variable Independen : umur ibu, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan keluarga, perokok, riwayat diabetes melitus, kepatuhan minum, riwayat persalinan.	- Jenis penelitian: Penelitian deskriptif - Lokasi: RSIA Pertiwi Makassar - Populasi: semua bayi - Sampel : 33 responden (teknik pengambilan sampel dengan menggunakan <i>purposive sampling</i>)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden pernah mengalami kehamilan (63,6%), bukan seorang perokok aktif (100%), tinggal serumah dengan seorang perokok (60,6%), makan 3 kali sehari dengan porsi nasi, sayur, lauk, dan buah (97%), bukan seorang pengkonsumsi alkohol (100%), tidak menikah di usia kurang dari 20 tahun (81,8%), pernah mengalami persalinan dalam 2 tahun terakhir (57,6%), mempunyai keturunan yang pernah mengalami kehamilan kembar (72,7%), rajin meminum obat yang telah diberikan oleh petugas kesehatan selama masa kehamilan (93,9%), tinggal di tempat yang tidak

					jauh dari pusat pelayanan kesehatan (90,9%), tidak ada riwayat penyakit gula atau biasa disebut diabetes melitus (78,8%), tidak memiliki penghasilan dalam keluarga mencukupi kebutuhan sehari-hari (72,7%), tidak pernah mengalami proses persalinan dengan bantuan alat (melahirkan tidak normal) (100%), ibu tidak pernah mengalami gangguan selama kehamilan berlangsung (97%) dan tidak ada pantangan makanan dalam keluarga atau budaya (60,6%).
10	Cut Ira Alfianti dan Darmawat/2016	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Banda Aceh	<p>a. Variable Dependen : Kejadian BBLR</p> <p>b. Variable Independen : usia ibu, jarak kelahiran, keadaan sosial ekonomi, pendarahan antepartum, preeklamsia, trauma fisik, merokok, kehamilang anda, hidramnion, faktor lingkungan.</p>	<p>penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis deskriptif - Desain: <i>retrospectif study</i> - Lokasi: NICU RSUDZA 	<p>Hasil penelitian menunjukkan usia ibu berada pada kategori baik sebanyak 30 orang (85,7%), jarak kelahiran pada kategori tidak baik sebanyak 21 orang (60%), keadaan sosial ekonomi pada kategori tinggi sebanyak 26 orang (74,3%), sebanyak 24 orang (68,6%) tidak mengalami perdarahan antepartum, 24 orang (68,6%) mengalami preeklamsia, 23 orang (65,7%) tidak mengalami trauma fisik, 19 orang (54,3%) terpapar asap rokok, 32 orang (91,4%) tidak mengalami kehamilan ganda, 25 orang (71,4%) tidak mengalami hidramnion, 22 orang (62,9%) berada pada lingkungan yang tidak baik. Disarankan kepada ibu supaya dapat</p>

					melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan, dapat merencanakan kehamilan dengan jarak kelahiran ≥ 2 tahun untuk kelahiran berikutnya dan hamil dalam waktu reproduksi sehat (20-35 tahun) serta tidak berada disekitar orang yang merokok agar tidak terpapar dengan asap rokok.
11	Muzilatul Nisma/2016	Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian BBLR di Ruang Perinatologi RSIA Annisa Jambi	<p>a. Variable Dependen : kejadian BBLR</p> <p>b. Variable Independen : usia ibu, usia kehamilan, jarak kehamilan, paritas, penyakit penyerta, pendidikan dan pekerjaan ibu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan penelitian : retrospektif - Desain : <i>case control</i> - Lokasi : ruang perinatologi RSIA Annisa Jambi - Populasi : dokumen ibu yang pernah melahirkan bayi dengan BBLR di RSIA Annisa Jambi pada pada bulan Januari sampai Desember tahun 2016 - Sampel : 254 data 	Hasil penelitian terdapat hubungan umur ibu ($p= 0,001$), parietas ibu ($p= 0,001$), penyakit ibu ($p= 0,002$) dengan kejadian BBLR. Tidak ada hubungan pendidikan ibu ($p= 0,071$) dengan kejadian BBLR. Diharapkan pada pihak RSIA Annisa agar dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan kehamilan, dengan memberikan pendidikan kesehatan yang optimal bagi ibu dan pasangan usia subur tentang resiko-resiko dalam kehamilan dan persalinan yang termasuk didalamnya adalah faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kelahiran bayi dengan BBLR.
12	Rahmawati/2016	Analisis Faktor Risiko Kejadian BBLR di RSKDIA Siti Fatimah Makassar	<p>a. Variable Dependen: Kejadian BBLR</p> <p>b. Variable Independen: stress kehamilan, keterpaparan asap rokok, riwayat penyakit selamaa hamil, status</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian : penelitian analitik Observasional - Desain : <i>case contro</i> - Lokasi : Ruang nifas di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar - Populasi : 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa stres berat berisiko 2 kali mengalami kejadian BBLR ($OR=2,034$) secara bermakna dengan nilai $p= 0,084$. Terpapar asap rokok berisiko 5 kali mengalami kejadian BBLR ($OR=5,911$) secara bermakna dengan nilai

			gizi ibu selama hamil, pemanfaatan ANC	- Sampel : 153 pasien	p=0,000. Ada riwayat penyakit selama hamil berisiko 4 kali mengalami kejadian BBLR (OR=4,400) secara bermakna dengan nilai p=0,000. KEK berisiko 19 kali mengalami kejadian BBLR (OR=19,855) secara bermakna dengan nilai p=0,000. kurang memanfaatkan ANC 35 kali berisiko mengalami kejadian BBLR (OR=35,567) secara bermakna dengan nilai p=0,000.
13	Rosmala Nur, Adhar Arifuddin, Redita Novilia. Jurnal Preventif, Volume 7 Nomor1, Maret 2016: 1-64	Analisis Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah Di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu	a. Variabel Dependen Berat Badan Lahir Rendah b. Variabel Independen Paritas, Jarak kehamilan, cakupan penimbangan berat badan, cakupan pemeriksaan darah, dan cakupan pemeriksaan kadar Hb.	Metode penelitian yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan case control. Sampel kasus adalah ibu yang melahirkan bblrdan sampel kontrol adalah ibu yang melahirkan normal dengan perbandingan 1 : 2 dengan matching umur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa paritas (OR = 1,703 pada 95%, CI 0,862-3,363), jarak kehamilan (OR = 3,231 pada 95% CI 1,633-6,391) cakupan penimbangan berat badan (OR = 2,519 pada 95% CI 1,261-5,031), cakupan pemeriksaan tekanan darah (OR = 2,692 pada 95% CI 1,397-5,184), dan cakupan pemeriksaan kadar Hb (OR = 3,154 pada 95% CI 1,451-6,855), merupakan faktor risiko terhadap BBLR.

14	Shinta mahdalena, tutik astuti, dan Vitrianingsih, 2017 p-ISSN: 2088-8872; e-ISSN: 2541-2728	FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN BBLR DI RSUD WONOSARI, GUNUNGKIDUL TAHUN 2017	<p>a. Variabel Dependen : BBLR (Berat badan lahir rendah)</p> <p>b. Variabel Independen Umur, Paritas, Pekerjaan, Pendidikan,</p>	Jenis penelitian deskriptif analitik, pendekatan survey case control. Sampel adalah keseluruhan bayi dengan BBLR yang dirawat di RSUD Wonosari, jumlah sampel: 110 bayi (55 kasus, 55 kontrol). Pengambilan sampel: purposive random sampling. Analisis data univariat persentase dan analisis data bivariat uji Fisher's Exact.	Hasil uji tidak ada pengaruh umur ibu ($p = 0,5721$), ada pengaruh paritas ($p = 0,000$), tidak ada pengaruh pendidikan ($p = 0,503$) dan tidak ada pengaruh pekerjaan ibu ($p = 0,702$). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa paritas merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kejadian BBLR di RSUD Wonosari, Gunungkidul.
15	Hasriyani, Suharyo Hadisaputro, Kamilah Budhi, Mexitalia Setiawati, Henry Setyawan, 2018 Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas 3 (2), 2018, 90-100	Berbagai Faktor Risiko Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) (Studi di Beberapa Puskesmas Kota Makassar)	<p>a. Variabel Dependen : BBLR (Berat badan lahir rendah)</p> <p>b. Variabel Independen Status sosial ekonomi, Status ANC, Adanya budaya pantangan makanan</p>	Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan desain case control dilengkapi analisis kualitatif dengan indepth interview menggunakan kuesioner terbuka yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai faktor risiko terhadap kejadian BBLR. Populasi studi kelompok kasus penelitian ini adalah	Faktor ibu yang terbukti sebagai faktor risiko kejadian BBLR adalah status gizi kurang, dan adanya penyakit kehamilan. Probabilitas untuk menyebabkan kejadian BBLR jika terdapat 2 faktor risiko tersebut secara bersamamaa adalah 68.87%. Faktor ibu dan faktor lingkungan yang terbukti bukan sebagai faktor risiko kejadian.

			<p>tertentu, adanya anggota keluarga yang merokok, jarak kehamilan, adanya penyakit kehamilan, status gizi.</p>	<p>semua ibu dengan bayi lahir berat <2500 gram di Puskesmas Antang, Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Kaluku Bodoa, Puskesmas Minasa Upa, Puskesmas Rappokaling, Puskesmas Pattingalloang Kota Makassar yang tercatat di buku register kohor ibu dan/ atau buku register nifas tahun 2016/2017. Sedangkan populasi studi kelompok kontrol adalah semua ibu dengan bayi lahir berat ≥ 2500 gram di Puskesmas Antang, Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Kaluku Bodoa, Puskesmas Minasa Upa, Puskesmas Rappokaling,</p>	
--	--	--	---	--	--

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi angka kejadian BBLR di Wilayah Puskesmas Tanralili Kab.Maros.

b. Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui pengaruh faktor pekerjaan ibu dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tanralili Kab.Maros.
- 2) Mengetahui pengaruh faktor usia ibu dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tanralili Kab.Maros.
- 3) Mengetahui pengaruh faktor pendidikan ibu dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tanralili Kab.Maros.
- 4) Mengetahui pengaruh faktor usia gestasi dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tanralili Kab.Maros.
- 5) Mengetahui pengaruh faktor ibu mengkonsumsi tablet Fe dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tanralili Kab.Maros.
- 6) Mengetahui pengaruh faktor paritas dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tanralili Kab. Maros.
- 7) Mengetahui pengaruh faktor Komplikasi kehamilan dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tanralili Kab.Maros.
- 8) Mengetahui pengaruh faktor pelayanan ANC dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tanralili Kab.Maros.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat bagi Peneliti

Sebagai sarana dalam pengaplikasian teori yang didapatkan selama perkuliahan serta menambah wawasan, memberikan pengalaman, dan mempertajam analitik peneliti.

b. Manfaat bagi institusi

Sebagai acuan atau referensi dan menjadikan pertimbangan dalam pembuatan program pencegahan kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Dan diharapkan bisa menjadi acuan dalam memberikan intervensi yang tepat dalam menyelesaikan masalah BBLR di wilayah kerja masing-masing dinas kesehatan.

c. Manfaat bagi masyarakat

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi untuk mencegah kejadian BBLR.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Bayi Baru Lahir

Bayi adalah seorang anak manusia yang masih berusia sangat muda. Umumnya istilah bayi diberikan ketika berusia di bawah 12 bulan atau umur satu tahun, namun defenisi mengenai bayi bervariasi tidak ada batasan pasti (Mutmainna, 2016). Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu smpai 42 minggu dan berat badan lahir 2500 gram sampai dengan 4000 gram (Kristiyanasari dalam Mutmainna, 2016).

Defenisi dari berat badan adalah saat tulang, otot, lemak, cairan tubuh, dan lain sebagainya mengalami peningkatan atau bahkan penurunan. Selain itu, berat badan merupakan indikator agar dapat mengetahui keadaan gizi dan tumbuh kembang seorang anak. Kondisi bayi lahir dapat diketahui menggunakan alat pengukuran berat badan bayi setelah dilahirkan. Dengan seperti itu, bayi baru lahir dapat dikategorikan sebagai berat badan lahir rendah (BBLR) atau berat badan lahir normal (BBLN) (Herlina, 2017).

B. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2500 gram saat ditimbang pertama kali setelah kelahiran hingga 24 jam (Pantiawati dalam Izzah K.A., 2018). Istilah lain sebelum BBLR yaitu bayi yang lahir prematur (kurang dari 2500 gram). BBLR dapat diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan ukuran (Wong dalam Septiani, 2015), antara lain.

1. Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang berat badannya kurang dari 2500 gram tanpa memperhatikan usia gestasi.

2. Bayi berat badan lahir sangat rendah (BBLSR) adalah bayi yang berat badannya kurang dari 1500 gram.
3. Bayi berat badan lahir ekstrem rendah (BBLER) adalah bayi yang berat badan lahirnya kurang dari 1000 gram.


Penyebab dari kesakitan, kematian, bahkan kecacatan pada bayi akibat dari kejadian BBLR sangat berpengaruh terhadap kesehatan ketika beranjak dewasa (WHO, 2014). BBLR sudah menjadi faktor utama kematian bayi di awal kelahirannya baik itu minggu pertama, bulan, maupun tahun pertama (UNICEF, 2006). Bayi berat badan lahir rendah akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lambat dan tidak jarang bayi akan mengalami penyakit kronis dan penurunan fungsi tubuh pada masa anak-anak berbeda dengan bayi berat badan normal (Boulet dalam Septiani, 2015).

Menurut Longo-Mbenza dalam Septiani (2015), bayi berat badan lahir rendah memiliki pengaruh dalam peningkatan angka kejadian hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Selain itu, Huxley dalam Septiani (2015) membuktikan bahwa terdapat hubungan konsisten antara kenaikan 1 kg berat lahir dengan penurunan risiko sebesar 10%-20% terhadap kejadian jantung iskemik.

Faktor yang paling utama dari BBLR itu sendiri adalah bayi yang lahir prematur (kurang dari 37 minggu dan kurang dari 30 minggu masa gestasi). Basdah dalam Septiani (2015) menemukan bahwa bayi prematur 6,4 kali memiliki risiko mengalami BBLR dibandingkan dengan bayi normal. Berdasarkan umur kehamilan pretermnya bayi prematur yang mengalami BBLR umur kehamilan tidak mencapai cukup bulan dan kejadian ini sering kali dikaitkan dengan keadaan medis baik dari segi kurangnya kurangnya kemampuan uterus mempertahankan janin, gangguan perkembangan janin, pelepasan plasenta prematur dan rangsangan yang tidak pasti (Behrman dalam Septiani, 2015). Selain itu, masalah

retardasi pertumbuhan intrauteri atau *intrauterine growth restriction* (IUGR) juga menjadi faktor penyebab kelahiran prematur (University of California, 2004; OECD dan WHO, 2012; Behrman, dkk, 2000). Dalam keadaan medik IUGR dapat mengganggu sirkulasi dan efisiensi plasenta, perkembangan dan pertumbuhan janin, dan nutrisi ibu. Plasenta memiliki fungsi sebagai perantara nutrisi, oksigen, dan lainnya dari ibu agar kebutuhan janin dapat tercukupi akibatnya perkembangan janin dapat sesuai dengan umur kehamilan (Manuaba dalam Septiani, 2015).

Allah SWT berfirman Q.S. Al-Baqarah ayat 168:



Artinya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Allah Swt menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan secara agama dari segi hukumnya baik halal dari segi zatnya maupun hakikatnya. Begitu pula sebaliknya makanan yang haram dari segi agama haram secara zat maupun hakikat. Makanan halal dari segi zatnya, seperti telur, buah-buahan, sayuran, daging sapi, kambing dan lain-lain. Makanan yang halal dari segi hakikatnya adalah makanan yang didapat dan diolah dengan cara yang benar menurut perintah Allah Swt. sebaliknya, makanan yang haram dari segi zatnya adalah daging babi, anjing, darah, dan bangkai. Sedangkan haram untuk hakikatnya karena cara memperoleh dan mengolahnya, seperti mencuri, korupsi, dan lain-lain sekalipun itu dari segi zatnya halal.

Merujuk pada ayat tersebut, dapat diketahui bahwa seorang ibu yang sedang mengandung seorang bayi atau janin hendaknya mengonsumsi makanan *halalan toyyiban* agar mencegah terjadinya BBLR pada saat bersalin. Mengonsumsi makanan yang halal sudah pasti mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin sehingga tidak terjadi prematur, kecacatan, bahkan kematian, pertumbuhan dan perkembangan yang lambat pada bayi, tidak jarang mengidap penyakit kronis, dan dapat berpengaruh pada kesehatan anak saat beranjak dewasa. Dari dahulu hingga dewasa ini seorang ibu yang mengandung sangat disarankan untuk memakan makanan yang bernutrisi, vitamin, dan lain-lain itu tidak terlepas dari *halalan toyyiban*. Apa yang diperbuat dengan baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Ketika ibu mengonsumsi makanan yang halal akan memberikan nutrisi, oksigen, dan lain-lain terhadap anak atau janin sehingga pada saat bersalin bayi dalam keadaan berat badan normal. Kita manusia janganlah bersifat seperti setan jagalah sebaik mungkin, memperhatikan dari segi kesehatan apa yang telah dititipkan Allah Swt.

C. Faktor Risiko kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berdasarkan penelitian Martin dalam Septiani (2015) menemukan bahwa pada tahun 2010, bayi yang lahir dengan berat di bawah dari 2500 gram sebanyak 1% dan bayi yang lahir dengan berat kurang dari 1.500 gram sebanyak 22% mengalami kematian pada tahun pertama kelahiran. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR, yakni:

1. Pekerjaan Ibu

Pekerjaan merupakan kegiatan atau profesi seseorang di masyarakat. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa jika status pekerjaan seseorang tinggi, maka boleh mempunyai anak yang banyak karena mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Herlina, 2011). Pekerjaan terkait pada

status sosial ekonomi dan aktifitas fisik ibu hamil. Dengan keterbatasan status sosial ekonomi akan berpengaruh terhadap keterbatasan dalam mendapatkan pelayanan ante natal yang adekuat, pemenuhan gizi, sementara itu ibu hamil yang bekerja cenderung cepat lelah sebab aktifitas fisiknya meningkat karena memiliki tambahan pekerjaan/kegiatan di luar rumah (Depkes RI, 2003). Adapun beberapa penelitian yang membuktikan bahwa pekerjaan ibu sebagai salah satu faktor kejadian BBLR sebagai berikut.

- a. Syarifuddin, dkk. (2011) menemukan hasil statistik bahwa berat lahir bayi pada kelompok ibu pekerja cenderung lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang bukan pekerja. Ibu yang bekerja berisiko 2,41 kali lebihh besar melahirkan BBLR daripada ibu rumah tangga (Aminian, dkk., 2014).
- b. Viengskhone, dkk. (2010) menyimpulkan bahwa ibu hamil yang memiliki pekerjaan fisik yang berat berisiko 5 kali lebih besar melahirkan BBLR dibandingkan dengan ibu hamil pekerja kantoran. Jenis pekerjaan yang berat dapat memicu pelepasan hormon stres yang mengganggu pertumbuhan janin sebagai akibat dari *hypothalamic pituitary axis* (HPA) yang sangat merugikan kehamilan di awal (vrijkotte, dkk., 2009).
- c. Niedhammer, dkk. (2009) mengatakan bahwa jangka panjang waktu kerja lebih dari 40 jam per minggu pada ibu hamil erat kaitannya dengan kejadian BBLR.

Namun, penelitian di atas dibantahkan oleh Pramono dan Putro dalam Septiani (2015), yang mengatakan bahwa berdasarkan data Riskesdas tahun 2007, menemukan tidak ada hubungan antara status bekerja dengan kejadian BBLR.

2. Usia Ibu Melahirkan

Berat badan lahir rendah (BBLR) menjadi salah satu akibat dari kehamilan yang terjadi sebelum remaja berkembang secara penuh karena dapat mengalami cedera pada saat persalinan, dan besar kemungkinan mengalami kematian pada

bayi (Herlina, 2011). Berdasarkan penelitian Viengsakhone, dkk. (2010) menyimpulkan bahwa usia ibu melahirkan kurang dari 18 tahun berisiko 8 kali lebih besar untuk mengalami BBLR.

Usia ibu hamil menjadi salah satu penyebab kejadian BBLR terlebih lagi ketika mengalami kehamilan di usia kurang dari 20 tahun (Badshah, Ganesh dalam Septiani, 2015). Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Borders dalam Septiani (2015) membuktikan bahwa ibu yang melahirkan dengan usia terlalu tua dapat pula berisiko kejadian BBLR serta menimbulkan masalah kesehatan bagi ibu dan anak. Namun, Fredrick dalam Septiani (2015) mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara usia ibu melahirkan dengan berat bayi saat dilahirkan.

3. Pendidikan Ibu

Pengaruh pendidikan sangat berdampak terhadap perilaku dan pola hidup seseorang terutama dalam memotivasi untuk bersikap dan ikut serta dalam pembangunan kesehatan (Notoatmodjo dalam Herlina 2017). Pendidikan ibu menjadi salah satu faktor kejadian BBLR dalam penelitian Khatun dan Rahman dalam Septiani (2015) menyimpulkan bahwa kaitan antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian BBLR secara signifikan. Tidak jarang sebagian besar masyarakat mengaitkan tingkat pendidikan dengan tingkat sosial ekonomi dalam konteks kesehatan. Seperti halnya dewasa ini seseorang terhambat mendapatkan pekerjaan dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah (Abu-Saad dan Fraser dalam Septiani, 2015). Namun, perbedaan penelitian ditemukan oleh Torres-Arroela, dkk. (2005), Fredrick, dkk. (2008), dan Khanal, dkk. (2014) bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan berat bayi yang dilahirkan.

4. Kunjungan *Antenatal Care* (ANC)

Antenatal care merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan profesional kepada ibu hamil selama masa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan *antenatal care* yang ditetapkan dalam buku pedoman pelayanan antenatal bagi petugas puskesmas (Herlina, 2011). Kementerian Kesehatan RI (2010) menetapkan standar pelayanan yang wajib diberikan tenaga kesehatan pada *antenatal care* sebagai berikut :

- a. Menimbang berat yang dapat dilakukan saat setiap kunjungan antenatal untuk melihat adanya gangguan pertumbuhan pada janin sebab ketika berat badan ibu bertambah kurang dari 9 kg atau kurang dari 1 kg pada setiap bulan itu mengakibatkan adanya gangguan pada pertumbuhan janin.
- b. Mengukur lingkar lengan atas (LiLA) dilakukan saat ibu hamil mengalami risiko kurang energi kronis (KEK), yaitu terjadinya kekurangan gizi pada ibu hamil dan telah berlangsung lama dengan ukuran kurang dari 23,5 cm. Akibatnya, ibu yang mengalami KEK besar kemungkinan dapat melahirkan bayi berat badan lahir rendah (BBLR).
- c. Mengukur tekanan darah agar dapat mendeteksi adanya hipertensi atau tekanan dara yang lebih dari 140/90 mmHg pada saat kehamilan dan pre-eklampsia.
- d. Mengukur tinggi fundus uteri dilakukan agar dapat melihat pertumbuhan janin sesuai atau tidak umur kehamilan dengan standar pengukuran menggunakan pita pengukur setelah kehamilan 24 minggu.
- e. Menghitung denyut jantung janin ketika kurang dari 120/menit atau cepat lebih dari 160/menit menunjukkan adanya gawat janin yang dilakukan pada akhir trimester I

- f. Menentukan presentasi janin untuk mengetahui tata letak janin pada akhir trimester II dan seterusnya.
- g. Memberikan imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil sesuai dengan status imunisasi ibu, tujuannya dapat mencegah terjadinya tetanus neonatorum.
- h. Memberikan tablet penambah darah (tablet besi) sejak kontak pertama.
- i. Melakukan pemeriksaan laboratorium, seperti golongan darah, kadar hemoglobin darah (Hb), protein urin, kadar gula darah, malaria, tes Sifilis, HIV, dan BTA.
- j. Tatalaksana/ penanganan kasus ibu hamil sesuai dengan standar dan kewenangan tenaga kesehatan.
- k. KIE efektif seperti kesehatan ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, peran suami/keluarga dalam kehamilan dan perencanaan persalinan, tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas, asupan gizi seimbang, gejala penyakit menular dan tidak menular, penawaran untuk melakukan konseling dan testing HIV di daerah tertentu (risiko tinggi), inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, KB paska persalinan, dan imunisasi.

Siklus pelayanan antenatal dianjurkan dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan dengan distribusi minimal 1 kali pada trimester pertama (12 minggu), minimal 1 kali pada trimester kedua (12-24 minggu), minimal 2 kali pada trimester ketiga (24-36 minggu).

Kunjungan ANC merupakan hal penting untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Menurut Khanal, dkk. (2014) mengatakan bahwa ibu yang tidak melakukan antenatal dua kali lebih besar berisiko untuk kejadian BBLR. Sedangkan penelitian Jammeh dan Torres Arroel dalam Septiani (2015), menemukan tidak ada kaitan antara kunjungan antenatal dengan kejadian BBLR

dikarenakan baik ibu yang mengalami BBLR ataupun normal, keduanya rutin melakukan kunjungan ANC.

5. Status Kurang Energi Kronis (KEK) ibu

Mekanisme terjadinya BBLR akibat kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil yaitu diawali dengan ibu hamil yang menderita KEK yang menyebabkan volume darah dalam tubuh ibu menurun dan *cardiac output* ibu hamil tidak cukup, sehingga menyebabkan adanya penurunan aliran darah ke plasenta. Menurunnya aliran darah ke plasenta menyebabkan dua hal yaitu berkurangnya transfer zat-zat makanan dari ibu ke plasenta yang dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan janin dan pertumbuhan plasenta lebih kecil yang menyebabkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) (Soetjiningsih dalam kemar, 2008).

Salah satu cara agar dapat mengetahui status gizi ibu yaitu ukur ingkar lengan atas (LiLA), kurang dari 23,5 cm. Menurut Syafruddin dalam Septiani (2015) menunjukkan adanya keterkaitan antara KEK dengan kejadian BBLR karena berisiko 4 kali melahirkan bayi BBLR daripada ibu hamil yang tidak mengalami KEK. Namun, penelitian Badshah dalam Septiani (2015) membantah adanya status gizi ibu yang diukur berdasarkan indeks massa tubuh (IMT) tidak ada hubungannya dengan kejadian BBLR.

6. Usia Gestasi (Kehamilan)

Usia gestasi merupakan istilah singkat untuk mendeskripsikan perkembangan kehamilan per minggu sejak hari pertama siklus menstruasi wanita hingga waktu tertentu (National Institute of Health, 2013). Hatfield (2014) mengklasifikasikan bayi berdasarkan usia gestasi:

- a. *Preterm infant* adalah bayi prematur (kurang dari 37 minggu).
- b. *Term infant* adalah bayi yang cukup bulan (37-42 minggu).

c. *Past term infant* adalah bayi lebih bulan (setelah 42 minggu).

Merujuk pada penelitian Mumbare dalam Septiani (2015) mengatakan bahwa usia kehamilan kurang dari 36 minggu menjadi salah satu faktor terhadap kejadian BBLR. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Jammeh dalam Septiani (2015) menyimpulkan bahwa bayi yang dilahirkan pada usia kurang dari 37 minggu tidak berkaitan dengan kejadian BBLR.

7. Konsumsi Tablet Besi (Fe)

Selama masa kehamilan kebutuhan zat besi akan terus meningkat sehingga ibu hamil dianjurkan untuk rutin mengonsumsi tablet Fe selama masa kehamilannya. Menurut Khanal dalam Septiani (2015) mengonsumsi tablet Fe berdampak positif terhadap kejadian BBLR dibandingkan dengan ibu yang tidak mengonsumsi tablet Fe akan mengalami BBLR. Resiko yang ditimbulkan oleh defisiensi zat besi akan semakin bertambah utamanya bagi wanita dengan tingkat sosial ekonomi rendah (Abu-saad dan Fraser dalam Septiani, 2015). Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Torres-Aroella dalam Septiani (2015) mengatakan tidak ada keterkaitan antara konsumsi tablet besi dengan berat bayi lahir.

8. Sosial Ekonomi Ibu

Sosial ekonomi adalah tolak ukur untuk mendeskripsikan tingkat perbedaan sosial, yakni pendapatan, pekerjaan, ataupun pendidikan. Penelitian Torres-Aroella dalam Septiani (2015) mengatakan salah satu faktor dari kejadian BBLR adalah tingkat sosial ekonomi rendah sebab berisiko 2,68 lebih besar. Sedangkan menurut Abusaad dan Fraser dalam Septiani (2015) tingkat sosial ekonomi rendah tidak semata-mata menjadi pengaruh terhadap perkembangan janin, melainkan risiko buruk yang dapat terjadi ketika bayi lahir, seperti nutrisi, aktivitas, psikososial, dll.

9. Merokok pada Masa Kehamilan

Mengonsumsi rokok selama kehamilan membawa dampak buruk terhadap kondisi janin. Karbon monoksida yang terkandung dalam asap rokok yang dihirup ibu hamil akan terbawa ke aliran darah menuju ke janin. Hal ini mengakibatkan

oksigen dan nutrisi yang akan disalurkan untuk bayi menjadi terhambat, sehingga berat plasenta menjadi berkurang sebab lapisan plasenta semakin menipis dan kemungkinan letak plasenta menjadi lebih rendah atau plasenta previa (plasenta ada pada mulut rahim) (Mutminna, 2017).

Terkena paparan dan menghisap asap rokok menjadi pengaruh utama terhadap kondisi perkembangan dan pertumbuhan janin, terutama pada trimester pertama sampai usia kehamilan cukup bulan. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Indah dalam Mutmainna (2017) bahwa ibu hamil yang terpapar asap rokok memiliki risiko 7,36 kali melahirkan bayi BBLR dibandingkan ibu hamil yang tidak terpapar oleh asap rokok.

Penelitian BMA *Tobacco Control Resource Centre* mendeskripsikan ibu yang terpapar asap rokok selama kehamilan berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah sebesar 1,5 kali hingga 9,9 kali dibandingkan dengan ibu yang tidak terpapar asap rokok (Kartono dalam Mutmainna, 2017). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sirajuddin dalam Mutmainna (2017) ibu hamil yang terpapar asap rokok akan berisiko 1,2 kali lebih tinggi melahirkan bayi berat lahir rendah dibandingkan ibu yang tidak terpapar asap rokok selama kehamilannya.

Faktor utama bayi berat lahir rendah akibat asap rokok adalah terhambatnya aliran darah menuju ke janin sehingga asupan gizi ibu untuk janin menjadi berkurang. Hindmarsh dalam Mutmainna (2017) menyatakan bahwa bayi yang lahir dari ibu perokok berat dapat mempengaruhi pertumbuhan bayi meliputi berat, panjang, dan lingkar kepala pada bayi. Bahkan tidak menutup kemungkinan efek dari asap rokok dapat mempengaruhi fungsi organ tubuh pada bayi seperti hati, jantung, otak, dan pertumbuhan tulang.

10. Paritas

Paritas merupakan jumlah kehamilan dengan menghasilkan janin yang mampu hidup diluar rahim selama 28 minggu (JHPIEGO dalam Herlina, 2017). Menurut BKBN tahun 2011, paritas adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan. Bentuk dan ukuran uterus menjadi pengaruh paritas seorang ibu (Cunningham

dalam Septiani, 2015). Manuaba dalam Septiani (2015) mengklasifikasikan jumlah anak yang dilahirkan.

- a. Primipara adalah wanita yang melahirkan satu kali.
- b. Multipara adalah wanita yang sudah melahirkan beberapa kali.
- c. Grandemultipara adalah wanita yang telah melahirkan lebih dari 5 kali.

Semakin banyak yang telah dilahirkan, maka akan semakin meningkat resiko BBLR bahkan kematian akibat jarak melahirkan terlalu dekat (Juaria dalam Septiani, 2015). Selain itu, Hapisah dalam Septiani (2015) mengatakan bahwa ibu yang mengalami paritas tinggi dapat menyebabkan tempat implantasi terganggunya plasenta dan janin.

Penelitian tersebut berbeda dengan penemuan Yuliva dalam Septiani (2015) menyatakan paritas tidak berkaitan dengan kejadian BBLR. Hal tersebut disetujui oleh Khatun dan Rahman dalam Septiani (2015) bahwa tidak ada keterkaitan antara primipara dan grandemultipara terhadap kejadian BBLR.

11. Riwayat Ibu Melahirkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Kelahiran bayi prematur dan BBLR akan sering terjadi dan berulang dalam keluarga. Riwayat ibu melahirkan BBLR 3,4 kali berisiko tinggi akan kembali melahirkan BBLR daripada ibu yang tidak memiliki riwayat melahirkan BBLR (Hapisah dalam Septiani, 2015). Sejalan dengan penelitian Darmayanti dalam Septiani (2015) riwayat ibu melahirkan BBLR menjadi faktor utama terjadinya kelahiran BBLR. Selanjutnya, Metgud dalam Septiani (2015) menemukan riwayat ibu melahirkan BBLR 3,3 kali cenderung lebih berisiko melahirkan BBLR dari pada ibu yang tidak sama sekali memiliki riwayat kejadian BBLR.

12. Komplikasi Kehamilan


Komplikasi kehamilan adalah suatu keadaan kegawatdaruratan obstetrik yang dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi (Prawirohardjo

dalam Ekaningrum, 2014). Selanjutnya, Pramono dan Muzakkiroh dalam Ekaningrum (2014) menemukan ibu yang mengalami komplikasi kehamilan mempunyai resiko 2,3 kali melahirkan BBLR dibandingkan ibu yang tidak mengalami komplikasi kehamilan.



D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dan disusun berdasarkan penelitian relevan atau terdahulu.




Skema 2.1 kerangka teori

Di modifikasi beberapa teori yaitu Kramer (1987), Stone et al (2007), Shah & Ohlsson (2002), dan McCarthy & Maine (1992), Behrman, dkk. (2000); Abu Saad dan Fraser (2010); Dharmalingan, dkk.(2010); Centers for Disease and Prevention, dkk. (2010)

Keterangan : : Variabel yang diteliti
 : Variabel yang tidak diteliti

E. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah istilah lain dari keterkaitan kerangka teori dalam hasil penelitian dengan teori yang sebelumnya. Di bawah ini bagan dari konsep penelitian faktor-faktor yang memiliki pengaruh dengan kejadian BBLR.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional* di mana pendekatan ini merupakan pendekatan yang melakukan pengukuran dan pengamatan di waktu yang bersamaan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September – Oktober 2019 di Puskesmas Tanralili Kab. Maros.

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Data

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Semua jumlah persalinan ibu yang lahir antara bulan Januari – September yaitu berjumlah 292 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu hingga dianggap mewakili populasinya (Sastroasmoro, 1995). Besar sampel yang dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan rumus Slovin berikut.

$$n = \frac{N}{(d^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat kepercayaan ketepatan (0.05)

Sehingga,

$$n = \frac{292}{1 + 292 (0.05^2)}$$

$$n = \frac{292}{1 + 294 (0.0025)}$$

$$n = \frac{292}{1.735}$$

n = 169 sampel

- c. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Random sampling*,

D. Teknik pengumpulan data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer mengenai faktor yang mempengaruhi angka kejadian BBLR di wilayah kerja puskesmas Tanralili Kabupaten Maros menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden ibu bayi dengan berat badan lahir rendah menggunakan bantuan kuesioner.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder mengenai faktor yang mempengaruhi angka kejadian BBLR di wilayah kerja puskesmas Tanralili Kabupaten Maros dengan cara mengambil data dari dokumentasi yang diperoleh dari Instansi atau pihak lain yang terkait berat badan lahir rendah.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah kuesioner. Selain itu, instrumen yang paling penting adalah peneliti itu sendiri dan alat penunjang adalah kamera handphone sebagai dokumentasi kegiatan yang berlangsung.

F. Pengolahan Data

1. Editing

Memeriksa data, memperjelas serta melakukan pengolahan terhadap data yang dikumpulkan dan memeriksa kelengkapan dan kesalahan.

2. Coding

Mengkode data merupakan kegiatan mengklasifikasikan data memberikankode untuk masing-masing kelas terhadap data yang diperoleh dan sumber data yang telah diperiksa.

3. Tabulating

Dari data mentah dilakukan penyesuaian data yang merupakan pengorganisasian data sedemikian rupa agar mudah dapat dijumlahkan, disusun dan ditata untuk disajikan dan dianalisa.

G. Tahap Analisis Data Penelitian

1. Analisis univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran masing-masing variable independen dan dependen dalam bentuk distribusi frekuensi.

2. Analisis bivariat

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian statistic dengan uji chi-square atau χ^2 , menggunakan komputerisasi melalui program SPSSversi 20 dengan penilaian :

- a. Jika nilai $p > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b. Jika nilai $p < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

H. Penyajian Data

Data yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan narasi untuk membahas hasil penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 8 Desa wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 169 orang Ibu yang melahirkan dari bulan Januari-September. Tanralili adalah nama sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Tanralili memiliki luas wilayah 84,46 km² dan jumlah penduduk sebanyak 293,92 jiwa/km. Delapan Desa di Kecamatan Tanralili sebagai berikut:

1. Desa Allaere, memiliki luas 6,16 km²
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simbang
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Borong
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Damai
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandai
2. Desa Damai, memiliki luas 8,3 km²
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Borong dan Desa Allaere
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Toddopulia
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kurusumange
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandai
3. Desa Kurusumange, memiliki luas 15,52 km²
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Damai
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Toddopulia dan Kecamatan Tompobulu
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lekopancing
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandai dan Desa Sudirman
4. Desa Lekopancing, memiliki luas 13,17 km²
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kurusumange
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Purna Karya
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandai

5. Desa Purna Karya, memiliki luas 5,34 km²
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lekopancing
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandai
6. Desa Sudirman, memiliki luas 4,35 km²
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mandai
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kurusumange
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kurusumange
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandai
7. Desa Toddopulia, memiliki luas 32,12 km²
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simbang
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kurusumange, Desa Damai, dan Kelurahan Borong
8. Kelurahan Borong, memiliki luas 6,16 km²
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simbang
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Toddopulia
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Damai
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Allaere

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen (kuesioner) yang dibacakan oleh peneliti dijawab langsung oleh responden. Setelah data terkumpul dan dilakukan pemeriksaan ulang, kemudian diolah melalui analisis SPSS, selanjutnya, hasil penelitian secara lengkap disajikan dalam bentuk tabel yang meliputi karakteristik responden, analisis univariat, dan analisis bivariat dari setiap variabel untuk menghasilkan data distribusi.

Data yang diperoleh kemudian diolah sesuai dengan tujuan penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut.

1. Karakteristik Responden

Kelompok umur responden

Tabel 3.1
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Responden
di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili
Kabupaten Maros

Umur	Frekuensi (n)	Persentase (%)
12-20	18	10.7
21-29	96	56.8
30-38	47	27.8
39-47	6	3.6
48-56	2	1.2
Total	169	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.1 tentang umur Ibu terhadap faktor kejadian BBLR di wilayah Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros menunjukkan bahwa dari 169 responden, distribusi responden berdasarkan kelompok umur dengan jumlah tertinggi yaitu kelompok umur 21-29 tahun sebanyak 96 responden (56,8%) dan yang terendah yaitu kelompok umur sebanyak 48-56 sebanyak 2 responden (1,2%).

2. Karakteristik Bayi

a. Kelompok umur bayi

Tabel 3.2
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Umur Bayi
di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili
Kabupaten Maros

Umur	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1-3	73	43.2
4-6	62	36.7
7-9	34	20.1
Total	169	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari 169 bayi, distribusi berdasarkan kelompok umur bayi dengan jumlah tertinggi yaitu pada kelompok umur 1-3 bulan yaitu sebanyak 73 orang (43,2%) dan yang terendah adalah umur 7-9 bulan yaitu sebanyak 34 orang (20,1%).

b. Jenis Kelamin Bayi

Tabel 3.3
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Bayi
di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili
Kabupaten Maros

Jenis Kelamin	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Laki-laki	73	43.2
Perempuan	96	56.8
Total	169	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.3 menunjukkan bahwa dari 169 bayi, distribusi responden berdasarkan jenis kelamin bayi dengan jumlah tertinggi yaitu Perempuan sebanyak 96 orang (56,8%) dan terendah Laki-laki yaitu sebanyak 73 orang (43,2%).

3. Analisis Univariat

Analisis univariat merupakan analisis yang dilakukan untuk mendeskripsikan distribusi dan presentase dari variabel dependen yaitu kejadian BBLR maupun variabel-variabel independen yang meliputi pekerjaan ibu, umur ibu, pendidikan ibu, usia gestasi, konsumsi tablet fe, paritas, komplikasi kehamilan, dan pelayanan ANC. Hasil analisis ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

a. Pekerjaan Ibu

Tabel 3.4
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Responden
di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili
Kabupaten Maros

Pekerjaan ibu	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Bekerja	30	17.8
Tidak Bekerja	139	82.2
Total	169	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.4 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan status pekerjaan Ibu yaitu dari 169 sampel, Ibu dengan kategori bekerja berjumlah 30 responden (17,8%) dan kategori tidak bekerja yaitu 139 responden (82,2%).

b. Usia Melahirkan Ibu

Tabel 3.6
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Melahirkan Responden
Di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili
Kabupaten Maros

Usia Melahirkan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Risiko tinggi	34	20.1
Risiko rendah	135	79.9
Total	169	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.6 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan usia Ibu melahirkan di wilayah Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros, yaitu dari 169 sampel, usia Ibu dengan kategori risiko tinggi berjumlah 34 responden (20,1%) dan kategori risiko rendah sebanyak 135 responden (79,9%).

c. Pendidikan Ibu

Tabel 3.5
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden
di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili
Kabupaten Maros

Pendidikan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Rendah	19	11.2
Tinggi	150	88.8
Total	169	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.5 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan Ibu di wilayah Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros, yaitu dari 169 sampel, tingkat pendidikan dengan kategori rendah berjumlah 19 responden (11,2%) dan kategori tinggi yaitu sebanyak 150 responden (88,8%).

d. Usia Gestasi

Tabel 3.7
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Gestasi Responden
Di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili
Kabupaten Maros

Usia Gestasi	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Preterm	9	5.3
Term	160	94.7
Total	169	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.7 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan usia gestasi di wilayah Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros, yaitu dari 169 sampel, usia gestasi dengan kategori prematur sebanyak 9 responden (5,3%) dan kategori normal sebanyak 160 responden (94,7%).

e. Tablet Fe

Tabel 3.8
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Konsumsi Tablet Fe
Di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili
Kabupaten Maros

Tablet Fe	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Kurang	16	9.5
Cukup	153	90.5
Total	169	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.8 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan mengonsumsi tablet Fe di wilayah Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros, yaitu dari 169 sampel, Ibu yang mengonsumsi tablet Fe dengan kategori kurang berjumlah 16 responden (9,5%) dan kategori cukup berjumlah 153 responden (90,5%).

f. Paritas / Jumlah Persalinan yang pernah dialami Ibu

Tabel 3.9
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Paritas
di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili
Kabupaten Maros

Paritas	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Banyak	8	4.7
Sedikit	161	95.3
Total	169	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.9 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan paritas di wilayah Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros yang menunjukkan bahwa dari 169 sampel, paritas dengan kategori banyak berjumlah 8 responden (4,7%) dan kategori sedikit berjumlah 161 responden (95,3%).

g. Komplikasi Kehamilan

Tabel 3.10
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Komplikasi Kehamilan
Di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili
Kabupaten Maros

Komplikasi Kehamilan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Ya	37	21,9
Tidak	132	78,1
Total	169	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.10 distribusi frekuensi berdasarkan komplikasi kehamilan di wilayah Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros menunjukkan bahwa dari 169 sampel, Ibu yang mengalami komplikasi kehamilan sebanyak 37 responden (21,9%) dan Ibu yang tidak mengalami komplikasi sebanyak 132 responden (78,1%).

h. Pelayanan Antenatal Care (ANC)

Tabel 3.11
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pelayanan Antenatal Care (ANC)
Di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili
Kabupaten Maros

Pelayanan ANC	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Lengkap	151	89,3
Tidak Lengkap	18	10,7
Total	169	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.11 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan pelayanan ANC di wilayah Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros, yaitu dari 169 sampel, Ibu yang memenuhi pelayanan ANC secara lengkap berjumlah 151 responden (89,3%) dan Ibu yang tidak memenuhi pelayanan ANC berjumlah 18 responden (10,7%).

i. Kejadian BBLR Bayi

Tabel 3.12
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kejadian berat badan lahir rendah
di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili
Kabupaten Maros

Kejadian BBLR Bayi	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Ya	16	9,5
Tidak	153	90,5
Total	169	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.12 menunjukkan bahwa dari 169 responden, distribusi frekuensi berdasarkan Kejadian berat badan lahir rendah berjumlah 16 orang (9,5%) dan yang tidak mengalami BBLR berjumlah 153 orang (90,5%).

4. Analisis Bivariat

Analisis yang dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh variabel dependen (kejadian BBLR) dan variabel independen (pekerjaan ibu, umur ibu, pendidikan ibu, usia gestasi, konsumsi tablet Fe, paritas, komplikasi kehamilan, dan pelayanan ANC) serta membuktikan hipotesis penelitian. Hasil analisis ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

a. Pengaruh Pekerjaan Ibu dengan Kejadian berat badan lahir rendah

Pengaruh tingkat pekerjaan ibu dengan Kejadian berat badan lahir rendah dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut.

Tabel 3.13
Pengaruh Pekerjaan Ibu dengan Kejadian Berat badan lahir rendah
di Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros

Pekerjaan Ibu	Kejadian berat badan lahir rendah				Total		<i>P-value</i>
	BBLR		Tidak BBLR		n	%	
	n	%	n	%			
Bekerja	0	0,0	30	17,8	30	17,8	0,78
Tidak Bekerja	16	9,5	123	72,8	139	82,2	
Total	16	9,5	153	90,5	169	100	

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.13, menunjukkan bahwa hasil analisis pengaruh antara pekerjaan ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros yakni dari 169 sampel, pada kategori bekerja terdapat 0 (0,0%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 30 (17,8%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal sedangkan pada kategori tidak bekerja terdapat 16 (9,5%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 123 (72,8%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal .

Sesuai dengan hasil uji statistik menggunakan uji *chi square*, maka diperoleh nilai $p= 0,78$ ($p>0,05$), yang berarti tidak ada pengaruh antara pekerjaan Ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros dan membuktikan H_0 diterima dan H_a ditolak.

b. Pengaruh Usia Melahirkan dengan Kejadian Berat badan lahir rendah

Pengaruh usia melahirkan dengan Kejadian berat badan lahir rendah dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut.

Tabel 3.15
Pengaruh Usia Melahirkan dengan Kejadian Berat badan lahir rendah di Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros

Usia Melahirkan	Kejadian berat badan lahir rendah				Total		<i>P-value</i>
	BBLR		Tidak BBLR		n	%	
	n	%	n	%			
Risiko Tinggi	13	7,7	21	12,4	34	20,1	0,000
Risiko Rendah	3	1,8	132	78,1	135	79,9	
Total	16	9,5	153	90,5	169	100	

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.15, menunjukkan bahwa hasil analisis pengaruh antara usia melahirkan ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros yakni dari 169 responden, pada kategori berisiko tinggi terdapat 13 (7,7%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 21 (12,4%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal sedangkan pada kategori berisiko rendah terdapat 3 (1,8%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 132 (78,1%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal.

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p= 0,000$ ($p>0,05$), yang berarti ada pengaruh antara usia melahirkan terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kec Tanralili Kab. Marus, yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima.

c. Pengaruh Pendidikan Ibu dengan Kejadian berat badan lahir rendah

Pengaruh tingkat pendidikan dengan Kejadian berat badan lahir rendah dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut.

Tabel 3.14
Pengaruh Tingkat Pendidikan Ibu dengan Kejadian Berat badan lahir rendah di Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros

Tingkat Pendidikan Ibu	Kejadian berat badan lahir rendah				Total		P-value
	BBLR		Tidak BBLR		n	%	
	n	%	n	%			
Rendah	5	3,0	14	8,3	19	11,2	0,21
Tinggi	11	6,5	139	82,2	150	88,8	
Total	16	9,5	153	90,5	169	100	

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.14, menunjukkan bahwa hasil analisis pengaruh antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros yakni dari 169 sampel, pada kategori pendidikan rendah terdapat 5 (3,0%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 14 (8,3%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal sedangkan pada kategori pendidikan tinggi 11 (6,5%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 139 (82,2%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal.

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p = 0,21$ ($p > 0,05$), yang berarti tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Kec Tanralili Kab. Maros dan membuktikan H_0 diterima dan H_a ditolak.

d. Pengaruh Usia Gestasi dengan Kejadian berat badan lahir rendah

Pengaruh usia gestasi dengan Kejadian berat badan lahir rendah dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut.

Tabel 3.16
Pengaruh Usia Gestasi dengan Kejadian Berat badan lahir rendah
di Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros

Usia Gestasi	Kejadian berat badan lahir rendah				Total		<i>P-value</i>
	BBLR		Tidak BBLR		n	%	
	n	%	n	%			
Prematur	6	3,6	3	1,8	9	5,3	0,000
Normal	10	5,9	150	88,8	160	94,7	
Total	16	9,5	153	90,5	169	100	

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.16, menunjukkan bahwa hasil analisis pengaruh antara Usia Gestasi dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros yakni dari 169 sampel, pada kategori preterm terdapat 6 (3,6%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 3 (1,8%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal sedangkan pada kategori term terdapat 10 (5,9%) responden yang mengalami BBLR dan 150 (88,8%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal.

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p= 0,000$ ($p<0,05$), yang berarti ada pengaruh antara usia gestasi dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Maros dan membuktikan H_0 ditolak dan H_a diterima.

e. Pengaruh Tablet Fe dengan Kejadian berat badan lahir rendah

Pengaruh Tablet Fe dengan kejadian berat badan lahir rendah dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut.

Tabel 3.17
Pengaruh Tablet Fe dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros

Tablet Fe	Kejadian berat badan lahir rendah				Total		<i>P-value</i>
	BBLR		Tidak BBLR		n	%	
	n	%	n	%			
Kurang	10	5,9	6	3,6	16	9,5	0,000
Cukup	6	3,6	147	87	153	90,5	
Total	16	9,5	153	90,5	169	100	

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.17, menunjukkan bahwa hasil analisis pengaruh antara tablet Fe dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros yakni dari 169 sampel, pada kategori kurang terdapat 10 (5,9%) responden mengalami kejadian BBLR dan 6 (3,6%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal sedangkan pada kategori cukup terdapat 6 (3,6%) responden yang mengalami kejadian BBLR dalam dan 147 (87%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal.

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p= 0,000$ ($p<0,05$), yang berarti ada pengaruh antara konsumsi tablet Fe dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Maros, dan membuktikan H_0 ditolak dan H_a diterima.

f. Pengaruh Paritas / Jumlah Persalinan yang pernah dialami Ibu dengan Kejadian berat badan lahir rendah

Pengaruh paritas dengan kejadian berat badan lahir rendah dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut.

Tabel 3.18
Pengaruh Paritas dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di
Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros

Paritas	Kejadian berat badan lahir rendah				Total		<i>P-value</i>
	BBLR		Tidak BBLR		n	%	
	n	%	n	%			
Banyak	0	0,0	8	4,7	8	4,7	1,000
Sedikit	16	9,5	145	85,8	161	95,3	
Total	16	9,5	153	90,5	169	100	

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.18, menunjukkan bahwa hasil analisis pengaruh antara paritas dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros yakni dari 169 sampel, pada kategori banyak terdapat 0 (0,0%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 8 (4,7%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal sedangkan pada kategori sedikit terdapat 16 (9,5%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 145 (85,8%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal.

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p= 1,000$ ($p>0,05$), yang berarti tidak ada pengaruh antara paritas dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Maros dan membuktikan H_0 diterima dan H_a ditolak.

g. Pengaruh Komplikasi Kehamilan dengan Kejadian berat badan lahir rendah

Pengaruh komplikasi kehamilan dengan kejadian berat badan lahir rendah dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut.

Tabel 3.19
Pengaruh Komplikasi Kehamilan dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros

Komplikasi Kehamilan	Kejadian berat badan lahir rendah				Total		<i>P-value</i>
	BBLR		Tidak BBLR		n	%	
	n	%	n	%			
Ya	16	9,5	21	12,4	37	21,9	0,000
Tidak	0	0,0	132	90,5	132	78,1	
Total	16	9,5	153	90,5	169	100	

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.19, menunjukkan bahwa hasil analisis pengaruh antara paritas dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros yakni dari 169 sampel, pada kategori ya terdapat 16 (9,5%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 0 (0,0%) responden yang bayinya tidak BBLR sedangkan pada kategori tidak terdapat 21 (12,4%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 132 (90,5%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal.

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$), yang berarti ada pengaruh antara komplikasi kehamilan dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Maros dan membuktikan H_0 ditolak dan H_a diterima.

h. Pengaruh Pelayanan ANC dengan Kejadian berat badan lahir rendah

Pengaruh pelayanan dengan kejadian berat badan lahir rendah dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut.

Tabel 3.20
Pengaruh Pelayanan ANC dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros

Pelayanan ANC	Kejadian berat badan lahir rendah				Total		<i>P-value</i>
	BBLR		Tidak BBLR		N	%	
	n	%	n	%			
Lengkap	6	3,6	145	85,8	151	89,3	0,000
Tidak Lengkap	10	5,9	8	4,7	18	10,7	
Total	16	9,5	153	90,5	169	100	

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 3.20, menunjukkan bahwa hasil analisis Pengaruh antara pelayanan ANC dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros yakni dari 169 sampel, pada kategori lengkap terdapat 6 (3,6%) responden yang kejadian BBLR dan 145 (85,8%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal sedangkan pada kategori tidak lengkap terdapat 10 (5,9%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 8 (4,7%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal.

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$), yang berarti ada Pengaruh antara pelayanan ANC dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Maros dan membuktikan H_0 ditolak dan H_a diterima.

B. Pembahasan

1. Pekerjaan Ibu

Pekerjaan merupakan kegiatan atau profesi seseorang di masyarakat. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa jika status pekerjaan seseorang tinggi, maka boleh mempunyai anak yang banyak karena mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Herlina, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pekerjaan ibu terhadap kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Maros tahun 2019 yang signifikan $p=0,78$ ($p>0,05$). Data yang diperoleh pada kategori bekerja terdapat 0 (0,0%) ibu yang mengalami kejadian BBLR dibandingkan pada kategori tidak bekerja terdapat 16 (9,5%) ibu yang mengalami kejadian BBLR.

Tidak ada pengaruh pekerjaan ibu terhadap kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) semuanya mengalami kejadian BBLR pada kategori tidak bekerja. Hal ini disebabkan karena meskipun tidak bekerja, ibu yang melahirkan bayi yang BBLR tidak memperhatikan hal-hal yang dianjurkan selama masa kehamilan seperti kepatuhan/kelengkapan kunjungan pelayanan kesehatan pada masa kehamilan mengenai ANC yang telah lengkap.

Data yang menunjukkan bahwa ibu yang bekerja sama sekali tidak mengalami BBLR bukan berarti tidak berdampak dan bukan menjadi penentu akan terjadinya BBLR karena baik itu bekerja maupun tidak bekerja, ketika ibu tetap dapat menjaga pertumbuhan dan perkembangan kandungannya terhindar dari faktor-faktor lain itu akan mencegah terjadinya BBLR.

Sejalan dengan penelitian Mahdalena (2017), perbedaan median pekerjaan kelompok Ibu yang melahirkan BBLR dan tidak BBLR mempunyai nilai *p-value* sebesar 0,702. Artinya tidak ada pengaruh pekerjaan ibu terhadap kejadian BBLR di RSUD Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta ekonomi yang berpengaruh

terhadap kejadian BBLR walaupun secara tidak langsung karena pendapatan yang kurang akan menyulitkan ibu memenuhi kebutuhan bayi terutama dalam hal gizi.

Sama dengan penelitian Septiani (2015) menunjukkan proporsi BBLR lebih banyak terjadi pada ibu yang tidak bekerja (65,7%) daripada ibu yang bekerja. Hal tersebut disebabkan karena lebih dari separuh sampel penelitian ini adalah ibu rumah tangga atau tidak bekerja (63,6%). Selain itu, penelitian ini sejalan dengan Vrijkotte, dkk. (dalam Septiani, 2015) menunjukkan bahwa rata-rata berat bayi pada ibu yang tidak bekerja lebih rendah daripada ibu yang bekerja.

Berbeda dengan penelitian Syarifuddin, dkk. (2011) menemukan hasil statistik bahwa berat lahir bayi pada kelompok ibu pekerja cenderung lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang bukan pekerja. Ibu yang bekerja berisiko 2,41 kali lebih besar melahirkan BBLR daripada ibu rumah tangga (Aminian, dkk., 2014). Sejalan dengan itu Viengskhone, dkk. (2010) menyimpulkan bahwa ibu hamil yang memiliki pekerjaan fisik yang berat berisiko 5 kali lebih besar melahirkan BBLR dibandingkan dengan ibu hamil pekerja kantoran. Jenis pekerjaan yang berat dapat memicu pelepasan hormon stres yang mengganggu pertumbuhan janin sebagai akibat dari *hypothalamic pituitary axis* (HPA) yang sangat merugikan kehamilan di awal (vrijkotte, dkk. dalam Syarifuddin, 2011).

Namun, penelitian di atas dibantahkan oleh Pramono (2009) yang mengatakan bahwa berdasarkan data Riskesdas tahun 2007, menemukan tidak ada Pengaruh antara status bekerja dengan kejadian BBLR. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh atau Pengaruh yang sangat signifikan antara pekerjaan Ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) karena lebih dominan dan besar peluang untuk BBLR ketika tidak bekerja.

2. Usia Ibu Melahirkan

Berat badan lahir rendah (BBLR) menjadi salah satu akibat dari kehamilan yang terjadi sebelum remaja berkembang secara penuh karena dapat mengalami

cedera pada saat persalinan, dan besar kemungkinan mengalami kematian pada bayi (Herlina, 2011). Berdasarkan penelitian Viengsakhone, dkk. (2010) menyimpulkan bahwa usia ibu melahirkan kurang dari 18 tahun berisiko 8 kali lebih besar untuk mengalami BBLR.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat adanya pengaruh Usia ibu melahirkan terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Maros tahun 2019 yang signifikan $p=0,000$ ($p<0,05$). Data yang diperoleh pada kategori berisiko tinggi terdapat 13 (7,7%) responden yang mengalami kejadian BBLR dibandingkan pada kategori berisiko rendah terdapat 3 (1,8%) responden yang mengalami kejadian BBLR.

Hal ini disebabkan karena usia ibu yang terlalu dini (12-19 tahun) atau remaja maupun terlalu tua (35-56 tahun) sehingga lebih berisiko tinggi mengalami kejadian BBLR, sebab seorang ibu yang hamil tidak memperhatikan kepatuhan/kelengkapan mengenai ANC. Usia ibu yang masih muda membutuhkan nutrisi dan harus dibagi kepada janin, selain itu pada masa muda juga sistem hormon masih dalam tahap perkembangan. Sama halnya dengan usia ibu yang terlalu tua dapat menimbulkan gangguan kesehatan ibu dan anak atau rentan terhadap penyakit yang berpengaruh terhadap kandungan.

Sejalan dengan penelitian Nisma (2016) yang menunjukkan hasil uji statistik dengan *chi-square* diperoleh p value = 0,001 ($p<0,05$) sehingga dapat disimpulkan ibu yang memiliki usia ibu berisiko (<20 tahun / >35 tahun) mempunyai peluang 2,551 kali untuk mengalami kelahiran dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dibandingkan dengan responden dengan usia yang tidak berisiko. Sama halnya dengan penelitian Septiani (2015) terdapat Pengaruh antara usia Ibu dengan kejadian BBLR, yang melahirkan pada usia < 20 tahun dan atau > 35 tahun kemungkinan 1,30 lebih besar melahirkan BBLR daripada ibu yang melahirkan pada usia 20-35 tahun.

Berbeda dengan penemuan Astuti (2011), menunjukkan bahwa kejadian BBLR terbanyak dialami oleh ibu dengan umur 20 – 35 tahun kemungkinan hal

ini terjadi terutama disebabkan oleh retardasi (penghambatan) pertumbuhan intrauterin, sedangkan yang lainnya termasuk SMK (sesuai masa kehamilan) yang disebabkan oleh tidak sanggupnya uterus menahan janin, gangguan selama hamil, lepasnya plasenta lebih cepat dari waktunya, atau rangsangan yang memudahkan terjadinya kontraksi uterus sebelum cukup bulan. Sama halnya dengan penelitian Rahma (2015) menunjukkan bahwa tidak ada Pengaruh antara umur ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 yang signifikan ($p>0,973$). Selain itu, mengingat bahwa kejadian peristiwa kesehatan termasuk yang berkaitan dengan kebidanan merupakan faktor dengan multi kausal, yang bisa saja terjadi karena adanya faktor lain yang lebih dominan terhadap kejadian BBLR. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai faktor predisposisi terjadinya BBLR.

Penelitian ini pun ditegaskan oleh penelitian Pramono (2009) yang menunjukkan bahwa usia Ibu melahirkan kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun dapat mempengaruhi terjadinya BBLR.

3. Pendidikan Ibu

Pengaruh pendidikan sangat berdampak terhadap perilaku dan pola hidup seseorang terutama dalam memotivasi untuk bersikap dan ikut serta dalam pembangunan kesehatan (Notoatmodjo dalam Herlina 2017), maka tingginya tingkat pendidikan seseorang maka makin mudah menerima informasi sehingga akan semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki salah satunya di bidang kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian tidak ada Pengaruh antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros tahun 2019 yang signifikan $p=0,21$ $p>0,05$). Data yang diperoleh pada kategori pendidikan rendah terdapat 5 (3,0%) responden yang mengalami kejadian BBLR yaitu pendidikan dasar 7-9 tahun dibandingkan pada kategori pendidikan tinggi terdapat 11 (6,5%) responden yang mengalami kejadian BBLR perguruan tinggi 10-12 tahun.

Hal ini disebabkan karena meskipun seorang ibu memiliki pendidikan yang tinggi tetapi tidak memperhatikan hal-hal yang dianjurkan selama masa kehamilan seperti kepatuhan/kelengkapan pelayanan kesehatan pada masa kehamilan mengenai ANC. Inilah yang menyebabkan pada kategori pendidikan tinggi banyak mengalami kejadian BBLR. tidak menjamin anak yang dilahirkan memiliki berat badan lahir normal, ibu yang melahirkan bayi BBLR

Tidak ada pengaruh pendidikan ibu terhadap kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) disebabkan dari 16 responden yang BBLR, terdapat 11 responden mengalami kejadian BBLR pada kategori pendidikan tinggi dan 5 responden yang mengalami kejadian BBLR pada kategori pendidikan rendah. Pendidikan tinggi pada penelitian ini lebih banyak yang mengalami kejadian BBLR dibandingkan dengan kategori pendidikan rendah dikarenakan seorang ibu tidak memperhatikan hal-hal yang dianjurkan selama masa kehamilan seperti kepatuhan/kelengkapan pelayanan kesehatan mengenai *antenatal care*.

Sejalan dengan hasil penelitian Nisma (2016) menunjukkan bahwa hasil uji statistik Chi-Square diperoleh p value = 0,071 ($p > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang bermakna antara status pendidikan ibu dengan kejadian BBLR. Hal ini dikarenakan banyak ibu yang melahirkan bayi dengan status pendidikan tinggi yaitu SMA dan diatas SMA. Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap respon dan tanggapan responden terhadap kondisi dirinya. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Notoatmodjo dalam Nisma, 2016), yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang berpengaruh dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang datang dari luar. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi akan memberikan respon yang lebih rasional dalam menyikapi keadaan yang dialaminya.

Penelitian ini sejalan pula dengan penelitian Puspitasari (2014), yang menemukan tidak adanya Pengaruh antara pendidikan ibu dengan kejadian BBLR, sebagian besar sampel berpendidikan tinggi dan telah memahami tentang faktor

risiko dan tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kelahiran BBLR.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Septiani (2015) mengatakan bahwa, semakin rendah pendidikan ibu maka risiko ibu untuk melahirkan BBLR turut meningkat karena hanya 6,9% ibu yang melahirkan BBLR dengan pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi, selebihnya ibu melahirkan BBLR karena pendidikan rendah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Pramono (2009) menunjukkan bahwa ibu yang berpendidikan tinggi lebih banyak tidak melahirkan BBLR (4,2%).

4. Usia Gestasi

Usia gestasi merupakan istilah singkat untuk mendeskripsikan perkembangan kehamilan per minggu sejak hari pertama siklus menstruasi wanita hingga waktu tertentu (National Institute of Health, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh antara usia gestasi terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili kab. Maros tahun 2019 yang signifikan $p=0,000$ ($p<0,05$). Data yang diperoleh pada kategori prematur terdapat 6 (3,6%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 3 (1,8%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal. Sedangkan pada kategori normal terdapat 10 (5,9%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 150 (88,8%) responden yang tidak bayinya BBLR. Usia gestasi pada kategori normal lebih banyak responden yang kurang mengonsumsi tablet Fe sehingga banyak yang mengalami kejadian BBLR.


Sejalan dengan hasil penelitian Windari (2015) menemukan bahwa ada pengaruh antara umur kehamilan ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Panembahan Senopati Bantul pada Tahun 2014. Berdasarkan uji Odds Ratio (OR) diketahui sebesar 2,042 yang artinya umur kehamilan <37 minggu berisiko 2,042 kali lipat untuk melahirkan BBLR dibandingkan umur kehamilan ≥ 37 minggu.

Sama halnya dengan hasil penelitian Septiani (2015) yang menemukan bahwa kejadian BBLR lebih banyak terjadi pada bayi prematur dengan proporsi masing-masing sebesar 26,6% dan 78,4%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan pada usia kehamilan < 37 minggu cenderung lahir dengan berat lahir <2500 gr.

Pengaruh antara masa gestasi dengan kejadian BBLR yang diteliti memiliki kesamaan hasil dengan yang didapatkan oleh Oktofusi (dalam Filla, 2015) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa usia kehamilan mempengaruhi kejadian BBLR dengan hasil uji *chi-square* menunjukkan nilai $p=0,001$ ($p\text{-value}<0,05$). Hasil serupa didapatkan pada penelitian Rahmi (dalam Filla, 2015) yang mendapatkan hasil uji dengan nilai $p=0,000$ ($p\text{-value}<0,05$).

Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Jammeh dalam Septiani (2015) menyimpulkan bahwa bayi yang dilahirkan pada usia kurang dari 37 minggu tidak berkaitan dengan kejadian BBLR. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut lebih cenderung yang mengatakan adanya Pengaruh usia gestasi dengan bayi prematur terhadap kejadian BBLR. Hasil penelitian yang diperoleh sebagian besar sama dengan beberapa penelitian sebelumnya.

Allah SWT Berfirman Q.S A'Rad ayat 8 :



Artinya:

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya”

Dari Al-aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas berdasarkan ayat tersebut sehubungan dengan makna firmanNya ada janin yang kurang sempurna atau janin yang gugur, kandungan yang bertambah yaitu rahim yang sempurna terus bertambah masa kandungannya hingga melahirkan dengan sempurna, berbeda dengan rahim yang kurang sempurna kelahirannya *prematuur*. Demikian itu karena diantara kaum wanita ada yang masa kandungannya mencapai sepuluh bulan ada pula yang kurang dari biasanya. Hal inilah yang disebutkan oleh Allah SWT semua terjadi berdasarkan pengetahuan dari Allah SWT. Allah SWT mengatakan mengetahui tentang kandungan dari dulu hingga sekarang dan seterusnya, mengetahui keadaan janin sejak masih berbentuk ovum yang dibuahi sperma. Allah Swt telah terlebih dahulu mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan bukan saja jenis kelaminnya, tetapi juga berat badan dan bentuknya, keindahan dan keburukannya, usia dan rezekinya, masa kini dan masa depannya dan Allah Swt ialah yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi, sehingga pada akhirnya tidak ada sesuatu pun yang ghaib bagi-Nya.

Merujuk pada ayat di atas seorang ibu hendaknya senantiasa mendoakan kehamilannya agar menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan bayi dalam kandungan karena berawal dari segumpal darah hingga memiliki bentuk, jenis kelamin, bahkan berat badan lahir bayi serta usia untuk bayi dilahirkan semua dengan ketentuan dan kekuasaan Allah SWT.

5. Tablet Fe

Selama masa kehamilan kebutuhan zat besi akan terus meningkat sehingga ibu hamil dianjurkan untuk rutin mengonsumsi tablet Fe selama masa kehamilannya. Jumlah zat besi yang dibutuhkan pada waktu hamil jauh lebih besar dari wanita tidak hamil, hal ini dikarenakan kebutuhan Fe naik untuk kebutuhan plasenta dan janin dalam kandungan. Menurut Kemenkes RI (2010), setiap ibu hamil harus mendapatkan tablet Fe minimal 90 tablet yang dikonsumsi sebanyak satu tablet selama 90 hari diberikan sejak pemeriksaan kehamilan pertama kali sehingga

mencegah terjadinya anemia dan menjaga pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh adanya pengaruh antara mengonsumsi tablet Fe atau zat besi terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Maros yang signifikan $p=0,000$ ($p<0,05$). Data yang diperoleh pada kategori kurang terdapat 10 (5,9%) responden dengan yang mengalami kejadian BBLR dibandingkan pada kategori cukup terdapat 6 (3,6%) responden yang mengalami kejadian BBLR. Hal ini disebabkan ketika seorang ibu tidak melakukan kunjungan atau pelayanan/kelengkapan kesehatan mengenai *antenatal care* karena pada saat melakukan kunjungan akan diberikan tablet Fe yang dibutuhkan pada saat mengandung agar bayi dapat berkembang pesat sehingga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi terlebih lagi ketika.

Selaras dengan hasil penelitian Septiani (2015) menemukan 52,3% bayi BBLR dilahirkan dari ibu yang mengonsumsi tablet Fe <90 hari. Penelitian tersebut menunjukkan adanya Pengaruh antara ibu yang tidak mengonsumsi tablet Fe dan ibu yang kurang mengonsumsi tablet Fe < 90 hari selama masa kehamilan dengan kejadian BBLR. Ibu yang tidak mengonsumsi tablet Fe selama hali memiliki kemungkinan 1,26 kali lebih besar melahirkan anak BBLR dibandingkan dengan ibu yang mengonsumsi tablet Fe > 90 hari.

Sejauh ini belum ditemukan penelitian yang menunjukkan tidak adanya Pengaruh konsumsi tablet Fe dengan kejadian BBLR pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan kepada Kementerian Kesehatan agar membuat kebijakan terhadap pemberian tablet Fe ketika ibu hamil melakukan kunjungan ANC.

6. Paritas

Paritas merupakan jumlah kehamilan dengan menghasilkan janin yang mampu hidup diluar rahim selama 28 minggu (JHPIEGO dalam Herlina, 2017). Menurut BKBN tahun 2011, paritas adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan.

Bentuk dan ukuran uterus menjadi pengaruh paritas seorang ibu (Cunningham dalam Septiani, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh tidak adanya pengaruh paritas terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Gowa tahun 2019 yang signifikan $p=1,000$ ($p>0,05$). Data yang diperoleh pada kategori sedikit terdapat 16 (9,5%) responden yang mengalami kejadian BBLR dibandingkan pada kategori banyak terdapat 0 (0,0%) responden yang mengalami kejadian BBLR.

Tidak ada pengaruh paritas terhadap kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) disebabkan dari 16 responden yang BBLR, semuanya mengalami kejadian BBLR pada kategori sedikit. Pada variabel paritas pada kategori sedikit seorang ibu banyak mengalami kejadian BBLR dikarenakan tidak memperhatikan kepatuhan/kelengkapan pelayanan *antenatal care*.

Selaras dengan hasil penelitian Astuti (2011) menemukan bahwa sebagian besar ibu yang melaksanakan persalinan dengan paritas minimal 3 anak sebanyak 192 (80.3%) dengan kelahiran bayi yang mengalami BBLR memberi interpretasi akan adanya faktor lain yang mempengaruhi dan biasanya dapat berpengaruh dengan asupan nutrisi yang kurang diperoleh ibu baik secara kualitas maupun kuantitas sebagaimana dipahami bahwa penurunan berat badan sangat erat kaitannya dengan kurangnya asupan nutrisi yang dikonsumsi.

Sedangkan Ibu yang melaksanakan persalinan dengan paritas lebih dari 3 anak sebanyak 47 (19.7%) Paritas yang sering tidak hanya berdampak pada tingkat kesejahteraan namun juga dapat berdampak pada status kesehatan baik ibu maupun bayi. Pada ibu, banyak anak akan menurunkan kemampuan fisikal dari organ reproduksi sehingga pada kehamilan dan persalinan yang dihadapi lebih dari 3 kali merupakan kehamilan yang berisiko terhadap timbulnya berbagai penyulit dalam masa kehamilan sehingga akan mempengaruhi tingkat kematian ibu. Adanya penyulit pada masa kehamilan tersebut tentunya akan berdampak pada kesehatan bayi yang dapat meningkatkan tingginya angka kematian bayi.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada Pengaruh antara paritas ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 yang signifikan ($p > 0,961$). Hal ini disebabkan karena ibu yang paritas >3 biasanya lebih berpengalaman dalam perawatan bayi, dan kesiapan dalam menghadapi kehamilan, baik secara fisik maupun mental, selain itu dikarenakan pada ibu yang memiliki jumlah paritas yang tinggi tidak semuanya memiliki faktor risiko pemberat lainnya, contohnya seperti anemia dan defisiensi nutrisi (Amiruddin, 2009). Setiap ibu hamil memerlukan tambahan kalori dan nutrisi karena selama kehamilannya mereka harus memasok energi untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Seorang ibu hamil akan melahirkan bayi yang sehat bila tingkat kesehatan dan gizi berada dalam kondisi yang baik, sejak sebelum dan selama hamil.

Berdasarkan penelitian Sulistyorini (2014) Hasil uji statistic dengan *Chi-Square tests* menunjukkan bahwa tidak ada Pengaruh antara paritas dengan BBLR ($p=1,000$) dimana (p) lebih dari ($\alpha=0,05$). Kepercayaan populer yang ada dikalangan masyarakat, bahwa persalinan akan semakin mudah dan baik dengan semakin banyaknya pengalaman melahirkan. Penelitian lain menambahkan bahwa status paritas yang tinggi dapat meningkatkan resiko kejadian BBLR dan bayi lahir mati, hal tersebut terjadi karena semakin tinggi status paritasnya maka kemampuan rahim untuk menyediakan nutrisi bagi kehamilan selanjutnya semakin menurun sehingga penyaluran nutrisi antara ibu dan janin terganggu yang akhirnya dapat mengakibatkan BBLR.

Berbeda dengan penelitian Septiani (2015) menemukan bahwa paritas Ibu memiliki Pengaruh dengan kejadian BBLR, ibu yang melahirkan pertama kali dan atau lebih dari 5 kali memiliki kemungkinan 1,24 kali melahirkan BBLR dibandingkan ibu yang melahirkan 2-3 kali.

7. Komplikasi Kehamilan

Komplikasi kehamilan adalah suatu keadaan kegawatdaruratan obstetrik yang dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi (Prawirohardjo dalam Ekaningrum, 2014). Selanjutnya Pramono (2009) menemukan ibu yang

mengalami komplikasi kehamilan memiliki resiko 2,3 kali melahirkan BBLR dibandingkan ibu yang tidak mengalami komplikasi kehamilan.

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa adanya pengaruh komplikasi kehamilan terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Maros yang signifikan $p=0,000$ ($p<0,05$). Data yang diperoleh pada kategori mengalami komplikasi kehamilan terdapat 16 (9,5%) responden yang mengalami kejadian BBLR dibandingkan pada kategori tidak mengalami komplikasi kehamilan terdapat 0 (0,0%) responden yang mengalami kejadian BBLR. Hal ini disebabkan dari 16 responden, lebih banyak yang mengalami kejadian BBLR karena tidak mengonsumsi tablet Fe dan tidak memperhatikan kepatuhan/kelengkapan pelayanan ANC.

Selaras dengan penelitian Ekaningrum (2014) menunjukkan bahwa proporsi BBLR pada ibu yang mengalami komplikasi kehamilan (17,7%) lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami komplikasi kehamilan. Proporsi BBLR terbanyak pada ibu yang mengalami 1-2 komplikasi kehamilan. Sama halnya penelitian Mulyanti (2015) yang memperoleh $p < 0,05$ menunjukkan bahwa semakin banyak ibu yang mengalami komplikasi kehamilan maka akan semakin banyak pula kelahiran bayi dengan BBLR. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan terhadap ibu yang mengalami komplikasi dalam kehamilannya agar dapat ditangani secara dini dan dilakukan perawatan untuk mencegah terjadinya BBLR.

8. Pelayanan ANC

Antenatal care merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan profesional kepada ibu hamil selama masa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan *antenatal care* yang ditetapkan dalam buku pedoman pelayanan antenatal bagi petugas puskesmas (Herlina, 2011).

Siklus pelayanan antenatal dianjurkan dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan dengan distribusi minimal 1 kali pada trisemester pertama (12 minggu),

minimal 1 kali pada trisemester kedua (12-24 minggu), minimal 2 kali pada trisemester ketiga (24-36 minggu).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh adanya pengaruh pelayanan ANC terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Maros yang signifikan $p=0,000$ ($p<0,05$). Data yang diperoleh pada kategori lengkap terdapat 6 (3,6%) responden yang mengalami kejadian BBLR dibandingkan pada kategori tidak lengkap terdapat 10 (5,9%) responden yang mengalami kejadian BBLR. Hal ini disebabkan ibu yang tidak memenuhi standar pelayanan ANC sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan kandunga karena ANC bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik atau mental ibu dan bayi dengan memberikan pengetahuan mengenai nutrisi, kebersihan diri, proses persalinan, dan dapat mendeteksi kelainan terhadap ibu dan bayi secara dini.

Selaras dengan penelitian Ekaningrum (2014) menunjukkan responden yang melakukan kunjungan ANC minimal 1 kali pada trisemester I, 1 pada trisemester II, dan 2 kali pada trisemester III adalah 0,814 dari seluruh total responden. Baik buruknya pelayanan ANC ditentukan oleh pemenuhan standar pelayanan ANC (ukur tinggi dan berat badan, tekanan darah, tes urin, diambil sampel darah, konsumsi tablet Fe > 90). Pelayanan antenatal yang berkualitas buruk ditemukan lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang mendapatkan pelayanan antenatal yang berkualitas baik. Sama dengan penelitian yang ditemukan oleh Simartama (2010) bahwa ibu dengan kualitas ANC buruk selama kehamilan berisiko 2,22 kali melahirkan bayi BBLR.

Berdasarkan penelitian Ruindungan (2017) memperoleh $p = 0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya pemeriksaan ANC baik mempertinggi peluang terjadinya BBLN dibandingkan dengan Ibu yang melakukan pemeriksaan ANC kurang baik. Menurut Sistiarani (2008) tentang kualitas pelayanan ANC yang berisiko terhadap kejadian BBLR ditemukan kualitas pelayanan yang kurang baik merupakan faktor resiko BBLR. Kualitas pelayanan antenatal dinilai dari kualitas tenaga kesehatan dan frekuensi kunjungan.

Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya BBLR adalah pelayanan *antenatal care* karena merupakan indikator penting dalam meningkatkan

kewaspadaan dan pemantauan kesehatan gizi ibu yang berdampak pada kandungan. Pada saat melakukan kunjungan ANC ibu akan diberikan standar pelayanan pemeriksaan tekanan dara, gizi ibu, dan pendeteksian dini untuk mencegah terjadinya BBLR.

Dalam Islam kita sebagai manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dalam hal ini pelayanan kesehatan yang baik, Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Ma'idah (5):2



Artinya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.

Dalam tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab menafsirkan Ayat di atas memerintahkan agar saling tolong menolong dalam suatu kebajikan dan ketakwaan. Islam mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, sikap tolong menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat kepada orang lain, seperti membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata.

Begitu pula dalam segi kemanusiaan, menolong merupakan keadilan seseorang dalam memberikan bantuan adalah yang tergerak hatinya. Sebab dalam diri manusia tersimpan rasa empati serta peduli terhadap orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.

Merujuk pada pembahasan di atas mengenai pelayanan ANC hendaknya sebagai petugas kesehatan melayani, mengayomi, menasihati, dan mengarahkan

seorang ibu hamil agar kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan ibu dan anak berjalan secara optimal tanpa kekurangan suatu hal apapun. Hal tersebut karena tidak semua seorang ibu berpendidikan tinggi untuk cepat mengetahui informasi yang ada. Oleh karena itu, diharapkan semestinya agar petugas kesehatan dan seorang ibu hamil bekerja sama saling tolong menolong dalam hal itu tanpa melihat perbedaan di kedua sisi baik itu ekonomi ibu dan sebagainya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah

1. Tidak ada pengaruh antara pekerjaan Ibu terhadap kejadian BBLR dengan nilai $p= 0,078$ di wilayah kerja Puskesmas Kec. tanralili Kabupaten Maros.
2. Tidak ada pengaruh atau hubungan antara pendidikan Ibu terhadap kejadian BBLR dengan nilai $p= 0,021$ di wilayah kerja Puskesmas Kec. tanralili Kabupaten Maros.
3. Ada pengaruh antara usia Ibu melahirkan terhadap kejadian BBLR dengan nilai $p= 0,00$ di wilayah kerja Puskesmas Kec. tanralili Kabupaten Maros.
4. Ada pengaruh antara usia gestasi terhadap kejadian BBLR dengan nilai $p= 0,00$ di wilayah kerja Puskesmas Kec. tanralili Kabupaten Maros.
5. Ada pengaruh antara tablet Fe terhadap kejadian BBLR dengan nilai $p= 0,00$ di wilayah kerja Puskesmas Kec. tanralili Kabupaten Maros.
6. Tidak ada pengaruh antara paritas terhadap kejadian BBLR dengan nilai $p= 1,000$ di wilayah kerja Puskesmas Kec. tanralili Kabupaten Maros.
7. Ada pengaruh antara komplikasi kehamilan terhadap kejadian BBLR dengan nilai $p= 0,00$ di wilayah kerja Puskesmas Kec. tanralili Kabupaten Maros.
8. Ada pengaruh antara pelayanan ANC terhadap kejadian BBLR dengan nilai $p= 0,00$ di wilayah kerja Puskesmas Kec. tanralili Kabupaten Maros.

B. Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta memberi informasi kepada petugas kesehatan sehingga lebih aktif melakukan kegiatan seperti penyuluhan atau pemberian informasi kepada masyarakat umum baik melalui media cetak, media sosial, ataupun metode lain dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat terkait pentingnya seorang anak diimunisasi secara lengkap dan sesuai jadwal.

2. Bagi Ibu Hamil

Diharapkan kepada ibu hamil agar senantiasa meningkatkan keimanannya kepada Allah SWT dan senantiasa berdoa agar kehamilannya terhindar dari masalah penyakit yang dapat membahayakan ibu dan janinnya. Perlunya penyuluhan/sosialisasi tentang bayi BBLR agar ibu dapat mengantisipasi kehamilan sejak dini dengan persiapan yang matang sehingga dapat mengurangi bayi yang lahir dengan risiko tinggi BBLR. Selain itu, diharapkan kepada ibu hamil agar menerapkan langkah-langkah petunjuk dari petugas kesehatan agar mencegah terjadinya komplikasi kehamilan, menjaga pola makan, aktivitas fisik dan rajin melakukan kunjungan *antenatal care*, serta meminum suplemen zat besi atau tablet Fe yang diberikan oleh petugas kesehatan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti lain agar melakukan penelitian yang sama dengan variabel yang lebih bervariasi dan mencakup data dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik bersalin dan praktek bidan swasta, sehingga dapat diperoleh gambaran secara keseluruhan dimana hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk penyusunan rencana (intervensi) strategis bagi Dinas Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Saad, K & Fraser, D. 2010. Maternal Nutrition and Birth Outcomes. *Epidemiologic Review*, 32.
- Agtini, dkk. 1994. Dampak Pemberian Tablet Zat Besi (Fe) pada Ibu Hamil Terhadap Kejadian BBLR. *Jurnal Karya Tulis Ilmiah. Analisis Lanjut SDKI 1994*.
- Alfianti, Cut Ira dan Darmawati. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Banda Aceh*. *Jurnal Karya Tulis Ilmiah. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Astuti, Indar. 2011. Gambaran Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Periode Januari Sampai September. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Behrman, dkk. 2000. *Ilmu Kesehatan Anak Nelson. Volume 3*. Jakarta: EGC.
- BKKBN. 2011. *Kamus istilah kependudukan dan keluarga berencana nasional*, Jakarta, BKKBN.
- BPPK. 2013. *Laporan riset kesehatan dasa indoesia tahun 2013*. Jakarta, Kemenkes RI.
- Darmayanti, dkk. 2010. Pengaruh kenaikan berat badan rata-rata per minggu pada kehamilan trimeseter II dan III terhadap risiko BBLR. *Berita kedokteran komunitas*, 26, 40-46. Tersedia di:<http://berita-kedokteran-masyarakat.org>.
- Dharmalingan, A., dkk. 2010. Nutritional Status of Mother and Low Birth Weight in India. *Matern Child Health Journal*. 14: 290-298.
- Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan. 2016. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2015*. Maros: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan. 2017. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2016*. Maros: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan. 2018. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2017*. Maros: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

- Depkes RI. 2001. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1239/MENKES/SK/III/2001 *tentang Standar Profesi Praktik Perawat*. Jakarta: Depkes RI.
- Depkes RI. 2003. *Manajemen Puskesmas*. Jakarta: Depkes RI.
- Ekaningrum, Annisa Yuri. 2014. Hubungan Komplikasi dengan Kejadian BBLR di Indonesia. *Skripsi*. FKM UI.
- Filla, Friasha P, Kaunag, Wulan PJ, dkk. 2015. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kasih Ibu Kota Manado*. Jurnal Karya Tulis Ilmiah.. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Haltfield, N. 2014. *Broadribb's Intoductory Pediatric Nursing*. Philadephia: Lippincott & Williams.
- Hasdiantoro, Hasriani Suharyo. 2018. Berbagai Faktor Risiko Kejadian BBLR (studi di beberapa puskesmas kota Makassar). *Jurnal Eoidemiologi Kesehatan Komunitas* 3 (2), 90-100.
- Hasriyani, dkk. 2018. Berbagai Faktor Risiko Kejadian BBLR (Studi di Beberapa Puskesmas Kota Makassar). *Jurnal Karya Tulis epidemiologi Kesehatan Komunitas*.
- Herlina. 2017. Gambaran Karakteristik Ibu dan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Mandor. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Pontianak.
- Izzah, Kurnia Aqidatul. 2018. Hubungan Riwayat BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) dengan Perkembangan Motorik Halus dan Kasar Bayi Usia -12 Bulan (Studi di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Kecamatan Babat). *Skripsi*. STIK Insan Cendekia Medika Jombang.
- Jayanti, dkk. 2016. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Kemar, V., dkk. 2008. Buku Saku Dasar Patologi Penyakit, Ed. 7, EGC, Jakarta, 32-40.
- Kemenkes RI. 2010. *Pedomaan pelayanan antenatal terpadu*. Jakarta, Kemenkes.
- Kemenkes RI. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019*. Jakarta.
- Kemenkes RI. 2017. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Kramer, M.S. 1987. *Determinants of Low Birth weight: Methodological Assesment and Meta Analysis*. Bull of WHO, No.5 (65).
- Mahdalena, dkk. 2017. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian BBLR di RSUD Wonosari, Gunungkidul. *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta*, 5 (2), 406-413.
- McCharty J and Maine, D. 1992. *A Framework for Analyzing the Determinants of Maternal Mortality*. Pubmed diunduh di <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1557792> pada tanggal 29 Maret 2019.
- Muslihatun, W.N. 2011. *Asuhan Neonatus Bayi dan Balita*. Yoyakarta: Fitramaya.
- Mutmainna. 2017. Determinan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. *Skripsi*. FKIK UIN Alauddin Makassar.
- National Institute of Health. 2013. *Gestational age* [online]. Tersedia di: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002367.htm> [diakses 29 Maret 2019].
- National Institute of Health Research and Development. Global Adult Tobacco Survey: Indonesia Report 2014.
- Niedhammer, I., dkk. 2009. Occupational predictors of pregnancy outcomes in irish working in the lifeways cohort. *BJOG: an international journal of obsertrics & gynaecology*, 116, 943-952. Tersedia di: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-0528/2009.02160.x>.
- Nizma, Muzilatul. 2016. *Faktor Risiko Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo*. Jurnal Karya Tulis Ilmiah. Akademi Kebidanan JMS.
- Nusyamsi, Andi. 2016. Gambaran Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Makassar. *Skripsi*. FKIK UIN Alauddin Makassar.
- OECD, dkk. 2012. Health at a glance: asia/pasifik 2012, *OECD publishing*.
- Perera, dkk. 2014. Socio-Economic and Nutritional Determinants of Low Birth Weight in India. *North American Journal of Medical Sciences*, [e-journal] 6 (7): pp 302-308.
- Puspitasari R. (2014). Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Ibu dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD PKU Muhammadiyah Bantul. *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan*.

- Pramono, M.S., dkk. 2009. Risiko terjadinya BBLR menurut determinan sosial, ekonomi dan demografi di Indonesia. *Buletin penelitian sistem kesehatan* 12, 127-132.
- Quran dan Terjemah. 2007. Departemen Agama RI. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Rahajeng, Dhenok Tri dan Dwiningsih Sri Ratna. 2013. *Faktor yang Mempengaruhi Kejadian BBLR di RSUD Dr. Soedomo Trenggalek*. Jurnal Karya Tulis Ilmiah. FK Universitas Airlangga Surabaya.
- Rahayu, M.L.D. 2013. Pengaruh karakteristik, perilaku, dan sosial ekonomi ibu terhadap kelahiran bayi BBLR di kabupaten sidoarjo swara bhumi, 2, 232-341. Tersedia di: <http://ejournal.unesa.ac.id>.
- Rahmah, Siti. 2015. Hubungan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan Angka Kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf. *Skripsi*. FKIK UIN Alauddin Makassar.
- Rahmawati. 2016. *Analisis Faktor Risiko Kejadian BBLR di RSKDIA Siti Fatimah Makassar 2016*. Jurnal Karya Tulis Ilmiah. STIKES Nani Hasanuddin Makassar.
- Rasyid, Puspita Sukmawaty, dkk. 2012. *Faktor Risiko Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo*. Jurnal Karya Tulis Ilmiah. FKM Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rosmala, Nur., dkk. 2016. Analisis Faktor Risiko Kejadian BBLR di RSU Anutapura Palu. *Jurnal Preventif Kesmas* vol, 7 No.1: 1-64.
- Sastroasmoro, S. 1995. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Septiani, Rini. 2015. Faktor Maternal pada Kejadian BBLR di Indonesia (Analisis Data Rikesdas 2013). *Skripsi*. FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Shah, P & Ohlsson, A. 2002. *Literature Review of Low Birth Weight, Including Small for Gestational Age and Preterm Birth*. Toronto: Mount Sinai Hospital. Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/237519287_Literature_Review_of_Low_Birth_Weight_Including_Small_for_Gestational_Age_and_Pret_erm_Birth.
- Simon, Merlis. 2008. *Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Kab. Maros*. Jurnal Karya Tulis Ilmiah. STIKES Nani Makassar.

- Simartama, OS. 2010. Hubungan Kualitas Pelayanan ANC terhadap Kejadian BBLR di Indonesia (Analisis Data Sekunder Survei Demografi dan Kesehatan Tahun 2007). *Tesis*. Depok : UI.
- Stone, P., et.al. 2007. *Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine*. United States of Amerika: Library of Congres Cataloging in Publication data
- Sulistyorini, dewi, dkk. Analisis faktorfaktor yang mempengaruhi kejadian BBLR di puskesmas perkotaan kabupaten banjarnegara, 2014.
- Suryati, 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Air Dingin Tahun 2013*. Jurnal Karya Tulis Ilmiah: FKM Universitas Andalas.
- Sutan, dkk. Determinant of Low Birth Weight Infants : *A Matched Case Control Study*. *Journal of Preventif Medicine*, 4, 91-99. Tersedia di: <http://dx.doi.org/1042236/ojpm.2014.43013>.
- Syarifuddi, V., dkk. 2011. KEK Ibu Hamil sebagai Faktor Risiko BBLR. *Berita Kedokteran Komunitas*, 27, 187-196. Tersedia di: <http://jurnal.ugm.ac.id/bkm/article/view/3393/2942> [diakses 25 Februari 2019]
- UNICEF. 2014. Undernourishment in the womb can lead to diminished potential ag predispose infants to early death [online]. Tersedia di: <http://data.unicef.org/nutrition/low-birthweigth#sthash.HdxUERM6.dpuf> [diakses 28 Februari 2019].
- Viengsakhone, L., dkk. 2010. Factors affecting Low Birth Weight at Four Central Hospitals in Vientiane, Lao PDR. *Nagoya J. Med. Sci*, 72., 51-58. Tersedia di: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20229703> [diakses 25 Februari 2019].
- WHO. 2014. *Low Birth Weigh* (<http://www.worldlifeexpentancy.com/cause-of-death/low-birth-weight/by-countr/>).
- Windari, Fitri. 2015. Hubungan Karakteristik Ibu Hamil dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Peembahan Senopati Bantul Yogyakarta. *Skripsi*. STIK Aisyiah Yogyakarta.
- Word health Rankings. 2017. Mental Disorder Fact Sheets. World Health Organization. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/> - diakses 29 Maret 2019.

Yanti, Eka Mustika. 2014. Hubungan Usia dan Jarak Kehamilan dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta Tahun 2012-2013. *Skripsi*. STIK Aisyiah Yogyakarta.

Yuliani, Endang dan Priskusanti, Retno Dewi. 2015. Pengaruh Kejadian Berat Badan Lahir Rendah terhadap Jarak Kehamilan dan Riwayat BBLR. *Skripsi*. Akademi Kebidanan Sakinah Surabaya.

Yuliva, dkk. 2009. *Konsep Kebidanan*. Yogyakarta: Fitramaya.





Lampiran 1

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

No. Responden :

Menyatakan kesediaan untuk turut berpartisipasi menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irsyad Sabili, mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Berat badan lahir rendah (BBLR) Di wilayah kerja Puskesmas Tanralili Kabupaten Maros”

Persetujuan ini saya buat secara sukarela, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun karena saya mengetahui bahwa keterangan yang akan saya berikan sangat besar manfaatnya bagi kelanjutan penelitian peneliti.

Maros, 2019

Responden

(.....)

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN BERAT
BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
TANRALILI KABUPATEN MAROS TAHUN 2019

Tanggal Pengisian :

No. Kuesioner :

A. IDENTITAS RESPONDEN

a. Data Umum Bayi

1. Nama Bayi :
2. Umur Bayi : Bulan
3. Jenis Kelamin : L/P
4. Berapa Riwayat Berat badan lahir Bayi :gram

b. Data Umum Ibu

1. Nama :
2. Umur : Tahun
3. Alamat :
4. No. Handphone :
5. Pekerjaan Ibu :
 - Tidak Bekerja
 - Swasta
 - Wiraswasta
 - Petani
 - PNS

6. Pendidikan Ibu :
 - Tidak Sekolah
 - SD
 - SMP
 - SMA/SMK
 - Perguruan Tinggi

B. USIA IBU MELAHIRKAN

7. Umur responden pada saat hamil anak terakhir : Tahun

18. Jika tidak, apa alasan ibu sehingga tidak memeriksakan kehamilan pada petugas kesehatan?.....
19. Jika ibu tidak pernah periksa hamil, apa yang ibu lakukan untuk menjaga kesehatan selama hamil ini ?.....
20. Pada umur kehamilan berapa minggu ibu mulai memeriksakan kehamilan sekarang ?..... minggu
21. Dimana pertama kali ibu memeriksakan kehamilan ?.....
22. Berapa kali ibu periksa kehamilan sampai dengan saat ini ? kali
23. Apa saja yang ibu peroleh saat periksa kehamilan ?
 1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
 2. Ukur tekanan darah
 3. Ukur tinggi fundus uteri
 4. Pemberian imunisasi TT (Tetanus Toksoid)
 5. Pemberian Fe (tablet besi)
 6. Tidak mendapatkan apa-apa
24. Apakah sewaktu ibu periksa hamil ke petugas kesehatan, ibu juga mendapat penjelasan dan nasehat mengenai kesehatan semasa hamil ini ?
 1. Ya
 2. Tidak
25. Jika ya, apakah ibu mengikuti nasehat tentang kesehatan selama hamil ini ?
 1. Ya
 2. Tidak

G. KOMPLIKASI KEHAMILAN

26. Chek list jawaban dibawah ini sesuai dengan keadaan yang pernah dialami ibu selama hamil :

No	Komplikasi kehamilan	YA	Tidak	Usia Kandungan
1	Muntah terus dan tak mau makan			
2	Demam tinggi			
3	Bengkah kaki, tangan dan wajah, atau sakit kepala disertai kejang			
4	Janin dirsakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya			
5	Pendarahan pada hamil muda dan hamil tua			
6	Air ketuban keluar sebelum waktunya			

7	Demam, menggigil, dan berkeringat. Bila ibu berada di daerah endemis malaria, menunjukkan adanya gejala penyakit malaria.			
8	Terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan			
9	Batuk lama (lebih dari 2 minggu)			
10	Jantung berdebar-debar atau nyeri di dada			
11	Diare berulang			





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63. Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK


Nomor : A.221 /KEPK/FKIK/IX/2019
 Judul Penelitian : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Tanralili Kabupaten Maros
 Nama Peneliti : Muhammad Irsyad Sabili
 No. Register

U	I	N	A	M	1	9	0	9	0	2	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tuliskan nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.

Makassar, 12/September 2019

Ketua



Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.
 NIP. 19550203 198312 1 001

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411)841879 Fax.0411-8221400 Gowa
Email: www.fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-249/FKIK/PP.00.9/09/2019
Lamp : -
Hal : Permohonan izin penelitian

Gowa, 19 September 2019

Yth.
Gubernur Prov. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPMMD Prov. Sulawesi Selatan
di-

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Dalam rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka bersama ini kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, saudara (i) memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Irsyad Sabili
NIM : 70200115096
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Faktor-Faktor Yang mempengaruhi BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) di Wilayah Kerja Puskesmas Tanralili Kab. Maros.
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Sitti Raodhah, SKM., M.Kes.
2. Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes.

Demikian penyampaian kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalam

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan


Gemy Nastity Handayani

Tembusan:
Dekan FKIK (sebagai laporan)

Lampiran 5



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 23314/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Maros

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2454/FKIK/PP.00.9/09/2019 tanggal 19 September 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUHAMMAD IRSYAD SABILI**
Nomor Pokok : 70200115096
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BBLR (BERAT BADAN LAHIR RENDAH) DIRWILAYAH KERJA PUSKESMAS TANRILILI KAB. MAROS "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 September s/d 30 Oktober 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 19 September 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



SALIM YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19610813 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Peringatan

SIMAP PTSP 19-09-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90222



Lampiran 6



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS TANRALILI
Alamat : Jl. Poros Kariango KM. 12 Carangki ■ (0411) 4815169 Kode Pos 90553

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No: 6342/TU/PKM-TRL/X/2019

Berdasarkan Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor 496/IX/IP/DPMPSTP/2019 Tanggal 25 September 2019 perihal Izin Penelitian dari :

Nama : **Muhammad Irsyad Sabili**
Nomor Pokok : 70200115096
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Program Studi : S1 Kesmas
Institusi : UIN Alauddin Makassar

Maka dengan ini yang bersangkutan telah selesai mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

” FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TANRALILI KABUPATEN MAROS ”

Tanggal : 23 September 2019 s/d 30 Oktober 2019
Pengikut : Tidak ada
Lokasi Pengambilan Data : UPT Puskesmas Tanralili

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala UPT Puskesmas Tanralili
Dr. H. Hendra Saputra Hamka
Penata Tk. I/ III.d
NIP. 19830528 201101 1 006

Lampiran 7

MASTER TABEL RESPONDEN DI WILAYAH
PUSKESMAS TANRALILI KABUPATEN MAROS TAHUN 2019

No	Nama Ibu	Nama Bayi	Umur Bayi	Jenis Kelamin Bayi	BBLR	Umur Ibu	Pekerjaan Ibu	Pendidikan Ibu	Usia Ibu Melahirkan	Usia Gestasi	Paritas	Tablet Fe	ANC	Komplikasi Kehamilan
1	Ny.U	N	1 Bulan	Perempuan	BBLR	17 Tahun	IRT	SD	17 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Tidak	Tidak Lengkap	Ya
2	Ny.M	S	6 Bulan	Perempuan	BBLR	41 Tahun	IRT	SMP	40 Tahun	8 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
3	Ny.R	S	2 Bulan	Perempuan	BBLR	19 Tahun	IRT	SD	19 Tahun	8 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
4	Ny.N	R	2 Bulan	Laki-laki	BBLR	23 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	23 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
5	Ny.R	N	1 Bulan	Laki-laki	BBLR	19 Tahun	IRT	SMP	19 Tahun	8 Bulan	Sedikit	Kurang	Lengkap	Ya
6	Ny.S	A	2 Bulan	Perempuan	BBLR	40 Tahun	IRT	SMA/SMK	40 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Tidak Lengkap	Ya
7	Ny.S	N	9 Bulan	Perempuan	BBLR	40 Tahun	IRT	SMA/SMK	39 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Kurang	Lengkap	Ya
8	Ny.M	K	2 Bulan	Laki-laki	BBLR	20 Tahun	IRT	SMP	20 Tahun	8 Bulan	Sedikit	Kurang	Tidak Lengkap	Ya
9	Ny.S	R	6 Bulan	Perempuan	BBLR	22 Tahun	IRT	SMP	21 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Kurang	Tidak Lengkap	Ya
10	Ny.R	R	2 Bulan	Perempuan	BBLR	18 Tahun	IRT	SMP	18 Tahun	8 Bulan	Sedikit	Kurang	Tidak Lengkap	Ya
11	Ny.H	K	7 Bulan	Laki-laki	BBLR	39 Tahun	IRT	SMA/SMK	38 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Kurang	Tidak Lengkap	Ya

12	Ny.H	A	7 Bulan	Laki-laki	BBLR	20 Tahun	IRT	SMA/SMK	19 Tahun	8 Bulan	Sedikit	Kurang	Tidak Lengkap	Ya
13	Ny.M	S	3 Bulan	Perempuan	BBLR	18 Tahun	IRT	SD	18 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
14	Ny.P	U	3 Bulan	Perempuan	BBLR	35 Tahun	IRT	SD	35 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Kurang	Tidak Lengkap	Ya
15	Ny.I	H	2 Bulan	Laki-laki	BBLR	19 Tahun	IRT	SD	19 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Tidak Lengkap	Ya
16	Ny.A	F	7 Bulan	Laki-laki	BBLR	41 Tahun	IRT	SMP	40 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Kurang	Tidak Lengkap	Ya
17	Ny.E	A	3 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	29 Tahun	Honorer	Perguruan Tinggi	29 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Tidak Lengkap	Ya
18	Ny.E	E	2 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	33 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	33 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Tidak Lengkap	Ya
19	Ny.M	Z	5 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	31 Tahun	PNS	Perguruan Tinggi	30 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Kurang	Lengkap	Ya
20	Ny.D	Q	7 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	27 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	26 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Tidak Lengkap	Ya
21	Ny.M	A	4 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	24 Tahun	IRT	SMA/SMK	23 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
22	Ny.D	D	5 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	23 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	22 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
23	Ny.Y	J	7 Bulan	Laki-laki	Tidak	23	IRT	SMA/SMK	22 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak

					BBLR	Tahun								
24	Ny.M	L	2 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	27 Tahun	PNS	Perguruan Tinggi	27 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
25	Ny.R	E	7 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	23 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	22 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
26	Ny. A	A	5 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	27 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	26 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
27	Ny.A	H	6 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	32 Tahun	IRT	SMA/SMK	31 Tahun	8 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
28	Ny.I	A	3 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	28 Tahun	IRT	SMA/SMK	28 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
29	Ny.M	A	5 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	27 Tahun	PNS	Perguruan Tinggi	26 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
30	Ny.H	K	6 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	30 Tahun	IRT	SD	29 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
31	Ny.W	A	4 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	19 Tahun	IRT	SMP	18 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
32	Ny.M	A	8 Bulan	Perempuan	Tidak	24 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	23 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak

					BBLR									
33	Ny.K	N	4 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	34 Tahun	IRT	SD	33 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
34	Ny.H	R	2 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	41 Tahun	IRT	SD	41 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
35	Ny.M	A	4 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	36 Tahun	IRT	SMA/SMK	35 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Tidak Lengkap	Tidak
36	Ny.R	A	4 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	28 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	27 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Tidak Lengkap	Tidak
37	Ny.A	S	2 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	19 Tahun	IRT	SD	19 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
38	Ny.M	S	6 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	49 Tahun	IRT	SMA/SMK	48 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
39	Ny.H	R	3 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	25 Tahun	IRT	SD	25 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
40	Ny.H	R	3 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	25 Tahun	IRT	SMA/SMK	25 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
41	Ny.E	A	4 Bulan	Laki-laki	Tidak	31 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	30 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Tidak Lengkap	Tidak

					BBLR									
42	Ny.N	R	5 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	20 Tahun	IRT	SMP	19 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
43	Ny.N	A	4 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	34 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	33 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
44	Ny.Y	A	3 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	20 Tahun	IRT	SD	20 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
45	Ny.P	R	4 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	22 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	21 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
46	Ny.S	A	3 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	22 Tahun	IRT	SMP	22 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
47	Ny.F	A	2 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	18 Tahun	IRT	SMP	18 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
48	Ny.H	A	1 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	25 Tahun	IRT	SD	25 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
49	Ny.S	H	4 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	41 Tahun	IRT	SD	40 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
50	Ny.N	G	7 Bulan	Laki-laki	Tidak	32 Tahun	Petani	SD	31 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak

					BBLR									
51	Ny.S	A	4 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	21 Tahun	IRT	SMA/SMK	20 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
52	Ny.W	A	3 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	23 Tahun	IRT	SD	23 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
53	Ny.M	H	3 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	36 Tahun	IRT	SMP	36 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
54	Ny.H	A	9 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	33 Tahun	IRT	SMP	32 Tahun	9 Bulan	Banyak	Cukup	Lengkap	Tidak
55	Ny.T	A	2 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	37 Tahun	IRT	Tidak Sekolah	37 Tahun	9 Bulan	Banyak	Cukup	Lengkap	Tidak
56	Ny.S	A	7 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	33 Tahun	PNS	Perguruan Tinggi	32 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Kurang	Lengkap	Tidak
57	Ny.M	F	4 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	40 Tahun	Honorer	Perguruan Tinggi	39 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Kurang	Lengkap	Tidak
58	Ny.S	A	1 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	32 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	32 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
59	Ny. S	A	3 Bulan	Laki-laki	Tidak	40 Tahun	IRT	SMA/SMK	40 Tahun	8 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak

					BBLR									
60	Ny.I	A	9 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	24 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	23 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
61	Ny.F	A	8 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	26 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	25 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
62	Ny.R	M	3 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	27 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	27 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
63	Ny.I	R	8 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	25 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	24 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
64	Ny.D	N	2 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	23 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	23 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
65	Ny.D	M	8 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	29 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	28 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
66	Ny.R	H	1 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	27 Tahun	PNS	Perguruan Tinggi	27 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
67	Ny.J	A	2 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	25 Tahun	IRT	SMA/SMK	25 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
68	Ny.E	A	2 Bulan	Laki-laki	Tidak	24 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	24 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak

					BBLR									
69	Ny.E	V	1 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	25 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	25 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
70	Ny.F	A	1 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	26 Tahun	IRT	SMA/SMK	26 Tahun	9 Bulan	Banyak	Cukup	Lengkap	Tidak
71	Ny.F	A	1 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	26 Tahun	IRT	SMA/SMK	26 Tahun	9 Bulan	Banyak	Cukup	Lengkap	Tidak
72	Ny.S	A	2 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	30 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	30 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
73	Ny.A	N	2 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	35 Tahun	IRT	SMA/SMK	35 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
74	Ny.F	S	3 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	24 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	24 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
75	Ny.Y	R	4 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	28 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	27 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
76	Ny.M	A	5 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	29 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	28 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Tidak Lengkap	Tidak
77	Ny.F	K	8 Bulan	Perempuan	Tidak	27 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	26 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak

					BBLR									
78	Ny.M	A	2 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	30 Tahun	IRT	SMA/SMK	30 Tahun	8 Bulan	Sedikit	Kurang	Lengkap	Tidak
79	Ny.S	F	5 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	27 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	26 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
80	Ny.Y	N	2 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	20 Tahun	IRT	SMA/SMK	20 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
81	Ny.A	K	9 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	26 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	25 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
82	Ny.R	A	3 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	28 Tahun	Honorer	Perguruan Tinggi	28 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Tidak Lengkap	Tidak
83	Ny.H	S	4 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	38 Tahun	IRT	SMP	37 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
84	Ny.N	A	3 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	36 Tahun	Honorer	Perguruan Tinggi	36 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
85	Ny.S	N	3 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	24 Tahun	IRT	SMA/SMK	24 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
86	Ny.N	A	4 Bulan	Perempuan	Tidak	25 Tahun	IRT	SMA/SMK	24 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak

					BBLR									
87	Ny.N	A	5 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	24 Tahun	IRT	SMA/SMK	23 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Kurang	Lengkap	Tidak
88	Ny.R	K	2 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	28 Tahun	IRT	SMA/SMK	28 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
89	Ny.M	A	5 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	26 Tahun	PNS	Perguruan Tinggi	25 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
90	Ny.A	F	2 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	35 Tahun	IRT	SMA/SMK	35 Tahun	9 Bulan	Banyak	Cukup	Lengkap	Tidak
91	Ny.N	A	1 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	28 Tahun	IRT	SMA/SMK	28 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
92	Ny.H	N	1 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	23 Tahun	IRT	SD	23 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Kurang	Lengkap	Tidak
93	Ny.H	A	4 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	32 Tahun	IRT	SMP	31 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
94	Ny.I	W	8 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	19 Tahun	IRT	SMA/SMK	18 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
95	Ny.S	R	8 Bulan	Laki-laki	Tidak	33 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	32 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak

					BBLR									
96	Ny.N	A	8 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	28 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	27 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
97	Ny.J	A	8 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	36 Tahun	IRT	SMA/SMK	35 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
98	Ny.K	H	7 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	29 Tahun	IRT	SMA/SMK	28 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
99	Ny.S	S	7 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	28 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	27 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
100	Ny.W	S	7 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	32 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	31 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
101	Ny.N	W	7 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	30 Tahun	IRT	SMA/SMK	29 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
102	Ny.N	K	6 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	23 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	22 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
103	Ny.N	K	6 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	24 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	23 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
104	Ny.H	P	6 Bulan	Perempuan	Tidak	30 Tahun	IRT	SMA/SMK	29 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak

					BBLR									
105	Ny.D	M	6 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	28 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	27 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
106	Ny.R	A	6 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	20 Tahun	IRT	SMA/SMK	19 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
107	Ny.R	F	6 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	22 Tahun	IRT	SMA/SMK	21 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
108	Ny.K	N	5 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	22 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	21 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
109	Ny.N	K	5 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	29 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	28 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
110	Ny.R	R	4 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	30 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	29 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
111	Ny.D	M	4 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	24 Tahun	IRT	SMP	23 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
112	Ny.E	E	4 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	31 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	30 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
113	Ny.M	H	4 Bulan	Perempuan	Tidak	26 Tahun	Honorer	Perguruan Tinggi	25 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak

					BBLR									
114	Ny.K	P	4 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	28 Tahun	Honorer	Perguruan Tinggi	27 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
115	Ny.E	A	3 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	30 Tahun	IRT	SMA/SMK	30 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
116	Ny.H	A	3 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	29 Tahun	IRT	SMA/SMK	29 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
117	Ny.E	R	2 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	34 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	34 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
118	Ny.N	A	2 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	36 Tahun	Honorer	Perguruan Tinggi	36 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
119	Ny.N	R	1 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	32 Tahun	Honorer	Perguruan Tinggi	32 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
120	Ny.H	A	7 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	35 Tahun	IRT	SMA/SMK	34 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
121	Ny.H	Z	7 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	33 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	32 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
122	Ny.H	S	8 Bulan	Perempuan	Tidak	33 Tahun	IRT	SMP	32 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak

					BBLR									
123	Ny.F	F	6 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	12 Tahun	IRT	Tidak Sekolah	12 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Kurang	Lengkap	Tidak
124	Ny.A	R	7 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	30 Tahun	Honorar	Perguruan Tinggi	29 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
125	Ny.N	G	6 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	36 Tahun	IRT	SMA/SMK	35 Tahun	9 Bulan	Banyak	Cukup	Lengkap	Tidak
126	Ny.S	R	5 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	24 Tahun	IRT	SMA/SMK	23 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
127	Ny.S	D	5 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	20 Tahun	IRT	SMA/SMK	19 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
128	Ny.M	N	5 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	20 Tahun	IRT	SMA/SMK	19 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
129	Ny.D	N	5 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	25 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	24 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
130	Ny.N	A	5 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	25 Tahun	IRT	SMA/SMK	23 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
131	Ny.P	U	4 Bulan	Perempuan	Tidak	40 Tahun	PNS	Perguruan Tinggi	39 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak


					BBLR									
132	Ny.R	P	3 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	28 Tahun	IRT	SMA/SMK	28 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
133	Ny.N	F	3 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	22 Tahun	IRT	SMA/SMK	22 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
134	Ny.R	Z	3 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	24 Tahun	Honorar	Perguruan Tinggi	24 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
135	Ny.S	R	4 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	24 Tahun	IRT	SMA/SMK	23 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
136	Ny.A	F	3 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	22 Tahun	IRT	SMA/SMK	22 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
137	Ny.S	R	3 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	43 Tahun	PNS	Perguruan Tinggi	43 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
138	Ny.R	B	3 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	48 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	48 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
139	Ny.H	F	3 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	26 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	26 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
140	Ny.M	A	3 Bulan	Perempuan	Tidak	25 Tahun	Honorar	Perguruan Tinggi	25 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak

					BBLR									
141	Ny.N	G	2 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	30 Tahun	Honorer	Perguruan Tinggi	30 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
142	Ny.R	S	2 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	22 Tahun	Honorer	Perguruan Tinggi	22 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
143	Ny.N	M	1 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	27 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	27 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
144	Ny.N	A	1 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	21 Tahun	Honorer	Perguruan Tinggi	21 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
145	Ny.M	S	1 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	30 Tahun	Honorer	Perguruan Tinggi	30 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
146	Ny.F	Q	1 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	24 Tahun	Honorer	Perguruan Tinggi	24 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
147	Ny.N	M	1 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	19 Tahun	Petani	SMA/SMK	19 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
148	Ny.M	A	1 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	25 Tahun	Petani	SD	25 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Kurang	Lengkap	Tidak
149	Ny.T	A	1 Bulan	Laki-laki	Tidak	36 Tahun	PNS	Perguruan Tinggi	36 Tahun	9 Bulan	Banyak	Cukup	Lengkap	Tidak

					BBLR									
150	Ny.N	F	8 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	22 Tahun	IRT	SMA/SMK	21 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
151	Ny.A	R	1 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	25 Tahun	IRT	SMA/SMK	25 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
152	Ny.H	A	1 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	27 Tahun	IRT	SMA/SMK	27 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
153	Ny.N	K	7 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	28 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	27 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
154	Ny.H	N	7 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	21 Tahun	IRT	SMP	20 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
155	Ny.S	S	6 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	26 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	25 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
156	Ny.H	L	6 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	23 Tahun	IRT	SMA/SMK	22 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
157	Ny.L	N	5 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	32 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	31 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
158	Ny.H	A	5 Bulan	Perempuan	Tidak	30 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	29 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya

					BBLR									
159	Ny.W	U	5 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	33 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	32 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
160	Ny.J	S	5 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	28 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	27 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
161	Ny.J	F	5 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	22 Tahun	IRT	SMP	21 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
162	Ny.N	C	5 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	22 Tahun	IRT	SMA/SMK	21 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
163	Ny.Y	H	6 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	27 Tahun	IRT	SMA/SMK	26 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
164	Ny.M	I	7 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	34 Tahun	Honorer	Perguruan Tinggi	33 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
165	Ny.F	P	3 Bulan	Laki-laki	Tidak BBLR	26 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	26 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
166	Ny.M	S	3 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	21 Tahun	IRT	SMA/SMK	21 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya
167	Ny.H	Z	3 Bulan	Laki-laki	Tidak	22 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	22 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Ya

					BBLR									
168	Ny.N	R	6 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	25 Tahun	IRT	Perguruan Tinggi	24 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak
169	Ny.E	R	5 Bulan	Perempuan	Tidak BBLR	25 Tahun	Honorer	Perguruan Tinggi	24 Tahun	9 Bulan	Sedikit	Cukup	Lengkap	Tidak



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Lampiran 8

1. Karakteristik Responden Kelompok Umur Responden

Umur Ibu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 12-20	18	10,7	10,7	10,7
21-29	96	56,8	56,8	67,5
30-38	47	27,8	27,8	95,3
39-47	6	3,6	3,6	98,8
48-56	2	1,2	1,2	100,0
Total	169	100,0	100,0	

2. Karakteristik Bayi a. Kelompok Umur Bayi

Umur Bayi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-3	73	43,2	43,2	43,2
4-6	62	36,7	36,7	79,9
7-9	34	20,1	20,1	100,0
Total	169	100,0	100,0	

b. Jenis Kelamin Bayi

Jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	73	43,2	43,2	43,2
Valid Perempuan	96	56,8	56,8	100,0
Total	169	100,0	100,0	

c. Riwayat Berat Badan Lahir Bayi

Riwayat Berat badan lahir Bayi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ya	16	9,5	9,5	9,5
Valid Tidak	153	90,5	90,5	100,0
Total	169	100,0	100,0	

3. Analisis Univariat

a. Pekerjaan Ibu

Pekerjaan Ibu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Bekerja	30	17,8	17,8	17,8
Valid Tidak Bekerja	139	82,2	82,2	100,0
Total	169	100,0	100,0	

b. Pendidikan Ibu

Pendidikan Ibu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Rendah	19	11,2	11,2	11,2
Valid Tinggi	150	88,8	88,8	100,0
Total	169	100,0	100,0	

c. Usia Melahirkan Ibu

Usia Melahirkan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Risiko tinggi	34	20,1	20,1	20,1
Valid Risiko rendah	135	79,9	79,9	100,0
Total	169	100,0	100,0	

d. Usia Gestasi

Usia gestasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Prematur	9	5,3	5,3	5,3
Valid Normal	160	94,7	94,7	100,0
Total	169	100,0	100,0	

e. Tablet Fe

konsumsi tablet fe

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang	16	9,5	9,5	9,5
Valid Cukup	153	90,5	90,5	100,0
Total	169	100,0	100,0	

f. Paritas

Paritas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Banyak	8	4,7	4,7	4,7
Valid Sedikit	161	95,3	95,3	100,0
Total	169	100,0	100,0	

g. Komplikasi Kehamilan

Komplikasi kehamilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	37	21,9	21,9	21,9
Valid Tidak	132	78,1	78,1	100,0
Total	169	100,0	100,0	

h. Pelayanan ANC

Pelayanan ANC

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Lengkap	151	89,3	89,3	89,3
Valid Tidak Lengkap	18	10,7	10,7	100,0
Total	169	100,0	100,0	

4. Analisis Bivariat

a. Pekerjaan Ibu

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pekerjaan Ibu * Riwayat Berat badan lahir Bayi	169	100,0%	0	0,0%	169	100,0%

Pekerjaan Ibu * Riwayat Berat badan lahir Bayi Crosstabulation

		Riwayat Berat badan lahir Bayi		Total
		BBLR	Tidak BBLR	
Pekerjaan Ibu Bekerja	Count	0	30	30
	% of Total	0,0%	17,8%	17,8%

	Count	16	123	139
Tidak Bekerja	% of Total	9,5%	72,8%	82,2%
	Count	16	153	169
Total	% of Total	9,5%	90,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,814 ^a	1	,051		
Continuity Correction ^b	2,590	1	,108		
Likelihood Ratio	6,605	1	,010		
Fisher's Exact Test				,078	,037
Linear-by-Linear Association	3,792	1	,052		
N of Valid Cases	169				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,84.

b. Computed only for a 2x2 table

b. Pendidikan Ibu

Case Processing Summary

		Cases					
		Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent	

Pendidikan Ibu * Riwayat Berat badan lahir Bayi	169	100,0%	0	0,0%	169	100,0%
---	-----	--------	---	------	-----	--------

Pendidikan Ibu * Riwayat Berat badan lahir Bayi Crosstabulation

		Riwayat Berat badan lahir Bayi		Total	
		BBLR	Tidak BBLR		
Pendidikan Ibu	Rendah	Count	5	14	19
		% of Total	3,0%	8,3%	11,2%
	Tinggi	Count	11	139	150
		% of Total	6,5%	82,2%	88,8%
Total		Count	16	153	169
		% of Total	9,5%	90,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,090 ^a	1	,008		
Continuity Correction ^b	5,048	1	,025		
Likelihood Ratio	5,315	1	,021		
Fisher's Exact Test				,021	,021
Linear-by-Linear Association	7,048	1	,008		
N of Valid Cases	169				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,80.

b. Computed only for a 2x2 table

c. Usia Melahirkan Ibu

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia Melahirkan * Riwayat Berat badan lahir Bayi	169	100,0%	0	0,0%	169	100,0%

Usia Melahirkan * Riwayat Berat badan lahir Bayi Crosstabulation

		Riwayat Berat badan lahir Bayi		Total
		BBLR	Tidak BBLR	
Usia Melahirkan	Risiko rendah	Count 3	132	135
		% of Total 1,8%	78,1%	79,9%
	Risiko tinggi	Count 13	21	34
		% of Total 7,7%	12,4%	20,1%
Total		Count 16	153	169
		% of Total 9,5%	90,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	41,097 ^a	1	,000		

Continuity Correction ^b	37,003	1	,000		
Likelihood Ratio	31,862	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	40,854	1	,000		
N of Valid Cases	169				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,22.

b. Computed only for a 2x2 table

d. Usia Gestasi

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia gestasi * Riwayat Berat badan lahir Bayi	169	100,0%	0	0,0%	169	100,0%

Usia gestasi * Riwayat Berat badan lahir Bayi Crosstabulation

		Riwayat Berat badan lahir Bayi		Total	
		BBLR	Tidak BBLR		
Usia gestasi	Prematur	Count	6	3	9
		% of Total	3,6%	1,8%	5,3%
	Normal	Count	10	150	160
		% of Total	5,9%	88,8%	94,7%

Total	Count	16	153	169
	% of Total	9,5%	90,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	36,287 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	29,580	1	,000		
Likelihood Ratio	19,598	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	36,072	1	,000		
N of Valid Cases	169				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,85.

b. Computed only for a 2x2 table

e. Tablet Fe

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
konsumsi tablet fe * Riwayat Berat badan lahir Bayi	169	100,0%	0	0,0%	169	100,0%

konsumsi tablet fe * Riwayat Berat badan lahir Bayi Crosstabulation

		Riwayat Berat badan lahir Bayi		Total	
		BBLR	Tidak BBLR		
konsumsi tablet fe	Kurang	Count	10	6	16
		% of Total	5,9%	3,6%	9,5%
	Cukup	Count	6	147	153
		% of Total	3,6%	87,0%	90,5%
Total		Count	16	153	169
		% of Total	9,5%	90,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	57,991 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	51,358	1	,000		
Likelihood Ratio	34,073	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	57,648	1	,000		
N of Valid Cases	169				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,51.

b. Computed only for a 2x2 table

f. Paritas

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Paritas * Riwayat Berat badan lahir Bayi	169	100,0%	0	0,0%	169	100,0%

Paritas * Riwayat Berat badan lahir Bayi Crosstabulation

		Riwayat Berat badan lahir Bayi		Total	
		BBLR	Tidak BBLR		
Paritas	Banyak	Count	0	8	8
		% of Total	0,0%	4,7%	4,7%
	Sedikit	Count	16	145	161
		% of Total	9,5%	85,8%	95,3%
Total		Count	16	153	169
		% of Total	9,5%	90,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,878 ^a	1	,349		

Continuity Correction ^b	,101	1	,750		
Likelihood Ratio	1,632	1	,201		
Fisher's Exact Test				1,000	,443
Linear-by-Linear Association	,873	1	,350		
N of Valid Cases	169				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,76.

b. Computed only for a 2x2 table

g. Komplikasi Kehamilan

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Paritas * Riwayat Berat badan lahir Bayi	169	100,0%	0	0,0%	169	100,0%

Paritas * Riwayat Berat badan lahir Bayi Crosstabulation

		Riwayat Berat badan lahir Bayi		Total
		BBLR	Tidak BBLR	
Paritas	Count	0	8	8
	Banyak			
	% of Total	0,0%	4,7%	4,7%
	Count	16	145	161
Sedikit				
% of Total	9,5%	85,8%	95,3%	

Total	Count	16	153	169
	% of Total	9,5%	90,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,878 ^a	1	,349		
Continuity Correction ^b	,101	1	,750		
Likelihood Ratio	1,632	1	,201		
Fisher's Exact Test				1,000	,443
Linear-by-Linear Association	,873	1	,350		
N of Valid Cases	169				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,76.

b. Computed only for a 2x2 table

h. Pelayanan ANC

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pelayanan ANC * Riwayat Berat badan lahir Bayi	169	100,0%	0	0,0%	169	100,0%

Pelayanan ANC * Riwayat Berat badan lahir Bayi Crosstabulation

		Riwayat Berat badan lahir Bayi		Total	
		BBLR	Tidak BBLR		
Pelayanan ANC	Lengkap	Count	6	145	151
		% of Total	3,6%	85,8%	89,3%
	Tidak Lengkap	Count	10	8	18
		% of Total	5,9%	4,7%	10,7%
Total		Count	16	153	169
		% of Total	9,5%	90,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	49,925 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	44,089	1	,000		
Likelihood Ratio	30,674	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	49,630	1	,000		
N of Valid Cases	169				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,70.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 9

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 4.1 Proses Wawancara dengan responden



Gambar 4.2 Proses Wawancara dengan responden



Gambar 4.3 Proses Wawancara dengan responden



Gambar 4.4 Proses Wawancara dengan responden



Gambar 4.5 Proses Wawancara dengan responden



Gambar 4.6 Proses Wawancara dengan responden



Gambar 4.7 Proses Wawancara dengan responden



Gambar 4.8 Proses Wawancara dengan responden



Gambar 4.9 Proses Wawancara dengan responden



Gambar 4.10 Proses Wawancara dengan responden



Gambar 4.11 Proses Wawancara dengan responden



Gambar 4.12 Proses Wawancara dengan responden

Lampiran 10

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Irsyad Sabili lahir di Bontoramba Kec. Bontomarannu Kabupaten Gowa pada tanggal 23 September 1997, anak kedua dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Basir Ali Daeng Rumpa dan Hj. Roslawati Daeng Peroso. Mengawali pendidikan, penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SDN Centre Mawang pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 1 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang menengah atas di SMA Negeri 1 Bontomarannu (SMAN 8 GOWA) dan tamat pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK) angkatan 2015 UIN Alauddin Makassar dan selesai pada tahun 2019. Semasa kuliah penulis pernah bergelut dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat periode 2016-2017.

Lampiran 11

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TANRALILI KABUPATEN MAROS

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	19% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
2	www.scribd.com Internet Source	4%
3	media.neliti.com Internet Source	2%
4	nursingjurnal.respati.ac.id Internet Source	2%
5	docgo.net Internet Source	1%
6	jurnal.fkm.unand.ac.id Internet Source	1%
7	e-journal.unair.ac.id Internet Source	1%
8	perpuswu.web.id Internet Source	1%
9	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
10	jurnal.untad.ac.id Internet Source	1%
11	www.docstoc.com Internet Source	1%
12	id.scribd.com Internet Source	1%
13	docplayer.info Internet Source	1%
14	quranpustaka.com Internet Source	1%
15	docobook.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off Exclude matches < 1%
Exclude bibliography Off