

**SURVEI TINGKAT KEPADATAN LARVA *Aedes sp.* BERKAITAN DENGAN
KEJADIAN DBD DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

NURRAHMI PAIZAH

NIM: 70200114052

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Survei Tingkat Kepadatan Larva *Aedes sp.* Berkaitan dengan Kejadian DBD di Kecamatan Tamalate Kota Makassar** yang disusun oleh **Nurrahmi Paizah, NIM : 70200114052**, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 12 November 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 12 November 2021
7 Rabiul Akhir 1443 H

DEWAN PENGUJI

- Ketua : Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes (.....)
- Sekretaris : Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes (.....)
- Pembimbing I : Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes (.....)
- Pembimbing II: Surahmawati, SKM., M.Adm.Kes (.....)
- Penguji I : Syahrul Basri, SKM., M.Kes (.....)
- Penguji II : Dr. Wahyuddin, M.Ag (.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurrahmi Paizah
NIM : 70200114052
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 30 Juli 1996
Jurusan/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumahan Taman Zarindah Tamarunang D/19
Judul : Survei Tingkat Kepadatan Larva *Aedes Sp.*
Berkaitan dengan Kejadian DBD di Kecamatan
Tamalate Kota Makassar

Menyatakan dengan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 November 2021

Penyusun



Nurrahmi Paizah

NIM: 70200114052

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. *Alhamdulillah* atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi kesehatan lingkungan yang berjudul “ Survei Tingkat Kepadatan Larva *Aedes sp.* Berkaitan dengan Kejadian DBD di Kecamatan Tamalate Kota Makassar“, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai *uswahtun hasanah* dalam menjalankan aktivitas keseharian diatas permukaan bumi ini dengan mencontohi bukan tidak mungkin bisa bersama-sama beliau didalam surganya Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang mukmin yang senantiasa istiqomah meniti jalan hidup ini hingga

akhir zaman dengan islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga kepada Ayahanda Muhammad Rosdah atas doa, dukungan dan motivasi untuk selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan senantiasa bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. dan Ibunda Nurhayati yang telah membimbing penulis dan memberikan bantuan baik dari segi moril maupun material.

Tidak lupa pula penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.si., M.si., Apt selaku


Wakil Dekan I, Bapak Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Bapak Abd. Majid HR Lagu, S.KM.,M.Kes selaku Ketua Jurusan yang dengan ikhlas menyediakan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si.,M.Kes selaku Pembimbing I yang dengan ikhlas menyediakan waktu, pikiran dan selalu memotivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Surahmawati, S.KM.,M.Adm.Kes selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas menyediakan waktu, pikiran dan selalu memotivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Syahrul Basri, SKM.,MKes selaku Penguji Kompetensi yang dengan ikhlas menyediakan waktu, pikiran dan selalu memotivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. dan Bapak Dr. Wahyudin ,M.Ag selaku Penguji Integrasi Agama yang dengan ikhlas memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Dosen yang senantiasa membimbing dan mendidik penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, khususnya di Jurusan Kesehatan Masyarakat.

9. Keluarga tercinta Ashabul Kahfi, Zainul Arifin, dan Syamsul Ma'arif mereka penyemangat yang slalu hadir memberi cinta.
10. Teman-teman andalan Nurwindy, Murdah Anugrah, Nurfadillah Sudirman, Rachmat Saleh, Dendi Permadi, dan Ahmad Amirullah yang telah memberikan motivasi, semangat dan mewarnai keseharian di dunia kampus.
11. Avif Yolandani, Sabrina Nurfadillah, Handayani, Muh. Ilham Basri, Sardiman, Muh. Adnan, Luli, Nisya dan Kak Firman yang telah memberikan motivasi, semangat dan mewarnai keseharian peneliti.
12. Anggota ENVIHSA yang selalu memotivasi dan memberikan semangat peneliti dan mewarnai keseharian peneliti.
13. Posko 7 KKN Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur serta semua pihak yang telah banyak memberikan saran dan motivasi baik moril dan materil pada proses penulisan skripsi hingga selesai.
14. Teman-teman seperjuangan Kesmas Angkatan 2014 (Hefabip), khususnya Kesmas B 014 yang telah memberikan motivasi, semangat dan mewarnai keseharian di dunia kampus.
15. Teman-teman di peminatan Kesehatan Lingkungan 014 yang selalu memotivasi dan memberikan semangat.
16. Teman-teman senior-senior peminatan Kesehatan Lingkungan 013 yang selalu memotivasi dan memberikan semangat
17. Teman-teman di adik-adik peminatan kesehatan lingkungan 015 yang selalu memotivasi dan memberikan semangat

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Umum.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Oprasional.....	11
F. Ruang Lingkup Penelitian	13
G. Kajian Pustaka	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Demam Berdarah Dengue	

(DBD)	18
B. Tinjauan Umum tentang Kepadatan Larva Nyamuk	
<i>Aedes aegypti</i>	32
C. Tinjauan Umum Pandangan Agama tentang Nyamuk	36
D. Kerangka Teori.....	40
E. Kerangka Konsep	41
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	42
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	42
C. Metode Pengambilan Data	43
D. Pengolahan dan Penyajian Data	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Hasil Penelitian	48
1. <i>House Index (HI)</i>	48
2. <i>Container Index (CI)</i>	49
3. <i>Breteau Index (BI)</i>	49
4. <i>Density Figure (DF)</i>	50
C. Pembahasan	51
1. Tingkat Kepadatan Larva <i>Aedes sp.</i> Berdasarkan <i>House</i>	
<i>Index (HI)</i>	52
2. Tingkat Kepadatan Larva <i>Aedes sp.</i> Berdasarkan <i>Container</i>	

<i>Index (CI)</i>	55
3. Tingkat Kepadatan Larva <i>Aedes sp.</i> Berdasarkan <i>Breteau</i>	
<i>Index (BI)</i>	59
4. Tingkat Kepadatan Larva <i>Aedes sp.</i> Berdasarkan <i>Density</i>	
<i>Figure (DF)</i>	59
D. Keterbatasan Penelitian	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Kasus DBD Per Bulan Kota Makassar Tahun 2013-2020.....	4
Grafik 1.2	Jumlah Kasus DBD Per Kecamatan Kota Makassar Tahun 2015-2017	5
Grafik 1.3	Jumlah Kasus DBD Per Kecamatan Kota Makassar Tahun 2018-2020	6



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Telur <i>Aedes aegypti</i>	24
Gambar 2.2	Jentik/Larva <i>Aedes aegypti</i>	25
Gambar 2.3	Pupa <i>Aedes aegypti</i>	26
Gambar 2.4	Siklus Hidup Nyamuk <i>Aedes sp.</i>	27
Gambar 2.5	Bagan Cara Pemberantasan DBD	34



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Penelitian Terdahulu Tentang Kepadatan Larva dan Nyamuk <i>Aedes sp.</i>	10
Tabel 2.1	Perbedaan jentik <i>Aedes</i> dengan jentik <i>Anopheles</i> , <i>Mansonia</i> , <i>Culex</i>	22
Tabel 2.2	Perbedaan Jentik <i>Aedes aegypti</i> dan <i>Aedes albopictus</i>	23
Tabel 2.3	Indikator Kepadatan Larva <i>Aedes</i>	31
Tabel 3.1	Indikator Kepadatan Larva <i>Aedes</i>	46
Tabel 4.1	Tingkat Kepadatan Larva <i>Aedes sp.</i> Berdasarkan <i>House Index (HI)</i> Di Kecamatan Tamalate	48
Tabel 4.2	Tingkat Kepadatan Larva <i>Aedes sp.</i> Berdasarkan <i>Container Index (CI)</i> Di Kecamatan Tamalate	49
Tabel 4.3	Tingkat Kepadatan Larva <i>Aedes sp.</i> Berdasarkan <i>Breteau Index (BI)</i> Di Kecamatan Tamalate	50
Tabel 4.4	Tingkat Kepadatan Larva <i>Aedes sp.</i> Berdasarkan <i>Density Figure (DF)</i> Di Kecamatan Tamalate	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Incidence Rate dan Case Fatality Rate DBD Indonesia Tahun 2019-2020
- Lampiran 2 : Jumlah Kasus DBD Per Kecamatan Kota Makassar Tahun 2015-2020
- Lampiran 3 : Kasus DBD Per Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2015-2020
- Lampiran 4 : Data Kasus DBD Puskesmas Di Kecamatan Tamalate Tahun 2017
- Lampiran 5 : Lembar Survei
- Lampiran 6 : Master Tabel Hasil Survei Larva
- Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Pengantar Izin Penelitian Dari UIN Alauddin Makassar
- Lampiran 9 : Surat Pengantar Izin Penelitian Dari BKPMMD Prov. Sul-Sel
- Lampiran 10 : Kode Etik Penelitian Dari Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Telah Meneliti Dari Kecamatan Tamalate
- Lampiran 12 : Riwayat Hidup Peneliti

SURVEI TINGKAT KEPADATAN LARVA *Aedes sp.* BERKAITAN DENGAN KEJADIAN DBD DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR

¹Nurrahmi Paizah, ²Andi Susilawati, ³Surahmawati

¹²³*Bagian Kesehatan Lingkungan, Jurusan Kesehatan Masyarakat*

FKIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

ABSTRAK

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah salah satu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes sp.* Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 138.127 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 919. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan angka kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah jumlah populasi jentik nyamuk *Aedes aegypti*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengukur tingkat kepadatan larva *Aedes sp.* berkaitan dengan kejadian DBD di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif, dengan metode survei secara visual. Sampel penelitian adalah jumlah kasus pada tahun 2017 yakni sebanyak 20 sampel dengan kriteria inklusi jarak terbang nyamuk untuk mencukupi jumlah 100 sampel. Hasil penelitian dari 100 rumah yang diperiksa di Kecamatan Tamalate terdapat sebanyak 28 rumah yang positif ditemukan larva, sehingga memperoleh nilai *House Index (HI)* 28 %, dan masuk dalam kategori tingkat kepadatan sedang, dari 524 kontainer yang diperiksa di Kecamatan Tamalate terdapat 44 kontainer positif ditemukan larva, sehingga memperoleh nilai *Container Index (CI)* 8.3%, masuk dalam kategori tingkat kepadatan sedang, terdapat 44 kontainer kontainer positif larva dari 100 rumah yang diperiksa di Kecamatan Tamalate, sehingga memperoleh nilai *Breteau Index (BI)* 44% dan masuk dalam kategori tingkat kepadatan sedang, untuk kategori *Density Figure* nilai *House Index (HI)* 28 sehingga mendapatkan hasil *Density Figure (DF)* 4 masuk dalam kategori *Density Figure (DF)* tingkat kepadatan sedang, hasil nilai *Container Index (CI)* 8.3 sehingga mendapatkan hasil *Density Figure (DF)* 3 masuk dalam kategori *Density Figure (DF)* tingkat kepadatan sedang, dan hasil nilai *Breteau Index (BI)* 44 sehingga mendapatkan hasil *Density Figure (DF)* 5 masuk dalam kategori *Density Figure (DF)* tingkat kepadatan sedang. Peneliti menyarankan kepada masyarakat agar melaksanakan kegiatan PSN secara terus-menerus dengan metode 3M Plus.

Kata Kunci: *Aedes sp.* , Larva, Kepadatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penularan penyakit melalui vektor berupa serangga pada manusia disebut sebagai *Arthropodborne disease* atau sering juga disebut sebagai *Vectorborne disease*. Agen penyebab penyakit infeksi yang ditularkan pada manusia rentan dapat melalui cara seperti dari orang ke orang, melalui udara, makanan dan air, melalui hewan, atau melalui vektor *arthropoda*. *Arthropodborne disease* atau sering juga disebut sebagai *Vectorborne disease* adalah vektor yang bertanggung jawab atas terjadinya penyakit dan penularannya dari satu host (pejamu) ke host lain. (Wahyuni, 2021). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 374/MENKES/PER/II/2010 tentang pengendalian vektor, definisi vektor adalah arthropoda yang bisa menularkan, memindahkan dan/atau menjadi sumber penular penyakit pada manusia. (Menteri Kesehatan, 2017)

Di Indonesia penyakit yang ditularkan oleh serangga dan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat adalah malaria, demam berdarah, penyakit kaki gajah (filariasis) dan chikungunya. Penyakit ini ditemukan hampir di seluruh Indonesia. (Sumantri, 2017)

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit endemik diseluruh wilayah tropis dan sebagian wilayah subtropis. Permasalahan penularan DBD oleh nyamuk *Aedes aegypti* disebabkan karena penularannya sangat cepat dalam suatu wilayah. (Syamsir, 2020). Demam Berdarah Dengue disebabkan oleh virus *Dengue* dari genus *Flavivirus*, family *Flaviviridae* yang memiliki empat jenis serotype, yakni DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Terinfeksi salah satu dari serotype akan menimbulkan antibody, akan tetapi yang terbentuk sangat kurang terhadap serotype lain sehingga tidak memberikan perlindungan yang memadai. (Denai Wahyuni, 2021)


Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia. Penyakit ini ditemukan hampir di seluruh belahan dunia terutama di negara dengan iklim tropis dan subtropis, baik sebagai penyakit endemik dan epidemik. Sekitar 2,5 milyar penduduk tinggal di negara endemis dengue, 70% populasi berisiko terkena dengue tinggal di negara-negara WHO di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik bagian barat. Menurut WHO, Demam Berdarah Dengue di Indonesia termasuk dalam kategori A yaitu Demam Berdarah Dengue (DBD) sudah merupakan masalah utama. (Nurdiansa Sahrir, 2016)

Menurut Profil Kesehatan Indonesia, kasus DBD pada tahun 2018 berjumlah 65.602 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 467 orang. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya, yakni 68.407 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 493 orang. Angka kesakitan DBD tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017, yakni dari 26,10 menjadi 24,75 per 100.000 penduduk. Penurunan *case fatality rate* (CFR)

dari tahun sebelumnya tidak begitu tinggi, yakni 0,72% pada tahun 2017, menjadi 0,71% pada tahun 2018. (Kementerian Kesehatan, Profil Kesehatan Indonesia, 2019)

Kasus DBD yang dilaporkan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 138.127 kasus, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 65.602 kasus. Kematian karena DBD pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan dari 467 di tahun 2018 menjadi 919 kematian pada tahun 2019. *Incidence Rate* DBD tahun 2019 sebesar 51,48 per 100.000 penduduk, ini diketahui menjadi puncak tren IR DBD yang sebelumnya terjadi juga pada tahun 2010 dan 2016. Selain angka kesakitan, besaran masalah DBD juga dapat diketahui dari angka kematian atau *Case Fatality Rate* (CFR) yang diperoleh dari proporsi kematian terhadap seluruh kasus yang dilaporkan. Secara nasional CFR menunjukkan sedikit penurunan dari 0,71% di tahun 2018 menjadi 0,67% pada tahun 2019. (Kementerian Kesehatan, Profil Kesehatan Indonesia, 2020)


Berdasarkan angka kesakitan (*Incidence Rate*) DBD per 100.000 penduduk menurut Provinsi, Sulawesi Selatan menempati posisi ke-21 pada tahun 2018 dengan IR 24,10 dan pada tahun 2019 menempati posisi ke-30 dengan IR 36,89. (Kementerian Kesehatan, Profil Kesehatan Indonesia, 2019) (Kementerian Kesehatan, Profil Kesehatan Indonesia, 2020)



Grafik 1.1
Kasus DBD Per Bulan Kota Makassar
Tahun 2013-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2013-2020


Data kasus DBD per bulan Kota Makassar total kasus pada tahun 2015 tercatat sebanyak 142 kasus korban meninggal 5 orang, tahun 2016 sebanyak 250 kasus korban meninggal 2 orang, tahun 2017 sebanyak 135 kasus korban meninggal 1 orang, tahun 2018 sebanyak 256 kasus korabn meninggal 1 orang, tahun 2019 sebanyak 268 kasus dan tahun 2020 sebanyak 175 kasus dengan tidak ada korban meninggal. (Dinas Kesehatan, Jumlah Kasus DBD, 2021)



Grafik 1.2
Jumlah Kasus DBD Per Kecamatan Kota Makassar
Tahun 2015-2017

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2015-2017

Dari grafik 1.2 jumlah kasus DBD per Kecamatan tahun 2015 sampai 2017 mencapai 527 kasus. Kasus DBD di Kota Makassar dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, Kecamatan Tamalate merupakan Kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2017 dengan jumlah 20 kasus. (Dinas Kesehatan, Jumlah Kasus DBD, 2018)



Grafik 1.3
Jumlah Kasus DBD Per Kecamatan Kota Makassar
Tahun 2018-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2018-2020

Dari grafik 1.3 jumlah kasus DBD per Kecamatan tahun 2018 sampai 2020 mencapai 699 kasus. Jumlah kasus terbanyak pada tahun 2019 sebanyak 268 kasus, dan terendah pada tahun 2020 yakni sebanyak 175 kasus. Kasus DBD di Kota Makassar dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. (Dinas Kesehatan, Jumlah Kasus DBD, 2021)

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan angka kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah jumlah populasi jentik nyamuk *Aedes aegypti*. Menurut penelitian sebelumnya didapatkan rumah yang positif ditemukannya jentik nyamuk berisiko 2,738 kali terkena Demam Berdarah Dengue dibandingkan dengan rumah yang tidak ditemukan atau negatif jentik nyamuk. Selain itu *house index*, *container index*, dan *breteau index* digunakan

sebagai indikator untuk menghitung rumah yang positif keberadaan jentik nyamuk dan mengukur kepadatan. (Linawati Alim, 2017)

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi terjadinya peningkatan kasus, salah satunya dan yang paling utama adalah dengan memberdayakan masyarakat dalam kegiatan pemabrantasan sarang nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M (menguras-menutup-mengubur). Kegiatan ini telah diintensifkan sejak 1992 dan pada tahun 2000 dikembangkan menjadi 3M Plus yakni dengan cara menggunakan larvasida, memelihara ikan dan mencegah gigitan nyamuk. (Dinata, 2018)

Kuat dugaan bahwa berkembang biakan nyamuk *Aedes aegypti* akibat lingkungan yang tidak sehat seperti pelaksanaan 3M yang tidak rutin, serta kebiasaan-kebiasaan manusia yang membuang barang bekas di sembarang tempat yang memungkinkan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus menjaga lingkungannya dengan baik, hubungan yang muncul antara manusia dengan lingkungan sangat erat dan saling memberikan timbal balik.

Allah SWT berfirman: (QS. Ar-Rum 30:41)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Kementerian Agama, 2013)

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, ayat diatas menjelaskan darat dan laut merupakan tempat terjadinya fasad ini dapat berarti daratan dan laut menjadi arena kerusakan. Laut telah tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Ayat ini juga menandakan ketidakseimbangan dan kekurangan manfaat. Akibat keseimbangan lingkungan menjadi kacau, inilah yang mengantarkan ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan, bahwa ayat diatas tidak menyebut udara, boleh jadi karena yang ditekankan disini adalah apa yang tampak saja sebagaimana makna kata zhahara. (M. Quraish Shihab dalam Feni Lusiana, 2018)

Bertambahnya populasi manusia di muka bumi telah banyak membawa perubahan lingkungan tempat tinggal manusia, tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan

yang semakin besar telah membuat berbagai perubahan lingkungan yang memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap keberadaan beberapa vektor penyakit, seperti nyamuk. Hal ini disebabkan karena dengan semakin tingginya populasi penduduk, kualitas lingkungan juga akan cenderung semakin menurun. Perubahan lingkungan yang menjadi faktor resiko terjadinya penularan itu dapat terjadi seperti pertumbuhan penduduk yang tidak memiliki pola tertentu, faktor urbanisasi yang tidak terencana dan terkontrol dengan baik, pembukaan lahan perumahan, pertambangan, sistem pembuangan limbah dan pengelolaan sampah yang tidak baik akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang kemudian berdampak pada perubahan iklim global, kenaikan temperatur, perubahan pola musim hujan dan kemarau yang diduga akan disinyalir menyebabkan resiko penularan DBD dan memunculkan KLB DBD. (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017)

Oleh karena itu diperlukan penelitian mengenai survey tingkat kepadatan larva *Aedes sp.* berkaitan dengan kejadian DBD di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui tingkat kepadatan larva *Aedes sp.* dengan kejadian DBD berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yakni :

1. Berapa nilai *House Index* survei larva *Aedes sp.* ?
2. Berapa nilai *Container Index* survei larva *Aedes sp.* ?
3. Berapa nilai *Breteau index* survei larva *Aedes sp.* ?
4. Berapa tingkat kepadatan larva *Aedes sp.* berdasarkan tabel *Density Figure* (DF) dari WHO?

C. Tujuan Umum

Mengukur tingkat kepadatan larva *Aedes sp.* berkaitan dengan kejadian DBD di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

1. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui tingkat kepadatan larva *Aedes sp.* dengan menghitung jumlah *House Index*.
- b. Mengetahui tingkat kepadatan larva *Aedes sp.* dengan menghitung jumlah *Container Index*.
- c. Mengetahui tingkat kepadatan larva *Aedes sp.* dengan menghitung jumlah *Breteau index*.
- d. Mengetahui kategori kepadatan larva *Aedes sp.* berdasarkan tabel *Density Figure* (DF) dari WHO.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai cara menghitung *House Index*, *Container Index*, *Breteau Index*, dan menentukan tingkat kepadatan larva *Aedes sp.* berdasarkan tabel *Density Figure* (DF) dari WHO, serta mengetahui hubungan tingkat kepadatan larva *Aedes sp.* dengan kejadian DBD di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

2. Bagi Pemerintah Setempat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat kepadatan larva *Aedes sp.* di wilayah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD) di kota Makassar sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembuatan strategi pengendalian vektor Demam Berdarah Dengue (DBD).

3. Bagi Perkembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan pustaka untuk pengembangan ilmu.

E. Definisi Operasional

1. Survei merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penularan kasus setempat, yang dilakukan dengan cara pemeriksaan keberadaan jentik/larva *Aedes sp.*
2. Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penderita DBD yang berada di Kecamatan Tamalate tahun 2017 dan tercatat oleh petugas pada buku kunjungan pasien dengan alamat yang jelas dan dapat diobservasi.

3. Tingkat kepadatan larva *Aedes sp.* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil perhitungan *House Index*, *Container Index*, dan *Breteau Index* yang kemudian disesuaikan dengan tabel *Density Figure* (DF) dari WHO untuk menentukan kriteria tingkat kepadatannya.

Kriteria Objektif

Rendah : Jika nilai *Density Figure* (DF) yang diperoleh sama dengan satu sesuai dengan peraturan WHO

Sedang : Jika nilai *Density Figure* (DF) yang diperoleh antara dua sampai dengan lima sesuai dengan peraturan WHO

Tinggi : Jika nilai *Density Figure* (DF) yang diperoleh antara enam sampai dengan Sembilan sesuai dengan peraturan WHO

4. *House Index* (HI) adalah jumlah rumah positif jentik dari seluruh rumah yang diperiksa, dinyatakan dalam rumus:

$$HI = \frac{\text{Jumlah rumah yang positif jentik}}{\text{Jumlah rumah yang diperiksa}} \times 100\%$$

5. *Container Index* (CI) adalah jumlah kontainer yang ditemukan larva dari seluruh kontainer yang diperiksa, dinyatakan dalam rumus:

$$CI = \frac{\text{Jumlah kontainer yang positif jentik}}{\text{Jumlah kontainer yang diperiksa}} \times 100\%$$

6. *Breteau Index* (BI) adalah jumlah kontainer dengan larva dalam seratus rumah, dinyatakan dalam rumus :

$$BI = \frac{\text{Jumlah kontainer yang positif jentik}}{100 \text{ rumah yang diperiksa}} \times 100\%$$

7. *Density Figure* (DF) adalah kepadatan larva *Aedes sp.* yang merupakan gabungan dari HI, CI, dan BI yang dinyatakan dengan skala 1-9 seperti tabel menurut WHO.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2021 di Kecamatan Tamalate. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepadatan larva *Aedes sp.* berkaitan dengan kejadian DBD di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan, pengambilan data sekunder, pemeriksaan keberadaan larva dan menghitung nilai HI, CI, dan BI, menentukan kategori kepadatan berdasarkan tabel *Density Figure* dari WHO pada rumah-rumah warga yang pernah ditemukan kasus DBD dan sekitarnya sesuai dengan jangkauan jarak terbang nyamuk di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

G. Kajian Pustaka

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu Tentang Kepadatan Larva dan Nyamuk *Aedes* :

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			
			Variabel	Jenis Penelitian	Sampel	Hasil
1.	Linawati Alim, Farida Heriyani, Istiana	Tingkat Kepadatan Jentik Nyamuk <i>Aedes aegypti</i> Pada Tempat Penampungan Air <i>Controllable Sites</i> dan <i>Disposable Sites</i> di Sekolah Dasar Kecamatan Banjarbaru Utara	Larva	Observasional	Larva Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	Dari hasil penelitian di 23 SD Kecamatan Banjarbaru Utara, dari 517 TPA didapatkan sebanyak 505 <i>Controllable Sites</i> (97,6%) dan 12 <i>Disposable Sites</i> (2,4%). Hasil analisis dari <i>Container Index</i> di 23 sekolah kemudian dimasukkan pada tabel <i>Density figure</i> , sekolah dengan nilai CI paling tinggi adalah SDN 4 Komet sebesar 50% dan masuk ke dalam kategori kepadatan tinggi, sedangkan SD IT Robbani dengan nilai CI paling rendah sebesar 5% masuk ke dalam kategori kepadatan sedang. Ini disebabkan karena SDN 4 Komet memiliki banyak bak mandi.
2.	Kursianto	Kajian Kepadatan dan Karakteristik Habitat Larva <i>Aedes aegypti</i> di Kabupaten Sumedang Jawa Barat	Larva	Observational-Deskriptif-Analitik	Larva Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	Kepadatan tertinggi dengan DF 6.3 terdapat di Kecamatan Paseh, sedangkan di Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Tanjungsari, dan Jatinangor mempunyai larva dengan kategori sedang. Tingkat kepadatan larva di 5 kecamatan endemis DBD di Kabupaten Sumedang termasuk ke dalam kategori sedang dengan nilai

						DF 4.7. Adapun jenis habitat tempat perkembangbiakan nyamuk adalah jenis kontainer TPA yang paling banyak ditemukan larva yaitu bak mandi (49.32%), ini disebabkan karena bak mandi mempunyai kapasitas penyimpanan jumlah air yang cukup besardan mungkin jarang dikuras dan disikat.
3.	Joni Hendri, Roy Nusa Rhagus Edo Santya, heni Prasetyowati	Distribusi dan kepadatan Vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) Berdasarkan Ketinggian Tempat di Kabupaten Ciamis Jawa Barat	Larva	Observational	Larva Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	Vektor Demam Berdarah Dengue ditemukan di setiap ketinggian yang disurvei. <i>Aedes aegypti</i> dan <i>Aedes albopictus</i> ditemukan pada ketinggian 3-5 mdpl, 409-416 mdpl, 512-518 mdpl, dan 695-701 mdpl. Pada ketinggian 218-221 mdpl hanyaditemukan spesies <i>Aedes aegypti</i> dan pada ketinggian 839-847 mdpl ditemukan <i>Aedes albopictus</i> saja. Berdasarkan Indeks jentik (HI, CI, dan BI) dan <i>Pupae Index</i> menunjukkan hasil yang tinggi pada ketinggian 3-5 mdpl.
4.	Evi Sulistyorini, Upik Kesumawati Hadi, Susi Soviana	Faktor Entomologi Terhadap Keberadaan Jentik <i>Aedes sp.</i> pada Kasus DBD Tertinggi dan Terendah di Kota Bogor	Larva	Observational-Deskriptif-Analitik	Larva Nyamuk <i>Aedes sp.</i>	Dari faktor entomologi berdasarkan kepadatan populasi larva dengan perhitungan HI, CI, BI, dan DF di Baranangsiang (HI : 33%; CI : 17,4%; BI : 42%; DF : 5) dan di Bojungkerta (HI : 42%; CI : 23,2%; BI : 54%; DF : 6), maka dapat dikategorikan bahwa di Baranangsiang termasuk kategori kepadatan sedang dan di Bojungkerta kepadatan tinggi.

						<p>Analisis factor risiko dari karakteristik habitat diketahui bahwa hanya factor tidak dikuras (sig=0,000; OR = 116,44) yang berpengaruh dan berisiko 116,44 kali terhadap keberadaan larva di Bojongketa factor jenis (sig= 0,000; OR = 0,020), letak (sig = 0,040; OR = 3,32), serta bahan kontainer (sig = 0,039; OR = 3,05) yang paling berpengaruh (jenis TPA berisiko 0,02 kali, letak di dalam rumah berisiko 3,32 kali, bahan semen/karet/tanah berisiko 3,05 kali) terhadap keberadaan larva.</p>
5.	<p>Mis R. Sidaluwu, Woodford B.S.Joseph, Dina V. Rombot</p>	<p>Gambaran Kepadatan Jentik Nyamuk <i>Aedes spp.</i> Menggunakan parameter <i>House Index</i>, <i>Container Index</i>, <i>Breteau Index</i> di Desa Kalasey Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Tahun 2015</p>	Larva	Deskriptif	Larva Nyamuk <i>Aedes</i> .	<p>Dari hasil pemeriksaan jentik dengan metode visual, didapatkan 36 dari 100 rumah yang positif jentik dengan hasil <i>House Index</i> (HI) sebesar 36% didapatkan DF = 5 sehingga kategori kepadatan jentik tergolong rendah dengan resiko penularan sedang. Untuk tempat penampungan air/kontainer , didapatkan 49 dari 307 kontainer yang positif jentik dengan hasil <i>Container Index</i> (CI) sebesar 15,9% didapatkan nilai DF = 5 sehingga tingkat kepadatan jentik tergolong rendah dengan resiko penularan sedang. Dan untuk pemeriksaan jentik dengan metode visual, didapatkan 49 kontainer dari 100 rumah yang positif jentik dengan hasil <i>Breteau Index</i> (BI) sebesar 49%</p>

						didapatkan $DF = 5$ sehingga kategori kepadatan jentik tergolong rendah dengan resiko penularan sedang.
6.	Sunaryo, Nova Pramestuti	Surveilans <i>Aedes aegypti</i> di Daerah Endemis Demam Berdarah Dengue	Nyamuk Dewasa	Analitik	Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kendal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Grobogan, dan Kota Semarang memiliki nilai HI > 10%, CI antara 4,92-58,58%, BI antara 13,27-157, PI antara 5-168. Adapun nilai OI tertinggi di Desa Kalikabong, Kabupaten Purbalingga yakni sebesar 40%. Proporsi <i>Controllable site</i> lebih banyak daripada <i>Disposable site</i> dimana hal ini menunjukkan rumah tersebut berisiko tinggi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Demam Berdarah Dengue (DBD)

1. Pengertian Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *Dengue* yang ditularkan oleh gigitan nyamuk khususnya nyamuk *Aedes aegypti*. (Deri Kermelita, 2020). Virus *Dengue* adalah virus dari genus *Flavivirus*, family *Flaviviridae*. Penyakit demam berdarah ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Nyamuk *Aedes aegypti* betina menyimpan virus *dengue* pada telurnya, selanjutnya virus itu akan ditularkan melalui gigitan, sehingga darah dari seseorang yang mengandung virus *dengue* dapat dengan mudah dipindahkan ke orang lain. (Denai Wahyuni, 2021)

Nyamuk dewasa lebih suka menggigit di daerah terlindung seperti di sekitar rumah. Aktivitas menggigit mencapai puncak saat perubahan intensitas cahaya tetapi bisa menggigit sepanjang hari dan tertinggi sebelum matahari terbenam. Nyamuk *Aedes aegypti* aktif menghisap darah di dalam rumah daripada diluar rumah dan menyukai tempat yang agak gelap. Nyamuk betina lebih menyukai darah manusia daripada darah binatang sampai lambung terisi penuh darah. Dengan begitu nyamuk *Aedes aegypti* sangat efektif sebagai penular penyakit. (Denai Wahyuni, 2021)

Masa inkubasi dari penyakit DBD, yakni periode sejak virus *Dengue* menginfeksi manusia hingga menimbulkan gejala klinis, antara 3-14 hari, rata-rata

antara 4-7 hari. Penyakit DBD tidak ditularkan langsung dari orang ke orang. Penderita menjadi infeksiif bagi nyamuk padasaat viremia, yakni beberapa saat menjelang timbulnya demam hingga pada saat masa demam berakhir, yang biasanya berlangsung selama 3-5 hari. Nyamuk *Aedes aegypti* menjadi infeksiif 8-12 hari setelah mengisap darah penderita sebelumnya. Selama periode ini, nyamuk *Aedes* yang telah terinfeksi oleh virus *Dengue* akan tetap infeksiif selama hidupnya dan potensial menularkan virus *Dengue* kepada manusia yang rentan.

Kedua jenis nyamuk *Aedes* ini, terdapat hampir di seluruh pelosok di Indonesia, kecuali di daerah dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut. Nyamuk *Aedes aegypti* merupakan penyebar penyakit (vektor) Demam Berdarah Dengue (DBD) yang paling efektif dan paling utama karena habitatnya di sekitar pemukiman penduduk. adapun nyamuk *Aedes albopictus*, banyak terdapat di daerah perkebunan dan semak-semak. (Dinata, 2018)

2. Gejala Klinis DBD

Penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) pada umumnya akan mengalami gejala yang dimulai dengan mengalami demam tinggi selama 2-7 hari, suhu tubuh mencapai 40°C demam akan sering disertai dengan adanya gejala yang tidak spesifik, misalnya tidak nafsu makan, badan akan terasa lemah, nyeri pada sendi dan tulang, mual dan muntah-muntah. Pada tahap ini masih sulit untuk dikenali jika disbanding dengan penyakit lainnya.

Setelah melewati tahap demam penderita akan mulai timbul bintik-bintik seperti bekas gigitan nyamuk, terdapat ruam pada kulit muka, dada, lengan, atau kaki,

dan disertai mimisan. Rasa nyeri pada ulu hati, rasa gelisah, ujung tangan dan kaki dingin, banyak menegluarkan keringat. Penderita DBD mengalami penurunan jumlah trombosit selama tiga hari dan kembali normal dalam waktu satu minggu. (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017)

Pada fase akhir, penderita akan mengalami dua fase yaitu demam turun dan sembuh, namun pada kasus berat penderita akan mengalami kegagalan sirkulasi udara yang ditandai dengan berkeringat, pasien tampak gelisah, denyut nadi lemah, ujung-ujung jari terasa dingin, dan disertai dengan penurunan kesadaran dan renjatan (syok) yang dapat berakibat kematian. (Rahmawati, 2016)

3. Endemisitas Demam Berdarah Dengue (DBD)

a. Endemis

Endemis adalah keadaan yang biasa atau normal atau frekuensi penyakit tertentu berada dalam keadaan normal, dengan kata lain penyakit tersebut biasa terjadi di suatu daerah dengan frekuensi yang normal. (Moh. Guntur Nangi, 2019)

b. Stratifikasi Desa Kelurahan DBD

Stratifikasi desa kelurahan DBD adalah sebagai berikut (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017) :

1) Desa/kelurahan endemis yaitu desa/kelurahan yang dalam 3 tahun terakhir, terdapat kasus ataupun kematian karena demam berdarah dengue secara berurutan, meskipun jumlahnya hanya satu.

2) Desa/kelurahan sporadis yaitu desa/kelurahan yang dalam 3 tahun terakhir terdapat kasus ataupun kematian karena penyakit demam berdarah dengue tetapi tidak berurutan disetiap tahunnya.

3) Desa/kelurahan potensial yaitu desa/kelurahan yang dalam 3 tahun terakhir tidak pernah diketemukan kasus ataupun kematian karena penyakit DBD, tetapi penduduknya padat, mempunyai hubungan transportasi yang ramai dengan wilayah yang lain dan presentasi rumah yang ditemukan jentik lebih atau sama dengan 5%.

4) Desa/kelurahan bebas yaitu kelurahan atau desa yang dalam tiga tahun terakhir tidak pernah ada penderita DBD dan persentasi rumah yang ditemukan jentik $\leq 5\%$. (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017)

4. Nyamuk *Aedes aegypti*

Nyamuk *Aedes aegypti* adalah vektor utama pada penularan virus Dengue kepada orang lain, namun ada beberapa spesies lain yang menjadi vektor penular penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) selain *Ae.aegypti* yakni, *Ae.albopictus*,

Ae. polyesiensis, anggota kelompok *Ae. scutellaris* dan *Ae. niveus* sebagai vector sekunder dalam penularan penyakit.

Nyamuk merupakan hewan yang berasal dari filum *Arthropoda*, kelas *Insecta*, dengan ordo *Diptera*. Nyamuk *Aedes aegypti* berasal dari famili *Culicidae* dengan genus *Aedes*. Berikut urutan klasifikasi dari nyamuk *Aedes aegypti* (Upik Kesumawati Hadi, 2021):

Kingdom : *Animalia*

Phylum : *Arthropoda*

Sub Phylum : *Mandibulata*

Kelas : *Insecta*

Sub Kelas : *Pterygota*

Ordo : *Diptera*

Sub Ordo : *Nematocera*

Famili : *Culicidae*

Sub family : *Culicinae*

Genus : *Aedes*

Sub Genus : *Ategomia*

Species : *Aedes aegypti*



a. Ciri-ciri Nyamuk *Aedes aegypti*

Nyamuk *Aedes aegypti* dewasa berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata nyamuk lain dan mempunyai warna dasar hitam dengan bintik-bintik

putih pada bagian badan dan kaki. Perbedaan morfologi nyamuk *Aedes aegypti* yang jantan dan betina terletak pada antenanya, yang jantan memiliki bulu yang lebat pada antenanya sedangkan yang betina berbulu agak jarang/tidak lebat. (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017)

b. Siklus Hidup Nyamuk *Aedes aegypti*

Nyamuk *Aedes aegypti* seperti juga nyamuk *Anophelini* mengalami metamorphosis sempurna, yaitu: telur, jentik, kepompong, nyamuk. Stadium telur, jentik, dan kepompong hidup di dalam air. Pada umumnya telur akan menetas menjadi jentik dalam waktu ± 2 hari setelah telur terendam air. Stadium jentik biasanya berlangsung 6-8 hari, dan stadium kepompong berlangsung antara 2-4 hari. Pertumbuhan dari telur menjadi nyamuk dewasa memerlukan waktu selama 9-10 hari. (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017)

1) Telur

Telur diletakkan satu persatu pada permukaan yang lembab tepat di atas batas air. Kebanyakan *Aedes aegypti* betina dalam satu siklus gonotropik meletakkan telur di beberapa tempat perindukan. Masa perkembangan embrio selama 48 jam pada lingkungan yang hangat dan lembab. Setelah perkembangan embrio sempurna, telur dapat bertahan pada keadaan kering dalam waktu yang lama (lebih dari satu tahun). Telur menetas bila wadah tergenang air, namun tidak semua telur menetas pada saat yang bersamaan. Kemampuan telur bertahan dalam keadaan kering membantu

kelangsungan hidup spesies selama kondisi iklim yang tidak menguntungkan. (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017)



Gambar 2.1 Telur *Aedes aegypti*

Sumber : (Ade Putri, 2016)

2) Jentik

Jentik memerlukan empat tahap perkembangan. Jangka waktu perkembangan jentik tergantung pada suhu, ketersediaan makanan, dan kepadatan jentik dalam sebuah kontainer. Dalam kondisi optimal, waktu yang dibutuhkan dari telur menetas hingga menjadi nyamuk dewasa adalah tujuh hari, termasuk dua hari dalam masa pupa. Sedangkan pada suhu rendah, dibutuhkan waktu beberapa minggu. Ada empat tingkat (instar) jentik sesuai dengan pertumbuhan larva *Aedes aegypti* tersebut, yaitu (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017) :

- a) Instar I: berukuran paling kecil, yaitu 1-2 mm
- b) Instar II: 2,5-3,8 mm

- c) Instar III: lebih besar sedikit dari larva instar II
- d) Instar IV: berukuran paling besar 5 mm



Gambar 2.2 Jentik/Larva *Aedes aegypti*

Sumber : (Ade Putri, 2016)

3) Pupa (kepompong)

Pupa (kepompong) berbentuk seperti koma. Bentuknya lebih besar namun lebih ramping dibanding jentik. Pupa *Aedes aegypti* berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata pupa nyamuk. Menurut Sugito (1989), pupa *Aedes aegypti* tidak memerlukan udara dan makan, belum bisa dibedakan antara jantan dan betina, menetas dalam waktu 1-2 hari, dan menjadi nyamuk dewasa, pada umumnya nyamuk jantan menetas lebih dahulu dari nyamuk betina. (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017)




Gambar 2.3 Pupa *Aedes aegypti*

Sumber : (Ade Putri, 2016)

4) Nyamuk Dewasa

Sesaat setelah muncul menjadi dewasa, nyamuk akan kawin dan nyamuk betina yang telah dibuahi akan mencari makan dalam waktu 24-36 jam kemudian. Darah merupakan sumber protein terpenting untuk pematangan telur. (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017). Habitat tempat perindukan nyamuk *Aedes aegypti* adalah di air yang relatif bersih, yaitu di wadah-wadah tempat penampungan air untuk kepentingan sehari-hari dan barang-barang bekas, seperti ban, botol, kaleng, plastik, pecahan kaca, dan sebagainya yang merupakan lingkungan buatan manusia.



Gambar 2.4 Siklus Hidup Nyamuk Aedes

Sumber : (Ade Putri, 2016)

Tabel 2.1

Perbedaan jentik Aedes dengan jentik Anopheles, Mansonia, Culex

Aedes	Anopheles	Mansonia	Culex
- Berenang bebas di air	- Berenang bebas di air	- Melekat pada akar tumbuhan di dalam air	- Berenang bebas di air
- Mempunyai siphon yang besar dan pendek dan terdapat <i>pectern teeth</i> pada siphon	- Tidak mempunyai siphon	- Siphon pendek, tajam, dengan ujung runcing seperti tanduk dan ditusukkan pada akar tumbuhan air, tanpa <i>pectern teeth</i>	- Terdapat siphon yang bentuknya langsing dan kecil tanpa <i>pectern teeth</i>
- Pada waktu istirahat membentuk sudut dengan	- Pada waktu istirahat sejajar permukaan air	- Pada waktu	- Pada waktu istirahat membentuk sudut dengan permukaan air
	- Banyak dijumpai pada genangan air	- Pada waktu	- Banyak dijumpai

permukaan air - Banyak dijumpai pada genangan air dengan tempat tertentu (drum, bak, tempayan, kaleng bekas, pelepah pohon, dan lain-lain)	yang tidak terlalu kotor (rawa, sawah, ladang, dan lain-lain)	istirahat tetap melekat pada akar tumbuhan air - Banyak dijumpai pada genangan air dengan tumbuhan tertentu (pistia, eceng, dan lain- lain)	pada genangan air kotor (comberan, got, parit, dan lain-lain)
---	--	---	--

Sumber : (Denai Wahyuni, 2021)

Tabel 2.2
Perbedaan Jentik *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*

<i>Aedes aegypti</i>	<i>Aedes albopictus</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Pada abdomen ke-8 terdapat satu baris sisik sikat (<i>comb scale</i>) yang pada sisi lateralnya terdapat duri-duri - Terdapat gigi pekten (<i>pectin teeth</i>) pada siphon dengan satu cabang - Sikat ventral memiliki 5 pasang rambut. - Hidup domestik pada kontainer di dalam dan di sekitar rumah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sisik sikat (<i>comb scale</i>) tidak berduri lateral - Gigi pekten (<i>pectin teeth</i>) dengan dua cabang - Sikat ventral memiliki 4 pasang rambut - Hidup dan berkembang di kebun dan semak-semak

Sumber : (Denai Wahyuni, 2021)

c. Penyebaran Nyamuk *Aedes aegypti*

Penyebaran nyamuk ada dua cara yaitu penyebaran aktif, jika nyamuk menyebar ke berbagai tempat menurut kebiasaan terbangnya dan penyebaran pasif, jika nyamuk terbawa oleh angin atau kendaraan, jadi bukan oleh kekuatan terbangnya sendiri. (Frida, 2019)

Penyebaran Nyamuk *Aedes aegypti* betina dewasa dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk ketersediaan tempat bertelur dan darah, tetapi tampaknya terbatas sampai jarak 100 meter dari lokasi kemunculan. Akan tetapi, penelitian terbaru di Puerto Rico menunjukkan bahwa nyamuk ini dapat menyebar sampai lebih dari 400 meter terutama untuk mencari tempat bertelur. Transportasi pasif dapat berlangsung melalui telur dan larva yang ada dalam penampungan. (Salmiyatun, 2014)

Aedes aegypti tersebar luas di wilayah tropis dan subtropis Asia Tenggara, terutama di wilayah perkotaan. (Deddy Maulana Hasyim, 2013). Penyebarannya ke daerah pedesaan dikaitkan dengan pembangunan sistem persediaan air bersih dan perbaikan sarana transportasi. *Aedes aegypti* merupakan vektor perkotaan dan populasinya secara khas berfluktuasi bersama air hujan dan kebiasaan penyimpanan air. Negara-negara dengan curah hujan lebih dari 200 cm per tahun, populasi *Aedes aegypti* lebih stabil, dan ditemukan di daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan. Di Indonesia nyamuk ini tersebar luas baik di rumah-rumah maupun di tempat umum. Tidak tersedianya tempat perindukan yang baik maka umur nyamuk menjadi pendek dan parasit tidak bisa menyelesaikan siklus hidupnya.

5. Bionomik Nyamuk *Aedes aegypti*

Yang dimaksud dengan bionomik adalah kesenangan memilih tempat perkembang biakan (*breeding habit*), kesenangan menggigit (*feeding habit*), kesenangan istirahat (*resting habit*), dan jarak terbang (*flight range*).

a. Tempat Perkembang Biakan (*breeding habit*)

Jenis tempat perkembang biakan nyamuk *Aedes aegypti* dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) TPA untuk keperluan sehari-hari, seperti: drum, tangki reservoir, tempayan, bak mandi/wc, dan ember.
- 2) TPA bukan untuk keperluan sehari-hari seperti: tempat minum burung, vas bunga, perangkap semut dan barang-barang bekas (ban, kaleng, botol, plastik dan lain-lain).
- 3) Tempat penampungan air alamiah seperti: lobang pohon, lobang batu, pelepah daun, tempurung kelapa, pelepah pisang dan potongan bambu.

b. Kebiasaan menggigit (*feeding habit*)

Nyamuk *Aedes aegypti* bersifat *anthropophilic*, walaupun mungkin akan menghisap darah hewan berdarah panas lain yang ada. Sebagai spesies yang aktif siang hari nyamuk betina mempunyai dua waktu aktifitas menggigit, yaitu beberapa jam di pagi hari dan beberapa jam sebelum gelap. Apabila pada waktu menghisap darah terganggu, maka nyamuk *Aedes aegypti* dapat menghisap lebih dari satu orang. Perilaku ini sangat meningkatkan efektifitas penularan pada masa

Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah DBD. (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017)

c. Kebiasaan beristirahat (*resting habit*)

Aedes aegypti suka beristirahat di tempat yang gelap, lembab, tempattersembunyi di dalam rumah atau bangunan, termasuk tempat tidur, kloset, kamar mandi dan dapur. Setelah menghisap darah, nyamuk *Aedes aegypti* hinggap (beristirahat) di dalam atau kadang-kadang di luar rumah berdekatan dengan tempat perkembangbiakannya. Biasanya tempat yang aga gelap dan lembab. Di tempat ini nyamuk menunggu proses pematangan telurnya. (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017)

d. Jangkauan terbang (*flight range*)

Penyebaran nyamuk *Aedes aegypti* betina dewasa dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk keberadaan tempat bertelur dan darah sebagai makanan, namun kelihatannya terbatas pada wilayah 100 meter dari tempat pupa menetas menjadi nyamuk dewasa. Walaupun demikian, penelitian terbaru di Puerto Rico menunjukkan bahwa nyamuk *Aedes aegypti* betina dewasa menyebar lebih dari 400 meter untuk mencari tempat bertelur. Penyebaran pasif nyamuk *Aedes aegypti* dewasa dapat terjadi melalui telur dan jentik dalam wadah. (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017)

B. Tinjauan Umum tentang Kepadatan Larva Nyamuk *Aedes*

1. Keberadaan Larva

Keberadaan larva nyamuk *Aedes aegypti* dapat diketahui dengan cara melakukan survey. Survey larva/jentik nyamuk *Aedes* dilakukan dengan cara sebagai berikut (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017):

- a. Semua tempat atau bejana yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes* diperiksa (dengan mata telanjang) untuk mengetahui ada tidaknya jentik.
- b. Untuk memeriksa TPA yang berukuran besar, seperti: bak mandi, tempayan, drum, dan bak penampungan air lainnya. Jika pada pandangan (penglihatan) pertama tidak menemukan jentik, tunggu kira-kira 1 menit untuk memastikan bahwa benar jentik tidak ada.
- c. Untuk memeriksa tempat-tempat perkembangbiakan yang kecil, seperti: vas bunga atau pot tanaman air atau botol yang airnya keruh, seringkali airnya perlu dipindahkan ke tempat lain.
- d. Untuk memeriksa jentik di tempat yang agak gelap, atau airnya keruh, biasanya digunakan senter.

Adapun metode survey larva/jentik dapat dilakukan dengan cara (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017):

- a. *Single larva*: Cara ini dilakukan dengan mengambil satu jentik di setiap tempat genangan air yang ditemukan jentik untuk diidentifikasi lebih lanjut.

- b. Visual: Cara ini cukup dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya jentik di setiap tempat genangan air tanpa mengambil jentiknya. Biasanya dalam program DBD menggunakan cara visual.

2. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keberadaan Larva *Aedes*


a. Pelaksanaan PSN DBD

Menurut (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017), pemberantasan terhadap jentik nyamuk *Aedes aegypti* yang dikenal dengan istilah Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah *Dengue* (PSN DBD) dilakukan dengan cara:

1) Fisik: cara ini dikenal dengan kegiatan 3-M yaitu menguras (dan menyikat) bak mandi, bak wc, dan lain-lain. Menutup tempat penampungan air rumah tangga (tempayan, drum, dan lain-lain). Mengubur, menyingkirkan atau memusnahkan barang-barang bekas (seperti kaleng, ban, dan lain-lain).

2) Kimia: cara memberantas jentik *Aedes aegypti* dengan menggunakan insektisida pembasmi jentik (larvasida) ini antara lain dikenal dengan istilah larvasidasi. Larvasida yang biasa digunakan adalah granules (*sand granules*). Dosis yang digunakan 10 gram (\pm 1 sendok makan rata) untuk tiap 100 liter air. Larvasidasi dengan temephos ini mempunyai efek residu 3 bulan.

3) Biologi: cara ini dengan memelihara ikan pemakan jentik (ikan kepala timah, ikan gupi, ikan cupang dan lain-lain). Dapat juga dengan menggunakan *Bacillus thuringiensis* H-14.



Sumber: Depkes RI, 2005

Gambar 2.5 Bagan Cara Pemberantasan DBD

b. Macam-Macam Tempat Perindukan Buatan *Aedes aegypti*

Sumber utama perkembang biakan *Aedes aegypti* di sebagian besar daerah pedesaan Asia Tenggara adalah di wadah-wadah penampungan air untuk keperluan rumah tangga, termasuk wadah dari keramik, tanah liat dan bak semen yang berkapasitas 200 liter, tong besi yang berkapasitas 210 liter (50galon), dan wadah yang lebih kecil sebagai tempat penampungan air bersih atau hujan. Wadah penampungan air harus ditutup dengan penutup yang rapat atau kasa. Setelah air digunakan harus dijaga agar wadah tetap tertutup. Cara ini cukup efektif seperti telah dilakukan di Thailand (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017). TPA yang berada di rumah meliputi tendon air, tower, bak mandi, bak WC, padasan, cadangan air ditaman, air jebakan semut yang memiliki peluang untuk nyamuk *Aedes aegypti* bertelur. Macam TPA untuk keperluan sehari-hari meliputi drum, tangki reservoir, tempayan, bak mandi atau WC, dan ember. TPA rumah tangga yang paling banyak

ditemukan jentik atau pupa *Aedes aegypti* adalah TPA rumah tangga yang berasal dari bahan dasar logam. Jenis TPA rumah tangga yang paling banyak ditemukan jentik atau pupa *Aedes aegypti* adalah TPA jenis tempayan. (Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 2017)

3. Cara Mengukur Tingkat Kepadatan Larva

Ukuran yang dipakai untuk mengetahui kepadatan larva *Aedes aegypti* adalah sebagai berikut :

a. *House Index* (HI) :

$$HI = \frac{\text{Jumlah rumah yang positif larva}}{\text{Jumlah rumah yang diperiksa}} \times 100\%$$

b. *Container Index* (CI) :

$$CI = \frac{\text{Jumlah Kontainer yang positif larva}}{\text{Jumlah Kontainer yang diperiksa}} \times 100\%$$

c. *Breteau Index* (BI) :

$$BI = \frac{\text{Jumlah kontainer yang positif larva}}{100 \text{ rumah yang diperiksa}} \times 100\%$$

WHO dalam menentukan kepadatan populasi nyamuk (*Density Figure/DF*) diperoleh dari gabungan HI, CI, dan BI dengan kategori kepadatan :

- 1) DF = 1 = Kepadatan Rendah
- 2) DF = 2-5 = Kepadatan Sedang
- 3) DF = 6-9 = Kepadatan Tinggi

Tabel 2.3
Indikator Kepadatan Larva *Aedes*

<i>DF</i>	<i>HI</i>	<i>CI</i>	<i>BI</i>
1	1-3	1-2	1-4
2	4-7	3-5	5-9
3	8-17	6-9	10-19
4	18-29	10-14	20-34
5	30-37	15-20	35-49
6	38-49	21-27	50-74
7	50-59	28-31	75-99
8	60-76	32-40	100-199
9	≥ 77	≥ 41	≥ 200

Sumber :<http://www.litbang.depkes.go.id>

C. Tinjauan Umum Pandangan Agama tentang Nyamuk

Terdapat berbagai jenis serangga yang hidup di atas muka bumi ini. Serangga sangatlah penting dalam kehidupan manusia bukanlah terletak pada jumlahnya yang terdiri daripada hampir 75% dari seluruh spesies hewan. Akan tetapi serangga amat berperan dalam ekosistem dalam mewujudkan kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Justru, Al-Qur'ān sendiri telah membicarakan tentang serangga kepentingannya dalam kehidupan manusia. Walaupun terdapat berbagai jenis serangga yang hidup di atas muka bumi ini, namun Al-Qur'ān hanya mengetengahkan beberapa jenis serangga saja yang mewakili kumpulan-kumpulan serangga dengan berbagai cara hidupnya, seperti serangga pemakan tumbuh-tumbuhan, pemakan benda-benda organik mati, serangga pemangsa dan parasit, dan serangga yang hidup secara bersendirian dan bermasyarakat. Pernyataan tentang serangga di dalam al-Qur'ān menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah swt. di


samping ia adalah satu fakta biologi untuk dikaji oleh manusia yang dikurniakan akal fikiran dan kemampuan untuk melakukan kajian. Ia bersesuaian dengan konsep ilmu di dalam Islam yang mengarah kepada tauhid dan keredhaan Allah swt.

Secara umumnya, serangga yang telah disebut di dalam al-Qur'ān ialah nyamuk, lalat, belalang, kutu, lebah, semut dan anai-anai.

Nyamuk adalah serangga yang tergolong dalam kategori hewan invertebrata yang berjumlah keseluruhan sekitar 41 genus yang merangkumi 3,530 spesies. Pada kebanyakan nyamuk betina, bagian mulutnya berbentuk *proboscis* panjang yang digunakan untuk menembusi kulit mamalia untuk menghisap darah. Nyamuk betina memerlukan protein untuk pembentukan telur dan oleh kerana nyamuk terdiri dari madu dan jus buah, yang tidak mengandungi protein, kebanyakan nyamuk betina perlu menghisap darah untuk mendapatkan protein yang diperlukan. Nyamuk jantan berbeda dengan nyamuk betina, dengan bagian mulut yang tidak sesuai untuk menghisap darah.

Nyamuk melalui empat tahap metamorphosis yakni: telur, larva, pupa, dan dewasa. Ketiga tahap pertama siklusnya bergantung kepada spesies dan suhu.

Allah swt. telah mendatangkan nyamuk sebagai salah satu serangga yang telah digunakan sebagai perumpamaan dalam Al-Qur'an. Firman Allah swt : (Q.S Al-Baqarah/2:26)


 إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا
 فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ
 كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ
 كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya :


“Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa saja, (seperti nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu (kerana perbuatan itu ada hikmahnya), Yaitu kalau orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahwa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka; dan kalau orang kafir pula maka mereka akan berkata: «Apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini?» (Jawabnya): Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya; dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu melainkan orang yang fasik.” (Kementerian Agama, 2013)

Kandungan dalam ayat 26 surah al-Baqarah ini, Allah Swt. telah mendatangkan perumpamaan tentang nyamuk (*ba`udah*). Dalam *al-Mu`jam al-Wasit*, dinyatakan bahawa *al-ba`ud* ialah sejenis serangga yang memudaratkan serta mempunyai dua sayap, dan ia juga dikenali sebagai ‘*al-namus*’. Perkataan *al-ba`ud* merupakan *ishtiqaq* atau derivasi daripada perkataan *al-ba`d* yang memberi makna sebagian daripada sesuatu. Hal ini menunjukkan kepada ukurannya yang kecil dan sedikit. *Al-Ba`udah* atau nyamuk tergolong dalam jenis hewan *al-hamj* yaitu serangga


kecil dan ia di bawah kategori *al-tayr* (hewan yang mempunyai sayap). Perkataan *al-ba`udah* disebut sekali saja di dalam al-Qur`ān yaitu pada ayat yang ini (Surah al-Baqarah ayat 26).

Tafsir Al Misbah pada surah Al-Baqarah ayat 26 diterangkan bahwa Allah swt. memberikan perumpamaan kepada manusia untuk menjelaskan segala hakikat dengan bermacam makhluk hidup dan benda, baik kecil maupun besar. Orang-orang yang tidak beriman menganggap remeh perumpamaan dengan makhluk-makhluk kecil seperti lalat dan laba-laba ini. Allah swt. Menjelaskan bahwa Dia tidak merasa enggan seperti yang dirasakan manusia, maka Dia pun tidak segan-segan untuk menggambarkan bagi hamba-hamban-Nya segala sesuatu yang dikehendaki-Nya meskipun dengan hal-hal yang sangat kecil. Allah swt. dapat menjadikan nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu sebagai perumpamaan. Orang-orang yang beriman mengetahui maksud dari perumpamaan itu dan mengetahui pula bahwa hal itu adalah kebenaran dari Allah swt. Sedangkan orang-orang yang kafir menerimanya dengan sikap ingkar dengan mengatakan, “Apa yang dikehendaki Allah swt.dengan perumpamaan ini?” perumpamaan ini menjadi sebab kesesatan orang-orang yang tidak mencari dan mengingingkan kebenaran, dan sebaliknya merupakan sebab datangnya petunjuk bagi orang-orang mukmin yang mencari kebenaran. Maka, tidak akan tersesat kecuali orang-orang yang membangkan dan keluar dari jalan-Nya. (Shihab, 2002)

D. Kerangka Teori



Sumber : HL. Blum

E. Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan lokasi penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif, dengan metode survei secara visual. Peneliti turun langsung ke Kecamatan Tamalate Kota Makassar melakukan survei larva/jentik *Aedes sp.* di rumah-rumah yang pernah ditemukan kasus DBD. Data yang telah diperoleh dari survei lapangan kemudian dihitung nilai HI, CI, dan BI untuk menentukan kategori kepadatan larva/jentik berdasarkan tabel DF dari WHO kemudian disajikan dalam bentuk tabel.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar pada bulan Agustus 2021. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tamalate adalah karena daerah ini merupakan daerah endemis DBD dengan jumlah kasus tertinggi di Kota Makassar pada tahun 2017.

B. *Populasi dan Sampel Penelitian*

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah rumah yang berada di wilayah Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah objek yang mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah rumah yang pernah terdapat kasus DBD yang alamatnya

tercatat jelas di buku kunjungan pasien dan dapat di observasi, dengan total sampel 20 sesuai dengan jumlah kasus DBD di Kecamatan Tamalate pada tahun 2017. Karena total sampel tidak mencukupi maka dimasukkanlah kriteria inklusi berdasarkan jarak terbang nyamuk yakni 100 meter sehingga mencukupi jumlah 100 sampel untuk menghitung nilai *HI*, *CI*, dan *BI* serta mengukur tingkat kepadatan berdasarkan tabel *Density Figure*.

C. Metode Pengambilan Data

1. Tahap Persiapan

Persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan penelitian yaitu membuat surat izin penelitian untuk melakukan survei lapangan dan mengumpulkan data, serta mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan survei.

2. Tahap pengumpulan data

Data penelitian yang digunakan pada penelitaian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang di dapatkan dengan cara survei di tempat penelitian. Sedangkan, data sekunder yaitu data yang di dapatkan dari dinas kesehatan terkait dengan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di kota Makassar.

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil survei dan penelitian langsung di lapangan. Data primer yang dibutuhkan adalah :

- 1) Jumlah rumah yang positif terdapat larva *Aedes sp.* untuk menghitung nilai HI.

- 2) Jumlah rumah dengan kontainer air yang positif larva *Aedes sp.* untuk menghitung nilai CI.
- 3) Jumlah kontainer yang positif larva *Aedes sp.* dari 100 rumah untuk menghitung nilai BI.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang harus dikumpulkan sebelum penelitian, yaitu data yang berhubungan dengan Lokasi Wilayah Studi. Data sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas terkait dengan penelitian.

Data sekunder yang diperlukan antara lain :

- 1) Data kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di kota Makassar.
- 2) Data atau alamat penderita DBD di wilayah Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei, memeriksa keberadaan larva, kemudian mengisi formulir survei. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Pemeriksaan larva nyamuk *Aedes sp.* Peralatan dan perlengkapan :

- 1) Senter.
- 2) Formulir pemeriksaan jentik

Cara pemeriksaan jentik :

- 1) Menentukan lokasi pemeriksaan jentik/larva.
- 2) Memeriksa keberadaan jentik/larva pada tempat-tempat yang berpotensi dimana nyamuk *Aedes sp.* meletakkan telur dengan menggunakan senter.

- 3) Apabila terdapat jentik/larva maka formulir pemeriksaan jentik diisi sesuai dengan lokasi penemuan jentik.

Metode pengukuran tingkatkepadatan larva *Aedes sp.* dilakukan berdasarkan standar dari WHO, adapun cara pengukurannya adalah sebagai berikut :

- d. *House Index* (HI) :

$$HI = \frac{\text{Jumlah rumah yang positif larva}}{\text{Jumlah rumah yang diperiksa}} \times 100\%$$

- e. *Container Index* (CI) :

$$CI = \frac{\text{Jumlah Kontainer yang positif larva}}{\text{Jumlah Kontainer yang diperiksa}} \times 100\%$$

- f. *Breteau Index* (BI) :

$$BI = \frac{\text{Jumlah kontainer yang positif jentik}}{100 \text{ rumah yang diperiksa}} \times 100\%$$

WHO dalam menentukan kepadatan populasi nyamuk (*Density Figure/DF*) diperoleh dari gabungan HI, CI, dan BI dengan kategori kepadatan :

- 4) DF = 1 = Kepadatan Rendah
- 5) DF = 2-5 = Kepadatan Sedang
- 6) DF = 6-9 = Kepadatan Tinggi

Tabel 3.1
Indikator Kepadatan Larva *Aedes*

<i>DF</i>	<i>HI</i>	<i>CI</i>	<i>BI</i>
1	1-3	1-2	1-4
2	4-7	3-5	5-9
3	8-17	6-9	10-19
4	18-29	10-14	20-34
5	30-37	15-20	35-49
6	38-49	21-27	50-74
7	50-59	28-31	75-99
8	60-76	32-40	100-199
9	≥ 77	≥ 41	≥ 200

Sumber : <http://www.litbang.depkes.go.id>

D. Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah, tahap-tahap pengolahan data adalah sebagai berikut :

1. *Editing*, data yang didapatkan pada tahap ini dilakukan pengecekan dan perbaikan terhadap semua data sebelum di masukkan dalam software hal ini untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah terisi , konsisten, relevan, serta dapat dimengerti oleh peneliti.
2. *Entry*, memasukkan data yang didapatkan peneliti ke dalam *software* yang digunakan untuk proses lebih lanjut.
3. *Cleaning*, setelah data di input ke dalam *software*, selanjutnya dilakukan pengecekan ulang untukantisipasi ada kemungkinan kesalahan pada tahap sebelumnya.

Setelah data di olah, data disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Tamalate merupakan bagian dari Kota Makassar yang mempunyai berbagai potensi yang dapat dikembangkan dalam mendukung kedudukan Kota Makassar sebagai pusat pelayanan dan pengembangan di Provinsi Sulawesi Selatan bahkan sebagai pusat pelayanan di kawasan Indonesia Timur. Hal ini mempunyai konsekuensi bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola berbagai potensi yang ada serta mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi pada rencana strategis perubahan dengan dukungan unit-unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar termasuk Pemerintah Kecamatan Tamalate.

Kecamatan Tamalate merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan

Di sebelah Utara dengan Kecamatan Mamajang,

Di sebelah Timur Kabupaten Gowa,

Di sebelah Selatan Kabupaten Takalar, dan

Di sebelah Barat Selat Makassar.

Dengan luas wilayah kurang lebih 20,21 km², dibagi dalam 11 Kelurahan. Sebanyak 3 Kelurahan di Kecamatan Tamalate merupakan daerah pantai dan 8 Kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi dibawah 500 meter dari permukaan laut. Menurut jaraknya, letak masing-masing Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan bervariasi antara 1-2 km (Macini Sombala dan Balang Baru), antara 3-4 km (Jongaya, Bontoduri, dan Parang Tambung), Kelurahan lainnya

berjarak 5-10 km. Dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa Kelurahan Barombong memiliki wilayah terluas yaitu 7,34 km², terluas kedua adalah Kelurahan Tanjung Merdeka dengan luas wilayah 3,37 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan Bungaya yaitu 0,29 km². Rasio jenis kelamin adalah sekitar 97,77% yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 98 orang penduduk laki-laki.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian survei tingkat kepadatan larva *Aedes sp.* dilakukan pada 100 rumah yang ada di Kecamatan Tamalate dengan objek penelitian adalah *House Index (HI)*, *Container Index (CI)*, *Breteau Index (BI)*, dan *Density Figure (DF)* dari WHO, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *House Index (HI)*

Menunjukkan tingkat kepadatan sedang yang diperoleh dari jumlah rumah yang positif larva dibagi jumlah rumah yang diperiksa dikalikan dengan 100 %.

Tabel 4.1
Tingkat Kepadatan Larva *Aedes sp.* Berdasarkan *House Index (HI)*
Di Kecamatan Tamalate

Positif/Negatif Larva	Jumlah Rumah	HI %	Kriteria
Positif	28	28%	Kepadatan Sedang
Negatif	72		

Sumber : Data Primer 2021

Tabel 4.1 menunjukkan hasil dari 100 rumah yang diperiksa di Kecamatan Tamalate, terdapat sebanyak 28 rumah yang positif ditemukan larva, sehingga memperoleh nilai *House Index (HI)* 28 %, dan masuk dalam kategori tingkat kepadatan sedang.

2. *Container Index (CI)*

Menunjukkan tingkat kepadatan sedang yang diperoleh dari jumlah kontainer positif larva dibagi jumlah kontainer yang diperiksa dikalikan dengan 100 %.

Tabel 4.2
Tingkat Kepadatan Larva *Aedes sp.* Berdasarkan *Container Index (CI)*
Di Kecamatan Tamalate

Positif/Negatif Larva	Jumlah Kontainer	CI %	Kriteria
Positif	44	8.3%	Kepadatan Sedang
Negatif	480		

Sumber : Data Primer 2021

Tabel 4.2 menunjukkan hasil dari 524 kontainer yang diperiksa di Kecamatan Tamalate terdapat 44 kontainer positif ditemukan larva, sehingga memperoleh nilai *Container Index (CI)* 8.3%, masuk dalam kategori tingkat kepadatan sedang.

3. *Breteau Index (BI)*

Menunjukkan tingkat kepadatan sedang diperoleh dari jumlah kontainer positif larva dibagi jumlah rumah yang diperiksa kemudian dikalikan dengan 100%.

Tabel 4.3
Tingkat Kepadatan Larva *Aedes sp.* Berdasarkan *Breteau Index (BI)*
Di Kecamatan Tamalate

Jumlah Kontainer Positif Larva	Jumlah Rumah yang Diperiksa	BI %	Kriteria
44	100	44%	Kepadatan Sedang

Sumber : Data Primer 2021

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat 44 kontainer kontainer positif larva dari 100 rumah yang diperiksa di Kecamatan Tamalate, sehingga memperoleh nilai *Breteau Index (BI)* 44% dan masuk dalam kategori tingkat kepadatan sedang.

4. *Density Figure (DF)*

Setelah diketahui nilai *House Index (HI)*, *Container Index (CI)*, dan *Breteau Index (BI)* kemudian dimasukkan ke dalam tabel *Density Figure (DF)* dari WHO untuk menentukan kategori tingkat kepadatannya.

Tabel 4.4
Tingkat Kepadatan Larva *Aedes sp.* Berdasarkan *Density Figure (DF)*
Di Kecamatan Tamalate

Larva Index	Hasil Perhitungan HI, CI, dan BI (%)	Hasil Perhitungan Density Figure	Kategori Hasil Perhitungan Density Figure
House Index	28	4	Kepadatan Sedang
Container Index	8.3	3	Kepadatan Sedang
Breteau Index	44	5	Kepadatan Sedang

Sumber : Data Primer 2021

Tabel 4.3 menunjukkan hasil nilai *House Index (HI)* 28 sehingga mendapatkan hasil *Density Figure (DF)* 4 masuk dalam kategori *Density Figure (DF)* tingkat kepadatan sedang, hasil nilai *Container Index (CI)* 8.3 sehingga mendapatkan hasil *Density Figure (DF)* 3 masuk dalam kategori *Density Figure (DF)* tingkat kepadatan sedang, dan hasil nilai *Breteau Index (BI)* 44 sehingga mendapatkan hasil *Density Figure (DF)* 5 masuk dalam kategori *Density Figure (DF)* tingkat kepadatan sedang.

C. Pembahasan

Survei jentik merupakan kegiatan pemeriksaan kontainer atau tempat penampungan air untuk mengetahui tempat perindukan potensial dan jenis jentik, mengukur index dan mencari cara pemberantasan yang sesuai. Ada dua metode pelaksanaan survei jentik, yakni dengan metode single larva dan metode visual. (Malonda, 2020).

Metode single larva adalah metode yang dilakukan dengan memeriksa keberadaan jentik dan mengambil satu jentik di setiap tempat penampungan atau genangan air yang ditemukan jentik untuk diidentifikasi lebih lanjut, sedangkan metode visual cukup dilakukan dengan melihat ada tidaknya jentik di setiap tempat penampungan atau genangan air tanpa mengambil jentiknya.

Kepadatan populasi nyamuk dipengaruhi oleh keberadaan habitat akuatiknya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain masyarakat cenderung menyimpan air di beberapa jenis kontainer atau tempat penampungan air, dan juga masih rendahnya pengetahuan tentang perkembang biakan vektor nyamuk DBD. (Malonda, 2020)

Keberadaan tempat penampungan air atau kontainer sangat berperan dalam menentukan tingkat kepadatan vektor nyamuk *Aedes sp.* Kepadatan larva nyamuk dapat diukur dengan tiga indikator yaitu *House Index (HI)*, *Container Index (CI)*, dan *Breteau Index (BI)*. (Khotafiatun, 2021)

1. Tingkat Kepadatan Larva *Aedes sp.* Berdasarkan *House Index (HI)*

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Tamalate menunjukkan bahwa dari 100 rumah yang diperiksa, rumah yang positif larva *Aedes sp.* sebanyak 28 rumah dan rumah yang tidak ditemukan larva *Aedes sp.* sebanyak 72 rumah sehingga diperoleh nilai *House Index (HI)* yakni 28 %, nilai ini termasuk dalam kategori *Density Figure (DF)* 4 dengan kriteria tingkat kepadatan sedang, maka mempunyai risiko transmisi nyamuk yang cukup untuk menjadi wabah penyakit DBD. Lokasi temuan larva tersebar di beberapa kelurahan diantaranya Kelurahan Mangasa, Mannuruki, Maccini Sombala, dan Parang Tambung yang berada di wilayah kerja puskesmas Mangasa, puskesmas Maccini Sombala dan puskesmas Tamalate.

Keberadaan nyamuk *Aedes sp.* sebagai vektor penular mempengaruhi peningkatan kasus DBD, yang menjadi salah satu faktor resiko adalah kepadatan penduduk dan jarak antar rumah mempengaruhi penyebaran nyamuk *Aedes sp.* dari satu rumah ke rumah lain. Semakin dekat jarak antar rumah warga maka semakin mudah nyamuk untuk menyebar dari rumah ke rumah karena jarak terbang nyamuk *Aedes sp.* berkisar 50-100 meter (Kurnia, 2021), temuan ini sejalan dengan lokasi temuan larva di rumah yang berada di Kelurahan Mangasa,

Mannuruki, Maccini Sombala, dan Parang Tambung yang merupakan wilayah hunian padat penduduk.

Hasil penelitian yang serupa (Handayani, 2020), Angka HI dan CI di RT 03 dan 04 Kelurahan Pancur Pungah sebesar 35% dan 14,1% mengindikasikan bahwa populasi rumah dan kontainer yang ditemukan nyamuk vektor demam berdarah cukup tinggi. Angka BI pada wilayah ini sebesar 55% memberikan informasi penyebaran TPA yang potensial sebagai tempat perindukan nyamuk vektor dengue.

Dari delapan puskesmas di Surabaya yang menjadi lokasi survei, didapatkan sejumlah 378 rumah yang bersedia mengikuti survei tersebut. Survei jentik meliputi seluruh tempat yang dicurigai sebagai wadah perindukan baik didalam maupun diluar rumah, gambaran HI dan CI yang bervariasi pada 8 puskesmas yang disurvei. Nilai HI dan CI cenderung memiliki pola yang sama, apabila HI tinggi maka nilai CI juga tinggi. Nilai CI yang tertinggi terdapat di Puskesmas Krembangan Selatan (24,3%). Sedangkan yang terendah terdapat di Puskesmas Pegirian (13,84%) penelitian dari (Rosyanti, 2020).

Perbedaan tingkat kepadatan larva di berbagai wilayah dipengaruhi oleh tingkat endemisitas, sanitasi lingkungan dan kebiasaan penduduk setempat, suatu wilayah disebut berisiko tinggi untuk penularan DBD apabila ditemukan HI $\geq 10\%$, CI $\geq 5\%$, dan ABJ $\leq 95\%$. (Sunarya, 2019)

Berbicara tentang sanitasi lingkungan atau biasa disebut dengan kebersihan lingkungan yaitu sangat erat kaitannya dengan islam, dimana islam adalah agama yang selalu mengajarkan umat yang menganutnya untuk selalu

menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan lingkungan sekitar perumahan dan pemukiman maupun kebersihan personal atau individual. DBD yang kerap sekali disebut dengan penyakit mematikan karena penyebaran dan penularannya terbilang sangat cepat dan dapat menjadi wabah.

Salah satu penyebab dari penyakit DBD adalah sanitasi lingkungan yang buruk yang dapat menimbulkan tempat-tempat perindukan nyamuk, oleh sebab itu islam selalu mengajarkan tentang kebersihan karena kebersihan merupakan salah satu upaya untuk mencegah timbulnya suatu penyakit. Selain itu orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan lingkungan adalah termasuk orang-orang yang beriman dan sesungguhnya Allah Swt menyukai kebersihan.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ مُّحِبُّ الطَّيِّبِ نَظِيفٌ مُّحِبُّ النَّظَافَةِ كَرِيمٌ مُّحِبُّ الْكَرَمِ
جَوَادٌ مُّحِبُّ الْجُودِ فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ (رواه الترمذي)

M A K A S S A R

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan, Bersih (suci) dan mencintai kebersihan, Mulia dan mencintai kemuliaan, Bagus dan mencintai kebagusan, bersihkanlah rumahmu....” (H.R. Tirmizi dari Saad).

Hadist lain mengatakan:

الإِسْلَامُ نَظِيفٌ فَتَنْظِفُوا فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا النَّظِيفُ
(رواه الطبرانی)

Terjemahnya:

“Agama islam itu agama yang bersih, maka hendaklan kamu menjaga kebersihan, sesungguhnya tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang bersih” (H.R. Baihaqi).

Allah SWT adalah dzat yang bersih, mulia, baik, dan bagus. Umat islam harus mempunyai sifat yang bersih terutama dalam hal kebersihan lingkungan tempat tinggal. Agama islam adalah agama yang lurus dan bersih dari ajaran kesesatan. Untuk itu, seorang muslim harus memiliki perilaku yang bersih dan hati yang suci, orang muslim yang demikian dijanjikan oleh Allah SWT akan masuk ke dalam surga-Nya.

2. Tingkat Kepadatan Larva *Aedes sp.* Berdasarkan *Container Index (CI)*

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Tamalate menunjukkan bahwa dari 524 TPA (tempat penampungan air) yang diperiksa terdapat 44 kontainer yang positif larva dan 480 TPA yang tidak ditemukan larva, sehingga diperoleh nilai *Container Index (CI)* 8.3%, nilai ini termasuk dalam kategori *Density Figure (DF)* 3 dengan kriteria tingkat kepadatan sedang. Jumlah TPA yang positif larva sebanyak 29 TPA yang berada dalam rumah dan 15 TPA berada di luar rumah. Adapun jenis TPA yang diperiksa adalah TPA untuk keperluan sehari-hari, bukan

TPA, dan habitat alami. TPA maupun NON TPA positif ditemukan larva yang berada dalam rumah terdiri dari 3 bak mandi, 21 ember, 3 dispenser, dan 2 kulkas, sedangkan yang ditemukan di luar rumah terdiri dari 6 ember, 1 tandon, 1 botol bekas, 5 saluran air, dan 2 pada pelepah pohon. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai *Container Index* selain pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan metode 3M Plus yakni, kemampuan daya jelajah nyamuk *Aedes sp.* yang luas dan tidak terbatas pada rumah area ditemukannya larva, akan tetapi kegiatan 3M Plus tetap menjadi rekomendasi dalam upaya pengendalian DBD untuk meminimalisir penularan dan sebaiknya dilakukan oleh setiap masyarakat. (Lestari, 2020)

Nyamuk *Aedes aegypti* dapat ditemukan pada genangan-genangan air bersih dan tidak mengalir, terbuka serta terlindung dari cahaya matahari. Sedangkan Nyamuk *Aedes albopictus* lebih menyukai tempat-tempat perindukan di luar rumah, di kebun, dan di halaman rumah seperti ketiak daun, pelepah tanaman, lubang pohon, tunggul bambu dan mempunyai tempat istirahat di luar rumah. (Nadifah, 2016)

Penelitian lain dari (Dheandri, 2021) menunjukkan indikator entomologi yaitu HI di Kecamatan Mijen sebesar 54%, CI sebesar 26,47%, BI sebesar 63 dan ABJ sebesar 46%. Pada penelitian ini spesies *Aedes Aegypti* banyak ditemukan karena berkaitan dengan banyaknya jumlah kontainer yang berada di dalam bangunan TTU. *Aedes aegypti* dewasa hidup dan mencari mangsa di dalam lingkungan bangunan. Tempat yang lembab dan kurang terkena sinar matahari seperti kontainer pada kamar mandi, tempayan, drum dan lain-lain yang

jarang di bersihkan sangat disukai *Aedes Aegypti*. Sedangkan nyamuk *Ae. albopictus* lebih banyak beristirahat dan menunggu proses pematangan telur di luar bangunan seperti ban bekas, pepohonan yang teduh, botol bekas, kaleng bekas dan lain lain. Setelah istirahat dan pematangan telur selesai, nyamuk betina akan mencari kontainer yang terisi air untuk meletakkan telurnya. Spesies larva *Aedes Albopictus* yang ditemukan di 24 kontainer TTU karena sifatnya yang sangat mudah beradaptasi dan mempunyai bionomic yang fleksibel. Vektor ini merupakan vektor invasif artinya spesies yang faktanya bukan asli dari suatu daerah tertentu. Namun vektor ini, dapat menularkan virus dengue meskipun tidak ada atau populasi vektor primer (*Aedes Aegypti*) yang sedikit.

Penelitian dari (Khotafiatun, 2021) dari hasil pemeriksaan pada 851 tempat penampungan air, ditemukan 117 tempat penampungan air yang positif jentik, sehingga diperoleh CI sebesar 13,7%. Tempat penampungan air yang terbanyak ditemukan jentik yaitu bak mandi. Hasil ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Adriyani pada tahun 2018 di Surabaya. Ukuran wadah yang besar dan jarang dibersihkan merupakan tempat yang potensial untuk perkembangan nyamuk *Aedes aegypti*. Sebagian besar bahan penampungan air yang digunakan masyarakat terbuat dari plastik. Dari 117 penampungan positif jentik sebanyak 70 terbuat dari plastik.

Penelitian dari (Novrianti, 2020) dari 66 rumah yang diperiksa terdapat 381 TPA. Rumah yang positif terdapat jentik *Aedes* sp sebanyak 36 rumah (54,5%), dan TPA positif jentik *Aedes* sp. sebanyak 57 buah (14,9%). Hasil

penelitian mendapatkan bahwa jentik *Aedes sp.* lebih banyak ditemukan di drum (21,3%), dan TPA dari bahan plastik (16,0%). Sebanyak 18,0% TPA yang tidak memiliki tutup ditemukan jentik *Aedes sp.* Jentik lebih banyak ditemukan di TPA luar rumah (19,1%), pada penampungan air hujan (26,0%).

Menurut Kemenkes 2016 pencegahan DBD yang paling efektif yaitu kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M PLUS, Adapun yang dimaksud dengan 3M PLUS yaitu menguras, adalah membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es, dan lain-lain; menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan sebagainya; dan memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk penular DBD. Adapun yang dimaksud dengan Plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan, seperti: menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan; menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk; menggunakan kelambu saat tidur; memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk; menanam tanaman pengusir nyamuk; mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah; menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk, dan lain-lain. Meski 3M plus tidak berhubungan langsung dengan kejadian DBD, namun perilaku 3M plus berhubungan dengan keberadaan jentik nyamuk *Aedes sp* yang merupakan vektor penyakit DBD. Pengukuran kegiatan 3M plus secara individu cenderung tidak dapat dihubungkan dengan kejadian DBD, karena beberapa faktor lain

seperti kemampuan daya jelajah nyamuk *Aedes sp* yang luas dan tidak terbatas pada satu rumah area jentik berada. Oleh sebab itu, kegiatan 3M plus sebaiknya dilakukan oleh setiap masyarakat dalam suatu wilayah untuk menurunkan populasi jentik/nyamuk *Aedes sp*, sehingga dengan populasi yang rendah hal ini diharapkan mampu menurunkan kejadian DBD di wilayah tersebut. (Kemenkes, 2016)

3. Tingkat Kepadatan Larva *Aedes sp*. Berdasarkan *Breteau Index (BI)*

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Tamalate menunjukkan bahwa dari 524 kontainer yang diperiksa terdapat 44 kontainer yang positif larva, rumah yang positif larva *Aedes sp*. sebanyak 28 rumah dari jumlah 100 rumah yang diperiksa sehingga diperoleh nilai *Breteau Index (BI)* 44% . Nilai ini termasuk dalam kategori *Density Figure (DF)* 5 dengan kriteria tingkat kepadatan sedang. BI merupakan indeks jentik yang paling informatif karena memuat hubungan antara rumah dengan penampungan yang positif jentik, semakin banyak jumlah tempat penampungan air yang dimiliki maka semakin besar pula kemungkinan tempat perkembang biakan nyamuk. (Khotafiatun, 2021)

4. Tingkat Kepadatan Larva *Aedes sp*. Berdasarkan *Density Figure (DF)*

Tingkat Kepadatan Larva *Aedes sp*. Berdasarkan *Density Figure (DF)* di Kecamatan Tamalate menunjukkan bahwa nilai *House Index (HI)* yaitu 28% sehingga nilai ini termasuk dalam kategori *Density Figure (DF)* 4 dengan kriteria tingkat kepadatan sedang, nilai *Container Index (CI)* 8.3%, nilai ini termasuk dalam kategori *Density Figure (DF)* 3 dengan kriteria tingkat kepadatan sedang,

dan nilai *Breteau Index (BI)* 44% termasuk dalam kategori *Density Figure (DF)* 5 dengan kriteria tingkat kepadatan sedang.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memiliki beberapa keterbatasan yaitu :

1. Peneliti tidak mengidentifikasi lebih lanjut jenis/spesies larva nyamuk yang ditemukan, peneliti hanya melihat positif/tidaknya larva pada tempat penampungan air yang menjadi habitat larva nyamuk *Aedes sp.*
2. Tidak semua masyarakat mengizinkan untuk dilakukan pemeriksaan larva/jentik di rumahnya, ada beberapa yang hanya bisa memberikan informasi.
3. Penelitian ini tidak mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepadatan larva nyamuk *Aedes sp.* dan hubungannya terhadap pertambahan jumlah kasus DBD di wilayah endemis DBD.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Survei Tingkat Kepadatan Larva *Aedes sp.* di Kecamatan Tamalate Kota Makassar” diperoleh hasil :

1. *House Index (HI)* di Kecamatan Tamalate 28%.
2. *Container Index (CI)* di Kecamatan Tamalate 8.3%.
3. *Breteau Index (BI)* di Kecamatan Tamalate 44%.
4. *Density Figure (DF)* di Kecamatan Tamalate memperoleh hasil *House Index (HI)* 4 dengan kategori kepadatan sedang, *Container Index (CI)* 3 dengan kategori kepadatan sedang, dan *Breteau Index (BI)* 5 dengan kategori kepadatan sedang.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Setempat

Disarankan kepada dinas terkait/petugas teknis di lapangan dalam hal ini Jumantik (juru pemantau jentik) agar melakukan monitoring secara berkala terhadap tempat penampungan air di masyarakat sehingga populasi nyamuk vektor DBD dapat ditekan dan proses penularan penyakit dapat ditanggulangi.

2. Bagi Masyarakat Setempat

Diharapkan agar melaksanakan kegiatan PSN secara terus-menerus dengan metode 3M, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi dan ember, menutup tempat penampungan air, dan membuang atau mengubur barang bekas

yang tidak digunakan lagi yang dapat menampung air, serta tidak membiasakan menggantung pakaian.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepadatan larva nyamuk *Aedes sp.* dan hubungannya terhadap peningkatan jumlah kasus DBD di wilayah endemis DBD.




DAFTAR PUSTAKA


- Ade Putri, R. (2016). Surveilans Vektor dan Kasus Demam Berdarah Dengue. *UNIMUS*, 27
- Denai Wahyuni, M. N. (2021). *Buku Ajar Entomologi dan Pengendalian Vektor*. Yogyakarta: Deepublish.
- Deri Kermelita, S. M. (2020). *Pemberantasan Sarang Nyamuk*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Dheandri, A. A. (2021). Kepadatan dan Tempat Potensial Perindukan Larva Aedes sp. di Tempat-tempat Umum di Kecamatan Mijen Kota Semarang. *Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat*, 1-5.
- Dinas Kesehatan, K. M. (2018). *Jumlah Kasus DBD*. Makassar: Dinas Kesehatan.
- Dinas Kesehatan, K. M. (2021). *Jumlah Kasus DBD*. Makassar: Dinas Kesehatan.
- Dinata, A. (2018). *Bersahabat dengan Nyamuk : Jurus Jitu Atasi Penyakit Bersumber Nyamuk*. Pangandaran: Arda Publishing.
- Frida. (2019). *Mengenal Demam Berdarah Dengue*. Semarang: Alprin.
- Handayani, D. (2020). Kepadatan dan Status Kerentanan Larva Aedes Aegypti di Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muara Dua Kabupaten Okus Tahun 2019. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan: Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Volume 7, No. 2, 2020*, 98-104.
- Kemenkes, R. (2016). *Petunjuk Teknis Implementasi PSN 3M Plus dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Agama, R. (2013). *Al-Quranul Karim Tafsir Per Kata (Pertama)*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Kesehatan, R. (2017). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan, R. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan, R. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan, R. (2016). *Situasi DBD di Indonesia*. Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan.
- Khotafiatun. (2021). Survei Kepadatan Jentik Nyamuk Aedes Aegypti Pada Penampungan Air Dalam Rumah Dan Implikasinya Terhadap Keperawatan Komunitas. *Jurnal Keperawatan Komprehensif Vol. 7 No.1, Januari 2021* , 74-79.
- Kurnia, R. (2021). Indeks Entomologi Vektor Nyamuk Aedes sp. di Daerah Endemis Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Kesehatan Terpadu* , 1-7.
- Lestari, B. (2020). Upaya 3M Plus terhadap Kepadatan Jentik Aedes sp. dan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* , 1-22.
- Linawati Alim, F. H. (2017). Tingkat Kepadatan Jentik Nyamuk Aedes aegypti pada Tempat Penampungan Air Controllable sites dan Disposable sites di Sekolah Dasar Kecamatan Banjarbaru Utara. *Berkala Kedokteran* , 8.
- M. Quraish Shihab dalam Feni Lusiana. (2018). Analisis Spasial Pengendalian dan Iklim terhadap Pola Kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Kaluku Bodoa dan Kapasa dan Kota Makassar Tahun 2013-2017. 2.
- Malonda, M. (2020). Gambaran Indeks Entomologi Vektor Demam Berdarah Dengue Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat. *Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Saintek (SNPBS) ke-V 2020* , 135-140.
- Menteri Kesehatan, R. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan RI : Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya*. Jakarta: Menteri Kesehatan.
- Moh. Guntur Nangi, F. Y. (2019). *Dasar Epidemiologi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nadifah. (2016). Identifikasi Larva Nyamuk Pada Tempat Penampungan Air di Padukuhan . *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas Volume 10 No 2* , 235.

- Novrianti, T. (2020). Studi Keberadaan Jentik Nyamuk *Aedes* sp. Berdasarkan Karakteristik Tempat Penampungan Air di Kelurahan Tungkal III, Kuala Tungkal, Jambi. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Ruwa Jurai* , 35.
- Nurdiansa Sahrir, H. I. (2016). Pemetaan Karakteristik Lingkungan dan Densitas Nyamuk *Aedes aegypti* Berdasarkan Status Endemisitas DBD di Kecamatan Kolaka. *JST Kesehatan* , 70-71.
- Profil Kesehatan Prov. Sul-Sel. (2016). *Jumlah Kasus DBD*. Makassar: Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Rahmawati, A. P. (2016). Surveilans Vektor dan Kasus Demam Berdarah Dengue. *Jurnal Unismus* , 24.
- Rosyanti, L. (2020). Profil Indeks Larva pada Delapan Wilayah Puskesmas di Surabaya. *Hang Tuah Medical Journal Volume 17 Nomor 2* , 1-9.
- Salmiyatun, P. W. (2014). *Pencegahan dan Pengendalian Dengue dan Demam Berdarah Dengue: Panduan Lengkap WHO*. Jakarta: EGC.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sumantri, A. (2017). *Kesehatan Lingkungan*. Depok: Kencana.
- Sunarya, A. (2019). Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Sentosa Baru Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. *Jurnal UIN Sumatra Utara* , 66.
- Syamsir, S. &. (2020). Autocorrelation of Spatial Based Dengue Hemorrhagic Fever Case in Air Putih Area. *Jurnal Kesehatan Lingkungan* , 78-86.
- Upik Kesumawati Hadi, D. J. (2021). *Panduan Identifikasi Ektoparasit: Bidang Medis & Veteriner*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Wahyuni, D. (2021). *Buku Ajar Dasar Biomedik Lanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.




**ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018**



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2019

ALAUDDIN
MAKASSAR


**CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018**



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2019


ALAUDDIN
MAKASSAR

**ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020


**CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**




Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

M A K A S S A R


**KASUS DBD PER BULAN KOTA MAKASSAR
TAHUN 2013- 2020**




JUMLAH KASUS DBD PER KECAMATAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2015-2017



**JUMLAH KASUS DBD PER KECAMATAN KOTA MAKASSAR
TAHUN 2018-2020**




KASUS DBD PER PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2015-2017




	M A N G A S A	M A C I N I S O M B A L A	T A M A L A T E	J O R O M A D A N G	B A R R A - B A Y A	M A C I N I S A W A H	D A H L I A	P E R T I W I	P A N A M B U N G A N	C E N D R A W A S I H	M A J A N G	M A K A S A	K A R A B O L I N G	P P O K A L I N G	J U M P A N G B A R U	T A M A N G A P A	B A N G K A L A	A N T A N G P R U M N A S	A N T A N G P R U M N A S	B A T U A	T O D O P U L I	K A R U W I S I	T A M A N G A U N G	P A M P A D A N G	A N D A L A S	T A R A K A N	L A Y A N G	M A L I M O N G A N B A R U	B A R R A N G L O M P O	K O D I N G A R E N G	P A T T I N G A L L O A N G	T A B A R I N G A N	A N T A R A	T A M A L A N R E A J A Y A	T A M A L A N R E A	T A M A L A B I R A	K A P A S A	S U D I A N G	B U L U R O K E N G	S U D I A N G R A Y A	P A C C E R S I - K A S S I	B A L L A P A N G	M I N A S A U P A			
■ KASUS 2015	2	2	2	2	6	3	3	1	3	0	3	4	2	6	3	8	2	1	3	3	2	0	4	3	5	4	3	2	0	0	0	1	1	3	1	6	3	1	9	3	2	12	14	1	2	
■ KASUS 2016	10	5	11	0	1	4	0	3	6	4	7	7	3	4	8	3	10	4	6	13	12	6	2	5	11	7	2	3	4	3	0	0	2	3	1	3	11	0	1	15	3	8	11	19	1	6
■ KASUS 2017	5	5	4	5	1	0	0	6	3	2	4	2	10	8	8	2	7	0	5	6	3	4	1	1	2	6	0	1	3	1	0	0	2	3	0	0	1	3	1	5	1	4	2	6	1	1

**KASUS DBD PER PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
TAHUN 2018-2020**



DATA KASUS DBD PUSKESMAS DI KECAMATAN TAMALATE TAHUN 2017

NO	PUSKESMAS	JUMLAH		
		KEL	PKM	KEC
1.	PKM MANGASA		5	
	MANGASA	3		
	MANNURUKI	2		
2.	PKM MACCINI SOMBALA		5	
	MACCINI SOMBALA	3		
	TANJUNG MERDEKA	2		
3.	PKM TAMALATE		4	
	BALANG BARU	3		
	PARANG TAMBUNG	1		
4.	PKM JONGAYA		5	
	JONGAYA	0		
	BONGAYA	1		
	PABAENG-BAENG	4		
5.	PKM BAROMBONG			
	BAROMBONG	1		
				20





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
RISET KHUSUS VEKTOR DAN RESERVOIR



RAHASIA

FORM J-05
(REKAP ENTOMOLOGI DBD)

I. PENGENALAN TEMPAT					STIKER KODE TIPE EKOSISTEM			
Provinsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kab/kota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TIPE EKOSISTEM	<input type="checkbox"/>	TEMPEL STIKER KODE TIPE EKOSISTEM DISINI

II. REKAPITULASI ENTOMOLOGI DBD (Dilisi dengan merjumlahkan total hasil rekapitulasi pada form J-04)		
1.	Jumlah rumah diperiksa	
2.	Jumlah rumah positif	
3.	Jumlah TPA	
4.	Jumlah TPA positif	
5.	Jumlah genus	

Catatan : Warna putih untuk dikirim ke B2P2V&P
Warna merah untuk kebagian tim
Warna biru untuk dikirim ke B2P2V&P

MASTER TABEL HASIL SURVEY LARVA

No.	Nama (Inisial)	Jumlah TPA	Letak TPA		Rumah Positif/Negatif Jentik
			Dalam	Luar	
1	NH	4	3	1	2
2	ND	3	2	1	1
3	YD	5	3	2	1
4	SN	7	5	2	1
5	AK	6	5	1	2
6	SM	7	6	1	1
7	ZA	9	6	3	1
8	NS	15	12	3	1
9	MR	6	6	0	2
10	AJ	7	5	2	1
11	AR	5	4	1	2
12	MA	10	9	1	1
13	MN	6	6	0	2
14	AZ	5	3	2	2
15	LI	7	6	1	1
16	HZ	10	8	2	1
17	SF	5	5	0	2
18	HH	5	4	1	2
19	YN	7	5	2	1
20	F	3	3	0	2
21	AY	5	4	1	2
22	JH	8	6	2	1
23	J	3	3	0	2
24	AI	5	5	0	2
25	TM	6	5	1	2
26	IN	4	4	0	2
27	AA	6	4	2	2
28	U	5	3	2	2
29	ZK	7	5	2	1
30	V	5	5	0	2
31	FU	6	5	1	1
32	SF	4	4	0	2
33	KK	3	3	0	2

34	H	5	4	1	2
35	AM	2	2	0	2
36	N	4	4	0	1
37	MS	5	3	2	2
38	BM	4	4	0	2
39	SU	3	3	0	2
40	MK	2	2	0	2
41	AI	5	5	0	2
42	SF	7	6	1	1
43	AS	4	3	1	2
44	JH	8	6	2	1
45	SE	4	4	0	2
46	AR	4	4	0	2
47	KI	6	5	1	2
48	YI	5	5	0	2
49	IM	4	3	1	2
50	SI	4	4	0	2
51	MR	3	3	0	2
52	SN	5	4	1	2
53	IL	6	4	2	1
54	MW	5	4	1	2
55	D	7	5	2	1
56	AD	6	4	2	1
57	FE	4	4	0	2
58	JJ	5	4	1	2
59	NI	5	5	0	2
60	UP	4	4	0	2
61	FN	3	3	0	2
62	IN	4	4	0	2
63	KP	5	4	1	2
64	DH	3	3	0	2
65	IR	6	6	0	1
66	AF	4	4	0	2
67	MH	3	3	0	2
68	FA	4	3	1	2
69	I	5	4	1	2
70	DN	3	3	0	2
71	TM	2	1	1	2

72	WA	8	8	0	1
73	SA	3	2	1	2
74	Z	8	7	1	2
75	NP	7	7	0	2
76	VI	4	4	0	2
77	MH	5	5	0	2
78	CI	4	3	1	2
79	S	6	5	1	2
80	GH	6	3	3	2
81	IT	7	7	0	1
82	UM	4	3	1	2
83	NI	3	3	0	2
84	KH	5	4	1	2
85	NA	10	8	2	1
86	B	3	3	0	2
87	L	4	3	1	2
88	JF	2	2	0	2
89	RS	5	4	1	2
90	MY	8	5	3	1
91	HT	4	4	0	2
92	R	6	4	2	2
93	NW	7	5	2	2
94	QQ	6	4	2	1
95	E	4	4	0	2
96	HR	9	6	3	1
97	JT	4	4	0	2
98	IS	5	4	1	2
99	CW	6	4	2	1
100	LS	4	4	0	2
Total		524	437	87	

1 = Positif

2 = Negatif

Positif = 28 Rumah

Negatif = 72 Rumah

**REKAPITULASI HASIL SURVAI JENIS TPA / KONTAINER HABITAT/BREEDING SITE
VEKTOR DBD**

No	Jenis Kontainer	Jumlah	Jumlah Positif Jentik	Spesies
A	TPA :			
1	Bak mandi	12	3	1
2	Bak WC	0	0	
3	Drum	2	0	
4	Tempayan	0	0	
5	Ember	219	27	1
20	Lain2 (sebutkan)....?	0	0	
	a.Tandon	78	1	1
	b.Jergen	34	0	
	c.Baskom	21	0	
B	Non TPA :			
6	Kaleng bekas	0	0	
7	Ban bekas	0	0	
8	Gelas/botol bekas	6	1	1
9	Vas/pot bungan	0	0	
10	Kolam/akuariaum	0	0	
C	NON TPA LAIN :			
11	Talang air	0	0	
12	Tempat minum burung	0	0	
13	Saluran air lain	9	5	2

14	Dispenser	71	3	1
15	Kulkas	63	2	1
20	Lain2 (sebutkan)....?	0	0	
D	HABITAT ALAMI			
16	Potongan bambu	0	0	
17	Tempurung kelapa	0	0	
18	Pelepah daun	9	2	1
19	Lubang pohon	0	0	
20	Lain2 (sebutkan)....?	0	0	
	Total	524	44	

Jlh rumah yang diperiksa = 100

Jlh container yang diperiksa = 524

Hasil :

HI = 28 %

CI = 8.3 %

BI = 44 %

Jlh rmh positif jentik = 28

Jlh container positif jentik = 44

1 = Aedes sp

2 = Non Aedes


3 = Aedes sp dan Non Aedes


DOKUMENTASI PENELITIAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI







ALAUDDIN
MAKASSAR





MAKASSAR







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 3083 / Un.06/FKIK/PP.00.9/08/ 2021 Gowa, 23 Agustus 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nurrahmi Paizah
N I M : 70200114052
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat
Semester : XV (Lima Belas)
Alamat : BTN Taman Zarindah

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

“Survei Tingkat Kepatuhan Larva Aedes sp. Berkaitan Dengan Kejadian DBD di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.”

Dengan Dosen Pembimbing : 1. DR. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes.
2. Surahmawati, SKM., M.Adm.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Kecamatan Tamalate terhitung mulai tanggal 25 Agustus s/d 27 September 2021.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan,



Syafirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar



120211930010758



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **20224/S.01/PTSP/2021**

Kepada Yth.

Lampiran :

Walikota Makassar

Perihal : **Izin Penelitian**

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3083/FKIK/PP.00.9/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NURRAHMI PAIZAH**

Nomor Pokok : 70200114052

Program Studi : Kesehatan Masyarakat

Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)

Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" SURVEI TINGKAT KEPADATAN LARVA Aedes sp. BERKAITAN
DENGAN KEJADIAN DBD DI KECAMATAN TAMALATE KOTA
MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 Agustus s/d 27 September 2021**

PTSP

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di
Makassar
Pada tanggal : 26
Agustus 2021

**A.n. GUBERNUR SULAWESI
SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Selaku Administrator Pelayanan
Perizinan Terpadu



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website :
<http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id Makassar
90231



SIMAP PTSP 26-08-2021

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

B.129/KEPK/FKIK/VIII/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :

The research protocol proposed by

Peneliti utama : Nurrahmi Paizah
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Survei Tingkat Kepadatan Larva Aedes sp. Berkaitan dengan Kejadian DBD di
Kecamatan Tamalate Kota Makassar"**

*"SURVEY OF THE DENSITY LEVEL OF Aedes sp. LARVAE RELATED TO THE INCIDENCE OF
DENGUE IN THE TAMALATE SUB-DISTRICT MAKASSAR CITY"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022.

This declaration of ethics applies during the period August 20th, 2021 until August 20th, 2022.



August 20th, 2021
Professor and Chairperson,

Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN TAMALATE
KELURAHAN MACCINISOMBALA
Jalan Danau Tanjung Bunga No. 1 Makassar
Kode Pos. 90224

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 050/KMS/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR ADNAN, A.Md
NIP : 19810830 201001 1 016
Jabatan : Plt. Sekretaris Lurah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **NURRAHMI PAIZAH**
NIM : 7022114052

Program Studi : Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Makassar

Telah selesai melakukan Penelitian di Wilayah Kelurahan Maccini Sombala untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**SURVEI TINGKAT KEPADATAN LARVA AEDES SP. BERKAITAN DENGAN KEJADIAN DEMAM BERDARAH DI KELURAHAN MACCINI SOMBALA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR**" sesuai dengan nomor surat izin penelitian : 070/034/KMS/IX/2021

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 1 November 2021
Mengetahui,

An. LURAH MACCINI SOMBALA
Sekretaris Lurah


NUR ADNAN, A.Md
Rangkat : Penata Muda Tk.1
NIP : 19810830 201001 1 016

RIWAYAT HIDUP PENELITI

NURRAHMI PAIZAH, lahir pada tanggal 30 Juli 1996 di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Muhammad Rosdah dan Nurhayati. Mulai menempuh pendidikan pada tahun 2002 di SD Negeri 110 Jekka dan tamat pada tahun



2008, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Sinjai Selatan dan tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan kembali pendidikan di SMA Negeri 1 Sinjai Selatan dan tamat pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 berhasil lulus masuk PTN melalui jalur SBMPTN di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Kesehatan Masyarakat, dan pada tahun 2016 memilih konsentrasi Kesehatan Lingkungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R