

**HUBUNGAN PAPARAN ASAP ROKOK TERHADAP KEJADIAN  
HIPERTENSI PADA WANITA DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS WOTU KECAMATAN WOTU  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**SOFIA PARWAENI**

**NIM: 70200117047**

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofia Parwaeni

NIM : 70200117047

Tempat / Tgl Lahir : Lakawali / 08 Juli 2000

Jurusan / Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat / Epidemiologi

Fakultas / Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan / Strata 1 (S1)

Alamat : Villa Samata Sejahtera Blok A/13

Judul Penelitian : Hubungan Paparan Asap Rokok Terhadap Kejadian  
Hipertensi Pada Wanita di Wilayah Kerja Puskesmas Wotu  
Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Gowa, 9 November 2021

Penyusun



Sofia Parwaeni

---

NIM : 70200117047

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Hubungan Paparan Asap Rokok Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Wanita di Wilayah Kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021, NIM: 70200117047, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 9 November 2021 bertepatan dengan 4 Rabi'ul Akhir 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 9 November 2021 M  
4 Rabi'ul Akhir 1443 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Emmi Bujawati, SKM, M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Nildawati Amir, SKM., M.Epid	(.....)
Penguji I	: Rimawati Aulia Insani Sadarang, SKM., M.P.H.	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

  
Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas kuasa-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Tak lupa pula shalawat serta salam tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa peradaban umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Orang Tua, Ayahanda dan Ibunda serta saudara-saudaraku yang telah mencurahkan kasih sayang, selalu memberikan nasehat dan dukungan baik dari segi moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan penulis di dunia dan di akhirat.

Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. Wahyudin, M.Hum., Wakil Rektor III Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., Wakil Rektor IV Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS., Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.
3. Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat.
4. Emmy Bujawati, SKM., M.Kes sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan perbaikan dalam penyusunan.

5. Nildawati, SKM., M.Epid. sebagai pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan perbaikan dalam penyusunan.
6. Rimawati Aulia Insani Sadarang, SKM., M.P.H. sebagai penguji I yang senantiasa memberikan arahan dan perbaikan dalam penyusunan.
7. Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag sebagai penguji II yang telah memberikan saran dan masukan khususnya pada integrasi keislaman.
8. Para Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan khususnya Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu, nasihat dan semangatnya bagi penulis.
9. Pengelola Seminar Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang membantu dalam administrasi persuratan dan kelengkapan berkas seminar.
10. Para staf akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi persuratan.
11. Orang Tuaku tercinta yang selama ini telah merawat dan membesarkan saya serta memberikan dukungan dan doa yang tak henti-hentinya.
12. Teman-teman angkatan 2017 (Anthophila) dan Epidemiologi 2017 yang telah memberikan semangat kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Cikaliya (Asri, Husnul, Wulan, Ade, Riska, Mila) yang selalu memberi motivasi dan inspirasi dalam penyelesaian penelitian.
14. Sahabatku (Pawwa, Dhana, Iyut) yang selalu ada menemani setiap saat. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Gowa, November 2021

Penulis

Sofia Parwaeni

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Hipotesis .....	4
D. Definisi Operasional dan Kategori Objektif .....	5
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	19
G. Manfaat Penelitian .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Rokok .....	37
C. Kerangka Teori .....	42
D. Kerangka Konsep.....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	44
B. Populasi Dan Sampel .....	44
C. Metode Pengumpulan Data .....	46
D. Instrumen Penelitian .....	47
E. Validitas dan Realiabilitas .....	47

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	
A. Hasil Penelitian .....	50
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
2. Hasil Analisis Univariat .....	52
3. Hasil Analisis Bivariat .....	61
B. Pembahasan .....	67
C. Keterbatasan Penelitian .....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	8
Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi menurut JNC-VII 2003 .....	23
Tabel 3.1 Jumlah Sampel Berdasarkan Dusun.....	46
Tabel 4.1 Sarana Prasarana Desa Bawalipu.....	51
Tabel 4.2 Distribusi Pekerjaan Responden di Desa Bawalipu.....	53
Tabel 4.3 Distribusi Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Responden .....	54
Tabel 4.4 Analisis Hubungan Jumlah Perokok Aktif Dalam Keluarga Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Wanita.....	61
Tabel 4.5 Analisis Hubungan Lama Keterpaparan Asap Rokok Terhadap Kejadian Hipertensi .....	62
Tabel 4.6 Analisis Hubungan Lokasi Terpapar Asap Rokok Terhadap Kejadian Hipertensi .....	63
Tabel 4.7 Analisis Hubungan Reaksi Saat Terpapar Asap Rokok Terhadap Kejadian Hipertensi .....	64
Tabel 4.8 Analisis Hubungan Jenis Rokok yang dihisap Perokok Aktif Terhadap Kejadian Hipertensi .....	65
Tabel 4.9 Analisis Hubungan Jumlah Batang Rokok yang dihisap oleh Perokok Aktif Terhadap Kejadian Hipertensi .....	66

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Distribusi Berdasarkan Klasifikasi Umur Responden .....	52
Diagram 4.2 Distribusi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden.....	52
Diagram 4.3 Distribusi Berdasarkan Status Perkawinan Responden.....	54
Diagram 4.4 Distribusi Berdasarkan Riwayat Hipertensi Responden .....	55
Diagram 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Umur Pertama Kali Terdiagnosis Hipertensi.....	56
Diagram 4.6 Distribusi Berdasarkan Status Hipertensi Responden.....	56
Diagram 4.7 Distribusi Berdasarkan Jumlah Perokok Aktif Dalam Keluarga.....	57
Diagram 4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Keterpaparan Asap Rokok.....	58
Diagram 4.9 Distribusi Responden Berdasarkan Lokasi Terpapar Asap Rokok.....	58
Diagram 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Reaksi Saat Terpapar Asap Rokok.....	59
Diagram 4.11 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Rokok yang dihisap oleh Perokok Aktif.....	60
Diagram 4.12 Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Batang Rokok Yang Dihisap Oleh Perokok Aktif .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	42
Gambar 2.2 Kerangka Konsep .....	43
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Bawalipu .....	50



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Formulir Persetujuan Mengikuti Penelitian Setelah Mendapat Penjelasan

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

Lampiran 3 Master Tabel

Lampiran 4 Output SPSS

Lampiran 5 Uji Validitas dan Realibilitas

Lampiran 6 Kode Etik Penelitian

Lampiran 7 Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 8 Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian



## ABSTRAK

**Nama** : Sofia Parwaeni  
**Nim** : 70200117047  
**Judul** : **Hubungan Paparan Asap Rokok Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Wanita di Wilayah Kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021**

---

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang masih menjadi permasalahan kesehatan hingga saat ini dan salah satunya faktor pemicunya adalah kandungan zat nikotin dan CO dalam asap rokok yang dapat menyerang baik perokok aktif maupun pasif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara paparan asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik observasional dan menggunakan desain studi *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah perempuan usia produktif 15-64 tahun yang tinggal di Desa Bawalipu dengan jumlah sampel sebanyak 343 responden diambil menggunakan *teknik purposive sampling* dengan kriteria inklusi perempuan yang berusia 36-65 tahun dan memiliki anggota keluarga yang merokok di dalam rumah.

Hasil uji Chi-square menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara lama keterpaparan asap rokok ( $p=0.002$ ), reaksi saat terpapar asap rokok ( $p=0.000$ ), dan jumlah batang rokok yang dihisap oleh perokok aktif ( $p=0.000$ ), dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah perokok aktif dalam keluarga ( $p=0.819$ ), lokasi terpapar asap rokok ( $p=0.153$ ), serta jenis rokok yang dihisap oleh perokok aktif ( $p=0.638$ ) terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Peneliti merekomendasikan bagi perokok aktif dalam keluarga disarankan untuk mengurangi kebiasaan merokok di dalam rumah dan bagi wanita disarankan untuk konsisten mengingatkan perokok aktif agar merokok di tempat yang jauh dari jangkauan anggota keluarga lain sehingga mengurangi risiko keterpaparan asap rokok yang menjadi penyebab hipertensi.

Kata Kunci: hipertensi; paparan asap rokok; wanita.

Referensi : (69 referensi 2002-2021)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyakit tidak menular (PTM) mengalami tren peningkatan yang signifikan akibat adanya urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi. PTM adalah suatu penyakit yang bersifat menahun dan tidak bisa ditularkan dari satu individu ke individu yang lain (Nur & Warganegara, 2016 dalam Kristiawan P. A. Nugroho et al., 2019). Salah satu jenis penyakit tidak menular ialah hipertensi yang ditandai sebagai sebuah epidemi karena penyakit tersebut menyumbang sekitar 43% beban penyakit global (WHO, 2014 dalam Yasnani et al., 2018).

Pada abad 21 hipertensi sering disebut sebagai penyakit yang dapat membunuh penderita secara diam-diam dan juga merupakan penyebab utama permasalahan penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kebutaan, serta kematian dini (World Health Organization, 2019). Penyebab hipertensi belum diketahui hingga saat ini, tetapi terdapat lebih dari satu faktor risiko yang bisa menjadi penyebab terjadinya hipertensi mulai dari faktor yang bisa dimodifikasi seperti pola makan, merokok, obesitas, dan penyakit diabetes mellitus sampai faktor yang tidak bisa dimodifikasi seperti usia, gender, ras, serta genetik (Nuraini, 2015).

Menurut *World Health Organization* hipertensi menyerang 1,13 miliar (22%) dari total penduduk di dunia, perbandingannya 1 dari 4 pria dan 1 dari 5 wanita yang rata-rata hidup di negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi rendah dan menengah. Kejadian hipertensi tersebar di berbagai wilayah dan kelompok pendapatan negara. Prevalensi hipertensi tertinggi yaitu di Afrika (27%) dan prevalensi hipertensi terendah di Amerika (18%) (World Health Organization, 2019). Setiap tahun jumlah penderita hipertensi makin bertambah dan diperkirakan akan ada 1,5 miliar (29%) penduduk terserang hipertensi pada tahun 2025 dan tiap tahunnya terdapat 9,4 juta kematian akibat hipertensi dan berbagai penyakit komplikasi (Kementrian Kesehatan, 2019).

Menurut *Centers for Disease Control and Prevention* nyaris separuh dari kelompok orang dewasa di Amerika Serikat menderita hipertensi yakni sekitar 108 juta (45%) penduduk (CDC, 2020). Berdasarkan data dunia prevalensi hipertensi terjadi pada banyak negara di kawasan Asia Tenggara yakni di negara Thailand (23,6%), Myanmar (21,5%), Vietnam (21,0%), Malaysia (19,6%), Filipina (18,65), Brunei Darusalam (17,9%), dan Singapura (16,0%) (WHO, 2016 dalam Mahelia, 2019).

Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyatakan bahwa prevalensi hipertensi pada umur  $\geq 18$  tahun sebanyak 658.201 individu (34,11%). Jika dilakukan perbandingan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 yakni (25,8%) angka ini tentu mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 8,3%. Berdasarkan urutan provinsi, prevalensi hipertensi tertinggi berada pada Provinsi Kalimantan Selatan (44,13%), disusul Jawa Barat (39,60%), Kalimantan Timur (39,30%), Jawa Tengah (37,57%), Kalimantan Barat (36,99%), dan Jawa Timur (36,32%), sedangkan provinsi paling terendah yaitu Provinsi Papua (22,2%) (RISKESDAS, 2018).

Sulawesi Selatan menempati urutan ke-12 penderita hipertensi di Indonesia yaitu sebanyak 21,142 kasus (31,68%) (RISKESDAS, 2018). Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Prevalensi penderita hipertensi di Luwu Timur sebanyak 7,844 orang (4,68%) dari 167,573 orang yang melakukan pengukuran hipertensi (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2018).

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 diketahui penyakit hipertensi berada diposisi ke-2 sebagai penyakit terbanyak yang diderita oleh masyarakat. Prevalensi hipertensi di Kabupaten Luwu Timur berjumlah 12,823 orang (28,7%) dari 87,360 orang yang melakukan pengukuran tekanan darah. Penderita hipertensi terbanyak berada pada Kecamatan Wotu (22,72%), disusul Kecamatan Tomoni (18,89%) dan Kecamatan Nuha (18,86%) (Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, 2020).

Hipertensi dapat dikatakan sebagai faktor utama kesakitan dan kematian di seluruh dunia baik pada pria dan wanita. Prevalensi hipertensi di Indonesia pada wanita usia produktif secara signifikan terjadi pada saat wanita memasuki usia  $\geq 35$ -64 tahun dan hanya sekitar 20,13% terjadi pada usia 25–34 tahun serta 13,22% terjadi pada usia 18-24 tahun (RISKESDAS, 2018). Hal ini disebabkan adanya peralihan gaya hidup, sosial, ekonomi, dan pola makan, oleh karena itu di masa kini hipertensi bukan hanya menyerang wanita usia lanjut namun juga terjadi pada wanita usia produktif (Armilawaty dkk, 2007 dalam Situmorang, 2018).

Problematika mengenai rokok tentunya melibatkan dua kelompok yaitu orang merokok secara aktif dan pasif. Perilaku merokok merupakan determinan terjadinya peningkatan tekanan darah dalam tubuh seorang perokok aktif maupun perokok pasif. Hal ini tentunya menunjukkan bahaya dua kali lipat dari rokok terlebih lagi bagi perokok pasif yang terpaksa ikut menghirup asap rokok (Bustan, 2000 dalam Nurwidayanti & Wahyuni, 2013). Salah satu masalah yang disebabkan oleh rokok ialah adanya kandungan nikotin yang bisa menyebabkan tekanan darah meningkat karena memiliki sifat *sympathomimetic* yang mempengaruhi peningkatan detak jantung (Rufaidah, 2015 dalam Aryani, 2019).

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Marisa dan Shinta (2018), menunjukkan bahwa dalam darah orang yang merokok secara aktif maupun pasif positif mengandung nikotin. Kadar nikotin dalam darah orang yang merokok secara aktif yaitu sebanyak 4,778 mg/ml dengan ciri-ciri usia perokok 32 tahun, merokok sekitar 10 tahun dan mengkonsumsi rokok sebanyak 2 bungkus, adapun kadar nikotin dalam darah orang yang merokok secara pasif yaitu sebanyak 1,936 mg/ml dengan ciri-ciri usia perokok pasif 32 tahun dan terpapar asap rokok sekitar 12 tahun (Latifah et al., 2020). Selain itu menurut riset Vozoris & Loughheed (2008), diketahui bahwa orang yang menghirup asap rokok mempunyai kemungkinan 20% terserang hipertensi dibandingkan orang yang tidak menghirup asap rokok (Janah & Martini, 2017).

Terdapat 4000 bahan kimia yang terdapat dalam rokok seperti Karbon Monoksida, *Polycyclic Aromatic Hydrocarbons* (PAHs), Tar, dan Nikotin yang bisa mengurangi harapan hidup individu (Nurwidayanti 2013, dalam Latifah et al., 2020). Partikel toksin yang ada pada asap rokok *side stream* 4-6 kali lebih besar ketimbang asap rokok *mainstream* (Sussana Dewi dkk, 2003 dalam Nurwidayanti & Wahyuni, 2013). Populasi yang rentan terpapar adalah wanita yang mempunyai suami perokok. Suami yang memiliki kebiasaan merokok di dalam rumah tanpa sadar memberikan pengaruh negatif kepada istrinya karena asap rokok dari suami dapat mengendap dan melekat di tembok ruangan yang nantinya akan terhisap oleh istrinya (Williams & Wilkins, 2002 dalam Mustolih et al., 2015).

Berdasarkan masalah tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul hubungan paparan asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara paparan asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

## **C. Hipotesis**

1. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )
  - a. Ada hubungan antara jumlah perokok aktif dalam keluarga terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.
  - b. Ada hubungan antara lama paparan asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.
  - c. Ada hubungan antara lokasi terpapar asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.
  - d. Ada hubungan antara reaksi perokok pasif saat terpapar asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.

- e. Ada hubungan antara jenis rokok yang dihisap oleh perokok aktif terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.
  - f. Ada hubungan antara jumlah batang rokok yang dihisap oleh perokok aktif terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.
2. Hipotesis Noll ( $H_0$ )
- a. Tidak ada hubungan antara jumlah perokok aktif dalam keluarga terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.
  - b. Tidak ada hubungan antara lama paparan asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.
  - c. Tidak ada hubungan antara lokasi terpapar asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.
  - d. Tidak ada hubungan antara reaksi perokok pasif saat terpapar asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.
  - e. Tidak ada hubungan antara jenis rokok yang dihisap oleh perokok aktif terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.
  - f. Tidak ada hubungan antara jumlah batang rokok yang dihisap oleh perokok aktif terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.

#### **D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif**

Definisi Operasional pada penelitian ini adalah :

##### **1. Hipertensi**

Hipertensi yang dimaksud adalah responden penderita hipertensi yang pernah didiagnosis oleh tenaga kesehatan.

Kriteria objektif hipertensi menurut (Kementrian Kesehatan, 2019).

Hipertensi : jika tekanan darah responden  $\geq 140/90$  mmHg

Tidak Hipertensi : jika tekanan darah responden  $< 140/90$  mmHg

## 2. Jumlah Perokok Aktif Dalam Keluarga

Jumlah perokok aktif yang dimaksud adalah jumlah anggota keluarga responden yang memiliki kebiasaan merokok.

Kriteria objektif jumlah perokok menurut (Nurwidayanti & Wahyuni, 2013) :

Berisiko tinggi : jika jumlah perokok dalam rumah tangga  $> 1$  orang

Berisiko rendah : jika jumlah perokok dalam rumah tangga sebanyak 1 orang

## 3. Lama Paparan Asap Rokok

Lama paparan asap rokok adalah selisih antara umur responden pada saat penelitian dengan umur responden pada saat pertama kali intens terpapar asap rokok.

Kriteria objektif lama paparan asap rokok menurut (Nurwidayanti & Wahyuni, 2013) :

Berisiko tinggi : jika perokok pasif terpapar asap rokok selama  $> 10$  tahun

Berisiko rendah : jika perokok pasif terpapar asap rokok selama  $\leq 10$  tahun

## 4. Lokasi Terpapar Asap Rokok

Lokasi terpapar asap rokok adalah tempat dimana responden terpapar asap rokok dari orang yang merokok secara aktif baik di ruangan tertutup maupun ruangan terbuka.

Kriteria objektif lokasi terpapar asap rokok menurut (Nurwidayanti & Wahyuni, 2013) :

Berisiko tinggi : jika perokok aktif merokok di dalam rumah

Berisiko rendah : jika perokok aktif merokok di luar rumah

## 5. Reaksi Perokok Pasif Saat Terpapar Asap Rokok

Reaksi perokok pasif adalah reaksi spontan responden ketika terpapar asap rokok.

Kriteria objektif reaksi perokok pasif menurut (Nurwidayanti & Wahyuni, 2013) :

Berisiko tinggi : jika responden tidak menghindar dan membiarkan dirinya terpapar asap rokok

Berisiko rendah : jika responden menghindar sembari menutup hidung dan mulut saat terpapar asap rokok

## 6. Jenis Rokok

Jenis rokok adalah jenis rokok yang dihisap anggota keluarga responden yang didasarkan pada penggunaan filter.

Kriteria objektif reaksi perokok pasif menurut (Mustolih et al., 2015) :

Berisiko tinggi : jika responden terpapar asap rokok yang tidak menggunakan filter

Berisiko rendah : jika responden terpapar asap rokok yang menggunakan filter

## 7. Jumlah Batang Rokok

Jumlah batang rokok adalah jumlah batang yang dihisap oleh perokok aktif dan ikut terhirup oleh responden dalam sehari.

Kriteria objektif reaksi perokok pasif menurut (Nurwidayanti & Wahyuni, 2013) :

Berisiko tinggi : jika responden terpapar asap rokok  $\geq 5$  batang/hari

Berisiko rendah : jika responden terpapar asap rokok  $< 5$  batang/hari

## E. Kajian Pustaka

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul	Metodologi			Instrumen	Hasil Penelitian
				Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel		
1.	2015	Ahmad Mustolih, dkk	Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi pada Perokok Pasif (Studi Kasus Pada Keluarga Perokok Aktif di Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)  <i>http://openjournal.unmuhpnk.ac.id/index.php/JJUM/article/download/38/273</i>	Populasi : seluruh istri yang memiliki suami perokok di Desa Bukit Mulya  Sampel : sebanyak 117 orang	Analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	Lokasi merokok suami, jenis rokok yang dihisap suami, jumlah batang rokok yang dihisap suami, jumlah perokok dalam keluarga, dan lama paparan asap rokok	Kuesioner	Hasil riset menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan pada variabel lokasi merokok suami ( $p=0.041$ ), jenis rokok yang dihisap suami ( $p=0.027$ ), jumlah batang rokok yang dihisap suami ( $p=0.041$ ), jumlah perokok dalam keluarga ( $p=0.047$ ) terhadap kejadian hipertensi pada istri. Adapun variabel yang tidak memiliki hubungan yang signifikan yakni lama paparan asap rokok ( $p=0.063$ ).

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul	Metodologi			Instrumen	Hasil Penelitian
				Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel		
2.	2017	Suryanda	<p>Analisis Faktor Resiko Hipertensi Sekunder pada Pengguna Kontrasepsi Aktif di Puskesmas Tanjung Agung</p> <p><a href="http://ejournal.poltekessmg.ac.id/ojs/index.php/jrk/article/viewFile/2628/580">http://ejournal.poltekessmg.ac.id/ojs/index.php/jrk/article/viewFile/2628/580</a></p>	<p>Populasi : seluruh perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi dan aktif melakukan pengobatan di ruang KIA dan KB</p> <p>Sampel : sebanyak 117 orang</p>	<p>Kuantitatif dengan metode <i>cross-sectional</i>.</p>	<p>Pengguna Kontrasepsi terpapar asap rokok, Penggunaan Kontrasepsi</p>	<p>Kuesioner dan alat pengukur tekanan darah</p>	<p>Tidak ada keterkaitan antara paparan asap rokok (<math>p=0.057</math>) dengan kejadian hipertensi sekunder pada pengguna kontrasepsi. Adapun variabel penggunaan kontrasepsi hormonal (<math>p=0.001</math>) yang menandakan adanya keterkaitan yang signifikan antara pengguna kontrasepsi dengan kejadian hipertensi sekunder</p>

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul	Metodologi			Instrumen	Hasil Penelitian
				Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel		
3.	2017	Gede Dilajaya Robin, dkk.	Prevalensi Hipertensi Pada Mahasiswa Semester VI Program Studi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana  <i><a href="https://ocs.unud.ac.id/index.php/eu/article/download/28958/17969">https://ocs.unud.ac.id/index.php/eu/article/download/28958/17969</a></i>	Populasi: Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, pada bulan Februari - April 2016  Sampel : sebanyak 127 responden	Deskriptif dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Jenis kelamin, body mass index (BMI), riwayat genetik dengan hipertensi, konsumsi alkohol, olahraga, konsumsi daging, merokok, tinggal di lingkungan dengan paparan asap rokok, dan stress	Kuesioner	Faktor penyebab hipertensi pada responden penelitian adalah variabel jenis kelamin, BMI, riwayat genetik, konsumsi alkohol, olahraga, konsumsi daging, merokok, tinggal di lingkungan dengan paparan asap rokok, dan stress dengan hipertensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul	Metodologi			Instrumen	Hasil Penelitian
				Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel		
4.	2017	Miftahul Janah dan Santi Martini	<p>Hubungan Antara Paparan Asap Rokok Dengan Kejadian Pre-hipertensi</p> <p><a href="http://jurnal.stikes.yrds.ac.id/index.php/JMK/article/download/75/73">http://jurnal.stikes.yrds.ac.id/index.php/JMK/article/download/75/73</a></p>	<p>Populasi : seluruh siswa kelas X SMK Negeri 10 Surabaya</p> <p>Sampel : sebanyak 31 siswa</p>	<p>Analitik dengan desain penelitian <i>cross sectional</i></p>	<p>Paparan asap rokok dan kadar COHb</p>	<p>Kuesioner, alat pengukuran tekanan darah, dan hasil lab untuk mengetahui kadar COHb</p>	<p>Hasil riset menyatakan bahwa dari 31 sampel, sekitar 28 sampel pernah menghirup asap rokok. Tidak ada keterkaitan secara statistik antara paparan asap rokok dengan kejadian pre-hipertensi (p=0.60;OR=0.67)</p>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul	Metodologi			Instrumen	Hasil Penelitian
				Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel		
5.	2017	Kim Sehung, dkk	<p><i>Relation between Secondhand Smoke Exposure and Cardiovascular Risk Factors in Never Smokers</i></p> <p><i>Never Smokers</i>  <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5585129/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5585129/</a></p>	<p>Populasi : pria dan wanita yang tidak pernah merokok berdasarkan data dari KNHANES dari 2008-2011</p> <p>Sampel : Berjumlah 7.376 sampel</p>	<p>Analitik dengan desain penelitian <i>cross sectional</i></p>	<p>Tekanan darah, lipid, dan kadar glukosa puasa</p>	<p>Kuesioner, pemeriksaan konitin pada urin</p>	<p>Usia rata-rata dari populasi penelitian adalah 45,4 tahun dan 75,2% diantaranya ialah perempuan. Paparan asap rokok dilaporkan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil studi kecuali untuk tekanan darah diastole. Tidak ditemukan keterkaitan yang konsisten antara paparan asap rokok dengan tekanan darah, lipid, atau kadar glukosa puasa</p>

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul	Metodologi			Instrumen	Hasil Penelitian
				Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel		
6.	2017	Ying Yang, dkk	<p><i>Association of Husband Smoking With Wife's Hypertension Status in Over 5 Million Chinese Females Aged 20 to 49 Years</i></p> <p><a href="https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.116.004924">https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.116.004924</a></p>	<p>Populasi : pasutri yang melakukan pemeriksaan di NFPCP Cina mulai tanggal 1 januari- 31 desember 2014</p> <p>Sampel : 5.227.731 pasangan suami istri</p>	Analitik dengan desain <i>cross sectional</i> .	Status merokok suami dan istri, jumlah rokok suami dan paparan kumulatif asap rokok suami.	Kuesioner dan alat pengukur tekanan darah	<p>Hasil analisis multivariat menunjukkan efek negatif bagi suami perokok dengan kejadian hipertensi pada istrinya. Jumlah rokok suami signifikan dengan prevalensi hipertensi dengan nilai OR 1.22, 1.24, 1.32, 1.37, dan 1.75 untuk wanita yang suaminya merokok 1-5 batang, 6-10 batang, 11-15 batang, 16-20 batang, dan <math>\geq 21</math> batang/hari (<math>p = &lt;0.001</math>). Variabel paparan kumulatif asap rokok suami juga signifikan dengan nilai OR 1.23, 1.36, 1.40, 1.50 dan 1.63 pada kelompok dengan lama paparan 0,1-2,0 tahun, 2,1-4,0 tahun, 4.1-6.0 tahun, 6.1-8.0 tahun, dan <math>&gt; 8.0</math> tahun pernikahan (<math>p = &lt;0.001</math>).</p>

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul	Metodologi			Instrumen	Hasil Penelitian
				Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel		
7.	2018	Young Sik Park, dkk	<i>Association Between Secondhand Smoke Exposure and Hypertension in Never Smokers: a Cross-Sectional Survey Using Data from Korean National Health and Nutritional Examination Survey V, 2010–2012</i>	Populasi : Orang dewasa berumur > 20 tahun yang tidak pernah merokok sebanyak 19.259  Sampel : 10532 (pria 1545, wanita 8987)	Analitik dengan desain <i>cross sectional</i>	Paparan asap rokok	Kuesioner dan alat pengukur tekanan darah	Hasil riset menyatakan terdapat 10.532 responden yang tidak pernah merokok dan terbagi menjadi 3 kelompok yakni tidak terpapar (kelompok I), <2 jam/hari terpapar (kelompok II) dan $\geq 2$ jam/hari terpapar (kelompok III). Berdasarkan analisis multivariat hipertensi lebih banyak terjadi pada kelompok III daripada kelompok I pada wanita dengan nilai (OR=1.50;p=0.011). Terdapat keterkaitan secara statistik antara paparan asap rokok dengan kejadian hipertensi pada wanita yang tidak pernah perokok. Namun pada pria, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik.

<https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/8/5/e021217.full.pdf>

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul	Metodologi			Instrumen	Hasil Penelitian
				Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel		
8.	2018	Arista Tri Nugraheni dan Anisa Catur Wijayanti	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi pada Perempuan Dewasa Muda di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017  <i><a href="http://repository.uirecol.org/index.php/proceeding/article/download/296/289">http://repository.uirecol.org/index.php/proceeding/article/download/296/289</a></i>	Populasi : seluruh penderita hipertensi berjenis kelamin wanita dan berusia 26-35 tahun  Sampel : sebanyak 180 sampel yang terdiri dari 90 kasus dan 90 kontrol	Kuantitatif dengan pendekatan <i>case control</i> .	Paparan rokok, pola makan, perilaku minum kopi, dan penggunaan kontrasepsi hormonal.	Kuesioner	Hasil analisis menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna pada variabel paparan asap rokok ( $p=0.000$ ), pola makan ( $p=0.000$ ), perilaku minum kopi ( $p=0.000$ ) dan penggunaan kontrasepsi hormonal ( $p=0.000$ ) dengan kejadian hipertensi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul	Metodologi			Instrumen	Hasil Penelitian
				Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel		
9.	2019	Astri Meidah Setiawati	<p>Hubungan Asap Rokok Terhadap Terjadinya Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Desa Brangkal Bojonegoro</p> <p><i><a href="https://jurnal.unej.ac.id/index.php/IKESMA/article/download/14411/7333">https://jurnal.unej.ac.id/index.php/IKESMA/article/download/14411/7333</a></i></p>	<p>Populasi : ialah 10 ibu hamil yang ada di Desa Brangkal</p> <p>Sampel : berjumlah 10 ibu hamil</p>	<p>Penelitian analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i>.</p>	Paparan asap rokok	Kuesioner	<p>Berdasarkan hasil analisis didapatkan tidak ada keterkaitan antara paparan asap rokok dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil (p=0.857)</p>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul	Metodologi			Instrumen	Hasil Penelitian
				Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel		
10.	2020	Novita Aryani	<p>Hubungan Paparan Asap Rokok Dengan Kejadian Pre-hipertensi Pada Usia 26-30 Tahun Di Desa Wihni Durin Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah 2019</p> <p><i>http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/darmaagungghusada/article/download/721/625</i></p>	<p>Populasi : sebanyak 40 orang yang berusia 20-30 tahun</p> <p>Sampel : sebanyak 36 orang</p>	<p>Analitik dengan pendekatan <i>cros sectional</i></p>	<p>Paparan asap rokok</p>	<p>Kuesioner</p>	<p>Hasil riset menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara paparan asap rokok dengan kejadian pre-hipertensi (<math>p=0.020</math>) di Desa Wihni Durin Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh tahun 2019</p>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul	Metodologi			Instrumen	Hasil Penelitian
				Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel		
11.	2020	Putra Apriadi Siregar, dkk	<p>Analisis Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Masyarakat Pesisir Kota Medan (Aspek Sosial Budaya Masyarakat Pesisir)</p> <p><a href="http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JP/article/view/69/63">http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JP/article/view/69/63</a></p>	<p>Populasi : masyarakat Kelurahan Belawan II</p> <p>Sampel : berjumlah 90 orang</p>	Observasional dengan studi <i>cross-sectional</i>	<p>Frekuensi terpapar asap rokok, usia, IMT, frekuensi derajat merokok, aktivitas fisik, konsumsi makanan asin, konsumsi mie instan, konsumsi <i>soft drink</i></p>	Kuesioner	<p>Hasil riset menyatakan tidak ada keterkaitan pada variabel frekuensi derajat merokok (0.923), usia (0.272), indeks massa tubuh (0.301), aktivitas fisik (0.223), konsumsi makanan asin (0.270), konsumsi <i>soft drink</i> (0.474), dan konsumsi mie instan (0.479) sedangkan untuk variabel frekuensi paparan asap rokok terdapat hubungan yang signifikan terhadap kejadian hipertensi pada masyarakat pesisir Kota Medan (<math>p= 0.019</math>).</p>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul	Metodologi			Instrumen	Hasil Penelitian
				Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel		
12.	2021	Anugrah Lintang Indrawati & Santi Martini	<p><i>Relationship Between Exposure To Cigarette Smoke In Houses And The Incidence Of Hypertension In Housewives</i></p> <p><a href="https://www.researchgate.net/publication/352060572_Relationship_between_Exposure_to_Cigarette_Smoke_in_Houses_and_The_Incidence_of_Hypertension_in_Housewives">https://www.researchgate.net/publication/352060572_Relationship_between_Exposure_to_Cigarette_Smoke_in_Houses_and_The_Incidence_of_Hypertension_in_Housewives</a></p>	<p>Populasi : Ibu Rumah Tangga di Desa Dampit pada Bulan Maret 2020 Sampel : berjumlah 115 sampel</p>	<p>Observasional dengan studi crosssectional</p>	<p>Lama paparan, frekuensi dekat dengan perokok dan lama setiap kali dekat dengan perokok</p>	<p>Kuesioner</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara lama paparan asap rokok dalam rumah lebih dari 33 tahun (<math>p=0,01</math>;OR=3,52) dekat dengan perokok lebih &gt; 3 kali tiap harinya (<math>p=0,01</math>;OR=36), dan lama setiap kali dekat dengan perokok lebih dari 10 menit (<math>p=0,01</math>;OR=8,09) dengan kejadian hipertensi.</p>

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pada variabel dan lokasi penelitian. Variabel yang akan diteliti merupakan hasil gabungan dari beberapa variabel yang dilakukan pada penelitian sebelumnya dan penelitian ini juga belum pernah dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Wotu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

## **F. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara paparan asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

### **2. Tujuan khusus**

- a. Mengetahui hubungan jumlah perokok aktif dalam keluarga terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.
- b. Mengetahui hubungan lama paparan asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.
- c. Mengetahui hubungan lokasi terpapar asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.
- d. Mengetahui hubungan reaksi perokok pasif saat terpapar asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.
- e. Mengetahui hubungan jenis rokok yang dihisap oleh perokok aktif terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.
- f. Mengetahui hubungan jumlah batang rokok yang dihisap oleh perokok aktif terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu.

## **G. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Ilmiah**

Menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi dan referensi mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan yang dapat menimbulkan penyakit seperti hipertensi.

### **2. Bagi Petugas Kesehatan**

Bagi petugas kesehatan penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan acuan pemberian intervensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor risiko penyakit hipertensi salah satunya ialah asap rokok.

### **3. Bagi Pemerintah**

Bagi sektor pemerintahan penelitian ini dapat memberikan gagasan yang bermanfaat guna pengambilan kebijakan kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan fokus pembiayaan kesehatan yang tepat guna dan sesuai sasaran.

### **4. Bagi Para Akademisi**

Mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang promosi dan pencegahan yang berkaitan dengan faktor risiko hipertensi.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Tentang Hipertensi

##### 1. Pengertian Hipertensi

Hipertensi ialah suatu keadaan tekanan darah seseorang  $\geq 140/90$  mmHg sesudah melakukan dua kali pemeriksaan tekanan darah secara terpisah. Tekanan darah sistolik merupakan tekanan pada saat pembuluh darah jantung berkontraksi adapun diastolik adalah tekanan pada saat pembuluh darah jantung berelaksasi (World Health Organization, 2019). Hipertensi bisa diartikan sebagai kelainan tanpa adanya tanda-tanda pada tubuh yang mengakibatkan tekanan darah meningkat di dalam arteri kemudian memicu berbagai penyakit yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskuler (Sutanto, 2010 dalam Hikmah, 2017).

*American Society of Hypertension* (ASH) menjelaskan penyakit hipertensi sebagai gabungan dari beberapa tanda-tanda penyakit kardiovaskuler yang kompleks dan saling berkaitan. Hipertensi ialah salah satu jenis penyakit kardiovaskular yang paling sering dialami oleh masyarakat (A. Tjokronegoro & H. Utama, 2001 dalam Nuraini, 2015). Hipertensi merupakan keadaan meningkatnya tekanan darah yang diakibatkan oleh adanya keterlambatan pasokan  $O_2$  dan nutrisi menuju jaringan tubuh yang memerlukan. Hipertensi juga dapat diklasifikasikan sebagai penyakit akibat penurunan fungsi organ tubuh yang mana penyakit hipertensi ini paling umum diderita bukan hanya manusia lanjut usia, tetapi juga mengancam populasi orang dewasa. Kematian diantara 9 dari 10 orang akibat hipertensi belum diketahui penyebabnya, oleh karena itu hipertensi juga disebut sebagai “pembunuh secara diam-diam” (Zauhani, Zainal, 2012 dalam Hikmah, 2017).

## 2. Klasifikasi Hipertensi

Klasifikasi hipertensi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 adalah sebagai berikut :

### a. Hipertensi Primer/*Esensial*

Hipertensi primer ialah jenis hipertensi yang tidak dapat diidentifikasi penyebabnya meskipun telah dihubungkan dengan gabungan faktor perilaku seperti kurangnya aktivitas fisik dan buruknya pola makan. Hipertensi ini menyerang sekitar 90% dari penyandang hipertensi.

### b. Hipertensi Sekunder/*Non Esensial*

Hipertensi sekunder merupakan jenis hipertensi yang dapat diidentifikasi penyebabnya. Sekitar 5-10% penyandang hipertensi ini dipicu oleh penyakit ginjal. Selain itu sekitar 1-2% diakibatkan oleh adanya gangguan hormon atau konsumsi obat, contoh pil kontrasepsi (Kemenkes RI, 2014 dalam Untario, 2017).

Adapun klasifikasi tekanan darah dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi menurut JNC-VII 2003**

Klasifikasi	Tekanan Darah Sistolik (mmHg)	Tekanan Darah Diastolik (mmHg)
Normal	< 120	<80
Meningkat	120 – 129	<80
Hipertensi tingkat 1	130 – 139	80 -89
Hipertensi tingkat 2	≥ 140	≥ 90

Sumber : (Nur Hikmah, 2017:20)

## 3. Tanda dan Gejala

Ada kalanya penyandang hipertensi tidak memiliki keluhan atau gejala. Keluhan yang tidak dapat dikenali oleh penderita adalah sebagai berikut (Elfira Riris Rindayati, 2018) :

- a. Kepala terasa pening
- b. Merasa cemas/khawatir
- c. Jantung berdegup
- d. Pandangan terasa buram

- e. Sakit pada bagian dada
- f. Mudah letih
- g. Pusing

Adapun gejala akibat komplikasi hipertensi yang sering ditemui seperti adanya gangguan pada mata, syaraf, jantung, ginjal dan otak yang dapat menyebabkan kelumpuhan, gangguan kesadaran hingga koma.

#### 4. Patofisiologi Hipertensi

Tekanan darah dapat dipengaruhi oleh volume serta total *peripheral resistance*. Ketika terjadi peningkatan yang tidak terkontrol akibat faktor-faktor tersebut, nantinya bisa menimbulkan penyakit hipertensi. Tubuh mempunyai metode yang berperan untuk menghindari transformasi tekanan darah yang diakibatkan oleh kelainan sirkulasi serta melindungi kestabilan tekanan darah secara terus-menerus. Cara untuk mengendalikan tekanan darah sangatlah luas. Pengendalian diawali dari reaksi spontan semacam *reflex cardiovascular* yang melewati sistem saraf, refleksi kemoreseptor, reaksi iskemia, susunan syaraf pusat yang bersumber dari atrium, dan arteri pulmonalis otot polos. Sebaliknya metode pengendalian respon yang tidak spontan yaitu menggunakan transfer cairan antara sirkulasi kapiler dan rongga interstisial yang diatur oleh hormon angiotensin serta vasopressin. Setelah itu diteruskan oleh sistem potensi yang berlangsung secara terus-menerus dan dilanjutkan oleh sistem pengontrolan jumlah cairan pada tubuh yang dapat dikaitkan dengan macam-macam organ (Kaplan M. Norman, 1998 dalam Nuraini, 2015).

Proses terbentuknya hipertensi dimulai dengan adanya angiotensin II dari angiotensin I oleh angiotensin I converting enzyme (ACE). ACE memiliki fungsi fisiologi dalam hal pengendalian tekanan darah. Darah memiliki angiotensinogen yang dibuat di dalam hati, selanjutnya hormon renin yang dibuat ginjal bakal diganti jadi angiotensin I sebab ACE yang berada di paru-paru, lalu angiotensin I diganti menjadi angiotensin II.

Angiotensin II ini yang memiliki kontribusi utama dalam peningkatan tekanan darah dengan 2 langkah.

Langkah pertama yaitu menaikkan pengeluaran hormon antidiuretik (ADH) serta rasa dahaga. Hormon antidiuretik dibuat di hipotalamus yang bertugas pada bagian ginjal untuk mengontrol osmolalitas serta volume urin. Peningkatan hormon antidiuretik memicu sekresi urin dari tubuh terbatas, akibatnya urin jadi pekat dan terjadi peningkatan osmolalitas, untuk mengembalikan seperti semula cairan ekstraseluler bakal dinaikkan dengan metode menyerap cairan dari bagian intraseluler. Dampaknya, volume darah bertambah dan menyebabkan tekanan darah meningkat. Langkah kedua ialah stimulus pengeluaran sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Aldosteron ialah hormon steroid yang mempunyai fungsi dasar pada ginjal, agar volume cairan ekstraseluler dapat terkendali aldosteron akan menurunkan pengeluaran natrium dengan cara mengabsorpsi kembali dari tubulus di ginjal, ketika konsentrasi garam naik maka dapat diencerkan lagi dengan menaikkan volume cairan ekstraseluler yang nantinya bisa menyebabkan peningkatan volume serta tekanan darah.

Menurut Elizabeth J. Corwin indikasi klinis bisa timbul akibat hipertensi berupa gangguan klinis yang muncul selepas menderita hipertensi yang menahun. Indikasi klinis yang muncul seperti sakit kepala saat terbangun dari tidur yang terkadang diikuti rasa mual serta ingin muntah karena kenaikan tekanan darah intrakranial, pandangan terasa buram karena rusaknya retina, langkah yang sudah tidak kokoh karena kemunduran fungsi lapisan saraf, nokturia (keseringan membuang urin di malam hari) sebab kenaikan aliran darah ginjal serta filtrasi glomerulus, dan edema karena kenaikan tekanan kapiler. Implikasi dari pembuluh darah otak bisa menyebabkan stroke maupun adanya iskemik transien yang berindikasi sebagai paralisis atau hemiplegia. Gangguan lainnya berupa epistaksis, gampang marah, kuping terasa mendengung, terasa tegang pada bagian

tengkuk, kesusahan untuk tidur, serta gangguan pada mata (Lam Murni BR Sagala, 2011 dalam Nuraini, 2015).

## 5. Faktor Risiko Hipertensi

Hipertensi adalah jenis penyakit yang sangat kompleks dan timbul akibat adanya interaksi beberapa faktor. Hipertensi terbentuk dari respon peningkatan tekanan perifer dalam tubuh. Terdapat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kejadian hipertensi yakni :

### a. Umur

Faktor umur mempunyai pengaruh dengan penyakit hipertensi sebab makin bertambah umur individu maka makin tinggi pula risiko terserang hipertensi. Peningkatan kasus hipertensi akibat pertambahan umur dipicu oleh transformasi alami tubuh yang mempengaruhi jantung, pembuluh darah dan hormon. Hipertensi di usia < 35 tahun menyebabkan kenaikan kasus baru penyakit arteri koroner serta merenggut nyawa seseorang pada usia muda. Prevalensi kejadian hipertensi pada populasi manula tergolong cukup serius yaitu sebesar 40% dengan persentase mortalitas sebesar 50% yang berada pada usia di atas 60 tahun (Suhadak, 2010 dalam Azizah, 2018). Hal ini terjadi karena arteri yang kehilangan fleksibilitas dan tekanan darah yang meningkat berbarengan dengan pertambahan umur. Pertambahan kasus hipertensi akan nampak di usia 50-60 tahun (E. Rahajeng & S. Tuminah dalam Nurhidayati et al., 2018). Tekanan darah akan meningkat seiring pertambahan umur adalah hal yang biasa, akan tetapi perubahan tekanan darah yang sangat berbeda dibarengi oleh faktor risiko lain yang mempengaruhi kejadian hipertensi dan berbagai komplikasi (Kartikasari, 2012 dalam Hikmah, 2017).

### b. Jenis Kelamin

Secara umum laki-laki lebih rentan untuk terkena hipertensi daripada perempuan dengan persentase sebesar 2,29% dalam hal peningkatan tekanan darah sistolik. Seorang laki-laki kerap merasakan gejala-gejala hipertensi pada umur tiga puluhan sebab laki-laki

diasumsikan mempunyai *life style* yang buruk daripada seorang perempuan sehingga perilaku ini mengarah kepada peningkatan tekanan darah, namun peningkatan prevalensi hipertensi pada perempuan terjadi ketika perempuan telah mencapai umur 45 tahun. Hal ini membuat perempuan lebih berisiko untuk terserang hipertensi. Peningkatan tekanan darah pada perempuan disebabkan oleh menurunnya produksi hormon estrogen, terutama pada saat memasuki fase ménopause (Herbert Benson, dkk, 2012 dalam Elfira Riris Rindayati, 2018).

Riset yang pernah dilakukan oleh Apriliya (2016) menyatakan bahwa umur  $\geq 40$  tahun mempunyai risiko menderita hipertensi 11,7 kali daripada umur  $< 40$  tahun. Selain itu, riset dari Heryudarini dkk 2008 diketahui dari 633 responden yang dijadikan sampel penelitian dengan kriteria umur 30-55 tahun didapatkan perbedaan jumlah penderita hipertensi antara pria dan wanita yaitu 342 (54%) pada pria dan 291 (46,0%) pada wanita (Elfira Riris Rindayati, 2018).

### c. Genetik

Salah satu faktor risiko penyebab hipertensi adalah faktor gen (keturunan). Keadaan ini dipicu oleh aktivitas kadar sodium intraseluler yang tinggi serta perbandingan antara potasium terhadap sodium rendah. Seseorang yang memiliki orang tua penderita hipertensi memiliki risiko 2 kali lebih tinggi terserang hipertensi daripada seseorang yang tidak memiliki orang tua penderita hipertensi (Wade dkk, 2003 dalam Nuraini, 2015), diketahui 70-80% kejadian hipertensi esensial diakibatkan oleh genetik (Yunis Tri dkk, 2003 dalam Nuraini, 2015).

Riset yang dilakukan oleh Davidson 2015 menyatakan bahwa jika terdapat kedua orang tua yang terkena hipertensi maka sebesar 45% dapat diturunkan ke anaknya, namun jika diantara mereka hanya satu yang terkena hipertensi maka sebesar 30% saja yang dapat diturunkan pada anak-anaknya (Elfira Riris Rindayati, 2018).

#### d. Konsumsi Garam

*World Health Organization* (WHO) menganjurkan untuk mengurangi pemakaian garam agar bisa mencegah risiko penyakit hipertensi. Kadar sodium yang dianjurkan yaitu tidak boleh  $>100$  mmol (sekitar 2,4 gram sodium dan 6 gram garam) tiap harinya. Mengonsumsi garam berlebihan dapat menjadi penyebab konsentrasi garam dalam cairan ekstraseluler meningkat. Peningkatan volume cairan ini mengakibatkan peningkatan volume darah dan nantinya akan berdampak pada penyakit hipertensi (Shapo L, dkk 2003 dalam Nuraini, 2015).

Garam dapur adalah komponen yang paling berpartisipasi dalam patogenesis hipertensi. Sekitar 40% natrium dan 60% klorida terkandung di dalam garam dapur. Usus halus memiliki peranan penting dalam mengabsorpsi konsumsi 3-7 gram garam tiap harinya (Kaplan M. Norman, 1998 dalam Kartikasari, 2012). Selain garam dapur, terdapat jenis natrium yang perlu diwaspadai penggunaannya yaitu bahan penyedap rasa dalam makanan (*monosodium glutamate*). Kebiasaan mengonsumsi *monosodium glutamate* saat ini sudah sangat memprihatinkan, yang pastinya semakin memperparah risiko kejadian hipertensi (Made Astawan, 2011 dalam Kartikasari, 2012).

#### e. Perilaku Merokok

Kebiasaan merokok adalah salah satu pemicu penyakit hipertensi karena adanya nikotin dalam rokok. Perilaku menghisap rokok mengakibatkan nikotin masuk ke pembuluh darah kecil yang berada di paru-paru yang nantinya disebarkan sampai ke otak. Di dalam otak, nikotin akan menyampaikan isyarat kepada kelenjar adrenalin agar mengeluarkan epinefrin yang dapat mengecilkan pembuluh darah serta mendesak jantung memompa lebih keras akibat dari tekanan darah yang lebih cepat. Karbon monoksida pada asap rokok bisa mengambil alih ikatan  $O_2$  dalam darah. Keadaan ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah sebab jantung didesak bekerja untuk menyuplai  $O_2$  yang

memadai ke dalam organ dan jaringan tubuh yang lain (Lam Murni BR Sagala, 2011 dalam Kartikasari, 2012).

Berdasarkan riset dr. Thomas S Bowman (2007) diketahui terdapat 28.236 responden yang sama sekali tidak memiliki riwayat hipertensi dengan persentase 51% responden yang tidak punya kebiasaan merokok, 36% responden adalah orang yang baru merokok, 5% responden yang merokok 1-14 batang/hari serta 8% responden yang merokok >15 batang/hari dimana responden terus diamati hingga 9,8 tahun. Hasil dari riset ini ialah prevalensi hipertensi paling banyak menyerang responden yang merokok >15 batang/hari (Bowman ST et al., 2007 dalam Nuraini, 2015).

Berdasarkan Fatwa MUI pada tanggal 23-26 Januari 2009 diketahui bahwa perilaku merokok bisa dikatakan perbuatan yang haram dan perbuatan yang makruh (Sadri, 2012). Rokok diharamkan bagi anak kecil, ibu hamil, dan perokok aktif yang merokok di ruang publik. Pro dan kontra mengenai haramnya rokok didasari oleh perdebatan antara kemaslahatan dan kemudharatan baik secara individu maupun kelompok. Keharaman rokok didasarkan pada kesepakatan dokter yang berpendapat bahwa perilaku merokok berbahaya bagi kesehatan. Bahaya akibat asap rokok makin meresahkan, hasil dari riset *World Health Organization* menunjukkan bahwa tiap 6 detik terdapat kematian yang dihubungkan dengan rokok. Berdasarkan tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab arti rokok dalam bahasa arab ialah دخن (*dakhina*) atau سجر sedangkan perokok dikatakan *al-mudakhin*. Dalil maupun Hadits yang membahas tentang larangan merokok memang belum tertera secara jelas, tetapi sebagai kaum muslimin sudah semestinya kita taat mengikuti perintah serta meninggalkan segala larangan-Nya (Shihab, 2002 dalam Sadri, 2012). Organisasi Muhammadiyah menyatakan dengan lantang bahwa perilaku merokok haram hukumnya karena termasuk perbuatan kotor yang dilarang oleh agama sesuai dengan QS. Al – A'raf/7:157.

.... يَاْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ  
(١٥٧) ...

Terjemahnya :

*“Nabi menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”*

Berdasarkan tafsir Kementerian Agama QS. Al – A'raf/7:157 berisi tentang akhlak Nabi Muhammad saw yang termaktub dalam Taurat dan Injil ialah beliau memerintahkan mereka untuk mengerjakan perbuatan baik yaitu sesuatu yang diketahui oleh agama, nalar dan budaya sebagai keistimewaan begitupun sebaliknya menjauhkan diri dari perbuatan buruk yaitu sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama, nalar, serta budaya, kemudian diantara maksud kehadiran Nabi Muhammad saw adalah menghalalkan semua yang baik untuk mereka dan mengharamkan semua yang buruk bagi mereka (Qur'an Kemenag, 2021). Pada saat menjelaskan sifat Nabi-Nya Allah swt bersabda: *“...dia menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharamkan yang buruk...“*, demikian rokok diharamkan sebab merupakan suatu hal yang buruk (*khabaits*), merokok bukan merupakan sebab timbulnya penyakit, namun rokok menjadi pemicu berbagai penyakit, oleh karena itu bisa dianggap rokok bukan sebab dari kematian, namun bisa memicu terjadinya penyakit yang dapat merenggut nyawa (Muhammad Jaya, 2009 dalam Ferizal, 2016). Allah SWT juga berfirman dalam surah Ar – Ra'd/13:11.

.....إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ  
وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَّالٍ (١١)

Terjemahnya :

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada*

*yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*

Kandungan QS. Ar-Ra'd/13:11 menerangkan tentang konsepsi perubahan pada masyarakat. Berdasarkan tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab QS. Ar-Ra'd/13:11 dapat diartikan seperti suatu metode perubahan yang dapat memberikan kedudukan atau tugas untuk individu sebagai pencetus perubahan, baik individu sebagai personal atau sebagai komponen dari komunitas (masyarakat). Pemakaian kata *qowm* pada QS. Ar-Ra'd/13:11 menerangkan tentang metode perubahan yang terjadi bukanlah perubahan individu, namun perubahan yang dimaksud adalah perubahan secara komunitas dan menjurus pada tindakan kemasyarakatan serta dapat membawa komunitas ke arah perubahan tata nilai yang idealis (Shihab, 2002 dalam Ulum, 2003).

Berdasarkan QS. Ar-Ra'd/13:11 hendaknya suatu kaum dapat mengubah perilaku atau pola pikir mereka ke arah yang lebih baik agar senantiasa mendapatkan pertolongan dan kenikmatan dalam hidupnya. Sudah menjadi fenomena yang nyata dimana mayoritas masyarakat mengetahui rokok adalah racun yang bisa membunuh individu secara perlahan. Merokok diketahui bisa menjadi penyebab kanker, serangan jantung, impotensi dan kelainan pada kehamilan serta janin. Rokok juga dapat merusak paru-paru serta menjadi penyebab penyakit batuk kronis, memperkecil aliran darah yang berakibat pada ketidاكلancaran darah, meningkatnya tekanan darah dan berujung pada kematian secara tiba-tiba, namun hingga saat ini merokok justru lebih dimengerti dan diterima oleh masyarakat sehari-harinya untuk menghindari pertikaian dan kesenjangan sosial (Ibid, h. : 896 dalam Sadri, 2012).

#### f. Obesitas

Secara umum berat badan adalah faktor risiko yang bisa memicu peningkatan tekanan darah pada suatu populasi. Menurut *National Institutes for Health USA* terdapat perbedaan tekanan darah tinggi pada individu dengan IMT >30 (obesitas) dengan individu yang memiliki IMT

<25 (normal), untuk kategori obesitas prevalensi tekanan darah tinggi sekitar 38% untuk pria dan 32% untuk wanita, untuk kategori status gizi normal prevalensi tekanan darah tinggi sekitar 18% untuk laki-laki dan 17% untuk perempuan (Cortas K dkk, 2008 dalam Nuraini, 2015).

Terdapat sejumlah penelitian global yang menyatakan bahwa berat badan berkaitan dengan tekanan darah. Berdasarkan *Framingham Heart Study*, prevalensi hipertensi berhubungan dengan faktor *overweight* dan obesitas yaitu sekitar 75% pada laki-laki dan 65% pada perempuan tetapi hipertensi tidak berlaku pada semua jenis obesitas. Terdapat dua jenis obesitas yaitu obesitas sentral dan obesitas perifer. Obesitas sentral adalah suatu keadaan dimana lemak berkumpul di bagian perut sedangkan obesitas perifer merupakan suatu keadaan dimana lemak tersebar secara merata di seluruh tubuh. Namun obesitas sentral dianggap sebagai faktor determinan yang sangat berpengaruh dalam peningkatan tekanan darah karena kasus hipertensi banyak dijumpai pada individu yang menderita obesitas sentral daripada obesitas perifer (Putu Yuda, 2011 dalam Hikmah, 2017).

#### g. Kurangnya Aktifitas Fisik

Aktivitas fisik dapat memicu kestabilan tekanan darah seseorang. Orang yang minim bergerak rentan mengalami frekuensi detak jantung yang relatif tinggi. Keadaan ini menyebabkan jantung memompa lebih cepat pada tiap kontraksi, semakin cepat jantung bekerja maka semakin besar tekanan yang diberikan pada dinding arteri akibatnya terjadi peningkatan tahanan perifer yang akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Penurunan kegiatan fisik juga bisa memperparah risiko terjadinya obesitas yang dapat memicu peningkatan risiko hipertensi (Mayo Clinic, 2012 dalam Kartikasari, 2012).

Aktivitas fisik bertujuan untuk melatih tubuh kita agar selalu bugar dan sehat. Energi yang dibutuhkan saat tubuh sedang bergerak dihasilkan dari reaksi metabolisme dalam tubuh yang memerlukan oksigen. Oksigen

ini diangkut oleh darah yang dipompa melalui jantung. Berdasarkan studi penelitian menunjukkan bahwa penderita hipertensi yang rajin berolahraga dapat menurunkan tekanannya sekitar 6-15 mmHg. Berolahraga secara teratur sering dikaitkan dengan pencegahan hipertensi, sebab penurunan tahanan perifer dapat diperoleh dari kebiasaan rajin berolahraga (Efendi Sianturi, 2004 dalam Kartikasari, 2012).

#### h. Kebiasaan Mengonsumsi Alkohol

Konsumsi minuman beralkohol bisa mengancam kesehatan individu karena terjadi peningkatan sintesis kotekolamin yang berdampak pada peningkatan tekanan darah. Salah satu faktor determinan penyakit hipertensi adalah konsumsi alkohol sebab alkohol mempunyai pengaruh yang sebanding dengan karbondioksida dalam hal peningkatan keasaman darah, sehingga darah jadi lebih kental dan jantung berkerja lebih keras (Suiraoaka, 2012 dalam Anggraenny, 2019).

Riset yang dilakukan oleh Komaling et al., (2013) menunjukkan adanya hubungan ( $p=0,000$ ) antara frekuensi mengonsumsi minuman beralkohol 1-3 kali/minggu dan 4-7 kali/minggu dengan kejadian hipertensi. Riset serupa yang dilakukan oleh Santana dkk, (2018) menyatakan bahwa risiko terserang hipertensi makin tinggi berdasarkan level mengonsumsi minuman beralkohol yakni kadang-kadang, 2-3 kali/bulan, 1-2 kali/minggu, dan  $\geq 1$  kali/hari. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah semakin tinggi level konsumsi alkohol maka semakin tinggi pula risiko seseorang menderita hipertensi (Anggraenny, 2019).

Mekanisme meningkatnya tekanan darah akibat konsumsi alkohol belum dapat diidentifikasi secara spesifik, tetapi fakta bahwa mengonsumsi alkohol dalam kurun waktu yang lama akan mengurangi fungsi jantung dan organ lainnya (Suryati, 2005 dalam Wahyuningsih & Wibowo, 2011). Perilaku konsumsi alkohol bisa mengakibatkan penyakit kekurangan gizi, gangguan pada hati, dan rusaknya saraf otak serta

jaringan. Penyebabnya adalah tidak adanya zat gizi yang terdapat di dalam alkohol kecuali kandungan energi (Hikmah, 2017).

Permasalahan alkohol diterangkan dalam QS. Al – Maidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*

Berdasarkan tafsir Al - Misbah oleh Quraish Shihab *khamar* diartikan segala sesuatu yang bersifat memabukkan apapun jenisnya, haram hukum jika dikonsumsi baik dalam jumlah banyak maupun sedikit, maka dari itu hukum haram meminum *khamar* bukan karena terdapat bahan alkohol namun karena adanya potensi memabukkan jika diminum oleh individu yang tidak terbiasa meminumnya (Shihab, 2002 dalam Hikmah 2017).

#### i. Stres

Stress bisa menjadi pemicu meningkatnya tekanan darah. Penyebab terjadinya peningkatan tekanan darah karena terjadi peningkatan hormon adrenalin sehingga jantung bekerja lebih cepat dari sebelumnya yang membuat tekanan darah naik (Bangkinang 2007, dalam Nuraini, 2015).

## 6. Komplikasi Hipertensi

Hipertensi adalah determinan dari penyakit jantung, gagal jantung kongesif, stroke, kebutaan serta ginjal. Secara umum peningkatan tekanan darah adalah salah satu faktor risiko dari komplikasi tersebut. Kerusakan sistem organ dan menurunnya angka harapan hidup sekitar 10-20 tahun bisa dipengaruhi oleh kejadian hipertensi yang tidak ditangani (Cardiology Channel, 2014 dalam Nuraini, 2015).

Kematian pada penderita hipertensi terjadi lebih singkat jika penyakit tersebut tidak dapat dikendalikan dan telah menyebabkan berbagai komplikasi pada organ vital. Mortalitas yang umum terjadi pada mayoritas masyarakat disebabkan oleh penyakit jantung seperti stroke dan gagal ginjal. Kerusakan yang muncul pada penderita hipertensi kategori rendah dan menengah adalah kerusakan pada bagian penglihatan, ginjal, jantung, dan otak. Pada bagian penglihatan terjadi perdarahan retina, gangguan pandangan hingga kebutaan, sementara pada penderita hipertensi kategori berat gangguan yang umum dijumpai adalah gagal jantung, gangguan koroner dan *miokard*. Stroke yang terjadi pada bagian otak dapat menjadi penyebab mortalitas karena terdapat pendarahan yang diakibatkan oleh pecahnya *mikroaneurisma*. Gangguan lainnya ialah proses *thromboembolic* serta iskemia otak sementara (*Transient Ischemic Attack*) (Hoeymans N et al., 1999 dalam Nuraini, 2015).

## 7. Diagnosis Hipertensi

Pemeriksaan tekanan darah bisa dilakukan menggunakan sfigmomanometer dan stetoskop (metode auskultasi) maupun alat pengukur tekanan elektronik. Sistem auskultasi dilakukan dengan cara memperhatikan bunyi *korotkoff* pertama dan kelima (muncul dan berhentinya suara denyut) yang berkaitan dengan tekanan darah sistolik dan diastolik. Pengukuran tensi darah baiknya dilakukan setelah pasien mengosongkan kandung kemih. Selain itu pasien harus duduk bersandar dengan posisi kaki lurus (tidak bersilang) dan menyentuh permukaan sekitar 5 menit. Lengan pasien harus dalam keadaan rileks di atas meja dan posisinya sejajar dengan posisi jantung, disarankan untuk melaksanakan dua kali pemeriksaan dengan jeda 1-2 menit, kemudian hasil pengukuran dapat ditentukan dari nilai rata-rata dua pemeriksaan.

Secara umum hipertensi bisa didiagnosis pada pemeriksaan kedua pasien, lazimnya 1-4 minggu usai pemeriksaan pertama. Hipertensi dapat didiagnosis jika pada kedua pemeriksaan menunjukkan hasil tekanan darah  $\geq 140/90$  mmHg, apabila tekanan darah terlalu tinggi (misal tekanan darah sistolik  $\geq 180$  mmHg), maka diagnosis serta tatalaksana yang sesuai bisa diterapkan usai pemeriksaan pertama yang menunjukkan hipertensi (Weber dkk, 2014 dalam Untario, 2017).

## 8. Pencegahan Hipertensi

Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari komplikasi dari penyakit hipertensi yaitu :

- a. Meminimalisir pemakaian garam, disarankan mengkonsumsi garam tidak lebih dari 2 gram/hari.
- b. Menjaga berat badan agar terhindar dari kegemukan atau obesitas, kategori kegemukan ialah jika berat badan melebihi batas berat badan normal yakni sebesar 10%.
- c. Mengurangi konsumsi lemak yang bertujuan untuk menjaga kestabilan kadar kolesterol dalam darah. Tingginya kadar kolesterol bisa menyebabkan adanya endapan kolesterol pada dinding pembuluh darah, jika endapan tersebut makin banyak bisa terjadi penyumbatan pembuluh nadi serta mempengaruhi peredaran darah.
- d. Berolahraga secara teratur, berdasarkan riset yang telah dilakukan diketahui bahwa rutin berolahraga bisa meminimalisir endapan kolesterol. Jenis olahraga yang dimaksudkan ialah melakukan gerakan pada persendian dan otot tubuh (statis ataupun dinamis), contohnya berjalan dengan jarak yang jauh, renang, dan mengayuh sepeda.
- e. Mengkonsumsi buah dan sayur yang di dalamnya terdapat vitamin maupun mineral. Buah yang di dalamnya kaya akan mineral kalium bisa digunakan sebagai alternatif penurunan tekanan darah.
- f. Hindari perilaku merokok dan minum-minuman beralkohol.

- g. Lakukan relaksasi ataupun meditasi yang bertujuan menghilangkan stress dan menenangkan jiwa. Relaksasi dilakukan dengan cara meregangkan serta mengendurkan otot-otot pada tubuh sembari mengkhayalkan hal-hal yang membuat nyaman dan tenang. Relaksasi bisa juga dilaksanakan sembari mendengar musik ataupun bernyanyi (Tri Prabowo, 2017 dalam Nina & Novita, 2020)

## **B. Tinjauan Tentang Rokok**

### **1. Definisi Rokok**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mendefinisikan rokok sebagai hasil produksi dari tembakau yang dikemas seperti cerutu maupun bentuk lain yang diolah dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* serta jenis lain yang di dalamnya terdapat nikotin, tar ataupun tanpa bahan lain. Selain itu berdasarkan *Canadian Center Occupational Health and Safety* tahun 2011 diketahui bahwa ada 4000 zat kimia dalam tembakau yang terbakar dan 200 diantaranya bersifat toksik, dari beberapa zat tersebut terdapat tiga zat toksik yang paling lazim yang terkandung di dalam rokok yaitu karbon monoksida, tar, dan nikotin (Sitorus et al., 2019).

Rokok adalah olahan dari tembakau yang diproduksi untuk dibakar, dihisap dan dihirup asapnya. Permasalahan rokok bukan hanya tentang perokok itu sendiri tapi juga berkaitan dengan orang yang tidak merokok. Perokok aktif merupakan seseorang yang merokok meskipun hanya sebatang per harinya, baik rutin maupun tidak rutin, adapun perokok pasif merupakan seseorang yang terpapar asap rokok yang berasal dari pembakaran maupun hembusan rokok dari perokok aktif (Nurwidayanti, 2013 dalam Latifah et al., 2020).

## 2. Bahan-Bahan yang Terkandung Dalam Asap Rokok

Perilaku merokok dapat merugikan kesehatan karena dalam rokok terdapat berbagai macam kandungan yang membahayakan tubuh seperti :

### a. Nikotin

Nikotin adalah zat yang memiliki sifat beracun dan bisa menyebabkan kecanduan. Nikotin adalah alkaloid alam yang memiliki sifat racun yang berwujud cair, tak berwarna, serta gampang menguap. Komponen ini bisa berubah warna jadi coklat dan beraroma bak tembakau apabila bercampur dengan udara (Kusuma, 2012 dalam Hikmah, 2017). Kadar nikotin dalam rokok didasarkan pada jenis rokok seperti pada riset Mustolih et al., (2015) yang mengungkapkan adanya keterkaitan antara jenis rokok suami dengan kejadian hipertensi pada istri ( $p=0,027$ ), istri yang memiliki suami perokok dengan jenis rokok non filter berisiko 3,947 kali lebih besar daripada istri yang suaminya merokok dengan jenis filter.

### b. Karbon Monoksida

Karbon monoksida memiliki sifat beracun yang berlawanan dengan  $O_2$  dalam hal pengangkutan dan cara kerjanya. Ketika seseorang sedang merokok terdapat karbon monoksida sebanyak 2-6% dan terdapat 400 ppm karbon monoksida yang dihirup oleh perokok yang bisa menaikkan kadar *carboxyhemoglobin* di dalam darah sebanyak 2-16%. Karbon monoksida yang ditimbulkan karena asap rokok bisa mengakibatkan pembuluh darah “*kramp*”, akibatnya membuat tekanan darah meningkat serta dinding pembuluh darah jadi sobek. Karbon monoksida juga bisa menyebabkan desaturasi hemoglobin, penurunan peredaran  $O_2$  dalam tubuh seperti *miokard*, karbon monoksida menggantikan posisi  $O_2$  di hemoglobin, mengacaukan pelepasan  $O_2$ , serta memacu aterosklerosis (penyumbatan pada dinding pembuluh darah) (Linda, 2010 dalam Hikmah, 2017).

c. Tar

Tar merupakan sekumpulan dari ribuan zat kimia yang terdapat di asap rokok yang memiliki sifat karsinogen. Ketika menghisap/menghirup rokok, tar bisa masuk menuju rongga mulut berupa uap padatan yang ketika dingin akan berbentuk seperti endapan berwarna coklat yang terdapat pada gigi, saluran pernapasan, serta paru-paru. Terdapat radikal bebas dalam tar yang dapat dikaitkan dengan risiko terjadinya kanker (Kusuma, 2012 dalam Hikmah, 2017).

### 3. Hubungan Paparan Asap Rokok dengan Hipertensi

Paparan asap rokok ialah kontaminasi yang masuk ke dalam tubuh perokok aktif dan pasif yang bisa menyebabkan beberapa jenis masalah kesehatan seperti terjadinya peningkatan tekanan darah (hipertensi) (Sitorus et al., 2019). Adanya zat nikotin di dalam rokok dapat membuat tekanan darah meningkat. Nikotin menjadi faktor determinan penggumpalan darah pada pembuluh darah serta pengendapan pada dinding pembuluh darah (Suiraoaka, 2012 dalam Anggraenny, 2019).

Selain itu zat nikotin yang terkandung dalam rokok bisa mengakibatkan peningkatan denyut jantung, penambahan kontraksi otot jantung, memicu vasokonstriksi pada pembuluh darah perifer dan pembuluh darah di ginjal sehingga meningkatnya tekanan darah. Nikotin bisa mempengaruhi sistem saraf simpatik menggunakan stimulus hormon epinefrin sebagai penyebab meningkatnya tekanan darah seseorang. Selain nikotin kenaikan tekanan darah juga dipicu oleh zat karbon monoksida yang dihirup oleh orang yang merokok secara aktif dan pasif. Dalam sel darah merah CO memiliki daya afinitas yang tinggi dengan hemoglobin daripada oksigen, sehingga apabila seorang individu menghirup asap rokok maka kadar oksigen dalam tubuh individu tersebut bakal berkurang, apabila tubuh individu kekurangan oksigen maka tubuh akan mengadakan kompensasi pembuluh darah menggunakan teknik vasokonstriksi. Jika vasokonstriksi terjadi dalam waktu yang lama maka

individu akan gampang terserang aterosklerosis (Sitepoe, 2000 dalam Nastiti 2017).


Kadar nikotin dan tar pada rokok juga mempengaruhi kadar nikotin dan tar pada asap rokok, makin tinggi kadar nikotin dan tar pada rokok maka makin tinggi pula kadarnya pada asap rokok. Nikotin yang terdapat pada rokok dan asap rokok bisa mengakibatkan pengecilan pada pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah. Hal ini diduga dipengaruhi oleh rentang durasi antara lama paparan asap rokok dengan hasil pengukuran tekanan darah. Meningkatnya tekanan darah sebesar 10 mmHg dapat terjadi bila individu menghisap asap rokok paling sedikit dua batang rokok. Tekanan darah terus berada pada level tinggi hingga 30 menit jika terbebas dari asap rokok, ketika dampak nikotin sedikit demi sedikit berkurang maka tekanan darah juga menurun secara perlahan (Rhoden & Schein, 2010 dalam Nurwidayanti & Wahyuni, 2013). Meningkatnya tekanan darah orang yang merokok disebabkan oleh nikotin yang mendorong pelepasan vasopressin dan hormon adrenokortikotropik yang memiliki peran dalam peningkatan tekanan darah serta ritme jantung (Hutapea, 2013 dalam Nurwidayanti & Wahyuni, 2013).

*World Health Organization* 2013 menyatakan bahwa peningkatan permasalahan perokok pasif baik di lingkup tempat kerja maupun tempat tinggal menimbulkan dampak negatif pada perokok pasif. Keadaan ini membuktikan terdapat dua permasalahan serius yakni rokok tidak hanya memiliki dampak buruk bagi diri sendiri tapi juga pada orang sekitarnya. Merokok pasif merupakan seorang non-perokok yang terpapar asap rokok, dimana paparan asap rokok tersebut berisi gabungan hembusan asap rokok dan asap rokok dari pembakaran langsung serta perangkat merokok yang lain seperti pipa, ceruti, bidi, dan lain-lain yang tercampur dengan udara sekitar (Bachtiar, 2010 dalam Nurwidayanti & Wahyuni, 2013). Meskipun efek jangka panjang dari rokok terhadap tekanan darah masih belum dapat dijelaskan secara rinci, namun efek sinergis merokok dengan tekanan darah

yang tinggi terhadap risiko penyakit kardiovaskuler salah satunya hipertensi secara umum dapat ditemukan dikalangan masyarakat. Perokok berat dapat dihubungkan dengan peningkatan insiden hipertensi maligna. Pada studi autopsi dibuktikan kaitan erat antara kebiasaan merokok dengan adanya aterosklerosis pada seluruh pembuluh darah. Merokok pada penderita tekanan darah tinggi semakin meningkatkan risiko kerusakan pada pembuluh darah arteri. Kebiasaan merokok dapat diukur menggunakan kuesioner yang terdiri dari variabel jenis rokok, konsumsi rokok, lama merokok, dan status menjadi perokok pasif yang secara tidak langsung merupakan faktor pendukung terjadinya hipertensi dibarengi dengan faktor risiko yang lain, namun sangat perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian terkait dengan paparan asap rokok terhadap perokok pasif agar dapat mengurangi faktor risiko hipertensi (Widiansah, 2016 dalam Erna Krisnawati Sarumaha, 2018).


Barnoya & Glantz (2005) juga telah melakukan riset menggunakan studi *case control* di Cina yang menghasilkan terjadi peningkatan jumlah responden yang menderita penyempitan pembuluh darah pada jantung dan dapat dikaitkan dengan akumulasi asap rokok yang dihirup dan lama paparan, ada juga riset dari Ashari (2011) yang menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara lama responden terpapar asap rokok dengan kejadian hipertensi pada orang yang tidak merokok dengan nilai  $OR=3,6$ . Efek asap rokok tidak hanya berujung pada penyakit hipertensi, menurut penelitian Asomaning et al., (2009) jika sejak lahir hingga usia 25 tahun terpapar asap rokok maka berisiko 1,29 kali terkena penyakit paru-paru, kemudian penelitian oleh Yankelevitz et al., (2013) mengungkapkan akumulasi batang rokok yang dikonsumsi perokok aktif (suami) memiliki hubungan terhadap prevalensi hipertensi dengan ( $p=0.00;OR=1.4$ ).

### C. Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka teori modifikasi dari teori Depkes RI (2006), Anggraini (2009), Sutanto (2010), Suraoka (2012) Komaling & Wongkar (2013), Aripin (2015) Sumber : (Nastiti, 2017 : 30)

#### D. Kerangka Konsep



Keterangan

 : Variabel Bebas/Independen

 : Variabel Terikat/Dependen

**Gambar 2.2 Kerangka Konsep**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kuantitatif, pendekatan analitik observasional dengan desain *cross sectional* yang bertujuan melihat hubungan antara paparan asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Penelitian kuantitatif ialah jenis penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk angka (Sugiyono, 2003).

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu di wilayah kerja Puskesmas Wotu tepatnya di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Penelitian akan dilakukan pada tanggal 19 Juli – 19 Agustus 2021.

#### **B. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **1. Populasi**

Populasi merupakan jumlah total dari objek penelitian (Notoatmodjo, 2010). Populasi penelitian ini ialah seluruh perempuan usia produktif 15-64 tahun yang tinggal di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah 2.386 orang.

##### **2. Sampel**

###### **a. Besar Sampel**

Sampel ialah objek dari penelitian yang dapat mewakili populasi (Notoatmodjo, 2010). Besar sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan:

$n$  = besar sampel

$N$  = besar populasi

$d$  = tingkat ketepatan 5% (0,05)

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

$$n = \frac{2.386}{1 + 2.386(0,05)^2}$$

$$n = \frac{2.386}{6,965}$$

$$n = 343 \text{ sampel}$$

#### b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling* berdasarkan penilaian tertentu yang sinkron dengan kriteria inklusi dan eksklusi.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Berjenis kelamin perempuan yang berusia 36-65 tahun yaitu usia yang termaksud dalam usia masa dewasa akhir sampai masa lansia akhir berdasarkan klasifikasi usia Depkes R1 2009
- 2) Memiliki anggota keluarga yang memiliki kebiasaan merokok di dalam rumah
- 3) Sehat secara fisik dan mental

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tidak bersedia menjadi responden
- 2) Keadaan sakit parah sehingga tidak memungkinkannya dilakukan wawancara
- 3) Memiliki kebiasaan merokok

Penentuan jumlah sampel pada tiap dusun ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$ni = \frac{Ni}{N} n$$

Keterangan :

$ni$  = jumlah sampel per dusun

$Ni$  = jumlah populasi dusun

$n$  = Jumlah sampel

$N$  = jumlah populasi keseluruhan

Berdasarkan rumus di atas maka didapatkan sampel pada masing-masing dusun yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Sampel Berdasarkan Dusun**

No	Dusun	Populasi	Sampel
1.	Saloborro	703	101
2.	Sambote	687	99
3.	Campae	467	67
4.	Lengkong	446	64
5.	Salualla	83	12
<b>Total</b>		<b>2.386</b>	<b>343</b>

Sumber : Data Sekunder 2020

## C. Metode Pengumpulan Data

### 1. Pengumpulan Data Primer

Data primer ialah suatu data yang dihasilkan langsung dari responden berupa hasil wawancara atau pengisian kuesioner. Data primer penelitian ini dikumpulkan dari hasil wawancara responden menggunakan kuesioner. Dalam

hal pengisian kuesioner, responden akan diberi penjelasan tentang tujuan serta langkah-langkah mengisi kuesioner oleh peneliti.

## **2. Pengumpulan Data Sekunder**

Data sekunder dikumpulkan dari hasil pencatatan dan pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur yakni data prevalensi penderita hipertensi dan 10 penyakit tertinggi yang diderita oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari Kantor Kecamatan Wotu yaitu berupa data penduduk wanita usia produktif serta diperoleh dari beberapa literatur seperti jurnal dan berbagai penelusuran data yang relevan dari internet.

## **D. Instrumen Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen yaitu :

1. *Inform Consent*/lembaran yang berisi bukti pernyataan kesediaan seseorang untuk menjadi responden.
2. Kuesioner yang akan digunakan dalam proses wawancara dengan responden.

## **E. Validitas dan Reliabilitas**

### **1. Uji Validitas**

Validitas bisa diartikan sebagai indikator yang membuktikan sebuah alat ukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas bertujuan untuk melihat valid tidaknya suatu instrumen penelitian yang bisa ditentukan dengan cara menghubungkan antara skor butir dengan skor total (Widi, 2011).

### **2. Uji Reliabilitas**

Reliabilitas merupakan indikator yang membuktikan suatu alat ukur bisa dipercaya ataupun diandalkan. Sebuah alat ukur bisa disebut reliabel apabila dilakukan pengukuran berkali-kali maka hasil pengukuran tetap konsisten. Kuesioner dikatakan reliabel, apabila nilai *Cronbach Alpha* > nilai r tabel (Widi, 2011).

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Adapun proses pengolahan data secara kuantitatif melalui tahap berikut :

#### **a. *Editing* (Mengedit Data)**

*Editing* ialah melakukan pengecekan kembali keakuratan data yang diperoleh dari kuesioner.

#### **b. *Coding* (Mengkode Data)**

*Coding* ialah memberikan kode pada jawaban responden yang bertujuan untuk mempermudah dalam *entry* data.

#### **c. *Entry* (Memasukkan Data)**

*Entry* ialah proses input data ke program SPSS pada komputer untuk dianalisis.

#### **d. *Cleaning* (Membersihkan Data)**

*Cleaning* dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali jika ada kemungkinan kesalahan kode sehingga dilakukan koreksi terhadap data yang *missing*. Setelah *cleaning* selesai selanjutnya dilakukan proses analisis data.

### **2. Analisis Data**

#### **a. Analisis Univariat**

Analisis univariat ialah teknik analisis data yang mana tiap-tiap variabel dianalisis tanpa dihubungkan dengan variabel lain yang bertujuan untuk memperoleh distribusi dan persentase. Analisis univariat penelitian ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden tiap variabel yang disajikan dalam tabel.

#### **b. Analisis Bivariat**

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan uji *chi-square* yakni keputusan uji didasarkan pada

nilai  $p$  (*value*) dengan membandingkan nilai  $\alpha$  sebesar 0.05 (95%), jika nilai  $p < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (Notoatmodjo, 2010).



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


##### a. Kondisi Geografis

Penelitian ini dilakukan di salah satu wilayah kerja Puskesmas Wotu yaitu Desa Bawalipu dengan luas wilayah sekitar 1.373,81 Ha dan dari segi geografis, Desa Bawalipu terdiri dari batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Tarengge
Sebelah Timur	: Desa Lampenai
Sebelah Selatan	: Laut Teluk Bone
Sebelah Barat	: Desa Balo-Balo

**Gambar 4.1**

**Peta Wilayah Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**



b. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Desa Bawalipu pada tahun 2020 sebanyak 6.703 jiwa yang terdiri dari 3.353 laki-laki dan 3.350 perempuan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.052, kemudian pembagian wilayah administratif Desa Bawalipu terdiri dari 5 dusun, yaitu Saloborro, Sambote, Campae, Lengkong dan Salualla.

c. Sosial Budaya

Penduduk Desa Bawalipu sebagian besar berasal dari Etnis Bugis dengan mayoritas pemeluk agama Islam. Adapun mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah Nelayan, Petani/Peternak, dan Wiraswasta, kemudian pola penggunaan tanah umumnya digunakan sebagai lahan pemukiman, persawahan, dan perkebunan (kakao, kelapa sawit, jagung dan lain sebagainya).

d. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

**Tabel 4.1**

**Sarana Prasarana Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**


<b>Jenis Sarana/Prasarana</b>	<b>Sarana/Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
Pemerintahan	Kantor Desa	2
	Kantor BPD	1
Kesehatan	Pustu	1
	Polindes/Poskesdes	1
	Posyandu	2
Pendidikan	Sekolah	6
Peribadatan	Masjid	7

*Sumber : Data Sekunder 2020*

Berdasarkan tabel 4.1, mengenai sarana dan prasarana di Desa Bawalipu menunjukkan bahwa terdapat 3 sarana pemerintahan, 4 sarana kesehatan, 6 sarana pendidikan, dan 7 sarana peribadatan.

## 2. Hasil Analisis Univariat

### a. Umur




**Diagram 4.1**

**Distribusi Berdasarkan Klasifikasi Umur Responden di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

(Sumber : Data Primer, 2021)

Berdasarkan diagram 4.1 menunjukkan bahwa dari total 343 responden, diperoleh kelompok usia paling banyak adalah kelompok usia dewasa akhir (36-45 tahun) sebanyak 185 responden (54%) dan kelompok usia paling sedikit adalah kelompok usia lansia akhir (56-55 tahun) sebanyak 57 responden (17%).

### b. Pendidikan



**Diagram 4.2**

**Distribusi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

(Sumber : Data Primer, 2021)

Berdasarkan diagram 4.2 menunjukkan bahwa dari total 343 responden, didapatkan tingkat pendidikan paling banyak yakni tamat SD/MI Sederajat sebanyak 102 responden (30%) dan paling sedikit tidak/belum pernah sekolah sebanyak 26 responden (7%).

c. Pekerjaan

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Pekerjaan Responden di Desa Bawalipu**  
**Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Tidak Bekerja/IRT	208	60.3
Petani	6	1.7
PNS/TNI/Polri	31	9.0
Wiraswasta	89	26.2
Buruh	1	0.3
Karyawan Swasta	1	0.3
Honorar	4	1.2
Tenaga Kesehatan	3	0.9
<b>Total</b>	<b>343</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer 2021*

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari total 343 responden, jenis pekerjaan paling banyak yakni mengurus rumah tangga sebanyak 208 responden (60.3%) dan jenis pekerjaan paling sedikit yakni menjadi buruh sebanyak 1 responden (0.3%).

## d. Pekerjaan Kepala Rumah Tangga

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Responden di Desa Bawalipu**  
**Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021**

<b>Pekerjaan Kepala Rumah Tangga</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Belum/Tidak Bekerja	4	1.5
Petani/Pekebun/Peternak	85	24.8
PNS/TNI/Polri	34	10.2
Wiraswasta	49	14.3
Nelayan	124	36.2
Karyawan Swasta	12	3.5
Buruh	18	5.2
Pensiunan	7	1.7
Honorer	10	2.6
<b>Total</b>	<b>343</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2021

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari total 343 responden, jenis pekerjaan kepala rumah tangga responden paling banyak yaitu menjadi nelayan sebanyak 124 responden (36.2%) dan jenis pekerjaan paling sedikit yaitu belum/tidak bekerja sebanyak 4 responden (1.5%).


## e. Status Perkawinan



**Diagram 4.3**  
**Distribusi Berdasarkan Status Perkawinan Responden di Desa Bawalipu**  
**Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**  
*(Sumber : Data Primer, 2021)*

Berdasarkan diagram 4.3 menunjukkan bahwa dari total 343 responden, terdapat 299 responden (87.2%) yang berstatus menikah dan 44 responden (12.8%) yang berstatus belum/pernah menikah.


f. Riwayat Hipertensi



**Diagram 4.4**  
**Distribusi Berdasarkan Riwayat Hipertensi Responden di Desa Bawalipu**  
**Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**  
(Sumber : Data Primer, 2021)

Berdasarkan diagram 4.4 menunjukkan bahwa dari total 343 responden, terdapat 138 responden (40.2%) pernah didiagnosis hipertensi dan 205 responden (59.8%) tidak pernah didiagnosis hipertensi.

g. Umur Pertama Kali Terdiagnosis Hipertensi




**Diagram 4.5**

**Distribusi Responden Berdasarkan Umur Pertama Kali Terdiagnosis Hipertensi di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

(Sumber : Data Primer, 2021)

Berdasarkan diagram 4.5 menunjukkan bahwa dari total 138 responden, diperoleh kelompok umur pertama kali terdiagnosis hipertensi paling banyak yaitu kelompok usia lansia awal sebanyak 72 responden (52%) dan paling sedikit pada kelompok usia dewasa awal sebanyak 5 responden (3%).

h. Status Hipertensi




**Diagram 4.6**

**Distribusi Berdasarkan Status Hipertensi Responden di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

(Sumber : Data Primer, 2021)

Berdasarkan diagram 4.6 menunjukkan bahwa dari total 343 responden, terdapat 138 responden (40,2%) menderita hipertensi dan 205 responden (59,8%) tidak menderita hipertensi.


i. Jumlah Perokok Aktif dalam Keluarga Responden



**Diagram 4.7**  
**Distribusi Berdasarkan Jumlah Perokok Aktif dalam Keluarga Responden**  
**di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**  
*(Sumber : Data Primer, 2021)*

Berdasarkan diagram 4.7 menunjukkan bahwa dari total 343 responden, terdapat 70 responden (20,4%) yang memiliki perokok aktif dalam keluarganya sebanyak > 1 orang dan terdapat 273 responden (79,6%) sebanyak 1 orang.


j. Kategori Lama Paparan Asap Rokok



**Diagram 4.8**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Lama Paparan Asap Rokok**  
**di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**  
*(Sumber : Data Primer, 2021)*

Berdasarkan diagram 4.8 menunjukkan bahwa dari total 343 responden, terdapat 253 responden (73.8%) yang intens terpapar asap rokok >10 tahun dan 90 responden (26.2%) intens terpapar asap rokok ≤10 tahun.


k. Kategori Lokasi Terpapar Asap Rokok



**Diagram 4.9**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Lokasi Terpapar Asap Rokok**  
**di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**  
*(Sumber : Data Primer, 2021)*

Berdasarkan diagram 4.9 menunjukkan bahwa dari total 343 responden, terdapat 130 responden (37.9%) yang sering terpapar di dalam rumah dan 213 responden (62.1%) sering terpapar di luar rumah.


#### 1. Kategori Reaksi Responden Saat Terpapar Asap Rokok



**Diagram 4.10**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Reaksi Saat Terpapar Asap Rokok**  
**di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**  
*(Sumber : Data Primer, 2021)*

Berdasarkan diagram 4.10 menunjukkan bahwa dari total 343 responden, terdapat 98 responden (28.6%) yang tidak menghindari saat terpapar asap rokok dan 245 responden (71.4%) yang menghindari saat terpapar asap rokok.

m. Kategori Jenis Rokok yang dihisap Oleh Perokok Aktif




**Diagram 4.11**

**Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Rokok yang dihisap oleh Perokok Aktif di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

*(Sumber : Data Primer, 2021)*

Berdasarkan diagram 4.11 menunjukkan bahwa dari total 343 responden, terdapat 51 responden (14.9%) yang anggota keluarganya menghisap jenis rokok yang tidak menggunakan filter dan 292 responden (75.8%) menggunakan filter.

n. Kategori Jumlah Batang Rokok yang dihisap oleh Perokok Aktif



**Diagram 4.12**

**Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Batang Rokok yang dihisap Oleh Perokok Aktif di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

*(Sumber : Data Primer, 2021)*

Berdasarkan diagram 4.12 menunjukkan bahwa dari total 343 responden, terdapat 80 responden (23.3%) yang ikut menghirup asap rokok  $\geq 5$  batang/hari dan 263 responden (76.7%) ikut menghirup  $< 5$  batang/hari.

### 3. Hasil Analisis Bivariat

#### a. Hubungan Jumlah Perokok Aktif dalam Keluarga terhadap Kejadian Hipertensi

**Tabel 4.4**  
**Analisis Hubungan Jumlah Perokok Aktif dalam Keluarga Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Wanita di Wilayah Kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

Jumlah Perokok Aktif Dalam Keluarga	Status Hipertensi				N	%	<i>p value*</i>	PR
	Hipertensi		Tidak Hipertensi					
	n	%	n	%				
> 1 orang	29	41.4	41	58.6	70	100	0.819	1.037
1 orang	109	39.9	164	60.1	273	100		
Total	138	40.2	205	59.8	343	100		

Sumber : Data Primer, 2021 (\**chi-square*)

Berdasarkan tabel 4.4, hubungan antara variabel jumlah perokok aktif dalam keluarga terhadap kejadian hipertensi diketahui dari total 70 responden yang memiliki anggota keluarga yang merokok sebanyak  $> 1$  orang terdapat 29 responden (41.4%) menderita hipertensi dan 41 responden (58.6%) tidak menderita hipertensi. Hasil analisis *chi-square* diperoleh nilai  $p=0.819$ , karena nilai  $p>0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah perokok aktif dalam keluarga terhadap kejadian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Adapun nilai PR didapatkan sebesar 1.037 yang berarti jumlah perokok aktif dalam keluarga bukan merupakan faktor risiko hipertensi.

**b. Hubungan Lama Paparan Asap Rokok terhadap Kejadian Hipertensi**

**Tabel 4.5**  
**Analisis Hubungan Lama Paparan Asap Rokok Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Wanita di Wilayah Kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

Lama Paparan Asap Rokok	Status Hipertensi				N	%	<i>p value*</i>	PR
	Hipertensi		Tidak Hipertensi					
	n	%	n	%				
> 10 Tahun	114	45.1	139	54.9	253	100	0.002	1.691
≤ 10 Tahun	24	26.7	66	73.3	90	100		
Total	138	40.2	205	59.8	343	100		

Sumber : Data Primer, 2021 (\**chi-square*)

Berdasarkan tabel 4.5, hubungan antara variabel lama paparan asap rokok terhadap kejadian hipertensi diketahui dari total 253 responden yang intens terpapar asap rokok selama > 10 tahun terdapat 114 responden (45.1%) menderita hipertensi dan 139 responden (54.9%) tidak menderita hipertensi. Hasil analisis *chi-square* diperoleh nilai  $p=0.002$ , karena nilai  $p<0.05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti ada hubungan yang signifikan antara lama paparan asap rokok terhadap kejadian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Adapun nilai PR didapatkan sebesar 1.691 yang berarti lama paparan asap rokok > 10 tahun merupakan faktor risiko terhadap kejadian hipertensi pada wanita, berisiko 1.691 kali lebih besar daripada wanita yang terpapar asap rokok ≤ 10 tahun.

**c. Hubungan Lokasi Terpapar Asap Rokok terhadap Kejadian Hipertensi**

**Tabel 4.6**  
**Analisis Hubungan Lokasi Terpapar Asap Rokok Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Wanita di Wilayah Kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

Lokasi Terpapar Asap Rokok	Status Hipertensi				N	%	<i>p value*</i>	PR
	Hipertensi		Tidak Hipertensi					
	n	%	n	%				
Di Dalam Rumah	46	35.4	84	64.6	130	100	0.153	0.819
Di Luar Rumah	92	43.2	121	56.8	213	100		
Total	138	40.2	205	59.8	343	100		

Sumber : Data Primer, 2021 (\**chi-square*)

Berdasarkan tabel 4.6, hubungan antara variabel lokasi terpapar asap rokok terhadap kejadian hipertensi diketahui dari total 130 responden yang sering terpapar asap rokok di dalam rumah terdapat 46 responden (35.4%) menderita hipertensi dan 84 responden (64.6%) tidak menderita hipertensi. Hasil analisis *chi-square* diperoleh nilai  $p=0.153$ , karena nilai  $p>0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara lokasi terpapar asap rokok terhadap kejadian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Adapun nilai PR didapatkan sebesar 0.819 yang berarti wanita yang sering terpapar asap rokok di luar rumah merupakan faktor protektif yang dapat mengurangi dampak hipertensi.

**d. Hubungan Reaksi Saat Terpapar Asap Rokok terhadap Kejadian Hipertensi**

**Tabel 4.7**  
**Analisis Hubungan Reaksi Saat Terpapar Asap Rokok Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Wanita Di Wilayah Kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

Reaksi Saat Terpapar Asap Rokok	Status Hipertensi				N	%	<i>p value</i> *	PR
	Hipertensi		Tidak Hipertensi					
	n	%	n	%				
Tidak Menghindar	56	60.9	36	39.1	98	100	0.000	1.709
Menghindar	82	32.7	169	67.3	245	100		
Total	138	40.2	205	59.8	343	100		

Sumber : Data Primer, 2021 (\**chi-square*)

Berdasarkan tabel 4.7, hubungan antara reaksi responden saat terpapar asap rokok terhadap kejadian hipertensi diketahui dari total 98 responden yang tidak menghindar saat terpapar asap rokok terdapat 56 responden (60.9%) menderita hipertensi dan 36 responden (39.1%) tidak menderita hipertensi. Hasil analisis *chi-square* diperoleh nilai  $p=0.000$ , karena nilai  $p < 0.05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti ada hubungan yang signifikan antara reaksi responden saat terpapar asap rokok terhadap kejadian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Adapun nilai PR didapatkan sebesar 1.709 yang berarti reaksi menghindar saat terpapar asap rokok merupakan faktor risiko terhadap kejadian hipertensi pada wanita, berisiko 1.709 kali lebih besar daripada wanita yang tidak menghindar saat terpapar asap rokok.

e. Hubungan Jenis Rokok yang dihisap Perokok Aktif terhadap Kejadian Hipertensi

**Tabel 4.8**  
**Analisis Hubungan Jenis Rokok yang dihisap Perokok Aktif Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Wanita di Wilayah Kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

Jenis Rokok yang dihisap Perokok Aktif	Status Hipertensi				N	%	<i>p value*</i>	PR
	Hipertensi		Tidak Hipertensi					
	n	%	n	%				
Tidak Menggunakan Filter	19	37.3	32	62.7	51	100	0.638	0.914
Menggunakan Filter	119	40.8	173	59.2	292	100		
<b>Total</b>	<b>138</b>	<b>40.2</b>	<b>205</b>	<b>59.8</b>	<b>343</b>	<b>100</b>		

Sumber : Data Primer, 2021 (\*chi-square)

Berdasarkan tabel 4.8, hubungan antara variabel jenis rokok yang dihisap oleh perokok aktif terhadap kejadian hipertensi diketahui dari total 51 responden yang anggota keluarganya menghisap jenis rokok yang tidak menggunakan filter terdapat 19 responden (37.3%) menderita hipertensi dan 32 responden (62.7%) tidak menderita hipertensi. Hasil analisis *chi-square* diperoleh nilai  $p=0.638$ , karena nilai  $p > 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis rokok yang dihisap oleh perokok aktif terhadap kejadian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Adapun nilai PR didapatkan sebesar 0.914, artinya wanita yang terpapar jenis rokok menggunakan filter dari anggota keluarga merupakan faktor protektif yang dapat mengurangi dampak terjadinya hipertensi.

**f. Hubungan Jumlah Batang Rokok yang dihisap oleh Perokok Aktif terhadap Kejadian Hipertensi**

**Tabel 4.9**  
**Analisis Hubungan Jumlah Batang Rokok yang dihisap oleh Perokok Aktif Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Wanita di Wilayah Kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

Jumlah Batang Rokok yang dihisap oleh Perokok Aktif	Status Hipertensi				N	%	<i>p value*</i>	PR
	Hipertensi		Tidak Hipertensi					
	n	%	n	%				
≥ 5 Batang/Hari	50	62.5	30	37.5	80	100	0.000	1.871
< 5 Batang/Hari	88	33.5	175	66.5	263	100		
Total	138	40.2	205	66.5	343	100		

Sumber : Data Primer, 2021 (\**chi-square*)

Berdasarkan tabel 4.9, hubungan antara variabel jumlah batang yang dihisap oleh perokok aktif terhadap kejadian hipertensi diketahui dari total 80 responden yang ikut menghirup asap rokok sebanyak  $\geq 5$  batang/hari terdapat 50 responden (62.5%) menderita hipertensi dan 30 responden (37.5%) tidak menderita hipertensi. Hasil analisis *chi-square* diperoleh nilai  $p=0.000$ , karena nilai  $p<0.05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti ada hubungan yang signifikan antara jumlah batang yang dihisap oleh perokok aktif terhadap kejadian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Adapun nilai PR didapatkan sebesar 1.871 yang berarti wanita yang ikut menghirup asap rokok  $\geq 5$  batang/hari merupakan faktor risiko terhadap kejadian hipertensi, berisiko 1.871 kali lebih besar daripada wanita yang ikut menghirup asap rokok  $< 5$  batang/hari.

## B. Pembahasan

### 1. Hubungan Jumlah Perokok Aktif dalam Keluarga Terhadap Kejadian Hipertensi

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden yang menderita hipertensi hanya memiliki perokok aktif dalam keluarganya sebanyak 1 orang yaitu 109 responden (79%). Secara statistik tidak terdapat keterkaitan antara jumlah perokok aktif dalam keluarga terhadap kejadian hipertensi dengan nilai  $p=0.819$  yang kemungkinan disebabkan oleh akumulasi asap rokok yang ikut dihirup oleh responden, terlihat dari hasil tabulasi silang antara jumlah perokok aktif dalam keluarga dengan jumlah batang rokok yang dihisap oleh perokok aktif diketahui sebagian besar responden yang memiliki perokok aktif sebanyak 1 orang dalam keluarganya ikut menghirup  $<5$  batang/hari yaitu sebanyak 234 responden (85.7%) sedangkan 39 responden (14.3%) ikut menghirup  $\geq 5$  batang/hari. Berdasarkan hasil pengumpulan data hubungan responden dengan perokok aktif dalam keluarganya diketahui rata-rata responden terpapar asap rokok oleh suaminya yaitu sebanyak 195 responden (71.4%) yang kebanyakan bekerja sebagai seorang nelayan (36.2%) dan waktunya lebih banyak dihabiskan di luar rumah yaitu pada saat bekerja di laut sehingga mempengaruhi penurunan aktivitas sehari-hari yang dilakukan di rumah termasuk mengurangi frekuensi merokok karena suami dari responden lebih banyak merokok pada saat melaut.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Banegas (2017) yang menemukan tidak ada hubungan secara statistik antara paparan asap rokok dengan tekanan darah, kolesterol serum dan glukosa puasa. Selain itu ditemukan juga kesamaan dengan penelitian Sehun et al., (2017) diketahui paparan asap rokok tidak memiliki hubungan dengan tekanan darah, lipid, atau kadar glukosa puasa berdasarkan kadar nikotin dalam urin. Berbeda dengan riset dari Siregar et al., (2020) yang mengungkapkan adanya hubungan yang bermakna antara frekuensi paparan

asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada masyarakat pesisir Kota Medan ( $p=0.019$ ), kemudian pada penelitian Nugraheni & Wijayanti (2018) diketahui paparan asap rokok memiliki hubungan dengan kejadian hipertensi ( $p=0.000$ ). Selain itu penelitian ini juga bertentangan dengan penelitian oleh Matthew & Budoff (2013) yaitu ada keterkaitan antara jumlah perokok aktif dalam keluarga terhadap kejadian hipertensi dengan  $OR=2,3$ .

Jumlah orang yang merokok dalam keluarga dapat dikaitkan dengan akumulasi asap rokok, makin banyak perokok aktif dalam satu keluarga maka makin banyak asap rokok yang dihasilkan. Komponen dari asap rokok yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi tekanan darah salah satunya ialah nikotin yang masuk ke pembuluh darah kapiler dalam paru-paru dan disebarkan ke aliran darah hingga ke otak. Kemudian otak nantinya menanggapi adanya nikotin dengan cara memberikan tanda di kelenjar adrenal agar melepaskan epinefrin, selanjutnya hormon ini membuat terjadinya penyempitan pada pembuluh darah yang akhirnya mendesak jantung agar memompa lebih cepat dari biasanya sebab adanya tekanan yang sangat tinggi (Williams & Wilkins, 2002 dalam Mustolih et al., 2015). Semakin banyak perokok aktif dalam lingkungan tempat tinggal maka semakin banyak pula nikotin yang dapat diserap oleh tubuh yang dapat meningkatkan risiko terserang hipertensi dengan memperhatikan jangka waktu dan durasi paparan seperti riset yang dilakukan oleh Park et al., (2018) yang menyatakan bahwa durasi paparan asap rokok secara signifikan terkait dengan hipertensi pada wanita Korea yang tidak pernah merokok dengan nilai ( $p=0.003$ ). Rekomendasi diberikan bagi responden agar selalu mengingatkan perokok aktif dalam keluarga untuk mengurangi kebiasaan merokok di dalam rumah agar dapat meminimalisir risiko paparan asap rokok sebagai faktor risiko hipertensi.

Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [رواه ابن ماجة وأحمد ومالك]

Artinya :

”Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain” (HR. Ibn Majah, Ahmad, dan Malik)

Suatu perbuatan yang bisa menyebabkan adanya bahaya untuk dirinya sendiri maupun orang lain merupakan hal yang dilarang menurut agama. Betapa ruginya perokok pasif akibat permasalahan rokok ini, tetapi kenyataan yang terjadi perokok justru lebih dimengerti masyarakat untuk menghindari adanya kesenjangan sosial dan keributan tertentu. Asap rokok yang dihirup perokok pasif memiliki efek yang buruk tidak hanya untuk dirinya namun juga bagi orang lain di sekitarnya salah satunya adalah dapat berpotensi mengalami kanker (Yunus Muhammad, 2009 dalam Sadri, 2012).

Merokok banyak mendatangkan kemudatan ketimbang kemaslahatan. Kebanyakan dari perokok aktif berfikir bahwa rokok bermanfaat untuk menghilangkan stress, pelengkap penampilan, serta membantu pertumbuhan ekonomi negara, padahal sejatinya rokok sangatlah berbahaya bagi kesehatan seperti yang lazim diketahui yaitu dapat mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner, kanker, impotensi, gangguan faal, gangguan janin dan kehamilan. Selain itu terdapat riset yang mengungkapkan bahwa perilaku merokok dapat menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi (ketidakmampuan pria dalam ketahanan ereksi yang cukup pada saat berhubungan seksual) dengan nilai PR=1.728 yang berarti individu yang sudah terbiasa merokok memiliki risiko 1,7 kali lebih besar menderita disfungsi ereksi daripada individu yang tidak pernah merokok (Darmi et al., 2020).

## 2. Hubungan Lama Paparan Asap Rokok Terhadap Kejadian Hipertensi

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden yang menderita hipertensi telah terpapar asap rokok selama >10 tahun, hanya 24 responden (26.7%) yang terpapar  $\leq 10$  tahun. Secara statistik terdapat keterkaitan antara lama paparan asap rokok terhadap kejadian hipertensi dengan nilai  $p=0.002$  yang kemungkinan disebabkan oleh latar belakang keluarga responden yang dulunya memiliki orang tua perokok yang menandakan responden telah terpapar asap rokok sejak kecil dan setelah menikah juga memiliki suami perokok sehingga paparan asap rokok terjadi terus-menerus sehingga dapat mengakibatkan terjadinya hipertensi. Berdasarkan hasil pengumpulan data umur pertama kali responden intens terpapar asap rokok, terdapat 199 responden (58.6%) yang terpapar asap rokok sejak kecil. Rentang waktu paparan asap rokok yang dialami oleh individu sebenarnya tergantung dimana individu tersebut menetap, apabila individu tinggal menetap dengan lingkungan keluarga atau lingkungan kerja yang sudah terbiasa merokok maka individu tersebut bisa makin lama terpapar asap rokok, jika paparan asap rokok makin lama terjadi maka makin banyak dampak negatif yang akan muncul khususnya bagi kesehatan (Auerelio, 2010 dalam Siregar et al., 2020).

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Park et al., (2018) yang menunjukkan keterkaitan kejadian hipertensi pada wanita yang tidak pernah merokok ( $p=0.011$ ) dimana kejadian hipertensi mayoritas terjadi pada wanita yang terpapar  $\geq 2$  jam/hari dengan nilai  $OR=1.50$ . Penelitian ini juga serupa dengan penelitian Indrawati & Martini (2021) diketahui ada keterkaitan antara lama paparan asap rokok >33 di dalam rumah dengan kejadian hipertensi pada ibu rumah tangga ( $p=0.01; OR=3.5$ ), namun berbeda dengan penelitian Shen et al., (2021) diketahui tidak ada keterkaitan antara paparan asap rokok dengan hipertensi  $OR=1.10$ , tetapi ketika responden secara bersamaan terpapar asap rokok dan kekurangan vitamin D maka estimasi risiko hipertensi meningkat menjadi 1,83 dengan efek interaktif yang

signifikan antara ( $p=0,009$ ), kemudian penelitian dari Mustolih et al., (2015) juga menyatakan tidak ada hubungan yang bermakna antara lama paparan dengan kejadian hipertensi pada perokok pasif ( $p= 0,063$ ) dengan nilai  $PR=2.29$ .

Lama paparan asap rokok berhubungan langsung dengan akumulasi toksik yang tertumpuk di dalam tubuh orang yang tidak merokok, makin lama paparan asap rokok terjadi maka akan mengakibatkan adanya masalah bagi kesehatan. Lama paparan asap rokok juga dapat dikaitkan dengan jumlah perokok yang tinggal bersama di lingkungan perokok pasif (Mustolih et al., 2015). Perokok aktif yang sering merokok  $\geq 1$  pak/hari akan semakin mudah terserang hipertensi disebabkan zat kimia beracun pada rokok memiliki sifat kumulatif (dapat ditumpuk), apabila akumulasi dosis sudah sampai pada titik toksik maka gangguan yang muncul dapat dirasakan (Sitepu, 2012 dalam Nurwidayanti & Wahyuni, 2013).

Menurut Hakim A (2012) menyatakan bahwa kebiasaan merokok yang terus menerus terjadi atau adanya paparan asap rokok yang bersifat menahun dapat dikatakan salah satu faktor risiko penting yang mengakibatkan terjadinya penyakit aterosklerosis sebagai penyebab meningkatnya tekanan darah individu. Perilaku merokok bisa mempengaruhi dinding pembuluh darah dan memacu kejadian pembekuan pembuluh darah. Darah yang kental dan pembuluh arteri yang lentur dapat terjadi akibat adanya paparan asap rokok, walaupun tidak secara langsung mengakibatkan peningkatan tekanan darah namun perilaku merokok memiliki risiko yang sangat tinggi khususnya bagi individu yang menderita hipertensi (Suheni, dkk, 2007 dalam Suryanda, 2017). Rekomendasi diberikan bagi responden agar selalu mengingatkan perokok aktif dalam keluarga untuk menjauh dari jangkauan anggota keluarga yang lain ketika sedang merokok.

### 3. Hubungan Lokasi Terpapar Asap Rokok Terhadap Kejadian Hipertensi

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden yang menderita hipertensi sering terpapar asap rokok di luar rumah yaitu sebanyak 92 responden (66.7%). Secara statistik tidak terdapat keterkaitan antara lokasi terpapar asap rokok terhadap kejadian hipertensi dengan nilai  $p=0.153$  yang kemungkinan disebabkan oleh reaksi responden yang cenderung menghindari asap rokok, terlihat dari hasil tabulasi silang antara lokasi terpapar asap rokok dengan reaksi saat terpapar asap rokok diketahui sebagian besar responden yang sering terpapar asap rokok di luar rumah memilih untuk menghindari asap rokok sembari menutup mulut dan hidung yaitu sebanyak 158 responden (74.1%) sedangkan 55 responden (25.9%) membiarkan dirinya terpapar asap rokok. Frekuensi responden yang sering terpapar asap rokok di luar rumah yaitu sebanyak 172 responden (80.8%) terpapar di lingkungan sekitar tempat tinggal, sebanyak 33 responden (15.5%) terpapar di tempat-tempat umum, dan sebanyak 8 responden (2.3%) terpapar di tempat kerja. Sebagian besar responden sering terpapar asap rokok di luar rumah kemungkinan disebabkan oleh aktivitas rutin yang dilakukan responden yaitu selain mengerjakan pekerjaan rumah responden juga memiliki aktivitas rutin seperti menjual dan mengolah hasil tangkapan dari laut seperti ikan, udang, cumi-cumi dan sebagainya serta mengolah rumput laut menjadi bibit baru.

Penelitian ini serupa dengan penelitian Suryanda (2017) yakni tidak ditemukannya hubungan secara statistik antara paparan asap rokok dengan kejadian hipertensi sekunder pada wanita pengguna kontrasepsi di Puskesmas Tanjung Agung ( $p=0.057$ ). Selain itu ditemukan hasil yang sama dengan penelitian Setiawati (2015) yang menunjukkan hasil tidak ada keterkaitan antara paparan asap rokok dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil ( $p=0.857$ ). Berbeda pada penelitian Kim et al., (2019) yang mengungkapkan paparan asap rokok di dalam ruangan maupun di tempat kerja dapat dikaitkan dengan kejadian hipertensi pada perokok pasif  $OR=1.16$ ,

penelitian ini juga tidak sesuai dengan Yasnani et al., (2018) diketahui hasil uji statistik nilai  $OR=2.453$  yang berarti paparan asap rokok ditemukan sebagai salah satu faktor risiko kejadian hipertensi dikarenakan responden sering terpapar asap rokok di lingkungan sekitarnya baik di rumah maupun di tempat kerja, selanjutnya penelitian dari Lupsa et al., (2015) diketahui ada hubungan antara kebiasaan terpapar asap rokok di dalam rumah dengan kejadian hipertensi dengan  $OR=1.19$ , ada pula riset dari Nan et al., (2015) juga menunjukkan hasil yang berbeda dimana terdapat 118 peserta terpapar asap rokok dan 88,4% di antaranya terpapar asap rokok di rumah, setelah disesuaikan dengan usia, BMI, pendidikan, pekerjaan, status minum, aktivitas fisik, dan status menopause, perokok pasif memberikan peningkatan risiko hipertensi sekitar dua kali lipat dengan nilai  $OR=1,99$ .

Riset Kesehatan Dasar 2013 menyatakan bahwa kebiasaan perokok aktif merokok di rumah baik itu suami atau anggota keluarga lain memiliki dampak negatif untuk orang-orang di sekitarnya sekalipun kondisi rumah mempunyai jendela/lubang angin yang sesuai dengan standar. Zat berbahaya yang terkandung dalam rokok akan sangat berbahaya apabila terhirup baik untuk perokok itu sendiri maupun individu bukan perokok yang tersebar di ruang tertutup dan sangat sulit terjadi pergantian  $CO_2$  menjadi  $O_2$ . Berdasarkan teori tersebut perilaku merokok di rumah sangat membahayakan anggota keluarga yang lain utamanya seorang istri sebab pada masa kini masalah mengenai asap rokok bukan saja dipusatkan pada perokok aktif tetapi lebih kepada efek yang didapatkan oleh perokok pasif. Makin meresahkannya permasalahan yang dialami bagi individu yang tidak merokok baik itu di rumah ataupun di sekitar tempat bekerja dapat menimbulkan efek yang merugikan akibat asap rokok dan makin memperburuk risiko terjadinya hipertensi. Hal ini tentunya dapat dijadikan acuan nyata bahwasanya terdapat efek ganda pada asap rokok yang tentunya bukan hanya dihirup oleh individu yang merokok tetapi ikut juga dihirup oleh individu di sekelilingnya (Bustan, 2014 dalam Aryani, 2019).

Permasalahan rokok hingga kini masih termasuk permasalahan nasional yang harus ditangani sebab melibatkan beberapa aspek permasalahan dalam hidup seperti pada aspek ekonomi, sosial, politik, dan yang paling utama aspek kesehatan. Berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh rokok membuat beberapa pihak mengusulkan perlunya dilakukan proteksi kepada masyarakat khususnya perokok pasif. Salah satu proteksi yang nyata ialah adanya Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan suatu perwujudan amanah dari Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan kemudian diatur dalam peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Habibi et al., 2016), oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mengeluarkan peraturan Nomor 26 Tahun 2015 pasal 4 ayat (2) yang berisi tentang penegakan aturan larangan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Tantangan terberat yang harus dihadapi pemerintah terkait penerapan KTR salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari merokok. Kawasan Tanpa Rokok yaitu sebuah tempat atau ruang yang mana tidak diperbolehkan untuk merokok atau membuat kegiatan produksi, memperjualbelikan, mengiklankan serta mempromosikan produk dari tembakau. Aturan ini berlaku di ruang publik seperti fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat peribadatan, pusat perdagangan, transportasi umum, tempat kerja, dan ruang publik lain yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Adanya KTR bertujuan untuk melindungi masyarakat dari peningkatan risiko kesehatan yang nantinya timbul akibat rokok sebab terjadi pencemaran lingkungan oleh asap rokok (Rahajeng, 2015). Rekomendasi diberikan bagi pemerintah agar lebih tegas mengenai imbauan dan penetapan sanksi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas umum, diharapkan melalui penerapan KTR kebiasaan merokok dapat terkendali dan berkurang atau hilang secara bertahap sehingga mengurangi

risiko seseorang terserang hipertensi dan penyakit lainnya yang terkait dengan asap rokok.

#### **4. Hubungan Reaksi Saat Terpapar Asap Rokok Terhadap Kejadian Hipertensi**

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden yang tidak menderita hipertensi memilih untuk menghindari asap rokok sembari menutup mulut dan hidung yaitu sebanyak 169 responden (67.3%). Secara statistik terdapat keterkaitan antara reaksi responden saat terpapar asap rokok terhadap kejadian hipertensi dengan nilai  $p=0.000$  yang kemungkinan disebabkan responden terpapar jenis rokok yang menggunakan filter, terlihat dari hasil tabulasi silang antara reaksi saat terpapar asap rokok dengan jenis rokok yang dihisap oleh perokok aktif dalam keluarga diketahui sebagian besar responden menghindar saat terpapar jenis rokok yang menggunakan filter yaitu sebanyak 214 responden (73.3%) sedangkan 78 responden (26.7%) tidak menghindar. Berdasarkan hasil pengumpulan data sikap responden terhadap perokok aktif di sekitarnya terdapat 245 responden (71.4%) yang berani menegur orang lain yang merokok di sekitarnya sedangkan 98 responden (28.6%) memilih untuk tidak menegur.

Penelitian ini serupa dengan penelitian Akpa et al., (2021) yang menemukan secara keseluruhan responden mengaku menjadi perokok pasif dimana 32,6% diantaranya adalah penderita hipertensi dengan nilai signifikansi  $p < 0,0001$ . Paparan asap rokok secara independen terkait dengan risiko hipertensi terutama di kalangan wanita usia dewasa dan lansia. Selain itu penelitian ini juga serupa dengan penelitian Chaar (2020) diketahui ada hubungan secara statistik terkait dengan paparan asap rokok dengan *outcome* kardiovaskular yaitu pada kejadian hipertensi (OR=1.554) dan peningkatan kadar kolesterol (OR=1.213), selanjutnya pada penelitian Aryani, (2019) diketahui ada hubungan yang bermakna antara paparan asap rokok dengan kejadian pre-hipertensi ( $p=0.020$ ), namun penelitian ini tidak serupa dengan penelitian

Nurwidayanti & Wahyuni (2013) yang mana reaksi menghindari asap rokok ketika terpapar di rumah tidak memiliki keterkaitan secara statistik terhadap kejadian hipertensi dengan nilai  $OR=0.99$ .

Teori *Health Belief Model* menjelaskan mengenai seseorang yang dengan mudah mengimplementasikan sebuah perilaku jika seseorang ini meyakini kalau perilaku yang disarankan bisa meminimalisir risiko penyakit yang nantinya timbul (Sitorus et al., 2019). Berdasarkan hasil observasi diketahui rata-rata responden memiliki pandangan bahwa terdapat manfaat dalam upaya melindungi diri dari efek negatif yang ditimbulkan oleh paparan asap rokok dengan cara menghindar sembari menutup hidung dan mulut. *The British Medical Association* berpendapat tidak ditemukannya jarak aman untuk bebas dari asap rokok (ASH Research Report, 2011 dalam Nurwidayanti & Wahyuni 2013), namun Santi Oktorini (2009) berasumsi bahwa asap rokok dapat menyebar di udara bebas selama 100 detik, maka jarak aman untuk menghindar bagi individu yang tidak merokok adalah sekitar 10 meter. Rekomendasi diberikan bagi responden yang masih membiarkan dirinya terpapar asap rokok agar sebisa mungkin menjauhi sumber paparan sembari menutup mulut dan hidung sehingga dapat mencegah terjadinya hipertensi dan penyakit lainnya.

Menjauhi keburukan seharusnya diutamakan ketimbang mendapatkan kebaikan dari keburukan tersebut. Pendapat mengenai rokok yang bisa menciptakan sensasi rileks dan memulihkan pikiran merupakan pendapat yang keliru sebab perilaku merokok lebih banyak mendatangkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatan. Petunjuk tersebut dapat ditafsirkan agar manusia sebisa mungkin menghindari keburukan yang muncul akibat rokok daripada melihat sisi manfaatnya karena asap rokok yang berasal dari ujung batang rokok hingga puntung rokok yang dihembuskan ke udara lalu dikembalikan ke mulut dan hidung perokok aktif merupakan bagian yang terpaksa harus dihirup oleh individu yang tidak merokok. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai *side stream smoking* yang akibatnya sama seperti *mainstream smoking*. Melakukan suatu perbuatan yang bisa mengakibatkan

timbulnya bahaya baik untuk pribadi maupun untuk manusia lain merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama (Muhammad Yunus BS 2009, dalam Sadri, 2012). Allah SWT menjelaskan dalam QS. Ali – Imran/3:148.

فَاتَّهَمَهُمُ اللَّهُ تَوَابِ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٤٨)

Terjemahnya :

*“Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan”.*

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al – Misbah QS. Ali – Imran/3:148 menjelaskan tentang penyambutan Allah swt atas permintaan banyak orang yang dengan ikhlas memanjatkan doa, percaya pada pertolongan dan sungguh-sungguh berusaha serta patuh pada Allah swt dan Rasul. Allah swt memberikan anugerah kepada mereka berupa balasan baik di dunia seperti kejayaan, kelengkapan, ketentraman batiniah, reputasi serta balasan baik di akhirat yakni surga dan keridaan Allah swt yang sangat tidak mungkin dapat digambarkan dengan perkataan maupun terbesit dalam hati seorang manusia dan Allah swt mencintai manusia-manusia yang selalu berbuat baik dalam kehidupan (Shihab, 2002 h.292-293), dari penggalan ayat *“dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan”* dapat dikaitkan dengan sikap responden yang telah sadar akan bahaya dari asap rokok sehingga responden memilih untuk menghindari dan berbuat baik kepada dirinya sendiri agar terjaga dari segala macam penyakit yang nantinya akan timbul akibat rokok.

##### **5. Hubungan Jenis Rokok yang dihisap Oleh Perokok Aktif Terhadap Kejadian Hipertensi**

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden yang menderita hipertensi terpapar jenis rokok yang menggunakan filter yaitu sebanyak 119 responden (86.2%). Secara statistik tidak terdapat keterkaitan antara jenis rokok yang dihisap oleh perokok aktif dengan kejadian hipertensi dengan nilai  $p=0.638$  yang kemungkinan disebabkan oleh lokasi responden saat terpapar asap rokok, terlihat dari

hasil tabulasi silang antara jenis rokok yang dihisap oleh perokok aktif dengan lokasi responden saat terpapar asap rokok diketahui sebagian besar responden sering terpapar jenis rokok yang menggunakan filter di luar rumah yaitu sebanyak 184 responden (86.4%) sedangkan di dalam rumah yaitu sebanyak 29 responden (13.6%). Penelitian yang dilakukan Susanna dkk (2003) menyatakan nikotin yang terkandung dalam jenis rokok yang tidak menggunakan filter lebih besar kadarnya ketimbang jenis rokok yang menggunakan filter. Berdasarkan hasil pengumpulan data merek rokok yang dihisap oleh perokok aktif dalam keluarga responden, rata-rata keluarga responden menghisap rokok yang menggunakan filter. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 telah diterangkan secara gamblang tentang peraturan kandungan tar dan nikotin yang masih masuk dalam kategori wajar untuk diperdagangkan dan harus diuji di laboratorium yang sudah terakreditasi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2003).

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Elfira Riris Rindayati (2018) yang menyatakan paparan asap rokok ( $PR=2,008$ ) tidak berkaitan dengan kejadian hipertensi pada penduduk wanita di Desa Siman. Selain itu penelitian Ansari et al., (2012) juga mengungkapkan hal yang serupa diketahui perokok pasif tidak berhubungan dengan kejadian hipertensi terlihat dari 893 subjek yang menderita hipertensi, hipertensi lebih tinggi terjadi pada individu yang merokok ketimbang dengan individu yang terpapar asap rokok dan bukan perokok namun perokok aktif dan pasif memiliki efek peningkatan faktor risiko aterosklerosis yang dapat mengakibatkan terjadinya penyakit kardiovaskular. Bertentangan dengan penelitian Zhang et al., (2021) yang menemukan hubungan potensial antara paparan asap yang tinggi dengan risiko hipertensi ( $OR=1.13$ ,  $p=0,007$ ) makin banyak paparan yang diterima maka makin tinggi risiko hipertensi, kemudian penelitian ini juga tidak serupa dengan penelitian Gac et al., (2021) berdasarkan analisis regresi menunjukkan bahwa paparan asap rokok yang tinggi, BMI yang tinggi, dan tekanan darah

sistolik/diastolik yang tinggi adalah faktor risiko independen yang dapat mengakibatkan penebalan jaringan adiposa epikardial pada pasien hipertensi.

Kadar nikotin dan tar dalam rokok tergantung pada asap atau keluaran yang dihasilkan, makin banyak asap rokok yang dihasilkan oleh perokok aktif maka makin banyak zat nikotin dan tar yang diterima oleh perokok pasif yang menyebar di udara bebas. Pengecilan pembuluh darah dapat diakibatkan oleh adanya kandungan nikotin pada rokok dan nantinya akan membuat tekanan darah meningkat dengan mengamati rentang waktu individu terpapar asap rokok dan akumulasi asap rokok yang ikut dihirup per harinya. Hasil uji menggunakan penelitian eksperimen ditemukan hasil yakni tekanan darah yang berada pada kategori normal sesudah merokok 1 batang jenis rokok non filter mengalami peningkatan sebesar 21,1 mmHg untuk sistolik dan 13 mmHg untuk diastolik, kemudian responden yang memiliki tekanan darah yang berada pada kategori tinggi sesudah merokok 1 batang rokok jenis non filter juga mengalami peningkatan sebesar 31,5 mmHg untuk sistolik dan 18,4 mmHg untuk diastolik (Mustolih et al., 2015).

Menurut Razak (2017) nikotin ialah suatu zat toksik yang berbahaya untuk individu karena ketika nikotin berada pada dosis 60 mg dapat mengakibatkan kematian dalam beberapa saat, diasumsikan hanya 10% dari jumlah keseluruhan nikotin yang masuk ke dalam tubuh dan butuh rentang waktu yang panjang, namun pada kadar yang rendah nikotin bersifat membius. Nikotin bisa meningkatkan percepatan kerja detak jantung (pada keadaan normal hingga 20 kali/menit), mengakibatkan penurunan suhu kulit hingga 1-2 derajat sebab terjadi pengecilan pembuluh darah, serta terjadinya pelepasan gula ke dalam aliran darah. Nikotin juga dapat mempengaruhi kerja otak dan sistem syaraf. Selain itu, nikotin dapat memberi pengaruh menenangkan dan merupakan obat yang bersifat adiktif (Muslimin, 2017 dalam Latifah et al., 2020). Rekomendasi diberikan bagi perokok aktif agar memperhatikan *personal hygiene* terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga lain.

Permasalahan mengenai hukum haramnya merokok menuai banyak pro dan kontra yang berporos pada adanya manfaat dan dampak buruk baik bagi individu ataupun komunitas. Kelompok yang mendukung haramnya rokok untuk dikonsumsi walaupun memiliki sedikit manfaat meninjau lebih banyak mendatangkan efek negatif baik untuk kesehatan individu itu sendiri ataupun lingkungan perokok pasif di sekelilingnya, berdasarkan pemahaman tersebut merokok akhirnya diharamkan. Allah SWT berfirman dalam surah Al - Baqarah/2:195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

Terjemahnya :

*“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.*

Berdasarkan tafsir Al – Misbah Quraish Shihab menjelaskan surah Al-Baqarah/2:195 dapat bermakna janganlah seorang manusia enggan menafkahkan hartanya untuk kebaikan yang sukai oleh Allah swt, sebab jika hal tersebut terjadi sama saja manusia menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Betapa ruginya jika harta benda tidak dimanfaatkan di jalan yang benar, karena nantinya dapat dihabiskan oleh diri sendiri juga dihabiskan oleh keturunannya, serta dapat membuat binasa pemiliknya di hari kemudian, oleh karena itu diharuskan melakukan perbuatan baik tidak hanya ketika berjihad atau berperang tetapi dalam tiap gerakan serta langkah kaki. Sebagaimana sabda Rasul saw yang menerangkan arti ihsan seperti: *“menyembah Allah swt, seakan-akan melihat-Nya dan bila itu tidak tercapai maka yakinlah bahwa Dia melihatmu”*, demikianlah kata ihsan berarti perintah untuk berbuat hal-hal yang bersifat positif seakan-akan diri ini terlihat oleh Allah swt ataupun selalu merasa diawasi oleh-Nya. Pemahaman terkait kontrol pribadi dapat membekas dan membuat individu selalu melakukan perbuatan baik serta

memperlakukan orang jauh lebih bagus ketimbang memperlakukan diri sendiri (Shihab, 2002 h.249).

Bentuk tubuh yang sempurna sesungguhnya anugerah dari Allah swt yang patut dipelihara agar tidak menggunakan sesuatu yang memiliki sifat merusak fungsi raga dan akal (*intoxicant*) seperti alkohol, ganja dan lain-lain (Muhammad Yunus BS, 2009 dalam Sadri, 2012). Kaitannya dengan penelitian ini adalah hendaknya responden menjaga tubuh yang telah diberikan oleh Allah swt dalam bentuk terbaik agar tidak mengonsumsi zat-zat berbahaya salah satunya zat nikotin, CO, dan tar dalam asap rokok yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan apalagi mengonsumsi dalam jangka panjang. Ulama' menyepakati tentang semua persoalan yang lebih banyak mendatangkan kemudharatan ialah haram, namun yang menjadi permasalahan timbul persepsi yang berbeda pada saat meneliti dan mempelajari esensi rokok yang mana rokok memiliki manfaat yang relatif kecil untuk manusia. Acuan para ulama dalam penetapan mengenai rokok dapat dijelaskan berdasarkan QS. Al- Baqarah/2:195, walaupun rokok sangat membahayakan nyawa seseorang, perokok di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan (Ferizal, 2016).

#### **6. Hubungan Jumlah Batang Rokok yang dihisap Oleh Perokok Aktif Terhadap Kejadian Hipertensi**

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden yang tidak menderita hipertensi ikut menghirup asap rokok <5 batang/hari yaitu sebanyak 175 responden (66.5%). Secara statistik terdapat keterkaitan antara jumlah batang rokok yang dihisap oleh perokok aktif terhadap kejadian hipertensi dengan nilai  $p=0.000$  yang kemungkinan disebabkan oleh lama responden telah terpapar asap rokok, terlihat dari hasil tabulasi silang antara jumlah batang rokok yang dihisap oleh perokok aktif dengan lama paparan asap rokok diketahui sebagian besar responden terpapar asap rokok selama <10 tahun dan ikut menghirup asap rokok <5 batang/hari yaitu

sebanyak 72 responden (80%) sedangkan responden yang ikut menghirup  $\geq 5$  batang/hari sebanyak 18 responden (20%).

Penelitian ini serupa dengan penelitian Yang et al., (2017) didapatkan efek negatif bagi wanita yang memiliki suami perokok yang mana jumlah batang rokok suami signifikan ( $p < 0.001$ ) terhadap prevalensi hipertensi dengan nilai OR=1.22 (1-5 batang/hari), 1.24 (6-10 batang/hari), 1.32 (11-15 batang/hari), 1.37 (16-20 batang/hari), dan 1.75 ( $\geq 21$  batang/hari). Penelitian Wu et al., (2017) juga menyatakan prevalensi hipertensi lebih tinggi pada wanita yang berstatus sebagai perokok pasif (71,9%) daripada wanita yang tidak terpapar asap rokok (66,1%) dengan nilai OR=1.38, responden yang tidak minum obat anti hipertensi dan terpapar asap rokok  $> 2$  jam/hari secara signifikan berkaitan dengan peningkatan tekanan darah, namun penelitian ini tidak serupa dengan penelitian Janah & Martini (2017) mengungkapkan kejadian pre-hipertensi tidak dapat dikaitkan dengan paparan asap rokok ( $p=0.60$ ; OR=0.67).

Kandungan zat nikotin pada rokok bisa mengakibatkan terjadinya penyempitan pembuluh darah dan membuat tekanan darah meningkat. Hal ini dapat dikaitkan dengan lama paparan dengan hasil pengukuran tekanan darah. Tekanan darah dapat meningkat hingga 10 mmHg untuk sistolik dan diastolik apabila individu menghirup asap rokok paling sedikit dua batang/hari, kemudian tekanan darah akan terus berada pada level tinggi sampai 30 menit sesudah terbebas dari hembusan asap rokok. Ketika zat nikotin sedikit demi sedikit hilang maka tekanan darah akan menurun secara perlahan. Hutapea (2013) menyatakan bahwa tingginya tekanan darah seorang perokok disebabkan oleh nikotin yang dapat memicu lepasnya vasopressin serta hormon adrenokortikotropik yang membuat peningkatan tekanan darah dan detak jantung, namun menurut Surono (2012) pada seseorang yang terpapar asap rokok dari perokok kategori berat maka tekanan darahnya akan terus berada pada level yang tinggi seharian penuh (Nurwidayanti & Wahyuni, 2013).

Ratusan zat kimia yang terkandung dalam tar sebagian besar dapat memicu terjadinya kanker, kemudian nikotin dapat memicu pelepasan kotekolamin yang dapat menyebabkan peningkatan detak jantung. Selain itu terdapat zat karbon monoksida pada asap rokok sekitar 1-5 % yang dapat mengakibatkan pembentukan *carboxyhemoglobin* pada eritrosit dalam darah. Perokok aktif memiliki *carboxyhemoglobin* lebih tinggi daripada orang normal pada umumnya, sekitar 0,5-2 %. Karbon monoksida juga dapat melukai dinding arteri yang nantinya menjadi penyebab penyakit aterosklerosis serta jantung koroner (Bustan 2007, dalam Mustolih et al., 2015).

Zat kimiawi yang menyebabkan tekanan darah tinggi pada perokok pasif (istri) dapat menjadi salah satu risiko individu mengalami hipertensi jika perokok aktif (suami) masuk dalam kategori perokok berat begitupun sebaliknya penurunan risiko terjadinya hipertensi bisa dilakukan jika seorang suami mengurangi jumlah batang rokok yang dihisap per harinya. Hipertensi terjadi akibat adanya nikotin dan tar yang menyebabkan terjadinya peningkatan adrenalin, membuat jantung berdegup lebih cepat sehingga jantung juga terpaksa memompa darah lebih keras (Ariestianto, E & Untari 2010, dalam Mustolih et al., 2015). Menurut Bustan (2007) individu bisa menderita hipertensi jika telah intens terpapar asap rokok sekitar 15 batang/hari selama 10 tahun sedangkan penelitian Yankelevitz (2013) mengungkapkan individu bisa menderita hipertensi jika terpapar asap rokok sekitar 25 batang/hari selama 15 tahun.

Asap rokok yang bertebaran di udara bebas di dalamnya terkandung beberapa zat kimiawi yang bisa menyatu dengan partikel lain yang ada pada udara dan bisa bertahan di udara selama 2-3 jam meskipun terdapat lubang angin atau ventilasi yang memadai. Efektivitas yang dimiliki rokok sangat tinggi dalam hal persebaran zat toksik yang mengandung racun apabila dihirup di dalam rumah (Pitriani et al., 2021). Berdasarkan penelitian Ying Yang dkk, (2017) diketahui analisis dosis - respon wanita yang terpapar asap rokok oleh suami lebih berisiko tinggi terserang hipertensi.

Paparan asap rokok suami membuat wanita terlihat seperti perokok aktif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh peran *third-hand smoke* (THS) yang bertahan lama menyebabkan asap rokok terakumulasi pada tangan, rambut, pakaian, dan kamar yang mempengaruhi dalam peningkatan risiko hipertensi pada wanita. Rekomendasi diberikan bagi responden yang masih memiliki anggota keluarga yang merokok di dalam rumah agar membuka ventilasi rumah dan memperhatikan kebersihan rumah untuk menghilangkan asap rokok yang mengendap dan menempel dalam rumah. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan mau itu untuk diri sendiri ataupun orang lain di sekelilingnya yang diterangkan dalam QS. Al – Isra/17:26-27.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Terjemahnya :

*“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.*

Quraish Shihab dalam tafsir Al- Misbah menjelaskan QS. Al – Isra/17:26-27 yaitu Allah swt memberi perintah kepada umat muslim agar memperhatikan hak atas keluarga dekat ataupun jauh baik itu dari keluarga ibu ataupun ayah. Menyerahkan haknya seperti memberi pertolongan, kebaikan, dan terus menjalin tali persaudaraan. Hak yang diberikan bukan hanya tentang materi namun termasuk non-materi berupa pemberian hikmah. Pertolongan tidak hanya diberikan kepada keluarga tetapi pertolongan juga sebaiknya diberikan untuk fakir miskin dan musafir walaupun tidak termasuk dalam lingkup keluarga, bisa berupa pemberian zakat ataupun sedekah sesuai kebutuhan mereka dan diterangkan juga mengenai larangan menghambur-hamburkan uang semauanya lebih tepatnya larangan memiliki sifat boros yakni menghabiskan harta benda tidak pada kodratnya serta tidak ada manfaatnya. Kata

*tabzir* diartikan oleh para ulama sebagai pengeluaran hak bukan pada tempatnya dan hanya untuk kepuasan pribadi, apabila terdapat manusia yang menghamburkan atau menghabiskan harta bendanya di dalam kebaikan maka yang seperti ini bukan termasuk seseorang yang memiliki sifat boros (Shihab, 2002 h.71-72).

Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir menjelaskan QS. Al – Isra/17:26-27 ialah perintah kaum muslimin dan muslimah agar senantiasa membelanjakan harta bendanya di jalan yang benar. Menurut Ibnu Mas'ud kata *tabzir* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dibelanjakan menggunakan harta benda untuk hal yang bersifat buruk yang tidak mendatangkan maafkan sedangkan menurut Qatadah kata *tabzir* ialah menghabiskan harta untuk kemaksiatan, di jalan yang keliru yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan di atas muka bumi (Sadri, 2012). Imam Al-Syaikani berpendapat perilaku merokok merupakan perbuatan *tabzir* yang menyia-nyiakan harta benda. Perilaku merokok juga sama sekali tidak mendatangkan manfaat apabila terdapat efek menenangkan dan rileks ketika merokok itu hanyalah sugesti dari perokok, sebaliknya kerusakan yang akan timbul dapat mempengaruhi kesehatan jiwa dan raga seseorang, habisnya harta benda tanpa adanya benefit yang diperoleh. Allah swt menggolongkan orang pemboros seperti saudara dari setan (Asy Syaukany & Fat-hul Qadir, h.122 dalam Sadri, 2012).

Larangan untuk menghamburkan harta benda dan bersenang-senang secara boros dalam kehidupan memang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an terlebih lagi Allah swt sangat membenci orang yang memiliki sifat boros. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu sikap boros yang dimiliki oleh anggota keluarga responden yang dengan sadar membelanjakan hartanya untuk hal yang sia-sia dan banyak mendatangkan kemudharatan bagi dirinya dan orang di sekitarnya. Pemborosan juga dapat disamakan dengan kata mubazir yakni menghabiskan harta benda tanpa adanya manfaat atau hal-hal baik yang telah dijanjikan oleh Allah swt akan dibalas dengan pahala yang berlimpah. Al-Qur'an telah jelas menjelaskan agar selalu bersikap sederhana dalam

perumpamaan yang sangat baik pula. Allah swt memerintahkan seseorang agar menjauhi sifat *tabzir*, berlebihan, dan kikir (Rofiqoh, 2021).

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur pada saat penelitian merupakan kuesioner yang belum baku sehingga memungkinkan terjadinya pengumpulan data yang kurang spesifik dan bervariasi.
2. Terdapat beberapa lansia yang menjadi sampel dalam penelitian dimana mereka mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan tidak bisa membaca kuesioner dikarenakan indera penglihatannya mulai terganggu sehingga memungkinkan terjadinya bias pada hasil penelitian.
3. Waktu penelitian yang singkat dengan jumlah sampel yang cukup banyak dan respon informan yang berbeda-beda menjadi satu hambatan tersendiri bagi peneliti dalam mengumpulkan informasi yang akurat.
4. Tidak dilakukan wawancara terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh responden sehari-harinya yang dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah responden.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan paparan asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak ada hubungan antara jumlah perokok aktif dalam keluarga terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu ( $p=0.819$ ).
2. Ada hubungan antara lama paparan asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu ( $p=0.002$ ).
3. Tidak ada hubungan antara lokasi terpapar asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu ( $p=0.153$ ).
4. Ada hubungan antara reaksi perokok pasif saat terpapar asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu ( $p=0.000$ ).
5. Tidak ada hubungan antara jenis rokok yang dihisap oleh perokok aktif terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu ( $p=0.638$ ).
6. Ada hubungan antara jumlah batang rokok yang dihisap oleh perokok aktif terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu ( $p=0.000$ ).

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan paparan asap rokok terhadap kejadian hipertensi pada wanita di wilayah kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021, terdapat beberapa saran yang ditawarkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagi fasilitas kesehatan diharapkan untuk membuat program pekan pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Selain itu perlu juga dilakukan edukasi tentang hipertensi dan PHBS rumah tangga khususnya pada poin “tidak ada orang yang merokok dalam rumah” bisa menggunakan media cetak seperti (poster, leaflet, brosur, pamflet, spanduk) maupun menggunakan media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat umum.
2. Bagi Pemerintah harus lebih tegas mengenai imbauan dan penetapan sanksi dalam penerapan kawasan tanpa rokok pada fasilitas-fasilitas umum agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari paparan asap rokok.
3. Bagi perokok aktif disarankan untuk mengurangi kebiasaan merokok di dalam rumah dan jauh dari jangkauan anggota keluarga lainnya agar dapat meminimalisir risiko paparan asap rokok yang menjadi penyebab hipertensi.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel durasi paparan asap rokok dan kadar nikotin dalam darah perokok pasif agar dapat menambah informasi terkait paparan asap rokok dengan kejadian hipertensi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR PUSTAKA

- Akpa, O. M., Okekunle, A. P., Asowata, J. O., & Adedokun, B. (2021). Passive Smoking Exposure and The Risk of Hypertension Among Non-Smoking Adults: The 2015–2016 NHANES Data. *Clinical Hypertension*, 27(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s40885-020-00159-7>.
- Anggraenny, N. (2019). Hubungan Merokok Dengan Tekanan Darah Pada Awak Kapal di Wilayah Kerja KKP KLS III Palangka Raya. *Universitas Airlangga*.
- Ansari, R., Khosravi, A., Bahonar, A., Shirani, S., Kelishadi, R., & Khosravi, Z. (2012). Risk Factors of Atherosclerosis in Male Smokers, Passive Smokers, and Hypertensive Nonsmokers in Central Iran. *ARYA Atherosclerosis Journal*, 8(2), 90-95.
- Aryani, N. (2019). Hubungan Paparan Asap Rokok Dengan Kejadian Prehipertensi Pada Usia 26-30 Tahun di Desa Wihini Durin Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah 2019. *Jurnal Darma Agung Husada*, 7(2), 80–86.
- Ashari, A. (2011). Perokok Pasif Sebagai Faktor Risiko Hipertensi Pada Wanita Usia 40-70 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang. *Universitas Diponegoro*.
- Asomaning, K., Ms, M. B. C., Miller, D. P., Liu, G., Wain, J. C., Lynch, T. J., Su, L., & Christiani, D. C. (2009). Second Hand Smoke, Age of Exposure and Lung Cancer Risk. *NIH Public Access*, 61(1), 13–20.
- Azizah, N. (2018). Analisis Faktor Risiko Penyebab Hipertensi pada Wanita Dewasa Muda dan Kaitannya dengan Permasalahan Kehamilan di Wilayah Kerja Puskesmas Teladan Tahun. *Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Banegas, J. R. (2017). Lack of Association between Passive Smoking and Blood Pressure, Lipids, and Fasting Glucose. *J Hypertension*, 35(10), 1952–1954. <https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001467>
- Barnoya, J., & Glantz, S. A. (2005). Cardiovascular Effects of Secondhand Smoke : Nearly as Large as Smoking Joaquin. *Circulation*, 10(111), 2684–2698. <http://doi: 10.1161/circulationaha.104.492215>.
- Banegas, J. R. (2017). Lack of Association between Passive Smoking and Blood Pressure, Lipids, and Fasting Glucose. *J Hypertension*, 35(10), 1952–1954. <https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001467>.

CDC.(2020).Hypertension.www.cdc.gov.https://www.cdc.gov/nchs/fastats/hypertension.htm.

Chaar, S. (2020). Cardiovascular Outcomes in Nonsmokers Exposed to Secondhand Smoke : Results From The National Health and Nutrition Examination Survey ( NHANES ) 2015-2016. *Universitas Florida*.

Darmi, G. P., Negara, M. O., & Kurniawan, Y. (2020). Hubungan Merokok dengan Kejadian Disfungsi Ereksi pada Pegawai Laki-Laki di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. *Jurnal Medika Udayana*, 9(11), 75–79. https://doi.org/doi:10.24843.MU.2020.V9.i11.P12

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. (2020). Pengukuran Tekanan Darah Penduduk  $\geq 15$  Tahun Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. *Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur*.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. (2018). Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar. *Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*.

Elfira Riris Rindayati. (2018). Analisis Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Pada Penduduk Wanita di Desa Siman. *STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun*.

Erna Krisnawati Sarumaha. (2018). Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kejadian Hipertensi Pada Usia Dewasa Muda di UPTD Puskesmas Perawatan Plus Teluk dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2018. *Institut Kesehatan Helvetia*.

Ferizal, I. (2016). Mekanisme Pengujian Hukum Oleh Ulama Dalam Menetapkan Fatwa Haram Terhadap Rokok. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 55–64.

Fitri, A. D., Mariana, Ismah, Z., Irfani, T. H., Gurfon, M., & Adil, M. (2018). Risk Factors of High Blood Pressure in Children Exposed to Passive Smoke. *LIFE*. 3(3), 158–167. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20319/lijhls.2018.33.158167.

Gac, P., Czerwinska, K., Poreba, M., Macek, P., Mazur, G., & Poreba, R. (2021). Environmental Tobacco Smoke Exposure Estimated Using the SHSES Scale and Epicardial Adipose Tissue Thickness in Hypertensive Patients. *Cardiovascular Toxicology*, 21(1), 79–87. https://doi.org/10.1007/s12012-020-09598-y.

Habibi, Surahmawati, & Sompo, H. (2016). Gambaran Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada RSUD Haji dan Rumah Sakit Stella Maris di Kota Makassar Tahun 2015. *Al-Shihah : Public Health Science Journal*, 8(2), 161–170.

- Hikmah, N. (2017). Hubungan Lama Merokok Dengan Derajat Hipertensi di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Indrawati, A. L., & Martini, S. (2021). Relationship Between Exposure to Cigarette Smoke in Houses and The Incidence of Hypertension in Housewives. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 9(2), 175–183. [https://doi.org/DOI:10.20473/jbe.v9i22021.175–183](https://doi.org/DOI:10.20473/jbe.v9i22021.175-183).
- Janah, M., & Martini, S. (2017). Hubungan Antara Paparan Asap Rokok Dengan Kejadian Prehipertensi. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 3(1), 1–13.
- Kartikasari, A. N. (2012). Faktor Risiko Hipertensi Pada Masyarakat di Desa Kabong Kidul Kabupaten Rembang. *Universitas Diponegoro*.
- Kementrian Kesehatan. (2019). Hipertensi Penyakit yang Paling Banyak diidap Masyarakat. [www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id/article/view/19051700002/hipertensi-penyakit-paling-banyak-diidap-masyarakat.html).<https://www.kemkes.go.id/article/view/19051700002/hipertensi-penyakit-paling-banyak-diidap-masyarakat.html>
- Kim, B. J., Kang, J. G., Kim, J. H., Seo, D. C., Sung, K. C., Kim, B. S., & Kang, and J. H. (2019). Association between Secondhand Smoke Exposure and Hypertension in 106 , 268 Korean Self-Reported Never-Smokers Verified by Cotinine. *Journal of Clinical Medicine*, 8(1238), 1–11. <https://doi.org/doi:10.3390/jcm8081238>.
- Komaling, J. K., Suba, B., & Wongka, D. (2013). Hubungan Mengonsumsi Alkohol dengan Kejadian Hipertensi Pada Laki-Laki di Desa Tompasobaru II Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Keperawatan*, 1(1), 1–7.
- Kristiawan P. A. Nugroho, Kurniasari, R. R. M. D., & Noviani, T. (2019). Gambaran Pola Makan Sebagai Penyebab Kejadian Penyakit Tisak Menular (Diabetes Mellitus, Obesitas, dan Hipertensi) di Wilayah Kerja Puskesmas Cebongan, Kota Salatiga. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 15–23.
- Latifah, Q. A., Hermawati, A. H., & Anggi Yupita Putri. (2020). Gambaran Nikotin Pada Perokok Aktif di Kabupaten Tulungagung. *Borneo Journal of Medical Laboratory Technology*, 3(1), 178–183.
- Lupsa, I., Nunes, B., Ligocka, D., Elena, A., Jakubowski, M., Casteleyn, L., Aerts, D., Biot, P., Hond, E. Den, Castaño, A., Esteban, M., Kolossa-gehring, M., Fiddicke, U., Knudsen, L. E., Schoeters, G., & Reis, M. F. (2015). Urinary Cotinine Levels And Environmental Tobacco Smoke in Mothers and Children Of Romania , Portugal and Poland Within the European Human Biomonitoring

Pilot Study. *Environmental Research*, 3(18), 1–13. <http://doi.org/10.1016/j.envres.2015.03.018>.

Mahelia, E. D. (2019). Asuhan Keperawatan Pada Lansia Penderita Hipertensi Dengan Masalah Keperawatan Nyeri Akut di Upt Panti Werdha Magetan *Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.

Matthew, & Budoff, M. (2013). CV Risk of Secondhand Tobacco Exposure. *JACC: Cardiovascular*. 6(6),658.659.<https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2013.03.003>

Mustolih, A., Trisnawati, E., & Ridha, A. (2015). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi Pada Perokok (Studi Kasus Pada Keluarga Perokok Aktif Di Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Kalimantan Barat). *Jurnal Mahasiswa dan Penelitian Kesehatan*. 2(4) 1-15.

Nan, L., Zhiwen, L., Sen, C., Na, Y., Aiguo, R., & Rongwei, Y. (2015). Effects of Passive Smoking on Hypertension in Rural Chinese Non-smoking Women. *Journal of Hypertension*, 33(11), 2210–2214. <https://doi.org/doi:10.1097/HJH.0000000000000694>.

Nastiti, W. N. (2017). Hubungan Aktivitas Fisik, Merokok, dan Riwayat Penyakit Dasar Dengan Kejadian Hipertensi Pada Kelompok Usia 20-44 Tahun (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Jelbuk Kabupaten Jember). *Universitas Jember*.

Nina, & Novita, A. (2020). Promosi Kesehatan Hipertensi di Desa Kutamukti Kecamatan Kutawakuya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Maju*, 1(01), 6–11. <https://doi.org/10.33221/jpmim.v1i01.568>

Notoatmodjo S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Nugraheni, A. T., & Wijayanti, A. C. (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi Pada Perempuan Dewasa Muda di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017. *University Research Colloquium*, 46–51.

Nuraini, B. (2015). Risk Factors of Hypertension. *J Majority*, 4(5), 10–19.

Nurhidayati, I., Aniswari, A. Y., Sulistyowati, A. D., & Sutaryono, S. (2018). Penderita Hipertensi Dewasa Lebih Patuh daripada Lansia dalam Minum Obat Penurun Tekanan Darah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 13(2), 4–8.

Nurwidayanti, L., & Wahyuni, C. U. (2013). Analisis Pengaruh Paparan Asap Rokok di Rumah Pada Wanita Terhadap Kejadian Hipertensi. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 1(2), 244–253.

- Oktorini, S. (2009). Selesaian Similiaritas (Similarity Solution) untuk Masalah Penyebaran Asap Rokok. *Universitas Negeri Malang*.
- Park, Y. S., Lee, C., Kim, Y., Ahn, C. M., Kim, J. O., Park, J., Lee, S. H., Kim, J. Y., Chun, E. M., & Jung, T. (2018). Association between secondhand smoke exposure and hypertension in never smokers : a cross-sectional survey using data from Korean National Health and Nutritional Examination Survey V , 2010 – 2012. *BMJ Open*, *10*(1136), 1–6. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-021217>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP19-2003PengamananRokokBagiKesehatan.pdf>
- Pitriani, Radhiah, S., & Sanjaya, K. (2021). Kerentanan Kejadian Penyakit Berbasis Lingkungan Pada Masyarakat Terdampak Bencana Di Daerah Pesisir Kabupaten Donggala. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *12*(1), 171–182.
- Qur'an Kemenag. (2021). *Tafsir QS. Al - A'raf/7:157*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <http://quran.kemenag.go.id/sura/7>.
- Rahajeng, E. (2015). Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok di Provinsi DKI Jakarta Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, *14*(3), 238–249.
- Riskesdas. (2018). Laporan Nasional Riskesdas 2018. [www.Kemas.Kemkes.Go.Id](http://www.Kemas.Kemkes.Go.Id). [https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir\\_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas-2018\\_1274.pdf](https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas-2018_1274.pdf)
- Rofiqoh. (2021). Makna Tabdhir Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al- Misbah). *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo*.
- Robin, G. D., Primayanti, D. A. I. D., & Dinata, M. K. (2017). Prevalensi Hipertensi Pada Mahasiswa Semester Vi Program Studi Pendidikan Dokter Di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. *E-Jurnal Medika*, *6*(2), 1–16.
- Sadri, F. (2012). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Merokok. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Sehun, K., Hyuk, K. S., Donghoon, H., Hwa, K. S., Jun, K. H., Joo, P. J., Youngjin, C., E, Y. Y., Do, H. K., Oh, I. Y., Hwan, Y. C., Won, S. J., Young, L. H., Seok, C. Y., Jin, Y. T., Yeong, C. G., Ho, C. I., Ju, C. D., & Ho, K. C. (2017). Relation between Secondhand Smoke Exposure and Cardiovascular Risk Factors in Never Smokers. *J Hypertension*, *35*(10), 1976–1982. <https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001426>.

- Setiawati, A. M. (2015). Hubungan Asap Rokok Terhadap Terjadinya Hipertensi Pada Ibu Hamil di Desa Brangkal Bojonegoro. *Jurnal IKESMA*, 15(1), 31–36.
- Shen, Q., Xu, Q., Li, G., Ren, L., Zhang, Z., Zhang, Y., Zhong, Z., Li, X., & Wang, Q. (2021). Joint Effect of 25-hydroxyvitamin D and Secondhand Smoke Exposure on Hypertension in Non-smoking Women of Childbearing Age: NHANES 2007-2014. *Research Square*, 10, 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-796119/v1> License:
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Volume I). Lentera Hati.
- Siregar, P. A., Fatimah, S., Simanjuntak, S., Harianti, F., Ginting, B., Tarigan, S., Hanum, S., & Utami, F. S. (2020). Analisis Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Masyarakat Pesisir Kota Medan (Aspek Sosial Budaya Masyarakat Pesisir). *Jurnal Pembangunan Perkotaan*. 8(1), 1–8.
- Sitorus, R., Widjanarko, B., & Kusumawati, A. (2019). Faktor yang Berhubungan Dengan Praktik Ibu Dalam Melindungi Keluarga dari Paparan Asap Rokok. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(4), 219–225.
- Situmorang, F. N. S. (2018). Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Pada Wanita Usia Reproduksi (15-49 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas Kedai Durian Kota Medan. *Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis*. Pusat Bahasa Depdiknas.
- Suryanda. (2017). Analisis Faktor Resiko Hipertensi Sekunder Pada Pengguna Kontrasepsi Aktif Di Puskesmas Tanjungagung. *Jurnal Riset Kesehatan*, 6(2), 17–22.
- Ulum, M. (2003). Dakwah Perubahan Masyarakat : Qur'anic Perspective (pp. 41–55). *Staff Pengajar SMK Azzahra*.
- Untario, E. (2017). Hubungan Merokok Terhadap Kejadian Hipertensi. *Universitas Hasanuddin*.
- Widi, R. (2011). Uji Validitas dan Realibilitas Dalam Penelitian Epidemiologi Kedokteran Gigi. *Stomatognatic (J.K.G. Unej)*, 8(1), 27–34.
- World Health Organization. (2019). Hypertension. [www.who.int](http://www.who.int). <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>.

- Wu, L., Yang, S, He, & Al., Y. et. (2017). Association Between Passive Smoking and Hypertension in Chinese Non-Smoking Elderly Women. *Hypertensi Research*, 40, 399–404. <https://doi.org/doi.org/10.1038/hr.2016.162>.
- Yang, Y., Liu, F., Wang, L., Li, Q., Wang, X., Chen, J. C., Wang, Q., Shen, H., Zhang, Y., Yan, D., Zhang, M., He, Y., Peng, Z., Wang, Y., Xu, J., Zhao, J., Zhang, Y., Zhang, H., Xin, X.Dai, Q. (2017). Association of Husband Smoking With Wife ' s Hypertension Status in Over 5 Million Chinese Females Aged 20 to 49 Years. *Journal of the American Heart Association*. 10(1161), 1–15. <https://doi.org/10.1161/JAHA.116.004924>
- Yankelevitz, D. F., Henschke, C. I., Yip, R., Boffetta, P., Shemesh, J., Matthew D. Cham, J., Narula, A., Hecht, H. S., & Investigators, and F.-I. (2013). Second-Hand Tobacco Smoke in Never Smokers is a Significant Risk Factor for Coronary Artery Calcification. *JACC Journals*, 6(6), 651–657.
- Yasnani, Gasong, A. C., & Sety, L. O. M. (2018). Faktor Risiko Kejadian Penyakit Hipertensi Pada Dewasa Muda di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 3(2), 1–8.
- Zhang, Q., Zeng, G., Wang, X., & Wu, and K.-H. (2021). Associations of Exposure to Secondhand Smoke with Hypertension Risk and Blood Pressure. *Environmental Health and Preventive Medicine*, 26(28), 1–11.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN SETELAH MENDAPAT PENJELASAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (inisial) :  
Usia :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :  
Status Perkawinan :

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian Hubungan Paparan Asap Rokok terhadap Kejadian Hipertensi pada Wanita di Wilayah Kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021, maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Luwu Timur, Juli 2021

Informan

( )

## Lampiran 2



### KUESIONER PENELITIAN HUBUNGAN PAPARAN ASAP ROKOK TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI PADA WANITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WOTU KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR

Kode Responden :

Tanggal Pengisian :

#### PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

- Jawablah pertanyaan secara berurutan
- Lingkari pada jawaban yang anda anggap sesuai
- Tidak ada jawaban benar atau salah, isilah sesuai dengan keadaan diri anda

#### IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :  tahun
4. Pekerjaan :  Tidak Bekerja  PNS/TNI/Polri  
 Petani  Wiraswasta  
 Pembantu RT  Nelayan  
 Buruh  Karyawan Swasta  
 Honorer  Tenaga Kesehatan
5. Pendidikan :  Tidak/Belum Pernah Sekolah  
 Tamat SD/MI Sederajat  
 Tamat SMP/MTS Sederajat  
 Tamat SMA/MA Sederajat  
 Tamat Perguruan Tinggi
6. Status perkawinan :  Belum/ Pernah Menikah  Menikah
7. Riwayat Diagnosis Hipertensi oleh Nakes : Ya  Tidak

8. Umur pertama kali terdiagnosis Hipertensi :  tahun
9. Tekanan Darah
- a. Sistolik :  mmHg
- b. Diastolik :  mmHg

### KUESIONER

1. Berapa banyak perokok aktif yang terdapat dalam keluarga anda ?
- a. 1 orang
- b. > 1 orang
2. Apa hubungan anda dengan perokok aktif tersebut?
- a. Suami
- b. Anak
- c. Menantu/Mertua
- d. Saudara
- e. Kakek/Nenek
- f. Ipar
- g. Paman
- h. Lainnya (.....)
- (\*jawaban boleh lebih dari satu)
3. Selain anggota keluarga apakah anda mengizinkan orang lain merokok di rumah anda ?
- a. Ya
- b. Tidak
4. Berapa umur anda ketika pertama kali terpapar/menghirup asap rokok ?
- ( ..... tahun)
5. Dimana lokasi anda yang paling sering terpapar/menghirup asap rokok ?
- a. Diluar rumah
- b. Didalam rumah (lamjut ke nomor 7)

6. Jika diluar rumah dimana biasanya anda paling sering terpapar/menghirup asap rokok ?
  - a. Lingkungan sekitar tempat tinggal
  - b. Di tempat-tempat umum (tempat ibadah, pasar, transportasi umum, pelayanan kesehatan, dll)
  - c. Di tempat kerja
  - d. Lainnya (sebutkan .....)
7. Apakah anda pernah menegur orang yang merokok disekitar anda?
  - a. Ya
  - b. Tidak
8. Bagaimana reaksi anda jika ada seseorang yang merokok disekitar anda?
  - a. Membiarkan diri terpapar/menghirup asap rokok
  - b. Menghindari asap rokok
  - c. Menghindari asap rokok sembari menutup hidung dan mulut
9. Jenis rokok apa yang dihisap oleh perokok aktif dalam keluarga anda?
  - a. Rokok filter
  - b. Rokok non filter
10. Berapa jumlah total batang rokok yang dihisap oleh perokok aktif disekitar anda yang ikut anda hirup perharinya ?
  - a.  $< 5$  batang/hari
  - b.  $\geq 5$  batang/hari

### Lampiran 3

### Master Tabel

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
1	36	1	3	4	5	2	1	1	1	0	Suami, Orang Tua	0	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Surya, Potenza	0	1
2	44	1	3	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	27 Tahun	1	0	1	0	0	0	Magnum Hitam	0	0
3	36	1	3	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	2	0	0	0	Potenza	0	0
4	42	1	3	4	4	2	2	0	0	0	Suami, Anak	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Surya, Sampoerna	0	0
5	37	1	2	1	5	2	1	1	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	LA Bold	0	0
6	59	3	2	1	1	2	1	3	1	1	Anak	1	54 Tahun	0	0	1	0	0	0	Dunhill	0	0
7	54	2	3	1	8	2	2	0	0	1	Anak	1	50 Tahun	0	1	4	0	0	0	Magnum Mild	0	0
8	36	1	4	4	5	2	2	0	0	0	Suami, Saudara	1	Sejak Kecil	1	0	2	0	0	0	LA Bold, Surya	0	1
9	46	2	2	1	5	2	2	0	0	0	Suami, Anak	1	39 Tahun	0	1	4	0	1	0	GG Merah, Sampoerna	1	1
10	55	2	3	1	7	2	1	3	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Urban Mild	0	0
11	48	3	3	4	5	2	2	0	0	0	Suami, Anak	1	45 Tahun	0	0	1	0	0	0	Urban Mild, Saampoerna	0	0
12	60	2	1	4	8	2	1	3	1	1	Menantu	0	Sejak Kecil	1	1	4	0	2	1	Marcopolo	0	0
13	50	2	2	4	9	1	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Dunhill	0	0
14	42	1	4	4	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Magnum	0	0
15	36	1	3	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	28 Tahun	0	0	2	0	0	0	Esse	0	0
16	44	3	3	1	5	2	2	0	0	1	Menantu	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Sampoerna	0	0

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
17	36	1	5	9	3	2	2	0	0	1	Suami	0	26 Tahun	0	1	4	0	0	0	Surya	0	0
18	57	3	1	1	6	1	1	3	1	0	Suami, Orang Tua	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	234 djisamsoe, GG Merah	1	1
19	41	1	2	1	5	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	1	1	Marlboro	0	0
20	49	1	2	2	2	2	2	0	0	0	Suami, Saudara	0	10 Tahun	1	0	3	0	0	0	GG Merah, 234 djisamsoe	1	0
21	51	2	5	3	3	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Next Mild	0	0
22	62	2	1	1	1	2	1	4	1	1	Suami	0	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	234 djisamsoe	1	1
23	41	1	3	4	5	2	1	2	1	1	Suami	0	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Sampoerna	0	1
24	52	2	2	1	5	2	2	0	0	1	Anak	1	46 Tahun	0	0	1	0	0	0	Sampoerna	0	0
25	40	1	4	4	5	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	1	0	Potenza	0	0
26	41	1	3	1	5	2	2	0	0	0	Suami, Mertua	1	39 Tahun	0	1	4	0	0	0	Surya, Bintang Mas	0	1
27	50	2	3	1	5	2	2	0	0	1	Anak	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Sampoerna	0	0
28	47	2	2	4	4	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Potenza	0	0
29	40	2	3	4	5	2	2	0	0	1	Suami	1	35 Tahun	0	0	1	0	0	0	Surya	0	0
30	48	1	2	1	5	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	234 djisamsoe	1	0
31	47	2	3	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	21 Tahun	1	0	1	1	2	1	Potenza	0	0
32	60	2	2	4	2	2	2	0	0	0	Suami, Anak	1	18 Tahun	1	1	4	0	0	0	Potenza, Surya	0	1
33	51	3	1	1	5	2	1	3	1	1	Suami	0	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	234 djisamsoe	1	1
34	52	2	2	1	2	2	1	3	1	1	Anak	0	50 Tahun	0	0	1	0	0	0	Urban Mild	0	0
35	36	1	2	1	5	2	1	1	1	1	Suami	1	Kecil	1	0	2	1	2	1	Sampoerna	0	0

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
36	40	1	3	1	5	2	2	0	0	0	Anak 2	1	35 Tahun	0	0	1	0	0	0	Potenza, Magnum Bintang	0	0
37	40	1	5	3	6	2	1	2	1	1	Suami	0	Sejak Kecil	1	0	2	0	0	0	Surya	0	0
38	49	2	3	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	234 djisamsoe	1	0
39	52	2	4	1	3	2	2	0	0	1	Suami	1	20 Tahun	1	1	4	0	0	0	234 djisamsoe	1	0
40	38	1	1	4	7	2	2	0	0	1	Suami	1	25 Tahun	1	0	1	0	0	0	Surya	0	0
41	46	2	4	4	5	2	2	0	0	1	Suami	0	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Bintang Mas	0	0
42	55	3	2	1	5	2	1	2	1	1	Saudara	0	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Bintang Mas	0	0
43	45	1	4	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	44 Tahun	0	0	1	1	2	1	Surya	0	0
44	63	1	2	1	4	1	1	3	1	1	Anak	0	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Bintang Mas	0	0
45	43	1	5	1	5	2	1	2	1	0	Saudara, Orang Tua	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Dunhill, Potenza, Bintang Mas	0	1
46	37	2	5	10	3	2	2	0	0	1	Suami	1	28 Tahun	0	0	1	1	2	1	234 djisamsoe	1	1
47	52	2	4	1	7	2	1	3	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Bintang Mas	0	0
48	53	2	3	1	4	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	234 djisamsoe	1	1
49	47	2	4	4	5	2	1	2	0	1	Anak	1	47 Tahun	0	0	1	0	0	0	Sampoerna	0	0
50	38	2	4	4	5	2	2	0	0	1	Suami	1	35 Tahun	0	0	1	0	0	0	Surya	0	0
51	46	2	3	1	5	2	1	2	1	1	Suami	1	30 an Tahun	1	0	1	0	0	0	Marlboro	0	1
52	61	1	1	1	9	1	2	0	0	1	Anak	1	17 Tahun	1	1	4	0	0	0	Sampoerna	0	0
53	38	1	5	10	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Potenza	0	0
54	39	1	3	4	5	2	2	0	0	1	Anak	0	37	0	0	1	0	1	0	Cilas Mild	0	0

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
													Tahun									
55	44	3	3	1	5	1	2	0	0	1	Anak	1	43 Tahun	0	0	1	0	0	0	LA Mild	0	0
56	55	2	2	1	5	2	1	3	1	1	Suami	0	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Urban Mild	0	0
57	42	1	3	1	5	2	1	2	1	1	Suami	0	Sejak Kecil	1	0	1	0	2	1	Next Mild	0	1
58	42	2	2	1	5	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	0	0	LA Bold	0	1
59	41	1	2	1	5	2	2	2	0	1	Suami	0	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	234 djisamsoe	1	0
60	46	2	5	3	3	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Marlboro	0	0
61	48	1	2	4	4	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	RX Bold	0	0
62	42	1	3	1	5	2	1	2	1	1	Anak	0	41 Tahun	0	0	1	0	0	0	Sampoerna	0	0
63	51	1	2	2	2	2	2	0	0	0	Suami, Saudara	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Bintang Mas, LA Bold	0	1
64	40	3	2	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	2	0	0	0	Pundi Mas	1	0
65	36	1	4	4	6	2	2	0	0	1	Orang Tua	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Bintang Mas	0	1
66	45	1	2	4	2	2	1	2	1	1	Suami	1	20 Tahun	1	0	1	1	2	1	Urban Mild	0	1
67	40	2	1	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Urban Mild	0	0
68	63	1	2	1	4	1	2	0	0	1	Anak	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Sampoerna	0	0
69	44	1	2	1	5	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Urban Mild	0	0
70	38	3	4	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	2	0	0	0	Crystal	0	0
71	58	1	1	1	4	2	1	3	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Pundi Mas	1	0
72	55	3	1	1	5	2	1	3	1	1	Anak	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	On Tri	0	0
73	36	1	4	9	3	2	2	0	0	1	Suami	1	17 Tahun	1	0	1	0	0	0	Crystal	0	0

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
74	41	1	2	1	5	2	1	2	1	1	Anak	0	38 Tahun	0	0	2	0	0	0	Sampoerna	0	0
75	50	1	1	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Kecil	1	1	4	0	0	0	Gabah	1	1
76	56	1	1	2	2	2	1	3	1	1	Suami	1	19 Tahun	1	0	3	1	2	1	GG Merah	1	1
77	49	1	5	3	3	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Surya	0	0
78	40	1	2	1	5	2	1	2	1	0	Suami, Saudara	1	35 Tahun	0	0	1	0	2	1	Potenza, Marlboro	0	1
79	45	2	2	4	4	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Bintang Mas	0	0
80	36	1	5	3	3	2	1	1	1	0	Suami, Mertua	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Surya, Marlboro	0	1
81	58	1	2	1	2	2	2	0	0	1	Menantu	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Sampoerna Kretek	1	0
82	58	2	3	1	2	2	1	3	1	1	Suami	0	19 Tahun	1	1	4	0	0	0	LA Bold	0	0
83	40	1	2	4	5	2	1	2	1	1	Anak	0	34 Tahun	0	0	1	0	0	0	Bintang Mas	0	0
84	45	1	2	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	44 Tahun	0	0	1	0	0	0	Bintang Mas	0	0
85	43	2	2	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Bintang Mas	0	0
86	36	1	4	4	4	2	2	0	0	0	Suami, Mertua	1	27 Tahun	0	1	4	0	0	0	Potenza, Bintang Mas	1	1
87	55	3	2	1	5	2	1	3	1	0	Suami, Anak	1	31 Tahun	1	1	4	1	2	1	Potenza, Urban Mild	0	1
88	38	3	5	3	5	2	2	0	0	1	Suami	1	29 Tahun	1	1	4	1	2	1	234 djisamsoe	1	1
89	40	1	2	1	5	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Potenza	0	0
90	38	1	4	4	3	2	2	0	0	1	Suami	0	22 Tahun	1	0	1	0	0	0	Surya	0	0
91	47	2	4	4	5	2	1	2	1	1	Suami	0	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Class Mild	0	0
92	60	2	3	1	6	1	1	3	1	1	Anak	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Sampoerna	0	0
93	62	1	1	1	4	1	1	4	1	1	Menantu	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Surya Pro	0	0

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
94	36	1	4	1	5	1	2	0	0	1	Orang Tua	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Bintang Mas	0	1
95	40	3	4	4	5	2	1	1	1	1	Anak	0	37 Tahun	0	0	1	0	0	0	Marlboro	0	0
96	51	1	1	1	2	2	1	3	1	1	Suami	1	49 Tahun	0	0	1	0	0	0	Potenza	0	0
97	36	3	4	7	6	2	2	0	0	0	Suami, Mertua	1	30 Tahun	0	0	3	0	0	0	Class Mild, Crystal	0	1
98	41	1	4	4	2	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Urban Mild	0	1
99	51	2	2	1	2	2	2	0	0	1	Anak	1	50 Tahun	0	0	1	0	0	0	Bintang Mas	0	0
100	45	2	5	1	5	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Magnum Mild	0	1
101	53	1	5	1	4	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Potenza, Sampoerna	0	0
102	50	2	3	1	2	2	1	3	1	0	Suami, Anak	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Potenza, Surya	0	1
103	36	1	4	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	29 Tahun	0	0	2	1	2	1	Surya	0	1
104	36	2	3	2	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	3	0	0	0	Potenza	0	0
105	48	2	4	4	5	1	1	2	1	1	Saudara	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Surya	0	0
106	53	1	2	1	2	2	1	3	1	1	Suami	0	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	GG Merah	1	0
107	45	3	5	3	3	2	2	0	0	1	Suami	1	30 an Tahun	1	1	4	1	2	1	Surya	0	1
108	64	3	3	1	5	1	1	0	1	0	Anak, Menantu	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	1	Urban Mild, Dunhill	0	1
109	63	1	3	4	5	1	2	0	0	1	Anak	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Sampoerna	0	0
110	63	3	1	1	4	1	1	4	1	0	Anak, Menantu	1	60 Tahun	0	1	4	0	0	0	Tembakau, LA Bold	1	1
111	60	3	3	1	4	1	2	0	0	1	Anak	0	Sejak Kecil	1	1	4	0	1	0	Sampoerna	0	0
112	63	3	2	1	2	1	2	4	0	1	Menantu	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Class Mild	0	0
113	53	2	2	1	2	2	1	3	1	0	Suami, Anak	1	Sejak	1	0	1	0	0	0	Bintang	0	0

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
													Kecil							Mas, Class Mild		
114	51	2	3	4	4	2	1	3	1	1	Suami	1	17 Tahun	1	0	1	1	2	1	Potenza	0	1
115	41	1	3	1	5	2	2	0	0	1	Saudara	1	Sejak Kecil	1	0	2	0	0	0	Esse	0	0
116	41	1	5	4	5	2	2	0	0	1	Orang Tua	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Surya	0	1
117	47	2	3	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	21 Tahun	1	0	1	1	2	0	Potenza	0	0
118	45	1	1	4	3	1	2	0	0	1	Anak	1	44 Tahun	0	0	1	0	0	0	RX Gold	0	0
119	54	2	4	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	18 Tahun	1	1	4	0	0	0	Bintang Mas	0	0
120	47	2	2	1	5	2	1	2	1	0	Suami, Saudara	1	46 Tahun	0	0	1	1	2	1	Pundi Mas, 234 Djisamsoe	1	1
121	42	1	3	1	5	2	1	2	1	0	Suami, Anak	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Sampoerna, Urban Mild	0	0
122	43	1	2	4	4	2	2	0	0	1	Anak	0	40 Tahun	0	0	1	0	0	0	Bintang Mas	0	0
123	53	2	3	1	4	2	1	3	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Crystal	0	0
124	41	1	3	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	1	0	Class Mild	0	0
125	36	3	3	4	5	2	2	0	0	1	Suami	1	27 Tahun	0	0	2	1	2	1	Magnum Mild	0	1
126	56	1	2	1	4	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Magnum Mild	0	0
127	40	1	3	1	5	2	1	1	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Magnum Mild	0	0
128	36	1	3	4	7	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Sampoerna	0	1
129	37	1	4	4	3	2	2	0	0	1	Suami	1	25 Tahun	1	1	4	0	0	0	Magnum Mild	0	0
130	59	3	2	4	2	2	1	3	1	0	Suami, Anak	1	19 Tahun	1	1	4	1	2	1	Magnum Mild, Urban Mild	0	1
131	57	1	3	1	2	2	1	3	1	1	Suami	0	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	GG Merah	1	0

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
132	40	3	2	1	5	2	2	0	0	1	Anak	0	40 Tahun	0	0	1	0	0	0	234 djisamsoe	1	0
133	45	1	2	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	RX Bold	0	1
134	36	1	4	4	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	2	1	0	0	Potenza	0	0
135	40	1	2	1	5	2	1	2	1	0	Suami, Saudara	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Bintang Mas, Potenza	0	0
136	38	1	4	9	3	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Bintang Mas	0	0
137	51	2	4	1	4	2	1	3	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Marlboro	0	0
138	46	2	2	1	5	2	1	2	1	1	Anak	1	40 Tahun	0	0	1	1	2	1	Bintang Mas	0	0
139	43	1	3	4	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	234 djisamsoe	1	0
140	37	2	2	4	4	2	2	0	0	1	Mertua	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Bintang Mas	0	1
141	46	1	3	1	5	2	1	2	1	0	Saudara, Ipar	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	0	0	Magnum Bintang, Surya	0	1
142	36	1	2	1	5	2	1	1	1	1	Suami	1	20 Tahun	1	0	1	0	0	0	Sampoerna	0	0
143	36	1	4	4	5	2	2	0	0	1	Suami	1	21 Tahun	1	0	2	0	0	0	Bintang Mas	0	0
144	55	2	2	1	5	1	2	3	0	1	Anak	1	53 Tahun	0	0	1	1	2	1	Surya Pro	0	1
145	36	1	3	4	7	2	2	0	0	1	Suami	0	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Nikki	0	0
146	54	1	1	1	5	1	1	2	1	1	Anak	1	50 Tahun	0	1	4	0	0	0	Nikki	0	0
147	36	2	5	3	6	2	2	0	0	0	Suami, Mertua	1	29 Tahun	0	1	4	0	0	0	Bintang Mas, Potenza	0	0
148	43	1	4	4	7	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Bintang Mas	0	1
149	40	1	3	4	5	1	1	1	1	1	Suami	1	22 Tahun	1	0	1	0	0	0	Crystal	0	0
150	39	2	2	1	5	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak	1	0	1	0	0	0	Bintang	0	0

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
													Kecil							Mas		
151	46	1	2	4	4	2	2	0	0	1	Anak	0	41 Tahun	0	0	2	0	0	0	Next Mild	0	0
152	44	3	1	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	234 djissamsoe	1	0
153	62	1	1	1	7	1	1	3	1	1	Anak	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	1	1	LA Bold	0	0
154	36	2	4	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	27 Tahun	0	0	2	0	0	0	LA Mild	0	0
155	50	2	4	4	2	2	2	2	0	0	Suami, Anak	1	27 Tahun	1	0	1	0	0	0	LA Bold, Magnum Mild	0	1
156	55	1	1	4	2	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	GG Merah	1	0
157	41	3	4	4	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	1	1	2	1	Sampoerna	0	0
158	62	2	2	1	9	1	1	4	1	1	Menantu	0	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Class Mild	0	0
159	47	1	2	4	4	2	1	2	1	1	Suami	1	18 Tahun	1	0	1	1	1	1	Potenza	0	0
160	44	1	3	1	5	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Sampoerna	0	0
161	45	1	2	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Magnum Mild	0	0
162	62	1	1	1	6	1	2	0	0	1	Anak	0	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Surya	0	0
163	41	1	2	1	5	2	1	2	1	1	Anak	1	36 Tahun	0	0	2	0	0	0	Sampoerna Revolution	0	0
164	36	2	4	4	3	1	2	0	0	0	Suami, Orang Tua	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Surya, Bintang Mas	0	1
165	47	1	1	1	5	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Urban Mild	0	1
166	45	3	3	4	5	2	1	2	1	1	Anak	1	37 Tahun	0	0	2	0	2	0	LA Bold	0	1
167	44	1	3	1	5	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	2	1	234 djissamsoe	1	0
168	50	2	2	1	7	2	1	3	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Bintang Mas	0	0

M A K A S S A R

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
169	42	1	2	1	2	2	2	0	0	1	Anak	1	41 Tahun	0	0	1	0	0	0	LA Bold	0	0
170	64	3	1	1	4	1	2	0	0	1	Anak	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Bintang Mas	0	0
171	39	1	4	4	3	2	1	1	1	0	Suami, Orang Tua	1	26 Tahun	0	0	1	1	2	1	Troy, Bintang Mas	0	1
172	36	1	4	9	9	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Magnum Bintang	0	0
173	38	1	3	4	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	234 djisamsoe	1	0
174	42	1	3	1	5	2	1	2	1	1	Suami	1	19 Tahun	1	0	2	0	0	0	Crystal	0	0
175	43	1	2	1	5	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Potenza	0	0
176	42	1	3	1	5	2	2	0	0	1	Anak	0	40 Tahun	0	0	1	0	0	0	Bintang Mas	0	0
177	40	1	3	1	5	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	2	0	0	0	Surya	0	0
178	60	3	1	1	1	2	1	3	1	0	Suami, Anak	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	1	GG Merah, Sampoerna	1	1
179	40	1	4	4	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	234 djisamsoe	1	0
180	44	2	2	1	5	2	2	2	0	1	Anak	1	43 Tahun	0	0	1	0	0	0	Sampoerna	0	0
181	54	2	3	4	2	2	1	3	1	1	Suami	1	54 Tahun	0	0	1	0	2	1	LA Bold	0	0
182	48	1	3	1	2	2	2	0	0	0	Anak, Menantu	1	40 Tahun	0	1	4	0	2	0	Bintang Mas, Nikki	0	1
183	36	3	3	4	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	2	0	0	0	Bintang Mas	0	0
184	63	2	2	1	4	1	1	4	1	0	Anak, Menantu	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Surya, Urban Mild	0	1
185	46	1	3	1	2	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Bintang Mas	0	0
186	36	2	5	3	3	2	2	0	0	1	Suami	1	29 Tahun	0	1	4	0	0	0	GG Merah	1	0
187	46	2	2	1	5	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Bintang Mas	0	1
188	50	1	2	1	9	2	2	0	0	0	Suami, Anak	1	Sejak	1	1	4	0	0	0	Surya,	0	1

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
													Kecil							Sampoerna		
189	42	1	5	3	3	2	2	0	1	1	Saudara	0	37 Tahun	0	0	2	0	0	0	Bintang Mas	0	0
190	37	1	4	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	29 Tahun	0	0	1	0	2	0	Surya	0	0
191	40	1	4	4	4	2	2	2	0	0	Suami, Orang Tua	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Class Mild, Bintang Mas	0	0
192	37	1	4	4	4	2	2	1	0	1	Suami	1	32 Tahun	0	0	1	1	1	1	Next Mild	0	0
193	36	1	4	1	4	2	2	1	0	1	Suami	0	26 Tahun	0	0	1	0	0	0	Surya	0	0
194	63	3	4	1	8	2	1	0	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Rokok Bambu	1	0
195	52	2	4	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	234 djisamsoe	1	0
196	40	1	4	1	2	2	1	2	1	0	Suami, Saudara	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Surya, Potenza	0	1
197	44	1	5	3	2	2	2	0	0	1	Anak	1	41 Tahun	0	0	1	0	0	0	Urban Mild	0	0
198	50	2	4	1	4	1	1	3	1	1	Suami	1	22 Tahun	1	1	4	0	0	0	Surya	0	0
199	46	2	2	4	4	2	2	0	0	1	Suami	1	19 Tahun	1	0	1	0	0	0	Sampoerna	0	0
200	38	1	2	1	7	2	2	0	0	0	Suami, Saudara	1	30 Tahun	0	0	1	1	2	1	Potenza, Magnum Mild	0	1
201	50	2	2	4	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Urban Mild	0	0
202	54	2	2	4	2	2	2	2	0	0	Suami, Anak	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Dunhill, Class Mild	0	0
203	42	1	2	4	7	2	1	2	1	1	Suami	1	18 Tahun	1	0	1	1	2	1	Surya	0	0
204	39	1	4	4	9	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	3	0	0	0	Bintang Mas	0	0
205	38	1	2	4	2	2	2	0	0	1	Suami	0	21 Tahun	1	1	4	0	0	0	Urban Mild	0	0
206	43	1	3	4	2	2	2	0	0	1	Suami, Anak	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	LA Bold	0	0

M A K A S S A R

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
207	57	3	3	4	4	1	1	4	1	1	Anak	0	52 Tahun	0	0	1	0	0	0	Surya	0	0
208	54	2	3	4	2	1	2	0	0	1	Anak	1	48 Tahun	0	0	1	0	0	0	LA Bold	0	0
209	36	1	5	4	4	2	2	0	0	0	Suami, Saudara	1	Sejak Kecil	1	0	2	0	0	0	Surya, LA Bold	0	1
210	54	2	4	4	2	2	1	3	1	1	Saudara	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	GG Merah	1	0
211	38	1	4	4	7	2	2	0	0	0	Suami, Orang Tua	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Sampoerna, Urban Mild	0	0
212	57	3	2	1	9	1	1	4	1	1	Anak	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Sampoerna	0	0
213	41	1	5	3	3	1	2	0	0	1	Saudara	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	LA Mild	0	0
214	37	1	2	1	2	2	2	2	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Urban Mild	0	0
215	41	1	2	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	19 Tahun	1	0	1	0	0	0	Bintang Mas	0	0
216	36	1	3	6	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	3	0	0	0	Bintang Mas	0	0
217	64	3	1	1	3	1	1	3	1	1	Anak	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Potenza	0	1
218	37	1	5	3	4	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	234 djisamsoe	1	0
219	47	2	5	3	6	2	1	3	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Magnum Bintang	0	0
220	50	2	2	2	2	1	2	0	0	1	Anak	0	45 Tahun	0	0	3	1	2	1	Surya	0	0
221	63	3	1	1	4	1	2	3	0	1	Menantu	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Marlboro	0	0
222	64	3	1	1	4	1	1	0	1	1	Anak	0	59 Tahun	1	1	4	0	0	0	Magnum	0	0
223	41	1	3	1	2	2	2	0	0	0	Suami, Anak	1	21 Tahun	1	1	4	1	2	0	Sampoerna, Urban Mild	0	1
224	36	1	4	4	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Bintang Mas	0	0
225	50	2	3	1	4	2	2	0	0	1	Suami	1	20 Tahun	1	1	4	0	0	0	Surya	0	0
226	38	1	2	2	2	2	2	0	0	1	Suami	1	36 Tahun	0	0	3	1	1	1	LA Bold	0	0

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
227	64	3	2	1	5	1	2	4	1	1	Anak	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Nikki	0	0
228	38	1	4	4	4	2	2	0	0	1	Suami	1	38 Tahun	0	0	1	1	2	0	Surya Pro	0	0
229	36	1	4	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Marcopolo	0	0
230	43	1	3	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Urban Mild	0	0
231	46	2	3	1	2	2	1	2	1	0	Suami, Anak	1	19 Tahun	1	1	4	1	2	1	Class Mild, Surya	0	1
232	37	1	5	4	2	2	2	0	0	1	Suami	1	29 Tahun	0	0	1	0	0	0	Surya	0	0
233	47	2	3	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Bintang Mas	0	0
234	56	3	3	1	7	2	1	3	1	1	Anak	0	51 Tahun	0	0	1	0	0	0	LA Bold	0	0
235	41	1	3	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Magnum	0	0
236	37	1	4	4	6	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	2	0	0	0	Nikki	0	0
237	39	1	4	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Djarum Super	1	0
238	58	3	2	1	2	2	1	3	1	0	Suami, Anak	1	19 Tahun	1	0	1	1	2	1	Bintang Mas, Sampoerna	0	1
239	59	3	2	1	2	2	2	4	0	1	Anak	1	17 Tahun	1	0	1	0	2	0	Class Mild	0	0
240	37	1	5	1	6	2	2	0	0	1	Mertua	1	30 Tahun	0	1	4	1	2	1	Bintang Mas	0	0
241	39	1	5	3	3	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	2	0	0	0	Jazz	0	0
242	44	1	5	3	3	2	2	0	0	1	Suami	0	29 Tahun	1	1	4	0	0	0	Surya Pro	0	0
243	47	2	4	1	2	2	2	0	0	0	Suami, Anak	1	41 Tahun	0	1	4	1	1	0	Sampoerna, Next Mild	0	0
244	58	3	3	1	2	2	1	4	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Bintang Mas	1	0
245	38	1	4	4	3	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Crystal	1	0
246	49	2	3	1	2	2	1	3	1	1	Suami	1	Sejak	1	0	1	0	0	0	Urban Mild	0	1

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
													Kecil									
247	59	3	2	1	2	2	1	3	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Bintang Mas	0	0
248	46	2	4	1	2	2	2	0	0	0	Suami, Saudara	1	44 Tahun	0	0	1	1	2	0	Surya, Crystal	1	0
249	59	3	3	1	2	2	1	4	1	1	Suami	1	29 Tahun	1	1	4	0	0	0	Surya	0	0
250	37	1	5	3	3	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	234 djsamsoe	1	0
251	36	1	3	1	7	2	2	0	0	1	Orang Tua	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	1	0	Crystal	0	0
252	37	1	3	1	2	2	2	0	0	0	Suami, Mertua	1	35 Tahun	0	1	4	1	2	1	Magnum Bintang, Bintang Mas	0	0
253	46	2	5	3	6	2	2	0	0	1	Suami	0	28 Tahun	1	1	4	0	0	0	Bintang Mas	0	0
254	46	2	4	1	4	2	2	0	0	1	Menantu	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Marcopolo	0	0
255	64	3	3	1	5	1	1	3	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Marlboro	0	0
256	39	1	3	1	4	2	2	0	0	1	Suami	1	18 Tahun	1	0	1	0	0	0	LA Mild	0	0
257	36	1	5	3	3	1	2	0	0	0	Suami, Mertua	1	28 Tahun	0	0	1	1	2	0	Crystal, Bintang Mas	0	0
258	57	3	4	1	4	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Bintang Mas	0	0
259	51	2	2	1	4	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Crystal	0	0
260	48	2	4	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	40 Tahun	0	0	1	0	1	0	Pundi Mas	1	0
261	46	2	4	1	4	2	1	2	1	0	Suami, Saudara	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Sampoerna, Potenza	0	1
262	37	1	4	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	2	0	0	0	Sampoerna	0	0
263	40	1	5	3	3	2	2	0	0	1	Anak	0	35 Tahun	0	1	4	0	0	0	Class Mild	0	0
264	36	1	5	3	4	1	2	0	0	1	Saudara	0	28 Tahun	1	0	2	0	0	0	Urban Mild	0	0

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
265	36	1	2	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Surya	0	0
266	36	1	5	3	3	2	2	1	0	1	Suami	1	29 Tahun	0	1	4	0	0	0	Potenza	0	0
267	37	1	5	3	3	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Surya	0	0
268	43	1	5	4	3	2	1	2	1	1	Suami	1	27 Tahun	1	0	1	1	2	1	Sampoerna	0	1
269	54	2	3	4	4	1	2	3	0	0	Suami, Saudara	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Bintang Mas, Marlboro	0	0
270	43	1	3	1	2	2	2	0	0	1	Anak	0	40 Tahun	0	0	1	0	0	0	Potenza	0	0
271	50	2	2	1	2	2	1	3	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	4	0	2	1	LA Bold	0	1
272	49	2	3	1	2	2	2	0	0	0	Suami, Anak	1	19 Tahun	1	1	4	0	2	0	LA Mild, Urban Mild	0	0
273	49	2	5	4	3	2	1	3	1	1	Suami	1	47 Tahun	0	1	4	0	0	0	Surya	0	1
274	46	2	4	4	4	2	2	0	0	1	Suami	1	23 Tahun	1	0	1	0	0	0	Crystal	0	0
275	48	2	4	1	2	2	1	3	1	0	Suami, Paman	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Potenza, 234 djisamsoe	1	1
276	45	1	4	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	17 Tahun	1	1	4	0	0	0	Surya	0	0
277	41	1	2	1	5	2	1	1	1	0	Suami, Mertua	1	35 Tahun	0	0	1	0	0	0	Potenza, Surya	0	1
278	45	1	2	1	5	2	2	2	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Urban Mild	0	0
279	37	1	4	4	5	2	2	0	0	1	Suami	1	30 Tahun	0	0	1	0	0	0	Marlboro	0	0
280	53	2	2	1	5	2	1	3	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Bintang Mas	0	1
281	40	1	2	4	5	2	2	0	0	1	Suami	0	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Potenza	0	0
282	36	1	2	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Urban Mild	0	0
283	40	1	2	1	5	1	1	2	1	1	Anak	0	35 Tahun	0	0	1	1	2	1	Urban Mild	0	0

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
284	40	1	3	1	5	2	2	0	0	0	Suami, Anak	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Potenza, Smapoerna	0	0
285	50	2	2	4	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Potenza	0	0
286	37	1	3	1	5	2	2	0	0	0	Suami, Saudara	1	29 Tahun	0	0	1	1	2	1	234 djisamsoe, GG Mild	1	0
287	36	1	4	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	29 Tahun	0	0	1	0	0	0	Surya	0	0
288	57	3	3	1	5	2	1	3	1	1	Saudara	0	30 Tahun	1	0	1	0	0	0	Surya	0	0
289	38	1	4	4	4	2	2	0	0	1	Suami	1	35 Tahun	0	1	4	0	0	0	Surya	0	0
290	38	1	5	10	3	2	2	0	0	1	Suami	1	23 Tahun	1	0	2	0	0	0	Potenza	0	0
291	55	2	3	1	2	2	1	1	1	0	Suami, Anak	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Magnum Mild, LA Bold	0	1
292	40	1	4	1	4	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	234 djisamsoe	1	0
293	58	3	2	1	2	2	1	3	1	0	Suami, Menantu	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Bintang Mas, Marcopolo	0	1
294	49	2	2	1	2	2	1	3	1	1	Anak	0	40 Tahun	0	0	1	0	0	0	Urban Mild	0	0
295	38	1	4	4	7	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Surya	0	0
296	40	1	3	1	7	2	2	0	0	0	Suami, Menantu	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Djarum Super, Surya	0	0
297	56	3	2	1	2	2	1	3	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Esse	0	1
298	47	2	4	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Sampoerna	0	0
299	54	2	5	3	8	2	2	3	0	1	Anak	0	50 Tahun	0	0	2	0	0	0	Class Mild	0	0
300	62	3	3	1	2	1	1	3	1	1	Anak	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Class Mild	0	1
301	51	2	4	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Potenza	0	0

M A K A S S A R

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
302	54	2	3	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	234 djsamsoe	1	0
303	36	1	5	3	3	2	2	0	0	1	Suami	1	26 Tahun	0	1	4	1	2	1	Surya	0	0
304	57	3	3	1	2	2	2	0	0	0	Suami, Anak	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Bintang Mas, Surya	0	1
305	59	3	5	3	8	2	1	0	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Bintang Mas	0	0
306	42	1	4	1	2	2	2	0	0	0	Suami, Menantu	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	0	Crystal, Marlboro	0	0
307	42	1	4	1	9	2	1	2	1	1	Suami	1	22 Tahun	1	0	1	1	2	1	Magnum Bintang	0	0
308	44	1	5	3	3	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Surya	0	0
309	36	1	2	1	7	2	2	0	0	0	Suami, Mertua	1	28 Tahun	0	1	4	0	0	0	Magnum Bintang, Dunhill	0	0
310	41	1	2	1	7	2	2	0	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Urban Mild	0	0
311	39	1	3	4	4	2	2	0	0	1	Suami	1	19 Tahun	1	1	4	0	0	0	Sampoerna Kretek	1	0
312	36	1	3	1	5	2	1	2	1	1	Suami	0	20 Tahun	1	0	2	1	0	0	Potenza	0	0
313	48	2	4	1	4	2	2	0	0	0	Suami, Menantu	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Surya, Urban Mild	0	0
314	57	3	2	1	2	2	1	2	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Magnum Bintang	0	0
315	56	3	2	1	2	1	2	4	0	0	Saudara, Anak	1	51 Tahun	0	1	4	0	2	0	Magnum Bintang, Sampoerna	0	0
316	47	2	5	3	3	2	1	3	1	1	Suami	1	29 Tahun	1	0	2	0	0	0	Surya	0	0
317	40	1	4	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	36 Tahun	0	0	1	0	0	0	Magnum Mild	0	0
318	47	2	3	1	2	2	1	2	1	0	Suami, Anak	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	LA Bold, LA Mild	0	1
319	46	2	4	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	234 djsamsoe	1	0
320	39	1	5	4	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Marlboro	0	0

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
321	41	1	5	3	6	2	2	0	0	0	Suami, Anak	1	27 Tahun	1	0	2	1	2	0	Surya, Marlboro	0	0
322	37	1	2	1	7	2	2	0	0	1	Suami	1	28 Tahun	0	0	1	0	0	0	Bintang Mas	0	0
323	51	2	2	1	5	2	1	3	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	1	0	Crystal	0	0
324	50	2	4	1	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	Potenza	0	0
325	64	3	2	1	1	2	1	3	1	0	Suami, Menantu	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	0	1	Bintang Mas, Surya	0	1
326	36	1	4	1	4	2	2	0	0	1	Orang Tua	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	0	0	Surya Pro	0	1
327	36	1	4	4	4	2	2	0	0	1	Suami	1	26 Tahun	0	0	2	0	0	0	Urban Mild	0	0
328	59	3	2	1	9	1	2	0	0	1	Anak	0	57 Tahun	0	0	1	0	0	0	Potenza	0	0
329	60	3	3	1	2	2	1	2	1	0	Suami, Anak	1	Sejak Kecil	1	0	1	1	2	1	Bintang Mas, Urban Mild	0	1
330	39	1	3	4	5	2	2	0	0	1	Suami	1	37 Tahun	0	0	2	0	0	0	Bintang Mas	0	0
331	39	1	3	4	5	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Nikki	0	0
332	45	1	2	1	5	2	2	0	0	0	Suami, Anak	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Bintang Mas, Class Mild	0	0
333	36	1	4	3	3	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Sampoerna	0	0
334	49	2	3	1	2	2	2	0	0	0	Suami, Anak	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Potenza, Surya Pro	0	0
335	59	3	2	1	2	2	2	4	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	0	0	0	234 djisamsoe	1	0
336	63	3	2	1	1	2	1	3	1	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	GG Merah	1	0
337	61	3	3	1	8	1	1	0	1	1	Anak	1	58 Tahun	0	0	1	0	0	0	234 djisamsoe	1	1
338	49	2	2	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Potenza	0	0
339	36	1	4	4	5	2	2	0	0	1	Orang Tua	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	1	Sampoerna	0	0

M A K A S S A R

No	Umur	Kat_Umur	Pdd	Pkj	Pkj_KRT	Stat_Nikah	Rwyt_Hiper	Kat_Umur_Hiper	Kat_Hiper	P1	P2	P3	P4	Kat_Umur_Terpapar	P5	P6	P7	P8	Kat_Reaksi	Merek_Rokok	P9	P10
340	45	1	4	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	0	0	Magnum Bintang	0	0
341	41	1	2	1	2	2	2	0	0	1	Suami	1	Sejak Kecil	1	0	1	0	2	0	234 djisamsoe	1	0
342	40	1	5	3	3	2	2	0	0	0	Suami, Menantu	1	Sejak Kecil	1	1	4	1	2	0	Marcopolo, Surya	0	0
343	45	1	4	1	5	2	1	2	1	0	Suami, Anak	1	40 Tahun	0	0	1	0	0	0	Potenza, Sampoerna	0	0

**Keterangan Tabel :**

Kategori Umur	: 1. Dewasa Akhir 2. Lansia Awal 3. Lansia Akhir
Pendidikan	: 1. Tidak/belum pernah sekolah 2. Tamat SD/MI Sederajat 3. Tamat SMP/MTS Sederajat 4. Tamat SMA/MA Sederajat 5. Tamat PT
Pekerjaan	: 1. Tidak bekerja/IRT 2. Petani 3. PNS/TNI/Polri 4. Wiraswasta 5. Nelayan 6. Buruh 7. Karyawan Swasta 8. Pembantu Nakes 9. Honorer 10. Tenaga Kesehatan
Pekerjaan Kepala RT	: 1. Tidak/Belum bekerja 2. Petani/Pekebun/Peternak 3. PNS/TNI/Polri 4. Wiraswasta 5. Nelayan 6. Karyawan Swasta 7. Buruh 8. Pensiunan 9. Honorer
Status Pernikahan	: 1. Menikah 2. Belum/pernah menikah
Riwayat Hipertensi	: 1. Ya 2. Tidak
Kategori Umur Hipertensi	: 0. Tidak pernah didiagnosis hipertensi 1. Dewasa awal 2. Dewasa akhir 3. Lansia awal 4. Lansia akhir
Kategori Hipertensi	: 0 (Tidak Hipertensi) 1 (Hipertensi)
P1	: 0 (1 orang) 1 (>1 orang)
P3	: 0 (Tidak) 1 (Ya)
Kategori Umur Terpapar	: 0 ( $\leq 10$ tahun) 1 ( $>10$ tahun)
P5	: 0 (Di luar rumah) 1 (Di dalam rumah)
P6	: 1 (Di lingkungan sekitar tempat tinggal) 2 (Di tempat-tempat umum) 3 (Di tempat kerja) 4 (Di dalam rumah/sekitar rumah)
P7	: 0 (Ya) 1 (Tidak)
P8	: 0 (Menghindari asap rokok sembari menutup mulut) 1 (Menghindari asap rokok) 2 (Membiarkan diri terpapar asap rokok)
Kategori Reaksi Terpapar	: 0 (Menghindar) 1 (Tidak menghindar)
P9	: 0 (Menggunakan Filter) 1 (Tidak Menggunakan Filter)
P10	: 0 ( $< 5$ batang/hari) 1 ( $\geq 5$ batang/hari)



## Lampiran 4

### Output SPSS

#### Kategori Umur Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Dewasa Akhir	185	53.9	53.9	53.9
Lansia Awal	101	29.4	29.4	83.4
Lansia Akhir	57	16.6	16.6	100.0
Total	343	100.0	100.0	

#### Pendidikan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak/Belum Pernah Sekolah	26	7.6	7.6	7.6
Tamat SD/MI Sederajat	101	29.4	29.4	37.0
Tamat SMP/MTS Sederajat	91	26.5	26.5	63.6
Tamat SMA/MA Sederajat	81	23.6	23.6	87.2
Tamat Perguruan Tinggi	44	12.8	12.8	100.0
Total	343	100.0	100.0	

#### Pekerjaan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Bekerja/IRT	207	60.3	60.3	60.3
Petani	6	1.7	1.7	62.1
PNS/TNI/Polri	31	9.0	9.0	71.1
Wiraswasta	90	26.2	26.2	97.4
Buruh	1	.3	.3	97.7
Karyawan Swasta	1	.3	.3	98.0
Honorer	4	1.2	1.2	99.1
Tenaga Kesehatan	3	.9	.9	100.0
Total	343	100.0	100.0	

M A K A S S A R

**Pekerjaan Kepala Rumah Tangga**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum/Tidak Bekerja	5	1.5	1.5	1.5
	Petani/Pekebun/Peternak	85	24.8	24.8	26.2
	PNS/TNI/Polri	35	10.2	10.2	36.4
	Wiraswasta	49	14.3	14.3	50.7
	Nelayan	124	36.2	36.2	86.9
	Karyawan Swasta	12	3.5	3.5	90.4
	Buruh	18	5.2	5.2	95.6
	Pensiunan	6	1.7	1.7	97.4
	Honorer	9	2.6	2.6	100.0
	Total	343	100.0	100.0	

**Status Perkawinan Responden**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum/Pernah Menikah	44	12.8	12.8	12.8
	Menikah	299	87.2	87.2	100.0
	Total	343	100.0	100.0	

**Riwayat Diagnosis Hipertensi oleh Tenaga Kesehatan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	158	46.1	46.1	46.1
	Tidak	185	53.9	53.9	100.0
	Total	343	100.0	100.0	

**Kategori Umur Pertama Kali Responden Menderita Hipertensi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah didiagnosis hipertensi	191	55.7	55.7	55.7
	Dewasa awal	14	4.1	4.1	59.8
	Dewasa Akhir	70	20.4	20.4	80.2
	Lansia awal	54	15.7	15.7	95.9
	Lansia akhir	14	4.1	4.1	100.0

**Kategori Umur Pertama Kali Responden Menderita Hipertensi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah didiagnosis hipertensi	191	55.7	55.7	55.7
	Dewasa awal	14	4.1	4.1	59.8
	Dewasa Akhir	70	20.4	20.4	80.2
	Lansia awal	54	15.7	15.7	95.9
	Lansia akhir	14	4.1	4.1	100.0
	Total	343	100.0	100.0	

**Kategori Hasil Pemeriksaan Tekanan Darah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≥140/90 mmHg	146	42.6	42.6	42.6
	<140/90 mmHg	197	57.4	57.4	100.0
	Total	343	100.0	100.0	

**Kategori Responden yang Mengalami Hipertensi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hipertensi	138	40.2	40.2	40.2
	Tidak Hipertensi	205	59.8	59.8	100.0
	Total	343	100.0	100.0	

**Berapa Banyak Perokok Aktif Dalam Keluarga Responden**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	> 1 orang	70	20.4	20.4	20.4
	1 orang	273	79.6	79.6	100.0
	Total	343	100.0	100.0	

**Selain Anggota Keluarga, Apakah Mengizinkan Orang Lain Merokok Dalam Rumah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	291	84.8	84.8	84.8
	Tidak	52	15.2	15.2	100.0
	Total	343	100.0	100.0	

**Kategori Umur Pertama Kali Intens Terpapar Asap Rokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid >10 tahun	253	73.8	73.8	73.8
≤ 10 tahun	90	26.2	26.2	100.0
Total	343	100.0	100.0	

**Lokasi yang Paling Sering Terpapar Asap Rokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Di Dalam Rumah	130	37.9	37.9	37.9
Di Luar Rumah	213	62.1	62.1	100.0
Total	343	100.0	100.0	

**Jika Diluar Rumah, Dimana Tempat Paling Sering Terpapar Asap Rokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal	172	50.1	50.1	50.1
Ditempat-tempat Umum (Tempat Ibadah, Pasar, Transportasi Umum, Pelayanan Kesehatan, dll)	33	9.6	9.6	59.8
Ditempat Kerja	8	2.3	2.3	62.1
Di dalam rumah/sekitar rumah	130	37.9	37.9	100.0
Total	343	100.0	100.0	

**Apakah Pernah Menegur Orang yang Merokok disekitar Responden**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	98	28.6	28.6	28.6
Ya	245	71.4	71.4	100.0
Total	343	100.0	100.0	

ALAUDDIN  
MAKASSAR

**Reaksi Ketika Ada Orang yang Merokok disekitar Responden**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Membiarkan Diri Terpapar Asap Rokok	99	28.9	28.9	28.9
	Menghindari Asap Rokok	14	4.1	4.1	32.9
	Menghindari Asap Rokok Sembari Menutup Hidung	230	67.1	67.1	100.0
	Total	343	100.0	100.0	

**Kategori Reaksi Responden Ketika Terpapar Asap Rokok**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menghindar	92	26.8	26.8	26.8
	Menghindar	251	73.2	73.2	100.0
	Total	343	100.0	100.0	

**Kategori Jenis Rokok yang Dihisap Anggota Keluarga**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menggunakan Filter	51	14.9	14.9	14.9
	Menggunakan Filter	292	85.1	85.1	100.0
	Total	343	100.0	100.0	

**Berapa Jumlah Total Batang yang Ikut Responden Hisap Perharinya**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	lebih dari atau sama dengan 5 btg/hari	80	23.3	23.3	23.3
	kurang dari 5 btg/hari	263	76.7	76.7	100.0
	Total	343	100.0	100.0	

ALAUDDIN  
MAKASSAR

**Jumlah Perokok Aktif Dalam Keluarga \* Hipertensi  
Crosstabulation**

		Kategori Responden yang mengalami Hipertensi		Total
		Hipertensi	Tidak Hipertensi	
Berapa banyak perokok aktif dalam keluarga	> 1 orang	Count 29	41	70
		Expected Count 28.2	41.8	70.0
		% within Berapa banyak perokok aktif dalam keluarga 41.4%	58.6%	100.0%
1 orang	Count	109	164	273
	Expected Count	109.8	163.2	273.0
	% within Berapa banyak perokok aktif dalam keluarga 39.9%		60.1%	100.0%
Total	Count	138	205	343
	Expected Count	138.0	205.0	343.0
	% within Berapa banyak perokok aktif dalam keluarga 40.2%		59.8%	100.0%

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.052 <sup>a</sup>	1	.819		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.008	1	.927		
Likelihood Ratio	.052	1	.819		
Fisher's Exact Test				.891	.461
Linear-by-Linear Association	.052	1	.819		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	343				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28,16.

b. Computed only for a 2x2 table

**ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**Kategori Umur Pertama Kali Intens Terpapar Asap Rokok \*Hipertensi  
Crosstabulation**

			Kategori Responden yang mengalami Hipertensi		Total
			Hipertensi	Tidak Hipertensi	
Kategori Umur Pertama Kali Intens terpapar asap rokok	>10 tahun	Count	114	139	253
		Expected Count	101.8	151.2	253.0
		% within Kategori Umur Pertama Kali Intens terpapar asap rokok	45.1%	54.9%	100.0%
	≤10 tahun	Count	24	66	90
		Expected Count	36.2	53.8	90.0
		% within Kategori Umur Pertama Kali Intens terpapar asap rokok	26.7%	73.3%	100.0%
Total	Count	138	205	343	
	Expected Count	138.0	205.0	343.0	
	% within Kategori Umur Pertama Kali Intens terpapar asap rokok	40.2%	59.8%	100.0%	

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9.339 <sup>a</sup>	1	.002		
Continuity Correction <sup>b</sup>	8.590	1	.003		
Likelihood Ratio	9.684	1	.002		
Fisher's Exact Test				.003	.001
Linear-by-Linear Association	9.312	1	.002		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	343				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,21.

b. Computed only for a 2x2 table

**Lokasi yang Paling Sering Terpapar Asap Rokok \* Hipertensi  
Crosstabulation**

			Kategori Responden yang mengalami Hipertensi		Total
			Hipertensi	Tidak Hipertensi	
Lokasi yang paling sering terpapar asap rokok	Di Dalam Rumah	Count	46	84	130
		Expected Count	52.3	77.7	130.0
		% within Lokasi yang paling sering terpapar asap rokok	35.4%	64.6%	100.0%
	Di Luar Rumah	Count	92	121	213
		Expected Count	85.7	127.3	213.0
		% within Lokasi yang paling sering terpapar asap rokok	43.2%	56.8%	100.0%
Total	Count	138	205	343	
	Expected Count	138.0	205.0	343.0	
	% within Lokasi yang paling sering terpapar asap rokok	40.2%	59.8%	100.0%	

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.047 <sup>a</sup>	1	.153		
Continuity Correction <sup>b</sup>	1.735	1	.188		
Likelihood Ratio	2.060	1	.151		
Fisher's Exact Test				.174	.094
Linear-by-Linear Association	2.041	1	.153		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	343				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 52,30.

b. Computed only for a 2x2 table

**Kategori Reaksi Responden Ketika Terpapar Asap Rokok \* Hipertensi  
Crosstabulation**

			Kategori Responden yang mengalami Hipertensi		Total
			Hipertensi	Tidak Hipertensi	
Kategori Reaksi Responden Ketika Terpapar Asap Rokok	Tidak Menghindar	Count % within Kategori Reaksi Responden Ketika Terpapar Asap Rokok	56 60.9%	36 39.1%	92 100.0%
	Menghindar	Count % within Kategori Reaksi Responden Ketika Terpapar Asap Rokok	82 32.7%	169 67.3%	251 100.0%
Total		Count % within Kategori Reaksi Responden Ketika Terpapar Asap Rokok	138 40.2%	205 59.8%	343 100.0%

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	22.265 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	21.108	1	.000		
Likelihood Ratio	22.001	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	22.200	1	.000		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	343				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,01.

b. Computed only for a 2x2 table

**Kategori Jenis Rokok yang Dihisap Anggota Keluarga \* Hipertensi  
Crosstabulation**

			Kategori Responden yang mengalami Hipertensi		Total
			Hipertensi	Tidak Hipertensi	
Kategori jenis rokok yang dihisap anggota keluarga	Tidak Menggunakan Filter	Count	19	32	51
		Expected Count	20.5	30.5	51.0
		% within Kategori jenis rokok yang dihisap anggota keluarga	37.3%	62.7%	100.0%
	Menggunakan Filter	Count	119	173	292
		Expected Count	117.5	174.5	292.0
		% within Kategori jenis rokok yang dihisap anggota keluarga	40.8%	59.2%	100.0%
Total	Count	138	205	343	
	Expected Count	138.0	205.0	343.0	
	% within Kategori jenis rokok yang dihisap anggota keluarga	40.2%	59.8%	100.0%	

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.221 <sup>a</sup>	1	.638		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.099	1	.752		
Likelihood Ratio	.223	1	.637		
Fisher's Exact Test				.757	.379
Linear-by-Linear Association	.220	1	.639		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	343				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,52.

b. Computed only for a 2x2 table

**Jumlah Total Batang yang Ikut Responden Hisap Perharinya \* Hipertensi  
Crosstabulation**

		Kategori Responden yang mengalami Hipertensi		Total
		Hipertensi	Tidak Hipertensi	
Berapa jumlah total batang yang ikut anda hisap perharinya	≥5 btg/hari	Count 50	30	80
		Expected Count 32.2	47.8	80.0
		% within Berapa jumlah total batang yang ikut anda hisap perharinya 62.5%	37.5%	100.0%
< 5 btg/hari	Count	88	175	263
	Expected Count	105.8	157.2	263.0
	% within Berapa jumlah total batang yang ikut anda hisap perharinya	33.5%	66.5%	100.0%
Total	Count	138	205	343
	Expected Count	138.0	205.0	343.0
	% within Berapa jumlah total batang yang ikut anda hisap perharinya	40.2%	59.8%	100.0%

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21.513 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	20.322	1	.000		
Likelihood Ratio	21.210	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	21.450	1	.000		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	343				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 32,19.

b. Computed only for a 2x2 table

**Jumlah Total Batang yang Ikut Diihisap Perharinya \* Jumlah Perokok Aktif Dalam Keluarga  
Crosstabulation**

			Berapa banyak perokok aktif dalam keluarga		Total
			> 1 orang	1 orang	
Berapa jumlah total batang yang ikut anda hisap perharinya	≥ 5 btg/hari	Count % within Berapa jumlah total batang yang ikut anda hisap perharinya	41 51.2%	39 48.8%	80 100.0%
	< 5 btg/hari	Count % within Berapa jumlah total batang yang ikut anda hisap perharinya	29 11.0%	234 89.0%	263 100.0%
Total		Count % within Berapa jumlah total batang yang ikut anda hisap perharinya	70 20.4%	273 79.6%	343 100.0%

**Kategori Reaksi Responden Ketika Terpapar Asap Rokok \* Lokasi yang Paling Sering Terpapar Asap Rokok Crosstabulation**

			Lokasi yang paling sering terpapar asap rokok		Total
			Di Dalam Rumah	Di Luar Rumah/Sekitar Rumah	
Kategori Reaksi Responden Ketika Terpapar Asap Rokok	Tidak Menghindar	Count % within Kategori Reaksi Responden Ketika Terpapar Asap Rokok	37 40.2%	55 59.8%	92 100.0%
	Menghindar	Count % within Kategori Reaksi Responden Ketika Terpapar Asap Rokok	93 37.1%	158 62.9%	251 100.0%
Total		Count % within Kategori Reaksi Responden Ketika Terpapar Asap Rokok	130 37.9%	213 62.1%	343 100.0%

M A K A S S A R

**Kategori Jenis Rokok yang dihisap Anggota Keluarga \* Kategori Reaksi Responden Ketika Terpapar Asap Rokok Crosstabulation**

			Kategori Reaksi Responden Ketika Terpapar Asap Rokok		Total
			Tidak Menghindar	Menghindar	
Kategori jenis rokok yang dihisap anggota keluarga	Tidak Menggunakan Filter	Count % within Kategori jenis rokok yang dihisap anggota keluarga	14 27.5%	37 72.5%	51 100.0%
	Menggunakan Filter	Count % within Kategori jenis rokok yang dihisap anggota keluarga	78 26.7%	214 73.3%	292 100.0%
Total		Count % within Kategori jenis rokok yang dihisap anggota keluarga	92 26.8%	251 73.2%	343 100.0%

**Lokasi yang Paling Sering Terpapar Asap Rokok \* Kategori Jenis Rokok yang dihisap Anggota Keluarga Crosstabulation**

			Kategori jenis rokok yang dihisap anggota keluarga		Total
			Tidak Menggunakan Filter	Menggunakan Filter	
Lokasi yang paling sering terpapar asap rokok	Di Dalam Rumah	Count % within Lokasi yang paling sering terpapar asap rokok	22 16.9%	108 83.1%	130 100.0%
	Di Luar Rumah/Sekitar Rumah	Count % within Lokasi yang paling sering terpapar asap rokok	29 13.6%	184 86.4%	213 100.0%
Total		Count % within Lokasi yang paling sering terpapar asap rokok	51 14.9%	292 85.1%	343 100.0%

M A R K A S S A R

**Kategori Umur Pertama Kali Intens terpapar asap rokok \* Berapa jumlah total batang yang ikut anda hisap perharinya Crosstabulation**

			Berapa jumlah total batang yang ikut anda hisap perharinya		Total
			≥ 5 btg/hari	< 5 btg/hari	
Kategori Umur Pertama Kali Intens terpapar asap rokok	lebih dari 10 tahun	Count % within Kategori Umur Pertama Kali Intens terpapar asap rokok	62 24.5%	191 75.5%	253 100.0%
	kurang dari atau sama dengan 10 tahun	Count % within Kategori Umur Pertama Kali Intens terpapar asap rokok	18 20.0%	72 80.0%	90 100.0%
Total		Count % within Kategori Umur Pertama Kali Intens terpapar asap rokok	80 23.3%	263 76.7%	343 100.0%



## Lampiran 5

### Uji Validitas dan Realibilitas

Correlations

		Berapa banyak perokok aktif dalam keluarga	Selain AK, apakah mengizinkan orang lain merokok dlm rumah	total variabel 1
Berapa banyak perokok aktif dalam keluarga	Pearson Correlation	1	.498**	.858**
	Sig. (2-tailed)		.005	.000
	N	30	30	29
Selain AK, apakah mengizinkan orang lain merokok dlm rumah	Pearson Correlation	.498**	1	.866**
	Sig. (2-tailed)	.005		.000
	N	30	30	29
total variabel 1	Pearson Correlation	.858**	.866**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	29	29	29

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Apakah pernah menegur orang yg merokok di sekitar anda	Reaksi ketika ada orang yg merokok disekitar anda	totalv4new
Apakah pernah menegur orang yg merokok di sekitar anda	Pearson Correlation	1	.378*	.819**
	Sig. (2-tailed)		.039	.000
	N	30	30	30
Reaksi ketika ada orang yg merokok disekitar anda	Pearson Correlation	.378*	1	.841**
	Sig. (2-tailed)	.039		.000
	N	30	30	30
total variabel 4	Pearson Correlation	.819**	.841**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	30	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Correlations**

		Umur pertama kali terpapar asap rokok	Lokasi yang paling sering terpapar asap rokok	Jenis rokok yang dihisap anggota keluarga	Berapa jumlah total batang yang ikut anda hisap perharinya
Umur pertama kali terpapar asap rokok	Pearson Correlation	1	.183	.067	.391*
	Sig. (2-tailed)		.334	.723	.033
	N	30	30	30	30
Lokasi yang paling sering terpapar asap rokok	Pearson Correlation	.183	1	.277	.659**
	Sig. (2-tailed)	.334		.138	.000
	N	30	30	30	30
Jenis rokok yang dihisap anggota keluarga	Pearson Correlation	.067	.277	1	.385*
	Sig. (2-tailed)	.723	.138		.035
	N	30	30	30	30
Berapa jumlah total batang yang ikut anda hisap perharinya	Pearson Correlation	.391*	.659**	.385*	1
	Sig. (2-tailed)	.033	.000	.035	
	N	30	30	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.860	10

## Lampiran 6

### Keterangan Kode Etik Penelitian

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
*HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE*  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
*UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR*

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION*  
**"ETHICAL EXEMPTION"**

**B.104/KEPK/FKIK/VII/2021**

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : SOFIA PARWAENI  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Hubungan Paparan Asap Rokok Terhadap Kejadian Hipertensi pada Wanita di  
Wilayah Kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun  
2021"**

*"The Association of Cigarette Smoke Exposure to the Women Hypertension Cases at Wotu Clinic Working  
Area, Sub-District Wotu, East Luwu Regency in 2021"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022.

*This declaration of ethics applies during the period July 01, 2021 until July 01, 2022.*

*July 01, 2021*  
*Professor and Chairperson,*

DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

## Lampiran 7

### Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Lingsi No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa  
Website: fak.iau-alauddin.ac.id

Nomor : B. 3834/Un.DS/FKIK/PP.00.9/07/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Gowa, 7 Juli 2021

Kepada Yth :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel  
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan  
Di  
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sofia Parwaeni  
N I M : 70200117047  
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Desa Lakawati Kecamatan malili Kabupaten Luwu Timur

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

**"Hubungan Paparan Asap Rokok Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Wanita di Wilayah Kerja Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021."**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Emmi Bujawati, SKM., M.Kes.  
2. Nildawati, SKM., M.Epid.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur terhitung mulai tanggal 19 Juli s/d 19 Agustus 2021.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

  
Wassalam  
Dekan, P  
Syatirah

Tembusan :  
-Rektor UIN Alauddin Makassar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 18019/S.01/PTSP/2021  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.  
Bupati Luwu Timur

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2824/FKIK/PP.00.9/07/2021 tanggal 07 Juli 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **SOFIA PARWAENI**  
Nomor Pokok : 70200117047  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" **HUBUNGAN PAPARAN ASAP ROKOK TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI PADA WANITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WOTU KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021** "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **19 Juli s/d 19 Agustus 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 13 Juli 2021

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


**Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. *Partinggal*.

SIMAP PTSP 13-07-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln. Soekarno-Hatta HP. 08 12345 777 56  
email : [kppt@luwutimurkab.go.id](mailto:kppt@luwutimurkab.go.id) | website : [dpmptsp.luwutimurkab.go.id](http://dpmptsp.luwutimurkab.go.id)  
MALILI, 92981

Malili, 15 Juli 2021

Nomor : 149/DPMPTSP/VII/2021 Kepada  
Lampiran : - Yth. Kepala Desa Bawalipu  
Perihal : Izin Penelitian Di -  
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 15 Juli 2021 Nomor 149/KesbangPol/VII/2021, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Sofia Parwaeni  
Alamat : Dsn. Bali Mas Ds. Lakawali Kec. Malili  
Tempat / Tgl Lahir : Lakawali / 8 Juli 2000  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Nomor Telepon : 082293302194  
Nomor Induk Mahasiswa : 702001174047  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Lembaga : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul:

**"HUBUNGAN PAPARAN ASAP ROKOK TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI PADA WANITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WOTU KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021"**

Mulai : 15 Juli 2021 s.d. 15 Agustus 2021

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.



- Tembusan : disampaikan kepada Yth :
- 1 Bupati Luwu Timur [sebagai Laporan] di Malili;
  - 2 Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
  - 3 Camat Wotu Kab. Luwu Timur di Tempat;
  - 4 Dekan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR di Tempat;
  - 5 Sdr. (i) Sofia Parwaeni di Tempat.

## Lampiran 8

### Surat Keterangan Telah Meneliti



## PEMERINTAH DESA BAWALIPU

KECAMATAN WOTU

KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Bahari No.09 Kode Pos 92971

---

### SURAT KETERANGAN

No : 464 / 1150/DB/VIII/KC.WT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOLIHIN B. KANIYU  
Jabatan : KEPALA DESA BAWALIPU

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama-nama berikut ini :


Nama : SOFIA PARWAENI  
NIM : 70200117047  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Instansi : UIN Alauddin Makassar

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana sesungguhnya.

Bawalipu, 18 Agustus 2021

Kepala Desa Bawalipu



SOLIHIN B. KANIYU

## Lampiran 9

### Dokumentasi Penelitian



Puskesmas Wotu Kecamatan Wotu  
Kabupaten Luwu Timur



Kantor Desa Bawalipu



Lingkungan sekitar tempat tinggal responden  
yang paling sering terpapar asap rokok



Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  
Wotu tanpa adanya imbauan  
kawasan bebas dari asap rokok



Proses Wawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R