


KUALITAS HIDUP PASIEN HIV/AIDS: *STUDI LITERATUR REVIEW*



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan
Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Keperawatan
Uin Alauddin Makassar
Oleh

Vilda Amaliah

NIM 70300116047

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

ABSTRAK

Nama : Vilda Amaliah
Nim : 70300116047
Judul : kualitas hidup pasien HIV/AIDS : Sudi Literature

Pendahuluan: Pada tahun 2018, terdapat 37,9 juta orang hidup dengan HIV dan 770.000 orang meninggal karena AIDS. Data dari *Global Report UNAIDS* dengan jumlah kumulatif orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Indonesia dari tahun 1987 sampai 2016 sebanyak 319.048 kasus. Jumlah tersebut terdiri dari penderita HIV sebanyak 232.323 kasus dan AIDS sebanyak 86.725 kasus. HIV/AIDS telah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. DKI Jakarta merupakan provinsi urutan pertama dengan jumlah kumulatif HIV tertinggi dari tahun 2009-2017 sebanyak 46.758, diikuti oleh Jawa Timur (33. 043 kasus) dan Papua (25.586 kasus). Sedangkan, Sulawesi selatan termasuk dalam 10 besar yakni berada di urutan ke-9 (6.629 kasus). Kota Makassar merupakan kota dengan kasus tertinggi di Sulawesi selatan yaitu 864 kasus ditahun 2017, bahkan masuk peringkat 3 kota dengan penderita HIV/AIDS tertinggi di Indonesia. **Metode:** penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Database yang digunakan dalam studi literatur ini adalah *PubMed, Science Direct, Google Scholar* **Hasil** : dari studi literatur, ditemukan 33.053 artikel, setelah dilakukan proses *identification, screening, eligibility*, dan penilaian artikel berdasarkan *Guidline Review* dari *Joanna Briggs Institute* maka diperoleh 7 artikel yang kemudian di review. **Kesimpulan:** kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan kualitas hidup HIV/AIDS. Adapun karakteristik pada pasien HIV/AIDS adalah karakteristik dukungan keluarga, dukungan sosial, tingkatan ekonomi, tingkatan perkawinan, status pekerjaan, penggunaan obat, status kesehatan, stigmatisasi, dan status emosional.

Kata Kunci: *kualitas hidup, karakteristik, HIV/AIDS.*

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Kualitas Hidup Pasien HIV/AIDS**" yang disusun oleh **Vilda Amaliah** NIM: 70300116047, mahasiswa jurusan keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 10 Februari 2021 M, bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1442 H. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu kesehatan, jurusan keperawatan

Gowa, 10 Februari 2021M.
28 Jumadil Akhir 1442 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid.S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Risnah, SKM, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Huriati, S.Kep., Ns, M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dekan

Dr. dr. Svatirah, Sp.A.,M.Kes
NIP:198007012006042002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Kualitas Hidup Pasien HIV/AIDS”. Semoga salam serta selawat semoga tercurahkan kepada nabiullah muhammad SAW, para sahabat dan umatnya.

Adapun maksud penyusunan *literature review* ini, untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program study strata satu (S1) jurusan keperawatan pada fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun akademik 2020.

Dalam penyusunan *literature review* ini tentu tidak lepas dari bimbingan dan dorongan moral serta bantuan dari berbagai pihak. Segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam khususnya kepada orangtuaku tercinta, Ayahanda **Barto dg tulo'** dan Ibunda **Justia dg romba** yang telah banyak memberikan do'a, kasih sayang, bimbingan, nasehat, dukungan, motivasi, serta pengorbanan baik moral maupun material yang tak terhingga kepada penulis yang tidak mampu terbalaskan sampai akhir hayat.

Pada kesempatan ini penulis merasa patut menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu khususnya kepada:

1. **Prof. Hamdan Juhannis, MA, Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes** selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta para wakil dekan dan staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
3. **Dr. Muh Anwar Hafid S.Kep., Ns., M.Kes** selaku ketua jurusan keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan **Hasnah, S.Sit., S.Kep., Ns., M.Kes** selaku sekretaris jurusan keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, serta dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta staf prodi keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. **Huriati, S.Kep.,Ns., M.Kep** selaku pembimbing I dan **Dr. Muh. Anwar Hafid S.Kep., Ns., M.Kes.** selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis dari awal hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. **Dr. Risnah S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.** selaku penguji I dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si** selaku penguji II yang telah ikhlas dalam membarikan saran serta kritikan yang membangun kepada peneliti sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang bermanfaat ini.

6. Rekan-rekan Program Studi Keperawatan Angkatan 2016, teman-teman Ep16lotis, atas kesediaanya memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian studi ini, terkhusus evi azhari, nur atmasari, meilinda nurkhafifa, ilmy limyah, laode agustino saputra, sudah membantu dan memberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi sampai saat ini.
7. HMJ Keperawatan yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual, memberikan ilmu dan pengalaman dalam pengabdian masyarakat yang dimana akan menjadi bekal tersendiri bagi penulis dikemudian hari.
8. Sahabat A. Zalikah nidasoliah dan fatmawati atas semangat, dukungan, selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya tulis ini.

Terakhir kepada yang telah kebersamai dalam proses penyusunan skripsi ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan, nasehat dan perhatiannya hingga saat ini. Serta semua pihak yang telah membantu penulis, dimana nama-namanya tidak dapat disebutkan penulis satu-persatu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Jika ditemukan kesalahan dalam skripsi ini, Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah swt. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada para pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang

membangun demi meningkatkan mutu penulisan selanjutnya. Akhirul qalam,
semoga riset ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin Ya Robbal Aalamiin.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.



Gowa, 3 Juni 2020

Vilda Amaliah

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang HIV\AIDS.....	21
1. Defenisi HIV\AIDS.....	21
2. Etiologi HIV\AIDS.....	23
3. Tanda dan Gejala.....	24
4. Patofisiologi penyakit HIV/AIDS.....	25
5. Penularan HIV/AIDS.....	27
6. Tahap HIV-AIDS.....	29
7. Dampak HIV/AIDS.....	30
8. Tahap Penerimaan Diri pada ODHA.....	31
9. Pengobatan HIV/AIDS.....	32
10. Pencegahan HIV/AIDS.....	33
B. Tinjauan Umum tentang Kualitas Hidup.....	37
1. Pengertian kualitas Hidup.....	37
2. Aspek-aspek Kualitas Hidup.....	40

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup	41
C. Tinjauan Pustaka Teori Keperawatan Virginia Henderson.....	44
1. Defenisi Keperawatan Menurut Virginia Henderson.....	44
2. Model Keperawatan Virginia Henderson.....	45
3. Konsep Utama dan Teori Virginia Henderson.....	47
4. Aplikasi Teori Henderson dalam Proses Keperawatan	51
5. Tujuan Keperawatan Menurut Henderson	52
6. Manfaat Teori Virginia Henderson Pada Praktik Keperawatan.....	53
7. Proses keperawatan menurut Virginia Henderson	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Teknik Pengumpulan Data.....	56
C. Analisis data.....	58
LAMPIRAN.....	89
DAFTAR PUSTAKA	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Human immunodeficiency virus (HIV) infection/ Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius dengan dampak yang parah dalam berbagai segi kehidupan manusia (Jadhav, P. S., Laad, P. S., & Chaturvedi, 2017).

Orang dengan HIV lebih rentan terhadap berbagai jenis penyakit, hal ini karena sistem kekebalan tubuh penderita HIV telah rusak parah. Seseorang yang telah terinfeksi HIV akan terinfeksi seumur hidupnya (Prevention, 2018). Kualitas hidup sebagai persepsi individu tentang posisi individu tersebut dalam kehidupan berkaitan dengan budaya dan sistem nilai dimana individu tersebut hidup dan berhubungan dengan tujuan, harapan, standar dan fokus perhatian hidup. Kualitas hidup dipengaruhi oleh kesehatan fisik, keadaan psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial kepercayaan pribadi dan berhubungan dengan keadaan penting dilingkungan (WHO 1997), Sehingga kualitas hidup adalah multidimensional yang dapat diukur dengan berbagai pendekatan (Hidayati, 2019).

Sejak ditemukan, HIV/AIDS telah menjadi salah satu masalah kesehatan utama di dunia (Liping, 2015). Pada tahun 2018, terdapat lebih dari 37,9 juta orang hidup dengan HIV dan 770.000 orang meninggal karena AIDS (UNAIDS, 2018). Data UNAIDS Global Report melaporkan bahwa jumlah kumulatif orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Indonesia dari tahun 1987 hingga 2016 adalah 319.048 kasus. Jumlah tersebut terdiri dari penderita HIV sebanyak 232.323 kasus dan AIDS sebanyak 86.725 kasus (Liping, 2015).

HIV/AIDS telah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. DKI Jakarta merupakan provinsi pertama dengan jumlah kumulatif kasus HIV tertinggi antara tahun 2009 dan 2017, dengan 46.758 kasus, diikuti oleh Jawa Timur (33.043 kasus) dan Papua (25.586 kasus). Untuk bagiannya, Sulawesi Selatan termasuk dalam 10 besar, peringkat kesembilan (6.629 kasus) (Kementerian Kesehatan, 2017a). Kota Makassar merupakan kota dengan jumlah kasus tertinggi di Sulawesi Selatan yaitu 864 kasus pada tahun 2017, bahkan menempati urutan ketiga kota dengan jumlah penderita HIV/AIDS tertinggi di Indonesia (Dinkes, 2016).

Dilaporkan bahwa HIV/AIDS tidak hanya menimbulkan gejala dan komplikasi, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas hidup penderitanya (Mbada, 2013). Infeksi HIV selain mempengaruhi kesehatan fisik juga dapat menimbulkan kecemasan, depresi terkait kematian, terapi dan stigma yang mempengaruhi kualitas hidup.

Prognosis penderita HIV/AIDS tergantung pada tingkat pelayanan kesehatannya. Kualitas hidup terkait kesehatan dapat digunakan untuk menilai prognosis di antara pasien terinfeksi HIV dalam hal variabel demografis dan klinis. HIV/AIDS tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan fisik, tetapi juga kualitas hidup secara umum.

HIV/AIDS merupakan sumber stres yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dalam berbagai cara. ODHA (Orang Dengan HIV - AIDS) merupakan suatu hal yang sulit dalam kehidupan, dimana permasalahan yang kompleks selalu dihadapi setiap hari, tidak hanya mengobati kondisi penyakit, tetapi kondisi penyakit disertai dengan stigma sosial yang sangat diskriminatif dan yang menyebabkan stigmatisasi ODHA karena penyakitnya.).(Liping, 2015).

Menurut (Liping, 2015) terungkap bahwa HIV/AIDS sebagai penyakit kronis, selain menimbulkan efek samping akibat penggunaan narkoba dan infeksi oportunistik, juga dapat membuat penderitanya mengalami stigma dan diskriminasi. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan ODHA secara umum baik secara fisik, psikis, sosial dan finansial. Oleh karena itu, program pengobatan yang diberikan tidak hanya untuk memperpanjang umur ODHA tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Bunjoungmanee, 2014).

Seiring dengan perkembangan penyakitnya, pasien sering menghadapi masalah fisik, psikososial dan mental, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan hal ini berdampak pada kualitas hidup ODHA. Kualitas hidup penderita HIV dan AIDS menurut WHO mengacu pada kesehatan fisik dan kesehatan mental yang ditinjau dari fungsi fisik, psikologis, sosial dan lingkungan (WHO, 2004). Evaluasi total dari berbagai aspek tersebut menentukan kualitas hidup penderita HIV/AIDS secara umum (Yuliyanti, 2013).

Menurut penelitian (Rihaliza et al., 2020) menunjukkan hasil yang signifikan antara kualitas hidup dan kejadian HIV/AIDS, dan didukung oleh penelitian lain oleh Triani Banna 2019 yang menunjukkan nilai signifikan dengan memiliki hasil positif yang signifikan terhadap kualitas hidup. / penyakit AIDS (Banna, Triani, 2019).

Menurut hasil penelitian Novrianda (2018), 59,4% responden mendapat dukungan dari keluarganya dan 57,5% responden memiliki kualitas hidup yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa jika Odha memiliki keluarga yang baik untuk mendukung mereka, mereka akan memiliki kualitas hidup yang baik (Novrianda, 2018).

Dukungan sosial keluarga merupakan bagian utama dari dukungan yang dibutuhkan ODHA, sehingga ODHA dapat mengembangkan respon koping yang

efektif untuk beradaptasi dengan baik ketika menghadapi stresor yang dihadapinya terkait penyakit fisik, psikis dan sosial (Kusuma, 2011).

Sedangkan kualitas hidup merupakan isu penting dalam pelayanan kesehatan karena kualitas hidup dapat menurun ketika orang sakit dan sakit dalam waktu yang lama, dan menjadi pertimbangan penting dalam pencegahan sebelum dan sebelum penyakit muncul (Hanafi et al., 2016). Oleh karena itu dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, yang sangat penting bagi seorang perawat untuk mengatasi masalah aspek fisik, psikologis dan sosial pada setiap pasien ketika pertama kali didiagnosis HIV/AIDS dan mengalami stres. khawatir saat itu. Selanjutnya, setiap pasien yang baru pertama kali didiagnosis HIV/AIDS membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar. Beragamnya kebutuhan dan harapan pasien yang pertama kali didiagnosis HIV/AIDS akan layanan yang nantinya dapat membantu pasien HIV/AIDS meningkatkan kualitas hidup (QoL) (Welly Vitriawan, Ratna Sitorus, 2017)

Berdasarkan uraian penjelasan diatas tentang dampak dari penyakit HIV/AIDS, baik yang akan mempengaruhi kualitas hidup HIV/AIDS maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul gambaran kualitas hidup penderita HIV/AIDS dengan pendekatan literatur review.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti ingin melihat “Bagaimana kualitas hidup pasien HIV\AIDS ?”.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kualitas hidup pasien HIV\AIDS.

D. Manfaat Penelitian

1. Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, tentang bagaimana kualitas hidup pasien HIV\AIDS dan menjadi bahan ajar dalam materi terkait pemberian asuhan keperawatan pasien HIV\AIDS.

2. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bacaan memperdalam dan mengembangkan penelitian ini. Untuk menambah wawasan dan bahan masukan bagi masyarakat dalam mengetahui kualitas hidup pasien HIV\AIDS.

3. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kualitas hidup pasien HIV\AIDS.

E. Kajian Pustaka

No	Peneliti	Judul peneliti	Metode	Hasil
1	(Batubara et al., 2020)	Meningkatkan Kualitas Hidup Penderita <i>HIV/AIDS</i> Melalui Penggunaan <i>Antiretroviral (ARV)</i> dan Dukungan Keluarga	kuantitatif dengan desain deskriptif analitik. jenis penelitian <i>cross sectional</i> yang digunakan untuk mempelajari korelasi antar variabel sebab-akibat, dengan pendekatan <i>point time approach</i> .	Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien dengan <i>HIV-AIDS</i> (<i>p-value Continuity Correction</i> sebesar 0,006), yang menunjukkan dukungan keluarga dapat meningkatkan kualitas hidup penderita <i>HIV-AIDS</i> .
2	(Ardian et al., 2020)	Persepsi Kualitas Hidup Penderita <i>HIV Positif</i> di Kota Semarang	Desain penelitian kualitatif yang berfokus pada persepsi kualitas hidup ODHA, Informan awal ditentukan dengan teknik purposive sampling dan untuk melengkapi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi ODHA mengenai kualitas hidup mereka baik dan memuaskan. Ini karena PLWH dalam penelitian ini memahami <i>HIV</i> dengan sangat baik, secara teratur menggunakan <i>ARV</i> , mempertahankan gaya hidup sehat, menghadiri Kelompok Dukungan Sebaya, dan mendapatkan dukungan dari keluarga

			<p>informasi lebih lanjut, teknik snowball sampling digunakan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu 5 pasien gay dengan HIV positif menggunakan pendekatan analitik deskriptif.</p>	atau teman.
3	(Xiaohua et al., 2015)	Perceived stigma, medical social support and quality of life among people living with HIV/AIDS in Hunan, China.	<p>Sampel 190 peserta yang memenuhi kriteria inklusi dari dua klinik HIV di Hunan, Cina. Skala Stigma terkait HIV, Studi Hasil Medis Versi</p>	<p>Dukungan sosial, dan kualitas hidup masing-masing adalah 104,32, 53,63, dan 61,97, yang berada dalam kisaran sedang. pengobatan antiretroviral, dan jumlah CD4 yang tinggi memprediksi kualitas hidup yang lebih baik.</p>

			<p>Cina - Survei Dukungan Sosial (MOS-SSS-C), dan Studi Hasil Medis-HIV (MOS-HIV) digunakan untuk mengukur stigma yang dirasakan, dukungan sosial dan kualitas hidup di PLWH.</p>	
4	(Cooper et al., 2017)	Measuring quality of life among people living with HIV: a systematic review of reviews	<p>Peninjauan dilakukan dalam dua tahap: 1) pencarian database elektronik untuk mengidentifikasi tinjauan sistematis alat yang digunakan untuk mengukur HRQoL pada orang dewasa yang hidup</p>	<p>Studi (MOS) Bentuk Pendek (SF) -12; SF-36; Kualitas Hidup Organisasi Kesehatan Dunia (WHOQOL-BREF), Pertanyaan Kehidupan Kepuasan (FLZM) dan SF-20. Data psikometri yang tersedia mendukung EQ-5D dan SF-36. Tujuh khusus HIV skala memenuhi kriteria inklusi: AIDS Clinical Trials Group (ACTG) -21; HIV-QL-31; MOS-HIV; Multidimensi Kuesioner Kualitas Hidup Orang dengan HIV / AIDS</p>

			<p>dengan HIV, diterbitkan sejak tahun 2000; 2) pemilihan HRQol skala dari yang diidentifikasi dalam ulasan. Kriteria inklusi termasuk skala yang dapat diatur sendiri 10 menit atau kurang, mencakup setidaknya 3 domain kualitas hidup (fungsi fisik, fungsi sosial / peran dan fungsi mental /fungsi emosional). Untuk skala generik, kriteria inklusi mencakup ketersediaan data normatif sedangkan</p>	<p>(MQOL-HIV), PROQOL-HIV, Gejala Kualitas Hidup Kepatuhan (HIV-SQUAD) dan WHOQOL-HIV BREF. Dari tindakan khusus HIV, MOS-HIV dianggap memiliki sifat psikometri yang paling mapan, namun batasan yang diidentifikasi dalam ulasan disertakan masukan yang tidak memadai dari orang yang hidup dengan HIV dalam pengembangan skala, relevansi lintas budaya dan berkelanjutan penerapan. Dua ukuran yang relatif baru, WHOQOL-HIV BREF dan PROQOL-HIV, dianggap memiliki sifat psikometri yang menjanjikan dan mungkin lebih relevan dengan orang yang hidup dengan HIV.</p>
--	--	--	---	--

			<p>untuk skala khusus HIV diperlukan masukan pasien untuk pengembangan skala tersebut.</p> <p>Hasil: Sepuluh ulasan memenuhi kriteria inklusi. Sembilan skala umum memenuhi kriteria inklusi: EuroQol lima dimensi kuesioner (EQ-5D); Indeks Utilitas Kesehatan; Kuesioner McGill Quality of Life.</p>	
5	(Rihaliza et al., 2020)	Hubungan Kepatuhan Minum Obat dan Jumlah CD4 Terhadap Kualitas Hidup Orang dengan HIV	Jenis penelitian adalah analitik dengan pendekatan <i>cross-</i>	Analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna dengan $p < 0,05$ antara kepatuhan minum obat dan jumlah CD4 terhadap

		<p>AIDS di Poliklinik Voluntary Counseling and Testing RSUP Dr M Djamil Padang.</p>	<p><i>sectional.</i></p> <p>Sampel penelitian berjumlah 100 ODHA yang melakukan kontrol di Poliklinik VCT RSUP Dr M Djamil Padang.</p> <p>Instrumen penelitian menggunakan 2 kuesioner, yaitu WHOQOL-HIV BREF, <i>Simplified Self-Report Measure of Adherence</i> dan studi dokumentasi pada rekam medis pasien.</p> <p>Analisis data menggunakan uji <i>Chi square.</i></p>	<p>kualitas hidup ODHA.</p>
--	--	---	--	-----------------------------

6	(Banna, Triani, 2019).	Kualitas Hidup Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) Ditinjau dari Kepatuhan Minum Obat Antiretroviral (ARV).	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan cross sectional, Sampel penelitian sebanyak 51 orang yang diambil dengan teknik accidental sampling sesuai kriteria inklusi dan eksklusif.	Hasil uji spearman menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan dengan arah positif antara kepatuhan minum obat ARV dengan spearman menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan dengan arah positif antara kepatuhan minum obat ARV dengan kualitas hidup ODHA, dan sangat kuat ($p = 0,000$; dengan nilai $r = 0,764$). Petugas kesehatan diharapkan dapat berkomitmen dalam menjalankan program yang sudah ada, memberikan edukasi secara kontinu tentang pentingnya menjalankan ARV, serta lebih dapat merangkul ODHA melalui kegiatan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS).
7	(Medeiros et al., 2017).	Quality of life, socioeconomic and clinical factors, and physical exercise in persons living with HIV/AIDS.	Penelitian Ini menggunakan penelitian kuantitatif eksplorasi cross-sectional menggunakan kuesioner	Domain yang menyajikan rata-rata lebih rendah untuk kualitas hidup adalah masalah keuangan, berkaitan dengan kerahasiaan, fungsi umum, dan kepuasan dengan kehidupan. Kami menemukan asosiasi

			<p>terstruktur untuk menilai aspek sosial ekonomi (jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, perkawinan status, ras, status sosial ekonomi, tanggungan pada pendapatan keluarga, hubungan kerja), parameter klinis (waktu diagnosis penyakit, penggunaan dan waktu pengobatan, jumlah sel T CD4, dan viral load), dan praktik latihan fisik. Untuk menilai kualitas hidup, kami</p>	<p>dengan variabel status sosial ekonomi dan latihan fisik, terapi, dan latihan fisik untuk dua domain terakhir, secara berurutan.</p>
--	--	--	--	--

			<p>menggunakan Kualitas kuesioner Kehidupan (HAT-QoL). Untuk karakterisasi data sosial ekonomi dan klinis dan domain kualitas hidup, kami melakukan analisis deskriptif (frekuensi sederhana, rata-rata, dan standar deviasi). Kami menerapkan regresi linier, mengikuti model hirarkis untuk masing-masing domain kualitas hidup.</p>	
8	(Carsita, Wenny & Mirah, Asmi, 2019).	Kualitas Hidup ODHA Di Kecamatan Bongas.	Jenis penelitian ini kuantitatif dengan pendekatan	Hasil penelitian sebanyak 118 (71,5%) responden memiliki kualitas hidup domain fisik baik, 84 (50,9%) responden

			<p>deskriptif. Sampel penelitian berjumlah 165 responden dengan teknik pengambilan <i>consecutive sampling</i>.</p>	<p>memiliki kualitas hidup domain psikologis baik, 124 (75,2%) responden memiliki kualitas hidup domain sosial baik, 93 (56,4%) memiliki kualitas hidup domain kemandirian baik, 86(52,1%) responden memiliki kualitas hidup domain lingkungan baik, dan 86 (52,1%) responden memiliki kualitas hidup domain spiritual baik. Simpulan pada penelitian ini adalah ODHA di Kecamatan Bongas memiliki kualitas hidup baik.</p>
9	(Miyada et al., 2019).	<p>Quality of life of people with HIV/AIDS - the influence of social determinants and disease-related factors.</p>	<p>Studi epidemiologi lintas bagian ini dilakukan di fasilitas kesehatan khusus HIV / AIDS dari Layanan Kesehatan Masyarakat Brasil. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen</p>	<p>Penelitian tersebut melibatkan 109 peserta. Di antara banyak asosiasi statistik signifikan yang ditemukan dalam penelitian ini, variabel yang memiliki pengaruh lebih besar pada domain yang dinilai oleh instrumen adalah tingkat pendidikan, pekerjaan, situasi keuangan, etnis, dan gejala.</p>

			HIV / AIDS-Targeted Quality of Life (HAT-QoL).	
10	(Gati Murwani et al., 2017).	Hubungan Tingkat Spiritualitas Dengan Tingkat Kualitas Hidup Pasien Hiv/Aids Di Poliklinik Vct RSUD Dr. Moewardi Surakarta.	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i> . Pengambilan Sample menggunakan Teknik <i>non-probability sampling</i> yaitu <i>purposive sampling</i> , dengan jumlah sampel penelitian 69 orang responden. Sedangkan Instrumen penelitian	Hasil uji bivariat membuktikan bahwa ada hubungan tingkat spiritualitas dengan tingkat kualitas hidup pasien HIV/AIDS di Poliklinik VCT RSUD Dr. Moewardi Surakarta (ρ value = 0,000 < 0,05, τ sebesar 0,514).

			menggunakan kuesioner dari WHO. Analisa bivariat menggunakan uji <i>Kendall's Tau</i>	
10	(Krisdayanti & Hutasoit, 2019).	Pengaruh <i>coping strategies</i> terhadap kesehatan mental dan kualitas hidup penderita hiv/aids positif.	Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelusuran artikel melalui database ncbi dan google scholar. Tahun penerbitan sumber pustaka adalah dari tahun 2001 sampai 2019 dengan 20 sumber pustaka.	Hasil dari sintesa artikel yang telah ditemukan yaitu <i>coping strategies</i> ini sangat mempengaruhi kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup penderita hiv/aids positif.
11	(Fajriyah et al., 2018) .	Pengaruh Depresi, Stigma, dan Kelompok Dukungan Sebaya terhadap Kualitas Hidup ODHA di	Jenis penelitian observasional analitik dengan desain cross-	Kualitas hidup ODHA meningkat dengan keterlibatan dalam KDS (b = 3,40; 95% CI = 0,71 hingga 6,10; p = 0,001), dukungan sosial (b = 0,70;

		<p>Kelompok Dukungan Sebaya Solo Plus, Surakarta Jawa Tengah.</p>	<p>sectional. Penelitian dilakukan di Solo plus peer support group, Surakarta, Jawa Tengah, dari bulan Januari sampai dengan Februari 2018. Sampel 100 ODHA dipilih untuk penelitian ini dengan simple random sampling. Itu variabel terikat adalah kualitas hidup ODHA. Variabel bebas adalah perilaku sehat, depresi, pendapatan keluarga, stigma, dukungan teman sebaya, dan dukungan sosial.</p>	<p>CI 95% = 0,01 hingga 1,40; $p = 0,046$), dan sehat perilaku ($b = 9,33$; CI 95% = 5,30 hingga 13,36; $p < 0,001$). Kualitas hidup ODHA menurun dengan adanya stigma ($b = -1,10$; 95% CI = -1,84 hingga -0,36; $p = 0,003$), dan depresi ($b = -4,23$; 95% CI = -6,62 hingga -1,83; $p = 0,001$). Kualitas hidup ODHA secara tidak langsung dipengaruhi oleh pendapatan ($b = 0,06$; CI 95% = 10,14 sampai 18,61; $p < 0,001$).</p>
--	--	---	--	---

			Pengumpulan data dilakukan oleh kuesioner dan dianalisis dengan analisis jalur.	
--	--	--	---	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang HIV/AIDS

1. Defenisi HIV/AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV menyerang tubuh manusia dengan cara membunuh atau menghancurkan sel-sel yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan kanker yang masuk ke dalam tubuh (Derrickson, 2016).

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami berbagai infeksi akibat rusaknya sel-sel sistem kekebalan tubuh secara progresif oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus). AIDS mencerminkan infeksi HIV stadium akhir. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat bebas gejala selama bertahun-tahun meskipun virus tersebut aktif menyerang sistem kekebalan tubuh (Derrickson, 2016).

Menurut Syafrudin, AIDS adalah kumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul akibat rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat terinfeksi virus HIV. Virus HIV menyebabkan sistem kekebalan tubuh

manusia melemah. Orang yang terpapar virus HIV akan menjadi rentan terhadap segala macam penyakit menular. Saat ini pengobatan virus HIV hanya memperlambat laju perkembangan virus, yaitu penyakit ini belum ada obatnya (Leminaria Naibaho, Palupi Triwahyuni, 2017).

Dalam pandangan Islam, penyakit merupakan musibah yang bisa menimpa siapa saja, bahkan orang yang shaleh dan mulia. Artinya, orang yang terkena penyakit itu belum tentu sakit karena dosa yang telah dilakukannya, tetapi bisa jadi menjadi korban dari perbuatan orang lain. Allah SWT berfirman :

وَأْتَفَوْا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. (QS Al-Anfal : 25).

Melalui ayat ini, Al-Qur'an menyeru manusia agar berhati-hati terhadap siksaan Allah, yang disebut fitnah dalam ayat ini. Seruan itu bersifat umum, dan Al-Qur'an tidak secara khusus menyebut kelompok-kelompok tertentu yang tidak benar sebagai konsekuensi logis dari tindakan mereka. Namun disebutkan pula bahwa fitnah/siksaan juga menimpa mereka yang tidak berbuat jahat (Ani, 2017).

AIDS juga dapat menimbulkan komplikasi penyakit, seperti penyakit paru-paru, saluran pernapasan, saluran pencernaan, gangguan saraf dan kejiwaan, tumor ganas (maligna), dan infeksi oportunistik (Kusuma, 2011).

2. Etiologi HIV/AIDS

Pada tahun 1984, Dr. R. Gallo dari Institut Kesehatan Nasional AS menemukan virus lain yang disebut HTLV-III (Human T Lyphotropic Virus Type III). Kedua virus ini merupakan temuan mereka dan diduga sebagai penyebab AIDS, karena dapat diisolasi dari penderita AIDS/ARC di Amerika, Eropa dan Afrika Tengah. Maka penelitian lebih lanjut terkait virus ini akhirnya membuktikan bahwa virus ini sama, sehingga WHO memberinya nama HIV, yang disesuaikan dengan penemuannya “International Committee on Taxonomy of Viruses” pada tahun 1982. HIV menyerang dan menghancurkan sel T yang telah peran penting dalam sistem kekebalan tubuh (Masriadi, 2016).

HIV merupakan Retrovirus dari famili Retroviridae karena informasi genetiknya ada pada RNA (Ribonucleic Acid) bukan pada DNA (Deoxyribonucleic Acid). Virus ini memiliki diameter 100-120 nm, terdapat dua komponen penting yaitu kapsul dan inti (Setiati, 2014). Inti berisi genom virus yang terkait dengan protein spesifik yang bertindak sebagai regulator. Inti bagian dalam adalah RNA yang ditutupi oleh cangkang protein (casid). Kasus HIV dikelilingi oleh selubung yang terdiri dari lipid bilayer yang ditembus oleh berbagai glikoprotein (Derrickson, 2016).

3. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala umum termasuk demam, lesu, ruam, sakit kepala, nyeri sendi, sakit tenggorokan, dan pembesaran kelenjar getah bening. Sekitar 50% orang yang terinfeksi HIV mengalami keringat malam. Ada beberapa tahapan dari HIV hingga AIDS. Beberapa orang memiliki perjalanan penyakit yang sangat cepat hanya sekitar 2 tahun, dan beberapa berkembang perlahan hingga 10 tahun (tidak ada perkembangan) (Derrickson, 2016).

Dengan menurunnya sistem imun atau daya tahan tubuh, berbagai komplikasi mulai muncul, yaitu:

- a. Pembesaran kelenjar getah bening yang terjadi selama 3 bulan
- b. Badan terasa lemas
- c. Penurunan berat badan yang berkelanjutan
- d. Demam dan keringat yang datang berulang-ulang
- e. e. Menderita infeksi jamur (mulut dan vagina) yang terjadi berulang kali dan terus menerus
- f. Radang panggul pada wanita yang tidak kunjung sembuh dengan berbagai perawatan
- g. kehilangan memori jangka pendek
- h. Beberapa pasien mengalami infeksi herpes disertai nyeri saraf yang parah.

Anak juga mengalami pertumbuhan yang lambat dan sering jatuh sakit (Soedarto, 2012).

Tanda dan gejala umum termasuk demam, lesu, ruam, sakit kepala, nyeri sendi, sakit tenggorokan, dan pembesaran kelenjar getah bening. Sekitar 50% orang yang terinfeksi HIV mengalami keringat malam. Ada beberapa tahapan dari HIV hingga AIDS. Beberapa orang memiliki perjalanan penyakit yang sangat cepat hanya sekitar 2 tahun, dan beberapa berkembang perlahan hingga 10 tahun (tidak ada perkembangan) (Derrickson, 2016)

Menurut (Kemenag, 2018) Terungkap Tidak semua HIV/AIDS memiliki gejala yang khas, dan gejala yang muncul tidak selalu pada alat kelamin.

Gejala terkena HIV/AIDS antara lain:

- a. Keputihan dengan jumlah yang banyak, berbau, berwarna, dan gatal.
- b. Gatal disekitar alat kelamin.
- c. Adanya benjolan, bintil/kutil atau jerawat disekitar kelamin dan anus.
- d. Adanya luka/koreng/lecet disekitar kelamin dan anus.
- e. Pembengkakan dan sakit di sekitar kelamin.
- f. Nyeri di bagian bawah perut dan selama berhubungan seksual.

4. Patofisiologi penyakit HIV/AIDS

HIV pertama-tama mengikat limfosit sel induk melalui gp 120 dan kemudian terjadi difusi membran HIV dengan sel induk. Kemudian inti HIV memasuki sitoplasma. Di dalam sitoplasma HIV, DNA dan RNA HIV akan dibentuk oleh enzim polimerase. DNA virus yang dianggap sebagai DNA sel

induk akan diubah menjadi RNA. Sedangkan enzim protease akan mengubah mRNA di sitoplasma menjadi partikel HIV. Partikel tersebut kemudian terlepas dari penutup bahan sel induk untuk melarikan diri sebagai virus HIV. Sehingga sistem kekebalan tubuh akan terganggu (Widoyono, 2011).

Menurut (Widoyono, 2011) menjelaskan bahwa orang yang terinfeksi HIV akan kehilangan limfosit T. Ada tiga tahap yang dapat membantu selama beberapa bulan atau tahun:

- a. Seorang yang sehat mempunyai CD4+ sebanyak 800-1300 sel/mL darah.
- b. Pada bulan pertama individu yang terinfeksi CD4 nya akan menurun sebanyak 40-50%. Orang yang menderita HIV/AIDS dapat menularkan jika partikel virus HIV banyak terdapat dalam darah atau tubuh.
- c. Setelah 6 bulan, perusakan sel CD4 dan penularan penyakit kepada orang lain terus terjadi.
- d. 1 sampai 2 tahun sebelum berlanjut ke fase AIDS, jumlah limfosit CD4
- e. menurun sangat drastis. Kadarnya didalam tubuh bisa mencapai 200 sel/ml. Sehingga penderita sangat rentan terhadap infeksi.
- f. Infeksi HIV juga dapat menyebabkan gangguan pada limfosit B yang berfungsi sebagai penghasil dan menyebabkan produksi anti bodi yang berlebihan.
- g. Antibody ini terutama berfungsi untuk melawan HIV dan infeksi yang dialami penderita akan tetapi anti bodi ini tidak bisa banyak membantu dalam melawan infeksi oportunistik pada penderita AIDS.

- h. Pada saat yang bersamaan, limfosit CD4 dihancurkan oleh virus sehingga berkurangnya kemampuan sistem kekebalan tubuh dalam mengenali organisme yang masuk ke dalam tubuh dan sasaran yang akan diserang.

5. Penularan HIV/AIDS

Menurut (Indonesia, 2016) mengatakan Penularan HIV/AIDS bisa melalui hubungan seks (anal, oral dan vaginal) yang tidak terlindungi dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Penularan melalui pemakaian obat bius intravena terjadi lewat kontak langsung darah dengan jarum yang terkontaminasi. Darah atau produk darah orang yang telah terinfeksi HIV dapat menular melalui transfusi darah. Virus HIV dapat pula ditularkan *in utero* dari ibu kepada bayinya dan kemudian melalui air susu ibu. HIV tidak ditularkan melalui jabat tangan, sentuhan, ciuman, pelukan, menggunakan peralatan makan/minum, gigitan nyamuk, memakai toilet yang sama atau tinggal serumah dengan ODHA.

Penularan penyakit ini yaitu dapat melalui cairan tubuh seperti darah, cairan genitalia laki-laki ataupun perempuan dan Air Susu Ibu. Virus juga terdapat pada saliva air mata tetapi sangat rendah penularannya. HIV tidak terdapat dalam air mata dan keringat. Pria yang sudah disunat atau sudah balig memiliki resiko tertular HIV/AIDS yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki yang belum disunat (Widoyono, 2011).

a. Media penularan HIV/AIDS

HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang yang terinfeksi, seperti darah, ASI, air mani, dan cairan vagina. Orang tidak dapat terinfeksi melalui kontak biasa sehari-hari, seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi barang pribadi, makanan, atau air.

Cara penularan HIV/AIDS :

- 1) Hubungan seksual : Hubungan seks yang tidak aman dengan orang yang telah terpajan HIV.
- 2) Transfusi darah : melalui transfusi darah yang terkontaminasi HIV.
- 3) Penggunaan jarum suntik : penggunaan jarum suntik, tindik, tato dan pisau yang dapat menyebabkan luka yang tidak disterilkan secara bersama-sama digunakan dan pernah digunakan oleh orang yang terinfeksi HIV.
- 4) Ibu hamil kepada anak yang dikandungnya
 - a) Antenatal : saat bayi masih dalam kandungan, melalui plasenta.
 - b) Intranatal : Selama persalinan, bayi terpapar darah ibu atau cairan vagina.
 Postnatal : setelah melahirkan, melalui ASI. Faktanya, 25-35% dari semua bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi di negara berkembang terinfeksi HIV, dan 90% bayi dan anak yang terinfeksi HIV terinfeksi oleh ibu mereka.

b. Perilaku berisiko yang menularkan HIV/AIDS

- 1) Melakukan seks anal atau vaginal tanpa kondom.
- 2) Memiliki infeksi menular seksual lainnya seperti sifilis, herpes, klamidia, kencing nanah, dan vaginosis bakterial.
- 3) Berbagi jarum suntik yang terkontaminasi, alat suntik dan peralatan suntik lainnya dan solusi obat ketika menyuntikkan narkoba.
- 4) Menerima suntikan yang tidak aman, transfusi darah, transplantasi jaringan, prosedur medis yang melibatkan pemotongan atau tindakan yang tidak steril.
- 5) Mengalami luka tusuk jarum yang tidak disengaja, termasuk diantara pekerja kesehatan.
- 6) Memiliki banyak pasangan seksual atau mempunyai pasangan yang memiliki banyak pasangan lain.

6. Tahap HIV-AIDS

Ada beberapa tahapan perkembangan virus HIV AIDS di dalam tubuh (Indonesia, 2016):

- a. Tahap masa jendela: Selama periode ini, orang tersebut sudah memiliki virus dan sudah dapat menularkannya bahkan jika mereka tidak dites positif di laboratorium.
- b. Tahap tanpa gejala: Pada tahap ini, sel darah putih masih cukup untuk mengatasi infeksi yang masuk ke dalam tubuh.

- c. Tahapan dengan gejala: Perusakan progresif dan penghancuran sel darah putih oleh HIV telah melumpuhkan sistem kekebalan tubuh. Dan saat itu penyakit oportunistik mulai bermunculan karena daya tahan tubuh sudah sangat menurun.
- d. Tahapan AIDS: Berbagai jenis infeksi oportunistik seperti pneumonia, gangguan saraf, jamur dan kanker kulit telah ditemukan pada stadium ini.

7. Dampak HIV/AIDS

a. Dampak Psikologis

Dampak psikologis merupakan persepsi atau pemikiran yang menjadi beban pikiran ODHA selama ini. Terdapat perbedaan psikologis sebelum dan sesudah terinfeksi HIV/AIDS (Pardita, 2014). Reaksi berupa syok (kejutan batin), stres, frustrasi, kecemasan, kemarahan, penyangkalan, rasa malu, dan kesedihan merupakan reaksi psikologis ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya telah didiagnosis. Penelitian oleh (Tao, 2016) menemukan bahwa 20% dari 367 partisipan 11 (74 orang) diduga mengalami depresi, malu dan bersalah atas apa yang telah mereka lakukan. Selain itu, anggapan bahwa obat yang dikonsumsi dapat melawan infeksi HIV tetapi tidak dapat mematakannya merupakan tekanan psikologis bagi ODHA (Pardita, 2014).

b. Dampak Spiritual

Dampak spiritual juga merupakan dampak yang dirasakan oleh ODHA. Menyalahkan Tuhan dan merasa bersalah atas hal-hal yang telah dilakukan di masa lalu membuat mereka tidak mau beribadah dan tidak lagi

ingin memikirkan masa depan karena merasa sudah mendekati kematian. Respon spiritual yang diharapkan dari ODHA adalah salah satu harapan yang realistis, teguh dan sabar serta pandai mengambil pelajaran dari kondisi mereka saat ini, karena spiritualitas dapat dijadikan sebagai sumber daya individu untuk menghadapi penyakit yang dihadapinya (Pardita, 2014).

c. Dampak Sosial

Dampak sosial merupakan hambatan terbesar bagi ODHA untuk berinteraksi dengan masyarakat. Terjadi penurunan intensitas aktivitas yang biasa dilakukan ODHA sebelum dan sesudah terinfeksi (Pardita, 2014). Hal ini disebabkan oleh stigma dan diskriminasi yang ada di masyarakat. Stigma sosial dapat memperburuk depresi dan pandangan negatif terhadap harga diri ODHA sehingga menimbulkan perasaan prasangka, malu, terasing, penurunan rasa percaya diri, kehilangan motivasi, penarikan diri dan penolakan yang sering dirasakan ODHA di masyarakat (Hikmat, 2015). Adanya stigma di tempat kerja, keluarga, pelayanan kesehatan meningkatkan stres ODHA sehingga akan menimbulkan depresi, respon psikologis yang berkepanjangan dan kembalinya perilaku destruktif seperti kembali menggunakan narkoba (Rajab, 2019).

7. Tahap Penerimaan Diri pada ODHA

Orang dengan HIV/AIDS termasuk dalam kerugian kesehatan, yang merupakan bagian dari kehilangan dan kesedihan. Kehilangan dan duka

merupakan respon yang diberikan oleh orang-orang yang telah kehilangan kenyataan yang terjadi atau seberapa besar ODHA menerima kenyataan (Segal, 2019). Respon emosional seperti terkejut, marah, tidak percaya, bersalah, dan sedih. Pada tahap ini, tahapan kehilangan dan kesedihan yang dirasakan oleh penderita HIV/AIDS adalah (Segal, 2019) :

- a. *Denial*: Penyangkalan, tidak menerima apa yang terjadi. Verbalisasi seperti "ini tidak mungkin terjadi pada saya".
- b. *Anger*: Marah terhadap kenyataan dan mencari orang lain untuk disalahkan. Verbalisasi seperti "mengapa ini terjadi kepada saya? Siapa yang harus disalahkan?"
- c. *Bargaining*: Tawar-menawar, adanya mekanisme untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Verbalisasi seperti "buat ini tidak terjadi dan sebagai imbalannya aku akan menjauhi narkoba".
- d. *Depression*: Depresi, menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara atau putus asa. Gejala yang timbul adalah menolak makan, susah tidur dan letih.
- e. *Acceptance*: Penerimaan, mulai menerima kenyataan yang terjadi. Perubahan verbalisasi "apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh?" dan juga "yah, akhirnya saya harus operasi".

9. Pengobatan HIV/AIDS

Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan orang dengan HIV/AIDS.

Namun, ada pengobatan yang dapat mempertahankan dan menekan viral load

(jumlah virus HIV dalam darah ODHA) pada tingkat yang rendah atau tidak terdeteksi untuk meminimalkan risiko penularan, yaitu ARV (antiretroviral yang harus diminum ODHA setiap hari sesuai anjuran). Ada 3 jenis kelompok ARV, yaitu NNRTI (non-nucleocidal reverse transcriptase inhibitor), nucleocidal reverse transcriptase inhibitor (NRTI), dan protease inhibitor (PI) (Children, 2014).

Dalam 6 bulan, ARV dapat membuat viral load tidak terdeteksi. Jika ODHA berhenti minum obat ARV, viral loadnya akan meningkat lagi dengan cepat (Secretary's Minority AIDS, 2019).

Namun, adanya stigma menjadi kendala dalam pengobatan yang dilakukan. Kelompok berisiko (heteroseksual, homoseksual, penasun, pekerja seks) akan takut untuk dites HIV karena takut jika status HIV mereka positif, mereka akan dikucilkan. ODHA cenderung menunda pengobatan karena takut mengungkapkan status HIV-nya kepada petugas kesehatan (Handayani, 2017).

10. Pencegahan HIV/AIDS

Pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan penderita HIV/AIDS, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui barang-barang yang terpapar bahan infeksius dari penderita HIV (Soedarto, 2012).

Menurut (Widoyono, 2011), pencegahan penyakit HIV/AIDS yaitu :

- a. Tidak hubungan seksual dengan penderita AIDS.
- b. Tidak berhubungan seks dengan orang yang suka berganti-ganti pasangan.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Isra“/17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Terjemahnya:

“Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Penjelasan ayat di atas yaitu Sayyid Qutub (2008) menulis bahwa zina adalah membunuh sperma yang tidak pada tempatnya, biasanya harus ada keinginan untuk menggugurkan kandungan, yaitu membunuh janin yang ada di dalamnya, sekalipun diizinkan. untuk hidup, biasanya akan dibuang atau dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mendidik dan membesarkannya. Perzinahan juga merupakan pembunuhan terhadap masyarakat dan merupakan fitnah dan kehormatan bagi keluarga Anda.

Paragraf ini menegaskan bahwa; jangan mendekati zina meski hanya dengan pemikiran karena bisa membuat anda terjerumus ke dalamnya. Padahal, zina adalah perbuatan yang keji dan melampaui batas ukuran apapun serta perbuatan yang buruk hanya untuk hanya nafsu. Zina itu perbuatan haram, jadi semua perantara/wasilah yang dapat menyebabkan perzinahan juga haram. Di antara hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang berzina adalah:

1. Memandang wanita yang tidak halal baginya
 2. Menyentuh wanita yang bukan mahramnya
 3. Berkhalwat (berduaan) di tempat sepi
 4. Berpacaran
- c. Tidak melakukan hubungan seksual dengan pengguna narkoba jarum suntik.
- d. Tidak melakukan donor darah untuk orang dengan kelompok yang beresiko tinggi.
- e. Memberikan donor darah kepada pasien yang memerlukan saja.
- f. Pastikan alat suntuk yang digunakan itu steril (Widoyono, 2011).

Ayat ini menegaskan bahwa ; jangan mendekati zina walaupun hanya sekedar berpikir karena bisa membuat anda terjerumus ke dalamnya. Padahal, perzinahan adalah perbuatan yang keji dan melampaui batas ukuran apapun dan merupakan perbuatan yang buruk hanya untuk melampiaskan nafsu semata (Widoyono, 2011).

Dalam hadits, Nabi juga mengharamkan zina seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذُّنُوبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً، وَهُوَ خَلْقَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ حَسْبِيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُرَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam , ‘Dosa apakah yang paling besar?’ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Engkau

menyekutukan Allâh padahal Dia yang telah menciptakanmu.” Kemudian aku bertanya lagi, ‘Kemudian dosa apa lagi?’ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu.” Aku bertanya lagi, ‘Kemudian dosa apa lagi?’ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menjawab, “Engkau berzina dengan istri tetanggamu.”

Zina adalah perbuatan haram, maka semua perantara/wasilah yang dapat mengantarkan kepada zina juga haram hukumnya. Diantara perkara yang dapat mengantarakan seseorang kepada zina adalah:

1. Memandang wanita yang tidak halal baginya
 2. Menyentuh wanita yang bukan mahramnya
 3. Berkhalwat (berduaan) di tempat sepi
 4. Berpacaran
- c. Tidak melakukan hubungan seksual dengan pengguna narkoba jarum suntik.
 - d. Tidak melakukan donor darah untuk orang dengan kelompok yang beresiko tinggi.
 - e. Memberikan donor darah kepada pasien yang memerlukan saja.
 - f. Pastikan alat suntuk yang digunakan itu steril (Widoyono, 2011).

Adapun ABCDE cara mencegah HIV/AIDS adalah sebagai berikut:

A (Pantang): berarti tidak berhubungan seks atau tidak berhubungan seks bagi mereka yang belum menikah. B (Setia): artinya setia pada pasangan seksual (tidak berganti pasangan). C (Kondom): Cara pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual melalui penggunaan kondom. D (Drug No): artinya dilarang

menggunakan narkoba. E (Education): Sarana memberikan pendidikan dan informasi yang akurat tentang HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya.

B. Tinjauan Umum tentang Kualitas Hidup

1. Pengertian kualitas Hidup

Menurut World Health Organization Quality of Life (WHOQOL), kualitas hidup adalah persepsi yang dimiliki individu terhadap posisi individu dalam kehidupan sesuai dengan konteks budaya dan sistem nilai yang dianutnya. kehidupan, dan hubungannya dengan harapan, tujuan, standar yang ditetapkan, dan perhatian individu. Masalah yang mencakup kualitas hidup sangat luas dan kompleks, antara lain masalah kesehatan fisik, keadaan psikologis, tingkat kebebasan, hubungan sosial dan lingkungan di mana mereka berada (WHOQOL, 2017).

Menurut Srivastava, Das, Kohli, Yadav, Prakash, dan Saha, kualitas hidup dapat dikonseptualisasikan sebagai keadaan tanpa rasa sakit atau sebagai individu yang mampu berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Lavdaniti & Tsitsis, setiap individu mempersepsikan kualitas hidupnya secara berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa dengan cara pandang yang berbeda, setiap individu akan melaporkan kualitas hidup yang berbeda, bahkan pada kondisi kesehatan yang sama (Lusiana, 2018).

Setiap individu memiliki kualitas hidup yang berbeda tergantung dari masing-masing individu dalam menyikapi permasalahan yang muncul di dalam dirinya. Jika Anda menghadapinya secara positif, kualitas hidup Anda akan baik, tetapi jika Anda menghadapinya secara negatif, kualitas hidup Anda akan buruk. Kualitas hidup didefinisikan sebagai persepsi individu tentang fungsi mereka dalam bidang kehidupan. Lebih khusus lagi, itu adalah evaluasi individu terhadap posisinya dalam kehidupan, dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup dalam kaitannya dengan tujuan individu, harapan, standar, dan perhatian individu (Nofitri, 2009).

Kualitas hidup adalah konsep yang lebih luas daripada standar hidup. Kualitas hidup mencakup seluruh rangkaian faktor yang mempengaruhi apa yang kita hargai dalam hidup, di luar aspek materi. Kualitas hidup adalah perbedaan antara keinginan yang ada dan perasaan saat ini. Pernyataan ini dikenal sebagai "Calman Gap". Calman mengungkapkan pentingnya mengetahui perbedaan antara perasaan yang ada dan keinginan yang sebenarnya. Misalnya, membandingkan situasi antara "where is someone" dengan "where someone want to be". Jika perbedaan antara kedua kondisi itu lebar, ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa kualitas hidup seseorang rendah. Sedangkan kualitas hidup tinggi jika selisih keduanya kecil (Mulyani, 2017).

Beberapa pendekatan fenomenologis terhadap kualitas hidup menekankan pentingnya persepsi subjektif seseorang dalam memfungsikan

kapasitasnya sendiri dan membandingkannya dengan standar kapasitas internalnya untuk melakukan sesuatu yang lebih ideal dan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kualitas hidup adalah penilaian individu terhadap posisinya dalam kehidupan, dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar, dan apa yang menjadi perhatian individu. Ada tiga pendekatan konseptual untuk mengukur kualitas hidup, yaitu:

- a. Pendekatan pertama : dikembangkan dalam kolaborasi erat dengan penelitian psikologis, didasarkan pada gagasan kesejahteraan subjektif. Pendekatan ini erat kaitannya dengan tradisi utilitarian, yang berpandangan bahwa upaya manusia untuk “bahagia” dan “puas” dengan kehidupannya merupakan tujuan universal keberadaan manusia.
- b. Pendekatan kedua : berakar pada gagasan tentang kapasitas. Pendekatan ini melihat kehidupan seseorang sebagai kombinasi dari berbagai 'aktivitas dan diri' (fungsi) dan kebebasan mereka untuk memilih di antara fungsi-fungsi ini (kemampuan). Dasar pendekatan kapabilitas ini berakar kuat pada gagasan filosofis keadilan sosial. Ini mencerminkan bahwa manusia akan fokus pada tujuan dan menghargai kemampuan individu untuk mengejar dan mewujudkan tujuan yang mereka yakini, dan memainkan peran prinsip-prinsip etika dalam merancang masyarakat yang "baik".

Pendekatan ketiga : berdasarkan gagasan alokasi yang adil. Kualitas hidup mengacu pada persepsi pribadi seseorang tentang hidupnya. Kualitas hidup adalah persepsi

yang didasarkan pada nilai dan keyakinan pribadi. Pandangan tentang kualitas hidup sangat bervariasi dan berubah tergantung pada situasi. Peningkatan kualitas hidup dilakukan melalui pencegahan dan pengelolaan penyakit kronis seperti perawatan preventif, dukungan gaya hidup sehat, pendidikan dan penilaian lingkungan untuk mencegah cedera. Kusuma menjelaskan, sebagian besar dari mereka yang disurvei memiliki kualitas hidup yang buruk, yakni 58 orang (63%). Ada juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Nojomi, Anbary dan Ranjbar pada tahun 2008 yang menegaskan bahwa semakin banyak responden yang mempersepsikan kualitas hidupnya rendah atau tidak baik (Sofia Roshma, 2014).

2. Aspek-aspek Kualitas Hidup

Menurut (Anam, 2014) kualitas hidup terdiri dari empat domain, yaitu kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial dan hubungan dengan lingkungan.

a. Kesehatan Fisik

Kesehatan jasmani adalah keadaan tubuh seseorang yang bersih dari segala penyakit yang berasal dari dalam dan luar tubuh. Kesehatan fisik dicapai melalui gaya hidup sehat.

b. Kesejahteraan Psikologis

Kesejahteraan psikologis adalah pencapaian penuh dari potensi psikologis seseorang dan keadaan di mana orang dapat menerima kekuatan dan kelemahan mereka apa adanya, memiliki tujuan hidup, mengembangkan hubungan positif

dengan orang lain, menjadi individu yang mandiri, mampu mengendalikan lingkungan dan terus berkembang secara pribadi.

c. Hubungan Sosial

Hubungan sosial adalah kemampuan individu untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan individu atau kelompok lain dimana perilaku seorang individu dapat mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku individu lain atau sebaliknya, sehingga terjadi hubungan timbal balik.

d. Hubungan dengan Lingkungan

Hubungan dengan lingkungan meliputi keuangan dan kebutuhan untuk merasa aman di lingkungan yang ada. Selain itu, hubungan dengan domain lingkungan meliputi kesehatan individu, kepuasan terhadap tempat tinggal, termasuk adanya kesempatan rekreasi bagi individu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa individu dikatakan memiliki kualitas hidup yang baik yang akan memenuhi aspek kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, dan hubungan dengan lingkungan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup

Menurut (Degroote, S., Vogelaers. D., & Vandijck, 2014) faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pada orang dengan HIV/AIDS yaitu sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin dalam kualitas hidup juga bisa menjadi konsekuensi dari perbedaan jenis kelamin pada penyakit mental, seperti gangguan mood, gangguan kecemasan, dan gangguan psikosomatik, yang lebih sering terjadi pada wanita daripada pria . Kualitas hidup perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan akan lebih cenderung melaporkan kondisi fisik yang kurang baik bagi dirinya dibandingkan laki-laki karena laki-laki diharapkan memiliki sikap yang lebih resilien.

b. Usia

Orang tua dengan HIV/AIDS umumnya dikaitkan dengan kesehatan fisik dan mental yang lebih buruk dan penurunan dramatis dalam kesehatan fisik dan mental dari waktu ke waktu. Sementara itu, kaum muda memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik.

c. Keadaan Keluarga

Hubungan yang stabil dalam keluarga memiliki kontribusi yang baik terhadap kualitas hidup, jika hanya dalam kesehatan fisik. Selain itu, kehadiran anak dalam keluarga merupakan sumber kebahagiaan bagi orang tua, karena anak membantu menstabilkan situasi keluarga.

d. Agama

Tingkat spiritualitas atau agama yang lebih tinggi dikaitkan dengan kualitas hidup orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Spiritualitas atau agama berkorelasi dengan persepsi kehidupan yang lebih baik pada orang dengan

HIV/AIDS. Selain itu, agama atau spiritualitas juga dapat menjadi coping yang efektif untuk merespon kondisi yang ada pada penderita HIV/AIDS. Hal ini diperkuat dengan penegasan Douaihy dan Singh (2001) bahwa Spiritualitas merupakan dimensi penting untuk merasakan kesejahteraan pada orang dengan HIV/AIDS. Spiritualitas pada orang yang terinfeksi HIV dianggap sebagai jembatan antara perasaan putus asa dan makna hidup.

e. Dukungan

Sosial Hubungan antara dukungan sosial dan kualitas hidup bervariasi dari waktu ke waktu. Dukungan sosial dapat secara langsung mempengaruhi kesehatan seseorang atau dapat berfungsi sebagai penyangga untuk mengurangi efek stres terhadap kesehatan seseorang. Dukungan sosial memiliki peran penting dimana hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dukungan sosial dapat menurunkan gejala depresi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup.

Menurut (Shishegar dkk, 2016) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas hidup, antara lain usia, status perkawinan, tingkat pendidikan dan indeks massa tubuh. Di sisi lain, menurut Coetzee (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup adalah gaya coping, penyesuaian mental, dukungan sosial, stigmatisasi, depresi, sosial ekonomi, sosial budaya, jenis kelamin dan perkembangan penyakit.

C. Tinjauan Pustaka Teori Keperawatan Virginia Henderson

1. Defenisi Keperawatan Menurut Virginia Henderson

Virginia Henderson memperkenalkan definisi keperawatan. Definisi Anda tentang keperawatan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan Anda. Ia menyatakan bahwa definisi keperawatan harus mencakup prinsip keseimbangan fisiologis. Definisi ini dipengaruhi oleh persahabatan Henderson dengan seorang ahli fisiologi bernama Stackpole. Henderson sendiri kemudian mengajukan definisi keperawatan dari segi fungsional.

Menurutnya, tugas unik perawat adalah membantu orang, baik yang sakit maupun yang sehat, melalui upaya mereka melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung kesehatan dan penyembuhan individu atau proses kematian dalam damai, yang orang-orang dapat mereka lakukan secara mandiri ketika mereka memilikinya. kekuatan, keterampilan, kemauan, atau pengetahuan untuk melakukannya. Selain itu, Henderson juga mengembangkan model keperawatan yang dikenal dengan "The Activities of Life". Model tersebut menjelaskan bahwa tugas perawat adalah membantu orang meningkatkan kemandirian mereka secepat mungkin. Perawat melaksanakan tugasnya secara mandiri, tanpa bergantung pada dokter. Namun, perawat tetap menyampaikan rencana tersebut kepada dokter saat menjenguk pasien.

2. Model Keperawatan Virginia Henderson

Virginia Henderson adalah orang pertama yang mencari peran unik dalam keperawatan. Selain keinginan untuk menemukan peran unik keperawatan, perubahan sosial tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam pengembangan pandangan dan idenya. Sebagai contoh, bukanlah suatu kebetulan bahwa ilmu perilaku sangat berpengaruh dalam pandangan dan pendapat kita tentang masyarakat pada tahun 1960. Oleh karena itu, inisiatif ini ditujukan untuk lebih memperhatikan aspek psikososial perawatan kepada pasien.

Kontribusi penting dari Henderson (1966) adalah definisi keperawatan berikut, yang saat ini merupakan definisi yang diterima secara umum: “Fungsi unik perawat adalah membantu individu, sakit atau sehat, dalam hal membawa dia ke kesehatan atau pemulihan (kematian yang damai) yang dapat dia lakukan tanpa bantuan jika dia memiliki kekuatan, kemauan, atau pengetahuan. Dan melakukannya dengan cara itu dapat membantu Anda mendapatkan kemandirian secepat mungkin.”

Henderson sangat dipengaruhi oleh Edward Thorndyke, yang melakukan banyak penelitiannya di bidang kebutuhan manusia. Berdasarkan teori Thorndyke dan definisi keperawatannya sendiri, Henderson membagi tugas keperawatan menjadi empat belas jenis tugas yang berusaha memenuhi kebutuhan manusia. Pembagian asuhan keperawatan menjadi empat belas

kebutuhan manusia merupakan pilar model keperawatannya. Saya menegaskan bahwa:

- a. Perawat harus selalu mengakui bahwa terdapat pola kebutuhan pasien yang harus dipenuhi
- b. Perawat harus selalu mencoba menempatkan dirinya pada posisi pasien sebanyak mungkin

Ketika Henderson berbicara tentang kebutuhan, dia mengacu pada semua kebutuhan dasar setiap manusia. Bagi perawat untuk membantu pasien memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan asuhan keperawatan dasar. Oleh karena itu, Henderson menyimpulkan bahwa asuhan keperawatan dasar ada di semua situasi keperawatan. Contoh situasi ini adalah:

- a. Rumah sakit umum
- b. Rumah sakit jiwa
- c. Institusi untuk penderita cacat mental
- d. Rumah perawatan
- e. Keperawatan distrik
- f. Perawatan di rumah

Jadi, menurut Henderson, pekerjaan perawat tidak terbatas pada rumah sakit umum. Henderson juga menekankan pentingnya perencanaan perawatan. Dalam modelnya ia menjelaskan rencana perawatan, metode skematis untuk memantau perawatan. Perencanaan yang cermat akan memperjelas hal-hal berikut:

- a. Urutan aktifitas yang harus dilakukan
- b. Aktifitas perawat yang harus dan tidak boleh dilakukan
- c. Perubahan-perubahan yang harus dibuat

Kita dapat meringkas prinsip-prinsip dasar dari model Henderson sebagai berikut:

- a. Fungsi unik dari keperawatan
- b. Upaya pasien ke arah kemandirian
- c. Asuhan keperawatan dasar berdasarkan kebutuhan dasar
- d. Perencanaan asuhan yang akan diberikan

Prinsip-prinsip dasar digembar-gemborkan era baru untuk keperawatan. Perawat menyadari peran dan keunikan mereka, dan kesadaran ini menandai era baru di mana profesi mulai memeriksa sifat sebenarnya dari pekerjaan keperawatan lebih kritis daripada sebelumnya. Komitmen terhadap kemandirian dan otonomi pasien juga menandai era baru.

3. Konsep Utama dan Teori Virginia Henderson

Dalam edisi keenam Virginia Henderson berjudul "Prinsip dan Praktik Keperawatan," dia mengutip beberapa definisi dari sumber, termasuk salah satu dari piagam WHO. Konsep utama teori Henderson meliputi manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan.

1. Manusia

Henderson melihat manusia sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk mencapai kesehatan, kebebasan, atau kematian yang damai,

serta bantuan untuk mencapai kemandirian. Menurut Henderson, kebutuhan dasar manusia terdiri dari 14 komponen yang merupakan komponen manajemen perawatan.

Keempat belas kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bernafas dengan normal
- b. Makan dan minum cukup.
- c. Pembuangan eliminasi tubuh.
- d. Bergerak dan mempertahankan posisi yang nyaman.
- e. Tidur dan istirahat.
- f. Memilih pakaian yang sesuai.
- g. Mempertahankan suhu tubuh dalam kondisi normal dengan memodifikasi Lingkungan.
- h. Menjaga kebersihan tubuh dan memelihara kesehatan.
- i. Menghindari bahaya dilingkungannya dan menghindari mencederai orang lain.
- j. Komunikasi dengan orang lain dalam pernyataan emosi, kebutuhan, ketakutan dan pendapat.
- k. Beribadah menurut kepercayaan seseorang.
- l. Bekerja sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan.
- m. Bermain atau terlibat dalam berbagai kegiatan rekreasi.
- n. Belajar, menemukan atau mencukupi keingintahuan akan pertumbuhan dan kesehatan yang normal dan dapat menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia.

Menurut Henderson, ke-14 kebutuhan dasar yang harus menjadi fokus tersebut dipengaruhi oleh :

- a. Usia
- b. Kondisi emosional (mood & temperamen)
- c. Latar belakang sosial dan budaya.
- d. Kondisi fisik dan mental, termasuk berat badan, kemampuan dan ketidakmampuan sensorik, kemampuan dan ketidakmampuan lokomotif, dan status mental.

2. Keperawatan

Perawat memiliki peran unik dalam membantu orang, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Sebagai anggota tim kesehatan, perawat memiliki peran independen dalam mengelola perawatan berdasarkan kebutuhan dasar manusia (14 komponen di atas). Untuk menjalankan fungsinya, perawat harus memiliki pengetahuan biologi dan sosial.

3. Kesehatan

Kesehatan adalah kualitas hidup yang dengannya seseorang dapat berfungsi untuk kemanusiaan. Mendapatkan kesehatan lebih penting daripada mengobati penyakit. Untuk mencapai kondisi yang sehat diperlukan kemandirian dan saling ketergantungan. Orang akan mencapai atau mempertahankan kesehatan jika mereka memiliki kekuatan, kemauan, dan pengetahuan yang cukup.

3. Lingkungan

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan aspek lingkungan.

- a. Individu yang sehat mampu mengontrol lingkungan mereka, namun kondisi sakit akan menghambat kemampuan tersebut.
- b. Perawat harus mampu melindungi pasien dari cedera mekanis.
- c. Perawat harus memiliki pengetahuan tentang keamanan lingkungan.
- d. Dokter menggunakan hasil observasi dan penilaian perawat sebagai dasar dalam memberikan resep.
- e. Perawat harus meminimalkan peluang terjadinya luka melalui saran-saran tentang konstruksi bangunan dan pemeliharannya.
- f. Perawat harus tahu tentang kebiasaan sosial dan praktik keagamaan untuk memperkirakan adanya bahaya. Dalam pemberian layanan kepada klien, terjalin hubungan antara perawat dan klien. Menurut Henderson, hubungan perawat-klien terbagi dalam tiga tingkatan, mulai dari hubungan sangat bergantung hingga hubungan sangat mandiri.
 - 1) Perawat sebagai pengganti (*substitute*) bagi pasien.
 - 2) Perawat sebagai penolong (*helper*) bagi pasien.
 - 3) Perawat sebagai mitra (*partner*) bagi pasien.

4. Aplikasi Teori Henderson dalam Proses Keperawatan

Ilmu keperawatan Henderson dalam kaitannya dengan praktik keperawatan menunjukkan bahwa perawat memiliki tugas utama memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien. Manfaat asuhan keperawatan dapat dilihat dari perkembangan kondisi pasien yang semula bergantung pada orang lain menjadi mandiri. Perawat dapat membantu pasien berpindah dari ketergantungan menjadi mandiri dengan mengkaji, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 14 komponen manajemen perawatan dasar.

Pada tahap evaluasi (assessment), perawat mengevaluasi kebutuhan dasar pasien berdasarkan 14 komponen sebelumnya. Dalam pengumpulan data, perawat menggunakan metode observasi, indra penciuman, perabaan dan pendengaran. Setelah mengumpulkan data, perawat menganalisisnya dan membandingkannya dengan pengetahuan dasar tentang kesehatan dan penyakit. Hasil analisis menentukan diagnosa keperawatan yang akan muncul. Diagnosa keperawatan menurut Henderson dibuat dengan mengenali kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, dengan atau tanpa bantuan, dan mempertimbangkan kekuatan atau pengetahuan individu.

Tahap perencanaan, menurut Henderson, meliputi kegiatan menyiapkan rencana perawatan berdasarkan kebutuhan individu, termasuk memperbaiki rencana jika ditemukan perubahan, serta mendokumentasikan bagaimana perawat membantu orang yang sakit atau sehat.

Juga pada tahap implementasi, perawat membantu orang memenuhi kebutuhan dasar yang telah dirumuskan dalam rencana perawatan untuk menjaga kesehatan individu, pulih dari penyakit, atau membantu mereka meninggal dengan tenang. Intervensi yang diberikan perawat bersifat individual, tergantung pada prinsip fisiologis, usia, latar belakang budaya, keseimbangan emosional, dan kemampuan intelektual dan fisik individu.

Terakhir, perawat menilai pemenuhan kriteria yang diharapkan dengan menilai kemandirian pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

5. Tujuan Keperawatan Menurut Henderson

Dari penjelasan tersebut, tujuan keperawatan yang dikemukakan oleh Handerson adalah bekerja secara mandiri dengan pemberi pelayanan kesehatan dan membantu klien mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Dimana pasien adalah makhluk sempurna yang dipandang sebagai komponen bio, psiko, budaya dan spiritual yang memiliki empat belas kebutuhan dasar.

Menurut Handerson, peran perawat adalah untuk menyempurnakan dan membantu mencapai kemampuan mempertahankan atau memperoleh kemandirian dalam memenuhi empat belas kebutuhan dasar pasien. Faktor penurunan kekuatan, kemauan dan pengetahuan menjadi penyebab sulitnya pasien dalam memperoleh kemandirian. Untuk itu diperlukan pendekatan

intervensi yaitu mengurangi penyebab dimana pola intervensi adalah untuk memulihkan, menyempurnakan, melengkapi, menambah, memperkuat kekuatan, kemauan dan pengetahuan (Hidayat, 2007).

6. Manfaat Teori Virginia Henderson Pada Praktik Keperawatan

Teori Virginia Henderson memberikan pernyataan tentang profesi keperawatan yang unik, independen dari profesi medis, sehingga perawat dapat secara mandiri menentukan rencana keperawatan mereka tanpa menunggu arahan dari dokter dan melengkapi model konseptual keperawatan yang ada.

7. Proses keperawatan menurut Virginia Henderson

Tahapan proses keperawatan meliputi pengkajian, perumusan diagnosa keperawatan, identifikasi hasil, perencanaan, implementasi dan evaluasi.

a. Pengkajian

Pengkajian merupakan tahap awal dan dasar utama dari proses keperawatan. Tahap evaluasi terdiri dari pengumpulan data dan merumuskan kebutuhan atau masalah klien. Data yang dikumpulkan meliputi data biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Pengumpulan data pengkajian kesehatan jiwa juga dapat berupa faktor predisposisi, faktor pencetus, pengkajian faktor risiko, sumber coping, dan keterampilan coping yang dimiliki klien.

b. Diagnosa keperawatan

Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinis dari respon individu, keluarga, dan masyarakat terhadap masalah kesehatan aktual dan potensial atau proses kehidupan. Menurut Henderson, diagnosis keperawatan sama dengan mengidentifikasi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan tanpa atau dengan bantuan orang lain, menilai keterampilan individu dan pengetahuan individu.

c. Rencana keparawatan

Ini mencakup intervensi yang dilakukan oleh perawat, apakah itu intervensi mandiri atau kolaboratif dan perawatan langsung atau tidak langsung. Henderson menyarankan untuk menulis rencana asuhan keperawatan agar orang lain dapat mengikuti asuhan keperawatan yang diberikan secara berkelanjutan.

d. Implementasi

Implementasi adalah pengelolaan dan realisasi dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Pada saat akan dilakukan tindakan keperawatan, perawat melibatkan klien dengan menjelaskan apa yang akan dilakukan dan peran yang diharapkan dari klien. Menurut Henderson, implementasi keperawatan didasarkan pada 14 komponen untuk membantu klien. Aspek penting menurut Henderson adalah hubungan antara perawat dan pasien.

e. Evaluasi

Evaluasi tentang keberhasilan sesuai kriteria yang diharapkan dengan melihat kecepatan pasien menjadi mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

- 1) Kondisi perawat : supervisi, analisis diri, peer review, partisipasi pasien dan keluarga
- 2) Perilaku perawat ; membandingkan respon pasien dan hasil yang diharapkan, mereview proses keperawatan, memodifikasi proses keperawatan sesuai yang dibutuhkan, berpartisipasi dalam peningkatan kualitas dari aktifitas yang dilakukan (Potter and Perry, 2005).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *deskriptif naratif* dengan pendekatan *literature review*. Tinjauan Pustaka adalah laporan yang berisi topik yang telah diterbitkan sebelumnya oleh akademisi dan peneliti dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan tentang suatu topik. Selain itu, *literature review* juga meningkatkan kemampuan pencarian informasi, yaitu kemampuan memindai literatur secara efisien. Serta penilaian kritis, yaitu kemampuan menerapkan prinsip-prinsip analitis untuk mengidentifikasi studi yang tidak bias dan valid (Taylor, 2020).

B. Teknik Pengumpulan Data

Aturan dalam pembuatan *literature review* ini adalah berdasarkan dari instrument penilaian STROBE (*Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology*). STROBE adalah daftar item yang harus ditangani dalam laporan artikel pada 3 desain studi epidemiologi analitik: kohort, kasus-kontrol, dan studi cross-sectional. Tujuannya semata-mata untuk memberikan pedoman tentang bagaimana melaporkan penelitian observasional baik, rekomendasi ini tidak dianjurkan untuk merancang atau melakukan studi.

Pernyataan STROBE adalah daftar dari 22 item pelaporan penelitian observasional Item dalam STROBE: judul artikel dan abstrak (item 1), pendahuluan (item 2 dan 3), metode (item 4-12), hasil (item 13-17), dan diskusi bagian (item 18-21) dan informasi lainnya (item 22) (Cuschieri, 2019).

Pencarian literatur melalui beberapa situs/data base yaitu : *google scholar*, *PubMed*, *Science Direct* dengan pertanyaan penelitian terstruktur menggunakan metode elektronik PEO (*Patient, Expusure an Interest, Outcome or responses*). Pencarian artikel pada penelitian ini menggunakan *Keyword* atau Kata kunci untuk menyaring atau menspesifikkan artikel yang akan digunakan, sekaligus mempermudah pencarian artikel. Pada penelitian ini kata kunci yang digunakan adalah *Quality of life* OR Kualitas Hidup AND *HIV\AIDS* OR ODHA. Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan informasi tersebut diseleksi kerelevanan dengan masalah yang dikaji (Frandsen & MB, 2018).

Adapun PEO dalam artikel ini sebagai berikut :

P	HIV\AIDS (ODHA)
E	Gambaran
O	Kualitas hidup

Pernyataan penelitian dirumuskan melalui strategi PEO adalah sebagai berikut: Bagaimana gambaran kualitas hidup penderita HIV\AIDS ?

Pemilihan literature peneliti memiliki kriteria inklusi dan eksklusi :

1. kriteria Inklusi

- a. tahun publikasi artikel yang ditelaah antara tahun 2015-2020
- b. artikel fulltex yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu gambaran kualitas hidup pada penderita HIV\AIDS
- c. Terdapat ISSN atau DOI atau Volume
- d. Artikel yang menggunakan desain crosssectional, case control dan cohort
- e. menggunakan bahasa inggris dan indonesia
- f. penelitian ini menggunakan subjek manusia

2. kriteria Eksklusi :

- a. artikel double publikasi
- b. Artikel yang memiliki nilai kualitas artikel yang rendah berdasarkan skor *Guideline Review dari Joanna Briggs Institute.*
- c. Artikel yang memiliki kualitas penilaian artikel dibawah 50%

C. Analisis data

Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan informasi tersebut diseleksi kerelevanan menggunakan instrument *Guideline review dari Joanna Briggs Institute* dengan masalah yang dikaji. Untuk menyajikan masalah yang akan dibahas maka data terkumpul di analisa dengan menggunakan tabel sintesis grid.

D. Rekomendasi

Penilaian Artikel secara kuantitatif dengan STROBE (*Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology*) yaitu dengan: tanda centang (✓) menunjukkan terpenuhi, tanda bintang (*) menunjukkan ketidakjelasan, atau tanda silang (x) menunjukkan tidak terpenuhi.

Setelah proses analisis data dilakukan, penulis memberikan alternatif model pemecahan masalah atau ide kreatif sebagai solusi dari permasalahan yang diangkat dalam makalah ini kemudian disusun menjadi hasil pembahasan dan kesimpulan. Rekomendasi kemudian diberikan kepada hasil pemecahan masalah dalam adopsi pengetahuan dan sebagai dasar pemikiran untuk pencegahan masalah yang telah dirumuskan.

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Sebanyak **53,508** artikel yang diidentifikasi dari ke empat pencarian database yaitu *PubMed*, *Google Scholar* dan *Scien Direct* yang telah disaring dengan batasan publikasi 5 tahun terakhir (2015-2020). Namun, setelah dilakukan *screening* dari 165 artikel, didapatkan 7 artikel yang relevan yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya dilakukan *screening* untuk menilai kelayakan artikel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari 7 artikel yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian, beberapa artikel dieksklusi dikarenakan artikel tidak memenuhi kriteria inklusi penilaian artikel diatas 50% yaitu tidak sesuai dengan standar penilaian dari *Guideline review* dari *Joanna Briggs Institute*. (1) Isi artikel tidak relevan, (2) Tidak memenuhi kriteria penilaian. Sehingga terdapat 11 artikel yang memenuhi kriteria inklusi.

Alur telaah jurnal dalam studi literatur ini dilakukan sesuai :

Tabel 4.1 Pencarian Literatur




Tabel 4.2 Hasil pengkajian kualitas studi yang direview

Author/Tahun	Persentase skor jurnal	Evaluasi kualitas
(Cherry et al., 2018)	75%/6	Kualitas cukup
(Studi et al., 2020)	75%/6	Kualitas cukup
(Medeiros et al., 2017)	75%/6	Kualitas cukup
(Moreno-Montoya et al., 2018)	75%/6	Kualitas cukup
(Jiang et al., 2019)	75%/6	Kualitas cukup
(Mugomeri et al., 2016)	75%/6	Kualitas cukup
(Jiang et al., 2019)	75%/6	Kualitas cukup


Catatan : Kualitas Baik (100-80%) Kualitas Cukup (79-50%) kualitas kurang (<50%)

No	Penulis	Judul Penelitian	Referensi	Metode	Sampel	Hasil Penelitian
1.	(Google Scholar) (Studi et al., 2020).	Respon Sosial Penderita HIV/AIDS di Yayasan Kanti Sehati Sejati Terhadap Dukungan Keluarga	DOI: http://doi.org/10.22216/jen.v5i2.4992	survey analitik dengan pendekatan potong lintang (cross sectional). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu dukungan keluarga. Sedangkan variabel terikat yaitu respon sosial. Dukungan keluarga merupakan motivasi yang diberikan oleh keluarga, meliputi dukungan emosional, dukungan informatif, dukungan instrumental, dan dukungan penilaian. Respon sosial merupakan reaksi individu terhadap stimulus yang terjadi di lingkungan sekitar	Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan penderita HIV/AIDS di Yayasan Kanti Sehati Kota Jambi. Jumlah sampel dari penelitian sebanyak 90 responden. Teknik pengumpulan sampel dilakukan dengan cara simple random sampling.	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa secara statistic terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan respon sosial penderita HIV/AIDS di Yayasan Kanti Sehati Sejati Kota Jambi. Semakin tinggi dukungan keluarga yang didapat, maka respon sosial penderita HIV/AIDS akan adaptif. Upaya yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan adalah dengan memberikan edukasi bagi keluarga penderita HIV/AIDS untuk dapat menjadi sistem pendukung yang utama dan pertama dalam menjaga status kesehatan penderita HIV/AIDS dengan memberikan dukungan yang bermakna agar efek negative yang ditimbulkan oleh respon maladaptif dapat diminimalisir.
2.	(Pubmed) (Medeiros et al., 2017)	Quality of life, socioeconomic and clinical factors, and physical exercise in persons living with	DOI: https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2017051006266	Ini adalah penelitian deskriptif cross-sectional, dengan orang yang hidup dengan HIV / AIDS dirawat di dua rumah sakit rujukan pada penyakit menular di Negara Bagian Rio Grande do Norte, Brasil: Rumah Sakit Giselda Trigueiro, di kotamadya Natal, dan Rumah Sakit Rafael Fernandes, di kotamadya Mossoró, dilakukan antara April 2012 dan Juni 2014. Penelitian ini	Sampelnya non-probabilistik dan berurutan; Di antara 275 pasien yang didekati dan diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian oleh evaluator setelah konsultasi medis, 46 menolak karena tidak	Domain yang menunjukkan kualitas hidup rata-rata yang lebih rendah adalah masalah keuangan, perhatian dengan kerahasiaan, fungsi umum, dan kepuasan hidup. Kami menemukan hubungan dengan variabel status sosial ekonomi dan latihan fisik, terapi, dan latihan fisik untuk dua domain terakhir, secara berurutan.

		HIV/AIDS		disetujui oleh komite etika penelitian dari Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Opini 648.909).	tersedianya waktu atau kurangnya minat untuk berpartisipasi, dan dua tidak menyelesaikan wawancara. Jadi, 227 orang yang hidup dengan HIV dari kedua jenis kelamin berpartisipasi dalam penelitian ini.	
3.	(Pubmed) (Moreno - Montoya et al., 2018)	Calidad de vida y percepción de apoyo social en personas con HIV en Bogotá, Colombia	doi: https://doi.org/10.7705/biomedica.v38i4.3819	Kami melakukan studi cross-sectional pada orang yang hidup dengan HIV / AIDS menggunakan pengambilan sampel yang mudah dari program perawatan di jaringan rumah sakit di Bogotá. Kualitas hidup 578 <i>Biomédica</i> 2018; 38: 577-585 Moreno J, Barragán A, Martínez M, dkk. kuesioner SF36 dan kuesioner dukungan sosial generik Duke-UNC-11 digunakan, bersama dengan model regresi linier untuk analisis.	Sebuah studi cross-sectional dilakukan pada manusia dengan HIV / AIDS dirawat di Jaringan Rumah Sakit Méderi di Bogotá. Jaringan terdiri dari rumah sakit tingkat kompleksitas keempat dan satu tingkat kedua, melayani yang dikenal sebagai kohort tertua pasien dengan ini diagnosis di bawah program B24, yang Mengoordinasikan perawatan yang komprehensif dan interdisipliner untuk	Ada hubungan langsung antara dimensi kesejahteraan emosional dari kualitas hidup dan sistem dukungan sosial dari efektivitas ($\beta = 7.36$; 95% CI: 1.04; 13.68) dan yang membangkitkan kepercayaan diri ($\beta = 11.63$; 95% CI: 5.30 ; 17.96). Ada korelasi antara dimensi fungsi fisik, kinerja emosional, nyeri, dan dukungan sosial afektif yang dirasakan. Demikian juga, kami mendeteksi hubungan antara persepsi dukungan sosial yang menghasilkan kepercayaan diri dan dimensi vitalitas dan fungsi sosial. Sebaliknya, kami menemukan hubungan terbalik antara rata-rata dimensi kinerja emosional dan dukungan sosial afektif yang dirasakan, serta antara dimensi kinerja fisik dan kesehatan umum dengan dukungan sosial yang menghasilkan kepercayaan diri.

					<p>orang-orang tersebut dan terdiri dari 17 profesional dari bidang infektologi, pengobatan umum, pekerjaan sosial, nutrisi, psikologi, kimia farmasi, keperawatan, pengobatan keluarga, dan oleh staf administrasi, yang memandu pasien melalui strategi pencegahan penyakit dan komplikasi, dan sebagai tambahan, mereka mengarahkan rawat jalan</p>	
4.	Scient Direct (Xiaohua et al., 2015)	Perceived stigma, medical social support and quality of life among people living with HIV/AIDS in Hunan, China	DOI: www.elsevier.com/locate/apnr	<p>Kami menggunakan desain deskriptif cross-sectional dalam penelitian ini. Data dulu dikumpulkan dari Juli 2011 hingga September 2012. Studi ini mencakup 190 PLWH. Pesertanya adalah ODHA yang menerima perawatan medis untuk HIV klinik dari 2 rumah sakit di Hunan: Rumah Sakit Ketiga Hengyang dan Rumah Sakit Penyakit Menular Changsha. Peserta dimasukkan jika mereka memenuhi kriteria berikut: 1) usia 18 tahun atau lebih; 2) diagnosis</p>	<p>Kami merekrut 190 peserta (137 laki-laki dan 53 perempuan) di belajar. Usia rata-rata peserta adalah 38,3 tahun (21-68 tahun, SD = 9,4 tahun). Sebanyak 166 peserta (87,4%) menerima antiretroviral terapi (ART), dan 49 peserta (26%) menggunakan obat-obatan dan rata-rata</p>	<p>Faktor lain, termasuk jumlah CD4, penyalahgunaan obat, dan ART, adalah juga terkait dengan QOL pasien. Stigma internal dan stigma keluarga adalah faktor penting untuk QOL pasien. Studi intervensi di masa depan diperlukan untuk membantu membentuk sikap positif pasien terhadap AIDS dan Masalah terkait HIV, dan membekali mereka dengan pengetahuan baru untuk mengelolanya penyakit kronis.</p>

				<p>pasti HIV / AIDS; 3) Mampu menjawab pertanyaan dalam kuesioner secara fisik dan dengan jelas menyampaikan nasihat mereka; 4) menerima pengobatan dengan hati-hati dan dukungan. Pasien yang memiliki ciri-ciri berikut dikeluarkan: 1) gagal untuk memahami tujuan studi dan berkomunikasi dengan peneliti; 2) gagal menyelesaikan studi karena penyakit fisik; 3) terdaftar di lainnya studi serupa. Semua peserta menandatangani persetujuan sebelum penelitian.</p>	<p>penggunaan narkoba berlangsung selama 24,2 bulan (0-74 bulan, SD = 19,9). Rata-rata Diagnosis HIV membutuhkan waktu 30,3 bulan (0-98 bulan, SD = 23,1). Lain informasi demografis disajikan</p>	
5.	(Scient Direct) (Mugom eri et al., 2016)	Reported quality of life of HIV-positive people in Maseru, Lesotho: The need to strengthen social protection programmes	DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.hivar.2016.03.006	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian <i>cross-sectional descriptive study</i> yang berasal dari kuesioner QoL Brief WHO (WHOQoL-Bref) yang didistribusikan ke PLWHA Maseru.</p>	<p>Penelitian ini melibatkan pasien HIV-positif yang menghadiri kunjungan ART bulanan mereka di tiga pusat ART terpilih. Sekitar 56.376 (58%) orang dewasa HIV-positif di Kabupaten Maseru memakai ART pada tahun 2011 (GoL, 2012 [1]). Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah 56.376 orang dewasa HIV-positif di Kabupaten Maseru. Ukuran sampel</p>	<p>aspek lingkungan hidup mereka. Penting untuk dicatat bahwa status perkawinan, status pekerjaan dan tingkat dukungan sosial merupakan variabel sosio-demografis penting yang mempengaruhi kualitas hidup ODHA. Studi ini menunjukkan perlunya peningkatan implementasi kebijakan sosial di Lesotho yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Strategis Nasional (NSDP) 2012 / 13-2016 / 17 di GoL (2013 [2]) dan memperkuat program perlindungan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup ODHA. Selain itu, program perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, termasuk janda, yatim piatu dan penganggur perlu dipertahankan, khususnya bagi ODHA.</p>

				 <p>dihitung sesuai dengan pedoman survei yang direkomendasikan oleh WHO [15]. Dengan asumsi populasi target 56.376, margin kesalahan 5% pada interval kepercayaan 95% dan tingkat respons minimum 50%, ukuran sampel minimum yang dibutuhkan adalah 382 [15]. Namun, 500 kuesioner telah dibagikan untuk memenuhi kuesioner non-respons dan kuesioner yang tidak lengkap. Kuesioner dibagikan secara proporsional tergantung besar kecilnya populasi sasaran di ketiga pusat tersebut. Klinik HIV Sankatana, Rumah Sakit Distrik St. Joseph dan Klinik Khubetsoana masing-masing menerima 170, 210 dan 120 kuesioner.</p>	
--	--	--	--	---	--

6.	(Google Scholar) (Cherry et al., 2018).	Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Pada Orang Dengan Hiv Dan Aids	DOI: 10.32.807/jkp.v13i1.211	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dan kualitas hidup ODHA.	Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 ODHA yang berkunjung di poliklinik VCT RSUD Kabupaten Sorong pada bulan Maret- April 2017.	Dukungan keluarga sangat dibutuhkan oleh ODHA sebagai <i>support system</i> atau sistem pendukung utama sehingga ia dapat mengembangkan respon atau coping yang efektif untuk beradaptasi dengan baik dalam menghadapi <i>stressor</i> terkait penyakitnya baik fisik, psikologis, maupun sosial. <i>Support system</i> yang baik akan meningkatkan kualitas hidup ODHA seperti meningkatkan kesehatan fisik, kondisi psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial, dan hubungan individu tersebut dengan lingkungannya.
7.	(Pubmed) (Jiang et al., 2019)	Psychosocial Factors Associated with Quality of Life in Young Men Who Have Sex with Men Living with HIV/AIDS in Zhejiang, China	DOI: www.mdpi.com/journal/ijerph	Sebuah studi cross-sectional dilakukan di Zhejiang. Kriteria inklusi adalah sebagai berikut: (1) Positif untuk antibodi HIV; (2) terinfeksi melalui perilaku homoseksual; dan (3) usia mulai dari 16 hinggausia 24 tahun. Pertama, kami mengidentifikasi kabupaten yang memiliki lebih dari 20 pasien yang memenuhi syarat pada November 2016.	Ada 1.583 pasien MSM yang memenuhi syarat; kemudian, 400 peserta dipilih secara acak dari 1583 tersebut pasien. Kriteria eksklusi adalah peserta yang menolak untuk berpartisipasi. Pengganti akan dipilih melalui kriteria inklusi yang sama di daerah setempat. Tiga belas penggantian akhirnya direkrut. Dari 400 subjek, 5 peserta dikeluarkan dari partisipasi dalam penelitian karena kegagalan	Penelitian kami mengungkapkan bahwa ada kualitas hidup yang lebih tinggi di antara remaja LSL yang terinfeksi HIV dibandingkan di antara mereka pasien HIV / AIDS lainnya. Faktor-faktor seperti dukungan sosial, kemandirian, tingkat pendapatan, dan CD4 tinggi Hitungan memiliki efek perlindungan pada QOL pada LSL muda yang terinfeksi HIV, sedangkan diskriminasi, AIDS tahap, dan perilaku berisiko tinggi memiliki efek negatif pada QOL. Hasilnya menyiratkan bahwa kita harus fokus pada dan meningkatkan faktor psikososial, seperti dukungan sosial, self-e_cacy, dan anti diskriminasi, dan memperkuat strategi dan teknik untuk mendiagnosis HIV dan menemukan serta mengobati remaja yang terinfeksi HIV individu sebelumnya. Perubahan tersebut akan membantu mengendalikan penyakit pada tahap HIV melalui pengobatan, mengurangi komplikasi

					<p>untuk memberikan informasi kunci, menghasilkan total 395 peserta LSL muda.</p>	<p>yang terkait dengan penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup individu yang terinfeksi. Akhirnya, lembaga dan individu yang terlibat harus mengadvokasi perilaku seks yang aman untuk mengurangi kemungkinan koinfeksi.</p>
--	--	--	--	--	---	--



Beberapa hasil penelitian yang ada dalam **tabel 1.2** tentang kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS, yang memberikan kesimpulan bahwa dari ketujuh tabel *literature review*, menunjukkan hasil dimana enam memiliki korelasi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS dan satu jurnal *literature review* menunjukkan hasil yang rendah untuk kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup HIV/AIDS yaitu :

1. Karakteristik Responden

a. Usia

Berdasarkan hasil penelitian literature dari ketujuh artikel ilmiah, maka dapat dilihat bahwa rentang umur pasien yang terlibat dalam penelitian sebagai subjek penelitian adalah pasien dengan umur 13-80 tahun.

b. Jenis kelamin

Berdasarkan hasil penelitian literature, maka penelitian ini menggunakan sampel dengan dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.

c. Status pernikahan

Berdasarkan hasil penelitian literature, maka dapat dilihat bahwa sampel pasien HIV/AIDS dapat dikelompokkan menjadi pasien yang belum menikah, menikah, dan berpisah.

d. Pendidikan

Hasil penelitian literature dari ketujuh artikel ilmiah, maka dapat dilihat bahwa responden berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, seperti ada yang tidak sekolah, SD, SMP, SMA, sampai dengan jenjang Sarjana.

e. Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian literatur, maka dapat digambarkan bahwa responden mempunyai berbagai jenis pekerjaan, mulai dari responden yang tidak bekerja, sebagai pegawai, ibu rumah tangga, pensiunan, mahasiswa, pelajar dan lainnya.

f. Lama terdiagnosa

Berdasarkan hasil penelitian literature, maka dapat dilihat bahwa responden yang terlibat dalam penelitian telah ada yang terdiagnosa selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan dalam waktu lebih dari 5 tahun.

2. Karakteristik Kualitas hidup Pasien HIV/AIDS**a. Dukungan keluarga**

Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang memiliki dukungan keluarga yang baik akan memiliki kualitas hidup yang baik. Di sisi lain, orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang kurang mendapat dukungan keluarga akan memiliki kualitas hidup yang buruk. Dukungan keluarga diperlukan untuk mendorong keberhasilan pengobatan ODHA.

Kebanyakan orang yang hidup dengan HIV membutuhkan keluarga mereka untuk pergi bersama mereka untuk mengunjungi klinik VCT untuk pengobatan. Selain itu, keluarga berperan dalam tindak lanjut dan pengawasan pasien dan dalam promosi ODHA.

b. Dukungan sosial

Masih banyak ODHA yang merasa dukungan dari keluarganya kurang karena tingginya stigma di masyarakat yang secara tidak langsung mempengaruhi psikologi anggota keluarga. Yang terjadi adalah keluarga merasa terpinggirkan yang berdampak pada penelantaran ODHA bahkan keterasingan dari lingkungan sosial.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dan paling berhubungan dengan pasien karena merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat anggota keluarga yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain yang memberikan dukungan, kasih sayang, rasa aman dan perawatan secara harmonis untuk menjalankan perannya masing-masing dalam kehidupan. konteks kelangsungan hidup ODHA. Oleh karena itu, semua pihak dituntut untuk memiliki tanggung jawab, pengorbanan, gotong royong, kejujuran, saling percaya, saling pengertian, dan kedamaian di rumah.

c. Tingkat ekonomi

Kualitas hidup ODHA dipengaruhi oleh status sosial ekonomi ODHA, dimana ODHA dengan kualitas ekonomi rendah lebih cenderung

mengalami lebih banyak kesulitan untuk bertahan hidup, seperti perumahan dan fasilitas hidup sehat untuk melakukan pengobatan.

d. Kesejahteraan sosial

kesejahteraan emosional dan dua domain dukungan adalah dimensi fungsional sosial, sedangkan dimensi fungsi fisik, kinerja emosional dan nyeri tubuh terkait dengan persepsi dukungan sosial afektif dan dimensi vitalitas dan fungsi sosial, dengan persepsi dukungan sosial kepercayaan. . orang. Bersama-sama, temuan menyarankan perlunya fokus pada strategi yang memperkuat jaringan dukungan sosial masyarakat dan memasukkannya ke dalam perawatan institusi kesehatan yang menyediakan program perawatan yang komprehensif.

e. Status perkawinan

Berdasarkan tinjauan bibliografi jurnal ke-6 menunjukkan bahwa status perkawinan sangat mempengaruhi kualitas hidup ODHA. Perempuan memiliki prevalensi HIV yang lebih tinggi (65%) dibandingkan laki-laki (35%) dalam penelitian ini. Prevalensi HIV yang tinggi di kalangan perempuan menimbulkan sejumlah tantangan, termasuk peningkatan risiko penularan HIV secara vertikal dan kerentanan perempuan dalam populasi ini. Dari 116 (25%) responden janda dalam penelitian ini, 86% adalah perempuan. Proporsi janda 25% dalam penelitian ini sebanding dengan 18%. dilaporkan oleh Mweemba. Responden yang berstatus janda memiliki rerata skor kualitas hidup yang

lebih rendah dibandingkan responden yang sudah menikah. Penting untuk dicatat bahwa perempuan janda HIV-positif adalah kelompok yang rentan dan memiliki kualitas yang lebih rendah. kehidupan. Dion mencatat bahwa janda membutuhkan perlindungan negara untuk mengurangi kerentanan mereka.

f. Status pekerjaan

Berdasarkan tinjauan pustaka di jurnal ke-6, dijelaskan bahwa pendidikan yang buruk mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan memperburuk kerentanan terhadap infeksi HIV, menciptakan lingkaran setan kemiskinan, kerentanan terhadap HIV dan kualitas hidup yang rendah. Hampir setengah (47%) responden HIV-positif dalam penelitian ini tidak bekerja dan memiliki skor kualitas hidup rata-rata yang secara signifikan lebih rendah ($p < 0,05$) dibandingkan dengan mereka yang bekerja.

g. Penggunaan obat

Subyek kami memiliki kualitas hidup yang relatif unggul, dengan skor kualitas hidup rata-rata 61,67. 3 skor tertinggi adalah nyeri, fungsi fisik, dan fungsi kognitif, sedangkan persepsi kesehatan umum adalah yang terendah. Penjelasan yang mungkin untuk kualitas hidup yang relatif lebih tinggi dalam sampel ini adalah pendapatan tahunan yang lebih tinggi, pekerjaan yang stabil, terapi antiretroviral yang memadai, kepatuhan pengobatan yang lebih baik, dan sistem dukungan sosial yang lebih kuat.

Bukti menunjukkan bahwa pasien yang memakai ART lebih lama memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi (Bello & Bello, 2013). ART mampu membatasi dan mengendalikan replikasi HIV dan mengurangi viral load ke tingkat yang tidak terdeteksi. Dengan peningkatan program ART, orang yang hidup dengan HIV memiliki keyakinan bahwa mereka akan memiliki persediaan obat penopang hidup yang berkelanjutan dan teratur, belajar lebih banyak tentang ART, dan menerima kenyataan bahwa ART sama seperti terapi penyakit lainnya. membutuhkan komitmen seumur hidup.

h. Status kesehatan

Pada saat yang sama, peningkatan standar hidup dan peningkatan pendapatan tahunan telah memastikan bahwa ODHA dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Faktanya, persepsi kesehatan umum yang buruk di antara ODHA perlu mendapat perhatian dan mungkin terkait dengan gejala terkait HIV seperti kelelahan, demam, depresi, atau kemungkinan komplikasi atau penyakit penyerta lainnya. Untuk ODHA dengan tingkat persepsi kesehatan umum yang rendah, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengesampingkan kemungkinan lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta mengalami tingkat persepsi stigma yang moderat. Temuan ini konsisten dengan Li et al. (2011).

i. Stigmatisasi

Stigma dan dukungan sosial Dukungan sosial berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas hidup dan dimediasi oleh harapan dan depresi pada ODHA. Korban umumnya memiliki status imun yang buruk dibandingkan dengan masyarakat dan perlu menjaga gizi yang baik, namun penggunaan narkoba memperburuk pandangan kesehatan mereka, yang merupakan dampak atau efek dari stigma.

Di antara semua domain, skor tertinggi adalah stigma yang terinternalisasi, stigma publik, dan kekhawatiran pengungkapan. Faktanya, stigma dan diskriminasi terkait HIV adalah masalah global. Di Cina, 41,7% pasien HIV yang disurvei pada tahun 2000 melaporkan pengalaman diskriminasi terkait HIV, dan lebih dari 76% melaporkan bahwa anggota keluarga mereka didiskriminasi (UNAIDS, 2009). Di Ethiopia, studi kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa stigmatisasi adalah alasan utama untuk skala pencegahan tambahan bagi penyedia layanan (Feyissa, Abebe, Girma, & Woldie, 2012). Di India, sebuah penelitian melaporkan bahwa lebih dari 80% pasien yang tidak memiliki HIV menganggap orang dengan HIV sebagai "orang yang terinfeksi. Selain itu, peserta penelitian yang melaporkan tingkat stigma internal dan stigma keluarga yang lebih rendah menunjukkan tingkat kualitas hidup yang lebih tinggi. Stigma yang terinternalisasi memiliki dampak besar pada kualitas hidup ODHA dan berkorelasi negatif dengan semua subskala kualitas hidup, yang serupa

dengan penelitian di Afrika Selatan (Peltzer dan Ramlagan, 2011). Stigma keluarga juga berkorelasi dengan sebagian besar domain kualitas hidup.

Karena sebagian besar kegiatan dalam budaya berfokus pada keluarga Tionghoa, sebagian besar pasien mendapatkan atau membutuhkan dukungan dari keluarga mereka. Begitu pasien sakit, mereka pertama-tama akan mencari perawatan dan dukungan dari keluarga mereka. Namun, ketakutan akan pengungkapan, ketidakpedulian keluarga, dan sikap negatif membuat mereka merasa tertekan, bersalah, tertekan, putus asa, dan tidak diakui. Semua emosi negatif ini mencegah pasien mencari layanan perawatan kesehatan profesional dan merupakan hambatan yang signifikan untuk pencegahan dan pengendalian HIV. Diperlukan waktu lama untuk mengubah sikap negatif dan bias masyarakat terhadap AIDS, dan upaya dari seluruh masyarakat akan diperlukan untuk mengatasi stigma yang terkait dengan AIDS. Tidak mudah untuk segera mengurangi diskriminasi sosial.

Namun, mengurangi stigma yang terinternalisasi dan stigma keluarga akan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup ODHA. Intervensi khusus diperlukan untuk meningkatkan pengenalan HIV di antara ODHA dan anggota keluarganya, untuk mendamaikan mereka. Hasil kami menunjukkan bahwa kualitas hidup berkorelasi positif dengan dukungan sosial dan berkorelasi negatif dengan stigma yang dirasakan, yang konsisten dengan penelitian sebelumnya (Bekele et al., 2013; Rao dkk., 2013; Rao dkk., 2012).

B. Pembahasan

Beberapa hasil penelitian yang ada dalam tabel 3.2 tentang kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS, yang memberikan kesimpulan bahwa dari ketujuh table literature review, menunjukkan hasil dimana tujuh memiliki korelasi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS dan satu jurnal literature review menunjukkan hasil yang rendah untuk kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS. Terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup HIV/AIDS yaitu :

a. Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin dalam kualitas hidup juga bisa menjadi konsekuensi dari perbedaan jenis kelamin dalam penyakit mental seperti gangguan mood, gangguan kecemasan dan gangguan psikosomatik lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Kualitas hidup pada wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki, wanita akan lebih mungkin untuk melaporkan keadaan fisik yang tidak menguntungkan bagi dirinya daripada pria karena pria diharapkan untuk memiliki sikap yang lebih tabah

b. Usia

Orang tua dengan HIV/AIDS umumnya dikaitkan dengan kesehatan fisik dan mental yang lebih buruk dan penurunan dramatis dalam kesehatan fisik dan mental dari waktu ke waktu. Sementara itu, kaum muda memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik.

c. Keadaan Keluarga

Hubungan yang stabil dalam keluarga memiliki kontribusi yang baik terhadap kualitas hidup, jika hanya dalam kesehatan fisik. Selain itu, kehadiran anak dalam keluarga merupakan sumber kebahagiaan bagi orang tua, karena anak membantu menstabilkan situasi keluarga.

d. Agama

Tingkat spiritualitas atau agama yang lebih tinggi dikaitkan dengan kualitas hidup orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Spiritualitas atau agama berkorelasi dengan persepsi kehidupan yang lebih baik pada orang dengan HIV/AIDS. Selain itu, agama atau spiritualitas juga dapat menjadi coping yang efektif untuk merespon kondisi yang ada pada penderita HIV/AIDS. Hal ini diperkuat dengan penegasan Douaihy dan Singh (2001) bahwa Spiritualitas merupakan dimensi penting untuk merasakan kesejahteraan pada orang dengan HIV/AIDS. Spiritualitas pada orang yang terinfeksi HIV dianggap sebagai jembatan antara perasaan putus asa dan makna hidup.

g. Dukungan

Menurut (Shishehgar dkk,2016) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas hidup, antara lain usia, status perkawinan, tingkat pendidikan dan indeks massa tubuh. Di sisi lain, menurut Coetzee (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup adalah gaya coping,

penyesuaian mental, dukungan sosial, stigmatisasi, depresi, sosial ekonomi, sosial budaya, jenis kelamin dan perkembangan penyakit.

Penelitian menunjukkan bahwa orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang memiliki dukungan keluarga yang baik akan memiliki kualitas hidup yang baik (96,7%). Di sisi lain, orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang kurang mendapat dukungan keluarga akan memiliki kualitas hidup yang buruk (20%). Hasil uji Spearman's rho diperoleh nilai $p = 0,001$ lebih kecil dari nilai $= 0,005$, maka disimpulkan ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup pada ODHA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang terlibat dalam penelitian ini berusia antara 26 dan 35 tahun, perempuan, dan sudah menikah. Ini karena, terlepas dari kenyataan bahwa struktur pasangan seksual bergantung pada usia, perempuan muda lebih berisiko tertular HIV daripada laki-laki muda. Penelitian (Lisa Anita Sari, 2020) menyebutkan bahwa secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan respon sosial ODHA di Yayasan Kanti Sehati Sehati Kota Jambi. Semakin besar dukungan keluarga yang diperoleh maka respon sosial ODHA akan adaptif. Upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah dengan memberikan edukasi kepada keluarga penderita HIV/AIDS agar dapat menjadi sistem pendukung utama dan pertama untuk mempertahankan derajat kesehatan penderita HIV/AIDS dengan memberikan dukungan yang berarti sehingga

dampak negatif yang ditimbulkan oleh respon maladaptif dapat diminimalkan.

Sedangkan penelitian (Moreno-Montoya et al., 2018) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien adalah hubungan sosial ekonomi (jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, ras, tingkat sosial ekonomi, ketergantungan pada pendapatan keluarga, pekerjaan). hubungan) semua Faktor di atas adalah yang mempengaruhi kualitas hidup pasien HIV/AIDS, semakin baik kriteria di atas, semakin baik kualitas hidup pasien HIV/AIDS.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mugomeri et al., 2016) yang mengatakan bahwa dukungan sosial menghasilkan kepercayaan diri dan dimensi vitalitas dan fungsi sosial. Sebaliknya, kami menemukan hubungan terbalik antara dimensi rata-rata kinerja emosional dan dukungan sosial afektif yang dirasakan, serta antara dimensi kinerja fisik dan kesehatan umum dan dukungan sosial yang menghasilkan kepercayaan diri dan kualitas hidup yang baik untuk HIV. . / AIDS. pasien AIDS.

mengatakan bahwa kualitas hidup pasien HIV/AIDS yang baik dipengaruhi oleh dukungan keluarga, dukungan sosial, ekonomi, jenis kelamin, usia yang baik akan membuat kualitas pasien HIV/AIDS akan membaik, berbeda halnya dengan dukungan keluarga dan sosial yang kurang akan mengakibatkan kualitas hidup juga akan memburuk. Berbeda halnya dengan penelitian yang mengatakan kualitas hidup pasien

HIV/AIDS yang baik memiliki dukungan psikologis yang baik karena dukungan psikologis berhubungan dengan kualitas hidup pasien HIV/AIDS.

Cherry et al., (2018) mengatakan bahwa kualitas hidup pasien HIV/AIDS yang baik dipengaruhi oleh dukungan keluarga, dukungan sosial, ekonomi, jenis kelamin, usia yang baik akan membuat kualitas hidup pasien pasien HIV/AIDS meningkat, berbeda dengan dukungan keluarga dan kurangnya pelayanan sosial akan mengakibatkan kualitas hidup juga memburuk. Hal ini berbeda dengan penelitian (Jiang et al., 2019) yang mengatakan kualitas hidup pasien HIV/AIDS yang baik memiliki dukungan psikologis yang baik karena dukungan psikologis terkait dengan kualitas hidup pasien HIV/AIDS.

Menurut penelitian (Mugomeri et al., 2016) dukungan keluarga, dukungan sosial, ekonomi, pendapatan keluarga, jenis kelamin, usia dan semangat hidup merupakan kunci kualitas hidup penderita HIV/AIDS dalam hal pelayanan yang diberikan kepada keluarga, support system yang diberikan agar klien dapat menjalani penyakitnya

Kualitas hidup penderita HIV/AIDS dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dukungan keluarga, dukungan psikologis, dukungan sosial ekonomi, pendapatan keluarga, usia, umur dan agama, sehingga dapat diterapkan berbagai intervensi, seperti:

a. Terapi Spiritual

Dalam penelitian Mozhdeh et al (2019) tentang pengaruh terapi spiritual terhadap kecemasan pada remaja penderita kanker, subjek penelitian ini adalah remaja penderita kanker dan mengalami trauma psikologis, berjumlah 40 orang dari Dr. The Sheikh Mashad Children's Therapeutic Center. , dalam penelitian ini tidak menjelaskan karakteristik usia responden. Seperti pembacaan ayat suci Alquran yang diberikan kepada klien dan terapi dzikir.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian pustaka ini adalah artikel yang digunakan sebagai referensi yang memenuhi syarat kriteria inklusi dan eksklusi serta yang memiliki nilai tinggi berdasarkan penilaian *Guideline Review* dari *Joanna Briggs Institute* masih terbatas. Sumber data yang berindeks baik dalam level nasional maupun internasional juga masih sedikit dalam memuat dan membahas terkait kualitas hidup klien masih kurang dalam hal pencarian literature dan interfensi.

D. Implikasi Penelitian

Implikasi dari hasil penelitian yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti berikut :

1. Pelayanan Keperawatan

Hasil penelitian didapatkan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien maka diperlukan untuk memberikan dukungan kepada pasien

HIV/AIDS seperti dukungan keluarga, dukungan lingkungan, sosial, ekonomi, pendapatan keluarga, umur, agama dan semangat hidup dalam pengobatan, hal ini lah yang harus ditekankan pada keluarga klien yang menderita HIV/AIDS maka dari itu diharapkan kepada pelayanan keperawatan harus memberikan dukungan penuh kepada pasien dan memberikan edukasi terkait apa yang dibutuhkan klien dengan keadaan yang menderita penyakit HIV/AIDS.

2. Bidang Pendidikan

Hasil yang telah diperoleh dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu keperawatan, dalam bidang keperawatan islami khususnya institusi-institusi yang mengintegrasikan ilmu keislaman ke dalam ilmu keperawatan yang bisa menerapkan ilmu spiritual yang harus diberikan kepada klien untuk ketenangan jiwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan tentang Kualitas hidup pasien HIV/AIDS, maka dapat disimpulkan bahwa :

Dalam memperbaiki kualitas hidup klien maka diperlukan suatu dukungan keluarga, dukungan sosial, ekonomi, keuangan keluarga, umur, lingkungan, agama dan dukungan psikologis dan dibutuhkan pula edukasi dan intervensi yang baik dalam memperbaiki kualitas hidup klien

B. Saran

Berdasarkan hasil dari studi literatur yang telah dilakukan tentang Kualitas hidup pasien HIV/AIDS, terdapat beberapa saran sebagai upaya dalam mengembangkan hasil penelitian yaitu :

1. Bagi institusi pendidikan

Melalui hasil penelitian yang diperoleh peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi bagi institusi pendidikan, terutama bagi mahasiswa yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang harus diberikan kepada penderita HIV/AIDS

2. Bagi penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan juga bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian tentang Kualitas hidup klien, agar kiranya kita dapat memperbaiki kualitas hidup pasien penderita HIV/AIDS.

3. Bagi pelayanan keperawatan

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan bagi tenaga medis khususnya perawat agar kiranya mengaplikasikan Ilmu atau hal – hal yang harus diberikan dalam memperbaiki kualitas hidup pasien penderita HIV/AIDS.

4. Bagi individu dan kelompok masyarakat

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan kepada individu maupun kelompok masyarakat agar memaknai penelitian ini tentang apa yang harus kita lakukan kepada penderita HIV/AIDS dan mengingat perlunya memberikan dukungan kepada pendrita HIV/AIDS untuk memperbaiki kualitas hidup mereka ingat “jauhi penyakitnya bukan jauhi orangnya”



L

A

M

P

I

R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

N

Lampiran I

Table Penilaian Artikel menurut STROBE

<i>Nilai STROBE (1 poin maks)</i>	<i>No. Referensi</i>																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<i>Judul dan Abstrak</i>	√	*	*	√	*	*	*	*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
<i>Latar Belakang</i>	√	√	√	√	*	√	*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
<i>Tujuan Penelitian</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√	x	√	x	√	√	√	x	x	√
<i>Desain Studi</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
<i>Setting Studi</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	√	√	x	*	√	*	*	x	√	√	√
<i>Subjek Terjangkau</i>	√	√	√	√	x	√	√	√	*	√	x	*	x	x	√	√	√	√	*
<i>Variabel yang Diteliti</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	√	√	√	√	x	√	√	√	√	x	√

LAMPIRAN
HASIL PENELITIAN

Daftar Periksa Penilaian Kritis JBI untuk Studi Sectional Cross Deskriptive Study

Peninjau : Tanggal :
 Penulis : Tahun :
 Catat Nomor :

NO	PERTANYAAN	YA	TDK	TDK JELAS	TDK DAPAT DIJELASKAN
1	Apakah kriteria yang dimasukkan dalam sampel jelas didefinisikan?				
2	Apakah subjek penelitian (sample) dan populasi dijelaskan dengan detail?				
3	Apakah Metode yang digunakan digambarkan dengan jelas ?				
4	Apakah kriteria objektif yang digunakan sesuai dengan standar pengukuran ?				
5	Apakah faktor perancu diidentifikasi?				
6	Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu dijelaskan?				

7	Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan ?				
8	Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai ?				

Penilaian keseluruhan :

Termasuk

Mengecualikan

Cari info lebih lanjut

Komentar termasuk alasan pengecualian

Lampiran II

Daftar Periksa Penilaian Kritis JBI untuk Studi Sectional Cross Analitik

JURUSAN ILMU KEPERAWATAN

Peninjau :

Tanggal:

Penulis :

Tahun:

Catat Nomor:

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KES

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN M

No	Pertanyaan	Jurnal								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	2020
1	Apakah kriteria yang dimasukkan dalam sampel jelas didefinisikan?	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Apakah subjek penelitian (sample) dan populasi dijelaskan dengan detail?	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Apakah Metode yang digunakan digambarkan dengan jelas ?	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Apakah kriteria objektif yang digunakan sesuai dengan standar pengukuran ?	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Apakah faktor perancu diidentifikasi?	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu dijelaskan?	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan ?	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai ?	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Penilaian Keseluruhan : Sertakan Kecualikan Cari Info Lebih Lanjut

Lampiran III**Daftar Periksa Penilai Kritis JBI untuk Studi Kohort**

Peninjau :

Tanggal:

Penulis :

Tahun:

Catat Nomor:

No	Pertanyaan	Jurnal	
		(10)	(11)
1	Apakah kedua kelompok serupa dan direkrut dari populasi yang sama?		
2	Apakah eksposur diukur dengan cara yang sama dan dijelaskan secara rinci?		
3	Apakah paparan diukur dengan cara yang valid ?		
4	Apakah faktor perancu diidentifikasi?		
5	Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu dijelaskan?		
6	Apakah rekrutmen peserta dideskripsikan dengan jelas sesuai dengan sample atau variable atau kriteria inklusi ?		
7	Apakah hasil diukur secara valid ?		
8	Apakah durasi waktu tindak lanjut digunakan cukup lama dan tepat?		
9	Apakah tindak lanjut sudah dilaksanakan dan sesuai, jika tidak, apakah ada alasan yang dijelaskan ?		
10	Apakah strategi untuk mengatasi tindak lanjut yang tidak lengkap ?		
11	Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai?		

Penilaian Keseluruhan : Sertak Kecualikan Cari Info Lebih Lanjut

Lampiran IV

Daftar Periksa Penilai Kritis JBI untuk Studi Kohort

Peninjau : Tanggal :
Penulis : Tahun :
Catat Nomor :

NO	PERTANYAAN	YA	TDK	TDK JELAS	TDK DAPAT DIJELASKAN
1	Apakah kedua kelompok serupa dan direkrut dari populasi yang sama?				
2	Apakah eksposur diukur dengan cara yang sama dan dijelaskan secara rinci?				
3	Apakah paparan diukur dengan cara yang valid ?				
4	Apakah faktor perancu diidentifikasi?				
5	Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu dijelaskan?				
6	Apakah rekrutmen peserta dideskripsikan dengan jelas sesuai dengan sample atau variable atau kriteria inklusi ?				
7	Apakah hasil diukur secara valid ?				
8	Apakah durasi waktu tindak lanjut digunakan cukup lama dan tepat?				
9	Apakah tindak lanjut sudah dilaksanakan dan sesuai, jika tidak, apakah ada alasan yang dijelaskan ?				
10	Apakah strategi untuk mengatasi tindak lanjut yang tidak lengkap ?				
11	Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai?				

Penilaian keseluruhan : Termasuk Mengecualikan Cari info lebih lanjut

Komentar termasuk alasan pengecualian

Lampiran IV

Daftar Periksa Penilaian Kritis JBI untuk Studi Kontrol Kasus

Peninjau : Tanggal :

Penulis : Tahun :

NO	PERTANYAAN	YA	TDK	TDK JELAS	TDK DAPAT DIJELASKAN
1	Apakah kelompok kontrol yang dipilih sesuai kasus dan berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan ?				
2	Apakah peserta (kelompok) kasus dan kontrol memenuhi syarat dalam studi kasus ?				
3	Apakah kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi kasus dan kontrol sesuai ?				
4	Apakah metode yang digunakan jelas digambarkan, apakah validitas dan realibilitasnya jelas ?				
5	Apakah kelompok kasus dan kontrol diukur dengan cara yang sama?				
6	Apakah faktor perancu diidentifikasi?				
7	Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu dijelaskan?				
8	Apakah hasil dinilai dalam standar valid untuk case dan kontrol?				
9	Apakah periode percobaan dilakukan dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang singkat?				
10	Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai?				

Catat Nomor :

Penilaian keseluruhan : Termasuk Mengecualikan Cari info lebih lanjut

Komentar termasuk alasan pengecualian

Daftar Periksa Penilaian Kritis JBI untuk Studi Sectional Cross Analitik

Peninjau : Tanggal :

Penulis : Tahun :

Catat Nomor :

Penilaian keseluruhan :

NO	PERTANYAAN	YA	TDK	TDK JELAS	TDK DAPAT DIJELASKAN
1	Apakah kriteria yang dimasukkan dalam sampel jelas didefinisikan?				
2	Apakah subjek penelitian (sample) dan populasi dijelaskan dengan detail?				
3	Apakah Metode yang digunakan digambarkan dengan jelas ?				
4	Apakah kriteria objektif yang digunakan sesuai dengan standar pengukuran ?				
5	Apakah faktor perancu diidentifikasi?				
6	Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu dijelaskan?				
7	Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan ?				
8	Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai ?				

Termasuk

Mengecualikan

Cari info lebih lanjut

Komentar termasuk alasan pengecualian

Instrumen Penilaian Dengan *STROBE* (*Strengthening the Reporting of
Observational Studies in Epidemiology*)

Item	Nomer Item	Rekomendasi
Title and abstract	1	Identifikasi desain studi dari judul dan abstrak dan diperlukan penggunaan kalimat umum dan secara eksplisit. Dalam abstrak harus terdapat: <ol style="list-style-type: none"> a. pertanyaan penelitian; b. deskripsi singkat metode dan hasil; c. hal-hal penting seperti jumlah sampel, estimasi hubungan, dan pengukuran yang tepat untuk variabel dan perancu, d. kesimpulan; dan e. kata kunci penelitian.
Introduction Background/ Rationale	2	Latar belakang menjabarkan topik dan <i>gaps knowledge</i> yang terjadi. Terdapat referensi mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diangkat, lebih baik lagi menyertakan jurnal meta analisis.
Objectives	3	Tujuan merupakan penjabaran detail tujuan penelitian. Pada tujuan harus mencakup 4 komponen, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Populasi 2. Paparan 3. Luaran 4. Parameter Dapat berbentuk kalimat atau kalimat tanya.
Methods Study design	4	Peneliti harus menyatakan studi desain yang digunakan (antara <i>cohort</i> , <i>cross-sectional</i> , atau <i>case control</i>) dengan penjelasan teknis desain studi.
Setting	5	Informasi <i>setting</i> meliputi: populasi, lokasi, waktu yang terperinci (bukan hanya rentang waktu saja), follow up

		dan waktunya.
Participants	6	<p>1. <i>Cohort</i> → kriteria inklusi dan metode <i>follow up</i>; Bila dilakukan <i>matching</i>, sertakan kriteria dan jumlah masing-masing kelompok terpapar dan tidak terpapar.</p> <p>2. <i>Case control</i> → kriteria inklusi, cara menentukan kelompok kasus dan kontrol serta perbandingannya; Bila dilakukan <i>matching</i>, sertakan kriteria dan jumlah kontrol untuk setiap kasus.</p> <p>3. <i>Cross-sectional</i> → kriteria inklusi dan cara penentuan subjek penelitian.</p>
Variables	7	Menjabarkan semua variabel termasuk variabel luaran, paparan, predictor, perancu potensial dan hal yang dapat memodifikasi efek secara potensial. Apabila diperlukan, sertakan kriteria diagnosis.
Data sources/ Measurement	8	Cara untuk mengukur paparan, perancu, dan luaran berpengaruh terhadap reliabilitas dan validitas penelitian. Oleh karena itu penting bagi peneliti menyertakan validitas dan reabilitas termasuk referensi standar yang digunakan.
Bias	9	Peneliti dapat mengidentifikasi bias potensial dalam penelitian. Secara spesifik arah dan besar bias harus didiskusikan.
Studi size	10	Pentingnya penentuan besar sampel pada studi observasional tergantung pada konteks. Peneliti harus mampu menjabarkan kalkulasi penentuan besar sampel dan pertimbangan lain yang menentukan sampel.
Quantitative Variables	11	Peneliti memilih mengumpulkan dan menganalisa data kuantitatif mengenai paparan, efek modifikator, dan

		<p>perancu. Peneliti dapat mengumpulkan data kuantitatif tersebut dan menjelaskan mengapa dan bagaimana mengelompokkan data kuantitatif. Apabila data dilaporkan dalam bentuk tabel harus menyertakan jumlah kasus, kontrol, orang berisiko dan orang yang sedang dalam risiko bukan hanya mengenai nilai pengukuran efek atau hasil dari <i>model fitting</i>.</p>
Statistical Methods	12	<p>(a) Jelaskan semua metode statistik, termasuk yang digunakan untuk mengontrol untuk perancu.</p> <p>(b) Jelaskan metode yang digunakan untuk meneliti subgrup dan interaksi.</p> <p>(c) Jelaskan bagaimana data yang hilang itu ditujukan.</p> <p>(d) Cohort studi: Jika berlaku, jelaskan bagaimana hilang dari follow up. Studi kasus-kontrol: Jika berlaku, jelaskan bagaimana pencocokan kasus dan kontrol ditujukan. Studi cross-sectional: Jika berlaku, jelaskan metode analisis dengan mempertimbangkan strategi sampling.</p> <p>(e) Jelaskan sensitivitas setiap analisis.</p>
Results Participants	13	<p>(a) Laporkan jumlah individu pada setiap tahap studi- misalnya, jumlah orang yang potensial sebagai subjek, pemeriksaan kelayakan, dikonfirmasi memenuhi syarat, ikut serta dalam penelitian, melengkapi <i>follow up</i>, dan dianalisis</p> <p>(b) Berikan alasan untuk tidak berpartisipasi pada setiap tahap.</p> <p>(c) Pertimbangkan penggunaan <i>flow diagram</i></p>

Descriptive data	14	<p>(a) Berikan karakteristik peserta penelitian (misalnya, demografi, klinis, sosial) dan informasi di eksposur dan <i>confounder</i> potensial.</p> <p>(b) Tunjukkan jumlah peserta dengan data yang hilang untuk setiap variabel.</p> <p>(c) studi Cohort: Meringkas waktu-misalnya tindak lanjut, rata-rata dan jumlah total.</p>
Outcome data	15	<p>Studi Cohort: melaporkan jumlah luaran atau ringkasan penilaian sepanjang waktu</p> <p>Studi kasus-kontrol: Laporan angka dalam setiap kategori paparan atau ringkasan penilaian sepanjang waktu.</p> <p>Studi cross-sectional: Laporan jumlahluaran atau ringkasan penilaian.</p>
Main results	16	<p>Peneliti memberikan estimasi yang belum disesuaikan, estimasi setelah menyesuaikan perancu, dan presisi. Terdapat penjelasan mengenai perancu yang disesuaikan dan mengapa dimasukkan. Peneliti memberikaan batasan apabila variabel kontinu dikategorisasikan. Apabila berhubungan, terjemahkan estimasi risiko relative menjadi risiko absolut pada periode waktu yang berarti.</p>
Other analyses	17	<p>Menjelaskan analisis lain apabila dilakukan seperti analisis subgroup dan analisis sensitivitas.</p>
Discussion Key results	18	<p>Diskusi dibuka dengan ringkasan singkat tentang apa yang menjadi penemuan utama pada penelitian. Ringkasan singkat akan membantu pembaca menilai apakah interpretasi dan hasil yang diberikan peneliti didukung dengan penemuan-penemuan yang ada.</p>
Limitations	19	<p>Mengungkapkan kekurangan penelitian. Dapat dengan</p>

		cara membandingkan dengan penelitian pada literatur lain mengenai validitas, <i>generalizability</i> dan presisi.
Interpretation	20	Berikan interpretasi secara keseluruhan hasil mempertimbangkan tujuan, keterbatasan, banyaknya analisis, hasil dari penelitian serupa, dan bukti lain yang relevan.
Generalizability	21	Diskusikan adanya validitas eksternal. Apakah hasil dapat diterapkan pada populasi yang berbea, apakah data yang dikumpulkan masih relevan, apakah penelitian pada satu negara dapat diterapkan pada negara lain.
Other information Funding	22	Peneliti perlu untuk memberikan keterangan mengenai pendanaan. Informasi meliputi sumber dana dan peran <i>founder</i> pada penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, F. &. (2014). Kemampuan Interaksi Sosial Antara Remaja yang Tinggal di Pondok Pesantren dengan yang Tinggal Bersama Keluarga. *Jurnal Fakultas Psikologi*, 2(2), 71–75.
- Ani. (2017). KONSEP FITNAH DALAM AL-QUR'AN (Suatu Kajian Tahlili atas QS al-Anfal/8:25). *Skripsi .Uin Alauddin Makassar*.
- Ardian, N., Kasmini, O. W., & Wijayanti, Y. (2020). *Life Quality Perception of Positive HIV Sufferers in Semarang City*. 5(2), 110–118.
- Banna, Triani, D. (2019). *WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE : Kualitas Hidup Dengan HIV Dan AIDS (ODHA) Ditinjau Dari Kepatuhan Minum Obat Antiretroviral (ARV). Vol.1 No.*
- Batubara, S., Kedokteran, F., Islam, U., Utara, S., Kedokteran, F., & Batam, U. (2020). *Meningkatkan Kualitas Hidup Penderita HIV / AIDS Melalui Penggunaan Antiretroviral (ARV) dan Dukungan Keluarga*. 2(2).
- Bunjoungmanee, D. (2014). Quality Of Life Assessment Among Patients Living With HIV/AIDS At A Tertiary Care Hospital In Thailand. *The Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health*, 45(4): 834-842.
- Carsita, Wenny, N., & Mirah, Asmi, K. (2019). Kualitas Hidup ODHA Di Kecamatan Bongas. *Jurnal Keperawatan Profesional (JKP)*, 7(Nomor 2), 1–14.
- Cherry, A., 1 □, M., Nurdin, M., Pratiwi, I. G., Keperawatan, J., & Naskah, G. (2018). Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Pada Orang Dengan Hiv Dan Aids. *Jurnal Kesehatan Prima*, 13(1), 76–84. <https://doi.org/10.32.807/jkp.v13i1.211>
- Children, H. C. F. (2014). *Obat Antiretroviral*.
- Cooper, V., Clatworthy, J., Harding, R., Whetham, J., Brown, A., Leon, A., Marent, B., West, B., Caceres, C., Lockhart, D., Garcia, D., Fatz, D., Wallitt, E., Beck, E., Gomez, E., Teofilo, E., Gonzalez, E., Garcia, F., Henwood, F., ... Mandalia, S. (2017). Measuring quality of life among people living with HIV: A systematic review of reviews. *Health and Quality of Life Outcomes*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/s12955-017-0778-6>
- Cuschieri, S. (2019). The STROBE guidelines. *Saudi Journal of Anesthesia*, 13(5), 80–89. https://doi.org/10.4103/sja.SJA_543_18
- Degroote, S., Vogelaers. D., & Vandijck, D. M. (2014). What Determines

HealthRelated Quality of Life Among People Living With HIV. *An Updated Review of the Literature. Archives of Public Health*, 72(40), 1–10.

- Derrickson, T. &. (2016). *Dasar Anatomi & Fisiologi: Pemeliharaan Dan Kontinuitas Tubuh Manusia*. EGC.
- Dinkes, K. M. (2016). *Profil Kesehatan Kota Makassar Tahun 2015*. Dinas Kesehatan.
- Fajriyah, Y. L., Demartoto, A., & Murti, B. (2018). The Effect of Depression, Stigma, and Peer Support Group, on the Quality of Life of People Living with HIV/AIDS in Solo Plus Peer Support Group, Surakarta, Central Java : Literature review. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 03(01), 27–36. <https://doi.org/10.26911/thejhp.2018.03.01.03>
- Frandsen, T., & MB, E. (2018). The impact of PICO as a search strategy tool on literature search quality: A systematic review. *J Med Libr Assoc*, 106, 420–31.
- Gati Murwani, W., Fatmawati, S., & Wulandari, R. (2017). Hubungan Tingkat Spiritualitas Dengan Tingkat Kualitas Hidup Pasien Hiv/Aids Di Poliklinik Vct Rsud Dr. Moewardi Surakarta : Sistematic Review. *Skripsi Stikes Aisiyiyah Surakarta*.
- Hanafi, R., Bidjuni, H., & Babakal, A. (2016). Hubungan Peran Perawat Sebagai Care Giver Dengan Kualitas Hidup Pasien Penyakit Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis Di Rsup Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *Jurnal Keperawatan UNSRAT*, 4(1), 105344.
- Handayani, A. &. (2017). Stigma Terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Sebagai Hambatan Pencarian Pengobatan: Studi Kasus Pada Pecandu Narkoba Suntik Di Jakarta. *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Humaniora Dan Manajemen Kesehatan*, 45(2), 81–88.
- Hidayat, A. A. A. (2007). *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan* (Edisi 2). Salemba Medika.
- Hidayati, A. . dkk. (2019). *manajemen HIV/AIDS terkini, komprehensif, dan multidisplin*. Airlangga university press.
- Hikmat, H. (2015). Zero Perilaku Diskriminatif Terhadap Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA). *Artikel Staf Ahli Bidang Dampak Sosial*.
- Indonesia, J. G. W. L. (2016). *HIV Dan AIDS. In Buku Kesehatan Dan Hak Sosial Serta Reproduksi Gwlmuda*. Jaringan Gaya Warna Lentera Indonesia.
- Jadhav, P. S., Laad, P. S., & Chaturvedi, R. M. (2017). Quality of Life Factors Affecting Quality of Life in People Living with HIV / AIDS in An Urban Area. *Int J Community Med Public Health*, 4(8), 3031–3036.

- Jiang, T., Zhou, X., Wang, H., Luo, M., Pan, X., Ma, Q., & Chen, L. (2019). Psychosocial factors associated with quality of life in young men who have sex with men living with HIV/AIDS in Zhejiang, China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(15). <https://doi.org/10.3390/ijerph16152667>
- Kemenag, R. (2018). *Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Menuju Keluarga Sehat*. Kementerian Agama RI.
- Krisdayanti, E., & Hutasoit, J. I. (2019). Pengaruh Coping Strategies terhadap Kesehatan Mental dan Kualitas Hidup Penderita HIV/AIDS positif: Literatur Review. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 2(3), 179. <https://doi.org/10.32584/jikj.v2i3.440>
- Kusuma, H. (2011). Hubungan Antara Depresi dan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Pasien HIV/AIDS yang Menjalani Perawatan di RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta. *Thesis. Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia*.
- Leminaria Naibaho, Palupi Triwahyuni, J. R. (2017). Fenomena kualitas hidup orang dengan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome. *Jurnal Skolastik Keperawatan*, 3(1), 59–63.
- Liping, D. (2015). Quality Of Life Of People Living With HIV/AIDS: A Cross-Sectional Study In Zhejiang Province, China. *Plos One*, 10(8): E0135705.
- Lisa Anita Sari, D. (2020). Respon Sosial Penderita HIV / AIDS di Yayasan Kanti Sehati Sejati Terhadap Dukungan Keluarga. *Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 5(2), 284–293.
- Lusiana, A. (2018). *Hubungan Antara Spiritualitas Dengan Kualitas Hidup Pada Orang Dengan Hiv/Aids (Odha)*.
- Masriadi. (2016). *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*. Trans Info Media.
- Mbada, D. (2013). Health-Related Quality Of Life And Physical Functioning In People Living With HIV/AIDS: A Case–Control Design. *Health And Quality Of Life Outcomes*, 11:106.
- Medeiros, R. C. da S. C. de, Medeiros, J. A. de, Silva, T. A. L. da, Andrade, R. D. de, Medeiros, D. C. de, Araújo, J. de S., Oliveira, A. M. G. de, Costa, M. A. de A., & Dantas, P. M. S. (2017). Quality of life, socioeconomic and clinical factors, and physical exercise in persons living with HIV/AIDS. *Revista de Saude Publica*, 51, 66. <https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2017051006266>
- Miyada, S., Garbin, A. J. I., Wakayama, B., Saliba, T. A., & Garbin, C. A. S. (2019). Quality of life of people with HIV/AIDS - The influence of social determinants and disease-related factors. *Revista Da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, 52(April 2018), 0–1.

0157-2018

- Moreno-Montoya, J., Barragán, A. M., Martínez, M., Rodríguez, A., & González, Á. C. (2018). Calidad de vida y percepción de apoyo social en personas con HIV en Bogotá, Colombia. *Biomedica : Revista Del Instituto Nacional de Salud*, 38(4), 577–585. <https://doi.org/10.7705/biomedica.v38i4.3819>
- Mugomeri, E., Chatanga, P., & Notoane, M. J. (2016). Reported quality of life of HIV-positive people in Maseru, Lesotho: The need to strengthen social protection programmes. *HIV and AIDS Review*, 15(2), 61–68. <https://doi.org/10.1016/j.hivar.2016.03.006>
- Mulyani, E. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. UNY Press.
- Nofitri. (2009). Gambaran Kualitas Hidup Penduduk Dewasa Pada Lima Wilayah Di Jakarta. In *Skripsi*. FPSI UI.
- Novrianda, N. & A. (2018). Dukungan Keluarga Dan Kualitas Hidup Orang Dengan HIV/AIDS Di Lentera Minangkabau Support. *Jurnal Ilmu Keperawatan Medial Bedah*, 1(1), 26–37.
- Pardita, D. (2014). Analisis Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Psikologis Penderita HIV AIDS Di Kota Denpasar. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(2), 193–199.
- Potter and Perry. (2005). *Fundamental Keperawatan Volume I*. EGC.
- Prevention, C. D. F. C. A. (2018). *HIV*.
- Rajab, A. (2019). Pengalaman Tentang Stigma Pada Pasien ODHA (Orang Dengan Hiv/Aids) Di Puskesmas Kota Makassar. *Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Rihaliza, R., Murni, A. W., & Alfitri, A. (2020). Hubungan Kepatuhan Minum Obat dan Jumlah CD4 Terhadap Kualitas Hidup Orang dengan HIV AIDS di Poliklinik Voluntary Counseling and Testing RSUP Dr M Djamil Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(4), 162–167. <https://doi.org/10.25077/jka.v8i4.1135>
- Secretary's Minority AIDS. (2019). *HIV Treatment as prevention*.
- Segal, R. & S. (2019). *Coping With Grief And Loss*.
- Shisheghar, F., Tehrani, F.R., Mirmiran, P., Hajian, S., & Baghestani, A. R. (2016). Comparison of the Association of Excess Weight on Health-Related Quality of Life of Women with Polyste Ovary Syndrome. *An Age and BMI Matched Case Control Study*, 11(10), 1–11.
- Soedarto. (2012). *Alergi Dan Penyakit Sistem Imun*. Sagung Seto.

- Sofia Roshma, D. (2014). *Keperawatan Gerontik*. Deepublish.
- Studi, P., Keperawatan, I., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Ibu, H. (2020). *Respon Sosial Penderita HIV / AIDS di Yayasan Kanti Sehati Sejati Terhadap Dukungan Keluarga*. 5(2), 284–293.
- Tao, D. (2016). Relationship of stigma of depression among newly HIV diagnosed chinese men who have sex with men. *AIDS and Behavior*, 21(1).
- Taylor, D. (2020). *The Literature Review: A Few Tips On Conducting It*. Writing Advice.
- Welly Vitriawan, Ratna Sitorus, Y. A. (2017). Pengalaman Pasien Pertama Kali Terdiagnosis Hiv/Aids: Studi Fenomenologi Dalam Perspektif Keperawatan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11, 6–12.
- WHOQOL. (2017). *The World Health Organization Quality Of Life*.
- Widoyono. (2011). *Penyakit Tropis : Epidemiologi, Penularan, Pencegahan, dan Pemberantasannya*. Erlangga.
- Xiaohua, W. R., Jia, C. R., Huigen, H. R., Ziping, L. M., Xianhong, L. R., & Honghong, W. R. (2015). Perceived stigma, medical social support and quality of life among people living with HIV/AIDS in Hunan, China. *Original Articiel*, 8(2), 169–174.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apnr.2014.09.011>
- Yuliyanti, A. . (2013). Kualitas Hidup Orang Dengan HIV Dan AIDS (ODHA) Di Kabupaten Jember. *Skripsi Bagian Epidemiologi Dan Biostatistika Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember*.